






III



SOL AD ASPECTUM NUNCIAT DE GLORIOSO DEO,
INSTRUMENTUM EST ADMIRABILE, OPUS ALTISSIMI.



HISTORIA
PLANTARUM
UNIVERSALIS

Tomus II,
Auctoribus

JOHANNES BAUHINO,
Archiatro.

JOH. HENRICO CHERLERO,
Doctore;
Basiliensibus

Quam recensuit et auxit
DOMINICUS CHABRAEUS,
D. Genevensis

Jussu vero publici fecit,
FR. LUD. AGRAFFENRIED,
Dñs in Gertzensee etc.

EBRODUNI.
MDC LI.

Dominus creavit e terra pharmaca, vir prudens non gravabitur
illis. Eccl. xxxix. 4.



Conr. Meyer fecit.



7

HISTORIA
PLANTARVM
VNIVERSALIS NOVA
ET ABSOLVTISSIMA
CVM CONSENSV ET DISSENSV
CIRCA EAS.

Auctoribus

IOH. BAVHINO ILL. CELS. VIRT.
ARCHIATRO

ET

IOH. HEN. CHERLERO PHILOS. ET MED. DOCT.
BASILIENSIBVS.

Quam recensuit & auxit

DOMINICVS CHABRÆVS MED. DOCT.
GENEVENSIS.

Iuris verò publici fecit

FRANCISCVS LVD. A GRAFFENRIED
Dominus in Gertzensee &c.

Continens

DESCRIPTIONES STIRPIVM EXACTAS, FIGVRAS NOVAS, EX IPSO
Prototypo maxima ex parte depictas: earumdem Sarum, Cultum, Mangonia: item Vires omnige-
nas: Præparationes, Extractions, ac Distillationes præcipuas: Exoticarum Orien-
tis atque Occidentis, aliarumque ante nostrum seculum incognitarum,
supra mille H storias novas: Synonyma: Æquiuoca: Succe-
danea: & præcipuarum Linguarum appellationes.

In primis verò

PLACITA VETERVM GRÆCORVM, ARABVM, LATINORVM,
& posterioris seculi Scriptorum:

INTERPRETATIONES AC CORRECTIONES SENTENTIARVM
obscurarum & deprauatarum.

Notantur ERRORES eorum qui de Plantis scripserunt: Ac continentur
plæraque omnia, quæ

THEOLOGI, IURISCONSULTI, MEDICI, PHILOSOPHI, HISTORICI, POETAE
Grammatici, Geoponici, Architecti, alique de Plantis promulgarunt.

Vt meritò omnium Herbariorum vicem supplere queat.

TOMVS II

EBRODVNI

CIO. IO. CLI.



A MAGNIFIQUE ET PUISSANT SEIGNEUR

FRANCOIS LOVYS DE GRAFFENRIED

SEIGNEUR DE GERTZENZEE, DV GRAND ET SOUVERAIN

Senat de la ville de Berne, Baillif d'Yverdon, Sur l'Impression de son Herbar.

QUATRAINS

SEigneur Agent infiny, ce Puissant Oeconomie
Qui a basti d'un rié tout ce grand Vminers,
Aux herbes a donné des offices diuers,
Et des Proprietez pour la santé de l'homme.
Le sçauant Esculape a esté le premier,
La Princesse Circé a esté la seconde,
Et Hermes le troisiéme qui ont laissé au monde
Les Vertus des herbages sa au siecle premier.
Dés lors les plus grands Rois ont reputé à gloire
De s'attirer du nom de quelqu'herbe nouvelle
Gentil de Gensiane, & Prunel de Prunelle,
Artemise d'Armoysse, Eupator d'Eupatoire.
Alors on appelloit les enfans du Soleil
Les Doctes qui auoyent des herbes la notice.
Comment nommiera-on cil qui d'un artifice
Admirable produit, cet Herbar nomparsil
Si d'une seule plante adiointe au Catalogue
Des autres, ils ont fait tant d'estime & de cas,
Qu'est-ce que nous dirons? Ains ne dirons nous pas
Que nous devons chanter de GRAFFENRIED l'Eloge?
De GRAFFENRIED qui est un Seigneur Magnifique,
Un Baillif debonnaire, amateur de Justice,
Fauteur de l'Innocence, & punisseur du vice
Grand Pilier au Canton de BERNE l'Heroïque.
Qui non pour son esgard, ou profit, ou trafic,
Estale en ce Volume mille plantes incognues,
Au grand Dioscorido, les raisons qui l'ont meues
A ce noble dessein, C'est le bien du public.
Tu me diras que Cherler, que Chabrey, que Baubin,
Y ont contribué de leur peine beaucoup,
Il est vray, mais c'est luy qui à fait ce beau coup
D'auoir heureusement mis cet ouure a sa fin.
Oeure qui prendra fin, seulement quand ce tout
Sera réduit en feu. Mais tandis que la fleur
Verdira au printemps, la memoire & l'honneur
De ce DE GRAFFENRIED ne verra point de bout.
De tous vous Medecins, commencez les premiers
A louer ce Chef d'ouure, qui vous fournit la source
De pouuoir à l'honneur bien remplir vostre bourse.
Et couronner vos chefs de verd. yans lauriers.
Vous humains qui auez icy un repertoire,
De remedes certains pour soulager vos maux
Exaltez ce Seigneur, benissez ses travaux
Et en rendez à DIEU louange, honneur, & gloire.

G. BYLET Sieur de Gram



DOMINVS A GRAFFENRIED ANAGRAMMA.

DIGNVS ODE FERRI MANA

EVOLVTIO.

SINT Mecœnates, non deerunt, Flaccet, Marones,
Ritè Poëta canit, quisquis & ille fiet.
Hoc, liber iste docet, cuius monumenta laboris
Magnorum crexit dextera gnara Virum.
Quid sit Amaltheæ cornu qui nôsse laborat
Huius præstabit lectio lecta libri.
Quid Chiron, Pæon, Podalyrius, atque Machaon,
Quid medicus Lucas, præstiteritque Philon.
Clusius, atque Tragus, Gesnerus, quid Lonicerus
Gesseri, hoc præiens continet omne Liber.
Plantigraphorum alijs stipata volumina voluant,
Sed tibi præ reliquis hic liber vnus erit.
Acriter heic dum tres desudauère Marones,
Eni nec Mecœnas defuit astes ope.
His grauis astes erat mox Grafenriedius Heros,
Gentis qui & mentis nobilitate valet.
Promouet hic operas, argenti & prodigus auri,
Inuita perâ nec remoratur opus.
Eius magnifico sumptu bene seruit incus,
Contuleret magnis vt liber iste Viris.
Non fiet hic dignus Mecœnas ferrier ode?
Staret inoblitus non sibi semper honos?
Vespasiane vale qui spurca lucella matellis
Exigis, hinc putet sordida fama tibi.
Sed Grafenriedi, saluèque, vigéque, viréque,
Lilia dum violam & florea rura dabunt.
Non lucra putida amas, sed commoda totius orbis,
Publica priuatis anteferendo lucris.
DIGNVS es ergo vehi nostra Venerabilis ODE,
MANA fama Viro huic inclyta, viua manet.
Claudam oden voto: Grafenriedi, viue Galeni
Lustra senex, à te cætera nãmque petes.

Ereoslichon per phalacin.

est IeVs MeDICVs IVVans probat Vs
ægrils Vera panax, & Vnlsanans.

Obseruantiz E.F.

L. M. Q.

Hen. Ernius H.F. Tigur.
Ecclesiæ Capellanz D.


CLARISSIMO Dn. DOCTORI CHABRAEO.
MEDICO PERITISSIMO, HISTORIÆ PLANTARVM
instauratori diligentissimo.



R 1 1 Apollinæ quamvis cernantur in arte
Censores multi, Medicas qui spernere Musas
Conutiis tentant, illas & dente maligno
Rodere non cessant : Medici non tollere possunt
Nodosos morbos, dicentes, & mala tristis
Dira lepræ, tum vastantis contagia pestis :
Insuper in campis crescit non herbula contra

Vim mortis rigidæ. Tua sed mens dedita Phœbo,
Scommata committit furiosis flatibus ista.
Nam sapiens clarum parcat contemnere Phœbum.
Hinc bene, gentis Apollinæ Propagator & Auctor,
Herbarum virtutes, radicesque potentes,
Et folia, & flores, caules, & semina, fructus
Diversos, pisces varios, mineralia plura,
Narcissos, ceras flauas imitantia pruna,
Ac pyra cum cerasis, Thibæi mora cruoris,
Castaneasque, nuces, & mespila, dulcia poma,
Tum dulces Bacchi succos, ratione proponis.
Hic liber iste tuus se nobilitate tuetur :
Nam sensus dubios, pugnantiâ scripta virorum
Doctrinâ Medicâ clarorum, soluere præstat.
Succurrit sanis, illis bona secula præbet,
Omnibus inferuire solet mortalibus ægris
Nam morbus cerebrum magnus si corripit ipsum,
Actio si cordis vitalis læsa veneno,
Actio si jecoris turbatur bile funesta,
Actio si stomachi læsa est, si tussis acerbat
Pulmones molles, tenes quando dolor vrget,
Si lacerat dentes, oculos, & membra fatigat.
Tum truculenta tabes corpus cum conficit omne,
Si rabie canis, & si læsit aranea valde,
Si nocuit serpens, si vipera dente momordit,
Tunc adfert Medicas herbas, & vincere morbos,
Corporis ac vires direptas reddere, tentat.
Singula quis numeret : restant perplura canendi,
Sed, peto, cognoscas animo mea scripta benigno,
Nestoris ac superes Musis comitantibus annos.

Observantiæ & amicitia E. F. L. M. Q.
Fridericus Scriberus Medicinæ Doctor.



SERENISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO,
DOMINO

HENRICO D'ORLEANS

LONGOVILLÆ NEC NON ESTOVTENVILLÆ DVCI:
GALLIÆ PARI:

Nouicastro & Vallangini SUPREMO PRINCIPI:

COMITI in Dunois, S. Paul, Chaumont, Gournay, & Tancarville:

DYNASTÆ in Colummiers en Brie:

BARONI in Vouant, Veruant, Monstreuilbellay, Humbic, Bricquebec &c.

Normanniz CONNESTABILI HÆREDITARIO:

Ejusdémque Prouinciz, Christianissimæ Majestatis nomine ADMINISTRA-
TORI & PROREGI:

Regiorumque Galliz Ordinum EQVITI.



VEM nuper SERENISSIME
PRINCEPS, obuiis excepit vlnis
Medicorum turba, denuò prodit
Naturæ Genius. Et qui duodecim
antehac promulgatis Libris Arbo-
rum & Fruticum Historiam absol-
uit: totidem jam ad aliorum, non
minùs cognitu necessariorum, gra-
phicam Enarrationem accingitur.

Hic enim Suffrutices: hic Rosæ: hic scandentes Plantæ: hic
Dionysio sacre: hic Legumina: hic Cereales Fruges: hic Gra-
mina: hic Iunci: hic Arundines: hic Flores hortorum decus: hic
Rapunculi & Campanulæ: hic Nasturtia: hic Culinariæ her-
bæ: hic Mollientes & Oleraceæ: hic Lactucæ & reliquæ Pap-
posæ recensentur, delineantur, pinguntur.

Hic tandem Veterum & Recentiorum circa eas Placita
obscura reteguntur, alia illustrantur, Nodi soluuntur, Dissi-
dia componuntur, notantur Lapsus.

Tom. II.

Nec deerit in quomiretur Mundus se tot cecutiuisse sæculis: atque adeò Poëtæ factus sit locus Epiphonemati

*Lucratius
Val. Flaccus.* *O miseras hominum mentes, ô pectora caca!
Qualibus in tenebris vita, quantisq; periculis
Degitur hoc aui quodcunque est?*

Et ut EN ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ, hic non Aegypti ΑΒΑΣΕΙΣ, sed bifera Alcinoi Viridaria: Horti Adonidis: Insula Tilos, palmarum, vinearum & margaritarum ferax: atque quicquid in physicarum rerum adytis & penetralibus aperiendis potuerunt celeberrimorum Philosophorum ac Medicorum solertia, sedulitas, & candor.

Prodit igitur alius nostri IOH. BAVHNI foetus: nec redimere volentibus longiores trahere datum moras. Diphilo in suis producendis sint alii tardiores: Accessæi expectent alii Lunam: Nobis humano generi prodesse animus.

Qui autem Primogenito Præpotentes inuenimus Patronos, à quibus scilicet inter alia & Cunas habuerat: Eandem & huic optamus sortem, sub cuius auspiciis cum nomine & splendore publici fiat juris. Minimè enim nos latet quibus hæc sine ridica vitis & Coeli & animalium exponatur iniuriis: Quàm fastidiosa sit hujus æui peruersitas: Quàm magnus sit labor cani lectum sternere: Quàm crescere aliquid ægrè ferat Inuidia: Quàm graues sint Zoilorum morsus: Præsertim verò quam aduersus ejusmodi malè feriatos homines præstet tutelam Principum virorum patrocinium.

Nec diu deliberandum fuit, PRINCEPS SERENISSIME, cujus clientelæ hoc committeretur OPVS. Ad te enim trahebant ejus cum tuis harum regionum amplis Ditionibus loci natalitij vicinitas, ac SERENISSIMAE CELSITVDINIS TVAE erga omnes humanitas, in literas & literatos pronus animus: maximè verò innatum GRAFFENRIEDANI GENERIS illi quam facimus parti de SUPREMIS Nouicastrensium DYNASTIS bene merendi studium. Cujus sicut & foelicia & grata ab Auo & à Parente piæ memoriæ edita fuere specimina; sic & NOBIS in eadem humili deuotione pergendi animus, & ejusdem spes gratiæ quæ à CELSIS-

SISSIMIS PRINCIPIBUS Majorum nostrorum accessit rebus.

Ecquem porrò Nostris hisce & incomparabilis illius BAVHINI lucubrationibus præcellentiore fauctorem Mæcenatēve præfecissemus, quā Principem cujus Stemma veneratur Gallia: cujus in Rempubicam Christianam merita celebrat Orbis: Principem pace bellōque, sago togāque, Arte & Marte, apud omnes Gentes celeberrimum. Principem præpotentem, clementissimum, munificentissimum. Principem cui labor in negotiis, fortitudo in periculis, industria in agendo, celeritas in conficiendo, & consilium in prouidendo, tanta in vno sunt, quanta in multis aliis etiam insignibus vix reperiantur. Principem quem numerosissimos exercitus cum summo imperio foelicissimè ducentem vidit Germania, vidit Italia, viderunt Iberia, Burgundia, & Lotharingia, semper & vbique vincentē. Principem Monasteriensis PACIS inter CAESAREAM, CHRISTIANISSIMAM, & SVECICAM MAIEST. aliāsque nonnullas Europæi Orbis primarias POTESTATES, nuper initæ præcipuum ARBITRVM. Atque adeò Principem quem meritò dixeris omnibus reddidisse omnia, singula singulis: prostratosque restituisse Magistratus & ficas effecisse ficas. Principem tandem, ut in his encomiorum suffitibus parcī simus, quem vnum rerum Natura videtur edidisse, ut ostenderet quid in summa Fortuna summa posset Virtus.

Talem nos eligimus Patronum, PRINCEPS SERENISSIME, Vniuersalis Plantarum Historiæ SECUNDAM hanc PARTEM, quā par est humili submissione, SERENISSIMAE CELSITVDINI TVAE offerentes & consecrantes.

Auiculæ, cū nihil possent opulentiùs, plumas ad magnificentissimum Delphici Apollinis templum vtrò feruntur detulisse: Apes ceras. Sic nos ad tuas aras quod opis est nostræ: nec dedignaberis Munus quod studio suo dignum plurimi censuere Reges, quodq; Mausoleis prætulit Cariæ regina, quæ post tot annorum myriades adhuc per Artemisiam viuit. GLORIAM sic TVAM tradent Posteris, & in huius Vniuersi extremis claram conseruabunt, omnia ea quæ in hominis & pecudum escam, in

aruorum & hortorum decus cedunt, quibus hic, quanta quanta nostra sunt, eminentissimo LONGOVILLAEI NOMINI litamus.

Supereſt, PRINCEPS SERENISSIME, vt obſequij hoc anathema, humillimæ obſervantiæ monumentum, et qualecunque beneficiorum redhoſtimentum, quod Sacrario tuo appendere annitimur, quo ſoles omnia, benigno & ſereno ſuſcipias vultu. Supereſt tandem, vt ab illuſtriſſimo & Splendidiffimo Nomine Tuo huic abiturienti tuarum laudum Præconi nitorem & commendationem accedere lubens patiare: nôſque tibi in omnem ſervitutem deditiſſimos ſemper in poſterum ſtudio & favore tuo proſequi digneris.

Sic, ô Nate in exemplum virorum Principum, Neſtoreos quàm foeliciffimè viue annos. Sic impleat Iehoua petitiones tuas. In his deſinunt votis

PRINCEPS SERENISSIME,

SERENISSIMÆ TVÆ CELSITVDINIS


Cientes Humillimi,

FRANCISCVS LVDOVICVS à GRAFFENRIED
D. in Gertzenzee, Ebrodunenſis Bernenſium Ditionis pro tempore Præfectus.

&

DOMINICVS CHABRÆVS M. D.
Illuſtriſſ. Celſit. Vvirtemb. à Conſiliis Medicis,
Vrbisq; Ebrodunenſis Medicus ordinarius.

*Ebroduni Heluetiorum Calendis Iun.
Anno ſalutis M. DC. LI.*



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XIII.

663

FRVTICES ET SVFFRVTICES FLORE

ROSEO HISVE AFFINES.

PROXIMUM nunc locum dabimus in fruticibus ac suffruticibus, quos v. scilicet quodam flore, veluti ornamento præcipuo natura donavit: consensum forte sit locum, si separemus, quia similitudinibus & amicitia illa quasi ressera ab eadem sunt unita.

DE CISTO VETERVM SENTENTIAE.

C A P. I.

Theophr.

Error mul-
torum.

Cisti duo
genera.

Plin.

Cisti mas-
culina.

Diosc.
Cistharos
& Cistha-
rus.



VNT, auctore Theophrasto, eorum [quibus aculeus deest] genera complura, summisque, differentius discreta, ut *xistod* [Gaza, *xistod* Hedera vertit, ut in Theophr. legitur. quem Plinius, Ruellius & olim etiam Clusius sequutus est, sed male: legendum enim *xistod*, Cisti, ut post etiam Clusius] cuius duo genera traduntur, mas & foemina. Quoniam altera majus, durius, pinguiusque folium [vox *qubd* in quibusdam Theophr. c. dicitur male desideratur] habeat, flore moue ad purpuram inclinatam: ambabus tamen flores Rosae [in Aldino codice male omittitur v. xistod] sylvestribus proximi, verum minores & sine odore.

Plinius non animadvertens distinctionem inter *xistod* & *xistov*, Theophrastem in emendatam lectionem sequitur, ita scribens: Hederæ [legendum *cisti*] duo genera prima, mas & foemina: major traditur mas, corpore & folio duriore etiam ac pinguiore & flore ad purpuram accedente. Vtriusque autem flos similis Rosæ sylvestri, nisi quod careat odore. Vtuntur [ad coronas] & Hederæ [leg. *cisti*] flore purpureo. Est & in alio genere, earum sylvestribus Rosae similis. Et in iis quoque color tantum delectat, odor autem abest. Graeci vicino vocabulo Cisthon appellant fruticem majorem Thymo, foliis Ocimi. Duo ejus genera. Flos masculo rosaceus, foemine albus. Plinius autem de Dioscoridis Cisto dicere, ambiguum non est, teste Cornario, etiam si ex toto non omnia ita respondeant, & hoc sanè loco Hederæ nomen [Cisthon] Cisto vicinum dicit. Theophrasti porò Græcum exemplar multis hinc seculis mendosum fuisse testatur Clusius & alij. *xistod* igitur pro *xistod*, locis citatis apud Plinium legendum esse constat. Cistus [xistov] quem aliqui Cistharon aut Cistaron [xistov & xistaron] vocant, frutex est iuxta Dioscoridem in petrosis locis nascent, multis ramis præditus, foliosus, non altus, folia

habens rotunda, acerba, hirsuta: flores velut Mali puriceæ [puriceæ] sed in foemina albi.

Ast quid Plinius rectius, quoniam Dioscorides, mas-
culum descripsit, roseum florem habere dicens, res
ipsa inquit Marantha, ostendit: nam si hanc floris
similitudinem ad colorem referat Dioscorides, siue
ad figuram (quamvis ad figuram potius referre vi-
deatur, quod ostendit ex hoc, quod de foemina sub-
dit, ei florem albescere) minus apta comparatio est.
Etenim Punicorum floribus phœniceus color in-
est, quem vix in alio reperias, si Theophrasto credi-
mus, lib. 1. c. 21. quanquam hoc de arboribus solis in-
telligere voluisse credendum sit. Est & alterum, per-
git Dioscorides, Cisti genus, quod ab aliquibus Le-
don appellatur. Ex his itaque constat Cisti duo pri-
ma genera tacere Veteres, Marem & foeminam: Dio-
scoridem verò tertium addere, Ledon dictum. Ve-
rum de hoc & alio nos plura trademus, sed potissi-
mum de iis, quorum icones exhibemus.

Frutex *xistov*, *xistod* aut *xistaron* Græcis dictus, Latini ut Scribon. Largus, quoque Cistus appellatur, & lingua
Rosæ silvatica, seu canina. Arab. *Kanter*, *Althra* sive
Lbaie althra, inquit Matth. Germ. *Cistern* & *Blin*. Gall.
Rose canine. Ital. *Cisto*. Cast. & Cat. *Estepa*. Portug. *Cer-
guacos*. *Cergacos*. Angl. *Listus* / *Cist busche* / *oder* / *Cist
sage* / *With sage*.

Cistus, inquit Dioscorides, vim habet adstringen-
tem, unde flores triti in vino austero, bis in die poti,
dysenterici commodant: ipsi verò per se illiti, nomas
depascentes cohibent. Cum cerato verò, ambusta &
vetera ulcera sanant.

Hæc paulò aliter ita Plinius. Cisti genera ambo
profunt dysentericis & solutionibus ventris, in vino
austero ternis digitis flore capto, & similiter bis die
poto. Vlceribus veteribus & ambustis cum cera: &
per se oris ulceribus.

Cisthus aut Cisthanus, auctore Galeno frutex est
gustu adstringens, omnibusque particulatim operi-
bus. Acta non folia & parva germina trita adeo de-

Marantha
notat Dio-
scoridem.

Cisti tria
genera
Diosc.

Nomen
lingue.

Virus &
usum
Dysenteria
Noma
Ambusta
Vlcera.

Solutio
generis.

HISTORIAE PLANTARVM

ficcant, adstringuntque, ut [?] ulcera glutinare valeant. At flores magis sunt efficaces, aded, ut cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque achumiditates sanent. Cataplasmatibus illita ulcerum putredinosa iuvant. Est enim facultas eorum non instrenue desiccans, ferèque secundi excessus à temperatis absoluti. Aded verò frutex hic frigidus est, ut tepidi caloris sit particeps.

Imbecillitates.
Humiditates.

Temperamentum.

CISTVS MAS, MAIOR, FOLIO rotundiore. CAP. II.

Generatissima.

Mas cum dicitur.

Mas flos.

Cistus mas Bononiensis.

Apulensis.

IN Cisti tractatione Dioscoridis vestigiis insistentium, tria summa genera constituenda, deinde singula in eas species, quas tum nos, tum alij observant, dividenda, initium à mare facturis. Matrem verò cum Clusio appellamus, qui flore quidem ut reliqua Cisti genera sylvestrem Rosam æmulatur, sed colorem rubrum, nunc saturatiorem, nunc dilutiorem habet: cujus quatuor species foliorum forma, aut colore inter se differentes numerantur.



Apud clariss. virum igitur, Vlysem Aldroandum Bononiæ primò vidimus Cistum mare, Monspelulano multò maiorem, foliis rugosis, rotundioribus & nigrioribus, non tamen exactè rotundis, ut olim pingebat Matthioli. Ramum observavi inter plantas, Domini Theodori Zvingeri, qui delatus dicebatur ex Apuleia, cujus folia erant minus nigra, & pluribus pilis albis, longioribusque abundabant.

Deser. Clus.

Ramuli.

Folia.

Flos.

Capitula.

Semen.

Clusius sic de scribit: Humanà altitudine plerumque attollitur, ut reliqui Cisti, fruticosus: ramulis aliquantulum incanis: folia reliquis majora & quasi orbiculata, hirsuta nonnihil & rugosa: flos reliquis forma similis paulò major & colore saturatiùs rubente: capitula hirsuta, dura, pentagona, dicendis majora, in quibus semen rufum, majus, quam aliorum continetur.

An Anguil.

Rosa maritima.

no.

An Anguil Cistus mas, Rosa marina & Rosole in Lanzana quam ait Hypocistidem & Ladanum ferre? An Cordo in sylv. Obl Cistus frutex ex folio oblongo & tamen subrotundo Salviæ aliquo modo simili, majori, hirsuto cavoque, semine in pericarpis minuto, Papaveri simili?

Matth. no.

latetur.

Matthioli olim Cistum marem pinxit folio admodum rotundo, & floribus integris, Campanulam exprimentibus (quum tamen Rosarum instar folia separata habeat) qualem plantam nunquam vidimus, eam igitur iconem in post. commen. meritò, ut falsam rejecit, in com. Lat. & Ital. cum mag. fig. & in hist. Germ. aliam reponens meliorem.

Turn. la.

ps.

Turnerus malam Matthioli figuram habet nomine Cisti maris, quem dicit se vidisse in Italia.

Dodonzi Cistum existimasset lib. de flor. cap. 29. nisi aliò videretur reduci similis figura à Clusio: unicam enim Cisti figuram ponit, relicta priore, quæ Cisti femina erat, ut arbitror.

Spem.

Lacunæ dicitur Cistus Mas Matthioli. Cistus masculus Lonic. Clus. Hisp. & Hist. Cistus quartus

mas sine figura. Lob. Obs. Cistus mas quartus Clusij.

Hist. Lugd. præter meliorem figuram Cisti maris Matthioli, habet etiam duas priores falsas sub his titulis: Cistus mas folio rotundiore Matthioli, & Cistus cum Hypocistide Matthioli. Ponit præterea descriptionem ex Clusio Cisti quarti.

Camer. in Matth. Hist. germ. ponit figuram cui inscriptio, Cistus femina cum Hypocistide. Eandem etiam ponit in ejusdem Epit. sub hoc titulo Hypocistis. Videtur autem mihi facta eius icon ad ramum quendam à me Bononiæ collectum anno 1563. & Gesnero missum. Erat tamen sine Hypocistide, & sine floribus. Gesnerus autem ad meam plantam quam adhuc habeo, annorarat, esse Ladanum foliis rotundis, Hypocistidem Matthioli.

C. Bauh. apud Matth. exhibet pro Cisto mare, figuram malam. Est enim eadem cum priore falsa Hist. Lugdunensis. Falsam autem eam esse ipsemet fateatur, ita enim scribit: Matthioli in suis editionibus diversas proponit icones: inter magnas enim figuras habet Cistum, cujus folia ex rotunditate oblonga sunt: inter minores verò eam proponit foliis rotundis, proculdubio imitari volens Dioscoridis descriptionem, qui talia in Cisto requirit folia. Cum verò talibus foliis marem hætenus non viderimus, sed oblongis, adposuimus figuram talem sub Hypocistide. Ait præterea C. Bauh. in animadv. in Hist. Lug. Historiæ Cistum marem Matthioli, & Cistum marem primum Clusij: esse duas figuras unius Cisti. Sed & hoc imaginarium. Sunt enim diversarum plantarum figurae, ut notum est utramque noscentibus. Est Cistus mas: Clusij, Cistus mas Monspelienis, folio oblongo albido. Sed cur hoc loco tam sicco pede transit impudentissimum illud Matthioli figmentum, Cistum marem folio rotundiore cum Campanæ effigie floribus, ex mera descriptione excogitatis (nihil enim tale unquam visum in natura) quæbis depingit, non sine fæda, ambitionisque plena impostura. C. Bauh. pin. Cistus mas, sive folio rotundo hirsutissimo.

Clusij Cistus quartus mas invenitur in regno Valentino & Aragonum in Italia etiam frequens est.

CISTVS MAS II. FOLIO longiore.



Eadem altitudine, ne, qua primus Clusij Cistus mas Monspel. folio oblongo, albido, assurgit, interdum etiam maiore, non minus fruticoso stipite, neque minore ramorum frequentia: minus tamen candidat. Folia præterea eodem ordine disposita, molliora, longiora, angustiora, & magis acuminata sunt: Flos superiori similis, incarnatus: capitulis etiam & semine parum differt. Dubium non est, quin

Hypocistis sub hoc genere crescat, nullam tamen observavit Clusius, qui Cistum marem secundum nominat.

Lob. Obs. & Ic. & Ger. Cistus mas angustifolia. Tab. Icon. & Hist. Cistus mas angustifolius Cistena. rōplcin

Synonyma cum nomine. lob. long.

röflein. Lugd. Cistus mas 2. Clusij. C. Bauh. pin. Cistus mas 2. five angustifolius. Belg. Cistus mannefen met smalle bladeren. Angl. The male holly Rose.

Locum
tempus.

Nascitur in Hispania, & diutius reliquis maris generibus florere: illius item ramuli teneriores sub Autumno, rorulentum quiddam pingue & odorum contrahunt.

CISTVS MAS III. FOLIIS dilutius virentibus.

Deser.
Folia.

Priori brevior est, non minus tamen fruticosus, sed tenuioribus ramis: folia ejus jam dicto breviora & dilutius virore prædita, magis rugosa, pingua, & odorata: flos alius similis, dilute rubens & aliquantulum odoratus, quam notam in reliquis Cisti maris generibus non deprehendit Clusius; hujus capitula superioribus paulò minora sunt, & suis involutris, quæ florum calycis sunt, diutius occultantur, semen in capitulis æquale.

Flor.

Capitula.

Semen.

Locum.

Cistus
femina Pat.


Hunc Cistum marem tertium (cujus autor nullam ponit figuram) in Lusitania solum sponte nascentem supra Vlyssiponem itinere Conimbricensi, atque etiam in maritimis observabat. Nos Patavij vidimus Cistum, quam sceminam vocabant, diversam nonnihil à Monspessulana, folio multò majore, rugosiore, densiore, hirsuto, formæ ferè ejusdem: ramis nigris, & minimùm tomentosis, quales etiam sunt Monspessulanae, fortassis id fecit cultura. Si flore fuerit rubente, considerandum, an sit eadem cum Cisto Clusij mare tertio. Lob. Obler. Cistus mas tertius Clusij. C. Bauh. pin. Cistus mas 4. five folio brevior.

CISTVS MAS IV. MONSP. FOLIO oblongo, albido.

Deser.

Lignum.
Cortex.

Rami.
Folia.



Frutex est, quàm scemina robustior, albidior, bicubitalis, hirsutus, Clusio autore, humana altitudine, plerumq; fruticans, ligno satis fragili, & candicante cortice recto, frequentibus ramis alternatim semper ex adverso respondentibus. Folia sibi invicem opposita, & teste Clusio, molliora & longiora in novellis plantis, in adultis verò, contractiora, duriora & aspera, adstringentis gustus: utrinque incana, hirsuta,

longiora, quàm latiora, infernè rugosa, angustiora, spissiora què, quàm scemina, non rotunda, ut in Cisto à Matthiolo olim exhibito. Flos coloris rosæ incarnatæ apices luteos in medio contentos ambit, magnus, in folia quinque divisus, non, ut in Cythino & Campanula, integer, ut pingebat Matthiolus, deciduus, nec singularis, hinc inde per ramos sparsus, ut ipsius icon habebat, sed confertus, agminatim stipatus, numerosior in ramulorum extremis, ex brevibus, robustis pediculis, non debilibus oblongis & singularibus, ut in Cisto scemina, quibus deciduentibus, succedunt capitula longè etiam majora & duriora, hirsuta, trifariam secta, perennia, foliolis tribus mucronatis, hirsutis obsepta; pentagona, ut refert

Tom. II.

Clusius, in quibus exiguum semen, ex rufo nigricans, seminis Hyoscyami, aut Papaveris magnitudinis. Ad huius radices, quæ summis cespitibus diffunduntur & coherent, Hypocistidem ille observavit copiosè nascentem, elegantissimam omnium, quas unquam viderit, primo vere, cum Cistus jam ad florendum se parat: Etenim quando primùm ex terra emergit, purpureum five kermelinum sericum esse diceres, deinde paulatim assurgens, & sese explicans, multum de pristini coloris elegantia remittit, cum n Cytinos suos profert, qui candicantes sunt, turgidique, & lentò succo pleni: qui à peritis pharmacopœis in Hypocistidis succum densatur.

Semen?

Hypocistis.

Clus. Hisp. & Hist. post. Cistus mas primus, ab Hispanis, ceu & 2. & 3. & quartus Estepa vocatus.

Lob. Adv. Cistus mas. Obs. & Ic. Cistus mas cum Hypocistide. Lusitanis Cergacos, Italis Cisto.

An Rauvvolf. Cistus flore purpureo? An Calsalp. hunc intelligit his verbis: Alterum genus Cisti, in arenosis maritimis nascitur, folio majusculo & candidiore, flores puniceos fert, latiores: fructum similem, [Cisto femina] sed conceptaculis quatuor distinctum: sub hoc nunquam Hypocistidem repertam scio: Diosc. hunc marem vocat, ut & Plinius flore rosaceo, foliis Ocimi.

Castori, Tabern. Eicon. & Hist. Cistus mas trifolius. Cam. apud Matth. Germ. relicta Matthioli figura, aliam posuit sub titulo Cisti maris. Figura autem ea facta est ad plantam Monspessulanam, quàm Gesnero miseram, quamque adhuc habeo. Eandem figuram ponit etiam in eiusdem Epit. nomine Cisti. An præterea eidem in horto, dicitur Cistus mas?

Hist. Lugdun. Cistus mas primus Clusij. Animadvertit & hic C. Bauh. Hist. Lugdunensem duas figuras ponere, quod est falsum, ut absolutioribus Botaniciis notum est. Est enim Cistus cum Hypocistide Matthioli à Cisto mare primo Clusij diversissimus, & non alius, quàm Cistus mas folio rotundior Matthioli cum falsis floribus Campanulam exprimentibus. Sed posterior figura Clusij sufficiebat, inquit. Vnde miror quomodo vir integer subicere potuerit figuram Matthioli esse falsam, fictam & imaginariam.

Ger. Ang. The male holly Rose with his. C. Bauh. apud Matth. Cistus 2. cui Hypocistis id dicitur, quod ex ipsius Cisti & Ledi radice medio pullulat: Limodori genus vocat Dodonæus. Reperitur rubra, flava, pallida. Eid. in pin. Cistus mas 2. five folio oblongo incano. Provenit in itinere versus Frontignanum inter Saxa, sesquimiliari Gallico à Monspelio, item in monte Setho, florens mense Aprili & Maio. Clusio frequens est hic Cistus eadè in Hispania, præsertim Bætica, tum Lusitania & Gallia Narbonensi.

C. Bauh.

Locum
tempus.

CISTVS MAS V. FOLIIS CRISPIS & quodammodo sinuosis.

Humilis est, & supinus ut plurimam, pedalis ramis, aut paulò amplioribus, multis ex eadem radice prodeuntibus: folia crispa sunt & quodammodo sinuosa, candicante & hirsuta, gustus acerbi & adstringentis: flores ramulorum summitatibus æquali altitudine & quasi umbellatim nascuntur, superioribus paulò minores, sed elegantis ex rubro purpurascens coloris intensioris, quàm in quarto, capitula reliquis minora, suis involutris plerumq; cōtecta, semè cōtinet reliquis simile, sed magis atrum.

Deser.

Folia.

Flora.


Capitula.

Locum
tempus.

C. Bauh. pin. Cistus mas 5. five foliis Chamedrys: Cistus mas 5. Clusij, Lob. Ic. & Lug. Cistus mas supinus fimbriatis & sinuatis foliis Lob. Cistus mas 3. Tabern.

Cistum marem quintum Clusius, in Lusitania tantum nascentem videbat, solo admodum arenoso, nec usquam frequentiore, quàm apud Mona-

A 2



sterium Peralongas dictum, quinto supra Vlyssiponem miliari, semine maturo onustum, in nonnullis plantis, flore etiam Novembri conspecto. Semen in Belgium reversus, aliquot amicis communicabat: sed nemini natus est hic frutex, præterquam uni Petro Coudebourgo pharmacopæo doctissimo, quem tamen diu conservare non potuit: nam subsequens hiems satis rigida abstulit. Florent prædicti Ci-

sti mense Aprili, aliquando etiam maturius, nonnunquam seriis, pro regionum & locorum natura & temperamento: semen Augusto, Septembri, & Octobri maturefcit: Cisti hoc genus peculiariter Lusitanis Rosella vocatur.


Nomina.

Ger. Cistus mas dentatus: Belg. Cistus mannes-
Pen plaeter acerden, ligghende. Angl. Tede hedor
snept male Cistus.

CISTVS FOEMINA MONSPELIANA flore albo, & Hispanica luteo.

C A P. III.

*Cisti femi-
na varie.
var.*



Cistus foemina etiam in suas species distribuenda. Nam aut elatior est, & rectis virgis fruticæ, sicut mas: aut supinus & humi sparsus, ut Erica vulgaris. Deinde utrumque genus, teste Clusio, in colore variat, qui maxima ex parte candidus est, & quandoque luteus. Cistus igitur foemina Monspeliana flore albo, & Hispanica luteo, frutex est, cui folia circinata ferè rotunditatis

Deser.

Edm.

Flores.

vix cedit ejus foliis, quem Bononiæ supra observasse nos retulimus, magis viridia, molliora & latiora, quam in mare Monspelienis: flores in longis pediculis, ut Rosa, sed albi, luteos apices in medio cõercent, non minores, quam mas, multò majores, quam Ledi, in odori, gustu grato ut Ledi, qui exsiccati lutei sunt non minùs quam mas.

*Deser. Clu-
fus
Rami.
Folium,*

Flos.

Clusius sic describit: Est Cistus foemina, frutex ramosus, cubitum interdum altus, nonnunquam humi stratus, gracilibus, nigricantibusque ramis, folio non minore, quam in mas quarto genere, circinata ferè rotunditatis, rudi & aspero, viridi tamen: saporis adstringentis & acerbi: Florem habet paulò minorem, quam mas, quinti generis flori penè similem, album, nonnunquam etiam flavum, luteis fibris, ut in Rosa sylvestri, medium florem occupan-

tibus: capitula minora sunt, mas capitulis, nigriora, non mucronata, sed nonnihil compressa superiore parte, semen paulò nigrius & satis magnum continentia.

Matth. in Diosc. Cistum foeminam proponit sine descriptione, floribus & fructu, quæ accedit ad hanc nostram: in post. com. Ital. & hist. Germ. addidit flores, qui an benè appicti sint, aliorum esto judiciorum: eam ait vocari à rusticis patavinis Salviam salvaticam. Anguill. Cisto foeminæ, rusticis Salvia salvatica. subnasci refert Hypocistidem & Ladanum. Turn. Cistum foeminam à Matthiolo depictam habet, quam ait se vidisse in Angliæ in horto à Sion denominato.

An Bellon. Obs. lib. 1. c. 7. de hac ait: Ladanum non fit in Creta ex Ledo, sed ex Cisto, cujus Cisti species provenit similis in ea parte Galliæ, quæ dicitur Lau-de d'Oise in Ducatu Mainio, præcipuè verò ad Castrum Fouletourte, juxta Soulleuere.

Cord. Hist. Lob. Camer. hort. & Cast. dicitur Cistus foemina. Dodon. in sol. Cistum foeminam videtur appellare, eadem repetens, quæ in flor. hist. dixerat in hist. Gall. pingit pro Cisto non Ladanifera,

ubi marem & foeminam colore florum tantum distinguit. Clus. Hispan. & post. Hist. ait Cistum foeminam Hispanis Xara-estepa: & à Narbonensibus Galliæ incolis, qui circa Monspelium vicinisque locis habitant, Mouges vernacula lingua dici. Rav-volf. est Cistus flore albo: Cæsalp. Cistus flore candido, alicubi Hypocistidem gignens, & Cistus fo-

mina Dioscoridis.

Camer. apud Matth. Germ. & Epit. mutavit figuram, aliamque reposuit, quam Gesnerus curarat pingendam ad ramum Monspelij collectum, quem ei miseram, quemque adhuc habeo: in qua figura pili non placent. Lugd. cum Tabern. & hunc imitato

Gerardo, pro Cisto foemina, præter bonam Clusij figuram, frustra ponunt Matthioli malam. Et hanc quoque C. Bauh. apud Matth. exhibet pro Cisto foemina.

Ipsæ tamen non veritus fuit Lugdunensem idè carpere. Cistus foemina Matthioli (inquit in suis animadv. in Lugd.) & Cistus foemina Clusij: posterior figura servanda erat. Ergo altera rejicienda. Sed quare? cur silentio involuit? quia patrocinium ejus assumpsit. Eid. pin. Cistus foemina 1. sive folio Salviz: Cistus foemina, Gesn. hort. Lac. Est elatior & rectis virgis: est & supinus humi sparsus: in utroque flos candidus, quandoque tamen luteus.


Florentem vidimus Aprili & Maio in sylva Ægremont propè Monspelium & in monte Serbi, in Italia juxta Florentiam: in Sabaudia penes Rodanum. Patavij observatur in montibus Euganeis inter Balneum Aponense & Arqua, ibi aiunt nasci Hypocistim. Bononiæ spontè à Florentia al jugo florebat Aprili. Ejus qui albo est flore, cum recti, tum supini magna est copia in Hispaniis, Lusitania, Gallia, Narbonensi & Aquitanica: qui verò luteum profert, nonnullis duntaxat Hispaniæ locis, & extrema Aquitania Cantabris finitima circa Bayonam se vidisse meminit Clusius.

CISTI SPECIES QUÆDAM HISPANICA flore albo.

Aliquot præterea Cisti genera observantur, quæ ad foeminam veluti ad primarium genus, Clusij judicio, potiùs referenda, quam ad marem, aut Ledon: quandoquidem nullo pingui, lentoque liquore sunt obsita, nec roseum, sive purpureum florem habent. Lugduni demonstrabat nobis Baro quidam Germanus ex Hispaniis reversus Cistialiam quandam speciem, fruticem, ut ex plantæ portione conji-

*Cisti speciem
nova.*

Folia.



Flores.

mucronati, lanugine alba, densaque hirsuti ambiebant totos. An à quoquam sit descripta hæc planta, non potuimus animadvertere.

conficere licebat, parvum, foliolis multis stipatum, non parùm minoribus, quàm in Cisto fœmina Monspeliensium, oblongis, hirsutis, minus rugosis, gustu adstringentibus. Flores non singuli ex ramulis, sed plures simul, ut in Ledo Monspeliensi, pediculis satis longis, hirsutis, incanis insidebant, albidis, Ledo Monspeliensis floribus penè similes, quos nondum explicatos alabastriculi


CISTVS FOLIO HALIMI flore luteo.

Def.

Rami.

Folia.

Flas.



Cisti generi, quod nonnulli Helianthemum vocant, similes, suas fibras in medio continentes: his succedunt longiuscula & triangula capitula, exiguum subrustum semen continertia. Ad hujus radicem Hypocistin nascentem observabam luteam omnino, sive ochrea colore, ipsius plantæ florem colore referentem, quam pueros & pastores manducare intellexi.

Capitula.

Hypocistin.

Loci.

Synon.

Cistus hic frequens est in Lusitania solo arenoso, & aura marina afflato, inter Ericas, non procul Olyssippone, nec usquam alibi Clusio conspectus.

Lobel. Observ. & Icon. plant. Cistus fœmina folio Portulacæ marinx, Cistus primus folio Halimi Clusij. Tabern. Icon. & Hist. Cistus folio Halimi [primus Clusij, addit Hist. Lugd.] sicet & Ger. qui Angl.

Cistus with leanes life sca purfiane vocat. Belg.

Cistus wysken met de bladers van
zee Porceleyn.

Tom. II.

CISTVS FOLIO HALIMI LON. giore incano.




Cistus folio Halimi alter Clusij. Def. Hist. & post. hili. procerior est præcedente, ramis firmioribus, incanis ut præcedens: folia etiam habet Halimi, paulò tamen longiora, angustiora, magis mucronata, & dorso elatiore, incana tamen tota & sicca, subacidi etiam & adstringentis saporis. Illius neque florem, neque semen visum. Provenit ubi præcedens.

Lobel. Obser. & Icon. plant. & Lugd.

Cistus folio Halimi secundus Clusij: Tabern. Icon. & Hist. Cistus folio Halimi secundus. Gerard. Cistus folio Lavendulæ, Angl. Lauander leafed Cistus. Belg. Cistus met bladers van Lauender.

CISTVS FOLIO LAVENDULÆ Clusio, fortè idem cum Helianthemum recto.



Cistus folio Lavendulæ (eundem vel similem fruticem denominamus Helianthemum sive Helianthemum rectum, repertum à socio nostro) plerumque cubitali est altitudine, admodum ramosus, sed brevibus ramis & foliis confertim natis, angustis, incanis, sapore adstringente: flores puri, non multum à superiore differentes, albo colore: semen non observavit Clusius. Est

hic frutex aded Lavendulæ similis, ut nisi odor & sapor prohiberent, pro Lavendula sumi posset: & certe quas plantas sine flore primùm conspexit, pro Lavendula habuit, ideoque negligebat, donec floribus, quos in plantis aliis conspiciebat, adiuvantibus, diligentius observaret.

Solummodò Valentino regno invenit aridis & petrosis locis, quarto à Valentia militari, mensis Aprilis initio. Repertus à socio fidelissimo Domino Leonhardo Rauvvolff in provincia montibus, qui unicaulis erat, rectus, cubitalis: flores in cæumine similes forma Helianthemum lutei & vulgaris coloris: folia autem per caulem multa, longa, similia foliis Lavendulæ. Florebat autem mense Maio.

Lobel. Obs. & Icon. plant. Cistus folio Lavendulæ Clusij & Valerandi. Tabern. Icon. & Hist. Cistus C.

A 3


sten. R. Klein / cuius titulus hic simplex non placet.
Lugd. Cistus Lavendulae folio Clusij. Gerard.
Cistus mas tenuifolius. Ang. Chin-laced Cistus.
Belg. Cistus met bladers van Lavender.

CISTVS FOLIO SAMPSVCI CLVS.
cui macula in flore.

Deser. Ra-
mus.

Folia.

Flor.



Capitula.

Locus.

Synon.

Tabern. no-
tatur.

constat, quorum meditullium macula ex purpura nigricans inficit, villis & staminibus luteis, medium florem occupantibus. Capitula deinde Lini ferè exigua, trigona, in quibus semen minutum Hyoscyami, ex nigro candicans, sive cinereum continetur: totus vero oblongus ille ramulus, qui florem & capitula sustinet, semine maturo arefcit, ut in singulis Cisti generibus.

Primum hic inventus in Castella veteri, supra S. Martin del Castanhal: deinde copiosus in castella nova, circa Caragejo, & toto Batice agro inter Taguin & Anam flumina.

Hispani Quiruela aut Quirivela appellant, communi semine cum Ericæ minoris vulgarioris vocabulo, quia fortassis inter Ericas numerant.

Lobelio, qui inscribit in Obs. & Ico. pl. Cistum folio Sampsuci Clusij, videtur eadem, quæ Helianthes Allobrogum & Gallorum Delphinatis flore albo. Clusij autem figuram habet, verum Cistus Clusij maculas habet ex purpura nigricantes, ergo diversa. Hist. Lugd. Cistus folio Sampsuci Clusij.

Tabern. Icon. & Hist. Sonnenblum / Helianthemum Sabaudicum vocat, & tamen sibi ait incognitum. Quare non placet nonnihil mutata figura & titulus in planta incognita. Gerard. Helianthemum Sabaudicum: Ang. the dwarfed Cistus of Savoie. Belg. Cistus met bladers van Mariolayne / ende schynt te wesen Helianthon van Savoye / ende Dolfine / met witte bloemen.


CISTVS FOLIO THYMI CLVSII,
cum maculis in flore.

Deser. Ra-
mus.

Folia.

Flor.

Cistus folio Thymi, ut annotat Clusius sepè dicto loco, pedali fruticat altitudine, ramulis ex purpura nigricantibus, duris, lignosis, qui magna ex parte sine foliis conspiciuntur, præterquam circa eorum summitates, in quibus confertim nascuntur, exilia adnecum, viridia, Thymi armula, gustu adstringente. Florem fert summis ramis, Cisto folio Sampsuci similem, minore, neque maculis insignitum. Semen non observavit.



Solum autem est conspectus in extrema Batice parte, quæ Castellam & Lusitaniam spectat.

Lobel. Obser. & Icon. Lugd. Cistus folio Thymi Clusij. Tabern. Icon. & Hist. sicut & Gerardo Cistus folio Thymi. Angl. Cistus with the leaves of Thyme. Belg. Cistus met de bladers van Thymme. Hispan. Perdigueta.

Synon.

DE LEDO ET LADANO.
CAP. IV.

EST & alterum Cisti genus, inquit Dioscorides, quod ab aliquibus Ledon appellatur, frutex simili modo, ut Cistus, nascens, sed longiora & nigriora folia habet, quæ in vere pinguetudines quasdam contrahunt. Hujus foliorum vis adstringens est, faciens ad quæ etiam Cistus. Fit autem ex ipso id, quod Ladarum appellatur. Nam capræ & hirci, folia ipsius depascentes, pinguetudinem palam barbis excipiunt, quæ etiam in semoribus adheret, eo quod sit viscosa: hanc oblatam excolant, & in massas efformatam reponunt. Quidam etiam furculos per frutices trahunt & adherentem ipsis pinguetudinem ita derasam, efformant. Optimum est Ladarum, quod odoratum est, subviride, facile mollescens, pingue, non particeps areæ, nec friabile, sed resinofum. Tale autem est id quod in Cypro nascitur. Nam & Arabicum & Libycum vilius est.

Arabia etiam in Ladano gloriatur, ut habetur apud Plinium: sorte casuque hoc, & injuria fieri odoris, plures tradidere. Capras maleficum aliàs frondibus animal, odoratorum verò fruticum appetentius, tanquam intelligant precia, carpere germinum caules prædulci liquore turgentes, distillantique ab his casu mixturæ succum improbo barbarum villo abstergere. Hunc glomerari pulvere, incoqui sole. Et idem in Ladano caprarum pilos esse. Sed hoc non alibi fieri, quam in Nabathæis, qui sunt ex Arabia contermini Syriæ. Recentiores ex Arabibus Strobos hoc vocant, traduntque silvas Arabum pastui caprarum infringi, atque ita succum villis inhaerescere: verum autem Ladarum Cypri insula esse: ut obiter quoque genera odorum dicantur, quævis non terrarum ordine. Similiter hoc & ibi fieri tradunt, & esse Oesypum hircorum barbis genibusque villosis inhaerens, sed Ederæ [Cisti debet scribere] flore deroso, pastibus matutinis, cum est rotulenta Cypros. Deinde nebula Sole discussa, pulverem in dentibus villis adherescere, atque ita Ladarum depecti. Sunt qui herbam in Cypro, ex qua id fit, Ledam appellant: etenim illi Ledanum vocant. Hujus pingue insidere: itaque attractis funiculis herbam eam convolui, atque ita offas fieri. Ergo in utraque gente bina genera, terrenum & factitium. Id, quod terrenum, est friabile: factitium, lentum. Necnon & fruticem esse dicunt in Carmania, & super Ægyptum per Ptolomæos translatis plantis: aut ut alij generante [vet. generari & id in insula] ut Thun.

Ledon. Dio.

Foliorum
Syn.

Delectus

Ladanum è
Cypro.
Arabicum.
Libycum.

Strobos.

Plinij locum
repositum

Leda herba.
Ladanum.

Ledam duo
genera.

In Carmania
& super
per Ægyptum.
ut Thun.

Colligendi vario. Adulterium. ut *Thuris arborem. Dal. generatib & ibidem cum Thuris arboribus* Scid Thuris arbore colligiq; ut gummi, inciso cortice, & caprinis pellibus excipi. Pretia sunt laudatissimi in libra asses xl. [xxx. d. l. b.] Adulteratur Myrti haccis, & aliis animalium sordibus. Synceri odor debet esse ferus, & quodam modo solitudinem redolens: ipsum visu aridum, tactu statim mollescere, accensu non fulgere, odore jucundo gratum. Myrtata deprehenduntur, crepitantque in igne. Præterea à syncero calculi potius è rupibus inhaerent, quam pulvis. Et Ladano (inquit alibi Plin.) sistitur alvus, utroque, quod in segetibus nascitur, contuso & cribrato: bibitur ex aqua mulsa: item nobile è vino. Lada appellatur herba, ex qua Ladano nunc in Cyprio, barbis caprarum adhærescens, nobilior in Arabia. Fit jam & in Syria, atque Africa, quod Toxicon vocant. Nervos enim in arcu circumdatos lanis trahunt, adhærescente rursus lanugine. Hoc gravissimum odore est, durissimum nuncque tactu. Plurimum enim terræ colligit, cum probeatur maximè purum, odoratum, nolle, viride, resinofum.

Ladanum recensio-rum & officinarum. Ladanum Officinarum laudabile, viscidus est succus, in magnas ossas coactus, easque graves, ex purpura fuscas, odore valido, sed suavi, præsertim si calorem senserit, cuius etiam beneficio mollescit, veluti & mansum, laporem imprimens adstringentem: hoc Ladanum existimamus esse idem, cum veterum Ladano. Hujus autem colligendi rationem miram quandam Bellonius describit, quam ipse in Creta observavit: Græci, inquit, colligendo Ladano peculiare instrumentum parant, vernaculo sermone illis Ergastiri dictum. Est verò id instrumentum rostro dentium experti simile: huic affixæ sunt multæ ligulæ sive Zonæ, è corio rudi, nec præparato confectæ. Eas leniter adfricant Ladaniferis fruticibus, ut inhæreat liquidus ille humor circa folia, concretus, qui deinde à ligulis per summos ardores Solis cultris est abradendus. Itaque Ladano colligendi summus, imò intolerabilis est labor, cum totos dies ardentissimo caniculæ æstu in montibus hædere necesse sit: neque facile quisquam alius ad id colligendum operam sumit præter Calohieros, hoc est, Monachos Græcos. Nusquam autem majore copia per totam insulam cogitur, quam ad montis Idæ radices, pago Cigalunus nuncupato, & apud Milopotamo. Hactenus Bellonius. Siquis tamen in Hispaniis huic colligendo operam navare vellet, multo minore (ut Clusio videtur) negotio, magnam ejus longè purissimi, resinosi, & odorati copiam colligere posset, cum integræ aliquando silvæ inveniuntur omnium pinguiissimi illius Ledi, quod Cistus Ledon flore macula nigricante notato inscribitur: neque illo ex Africa in vecto, magna ex parte impuro, opus esset.

Tempus. *Locus.* *Ladanum in Hispania capisum.* Ladanum, autore Dioscoride, vim habet adstringentem, calefacientem, mollientem, aperientem. Sistit de fluos capillos, ammixtum vino, Myrtæ, & oleo myrteo. Cicatrices decentiores efficit cum vino illitum. Aurium doloribus, cum aqua mulsa, aut rosaceo infusum medetur. Suffitu etiam secundas ejicit. Et duritias in utero pessis ammixtum curat: compositionibus item, quæ dolorem & tussim, eximunt, & malagmatis utiliter ammiscetur. Alvu quoque sistit cum vino veteri potum, ciet etiam urinam.

Vires & usus. Capilli. Cicatrices. Aurea. Secunda. Vetus. Tussis. Alvi fluxus. Urinam cit. Cistus, aut Ladanum in calidioribus regionibus proveniens, tametsi haud alius sit genere, quam qui apud nos nascitur, inquit Galenus, eximiam tamen à regione, ac peculiarem digerentemque caliditatem nactus est: atque utroque à nostrate differt: tum quia frigiditatem deposuit, tum quia calorem assumpsit. Itaque cætera quidem hujus Cisthi, illis quæ in nostrate visuntur, similia sunt. E vero Ladano, quod

Cistus Galenus. Temperamentum. vocant, provenit medicamentum, primo excessu jam quodammodo completè calidum, ut vi & secundum attingat, habens etiam adstrictionis paululum. Ad hæc substantia tenui ac proinde emolliens, sive malacticum moderatè pariterque digrens, ac videlicet etiam in *emulsa*, hoc est, concoquens. Itaque miranda non est, si peculiariter ad uteri vitia conveniat, quandoquidem ad dicta paululum quidem adstrictionis obtinet. Quocirca defluentes capillos retinet. Nam quicquid, ad radices eorum, pravi humoris sederit, id omnino absumit: tum meatus quibus infixi sunt contrahit, & constringit adstrictione. Ceterum, alopecias & ophthalmias sive lippitudines sanare non potest, utpote magis discillorias vires, quam quæ Ladano insunt, poscentes.

Substantia. Vetus. Capillorum fluxus. Ophthalmiam non sanat. Plin. de facultate Ladani sparsim ita scribit. Natura ei, molliendi, siccandi, concoquendi, somnum alliciendi. Capillum fluentem cohibet, nigritiamque custodit: auribus cum hydromelite, aut rosaceo infunditur. Furfures cutis & manantia ulcera sale addito sanat. Tussim veterem cum Styrace sumptum. Efficacissimum ad ructus. Cicatrices cum elegantia ad colorem reducit: suffitu corrigit vulvas; dolori earum exulceratisque imponitur. Denique, si fistula in quacunque parte serpant, Medicorum vitio malè sectis corporibus, auxilio est Ladanum cum castorio. Lad. Cyprium potum interaneorum vitiis occurrit. Ladanum vero segetum contusum febres tertianas leviores facit. Hæc ille, qui confusè satis & ignoranter, ut de aliis, indistinctè hæc recitata colligit.

DE HYPOCISTIDE CAP. V.

Hypocistis. Robethrum. Orobethrum. Cytinus. *Cistus erythranos. Plinius notat.* *Orobethrium. Orobethrum.* *Hypocistis officina.* *Vires.* *Alvi fluxus.* *Sanguinis fluxum muliebres. Plinij error.* *Cistus* radicibus adnascitur quoddam Mali puniceæ Cytino simile, quod Hypocistis [Cistus] dicitur: nonnullis verò Robethrum [Cistus], Sarr. [Cistus], Ald. Orobethrum, Orobethrum Pal.] aut Cytinus [Cistus] appellatur. Est ex ipso quoddam fulvum, quoddam viride, quoddam album: ex quo succus exprimitur, velut ex Acacia. Quidam verò resiccatum ipsum & contusum madefaciunt ac coquunt, & reliqua velut in Lycio faciunt, teste Dioscoride. Sub his [Cistus] maximè nascitur Hypocistis, quam inter Hederas diximus, inquit Plinius: Cysos erythranos ab iisdem appellatur, similis Hedera. Manifestus hic sit Plinij lapsus confundentis Cistum cum Cisso Hedera, de quo errore plura ante. Quia verò (Cornario) Mali punici flori similis est, idem etiam ipsa Hypocistis appellatur Cytinus: Plinius Orobethion habet, sed in manuscripto exemplari Orobethron legitur, omnibus ex æquo obscuris appellationibus: idem Malo granato immaturo similem dicit, & sub Cisso nasci, unde habeat nomen, nostris officinis ut Cistus, ita etiam Hypocistis ignota est: Hypocistidis tamen succum aliunde importatum habent, & re, & usu omnibus notum: an verò genuinus sit, & ex vera Hypocistide, non temerè ambigi putat Cornarius.

Hipp. de nat. mul. Hypocistin ex vino bibitam, secundas & menses detrahare posse ait, cui non assentior hoc medicamento purgari uterum; sed suspicor multa confusè scripta per transcriptores. Vimenim ut Diosc. prodidit, habet eandem quam Acacia, sed magis adstringentem & siccantem, euz facit ad cæliacos, dysentericos, sanguinem per sputum rejicientes, fluxum muliebrem, sive bibatur, sive per clysterem infundatur.

Plinio autore. Cysos erythranos coxendicibus utilis est è vino potus: item lumbis, tantamque vim

accipiunt, ut sanguinem urina detrahant. Plinius confundens Hederam cum Cisto malè tribuit Hypocistidi vires ex eo nunc dictas.

Hypocistis. Hypocistis, quam vocant apud Gal. simpl. multò est magis adstrictoria, quàm folia [Cisti.] Admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis rejectiones, profluvia muliebria, celiacos, dysentericosque affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac firmitatem illi non instrenuè addit. Sic sanè stomachicis Epithematis, hepaticisque commiscetur, & ex viperis confectio Antidoto inditur, nimirum quò corpora confirmet ac roborat.

**Hypocistis-
di planta.** Ceterum Hypocistis in variis provenire plantis creditur, ut in Cisto mare Montpel. flore rubente carneo, uti ex Clusio annotavimus antehac, & ejus descriptionem posuimus.

Casalpinus meminit Cisti puniceo flore, sub qua ait nunquam Hypocistidem repertam se scire: an eundem Cistum intelligat nescimus. Nobis tamen nimium securè affirmare videtur Hypocistidem non ferre, ille non potuit ubique fuisse. In Gallia Narbonensi quidem nos non observamus in hac planta Hypocistin rubram: Clusius autem observavit & ex eo succum densari ait.

Cistus mas Considerandum etiam an Cistus mas major folio rotundiorè à nobis dictus, idem sit, cum Cisto mare, quem ait Casalpinus vocari Rosam marinam & ferre Hypocistidem.

Cistus sam. Cistus quidem semina Monspeulana, flore albo, fertur ferre Hypocistidem.

Cistus folio Sub Cisto folio Halimi, flore Luteo, Clusius observavit Hypocistidem.

Cistus Le- Vtrum præterea Cistus Ledum latifolium idem sit cum Cisto mare Anguillæ, quod Ladanum in Cypro & Italia profert, & Hypocistidem, quoque perpendendum.

Cistus La- Nos in Cisto ladanifera angustifolio Monspeulensi Hypocistidem observavimus, ut suo ostenditur loco.

Cistus Le- Cistus porro Ledum Thymi foliis Clusij, fertur ipse nec illo autore Tubera, quæ Hispanis Turmæ appellantur, vel potius ut existimat Hypocistis.

HYPOCISTIS OFFICINARVM & ejus substituta.

Deser. Succum ex Hypocistide excoctum, qualis ad nos adfertur, & à nobis observatur, in orbiculatos panes concretus, splendido nitore Asphalti nigricans, sed consistentia cerea, ductili, molli: Sapore acidulo cum adstrictione, eo ferè, qui in Myrobalanis ledis observatur, non negaverimus eundem cum veterum Hypocistide.

**Vires &
usque** Insignis Medicus Frisimelica in suis in Diosc. le-
Iluxus tionibus meminit, se in calidis fluxionibus, præfer-
mulicibus. tim seminarum, non sine magna utilitate & efficacia Hypocistide usum, ex vino, si nihil vetet, propinata. Monet etiam usurpandam Hypocistidem, quæ ad Orientem sit nata. Ceterum cum ex Italia non sit difficile succum hunc germanum nascisci, imprudenter faciunt, qui ei succum prunorum silvestrium, præsertim vero in theriaca substitunt.

Succus prunorum sil- Ceterum Hypocistin, qua passim utuntur officinae, ex hirci barba radicibus impostores conficiunt, succum inde exprimentes, ac ut concreseat, insolantes. Errandi ac simul imposturam faciendi causam dederunt Arabes, quòd Cistum Hirci barbulam appellant. Quò factum, ut ij omninò aberraverint, qui officinis Hypocistidem parant, sibi persuadentes Hirci barbaram, quam Græci *ἡρκεῖα* vocant, illam esse stirpem, de qua Arabes intelligunt. Quo

errore ducti non modò seipsos decipiunt, sed etiam alios, qui passim adulterina Hypocistide utuntur. Potest, si desit Hypocistis, assumi ejus loco floris angustis Punicæ succus, quippe qui eadem præstet, quæ Hypocistis, autore Dioscoride.

*Substitu-
tum. Puni-
cæ succus.*

CISTVS LEDON LATIORE folio. CAP. VI.

Ledum latifolium (inquit Clusius, & ex eo Lob. *Locus:* *Folium.*) superata Calpe, littore marino, qua Malacæ iter est, latiore nascitur folio, quasi ad Lauri angustifoliae foliorum formam & amplitudinem accedente: non minùs tamen pingui, lentoque illo humore abundat, quàm id, quod angustiore est folio. Ladanum latifolium primura, sive Cisti Ledi primi species altera, Hispanis quoque Xaradicitur.

CISTVS LEDON FLORE MACVLA nigricante notato.



Ledigenus, cuius exhibita *Deser.* in hist. Lug. siccum nobis Lugduni demonstrabat Germanus quidam Baro, ex Hispaniis reversus: ex cujus ramo apparuit fruticem esse satis insignem, ramuli rubentes, multis abundabant foliis, sibi invicem, oppositis, palmaribus, Ledi Monspeulani multò longioribus, crassioribus, nigrioribus, minùs rugosis: Latitudine tamen pari, supernè virentibus, infernè inca-

ris, gustu admodum adstringente: in ramulorum extremitate folia longa, cæteris similia, non ita tamen crebra, ut habet icon Lugdunensis, à pictore minùs accuratè representata. Nec non flores singulares, magni, Rosæ silvestribus albis similes, in quorum singulis foliolis est macula pulchra, nigra, satis magna: totius floris medium obtinent apices lutei, ut in Rosæ: ad floris exortum foliola oblonga, utrinque hirsuta.

Lugd. non posuit nostram descriptionem, idèd non ponit florem luteum, nec meminit maculæ insignis, quæ in Icone apparet. Sed animus est hoc in loco integram historiam ex Clusio recensere. Cistus Ledum angustifolium omnium vulgatissimum & pinguisimum, per Hispaniam nascens, fruticat ad hominis altitudinem, quam etiam interdum superat, ramis frequentibus, lignosis, duris, nigris: folia, quemadmodum & rami, ex adverso sita sunt, oblonga, transversum digitum quandoque lata, nonnunquam etiam latiora, supernè ex viridi nigricantia, infernè candicantia, quæ cum tenellis ramulis pingui quodam odorato, calido & transparente liquore adèd copioso aspersa sunt, ut procul etiam ex splendore conspici & agnosci possit, odor autem octava militarij germanici parte naribus percipi: flore est inter reliqua Cisti genera & pulcherrimo & amplissimo, magnæ Rosæ instar, simplici quinque foliorum textura, omninò interdum albo, sed cujus singula

*Liquor.
Odor.*

Flor.


singula folia circa unguem ex purpura nigricante macula rhomboide nunc majore, modò minore, & angustiore, ut plurimam infecta sunt, floris umbilico multis croceis fibris pleno, ut in aliis Cisti generibus: Capitula in longis pediculis, foliisque suis denudatis, omnium maxima, rotunda ferè & plana, non mucronata, & sæpenumero decagona, dura, interius flavescentia, quibus dehiscuntibus, semen decidit copiosum, subrusum, omniū miratissimum.

Tota planta dum resiccata est, quendam candorem contrahit, pinguem attamen illum suum lentorem & suavem odorem non amittit, sed cum retinet ad multos etiam annos.

Crescit multis Hispaniæ & Lusitaniæ locis frequentissime, nusquam tamen magis copiosè, quàm in collibus declivis inter Tagum & Anam flumina & toto ferè monte Sierra morena nuncupato. Hispani Xara, Lusitani Estepa vocant.

Lobel. Obs. & Gerard. dicitur Cistus Ledon primus. Dodonæus in fol. figuram habet Clusij, & describit sub Cisto Ledo, & Aider & Aideripsum fruticem dicit & Cisti spurium affirmat. Tabern. vocat Ledum Clusij primum: Lugd. Ledi speciem Bauhini, in Gallia Narbonensi. Sed non est Gallie Narbonensis. Figura etiam mala: meliorem habet nomine Cisti ledi 1. Clusij. C. Bauh. pin. Cistus ledon 2. sive Cistus ladanifera Hispanica incana. Belg. Erste Cistus ledon van Clusius. Angl. The first Cistus bringing.

CISTVS LEDON, POPVLI NIGRÆ foliis Clusij, major & minor.



L. Edialterum genus, sive Ledum 2. Latifolium majus, ubi spontè nascitur, brevius est, sed bicubitalibus duntaxat assurgit stolonibus, ramosis: rami sunt fragiles: folia omnium inter Cisti generum, quæ observabat Clusius, maxima, supernè viridia, internè nonnihil candicantia, Hedera foliorum formam interdum, & Populi nigrae plerumque æmulantia, satis rudia & carnosia, lymem rubedinem aliquam contrahentia, subacidi & adstringentis saporis. Flos candidus, Cisti femine magnitudine par: capitula pentagona, acuminata, semine exili & nigricante referta. Tenellæ plantæ neque pingues, neque odoratæ sunt, sed annotine duntaxat, & vetustiores Autumno præsertim, quo tempore omnes Cisti, qui pingues sunt, abundantiore succo, crassio-



re saltè & magis tenaci prægnantes esse visè sunt.

Hujus generis aliæ species invenitur, per omnia ferè similis, sed humilior, neque cubitum excedens; cujus folia etiam minora sunt: alias neque facie, neque flore, neque semine, neque sapore dissimilis.

Utrumque nasci in Mariano monte (vulgò Sierra morena) qui superandus est iis, qui Vlyssipone Hispaniam faciunt iter. Invenitur etiam collibus quibusdam Granatæ vicinis. Pri. nam speciem incolæ Xara-xarguna & Xaron-vocabant. Granatenlès Xara-estepa, eodè, quo Castellani Cistum feminam, nomine. Altera species incolis Xaguarco dicitur.

Lobel. Observ. & Ic. cum Lugd. Tabern. (qui non benè capitibus separat.) & Gerard. dicitur Ledon secundus, & Cistus Ledon populeæ fronde alter, cultu fortè duntaxat, differens. C. Bauh. pin. Cistus ledon 4. sive folijs Populi nigrae major: Ledon 2. Clus. hisp. Lugd. Tab. Ledon latifolium 2. majus, Clus. hisp. Cistus ledon Clusij, Lob. Ger. Eid Cistus ledon 6. sive Populi nigrae minor: Cisti ledi 2. altera species, Clus. hisp. & Lugd. Ledon 2. latifolium minus, Clus. hisp. Cistus ledon populeæ fronde alter, Lob. Cistus ledon 3. populeæ fronde Lugd. Tab. & Ger.

CISTVS LEDON LATIFOLIVM creticum.



L. E. genus viscidum, folio majore, quàm Cisti femine. Mor speculanae, minus rotundo, mucronato, internè candicante, tribus secundum longitudinem decurrentibus nervis plartagineis, supernè nigrore, minus rugato, quàm Cisti maris majoris: folia verò juniora & extremorum ramorum longa, angusta, latiora tamen multò quàm Montpellierani Ledi. In extremis ramorum

veluti ex longo pediculo, aliquot flores sunt [tres observavimus] ex pediculis unciam circiter longis: calyces hirsuti cum brevibus pilis.

Hujus fructus Ledi ladaniferi nomine missus se habet: Capitula vel vateula sunt Cicentis circiter magnitudine, Oliva ferè, sive oblonga figuræ, hirsuta cum quinque angulis, membranis distincta, plena seminibus minutis, papaverinis, fuscis, angulosis.

Clusius sic describit: Ledon tertium, se nunc ex Italia misso, Cyprij Ledi nomine, nobis & plerisque natum est, cubitali interdum majori altitudine, fruticosum, nigricantibus ramis, carnosissimis foliis, & præ saturatà viriditate nigricantibus, mediæ inter primi & secundi generis [Ledi angustifolij & latifolij] folia magnitudinis, brevioribus tamen, & rhomboidis quodammodo figuræ, quæ cum novellis ramis lentò & roseo humore obsita sunt, non adeò tamen abundanti & denso, neque etiam adeò odorato, ut in primo genere: Flos albus est, secundo generi similis, semen etiam exile, nigricans in rotundis capitulis. Lugd. etiam eundem, vel valdè similem sic delineat: A floris specie dicitur Cistus frutex hic, in maritimis proveniens, cubitalis, nonnunquam altior, densus, numerosisque radicibus, caulibus multis, furculosis, cortice ex rufo rubente, foliis longis,

longis, in ambitu laciniatis, acuminatis, supernè ob-
scuris virentibus, infernè candicantibus, & parè n
lanuginosis, flore Cisti, Rosæve silvestris, albo, vel
ex albo purpurascente.

Ladanum. An Anguill. Cistus mas, produens liquorem di-
ctum Ladanum in Cypro & Italia &c. proferensq;
Hypocistis. etiam Hypocistidem? An Bel. Obs. Cistus, ex quo La-
danum fit in Creta, de quo sub Cisto femina ante.

Lob. error. Lobel. & Penz Adv. est Cistus Ledon latifolium:
rarior species quædam Ladanifera, foliis multò erat-
sioribus, longioribus, Sumachij Plinij, aut Rusci
modo fruticans, &c. apud quos tamen figura pessi-
ma & inepta: proque Rusci legendum Rhois. Icon.

*Error in
icon plant.* plan. Cistus Ledon Rusci aut Myrti folio. Sed & hic
figura Adversariorum mala: Titulus falsus & deter-
rior factus ad figuram malam. Melior icon ex Clusio
in obs. Lobelij ante, hac inscriptione: Cistus Ledon

*Ledon Cy-
prium
Tab. nota-
tur.* tertius, Ledon Cyprium in Italia. Tab. Icon. &
hist. Cistus Ledon myrtifolium. Malam figuram as-
sumpsit Taber. cum falso titulo, & falsam proponit
descriptionem.

An Casalp. Cisti Ledi sive Ladani species quæ-
dam latiore folio.

Camer. ad hist. Germ. Matth. n. j. u. s. d. e. m. que Epit.
ponit ramum sub Ladano, quem ex meis plantis de-
pinxerat Gesnerus notatum litera O.

Ladanum. An Alpin. de hac ait. plantam, ex qua Lada-
num Cretenses colligunt, planè differentem ab ea,
quam hæcenus serè omnes prodidère, inspexi: hæc
si quidem Cisto feminae per similes est, foliis tamen
Cisti longioribus prædita, Salviaeque proximis: flo-
resque fert silvestribus Rosæ omnino similes, qui
roseo etiam colore, quippe communium Rosarum,
suffusi spectantur: quæ planta à Cisto femina flo-
rum tantum magnitudine differre videtur: dece-
ptusque fuit Matthiolus, Diosc. dicente, Ladanum
esse Cisti genus longioribus foliis nigrioribusq;
refertur: quæ notæ in Cisto, ex quo Cretenses Lada-
num colligunt, omnes observantur, quando hæc
planta omnino Cisto feminae sit similis, cum iisdem
foliis, floribusque, et si maioribus.

*Matth. er-
ror.*

Lugd. Cistus Ledon aliud latifolium Penz. Item,
Cistus marinus. Hunc suspicamus pictum ad plan-
tam siccam, ac etiam descriptum. Non additur præ-
terea locus particularis ubi proveniat: eo loci per-
quiri posset, si annotatus fuisset. Florum etiam di-
positio alia est, quam soleat esse in Cistis Ledis,
non ex extremitate ramulorum, sed ex alis. In siccis
præterea plantis folia quædam apparent laciniata,
ubi ambitus eorum se contrahit. Nos portionem e-
jus figuræ proponimus ex planta nostra sicca.

*Gerard. no-
tatur.*

Gerardus, cui Cistus Ledon myrtifolium, imita-
tur Compilatore, Taber. figuram non bonam pro-
ponens, cum falso titulo, & falsa descriptione.

C. Bauh. pin. Cistus Ledum 4. sive Cretense: An Ci-
stus mas Matth. in mag. fig. & Lugd. Ledon 3. Clus.
Hisp. Lob. Lugd. Ledon 3. Cyprium, Clus. hist.


CISTVS LEDON IV. CLVS. flore candido.

*Deser. Ro-
mi.
Folia.*

Multis ramis fruticat, cubito longioribus, lentis
& flexibilibus, hirsutis, albicantibus: folia reli-
quis Ledi generis us molliora, ad Cisti feminae fo-
lia accedunt, verum paulò longiora, angustiora, hir-
suta, nigriora & lentà pinguedine conspersa, non
modò verno tempore, sed etiam per totam æstatem
conspiciuntur: flos albus est, Cisti feminae flore non
minor, nec ei ab similibus: capitula exigua membra-
nceis quibusdam & laxis involucribus tecta: semen con-
tinent omnium inter Cisti genera maximum, ni-
grum. In sola Castella veteri hoc genus observabat

*Flus.
Capitula.
Semen.*

Lugd. 1



autor, vicinis pago
S. Martini del Ca-
stannal locis, u-
bi ab incolis Ardi-
vieja nuncupatur,
aded frequens, ut
vulgare sit istic p-
verbium.

*Ar. divieja
Hisp.*

Quen al mon-
te va, y mas non
puede, Alomenos
ardiveieja coge:
hoc est, quicunque
montem accedit,
potius quàm ina-
nis redeat, vel Ar-
divieja (plantam
vilissimam) colli-
gat. Apud nostros
Belgas satum feli-
citer provenit.


Adagiump

An Dod. de flor.
hunc pinxerit pro Cisto, dubito: sive tamen exhibeat
suâ figurâ pro mare aut femina, olim aliam habuit.

Lob. Obs. & Icon. eandem cum Clusio figuram
habet, Ledi quarti nomine. Taber. Ic. & Hist. est Le-
dum Clusij: Gerard. & Lugd. Cistus Ledon quartum
Clusij. C. Bauh. pin. Cistus Ledum 3. sive hirsutum.

Synop.

CISTVS LADANIFERA, SIVE LE- dum Monip. angusto folio, nigricans.



Ledum hoc Mô. Deser.
Spessulanū, cu-
jus figuram dedit
Matthiolus, & ex
eo Lonicerus, fru-
tex est bicubitalis,
odoratus, in ramos,
plures brachiatus,
cortice nigro ob-
ductus, foliis ses-
quiunciam longis,
argutis, nigris, ru-
gosis, ex brevibus
intervallis mutuo
oppositis, angustio-
ribus, quàm præfe-
rat Matthioli figu-
ra, quam fortè ex
sativa depinxit: flo-
res albi, parvis Ro-
sis sylvestribus assi-
miles, majores,

Rami.

Folia.

Flor. et.

quàm exprimat Matthioli figura, in quorum medio
apices lutei succedunt pericarpia hispida, & semina
minora, quàm in Cisto mare Monspess.

Pericarpia.

Ad hæc observavi Hypocistin seu rectius Hypo-
ledon, copiosè proveniens Maio. Nascitur autem
ad Ledi radicem cui adhæret ut Fungi, & Agaricus
arboribus, neque verò est de substantia ipsius fruti-
cis propriè. Itaque non videtur nisi reprehensione
dignus Fuchsius, qui tanquam Fungum esse dixerit.
Sed ut redeam, ad unius plantæ radicem multa sub-
nascuntur Hypoleda, palmari longitudine, ex squa-
mis multis imbricatim compacta, quibus sui sunt in
summo Cityni, luteoli, sub quibus capitula rotun-
da, mediocriter magna, succo viscido & lento plena.

*Hypocistin
sive Hypo-
ledon.*

*Fuch. op-
preh.*

Dourez annotat se Monspelij verno tempore, ex
aqua calida, in qua Ledum hoc eluerat, ad spissitu-
dinem decocta, optimum Ladanum confecisse.

Nos existimamus idem esse Ledon quintum à
Clusio his verbis traditum; eadem, quæ quartum as-
surgit

*Ledum 5.
Clusio.*

Rami. surgit altitudine, verum ramis duris, lignosis, nigri-
Folia. cantibus, oblongis, Oleæ foliis angustioribus, fuscis,
Flor. pinguibus, lento humore conspersis, quemadmo-
Capitula. dum & novelli ramuli; flos albus, omnium serè mi-
Semen. nimus: longa & angulosa capitula, in quibus semen
Hemede- ex ruffo nigricans, exiguum. Ad hujus radices ge-
rum. nus illud *acrostichum*, sive Cynomorij, Hypocistis nun-
cupatum, adnatum inveniebat Clusius, multis velu-
ti squamis, ut quod in aliorum Cisti generum radi-
cibus crescit compactum, pallefcantis coloris, qui-
busdam tamen lineis purpurascens & non nihil
virescentibus distinctis, Cytinos suos in summo pro-
ferens, lentosq; & glutinoso succo totum prægnans.
Matthiolus in Diosc. notat Plinium, aitque voca-
bulo vicinitate eum deceptum, ex Cisso [Hede-
ra] Ladanum colligi dicentem, non autem ex Cisto,
arbuscula: Græc. *Λάδανον*, Lat. *Ledum*, Arab. *Chafus* vo-
cari: In post. comm. Ital. ait Rob. Constantinum con-
vivere in annot. ad enarrat. Amati, excusantem Pli-
nium. Habet autem is Ledi figuram cum foliis latioribus,
quàm sint in nostro, fortè ad cultas plantas
factam: vidi sanè *Ledum* valde simile nostro, si non
sit idem, folio longiore & triplo latiore: in ceteris
nescimus an sit discrimen, nec etiam ullius discrimi-
nis ejus video mentionem factam à Clusio.

Turn. icon Turn. pro Cysto ladanifera, figuram habet quæ
mala. non placet. Lob. in Adv. Cistus Ledon, cui fre-
quenter Hypocistis adascitur: Eid. Obs. Ledon 5.
Icon. *Ledum* Narbonense cum Hypocisto, *Ledum*
5. Clusij.

Limodo- Clus. *Ledum* quintum, sub quo ait se invenisse
rum. Limodori, sive Orobanches speciem, quod Hypo-
Icon Clusij. cista appellant. Notandum apud Clusium figuram
angustissimis foliis esse positam in Hispanicis sub ti-
tulo quinti: pertinere autem ad sextum: folia enim
tenuiora, in postrema hist. meritò mutatum esse ti-
tulum, & positam pro sexto: quintum autem loco, ro-
vam iconem introductam quæ respondet Mòn-
speliensi.

Cæsalp. & Camer. ad Matth. germ. Ladanum vul-
gè appellatum frutex, odoramentum ferens eodem
nomine. Eid. in Epit. *Ledum*.

Ledum no- Lugd. Cisti Ladaniferi genus, *Λάδανον*, sic fortè di-
de distinn. ctum, quia folia ejus neque levia, neque nitida sunt,
sed scabra & pannosa: *Λάδανον* enim est vestis ex pan-
no raro & detrito: *Ledum* Matthioli, item *Ledum*
5. Clusij.

Tabern. Tabern. Icon. & hist. Cistus Ledon Narbonense
ignotum. cum Hypocistide: item *Ledum* Clusij nonum. Mira
Tabern. circa rem herbariam ignorantia manifestat-
ur, ut à quo passim in suis eiconibus ultra centum
& quinquaginta superflua proponantur, quemad-
modum videre est hoc in loco, ubi eandem Ledi
plantam, duobus diversis & titulis & figuris expri-
mendam curavit.

Ger. mela- Ger. Cistus Ledon quintus Clusij, Cistus octavus
tur. Ledon, cum Hypocistide Lobelij: Cistus decimus
tertius, *Ledum* Matthioli. Gerardus separat juncen-
das figuras. Anguill. dicitur Ladanum ferens Hypo-
cistidem. C. Bauh. pin. Cistus Ledon 9. sive foliis Oleæ,
sed angustioribus: Cistus Ledon Lobelij, Ger. Cistus
flore albo. Eyst. Hunc similem sub Cisto adulteri-
no pingunt, Tab. & Ger.

Ledum ex *Ledum* abundat Monspelij in silva Egremont,
Tempus. ubi quis diceret datà operâ satum, florens Aprili &
Maio: ferens Hypocistida, sed parum liquoris sive
Ladani continens conspicitur in monte S. Iuliani in
Abruzzo in Apuleia & Provincia: nihil isto Ledi
genere vulgatus toto regno Valentino, & Gallia
Narbonensi, ubi aliud Leon non observatum à
Clusio, sed in plerisque aliis Hispaniæ & Lu-
sitaniæ locis etiam inve-
nitur.

CISTVS LEDON VL MINORIBVS angustioribusque foliis Clusij.




Defor. Erè simile est
quinto, sive
Monspel. brevius
paulò, minoribus
angustioribusq; fo-
Folia. liis, lento humore
asperis, quemad-
modum illius folia:
flos major est, al-
Flor. bus item, quinque
foliis constans: se-
men etiam non re-
spondet.

Clus. hisp. & hist. *Sym.*
Lob. Obs. sine ico-
ne ac H. Lugd. Ledi
genus 6. Item, Lug.
& Gerat. *Ledum* 5.
Clusij: Tab. *Ledon*
Clusij 9. C. Bauh.
Cistus ledon 10. si-
ve angustis foliis.

Valentino quoque regno observatum à Clusio *Lecor.*
circa Xativa, ubi ab incolis Xaguarco dicitur.

CISTVS LEDON FOLIIIS colore cinereo.



Defor. Cvhitalis est,
Rami. multis & fre-
quentibus ramis fru-
ticans, colore cine-
reo præditis, fre-
quentissimis foliis
Folia. eos septemibus,
Rosmarini cor-
onariz, led om-
nino canescentibus
& hispidis: non ta-
men minus pingui-
bus, lento succo
perfusis, cum suis
tenellis ramulis, quâ
quintu genus *Moss.*
Flos summis ramis
Flor. copiosus, candidus,
præcedenti similis,
semen etiam non
dissimile.

Valentino regno, *Lecor. cum*
Sym.

Cisti Ledi genus septimum Clusio Hispan. & Hist.
duntaxat observatum, circa Xativa, ubi ab in-
colis quoque Xaguarco dicitur. Lob. Obs. & Icon.
Ledi genus septimum. Tab. Lugd. ac Ger. *Ledon*
Clusij septimum. C. Bauh. pin. Cistus Ledon 11. si-
ve foliis Rosmarini hispidis.

CISTVS LEDON FOLIIIS ROSMA- rini coronariz Clusij, flore luteo.

Defor. Eadem, quâ superius magnitudine crescit, rami
Rami. tamen magis expansi sunt, folia tenuiora, super-
Folia. na parte ex fusco viridia, inferna verò candicante,
ut Rosmarini coronariz folia videantur, gustu ta-
Gust. men adstringentia, licet lento quodam & pingui
humore sint, cum tenellis ramis obsita: flores ru-
Flor. merosi secundum ramorum longitudinem, quin-
que foliis constantes, exigui, lutei: semen in exiguis
Semen. capitellis ex cinereo nigricans.

Inve-

Symb.

Locus.

Rosmarin.
mar.Tab. C.
C. i. i. i. i. i.

Cistus Ledon 12. five foliis Rosmarini subtus incanis.

Invenitur Cisti Ledi genus octavum Clusij frequens in nonnullis locis intra Tagum supra Vlyssiponem & nonnullis Beticis, ubi ab incolis Romero appellatur, id est Rosmarinus.

Rauv. Ladarum Clusij folio Rosmarini, flore luteo. Lob. Obs. & Ic. ut & Lugd. Ledi 8. genus. Tab. Ledum Clusij quintum p. octavo. Ger. Cistus Ledon sextus Clusij. Cur sextum facit, cum sit octavus. C. Bauh. pin.



C. Bauh. pin. Cistus Ledon 14. five foliis Thymi.

vel potius, ut existimabat autor, Hypocistis, quae illis tuberis fortasse loco observata est, nascantur: Tuber enim Hispani Turmas vocant.

Lob. Obs. & Ic. Symb. Ledi decimum genus. Tab. Ledum Clusij octavum pro decimo. Lugd. Ledum decimum Clusij. In icone nostra observata proportione ad figuram Clusij, oportebat minora esse folia. Ger. Cistus Ledon decimus Clusij.

CISTVS LEDON IX. CLVSIO.


Deser.
Folia.

Ramuli.

Capitula.

Symb.

Locus.



guaco nuncupatum.

Lob. Obs. & Ic. ut & Lugd. Ledi nonum genus. Tab. Ledum Clusij sextum pro nono. C. Bauh. pin. Cistus Ledon 13. five foliis Rosmarini, sed non incanis.

Minus est superiore, folia paulo majora, neque subtilis incana, ut in octavo, sed rariora & magis glutinosa sunt: ramulos, quibus flos inhaeret, tenues, & exsuccos planaque retortidos: aliquot capitula inania, omnino hiantia, jam excusso semine, sustinere deprehendebat Clusius.

Nascitur Ledi nonum genus Clusij in extrema Beticæ parte, qua Castellam novam spectat, ab incolis Xar-

CISTVS LEDON THYMI
foliis Clusij.Deser.
Ramuli.

Folia.

Capitula.

Locus.

Tumeru.
La Hsp.

Pedali duntaxat est altitudine, ramulis exilibus, lignosis, satis tamen fragilibus, nigricantibus, pinguioribus, & lento quodam humore maderetibus: folia longè minora, quam in nono, non multum à Thymi foliis dissidentia: flores non observavit Clusius, quemadmodum nec in superiore, sed in oblongis ramulis quasi umbellatim procedentia capitula, exigua, & superiore parte aperta, jam inania & cum suis ramulis arida.

Nascitur Cisti Ledi decimum genus Clusij in extrema Beticæ parte, qua Castellam novam spectat, ab incolis Xaguarco nuncupatum: quidam etiam Tumeruela appellant, quoddam sub eo fortè tubera,

TVBERARIA NOSTRAS.
CAP. VII.

Caulis pede al-
tior, teres, alio-
qui glaber imò dū-
taxat parte candi-
cante tomento ob-
situs, interlucente
leviculā quādam
rubedine, folia cir-
ca infimum caulis
crebra, plantagi-
nea, ex rotundo
oblonga, latitudine
semunciali, longi-
tudine ferè unciali,
supra, subtusque in-
cana lanugine, pu-
bescentia, nervis
tribus, Plantaginis
in morem dispositis,
distincta. Per re-
liquum caulem ex
longis intervallis

bina folia adverso situ veluti ex geniculo nascuntur, (aut alterum altero paulo inferius) angustiora, longiora, acutiora, quam infima, glabra, nervosa, supremum caulis fastigium in biros longiusculos pediculos dividitur, quorum unus in tres alios breviores facessit. Singulis autem inhaeret capitulum turbinatum, plurimum foliolorum voluminibus contextum, cuius basim fulciunt foliola perpusilla acuminata: flores interdum longè plures. Duodecim si-
quidem gerebat ea, quam siccā apud D. Rentzium vidi. Ego eandem cum Tuberaria maiore Myconi suspicor, de qua mox.

Raram hanc nec uspiam nobis visam alibi plantam communicavit D. Rentzius collectam in monte Divi Iohannis propè Pisas, inter plantas Stachadis arabicæ.

TVBERARIA MAIOR MYCONI

Tuberaria major Myconi, à Mycono dicta, ut Erym-
refert. Lugd. quoddam foliorum & florum figurā,
hirsutiae & facultate minori jam dicendæ sit similis,
magnitudine tantum distans, foliis multis, Plan-
tagini

Caulis.

Flos.

Radix.

Sapor.

Locum.



tagini similibus, minoribus tamen hirsutis, humijacentibus, & vix à terra sese attolentibus: hæc caules multos fundit, subhirsutos, rotundos, in quibus folia sunt per intervalla, caulem amplectentia, minoris, quæ humi repunt. In caulium summitate flores visuntur lutei: inde semen folliculo inclusum. Radix lignosa per summa cespitem spargitur. Tota herba aliquantulum pilosa est, ejusque sapor adstringens, majoris, quam minor efficacit. Nascentur in locis siccis.

Hanc cum sequenti C. Bauh. refert ad Cistum feminam vocatque secundum, sive folio Plantaginis.

TUBERARIA MINOR MYCONI.

Descriptio.

Folia.

Caulis.

Flos.

Semen.

Radix.

Sapor.

Locum.

Hydnophyllum.

Locum.



Tuberaria minor Myconi, forma & facultate cum superiore, affinis est Pilosellæ, folia habet Plantagini similia, sed multo minora, humi repentia, villosa: caules dodrantales, rotundos, inanes, hirsutos, in quibus per intervalla folia sunt bina, exigua, caulem ambiencia, minoris, quæ circa radices humi jacent: in caulium vertice flores luteos, in quorum medio purpureum quiddam est, in nigrum vergens, semen in exiguo folliculo, (dilatato flore) statim conspicitur: radix admodum parva est, tenuis, nonnihil fibrata. Tota herba hirsuta est: totius etiam sapor adstringens est cum siccitate.

Castellani eam *Terva Turmeræ* vocant, id est, Herbam Tuberariam: quoniam ubi illa crescit, tubera frequentissime reperiuntur. Hanc, si veteres cognoverunt, eam esse suspicatur Myconus, quam apud Athenæum Pamphilus Hydnophyllum vocat, quia suppositum tubera demonstrat: unde nomen Tuberariæ ei à Castellanis inditum.

Passim in pratis reperitur, locis pinguibus, terrenis. Ambas has plantas Myconus ex Hispania misit.

CISTVS ANNVVS I. CLVSIO, folio rotundiore. CAP. VIII.

Descriptio.

Radix.

Caulis.

In horto meo Genevensi ad cubiti altitudinem ac equam majorem excrevit: ab una radice lignosa & nigra, modo colicula uno, modo pluribus, quinque

Tom. II.



ac etiam sex, medio erectiori, omnibus hirsutis, teretibus: foliis veluti per genicula binis, Majorana similibus, longioribus, potissimum circa medios caules: inferiora enim rotundiora sunt, superiora angustiora verò, pilosa: ad latera singulorum, geniculorum, ad unum quodque folium, duo parva foliola: in extremis ramis duo, tres, quatuorve flores, unusquisque in suo geniculo ex brevi pediculo, hirsuto u-

no folio longo & duobus parvis constans. Floribus succedunt vascula, triquetra, brevia, magna, Ciceri ferè equalia, quæ matura in tres dehiscunt veluti cotyledas latas, corticofas, rufas, quas cingunt foliola tria, hirsuta, costas habentia: intus membranula tenuis, lucida, cui adherent multa semina, minus ruffa, papaverinis minora, inæqualia, matura Augusto.

Leon nostra ex Clusio potuisset fortè melius exprimi, quod folia attinet superiora, & capsulas, nisi abfuissemus, cum pingeretur.

Clus. suam sic describit: longiusculis, hirsutis, rectis & raris est virgulis, foliis autem amplioribus, quam in Chamæcisto primo, magisque viridibus, adstringentis gustis: flos Chamæcisti primi flori similis, pallidus aut albicans est, semen minutum rubescens in trigonis capitulis, duplo quam Chamæcisti primi majoribus continetur.

Castellani, Cistum annuum hunc Clusij primum *Turmeræ* vocant, quia forsitan, ubi hæc nascitur, tubera, quæ illis *turme* dicuntur, crescant, Granaten- ses *verva del quadrillo*. An Hydnophyllum herba est, ait Clusius, quam Pamphilus in glossis, teste Athenæo l. 2. Deipnosoph. tradit supernascentem tuberibus, cujus judicio subesse tubera cognoscunt. Meo judicio quidem Chamæcisto est congener.

Ejus alia species invenitur longioribus aliquantulum virgis, non tamen minus hirsutis, angustioribus etiam foliis, cujus flos minor, pallidus, valde caducus: capitula & semen similia.

Lob. Obs. Cistus humilis annuus, folio Salicis humilis: item (ut & Lugd.) Cistus annuus primus Clusij. Ic. Cistus annuus folio Salicis. Cam. hort. Cistus annuus flore luteo Clusij in Hisp. Tab. & Ger. Cistus annuus. C. Bauh. pin. Cistus femina 10. sive Cistus folio Salicis.

Belg. *Jacrische cleyne leese Cistus met blaz dero van cleyne milbe.*

Genevæ habui semine maturo, Augusto. Argentinæ vidi cum vasculis, sive capsulis triquetris Julio mense, in horto D. Obrecht. In vinetorum apud Salamanicensis marginibus, & Granatensi regno a Clusio observatus.

Cisti annui semen, annotante eodem, maxime commendatur ad nephriticos dolores, præter alios usus, à doctissimo viro Simone de Tovar, Hispanensi Medico.

CISTVS ANNVVS II. CLVSIO, FLO- re pallido, maculâ punicante insignito.

Cistum annuum secundum Clusium inveniebat in sylva Madriana, secundo ab urbe Lutetia

HISTORIAE PLANTARVM

Caulis.
Folia.
Flos.
Capitula.
Semen.
Tempus.

miliari, ad Cisti genus referendum, pedali altitudi-
ne, exilibus cauleculis, rectis, tenellis, non admo-
dum ramosis, foliis oblongis, angustis, hirsutis, vire-
scentibus, quæ cum ramulis per Caniculæ æstus hu-
more quodam pingui, & lento sunt oblitæ: flos pu-
fillus, quinque foliis constans, ut Helianthemum, pal-
lido colore, & maculâ punicante insignitis: capitula
tenella admodum, triquetra, semen pusillum & ci-
nereum continentia. Maio mense floret.

C. Bauh. pin. hunc Cistum cum sequenti eundem
facit, statuens varietatem esse in flore maculoso, &
non maculoso. Vocat autem Cistum feminam II.
Cistum flore pallido punicante maculâ insignito:
Cistum annuum 2. Clus. hisp. & hist. Lugd. Cistum
annuum guttato flore, Pona: Helianthemum flore
maculoso, Colum.

Variat: est enim flore maculoso, macula ex nigro
rufescente, sive puniceo: vel non maculoso. Cate-
rum, mirari subit C. Bauhinum, quomodo in phyt.
Cistum silentio præterierit, nec ejus mentionem a-
liquam fecerit.

CISTVS ANNVVS FLORE guttato.

Deser.
Folia.
Flos.



Assurgit (atte-
stante Pona)
recto surculo, tri-
palmari, quadrato,
hirsuto, virescens;
cui prope terram
folia multa Oleæ ef-
figiæ, deinde per
intervalla ad oppo-
sita latera alternato
sua bina, ad me-
dium usque, deinde
per aliquos ordines
terna spectantur,
duobus tamen ex
his angustioribus, è
quibus flores mul-
ti, colore & forma
Helianthemum. Sed
hoc amplius in sin-
gulis foliis guttu-
lam sanguineâ for-
titi, ad instar Pyropi, auro summa arte excepti, tum
summitati, tum pediculo longiusculo & capillari
calycibus affixi hærent, horum tamen aliqui sine fo-
liis unicum florem in suprema parte obtinentes
plantam finiunt. quæ radice unica, exili, lignosâ, ac
parùm fibratâ alitur. Floret initio Iulij: sapor &
semina, ut in aliis Chamæcistis. Provenit in plano
Agro altero, sed frequenter in oppido Ciani.

Si quis consideret, quæ scribuntur de Tuberaria
Myconi, de Cisto Clusij annuo secundo, & de Cisto
hoc annuo Pona, judicabit fortè de una eademque
planta scribi. Verùm quum quotidie experientia
nos doceat, multas plantas ex descriptionibus vi-
deri easdem, quæ tamen non parùm differant; ma-
luisse nos hic omnes tres proponere, quam teme-
rè asserere, eandem plantam cum reliquis duabus
unam esse. Hoc autem idè potissimum, quodd col-
laus descriptionibus & iconibus non raro notæ
quædam observentur, quæ differentias manifestè
facere videntur. Qui igitur fuerunt us in locis aut
ibunt, ubi illæ proveniunt, statuunt quid sen-
tendum, & nos moneant, libenter
sententiam mutabimus, ut-
pote qui veritatis si-
mus Auditi.

Radix.
Locust.
Tempus.

CISTVS ANNVVS FOLIO LEDI, flore luteo.



Narbonensis *Locus.*
Ledi annui ra-
ra species, via, quæ
ducit Monspelio
ad Rondeletij præ-
dium vulgè Ter-
ral, inter Sterro-ca-
vallo & Cristas gal-
linaceas herbulas
fruticat, foliis Ledi
angustifolij, hirsutis,
juxta summum pe-
dalem & sesquipe-
dalem caulem: se-
men exile angulo-
sum, rubrum, pul-
chellum in pericar-
pio nudo trique-
tro Selaginis Plin-
ianæ dictæ, lævo-
re glandis ilicis &
magnitudine ferè

pari: flos luteus. Lob. in iconè, quàm hic posui-
mus, caules sunt crassiores, quàm proportionaliter
esse oporteat.

Lob. Obs. & Ic. Cistus annuus-folio Ledi. Tab. *Cistus annuus*
Cistus annuus Ledi folio Lobelij. Lugd. Cistus an-
nuus alter Lobelij, quæ eundem facit cum Clusij
annuo secundo, contra sententiam Lobelij sepa-
rantis. Considerandum an ejusdem plantæ figura
& descriptio à Lugd. non ponatur pro Alyssum tri-
gono Dalechampi: perpendendum etiam an Tu-
beraria Myconi aliquid commune habeat cum hoc
Cisto. *Alyssum trigonum*
Tuberaria Myconi

Ger. Cistus annuus longifolius Lobelij. Belg.
Cistomet bladers van Ledum: Ang. Long leaved
yeerely Cistus. C. Bau. pin. Cistus femina 12. sive Ci-
stus Ledi folio: Cistus annuus alter Lobelij, & A-
lyssum trigonum, Lugd.

Pona annotat in monte Baldo provenire Cistum
annuum alterum Lobelij. *Locus.*

CISTVS MINIMVS FOLIO subrotundo.



Exhibuit Hei-
delbergæ ann-
1595. Sprengerus
Cisti tenui folio Ca-
diz nonunc plan-
tulam semipalma-
rem, radice tenui,
lignosâ, reliqua
plantâ longiore fo-
liis parvis, subro-
tundis, latiusculis,
binis ex adverso re-
spondentibus, ci-
nereis, in coliculo
singulari, tenui, te-
reti, cujus sum-
mum occupant ca-
pstellæ Helianthe-
mi canâ lanugine
pubescentes. Co-
lebatur in fictili ni-
nio mense; peren-
nem discitabat, de quo tamen dubitamus. *Cistus*
Cadiz
Deser.
Radix.
Folia.
Perennans.

CISTI

Tab. n. 1.

Tab. Helianthemum 1. sativum, sam Sonnenz. Blumlein. Compiler in hist. male ponit figuram, quæ iterum ponitur pro Helianthemo peregrino angustifolio. Ger. Helianthemum Anglicum luteum, Englisch yellow dwarfed Cistus. C.B. pin. Chamæcistus 4. live foliis minoribus & incanis: Flos solis, Lob. Dod. utriusque quoad iconem. Chironia aliud genus, Czf.

Zam.

Monspeli spontaneam vidi, & quidem florentem in monte prope Castelneuf, & montibus prope Gigan, quæ itur Narbonam, mense Martio & Aprilis, Lugduni prope ades, quæ erant Daruorum ad ripam Rhodani, inter Lugdunum & Montiel, florentem Maio.


HELIANTHEMUM FLORE ALBO, folio angusto, hirsuto.

Def.

Rami.

Folia.

Flores.



Plantula sesqui-palmatis, dod. artallibusve ramis donata, interdum paulo minoribus, Monspeli verò & Lugduni nunquam ferè cubitalibus, partim erectis, partim repandis: folia mediocriter magna, semiciliata longa, angusta, pilosa, incana, ut Lavendula, insipida, nonnihil viscosa: flores ex longa serie plures, quales Helianthes vulgaris, nisi quod albis, fibris luteis me-

diu occupantibus, calyces hirsuti, vascula quoque consimilia, in quibus semen. Quæ Monspeli pro- venit, radicem habet crassiusculam, lignosam, & in frequentes abit propaggines.

Radix.

Def. Cl.

Folia.

Radix.

Rami.

Cistus hu-

milis.

Lab. n. 1.

Tab. n. 1.

Tab. n. 1.

Tab. n. 1.

Tab. n. 1.

Tab. n. 1.

Hanc fortè Clusius in Hisp. pro Cisto humili secundo: & Hist. pro Chamæcisto quinto sic describit. Non differt magnitudine & ramulorum tenuitate: flores item similes, semina similia: sed folia angusta omnino & tenuia, Cisto foliis Thymi respondentia, incana etiam, & ejusdem temperamenti. Radix perinde dura, & fibrosa, atque præcedens, flores aperit Maio, frequens plantula Salmaticensi agro, ubi Perdiguera appellatur. Apud Clusium verò in hist. icon hujus posita est sub titulo quarti Chamæcisti, incuria Typographi.

Lob. Obi. dicitur Cistus humilis angustifolius, Coris Monspeliensis foliis, Selago Monspel. Cistus 4. Allatij & Erica Chrysanthemis minima Adv. Ego contra Ericam Chrysanthemin diversam puto à Cisto humili secundo Clusij, ut in Icon. inscribitur) quam ob causam, quæ Lobel. dixit de Erica Chrysanthemi ad aliam plantam refero.

Tab. Helianthemum peregrinum, angustifolium, Klein fremdd. Sonnengunzel: item Helianthemum germanicum tertium, Sonnengunzel. Quæ qua in re à peregrino differat nondum animadverto: Compiler nulla utitur diligentia in distinguendis Cistis. Ger. Helianthemum album germanicum: item Helianthemum angustifolium. Diximus qua in re differant hæc duo figura, nos nondum videre, unam plantam tæcùm exprimere videntur.

C.B. pin. Chamæcistus 5. live foliis Thymi incanis: Panax chironium minus, Cam. ep.

Tom. I L

CHAMÆCISTVS SERPILLI FO- lio, nigricante & hirsuto, flore aureo odorato.



M Vltos promit Desf. R. Mex eadem ra- mulo. dice ramulos, te- nues, oblongos, summa cellure spar- sos, subrubentes, in quibus exigua folia, ordine quodam & duplici serie, quæ admodum in reli- quis Cisti generi- bus disposita, Ser- pilli ferè similia, nigricantia, & hir- suta crassaque: sub- florum autem par- tum, in novellis ra- mis longiora & can- didiora: flores in extremis ramulis iisdem novellis ter- ni, aut quaterni, ob-

longis & hirsutis pedicellis inherentes, quibus so- lus, ut superiores flores constantes, illisque magni- tudine pares, sed aurei planè coloris, & odorati: se- men observare non licuit. Radix multifida, aliquot fibris læte sparsis capillata: Color. Radix.

Nusquam nisi in summis Austriæ & Stiriz alpi- bus invenit Clusius Chamæcistum hupe 4. pann. Locus et tempus.

2. Hist. semel mense Augusto florentem. In hortum verò translatus, Maio ipsi floruit: sed flores cum suis pedicellis nimium caduci, omnem observandi seminis occasione n planè ademerunt.

Tab. & Ger. Cistus humilis, Serpilli folio.

C.B. pin. Chamæcistus 11. live repens Serpillifolia lutea. Germ. Klein Cisten: & Klein: Ang. Low Cist. Russ. wuch leaneos life wilde Thyme.

CISTVS HELIANTHEMOS, flore parvo, luteo.


P Almo longiores fundit virgulas, molli lanugine incanas, foliis pergenicula binis mollicellis, muncialibus, pilosis, ex quorum alis ramuli propa- gantur. Flores virgularum extremis multi, saturate crocei, triplo minores, quam nostratis Helianthe- mi. Calyces eorum hirsuti. Gener Cherlerus collec- git Nemausi, & Cistum Helianthemum flore parvo, luteo denominavit. Considerandum an conveniat cum Chamæcisto Clusij Serpilli folio. Locus. An Chamæcistus 3. Clusij.

CHAMÆCISTVS ANGVSTIFO- lius, flore luteo. Clusij.

R Amulos habet humi fufos, dodranteales, aut majores, multis, oblongis, angustisque foliis, nullo ut plurimum certo, sed confuso ordine dispositis septos, præter vulgarem in omnibus Cisti generibus foliorum situm, saporis primum veluti gummosi, deinde amaricantis: extremos ramulos bi- ni aut terni occupant flores, quinque foliolis con- stantes; lutei cum suis in medio flaminibus coloris: quibus succedunt trigona capitula, satis magna, majusculum & inæquale semen continentia: Radix li- gnosa, dura, vivax, foris nigro cortice obducta, & in aliquot ramos sparsa. Def. R. n. 1. Folia. Sapor. Flos. Capitula. Semen. Rami.

B 3

Locus
tempus.



Cistus
humilis.

Ang. Loto Cistus with narrow leaves.

Rarior est Chamæcistus 1. angustifolius Clusij in pan. 6. in hist. nec nisi in monte Badenibus Thermis imminenti, quarto à Vienna Austriae miliaribus; atque in Hamburgensi duobus à Polonio Vngariae urbe miliaribus, pauculas plantas, inveniebat autor, florentes Iunio, quo tempore, aut paulò post semen etiam perficit.

Tab. & Ger. Cistus humilis angustifolius. C. Bauh. pin. Chamæcistus 8. sive angustifolia.

CHAMÆCISTUS FOLIIS MYRTI

Tarentinæ canis vel cineris.

Deser.
Ramuli.



Folia.

Infus.

Floras.

Scm.

Capitula
Semen.
Radix.

Locus.

Tempus.
Quoties
est huius.

Item Tab.

Dodrantalibus est ramulis, humi diffusis, quos bina, semper contrario inter se situ sepiùt foliola, Myrti Tarentinæ foliis æqualia, aut angustiora, supernè cinerea quadam lanugine obducta, infernè verò omninò incana, gustu adstringente, & nonnihil deinde amaro prædita: pedicillos postea exerit duas aut tres uncias longos: quibus insident quini, aut seni flores, Chamæcisto Serpilli-folio similes, quos pictor malè expressit, & sculptor corruptit, lutei coloris: his succedunt trigona parva capitula, semine in æquali minuto, rufo, plena: radix lignosa, dura, vivax. Ramuli, flores sustinentes, maturo & deciduo semine exsiccati & confringi plerumque solent.

Maxima abundantia nascitur Chamæcistus 2. Clusij pann. 3. hist. in omnibus illis montibus, qui à Eilenberg Danubio imminenti, ad Alpes Austriae continuà quadam serie procurunt, tum etiam in Hamburgensi, Pannonia monte aliusque ejusdem provinciae locis, sublimioribus præsertim, siccisque, gramine tamen cæcis agnis. Floret Maio, semen maturum est Iunio. Austriae Seylacher velle Braut vocatur à præsentem videlicet juvandum vulnerum facultate. Tabern. qui mutavit flores, qui non respondent descriptioni Clusij, quia, ut ait, à sculptore corrupti, & Gerard Cistus humilis latifolius. C. Bauh. pin. Chamæcistus 7. sive foliis Myrti minoris incanis.

Germ. Klein Cisten Köpfelein: Ang. Loto Cistus with broad leaves.

HELIANTHEMVM TENUI- folium glabrum luteo flore.



EX radice crassa, Deser. lignosa, cortice Radix. nigricante contexta, ramuli plures exsurgunt, lignosi, dodrantes, nonnunquam erecti, interdum per humum sparsi, foliis folia donati valde tenuibus & angustis, ut in Cori Monspesulana, vel Erica arborecente, viridantibus & subrubentibus, glabris, nec sibi oppositis, ut in vulgari, sed alternatim ramos conscedentibus, & singularibus: Ramosius videtur,

quàm Thymi-folium sequens. Flores multò minores, quàm in vulgari, aurei, caduci, quibus succedunt vascula, majuscula, lucida, quæ semine maturo, in tres veluti scutellas triquetras dehiscunt, ea autem vascula ambiunt tres tunicæ. Semen copiosum, ferrugineum, triquetrum.

Lugd. Erica quinta Chrysanthemos. Lob. Adv. Cistus quintus opinatus Assatio: item, Chrysanthemis Erica minima foliis Tamarisci, strobillis luteis. Dalechampius vocabat Ericam Chrysanthemin: Rob. Confl. Chrysocomen faciebat: Frater C. Bauh. attulit ex Italia nomine Coris Dioscoridis, Guillan.

Per Ericam minimam Chrysanthemin Lobelium intellexisse eandem, quàm Dalechampium, non dubitamus, id indicante ipso nomine: is enim Dalechampi & nostras opiniones plerasque habuit, licet rardè meminerit, id quæ opera Valerandi Dourez affinis nostri, cui ei omnia nostra communicabat, cum Lugduni Lugdunensem incepisset Historiam conscribere generalem, in qua multum laborabat Dalechampius. Quæ tandem ob tumultus bellicos interrupta, consarcinata est per stirpium ignarum, qui confudit ac miscuit nostras & Dalechampi doctas observationes cum aliis. Vidit etiam Lobelius nostras stirpes cum suis nominibus, descriptiones etiam plantarum habuit. C. B. pin. Chamæcistus 12. sive Erica folio luteus. Cori similimus frutex in maritimis, Cxf. Hujus duæ species, altera brevioribus foliis & humilior, altera quadruplo longioribus & elatior. Genevæ observavi locis siccis circa Champe & Monspelij. Cherlerus attulit collectum Ne-mausi. Vidi Basileæ in hortis, semine maturo Septembri. Degustata nobis nullum manifestum saporem præbuit. Chrysanthemis, Erica minima, inquit Lobelius, nata est natales fabuleta maritima Veneta: eandem studiosiores videbant Monspelij secus paubulum Castri novi. Erica Chrysanthemum non in fabulosis arctorum collum locis apicis & perfatis gigni, florere Iulio observavit Dalechampius.

HELIANTHEMVM ALPINVM FO- lio Pilosellæ minoris Fuchsi.

Herba hæc collecta in montium locis siccis circa Genevam, ut Saleve, & in hortum translata floruit Iunio. Eam sic descripti ante triginta annos: Fruticosa

Folia.



Flor.

Fruticosa herba, cui folia oblonga, Pilselle minoris Fuchsi j similia, inferiori parte magis candicante, superiori viridia & pilosa, sed minus, quam in inferiore: flos luteus, qualis Helianthemum vulgari, unde hac vocaveram Helianthemum alpinum. Est mihi sicca (an vera una sit ex iis, quae Genevæ erant collectæ, dubito:) non tamen integra, foliis quibusdam uncialibus fere, aut minoribus, oblongis, in acumen desinen-

tibus, ad Polium montanum vulgare accedentibus, cinereis & fere albis radice crassa, lignosa, cum capitulis multis onusta.

CISTVS HELIANTHEMOS folio Polij montani.

Cist. Heli-
anthemos.Folium
flore.

Eadem, aut plane similis, nobis data est Argentoræ ex plantis D. Agerij, cui nomen feceram, Cistum Helianthemum folio Polij montani vulgari. Albicantes in ea erant cauliculi, unciarum quatuor, vel quinque, ramosi, qui desinebant in tenues pediculos, parvos flores proferentes, luteos, tres vel quatuor: Folia albicantia Polij vulgari montani.

Nec dissimilem ab hac Cherlerus attulit stirpem, collectam in rupetis pro-

pe Agdes Galliz Narbonensis, quæ folio est candidiore, quantum judicare possum ex reliquiis quibusdam allatae sanè fuerant plures plantæ integræ, sed reddita sunt nobis invisibiles, remanente tantum portiuncula.

CISTVS PVILLVS FOLIO candido, flore luteo.

Deser.

Ramuli.

Cistus pusillus folio candido, flore luteo, pal- mum longiorem, duram, lignosam, foris rubentem, intus albam, gracilem demittit radicem, quæ terram versus crassescit, inque numerosa capita dividitur: quorum singulis ramuli prodeunt, alij unciales, alij duplo longiores, hirsuti, foliis numerosis, inferià parte candicante densâ lanugine obsitis, supernè viridantibus, pilorum non expertibus: acuminatis, semicircularibus, cultis latis or uis: extremis ramulis bini suis singuli pedicellis insident flo-



sculi perpusilli, lutei, luteoque capitula meto donati, quorum exteriori parte foliola extrema, pilis obsita canescunt, interiori parte lutea.

Ceterum, fieri potest, ut vel natura ob Solitantiâ naturalis varietatem in tribus præcedentibus plantis ludat: Vel, si non, ut eadem, aut eam aliquæ àCLUSIO in hist. c. de Chamæcisto, & potissimum sub Cisto humili altero tradantur. Hæc diligentiâ posteri examinent.

An hæc est
duabus præ-
cedentibus
eadem?An Chamæ-
cisto a. a.
CLUSIO?

HELIANTHEMVM FOLIO Thymi incano.

Virgulae plures, tenues,



incanæ, quæ in alios se pandos mox dividuntur ramulos: foliola Thymi durioris, minuta, breviter hirsuta, cinerea, terna, quaternaria, interdum plura ex eodem pediculo enata.

Flos & Capsella in tres catinas delincentes, cum involutis hirsutis, ut in Helianthemo vulgari. Radix crassa, fusca, contorta, lignosa, multifida, multorum capitum.

Fortè hanc mi-

scet & intelligit Lobel. cum Helianthemo tenuifolio glabro: similes sunt plantæ, differentes tamen, diligentius consideranti.

Montepelii observavi florens adhuc mense Septembri & in montibus propè Castelnovæ & juxta patibulum Maio. Mense quoque Aprilis, in monte Seti: Cherlerus attulit collectum in vineis & collibus Nemauso vicinis.

Heliantho-
mo tenuifolioLacm. ex
tempore.

CISTVS PVILLVS MONTIS Baldi, fortè Austriacus myrsifolius.

Compluribus, sesquialibus & quadrantalibus, lignosis adolefcit virgulis, tenuibus & hirsutis: folia virentia, crebra satis, similia Myrto Tarentinz, vel Lentis foliis paria, nec ita dissimili circumscriptione, ortu & positu diversissimo, quippe bina, incondita tamen, fortuitis pilis, supra subtusque donata, per margines copiosioribus, ut in Nerio alpino: flores extremis ramulis unici, satis magni, cum multis staminibus. Siccam hanc accepimus à Jacobo Zyvingero, & fratre C. Bauhino, delatam è Monte Baldo. Eadem fortè est, cum Chamæcisto 8. in hist. seu 4. in pann. Clusij, proveniente in Austria, quam

Deser.

Folia.

Flora.

Def. Clus. sic describit. Palmatis aut paulò amplior est, superioribus Chamæcistis tamen firmior, multisque ramulis; lignosis, rectis & nigricantibus præditus, quos numerosa & aded conferta ambiunt folia, ut quaternis versibus digesta videantur, Myrti minoris foliis non dissimilia, minora quidem & hirsuta, licet atra viriditate supernè splendeant, quorum gustus adstrictionis participes est: flos unicuique interdum & alter extremis ramulis exit, satis crasso pediculo subnixus, unico constans folio, quinque profundis crenis, insillemque veluti circinatis, diviso, ita ut quinque folia habere videatur, ejusdem cum primo genere penè magnitudinis, coloris ex albo purpureascentis, & quasi carnei dilutionis, decem staminibus extrema parte nigris, & stylo oblongo purpureascente, infedum florem occupantibus. Floribus excussis apparent pentagona capitula, qualia in nonnullis Cisti generibus videre est, obtusè mucronata, quæ maturitate aperta, semen continere deprehenduntur exile admodum, flavi coloris.



Folia.

Capitula.

Flos.

Color.

Capitula.

Semen.

Locus.

Rarissimum suum fruticem duntaxat in Snealsben iugi scopulis nascentem observabat Clusius, unde florentem sub mensis Iunii finem eruit; semine verò prægnantem Augusto: in Veyrsalben summo supercilio, duobus supra Neuburg miliaribus. Eam circurare voluit in horto suo semel atque iterum ex iis singulis cum suo cespite desumptum, sed mitescere noluit.

Si Clusij Chamæcistus hic eadem est, cum nostra, sanè in leone, quam proponimus, caules nimis crasse picti, & folia sunt, ejusdem magnitudinis cum figura: Idem mihi evénire videtur ipsi Clusij figure, quod animadvertere poterit Lector conferens descriptionem cum iconè.

Si Clusij Chamæcistus hic eadem est, cum nostra, sanè in leone, quam proponimus, caules nimis crasse picti, & folia sunt, ejusdem magnitudinis cum figura: Idem mihi evénire videtur ipsi Clusij figure, quod animadvertere poterit Lector conferens descriptionem cum iconè.

Tab. & Ger. Cistus humilis Austriaca Klein Cistenröflein. C. Bau. pin. Chamæcistus 10. sive hirsuta.

HELIANthemVM, SIVE CISTVS humilis, folio Sampsiuchi, capitulis valdè hirsutis.



Def.

Radix.

Caules.

Folia.

Flos.

Dodrantales circiter, eosque creberrimos, aliquando à radice lignosa, crassiusculà, longiusculi, surditi caules, eosque rigidos, perquam hirsutos, per quos veluti ad nodos se ita adversa, Majorana foliis paria, alia oblonga & latiuscula, alia angustiora: flores in ramulorum extremis multi, semurcialibus circiter pediculis hirsutissimis rami, lutei, folioso calyce, stria-

to, villosa obvallati. Hanc Cherlerus attulit Monspelio ac nominavit Cistum folio Sampsiuchi.

HELIANthemVM AD NUMMULARIAM accedens.



Perplacet nobis planta à D. Richnero Basileæ anno 1568. data, nomine Cisti, folio Sampsiuchi, dolemus non integram fuisse, sed tantum ramos cubitales, quos putamus supra terram excludi fuisse. Rami magnis pilis hirsuti, folia bina in ordine disposita, ad Nummulariam accedentia, minora tamen & cum pediculis longiusculis, quales Alsine vulgari, tales pediculis in consimilibus Helianthemis, vel Cistis minoribus non observavi: folia breves habent pilos, minus conspicuos: ad alas foliorum sunt tenuia foliola.

Rami.

Folia.

HELIANthes SPECIES RARA, coma inflexa, ut in Heliotropio.



Radix crassitudine digitali, longitudine sesqui palmari, lignosa, fibris paucis, sed validis donata, foris buxæ, intus alba, ramos sex, octo, aut plures per terram spargit palmares & spithameos, teretes, tenues, quibus folia nullo insigni sapore prædita, crebra, alterno situ utrinque adnascuntur Majorana, glabra, & ex viridi luteola, unico nervo per longitudinem decurrente, at priora folia, & quæ proximè terram, non parum ab iis, quæ per ramos videntur, differunt, utpote longiuscula: flores in extremis ramulis perquam conferti & Scoppioideis reflexi, quinque foliis albis constant, apicibus luteolis, quinque viridantibus extrinsecus obvallati: capitula sequuntur triquetra, sulcata, semine exiguo, papaverino pari, atro, cavitate impressa, sam altera parte habenti, altera gibbo repleta amaro.

Def.

Rami.

Folia.

Flores.

Capitula.

Semen.

Lob. not.

tur.

Lob. attribuit huic flores aureos, cum sint albi: verum eam describit ex sicca planta, non ex vivente, in quibus non raro mutantur colores. Vocat autem Helianthes speciem rarà, figurà leguminosà, floribus aureis: In le. Cistum folio Majorana deflexis floribus: ejus autem icon non placet, idè aliam curavimus pingendam. Aliquando milit nobis Hortu-

Telephium. Hortulanus Ducis Potentillæ cum inscriptione, an Telephium Candia? Cherler, tulit cum sequentibus nominibus, Telephium, orundam & Helenium Cratææ, dictum à Pona. Imper. Telephium Dioscoridis quibusdam, Helenium Cratææ. **Telephium.** Cam. hort. ait caldrem, quem in Telephio Imperati requirant veteres, à radicem potillam gustantibus deprehendi.

C. Bauh. C. Bau. phyt. meminit hujus Telephii: scilicet, rater mentem Camerarij, ut suo capite di lum, in faciens cum Aizon peregrino e jusde in Camerari. Ego Telephium Dioscoridis non existimatum, de proprio siquidem non convenit, ut apparet confer. Eid. pin. Cistus scemina 8. sive folio Majoranæ: Hianthes species Peræ, Lugd.

Aizon peregrinum. **Telephium Dioscoridis.** **est contra Camerarium.** **Locus & Tempus.** Ex Gallo-provinciæ misit Iacobus Reynaudet, primum nomine plantæ repentis, ut Numularia secundæ stirpis Veronicæ nodo repentis. Ex semine mihi nullo provenit floræque Junio & Julio: etiam non reposita duravit aliquot annis: Basilæ observavi in hortis, & Lutetia Augusto cum suis capitulis. Camerario perit hyeme postquam plurimos annos duravit, semine tamen sponte exidente, plurimum rursus propagavit. Lob. misit Raymundo è jugis arduis montis D. Bonaventuræ non procul Aquilexus erutum.



succum, quali Ledi genera madent) effundere videtur.

Clusio hæc planta revocat in memoriam fruticem Gagei, qui etiam frutex odoratus, de quo nos suo loco.

Clus. Pan. & hist. Myrto-Cistus Balearica, & (ut Ger. & C. Bau. pin. cui etiam Cistus ledum 17.) Myrto-Cistus Pennæi. Tab. Myrto-Cistus Clusij.

Londini in Anglia siccam ostendit Clusio, Pennæus Londinensis Medi-

cus, quam ille ex Balearum insularum majore, vulgo Majorica nuncupata erutam, Myrto-Cistus appellavit.

CISTI FOLIO ARBOR EXOTICA,
capitulis lanosis Platanis.

Defr. **Vergula.**

Folia.

Flori.

Synop.



Cisti folio arboris extrema virgula lignosa sunt, Cisto consolida & similia: folia item rugosa, oblonga, sive aut Menhe, sed in summis ramulis villosos, exactè sphericos floccos ostentant, sive lanosa capitula Platani.

Lob. Adv. & Ic. Arbor exotica Cisti folio. Tab. Cisti folio exotica arbor.

Lugd. Cisti, vel Ledi Arbor peregrina Pene. Ger. Cistus exotica. Lobelij. C. B. pin. Cistus

scemina 13. sive Cisti folio arbor exotica. Belg. Weilauschen boom met bladers van Cistus: Angliæ strangæ Cistus.

MYRTO CISTVS PENNÆI, FLO-
ribus luteis oblongis.

Defr. **Cortex.**

Folia.

Flori.

Capitulum.

Myrto-Cistus tricubitalis interdum frutex est, scabro admodum cortice, & velut quibusdam tuberculis obsito, qui in vetustis ramulis facillè abscedit & sponte decidit: foliis Myrti ferè, dorso non minus scabro, quam ramuli, supernè autem lzuibus, conjugatim ut reliquis Cisti generibus circa ramulos nascentibus: flores summis virgis insident, luteis quinque oblongis foliis constantes, & multis intus longiusculis staminibus præditi: his succedit oblongiusculum & pentagonum capitulum, semine plenum. Tota stirps odorata est, & gummi sive resinam (lentorem potius & pinguem quandam



Vtrumq; Nerium Alpinum, tum facies, tum naturales conjunxerunt.

Frutex est prius cubitalis, ramis contortis ac lignosis, digitali crassitie, cortice veltus, extinto quidem cineraceo, interiore autem nigricante, at minimi ramuli subinde etiam rubente cortice teguntur, per quos

folia, circa fastigium conferta, glabra, brevibus hærent pediculis Lætici foliis paria, nec forma distimili, nisi quod crassiora, nervosiora, Clusio autore, minime in ambitu hirsuta: superiore parte vident, inferiore ferruginei sunt coloris, saporis adstringentis, & quodammodo resinosi: Inter quæ in extremis ramulorum flores multi coacervantur coccinei.

Clusio, dilutiores, quam sequeris, oblongi, superius quinque partiti, atque argenteis punctulis conspersi, in quibus plusscula stam-



mula, capitulis totidem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

Capitula. dem, medium pistillum stipant, quibus decedentibus relinquuntur capitula rubentia, in quinque catinulas dehiscencia, in quibus pulvisculus, veluti semen ferrugineum. Radix oblonga, lignosa, dura, subnigro cortice tecta. Hujus porro surculorum summatibus capitula quaedam increscunt, squamis foliaceis congesta, oblonga, & gemmae majoris speciem exhibentia. Colore subrufo foris, intus flavescence. Foliis verd (Clusio referente) ramisque adnata aliquando repeniuntur Tubercula, nunc Nucis ponticae, modò Pisi magnitudine, inaequalia, foris rutilante aut pallescente nonnunquam colore, intus fungosa, alba, gustuque adstringente, pulpa plena, quae gallarum vicem prestare possint.

Nerium II. Alterum Nerij Alpini genus, multis etiam stolonibus, duris, ac lignosis, cubitalibus, aut paulò longioribus, vix unquam surrectis fruticat. Folia oppositum per ramorum extrema conspiciuntur, & licet quidem conferta, breviora, quàm precedenti, & obtusiora, utrinque virentia, sed virore saturato, per ambitum pilis seu ciliorum tarsus, longis & conspicuis oblita, saporis non ingrati, aromati, & nonnihil resinosi, cum astringente quadam. Flores precedenti consimiliter acervatim in ramorum extremis nascuntur, sed pediculis hirsutis intexentes, nec adeò diluti, & in capitula, quinque cellulis constantia, desinentia. Celsio capitula virida, suo odore capitis gravedinem quodammodo inducunt. Radix dura, lignosa, oblonga, sed & rami per terram sparsi, interdum libras agunt.

Gesner. in epist. ad Arcetium, scribit se Berg-Rosen in multis montibus invenisse, & Sabaudica Italicaque nomina diversa audivisse, quorum nullum Latinam, Graecamve originem praeseferat. Item de Lunariis agens (intelligit de Arthritica) ait eam vocari Fläblümle, & suavem esse odoratum, cuius ligno pro Xylobalsamo, & semine pro Carpopalsamo Bergoniensis quidam perperam utatur. Ad hanc eodem libro in descr. Montis fracti, inquit: Rosa alpina, pastores nominare; Aldroandum verd Nerion Alpinum: sed potius, Ledum Alpinum esse denominandum. Item in fine hist. Cordi. refert, virum quendam Italum seu Chamænerium quoddam, Nerium Alpinum vocare, natura tamen totà discrepare: Demum in epist. ad me I. Bauhinum: in monte Gouthardo Laurum Alpinum virentem (ut scribis) invenisti ascendendo, quo nomine Balsamum ab aliis dictum (aliis Alp-Rosen / Berg-Rosen) accipere te conjecto.

Lob. Adv. Montana Allobrogum Lentisci-folia, Chamælexfolia, vel Oleastifolia, minus odora, Chamærhododendrum. Chamædaphnes, sive pusilla Laurus, an Germanicum Mezereum, an rum potius nostrum Chamærhododendrum? Et paulò ante: Alpigena Chamærhododendros, odora; Alpini Italo-Germanis, Alp-Rosen / bacculas Asparagi, vel Taxi pares & concolores, Septembri edens. Hæc ille. Ego facillè equidem crederem, eam duarum istarum specierum, quæ latiora & rotundiora habet folia, esse Nerij nostri Alpini speciem, si baccas non ferret, nostrum enim Nerium his destituitur. Videndum itaque an inter scribendum illa verba baccularum, non sint transposita apud Lobelium in Adv. & fortè pertineant, ad alteram plantam, quam paulò post describit. In Obs. habet figuram sub titulo Balsami alpini, de quo ait: Alpigenæ Chamærhododendri odoræ varietas. Balsamum Alpinum Gesneri & Rosa alpina, vel Evonymos Theophrasti, Dalechampi & Herbariorum. Idem ponit aliam figuram cum Bacis, cui hæc adscribit: Alpigena Chamærhododendros odora Adv. 154. Balsamum Italicum vulgare, sive Rhododaphne parva rustica, Terionarcha Plinii putata ex Guilandino. Eisdem alibi, Genuina uva Vrsi

Galenii apud Jusium, eadem videtur cum Alpigena Chamærhododendro exhibita Obs. p. 199. & Adv. 145. Videtur etiam Lob. in Obs. etiam in Adv. minus bene agnoscere Nerium Alpinum, sed miserè cum eo Vitis Adram secundam miscuisse. Aliquando fortè puit ramulum Ledi, sive Nerij Alpini sine floribus & fructu, cum nominibus prædictis, qualia inve inter chartas Valerandi adscripta: inde putavit leccas ferre.

Jus. in Pann. & hist. Cisto ledum non ineptè subigit Ledum Alpinum, de quo ait, Nerion alpinum Aldroandus appellat: Alpini pastores Alp-Rosen & Bergrosen / quidam etiam Bärenbläst (Vrsi florem dixerunt) nonnullos Bärenbläst (Vrsi florem dixerunt) vocant. Primum genus intelligi existimarem à Lobelio in Adv. sub Alpigenæ Chamærhododendri odoræ nomine, nisi bacculas Asparagi vel Taxi pares illi tribueret, quas in nostro non reperias; sed pentagona cartilum capitula, ut ex ejus descriptione liquet. Alterum plurimum convenit, cum ejus Montana Chamælexfolia, sive Lentisci folia, Chamærhododendro minus odorata in Obs. prioris iconem exhibet Lobelius, Balsami alpini nomine: pictor tamen flores non fideliter expressit, quos in quinque crenas, non in quatuor divisos esse compersit, siquidem suis floribus onustos à me anno 1574. amicus Machliniam misit (de quibus illam iconem expressit) diligentius considerasset: licet non negem interdum fieri posse, ut quatuor tantum crenis dividantur, sic nonnunquam ludente in floribus natura: at omnes in eodem ramo tales natos esse, credibile non est. Et hic est frutex qui à nonnullis Evonymos dicitur, nescio qua ratione ductus: Nam in hoc ubi fructus Sesamo proximus, in quo acinus in quaternos versus digestus, qualem Theophrastus; sive granum quadrangulæ figuræ, quod Plinius alliter tribuit. Sed ex ipsa sanè historia satis liquet ne minimam quidem notam ad Evonymum Theophrasti & Plinii referri posse. Itaque cum Gesnero Ledi potius esse genus, quam Nerion aut Evonymum arbitror, multum me impellente, ut ita censeam, hujus stirpis odore & temperamento. Rustici & pastores eorum montium, in quibus observavi, utrumque genus Rausch appellant.

Myrtus Alpina dicitur Rob. Constant. In Rhætia Porcellana Dourez annotat ad ramum plantæ nostræ esse Evonymum Theophr. veram Dalechampi, Laurum tinum Plinii, Rhododaphnen rusticam Gesnero & Chamæpeucen Bellonio. Gesnerus autem sub junctat nihil habere commune cum Lauro.

Tab. (ubi decimum facit) Ledum Alpinum: Item Balsamum Alpinum Alp-Balsam: Adhæc, Chamærhododendros alpina latifolia, Balsamum Italicum, Alp-Rosen. Demum, Chamærhododendros alpina angustifolia, Alp-Rosen / montana Allobrogum, Lentisci folia, Chamælexfolia, aut Oleastifolia. Cæterum, quam Tabern. ponit sub titulo Alp-Rosen / Chamærhododendros alpina latifolia, cui baccas tribuit, videtur mihi Vitis Idææ species, quam confundit cum Ledo Alpino. Cui vero titulus est, Alp-Rosen / Chamærhododendros Alpina angustifolia, est Ledum sive Nerium Alpinum glabrum, sed figura non placet. Illa autem quæ inscripta est, Alp-Balsam / Balsamum Alpinum, est Ledum Alpinum hirsutum. Tandem cui nomen Ledi decimi Alpini est in hist. eadem est cum Balsamo Alpino Tabern. vel Ledo alpino, hirsuto.

Lugd. Evonymus Theophr. l. 3. c. 19. quæ eo auctoritate tum alibi, tum in Ordynno, Lesbii monte nascitur (sic enim ex Plinio legendum, non eorum quodammodo ut Theophrasti exemplaria habent magnitudine folioq; Punice, pariter molli, majore, quàm Chamæ-

Figura
Lob. f. 154.

Evonymos
non est.
Nerium
non est.

Rhododaphne
Chamæpeuce

Vitis Idæa
Theophr.

Evonymos
Theophr.

plumum cor-
rigitur.

Tempus. Chamædaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color, qualis Leucio, odore gravi, & qualis sentitur trucidato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, *scilicet dicitur de eo Plinius trans-*

Pliny error. stulit, statim pestem deruntians, sed non rectè) fructu cum suo putamine loculo ve Sefami filiquis non absumili, intus solido, sed in quatuor versus distin-

Asa lethalis. ctio. Est lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis pectori, & ovium gregibus, sed præcipue capris, nisi purgentur. Purgantur autem inedia & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinor, traducta sunt, quam à Theodoro. Nusquam legi quid sit *Asa*.

Gaza le-
Asa degra-
Quæ. Quare *asa* legi potest. Alii *asa* interpretantur vomitionem, ut Dodonæus. Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves resugere opiliones asserunt. Dalecha npius quidem eam attentis

contemplantur caprarum greges, vicina fruteta depascentes, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque ad eam deceptam obiceret, reversam deprehendit. Allobroges vocant *des ourles*. Quo loco Theoph. Chamædaphnes legitur, merdum subesse Asteriscus indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Vincam pervincam venterit non *ad eam* in, similem lego, sed *ad eam*, præsertim puniceo. Floris tam gravem & detestandum odorem non potest significare *asa*.

Hæc Lugd.
notatur. Hæc Lugd. quæ jungit & describit glabram plantam, quæ non est, ut vult, Cneorum Matthioli.

Evonymus
Theoph.
non est. An sit Evonymus Theoph. hæremus. Non enim audivimus quenquam vidisse hanc in arborem excrevisse, folia non sunt mollia, fructus non est solidus, locus *scilicet non sunt in quatuor versus distincta*, sed in quinque. Odor, nec sapor nobis ingratus & sordidus, sed aromaticus & resinosus.

C.B. pin. Ledum alpinum, sive hirsutum: Alpigenæ Chamærhododendri varietas, Lob. Balsamum alpinum Gæleri, Lob. Tab. & Cam. Ledum alpinum, Clus. pan. & hist. Tab. Cistus Ledon alpinum, Ger. Eid. pin. Ledum alpinum, sive foliis ferrea rubigine nigricantibus: Ledi alpini genus alterum, Clus. pan. & hist. Rhododendros alpina quibusdam, Cæs. Chamærhododendros alpigena, Ger. Hoc floris colore variat, communiter dilute rubentis: at in Pyrenæis, flore tantum albo reperitur.

Locum. In Allobrogum saxosis & asperis montibus nasci, propè Muram oppidum, decem à Gratianopoli miliaribus distans, Punica non altiore, sepilis brevior, legitur apud Lugdunensem. Ledi Alpini genus 1. inventum à Clusio in summis Eneberg/Encalpen/Wedelsch/Schneckenstein, aliarumque vicinarum Alpium jugis inter saxa, ad deversa plerumque eorum latera, & supra Gammangam, Chartistanorum Cornubium, in montis ascensu lapidibus strato, qui sub arduus est iis, quoad Schof & vicinas Alpes proficiscuntur. Aliud ejus genus invenitur in Encalpen supra Neuberg. Floret utrumque Iunio & Julio: semen sub Augusti finem, aut paulò senius mature scit. Ledum alp. minus, hirsutum, in prioritabellâ htera A. der otatum provenit in montibus Genevensibus, ut Thuiri. Vtrumque vidit in montibus Rhæticis, ut Burnio floris mense Iunio; Patavij virens Martio, est enim perpetui folio: In monte Gotthardo Maio cum angustioribus foliis & quadrupartito fructu, unde etiam attulit Cherlerus. Vtrumque Ledi genus observavit Gargillus in monte Pilau Lucernatum mense Iunio, glabrum quidem adhuc floris, hirsutum verd jam defloruerat.

Tempus. Vtrumque Ledo Alpino tinctores, qui montium Eneberg/ & aliorum vicina inhabitant, ubi provenit, utantur ad lineas penulas nigra colore tingendas, autore Clusio.

ROSMARINVS SYLVESTRIS quorundam. CAP. XI.

C Vitalibus interdum est virgis, firmis, lignosis, cortice cinereo obductis, quarum extremitas in plures alias tenuiores & quodammodo purpureascentes, easque etiam nudas dividuntur; illæ vicissim in alios dodrantes ramulos, virentes quidem, sed tomento quodam rubiginei coloris obritos,



quos nullâ serie digesta, sed confusa ambiunt folia, Libanotidis coronariz foliis, se-
Folia. re similia, sed longiora, supina parte viridia, adeoque in pronam partem reflexa & convoluta, ut ejus nihil conspici possit, præter nervum, secundum folij longitudinem, excurrentem simili tomento cum pediculo, cui inhaeret, pubescentem, grati & suavis odoris, acriusculi tamen saporis: summis istis

ramis insident capita, ex multis, brevibus quasi squamis ferrugineis compacta, è quibus deinde se explicat, corymbacea quædam multorum florum coma, oblongis, tenellis atque virentibus, nonnihil tamen lanuginosi pedicellis inhaerentium, grato odore nares tenendum, quinis foliolis albis constantium, non sublateorum (ut temerè quidam Lob.) qui sic cum flore ramum duntaxat conspexit, asserere non est veritus: decem candidis staminibus cum stylo medium florem occupantibus: his demum succedunt, oblongiuscula capitula, per tago-
Capitula. na, officulis fructus Corni, aliquando magnitudine non cedentia, quæ, dum adhuc viridia sunt, argenteis punctis distincta esse videntur, sed maturitatem adeptæ, rubiginei sunt coloris, semenque continent oblongum, flavescens, adeoque exile, ut scobis, è ligno à v. ramibus crosso sponte decidentis, insistant. Verum peculiare est in istis capitulis, ut maturæ deorsum inflectantur, terramque mucrone spectent, magnâ Naturæ providentiâ, ne semen temerè effluat: nam præter reliquorum consuetudinem, à pediculo, non ab extrema cuspidè, aperiri & dehiscere solent: immaturo semine, terni aut quaterni, alij ramuli, rubigineo tomento obducti cum suis foliis, in comæ lateribus nascuntur, spem florum in sequentem annum pollicentes: radix lignosa est, & brevibus fibris donata. Tota planta odorata, præsertim cum floribus onusta est, & aromaticum quiddam spirat.

Monuit Clusium Achilles Cramerus, ad montium radices, se aliquas plantas invenisse, quæ flores sex foliis constantes, duodenisque staminibus præditos proferrent: insuper addidit, qui illi dux via fuisset. Venatorem adfirmare similem plantam, in summis montium jugis conspexisse, jam suis floribus ornata, quæ digitalem longitudinem non excederet, nominatam autem ab eo Seydnisch bin-
Apiana peregrina. traut hoc est peregrinam Apariam, quod apes ejus videlicet floribus delectentur.

Cord. in Diosc. Chamæpeuce, à Germanis Zeirbeyde appellata, quam ait quosdam pharmacopolas Chamæpyum vocare, sed errare: quædam exempla

na pro

HISTORIAE PLANTARVM

na pro *zauar d'm*, *zauar d'm*, habere, sed malè. Chamæpeuce Dioscoridi & Plinio, Germanis *Sertrannen* / *Sichtrannen* & *Zeitheyde* appellan-
n. Hæc ille, qui in hist. eam copiosè describit.

Falli eos ait Matth. qui velint esse Ericam Dio-
scoridis: is vocat *Wilden Rosmarin*, Rosmarinum
sylvestre: Bohem. *Kopowend*. Lob. Obs. & k.
Ledum foliis Rosmarini alterum.

Videtur Clusio pann. & hist. Cisti Ledi generi-
bus adnumerari posse hunc fruticem, Rosmarinum
sylvestre, vocatum à Matthiolo & Castore, idè què
Lefiacum. Ledum Silesiacum nuncupavit.

Cam. hort. Chamæpeuce Cordi: Eid. ad Germ.
Matth. ejusdèmgue Epit. Rosmarinum sylvestre.

Tab. Ledum Rosmarini folio: Item Ledum Si-
lesiacum. Si compilator intellexisset, vel diligenter
confiderasset, quæ scriberet, non separasset à capite
Rosmarini sylvestris Matthioli Cistum adulterinam:
nec ejus imitator Gerardus, cui dicitur Cistus Le-
dum Silesiacum, the Polonian Cistus: item, Cistus
Ledon Rosmarini folio.

H. Lugd. p. 967. Rosmarinum sylvestre sive Bohe-
micum Matthioli. Schwenck. Ledum Silesiacum
majus: Melissa solitudinum: Schabenfram / *Sey-
den Bientraut* / *Hart Heyde* / *Grange* / *Seygrang-
ze* Monticulis, quali dicatur suum grando, per me-
diatè in literarum. C.B. pin. Cistus ledon 15. sive
foliis Rosmarini ferrugineis: Rosmarinus sylvest.
Dod. belg.

Floret sub finem Junij, & Julio plurimis udis &
desertis montium locis: semen Augusto & Septem-
bri est maturum: in hærentque interdum in sequen-
tem usque annum capitula, sive ut recenti flore, &
fructu superioris anni vacuo, nonnunquam & ter-
tij anni fructus pedicellis, onusti rami conspici
possunt.

Excalescit, attenuat, aperit, roborat, concoquit,
resolvit, incidit, & digerit. Quin ad ea omnia effi-
cax est, ad quæ Coronarius Rosmarinus, præter-
quam ad ciborum condimenta. Non dubium est ta-
men, quin si quis periculum faceret, ad pleraq; ma-
gni usus futurus sit hic frutex. Sileij, teste Crome-
ro, adversus articulorum contractions felicissi-
mum ejus usum compererunt, totius plantæ deco-
cto in solium infuso, cui ægri insideant & subinde
repetant. Hujus Oleum stillantium vitreis orga-
nis extractum, quod cum fragrans admodum sit, &
stirpis florantque nativum odorem retineat, ma-
gnas procul dubio facultates etiam obtinebit. Non-
tum tamen quicquam periculum fecit, sed non de-
futuro arbitramur, qui aliquando experientur. To-
ta planta odorata est, & aspectu jucundo (inquit
Schwenck.) præsertim cum floribus opusta est.

Articulos roborat: prodest sciaticæ, & aquosis pe-
dum tumoribus. Additur infessibus ad menses mu-
lierum eliciendos, aliisque uteri morbos. Lixivio ad
inveteratos capitis dolores. Cum Scrofularia in bal-
neis scabiem sanat. Cymas cerovisæ nonnulli inco-
quant ad inebriandum. Totam plantam in cistas,
vestimenta à tineis & blattis ut vindicet, reponit
vulgus. Rustici in stabulis substernunt jumentis &
porcis, adversus eorum scabiem & grandinem. Fo-
lis apianj alvearia perficere solent ob odorem a-
pibus gratum & amicum.

ROSMARINVS SYLVESTRIS, • Clusio. CAP. XII.

Frutex quidam, inquit Clusius, pedalis altitudi-
nis raro amplior, tenuibus, subrubentibus, vir-
gis præditus, quæ deinde in tenuiores candicantes
que ramulos, dividuntur, angustis, oblongisque fo-



lis, temerè & con-
fuso ordine eos ve-
stientibus onustos,
superne virgibus,
inferne verd canes-
centibus, & Salici-
pumila angustifo-
lia foliis admodum
similibus, gustu
valdè exsiccante, &
nullo grato odore:
summis etiam ra-
mis insident capi-
tula, ex multis, bre-
vibus squamis co-
pacta, cachrys
modo, è quibus se-
se explicat aliquot
flosculi, tenuibus,
oblongisque pedi-
cellis inherentes,
quinq; foliolis co-

stantes, ut superioris, sed diversi coloris, nimirum
rubri dilutionis, sive quodammodo carnei, quibus
excussis pentagona conspiciuntur capitula, breviter
& obtuso mucrone, exili & pallescente semine ple-
na. E Silesia ad Clusium mittebat Frid. Sebitz, in-
scriptione Rosmarini sylvestris descripti. Tab. Ci-
stus adulterina mihi incognita. Compiler poterat
considerare esse effigiem, Clusij figuræ valdè simi-
lem, & ponere prope Rosmarinum sylvestrem Mat-
thioli. Ger. Cistus adulterina, Contræscut. Cistus:
item, Rosmarinus sylvestris, Wilder Rosmarin.
Cur Gerardus duas facit Cistum adulterinam ex
Tab. & Rosmarinum sylvestrem ex Clusio, diversas
plantas? Cur non ponit, s. juxta Cistum Ledum
Rosmarini folio?

C.B. pin. Cistus ledon 16. sive foliis Salicis angu-
stifolia. Chamærhododendros montana Allobro-
gum lentiscifolia, Lob. Adv. & Ic. Chamærho-
dendros alpina angustifolia, Tab. Chamærho-
dendros montana, Ger. Rosmarinum sylv. minus,
Cam. ep. Hic doctores judicent, an ego fratre C.
Banhino melius Chamærhododendron hanc mon-
tanam, Lob. Tab. & Gerardi, ad Nerium alpinum;
Vel ille me rectius, ad Cistum Silesiacum Clusij, si-
ve Rosmarinum, referat?

Hoc tamen moneo, me suspicari Clusij Rosma-
ri iconem factam ad plantam in horto cultam, &
forte non differre nisi culturâ, à sequenti Camerarij
Rosmarino sylvestri minore, ut statuere etiam vide-
tur Schwenckfeldij.

ROSMARINVS SYLVESTRIS minor Camerarij.

Minor, & tenerior est priore, lignosis at-
que tenuibus virgis, ultra palmi altitudinem
paululum assurgens: vel ad plerumque dodrantem
æquans: folia acuminatiora sunt, & inferiore parte
cæcia. In furculorum summitatibus flosculi pro-
deunt rubelli, è quibus semen, prioris plantæ
[Rosmarini sylv. quorundam] semini simile. Odor ipsius
vix percipi potest.

Nascitur Rosmarinum sylv. minus, Cam. Epit.
sive (ut in hist. Germ.) Rosmarinus sylvest. minor,
Wilder fleiner Rosmarin in Borussia, in silvis um-
brosis, uliginoso solo prope priorem, quæ ibi huma-
nam staturam pæne superat.

Rosmarinum hoc Camerarij mihi persuadeo
idem cum Clusiano inodorato, antè tradito, quam-
vis icones multum differre videntur: forte à Clusio
cultu



culca depicta.
Schvvenckf. Ledū
Silefiacum minus:
Rosmarinum silve-
stre minus Mat-
thioli: Rosmar. silv.
Zotici Clusij: Hic in
Grange.
Rariss occurrat
isdem nataliis,
flore Maio & Junio
conspicuis, conca-
vo, quo ab altero
diversus, suaviter
rubente.
Folia Rosmarini
latiora, pulchrè vi-
xentia, inodora, ex-
siccantis & adstrin-
gentis facultatis.
Neglecti usui.

LIBANOTIDIS SPECIES RON-
deletij. CAP. XIII.



Lignosus est fru-
tex, bipalmaris
(à Cherlero, bicubi-
talis observatus) ra-
dice subrufo, robu-
sta: stolonibus rigi-
dis Rosmarini
textura, alioqui gla-
bris, sed minoribus
ramis, hirsutis, per
quos folia, Hysopi
Arabum foliis pa-
ria, alia Thymi Cre-
tici capituli folio-
rum modo, latiora,
hirsuta, aspera, du-
ra, ex eodem pur-
pureo saepe numero
plura, quorum u-
num reliquis lon-
gius multo, urcia-
lem tamen longitu-

dinem non assequitur, nervo unico, per singula se-
cundam longitudinem decurrente: nullo seu odo-
re, seu sapore: flores extremis hærent ramulis, ex
oblongo tubulo in calathiscum quinquepartitum,
ad Primulæ veris imitationem, explicati, colore pur-
pureo, semina cum Echii seminibus nonnihil ha-
bent commune, aut potius Buglossi, satis magna,
colore cinereo.

Lugd. figuram & descriptionem habet sub titulo,
Tragoriganum nothi Dalechampi. C.B. phyt. Trago-
riganum angustifolium 3, sive, Tragoriganum ro-
thum Dalech. Ed. in Animadv. in Hist. Lugd.
Tragoriganum nothum Dalechampi: Anchusa li-
gnosior Penz. Vtrobique describitur. Non possum
ego cum fratre Tragorigarum Dalech. & Anchusa
Lobelij eandem facere plantam, quamvis ad-
huc in pin. ejusdem sit opinionis. Vna enim frutex
est: altera non item. Vni flores spinosi, purpurei:
alteri pusilli, cærulei.

Mensibus Martio, Aprili & Maio floret Monspe-
lij in monte Castelnou.

ROSMARINVS CORONARIVS
fruticosus. CAP. XIV.

Rosmarinus frutex jucundissimi odoris Thus
redolentis (unde & nomen ipsi) & Coronarij
Tom. II.

tum) vel imprimis utilitatis commendatione notis-
simus, & quia corollis petiis, Coronarij nomen
adeptus, bicubitalis est, & alior, virgultis tenuibus, ruginis



cinereo colore p-
ditis, in quibus fo-
lia aliquot simul,
ex intervallis o-
riuntur, rigidula,
Lavendulæ angu-
stioribus, brevio-
ribus, pronè parte
candidis, luptinè
semper virentibus:
flores ex foliorum
alis, ex catulco al-
bicantes, Salvia
florum effigie, mi-
nores, labello co-
tylæ instar cor-
vo, guttato: fibræ
incurvæ, longæ, ex
rictu sub supremo
folio promicant.

Duplicem magno-
scimus Rosmari-

num vulgarem, seu Coronariam Libanotin, cujus
modi etiam meminit Cordus & ex eo Ges. de hortis.

Vra n nobiliorem angustiore folio, quam Cordus
in Hist. Rosmarinum mir orem seu tenuifolium ap-
pellat, quique apud nos in hortis colitur, quem qui-
da n putant veram Libanotidem Diosc. & veterum
Medicorum, sed apud nos degenerare: verum hi to-
to cælo aberrant: diversissimæ sunt plantæ. Alteram
ignobiliorem à Cordo silvestrem seu majorem vo-
catam, cui Plinium falsò semen negare tradit, quan-
que nasci in Narbonensi Gallia scribit.

Munsterus. Cosm. lib. 2. de Narbona, Rosmarini
ineptam figuram proponit. Quin & Crescentius
pro Rosmarino aliquid Myrti simile pingit.

Mizald. ait rura & officinas Rosem marium ap-
pellare quod aliis Libanotis dici soleat. Sed Mizal-
dus non distinguens inter Libanotidem, quæ Ca-
chry fert herbam: & Libanotidem coronariam fru-
ticem, huic tribuit, quæ ei conveniunt, ut infra lice-
bit videre de viribus ex eo recitatis. Eundem pla-
nè errorem ac plures alios Car. Steph. in hort. com-
mittit, talia dicens: Rosmarinum, sive, ut quibusdam
placet Rosmarinus, adhuc hodie vulgus appellat du-
Rosmarin: Eum autem fruticem Plinius Libanotida
vocat l. 9. c. 12. &c. Sunt autem, ne quis fallatur, mul-
tæ Libanotidis species, quarum una tantum mihi
est cognita. Est enim Libanotis serax, quæ duplex,
mas & femina: folia habet Rosmarino similia, sed
umbellam gerit, quemadmodum Anethum, in qua
est Cachry, cujusmodi in canina Rosa apparere so-
let, atque in ipso Cachry semen complexum est. Cæ-
terum hæc dux Libanotidis species mihi sunt igno-
tissima. Est & alia Libanotis, quæ sterilis appellatur,
cæque simplex est, ramos sessiles habens, ac folia no-
stro Rosmarino similia, sed neque florem, neque
semina gerit, passimque audio reperiri apud Mon-
spelulanum item etiam in quibusdam Hispaniæ a-
gris, quos eà herbà spontè nascenti plenos ac refer-
tos audi. Est insuper alia Libanotis species nobis
cognitissima, atque hæc Gal. l. 7. simpl. Coronaria
vocatur. Quæ hætenus scribit Steph. de Libanoti-
de coronaria, scateant erroribus. In primis malè Ro-
marinum coronarium, eandem facit cum Libano-
tide Plinij. Quis dixit Stephano Libanotidem sera-

mas & femina: folia habet Rosmarino similia, sed
umbellam gerit, quemadmodum Anethum, in qua
est Cachry, cujusmodi in canina Rosa apparere so-
let, atque in ipso Cachry semen complexum est. Cæ-
terum hæc dux Libanotidis species mihi sunt igno-
tissima. Est & alia Libanotis, quæ sterilis appellatur,
cæque simplex est, ramos sessiles habens, ac folia no-
stro Rosmarino similia, sed neque florem, neque
semina gerit, passimque audio reperiri apud Mon-
spelulanum item etiam in quibusdam Hispaniæ a-
gris, quos eà herbà spontè nascenti plenos ac refer-
tos audi. Est insuper alia Libanotis species nobis
cognitissima, atque hæc Gal. l. 7. simpl. Coronaria
vocatur. Quæ hætenus scribit Steph. de Libanoti-
de coronaria, scateant erroribus. In primis malè Ro-
marinum coronarium, eandem facit cum Libano-
tide Plinij. Quis dixit Stephano Libanotidem sera-

cent habere folia Rosmarini: Diosc. dixit Matathij.
Quid sibi vult cum Cachry in rosa canina? Quam-
vis est Monspelulana & Hispanica: Cur non
læni eandem cum Rosmarino, primo loco ab eo tra-

car. Steph.
erroneo pla-
ret,
Ga-
C

HISTORIAE PLANTARVM

dicant? Cur non statim eam subjunxit? Verba quæ de viribus adducit radicis, nullo modo competunt

Fr. V. m. m. m. nostro Rosmarino. Sed & Francisc. Venetus in sua Harmon. mundi confundit cum Libanotide, si-

Zea. Den- ve Rosmarino coronaria, umbelliferâ sive ferulaceâ. Trago Libanotis dicitur etiam Zea, ite Dendroli-

Arbor Ma- banus & Campfanema, ab Italis Corona montana. In Serapione hæc leguntur nomina Xaieralmerien,

ria. Arbor Mariz, Alpinalphach, Cachola. Avic. facit Buchormarien, quod negat Serapio. Orpheus vocat

Ang. eren. Solis Thymiana teste Agrippa occult. philosoph. Anguillara est Rosmarinus coronaria Cneorum nigrum Theophr. Casia Hygini & Virgilij. Sed errat Anguillara, ceu & alij recentiores quidam, existimantes Rosmarinum coronarium esse Cneorum Theophrasti.

Sym. C. B. C. B. pin. Rosmarinus 1. sive hortensis angustiore folio. Rosmarinus, Brunfels. Trag. Fuch. Turn, & Lon. Rosmarinum coronarium, Matth. Ang. (cui & Cneorum Theophr. & Casia Latinorum) Dod. gall. Lac. Lob. Lugd. Cam. & Eyst. Libanotis coronaria, Cord. in Diosc. & Gesn. hor. cui & Rosmarinus minor sive tenuifolius. Casia nigra Theophrasti, Dal. in Plin. Hyssopus Hebræorum quibusdam. Floribus est communiter subcæruleis, rarius albis.

Coronaria. Eid. pin. Rosmarinus 2. sive spontaneus latiore folio: Rosmarinus silv. seu major, Cord. hist. Rosmarinus alter ignobilior, Gesn. hort. Rosmarinum silv. Cæf.

cur. de B. m. Cæterum, Coronariam hanc, & Libanotidem & Rosmarinum cognominamus ad differentiam aliarum Libanotidum & Rosmarinorum, partim scilicet hoc libro dictorum, partim verò dicendorum lib. 27. inter Umbelliferas.

Stomach. languor. *Alcavante Diosc.* Rosmarinus coronarius recentioribus, Rosmarinus aut Libanotis coronaria, Arab. El-halgeber: Germ. Rosmarin: Belg. Rosmaryn: Gall. Rosmarin: It. Rosmarin, Rosmarino coronario: Hisp. Rosmer: Ang. Rosmary: & Garden Rosmarien: Boh. Rosmaryn.

Locum cum tempore. Qui seminatur, & latiora & rugosiora habet folia, non facile fert hyemem. Alter folio angustiori, vulgarior, surculis facile propagatur: Ex semine an hic proveniat ignoro. Rosmarinum sponte provenientem observavi in Gallia Narbonensi, ubi tantus ejus proventus, ut haud temerè aliud incolæ lignum utant, eoque Monspelij & locis vicinis pro ignis vomite utantur. Floret mense Martio, Aprili, Autumno ac toto serè anno. Vvatvillæ in Alsatia me docuit Sacerdos, Rosmarino ut citius proveniat decerpandos esse summos ramulos, idque sæpius, ut lignum durius evadat ac frigori magis resistat: adhæc si in transplantatione, simus addatur, corrumpi. Seritur, inquit Plinius, quoniam illi semen non est [falsò illi negat semen] propagine & avulsione. Tradunt facie vini, aut è parietibus latere tulo, mirè ali. Rosmarinus certò tempore in novella Junipero insita, ut Cam. observavit, eò facilius hiemem non reconditus perfert.

Cultura. Diosc. Rosmarino vim tribuit calefacientem: sanare morbum regium, si quis ipsam in aqua coctam ante exercitationem exhibeat bibendam: deinde exercitatum lavet, & vinum ipsi bibendum det: miseret etiam acopis & unguentis de glaucino. Vfus ejus si Plinio credimus, stomacho post annum saluberrimus. Datur contra serpentes ex vino, vel aceto. Pulices etiam pontica, & cum aqua sparsa necat. Rosmarinus coronaria, ut Serapio testatur, calefacit, exsiccatque: & ex autontate Abir Mesue, confert, ait idem, Coriza frigida cerebri. Mizaldus varias et adscribit vires, de quibus ager dum. Rosmarinus inquit, frutex est copiosius, nec non coronarius,

Vires et usus. Diosc. Rosmarino vim tribuit calefacientem: sanare morbum regium, si quis ipsam in aqua coctam ante exercitationem exhibeat bibendam: deinde exercitatum lavet, & vinum ipsi bibendum det: miseret etiam acopis & unguentis de glaucino. Vfus ejus si Plinio credimus, stomacho post annum saluberrimus. Datur contra serpentes ex vino, vel aceto. Pulices etiam pontica, & cum aqua sparsa necat. Rosmarinus coronaria, ut Serapio testatur, calefacit, exsiccatque: & ex autontate Abir Mesue, confert, ait idem, Coriza frigida cerebri. Mizaldus varias et adscribit vires, de quibus ager dum. Rosmarinus inquit, frutex est copiosius, nec non coronarius,

cujus odor, testem aut Thus, utcumque præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus de-

fecerit, ilico recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiumque morbum suo curat decocto. Quod illi de multis nobile est ac insigne,

solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore saluati. Flores caput ac cerebrum

maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omni-

bus frigidis agitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis

& probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum

valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum luco Pomi generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare

adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhibet Mizaldum? Quis unquam observata Rosmarini

radice præscribet ex ea succum defæcatum, vel crederet lignosam & insipidam radicem efficere posse perbellè, quæ ille pollicetur: si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas

scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul aditringentis facultatis particeps; utpote

ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidique causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuunt, nervosas partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructions aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunque utilis, epilepsiz, lethargo, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori, albos fluores mulierum potu & infessu curat. Siccati pulveris cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosmarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento hibitum, auxilio est epilepticis. Conserva

florum Rosmarini idem præstat. Quibus anima fortet, aut visus imbecillior, prodest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Suffitus naribus & ore hiantes exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera purganda & ulcera extergit insperso simul pulvere. In vino capituli utiliter maceratur. Stillati liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitui siccò. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tempora inuncta apoplexiam præcavet.

conjugat, testem aut Thus, utcumque præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus defecerit, ilico recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiumque morbum suo curat decocto. Quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore saluati. Flores caput ac cerebrum maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis agitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis & probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum luco Pomi generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhibet Mizaldum? Quis unquam observata Rosmarini radice præscribet ex ea succum defæcatum, vel crederet lignosam & insipidam radicem efficere posse perbellè, quæ ille pollicetur: si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul aditringentis facultatis particeps; utpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidique causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuunt, nervosas partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructions aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunque utilis, epilepsiz, lethargo, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori, albos fluores mulierum potu & infessu curat. Siccati pulveris cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosmarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento hibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosmarini idem præstat. Quibus anima fortet, aut visus imbecillior, prodest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Suffitus naribus & ore hiantes exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera purganda & ulcera extergit insperso simul pulvere. In vino capituli utiliter maceratur. Stillati liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitui siccò. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tempora inuncta apoplexiam præcavet.

conjugat, testem aut Thus, utcumque præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus defecerit, ilico recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiumque morbum suo curat decocto. Quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore saluati. Flores caput ac cerebrum maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis agitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis & probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum luco Pomi generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhibet Mizaldum? Quis unquam observata Rosmarini radice præscribet ex ea succum defæcatum, vel crederet lignosam & insipidam radicem efficere posse perbellè, quæ ille pollicetur: si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul aditringentis facultatis particeps; utpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidique causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuunt, nervosas partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructions aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunque utilis, epilepsiz, lethargo, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori, albos fluores mulierum potu & infessu curat. Siccati pulveris cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosmarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento hibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosmarini idem præstat. Quibus anima fortet, aut visus imbecillior, prodest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Suffitus naribus & ore hiantes exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera purganda & ulcera extergit insperso simul pulvere. In vino capituli utiliter maceratur. Stillati liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitui siccò. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tempora inuncta apoplexiam præcavet.

conjugat, testem aut Thus, utcumque præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus defecerit, ilico recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiumque morbum suo curat decocto. Quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore saluati. Flores caput ac cerebrum maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis agitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis & probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum luco Pomi generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhibet Mizaldum? Quis unquam observata Rosmarini radice præscribet ex ea succum defæcatum, vel crederet lignosam & insipidam radicem efficere posse perbellè, quæ ille pollicetur: si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul aditringentis facultatis particeps; utpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidique causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuunt, nervosas partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructions aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunque utilis, epilepsiz, lethargo, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori, albos fluores mulierum potu & infessu curat. Siccati pulveris cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosmarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento hibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosmarini idem præstat. Quibus anima fortet, aut visus imbecillior, prodest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Suffitus naribus & ore hiantes exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera purganda & ulcera extergit insperso simul pulvere. In vino capituli utiliter maceratur. Stillati liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitui siccò. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tempora inuncta apoplexiam præcavet.


conjugat, testem aut Thus, utcumque præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus defecerit, ilico recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiumque morbum suo curat decocto. Quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore saluati. Flores caput ac cerebrum maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis agitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis & probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum luco Pomi generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhibet Mizaldum? Quis unquam observata Rosmarini radice præscribet ex ea succum defæcatum, vel crederet lignosam & insipidam radicem efficere posse perbellè, quæ ille pollicetur: si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul aditringentis facultatis particeps; utpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidique causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuunt, nervosas partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructions aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunque utilis, epilepsiz, lethargo, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori, albos fluores mulierum potu & infessu curat. Siccati pulveris cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosmarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento hibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosmarini idem præstat. Quibus anima fortet, aut visus imbecillior, prodest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Suffitus naribus & ore hiantes exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera purganda & ulcera extergit insperso simul pulvere. In vino capituli utiliter maceratur. Stillati liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitui siccò. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tempora inuncta apoplexiam præcavet.

conjugat, testem aut Thus, utcumque præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus defecerit, ilico recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiumque morbum suo curat decocto. Quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore saluati. Flores caput ac cerebrum maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis agitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis & probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum luco Pomi generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhibet Mizaldum? Quis unquam observata Rosmarini radice præscribet ex ea succum defæcatum, vel crederet lignosam & insipidam radicem efficere posse perbellè, quæ ille pollicetur: si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul aditringentis facultatis particeps; utpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidique causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuunt, nervosas partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructions aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunque utilis, epilepsiz, lethargo, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori, albos fluores mulierum potu & infessu curat. Siccati pulveris cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosmarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento hibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosmarini idem præstat. Quibus anima fortet, aut visus imbecillior, prodest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Suffitus naribus & ore hiantes exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera purganda & ulcera extergit insperso simul pulvere. In vino capituli utiliter maceratur. Stillati liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitui siccò. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tempora inuncta apoplexiam præcavet.

conjugat, testem aut Thus, utcumque præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus defecerit, ilico recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiumque morbum suo curat decocto. Quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore saluati. Flores caput ac cerebrum maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis agitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis & probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum luco Pomi generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhibet Mizaldum? Quis unquam observata Rosmarini radice præscribet ex ea succum defæcatum, vel crederet lignosam & insipidam radicem efficere posse perbellè, quæ ille pollicetur: si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul aditringentis facultatis particeps; utpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidique causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuunt, nervosas partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructions aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunque utilis, epilepsiz, lethargo, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori, albos fluores mulierum potu & infessu curat. Siccati pulveris cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosmarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento hibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosmarini idem præstat. Quibus anima fortet, aut visus imbecillior, prodest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Suffitus naribus & ore hiantes exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera purganda & ulcera extergit insperso simul pulvere. In vino capituli utiliter maceratur. Stillati liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitui siccò. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tempora inuncta apoplexiam præcavet.

conjugat, testem aut Thus, utcumque præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus defecerit, ilico recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiumque morbum suo curat decocto. Quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore saluati. Flores caput ac cerebrum maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis agitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis & probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum luco Pomi generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhibet Mizaldum? Quis unquam observata Rosmarini radice præscribet ex ea succum defæcatum, vel crederet lignosam & insipidam radicem efficere posse perbellè, quæ ille pollicetur: si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul aditringentis facultatis particeps; utpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidique causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuunt, nervosas partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructions aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunque utilis, epilepsiz, lethargo, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori, albos fluores mulierum potu & infessu curat. Siccati pulveris cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosmarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento hibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosmarini idem præstat. Quibus anima fortet, aut visus imbecillior, prodest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Suffitus naribus & ore hiantes exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera purganda & ulcera extergit insperso simul pulvere. In vino capituli utiliter maceratur. Stillati liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitui siccò. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tempora inuncta apoplexiam præcavet.

conjugat, testem aut Thus, utcumque præ se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus defecerit, ilico recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiumque morbum suo curat decocto. Quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore saluati. Flores caput ac cerebrum maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis agitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis & probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle despumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum luco Pomi generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhibet Miz



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XIV.

(543)

QVI EST ROSARVM, ET HIS AFFINIVM
SPINOSARVM NONNVLLARVM, VT
RVBORVM, CAPPARVM.

NUNC amantem illum Rosam celebremus, florum reginam, sed quæ undique rigida spinarum telis armata sit. Unde Rosa Plinio nascitur spinâ verius, quam frutice. Quamquam & nos absque spinis nascentes observaverimus, uti constabit in progressu. Sed quid vel spinarum minas metuerimus, eam roseo colore, eam pulchra florâ facie, eam suave spirante odore illud? Ad eam & florum venustissimam decerpentes contemplemur.

DE ROSA. CAP. I.

Deo sum-
ma sassa-
fia.

Deferunt
seu jalei.

Virga.

Folia.

Floris.

Calabastri.

Stamina.

Semen.

Rosa partes

Calix.

Cortex.



OTISSIMA Rosarum stirps tam hortensis, quam silvestris, tamen fruticosa & spinosa sit, consentaneum tamen & decens magis est, eam seorsim hic tradere, quam aliis spinosis fruticibus jungere. Est igitur in genere frutex infirmus, Cæ-

& citò senescens, nisi recidatur, ut eum suffruticibus ambigere videatur: ramis aut potius virgis duris, lignosis, & ut plurimum, hispidis, mordacibusque aculeis horrentibus, non rectis, sed modicè recurvis, frequentibus: foliis subrotundis, asperis, per ambitum serratis, quinque & septem ex uno nervo, sive pediculo coherentibus, sibi invicem oppositis, supremo singulari: floribus (quibus Rosæ nomen sui fruticis, quique proprie ῥοζα Græcis, ob odoris suavitatem dicti) primùm herbaceo inclusis calyce, qui tumescentes in virides alabastros, fastigiantur, quibus dehiscuntibus flores panduntur, vel simplices, vel multiplices, in calycis sui medio stamina quædam capillacea, luteis apertibus donata, complexi: semine in oblongis capitulis, quæ calycibus & floribus subsunt, Dod. per maturitatem rubentibus, duro, lanugine involuto: radicibus duris, lignosis, in diversâ tendentibus.

Porro, Rosæ partes Medici numerant octo, quas ob medicam materiam novisse proderit, viribus siquidem differunt. Pediculus igitur, qui florem sustinet terminatur in caput solidum, lanugine quadam refertum, foliis & floribus substratum, seu basis totam rosam sustinens, calyx [quo nomine tamen globulum totis foliis nondum apertum cognominant] vocatus. Hunc ambit cortex apertâ rosâ in quinque pinnulas seu lacinias divisus. Tertia pars est, floris medium illud croceum, quod capillamentis insidet,

à recentioribus & Officinis Anthera vocata, deducum ab eo, quod est ἀνθῆρ, id est, flos rosæ.

Quarta, ipsum capillamentum subtile, veluti filum floris, seu crocei illius fulcrum & sustentaculum.

Quinta folium, cujus ima pars candida, anguis apellatus, sextam constituit. His addunt septimam, quæ est lana in capite contenta. Semen, quod est octava pars Rosæ, ne putes inquit Palladius, medius flosculos esse, aut ei coloris, sed baccas Pyribrevissimi similitudine, seminibus plenas, post vindemiam maturas, quarum quidem maturitas tum ex colore ruffo, tum ex mollietate æstimatur. Et hæc ferè sunt, quæ omnibus Rosis sunt communia: de his pluribus agetur infra.

Theophrastus Rosam modò inter frutices, modò inter suffrutices numerat, ejusque differentias his verbis assignat. Rosarum differentiarum multæ, foliorum multitudine, paucitate, asperitate, lævitate, colore, odore. Quippe plurimis quina [in flore] folia sunt, quibusdam duodena, viciatque, aliis longè plura: sunt enim quas Centifolias vocant, quæ circa Philippopolim proveniunt, quas incolæ ex Pangaio transterentes serunt: illic enim multæ ejusmodi sunt. Sed folia interna [in harum flore] parva admodum sunt, ita enim oriuntur, ut alia intus, alia extra emicent, non tamen jucundi odoris, nec amplæ magnitudinis sunt. Odoratiore inter amplas, quibus pars ima scabra. Ad summam (ut dictum est) & odoris & coloris præstantia, loci ratione continet: & quæ eadem in diversa tellure proveniunt, à se differunt, quod jucundum vel nullum spirent odorem. Et hunc locum Gaza sic est male interpretatus: nam Gaza lo-

quit: & quæ in eadem tellure proveniunt, diversitatem bonæ & malæ exilisve olentie, nullam ostendunt. Odoratiore quæ apud Cyrenam gignuntur. Sylvestris asperioribus tum virgis, tum foliis constat, & florem minùs odoratum, minùsque coloratum, nec tam magnum fert.

Ad idem. A colore. A odore. A bono malo.

Ad idem. A bono malo. A bono malo. A bono malo.

Genera Pl. Pauli. curiosius de his Plinius prodidit. Genera
Præfina. ejus nostri tectere celeberrima, Prenestinam & Cam-
Camp. panam: addidit alij Milefiam, cujus sit ardentissi-
Milef. mus tolos, non excedentis [excellentis] duodena folia.
Trachina. Proximam & Trachiniam minus rubentem: mox
Alaband. Alabandicam, villiorem, albianthus foliis. Utilissi-
ca. mam [alij vilissimam] verò plurimis, sed minutissimis
Spineola. Spineolam. Differunt enim multitudine foliorum,
 asperitate, lavore, colore, odore. Paucissima qui-
 na folia ac deinde numerosiora, cum sit genus ejus

Centifolia. quam Centifoliam vocant, quæ est in Campania Ita-
 liz, Græciæ verò circa Philippos, sed ibi non suæ ter-
 ræ proventu. Pangæus mons in vicinio fert, nume-
 rosis foliis ac parvis, unde accolæ transferentes con-
 ferunt, ipsaque plantatione proferunt. Non autem
 talis odoratissima est, nec cui latissimum maximum-
 que folium. Breviterque indicium est odoris, sca-
 biritia corticis. Cepio Tiberij Cæsaris principatu,
 negavit Centifoliam in coronas addi, præterquam
 extremos velut ad cardines utpote nec odore, nec
 specie probabilem. Est & quæ Græca appellatur à

Judicium
odori.

Græca, Ly-
chnis.

Gracula.

Molceuton

Autumna-
lis, sive Co-
roneola.

Rosa colore

Fabula de

Rosa colore

mut. no.

Cupidini

languis.

Veneris

languis.

Ne Tar

Dir.

Cupidini

sacra.

Entomia

Rosa.

In Rosis communiter color quadruplex invenitur:
 est enim alius rubeus, candidus alius, alius candor in-
 est rubore aspersus, qui color propriè roseus & car-
 neus dicitur, & hoc genus vulgò incarnatum vo-
 cant: alius pallidus.

Rosam verò nonnisi candidam per initia fuisse,
 comminiscuntur, & Turcæ & Poëtæ. Illi non ut Poë-
 tæ Rosam ex sanguine Dæ alicuius tinctam esse
 credunt, sed (id referente Generoso D. Augerio
 Busbekio) ex sudore Mahumetis rubedinem illam
 ortam esse sibi persuadent: ac propterea hujus folia
 humi jacere non patiuntur. Græci contra sangui-
 ne Cupidinis, ut Ausonius, admirandam illam colo-
 rum pulchritudinem odorisque suavitatem à Vene-
 re contributam fingunt. Alij vulnerato Veneris pe-
 de eam adrubuisse fabulantur hoc modo. Deam Ve-
 nerem Adonidis amore captam Mars Zelotypus
 deperire laborans, Adonidis morte initam consue-
 tudinem solutum iri sperat, Adonium interficit. Ve-
 nus rescians gestum facinus, omni studio diligen-
 tiæque propter subsidium ferre volens, in Rosæ fru-
 tices irruit, pedem nullo munitum Sandalio ejus
 spinis transfigit: unde Rosæ pristinum candorem,
 in profusi cruoris memoriam, in ruborem conver-
 tit. Quare Claudianus:

— Sic fata cruoris Carpit signa sui.

Alij aliter: Ferunt enim Cupidinem cum in Deo-
 rum convivio lascivis saltationibus indulgeret pate-
 rari nectaris plenam, alæ concursu subvertisse, ne-
 ctar inde fufum florem Rosæ rubicundum reddidisse.
 Philostratus Rosæ fruticem Cupidini dicat,
 quem tota facie videtur æmulari. Semper illa recens
 juvenisque, nec non mollis ut Cupido. Aureis co-
 matur capillis, spinas pro jaculis gestans, pro faci-
 bus fulgorem. Folia pro alis Rosæ data sunt: neque
 Cupido, neque Rosæ tempus norunt. Idem lumi-
 na terræ, veris comas, amoris igniculos, terræ ful-
 gur appellat. Quod vero Philostratus Rosis hæc
 assignet attributa, nemini mirum videbitur, si Ana-

creontem Tejum Poëtam græcum vetustissimum
 quem Henricus Stephanus perquam eleganti car-
 mine latino reddidit, canentem audiverit:

Rosa honos decusque floribus,

Rosa cura, amorque Veris,

Rosa cælitus est voluptas,

Rosæ puer Cytheræ

Caput implicat coronis,

Charitum chæros frequenterans.

Apud Achillem Tatium l. 2. de Leucippe & Clito-
 phonte, invenitur sequens encomium Rosæ. Si flo-
 ribus vellet Jupiter imponere Regem, Rosæ inter
 flores regnum obtineret. Tertæ est ornamentum,
 plantarum decus, oculus florum, prati rubor, pul-
 chritudo consuecans. Amorem spirat, Veneris est
 conciliatrix, formosis foliis comata est, nobilibus
 frondibus luxuriat: Calix Zephyro ridet.

Rosæ etiam Veneri sacra est. Virgilius in Rosæ

Sideris & floris est d. mina una Veneris.

Hæc autem ratione Veneri Rosam dicuntur anti-
 qui, ut quemadmodum brevi hæc tempore daret, &
 ocyssimè marcescat, sic forma & voluptas venerea
 citò pereant. Quod Hieronymus Angerianus a-
 pud Curtium festivo hoc disticho notavit:

Pulchra brevi duras Rosa tempore, forma brevique

Tempore: sic forma par Rosa tempus habes.

Rosam portò brevi temporis spatio durare, insinuat
 elegantissimus hic Theocriti versus:

Καὶ τὸ ἴδιον ἔχει ὄντι, καὶ ἡ χεὶρ αὐτὴ μαρτυρεῖ.

Et Rosa formosa est, sed tempore marcescit & areet.

In quam sententiam elegantissimè distichon extat Ioan-
 Majoris Poëtæ celebris.

Ut Rosa mane viget, tamen & mox vespere languet,

Sic modò qui summus, cras levius umbra sumus.

Et alterum ejusdem:

Vidi ego mane Rosam solū cum lumine nasci,

Et vidi vultu in Sole cadente mori.

Huc facit & illud:

Πόθεν τὰς ῥόδους, καὶ πῶς ἔχουσιν ὄντι.

Ne quereretur in præteritā semel rosam. l. 2.

Ne te maceres desiderio rerum, quæ revocari resti-
 tuique non queunt, velut exatæ juventæ, formæ,
 virium, fortunæ. Nam ut nihil est Rosa gratius, ita
 nihil minus diuturnum. In eundem sensum dixit in
 Odis Horatius,

Morte sectari Rosam, quo locorum Sera moratur. 2.

Habent enim Rosæ suum tempus, sed per breve, at
 exquisitius delicati etiam alieno tempore Rosam
 quærent. Vnde quadrabit & in eos qui jam hæc
 voluptates sectantur: veluti si Nucibus ludat vir,
 aut amet, potitè ve senex. Rubet præterea, pungit
 que. Nam & libido ipsa verecundiz opprobrio cru-
 bescit, pererratique aculeo stimulat. Græcorum
 tamen nonnulli Palladi Rosam attribuunt, propter
 Myrsinem Atheniensem puellam. Huc etiam refer-
 tur distichon hoc Virgilij:

Collige virg. Rosas, d. in flos novus, & nova pubes:

Et memor esto ævum sic properare tuum.

Ovidij illud de arte amandi:

Forma bonum fragile est, quantumque accedit æ-

tas,

Fit minor & spacio carpiunt ipsa suo.

Nec semper Viola nec semper Lilia florent:

Et riget amissæ spina relicta Rosa.

Olympij Nemæiani in Bucolico ludicro:

Non hac semper eris, perdunt & gramina flores:

Perdit spina Rosas, nec semper Lilia cadunt.

Nec longum tenet Vva comas, nec Populus umbras.

Donum forma breve est, nec se tibi comodat annus.

Priscis, sicut & recentioribus, Rosam in honore ma-
 ximo fuisse, satis superque compertum est, eorum
 etiam monumentis. Quod vel imprimis hoc a-

Florum rō-
gina.

Veneri dō-
cat.

Brevi tem-
pore durat.

Adagio.

Palladi ad-
scripta.

Adagio.

id est,

Rosam cum id est, Rosam cum Anemone confers. Vbi quis im-
Anemone para inter se componit. Est autem Anemone, Pa-
confers paveris genus; cuius flos, specie Rosam imitatur, ex-
 teram nulla odoris gratia. Est & aliud, *Rosa loqui*,
Rosa loqui id est, verba gratissima, & Rosarum inter amabilia.
 Et Persius ait:

3. Quicquid calcaverit hic, Rosa fiat.

Quod adhuc vulgus in homines gloriosos profert.

4. Adde & hoc quod Cræti philosopho adscribitur.
Sus per Rosas [id est, postea]. Est autem Rose odor huic
 animali naturæ contrarius. Consule hæc de re Ca-
 meracii cent. 2. p. 38.

*Virtutis in-
 diuina.*

Inter Philologica, quæ de Rosa sese offerunt, im-
 primis placet illud quod apud Claudianum legitur:
Armat spina Rosas: id est, nihil absque labore jucun-
 dunt. Lege Cameracii cent. 1. p. 38. Rose itaq; indi-
 cant allegoricè animum heroicæ virtutis præditum,
 consilia & facta singularia, non à quovis præstita.

Veterum

Rosa noster

*accommo-
 dantur.*

Sed relictis Poëtis, missis Græcorum fabulis, reci-
 tatis Adagiis, investigemus quam sint illa Plinij
 Rosarum genera, & utrum eorum quædam ad nos
 usque pervenerint. Cæsar. sua veteribus accom-

Rosa Gallica

in. arnata.

modare studet, sic: Quæ roseo colore est nascitur in
 scutice valde hispida, quaternæ cubita excedente,
 primò floret inter cæteras: Campanam videtur ap-
 pellare Plinius, quæ præcox est, & Trachiniam mi-
 nus rubentem. Apud nos [in Italia] præter Car-

*Rubra Gal-
 deplena.*

neam Rosam, quædam rubens est multifolia, odore
 jucundo, sed exili: hanc Plinius Milesiam vocat, co-
 lore ardentissimo, non excedentem duodecim folia.

Acaphos

*plena ru-
 bella.*

Alia apud nos huic similis inter peregrinas visitur,
 colore magis diluto, accedente ad carneam, latissi-
 mis foliis, pluribusque in se convolutis, ut explicari
 nequeat, odoratior rubente: Eius frutex parvus est,
 & solus spinis caret: hanc Græculam videtur Plinius

Lactea.

appellasse. Quarta candida, maximè omnium nu-
 meroso folio constat, sed parva, odore valde exili.
 Plinius hanc Alabandicam vocat, viliores albican-
 tibus foliis: & Spermoniam plurimis foliis, sed mi-
 nutissimis, utilissimam, non multo odoratam. Quæ

*An mosca-
 ta maior.*

ex translatione in Campania, & circa Philippo a-
 dedo profecit, ut latissima, & maxima folia proveni-
 rint, non tamen odoratissima quam Centifoliam
 vocant, Muscatula apud nos appellatur, ob odoris
 excellentiam, sed quæ opere Topiario colitur: cau-
 dice cæteris trassiore: ramis longissimis: aculeis ra-

Candida

*plena & ff-
 mpleta.*

tionibus. Rosa parva ex quinque foliis constans
 candidis, multis intus floccis, pulvisculum luteum
 fundentibus, amarior hæc & maiorem vim purgan-
 di habet: tardissime floret, & perdurat usque in au-
 tumnum: In hoc genere quædam reperitur multi-

Syl. duplex.

folia, fortè Prænestina apud Plinium, quæ celebra-
 tissima, novissime desinit. Sylvestris in sepibus spon-
 te nascitur, virgis prælongis, Rubo similibus; in
 quibus sæpè spongiolæ villosæ visuntur: fert par-

*Alba &
 rubra.*

vam Rosam, non excedentem quinque folia, colore
 albo, aut subrubente, exili odore: altiores virgæ, &
 spinosiores sunt, quibus subrubentes Rose, humi-
 liores quibus alba: Dioscorides eandem Cynosba-

Rosa lutea

ton appellat, quasi Rubum caninum: Theophrastus
 inter Rubos tertium genus describit: Theodorus a-
 liquando Caninam sentem vertit: Plinius modo Cy-
 norodon, modo Cynosbaton vocat, videturque
 diversas intelligere: nam Cynorodon, radicem
 sylvestris Rose facit: Cynosbaton verò Rubi
 genus, Rose similitudine. Quin & Capparis quo-
 que Cynosbaton vocari traditur ab eodem. Sunt

Rosa lutea

& Rose luteæ quinq; foliis constantes, ut sylvestres,
 latioribus tamen: odore ingrato: frutex, & folia si-
 milia sylvestri. Plinius alteram Græculam vocat, Pal-
 lidam, spinosam, longissimis virgis quinque-foliam.

Addit autem Plinius alia genera, ut Græcam, quæ
 Lychnis vocatur à Græcis & Moscuton, sed ex

Tom. II.

æquivocè potius Rose appellata sunt, alio loco ex-
 plicandæ.

Athenæi: Rosarum differentias ex Theophr. po-
 nit, nec plures: Ex recentioribus Hermolaus præter
 ea, quæ ex Plinio transcripsit ipso in nominato, de
 suo nihil adjecit, quam quodd apud Plinium mavult

Athenæi

diff.

Plin. corr.

gitur, ob

Hermol.

Spermonia

Sycionia

Acetum Cy

Moscuton

unde.

Curti diff.

Papana.

*An Dama-
 scenæ?*

Profundia

lu.

Anconia

na

Odoratis

ma qua

Quæstio

Ruellia

notatum.

Tragi diff.

*Cynorho-
 don Barba-
 ri.*

Rosa lutea

Pestris.

Matth. diff.

ferentia.

Gesl. diff.

Incarnatæ.

Citrina.

Moschæa.

Vulpina.

Moschæa

Nobilis

Nobilis

Adhæc purpur.

C 3

legi Spermoniam, quam Spinolam aut Spinofamita
 enim, live quodd minutissimo folio, live quodd vilissi-
 ma sit omnium, re diffimè ipsi videtur appellata, ait
 tamen esse quosdam qui Sycioniam legendum pu-
 tent. Nec probat quod nonnulli Muscetum legant,
 quandoquidem Acetum & Moscheuton melius red-
 datur à propagine, vivitradicève, quam Græci Mo-
 scheuma dicant. Cæterum, ambigit Coroneola sitne
 Cynosbati, an Cynorhodiflos: quanquam Cynos-
 bati magis putet. Cynorhoda porro silvestres esse
 Rosas dicit, licet Aristoteles eam videatur appella-
 se Cynacanthem, hoc est, Caninam senticem.

Curtius particulatim ex sua, observatione Pæstæ
 nam celebrat, à Pæsto Calabriz oppido, passim apud
 autores commendabilem, quotannis bis germinan-
 tem. An autem ea sit, quæ nunc Damascena dicitur,
 ignorat. Parva enim hæc, inquit, candidi & rubei
 coloris, egregij odoris. Plures autem ab uno geni-
 culo exeunt. Ultima autem hæc germinatu est, ve-
 rum continuè & hieme etiam tepidioribus locis flo-
 ret. Est & Provincialis in Gallia ab oppido sic cogno-
 minata, colore inter album & rubrum medio, quem
 incarnatum vulgus vocat. Etruria has Anconianas
 vocat. Odoratissimæ non sunt quibus folium maxi-
 mum & latissimum. Odoratiores, quo rubicundio-
 res. Indicium autem odoris corticis scabritia. Quæ-
 rit in probl. Arist. Cur suavis Rose oleant, quibus
 asper, quàm la vis umbilicus sit? Quod magis secun-
 dum suam naturam constitutæ sint. Naturæ enim
 suæ, Rosa spinosa est.

Differentiæ Rosarum quas Ruellius in longum
 recenset, alix non sunt, quàm Theophrasti & Plinij,
 quamvis pro suis venditet.

Tragus Rose hortensis hanc ponit differentiam, Tragi diff.
 ut alia candida sit, alia ex purpura albicans, quædam
 rubra. Et rursus in hoc genere una simplici: altera
 multiplici foliorum ordine. Rose verò sylvestris
 quatuor fastigia constituit. Cujus primum genus,
 ejus quidem judicio, Cynorhodon Barbari fuerit,
 nobis Rose silv. folio glabro: secundum, Spina Ma-
 ritz nominatum, est nobis Rosa Eglertina, sive fo-
 liis odoratis: tertium, Rosam cinnamominam flore
 subrubente conjectamur; ceu ultimum, cum priori
 Rosa campestri dicta, Rosam sylvest. folio glabro,
 flore planè albo. Et ita Tragus distinguit, laus osci-
 tantæ.

Matthiolus de Rosis Italicis, pauca hæc habet. Matth. diff.
 Multa quidem sunt Rosarum genera, quæ in usum
 medicum veniunt. At vulgatissimæ in Italia sunt, al-
 bicantes, puniceæ, & quæ ex albo rufescunt, quas
 vulgò appellant incarnatas. Quædam etiam aureo
 colore fulgent, odore admodum ingrato ac insuavi.

Rose hortenses albæ (inquit Gesl.) multiplici
 folio, passim apud Tigurense in hortis abundant,
 frutice proceriore, quàm rubrarum, quæ tum sim-
 plici, tum multiplici folio constant. Vidi & Rosam
 dimidia parte candidissimam, alterâ purpuream.
 Rose Alexandrinæ, vel Persicæ, vel Damascenæ,
 vulgò Incarnatæ dictæ nunc nobis satis frequentes
 Damascenas autem vocant, quoniam ex Damasco
 Syriæ urbe advechæ creduntur. Rose citrinæ, seu
 luteæ. Rose moschum fragrantis luteæ. Rosa
 lutea inodora, vulpina cognominata. Rosa mu-
 scata alia à præcedenti simplex & multiplex. Rose
 muscata vel Damascenæ parvæ, simplices, albæ, flo-
 rentes in Italia toto ferè anno. Alia nobiles, den-
 ti folio, flore parvo, purpurei coloris diluti. Adhæc purpur.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Locus
campus.Cistum
humile.


Rarior est Chamæcistus 1. angustifolius Clusij in pan. 6. In hist. nec nisi in monte Badenibus Thermis imminenti, quarto à Vienna Austriæ militari; atq; in Hamburgensi duobus à Posonio Vngariæ urbe miliaribus; pauculas plantas, inveniebat autor, florentes Iunio, quo tempore, aut paulò post semen etiam perficit.

Tab. & Ger. Cistus humilis angustifolius. C. Bauh. pin. Chamæcistus 8. sive angustifolia.

Ang. Low Cistus with narrow leaves.

CHAMÆCISTVS FOLIIS MYRTI

Tarentinæ, canis vel cinereis.

Deser.
Ramuli.

Folia.

Capitula.

Flores.

Rm.

Capitula.
Semen.
Radix.

Dodrantalibus est ramulis, humi diffusis, quos bina, semper contrario inter se situ sepiunt foliola, Myrti Tarentinæ foliis æqualia, aut angustiora, supernè cinerea quidam lanugine obducta, infernè verò omnino incana, gustu adstringente, & nonnihil deinde amaro prædita: pedicillos postea exerit duas aut tres uncias longos: quibus insident quini, aut seni flores, Chamæcisto Serpilli-folio similes, quos pictor male expressit, & sculptor corruptit, lutei coloris: his succedunt trigona parva capitula, semine in æquali, minuto, rufo, plena: radix lignosa, dura, vivax. Ramuli, flores sustinentes, maturo & deciduo semine exsiccati & confringi plerumque solent.

Maxima abundantia nascitur Chamæcistus 1. Clusij pan. 3. hist. in omnibus illis montibus, qui à Calenberg Danubio imminenti, ad Alpes Austriacas continuà quadam serie procurunt, tum etiam in Hamburgensi, Pannoniæ monte aliisque ejusdem provinciæ locis, sublimioribus præsertim, sicisque, gramine tamen testis agris. Floret Maio, semen maturum est Iunio. Austriacis Seylacher veld Braut vocatur à præsentem videlicet juvandorum vulnerum facultate. Tabern. qui mutavit flores, qui non respondent descriptioni Clusij, quia, ut ait, à sculptore corrupti, & Gerard Cistus humilis latifolius. C. Bauh. pin. Chamæcistus 7. sive foliis Myrti mirorisincaris.

Germ. Klein Cisten Köflein: Ang. Low Cistus with broad leaves.

HELIANTHEMVM TENVL

folium glabrum luteo flore.



EX radice crassa, Deser. lignosa, cortice Radix. nigricante contexta, ramuli plures ex-furunt, lignosi, dodrantes, nonnunquam erecti, interdum per humum sparsi, foliis donati valde tenuibus & angustis, ut in Cori Monspefulana, vel Erica arborescente, viridantibus & subrubentibus, glabris, nec sibi oppositis, ut in vulgari, sed alternatim ramos confedentibus, & singularibus: Ramosius videtur,

quàm Thymi-folium sequens. Flores multo minores, quàm in vulgari, aurei, caduci, quibus succedunt vascula, majuscula, lucida, quæ semine maturo, in tres veluti scutellas triquetras dehiscunt, ea autem vascula ambiunt tres tunice. Semen copiosum, ferrugineum, triquetrum.

Lugd. Erica quinta Chrysanthemos. Lob. Adv. Cistus quintus opinatus Affatio: item, Chrysanthemis Erica minima foliis Tamarisci, floribus luteis. Dalechampi vocat Ericam Chrysanthemin Rob. Confl. Chrysocomen faciebat: Frater C. Bauh. attulit ex Italia nomine Cori Dioscoridis, Guillian.

Per Ericam minimam Chrysanthemin Lobelium intellexisse eandem, quàm Dalechampium, non dubitamus, id indicante ipso nomine: is enim Dalechampi & nostras opiniones plerasque habuit, licet rarè meminerit, id quæ operâ Valerandi Dourez affinis nostri, qui ei omnia nostra communicabat, cum Lugduni Lugdunensem incepisse Historiam conscribere generalem, in qua multum laborabat Dalechampi. Quæ tandem ob tumultus bellicos interrupta, conclusa est per stirpem ignarum, qui confudit ac miscuit nostras & Dalechampi doctas observationes cum alijs. Vidit etiam Lobelius nostras stirpes cum suis nominibus, descriptiones etiam plantarum habuit. C. B. pin. Chamæcistus 12. sive Ericæ folio luteus: Cori similis frutex in maritimis, Cæf. Hujus duæ species, altera brevioribus foliis & humilior, altera quadruplo longioribus & elatior. Genevæ observavi locis siccis circa Champe & Monspelij. Cherlerus attulit collectum Ne-mausi. Vidi Basileæ in hortis, semine maturo Septembri. Degustata nobis nullum manifestum saporem præbuit. Chrysanthemis, Erica minima, inquit Lobelius, nasci est natales subuleta mariuma Veneta: eandem studiosiores videbant Monspelij secus patibulum Castri novi. Erica Chrysanthemon in sabulosis aditorum collium locis apricis & perflatis gigni, florere Iulio observavit Dalechampi.

HELIANTHEMVM ALPINVM FO-


lio Pilosella minoris Fuchij.

Herba hæc collecta in montium locis siccis circa Genevam, ut Saleve, & in hortum translata floruit Iunio. Eam sic descripsi ante triginta annos.

Fruticosa

Folia.

Flos.




Fruticosa herba, cui folia oblonga, Pilselle minoris Fuchsi similia, inferiori parte magis candida, superiori viridia & pilosa, sed minus, quam in inferiore: flos luteus, qualis Helianthemum vulgari, unde hac vocaveram Helianthemum alpinum. Est mihi sicca (an vero una sit ex iis, quae Genevæ erant collectæ, dubito:) non tamen integra, foliis quibusdam uncialibus fere, aut minoribus, oblongis, in acumen desinen-

tibus, ad Polium montanum vulgare accedentibus, cinereis & fere albis: radice crassâ, lignosâ, cum capitulis multis onusta.

CISTVS HELIANTHEMOS folio Polij montani.

Cist. Helianthem.



Flos. furc.

Eadem, aut planè similis, nobis data est Argentoræ ex plantis D. Agerij, cui nomen feceram, Cistum Helianthemum folio Polij montani vulgari. Albicantes in ea erant cauliculi, unciarum quatuor, vel quinque, ramosi, qui delinebant in tenues pediculos, parvos flores proferentes; luteos, tres vel quatuor: Folia albicantia Polij vulgari montani.

Nec dissimilem ab hac Cherlerus attulit stirpem, collectam in rupetis pro-


pe Agdes Galliz Narbonensis, quæ solo est candidiore, quantum judicare possum ex reliquiis quibusdam: allatæ sanè fuerant plures plantæ integræ, sed reddite sunt nobis invisibiles, remanente tantum portuncula.

CISTVS PVSILLVS FOLIO candido, flore luteo.

Flos.

Ramuli.

Cistus pusillus folio candido, flore luteo, pal-
Cinum longiorem, duram, lignosam, foris ru-
bentem, intus albam, gracilem demittit radicem, quæ terram versus crasset, inque numerosa capita dividitur: e quorum singulis ramuli prodeunt, alij unciales, alij duplo longiores, hirsuti, foliis numerosis, inferiori parte candidante densâ lanugine obfatis. supernè viridantibus, pilorum non expertibus, acuminatis, semicircularibus, culmis latis or ulitexturis ramulis bini suis singuli pedicellis insident flo-



sculi perpusilli, lutei, luteoque capitula mæto donati, quorum exteriori parte foliola extima, pilis obfata canescunt, interiori parte lutea.


Ceterum, fieri potest, ut vel natura ob Soli tantum natalis varietatem in tribus præcedentibus plantis ludat: Vel, si non, ut eadem, aut eademque à Clusio in hist. de Chamæcisto, & potissimum sub Cisto humili altero tradantur. Hæc diligentiâ posteri examinent.

An hoc est duabus præcedentibus eadem?

An Chamæcisto ut a Clusio?

HELIANTHEMVM FOLIO Thymi incano.

Virgulae plu- res, tenues, *Defect. Virgula.*



incanæ, quæ in alios repandos mox dividuntur ramulos: foliola Thymi durioris, minuta, breviter hirsuta, cinerea, terna, quaternaria, interdum plura ex eodem niculo crata. Flos & Capsellæ in tres carinas delinquentes, cum involucri hirsutis, ut in Helianthemo vulgari. Radix crassa, fuscula, contorta, lignosa, multilida, multorum capitum.

Fortè hanc misceat & intelligit Lobel cum Helianthemo tenuifolio glabro: similes sunt plantæ, differentes tamen, diligentius consideranti.

Montepelii observavi florens adhuc mense Septembri & in montibus propè Castelneuf & juxta patibulum Maio. Mense quoque Aprili, in monte Seti: Cherlerus attulit collectum in vineis & collibus Nemauso vicinis.

Helianthemum minus, minus.

Locum & tempus.

CISTVS PVMIIVS MONTIS Baldi, fortè Austriacus myrtifolius.

Compluseulis, sesuncialibus & quadrantalibus, lignosis adolescit virgulis, tenuibus & hirsutis: folia virentia, crebra satis, similia Myrto Tarentina, vel Lentis foliis paria, nec ita dissimili circumscriptione, ortu & positu diversissimo, quippe bina, incondita tamen, sortitis pilis, supra lubrisque donata, per margines copiosioribus, ut in Nerio alpino: flores extremis ramulis unici, satis magni, cum multis staminibus. Siccam hanc accepimus à Jacobo Zwingero, & fratre C. Bauhino, delatam è Monte Baldo. Eadem fortè est, cum Chamæcisto 8. in hist. seu 4. in pann. Clusij, proveniente in Austria, quam

Flora.

Defcriptio
Ramuli.

hic descriptis. Palmatis aut paulò amplior est, superioribus Chamæcistis tamen firmior, multisque ramulis; lignosis, rectis & nigricantibus præditus, quos numerosa & aded conferta ambiunt folia, ut quaternis versibus digesta videantur. Myrti minoris foliis non dissimilia, minora quidem & hirsuta, licet atra viriditate superne splendēant, quorum gustus adstrictionis participes est: flos unicuique, interdum & alter extremis ramulis exit, satis crasso pediculo subnixus, unico constans folio, quinque profundis crenis, iisdemque veluti circinatis, diviso, ita ut quinque folia habere videatur, ejusdem cum primo genere penè magnitudinis, coloris ex albo purpurascentis, & quasi carnei dilutionis, decem staminibus extrema parte nigris, & stylo oblongo purpurascente, medium florem occupantibus. Floribus excussis apparent pentagona capitula, qualia in nonnullis Cisti generibus videre est, obtusè mucronata, quæ maturitate aperta, semen continere deprehenduntur exile admodum, flavi coloris.



Rosa.

Gefum.

Flor.

fundis crenis, iisdemque veluti circinatis, diviso, ita ut quinque folia habere videatur, ejusdem cum primo genere penè magnitudinis, coloris ex albo purpurascentis, & quasi carnei dilutionis, decem staminibus extrema parte nigris, & stylo oblongo purpurascente, medium florem occupantibus. Floribus excussis apparent pentagona capitula, qualia in nonnullis Cisti generibus videre est, obtusè mucronata, quæ maturitate aperta, semen continere deprehenduntur exile admodum, flavi coloris.

Rarissimum suum fruticem duntaxat in Seneben iugi scopulis nascentem observabat Clusius, unde florentem sub mensis Iunii finem eruit; semine verò pregnantem Augusto: in Deytsalben summo supercilio, duobus supra Neuburg miliaribus. Eam cunctare voluit in horto suo semel atque iterum exiis iugis cum suo cespite desumptum, sed nitescere noluit.

Si Clusij Chamæcistus hic eadem est, cum nostra, sanè in Leone, quam proponimus, caules nimis crasse picti, & folia sunt, eiusdem magnitudinis cum figura: Idem mihi evēnire videtur ipsi Clusij figure, quod animadvertere poterit Lector conferens descriptionem cum icone.

Tab. & Ger. Cistus humilis Austriaca Klein Cistenroßlein. C. Bau. pin. Chamæcistus 10. sive hirsuta.

HELIANthemVM, SIVE CISTVS humilis, folio Sampfuchi, capitulis valdè hirsutis.

Defcriptio.

Radix.

Gaulis.

Folia.

Stems.



Odorales circiter, eosque creberrimos, aliquando à radice lignosa, crassiusculà, longiusculi, fundit caules, eosque rigidos, perquam hirsutos, per quos veluti ad nodos folia adversa, Majoranae foliis paria, alia oblonga & latiuscula, alia angustiora: flores in ramulorum extremis multi, semuncialibus circiter pediculis hirsutissimis nixi, lutei, folioso calyce, stria-

to, villosò obvallati. Hanc Cherlerus attulit Monspelio ac nominavit Cistum folio Sampfuchi.

HELIANthemVM AD NUMMULARIAM accedens.



Perplacet nobis planta à D. Richnero Basileæ anno 1588. data, nomine Cisti, folio Sampfuchi, dolemus non integram fuisse, sed tantum ramos cubitales, quos putamus supra terram excludi fuisse. Rami magnis pilis hirsuti, folia bina in ordine disposita, ad Nummulariam accedentia, minora tamen & cum pediculis longiusculis, quales Alsine vulgaris, tales pediculis in consimilibus Helianthemis, vel Cistis minoribus non observavi: folia breves habent pilos, minus conspicuos: ad alas foliorum sunt tenuia foliola.

lianthemis, vel Cistis minoribus non observavi: folia breves habent pilos, minus conspicuos: ad alas foliorum sunt tenuia foliola.

HELIANthes SPECIES RARA, comainflexa, ut in Heliotropio.



Radix crassitudine digitali, longitudine sesquipedali, lignosa, fibris paucis, sed validis donata, foris buxæ, intus albæ, ramos sex, octo, aut plures per terram spargit palmares & spiramæos, teretes, tenues, quibus folia nullo insigni sapore prædita, crebra, alterno situ utrinque adnascuntur Majoranae, glabra, & ex viridi luteola, unico nervo per longitudinem decurrente, at priora folia, & quæ proximè terram, non parum ab his, quæ per ramos visuntur, differunt, utpote longiuscula: flores in extremis ramulis perquam conferti & Scoppoidis reflexi, quinque foliis albis constant, apicibus luteolis, quinque viridantibus extrinsecus obvallati: capitula sequuntur triquetra, fusca, semine exiguo, papaverino pari, atro, cavitatem imple-

ram altera parte habenti, altera gibbo resecta amaro.

Lob. Adv. tribuit huic flores aureos, cum sint albi: verum eam describit ex sicca planta, non ex vivente, in quibus non raro mutantur colores. Vocat autem Helianthes speciem rarà, figurà leguminosà, floribus aureis: In la. Cistum folio Majoranae, deflexis floribus: ejus autem icon non placet, adeò aliam curavimus pingendam. Aliquando mihi nobis Hortu.

Telephium. Hortulanus Ducis Potentillæ cum inscriptione, an Telephium Candia? Cherles, tulit cum sequentibus nominibus, Telephium, horundam & Helenium Cratææ, dictum à Pona. Imper. Telephium Dioscoridis quibusdam, Helenium Cratææ. Cam. hort. ait calorem, quem in Telephio Imperati requirant veteres, à radicem potius, quam gustantibus deprehendi.

C. Bauh. C. Bau. phyt. meminit hujus Telephii: sed præter mentem Camerarii, ut suo capite di. lum, ita faciens cum Aizoo peregrino ejusdem Camerarii. Ego Telephium Dioscoridis non existimatum, deceptio siquidem non convenit, ut apparet, confer. Eid. pin. Cistus sericina 8. sive folio Majoranæ: H. hanties species Peræ, Lugd.

Aizoo peregrinum. Telephium Dioscoridis non est contra Camerarium, Locum & Tempus. Ex Gallo-provinciâ his misit Jacobus Reynaudet, primum nomine plantæ repentis, ut Numularia secundæ stirpis Veronicæ nodo repentis. Ex semine mihi missò venit floræque Junio & Julio: etiam non reposita duravit aliquot annis: Basileæ observavi in hortis, & Lutetia Augusto cum suis capitulis. Camerario perit hyeme postquam plurimos annos duravit, semine tamen sponte exidente, plurimum rursus propagavit. Lob. misit Raymundo à jugis arduis montis D. Bonaventuræ non procul Aquilexius erutum.



fructum, quali Ledi genera madent) effundere videtur.

Clusio hæc planta revocat in memoriam fruticem Gagei, qui etiam frutex odoratus, de quo nos suo loco.

Clus. Pan. & hist.

Myrto-Cistus Balearica, & (ut Ger.

& C. Bau. pin. cui etiam Cistus ledum

17.) Myrto-Cistus

Pennæi Tab. Myrto-Cistus Clusij.

Londini in Anglia siccam ostendit

Clusio, Pennæus

Londinensis Medi-

cus, quam ille ex Balearum insularum majore, vulgo Majorica nuncupata erutam, Myrto-Cistus appellavit.

CISTI FOLIO ARBOR EXOTICA, capitulis lanosis Platani.

Deser. Fergulæ.

Folia.

Flori.

Sym.



Cisti folio arboris extrema virgula lignosa fuit, Cisto corollaria & similia: folia item rugosa, oblonga, Salviæ aut Menhæ, sed in summis ramulis villosos, exactè sphericos floccos ostentant, sive lanosa capitula Platani.

Lob. Adv. & Ic. Arbor exotica Cisti folio. Tab. Cisti folio exotica arbor.

Lugd. Cisti, vel Ledi Arbor peregrina Penæ. Ger. Cistus exotica Lobelij. C. B. pin. Cistus

semina 11. sive Cisti folio arbor exotica. Belg. Weslauschen boom met bladers van Cistus: Ang. strange Cistus.

MYRTO CISTVS PENNÆI, floribus luteis oblongis.

Deser. Cortex.

Folia.

Flori.

Capitulum

Myrto-Cistus tricubitalis interdum frutex est, scabro admodum cortice, & velut quibusdam tuberculis obsito, qui in vetustis ramulis faciliè abscedit & sponte decedit: foliis Myrti serè, dorso non minus scabro, quam ramuli, supernè autem lævibus, conjugatim ut reliquis Cisti generibus circa ramulos nascentibus: flores summis virgis insident, luteis quinque oblongis foliis constantes, & multis intus longiusculis staminibus præditi: his succedit oblongiusculum & pentagonum capitulum, semine plenum. Tota stirps odorata est, & gummi sive resinam (lentorem potius & pinguem quandam



Vtrumque Nerium Alpinum, tum facies, tum naturales conjungere.

Frutex est prius cubitalis, ramis contortis ac lignosis,

digitali crassitie, cortice vestitus, extincto quidem cineraceo, interiore autem nigricante,

at minimi ramuli subinde etiam rubente cortice teguntur, per quos

folia, circa fastigium conferta, glabra, brevibus hærent

pediculis lævis foliis paria, nec forma dissimili, nisi quoddammodo crassiora, nervosiora,

Clusio autore, minime in ambitu hirsuta: superiore parte virent, inferiore ferruginei sunt coloris, saporis adstringentis, & quodammodo resinosi:

Inter quæ in extremis ramulorum flores multi coacervantur coccinei,

Clusio, dilutiores, quam sequetis, oblongi, superius quinque partiti, atque argenteis punctulis conspersi, in quibus plusecula staminula, capitulis cor-

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

dem

*Capitula**Radix**Tubercula**Nerium II.**five hirsutum.**Folia**Sapor.**Flores.**Radix**Xylobalsamum falsa.**Rosa alpina.**Nerium**Alpinum**Ledum Alpinum**Chamaecyparissus**Laurus Alpina.**Chamaerhododendrum**(Chamaedaphnes)**phnes.**Lob. Jacus**fulgens.**Balsamum**alpinum.**Evonymus**Theophr.**Balsamum**Ital. vulgare.**ve**Via Vrsi.*

dem, medium pistillum stipant, quibus decedentibus relinquuntur capitula rubentia, in quinque carinulas dehiscencia, in quibus pulvisculus, veluti seminem ferrugineum. Radix oblonga, lignosa, dura, subnigro cortice tecta. Hujus porro sirculorum summitatibus capitula quaedam crescunt, squamis foliaceis congesta, oblonga, & gemmae majoris speciem exhibentia. Colore subrufo foris, intus flavescente. Foliis vero (Clusio referente) ramisque adnata aliquando reperiuntur Tubercula, nunc Nucis ponticae, modò Pisi magnitudine, inaequalia, foris rutilante aut pallescente nonnunquam colore, intus fungosi, alba, gustuque adstringente, pulpi plena, quae gallarum vicem prestare possint.

Alterum Nerij Alpini genus, multis etiam stolonibus, duris, ac lignosis, cubitalibus, aut paulò longioribus, vix unquam surrectis fruticat. Folia possumus per ramorum extrema conspiciuntur, & licet quidem conferta, breviora, quam precedenti, & obtusiora, utrinque virentia, sed virore saturato, per ambitum pilis seu ciliis tarsus, longis & conspicuis obsita, saporis non ingrati, aromatici, & nonnihil resinosi, cum astrictione quadam. Flores precedenti consimiliter acervatim in ramum extremis nascuntur, sed pediculis hirsutis intertextis, nec adeò diluti, & in capitula, quinque cellulis constantia, desinentia. Clusio capitula virida, suo odore capitis gravedinem quodammodo inducunt. Radix dura, lignosa, oblonga; sed & rami per terram sparsi, interdum fibras agunt.

Gesner. in epist. ad Aretium, scribit se Berg-Rosen in multis montibus invenisse, & Sabaudica, Italicaque nomina diversa audivisse, quorum nullum Latinam, Graecumve originem præ se ferat. Idem de Lunariis agens (intelligit de Arthritica) ait eam vocari *Flüßblume*, & suicem esse odoratum, cujus ligno pro Xylobalsamo, & semine pro Carpobalsamo Bergovensis quidam perperam utatur. Ad hanc eodem libro in descr. Montis fructi, inquit: Rosa alpina, pastores nominare; Aldroandum vero Nerion Alpinum: sed potius, Ledum Alpinum esse denominandum. Item in fine hist. Cordi. refert, virum quendam Italum seu Chamænerium quoddam, Nerium Alpinum vocare, naturam tamen totà discrepare: Demum in epist. ad me I. Baubinum: in monte Gotthardo Laurum Alpinum virentem (ut scribis) invenisti ascendendo, quo nomine Balsamum ab aliis dictum (*Alpe Rosen / Berg-Rosen*) accipere te conjecto.

Lob. Adv. Montana Allobrogum Lentisci-folia, Chamaeleafolia, vel Oleastri-folia, minus odora, Chamaerhododendrum, Chamaedaphnes, sive pusilla Laurus, an Germanicum Mezereum, an rum potius nostrum Chamaerhododendrum? Et paulò ante: Alpigena Chamaerhododendros, odora; Alpini Italico-Germanis, *Alpe-Rosen*/bacculas Asparagi, vel Taxi pares & concolores, Septembri edens. Hæc ille. Ego facile equidem crederem, eam duarum istarum specierum, quæ latiora & rotundiora habet folia, esse Nerij nostri Alpini speciem, si baccas non ferret, nostrum enim Nerium his destituitur. Videndum itaque an inter scribendum illa verba bacularum, non sint transposita apud Lobelium in Adv. & forte pertineant, ad alteram plantam, quam paulò post describit. In Obs. habet figuram sub titulo Balsami alpini, de quo ait, Alpigenæ Chamaerhododendri odore varietas. Balsamum Alpinum Gesneri & Rosa alpina, vel Evonymus Theophrasti, Dalechampi & Herbariorum. Idem ponit aliam figuram cum Baccis, cui hæc adscribit: Alpigena Chamaerhododendros odora Adv. 154. Balsamum Italicum vulgare, sive Rhododaphne parva rustica, Tetrica archa Plinii putata ex Guilandino. Eodem alibi, Genuina uva Vrsi

Galenus apud Iulium, eadem videtur cum Alpigena Chamaerhododendro exhibita Obs. p. 199. & Adv. 145. Videtur, em Lob. in Obs. uti etiam in Adv. minus bene agnoscere Nerium Alpinum, sed miserè cum eo Vitis Idæam secundam miscuisse. Aliquando forte prout ramulum Ledi, sive Nerij Alpini sine floribus & fructu, cum nominibus prædictis, qualia inve inter chartas Valerandi adscripta: inde putavit leas ferre.

Iul. in Pann. & hist. Cisto ledo non ineptè subjicit Ledum Alpinum, de quo ait, Nerion alpinum Aldroandus appellat: Alpini pastores *Alpe-Rosen* & *Berg-Rosen*/quidam etiam *Bärenblüß* (*Vrsi florem dixerunt*) nonnullos *Gännerlaub* (*F. l. l. galinaceum*) vocant. Primum genus intelligi existimarem à Lobelio in Adv. sub Alpigenæ Chamaerhododendri odore nomine, nisi bacculas Asparagi vel Taxi pares illi tribueret, quas in nostro non reperias; sed pentagona tantum capitula, ut ex ejus descriptione liquet. Alterum plurimum convenit, cum ejus Montana Chamaeleafolia, sive Lentisci-folia, Chamaerhododendro minus odorata in Obs. prioris iconem exhibet Lobelius, Balsami alpini nomine: pictor tamen flores non fideliter expressit, quos in quinque cristas, non in quatuor divisos esse compersisset, si ramos suis floribus onustos à me anno 1574. amicus Machliniam missos (de quibus illam iconem expressit) diligentius considerasset: licet non negem interdum fieri posse, ut quatuor tantum crenis dividantur, sic nonnunquam ludente in floribus natura: at omnes in eodem ramo tales natos esse, credibile non est. Et hic est frutex qui à nonnullis Evonymus dicitur, nescio qua ratione ductus: Nam in hoc ubi fructus Sesamo proximus, in quo acinus in quaternos versus digestus, qualem Theophrastus; sive granum quadrangulæ figuræ, quod Plinius illi tribuit. Sed ex ipsa sanè historia satis liquet ne minimè quidem notà ad Evonymum Theophrasti & Plinii referri posse. Itaque cum Gesnero Ledi potius esse genus, quam Nerion aut Evonymum arbitror, multum me impellente, ut ita censeam, hujus stirpis odore & temperamento. Rustici & pastores eorum montium, in quibus observavi, utrumque genus *Rausch* appellant.

Myrtus Alpina dicitur Rob. Constant. In Rhætia Porcellana. Dourez annotat ad ramum plantæ nostræ esse Evonymum Theophr. veram Dalechampi, Laurum tinum Plinii, Rhododaphnen rusticam Gesnero & Chamæpreucen Bellonio. Gesnerus autem sub junxerat nihil habere commune cum Lauto.

Tab. (ubi decimum facit) Ledum Alpinum: Item Balsamum Alpinum *Alpe-Balsam*: Adhæc, Chamaerhododendros alpina latifolia, Balsamum Italicum, *Alpe-Rosen*. Demum, Chamaerhododendros alpina angustifolia, *Alpe-Rosen*/montana Allobrogum, Lentisci-folia, Chamaeleafolia, aut Oleastri-folia. Cæterum, quam Tabern. ponit sub titulo *Alpe-Rosen*/Chamaerhododendros alpina latifolia, cui baccas tribuit, videtur mihi Vitis Idæa species, quam confundit cum Ledo Alpino. Cui verò titulus est, *Alpe-Rosen*/Chamaerhododendros Alpina angustifolia, est Ledum sive Nerium Alpinum glabrum, sed figura non placet. Illa autem quæ inscripta est, *Alpe-Balsam*/Balsamum Alpinum, est Ledum Alpinum hirsutum. Tandem cui nomen Ledi decimi Alpini est in hist. eadem est cum Balsamo Alpino Tabern. vel Ledo alpino, hirsuto.

Lugd. Evonymus Theophr. l. 4. c. 19. qui, eo auctoritate tum alibi, tum in Ordynno, Lesbii monte nascitur (sic enim ex Plinio legendum, non *evonymus* sed *uva Vrsi* Plinii cor-
regenda, ut Theophrasti exemplaria habent magnitudine folioq; Punice, pariter molli, majore, quam Chamæ-

*Lob. notat.**lur.**Figura Lob. falsa.**Evonymus non est.**Nerium non est.**Rhododaphne.**Chamaepreuce.**Vitis Idæa species.**Evonymus Theophr.*

Tempus. Chamædaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, flores vere, floris color, qualis Leucio, odore gravi, & qualis sentitur trucidato cadavere in totum putrescente, ut quasi casum animal referat (sic enim vertenda videntur, & sicut dicitur Plinius trans-

Plinij error. stulit, statim pestem deruntians, sed non recte) fructum cum suo putamine loculo ve Sefami filiquis non absumili, intus solido, sed in quatuor versus distincto. Esulethalis est arbor, tam fructu, quam foliis pecori, & ovium gregibus, sed præcipue capris, nisi purgentur. Purgantur autem in media & cibi abstinentia. Quæ postrema sic fidelis opinio, tradita sunt, quæ à Theodoro. Nusquam legi quid sit dicitur.

Gaza le. dicitur præputia. Quare avo xⁱ legi potest. Alij alio modo interpretantur nominationem, ut Dodonæus. Matth. in Diosc. Cneoron vocat. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalecha npius quidem eam attentius contemplaretur caprarum greges, vicina frutera depascentes, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque adeo cum deceptam objiceret, reversum deprehendit. Allobroges vocant *des ourles*. Quo loco Theoph. Chamædaphnes legitur, mendum fuisse Asteriscus indicat, & Gaza Clemaidem legisse videtur, qui Vincam pervincam vertentem non adnotat, similem lego, sed adnotat, præsertim puniceo. Floristam gravem & detestandum odorem non potest significare.

Hist. Lugd. notatur. Hæc Lugd. quæ jungit & describit glabram plantam, quæ non est, ut vult, Cneorum Matthioli. An sit Evonymus Theoph. hæremus. Non enim audivimus quenkum vidisse hanc in arborem excrevisse, folia non sunt mollia, fructus non est solidus, locus, & non sunt in quatuor versus distincti, sed in quinque. Odor, nec sapor nobis ingratus & feridus, sed aromaticus & resinofus.

Exemplum Theophr. non est. C.B. pin. Ledum alpinum, sive hirsutum. Alpigena Chamæhododendri varietas, Lob. Balsamum alpinum Gæleri, Lobac. Tab. & Cam. Ledum alpinum, Cluspan. & h. a. Tab. Cistus Ledon alpinum, Ger. Eid. pin. Ledum alpinum, sive foliis ferrea rubigine nigricantibus: Ledi alpini genus alterum, Cluspan. & hist. Rhododendros alpina quibusdam, Cæs. Chamæhododendros alpigena, Ger. Hoc floris colore variat, communiter dilute rubentis: at in Pyrenæis, flore tantum albo reperitur.

Locum. In Allobrogum saxosis & asperis montibus nasci, prope Muram oppidum, decem à Gratianopoli miliaribus distans, Punicea non altiore, sæpius brevior, legitur apud Lugdunensem. Ledi Alpini genus 1. inventum à Clusio in summis Eneberg/ Sencalpen/ Weyssel/ Sencenstein, aliarumque vicinarum Alpium jugis inter saxa, ad deversa plerumque eorum latera, & supra Gamingan, Chatusianorum Cænobium, in montis ascensu lapidebus strato, qui sub. ut dicitur, quidam Schof & vicinas Alpes proficiscuntur. Aliud ejus genus invenitur in Sencalpen supra Neuberg. Floret utrumque Iunio & Julio: semen sub Augusti finem, aut paulo ferius mature scit. Ledum alp. minus, hirsutum, in prioribus tabella litera A. de oratum pro venit in montibus Genevensibus, ut Thuiri. Vtrumque videtur in montibus Rhæticis, ut Burnio florens mense Iunio: Patavij virens Martio, est enim perpetui folio: In monte Gotthardo Maio cum angustioribus foliis & quadripartito fructu, unde etiam attulit Cherlerus. Vtrumque Ledi genus observavit Gargillus in monte Pilau Lucernati in mense Iunio, glabrum quidem adhuc florens, hirsutum vero jam desoluerat.

Tempus. Vtroque Ledo Alpino tinctorum, qui montium Eneberg/ & aliorum vicina inhabitant, ubi provenit, utuntur ad lineas penulas nigra colore inficiendas, autore Clusio.

ROSMARINVS SYLVESTRIS quorundam. CAP. XI.

C Vbitilibus interdum est virgis, firmis, lignosis, cortice cinereo obductis, quarum extremitas in Virga. plures alias tenuiores & quodammodo purpureascentes, easque etiam nudas dividuntur; illæ vicissim in alios dodrantes ramulos, virentes quidem, sed tomento quodam rubiginei coloris obitos,



quos nullâ serie digesta, sed confusa ambiunt folia, Libanotidis coronaræ foliis, ferè similia, sed longiora, supina parte viridia, adeoque in pronam partem reflexa & convoluta, ut ejus nihil conspicua possit, præter nervum, secundum folij longitudinem, excurrentem simili tomento cum pediculo, cui inhaeret, pubescentem, grati & suavis odoris, acrisculi tamen saporis: summis istis

ramis insident capita, ex multis, brevibus quasi squamis ferrugineis compacta, & quibus deinde se explicat, corymbacea quædam multorum florum coma, oblongis, tenellis atque virentibus, nonnihil tamen lanuginis pedicellis inhaerentium, grato odore nares ferientium, quinis foliolis albis constantium, non tubulorum (ut temerè quidam Lob.) qui sic cum flore ramum duntaxat conspexit, asserere non est veritus: decem candidis staminibus cum stylo medium florem occupantibus: his demum succedunt, oblongiuscula capitula, per tagona, officulis fructus Corni, aliquando magnitudine non cedentia, quæ, dum adhuc viridia sunt, argenteis punctis distincta esse videntur, sed maturitate adæpta, rubiginei sunt coloris, semenque continent oblongum, flavescens, adeoque exile, ut scobis, è ligno à vermibus eroso sponte decidentis, instat sit. Verum peculiare est in istis capitulis, ut maturae deorsum inflectantur, terramque mucrone spectent, magnâ Naturæ providentiâ, ne semen temerè effluat; nam præter reliquorum consuetudinem, à pediculo, non ab extrema cuspide, aperiri & dehiscere solent: immaturo semine, terni aut quaterni, alij ramuli, rubigineo tomento obducti cum suis foliis, in comæ lateribus nascuntur, spem florum in sequentem annum pollicentes: radix lignosa est, & brevibus fibris donata. Tota planta odorata, præsertim cum floribus onusta est, & aromaticum quiddam spirat.

Monuit Clusium Achilles Cromerus, ad montium radices, se aliquas plantas invenisse, quæ flores sex foliis constantes, duodecimque staminibus præditos proferrent: insuper addidit, qui illi dux via fuisset. Venatorem ad hunc similem plantam, in summis montium jugis conspexisse, jam suis floribus ornata, quæ digitalet longitudinem non excederet, nominatam autem ab eo Beydnisch binsch, hoc est peregrinam Apariam, quod apes ejus videlicet floribus delectentur.

Cord. in Diosc. Chamæpeuce, à Germanis Zeitz beyde appellata, quam ait quosdam pharmacopolas Chamæpyum vocare, sed errare: quædam exemplaria pro

HISTORIAE PLANTARVM

ris pro *marum* habere, sed malè. Chamæpeuce Dioscoridi & Plinio, Germanis *Semrannen* / *Gichtannen* & *Zeitheyde* appellatur. Hæc ille, qui in hist. eam copiosè describit.

Fallit eos ait Matth. qui velint esse Ericam Dioscoridis: is vocat *Wilden Rosmarin*, Rosmarinum sylvestrem: Bohem. *Royowend*. Lob. Obs. & k. Ledum foliis Rosmarini alterum.

Videtur Clusio pann. & hist. Cisti Ledi generibus adnumerari posse hunc fruticem, Rosmarinum sylvestre, vocatum à Matthiolo & Castore, ideoque *Ledum Silesiacum* nuncupavit.

Cam. hort. Chamæpeuce Cordi: Eid. ad Germ. Matthei jussu Epit. Rosmarinum sylvestre.

Tab. 67. Ledum Rosmarini folio: Item Ledum Silesiacum. Si compilator intellexisset, vel diligenter considerasset, quæ scriberet, non separasset à capite Rosmarini sylvestris Matthioli Cistum adulterinam: nec ejus imitator Gerardus, cui dicitur Cistus Ledum Silesiacum, the Polonian Cistus: item, Cistus Ledon Rosmarini folio.

H. Lugd. p. 967. Rosmarinum sylvestre sive Bohemicum Matthioli. Schvvenckf. Ledum Silesiacum majus: Melissa solitudinum: Schabentrant / Heyden Bientraut / Bart Heyde / Grange / Scrogrange Monticulis, quali dicatur suum grando, per methatesin literarum. C.B. pin. Cistus ledon 15. sive foliis Rosmarini ferrugineis: Rosmarinus sylvest. Dod. helg.

Floret sub finem Junij, & Julio plurimis udis & desertis montium locis: semen Augusto & Septembri est maturum: inharèntque interdum in sequentem usque annum capitula, sio ut recenti flore, & fructu superioris anni vacuo, nonnunquam & tertij anni fructus pedicellis, onusti rami conspici possint.

Excalsfacit, attenuat, aperit, roborat, concoquit, resolvit, incidit, & digerit. Quin ad ea omnia efficac est, ad quæ Coronarius Rosmarinus, præterquam ad ciborum condimenta. Non dubium est tamen, quin si quis periculum faceret, ad pleraque magni usus futurus sit hic frutex. Silesi, teste Cromeo, adversus articulorum contractiones felicissimum ejus usum compererunt, totius plantæ decocto in solium infuso, cui ægri insideant & subinde id repetant. Hujus Oleum stillantium vitreis organis extractum, quod cum fragrans admodum sit, & stirpis florumque nativum odorem retineat, magnas procul dubio facultates etiam obinebit. Non tamen quicquam periculum fecit, sed non de futuros arbitramur, qui aliquando experientur. Totam plantam odoratam est, & aspectu jucundo (inquit Schvvenckf.) præsertim cum floribus onusta est.

Articulos roborat, prodest sciaticæ, & aquosis pedum tumoribus. Additur in fessibus ad menses mulierum eliciendos, aliisque uteri morbos. Lixivio ad inveteratos capitis dolores. Cum Scrofularia in balneis scabiem sanat. Cymas cerevisiæ nonnulli incoquant ad inebriandum. Totam plantam in cistas, vestimenta à tineis & blattis ut vindicet, reponit vulgus. Rustici in stabulis substernunt jumentis & porcis, adversus eorum scabiem & grandinem. Foliis apianj alvearia perficere solent ob odorem apibus gratum & amicum.

Articulos roborat, prodest sciaticæ, & aquosis pedum tumoribus. Additur in fessibus ad menses mulierum eliciendos, aliisque uteri morbos. Lixivio ad inveteratos capitis dolores. Cum Scrofularia in balneis scabiem sanat. Cymas cerevisiæ nonnulli incoquant ad inebriandum. Totam plantam in cistas, vestimenta à tineis & blattis ut vindicet, reponit vulgus. Rustici in stabulis substernunt jumentis & porcis, adversus eorum scabiem & grandinem. Foliis apianj alvearia perficere solent ob odorem apibus gratum & amicum.

ROSMARINVS SYLVESTRIS, Clusio. CAP. XII.

Frutex quidam, inquit Clusius, pedalis altitudinis raro amplius, tenuibus, subrubentibus, virgibus præditus, quæ deinde in tenuiores candicantesque ramulos, dividuntur, angustis, oblongisque fo-



lis, tenerè & confuso ordine eos vestientibus onustos, superne virētibz, internè verd canescentibus, & Salicis pumilæ angustifoliae foliis admodum similibus, gustu valdè exsiccante, & nullo grato odore: summis etiam ramis insident capitula, ex multis, brevibus squamis compacta, eachrysomodo, è quibus sese explicat aliquot flosculi, tenuibus, oblongisque pedicellis inharēntes, quinq; foliolis co-

stantes, ut superioris, sed diversi coloris, nimirum rubri dilutionis, sive quodammodo carnei, quibus excussis pentagona conspiciuntur capitula, brevibus & obtuso mucrone, exili & pallecente semine plena. E Silesia ad Clusium mittebat Frid. Sebitzius, in descriptione Rosmarini sylvestris. Tab. Cistus adulterina mihi incognita. Compiler potèrat considerare esse effigiem, Clusij figuræ valdè similem, & ponere prope Rosmarinum sylvestrem Matthioli. Ger. Cistus adulterina, Contrefaict Cistus: item, Rosmarinus sylvestris, Wilder Rosmarin. Cur Gerardus duas facit Cistum adulterinam ex Tab. & Rosmarinum sylvestrem ex Clusio, diversas plantas? Cur non ponit c. 5. juxta Cistum Ledum Rosmarini folio?

C.B. pin. Cistus ledon 16. sive foliis Salicis angustifoliae. Chamærhododendros montana Allobrogum lentisifolia, Lob. Adv. & Ic. Chamærhododendros alpina angustifolia, Tab. Chamærhododendros montana, Ger. Rosmarinum sylv. minus, Cam. ep. Hic doctiores judicent, an ego fratre C. Balthino melius Chamærhododendron hanc montanam, Lob. Tab. & Gerardi, ad Nerium alpinum; Vel ille me rectius, ad Cistum Silesiacum Clusij, sive Rosmarinum referat?

Hoc tamen moneo, me suspicari Clusij Rosmarini iconem factam ad plantam in horto cultam, & fortè non differre nisi culturâ, à sequenti Camerarij Rosmarino sylvestri minore, ut statuere etiam videtur Schvvenckfeldius.

ROSMARINVS SYLVESTRIS minor Camerarij

Minor, & tenerior est priore, lignosis atque tenuibus virgis, ultra palmi altitudinem paululum assurgens: vel ad plurimum dodrantem æquans: folia acuminatiora sunt, & inferiore parte cæcia. In furculorum summitatibus flosculi prodeunt tubelli, è quibus semen, prioris plantæ [Rosmarini sylv. quorundam] semini simile. Odor ipsius vix percipi potest.

Nascitur Rosmarinum sylv. minus, Cam. Epit. sive (ut in hist. Germ.) Rosmarinus sylvest. minor, Wilder kleiner Rosmarin in Borussia, in silvis umbrosis, uliginoso solo prope priorem, quæ ibi humanam staturam pænè superat.

Rosmarinum hoc Camerarij mihi persuadeo idem cum Clusiano inodorato, antè tradito, quamvis icones multum differre videntur: fortè à Clusio cultu



culta depicta.
Schvvenckf. Ledū
Silefiacū n minus:
Rosmarinum silve-
stre nunt. Mat-
thioli Rosmar. silv.
flor. Clusij: Flean
Granae.

Rarū occurrit
isdem natalitiis,
flore Maio & Iunio
conspicuis, conca-
vo, quo ab altero
diversus, suaviter
rubente.

Folia Rosmarini
latiora, pulchrē vi-
rentia, inodora, ex-
siccantis & adstrin-
gentis facultatis.
Neglecti usds.

LIBANOTIDIS SPECIES RON- deletij. CAP. XIII



Lignosus est fru-
tex, bipalmaris
(à Cherlero, bicubi-
talis observatus) ra-
dice subrufo, robu-
sta: stolonibus rigi-
dis Rosmarini
textura, alioqui gla-
bris, sed minoribus
ramis, hirsutis, per
quos folia, Hysopi
Arabum foliis pa-
ria, alia Thymi Cre-
tici capituli folio-
rum modo, latiora,
hirsuta, aspera, du-
ra, ex eodem pun-
cto saepe unum
plura, quorum u-
num reliquis lon-
gius multo, uncia-
sem tamen longitu-

dinem non assequitur, nervo unico, per singula se-
cundum longitudinem decurrente: nullo seu odo-
re, seu sapore: flores extremis haerent ramulis, ex
oblongo tubulo in calathiscum quinquepartitum,
ad Primulę veris imitationem, explicati, colore pur-
pureo, semina cum Echii seminibus nonnihil ha-
bent commune, aut potius Buglossi, satis magna,
colore cinereo.

Lugd. figuram & descriptionem habet sub titulo,
Tragorigani nothi Dalechampi. C.B. phyt. Trago-
riganum angustifolium 3. sive, Tragoriganum ro-
thum Dalech. Eid. in Animadv. in Hist. Lugd.
Tragoriganum nothum Dalechampi: Anchusa li-
gnosior Penz. Vtrobique describitur. Non possum
ego cum fratre Tragoriganum Dalech. & Anchusa
Lobelij eandem facere plantam, quamvis ad-
huc in pin. ejusdem sit opinionis. Vna enim frutex
est: altera non item. Vni flores spinosi, purpurei:
alteri pusilli, cærulei.

Mensibus Martio, Aprili & Maio floret Monspel-
lij in monte Castelnœuf.

ROSMARINVS CORONARIVS fruticosus. CAP. XIV.

Rosmarinus frutex jucundissimi odoris Thus
redolentis (unde & nomen ipsi) *Car. Steph.*
Tom. II.

(cum) vel imprimis utilitatis commendatione notis-
simus, & quia corollis petiuis, Coronarij nomen
adeptus, bicubitalis est, & alior, virgultis tenuibus, *Car. Steph.*

cinereo colore p-
ditis, in quibus so-
lia aliquot simul,
ex intervallis o-
riuntur, rigidula,
Lavendulę angu-
stioribus, brevio-
ribus, pronā parte
candidis, supinā
semper virentibus:
flores ex foliorum
alis, ex cartulco al-
bicantes, Salviz
florum effigie, mi-
nores, labello co-
tylę instar corca-
vo, guttato: fibræ
incurvæ, longæ, ex
ristu sub supremo
folio promicant.

Duplicem agno-
scimus Rosmari-

num vulgarem, seu Coronariam Libanotin, cuius-
modi etiam meminit Cordus & ex eo Gesl. de hortis.
Vram nobiliorem angustiore folio, quam Cordus
in Hist. Rosmarinum mir orem seu ter uis folium ap-
pellat, quique apud nos in hortis colitur, quem qui-
da n putant veram Libanotidem Diosc. & veterum
Medicorum, sed apud nos degenerare: verum hi to-
to celo aberrant: diversissimæ sunt plantæ. Alteram
ignobiliorem à Cordo silvestrem seu majorem vo-
catam, cui Plinium falsò semen negare tradit, quam-
que nasci in Narbone si Gallia scribit.

Munsterus. Cosm. lib. 2. de Narbona, Rosmarini
ineptam figuram proponit. Quin & Crescentius
pro Rosmarino aliquid Myrti simile pingit.

Mizald. ait rura & officinas Rosem maritimum ap-
pellare quod alijs Libanotis dici solet. Sed Mizal-
dus non distinguens inter Libanotidem, quæ Ca-
chry fert herbam: & Libanotidem coronariam fru-
ticem, huic tribuit, quæ ei conveniunt, ut infra lice-
bit videre de viribus ex eo recitatis. Eundem pla-
næ errorem ac plures alios Car. Steph. in hort. com-
mittit, talia dicens: Rosmarinum, sive, ut quibusdam
placet Rosmarinus, adhuc hodie vulgus appellat du-
plex. Eum autem fruticem Plinius Libanotida
vocat l. 19. c. 12. &c. Sunt autem, ne quis fallatur, mul-
tæ Libanotidis species, quarum una tantum mihi
est cognita. Est enim Libanotis serax, quæ duplex,
mas & femina: folia habet Rosmarino similia, sed
umbellam gent, quemadmodum Anethum, in qua
est Cachry, cuiusmodi in canina Rosa apparere so-
let, atque in ipso Cachry semen complexum est. Ce-
teram hæc dux Libanotidis species mihi sunt igno-
tissimæ. Est & alia Libanotis, quæ sterilis appellatur,
eaque simplex est, ramos sessiles habens, ac folia no-
stro Rosmarino similia, sed neque florem, neque
semina gerit, passimque audip reperiri apud Mor-
spellanum: item etiam in quibusdam Hispaniæ a-
gris, quos eā herbā sponte nascenti plenos ac reser-
tos audiui. Est insuper alia Libanotis species nobis
cognitissima, atque hæc Gal. l. 7. simpl. Coronaria
vocatur. Quæ hæcenus scribit Steph. de Libanoti-
de coronaria, scateat erroribus. In primis male Ro-
marinum coronarium, eandem facit cum Libano-
tide Plinij. Quis dixit Stephano Libanotidem sera-

cem habere folia Rosmarini? Diosc. dixit Marathri.
Quid sibi vult cum Cachry in rosa canina? Quænam
est Monspellulana & Hispanica? Cur non
eandem cum Rosmarino, primo loco ab eo tra-

ditant. Cur non statim eam subjunxit? Verba quæ de viribus adducit radicis, nullo modo competunt nostro Rosmarino. Sed & Francisc. Venetus in sua Harmon. mundi confundit cum Libanotide, siue Rosmarino coronaria, umbelliferâ siue ferulaceâ.

Zea. Dendrobanus Trago Libanotis dicitur etiam Zea, ite Dendrobanus & Campfanema, ab Italis Corona montana. In Serapione hæc leguntur nomina Xaeralperten, Arbor Mariz, Alpinalphach, Cachola. Avic. facit Buchormarien, quod negat Serapio. Orpheus vocat Solis Thymiam teste Agrippa occult. philosoph. Anguillaz est Rosmarinus coronaria Cneorum nigrum Theophr. Casia Hygini & Virgilij. Sed errat Anguillara, seu & alij recentiores quidam, existimantes Rosmarinum coronarium esse Cneorum Theophrasti.

C.B. pin. Rosmarinus: siue hortensis angustiore folio. Rosmarinus, Brunfels. Trag. Fuch. Turn, & Lon. Rosmarinum coronarium, Matth. Ang. (cui & Cneorum Theophr. & Casia Latinorum) Dod. gall. Lac. Lob. Lugd. Cam. & Eyst. Libanotis coronaria, Cord. in Diosc. & Gesn. hort. cui & Rosmarinus minor siue tenuifolius. Casia nigra Theophrasti, Dal. in Plin. Hyssopus Hebræorum quibusdam. Floribus est communiter subæruleis, rariis albis.

Eid. pin. Rosmarinus 2. siue spontaneus latiore folio: Rosmarinus silv. seu major, Cord. hist. Rosmarinus alter ignobilior, Gesn. hort. Rosmarinum silv. Cæf.


Coronar. cur. di. am. Cæterum, Coronariam hanc, & Libanotidem & Rosmarinum cognominamus ad differentiam aliarum Libanotidum & Rosmarinorum, partim scilicet hoc libro dictorum, partim verò dicendum lib. 27. inter Umbelliferas.

Rosmar. linguar. *Albanotis* Diosc. *Libanotis* recentioribus, Rosmarinus aut Libanotis coronaria, Arab. *El-kidger*: Germ. Rosmarin: Belg. Rosmaryn: Gall. Rosmarin: It. Rosmarin, Rosmarino coronario: Hisp. Rosmer: Ang. Rosmari: & Garden Rosmarien: Boh. Rosmaryn.

Locum cum tempore. Qui seminatur, & latiora & rugosiora habet folia, non facile fert hyemem. Alter folio angustiori, vulgarior, surculis facile propagatur: Ex semine an hic proveniat ignoro. Rosmarinum sponte provenientem observavi in Gallia Narbonensi, ubi tantus ejus proventus, ut haud temere aliud incolæ lignum utant, eoque Monspelij & locis vicinis pro ignis vomite utantur. Floret mense Martio, Aprili, Autumno ac toto ferè anno. VVatvillæ in Alsatia me docuit Sacerdos, Rosmarino ut citius proveniat decerpandos esse summos ramulos, idque sæpius, ut lignum durius evadat ac frigori magis resistat: adhæc si in transplantatione, simus addatur, corrumpi. Scribitur, inquit Plinius, quoniam illi semen non est [falsò illi negat semen] propagine & avulsione. Tradunt facie vini, aut è parietibus latere tulo, mirè ali. Rosmarinus certò tempore in novella Junipero insita, ut Cam. observavit, eò facilius hyemem non reconditus perfert.

Vires ejus. Diosc. Rosmarino vim tribuit calefacientem: sanare morbum regium, si quis ipsam in aqua coctam ante exercitationem exhibeat bibendam: deinde exercitatum lavet, & vinum ipsi bibendum det: misereri etiam acopis & unguentis de glaucino. Vfus ejus si Plinio credimus, stomacho post annum saluberrimus. Datur contra serpentes ex vino, vel aceto. Pulices etiam contrita, & cum aqua sparsa necat. Rosmarinus coronaria, ut Serapio testatur, calefacit, exsiccaturque: & ex autontate Abin Mesue, confert, ait idem, Corizæ frigidæ cerebri. Mizaldus varias et adscribit vires, de quibus agendum. Rosmarinus inquit frutex est opianus, nec non coronarius,

cujus odor, tenuem aut Thus, utcumque per se fert: tam suavi ac jucundo spiraculo, ut quos animus de secerit, iteò recreare possit. Suffitu destillationes tussim continet, regiūque morbum suo curat decoctis. Quod illi de multis nobile est ac inigne, solo nidore in pestilentia tutam addit domum, diluendo & expurgando improbam aëris perniciem suffitu ac vapore sanari. Flores caput ac cerebrum maximè roborant, ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos coadiant, & sibi ac amicis eam rem diligenter custodiant. Totus frutex utilis est, omnibus frigidis ægitudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulo particularius hic nobis est medicè philosophandum in expertis & probatis Rosmarini auxiliis. Itaque succus radicum & foliorum ejus defæcatus, & cum melle de spumato in modum collyrij concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidæ fuerint, licebit addere ovi albumen, cum succo Pomii generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert præsidium contra icterum, hepatis obstructions & inflationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhiberet Mizaldum? Quis unquam observata Rosmarini radice præscribet ex ea succum defæcatum, vel crederet lignosam & inspidam radicem efficere posse perhellè, quæ ille pollicetur? si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonzo calidum & sic cum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul adstringentis facultatis particeps; utpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profluvia suppressit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidâque causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuunt, nervosas partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expetitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: obsoniis enim quibuslibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim salutarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructions aperit roboratque. Rosmarinus cerebro robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscumque utilis, epilepsiz, lethargo, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stupori: albos fluores mulierum potu & infellu curat. Siccati pulveris cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosmarini cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento bibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosmarini idem præstat. Quibus anima fortet, aut visus imbecillior, pdest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Suffitus naribus & ore hians exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosmarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera putrida & ulcera extergit insperfo simul pulvere. In lixivio capitali utiliter maceratur. Stillatius liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitui secundo. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tempora eò inuncta apoplexiam præcavet.



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XIV.

6543

QVI EST ROSARVM, ET HIS AFFINIVM
SPINOSARVM NONNVLLARVM, VT
RYBORVM, CAPPARVM.

NUNC amenam illam Rosam celebremus, florum reginam, sed quæ undique rigidis spinarum telis armata sit. Unde Rosa Plinio nascitur spinâ verius, quam frutice. Quamquam & nos absque spinâ nascentes observaverimus, uti constabit in progressu. Sed quid vel spinarum minas metuemus, tam roseo colore, tam pulchra florâ facie, tam suave spirante odore lecti? Ad eam & florum venustissimam decerpentes conueniemur.

DE ROSA CAP. I.

Deo summa fastigium.

Deferuntur in fastigium.

Virga.

Folia.

Floris.

Calabastri.

Stamina.

Seneca.

Rosa partes.

Calix.

Cortex.

NOTISSIMA Rosarum stirps tam hortensis, quam silvestris, tamen si fruticosa & spinosa sit, consentaneum tamen & decens magis est, eam seorsim hic tradere, quam aliis spinosis fruticibus jungere. Est igitur in genere frutex infimus, Czf. & citò senescens, nisi recidatur, ut cum suffruticibus ambigere videatur: ramis aut potius virgis duris, lignosis, & ut plurimum, hispidis, mordacibusque aculeis horrentibus, non rectis, sed modicè recurvis, frequentibus: foliis subrotundis, asperis, per ambitum serratis, quinque & septem ex uno nervo, sive pediculo coherentibus, sibi invicem oppositis, supremo singulari: floribus (quibus Rosæ nomen sui fruticis, quique proprie ῥοζα Græcis, ob odoris suavitatem dicti) primum herbaceo inclusis calyce, qui tumescentes in vitides alabastris fastigiantur, quibus dehiscens flores panduntur, vel simplices, vel multiplices, in calycis sui medio stamina quædam capillacea, luteis apertibus donata, complexi: semine in oblongis capitulis, quæ calycibus & floribus subsunt, Dod. per maturitatem rubentibus, duro, lanugine involuto: radicibus duris, lignosis, in diversa tendentibus.

Porrò, Rosæ partes Medici numerant octo, quas ob medicam materiam novisse proderit, viribus siquidem differunt. Pediculus igitur, qui florem sustinet terminatur in caput solidum, lanugine quadam refertum, foliis & floribus substratum, seu basis totam rosam sustinens, calyx [quo nomine tamen globulæ totius folii nondum apertæ cognominantur] vocatus. Hunc ambit cortex apertâ rosâ in quinque pinnulas seu laciniâ divisus. Tertia pars est, floris medium illud croceum, quod capillamentis insidet,

à recentioribus & Officinis Anthera vocata, deducitur ab eo, quod est ἀνθρα, id est, flos rosæ. Quarta, ipsum capillamentum subtile, veluti filum floris, seu croci illius fulcrum & sustentaculum. Quinta folium, cujus ima pars candida, anguis apellatus, sextam constituit. His addunt septimam, quæ est lana in capite contenta. Semen, quod est octava pars Rosæ, ne putes inquit Palladius, medios flosculos esse, aurei coloris, sed baccas Pyri brevissimi similitudine, seminibus plenas, post vindemiam maturas, quarum quidem maturitas tum ex colore ruffo, tum ex mollitie æstimatur. Et hæc ferè sunt, quæ omnibus Rosis sunt communia: de his pluribus agetur infra.

Theophrastus Rosam modò inter frutices, modò inter suffrutices numerat, ejusque differentias his verbis assignat. Rosarum differentia multæ, foliorum multitudine, paucitate, asperitate, levitate, colore, odore. Quippe plurimis quina [in flore] folia sunt, quibusdam duodena, vicinæque, aliis longè plura: sunt enim quas Centifolias vocant, quæ circa Philippos plurimè proveniunt, quas incolæ ex Pangæo transferentes ferunt: illic enim multæ ejusmodi sunt. Sed folia interna [in harum flore] parva admodum sunt, ita enim oriuntur, ut alia intus, alia extra emicent, non tamen jucundi odoris, nec amplæ magnitudinis sunt. Odoratiores inter amplas, quibus pars ima scabra. Ad summam (ut dictum est) & odoris & coloris præstantia, loci ratione contingit: & quæ eadem in diversa tellure proveniunt, à se differunt, quod jucundum vel nullum spirent odorem. Et hunc locum Gaza sic est malè interpretatus: nam Gaza & quæ in eadem tellure proveniunt, diversitatem bonæ & malæ exilisque olentia, nullam ostendunt. Odoratissimæ quæ apud Cyrenam gignuntur. Sylvestris alperioribus tum virgis, tum foliis constat, & florem minus odoratum, minusque coloratum, nec tam magnum fert.

Tom. II.

G 1

Rosarum id est, *Rosam cum Anemone confers.* Vbi quis im-
paria inter se componit. Est autem Anemone, Pa-
paveris genus, cuius flos, specie Rosam imitatur, ex-
terum nulla odoris gratia. Est & aliud, *Rosula*, quae
Rosae loqui, id est, verba grauiissima, & Rosarum instar amabilia.
Et Persius ait:

3. *Quicquid calcaverit hic, Rosa fiat.*

Quod adhuc vulgus in homines gloriosos profert.
4. Adde & hoc quod Crateti philosopho adscribitur.
Sus per Rosas [& dicitur]. Est autem Rosae odor huic
animali naturae contrarius. Consule hac de re Ca-
merarii cent. 2. p. 38.

Virtutis in-
disiunctio. Inter Philologica, quae de Rosa sese offerunt, im-
primis placet illud quod apud Claudianum legitur:
Armat spina Rosas id est, nihil absque labore iucun-
dum. Lege Camerarii cent. 1. p. 38. Rosae itaq; indi-
cant allegoricè animum heroica virtute praeditum,
consilia & facta singularia, non à quovis praestita.

Veterum
Rosa nigris
accommo-
dantur. Sed relictis Poëtis, missis Graecorum fabulis, reci-
tatis Aetiis, investigemus quoniam sint illa Plinij
Rosarum genera, & utrum eorum quaedam ad nos
usque pervenerint. Callip. sua veteribus accom-

Rosa Gal-
de plena. modare studet, sic: Quae roseo colore est, nascitur in
frutice valde hispida, quaterna cubita excedente,
primo floret inter ceteras; Campanam videtur ap-
pellare Plinius, quae praecox est, & Trachiniam mi-
nus rubentem. Apud nos [in Italia] praeter Carne-

Scaphos
plena ca-
belli. neam Rosam, quaedam rubens est multifolia, odore
iucundo, sed exili: hanc Plinius Milesiam vocat, co-
lore ardentissimo, non excedentem duodecim folia.
Alia apud nos huic similis inter peregrinas visitur,
colore magis diluto, accedente ad carneam, latissi-
mis foliis, pluribusque in se convolutis, ut explicari
nequeat, odoratior rubentes: Ejus frutex parvus est,
& solus spinis caret: hanc Graeculam videtur Plinius
appellasse. Quarta candida, maxime omnium nu-
meroso folio constat, sed parva, odore valde exili.

Laetolia. Plinius hanc Alabandicam vocat, viliores albican-
tibus foliis: & Spermoniam plurimis foliis, sed mi-
nutissimis, utilissimam, non multo odoratam, Quae
ex translatione in Campania, & circa Philippos a-
ded profecit, ut latissima, & maxima folia proveni-
unt, non tamen odoratissima quam Centifoliam
vocant, Muscatula apud nos appellatur, ob odoris
excellentiassimae, sed quae opere Topiario colitur: cau-
dice ceteris transiore: ramis longissimis: aculeis ra-
rioribus. Rosa parva ex quinque foliis constans

Candida
plena &
niplena. candidis, multis intus floccis, pulvisculum luteum
fundentibus, amarior haec & maiorem vim purgan-
di habet: tardissime floret, & perdurat usque in au-
tumnum: In hoc genere quaedam reperitur multi-
folia, forte Praenestina apud Plinium, quae celebra-
tissima, novissime desinit. Sylvestris in sepibus spon-
te nascitur, virgis praelongis, Rubo similibus; in
quibus saepe spongiolae villosae visuntur: fert par-
vam Rosam, non excedentem quinque folia, colore
albo, aut subrubente, exili odore: altiores virgae, &
spinosiores sunt, quibus subrubentes Rosae, humi-
liores quibus albae: Dioscorides eandem Cynosba-
ton appellat, quasi Rubum caninum: Theophrastus
inter Rubos tertium genus describit: Theodorus a-
liquando Caninam sentem vertit: Plinius modo Cy-
norodon, modo Cynosbaton vocat, videturque
diversas intelligere: nam Cynorodon, radicem
sylvestris Rosae facit. Cynosbaton verò Rubi
genus, Rosae similitudine. Quin & Capparis quo-
que Cynosbaton vocari traditur ab eodem. Sunt

Syl. duplex. & Rosae luteae quing; foliis constantes, ut sylvestres,
laurioribus tamen: odore ingratissimo: frutem, & folia si-
milis sylvestri. Plinius alteram Graeculam vocat, Pal-
lidam, spinosam, longissimis virgis quinque-foliam.
Addit autem Plinius alia genera, ut Graecam, quae
Lychnis vocatur à Graecis & Moscheuton, sed ex
Tom. II.

aequivocè potius Rosae appellatae sunt, alio loco ex-
plicandae.

Athenaeus Rosarum differentias ex Theophr. po-
nit, nec plures: Ex recentioribus Hermolaus praeter
ea, quae ex Plinio transcripsit ipse, innotinato, de
tino nihil adiecit, quam quod apud Plinium mavult
legi Spermoniam, quae Spinolam aut Spinofamita
entim, sive quod minutissimo folio, sive quod vilissi-
ma sit omnium, reatissime ipsi videtur appellata, ait
tamen esse quosdam qui Sycioniam legendum pu-
tent. Nec probat quod nonnulli Musceton legant,
quandoquidem Aceton & Moscheuton melius red-
datur à propagine, vivradicève, quam Graeci Mo-
scheuma dicant. Ceterum, ambigit Coroneola siene
Cynosbati, an Cynorhodiflos: quanquam Cynos-
bati magis putet. Cynorhoda porro sylvestres esse
Rosas dicit, licet Aristoteles eam videatur appella-
se Cynacanthem, hoc est, Caninam sentem.

Curtius particulatim ex sua observatione Pastas
nam celebrat, à Pasto Calabriae oppido, passim apud
autores commendabilem, quotannis bis germinan-
tem. An autem ea sit, quae nunc Damascena dicitur,
ignorat. Parva enim haec, inquit, candidi & rubei
coloris, egregij odoris. Plures autem ab uno geni-
culo exeunt. Ultima autem haec germinatu est, ve-
rum continuè & hieme etiam tepidioribus locis flo-
ret. Est & Provincialis in Gallia ab oppido sic cogno-
minata, colore inter album & rubrum medio, quem
incarnatum vulgus vocat. Ethruria has Anconitanas
incarnat. Odoratissimae non sunt quibus folium maxi-
mum & latissimum. Odoratiores, quo rubicundio-
res. Indicium autem odoris corticis scabritia. Quae
rit in probl. Arist. Cur suavis Rosae oleant, quibus
asper, quàm laevis umbilicus sit? Quod magis secun-
dum suam naturam constitutae sint. Naturae enim
suae, Rosa spinosa est.

Differentiae Rosarum quas Ruellius in longum
recenset, aliae non sunt, quàm Theophrasti & Plinij,
quamvis pro suis venditet.

Tragus Rosae hortensis hanc ponit differentiam, Tragi diff.
ut alia candida sit, alia ex purpura albicans, quaedam
rubra. Et rursus in hoc genere una simplici: altera
multiplici foliorum ordine. Rosae verò sylvestris
quatuor fastigia constituit. Cujus primum genus,
ejus quidem iudicio, Cynorhodon Barbari fuerit,
nobis Rosa silv. folio glabro: secundum, Spina Ma-
riae nominatum, est nobis Rosa Eglantina, sive fo-
liis odoratis: tertium, Rosam cinnamominam flore
subrubente conjectamur: ceu ultimum, cum priori
Rosa campestri dicta, Rosam sylvest. folio glabro,
flore plane albo. Et ita Tragus distinguit, satis osci-
tantes.

Matthiolus de Rosis Italicis, pauca haec habet. March. diff.
Multae quidem sunt Rosarum genera, quae in usum
medicum veniunt. At vulgatissimae in Italia sunt, al-
bicantes, puniceae, & quae ex albo rufescunt, quas
vulgò appellant incarnatas. Quaedam etiam aureo
colore fulgent, odore admodum ingrato ac insuavi.

Rosae hortenses albae (inquit Gesn.) multiplici
folio, passim apud Tigureses in hortis abundant,
frutice procenore, quàm rubrarum, quae tum sim-
plici, tum multiplici folio constant. Vidi & Rosam
dimidia parte candidissimam, altera purpuream.
Rosae Alexandrinae, vel Persicae, vel Damascenae,
vulgò Incarnatae dictae nunc nobis satis frequentes
Syriz urbe advectae creduntur. Rosae citrinae, seu
luteae. Rosae moschulm fragrantissimae luteae. Rosa
lutea inodora, vulpina cognominata. Rosa mu-
scata alia à praecedenti simplex & multiplex. Rosae
muscatae vel Damascenae parvae, simplices, albae, flo-
rentes in Italia toto fere anno. Aliae nobiles, den-
si folio, flore parvo, purpurei coloris diluti. Adhuc purpur.

Albo-cur-
na.

Rosæ aliz abz ad citrinum tendentes, parvæ, tria, quatuorve folia habentes (quales hæ Rosæ sinu nos latet) per totum annum in arbore ferè vidèda. Muscatæ ab odore, vel Alexandrinæ vulgò appellatæ, ab aliquibus Damascenæ. Hæ verd odore caput tentant: & potentissimè alvum subducunt, non minùs autore Manardo, ac Scammonium: ita ut si sex, vel octo folia acetario miscueris, totum purgatorium reddas, quæ de causa ab illis tanquam pernicioso medicamento, naturæ vim inferenti, abstinendum censèd. In Hispania rarò videntur & ab aliquibus cum incarnatis confunduntur. Audio easdem Marinas à nonnullis vocari.

Incarnata
Marina.

Sylvestris.

Cynorodon.

Campestris
Tragi.

Classi diff.

Centifolia
Batavica.

Major pro-
vincialis.

Prænestina
alba.

Verficolor.

Flava ple-
na.

Centifolia
b.

Spina 2 sine
spina.

Humilis
Campestris.

Folioru ec.

Tab. diff.

Milefia.

Perficam.

Sine spinis.

Muscata.

Aegyptia.

Eglentiana.

Sylvestris.

Dodon. diff.

Domestica
triplex.

Hermol. ex
Plin. notat.

Lab. diff.

Rubra.

Candida.

Monachi Rosam Damascenam *Mosibette* vulgò dictam, è silvestrum genere esse putant, sicut & incarnatam, vel trentaphyllam, à foliis triginta, & albam Centifoliam dictam. Rosæ sylv. Cynosbati, vel Cynorhodi veteribus dictæ, passim sepes vivas replent. Rosæ sylv. aliâ humilior in collibus siccis & apertis toto frutice suavissimè odorato. Rosæ sylv. à Maio mense denominata *Meyenröfle* spontanea in Albio monte, fuerit Rosæ campestris Tragi, rosâ colore magis rubro tinctâ. Hujus altera species, rosâ profusè candidâ.

Insignis Botanicus Clusius prodidit nobis Rosas Batavicas, Austriacasque, ita scribens: an, quæ apud Batavos Centifolia nomine dicitur Rosæ, nonnunquam etiam centenis vicenis foliis, ea sit, cujus Theophrastus & Plin. mentionem faciunt, hæreo. Istius stirps altera, albo flore, mediâ inter illam & proximè sequentem magnitudinis, alba major Provincialis appellata, ut superior major Prænestina. Sed & rarius Centifolia genus, puore aliquanto minus, colore alioqui, odore & formâ conveniens. Non desunt, qui Prænestinam albi coloris inveniri asserant, quæ mihi nondum videre contigit, nisi ea sit, quam V Vilh. Osterrat Francofurt. unicam in horto suo alit, flore multò diluciore Prænestinâ, & ferè albicante. Illi congener esse videtur Rosæ versicolor, Ioannis Rest. au Colonienfis. Accipio etiam Rosas flavas multiplici foliorum serie prædictas existare.

Ceterum, ad eas, quæ præter vulgares à me observatæ sunt, redeam. Illarum autem varietates sunt species. Prior Prænestina, Provincialis vocatæ, valde similis, si re saturatis nonnihil rubente, & eadem albo, Centifolia alba vocata Batavis. Rosæ 2. sine spinis, ejusque varietas flore albo. Rosæ sine spinis altera. Rosæ cinnamomea pleno fore. Rosæ humilis flore albo, Græculâ Plinij fortè. Rosæ campestris odora. Rosæ pumila sive Chamærhodon. Herodotus in Vrania, sive lib. 8. Rosas in Midæ Gordio, niti hortis sua spontè nasci refert sexagenum foliorum, fragrantiore odore, quàm ceteras.

Tabern. hæc agnoscit differentias. 1. Rosam albam. 2. Rosam rubram, quam vocat ait Milefiam, purpuream & puniceam. 3. Rosam provincialem majorem, Perficam, incarnatam & purpuream dictam, ut 4. Provincialem minorem. 5. Rosam sine spinis. 6. Rosam muscatam albam. 7. Muscatam albam multiplicem. 8. Rosam luteam Aegyptiam & Vulpinam dictam. 9. Rosam Eglentianam, Dunensem & Pampinulam cognominatam. 10. Rosam silvestrem. 11. Rosam arvinam.

Lacuna Rosam domesticam triplicem facit, albam, rubram, & incarnatam, additque quartam vulgari Mosquetam, vel Damascenam dictam. Rosam silvestrem ait Cynorhodon Græcis vocari, Plinijque ac Hermolam eam cum Cynosbato confundere, quàm verè judicent alij.

Lob. in Adv. Rosas Angliæ, Belgij, & Northmanniæ tradit: Triplex est vulgationis è colore differentia: nam aut purpura sanguinea saturatè puniceant: vel aspectu myco micant: aut candore & rubore

confusis, flammeo rutilant, virginis genis conciores, quas plebecula pallidas vocat. Silvestris natiæ varietates notatu dignæ: Cinnamomea præsertim florum foliis minimis. Moschatæ silvestrem exuerunt animum & hortenses duplæ factæ. Pares & illis luteæ Galliz inquilinæ factæ. Est & jamdiu ceruleas videre. Est species vulgò *Eglentiana*, vel *Eglentia* dicta foliis odoratis. Est alia pomifera, monifera, aut baccifera Dunen-Rosen dicta.

In tradendis Rosarum differentis diligentior paululum Lobelio Dodonæus est. In sativarum Rosarum numero prima, inquit is, Rosæ alba, Plinij Spineola esse potest, si modo Campana non sit. Altera, quam Incarnatam Italia nuncupat, Alabandi ex similis est. Tertia, Provincialis Gallis dicitur: hæc Milefiam esse, non temere suspicari licet. Quarta Rosas Franchas Gallia, Plinius Trachiniam fortè, aut Prænestinam dixerit. Quinta Moschatæ ab odore dicitur: Damascenam autem & hanc nonnulli appellant. Sexta Rosæ sylv. propriissimè, hirsutis pilulis, spongiosis dictis. Septima Cinnamomina appellatur. Octava à colore nomen accepit, Lutea dicta. Nonam, Dunensem nominant, ab ipsis in marino littore arenosis tumulis, quos vulgò *Dunen* nomen nominant: Sunt qui Pampinulam nuncupant.

Decima Cynorhodon, sive canina Rosæ odorata, Gallis Engletterium, teste Ruellio, nominata, qui & hanc Cynosbaton, sive Canirubum esse suspicatur. Lugd. vult Campanas Plinij, esse Rosas nostras albas: Damascenas foliis densissimis, Alabandicas, Spineolas & Centifolias: Rosas verd Prænestinas, rubras, & in iis Milefias, quas Galli *Roses de provins* appellant. Trachinias nris rubentes, quas *Roses incarnates*. Græcarubra etiam est, ut ille equidem sentit, quamvis Plinius colorem non expresse rit, eaque multorum sententiâ, quæ Damascena rubra nominatur, *Rose de Damas rouge*. Græculâ etiam multorum judicio, Rosæ Damascenæ genus est, flore ex albo ad puniceum nonnihil vergente, *Rose de incarnate*.

Damascenæ: Moscheutos Rosæ Plinio quæ sit ambigitur. Sicut qui inter Damascenas numerent, alij inter Rosas sylvestres passim nascentes indudis. Damascenarum cortex malvacei corticis modo latus quidè viret, quàm ceterarum, sed quæ foliis sit Oleæ nullam adhuc comperit Dalechampius, quanquam in quibusdam exemplaribus folia lævia legantur, non Oleæ. Ceterum, Moscheuton Rosam dictam putat, non quodd Moschum oleat (ut ait Dodon.) antiquis incognitum, sed quodd *moschus* id est, stolonibus multis frutiger, vel quodd *moschus* id est, malleolis feliciter pangatur Vitis modo, non solum vivi radice. Coronecolam à coronis nominatam, si ve seram, sive Autumnalem, Damascenam esse ferè omnes autumant, tum quod Autumno proveniat, tum quod odore suavi prædita sit, Galli *Rose de Masque* & *Muscadelle* vocant. Ea duplex est, Quinque folia una, & altera densa. His addenda Lutea veteribus indita. Cynorhodon universè quidem Rosam omnem silvestrem Plinius appellat. Hujus autem generis duo observant Herbarij: silv. Rosam vulgarem, & Cynorhodon Polyacanthion, forma Rosæ sativæ.

Camer. in horto memorat primò albam simplicem & plenam, quam Campanam præcocem Plinij dicit. 2. Lætecolam, Centifoliam eandem putat. 3. Rubricundam non omnino dehiscens, ut Plinij Græculâ. 4. Incarnatam, Norimbergæ Plinij sem à loco vocatam, veterum Prænestinam existimat: 5. Intensè rubentem simplicem, vel plenam à pharmacopoeis Finam appellatam, Plinij Milefiam facit. 6. Rosæ purpureæ, à priore parum discrepans, videtur ipsi Trachinia Plinij. 7. Damascenam sive Muschatam nominat, eamque simplicem facit & plenam,

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

Coronecola. Damascen. Rose musque. Muscadelle. Lutea. Cynorhodon vulg. Polyacanthion. Camærhodon.

plenam, quam Coroneola Plinij accommodatam
plicem vero Neirin, vel Neirin Serapi, & Avic vocat.

Cinnamomum 8. Rosam cinnamomeam simplicem, pro Lychide
Alba Plinij Gesnerum habere tradit. 9. Venetam, quam
Alba alij Provinciale vocant, Spermoniam Plinij cre-
Alba dit. Idem celebrat Rosam totius spinis, campe-
Alba streim odoratam Clusij, sive Pomifera, ut existimat
Alba Lob. quamvis hic sine spinis pingat, & utamen sit
Alba spinosissima: Luteam Apenninam in Italia inquil-
Alba nam, & herbacei coloris Rosam. At tandem Ro-
Alba sam caninam, ut etiam duplicato inveniri flo-
Alba re, quæ pro Alabandica Plinij haberi queat.

C. B. apud C. B. apud Matth. dividit Rosam in sativam & sil-
Purpurea vestrem Sativam purpuream, incarnatam Italorum,
Alba Trachiniam Plinij credit. Alba n. mavult ejusdem
Alba Campapam dicere, quam Spineolam cum Dod-
Alba onzo, nisi sit Alabandica. Rubra saturati coloris, vi-
Alba detur ipsi Milesia: flore simplici & multiplici: flore
Alba non ita saturate rubente, forte Prænestina Plinij: &
Alba hæc vel simplici, vel multiplici flore. Moschata ab o-
Alba dore, Neirin Serapioni: alia simplici, & quidem vel
Alba majore, vel minore flore: alia pleno flore. Spinis
Alba carens major & minor. Sylvestris vulgæ cui Bede-
Alba guar adnascitur, flore simplici & pleno, ut & illa,
Alba quæ Cinnamomea dicitur. Lutea veteribus indi-
Alba cta, flore simplici, rarissime pleno. Pimpinella, à si-
Alba militudine foliorum Pimpinellæ. Odoratus foliis,
Alba Esclanterium vulgo & Spina Maria: Campestris hu-
Alba milis, vel avenacea flore albo & rubello. Pomifera.
Alba Rotundifolia.

Alba Idem in pin. sequentes assignat Rosarum diffe-
Alba rentias: sativam, & rubram Milesiam Plinij, simpli-
Alba cem & multiplicem, colore magis minusque rubro:
Alba ad hanc refert Milesiam rubram plenam vulgo Ro-
Alba sam finam, Milesiam simplicem: Rosa n. ex rubro ni-
Alba gricantem plenam, & rubicundam Saccharinam di-
Alba ctam, Græculam Plinij, Camerario. 2. Rubram pal-
Alba lidiorum. 3. Saturatius rubertem. 4. Purpuream,
Alba Trachyniam Plinij. 5. Versicolore. 6. Maxi-
Alba mam multiplicem. 7. Mediam multiplicem. 8. Ma-
Alba jorem Prænestinam. 9. Albam vulgarem majorem,
Alba Campanam Plinij. 10. Albam minorem. 11. Mo-
Alba schatam simplici flore. 12. Moschatam flore pleno,
Alba Coroneolam Plinij. 13. Moschatam semper viren-
Alba tem. 14. Spinis carentem flore majore. 15. Spinis
Alba carentem flore minore. 16. Subviridem. 17. Ro-
Alba sam folio subrotundo & crispo. Sylvestrem, & 1.
Alba Vulgarem flore odorato incarnato. 2. Sylv. flore
Alba majore & rubente. 3. Sylv. flore pleno. 4. Sylv.
Alba foliis odoratis. 5. Sylv. odoratissimo rubro flore.
Alba 6. Sylv. odoratam albo flore. 7. Rosam odore Cin-
Alba namomi simplicem. 8. Rosam odore Cinnamomi
Alba flore pleno. 9. Rubram præcocem simplicem. 10.
Alba Minorem rubellam, vulgo Majalem. 11. Luteam
Alba simplicem. 12. Luteam multiplicem. 13. Campe-
Alba streim spinosissimam, albam odoratam. 14. Sylv.
Alba pumilam rubentem. 15. Sylv. pomiferam majorem.
Alba 16. Sylv. pomiferam minorem. 17. Arvensem can-
Alba didam. 18. Campestreim repetem albam. 19. Cam-
Alba pestrem spinis carentem, bifloram.

Alba Et hæc ferè sunt Rosarum propriè dictarum diffe-
Alba rentiæ, quas ordine paulò post recensentes de-
Alba scribemus: hic vero breviter annotabimus alias
Alba plantarum species, quæ Rose nomen obtinuerunt.
Alba Non igitur est institutum nostrum agere hoc in
Alba loco de Rosa illa, quam apud Io. Agricola Io. Pöl-
Alba lio Oenipontanus quidam Medicus sibi in Suevo-
Alba tum Brigioia monstratam prædicat quam incolæ
Alba Rosam & Libum inter spinas appellant. Ea enim
Alba nostro iudicio Periclymenum fuerit, de quo lib. 19.
Alba Nec agimus de Rosa menapia, Sambuci aquatici
Alba specie Dodon. quæ Sambucus rosea est, de qua lib. 5.
Alba Nil dicimus de Rosa canina, ex qua Luminare

maius hypocistidem fieri scribit. Ea enim Cistus est:
de hac lege lib. 11.

Nec hic nobis sermo est de Rosa marina & Ro-
sæ in Lanza, quæ dicitur Cistus mas major lib. 13.

Tacentur Rosam Persicam Avicennæ in Ieneli-
bi, quæ Anatadstipulante, non est genus aliquod
Rosarum, sed flores Persæ. Hæc tamen opinio re-
felliatur à Matthiolo. Separamus à Rosis propriè
dictis Rosam motacæ sive alpina n., Berg Rosen
Aretij, quam quidam Nerium alpinum vocant lib. 13.

Silenus Rose Alpina speciem alteram foliolis
n. quæ Gesneri, quæ forte Anonymos 2. Clusij
fuerit, de qua lib. 1. sub Erica baccifera assipi.

Præterimus Rosam Hiericentem de qua lib. 14.
Missa facimus Rosam Hiericentis Fragosi, quæ
nobis Herba maxima lib. 25.

O nirtus Rosam transmarinam vulgi Ruellio.
Hæc enim Malva rosea est, lib. 21.

Non tradimus Rosam Zaveni, quæ Althea est,
tradenda lib. 23.

Non statim dicere de Rosa Græca, quam qui-
dam Baptifeculam volunt, malè. Cyanus est, lib. 26.

De Rosa Indica Gesneri hort. hic non loquimur,
sed lib. 25. sub Tageti Indico.

Sic & de Rosa mariana sexta Tragi, sub Pseudo-
melanthio.

Et de Rosa mariana quinta, sub Been albo.

De Rosa mariana sylv. flore rubro, sub Ocymoi-
de rubro.

De Rosa mariana sylv. flore albo, sub Ocymoi-
de albo.

De Rosa Iunonis vel Iunonia, quod Lilium est,
scribimus lib. 19.

Rosam Solis, vide Rosem solis lib. 37.

Rose nomen attribuitur Rhodæ radici, quam
tradimus lib. 15.

Rosa arbor est Nerium de quo lib. 15.

Rosa marina Cæsalpini describitur lib. 39. cap. de
Eschara.

Rosa de qua hic agimus, Græcis ῥόδον dicitur qua-
si ῥοδὸν pro ῥοῖ, Ety mologico: At ex mente Plutarchi
3. symp. ῥοδὸν πρὸς τὴν ῥοῖν ἔστιν ὁ ῥοδὸν, quod largum
odoris effluviū emittat. Ab Arab. vocatur Ward,
Narūn seu Ward. It. s. Germ. Rosen: & Arg. Belg.
Roos. Hisp. Rosa: Gall. Rose: Boh. Ru se. Stirps ipsa,
quæ græcè ῥοδὸν dicitur, apud Latinos cum flore
Rhodonia nomen idem retinet: Germ. Rosenstauden: Gall.
R. sive: Virgas stirpis Rosarum, Strabus poëta Gallus
Viburnum nominat.

D. b. ram V. b. Rosa præensa met albo.

Notandum apud Galenum per ῥοδὸν, Rosam, in-
telligi totum florem; per ῥοῖν, vero solum, floris
partem, & non ipsius stirpis. Eadem enim est phra-
sis Germanica cum Græcis, quando dicunt Rosen-
blätter de flore. Sed & hic observandum, an quod
Gal. dicit in Philoxeni remedio ad fluxum & dolo-
rem; Item in Diarhodo, ῥοδὸν ἀντὶ τῆς ῥοῖς, quod
verè Cornarius recentium, sit legendum mollium
aut tenerorum, ut intelligat, quod idem dicit in Di-
arhodo ῥοδὸν ἀντὶ τῆς ῥοῖς. Ipsemet præterea Cornarius
apud Diosc. ῥοδὸν ἀντὶ τῆς ῥοῖς: ita ut ex sint te-
neræ partes, quæ separantur ab unguibus, qui du-
riores sunt. Manardus ait, Partes eas candidas, quæ
capiti de proximo hærent, præcidi à Sepalsariis,
Rhodomeli vel Rhodosaccharum reliquo paratu-
ris. Et hinc Rosas tales exungulatas appellat: un-
guem verò, qui calycibus insentur & græcè ῥοῖν δι-
citur, à Galeno tum alibi, tum lib. 4. ῥοῖν ῥοδὸν
vocari, id est, extremitatem. Ar. ῥοδὸν ῥοῖν
quod (ut Diosc. dicit) in medio Rosarum reperitur,
hos Plinio dicitur, id luteum scil. quod foliis circum-
quaque ambitur, separatim in capillum, id est, in
tenua quædam fila, & in sergen quod sub his filis

lanugine quadam opertum cortice continetur: in Officinis tamen, ut dicit Dodonæus, & ab Arabibus Medicis, Anthera nominatur. Manardus contra flores, Anthera nomine recentiores significasse continet. Quod & nomen ipsum manifestat, cum ab eo, quod est ἀνθή, id est, flos. Rosa deductum videatur, voce tamen (ut fieri vulgo solet) paulisper decurrat. Est & Anthera compositionum nomen, quarum Plinius 24. Cell. 6. Diosc. 1. Gal. 5. de compos. med. secundum genera, Paulus & plerique in suis libris meminere. Ceterum, Dodonæus & Manardus non distinguunt ἀνθή a capillamentis, id quod facit Tragus: qui Anthos vocat puncta lutea in Rosis. Capillamenta autem vocat fila illa quibus insident puncta. Nunc Κίθαρις ἢ, καπάλια ἢ ῥόσιν, Diosc. dicta, id est, Capita Rosarum Plinio, in quibus semen gignitur, dicit Manardus esse solidum illud, quod foliis & floribus, seu basis subternitur: cuius superior pars, ex qua flos & folia prodeunt proprie caput, reliquum calyx nominetur. Tragus calicem ait esse superiorem partem Rosæ nondum expansæ. Dodonæo Calix vocatur, qui stamina & floris foliola complectitur & continet. Alabastrici etiam sunt calycis partes lacinosæ, conum floris priusquam panditur, complectentes: quæ quinque sunt, duæ barbutæ, duæ imberbes, & quinta partim barbata, partim munime, quæ cortices Rosarum à plerisque appellantur. Per nodum Rosarum non intelligit author apud Monachos (scilicet Mesues) pomellum, siue pyrum in quo semina Rosarum conerescent & servantur ad maturitatem, quodque de fluxis foliis restat in planta & tempore maturationis fit rubrum: sed Calycem, folia florum Rosarum continentem, qui vulganter Bolto dicitur. Fructum autem, ut inquit Tragus, Rosæ maturum & rubrum, Germani Büttel, Büttel, Arstbigein nominant. Semina denique sunt lapilli illi duri, qui in capite Rosæ includuntur, ex quo novæ plantulæ proveniunt, sed tardè. Qui itaque Rosarum semen Antheram vocant, decipiuntur. Lanx tandem sunt capilli, in quibus lapidea semina continentur.

Nascitur, autore Theophr. Rosa etiam ex semine, quod sub flore in malo inclusum habet, lanugine Cnici modo, aut Echini Carduorum obductum, omnia semina proximè ambiente: καὶ οὕτως ἡ ἀναστροφὴ ἔχει πρὸς τὸν χρόνον, ὡς ἔργον τῆς φύσεως. Sic enim emendari debet falsa hæc Gaza lectiq, ἡ γὰρ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τοῦ καπάλια ῥόσιν, ἢ ἀπὸ τοῦ καπάλια ῥόσιν, ἢ ἀπὸ τοῦ καπάλια ῥόσιν: quod flori subditum suo in malo contentum cneceum, vel acanaceum, lanugine quadam obductum gent, ut primis seminibus proximum sit. Ceterum, quoniam tardè perficitur semine sata, caule conciso vel toto purgato sentitur: ulla recisave florem melius profert: relicta namque exerescit, silvescitque: sæpius transferre eam sanus est: sic enim pulchriorem effludi Rosam affirmant. Tempus hoc generationis notatur. Rosa senior hinc [Hyacintho, Gladiolo, Viola nigra, &c.] est, & novissima quidem erumpit: prima autem inter vernos desinit flores, parum enim temporis durat ejus proventus. Vita Rosæ quinquennii ad vigorem scilicet, non adustæ, nec recisæ. Sed ejus quoque flores senescentis deteriores redduntur. Ad jucundam autem olentiam, Solium, exlimumque accommodatum plurimum confert: montibus autem Rosæ longè deteriores emergunt.

Nascitur, inquit Plinius, Rosa spina verius, quam frutice. Germinat omnis primò inclusa granoso cortice. Quosdam intumescere, & in virides alabastricos [pap. dard. cornub. Hier.] fastigiato, paulatim rubescens delibescit, ac sese pandit, in calicis medio sitis stans complexa luteos apices. Et alias verò quoque plurimum solo prævalet. Cyrenis odoratissima

est, idèoque ibi unguentum pulcherrimum. Carthagine Hispaniæ hyeme tota præcox. Refert & celi temperies. Quibuldam enim annis minus odorata provenit. Præterea locis omnis siccis, quàm humidis odorator. Sed nec pinguibus vult, nec argillosis locis, nec rigus, contenta raris: proprièque ruderatum agrum amat. Præcox Campaniæ, sera Miliæ. Novissimè tamen desinit Prænestina. Fodiuntur altius, quàm fruges, levius, quàm Vites. Tardissimè proveniunt semine, quod in ipso cortice est sub ipso flore opertum lanugine, ob id potius caule conciso inferuntur. Et ocellis radicis, ut Harundo, unum genus inseritur pallide spinosæ, longissimis virgis quinquefoliæ, quæ è Græcis altera est. Omnis autem recisione atque ustione proficit: translatione quoque ut Vitis optimè oxyllimèque provenit, surculis quaternum digitorum longitudine, aut ampliore, post Vergiliarum occasum sata: dein per Favonium translata pedibus intervallis, crebroque circumfossa. Qui præcocem faciunt pedali circa radicem scrobe aquam calidam infundunt, germinare incipiente calyce. Rosa & quinquennium profert, nec recisa, nec adusta. Illo enim modo juvenescit. Diximus & terram referre plurimum. Nam & in Egypto sine odore hæc omnia: tantumque Myrtis odor præcipuus. Alicubi etiam bigis mensibus antecedit germinatio omnium. Rosaria à Favonio fossa oportet esse, iterumque solstitio. Et id agendum, ut intra id tempus purgata ac pura sint. Rosa recens longinquo olet, sicca propius. Omnis autem verno tempore acrior, & matutinis: quicquid ad meridiana hora diei vergit, hebetatur. Novella quoque vetustis minus odorata. Acerrimus tamen odor omnium æstate media. Rosa & Crocum odoratiora, cum serenis diebus leguntur: & omnia in calidis, quàm in frigidis.

Februario mense Rosaria conferenda, inquit Paladius, sulco brevissimo, aut scrobibus ponenda sunt vel virgultis, vel etiam semine. Si qua etiam sunt antiqua rosaria, hoc tempore circumfodiuntur sarculis, vel dolabris, & ariditas universa reciditur. Nunc & quæ rara sunt, possunt ducta virgarum propagine reparari. Si Rosam temperius habere volueris, duobus palmis ab ea in gyrum fodies, & aqua calidâ bis rigabis in die. Rosas nondum patet factas Maio mense servabis, si incanna viridi stante illa, recludas ita, ut fissuram coire patiaris, & eo tempore cannam recidas, quo Rosas virides habere volueris. Aliqui olla rudi conditas, ac benè munitas sub dio obruunt, ac reservant. Odoratiores fieri Rosas Didymus affirmat, quibus Allia propè fuerint confita. Si velis sine temporis intercapedine tolli frui, singulis mensibus loco stercoreato pangis, semper Rosas habiturus. Serendi ratio variat. Aliqui integras plantas cum suis radicibus transferunt: alij in palmares taleolas, cum suis radicibus in sôbolis modum cubitali intervallo deponunt, & crebris irrigationibus & stercore juvant. Nonnulli majorem odoris fragrantiam adfiscant, intertextas iis coronas simul adobruunt. Majorem odoris gratiam habent quæ siccanis enascuntur. Vita, vigorque manet Rosis, quæ in amurca, si mergantur ut humor extet. Alij ut diu servantur, hordeum cum in herba est, cum radicibus evulsam, in ficule non picatum demitti, Rosamque prius quàm dehiscens se pandat, openti præcipiunt. Alij virentem hordei legem pavito loco sterrunt, & rosas ipsas recondunt. Democritus fruticem bis die rigatum. Januariò mense Rosas ædere promittit. Florentinus est author, florem Rosæ in oculationis modo cortici mali insitam, eodem quo malum tempore parcas suos excludere. Sunt qui recentes hac ratione custodiant: Alabastris turgentibusque calyces in ventre adolescentis

Locum
sano.Temperies
Culm.

Inferio.

Præcox ut
sarcinula.Duratio.
In Aegypto
modera.Rosaria
quo tempo-
re colenda.
Rosa ubi
quædam o-
doratur.Rosaria
tam culta
tuta.V. præcox
fiat.
V. in can-
na inferen-
da.V. odorat-
ior fiat.Serendi
ratio.Rosæ
murca.Recentium
asservatio.

HISTORIAE PLANTARVM

Aquilegia. Nunc verò, Cynosbati, sive Rubicanini æquivo-
cationem pæcis prosequemur. Ac primum quidem
Rosa foliis Cynosbati sive Cynospastos, pro Rosa foliis o-
odoratis. doratis Eglentina dicta, à quibuldam accipitur.

Capparis. A Medicis quoque Cynosbatos, ut vel ipsi novi-
raus, Capparis non raro dicitur.

Smilax a- Smilacem etiam asperam nonnulli vocant Cy-
pera. nosbati.

Chama- Plinius verò, autore Dalechampio, confundit
ris. Cynosbati historiam, cum Chamæbato. Cynosba-
Veternum tus adhuc, vel ut alij Cynospastos, quem Plinius
Cynosbatum describit, alius est à Theophrasti, & à Diosc. Cynos-
garum. bato differt.

Spinæ alba. Vltimò spinam albam voluerunt aliqui esse Dio-
scoridis Cynosbati, ut facit Cornarius.


ROSA RUBRA, FLORE VALDE pleno, & semi-pleno, & simplici ferè.

Descri.

Virga.
Spina.

Folia.

Stem.



Rose rubre frutex minor est quam alba aut rubella: virgæ non ita crassæ: spinæ inultè rariore, nec ita mordaces, aliqui ramum etiam sine spinis: folia ex longiusculo pediculo, cui in principio veluti auriculæ foliola sūt terna, vel quina, utrinque glabra, superne magis virentia, subrotunda: flores sive Rose, rubra, magnæ, quædam plene admodum, coloris intensè rubri, sive purpurei: quædã pau-

tifolia: odoratæ omnes, & potissimum sic: flores sequuntur fructus sive capita sublonga, rubra ubi matura.

Fructus.

Dod. descri.

Dod. sic describit: Tertia, similis incarnatis ramis & foliis est, sed subinde brevior, flore verò odoratissimo, pulcherrimoque, saturato, & quodammodo puniceo rubore nitente. Rosarum omnium præstantissima, & ad medicamenta omnis ferè generis utilissima. Quarta, modò dicta brevior est, virgis cubitalibus, aut altioribus, flore eleganter rubente, sed minùs, quàm jam dicta, & quandoque simplici, quinque tantummodo foliorum, aliàs plurium: aliquando etiam multiplici, odore grato & perquam jucundo.

Sym.

De Rosis rubris scripsisse Dioscoridem, inde colligere licet, quia meminit unguis, quod est in folio album. Sed & Cord. in Diosc. hunc de Rosis rubentibus, quæ à Medicis receptæ sint, agere scribit.

Rosa fina
lana.

Milefia

Trachinia

Rosa Ro-
chama-

Sym.

Cam. h. Rosa intensè rubens, simplex, vel plena, vulgè Pharmacopæis Fina vocata, cujus foliis exsiccatis, quondam colorem & odorem diutius servant, utuntur: Hanc Milefiam fuisse olim dictam, ex Plinio conijcitur. Rosa purpurea sive in rubro nigricans, & ceu violacei aliquid diluti admixtum habens, priore major, ab aliquibus Bolrosen appellata, videtur Trachinia Plinij. Rosa rubicunda, non omnino dehiscens, ut Plinij Græcula, folio quoque, quàm in cæteris latiore, odorata tamen. Ex quibus Saccharum Rosaceum conficitur, unde apud nos Zuckerrosen dicitur.

Dod. gall. Rosa altera culta, Rosa purpurea, &

Rosa rubra. Sub hoc genere continentur Rose Trachinia Plinio, cui in rubro magis nigricantes, sunt Rose Milefia: Rosa sativa quartum genus, Rosa Milefia Plinij. Eidem de flor. & hist. Rosa sativa tertia, Provincialis Gallis dicta: hanc Milefiam esse non temerè suspicari licet. Rosa sativa quarta, Rosa Francha Gallis: Plinio Trachinia fortè aut Prænestina dicta.

Lob. Adv. Rosa purpurea sanguinea: Ic. Rosa holoserica. Tab. Rosa rubra: item simplices & flore pleno, Rosa Milefia, Rosa purpurea & Punicea. Cur hanc ita spinosam pinxit, an figura transposita per Compilatores aut Typographum? Lugd. Ro- las Prænestinas existimat rubras & in iis Milefias, quas Galli *Roses de provins* appellant: item, Græca Plinij [à Græcis *Lychnis*] rubra etiam est, ut Lugd. e- quidem sentit, quamvis Plinius colorem non expresserit, eaque, multorum sententia, quæ Damascena rubra nominatur, *Rose de Damas rouge*. Figura fortè Rose rubra convenit, cui in Hist. Lugd. titulus simpliciter Rosa. Considerandum an Græca Plinij, sive Lychnis, non sit potius herba? An porro benè ad rubras Rosas referat Lugdun. Damascenam rubram, dubitamus.

Germ. Rosa rubra urbanæ simplices vulgares, quarum præstantissime, quæ puniceo colore rubent. Eid. coll. & Cardano de rer. var. Rosa rubra. Cæf. Rosa rubens multifolia in brevi frutice, vix cubitum excedente, aculeis firmioribus, calyce scabro, odore jucundo, sed exili: Milefia Plinij. Ger. Rosa 2. rubra, *The red Rosen*. Figuram Tabern. habet spinosis virgultis, cur non mutavit, e jusque loco eam ponit, quæ est nomine Provincialis. Eid. Rosa 3. sive Holoserica, *The velvet Rose*. Germ. Rot Rosen/Blätrot Rosen: Gall. *Rose rouge, Rose de Damas rouge*. Belg. *Prouinsch Rosen*.

C. B. pin. Rosa sativa 1. sive rubra, Milefia Plinij: Rosa sativa multiplex, Brunf. Domestica punicea, Matth. Hortensis rubra multiplex, Tragi. Rosa hortensis, Fuchf. Rosa, Tur. Lac. Lon. rubra, Cord. in Diosc. Lugd. Adv. Tab. Ger. Rosa rubra urbana, Gesh. h. Sativa rubra, Ang. Cast. Sativa 3. quæ Provincialis, Dod. Rosa Damascena, Lob. Rosa rubens multifolia, Cæf. Rosa intensè rubens, Cam. Est simplex & multiplex, colore magis minùsq; rubro: huc refertur, 1. Rosa Milefia fl. rubro pleno, vulgo Rosa fina. 2. Milefia fl. simplici rubro. 3. Rosa ex rubro nigricante fl. pleno. 4. Rosa rubicunda Saccharina dicta, Græcula Plinij, Camef. Eid. Bau. Rosa sativa 2. sive rubra pallidior: Sativa 4. sive Francha Gallorum, Dod. Rosa holoserica, Lob. ic. Rosa rubicunda, Cam. Rosa 3. Cæf. Rosa Damascena rubra, Lug. Aliis Trachinia, Prænestina aliis, aliis Græcula Plinij: hæc priore minùs rubet, & flore simplici plerumque est, & foliis latissimis, cujus frutex spinis communiter caret. Eid. B. Rosa sativa 2. sive saturatius rubens: Rosa 1. Prænestina similis, Clusf. hist. Rosa purpurea, sive in rubro nigricans, Cam. Foliis est quadragenis amplioribus, saturatius rubentibus, ad nigredinem vergentibus, & alabastro crassiore.

Genevæ, Lugduni, Montbelgardi, & Basileæ flo- re observavi intensè rubente: in urbe liæ vidi Rosam valde plenam & rubram, quæ in va- rias Galliarum partes exsiccata distribuitur, quia valde odorata. Ex hac Conserva sicca ubique paratur. Et hæc est, ni fallor, quam observavi ar. 1609. medio Maij mensis, in horto D. Joh. Heitzmænni, cui flos densissimis factus foliis, multò minoribus, quàm in vulgari rubra, odoratiores etiam, quàm illi: calyx spinulis horret: folia duum ordinum, duo semper sibi ex adverso opposita sunt, quintum in summitate, medium inter ordines locum occupat: omnia in cir-

in cunctis floribus, glabris, & in omnia, inferne
caneſcentia.

ROSA ACANTHOS, FLORE pleno, coloris rubelli.



IN plurimis hac
variat à reliquis
Rosaſum ſpecie-
bus. Eſt quidem
ea ramis & frondi-
bus Roſæ intenſe
rubelſcentis, vulga-
ris altitudine, figu-
ra & effigie, laxi-
bus & ſine ſpinis,
viridantibus magis
atq; flexuofis: qua-
rum tamen ſummi
propter floriscaly-
cem & folia ſurculi
horridiufculi ſunt,
ex denſiſſima api-
cularum nigrarum
& aſperiuſcularum
congerie: foliola,
quæ ſumma occu-
pant ramorum, com-

muniter quina ſunt, rariùs terna, interdum ſena, la-
ta, oppoſita, impari ſeriem claudente: ſupernè qui-
dem atro-virentia, infernè ſubcinerea, tria nonnun-
quam unciarum longa: roſa ſpecioſa, nec minore ſo-
liorum ſtipatu, quàm pallidæ ſive incarnatæ, ſuavis
odoris, coloris rubelli ſaturatione tinctura, quàm or-
nat varia vagaque venularum purpuraſcentium de-
lineatio: ſtrobilus verdè folia ex incarnato candicant
omnia. Huius ſuccedit fructus orbicularis, maioris
Avellanæ, colore obſcurè rubente, denſiſſimo la-
pillorum villorum agmine ſarcto. Radix repens,
lignosa, durique.

Cluſ. ſic deſcribit: Multis ſtatim à radice aſurgit
virgis, humanam altitudinem interdum æquantibus,
ſi fertili ſolo & umbroſo loco pangatur, ut plu-
rimùm verdè longè infra eam magnitudinem, & cu-
bitalibus quantitat, vel ſeſquicubitalibus, laxibus
& ſine ſpinis, viridibus, in varios ramos deductis: fo-
lia habet alata, hoc eſt ternis aut quinis uni coſtæ
(quæ ſubſpera eſt) inhzrentibus, binis ſemper in-
ter ſe oppoſitis, extremo impari ſatis amplo, con-
ſtantia, ſuſcâ viriditate ſupernè nitentia, infernè ca-
neſcentia: extremis ramis inſident flores, oblongis
hiſcutiſque pediculis inhzrentes, multiplices ſunt
rum numero conſtantes, Præneſtiniſ maiores, me-
dique inter illas & rubras coloris, jucundi odoris:
fructus brevis, craſſus, penè orbicularis, maturitate
rubens, inxquale ſemen, & ut rectè Theophrastus
notat, ut omnia Roſarum genera, lanugine
involutum continet: radix dura, lignosa plerumque,
ſub terra propagines in lateribus
argit.

Cluſ. pann. Roſa Austriacæ, ſive ſine ſpinis. Eid.
hiſt. Roſa non vulgaris ſive ſine ſpinis. Cam. h. Ro-
ſa abſque ſpinis purpuraſcentis, ſolis maioribus flo-
ribus. Cz. Roſa rubens multifolia colore magis di-
luto, Græcula Phleg. Tab. Roſa ſine ſpinis. Ger. Ro-
ſa ſive ſine ſpinis. Ang. The Roſe without Prick-
les. C.B. pin. Roſa ſativa 14. ſive ſpinis carnis, flo-
re majore.

Friderici Meſſ. Roſa ſativa provenit mihi in horto
M.E.C. Montbelgardi florens Junio: Octobri cum
fructu in prædicti horti Argentina obſervata, cui
ex Cluſij horto Vienna primò delata. Cluſius ap-

ud huius cognitionem acceptam fert C.V.D. Ioan-
niſ Cordus ſenior, leneſis Academiæ in Thuringia
Monacho. Non deſiunt qui flores alboſos conſpe-
xiſſe aſſerunt.

ROSA SINE SPINIS, COLORE penè ſecundum vini rubri.

Aliud genus Roſæ ſine ſpinis invenitur, non
valde diſtans à virgibus. Viennæ Austriæ
Cluſij in eam urbem adventum, in qui-
busdam hortis cultum, quod maiores & rariore ſo-
liorum textura conſtantes flores proferat, colore pen-
nè ſecundum vini rubri.

Cluſ. pann. & hiſt. Roſa ſine ſpinis altera. C.B. pin.
Roſa ſativa ſive ſine ſpinis flore minore.

ROSA PUMILA PANNONICA, flore rubello.

Pedales, inquit Cluſius, atque aliquando cubi-
tales etiam ex eadem radice proferunt virgas, viri-
des, lentas, infernè paucis, ſupernè multis ſpinis ri-
gentes: foliorum alas rubræ ſimillimas, quinque
aut ſeptem foliis ſupernè viridibus, infernè candi-
cantibus conſtantes. ſummiſ virgis & ramulis in-
naſcuntur ſatis magni calyces ſive alabaſtri, hirti,
barbanici, quales in Roſis rubris ſimplici foliorum
ordine conſtantibus, ex quibus deinde ſeſe expli-
cant magnæ, non omnino odoris expertes Roſæ,
quinque foliis præditæ, iniſio rubræ, deinde paula-
tim remittente & quaſi evaneſcente rubedine, car-
nei ſerè coloris, multis luteis ſtamimbus, ſtrobili-
bilibus, quemadmodum in aliis Roſis, occupanti-
bus: fructus ruber, rotundus, omnium maximus &
Pyrii in modum turbinatus, fulveſcente pulpa, in-
qualia alba ſemina continet.

Non ineptè meo quidem iudicio, quoniam græ-
cè dicitur hoc 4. Roſæ genus, Latinis Roſa pumila:
Austriaci & Erdroſen vno Heydroſen / Vngari verdè
PARRAGI Roſa appellant. C.B. pin. Roſa ſylv. 14. ſive
pumila rubens: Roſa 4. Cluſ. pann. ac in hiſt. 6. &
pumila.

Naſcitur paſſim in cædis ſylvis, aliarum ſylvarum
marginibus, ſublimioribus & deſertis agris per Au-
ſtriam inferiorem & univerſam Pannoniam. Floret
Junio: fructus matureſcit Auguſto, & plerumque
tota Hieme ipſi ſturpi inhzret.

ROSA SYLVESTRIS RUBELLA, parvo, frutice.

Roſæ rubellæ ſylveſtris frutex parvus eſt, cultus
talis ut plurimum, formâ ſimilis Roſæ intenſe
rubræ, curvis nonnunquam ſpinis, ſed raris: foliis
ut in illa quinque parvis, rariùs in ſeptem foliola
diſtributis, ſerratis, glabris, ſupernâ parte obſcurius
virentibus; denique ejuſdem ſerè & coloris & for-
mæ, ſed rotundioribus & minoribus: flore non par-
vo, coloris rubelli, ſive incarnati, ut vocant, quin-
que folio, jucundiſſimi odoris, cui ſuccedit capitulum
cum pediculo hiſpido.

An Trago tertium ſylveſtris Roſæ genus, magni-
tudine foliorum, eam, quæ odorato ſolo antecede-
dens, tamen ſpinas gerens, non perinde minaces,
& frondem priuſ inodoram: Roſa quoque ali-
quanto majore, colore magis rubro, & elegantiore
tinctâ, odoris, ejus quidem iudicio, ante omnia
ſuaviſſimi, tactu pinguiore & magis leni, ſu-
rans plerumque in humectis, ac minime ſerribus
avenacis agris, aliſque nonnullis dumetis, præ
ſuprà altitudinem trium cubitorum, ſeſe attolens,
& intra humum hinc inde ſerpentibus, ediculis
ſubinde juveneſcens. Hæc Roſa campeſtris ſa-
cile & nullo negotio plantari poteſt.

An Tra-

HISTORIAE PLANTARVM



Rosa pumila
la Pann.

Rosa
Tempus.

An Tragus hanc suam Rosam no- verit nondum no- bis certo constat. Multa communia habere videtur. Rosa pumila Pan- nonica Clusij, ean- dem tamen asse- re non audent, de qua ante.

Ad Rosa sylv. 3. genus Tragi refert C.B. in pin. Rosam sylv. Gess. h. dubi- tatur an sit Cy- nosbatus 4. Cordi in Diosc. Vocat au- tem Rosam sylv. 3. five odoratissimo rubro flore.

Primum observavi Genevæ circa Castellum Ab- batie florentem Junio, postea inter Genevam & Trenci: deinde in Ducatu VVirttembergico non longe à Stutgardia secus viam cum contenderem Pfäingen, florentem Junio, & in sylva non longe ab urbe Marbach.

ROSA RVBELLO FLORE MAIORE multiplicato five pleno, incar- nata vulgo.



Rosa

Rosa
Spina.

Rosa

Rosa

Rosa hæc fruti- cis sunt præal- ti, ut alba, spinosioris tamen us multo. Ejus rami abund- ant spinis adun- cis, & mordacibus: folia non virent, ut in rubra, nec polita sunt, ut in alba, ter- na, quina ac etiam septena, penè ro- tunda: flores multi simul ex longis pe- diculis hispidis, ca- lices etiam hispidi, magni, pleni, ru- belli, five incarnati, odoratiores, dum virent, rubris & al- bis.

Dod. gall. Rosa sativa 3. genus in Belgio Provincie Rosen: Germ. Leibfarb Rosen/ quæ fortè Plinio Alabandica. Eidem de flor. & hist. Rosa altera sativa dilute & pallide rubens, Incarnata ab Italis vocata, Alaban- dica similis. Videtur Dod. hujus figuram in hist. ex- hibere sub titulo Rosa sativa.

Alabandi-
ca Plinio.

Alexandri-
na.

Perfice.

Damascena.

Gess. h. Rosa ex purpureo albicantes, folio mul- tiplici. Rosa Alexandrina, vel Perfice, vel Dama- scenæ, vulgò Incarnata dicta. Harum Rosa- na (inquit Monard.) nostris majora & viridio- ra sunt, foliis amplioribus: aculeis plurimis & acu- tioribus: florum numerosam copiam fundunt, quæ foliis quibus aut senis constant, medio inter alium & rubrum colore. Rudera tum amant locum. Serun- tur in ædificiis, cremantur, transferuntur, sicuti no- Ara. Harum Rosarum apud Italos, Gallos, Germa- nos, diversasque gentes nunc frequens est usus, quas Damascenas vocant, quoniam ex Damasco Sy-

ria Urbe creduntur advecta. Apud nos verò triginta sunt anni, ex quo earum notitiam attigimus; ex his Rosis medicamentum (sympum ex multiplici Sympum: catum infusione) vel mel Rosaceum foliatum para- re solent: hæc ille. Sed videt Gesnerus. Damascenas, vel Alexandrias Rosas diversas esse, ut differentie causa has Perficas tantum nominare censuerit. Pro- xima laus à Punicis, his quæ in rubrum candicant, Incarnata vulgò dicta. Monachus in Mesuem incar- nata vel trentaphilla. Item de coll. Rosa purpurea vel incarnata. Ego Rosas has nunquam vidi solum cum quinis aut senis foliis, ut apud Gess. hoc loco Monardo placet sed semper multo pluribus.

Ryff. Rosa flore incarnato Gallorum; Et, Roseo colore insignes Incarnata dicta. Math. Rosa ex albo rufescentes, vulgò incarnata vocata. Lob. Adv. Rosa pallida plebecula. Obl. & Ic. Rosa Da- scenæ. Et Rosam Damascenam five Provinciale vulgi odoratissimo omni floribus, vel tantillo candore & rubore confusis, maximo proventu ale- bat Gandani D. Adrianus van der Gracht. Quan- tum judicare possum ex figura Lobelij, cui stolonæ sunt spinosæ, Rosam rubello flore intelligit: Rosas alioqui minus diligenter tradidisse videtur.

H. Lugd. Rosa Plinio Trachinæ minus ruben- tes, Rosas incarnates vocata. Tab. gross. Provincie Rosen/ Rosa Provincialis major: Item, Rosarum 3. genus, Rosa majores, & 4. genus minorum dicta. Rosa provinciales, Rosa Perfice, incarnata, pur- purea. Pingit Tab. fruticem sine spinis, cum lo- leat esse valde spinosus: errat fortè Compiler, vel Typographus, qui transposuit. Gerard. Rosa 3. Provincialis five Damascena, Angl. The Prouins- sche & Damasc Rose. Miror sequutum Tabern. posuisse fig. fruticis rosei, non spinosi, cum maxime sit spinosus.

Cam. h. Rosam incarnatam, vel leviter purpura- scentem Norimbergæ Vlmensem nominatam, ve- terum esse prænestinam existimat: Incarnatam ta- men Lugd. Trachiniam esse putat. Nos suspicamur Theophrasto esse Rosas, quas recenset inter am- plas, quibus pars inferior scabra. Cæf. Rosa roseo colore, nascens in frutice valde hispido, quaterna cubita excedente, primo florens inter ceteras: Cam- pana fortè Plinij, & Trachinia minus rubens.

C.B. pin. Rosa sativa 4. five purpurea, Trachynia Plinij: Rosa hortensis ex purpura albicans, Tragi, Gess. h. Rosa domestica carnis colorem referens, Math. Rosa incarnata, Ang. Cam. Rosa rubra, five carnei coloris, Bellon. Rosa pallida, Adv. Rosa sa- tiva purpurea, Cæf. Rosa mirus rubens, Lugd. Ro- sa provincialis fl. incarnato pleno, Eyst. Rosa Zebe- dena Pharmacopozorum, Ioannij in tract. de pilulis.

De Rosa hæc, Clusio Prænestina dicta, alias vul- gò Provincialis, puto loquutum Thomam Morum in Epigr. ubi, quomodo utraq; in una coaluerit, ostendit his verbis:

Purpurea vicina fuit Rosa candida, utramque
Vitræque di. m. certant sit prior utra, premir.
Veraque sed florem Rosa tam coaluit in unum,
Quoque potest uno lu cadit illa modo.
Nunc Rosa consurgit, nunc palluit una. Sed omne
Vna habet hæc doctes, quas habuere dua.
Scilicet hinc unispecies decor, atque venustas,
Et color & virtus est utriusque Rosa.
Alternam ergo Rosam vel (clam quisquis amaret.
Hæc in qua nunc est, quicquid amavit amet.
At qui tam serus est, ut non amet, ille timebit.
Nempe etiam spinas flos habet, ille suas.

Tenerior hæc ad frigus quam alba & rubra: Basi- leæ florentem vidi Maio & Junio; Monspelij Mar- tio, Aprili & Junio; Genevæ copiose Octobri & Novembri ac etiam Decembri: quæ tardè florent, juncu-

Perfice.

Incarnata.

Rosa alba.

Trachinia
Plinio.

Provincialis
la major.

Perfice.

Vlmensis
Prænestina.

Synon. B.
pin.

Zebedenæ.

Prænest.
Clus.

Locum
Tempus.

jucundissimi sunt odoris, nec ita citò flaccescunt. Et licet nimio frigore impatiens satis, nisi ab eo muniat, quandoque pereat, tamen altero anno à radice rurtum repullulat.

ROSA FOLIO CRISPO, FLORE rubello sive incarnato.

Locum cum describo.



Proveniens à anno 1593, idibus Julij observavi in horto D. Grienningeri Rose fruticem folio subrotundo & crispo, flore rubello sive incarnato, & precedenti in ceteris nō differentem. Plantata in horto Montbelg. feliciter provenit.

C.B. pin. Rosa sativa sive Rosa folio subrotundo & crispo.

Idem nostris appropinquat separatiōe Rosa domesticam, sed minori proportionē.

ROSÆ RVBELLÆ SIVE INCARNATÆ SIMILIS.

Descriptio.

Flos.

Cens. alba.

Locum.

Tempus.

Praenestina, quam vulgus Provinciale vocat, valde similis est [et sapienter vel prima Clusii praeferunt vulgares] nec illa minus al. e. allurgit in solo flore discrimen est, qui citius quadragenis aut pluribus foliis, paulò amplioribus, & saturatius nonnihil rubentibus contat, multis staminibus flavis umbilicū occupantibus, alabastroque multo crassiore & breviorē, quam ob eam Tuppel Rose vulgò appellatur: odor minùs suavis, & albæ ferè proximus. Hujus genus album florem ferens, apud Batavos invenitur, Centifoliaq; alba illis dicitur de qua mox.

C.B. pin. Rosa sativa sive Rosa major Praenestina Clusii. Rosa Praenestina variegata. Eyf.

Valde frequens Viennensibus est hortis, & tota Austria, nullius tamen apud illos usus, quam ad eliciendam stillaciam aquam. Francofurti ad Mœnum quadam ejus stirpes Praenestinis mixtae aluntur. Floret cum ceteris Junio, interdum etiam Maio.

ROSA PRÆNESTINA ALBA & varicolor.

Locum.

Varicolor.

Non desunt, inquit Clusius, qui Praenestinae albi coloris inveniri astant: mihi certè nondum videre contigit, nisi fortè ea sit quae honestus vir VVilhelmus Osterrat Francofurtensis civis unicam in cultu suo horto alit. Illius flos multò dilutior Praenestina, & ferè albicans, perinde tamen magnus & plenus, in quo nonnulla etiam folia observavi, media ex parte candicans, alterà purpurascens, vel similis coloris venis aspersa. Anno etiam 1593. florem mihi protulit ea, quam ad me Hoghelandus miserat planta.

Illi congener esse videtur elegans illa Rosa, de qua honestus vir Ioannes Resteau, civis Colonien-

Tom. II.

sis, superioribus Autumnalibus nundinis apud me verba fecit: se videlicet Coloniam in suo horto alere Rosam Praenestinae similem formā & magnitudine, quae ut plurimum media ex parte folia candida haberet, reliqua rubra, aut tertia duntaxat ex parte alba, vel nunc integra alba, modò integra rubra inter se comixta conspiciantur. Ejus prolem sequente Octobri ad me mittebat, quae praevaluit quidem, sed nondum florem ullum dederat, quum Francofurti excessi.

C.B. pin. Rosa sativa sive varicolor: Rosa praenestina varicolor, Clusii hist.

ROSA HOLLANDICA RVBELLA plena, quibusdam Centifolia spinosa frutice.



Centifolia est Rosa sive Hollandica, aut Batava, Angl. The great Holland Rose, vulgò The great Province Rose, dida, quae Francofurti anno 1595. Julij 5. mihi adhuc flores demonstrata est, in horto D. Grienningeri, quam D. Hochstetter de nomina vit Rosam Hollandicam, quamque de alba ex albe Delphis allatam de magno pretio unpta. Ceterum, folia ejus videntur majora quam in rubella si-

ve incarnata, cui similis frutex spinosus: Ros etiam similis, major, plenior, florum folia minora paulò.

De hac Clus. Rosa centifolia Batavica prima an ea sit, cuius Theophr. Plinius & Atheraus mentionem faciunt, hæreo. Nam illi Centifoliam, in odorem esse, & pusilla habere folia, scribunt. Quae autem apud Batavos alitur, non modò refertente N. V. Io. ab Hogheland de (qui binas ejus plantas sub anni 1598. initium mihi misit, quas quum praevaluisse putarem, corruptas esse deprehendi, praeter unius radiculæ fragmentum) praenestinis majorem, & perinde ferè odoratum intellexi: sed etiam Francofurti ad Mœnum apud Palthatarem & Carolum Hoycke Belgas fratresque germanos illo ipso anno conspexi: si quæ te verò, ex neglecto illo, & veluti abjecto fragmento nata est mihi stirps, quæ altero anno nempe 9. circiter quadragenos flores tulit, non omnes tamen ejusdem amplitudinis. Sed nonnullis nūcupavi centena vicena folia, extrinsecus majora, intrinsecus pusilla, staminum locum expleta, & in ipsum calycem reflexa, odorem autem deprehendi praenestinae, ad albam nonnihil accedentem, colorem Praenestinae non dissimilem.

Illius etiam stirpem unam quæ album florem ferat, habere se ait idem Hoghelandus, modò inter illam & proximè sequentem magnitudinis, quam albam majorem Provinciale appellari ait, & quædam majorem Praenestinam.

C.B. pin. Rosa sativa 6. sive maxima multiplex: Centifolia Batavica rubra, Clusii hist. Eyf. Habetur & alba, quæ, Rosa alba major provincialis, & Centifolia Batavica alba, Clusii hist. Rosa provincialis horti anno, Eyf.

D

ROSA CENTIFOLIA BATAVICA altera.

Centif. Bat.
Tabula 2.
Clus.

Sed & rarius Centifoliae genus apud Batavos inveniri ad Cladium scriptum ille ipse Hoghelandus, priore aliquanto minus, hoc est, media inter Centifoliam & Prænestinam vulgarem magnitudinis, alioqui colore, odore, & forma convenire: quod verum esse ex eius planta ab illo missa, sequenti annoprehendit Clusius.

C.B. pin. Rosa sativa 7. five multiplex media.


ROSA POMO SPINOSO, folio hirsuto.

Locum.
Defec.

Folium.

Spina.

Spina.



Clusius attulit Rose genus ex monte Calvari, & horti Dei declivibus, foliis palmatis, ferè longis, quinquepartitis, ad rubellam plenam penè accedentibus, minus rotundis, longioribus, serratis, hirsutis, quibusdam lenibus tactu, & penè cinereis: capitulis sive fructibus spinosis, magnitudine. Avellanae rotundæ, ex pediculis brevibus spinosis: per ramulos sunt spinæ rariore.

Hanc exilima-

Sym. C.B. mus esse Rosam sylvestrem 15. C. Bauh. in pin. five Rosam sylv. pomiferam majorem, Rosâ sylv. pomiferâ Lobelij altiore, ramosiore, paucissimis aculeis, foliis majoribus, pallidè virentibus, Batilæ locis humidis in Alnetis proventientem.

An Cynorhodol?
Spongiosa.

An Thal. Cynorhodol seu Rosa canina, virgis, fructu ac foliis auleatis, spongiolas præferens, weyß Dorn/vel Riechende Dorn.

ROSA POMIFERA VENETIIS Sprengeri folio hirsuto.

Locum.
Defec.

Folia.

Spina.

Collegi Heidelbergæ 1595. in horto Sprengeri Rose genus, alibi non observatum, foliis accedentibus Rose nostræ pomo spinoso, subtilis lenibus ad tactum, & albicantibus, hirsutisque: differt autem quod tres conjugationes foliorum minorum habet, & postremo unicum ut cetera Rose: in extremis ramis rari spinæ: florem non videtur amo sicco describo.

Anno 1609. Maio vidi, ni fallor, hocidem genus Rose, Basileæ in horto Heitzmanni, foliis similibus, trium conjugationum: spinis ramorum juxta folia adnatis, hirsutis: flore rubello simplici: capitulo spinoso ut præcedenti.

ROSA SPINOSISSIMA HIRSVTA.

Spina.
Folia.

Est & mihi Rose ramus, abundans spinis adunatis, folia sunt hirsuta, subtilis ad tactum lenia, conjugationum trium, postremo foliorum autem majora sunt ungue parvi digiti: quales ferat flores & ut ramus, ex quo describo, fuerit collectus, me latet.

ROSA MINOR RUBELLO MULTIPlicato flore, asperis spinis armata.



Frutex est asperis duris spinis armatus, in altitudinem satis magnam multis virgis rubentibus valde excrecens: Rose huic parva ex brevibus pediculis plerumque admodum odorata.

De hoc frutice Deser. Clus. Clusius: Rosâ nanioneam, pleno rarè duorum cubitorum altitudinem superantè Viennâ observavi, frequentibus & brevibus ramis donatam, purpureiscentibus, qui raris & brevibus spinis armati sunt: foliorum autem illis similes quæ in Rosa, vulgo Canelle nomen adeptæ, sunt, h. e. ex quibus aut septenis foliis æqualiter se spatio distantibus constant, uno hinc, alio inde, geniculatim conjunctimque semper adherente, unoquoque in cacumen excurrente, coloris supernâ parte viridis, infernâ candicantis: flores vulgari Cinnamomeæ similes, sed majores & multiplices pusillorum foliorum glomeratione constante, quemadmodum alba & prænestina: odor ferè qualis in alba vulgari plerumque fructum nondum videre licuit, ametti multis annis aluerim. ejus. Radix late admodum serpit, & vivax est, novæ virgæ subinde producens.

Camb. Rose Cinnamomeæ altera, vulgè Veneta, alibi Provincialis, Spemona Plinij, Barbari, & non Spinicola, aut Spinosa, Svecionia quorundam. Gest. Rose nobiles densi-folio flore, parvo, purpurei coloris diluti. An Lugd. Græcula, quæ multoties etiam judicio Rose Damascenæ genus est, flore ex albo ad purpureum nonnihil vergente, Rose de Damasco incarnate. An Eid. Græcula Rose flore suaviterolente, quem sub ætatis initium paulò ferius quàm Damascena candida promit & per ætatem ferè totam perseverat, foliis Damascenæ albæ latioribus sese non explicantibus, nisi quis manu deducat, sed veluti conglobatis & convolutis, ut Plin. scribit: Cinnamomum olere hanc vulgus ait. Intimius perquirendum, & ad trutinam veræ contemplationis revocandum, an Plin. scribens de Rose Græcula, non miscuerit herbas: præcedens enim, quæ Græcis Lychnis, herba videtur, uti & sequens, quæ Moscheuton & quamvis veræ Rose genus traheret, tamen non videtur competere nostræ minori rubellæ, quæ solus non est latissimis. Proponimus etiam examinandum an nostra non possit esse Theophrasti Rose ex Pangro, de qua etiam Plinius. Sed & hoc observandum quod scribitur à Lugd. suam videlicet Græculam sub ætatis initium florere, quandoquidem nostra Rosa, de qua hic agimus, primo Vere floret.

Tab. Rosa Provincialis minor: Item, Rosarum genus, Provinciales magnæ & parvæ, coloris auræ, jucundi odoris: Rose perficæ, incarnate, purpureæ. Figura Tabern. posita pro Rose provinciali minore, commodè satis exprimit Rosam, de qua hic agimus.

Ger.

Ger. Rosa 4. five Provincialis minor, Angl. The les-
ser Damask Rose: item, Rosa Cinnamomea ple-
no flore, The double Cinnamome Rose. Peccat in
excessu Ger. duas proponendo figuras, quæ viden-
tur eandem plantam denotare, prior est Tab. altera
verò Clusij in Pannon.

C.B.pin. Rosa silv. 8. five Rosa odore Cinamomi
flore pleno: Rosa cinnamomea pleno flore, Clus. pan.
& hist. Eystett.

Locus
Tempus.

In horto E. C. tempestivè primo vere floret, ex
Burgundia delata. Vnde primum Viennam allata
sit plerique dubitant, nonnulli tamen ex Tyrolensi
Comitatu originem ducere existimant, alij à Gallia
Moschata pleno rubro flore, nomine missam. Tunc
in omnibus Cæsareis hortis, & aliorum qui herba-
ria rei studio oblectantur, habetur: sed omnium fre-
quentissimam Castellis in cultissimo Ill. Principis
Vilhelmi Landgravi Hassia horto, supra huma-
nam altitudinem sese attollentem, interdum etiam
autumno rursus florentem, quæ tamen florem mi-
nus plenum superiorem, quæ Viennæ est, habere Clusio
visa est, & stolones acque ramos minus rubentes.

ROSA CINNAMOMEA FLORIBVS subrubentibus, spinosa.

Sym-
ptom.



DOd. gall. Ro-
sa, latius 5.
genus, flore sim-
plici, forte Rosa
Prænestina Plinij,
foliis minoribus,
quam albarum, ru-
brarum & rubella-
rum, ramis tenui-
bus, spinosis, sub-
rubentibus: flor-
bus parvis, simpli-
cibus, odoratis, ru-
bellis. Eid. de flor.
& hist. Rosa 7. five
sylvestris 2. à qui-
busdam Cinnamo-
mina dicta, id est,
Cannel Rooskens,
Rosa canina vul-
gò dictæ similis, ve-
runtamen aliquan-

tulum minor, cujus virgæ subrubente cortice ve-
stiuntur; flores pallidè rubent, non in totum ob-
que odore plerique in hortis habent, præcox est.
Notandum Dodon. olim scripsisse spinosam, quod
nunc non repetit: In postremis etiam spinarum nul-
lam fieri mentionem, quanquam ante dixerit o-
mnes has Rosas mordacibus aculeis horrere.

Did. notat.

Lob. ex Lugd.
notat.

Lob. Adv. Rosa silv. quam Boreales Cannel roose/
five Cinnamomeam appellant. He foliis sunt om-
nium florum minimæ: Franciæ, Belgio, Angliæ, ruri
spontè crebre, ipso odore notissimæ. Eid. l. c. Rose de
Cannel. Miror autem Lobelium (& ex eo Lugdu-
nensem, qui eadem recitat) Rosam hanc non de-
scribere, nec in Obs. se explicare: coloris florum non
meminit, nec etiam tradit an spinosa, vel non spino-
sa: is quidem titulo Rose de Cannel ponit figuram Ro-
sæ simplici flore cum spinosis virgis: sed consideran-
dum an intelligat rubellam flore pleno.

Clus. in pan. & hist. Cannelle rose vulgaris nec co-
lorem tradit, nec eam describit, neque docet an sit
spinosa aut non spinosa. Thal. Cynorthodon five
Rosa sylv. suaviter fragrantibus foliis, videtur esse
Cinnamomina Dodonæ, quam etiam flore candi-
do, non ita frequente n tamen inveniri ait. Sed an
hæc eadem sit cum Cinnamomina, vel cum aliqua
Tom. II.

Flora alba.

earum, quas tradimus, non est quod adhuc adme-
mus. C.B.pin. Rosa silv. 7. five Rosa odore Cinnamomi simplex: Cinnamomea simplex, Can. Pro Lychnide Plinij Gesnerus habet: & in Albio monte, majorem & minorem nasci tradit: illam feminam, hanc marem faciens.

ROSA RUBELLO FLORE, PARVO. simplici, non spinosa.



Melior hæc, nullis horret spi-
nis, pediculis dun-
taxat floris nonni-
hil spero: foliorum
autem glabrorum
conjugationes præ-
ter extremum in-
par, tres sunt, vel
quatuor, serrato-
rum, superius viren-
tium, inferius albi-
cantium, glabro-
rum: rose sunt par-
æ quinquefoliæ, o-
dorata, coloris ru-
belli: fructus rotun-
dus, parvo Mispilo
paullò minor, per
maturitatem rubes,
grana tomento in-
voluta continet in
Lugd.

Defin.

Folia

Flora

Fructus

Lugd.

hortis sæpè altitudinem hominis excedit.

Ges. h. Rosa silv. vulgè Tigrinensis Meyenroßle/ Rosa Maj.
ubi à quibusdam colitur in hortis: crescit verò spon-
tè ad radicem Albij montis, & est minor, odoratior
& pretiosior Cynorthodo, inque hortis facillimè
durat. Hæc eadem fuerit Rosa campestris Tragi,
quam Germ. vocat Canrosen/ feldrosen/ Babers Tragi.
rosen: Item coll. Rosa à Maio denominata Meyen-
roßle/ Rosa Maj sine spina, montis Albij prope Ti-
gurum. An Rosa Maj Gesneri eadem sit cum Tra-
gi Rosa campestri, vel 4. nobis dubium est, quia ei
prior spinas gent; secunda autem flore proflus est
candido.

Campestris

Ges. notat.

Lugd. Rosa Græca [Plinio] à Græcis ῥόζα dicta, Græca Ph-
nascens spontè in sepibus, valdè humilis, spinis ca-
rens, (quod huic tantum generi Rosarum pro-
prium est) flore languidè rubro, Vere & Autum-
no prodeunte: quod etiam huic Rosa cum Coro-
neola & Gecula commune est, que in hortis nostris
colitur, & in quibusdam montibus luxuriat, odoris
est expers: At humi jacentem & valdè humilem fo-
lis tam exiguis, ut vix Rosa esse videretur, flore sua-
vissimi odoris in Cemenearum montium jugo al-
tissimo Lugduno propinquo, quod montem Pilati
vocat, Dalechampius collegit: Contra in Carthu-
sianorum Cœnobio primario, Gratianopoli vicino
proflus inodora est, ut verissimum esse conperitur
quod scripsit Theophr. de his ipsis Rosis tractans
odoris præstantiam idci ratione contingere, & quæ
eadem in tellure proveniunt à se differre, quod ju-
cundum, vel nullum odorem spirent. Eum locum
Gaza (ut id obiter etiam hic dicatur) non rectè est in-
terpretatus: Hanc liquis Rosam Græcam esse Plinij
negaverit, Rose genus Cynorthodon leve esse Da-
lech. jute concesserit: Sunt Cinnamomeæ foliis o-
mnium florum minimæ. Inter sylvestres etiam non
postrema venustatis, inquit Pena, sed inodoro po-
mo donatæ. Hæc Lugd. separans Cinnamomeam à
pomifera Lobelii imitatus, nec indicat an ambe di-
versæ sint ab ea, quæ Lychnide vocat: figura sanè ex
Lobelio quæ ponit titulo Rosa sylvestris Pomifera,
D 2

Lychnis.

Flora 1.

Odorata 2.

Gaza error.

Cynorthodon

Lugd. notat.

conuenit cum ejus Lychnide descripta de store hac
pendant.

Cinnamo-
mea.
Lychni Pl.
ny.

Cam. h. Rosa Cinnamomea simplex, pro Lychni-
de habita à Gesnero, & in Albio monte major & mi-
nor nasci tradit. Quaternas in costis singulis folio-
rum syzygias habet plerumque major, præter sum-
mum singulare, quod domesticæ nullæ, nisi rariss.
silvestres quædam, sed non omnes solent: Minor,
quam pro mare habet, ut priorem pro femina, mi-
nutiones gerens spinas, floris pericarpium gerit spi-
nosum modicè, superioris leve. Distinctionem hanc
à Camer. assignatam nondum inveni in libris im-
pressis Gesneri, fortè Camer. inter manuscriptas an-
notationes reperit, & non separat Rosam non spi-
nosam à Cinnamomea, de qua ante, quæ Dodon. &
Lob. spinosa est, rem ulterius considerasse debebat.

Cam. error.

C. B. pin.

C. B. pin. Rosa sylv. 10. sive minor rubello flore,
rubra a mente Maio, Majalis dicta: Cinnamomea
altera, Cam. Provincialis minor, Tab. Ger. Malè
quoque fratres Rosam hanc Majalem, quæ sine spi-
nis est, eandem facit cum spinosa & Provinciali mi-
nore Taber. & Ger. ad quam etiam Cinnamomeam
2. Camer. referimus.

Locum &

In hortis nonnullis florentem observavi mense
Julio: Geneva ubi vocant *petits Damas rouge*, Maij
principio: Reperi spontaneam in monte Thoiri co-
piose, seu etiam in pago Colonger in monte Balon
Lotharingiam attingente: item, in montibus Bur-
gundix propè Malcom cum flore Maij principio.

ROSA SYLVESTRIS POMIFERA

Lobelio, flore rubello, sine spinis, pu-
nula, eadem fortè cum
precedenti.

Locum.
Deser.



Edimus

Pomum

Inter silvestres
Rosas (inquit
Lob. in Adv. Su-
nen Rosen / pogu-
fera, monifera, bac-
cifera, non postre-
mæ venustatis, An-
glæ perquam sa-
mians, & Eglen-
tine cognatio, fru-
ticea pumila, bi-
cubito non altior,
sed inodora: folio
minore, & perele-
ganti: Mespilo A-
ronia non dispari
pomo donata, mi-
nore multo, colore
viridiore, rubello,
subpunico, per
Augustum matu-
ro: Rosæ sylve-

stris est. Ed. Obs. & Ic. Rosa silvestris pomifera.
Minor Lobelium non gradere qua in re, nec differat
à Cinnamomea, nec coloris meminisse, nec indicat.
se ap. sit spinosa: figura spinis destituta non malè
conuenit nostræ Rosæ parvo flore tubello, quæ
spontè provenit, quam an intellexerit Lobelius du-
bito. Camerarius aliam intelligit nempe Rosam
campestris odoratam Clusij, quamvis illa sit spie-
nosissima, ut ipsemet Camer. fatetur: & flos albus
qui Lobel. rubellus: nos igitur Camer. non asseru-
mur, eandem Lobel. & Clusij esse hanc parte plan-
tam. Lugd. Rosam sylvestrem pomiferam Penz
separat à nostra precedenti Rosa, non spinosa: nos
sanè suspicamur hanc eandem esse cum nostra, sed
spontaneam, id quod stirpium peniti investigant.

Cam. error.

Locum.

C. B. pin. Rosa sylv. 10. sive pomifera minor: Rosa
sylv. pomifera, Lob. & Lugdun. Cynorrhodi spe-
cies, Thal. Rosa arvensis, Tab. Rosa pimpinella, Ger.
Hanc Lob. spinis carentem, at Tab. spinosam pingit.
Ego contra fratrum Cynorrhodi speciem Thalij, C. B. confu-
non puto referendam ad hanc silvestrem pomife-
ram Lobelij, sed ad paniculam spinosissimam folio
Pimpinellæ. Præterea Rosam arvensis Taber. aliam
existimo, quæ rationes paullo post dicendas.

ROSA PUMILA SPINOSISSIMA,

foliis Pimpinellæ, glabra,
flore albo.



Haud improbe descri-
buntur huius parte
contredari se pat-
tur pumila hæc ses-
quicubitalis Rosa,
tam denso horret
minacium spina-
rum undiq; agmi-
ne, tam per caude-
tem quam ramu-
los, quos in condi-
tos multos habet,
per quos sola con-
jugationum qua-
tuor, alata, gla-
bra, vix quadran-
tem equant ungulis.
digni minimi, cum
cum circa crenata,
subrotunda: floscu-
li simplici constare
foliorum, texturâ,

candidi, crebri, luteis capillamentis medium obsi-
dentibus, alabastriculis parvis: radix repit & pluri-
mas virgas emittit.

Considerandum an eadem sit, quam Clusius in
pann. pro Rosa 3. in Hist. pro 5. sic describit: Rosa
campestris odorata, cubitalibus aliquot, aut ad sum-
mum, sed rarissimè, bicubitalibus assurgit virgis, fir-
mis, duris, lignosis, rubescentibus, densissimo spina-
rum vallo munitis, ex quibus frequentes confuso
ordine oriuntur spinosi ramuli, virides, singuli
suum florem sustinentes, album odoratum, quin-
que foliis constantem, luteæ, aut Cancellæ Rosæ
vulgæ [qualiter sit Clusius ostendit] æqualem, ca-
pillis quibusdam staminibus cum luteis apicibus
luteis medium floris umbilicum occupantibus: fru-
ctus rotundus, brevis, initio viridis, deinde plerumque
maturitatem adeptus niger, crassa, angulosa, candi-
da, dura semina continet: folia sunt inter eam quas
luteos simplices flosculos, & illam quæ ab aggeri-
bus, in quibus spontè provenit, quæque à Pimpi-
nellæ foliorum similitudine nomen apud Belgas ac-
cepit (Sennen Roosen & Pimpernell Roosen
etiam appellant) serè media, per ambitum serrata, &
nullius splendoris: radix dura, lignosa, in diversâ
tendit. Invenitur multis circa Viennam locis, præ-
sertim editoribus & montosis. Floret Maio, quo
tempore rusticæ mulieres plurimos ejus fasciculos
ob odoris gratiam, venales in forum deferunt. Fru-
ctus Augusto maturescit.

Dodon. gall. Rosarum silvestrium genus, cujus
virgæ spinis acutis abundat, flores parvi, sim-
plices, albi, suavitissimi odoris: humilis Rosa,
inter Rosas domesticas & silvestres minor: Vi-
detur Græcorum *ρὸς ὀλέαν*. Latinorum Canicu-
bus, & Phio. Rosa spinicola. Idem. de fl. *σινεσ-
λα*. In histor. Rosa 9. parva humillima, *σινε-
σπιν-
spino-*

spinosissimis, foliis minimis, rosas perquam exiguis, candidis, & suaviter odoratis: frutex hujus nigraliorum ruber. Rosa minima à nostris Duyn roosfena, h. e. Dunensis Rosa dicta in marino litore, arenosis tumulis, quos vulgo Duynen nominant; sunt tamen qui *Pimpernelle* Rosas nuncupant. Rosam Pimpinellam dicens à similitudine nempe hujus fructus foliorum, cum foliis minoris Pimpinulae quae alio nomine Sanguisorba & Pimpinella vocatur. Minima spinosissima & asperum, locis gignitur maritimis, frequens in Morinorum finibus, juxta Iclum portum, in arenosis juxta mare tumulis. Observandum hoc in loco Dodonaeum in histor. Dunensis Rosae fructum nigrum dicere, Clusium autem id tribuere suae Campaniae, quam videtur separare à Dunensi sive ea quae Pimpinella folio.

Thal. Cynorrhodi species in Boccenbergo nascentis, rarior inventu, fructu nigro, non oblongo, sed rotundo, Cerasi magnitudine, continente semina pauciora quam reliquae species, duplo tamen grandiora, ac formae quodammodo granorum Vitis. Camer. apud Thaliu & in horto ut Rosam pomiferam Lobelij, vel campestem odoratam in pann. Clusij, Belgis à foliorum figura *Pimpernellin* Rosae lin: vocari: quamvis ille sine spinis depingat, cum revera sit spinosissima. Ego non ad stipulor Camerario: Rosa siquidem Clusij, albo flore est; Lobelij autem Rubella: Hoc praeterea observandum, videtur Clusium Rosam Campestem distinguere ab ea quae folio Pimpinellae, ut jam dictum.

Tab. error. Tabernam. Rosarum 9. genus, Rosa Egenteria dicta, frutice humili, virgulis spinosis, foliis parvis, floribus sive rosis pusillis, albis odoratis: fructu nigro: Rosa Dunensis, aut Pimpinula. Sed apud Tabern. confunduntur Rosarum genera duo: Icon repraesentat quidem Egenteriam, sed non descriptio, ut apparet ex ea & nomenclaturis.

C.B. pin. Rosa sylv. h. sive Rosa campestris spinosissima fl. albo odoro: Rosa campestris odora & s. Clus. pan. & hist. & Cam. Cynorrhodon polyacanthos, Lugd. Rosa Dunensis, Dod. Rosa praecox spinosa fl. albo, Eyst. Hæc opinio non placet: patet verò nostra ex dictis, & mox subdendis.

In hortis non parum se multiplicat serpendo, ideoque haud multum in altum sese attollit. In castello Bermont, unde mihi missa, copiose provenit in rupibus.

ROSA SPINOSISSIMA PYMILA flore rubro.

Vgd. Icon est sub titulo Cynorrhodi Polyacanthi, quæ non malè exprimit nostram Rosam spinosissimam flore albo jam dictam, Cynorrhodi autem hoc genus à spinarum densissima multitudine quibus caulibus, surculis, ramulis, folia rigent, Polyacanthon nominavit Dalechampius. Id pedis altitudinem nunquam excedit. Flore est rubro exiguo: Reperitur in Graminis nemore propè Monspelium: hæc Lugd. Ego inter Rosas siccas plantas invenio ramulum spinosissimum foliis minimis, præcedenti similibus, sed minoribus multo, cui titulum secut. Dogrez Cynosbati odorati. Gesnerus, qui hunc habuit, ascripserat esse fortè vel Rosæ Damascenæ cognatam, vel Nerii Serapionis.

Hanc nos suspicamur esse collectam Monspelij: fecissemus eandem cum præcedenti, nisi invenissemus Dalechampium tradere Cynorrhodon Polyacanthon flore esse rubro circa Monspelium. Cherlerus reulit ramis spinosis cum minimis foliis, modo dictis similibus, passim provenire in rupibus & frutetis collium Narbonensis Galliae, ac ibi florere Maio: verum quo colore non indicabat.

Tom. II.

C. Bauh. hanc spinosissimam eandem statuit cum Pymila spinosissima, foliis Pimpinellae. Sed huic flos albus, illi ruber. Hæc pedis altitudinem nunquam excedit, illa verò sesquicubitabit: est.

ROSA ARVINA TABERN. SPINOSA



Apud Tabern. in 7. le. & hist. hujus Rosæ nomen Arvinæ, sive Rosæ nihil præter iconem & nomen extat, quod ut ait, adeo vulgaris sit omnibus locis, ut non egeat descriptione. Sed Compilator satis demonstrat se parum versatum in Rosarum discriminibus: Icon quam proponit, accedit ad Iconem Rosæ pomiferæ Lobelij. Quare eandem plantam existimarem nisi spinosa præteretur, rarioribus tamen spinis & non

caebis, quales sunt in Rosa nostra spinosissima: Considerandum an sit Rosa Maij minor Gesneri Cameirario, cujus descriptionem posuimus antea, sub Rosa rubello flore non spinosa.

A me aliquando reperta est Rosa sylv. in monte S. Hippoliti, urbi Burgundiae vicino, frutice parvo spinis robustis, rarioribus, ut in iconem Tabern. foliis novem acutis undecim, glabris, qualis in Rosa spinosissima alba Ger. qui figuram Tab. exhibet, Rosa pimpinellæ, Angl. The pimpernell Rose, & Rosa pomiferæ.

C. Bauh. eandem facit Rosam arvinam. Tab. cum C. Bauh. silv. pomifera Lob. & Cynorrhodi specie Thalij: sed ei adhuc assentiri non possum.

ROSA MINIMA.

Rosam vix tam desertam, colle in horto Dei detulit gener, cui folia unciam circiter longa, quinquepartita, glabra: flos pro portione plantæ magnus, quinquefolius, albus in ea spinas non animadverto: considerandum an sit tantum varietas aliqua alicujus præcedentis generis: nolimus nos ut videamur plures plantas ceteris nosse, multiplicare species: studemus quidè opera Dei in Botanicis



demonstrare quantum pro nostro capiti fieri poterit.

ROSA FOLIIS ODORATIS

Eglerina dicta.

Rosæ silvestris. ante dictis similibus, aculeis viridis, Trago magis exigua Rosa silvestris vulgari.

D 3

HISTORIAE PLANTARVM



sed spinis & foliis asperioribus Dod. proceritate sylvestres omnes sepe superans, virgas habet duras, crassas, & lignosas: nos plerumque observavimus minorem & virgis minus crassis: foliis subrotundis, quibusdam pæne rotundis, plerumque septenis, Dod. splendentibus & pulchre crentibus, Trag. cineraceis, nobis potius virgibus odore gratissimo ac suavissimo

stantur. Et licet in Dioscoridis historia nihil sit quod non sententia Herbariorum de hac planta adstipuletur, dubitant tamen adhuc de ea re quidam, alij aperte refragantur, in primis vero Matthiolus: cui respondens alterius sententia auctores. Hoc primum, quod Matthiolus vehementer probat, & adversus Marcellum contendit: Cynosbaton à Cynorrhodo sive Rosa sylvestri differre tantum robore, proceritate, crassitudine, aculeorum multitudine & rigiditate: folio jucundi odoris, ut inquit Plinius, sed angusti, nec late se diffundentis (quod in Rosa sylvestri propter odoris est expers) in acutum desinente, cum Rosa sylvestris folium summa parte latiusculum sit & majoribus incisuris divinum, quæ cum tantopere inter se diffideant, Cynosbaton neque cum Rosa sylvestri, neque cum lativa à Dioscoride conferri oportuit. Nullo vero pacto adversatur Plini, auctoritas, Rosam sylvestrem Cynorrhodon non Cynosbaton appellantis: qui præterea non scribit, veteribus Cynorrhodon nihil aliud fuisse, quam spongiolam illam, quæ mediis sylvestrium Rosarum ramis obocitur, ut circa illius mentem ait Matthiolus. Per-

Matth. de
salar.
Cynobaton
differt a
Cynorrh.
do.

Flora.

maximè vento flante, teste eodem Trago: flores exigui, quinquefolij, albi, & valde odorati, (vidimus & rubentes,) Trago ex purpura saturate candicantes & odore jucundiore ac vehementiore præditus Dodoneo vero, frequentissimè albicantes, rari purpureascentes, exigui aut nullius odoris: fructus oblongus, coloris subrubentis. Reperiuntur etiam circa hujus tenues virgas spongiolæ hirsutæ, quales circa Caninæ Rosæ spinas nascuntur.

Alba, &
rubens.
Fructus.
Spongia.

Cynobaton
Cynorrh.
do.
Englantina
ra.

Cord. in Diosc. *ruvis bat* sive Cynorrhodos altera, hirsutioribus foliis, cujus frutex totius suavissimum odorem spirat, Englandira vulgo appellata. Trago Rosæ silv. genus 2. German. nonnullorum Weindrosen, Franten Dorn, Marien Dorn.

Syl. humilior.
Cynobati
genus.

Gesli. Rosa sylv. humilior, Tigurenlibas Weinroslein denominata, à vino. Eid. cat. Cynobati genus odoratum, Weindorn, Weinbat.

Rubus canis.
Cynorrhodon.

Turn. Rubus canis, *ruvis bat*, Angl. Eglantine. In hac communiter spongia nascitur, ut scribit Plinius. Ego hanc nihil aliud quam suaviscentem Cynosbaton speciem existimo. Idem habet de Cynosbato. Dod. Gall. Rosæ genus, Plinio Græcè *abvur*, Lat. Rosa Græca, Gal. & Bel. *Eglentier*. Idem de flo. & hist. Rosa 10. sive sylv. quædam, foliis odoretionibus:

Græca.

Canina
species.

Cynorrhodi sive Caninæ Rosæ odorata species, quam Galli Englentierum Ruellio teste nominant, qui & hanc sylvestrem Rosam Cynosbatum sive Caninum Rubum suspicatur, de quo Diosc. *ruvis bat* si *ruvis bat* Extat & Cynobati apud Theophr. *descriptio*, quam habet correctiorem Athenæus: Cum hanc descriptionem utraque non malè canina Rosa odorata convenire videtur: Est verò & alius Cynosbatus, quem Plin. 14. describit: sed huic Cynosbato, sylvestris odorata (si modo legitima & non corrupta est descriptio) nec quicquam similis est, veluti neque Cappari, neq; Smilaci asperæ, quæ utraque etiam Cynosbato à nonnullis appellatur.

Cynobaton
Oxyacanth.
do.

Cynob.
ru. Plin.
non est.

Lob. Adv. Rosæ species altera, vulgè *Eglentine* aut *Eglentier*: in hujus potissimum ramis Bedegar vocatum provenit. Idem Obs. & Ic. Sylv. Rosa & Canina Rosa odorata, Angl. Brerbusche or Septree sive Brere tre. Germ. Wildtrosen & Bedtrosen. Bel. Wilde Rose. Gall. *Eglentine*. Hisp. Rosa salvaje. It. Rosa canina, Rosa salvatica & canina. An Lob. benè distinxerit Rosas sylvestres examinent lectores.

Bedegar.

Rubi Rosa
Plin.
Cynobaton.

Lugd. Rubi genus aliud in quo Rosa nascitur, inquit Plinius, Dioscoridis *ruvis bat*, quæ in senibus cum aliis Rubis gignitur. Latine Rubus caninus appellatur, aut Caninubus, Arabicè Sent. Fruticem eum esse putant nonnulli, quem Galli Englantier, & Englantier vocant, id quod notæ à Diosc. posita to-

stantur. Et licet in Dioscoridis historia nihil sit quod non sententia Herbariorum de hac planta adstipuletur, dubitant tamen adhuc de ea re quidam, alij aperte refragantur, in primis vero Matthiolus: cui respondens alterius sententia auctores. Hoc primum, quod Matthiolus vehementer probat, & adversus Marcellum contendit: Cynosbaton à Cynorrhodo sive Rosa sylvestri differre tantum robore, proceritate, crassitudine, aculeorum multitudine & rigiditate: folio jucundi odoris, ut inquit Plinius, sed angusti, nec late se diffundentis (quod in Rosa sylvestri propter odoris est expers) in acutum desinente, cum Rosa sylvestris folium summa parte latiusculum sit & majoribus incisuris divinum, quæ cum tantopere inter se diffideant, Cynosbaton neque cum Rosa sylvestri, neque cum lativa à Dioscoride conferri oportuit. Nullo vero pacto adversatur Plini, auctoritas, Rosam sylvestrem Cynorrhodon non Cynosbaton appellantis: qui præterea non scribit, veteribus Cynorrhodon nihil aliud fuisse, quam spongiolam illam, quæ mediis sylvestrium Rosarum ramis obocitur, ut circa illius mentem ait Matthiolus. Per-

Matth. de
salar.
Cynobaton
differt a
Cynorrh.
do.

Matth. de
salar.
Cynobaton
differt a
Cynorrh.
do.

Eglantine.
Cynorrh.
veterum.

Compiler Tabern. *concordantia* hist. cum nona Rosa, quæ est Eglentia, Rosam Dunensem sive Pampirulam. Cur Ger. pro Rosa silv. odora, Angl. the Eglantine or Schmeete Brier dicta, figuram Tabern. Rosæ sylvestris posuerit, rationem non video: An C. h. Rosa canina *ruvis bat* vivis sepibus idonea?

Gerard.
lappus.


C. B. pin. Rosa sylv. 4. sive foliis odoratis: Englantia, Ruell. Rosa silv. altera, Trag. Gesli. h. Rubus canis, Eglanterium, Turn. Cynosbatus, Lat. Rosa 10. Cynorrhodi, vel canina Rosæ odorata species, Dod. Rosæ sylv. species altera, Lugd. Rosa Eglentia, Lob. Adv. Tab. & Eyt. Rosa canina, Ger.

Locus &
Tempus.

Provenit sponte Montbelgardi ad collem, quem vocant Condmeine & alibi, ut Bailex, Geneva & Lugduni,

Lugduni, mense Iunio, nunc Augusto, nunc Septembri, etiam cum spongia. Dodonæo hortensis est, nec ulquam in Gallia aut Belgio sponte vivit. Anglia & Flandria hortis ad odoris gratiam colitur, sponte oritur in Bathonia Angliæ, proximus collibus non procul ab ædibus D. Laurentij, thuyde Lob. Hanc cum aliquando Gesnerus in hortulis: loco umbroso plantasset, odorem amisit: cæmen civis quidam alius parum in ipso muro hortuli sui, parum iuxta, loco aprico, valde proceram, & suavissimi odoris, quem nectarum dixeris, annis quamplurimis illic vivat habuit.

ROSA EGLENTINA FLORE pleno.



Vesunt in stirpium cultissimis hortis Dom. à Bellosontaine vigi fruticem cum foliis odoratis, sed majoribus, quam in spontanea. Et hinc Lob. in Obs. ait Rosam Egleninam flore multiplici in hortis variare: hanc in Ic. inscribit, Rosâ sylvestrem odoratam flore multiplici.

Cam. h. n. u. p. de duplicato flore, que pro Alabandica Plinij haberi queat. Hanc ego cum Camerario Alabandicam non censue-

ram: ea siquidem vilior Plinio albicantibus foliis. C.B. pin. Rosa sylv. sive flore pleno: Rosa canina duplicato flore, Cam.

ROSA SYLVESTRIS, FOLIO Eglantinz vivente, albo flore & rubello.

In Asia & circa Monachiam, in sepibus cum reliquis Rosâ sylvestribus, genus quoddam provenit magni, foliis quinque plerumque, ex virentibus, similibus Egleninis rugis & colore, non tamen ut illarum h. odoratis, præterea majoribus: rose sunt, sive sive luncinde peramos aduncæ. Hujus etiam observavimus florentem Maio in Ducatu V. V. in Bergeico inter Stutgardiam & Esslingam flore rubello.

ROSA SYLVESTRIS ALBA CVM rubore, folio glabro.

Rosa nostra sylvestris, folio glabro, in magnos excrescit frutices, magnis armatis spinis: folia sunt satis magna, utrinque glabra: flores simplices, quinquefolij, albi, cum aliquo rubore, in medio stamina lutea: accedunt capita longa, primum, viridia, deinde Coralli modo rubra, quæ ubi planè matura, mollia redduntur, sapidi gustus, cum aliqua aciditate: à pilis, quibus semina involuta sunt, inter edendum, cavendum.

Dodon. sic describit: Ea quæ canina Rosa vulgo dicitur, Belgio familiaris, aculeatis virgis, & alperis



foliis, sativis similis est; singulis tamen minoribus: flos simplex, quinque folia non excedens, albicans, aut ex albedo colore purpureas. Adnascitur hujus virgis, aliquando pilula quædam hirsuta, æthino Castaneæ quasi similis, at mollis, quam spongiolam Rose nuncupant.

Lugd. sic, Rosa sylv. quæ Cynosrhodon Plinius appellat, foliis est asperis, aculeatis: ramis surculisque, ut in sativa spinis hor-

rent; sed graciliores sunt, foliaque multo minoræ: rose ipsæ simplices, alba, aut in albo purpureæ, inodora, quibus tandem succedunt capita rotunda, ut in sativa, alba cum matura sunt, in quibus semen lanâ opertum. In mediis ramis nascitur pilula quædam hirsuta, à Plinio spongiola nominata. Hanc Sepastianus quidam Bedeguar appellant, non sine errore, cum Bedeguar Cardui genus sit. Sed ne Dodonæus, nec Compiler Lugd. videntur cognoscere discrimina Rosarum sylvestrium. Icon nostra ex Camer. valde placet.

Est hæc illa plantæ quam Theophr. & Diosc. Cynosbator vocant, & alij apud eundem Oxyacantham, malè meo quidem iudicio: Melius alij apud Plinium Cynosbator, Cynospaston, alij autem Neurospaston cognominant: existimo tamen eum duas plantas miscere.

Cord. in Diosc. ait Cynorubum Gazam apud Theophr. reddere, sed eundem fruticem alio nomine Cynosrhodon, Canis rosam, vocari: Esse autem nihil aliud, quam syl. & aculeatam hamatis spinis Rubum: esse quæ tres, aut quatuor ejus distinctas, & ex omnibus hanc esse proceriorem: Plin. Cynosbatum cum vulgari Rubo confundere, quosdam etiam hunc fruticem Arbutum esse credere, sed malè.

Tragi iudicio Rosa syl. prior ex purpureâ dilute albicans, sive vulgare sylvestris Rosei. genus, quod Germani Wildtheckrosen, Sandwiel, & Buntelrosen, & spongiolas quæ hinc adnascuntur, Schlassfungz appellant, Cynosrhodon Barbari sunt.

Dodon. g. Rosa n. u. p. de, Rosa canina & Rosa sylv. Eid. hist. & de flor. Rosa 6. syl. canina vulgo vocata, nonnullis etiam Canina sentis, flore albicante, aut ex albedo colore purpureascente, olim inodoro.

Holler. morb. int. Cynosbator: Eid. de compos. medic. Cynosbati fructus detracta interiori lanugine Senella vocata. At Senella solet dici de Oxyacantha Matthioli, quæ commendatur ad calculum: quare videndum an neab Hollerio dux confundantur plantæ.

Nescio, inquit Lob. in Adv. quæ si ducit in vitium me nihil scire docere vult Matth. qui jam diu non novit, ne quidem postremo momentis agnovit Cynosbator, cujus duo frutices, ut nomenclaturæ sic effigaturæ ex antiqua descriptione per similes, ætærum me faciunt, aut saltè ea non carere nos hodie: Est autem fructuissimus Cynosbator Rubi per similis, promens florem & fruticem Rosei syl. albis. An autem Rosei sylvest. fuerint ritè perspectæ Lo-

belio, valde ambigimus; videant lectores.

Rubrum caninum.
Cynorhodon.
Heliodoron.
Cynorhodon.
Spongia.

Anguill. vocat Rubum caninum, Rosas albas vestres Galeni lib. comp. med. sec. loc. Cynorhodon, & Orisani Heliodoron; Plinium ait tradere in hoc invenit plantam spongiolam, vocatam Cynorhodon. Hanc Lob. spongiam Bedeguanis vocat. Tab. Rosam silv. Sed roses non describit, ita ut nequa an hanc vel sequentem intelligat. Gesh. Rosa sylvestris Cynosbati vel Cynorhodi nomen veteribus dicta. Eid. cat. Cynorhodon, Rosa canina. Hanc aliquos à Cynosbato distinguere scribit non flore roseo, quem fert utraque, sed spongiolis quas Cynorhodo attribuit, & Cynosbato negat. Turn. eos errare scribit, qui Rubum canis & Caninubum, Rubum esse putent. Ger. vocat Rosam caninam inodoratam, ejusque figuram assumpsit ex Tab. quæ posita fuerat pro Rosa Eglentaria, cur mutavit nomen. Hæc tandem est cujus turpis figura extat apud Lonici nomine Sagenbutten & Santschen & Cynosbati Dioscoridis.

Cynorhodon
Cynosbato
differen-
tia.

Rubum caninum
q. 1.

C. B. pin.

C. B. pin. Rosa sylv. 1. sive flore odorato, incarnato; Cynorhodos Plinij & Barbari: Sentis canis & Cynosbatos, Brunf. Rosa sylv. Matth. Dod. odora, Ger. Cynorhodos [non in hac Rosa pomis immixta, folio hirsuto] seu Rosa canina, Thal. Rosa sylv. vulgaris, Lugd. Cam. ep. Rosa canina odorata & sylv. Lob. Rosa sylv. altior & spinosior, C. B. Rosa canina, Camer. Cynosbatos & Rubi tertium genus, Lugd. Rosa sylv. odorata incarnato flore, Eyst. Hæc, ut & tertia [Rosa Eglentaria plena] spongiola adhaeretur, quam Plinius in Cynosbato, pilulam Castaneæ similitudinem in Cynorhodo spongiolam vocat.

Rosa cum
tempore.

Passim circa serobes, fossas & margines agrorum & pratorum locis humidi provenire tradit Dioscorus. Ego diversis in locis diverso tempore florere observavi, ut Junio, Julio, Augusto, Septembri, Octobri & Novembri, æquæ spongiam ferentem.

ROSA SYLVESTRIS, FOLIO glabro, flore planè albo.

Defert.



Folia.

Rosa fruticem invenit in Burgundia inter Courchaton & Grange castellum & oppidum Ill. E. C. floribus multis simul junctis, Rose mæschæ in modum majoribus, omnino albis, odoratissimis; calycibus, eorumque pediculis rubentibus; foliis septem, planè glabris, Rosa sylv. albæ similibus. Et hæc illa est quæ in dumetis provenit, non ita in altum excrecens, nec ita robustos proferens ramos, ut Rosa sylv.

alba cum rubore, folio glabro, sed multum serpens, ramis quibusdam parum spinosis: Eadem passim in silvosis & fruticibus provenit & circa itinera inter Montbelgardum, & Borongne, aliisque in locis plerumque cum singularibus floribus, modò cum pluribus ut ante dictum: floret Junio & Julio, tardius paulò quam ceteræ sylvestres. Hæc demum forte sunt Rose albæ odoratissimæ quas ceperi florescentes mensè Septembri inter VVallenburg & Liechtal Basiliensium.

Tempus.

An Cordo in Diose. Cynosbatos sive Cynorhodos, quæ Rosa sylv. 3. omnium minima, nec multum à terra elata, ac propterea Erdrosen, quasi Chamærhodos appellata. Cum nostra hæc Rosa sylvestris non male videtur convenire Rose sylvestris Tragi species, Rose 4. genus, Cyathosen? Sabrosen? Feldrosen? sive Rosa campestris, de qua ait: Rosa proferit prorsus candidas, odoris non tam jucundi ut tertiæ generis, silvestrium omnium Rosarum vilissima. In siccanis agrorum in hinc limbus juxtaque vœra Junio & Julio, antequam in flore suo appareat. An Gesh. h. Rosa campestris Tragi species altera, rosas prorsus candidas proferens. An Lugd. Cynorhodon, sive sylv. vulgaris Rosa passim in dumetis reperta ab Herbariis?

C. B. pin. Rosa sylv. 4. speciem Tragi, facit Rosam sylv. 7. sive arvensem candidam: Cynosbaton verò tertiam Cordi, Rosam sylv. 18. sive campestem repentem.

ROSA SYLVESTRIS ALBA, CVM aliquo rubore, folio hirsuto.



Rosa sylvestris Defert. Genus hoc magnè ramulosum, frons hinc inde aduncis, robustis, cui foliola quina, vel septena, subrotunda, rugosa, albicantia, hirsuta, nonnihil odorata, minus tamen quàm Eglentaria: flores quinquefolij, albi, cum aliquo rubore, quorum pediculi spinulis asperi, circa Montbelgardum in septibus & dumetis cum ceteris frequenter affert.

Hujus alia species Varietas. Quædam à me reperta est mensè Septembri in monte VVirmberg, ubi sita arx Teck.

spinis non curvis, sed rectis: foliola hinc quidem etiam hirsuta, sed tenuiora, minus rugosa, angustiora, septena in pediculi dorso: et quædam spinæ.

Cordo in Diose. Rosa canis, Cynosbatos quarta, majora, quàm tertia omnium minima, & lanuginosiora [forte longiora & lanuginosiora, non magis striptum] & ita cana habens folia, & rosas in candido suavitè rubescentes. An Thal. Hæcyn. Cynorhodos alia flore paulò minor, et candido tenuiter rubescente.

ROSA CANDIDA, PLENA ET semit plena.

Rosa alba assurgit virgis longis, lignosis, fungosis, in quibus spinæ acutæ, aduncæ, rari: cortex alioqui politus & levis: foliola quinque vel septena, crenata, glabra, sublonga, quædam planè rotunda, pediculi dorso spinoso interdum exermis ramis calices plures, ex pediculis spinulis non minus acutis inhaerent, quibus apertis apparent roseæ pulchre, odoriteræ, albæ, multorum foliorum interdum cum negliguntur pauca producant folia, nisi aliud genus sit: quorum interiora minora, exteriora verò majora & ampliora, in medio apices lateos includunt: dentia:

Defert.

ROSA HUMILIS, FLORE
albo Clusij.

Rosa. Clusij humilis est & fruticosa, foliis illi Descri-
ptis, quibusdam flore non fert, perfructibus: sed ejus flo-
res, licet albi, longe minores, neque unquam plene
sele explicantur, ejusdem cum alba vulgaris odoris &
coloris, qui tamen plus carnei ad nictu habet. Pau-
lo serius illa floret. Hanc primam observabat autor Locum
in cultis. D. Ioan. Archetzi p.orto, unde illam ad- Tempus
quisivisset, ignorantis: Deinde Francofurti ad Ma-
num, quorundam Patriciorum hortis. Plurimum
autem accedere videtur, ad Græculam Plinij. Græcula
Plinij.

C.B. pin. Rosa sylv. sive odorata albo flore: Ro-
sa sylv. humilior, Cæf.

ROSA MOSCHATA MAIOR.

Rosa Moschata Descri-
ptis floribus maio. Flus.


stibus, albis, frutex
est robustus, rectus,
spinosus, ut Mo-
schata minor: in ra-
morum summitati-
bus, ex pediculo ra-
ris aliquibus spinis
aculeato Rose ena-
scuntur, plerum-
que quique aut
septem foliis con-
stantes, magnæ, al-
be cum aliquo ru-
fore, qui potissi-
mum degetur cum
exsiccantur: Odore
suavissimo floret
Junio. Genevæ in Locis
hortis, non facile
læditur à frigore.

Hanc florentem Maio observavi, etiam Clarevallæ
in oppido Burgundiæ, unde transfuli Montelgar-
dum in hortum, ubi quotannis terè partes superio-
res gelu absumentur.

Lob. Ic. Rosa moschata major species. An de hac
loquitur Cæf. Rosa candida, quæ ex translatione in
Campania & circa Philippos adeo profecit, ut laetis-
sima & maxima folia provenerint, non tamen odo-
ratissima, quam Centifoliam vocant; Muscatula ap-
ud nos appellatur ob odoris excellentiam: sed quæ
opere topiario colitur, caudice cæteris crassiore: ra-
mus longissimus aculeis rarioribus.

ROSA MOSCHATA MINOR
flore simplici.

Hæc jam olim à me sic descripta: Rosa Moschata Descri-
ptis magnos habet stolonos, rectos, crassos, statim à
radice prodeuntes, in quibus spinæ rariæ, interdum
à trunco rubræ ac robustæ: rami tactu essent leves,
nisi interdum spinæ intervenirent, in quod quiddam
habent commune cum Rosis albis, sativis, ac disse-
runt ab Incarnatis vulgè dictis, quorum rami undi-
que valde spinosi. Folia satis rara quæ non multum
disserunt à Rosis albis & incarnatis, omni quod minus
rugosa, & magis acuta, glabra superne cum viriditate
viridiora, & minus albidiora cum pilis vix apparentibus, in
remitu serrata, quæ ut plurimum habent septem
foliola, interdum novem, majori ex parte sibi invi-
cem opposita, in foliorum pediculis parte infera à
spinæ.



dentia: succedunt
fructus rotundi,
rubri, ubi maturi,
in quibus grana
dura, lanâ involu-
ta. Hic frutex quia
procerior, ideo
melius frigus to-
lerat, quam rubel-
la: et putandi quo-
tannis ramuli qui
flores tulere. No-
stra Leon ex em-
puriis non placet.

Dod. g. Rosa t.
genus, Rosa Da-
mascena Italix,
Rosa alba Gallix,
Campana Plinij.
Eid. fl. & hist. Rosa
sativa, vulgè Ro-
sa alba, Rosa spi-
neola Plinij, si modo ejus Campana non sit.

Lob. Ad. Rosa sativa candida. Gesh. Rosa alba hor-
tensis multiplici folio. Rosa vilissima, albicantes:
Monachorum alba Rosa, quæ & Centifolia. Eid. coll.
Matth. & Apollinar. Rosa alba. Trago. Rosa hor-
tensis multiplex alba. Tao. Gen. Anguill. & Lugd.
Rosa alba, Cam. h. Rosa alba, candida simplex
plena. Ryff. in Diosc. Rosa flore albo. Cæf. Rosa
parva quinque foliis constans candida: & eadem
multipolia, fortè Prænestina Plinij, quæ celebratissi-
ma, novissime desinit.

Rosas albas Campanas esse existimat Lugd. cæf.
quæ omnium vilissimas tradit, demptis Damascenis.
Addit quoddam esse foliis densissimis, ut antiquo-
rum Alabandica: hæc Spineolas fuisse arbitrat &
Centifolias.

C.B. pin. Rosa sativa sive alba vulgaris major,
Campana Plinij, sativa alba, Brunf. Rosa domestica
alba, Matth. Rosa candida, Cæf. [hec. bu. est la-
tella, de qua mox.] Hujus flores foliorum numero
variant: hinc Rosa flore albo pleno & simplici,
Eylfett.

Germ. Weisse Rosen/ Weiss garten Rosen. Belg.
Witte Roosen. Gall. Rose blanche. It. Rosa biancha.
Aug. The white Rose.

In variis locis vario tempore floret, ut Maio &
Junio, Octobri & Novembri. Cæf. tardissime floret,
& perdurat usque in Autumnum. Amarior hæc &
majorem viam purgandi habet.

ROSA LACTEOLEA.

Rosa lacteola, elegans, non magna, foliis mul-
tis, dense stipatis, quæ singula, si evelluntur,
candida sunt, cum verd simul calyci inhaerent, in
flore integro videtur quiddam dilutus rubor emicare.

Vratislaviæ copiose in hortis colitur, unde
etiam ad nos proveniunt. Hæc Centifolia Plinij vi-
detur, numerosis foliis & parvis. Nec tamen est ta-
lis odoratissima, quamvis reliquis odoris præstantia
parum cedat. Extremos veluti margines in coro-
nis aptè ornat, quod exigua sit, Cam.

C.B. pin. Rosa sativa ro. sive alba minor.

Et hæc, me iudice, illa est, quam Cæsalpinus quar-
to loco tradit, maxime omnium numeroso folio
constantem, sed parvo, odore valde exili, quam Plinij
Alabandicam vocare scribit, viliores albican-
tibus foliis: & Spermoniam plurimus
foliis sed minutissimis, vilissimam,
non multo odoratam.

Locus.

S'us.

Candida
minore
fimo folioAlabandi-
ca.
Spermonia.



spina valde aqua-
ca. Ramus extremi
divisi in alios mi-
nores, qui quadam
quasi lanugine ob-
ducuntur & rubent,
pauci habent folia,
abundantque mul-
tis floribus simul
cohaerentibus qui
praequant se ex-
pandant longa ap-
parerit capitula mol-
lia & hirsuta. Ape-
ta rosae vix diem
durant, & medio-
cris sunt magni-
tudinis, albae, habent
nonnunquam un-
gues rubentes, qui
lutei sunt prius-
quam expandun-
tur, constantes singulis quinque foliis: apices lu-
tei foliis deciditibus nigrescunt: relicto in me-
dio uno magno, hirsuto, clavam aliquatenus expri-
miente. Odor cum suavitate insignis, moschum ut
bene ait Dodon. proxime referens, sapor amarus,
astictionis non magnae participes, aliquam acrimo-
niam in faucibus relinquent.

Apoc. tur, constantes singulis quinque foliis: apices lu-
tei foliis deciditibus nigrescunt: relicto in me-
dio uno magno, hirsuto, clavam aliquatenus expri-
miente. Odor cum suavitate insignis, moschum ut
bene ait Dodon. proxime referens, sapor amarus,
astictionis non magnae participes, aliquam acrimo-
niam in faucibus relinquent.

Nesrin A- Auctores sunt Monachi in Mes. ipsum Avicen-
nam cap. de Nesrin, vel Nesrin, sive Nelerin, loqui
de Rosa hac parva sylvestri alba, vulgo dicta Dama-
scena, seu Damascina, & à nonnullis Rosa musca-
tella. Ang. Nesrin serapionis, Moschete Rosa sim-
plices. Sylv. & Ryff. Rosa moschata. Matth. Rosa
Hetruscorum Damascena, Moschete vulgo dicta,
de quibus ut ipse credit, non est intelligendus Me-
sue, quod eas illi facile incognitas fuisse existimet.

Damasc. Has enim veteribus cognititas fuisse (quod sciat) me-
moriz prodit nemo: ni forte esse eas credamus, quae
Plinio Spineolae appellantur, quae ceteras excellunt
odore. Lob. Adv. & Obl. Rosa Moschata. Eid. G.
Rosa Moschata flore simplici. Dod. g. Rosa sativa g.
genus, Plinio Rosa Coroneola, Neoterici Rosa se-
ra & Rosa Autumnalis, Belgae Mustet roosfens.
Eid. de flor. & hist. Rosa sativa s. Hetruscorum Ro-
sa Moschete, ubi Coroneolam Plinij esse posse tra-
dit, eamque Damascenam nonnullos appellare, flo-
re ut plurimum simplici. Gesl. h. Rosa moschum
fragrans: Rosa muscata simplex: Moschata vel Ale-
xandrina vulgo, & ab aliquibus Damascena appel-
lata. Is se audisse scribit eandem marinas à nonnul-
lis vocari, colique jam in hortis circa Verbanum la-
cum, sed forte genus diversum esse: Monachos in-
terpretes Mesuei Nesrin vel Nesrin Arabicè hunc
fruticem vocare, alias Rosam putare. Item in app.
ex Anguill. Rosam Moschatam, vel Damascenam,
Alexandrinamve Nesrin Serapionis vocat. Idem ta-
men lib. de Quadrup. Rosam Moschatam esse Nes-
rin Avicennae negat, his verbis. Rosa Damascena
leu Muscatella vulgo dicta inter sylvestres annu-
rari potest: quam Avicenna Canone 2. c. 514. Nesrin
vel Nesrin, vel Nelerin nominat, ut Bellunensis in-
terpretatur, cujus haec sunt verba: Nesrin est Rosa
odoris acuti, quae vulgo in Hispania & Barbaria Ro-
sa Muscata dicitur. Damasci est Rosa Nesrin vel Ne-
sarin, & est species Rosae sylvestris. Simon Ianuensis
etiam & Pandectarius, Nelerin vel Nesrin, autori-
tate Alhavi dicunt esse Rosam sylvestrem, & albam,
quae in frutice spinoso ut sativa nascatur. Serapio
Nesrin vocat, & ab aliquibus Rosam sylvestrem &
Rosam Seni nominari scribit. Monachi in Mesuem
alibi etiam Nesrin Rosam parvam, sylvestrem al-

Spineola
Plum.

Alexandri-
na.

Damasc.
na.

Nesrin
Bellun.

Nesrin Al-
havi Ianu-
ensis 17
pandect.
Nesrin Ser-
apio.

ham interpretantur: cui Avicenna & Serapio ean-
dem facultatem attribuant, quae praeditum est Zambacum vel Ieseminum, sed in firmiorem utin pen-
ria Olei Zambacini, oleo de Nesrin, id est, Rosa Da-
mascenis uti liceat. Nesrin, inquit Avicenna, calidus
& sicus est ordine tertio. Omnis species (pars) ejus
vim habet abstergendi & attenuandi, sed flos praeci-
puè. Nervis frigidis prodest. Venæ aurium oedi-
dit: & tinnitum earum tollit. Dentum dorem mi-
tigat. Sylvestris in hoc genere fronti in capitis do-
lore illinitur. Prodest gutturi & tonsillarum absces-
sibus. Drachmae quatuor inde potae, de sylvestri pre-
cipue, vomitum & singultum sistunt. Hec Avicenna
de Nesrin. Sequitur planta sit calida & sicca in ter-
tio, & eadem ferè quae Zambacum efficit, Rosae
eam adnumerare non possumus: neque enim ulla
nobis Rosarum species sive sativa, sive sylvestris co-
gnita est, quae tertio gradu calfaciat, & illa praestet,
quae plantam Nesrin praestare ex Avicenna nunc re-
citavi. Quamobrem aliam esse oportet Rosam Da-
mascenam sive muscatam vulgo in Italia deaurcu-
jus Matthiolus etiam meminit, perquam odorife-
ram esse scribens, colore albo, & veni movendo
ceteris efficacior. Ego loco Nesrin Ieseminum
vulgo dictum, aut Leucoia potius quam ullum Ro-
sarum genus usurpare malui. Nesrin, id est Zamba-
cum sylvestre calidum est & sicum: & calidi tempera-
menti, caput laedit (& vel sanguinem naribus a-
liquando suo odore efficit). Rasis. Idem apud Sera-
pionem, vidi inquit, in Corascem qui dabant folio-
rum ejus duas aut tres ad summum drachmas, unde
venter admodum movebatur. Nesrin est sicut Nar-
cissus, Avicenna & Aben Mesuai: ego Narcissum
hic falso legi vido, sive auctorum, sive interpre-
tum aut librarium hanc culpa sit: nam neque for-
ma, cum sit frutex Rosa similis, aut saltem magni-
tudo par: neque vires cum Narcisso conveniunt.
Fieri quidem potest ut ea vox corrupta sit pro Iese-
mino, Quamquam rursus in Narcisso etiam apud Se-
rapionem scribitur, Narcissum ea efficere quae Iese-
minum. Sed legendum est Nesrin, non Narces (sic
enim Narcissum vocant) ea praestare quae Iesemi-
num, ut Avicenna & Mesuagii docent. Serapio qui-
dem, vel citatus ab eo auctor vocem affinitate fac-
ile falsi potuit. Est autem Zambacum sive Iesemi-
num frutex floribus odoratis, quem Galli & Itali e-
tiamnum Ieseminum appellant, docti quidam Ias-
minum, & Vnguentum ejusdem nominis, Dioscori-
di descriptum, ex floribus ejus confecti arbitrantur.
Ego eundem fruticem Vergilij Cassiani esse puto,
apibus gratam, ut plurimum in apium historia doc-
bo. Quod si Nesrin Ieseminum sylvestre est, ut Ra-
sis scribit, non rectè Avicenna hujus plantae genus
sylvestre privatim nominaret, sativum etiam genus
ejus alterum esse intelligendum relinqueret. Cum
de Sambaco, id est Iasmin (sic enim Bellunensis haec
vocabula scribit) serapio agat, scribit autem Sam-
bacum calidum & sicum esse ordine tertio, & o-
leum ejus prodesse nervis frigidis, in sensibus pra-
sertim, sed odore suo, caput laedere, quod Dioscori-
des etiam de Iasmino tradidit unguento. Sed sive
Sambacum sylvestre haec planta est, sive similis ei, sat
fuerit intelligere eandem utriusque facultatem esse:
Sambacum tamen efficacior paulò: & nullum pro
eo Rosarum genus substituendum. Rosae quidem
nomen (vocant enim Nesrin aliqui Rosam agre-
stem, & Rosam seni, ut apud Serapionem legimus)
non satis est ad probandum propriè dictae Rosae
hanc speciem esse: neque Violae propriè dictae ge-
nera sunt, quae vocantur Leucoia Dioscoridis, &
Leucoion Theophrasti. Oleum de Nesrin utile est
adversus pleuritidem ex atra bile, & uteri dolores, A-
ben Mesuai. Haec Gesl. cujus argumentum mihi
non

non satisfacit, quo negat Rosam moschatam esse Nesrin Avicennae, quod desumptum est à viribus. Rose enim muschatae sunt calidae, & prestare posse videntur quae Avicenna attribuit Nesrin. Sylvio Rosarum calidissimae sunt, ex odoris gravitate insigni: sapore quoque amaro, cum acrimonia & adstrictione non pauci. Sylvestre etiam Nesrin si est Rosa nostra sylvestris, optimè respondet viribus ei attributis ab Avicenna, quae contraria in quibusdam facultatibus & viribus Rose Moschatae. Ieseminum quod Gesnerus loco Nesrin sumere mavult, nobis non videtur calidius Rosa Moschatae vires. Rhasi adscriptae non repugnant: odor ejus non minor quam Iesemini, cerebrum valenter feriens, & caput tentans. Amato. Quod Serapio scribit de purgandi vi, optimè convenit Rosa Moschatae, quae violenter purgat. Annotavit enim Amatus purgare non minus quam Scammonium, ac ideo abstinendum ab eis suadet: historiam recitat mulieris, quae ex gustato condito harum rosarum, faucium & linguae excoitationem cum stomachi rofione contraxerat. De Iesemino id non constat. rosa mosch. simplex flore est satis simili Narcissi flori, qui roseus. Odor etiam vehemens, nec vires tantum differre putamus, quantum putat Gesnerus: perpendantur vires Narcissi à Dioscorido traditae.

Synon. cum
nomine
linguae.

Cam. h. Rosa Damascena quasi de Sene apud Arabas, sive Muscatae simplici flore & praecoci, ex albo flore ad puniceum nonnihil vergentem habentes. A quoniam quaso praeterquam à Cam. observatus est talis color in Rosa Moschata. Tab. Rosa muscata alba, Weiß Muskat Rosen/ Damascen Rosen/ Biesem Roslin. Lugd. Rosam Coronatam sive seram, sive autumnalem, Damascenam esse cum pluribus autumnat, tunc quoddammodo proveniat, tunc quoddammodo odore suavi praedita sit: Gallic. Rose Musquée, & Muscadelle. Ital. Rosa Moschata: Tradit praeterea ex Damascenis unam quinque tantum foliis esse, eam florere Maio, ac iterum Septembri. Et hoc nemini mirum videri debere ait, quod sint etiam pestanae Rose biferae. Ger. Rosa muscata simplici flore Angl. The simple muscat Rose. Belg. Ghemeen enel musque Rose.

Damascena
maior.

C. B. pin. Rosa sativa n. sive moschata simplici flore, Nesrin, vel Nesrin Serapionis, Ang. Rosa muscatula, Cast. Rosa alba Damascena fl. simplici, Cast. Rosa Damascena (quasi de Sene apud Arabes) simplici flore, Eyst. Haec minor est, & major Rosa muscata cum silv. cum domibet, rubra, alba & viridis, Bellon. lib. de cult. meminit.

Montbelgardi copiose floruit etiam Autumno, sed tandem gelu contracta est frigoris rigidioris impatiens. Monspelij floruit qualis descripta est, Autumno & mense Maio. Lugduni ubi frequens, vidi florentem Augusto, Septembri & Octobri, Geneve etiam Novembri. Florent in Italia ut audit Gesnerus toto ferè anno: Augusto vix ante Autumnum.

ROSA MOSCHATA MINOR, flore pleno.

Defect.

Rosa Moschata flore pleno similis est simplici, habens in flore foliola exteriora majora, interiora minora: Videtur Lobelio Sylvestrem exuisse animum olitorum arte & mangonio, & hortensis duplicata.

Synon.
Damascena
maior
autumnalis.

Muscata
multiplex.

Lugd. Rosa Damascena, sive Autumnalis altera, densa foliorum congestie, & eximia odoris suavitate delectans. Cels. h. & Ger. Rosa muscata multiplex. Dod. Rose sativa & species rarior multiplex. Lob. Adv. & Ic. Rosa muscata. T. b. Rosa muscata alba multiplex. Cam. h. Rosa Damascena flore pie-



no, Coroncola Plinij quorundam, quoddammodo coronae odorantibus ne nectantur & autumno nascantur. Quatuordecim posterioribus saeculis primum Italiae innotuerunt. Quid enim mirum, quamvis multa Theoph. & Plinio Rosarum genera numeretur, alia etiam extitisse nostra aetate. Tan- toper enim diversis locis per se & humano opere coacta variae naturae suas opes.

C. B. pin. Rosa sativa n. sive moschata fl. pleno, Synon. C. B.

Coroncola Plinij: Rosa muscatula multifolia, Cast. Rosa alba Damascena fl. pleno, Cast. Eyst. Rosa Coroncola altera, Lugd. Pernefina Plinij, aliorum.

Ger. Weiss gefüllte Muscat Rosen Belg. Dobbel Musens Rose Ang. The double Muske Rose.

Rosa Moschata duplici conduntur & citantur passim in Italia, Venetijs praesertim: alvum jucundius, Lob. sed vehementius cient, & anioni deliquia, stomachi cordisque lacerationes accersunt. Sed quam jucundè cient alvum, si tam prava symptomata excitant evacuando, videant lectores.

Ling. nomine

Virr.
Alvum.

Dob. raxa
pur.

ROSA SYCCHARINA PLENA.

Anno 1708. Maio mense in horto fontis & bal- Ancei admirabilis, occurrit Rosa haec albi non visa, spinis multis, ut Incarnata, horrida, cui & folia ferè similia, utrinque pilosa, quinque vel sex foliolis constantis, ad pediculi originem lata, veluti duae aeneae, crispiora, quam Incarnata: capicula hispida, breviora, crassa: floris color ruber. Aiebat hortulanus vix in totum explicari eam Rosam Idibus Iunij.

Defect.

ROSA LUTEA.



Rarior & speciosa est Rosa lutea, spinosis virgis, foliolis glabris quinque vel septenis, vix tantillum horridis: floribus luteis simplicibus, cum gravitate odoratis: pomis brevioribus, ventriscofioribus: repit & multum se propagat. Haec ita delineat Lugd. Rosa lutea virgibus in- di- lutea aurea dicta, quod luteo aureo, ve colore fulgeat, à ceteris Rosarum generibus solis, flore, odore, libet.

Defect.

Rosa aurea
Scribitur
multa.

pans: Nam parva ejus folia sunt, rotunda, obscura viriditate.

viriditatis, valde infecta, incisurarum crebris propemodum nigentibus, caulis valde spinosis, flore aureo sive luteo, cetera aliis simili, sed simplici & quinque tantum foliis constante, odore gravi atque ingrato: accusanda natura quæ floribus egregio suavem odorem, id est, roseum invident, quo si non careret, haud postremum locum inter flores excellentes obtineret: delapso flore poma succedunt aded Sorbis similia colore, figura & interdum magnitudine, ut imperitus ac inexercitatus, ea vix a Sorbis discernat.

Synon.

Rosa cro-

cea

Vulpina.

Bellon. Rosa Alexandria, & totius Egypti, flore luteo sine odore. Card. ter. var. Rosa crocea male olens. Gesn. h. Rosa citrina seu lutea, quam Augustæ ali in odorem audio (& vulpinas cognominari) frutice tamen odorato: End. Rosa Indica magna, coloris aurei, VVeisselz. Sed quid si forte VVeyselus intelligebat florem majorem Africanum? Lob. Adv. & Ic. Angl. Can. h. Tab. Ger. Cast. & Carl. Rosa lutea. Dod. fl. & hist. Rosa s. sive Rosa sylv. lutea dicta. Matth. Rosa quædam Italica aureo colore fulgens, sed odore admodum ingrato atque insuavi.

Rosa lutea.

C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplici, Eyst.

Locus.

Luteam Rosam Egypti & Africae plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cum aliis sæpe vidi, inquit Lob. Argiera Africa, ex Numidia Gallia inquilinas factas: tam in Anglia consimiles, solerti manu in Genistæ scapum insitas, unde colorem virisq; mutantur novas. Si

Lob. notat.

Lobel. vidit cur non demonstrat discrimen inter naturales & insitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hactenus cor spexi non solum colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distinguere vires expertus cur non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ surculum facto foramine per Genistæ scapum tractum, luteos flores producere.

ROSA LUTEA FLORE PLENO.

Locus.

Amidud Clusius flavas Rosas, multiplici foliorum serie præditas, extare accepit: Viëna enim Austria ad ipsam senescibat nobilis Matrona, ejus ipsi factam esse spem. Et ceterè paucis post annis intelligebat non inodè Matronam illam similem platanum adquisivisse, sed etiam Pragæ in Cæsareo horto alitum in quibusdam Germaniæ locis reparari apud eos qui in colendis peregrinis & elegantibus plantis operam collocant. Inter illos Frid. Majerus Argentensis, anno 1601. digitalis longitudinis ramulum binis foliis præditum & florem sustinentem flavum multiplici foliorum serie constantem, ad eum mittebat, sed prorsus aridum: sed & anno insequente ab eodem accipiebat similis Rosæ surculum sine radice, spinis armatum, perinde ac hi qui florem flavum simplici quinque foliorum textura constantem ferunt, atque foliis illius prorsus similibus.

Syn. C. B.

C. B. pin. Rosa sylv. 12. sive lutea multiplex: Rosa flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post. Rosa lutea maxima flore pleno, Eyst. Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet. Germ. Geel Rosen. Gall. Roses jaunes. Angl. The yellow Rose.

ROSA SUBVIRIDIS ET caerulea.

Si in teneras Agnoli arbusculas Rosas inferant, vides flores producere scribunt aliqui apud Camerarium. Quamvis interdum anni constitutio

ne frigidiore & humidior, herbacei coloris rosæ, sine calyce proveniant, cuius causam Collatus de natur. stirp. explicat.

Hæc est Rosa laeva 16. sive Rosa subviridis, C. Bauh. pin.

Est & jam diu videre, ut refert Lob. & ex hoc Lug. Rosa Caerulea. Caeruleas Rosas in hortis Italicis, Sed optatim ego scire hortos, si extent, ubi proveniant, & qua in re differant à cæteris Rosis.

ROSA SEMPER VIRENS, Clusio.

Mittebat ad me, inquit Clus. Patavio Joachimus Lungermannus anno Christi 1592. cujusdam Rosæ semen, ejus sch. dæ inscriptum Rosa semper virens: ex eo Francofurti terræ commisso nate sunt plantæ, quæ mirificè quidem luxuriarunt, sed nulla florem protulit, præter eam quæ translata in Academico Lugduni Batavorum horto alebatur, ejus flos demum anno 1605. conspectus est Julio mense, magna tanè meâ lætitiâ: valde enim metuebam ne adeo adulta nullum florem proferens, soli mutatione sterilis evasisset. Multis porro hæc Rosa statim à radice luxurat sarmentis flexilibus & exducis, nisi quis palo sustineat, aut ad parietem applicet: nam non valde crassa sunt, sed lenta, viridia, spinis rubescentibus, hami instar aduncis & muctone verius terram converso obfita, ut pleraque ferè omnia Rosarum genera, eaque alternatim ambiuntur à foliorum alis, septem interdum, sed quinque ut plurimum, foliis præditis, ex adverso sese spectantibus: horum duo quæ latiori alæ sedis, quæ ramum amplectitur, proxima, minora sunt, bina alia quæ succedunt illis duplo præ majora, quintum extremam alam occupans, & imparem s. unum faciens, omnium maximum: singula autem à nervo medium folium occupante aliquot venas habent ad folij oras excurrentes, s. in ambitu sunt serrata, & præ viriditate splendens, nec dehuunt ut in aliis Rosis, sed etiam hieme permanent: eam ob causam Rosa semper virens nomen illi inditum. Novo verè ex flagellis illis sive sarmentis foliorum alis multi oriuntur novelli rami, initio quidem cum foliis nonnihil purpurascens, deinde verò colorem viridem contrahentes: quorum nonnulli summo fastigio ternos aut quaternos gerunt flores uncialibus gracilibus petiolis subnixos, quinque foliis penè uncialibus constantes prorsus nivei candoris, è quorum medio plura staminula prodeunt candida, flavis apicibus insignita, & inter illa capitellum hirsutum albicans. Floris odor suavis est, & ad Rosæ moschatæ simplici quinque foliorum seriem habentis odorem valde accedit, sed nec ipsius floris forma valde dissimilis.

Nomen

virens.

C. B. pin. Rosa sativa 18. sive Rosa moschata semper virens fl. albo, Clus. hist. app. alt. auct.

DE ROSARVM COLLECTIONE, delectu, repositione, & substitutione.

Debent igitur Rosæ tempestivè colligi, antequam penitus apertæ, & cum adhuc clausæ, configurationem imitantur & in umbra siccantur: s. priusque, ne situm contrahant, verè ad suos usus reponi. Hæc Cordus eadem serè. Fuch. de compos. medicam. Sunt, inquit Sylvius, præstantissimæ quæ longè omnium suavissimæ sunt, & aliis rubicundiores, quales ex montanis, non autem convallibus leguntur: siccandæ loco sublimi meridiano, quo solis radij penetrent, rosas tamen non tangant. Nam albae anar.

Colligendi

tempus.

Delectum.

ubi & quomodo sic

candæ.

hæ, incarnatz, moschate, quamvis recentes odora-
tissimi nã sint, tamen siccatz sunt in odore rubra con-
tra recentes parum odoris reddunt, siccatz jucun-
dissimi nã & diuturnissimi jaculantur. Ex agro
montoso petroso Pruni urbis, unius diei itinere à
Parisiis distat in universam propè Galliam om-
nium præstantissimæ convehuntur, in territorio ta-
men Parisino non insuaves præsertim vico cui Fons
Najadum nomen etiam vulgè est, larga manu luxu-
riant fabulosis vineis, quæ urbi toti satis esse pos-
sunt, ut Pestanas & alias præcis celebratas rosas,
non desideremus. Rubras ad nãdum foliis paucis &
planis præditas præfert Mesues. Rosæ tardius colle-
ctæ parum diu servantur, & citò nigrescunt, tempe-
stivè lectæ biennio servantur: cū igitur mediocri-
ter sunt apertæ, mox integre insolentur, sæpè mo-
vendæ, deinde folia avulsa, vase terreo claudantur,
ne odor aut color pereat. Si quo die sunt lectæ sol
non luceat, raræ disponuntur, ne se corrumpant
densatz. Rosæ igitur mediocriter apertæ sereno ex-
lo manè lectæ eodem die ut sunt, siccantur sole, si
potes, sæpè vertendo. Nam vix umbra siccaverit
quamquam id esset optatius, siccitas avelle, & re-
conde, ut dictum. Meliores montanz campestris-
bus, & minis minuuntur siccando, cum ex harum
libris decem siccatis libr. urica superest quibudam,
idem de Violis. Hæc Sylvius, qui de rosarum tritu-
ratione & siccatione pluribus agit, quæ si cupidus
scire desideras, ipsum leges. Rosæ cū absolute
scribuntur, rubræ semper & verè rubedinis ex Mo-
nachis intelliguntur. Vbiunque autem pecuntur
rosæ recentes, si non habentur, faciendum est po-
tius sine eis quàm cum siccis. Et contra scilicet in
defectu siccarum non sunt apponendæ recentes.
Quamvis hæc rarissimè in aliqua urgenti necessi-
tate possit accidere. Quia facilius possumus siccare
Rosas tempore suo, quàm extra tempus congruum
invenire recentes. Idem autem Monachi (salvo
semper meliori iudicio) in defectu Rosarum recen-
tium, ponendum succum ipsarum putant. Et pro-
priè drachmam pro uncia, scilicet quodd pro quali-
bet uncia rosarum recentium, ponatur drachma
vel circa, ex ipsarum succo. Præstantissimæ, quæ
purpureo colore rubent: proxima laus iis, quæ in ru-
tum candicant: vilissimæ albicantes in quarum
tamen genere, ex odoratissimæ excipiuntur, quæ
Hetruscis Damascenæ, & aliis M. schette vulgè di-
cuntur. Siquidem non modo cæteras excellunt,
quodd odore admodum suavi fragrent, sed quodd
etiam magis alvum subducant, id quodd indicat
earum jucundissimus odor. Hæc Matth. An ju-
cundissimus odor indicet magis alvum subducere
iudicent alij. Idem, sunt Rosæ rubræ minis odo-
ratæ albis, quæ verò purpureæ, sunt omnibus odo-
ratiore: croceæ autem etiam malè olent. Hujus
quidem rei reddit rationem Cardanus: Ruber, in-
quit, nimis siccæ sunt: accidit autem, ut in tenui
substantia, citò siccum exhalet, velut & in sylve-
stribus: albe autem, quoniam nimis humidæ sunt,
non tam benè olent, retinent tamen magis odo-
rem: purpureæ cum temperatæ sint, optime o-
lent, & diu retinent odorem. Croceus color in
plantis sit, evanescente calore nativo: sed non
croceus qualis croci, sed qualis competit rosis,
& qualis palmarum foliorum arescentium, unde o-
dorem potius tetrum efficit. Si Rosas totò an-
no habere velis, flores semper apertos sub vespe-
ra sub divo habeto, manè siccabis vitæ re-
conde, vas obtura, sepelito in arena sicca. Alius
modus: siccatas rosas madescent aqua rosacea, in-
de per quinque dies in vase figulino sepelias. Ali-
ter, præcis botros circumligas, in arundine

Tom. II.

ponere, claudere os cæra & sepeli. Sed longè melius
Palladij experimentum, decerptos enim botros a-
rundini virenti & plantatæ discisso nodo impo-
nes, & nodi partes coite patie iis, abscessa arun-
dine cum opus fuerit botros excipe & aqua tepida
fove. Nos accipimus folia Vitæ, & modico sale a-
spargimus, rosarumque bulbones interponimus ad
modum strati superstrati, ac simul omnia ad usum
cum aceto in vase vitreo foliis Vitæ superpositis
benè obturato natantia conservamus.

ROSARVM VIRE ET
usus.

Dioscoridem potissimum de rosis rubris scri-
bere, ex sequentibus ejus verbis satis con-
stare arbitror. Rosæ, inquit, stringit & adstringit.
Sed sicca [sicca, Martell. nota recens] magis ad-
stringit. Succum autem exprimere oportet & te-
neris, fornice defesto eo quodd unguem vocant: re-
liquum autem exprimere, & in mortario terere in
umbra, ita ut assidue vertantur, ne siccum corrumpantur.
Facit id quodd aridis rosis in vino coctis ex-
primitur, ad dolorem capitis, oculorum, aurium,
gingivarum, sedis [sicca, Martell. nota recens] unguem exempli. Dioscorid. in
intestini recti, & uteri, penna illi & assulum.
Ipsæ verò citra expressionem convulsæ & impositæ, virentium
ad præcordiorum inflammationes faciunt, & ad
ignes sacros. Sicca verò citra femora [sicca, Martell. nota recens] unguem
unguentum, semina versit Ruel. & Sarracenus: in quibus-
dam exemplaribus errore forte Typographi legunt, & sic-
ca semina consperguntur] asperguntur, & compo-
sitionibus antheris dictis, & vulnerariis antidotis
ammiscentur. Utuntur etiam ad medicamenta or-
nandis palpebris commoda. At qui in mediis Ro-
sis reperitur flos, is siccus aspersus ad gingiva-
rum fluxiones facit. Capita verò potè, alvum
fluentem, & sanguinis rejectionem cohibent. De Rosis ita passim Galenus: In Rosæ natura
aliud gustantibus acerbum est, quodd terreum ut
sit & crassum frigidumque necesse est: aliud ve-
rò amarum, quodd tenue est & calidum, & ter-
tium in his aqueum, necessario quidem frigi-
dum, sed in tenuitatis crassitudineque opposi-
tione quadantenus summorum medium, cujus
mistura neque ipsum illud acerbum, neque ip-
sum amarum summe est tale, quale dicitur: qua-
litates enim omnes exolvit aquei admistio. Ipsum
itaque hoc aquum elaboratum, extenuatumque,
atque exaltatum quodammodo videtur, ac per-
inde facile in vaporem solvi, & hac ratione ro-
sam tum odoratam esse, tum celeritè reficari.
Atque hæc omnia de eo ex gustu conicias. Ro-
sarum flos magis etiam ipsis rosis adstringit, ac
proinde sanè etiam exicatorius est. Quin ro-
las experiri eundem suavi, sensuque in noctur-
nis venereis imaginationibus ex his substratis le-
vamen citra ullam rerum noxam. Liceat repe-
riatur Medicorum plerique qui experientia pos-
habita, an rubra sit rosæ, an benè olens, con-
siderant, negligentes ubi caput ipsis exstuat,
coronis ex Rosæ contextis, capitique impositis,
aut succo ejus, aut oleo rosaceo, sic vel ipsa e-
pendentia, id quodd res est, discere. Nam si ex-
calscant, magis etiam calida fuerit: sin refri-
gerentur, frigida: quodd perinde est, atque re-
frigeranda humanæ naturæ facultate pollere, &c.
Et profecto experientia quidem ratio tam facilis
est, cū in rosis, tum in cæteris medicamentis o-
mnibus. Nam Rosis aut coronari liceat, aut eis con-
tatis hominis æstuantis os ventriculi illinere, aut
succum earum expressum obicere, aut oleum aquæ ve-
mistis aliquam corporis partem conficere. Sed quid

E

HISTORIAE PLANTARVM

hæc multis commemorare, cum nonnulli mistum Opobalsamo, rosarum succum sub canis ardoribus refrigerij causa corporibus inungant, usu videlicet ipso docti, cum hoc fecerint abundè refrigerare, &c. Verùm rosa illis nequaquam his in rebus propinqua est: tametsi quod ad caloris tepiditatem & essentia tenuitatem attinet, perquam sanè & ipsa inflammationibus in hypochondriis consistentibus utilis esse possit, nisi adstrictio (quæ una quæque illi inest) multifariam læderet, quæ maxime illis obest, in quibus Chamæmelum præcellit, nempe condensata corpora rarefaciens, indurata molliens, tensa relaxans. Nam his omnibus inimica adstrictio est. Attamen ad ascensum augmentaque inflammationum, ac potissimum earum quæ in exterioribus membris extant, Chamæmelo rosaceum præfertur: quippe cum hæc tepida caliditate cum leni adstrictione indigeant. Eademque ratione idem caput ab odore rosarum iuvare consentaneum est, cum à solis exustione laborat. Apud Plinium de rosis sequentia comperimus. Excalfactoria & rosæ Corn. Iunci cum resina imponitur excalfactoria. At rosa adstringit &c. primum vocabulum ad superiora refertur uteros astringit, refrigerat. Vfus ejus dividitur in folia & flores. Folium siccatur, aut tribus modis exprimitur. Per se, cum ungues non detrahuntur: ibi enim humoris plurimum. Aut cum detractis unguibus reliqua pars aut oleo, aut vino maceratur, in sole vasis vitreis. Quidam & salem admiscunt & Anchusam nonnulli, aut Aspalathum, aut Iuncum odoratum, quia talis maxime prodest vulvæ & dysentericis. Exprimuntur eadem folia detractis unguibus, trita, per linteum spissum in aræum vas, lenique igni succus coquitur, donec fiat crassitudo mellis. Ad hoc eligi oportet odoratissima quæque folia. Vfus succi ad aures, oris ulcera, gingivas, tonsillas, gargarizatus, stomachum, vulvas, sedis vitia, capitis dolores. In febre per se, vel cum aceto ad somnos, nauseas. Folia uruntur ad calliblepharum. Et siccis semina [semina forte meliora] asperguntur. Epiphoras quoque arida leniunt. Flos somnum facit. Inhibet fluxiones mulierum, maxime albas, in posca potus, & sanguinis excretiones. Stomachi quoque dolores, quantum [tamquam] in vini cyathis tribus. Semen his optimum è crocinum, nec aniculo vetustius: & in umbra siccatur. Nigrum inutile. Dentium dolori illinitur. Vrinam ciet. Stomacho imponitur. Item igni sacro non veteri. Nanbus subductum caput purgat. Capita pota sanguinem & ventrem sistunt. Ungues rosæ epiphoris salubres sunt. Hæc enim oculorum rosæ sordescunt, præterquam iniunctis epiphoris, ita ut arida cum pane imponatur. Folia quidem iniunctis stomachi rosionibus & vitis ventris, & intestinorum & præcordiis utilissima vel illita. Cibo quoque lapathi modo condiuntur. Cavendus in his situs celeriter insidens. Et aridis & expressis aliquis usus. Diapasmata inde sunt ad sudores coëcendos, ut à balneis inarescant, corpori, dein frigida abluantur. Sylvestris cum adipe ursino alopecias mirifice emendat. Vfus rosæ in coronis propè minimus est [putamus legendum, ut videtur ex vet. legisse Ruffum, nimis] Oleo maceratur, idque jam à Trojanis temporibus, Homero teste. Emplastris atque collyriis inferitur mordaci subtilitate. Mensarum etiam delictis inungendis minimè noxia. Rosæ ut complacet Mesue, est frigida primo gradu, sicca secundo, ex substantiis diversis etiam separabilibus composita: aquea quidem mediocri & terrea adstringente, materiam ei multam præbente: æra verò dulci & aromatica: ignea denique tenui à qua est amaritudo, robur, perfectio & forma. Ignem tamen substantia vis, quæ ruborem & speciem impressit,

valentior fuit quàm quæ amaritudinem. Ob id hæc sola siccatione perditur, illis adhuc permanentibus: quæ si perierint, non magis rosa fuerit, quàm homo mortuus est homo: recentes tamen sunt amaræ magis: quàm adstringentes. Ob eamque amaritudinem rosæ recentes, succo præsertim purgant: siccata verò resoluta caliditate amaritudinem excitante, substantiam stypticam & constipantem ostendunt. Succus autem rosarum calidus est, propè ad primum gradum, quia est à substantia terrestri & frigida secretus: purgat, resolvit, aperit, terget. Siccæ verò rosæ est frigidior, & magis styptica & ea magis, quæ non sunt perfecta, & alba magis, quàm rubra. rosæ præterea resolvit, intemperies calidas extinguit: partes cogendo & constipando roborat: id autem semine & pilis in calycis medio inventis maxime. Cum autem Rosæ sint rubræ, & albæ, & ambæ foliorum multorum, vel paucorum: crispiorum, vel planorum: in utroque genere est præstantior, cui color genuinus est perfectior, & folia adstant pauca & plana. Albæ nihil aut minimum purgant, potentius tamen adstringunt & roborant quàm rubræ. Succus completarum est melior, idemque & aqua, in qua recentes & perfectæ sunt macerata: purgat bile flava sanguinem venarum & arteriarum: Confert utero, quia obstructions ventriculi & hepatis aperit & expurgat. Cor, ventriculum, hepar roborat, cordis tremorem sanat, vacuata ejus causa. Febribus biliosis confert. Eadem partes roborat oleum rosarum & aqua sublimando ex rosis educta. Corrigendo substantiam ipsarum laxam facultatem retentricem roborant, inflammationem omnem extingunt, & ab ea dolorem sedant, somnum conciliant: coryzam tamen & sternutationem excitant, catarrhis obfunt: uva nstringunt, & guttur, & roborant ea, crapulam auferunt. Rosæ etiam sit medicamentum benignum, sed ad purgandum inbecillum, & miniculis quibuscumque eger, ut sero lactis, melle: succi enim rosarum uncia una cum seri lactis unciis duabus, aut tribus, & pauca Spica, commodè vacuat: foliorum quoque in sero lactis infusorum, cum paucis melle expressum sine molestia purgat. Syrupus quoque ex succo rosarum, & rosis ipsis est elementer purgatorius. Oleum verò Rosarum, valentium medicamentorum, ut Scammionij, Euphorbij, acrimoniam potu obtundit, & noxam à siccitate Myrobalanorum corrigit: ut oleum violarum, Amygdalarum dulcium, Sesaminum, Omphacium. Rosæ melle conditæ tergent, purgant, roborant: saccharo autem mundis tergent, magis roborant, & adstringunt. Aqua cui infusa sunt rosæ, mundum facit, terget, purgat: per sublimationem verò facta, multum roborat, non purgat: quia subtilis ejus caliditas igni est dissoluta. Acetum Rosarum inflammationes omnes sedat, incidit, purgat, roborat. Rosæ præsertim recentes, coctionem nullam sustinent, facultas enim earum tergens & purgatoria, mox igni resolvitur, remanet adstringens, jam planior. Succus autem earum mediciter coquendo fit tenuior, & potentius terget. Oleum præsertim Omphacium cum rosis imperfectis insolutum, valentius refrigerat & adstringit. Oleum verò dulce, ex maturis olivis expressum, vel setigum cum rosis perfectis insolutum, potentius resolvit. Datur Rosarum succus ab uncia una ad uncias duas: Syrupus autem cum succo earum factus, ab uncias duabus, ad uncias quinque.

Non video, inquit Monardus, à Græcis, neque ab Avenis inter purgatoria medicamenta reponi rosam, experientia tam inopia, collocari inter ea debere ostendit: cui etiam Diosc. consentire videtur, Rosaceum unguentum vires habere dicens, ad solvendam alvum conducentes: Quod dicit Meues, Rosam

Inflammationibus

Vires ex Plinio

Plin. corrigitor

Succi usus

Pulvis

Semina

Vrinam ciet

Caput purgat

In cibis

Diapasmata

Temperamentum

Alisue

Purgant recentes

Succus calidus

Quæ rosarum frigida

Quæ præstantior

Infuso sero

Roborat

Oleum rosarum

Inflammationibus

Natura

Capula

Rosæ infusa

Oleum

Mel rosarum

Aqua ex infusione

et sublimatione

Acetum

Rosæ coctionem non

sustinent

Succus coctus

Omphacium

et adstringit

Syrupus

et adstringit

et adstringit

et adstringit

et adstringit

Rosam deperditā, rubedine non plus esse Rosam, quam homo mortuus. Hoc dictum valde est ambiguum: neque ex rubore speciem habet rosa: alioquin alba rosa, rosa non esset: colore etiam deperdito, servari odorem adhuc visum est & adstringendū vim. Sed respondetur Manardo Mesuem non habere rationem coloris quatenus ruber, sed quatenus, ut Sylv. dicit, Rubor signum inseparabile est forme manentis in rosa. Addit Manardus in doctrina Mesues (quod dixerit, per albas non fieri solutionem aliquam) apertum errorem deprehendi: albas enim de Seni vocatas, & vulgo Damascenas, cum albis sint ceteras in purgando excellere. Ei autem respondet Matthiolus, ut infra apparebit. De succi præterea temperamento adversus eundem hæc scribit. In arabica scientia unum pro cæteris maximum, graviterque vitandum invenit. Mesues namque, cui universa Medicorum caterva Evangelistæ nomen imponit, rosarum succum calidum esse scribit, quod ita animis quorundam insidet, ac si una rarique in arte sit veritas. Atque frigidum potius esse ex Græcorum voluminibus excepti, quod quidem ratione, atque complurium Medicorum auctoritatibus ita comprobo. Fiunt ex Rosis Oleum, quod virtutem habet refrigerandi ac medendi calidis morbis: Vnguentum, quod inflammationes placat: Syrupus, qui calorem febrium arceat: Saccharum rosaceum, quod stomachum & cor calidum firmat: Aqua, quæ per sublimatorium extrahitur, mirum in modum frigefacit, & inflammationes repellit: Diversa antidota, quibus rose sunt basis & fundamentum totius compositi, velut Diarhodon, utrumque Aromaticum, Rosata novella, & Pastilli, quæ etiam Rosarum sibi vendicant nomen: aut quia maiorem partem constituunt compositi, aut quia ipsis vigoreantur, vel ad temperamentum & correctionem commiscentur. Velut Mesues pro rectificatione Scamoniæ succo Rosarum utitur, in quamplurimis locis. Quod fecit Avicenna lib. 3. quo syrupum rosaceum laxativum ex Scamoniæ & succo rosarum, cum saccharo condidit. Et hæc omnia medicamenta, quæ ex rosis fiunt (si attentè prospicias) tam apud Græcos, quam Arabes ad nihil aliud videntur prodesse, quam ad inflammationes & calidos morbos expellendos. De aliis rose partibus, quas Plinius didicit, non memini me legisse illas ad aliud prodesse, quam ad refrigerandum, comprimendumque. Et nullam earum partem calefacere adhuc in monumentis Medicorum invenio. Porro, quod Rosarum succus gradum caliditatis attingat, nec gustis, nec experimentum hoc mihi demonstrant, nec ratio hoc convincit: maxime cum rosa ipsa, ut vel Mesues testatur, infrigidet in primo ordine, & omnes ejus partes hunc ordinem servant. Succus vero, qui per expressionem subducitur, manifestissime virtute frigida pollere videtur, cum partes aqueæ sint, quæ per expressionem subtrahuntur, ex unguibus & foliis ipsius Rose. Quoniam Aristotele teste, Omne quod divitur simile est illi a quo derivatur. Et licet in parte superiore Rose inhiæreat aliqua caliditas, adeo tamen exigua est, ut in extractione succi ferè tota evanescat: & si quæ permaneat, ob magnam aquositatem deperdatur. Unde si rosa sit in primo ordine infrigidantium, hæc ratione succus remanet in secundo, quoniam illæ partes calidæ, quæ erant in rosa, deperditæ fuerunt in succi expressione, quod ex gustu, nature medicinarum iudice cognoscere: si enim vel paululum ex eo biberis, laporem acerbum atque austerum in eo senties, qui coarctativam virtutem manifestè demonstrat. Non est tandem quod per odorem quatuor calidam temperaturam rosam habere: nam ut Gal. affirmat, ex odore sensibilem temperaturam non cognosci-

tur, ut ex gustu. Quod si castigator arguat, quod partes ruber superiores Rose sunt ex quibus calorem ministrant ipsi succo, hoc potius esset attrituendum infusioni rosarum, in quam permeant partes illæ subtiles rubor, quæ dant ei amaritudinem & ruborem. Quapropter potius dijudicarem infusionem habere vim solutivam, quam succum. Mesues autem non ad aliud infusionem saccharo confectam comprobat, quam ad morbos calidos febrium adstrictiones, pedorisque calorem. Sed nec ex colore succum rosarum, quoniam rubet sit, eandem temperari possidere dixeris. Neque enim calorem (inquit Gal. lib. de Ther. ad Pisonem) quod candida sit, visu duntaxat frigidam judicare, satis esse censemus: neque rosam quod rubea sit, ideo illam calefacere, statim pro certo habemus: sed undecum visu sensum quoque tactus adhibentes, calidam quidem illam, adeo ut urat, certo invenimus: Hanc vero quod frigiditatem e contrario in ea tactu percipiamus, ex refrigerantium numero esse, firmiter habemus persuasum. Pater enim ex eodem Galeno lib. simpl. per colorem temperaturam medicamentum non esse dijudicandam. Aëtius quoque sub primo infrigidandi ordine, Oleum rosaceum, ipsamque adeo rosam collocat, & sub secundo ejusdem rose succum. Præterea Galenus 5. & 10. m. m. succum rosarum esse tantum frigiditatis nos docet. Quibus clarius sole demonstratur, Mesuem hallucinari in cognoscenda temperatura succi rosarum. Sed & ipsemet sibi repugnat, multis in locis (ut in lib. suo de rectificatione medicinarum acutarum, præsertim ubi de rosa, & scammonio loquitur) demonstrans, succum rosarum frigidam potius temperaturam quam calidam possidere: quoniam tum ad medicinas valde calidas, tanquam frigidum rectificans adhibet: Scorum ad morbos calidos biliososque, ut febres cholericas, & inflammationes extinguendas medicinis commiscet: & ad repellendum, comprimendumque veluti in angina, pro ultima infrigidatione, succo rosarum utitur. Et hæc potissimum sunt rationes, propter quas nullam aliam in succo rosarum constituo temperaturam, quam frigidam. Neque omnino in hoc est culpandus Mesues, sed interpret, qui hunc locum vitavit, qui pro frigido, calidum esse succum interpretatus est. Hactenus Manardus, qui complures alias rationes de temperatura succi rosarum frigidam in medium adducit, quas brevitate gratia mislas facimus, quas si ulterius cognoscere cupis, leges ejusdem tractatum de Rosa, ejusque succi temperamento.

Sylvio rosa omnis amara est atque astringens, præcipue rubra, a qua substantia refrigerat, licet: flos autem ejus astringit magis, proinde etiam siccatur valentius: præstantissima est, quæ longe omnino suavisissima, & aliis rubicundior. Succus essentia est tenuissima, nam celeriter accescit, & lentore caret, & unguentorum omnium odores exolvit & obscurat. Ex rosis calidissimæ videntur Moschatæ, post has roseo colore insignes, incarnatæ dictæ, quæ & cerebrum valenter ferunt, paulo minus albae. Folia decem recentia, alvum eundem decies duxerunt, ostendit Tagaultium, refert Razis. Sicca autem folia, quia ab eis recessit amaror, laxativa non sunt, sed styptica, & adstringentia. Decoque Tragus, manipulum foliorum rose aridorum, in undia mensura vini albi & exhibet his, qui fluxionibus alvi laborant, aliquoties per diem bibendum. Quod si morbo producto, calor conjunctus fuerit, cum aqua rose confectioem instituit. Semina dura, quæ capitibus Rosarum insunt in pulverem redacta, vino pota, calculi apud eundem pellere traduntur. Faldem facultate nonnulli spongiosis (serp. Scip. s. s. s. vocatis) quæ silve filius adna-

Manardus
Mesues de
fenditur.

Rosarum
succus frigidus, cum
sua Me.
fuerit.

Item I.

Medica-
mentum a
rosis factum,
frigida &
dicitur.

Rosa ex
omni parte
tempera-
mentum
frigidum.

Ex flore
Rosarum
pateratur
non in-
frigidando.

Tempera-
tura rosa
ex colore
non di-
dicanda.

Mesues sibi
repugnat.

Mesues ex
censatur.

Calidiss.
moschata

Folia ro-
sarum pur-
gantia,
sive a. od.
fluorem
alvum.

HISTORIAE PLANTARVM

sciuntur rosas, si in pulverem redactæ aut in vino decoctæ calidæ sumantur, tribuunt. Succus est seu-
 tu rubeo maturo, totaq; sua substantiaculo expres-
 sus, posteaque siccatus, demumque in pulverem re-
 ductus, gonorrhææ, & tam rubris quam albis mulie-
 rum mensibus singulari experimento medetur.
 Rubra illa capita, antequam maturitate molles-
 cant, integra conservantur & siccantur, & ad præ-
 dictas affectiones vino decoquantur & potantur,
 quod etiam medicamentum & dysentericæ & cruentis
 excreationibus unice prodesse experientia non se-
 mel docuit. Omnia rosarum tam sylvestrium quam
 domesticarum genera refrigerantis sunt & adtrin-
 gentis natura, præsertim verò rosæ sylvestres ari-
 dæ. Sylvestrium rosarum maximè earum quæ Ha-
 berrosen appellantur aquam distillatam nonnulli
 majoris faciunt, & efficaciorē credunt, quam do-
 mesticarum. Ea namque quibusvis calidis affectio-
 nibus prodest, refrigerat namque & reprimat om-
 nes cholericas & acres exhalationes, & cor in deli-
 quio animi confortat. Ad confectiones quas vo-
 cant, Maris Christi, & Zulapium rosatum, primo
 loco eas quas vocant Haberrosen: secundo quas
 Stramentosen: tertio rubras domesticas eligit Tra-
 gus. Aqua ex rosis nunc commemoratis distillata,
 doloribus capitis in linteolis imposita, neque non
 fronti pariter citu applicata epiphoris oculorum unice
 prodest. Virtus, inquit Langius, rosarum laxati-
 va, & odonifera, in supernis ejus partibus consistit
 at astringentia & roboris altit in internis delitescit.
 Fuchsius ex Senecone Sethi has adscribit totis facul-
 tates. Odorata calidis capitibus prodest, humidā
 verò offendit, eaque distillationi obnoxia reddit.
 Sumpta verò febres ex flavā bile procreatas juvat,
 & roborat stomachum & jecur. Proprietate autem
 quadam testes le die, prohibetque acres exhalatio-
 nes ne in caput ferantur. Spongiolæ ac fructus Cy-
 norrhodi mirifice valent contra calculum, & Urinæ
 difficultates si lavigata in pulverem exhibeantur.
 Nos contra Fuchsium nihil facimus ad calculum &
 urinæ difficultatem nec semina, nec spongiolas, ob
 eorum astringentem & siccitatem, nisi fortè prosit
 per accidens eo modo quo scribit Dodonæus, cu-
 jus verba postea ponemus.

Succus ut placet Matthiolo, medicamentis
 componendis expetitus; præstantior est puniceis
 elicitur, item ex subrutilis, verum huic infirmior fa-
 cultas. Dilutum Græcis ἀνθόσυμα, è quo rhodo-
 pharmacum alium innoxie deiciens conficiunt,
 plerumque ex subrubescensium maceratis aqua so-
 lis paratur: ethi hæc in re iis Damascenæ Hetruscis
 vocatæ longè præstant: quippe ex earum viceris
 devoratis solis facile quidem, & citra noxam sub-
 ducitur alvus. Albicantes deinde rosæ (Damasce-
 nas tamen exceptas vult Matth.) non alium sibi in
 Medicina vendicant usum, quam ut ex se aquam
 stillent: siquidem iis dejectoria vis, qua possent pu-
 niceæ, ac subrutilæ, multò infirmior inest. Quam-
 obrem videtur Manardus immeritò id Mesum vitio
 vertisse. Nam albæ, quas Damascenas appellat,
 est majore deieciendi vi ceteris præstant: creden-
 dum tamen est de iis non intellexisse Mesum, quod
 eas illi facile incognitas fuisse existimet: verum de iis
 albis tantum, quibus passim rosæta florent, ejus
 rei illud maximo argumento esse potest, quod Da-
 mascenæ Hetruscis vocatæ nuper in Italia florere
 ceperunt, quodque eas veteribus cognitæ fuisse
 (quod sciat) memoriæ prodiderit nemo: si fortasse
 eas credamus esse, quæ Plinio spinetæ appellantur.
 Sylvestres majore astringendi facultate sunt præ-
 dictæ quam sint, sed minori fragrantia redolent,
 atque deieciendi alvi ne tantillum quidem faculta-
 tem retinent. Idem inquit, Germ. Puris exalfectis

& exornatis ab urina circa pulenda aspergendis
 pulvis Rosarum. Ex calcibus distillatur optima a-
 qua adversus omnia profluvia, nullis illæstimanti-
 bus oculis. Verum in spongiolis dicuntur poten-
 tiores esse ad calculum, ipsis spongiolis. In a-
 polog. adversus Anathim, nihil, inquit, ad me at-
 tinet de illa, quam adducit, muliercula Amathus:
 Primam scipis ipsemet id sumpsit medicamentum
 aliisque frequenter dedi sine ullo prorsus incom-
 modo, adeo ut quandoque pueris felicissimè propi-
 naverim. Præterea mansa hæc rosa nullam peni-
 tūs gustui relinquit acridinem, sed tantum se osten-
 dit tum adstringentem, tum etiam subamaram. Id
 quod manifestè indicat, ut nulla faucium, aut linguæ
 erosio, inflammatione hinc degustantibus accede-
 re possit. Mihi enim hæc rosas sæpè mandenti, ut
 quandoque adstrictam excitarem alvum, nihil ero-
 sionis, inflammationisque accessit. Quod sit ut quis
 rectè opinari possit delusum esse Luitanum, utpo-
 te qui hujusce medicamenti facultatis penitus igna-
 rus, symptomatis illius causam in illud perperam re-
 jecerit. Cum potius credendum sit id ab acrimia
 salforumq; succorum defluxu provenisse, qui fortè
 fortuna eo tempore, quo rosaceum illud saccharum
 mulier illa sumpsit, à capite in eas partes labi cepit.
 Atque magis sanè demoror, quod tam acriter dam-
 naverit has Damascenas rosas odore perquam suavi
 fragrant, è quibus clementissimum illud paratur
 medicamentum nullo penitus incommodo alvum
 ducens. Præter id, eo ignorantia pervenisse con-
 stat, ut terebenti persuaserit leneliabin è Persicis
 rosas parari, de quo pluries in febrium curatione
 & ventriculi dolore meminit Avicenna, ex Persici
 arboris floribus parari debere: sed quæ falsè teneat-
 ur opinione, ipsa ostendit medicamenti nomencla-
 tio, quippe leneliabin Mauntaris omnium præcla-
 rissimorum Medicorum consensu nihil aliud designat
 quam Mal rosaceum. Constat enim per rosas Per-
 sicas nihil aliud voluisse Avicennam, quam Puni-
 ceas. Siquidem lib. ubi is de medic. compos. om-
 nium egit, de quibus in universo meminit volumi-
 ne, leneliabin ad febres, & ventriculi dolores parari
 jubet è rubris rosis, non autem ex Persici arboris
 floribus. Id quod manifestè indicat, nil aliud Persi-
 cas rosas Avicennæ designare, quam Puniceas, Per-
 sicas illi fortasse vocatas, quod à Persis in suas ve-
 nerint regiones. Nam & nos Damascenas vocamus
 eas, de quibus diximus, quod è Damasco Syriæ pri-
 mò ad nos pervenerint. Et hætenus Matth. qui vi-
 detur causam rubedinis in rosis tribuere calori sta-
 tueretq; è rosis rubras subrubentibus esse calidiores:
 dixit enim, ab ære vero & s. b. d. n. c. m. & odoratum sap-
 rem assuunt: Ex his demum, quæ igno naturam sequun-
 tur amarorem conspiciunt, ac etiam color rubedinem, qua
 fuitet rubundo spectantur. Quo sit ut plurimè calid-
 ra puniceis quam s. b. r. b. r. b. m. Sed hoc Matthioli ar-
 gumentum in firmum esse, constat superius ex Ma-
 nardo. Quam porro utiliter lotionibus, & clyste-
 ribus, ad inhibendas fluxiones unguis, qui ab au-
 toribus nullam propriam receperunt dosē, inse-
 rantur, judicent alij. Plinius dicit urguis epiphoris
 salabres esse.

Sunt Amato in Dioscoridis quædam Rosæ rubræ, cras-
 se, stypticæ, ex quibus Zuccarum rosaceum parari
 debet, nam stypticæ sunt & constringentes: proin-
 de rectè quoque stypticus rosaceus, pro fluxu stillen-
 do, ex ipsis succis conficitur, quæ quoque siccata
 pro lavaculis servantur. Sunt quoque alie albæ, ex
 quibus saccharum paratur, quarum tamen loco Fern-
 riæ incarnatæ, id est, coloris inter album & ru-
 brum habentibus, utuntur, quæ dubio procul, Fer-
 rariæ velut Ancora & Neapoli aliive variæ la-
 tæ è locis, solentur sunt, & maxime proparant,

Gussirbaa

Dysenteria

Temper
Tragus

Rosa sylv.

Aqua stil-
lata

Dolores ca-
pitis

Langius

Fuchsius

Testes la-
di-
Fuchsius op-
us -
et in facul-
tate

Deleam
rosa pro
compositio-
nibus

Manardus
exph.

Sylvestres
in g. ad
struendum

Exornatio
infantibus
abamini

Calculus

Rosa Da-
mascena
non infalu-
bris contra
Amathum

Persica Ro-
sa non sunt
flores Per-
sici ut Sule-
Amardo

Persica Ro-
sa dicitur
aut Punice-
ca
leneliabin
è rosarum
rubra

Matth. opi-
nio exph.

Amato ex
quibus rosæ
Zuccarum
rosaceum
paratur

precipue si ex illis mel rosaceum foliatum fiat: nam uncia hujus mellis rosacei, cum strepitu, & alvi turbatione levi, purgare in corpore mediocri, ter & quater facit, ut millies expertus est Amatus, illud pro laxante medicamento agrotantibus propinans. Nec enim dicendum vult, ut multi medicamenti hujus vires ignorantes contendunt, conditum hoc mellis ratione tantum purgare, quum mel coctum parum aut nihil purget, imò mel crudum ciondi vim habeat, quam in coctione amittit, ut Hippocrates testatur lib. de morbis qui extra, & Galenus lib. 3. de alimentis cap. 38. non minus Paulus Aegineta lib. 1. suae medicinae cap. 95. hoc ut solet approbat, inquit, mel coctum valentius nutrit quam subducit alvum, non coctum è contrario. cui ad stipulatur Alex. Aphrodisius lib. 2. problem. 66. dicens, mel incoctum tergit & purgat, coctum alere tantum potest. Ex quibus liquidò constat, rosas vim laxandi & subducendi insitam & naturalem esse, non verò ex melle acquisitam.

Ex iis igitur rosis, syrupus rosatus solutivus multarum infusionum dictus nobile & securum purgatorium medicamentum parari debet, prout in universa Italia magno agrotantium juvamento paratur, qui Amati sententia efficacior & nobilior evadet si aquae loco, cum rore è caelo super ipsis cadente patetur, vel saltè super caulibus ex quibus rosis vel pruinæ magna copia haberi potest. Sunt præterea, inquit, aliae rosae albae ad citrinum tendentes, parvae, pauca folia habentes, quae ferè per totum annum in arbore videntur, quas Moschatas, quia Moschi odorem referunt, vel Alexandrinas vulgus appellat. Hæ verò, odore caput tentant, & potentissimè alvum subducunt, non in jolis ac Scamoniæ, ita ut si sex vel octo acetario folia miscueris, totum acetarium purgatorium reddas, & ea de causa ab illis, tanquam pernicioso medicamento, naturæ vim inferente, abstinendum suadeo. Nam non ita pridem Venetiis nobilissima Beatrix à Lima, mulier opulentissima, in morbum quandam incidit pro quo juvando, Medicus quidam Venetus, ex prædictis rosis & saccharo conditum parare fecit, ut eo tanquam præstantissimo, & securo purgatorio medicamento interdum uteretur: at quum primum præclara illa domina, conditum gustare cepit, faucium & linguæ excoriationem cum stomachi rosione contraxit: sed illa dubitans, num symptomata ea ex morbo, aut condito orta essent, nullam in medicamentum culpam rejecit. Ego verò noscens medicamentum potentissimum & ferè venenum esse, eam monui, ut ab illo abstineret, nec eo amplius uteretur, putaverat enim hæc domina conditum illud ex rosis incarnatis à nobis dictis paratum esse, quo alias Antuerpiæ sæpè usæ erat. Hæ verò rosae moschatae in Hispania rarè videntur: sunt enim albae, subcitrinae, similes, ut paucis dicam, rosis caninis inter spinas nascentibus, quae ad summum tria quatuorve folia habent. Non mirum igitur est si Hispani iis Rosis moschatis carerent, dubitent, num incarnatae à nobis dictae, quae ut solutivae sunt, & apud ipsos repertiuntur, Moschatae vel Alexandrinae dicantur. Sunt enim longe differentes: rosa autem hæc moschata Alexandrina sive Damascena dicta, alba ad citrinum inclinans, est omnino fugienda: incarnata verò rosa, quae inter rubram & albam media est, rubricaque, longè alia est, quæ ut præstantissima & nobilissimè medicamento uti suaderem. Quia enim in maxima copia habetur per universam Italiam Rosa hæc adeo ex ea syrupus rosatus solutivus, sive novem infusionum, mirus paratur, adeo ut illius uncia res

absque noxa ulla malos à corpore humores pellant. An verò Ienchabin de rosis, Perficis, apud Avicennam multis in locis citatum ex aliqua rosarum dictarum paratur? Respondeo quod non, quia Avicenna ex floribus Perfex arboris, mel rosatum, sive Ienchabin, confici suadet: vocat enim flores istos interpretes Rosas: proinde ornata nonnullæ officinae, ex illis syrupum paratum habent, morbis pituitosis admodum convenientem. Sunt enim flores isti, naturæ purgatorii, pituitam & lentes humores, ac crassam bilem depellentes.

Rosarum foliola, inquit Dodon. quia ex diversis partibus constant, dissimiles etiam facultates obtinent; quæ tamen in singulis non similiter se habent. In uno siquidem genere: terrestres & adstringentes: in alio humidae & aquae: & in alio spirituosae & aëreæ partes excellunt. Prædominantem autem omnes frigidam habent temperiem, proximam tamen temperiei mediæ, ex primo videlicet ordine refrigerantium. Superant quidem humida, aëreæ & spirituosae partes in candidis, dilute rubentibus, nec non in Damascenis sive Moschatis. Ex tribus his liquot, ea de causa, elicitur gratissimi ac suavissimi odoris, qui ferè ex aliis rosis inodorus est.

Utilis autem Rosarum hæc stillatitia aqua, cum ad cordis roborationem & spirituum reparationem, tum etiam ad omnia quæ clementer refrigerari possunt: tragematis, placentis, condimentis & aliis, quæ voluptatis excitandæ gratia conficiuntur multis, eadem admixta, saporis gratiam conciliat: oculorum calidos dolores mitigat: somnum inducit, quem & ipsæ virentes rosae odore suo suavi provocant. Succus harum rosarum etiam candidarum, alvum lenit & subducit: efficacissimus earum quas Damascenas vocant, proximus dilute rubentium, quarum frequentior usus. Idem præstat earundem dilutum, & quod ex eo coquitur Drosatum sive Serapium; Officinae syrupum rosatum solutivum nuncupant, quod ex infuso sive diluto apparari debet, in quo pluries rosarum virentium folia multa macerata sunt. Ad leniendam autem sive subducendam alvum utile, quando expurgatione aliâ potentiori, aut opus non est, aut uti non expedit. Nam præter ea quæ in intestinis hærent excrementa, aut in proximis & primis venis crudas, pituitosa & subinde biliosa, alia non educit; si non ab his quibusdam potentioribus medicamentis permisceatur. Humectat porro & refrigerat Serapium illud, idè etiam febrium ardentium calores nimios sedat, & viscerum inflammationes mitigat: sitim extinguit: debili autem & humido ventriculo parum utile, nam eum laxiorem debilioremque relinquit. Simile possunt & folia harum rosarum saccharo condita, resertim si manibus tantummodo contritas, ac diligenter cum saccharo permixta, igni admota incalescant, potius quam decoquantur. In rubentibus, quæ passim sunt vulgares, & aliis saturatæ purpureæ, quas Provinciales appellant, plus est terreæ substantiæ, & resiccantis adstringentisque facultatis, non tam absque humido quodam permixto; quod quidam ipsis adhuc virentibus inest: in resiccatis verò deperditum est. Succus hac de causa, & dilutum earum, ad alvum subducendam quoque facit minus tamen quam aliarum prædictarum. Resiccant autem hæc Rosae humiditate jam absorptâ, adstringunt & resiccant: refrigerant quoque, sed minus quam virentes: robur cordi conciliant, ac tremori & palpitationi ejus succurrunt: hepatis, rerum, & alia viscera debilia confirmant: ventriculum flaccidum, debilem & humidum, siccare & corroborant: fluorem muliebrem & superfluam menstruationem compescunt.

sanguinis unde quaque eruptiones sistunt: sudores reprimunt: alvum nimio fluore laxam constringunt: antidotis omnibus utiliter admiscuntur, & aliis quoque medicamentis, si ve foris adhibendis, si ve intra corpus assumendis, quibus ut adstringes ac corroborans aliquod utiliter accedit. Quod ex ipsis

Rhodomeli.

Oleum.

*Rosa pur-
purea n. 100.*

*Spongiola
qui conve-
niunt cal-
culosis &
urina dis-
ficile.*

fit Rhodomeli, vulneribus, ulceribus, eruptionibus, ac in universum omnibus, quæ abstergi & resiccare postulant, longe utilissimum est. Oleum calores omnes sedat, & inflammationes prohibet, aut jam incipientes mitigat. Flores rosarum, lutea videlicet stamina & apices, resiccant similiter & adstringunt, & potius quidem, quam ipsarum rosarum foliola. Idem possunt calyces & alabastrum: sed cum his omnibus odor desit, minus utilia sunt, humanæque naturæ minus amica. Fuchsius, spongiolæ & capitula sylvestris Rosæ contra calculum & urinae difficultates valere affirmat: si in pulverem trita exhibeantur. Prodesse autem possunt non ut diuretica, aut calculum atterentia: sed veluti aliarum quædam adstringentia, debiles renes confirmantia: quæ calculosis non raro utiliora sunt, quam multa, præsertim potenter diuretica. Nam talium diureticorum frequentiori aut nimio usu, & renes multum debilitari, & sæpe supercaleheri contingit: & calculos non modo non comminui, atteri, aut expelli, sed copiosiores & duriores frequenter generari. Quod etenim in sanguine tenue, aequum & serosum est, segregant: quod verò crassius, cogunt, ac indurari diuretica fortiora faciunt: & similiter etiam alia minus potentia, frequentiore usu: ut Gal. s. simpl. scribit.

*Contra Do-
don Symp-
tom. de lib-
ro humido
Ventriculo
molem.*

Hæc Dodonæus. Cur autem rosarum syrupus, ut ipse vult, debili & humido ventriculo parum sit utilis, & laxiorem & debiliorem relinquat, animadvertere non possum: quandoquidem rosæ præter vim purgandi etiam adstrictionem habent, ut Rhabarb. & Myroholani: quæ occasio ut in dysenteria & aliis alvi fluoribus lubenter eo utamur cum Myrobolanis & Rhabarbaro ac Rhapontico vero, si haberi possit. Excipimus tamen syrupum de rosis moschat, sicubi præparetur.

*Saccharum
purgans
Cardani.*

Saccharum ros. purgans vide (inquit Cam. hort.) apud Card. de tuenda valet. quod non contemnendum. Interior rosæ rubæ flos pulverizatus, cum aqua Cydoniorum de stillata datur utiliter in nimio mensium fluxu. Ad dentes à corruptione servandos & gingivas roborandas sumitur aceti Scyll. & aqua de calycibus rosarum destillata æqua portio & eo sæpe os colluitur, annotante Monardo Hispanensi de rebus Indicis. In spongiola Cynorrhodi cavitate interiore tinea interdum occluduntur, quibus pulverizatis ad expellendos vermes intestinorum multi feliciter utuntur. Ferculum ut ipse dicit suavisimum docet parare Athenæus ex rosis lib. 9.

*Ferculum
Athenæum*

En Casalp.

Ex Rosa carnea, autore Casalpino, colligitur aqua per distillationem odonitissima: Medici quoque oleo infundentes rosaceum componunt: succus ex iisdem, & infusio ad purgationes paratur. Rubens multifolia minimè amara, idè sine vi purgandi: conditur saccharo ad adstringendum, roborandumque. Parva quinquem foliis candidis amarior, majorem vim purgandi habet. E rosis rubæ succus perfectè rubens extrahitur, ubi paululum ex calefacta in sartagine rosâ, expresseris succum leviter, relinquitur rosæ substantia alba. Ergo si exquisitè expresseris ac diligentius, color corrumpetur: atque ita de aliis. Profuit interdum ut in exhibendis medicamentis etiam deliciae locum habeant præsertim apud morosos & delicatos. Ad alvum igitur ducendam parabitur Saccharum roseum tale. Libram unam Sacchari cum libra una rosæ dissolvè: purga, ut solet, cum ovi candido inde unciam unam rosarum Persicarum immitte, cum jam fuerit Saccharum, &

ubi paululum coxeris extrahe, aliamque unciam simili modo indito atque ita usque ad duodecimam unciam. Præstat autem rosas cum rore esse collectas. demum coquito ad perfectam rationem: additoque uncias quatuor rosarum rubearum, & in sole exponito. Hoc non differt ab alio Saccharo, & jucundè purgat & cum voluptate devoratur. In ulceribus penis & pudendorum in quibus alia remedia frustra adhibita, Cento-Empiricus pilos spongiolæ rosæ silv. in tenuissimum pulverem reducit, inspergit, & probatum remedium extollit.

Instituti nostri ratio postulare videtur, ut aliquas Rosarum compositiones, quarum hodiè in medicina facilius da magrus est usus, in medium proferamus. Ecquis enim ignorat vel solas has tum intus sumptas, tum extra admotas in maximis depellendis contra naturam affectibus, vim obtinere summam? Exorditur idcirco Matthiolus, nobisque de distillandi ratione opinionem suam recludit. Ex rosis, vi ignis sit aqua pluribus ac diversis instrumentis: veruntamen ea cæteris præstantior, ac odore fragrantior habetur, quæ per balneum calentis aquæ vitreis organis elicitur, cujusmodi & aliarum sunt, quæ eodem modo ad universum medicinæ usum confici solent. Quandoquidem inter has quæ plumbeis instrumentis, lignorum, vel carbonum igne extrahuntur, tanta deprehenditur differentia, quanta inter plumbum & argentum deprehendi potest. Quippe quæ sunt in balneo calentis aquæ vitreis rostratis organis, ab herbis & floribus, à quibus manant, nec sapore, nec odore dissentiant, adeo ut non solum proprias plantarum qualitates secum referant, sed ne tiam tantillum quidem tum fumum rei adustæ respiciant. Quod quidem in iis non invenias, quæ vulgo plumbeis, & æreis instrumentis eliciuntur: has enim nunquam vel rarissime gustaveris, quibus tibi submidum virus, ridoreque, non reddant. Quæ res non modo ægris ingentem molestiam afferunt, & nauseam plerumque movent, sed & plurimum noxæ pectori, ventriculo, jecitori, visceribusque omnibus inferunt: quod à metallicis organis, à quibus distillant, malam eorum qualitatem sibi vendicent. Quare hac ætate perspicua, doctissimi, ac peritissimi medici veteres secuti, decoctis, ac dilutis tantum uti ceperunt. Quæ tamen viribus aquarum qualescunque sublimatas ita enim stillatitias vocant) præcellant: ex tamen, quæ calentis aquæ fervore (ut supra diximus) sunt, cum proprios tum odores tum sapes herbarum ac florum, à quibus extrahuntur, secum trahant, jure quidem decoctis non modo ipsas æquipollere sed etiam præstare crediderim, non tamen, quod viribus præcellere dixerim, sed quod gustui suaviores, & visui jucundiores habeantur: quod non parum solatij egritantibus affert. Nos quidem aliis aquis non utimur, quæ in his, ad quas eliciendas nobis organum affabre parari fecimus, cujus ope hæc distillatitias, ac præstantissimas aquas suo tempore conficimus. Quarum aliarum sapore constant amaro, aliarum verò acri, aliarum austero, aliarum acido, aliarum denique insipido pro variis simplicium medicamentorum qualitibus, à quibus eliciuntur. Quapropter Sepplisij, & Medici, quos magis decet humanam charitatem colere, quam aurum & argentum, denique peram ut jam plumbea, & ærea organa abolcantur, & balnea, de quibus diximus, in eorum locum succedant, quippe in hoc etiam (quamvis plus laboris, miris verò emolumentum suscipiant) & Deo, & hominibus simul rem gratam facere poterunt. Carum Fuchsius in lib. de compos. medic. unice cavendum præcipit in succis nullius eliciendis, nec ejus vascum fundum, in quo stirpes continentur, aquam in cacabo bullientem attingat, sed solo vapore ab ea elevato incalascit. Quæ in re secutus potius videtur fuisse

*Aqua Rosa-
rum Stillat.
capa.*

*Balneo
Maria.*

*Plumbea
Cassa rep-
batur.*

*Aqua subli-
mata.*

Admonitio.

*Fuchsius can-
no nimis
religiosa.*

tur fuisse Manardum, quàm rei experimentum. Verum non possum ipse omnino eorum sententiæ subscribere, ut qui iudicem non esse semper ex exquisita ratione procedendum in herbis distillantibus, quod certo sciam nihil referre, quando etiam vasculum herbas recipiens in aquam in maiore vase bullientem immergatur. Nam etsi aqua, quas illi volunt ex herbis vapore tantum ab aqua bulliente elevato extrahi, ceteris præstantiores habeantur: tamen quæ ex herbis eliciuntur vasculo impositis, quod aqua bulliens circumluat, parum certe, aut ferè nihil illis bonitate cedunt, quod mihi compertum est in iis aquis, quas sæpissime libuit utroque modo elicere & experiri. Attamen aliquis illud discrimen esse dicit, quod illo modo aqua ex herbis extrahantur, quæ tenuiores partes retinent, quod vaporis illius caliditas imbecillior sit, quàm ut possit totam herbæ substantiam conficere: hoc autem modo aqua eliciantur, quæ omnes herbarum partes secum referant. Hæc sane differentia quæ facile concedi potest, non est (meo iudicio) tanti momenti, ut illa regula perpetuò sit observanda, hæc verò evitanda: quin potius, ut hæc mihi videatur probanda, illa verò rejicienda tanquam cautio nimis religiosa. Sed quandoquidem in Aquarum distillantiarum mentionem incidimus, non gravabimur illarum aliquot modos adscribere, quos quidem in præsentia licuit, multum celebratos invenire. Alij itaque sumunt rosarum quantum volunt, idque triduum, in balneo digestum, vapore aquæ calidæ distillant. Alij absque digestionis præcedentia, aquam ex rosis in alembicum conjecis, eliciunt. Alij per cineres distillant: ubi tamen maxima opus est cautione & circumspectione, ne empyreumate liquor stillatius inficiatur. Alij lucro magis, quàm valetudini hominum intenti, eas integras, ut decerpitæ sunt: cum magna aquæ copia, per vesicam æneam distillant, ac ex triginta rosarum libris centum odoratæ aquæ venalis extrahunt. Alij flores rufos, absque menstruo, aut eo saltè tam paucò, ut ad irrigationem sufficiat, modico balnei calore distillant: & ad vim refrigerantem, tanto expeditius evocandam. una distillatione, quam præcedit irrigatio, ex aqua communi, vel rosacea veteri, aut ad virtutem confortantem & fragrantem proleclandam, pluribus in distillata aqua infusionibus utitur. Io. Beguinus in Tyrocinio chymico, ita eam parandam ducit: distinguendo inter rosas albas & incarnatas. Ex illis enim ut plurimum vis refrigerans peitur, ac propterea paucæ aqua pluviali irroratæ in mortario marmoreo contundendæ sunt: inde torculari succus exprimendus & distillandus. Incarnatæ absque irrigatione contusæ, reponuntur in magno vase vitreo, in cellam: post triduum succus exprimitur, qui per balneum distillatur. Hæc aqua est fragrantissima, quæque vel multos annos, odoris sui fragrantiam conservat. Nonnulli recrementis ejus aquam puram superfundunt, & ita per octiduum maceratam, vel balneo, vel vesica distillant, quæ communi venali viribus & efficacia non cedit. Sed & ultra progredi, ac certum faciliusque, aquas vitæ ex plantis, floribus, seminibusque, cujuscunque generis sint, concinnare brevitate, veram & legitimam extrahendi methodum tradere æquum, & quidem per digestionis, fermentationisque viam, ut quarum ope solâ, ex omnibus rebus, ac iis potissimum, quæ in alimentum veniunt, imò etiam & ex rosis quæ frigida existimantur, aqua vitæ odoratissima elici potest, quæ de natura cælesti ætherea participet, flammamque, non secus ac ea, quæ ex vino eliciuntur, concipiat. Rosas igitur sume cælo sereno, cum torido madore destituantur, collocas: eas tere accuratissime, & in cucurbitam vitæ, quæ postea benè clausa, in cel-

lam reponatur, ut ibi fiat earum fermentatio, immitte: Cum jam acidum quiddam pedolere videntur: su ne de floribus eritis, quantum vis, & per balneum distilla: aquam inde extractam superaffunde parti rosarum restanti, & rursus distilla: similem in modum pergendo, donec omnis rosarum fermentatarum quantitas per alembicum transierit: fecibus, quæ in fundo remanere solent, semper segregatis. Tandem omnem aquam ex rosis elicitam, per balneum distilla: & duodecimam saltè partem nauticè abstrahere, eamque si vis, rectifica. Sic aquam habebis gratissimam, adeoque excellentem, ut unica ejus gutta, ingenti satis aquæ copiarum suarum communicare, eamque utilissimam & succundissimam reddere possit. Non abs re visum fuit paucula hæc absolutioris doctrinæ ergo proponere, quo modi quidam, distillandi aquas, non infimilicet & hujus aquæ rosarum, ut & simplicium ceterorum omnium, lectori manifestentur.

Non enim hic reticenda tintura rosarum, ob summum lætamen quod percipiunt ægri, in summo febrii vigore, in sui inexhausta, in inquietudinibus, dysentericis passionibus, aliisque affectibus ab humore bilioso, acri & mordaci genitus, pro potu ordinario, ubi pusilla palato ægrotantium non sapit: talis igitur est modus brevissimus. ℞. pro ℥. j. aquæ fontanæ, limpidissimæ, gelidissimæ. Rosarum rubrarum, exsiccatarum m. s. hordei p. j. decoquantur leviter, adstendo ℥. j. sacch. filtra vel cola, addendo sp. vitriol. gutt. vi. postquam refrigerata erit, ager hanc sumet cum voluptate, liberalius bibet, sedabiturque sitis. Ne autem statim transgredi videamur, omit-tendo eorum aliqua, quæ ad hanc rosarum tractationem spectare videntur, Syrupus quoque enumerandus venit. Est autem simplex, qui ex solo rosarum decocto vel succo fit, & ℞. Rosarum rubrarum recentium, partes sex, quæ infunduntur in vase terreo vitrato, sicuti oris benè operculato, horis octo in prædictis quæ recalcasce partibus: tandem additur ad singulas s. partes infusi colati partes 4. sacchari, per albumen ovorum clarificati, & s. syr. Compositus qui ex infusionibus & aliarum rerum decoctionibus conficitur: ℞. Rosæ vernalis partes sex: ferveant, & indantur rosarum completarum recentium rubrarum partes tres, ac horis octo immo-ventur: Deinde renovatio & reinfusio florum fiat usque septies inclusive absque fraude, & singulis vicibus diligenter exprimantur: post adde sacchari albi partem mediam, & ad syr. formam coquito. Fit quoque syr. de rosis siccis, qui ℞. sesquiquintam rosarum rubrarum siccarum (nam libra una men-suralis referta rosis siccis, & moderatè coacta ponderat, drachmas 12. plus minus) quæ infunditur horis octo in aqua libris tribus: terque reteratur rosæ, & infusiones atque expressiones. Aqua quoque eadem calefiat, antequam rosæ indantur. Postea accipitur liquoris infusi & expressi quantum libuerit, & cum media parte sacchari coquitur ad formam syrupi: Verbi gratia, si liquoris infusi habeas tres libras, tunc illis adde sesquilibram sacchari, & hæc Dispensat. Colonier se. Paratur tandem syr. vel potius lulepum suavissimum ex aquæ rosarum partibus tribus, sacchari paribus duabus, quod præcedente longè clarior est, usque frequen-tissimum. A quibusdam verò sacchari partibus 12. in aqua communi clarificatis adduntur aquæ rosarum partes dux, ut sit ex aqua rosarum paucæ, & multa communis compositum, sed id inefficacius. Sunt etiam qui rosarum folia integra condiunt. Sed paratur conserva rosarum, tundendo rosarum exurgium partem unam cum duplo sacchari solidi in mortario marmoreo pistillo ligneo: flores & saccharum simul contunduntur & non prius flores seorsum (sicut fieri

Tintura Rosarum
Resina Rosarum
Simili.

Syrupus Rosarum
Compositus

Syr. Rosarum
Simplex

Syr. de rosis
siccis

Lulep Rosarum

Conserva Rosarum

HISTORIAE PLANTARVM

consuevit) & deinde saccharum seorsum, & demum ambo simul. Post contusionem autem & commixtionem sacchari cum floribus rosarum, conserva aliquoties soli exponatur, moveaturque subinde forsum & deorsum. Relinquatur autem spatium vasis inane propter fermentationem. Triplicem modum parandi mel rosatum docet nos Mesue, quorum primus est, ex foliis rosarum & melle. Secundus vero, sine foliis, ex succo ipsorum foliorum tantum & melle. Et hic secundus modus potest connumerari inter syropos simplices. Tertius autem ex foliis & succo simul & melle, qui tertius modus recipit foliorum partem unam, succi partem unam levis, mellis partes tres. Accipitur mel optimum, feruet, & inde tepere sinitur, spumaque aufertur: deinde adduntur rosae contusae cum succo, & ad infolationem ponuntur diebus viginti, vase diligenter operculato. Postmodum supra ignem duplo vase incallescunt, & effervent: mox fit fortissima expressio & colatura. Rursus coquuntur leniter ad consistentiam melleam, id est, mellis fluxilis. Pastillos roseos, Rhodides appellatos hoc modo preparari auctor est Dioscorides. Rosarum viridium non madentium siccaturum 3. xl. Nardi Indicae 3. x. myrrhae 3. vj. Trita haec efformantur in pastillos triobolares, & in umbra siccantur, & reponuntur in vase fictili non picato probe obturato. Quidam adijciunt etiam Costi 3. ij. Iridis Illyricae tantundem, ammiscentes etiam vinum Chium cum melle. Ceterum, pastilli rosei de rosis quas recipiunt nomen habent. Preparabantur autem graveolentiae a sudoribus oborientis gratia, & a feminis collo circumdati monilis vice gestabantur, ut exhalantem de corpore sudoris graveolentiam suo odore retunderent, ex aromatum illorum ammissione. Officinae praescriptas habent aliquot pastillorum sive trochiscorum ex rosis compositiones, sed nulla ex his ad hunc usum spectat. Alter etiam horum pastillorum usus erat in diapsmatis quae corpori insperguntur, & in unguentis post balneum, ad coercendos videlicet sudores, & jucundum corpori odorem induendum. Sed Plinius etiam solas rosas aridas & expressas in hunc usum commendat. Sic enim lib. 21. cap. 12. ait: Et aridis & expressis aliquis usus: diapsmata inde fiunt ad sudores coercendos, ita ut a balneis inarescant corpori, deinde frigida abluantur. Ex quo loco ferè cognoscendum datur, de quibus Rosis accipiendum sit, quod Dioscorides lib. 1. cap. 12. dicit, nimirum de his quae virides quidem & recentes adhuc sunt, non tamen humidae & madentes, sed siccatae, id quod ipsis una die contingere potest, ut humor omnis ab eis desiccet, velut Galenus lib. 1. cap. 1. in fine & 2. in fine docet. Quid autem sint diapsmata, idem Plinius lib. 13. cap. 2. exponit. Siccis, inquit, odoribus constant quae diapsmata vocantur. Nam feces unguenti imaginata appellantur. Aromaticum rosatum est confectio suavis & saluberrima, in qua miscetur unile dulci, & ob ejus bonitatem & excellentiam ceteris praeposenda est, confortat stomachum, cor, cerebrum, & epa, letos & claros spiritus gignit, excitat appetitivam, munit digestivam, nutritivam, & virtutes omnes naturales corroborat, resolvit aquosam humiditatem stomachi, & emendat malas qualitates, quae generant malos humores & putredinem, & convalescentibus & debilibus integras vires, & pristinam sanitatem restituit. Rosae 3. j. vij. Liquitius rase 3. vij. Cinnamomi 3. v. Lignialoes, Santali citrini, an. 3. ij. Gummi Arabici, Dragantiae an. 3. ij. 3. ij. Macis, Garyoph. an. 3. ij. 3. ij. Spicae 3. ij. Nucis muscae Cardamomi, Galanga an. 3. ij. Ambrae 3. ij. Musci 3. j. Sacchar. lb. vj. fiat confectio cum aqua Ros.

Confectio ex rosis aromatica calefacit & confortat

stomachum, jecur & praecordia omnia, frigiditatem repellit, phlegma prohibet & ejus aggritudines, ventositates & inflationes discutit, nauscam, acidositatem tollit, & omnem stomachi cruditatem emendat, gustum revocat, renes calefacit, coitum excitat, & facit pulchrum colorem, & odorem anhelitus & sudoris. Rosarum, lignialoes an. 3. ij. Calami aromatici 3. j. 3. j. Galliae muscae, macis, pipetis longi, Nucis muscae, Mentae siccae, Cassiae lignae, malticis, Asari, Cinnamomi, Garyophyllorum, an. 3. j. Croci, Cardamomi, trium Santalorum, Rheubarbari, Spicae, Costi, Cubebae, Zingiberis, Feniculi, Anisi, Libistici an. 3. ij. Sacchari lb. iij. fiat confectio cum aqua rosata. Electuarium succi rosarum exploratum est contra guttam calidam, & malos tumores calidos & furiosos, fortiter purgat, sanat tertianas simplices & duplas, & reliquias malorum humorum, in convalescentibus exquisitè evacuat, potenter solvit, & est calcar aliarum medicinarum. Succus rosarum, Sacchari an. lb. j. 3. iij. fiat syrupus, cui adde diagridij 3. j. Santalorum omnium an. 3. vj. Spodiij 3. ij. Camphorae 3. j. fiat electuarium. Equum est ut vini etiam, liquorum omnium post aquas communissimum, quod humanae in primis inservit nutritioni, symphytumque corporis nostri calorem instaurat roboratque, tractationem aggrediamur brevem. Quinque libras igitur infundito (inquit Palladius lib. 6. quem inscribit Maum c. 13. rosae pridie purgatae, in vini veteris x. sextarios, & post 30. dies, x. despumati mellis libras adicies, & uteris. Et Rosatum sine Rosafacies sic. Folia citri viridia sporta palmea missa in multi nondum ferventis vase depones, & claudes, & exemptis quadraginta diebus melle addito, ad modum Rosati, cum placebit, uteris. Merito vinum subsequitur acetum, quod Rosarum rubrarum medietate maturitatis, praefectis & abjectis unguibus, in umbra extra solem ad triduum aut quadriduum expansarum & resiccatarum, lb. j. acetum sextario octo, hoc est, quartas Colonienfes quatuor. Infolentur diebus quadraginta: Deinde reponantur, vel (quod melius est) abjectis foliis corruptis, acetum coletur ac reponatur. Quidam saepius mutant folia rosarum, nec ita diu stare in sole sinunt (verbi gratia ad dies triginta vel pauciores) ut elegantius colore aspectuque, & sapore odoreque validius fiat acetum. Singulariter prodest animi deliquis, si olafaciatur aut nares oblinantur, prodest etiam membris calidis hocce oblinitis: si duplicatum linteolum in aceto rosaceo humectetur, stomacho ve applicetur, maxime prodest optimèque calorem attemperat. Oleum rosatum quamvis pluribus fiat modis, melius tamen, teste Clem. de materia medica cap. 10. sic fit. Collige Rosas priusquam complicita folia penitus expandantur, & ponantur in umbra sex vel octo dies, quousque fiant modicum pallae, & evellantur folia rosarum a suis tirsis, & contendantur, postea habeas oleum ex Olivis immaturis quod dicitur Omphacinum, quod cum aqua fontium frigida saepius lavetur & in qualibet ejus libra pone Rosarum 3. viij. in vase vitreo obtuso ore, & soli quodidie in hebdomada exponatur, deinde in balneo Mariae tres horas bulliat ad summum. Praedictas ergo rosas sic coctas exprime, & expressas abjice, & cum oleo alias rosas commisce, & folia septem abis diebus expone, & postea iterum coque in balneo Mariae, & permuta iterum Rosas, & adde infusionis Rosarum 3. iij. & quam bene cooperiatur officium vasis, & exponatur soli quadraginta diebus. Deinde oleum extractis rosis quotidie ad solis radios ponatur. Plenique sic faciunt in qualibet libra olei saepius loti ponunt rosarum recentium contritarum 3. viij. & coquunt in balneo Mariae ad consumptionem duarum partium & cum terebintina

primur. Confoquat membra debilia, digestivam facultatem & calorem naturalem, & refrigerat calorem accidentalem, febrilem & acutatum cholerae: stipicat lubrica intestina, & corroborat retentivam, & in principio repellit malos humores, qui concurrunt ad apostemandum, & mitigat dolores capitis, & prohibet phrenesin. Plura de Oleo rosato tradere supervacaneum ducimus, quod ea passim apud autores videre liceat.

*Diarrhodon
descriptio
communis*

Restat ut Diarrhodon describamus duplex. Commune quod 2℥. foliorum rosarum rubrarum 5. xx. Trochiscorum diarrhodon. & de spodio, liquiritia ana 3. iij. Cinamomi [quedam ex: mpt non h ibent] Caryophyllorum, Gallie mulicacae an. 3. iij. Spodij, Croci, Mastice, Berberis [quidam omittunt] ligni aloes an. 3. ij. Trium santalorum, an. 3. iij. Asari, Spicae Indae, Macis, Cardamomi, seminis Portulacae, La. uice, Scariole, Citrulli, Melonis, Cucu neris, Cucubur albarum margaritarum, Oeymi Caryophyllati [Alfengamusch] salure eboris, Tragacanthi, gummi Arabici, an. 3. j. Camphorae 3. 8. Musci 3. 8. Canthar. cum syrupo de rosis, ex aqua rosarum. Dosis est 3. 8. Ventrículum & hepatis roborat, coctionem obid juvat, & dolorem horum a calenti & acri, ac mordente bile mitigat. Diarrhodon Abbatis 2℥. Santalorum alborum & rubrorum, an. 3. ij. 8. Tragacanthae, Gummi Arabici, Spodij an. 3. ij. Asari, Spicae, Nardi, Mastiches, Cardamomi, Croci, Xylaloes, Caryophyllorum, Gallie Moschatae, Anisi, Foeniculi, Cina nomu, Succu liquiritiae, Rhubarbari, seminum basilicon, Berberorum, acinorum ejus, sem. Scariole, Portulacae, Papaveris albi, Citrulli, Melonum, Cucumeris, & Cucubur, an. 3. j. Ossis ex corde cervi, Margaritarum, an. 3. 8. Sacchari candi, rosarum an. 3. j. 3. iij. Fiat omnium pulvis Camphoram & Moschum studiosè omittimus, quæ, ut & ambra, in aliis etiam compositionibus omitti debent, nisi specialiter exprimatur, aut Medicus jubeat. Trochisci à Mesue sic describuntur. 2℥. Foliorum rosarum rubrarum, exungulatarum modicè siccaturum, aureos 2. Spicae aromaticæ, ligni aloes, an. aureos 1. Glycyrrhizae aureae 1. Spodij aureum 1. Croci aureum diuturnum, Mastiches 3. ij. Cum vino albo fac trochiscos drachmæ unius pondere. Rosata novella, autore Nicolao Alexandrino, recipit rosarum, Glycyrrh. sacch. ana 3. iij. Cinnam. 3. vj. Caryoph. Nardi, Galangæ, Zingib. Nuc. mosch. Zedoar. Syrac. Cardam. veri, Apij ana 3. j. Mellis desp. q. s. Si in pulvere quis asservare voluerit, Zacccharum omittat, donec in formam solidam redigere velit. Vnguentum Rosaceum, Clement. hoc modo describit; 2℥. Rosarum rub. recentium lb. 1. & tantundem axungie porcinae recentis cum aqua calida novies, & toties cum aqua frigida optime lotæ, & simul cōtundantur, & sepre m alios dies dimittantur; postea adde succi ros. lb. 8. olei amygd. dulciū 3. ij. 8. coquantur ad succi cōsumptionem, & conservetur. Phurimum valet in principio apostematum, repercutit enim materiam, sedat dolores eorum, & capitis febricitantis, & inquietudinem, refrigerat febre sardentes, epar & stomachum calefactum. Si verò addatur Opij cum aqua rosata dissoluti 3. 8. Croci 3. ij. sedabit quoscunque acerrimos dolores, & provocabit somnum. Vnguentum seminis, 2℥. seminis rosarum, cupularum glandium an. 3. j. sumac. acacie an. 3. 8. Carabæ, seminis plantaginis, mathicis, balaustium, corticum Granatorum, Gallarum, nucis Cypressi, rosulæ, gummi Arab. Myrtæ, Myru, Diaganthe, rosulæ, Coriandrorum preparatorum, boliameni, santalorum rub. an. 3. 8. sanguinis dragonis, thuris, hypocistidos an. 3. 8. bdellij, Spodij, rosulæ, rub. an. 3. ij. camphoræ 3. 8. olei rosat. lb. j. olei citrionum, myrtini, mastichini, an. lb. 8. cetera quod sufficit. Fiat unguentum. Sed hæc

*Dosis
Vires.*

*Diarrhodon
Abbatis.*

Trochisci.

*Rosata
Novella.*

*Vnguentum
Rosaceum.*

Vires.

Apostema.

*Febris
ardens.*

Opium.

Semina.

*Angustia
seminis
rosarum.*

de Rosis tractatio, hucusque sufficiat: Temporis nunc ratio postulat, ut vela contrahamus, ne forte longiori mora in vertices inextricabiles abrepti, benigno lectori molestiam creare videamur.

RVBVS MAIOR, FRVCTV nigro. CAP. II.



Nihil vulgatius norunt dumeta Rubo, qui exradice nodosa, impotens feracitate se propagans, longe lateque seniculis & mordacibus famentis, angulosis, rubentibus vagatur. Si vicinis sulciatur in algi crassiores emittit virgas, quæ tamen & ipsæ gracilitate & proceritate nimia in terram retrahuntur, ac curvæ defixis in eam capitibus radicantur. Virga spinis aduncis & pungentibus acu-

leis vestiuntur, quibus prætereuntium vestibus sese attingunt, eoque remorantur. Folia terga, serrata, alpera, dorso aculeato, inferiore parte candicante, superiore nigrescentia, sicco adstringentique sapore prædita: hyeme vix decidentia, nuli altera succrescant: flores albi, vel ex tándido rosei, rosula instar, apicibus concoloribus: mora rubra per maturitatem nigrescunt, arillis quibusdam asperiuscula, acinis parvis, gustu quibusdam, ut nobis, grato, dñler paululum amaro, Trago.

Theophrasto Rubi genera tria sunt, maxime inter se distantia. Quoddam enim erectum excelsumque: quod 3. 8. 0, qui Rubus hic major est, fructu nigro. Quoddam propè à terra protinus decursum vergens, terreque conjunctum, rursus radicem agens, quem 3. 8. 0, 1. Humi-Rubum quidam appellant, nos Rubum minore, fructu caruleo. Nec est quod Humisrubum cum Celsalpino inter plantas humilioris naturæ reconsecramus, & Fragariam appellemus. Tertium, quod 3. 8. 0, dicitur, de quo in Rosa loquuti sumus. Ceterum Theophr. in hist. Rubum fruticem spinosum tradit non solum caule & ramis, sed & folijs cunctis, quin in extremo & lateribus sinuata concitant.

Dioscorides duo genera tradit, Rubum hunc vulgare notitæ, qui 3. 8. 0, simpliciter ipsi dicitur, & ab aliis eodem anno notante; Cynosbato, ab aliis Selinotia, ab aliis Atyntrophos, ab aliis Titiæ sanguis [hæc appellatur à Dioscoride Lactuca agraria aservitur, & potest fieri ut Rubo propeere communicata fuerit, quod mora illius sanguinem compressa succum reddunt.] ab aliis Ibidis sanguis, à Romanis Rubus, ab aliis Sentes, à quibusdam Mora haticapa; à Dacis Mantia, Aegyptiis Hæmos, aliis Ametrois appellatur: Serapionem autè Tragus Hyleich, sive Haleich nominare tradit, & Hebræos Sene. Altatum, Ideu nō cognominat, de quo paullo post. Minior 3. 8. 0, 1. Rubi mora ferunt: & alio genere similitudine prole, qui vocatur Cynosbato, æternum genus Ideu vocant Græci loco. Sic 1. 2. 4. 5. duorum prætorum meminit. & 3. 8. 0, 1. Cynosbatu, Rubi Idæi, & Rhamnum inter Rubi genera recensuit.

HISTORIAE PLANTARVM

An Rubum majorem fructu nigro intelligunt facit pagina Exod. cap. 3. Aparuitque ei Dominus [Angeli Domini, Tigr.] in flamma ignis de medio Rubi, & videbat, quod Rubus arderet, & non combureretur. Dixit ergo Moses: vadam & videbo visionem hanc magnam, quare non comburatur Rubus.

Anguill. Morus aut Rubus. Trag. Rubus grandis & secundus. Thal. & Gesn. h. Rubus vulgaris: Eid. coll. Rubus major. Turn. Rubus sentis, baccæ semper nigra ubi maturuerit. Lob. Adv. Rubus, Batis vulgarissimus, cujus mora ad diamorum confectionem officinis usitatissima.

Lugd. Rubus, Rubus magnus & Sentis. Dod. Rubus & Rubus vulgaris fructu nigro, Vepres dictus apud Ovid. metamorph. 5.

Vepres O.
Sedij.

Aut Lepori, quæ Vepre latens hostilia cernis
Ora canunt.

Cord. in Diosc. & Tabern. (quoad descriptionem) Rubus Arvensis, figura autem quam habet sub dicto titulo cõpetit potius Rubo minori, fructu cæruleo, cujus non meminit compiler. C. Bau. apud Matth. & Ger. pro Rubo non benè ponunt figuram Tabern. quæ est Rubi Idæi. Ille tamen pro Rubo Idæo meliorem quoque habet. Schvv. Rubus batus, & Rubus lentis. Corn. Brunf. Fuch. Matth. Ryff. (cujus figura minus placet) Cresc. Cam. apud Matth. germ. & Epit. Lac. Lon. Lob. Obf. & Ic. Cast. & Czf. Rubus. Dorsth. qui ineptam Ryffij figuram habet, Mora baccæ: Rubi genus grandius fungosum. C. B. pin. Rubus sive vulgaris, Rubus fructu nigro.

Yomina
linguarum.

Bat. Græcis dicitur: Rubus & Sentis, Lat. Germ. Brombeer Stander/ Bremen/ & ut Cornario placeat, Eratzbeer/ ab ipsius Rubi pungentibus aculeis, Belg. Braemen & Breemen/ Braembesjen haghe: Gall. Ronce, à runcatione, quæ dumorum tantum est. Ital. Rovo: Anguill. Morecampagnole: Hispan. Carca: Anglie, Bramblebusche / aut Blackberrybusche: Hung. Cypkefa, & fody szeder. Boh. Wofstruzina. Fructum Græci μῆλον τῆς βέρας, vber bærre, & bærre quemadmodum & Mora & Sycamina appellant, Galeno teste. Morum Rubi & Vaucanum Schvv. nominant, ac ut Fuchsius sentit Vaccinium vel Vaccinium, quod tamen nec nobis, nec aliis probatur: Offic. Mora Bati, & quæ barbariores sunt, inquit Dodon. Mora Bassi, Germ. Brombeer. Belg. Braembesjen/ & Haghebesjen: It. More di Rovo: Hisp. Carca moras: Boh. Wofstruziny.

Lum.

Per dumos repit & in sylvis inter cæteras sentes, neque non ad sepes & agrorum limites reperitur. Plantatur autem plantulis suis, ubi capita in terram demittunt, quia ibi statim radices agunt. Rubi namque (tradente Plinio) curvati gracilitate & simul proceritate nimia, defigunt rursus in terram capita, iterumque nascuntur ex sese, repleti omnia, nisi resistat cultura. Plantatur & senibus maturè collectis & siccatis, usque ad initium Veris servatis & tunc seminatis: Mayo mense & interdum etiam Julio & Augusto, itemque Octobri flores conspicui sunt: fructus Augusto & circa Autumnum maturitatem assequitur. Rubi folia Vere, flores ætatis initio colliguntur: fructus cum maturuit per menses & extrema ætate decerpitur.

Vires.

Rubus, autore Dioscoride, adstringit & siccatur, capillosque tingit. Summorum autem ipsius ramorum decoctum potu alvum sistit, fluoremque muliebrem cohibet, nec non & contra presteris morbum valet. Firmant & gingivas, orisque ulcera sanant, commanducata folia. Imposita verò herpetas cohibent, ulceribusque in capite manantibus, oculis procidentibus, condylomatibus, item & hæmorrhoidibus remedio sunt. Eadem cardiachis quoque & stomachicis trita convenienter imponuntur. Cz-

Flum.

Vltura.

terum contulis caulibus. Sole coactus ad antedicta vitia efficacior est. At fructus perfectam maturitatem assecuti succus, stomaticis, h. e. oris medicamentis accommodatur. Sistit & alvum subcrudus fructus in cibo sumptus, æquè ac flos in vino potus. Galeno Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, eaque non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia ac præcipuè mollia & recens nata plurimùm in se habeant substantiæ aqueæ, parum verò adstrictionis eadem ratione & germina, itaque si mandantur, aphthas, & alia oris ulcera sanant. Quin & alia vulnera glutinare valent. Est enim eorum temperies & ex terrea frigida essentia, & aquea tepida. At fructus, si quidem maturus fuerit, non parùm habet succi calidi temperati, qui dulcis est. Itaque ob hoc, & ob modicam adstrictionem esui non insuavis est. At immaturus à frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbus est & valdè exiccatorius. Et sanè uterque siccatus reconditur, validius quàm recens desiccans. Sed & flos eandem vim fructui immaturo possidet: utraque ad dysenterias, & ventris profluvium, & atonias, i. e. imbecillitates [r. but exolutum] & sanguinis expuitionem sunt idonea remedia. Porro radix præter adstrictionem, non paucam habet substantiam in sese tenuem, per quam & lapides renum comminuit. Idem Akment, 2. Ruborum fructum bærre appellant. Sunt autem Camra, quàm Mora, magis adstringentia: & si quis largius iis vescatur, capitis dolorem sentiet: alij stomacho angentur. Proinde fructum hunc abstinemus, oportet, prius quàm mandere ipsum aggrediamur: quod maximè in Sycaminis quoque est faciendum. Non tamen ventrem subducunt, sed potius cohibent: & si quis immatura ipsa prius siccata reposuerit, multò etiam magis cohibebunt: Omnia tamen medicamenta, quæ ex Mororum succo parantur, si facta ex iis quoque fuerint, facultatem habebunt efficaciorum. Idem de comp. med. sec. loc. Innocuum est pharmacum Rubi mororum succus voratus, veluti & ipsorum Mororum: sed succus Rubi Mororum habet quid quod stomachum roborat: quod ipsum Mororum cremor non habet: Rubi mororum succus post nucum succum plurimo melle opus habet.

Erasistratus Rubi cremore ad oris inflammationes usus, se ipsum curavit. Nec Rubos, inquit Plinius, ad maleficia tantum genuit natura: ideoque ex eis mora vel hominibus cibos dedit. Vim habent siccandi, adstringendi que, gingivis, tonsillis, genitilibus accommodatissimam. Adversantur serpentium sceleratissimis hæmorrhoidi & presteri, flos aut mora. Scorpionum vulnera sine collectionum periculo inungunt: urtiã cient. Caules eorum tunduntur teneri, exprimiturque succus, qui sole cogitur in crassitudinem mellis, singulari remedio contra mala oris, oculorumque, sanguinem excreantes, anginas, vulvas, sedes, caliacos potus aut illitus [indigitur succu] Oris quidem vitis etiam folia commanducata prosunt: & ulceribus manantibus, aut quibuscunque in capite illinuntur. Cardiachis vel sic per se imponuntur à mamma sinistra: item stomachi doloribus, oculisque procidentibus. Instillatur succus eorum & auribus. Sanat condylomata cum rosateo cerato. Cauliculorum ex vino decoctum, vel præstantaneum remedium est. Idem per se in cibo sumpti cymatogodo, aut decocti in vino austero, labantes dentes firmant. Alvum sistunt & profluvia sanguinis: dysentericis prosunt. Siccantur in umbra, ut cinis crematorum uvam reprimat. Folia quoque arefacta & contrita, junientorum ulceribus utilia traduntur. Mora, quæ in sycaminis nascuntur, vel cum efficaciorum stomaticorum præbuerint, quàm sativa Morus. Eademque compositione vel cum hypocy-

Ex Odore

Aphtha

Vulnere

Camra

Bærre

Nasa

Corrosiva

Ex Plinio

Vaccinium

Prima

Succum

Os Oculi

Anima

Vltura

Stomachicis

Aurea

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Alia

Cholera.

potissime tantum & melle bibuntur in cholera, & a cardiacis, & contra ataneos. Inter medicamenta, quæ styptica vocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice decocta in vino ad tertias partes, ut colluantur eo oris ulcera, & sedis foveæ: tur: tantæque vis est, ut spongæ ipsæ lapidescant. Tragus addit à merulis avibusque exteris expeti fructus, & in cibos quoque venire pauperum: Galenum scribere frequentem fructus Rubi usum dolorem capitis inducere, se autem id necdum expertum esse: Verum se testari posse, quod mora illa vehementer refrigerent, ita quidem ut si quis aquam superbibat, eum horrores febiles continuè obruere posse. Si verum est quod Tragus scribit, dehortari pauperes debet ab eorum usu, qui nil nisi aquam superabunt. Ego Ruborum mora sapiens comedi copiosè, nec nocu nec in sensu, quamvis frigidum & humidum ac pituitosum habeat in ventriculo.

Tragus in
natur.

bat ab eorum usu, qui nil nisi aquam superabunt. Ego Ruborum mora sapiens comedi copiosè, nec nocu nec in sensu, quamvis frigidum & humidum ac pituitosum habeat in ventriculo.

RUBUS MINOR, FRUCTU
caeruleo.

Deser.

Sarcocolla.

Folia.



Flores.

Fructus.

Radix.

Turn. m.

natur.

Monach.

error.

Rubus in.

milit. Bel.

gicus, Clus.

Locus.

Contra hunc Rubus proxime jam dicto minor parum, aut nihil, interdum humile tollit, reptans, gaudens, sarmentis longè lateque diffusis, Trago, humiliter serpentes tenuissimis & aculeatis flagellis nunquam sese attollens, sed protinus deorsum vergens: & foliis minoribus minusque senticosis, & Trago auctore, Lupulo penè respondentibus, nisi quod magis nigrescent, spinisque asperioribus.

horrent flores similes, Trago ex candido rosei, stellati: ac fructus, qui minor, primo exortu viridis, paulò post rubro, per maturitatem caesus vel caeruleo colore tingitur, pilosus ut Rubi præcedentis mora, gustu pari, non in jucunda, qualia arboris Mori radice nodosa.

Est hic Chamæbatus Theophrasti, Humirubus Gazæ, Rubus humilis & Tragi. Turn. Rubi species 2. baccis rubris: Is fortè maturum non observavit, sed immaturum duntaxat: mihi enim tantum baccis aut caesis, vel caeruleis, aut nigris notus Chamæbatus. Quare meritò scripsit Matth. in errore versari Monachos, quum Rhamnum existimant Rubum quendam, qui mora caeruleo colore profert. Gesn. h. alia Rubi species: In cit. Rubi genus humile: de coll. Rubus humilis, Chamæbatus. Lobel. Adv. Rubus alter reptans. Dod. Rubus minor & 2. sive tenerior.

Clus. par. & h. Rubus humilis proxime ad Chamæbator accedens, qui plerisque Belgicæ locis nascitur, acinis modo nigris, modo caeruleis, palato admodum gratis. Occupantia nulle multos Austria & Pannoniæ agros, Hungariis Szedory dicitur.

Lugd. Rubi genus alterum, & Tragi & Theophrasti. An Tab. Rubus arvensis, Bronbeeren. Figura enim Tabern. & titulus videntur convenire Rubo minori caeruleo, quamvis Compiler non distinguat à majori & pro eo po-

nat: verum ei non novum omnia confundere. Ger. malè ponit pro Rubo, & Trago ligum Tab. quæ nobis potius Rubi minoris fructus caeruleo videtur. Schv. Rubus arvensis, & H. n. Rubus. Cels. Rubi differentia altera, & non huiusmodi. C. B. pin. Rubus x. sive repens fructu caeruleo.

Rapis flavorum gaudet nec non humectis nonnullis & macris & in celis ignis. Flores Maio mensis erumpunt: Mora flore excusso subsequuntur.

Locus & Tempus.

RUBUS IDEVS SPINOSVS FRV-
ctu rubro & albo.

CAP. III.



RUBUS IDEVS Deser.

vulgari illo senticoso minor & minor, brevibus & ferè innoxis spinulis horridus, interdum is omni indacens potissimum inquit Tragus in virgibus primo anno profluentibus, sarmentis teretioribus, teretibus & plurimique rectis, tricubitalibus & altioribus, folia ternaria aut quinarum ala modum disposita, pediculis senticulis aut unciis duas longo, lavi, annexa, Rubi

vulgaris foliis si nuda, sed tenera & mollia, superius acrovirentia: inferius incana, ut farina aspersa videantur inquit Tragus, sapore austero: flores albidos excipiunt mora per maturitatem cana, rubentia sunt & alba inter acinos pilis donata, dulci, viridique carnet coloris succo ebria: Tragus ait, odorem ut ferè Violam Martiam spirare. Radix est longa, per terram late se spargens, quotannis succullos producens, qui secundo anno flores fructusque proferunt.

Est Dioscoridis Idæa, copiosè in Ida proveniens, & multo tenerior Rubo, exiguus spinis præditus. Phario, Rubi, gerus, Idæum in Græcis vocatum, tenuius, quam Rubus & Cynosbatus, minoribusque spinis minus aduncis. Et rursus Idæus Rubus appellatus, quoniam in Ida non alias nascitur. Est autem tenerior ac minor, rarioribus calamus [hanc Dilect.] innocentioribusque, sub arborum umbra nascens.

Galenus, & Paulus, & Aëtius Rubi Idæi non meminerunt, velut sub Rubo comprehendenti, cui viribus respondet. Non alias Plinius nasci dixit quam in Ida: Dioscorides tamen non negat etiam alibi provenire. Et certè communi ferè peritorum consensu, multus etiam passim per Germaniæ sylvas nascitur, & is esse iudicatur, cuius fructum Fundaber, i.e. Vvam cervæ appellant. Et profectò non alius fructus esse mihi videtur (inquit Cels.) quem lib. cap. 4. & 5. Asclepiades in pharmaco Art. rhabiani Vvam ursi appellavit. De qua Galenus sic ait. Quæ Ursi vva appellatur & in Ponto nascitur, planta est humilis & fruticosa, folio membræ, fructum ferens rubrum, & rotundum, gustu austero, quem Ursi Vvam appellant. Huc accedit, quod ob uris hunc fructum expeti, hodièque notum est.

Rubi tertium genus hoc licet recentiores vocent Cynosbator, vel Tragi tamen iudicio rectè Dioscoridis

HISTORIAE PLANTARVM

Scoridis *Idae* hoc est, Rubus Idæus nuncupatur, ceterum dicendi Rubus Polybatea, à copia motorum sic non nata. Hancille describit, ejusque figuram ni fallor capite sequenti exhibet pro Chamæbato. Porro monet Tragus quoddam Fraga per Rubum Idæum intelligere, sed arroganter nimis. Sunt & recentioribus (inquit Matth.) qui Rubi quoddam genus, quod in montibus Tridentinis, praesertimque Ananienfibus nascitur, quodque rubra montis, Fragis non dissimilia, nullis intus ossiculis, quæ ab incolis vulgò vocantur *Ampomelle*, gustui non injucunda profert, pro certo credam Rubum Idæum esse: Sed equidem non video quomodo illorum sententia prorsus rectè probari possit, &c. Nam in Ida provenit. Idem postea com. lat. & it. *Idæus* Rubus et si ab Ida monte denominari coeperit, quod ibi copiosissimus fortasse habeatur, nascitur tamen in aliis etiam montibus. Nam in Boemia non solum habetur in montibus, ubi *Idæus* copiosissimus, sed & in hortos transferatur.

Meminit ergo Matthiolus, ut ait Turn. Rubi cujusdam baccis rubris suavis, sine acinis, quam Neotericorum aliqui Rubum Idæum nominarint, ut autem se non videre, quæ ratione hæc sententia probari possit. Cum enim dicat Diosc. Rubum Idæum ab Ida nomen adeptum, inde colligi posse putat, non alibi Rubum Idæum, quàm in Ida crescere, &c. Sed hoc argumenti genus, quo frequenter utitur Matthiolus, in veritate evertenda nihil planè concludit, non magis quàm hoc, Stoechas in Stoechadibus insulis nascitur Dioscoridi, Ergo quæ in Arabia, Hispania & Italia nascitur, Stoechas non est. Non enim ait Diosc. Rubum Idæum solummodo in Ida provenire, sed ibi copiosissimam esse: interim non negat quin alibi possit nasci. Et sanè Bellon. in Ida monte Rubum Idæum invenire non potuit.

Tab. Rubus hircinus Boissier / quem Compiler non rectè describit & distinguit à Rubis: titulus etiam non convenit figuræ, quæ est Rubi Idæi. Nec melius Ger. ponit figuram Taber. Rubi Arvensis, quæ mihi potius videtur Rubi minoris fructu cæruleo.

Rubus Idæus Cord. in Diosc. Ryff. Lon. (horum duorum figura non commendanda. Lon. quidem maiorem posuit pro Boissier:) Cam. Ep. & hist. Lac. (qui Fragariam exhibet) Lob. Adv. Obl. & Ic. Ang. Dod. Gesn. h. coll. & cat. Cast. & Schvvenckf. cui etiam Rubus cervinus & Cervirubus. Czf. Rubus, montibus proprius, fructu in maturitate solum rubescens, non nigrescente, sapore acido, gustui grato, quem in Alpibus *Ampomelas* vocant. Lugdun. Rubus Idæus spinosus. Glac. hist. Rubus Idæus *Idæus*, quoad iconem, Rubus Idæus vulgaris, quoad descr. rubro & albo fructu. Vtrorumque meminit Thalius: rubicundo fructu communem passim tradit; candido rariorem.

C.B. apud Matth. ambos conjungit, eos tamen in pin. separat: & hinc Rubus, sive Idæus spinosus: & Rubus, sive Idæus fructu albo. Hic est Camer. h. Rubus Idæus leucocarpos, i.e. fructu albicante, odoratissimo.

Idæus Græcis, Lat. Rubus Idæus: Ger. *Symbecker* / *Borbeer* / & *Bimberstauden*: Tragus ait & *Bimberstauden* vocari, sed hæc vox magis propriè Cynosbaton denotat. Belg. *Binnebesien* & *Binnebesmen*. Gall. *Framboisier* (*Framboisier*) quali Fragariam ligneam aut silvestrem. Ital. *Rubus* & *Rovo Idæus*: in Baldo *Ampomelle*: Hispan. *Cereja Idæa*: Angl. *Raspia Bush* / & *Framboise Bush*. Fructus sive mora Idæi Rubi nominatur propriè, Ger. *Bimbeer*: Gal. *Framboisier*: Allob. *Amp.*: Angl. *Framboise* & *Bimberg*.

Flores Mayo, Junio & Julio mensibus abeunt in mora, quæ diu subsistere nequeunt: inter paucos

etiam dies verticali in iis nascuntur, & cum proinus pereunt. Vliginosis & umbrosis silvis, locisque unimè apricis, neque non rotulentis & arenosis saxis gaudet. Potentius, ubi *Ambre* vocant, sicut & Montbelgardi, ex eo succum condiunt more Citronum, jucundissimi saporis.

Eadem præstat, autore Diosc. quæ Rubus. Ceterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissime illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicisque ex aqua bibendus datur. Eadem Plin. duobus in locis repetit. Ad quasvis non solum ardentes febres aqua è Rubi Idæi moris distillata utilis est, sed & jucunda & grata ægris cum non propter manifestam refrigerandi facultatem, tum propter suavisimum quem exhalat odorem violaceum. Decoctio tenellarum frondium foris, inque inflammationibus convenienter in linteolis imponetur, nam sedandi illas, & restringendi vi pollere id medicamentum certè experientia docuit. Qui cibis in ventriculo continere nequeunt, & frequentibus vomitionibus infestantur, iis fructus devoratus, & foras recentia tusa, ac foris stomacho imposita, mirè profunt. Folia Rubi lixivio decocta, si illo caput aliquoties abluis, capillos denigrant. Recentia trita & inflammationibus epatis & stomachi foris imposita, calorem remouent, deliquiumque animi & vires ægrotis addunt, quæ omnia aqua distillata efficacius præstat, potu & illitu, quemadmodum supra quoque Tragus meminit. Idibus serpentium illita folia addito oleo & vino veneno adversantur. Ex Rubi Idæi fructu succo expresso, Gesn. Syrupum parare solet, quem vel Sapphicis & Smaragdinis ad cor roborandum, anteferre non dubitat. Is enim summo pere oblectat, tum aspectu floridissimi & pellucidi ruboris, tum odore gratissimo tum sapore inter dulcem & acidum suavissimo, idque expertus in seipso & aliis. Ex moris Rubi Idæi exprimi posset vinum in usus multos, ad ventriculum imbecillum, alvi fluxus, variis que gingivarum, dentium, uvulæ, palati, aliarumque partium affectus. Calculosis utile est. Aquæ stillatæ florum Rubi cochlear. i. mane & vespere assumptum cum quatuor cochlearibus vini.

RUBUS IDÆVS NON SPINOSVS.

Ignitur frequens (inquit Lugdun.) in Allobrogum monte Gratianopoli vicino, quem vocant la Motte, caulibus multis sesquipedalibus, ut Idæus Chamæbatus jure nominari possit, foliosis, sine spinis ullis, folio Rubo Idæo simili, aversa parte candido & lanuginoso: fructu rubro, sed non ut in superiore rotundo & dulci, verum ex granis sic coagmentato, ut in metæ modum fastigiatur, acido sapore etiam cum maturuit, fragi magnitudine. Incolæ vocant *des Asnes*, & ab Idæi Rubi fructu probe distinguunt quem vocant *des Ampes*. Tragus Chamæbatus speciem esse existimat, nec male Rubo Idæo conjungi & in hortum translatum in Rubum Idæum mutari, omniaque quæ de Rubo dicta sunt, huic fructui rectè attribui posse scribit. Hæc Lugdun. cujus descriptio multum videtur differre à descriptione Tragique paulo post proponenda ad historiam Rubi alpini humilis. Non placet præterea ex Tragò desumpta icon, quæ non alia videtur, quàm Rubi Idæi spinosi: sunt enim in ipsa iconè spinæ, & fructus minime fastigiatus in metæ modum, sed ternis, aut quaternis acinis solum constans.

C.B. apud Matth. Rubus Idæus non spinosus. Eid. pin. Rubus, sive Rubus Idæus levis: Chamæbatus sive Rubus Idæus alter, Trag. Rubus, Cord. in Diosc. Rubi alia species, Gesn. h. Boissier / i.e. baccæ hircinæ, Lon. Rubus hircinus, Tab.

Rubus

Syst.


Rubus Idæus non spinosus, Lugd. Rubus Idæus Placz, Clusii hist. de Rubus, Ger. ic. C. Bauh. sententia de hoc Rubo aliena est à nostra opinione. Et præsertim Rubi alia species Gesn. h. est nobis Rubus minor, &c. Rubus, Ger. ic. & Bodßbeer Lon. itémque Rubus hircinus Tab. ic. est Rubus Idæus spinosus. An porro Rubus Placz, de quo mox agendum, idem sit cum præsentī, judicent alij. Demum, Chamæbatus Tragi, quoad descriptionem videtur Rubus alpinus humilis; quoad iconem verò Rubus Idæus.

RUBUS SINE SPINIS Valentinus.

Idæi Rubi genus Clusio ostendebat Io. Plac. in monasterio D. Virginis, cui cognomen de Iesus, primo ab urbe Valentia miliari, sine spinis, foliis Rubi mollioribus, longis sarmentis per terram sparsis, cujus fructum dicebat Rubo vulgari minorem, aliàs illi admodum similem. Ceterum Plac. hanc plantam Rubum Idæum censuit, fortè quod Dioscoridis latinus codex cap. de Rubo Idæo, hæc verba, *quamquam & sine spinis invenitur*, addita haberet, præter græci codicis fidem. C. B. pin. cum præcedenti Rubo eundem facit.

RUBUS ALPINUS HUMILIS.

CAP. IV.



Rubi genus hoc, quod *des Chevettes* vocant Burgundi, planta est admodum humilis, palmatis ut plurimum, aut paullo major, mollis, sine spinis: folia terna ut in Rubo Idæo vulgari, mollia, viridia, non ut illa subtus alba: mora punicea ex longo pediculo in ramorum extremitate plura, capitulo ceu Ruborum, sæpe uno acino vel duobus constant, interdum tribus, rariùs quatuor, sapore grato, acido:

granum unum singulis acinis mediocriter durum, sublongum, rugosum, majus, quàm semina Rubi Idæi.

Rubus p. am. Clus.

Clusius sic fusiùs describit: Pedalem non superat altitudinem, teretibus, subrubentibus, & hirsutis viticulis, in quibus bina aut terna folia, Rubo Idæo à plerisque nuncupati penè similia, h. e. terna simul ex eodem pediculo nascentia, rugosa, non hirsuta tamen, nullisque spinis horrentia, valdè exsiccantis & adstringentis gustus, deinde amariusculi: in summis viticulis & supremis earum alis flores quidem fert (sed cujus formæ aut coloris, ignoro, verisimile est Rubo Idæo aut humili pares) deinde fructum Rubo vulgari aut Idæo minorem, h. e. minore acinorum numero constantem: etenim binos tantum, ternos, quaternos, aut ad suum quatuordecim.

Tom. II.

nos acinos habet, longe tamen majores quàm in ullo alio Rubi genere, omnino rubentes, & ad succi plenos, ut quodammodo transparent, acidi & palato gratissimi saporis: continent singuli isti acini singula grana alba, & inæqualia, adstringentis gustus, radix longe, latè que serpit, & longas interdum viticulas humi spargit, quæ subinde radices agunt.

Chamæbatus, seu Rubus Idæus alter, inquit Tragus, non ubique locorum in umbrosis arbutis provenit, virgis tenuissimis humi sparsis, quæ non aliter atque Fragaria, aut Rubi vulgaris coliculi, se ipse propagant; folia gerit Rubo adsimilia, sed magis exigua nullis spinis horrentia; fructum edit Augusto mense, sed non copiosum: Atque is nihil aliud est quàm Morum rubrum magnitudine fraga non excedens, ternis aut quaternis acinis constans, fructui Rubi exiguo similis, gustu vinum referente, sed pergrato prædictus; radix gustum obinet asperum & ad amaritudinem quandam vergentem. Ea quotannis novos emitit & teneros coliculos. Hæc Mora in V. Valgoia nostra & apud Mediomaticas Bodßbeer vocant. Ego existimo Chamæbati speciem esse, aut certè non male Rubo Idæo conjungi posse. Nam in altissimis montibus gignitur, nec alibi anquam illum me reperisse fruticem memini. Ceterum cum in hortulos meos illum transtulissem in Rubum Idæum mutatus est. Quæcunque de Rubo dixi ea puto huic quoque frutici attribui rectè posse. Hactenus ille. Ego jam antea monui me dissentire à Lugdunensi existimante suum Rubum Idæum non spinosum eandem plantam cum hac Tragi, quæ occasio ut hinc integram descriptionem ex eo posuerim, licet eandem plantam existimem cum hac quam hic propono, cujusque descriptionem ex Clusio pono: nihil enim invenio quod reclamet præter iconem, quæ est potius Rubi Idæi, ut in qua appareant spinæ & mora multorum acinorum: respondet etiam tota descriptio Tragi. Quare nullus mihi persuadebit eam mutari in Rubum Idæum ut ipse ait se observasse: quanta esset in fructu, foliis & caulibus differentia à Rubo Idæo ab ipsemet descripto: suspicor deceptum Tragum in sua mutatione quam se perhibet observasse: Quandoquidem Rubus Idæus & Chamærubus in iisdem montibus proveniunt, nempe V. Valgoie ut ipse testatur: faciliùs fuit Trago unam radicem pro altera absumpsisse, quam tantam metaphoram quasi poeticam everisse.

Notus Gesnero haud dubie fuit humilis hic Rubus, eumque de Lunar. Rubum Idæum; de hort. verò Rubum alpinum humilem appellavit.

Clus. pann. & hist. Rubus saxatilis, sive petreus alpinus, quia solis saxosis & petrosis locis nascitur. Adq. em modum rustici montani Steinbeer [petreæ bacca] quoque vocant. Chamæbatus Theophrasti non ineptè ejus judicio etiam dici potest, quem Gaza Humi-Rubum interpretatus est. Rubus saxatilis alpinus, Simlero. Cam. h. Rubus parvus saxatilis Clusij.

Lugd. meminit Rubi Idæi non spinosi Allobrogum, quem ait vocari *de Asnes*, putatque eundem cum Chamæbato Tragi. Præterea ejusdem iconem assunxit, quæ est Rubi Idæi vulgaris, non Chamæbati, ut antea dictum. Conferenti descriptionem Rubi Idæi non spinosi Allobrogum cum Tragi Chamæbato faciliè apparebit insignis differentia. Tabern. Rubus hircinus, Bodßbeer. Nomina, quæ Compiler ex Trago mutuatus est, conveniunt Rubo alpino humili, sed non icon, quam hoc titulo exhibet, est enj. Rubi Idæi vulgaris. Sed consuetæ excusat

Morum rubrum.

Chamæbatus
Rubus Idæus.Rub. Idæus
Gefn.Rubus saxatilis
petreæ
bacca
Bacca petraea.Rubus hircinus
Tab. tabern.

HISTORIAE PLANTARVM

etiam ignoranda: discrimina Riborum non novit. Gerard. Rubus Saxatilis. (Stenclade/ Berry tree/ Schvv. Rubus alpinus. Item Rubus hircinus. Eodem uni plantæ duplicem dedit inscriptionem? Thal. Rubus minimus. C.B. pin. Chamærubus spinis carens sive saxatilis.

Rubus alpinus.

Rubus minimus.


Locus.

Abundè provenit in saxosis collibus Neuberger monasterio imminentibus, sub celsissimo ejusdem nominis monte, cujus summum jûgum perpetua nive oblitum. Crescit & in aliis scopulis qui circa celsissimorum montium radices sunt, non in ipsis montium jugis. Augusto mense colligebat Clusius maturo suo fructu onustum. Ego provenientem observavi in Burgundia montanis prope Marhebi comedunt. Vidi alias in Sabaudia montibus.

RVBO IDEO MINORI AFFINIS CHAMÆMORUS.

CAP. V.

Descriptio.



Inter mites Rubos etiam censenda est hæc elegans planta cujus iconem & historiam Clusio communicabat Thomas Pénz, Londinensis Medicus. Dodrantalibus autem prædita est viticulis, in quibus alternatim tria, quatuor, rarius quinque folia, scabra, Malæ, vel potius Mori [novella videlicet & primùm nata. mavis tamen Clus. cum Ribes vulgari solim conferre] foliis non valdè

dissimilia, in quinque præcipuas partes divisa, & per ambitum serrata, longis pediculis innixa, qui ex binis alis sive apophysis cauliculum amplectentibus exeunt. Summum caulem exornat flos unicus quinque foliolis ex nigro purpurascens constans. Fructus Mori fructui [Rubus vulgaris verius] similis (unde nomen) sed paulò minor, primùm albicans, & acerbus, postea ruber, ex acerbo dulcis: radix utcumque nodosa, ex singulis nodis paucas fibras spargens, mirè se propagans, & quàm longissimè serpens, aded ut brevi tempore maximum spatium occupet.

Angli Antherries appellant, h.e. nodosam hanc, à fructu nodis simili. Clus. pan. & hist. itemq; Ger. Chamæmorus dicitur. C.B. pin. Chamærubus spinis carens; sive foliis Ribes Anglica.

Locus & Tempus.

Nivosa & aperta loca amat, summòsque montes, & magnà copiam inter Ericas provenit monte Engleborov totius Angliæ celsissimo, duodecim miliaribus à Lancastria. Floret Junio & Julij initio fructus Augusto maturus est.

CHAMÆMORVS NORVVGICA.

Chamæmorus Norvvgicus.

Chamæmoro superiori valdè affinem in Norvvgia & finitum regionibus nasci ex Henrico

Hoieri epistola intelligimus. Clusius, qui & ejus fructum conditum sub extremum annum 1594. mittebat, & insequentis anni Junio virgulas, cum foliis & flore inter chartulas repositas. Erant autem hæc virgæ tenues, digitalis longitudinis, fusci coloris cortice obductæ, quibus inhærebant uncialibus petiolis folia, vulgaris Ribes foliis non valdè dissimilia, sed paulò magis orbiculata, in breves aliquot lacinias divisa, tribusque eminentioribus nervis aversâ parte prædita, in quibus multæ venæ ad circumferentiam sparguntur, in ambitu dentata: & summis virgis exeunt oblongiores tenuioresque petioli sustinentes singularem caliculum, è quo flos emergit candidus, nunc quaternis, modò quinis foliolis constans, umbilicum occupantibus multis exilibus staminibus albis cum flavis apicibus: flori fructus succedit, fragi magnitudine, rubens aut pallidus, cujus interior pulpa mollis, humida, mucilaginosâ exiliâ acinulorum plena, gustu non insuavis.

Descriptio.

Paludosis & humidis locis gaudet, & maturitate. Natalis. tem. acquirit fructus, mensibus Junio, Quintili, Sextili: ab incolis yerd Molekbeeren appellatur.

C.B. pin. Chamærubus spinis carens sive foliis Ribes.

Ceterum, quæ conservandi hujus fructus ratio, quàm admirabiles ejus facultates, cum ex ipsius Hoieri epistola, tum ex iis quæ ipse anno 1595. præfens mihi Lugduni confirmabat, subijcere libuit. Ex ipso fructu, inquit, Electuarium rudi minervâ conficiunt quotannis Norvvgij, atque Finmarchij, in hunc sermè modum. Baccas in fistiliâ aut aheno per se ad mediocrem consistentiam coquunt, nullo alio addito liquore: cum enim succi plenæ sint & molles alieno humore irrigari non expetunt. Quæquam in delicatioribus sunt nonnulli, qui melicrati Florentis (quo summè delectantur Septentrionales isti) aliquid affundant. Hanc confectioem idoneis vasibus exceptam, & ne corrumpatur ab ambiente aëre, butyro dissoluto obductam usui studiosissimè reservant: nobile sanè, & probatissimum illis adversus scorbutum remedium. Etenim non facile credas, quæ miracula ista gens, solâ hæc medicinâ faciat quotidie: ut omnino satendum sit, nihil ad hanc esse vel Cochleariam illam tot encomiis hæctenus celebratam, vel Becaburgiam, vel Silymbrium Cardaminem, & id genus alia, quibus Germani sese efferunt. Et merito admiranda singularis Dei benignitas, quod Nordlandiæ longius ad Septentrionem remota, & fœdissimis morbi obæli, solique inclementiam miserabiliter scatenti, indigenis remediis prospicere voluerit: enim verò morborum crudorum, putridorum, melancholicorum, mira hæc ubique seges. Idcirco necessitas miseris rusticanos varia auxilia edocuit, ut nunc vel in gravissimis casibus pauperculus aliquis accommodatè sibi suisque mederi sciat. Ita nonnulli scorbuticos, quamvis ridiculè, tamen benè atque utiliter hunc in modum curant. In vicinam aliquam insulam moris abundantem exponunt, ibidemque solos reliquos, domum non transferunt, priusquam sanitati sint restituti. Tum enim illi, quasi ab omni humanitate exclusi, vitam tamen (quod credibile est) cupidi, moris istis vesci coguntur, sive ut extremo remedio promissam sanitatem recuperare tentent, sive ut sitim, quâ ut plurimum torquentur, extinguant. Dumque hoc ad satietatem agunt, sine dubio intra paucos dies oppidè convalescunt. Hieme verò quando id non licet, electuario suo non minus feliciter utuntur, sine certâ dosi, aut custodiâ. Aliqui toto curationis tempore, nullo alio alimento utuntur. Hæcenus Hoierus.

Condimento fructum.

Facultates.

CHAMÆ.

CHAMÆMORVS ALTERA
Norvegica.

*Chamæmor-
us baccifera.*
Idem Hoierus, aliam quandam Chamæmorum
bacciferam, similibus pene prædictæ foliis obser-
vavit, cujus historiâ Clusio anno 1596. commu-
nicavit. Fruticosa autem quæ la nst ipsa erat, quæ
Ribesium foliis & fructu pro sua proportione
admodum æmulabatur, ut non dubitavit Clusius ter-
tiam Ribesij speciem appellare. Dodrantalis por-
to erat, cortice petiolorum nigricante, foliis latis,
dissectis, Vitis foliorum modo: baccis in cujusque
pediculi apice quamplurimis conjunctis tanquam
in umbella, non, ut in vulgari Ribesio, multis ob-
longis racemulis pendentibus, rubentibus, acidu-
lis, saporis valde ingrati; Incolis Teticberen nuncu-
patis.

C. B. pin. Chamærubus spinis carens 4. sive foliis
Vitis: Chamæmorus altera Norvegica Clusij.

RVBI FACIE SENTICOSA PLAN-
ta Lobelio. CAP. VI.

Alterius illic
(in India) na-
ta arboris truncum
aut bacillum expri-
mendum curavi-
mus, qualem cum
aliis accepimus.
Carpi crassitie est,
longam hastam æ-
quans, & cortice
nigro, deriso vesti-
tus, tuberculis cras-
sis, senticosis, cre-
berrimis, in clava
modum muricato,
solido & gravi præ-
dura ligno.

Lob. Adv. & Ic.
Rubi facie sentico-
sa planta.

C. B. pin. Rubus
6. sive exoticus: Ar-

boris truncus spinosus, Lugd. descr. ac figura sub ti-
tulo Nerij facie secundo loco habetur.

CAPPARIS SPINOSA ET NON
spinosa. CAP. VII.

Impertinens nihil Capparum luxuriantibus lon-
gè, latèque radicibus veteres prodidère. Ipse
autem frutex multis etiam stolonibus præditus
est, quos aduncæ spinæ deorsum spectantes Ru-
borum in morem armant, quanquam & spinarum
expers nullique invenitur: folia alterno positu
nascuntur, circinata rotunditatis, aliàs modicè
acuminata, uncias duas circiter lata, paulum va-
riante longitudine, saporis perquam amari: ex
horum sicut pediculi singulares exeunt longi, qui-
bus capitula insident viridantia, quæ explicata flo-
rem exhibent candidum, Rosæ parvulæ æmulum,
mediam obtinentibus interitis fibrarum cirris: se-
quen penicarpio oblongo clauditur, multum, par-
vum.

Cortices autem, quæ in officinis prostant, parietes
habent crassos, duros, solidos, albicantes, nec fracti-
faciles, acerbis sapore, quem obvestit alius ru-
gosus & pinosus. Tales reperiuntur interdum qui
Tom. II.

CAPPARIS OFFICINARVM
cortex.

citur, aliis Capria, aliis Malum corvi. Alij Ophio-
scorodon vocant, alijs Phyllostaphylon, alijs Thal-
lian, alijs Petram, alijs Holophyton, alijs Ioni-
tem, alijs Oligochloron. Sunt qui Aconiton [A-
conitum Trag.] qui Hippomanes, qui Trichomanes.
Prophetæ Poteram, alijs Peuteron [Pentheron Trag.]
alijs Cor lupi, alijs Haloscorodon [Alischor d. n. Trag.]
alijs Liliam [Crimon Trag.] alijs Thlaspin: Romani Si-
napi Persicum, alijs Inturim, Aphri Hebraicè, co-
gnominant. Differre autè tradit Lybicum quæ apud
Marmaridas nascitur, ab ea quæ in Apulia provenit,
cui & ea, quæ de Rubro mari & Lybia affertur. Qua
de re fulius inter Vires. Quod autem Capparin Cy-
nosbatum, quidam dixerint, factum esse lenibz Cor-
nariis, quod quædam cõmunia cum Cyrosbato ha-
beat. Ast quæ illa sint, non demonstrat. Est Ophio-
staphyles appellatio apud Plinium, i. e. Vix viperi-
na: pro qua in supposititijs Phyllostaphylorū habet-
tur. In Aegypto, inquit is, & Capparis firmioris ligni
frutex seminis quæ & cibi vulgati, caule quoque una
plerumque decepto. Cavenda ejus genera pere-
grina. Siquidem Arabicum pestilens, Asficum gin-
giva inimicum, Apulum vomitus facit, Romæ chum
& alvum movet. Quidam, cum Cyrosbatum
vocant, alijs Ophcostaphylen. Et postea: Inno-
centius Italicum est. Marmaricum itaque dixit
Plinius, id quod apud Marmaridas nascitur,

duos pollices cras-
situdine æquens,
quod si è radice de-
trahatur, simpli-
ter existunt, colo-
remque habet ob-
soletum.

Theoph. non so-
lum caule & ramis
aculeatis constat
Capparis, sed & so-
lio hispido, quæ
cultura deterior
redditur, ut naturâ
sylvestrem dixeris.

Diosc. Capparis
frutex est aculeatus
[arab. d. n.] per ter-
ram in orbem stre-
tus, spinas in Ru-
bus [arab. d. n.] habens
in hami modum
aduncas: folia Mali

Cotonæ [arab. d. n.]
rotunda: fru-
ctum verd Oliva
[arab. d. n.] instat: qui
cùm debiles pan-
ditur florem pro-
mit candidum. Hoc
autem delapso nō
nihil glandis ob-
longæ figura inve-
nitur, quod aper-
tum grana tãquam
Punici mali [Balan-
ste serap.] exigua
rubentiaque intra
se ostendit. Radi-
ces lignosæ sunt,
grandes ac nume-
rosæ. Ceterum,
Capparis inter e-
jusdem Notha &
liis Cynosbatus di-

Theoph. d. n.
Diosc. an-
tearum de-
scribitur.

Arab. d. n.
Notha.

Covera
Diosc.

Cynosbatus

Plin gene-
ra.

Delectum.

ut Dioscorides ait. Palladius Cappar vocat; Serapio
Capparus.

Virg. herba Capparidis, Cynobatos [Cantharus] ob hamatos quos habet aculeos dicta. Phyllo-
staphylon, quod inter folia fructum quasi uvam ha-
beat: Petrea herba à natalibus. Cur Sinapi Persi-
cum à Romanis appelletur, incertum.

Dod. hist. iconem exhibet priorem Plantini: descriptio verò convenit Cappari retuso folio; ait enim folia habere rotundiora, quàm Malus Cotonæ. Turn. in plurali numero Cappares vocat, & tamen tradit tantum spinosam. Gazz. H. lun. & Gesn.

Matth. no. cat. Inturis. Matth. iuxta iconi addit spinas, an ex ipsa
tatur. planta, vel ex lectione Dioscoridis, ambigo: eo mo-
do dispositas, ut ipse pingit, non vidi. Cam. Epit. &
hist. aliam posuit figuram, in qua vix spinæ apparent
& folia rotunda ut erant Matthiolo, qui ait se vidisse
Capparis Cappares frutice non spinoso hortenses, Ferrariz.
non spinosa. Lonic. figuram habet Capparis non spinosæ, licet in
non rotat. descriptione spinosam tradat, nec faciat mentio-
nem non spinosæ. Ryff. Dioscoridis descriptioni ad-
dit Capparis figuram non spinosam, cum tamen
Diosc. aculeatam tradat.

Lob. Adv. Cappares : Obf. & Ic. ficut & Tab. Cap-
paris folio acuto, & Capparis retuso folio : figuræ
duæ. Eafdem etiam exhibet Lugdun. dicitque folio
tantum differre: Et hinc cum Lob. & Compilatore
pingit utramque spinofam. Certè fi nulla differen-
tia alia eft, folium non meretur alteram figuram.

C. Bauh. apud Matth. eandem proponit, dicens. Quæ rotundo folio est, Matthiolum expræssit. I. Capparis, Tragi, Matth. Cord. in Diosc. Dod. Gall. Gesn. h. Lon. Lac. Cast. Lugd. Capparis retuso folio, Lob. Capparis Italica, Cæsalp. Capparis 2. Tabern. II. Capparis Dod. hist. Capparis folio acuto, Lob. Lugd. Ger. Capparis aliud genus, Cæf. Capparis prima Tab. Idem pin. Capparis 1. sive spinosa fructu minore, folio rotundo: Capparis, Tragi, &c. Ang. Lugd. & Rauvv. qui & sylvestrium meminit. Capparis spinosa, Bellon. Capparis rotundior folio, Ger. Item, Capparis 2. sive folio acuto. Et, Capparis 4. sive non spinosa fructu majore: Capparis non spinosa, Bellon. In Arabia arborefcit & hyeme folia retinet, Cappares Alexandriæ majores esse, quàm alibi, quos Cappar appellant, Alpinus author est. Hæcille, cujus multiplex error, studiosum tedio consumere posset. Pingit plantam folio retuso, scribens interim esse rotundo. quasi inter rotundum & retusum nihil intersit. Matthiolum eam non expræssit. Spinæ malè pictæ sunt, quod severus censor Lugd. non animadvertit. Sursum enim spectant, & plures simul conjunguntur, cùm deorsum inclinent, hamatæ sint, & simplices. Nec folia retusa sunt, sed ex rotundo acuminata. Nec prima ejus Capparis, Tragi est, sicut nec Dod. gall. Lacunæ, aut H. Lugdunensis, quæ eandem cum Matthiolo exhibent, excepto Trago, cujus figura neque ad plantam vitidem, neque ad siccam picta videtur. Cordus etiam in Diosc. & Gesn. h. (cui Capparis & Rurpodius dicitur) non concludunt, quam intelligant, imò nec folij acuti aut rotundi ibidem meminerunt. Mirum ergo unde colligat, esse ejus primam Capparin. Loniceri quoque figura esse non potest, spinis enim caret. Cæsalpini tandem Capparis Italica esse requit, quæ virgas simplices profert, sine spinis. Quod idem comprobant sequentia ejus verba. Aliud genus spinosis ramis constat peregrinum: Dioscorides describit illud genus, quod aculeis constat. Cam. h. Capparis vera. Schvven. Capparis major & minor.

Nomen apud Græcos idem, quod apud Latinos
tum in planta, tum fructus obtinet: *καρμυ* siquidem dicitur, nonnullis tamen Latinitis: Arab. *Car-*

par & Kapper. Br. Caparn. Germ. Capperen: Belg.
gis Cappeto: Gall. Caprera. Ital. Cappare. Hesp. Castil.
& Portug. Alcaparn: Ocul. Taperes: Angl. Capper:
Boh. Kappary.

Inter interpretes non convenit, quomodo ^{Capparis}
Ecclesiasticus cap. 12. Et dissipabitur Capparis, sit pro-
^{sacerdotum}
priè explicandum. Aliis enim appetitus est decisa
^{PAGINARIUM}
voce. Alij sunt qui exponunt de libidine, & rei ve-
nereæ appetitu, qui expiret ac emoriatur in senibus.

Montpelij vidi Cappares florentes Autumno, Locus
 Septembri sine spinis: Patavij fruticem siccam cum Tempus
 spinis certo ordine dispositis, ac aliter quam pingat
 Matthiolus: nec animadverti spinas alias sursum
 vergentes, alias seorsum tendentes: Lugduni spino-
 sas Cappares florētes Novembri, unde etiam plan-
 tas habui: quas plantavi in horto Montbelgardi:
 Prostant in officinis venales aceto conditæ parvæ
 & mediocres, asservatæ cum sale marino grumoso,
 quæ ante usum in aqua calida macerantur. Seritur
 (autore Plinio lib. 19. cap. 8.) Capparis siccis maximè
 area in defossu cavata, tipisque undique circum-
 stru- Locus
 tis lapide: aliàs evagatur per agros, & cogit so-
 lum sterilefcere: floret Æstate: viret usque ad Ver-
 giliarum occasum: fabulosis familiarissima. Præstan- Capparis
 tissimas Cappares ex Alexandria Ægypti Venetias Alia
 advehi perhibet Matth. Essè & in Apulia Cappa- Apulia
 rum proventus, unde etiam plurimæ deferantur,
 verū in longè deteriores his quæ ex Ægypto im-
 portantur; provenire etiam Romæ in collapsis æ-
 dificiorum parietibus, ruderibusque præsertim circa
 Pacis templum: itēque Senis, quæ quidem Apulis
 saporis præstantiā minimè cedant: In cultis nasci
 Cappares negare Theophr. lib. 6. cap. 4. de plant. hist.
 Seritamen hac ætate, colique perinde ac segetes &
 legumina, quemadmodum & Plinij tempore, qui
 ferendi rationem jam supra explicavit. Cū ergo
 in cultis locis sat excrevant Cappares, id Theo-
 phrastō repugnare putat Matthiolus, quia gaudere
 locis arenaceis atque tenuibus, cultis haudqua-
 quam exire scripserit: at oppidū quantingerosus
 sit Matth. quo vultu, quo aspectu talia pronuncia- Matth. L
 re audeat, quā sollicitè authorum animos asse- p/ae.
 quatur, hinc apertissimè dignoscitur, cum Theo-
 phrast. rem dubitative proposuerit hoc modo: In-
 turis peculiare habet, quod & folium & caulem ge-
 rit subhispidum, nec Phleum, & Lappaginem æmu-
 latur, quæ foliis mitibus constant: Vnitiirps humi-
 lis humicaulis est: germinat florētque Æstate & fo-
 lium usque Vergiliæ perdurat: gaudet locis arena-
 ceis atq; tenuibus: cultis haudquaquam exire dicitur.
 Sed cum apud oppida & loca plana proveniat, non
 Lascipitij modo apud montuosa: hoc minus verū
 putarunt. Cultus ergo exit, sed cultu levissimo con-
 tenta est, ut docet Columella his verbis. Capparis
 plurimis provinciis sua sponte novalibus nascitur:
 sed quibus locis ejus inopia est, si ferenda fuerit,
 siccum locum desiderabit. Isque debet ante cir-
 cumdari fossula, quæ repleatur lapidibus, & calce,
 vel punico luto, ut sit quasi quædam lorica, ne
 possint eam perturbare prædicti seminis frutices,
 qui ferè per totum agrum vagantur, nisi munimen-
 to aliquo prohibiti sint. Quod tamen non tantū
 incommodum est (subinde enim possunt extirpari)
 quantum quod noxium virtus habent, succoque suo
 sterile solum reddunt. Cultu aut nullo, aut levissi-
 mo contenta est. Quippe quæ res etiam in desertis
 agris citra rustici operam convalescit. Seritur quo-
 que æquinoctio. Fruticat ruri in ora Tyrrenici
 maris, Narbonensi, & Hispanica. Eadem hortis jam-
 diu innotuit.

Capparis, ut videre est apud Dioscoridem, caulis & fructus ad cibi usum sale conditur. Turbat autem alium, stomachoque incommodus est, & fittim in-

Vires & Temperamentum.

um inducit. At cocta Capparis in cibo accepta, commoda magis est stomacho quam cruda. Fructus itaque ejus splenem liquat, si duarum drachmarum pondere cum vino bibatur ad dies quadraginta. Ducit etiam urinam & alvi excrementum cruentum. Coxendicum quoque morbo & resolutioni opitulatur. Fructus si bibatur, rupus item ac convulsus. Ducit & menses, & pituitam de capite detrahunt. Dentium item dolorem sedat fructus cum aceto coctus & collatus. Ceterum radice cortex aridus, cum ad praedicta commodus est, cum omne diuturnum & sordidum ac callosum ulcus repurgat. Imponitur etiam in splenicis, cum cruda hordeacea farina: si vero radix manducetur, dolenti denti auxiliatur. Vitiliginis etiam albas extergit cum aceto trita. Ad vero folia & radix trita, duritias & strumas discutit. Succus autem auribus infusus, vermes in ipsis occidit. Porro Lybia Capparis, quae apud Marmaridas appellatur nascitur, vehementer infiat, quae in Apulia provenit, vomitus concitat, quae vero de Rubro mari & Lybia affertur, acerrima est, pustulas in ore excitans, & gingivas ambedens usque ad denudationem. Vnde ad esum inepta est. Ferunt eos, inquit Plinius, qui quotidie Capparin Italiam edunt, paralyti non periclitari, nec henis doloribus. Radix ejus vitiliginis albas tollit, si trita in sole fricentur. Splenicis prodest in vino potus radice cortex & j. dempro balnearum usu. Feruntque 35. diebus per urinam & alvum totum henis emitti. Bibitur in lumborum doloribus, ac paralyti. Dentium dolores sedat tritum semen, et aceto decoctum, vel manducata radix: infunditur & aurium doli decoctum semine in oleo. Phagadanas folia & radix recens cum melle sanant. Sic & strumas discutit radix: parotidas vermiculosque cocta in aqua. locinoris quoque malis medetur. Dant & ad tineas in aceto & melle. Oris exulcerationes in aceto decocta tollit. Stomacho inutile esse inter auctores convenit. Capparis facultas, ut prodit Gal. lib. de Sim. est satis tonivum partium, & idem minimum alimentum exhibet corporibus ac vescentibus. Fructu vero ejus magis ut medicamento, quam ut alimento vivunt. Idem 7. simpl. Capparis radice cortex vincentem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde acerbam. Ex quo liquet, quod diversis pugnantibus constet facultatibus: quibus abstergere, purgare, incidere potest amaritudo: ex cunctis, incidere, digerere acrimonia: porro contrahere, densare, costringere acerbitate. Itaque lienes induratos, si quid aliud hoc medicamentum vivare valet, tum foris idoneis, illinendis remediis admittunt, tum intra corpus assumptum, si ve decoctum in aceto aut oxymelite, & id genus sive aridum coctum illisque permixtum: quippe cum aperte crassos, lentosque humores hoc pacto sumptum evacuet, nec eos tantum per urinas, sed & per ventrem, saepe etiam sanguinolentos deferat, unde & lienes adjuti sunt, & coxarum dolores. Quin etiam menses promovet, & ex capite purgat, detrahuntque, quod amara quoniam vocant, auxiliaturque rupus atque convulsis. Porro radice & jus cortex ulceribus malignis cataplasmatibus modo impositus, non malum est remedium: ut qui illa extergere valeat, nec segniter desiccate. Praeterea dentium labores praedictarum qualitatum ratione adjuvat, interm cum aceto coctus, interm cum vino, saepe etiam solus dentibus mansus ac morsus. Ex dictis ergo clarum est, incidendi quandam ei facultatem inesse itemque extergendi, digerendi, contrahendi. Vitiliginis siquidem cum aceto detrahunt, & choeradas & duras tumores digerunt, idoneis ad ea medicamentis mixtus. Radice cortici, fructus proportionem vivum respondet, nisi quod ad omnia in-

Tom. II.

becillior. Ino. & folia & caules ejus similem vim obtinent, memini quosdam folijs quandoque paucis diebus duritiem choeradis naturam referentem discussisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam, quod eorum vehementiam obtundit. Nec mirum est, quod aurum vermes amaritate occidant sua. Porro capparis quae in admodum calidis ferventibus regionibus provenit, ut quam fert Arabia, multo est rostrate acrior, adeo ut plurimum etiam habeat facultatis adurentis. Serapio Clysteres ad sciaticam (ut loquuntur barbari) & succo Capparorum, Rasin magna olim experientia factitasse scribit. Capparin affert Simeon Sethi calidam & siccam esse gradu secundo. Contra Fern. m. m. Capparin, cujus florem ac radice corticem usurpant, calidam, licetque esse tertio recessu statuit. Capparis affertur ad nos, inquit Corn. sale conspersa, quod sola recondita putrescat. Sale itaque condita etiam hodie in mutia ad nos affertur. Ex qua exempta & leniger servata, aceto ac oleo affusa, in tribulum venit, intinctus fere loco ad carnes & pisces affatos adhibita. Majores & minores Cappares aiunt Advers. Emponit variis videntur, sed minores in prima sunt commendatione, sexiesque pluri emuntur quam majores: vulgo namque habentur meliores parvae. Sic palati studium salit ingenium, valedudinis dispendio: nam qui sapor illis percipitur, ascit, sedit a mutia, vel ab aceto: alioqui utraque acerrimi ac teterrimi gustus est, seu viridis, seu matura, proindeque minus per paucam carnis & succi, facilius & penitus insubuitur conditura, quam major, quae melioris succi & aprioris alendae carni est. Culinæ proinde error est, minores majoribus praferre. Sed hic consuetus inolevit mos, nam, ut scite dicebat Philosophus, nihil magis adversatur vilerudini aut Medico, quam bonis coquus. Itaque voluptati coquus emat minores magno precio: frangi economus emet (si nos audiat) majores minoris multo, bonae tuerdae valedudini. Radices esse adulterinas quidam imperiti Medici radice quiritantur: nam hac radice nihil vulgariis aut vilius quam in Hispania. Vomitiones Cappares haudquaquam ciete, ut inquit Diosc. exstimat Matth. Nisi forte hae facultate sint praeditae, dum recentes ac virides comeduntur, antequam muriam experiantur, & inde elixentur. Sed infirmat Matth. opinionem, quod forte non eandem Capparin, scilicet Apuleam, cum Diosc. intelligat. Capparis virides ac teneros furculos apud Amatum non aliter quam Terebinthi manduntur aceto simul & muria aut solo aceto condientes. In suis consultationibus tradit Montanus radice Capparum masticatam multam pituitam trahere. Cappares mense adhibet contra lumbricos Celsus. Bayrus, recipit radices Capparorum & illas coquit in lacte alina nigra, usque ad tertiam partem & urgit capillos dimitendo per noctem, hos enim peccando nigrificat.

CAPPARES ARBORESCENTES

Cappares in Arabia invenimus, punilarum fereum altitudinem aequantes, ut nobis consuecenda fuerint, ad earum fructus colligendos, ovi gallinaei magnitudine, & semina intus continentia, pipereis instar calida: ipsae Cappares Inlandibus magnitudine non cedunt. Ut vero album sinapi in vinum vernaciam injiciunt, ne ferveat, sed diutius suam dulcedinem retineat: sic Arabes istarum Capparum semina in suis Vinis commiscere solent, ut dulcia ea conservent, quod etiam Avicenna annotavit. Ballon. Obil. 2. co.

F 3

C.B. pin. Capparis 4. sive arborescens fructu luglandis magnitudine: Capparis Arabica fructu ovi magnitudine, semine piperis instar acri, Bellon. Capparium arbor, Rauv. qui fructus magnitudinem non expressit. Cappares plurimum ab his quae in arborescunt, & quae in Graecia proveniunt, differentes in Tauri montis saxorum fissuris, Bellon. notavit.

CAPPARIS FABAGINEA SIVE
Peplios Lutetianorum.

CAP. VIII.



Longis lentis-
que caulibus
est praedita, glabris,
striatis, ramosis, ad
quorum genicula
nascuntur duo: ex
adverso liti pedi-
culi unciales & ses-
cunciales, bina fo-
lia in summo cacu-
mine gerentes, mo-
dicè distantia, posi-
ta ferè foliorum
Visci, pinguis, ex-
rotundo oblonga,
Portulacæ foliis
quodammodo si-
milis, nervo me-
dium percurrente,
à quo venulae obli-
quæ in margines
exporriguntur, a-

maris, ex eorundem sinu pediculi semunciales pro-
deuntes, florem unum sustinent singuli miniatum,
extra quem prominent longa rubentia stamina,
apicibus donata concoloribus: florem extrinsecus
ambians foliola oblonga, viridantia: siliqua aucto-
re Rauvolfio, Sesamo similis: addit frater C. Bau-
hinus oblonga, angulosa, quatuor veluti ex thecis
composita, in qua semina continentur plura, lata,
compressa, ex rotunditate in acumen desinentia.

Univerſa planta gustu amaro Salicis aut Capparis.
Lob. Obs. & Ic. Capparis leguminosa, sive Fabago Belgarum; Peplios Petri Quishe & Parisiorum.

Rauvolf. Halepi Morgesani, Avicenna Ardisiugi, & Andisia Rhafis.

Dodh. annotat à recentioribus Capparin Fabagineam & plerisque Capparin leguminosam dicit, veteribus notam fuisse non constare: Ceph. Dio-
scoridis esse, non esse facile affirmare, brevi ac succincta admodum apud Dioscoridem extante descriptione: describi verò ab Avicenna capite 28. herbam quandam Ardisiugi nomine: cum qua responderet, si tam gravi esset odore, quam sapore amari-
cante. Si nihil aliud impedit, quam gravis odor, quominus sit Ardisiugi, nos illud recipimus ex auctoritate Rauvolfij, qui ait Halepi ingratiſſimi esse odoris, ac eam ob occasionem incolae crebrè uti ad expellendos vermes.

Cam. apud Matth. ejusdemque Epit. Capparis silvestris sive fabaginea, vel leguminosa: Avicenna Ardisiugi, aut Ardisiugi, Rhafis Andisia. Eid. h. Capparis, Fabago. Tabern. Capparis leguminosa, Ges-
schlecht der Capperen.

C.B. in Lugd. Fabago Belgarum: repetitur in append. Morgesani Rauvolfij nomine: duae descriptiones, ex utraque una facienda erat, siquidem in prima fructus reperiantur: alias figura posterior magis probatur. Fallitur C. Bauh. nam fructus alii-
quos pergitur in ipsa planta, & separatim juxta eam. Eid. pin. Capparis sive Portulacæ folio: Telephium Dioscoridis & Plinij, Colum.

Observavi florentem Augusto, Lutetiae in horto regio: Romæ inter rudera spontè nasci perhibetur apud Camer.

CAPPARI FERÈ SIMILIS


Alhaut.

CAP. IX.

Hevetus auctor est, in Insula Suachem Aethio-
pico littori adjacente, nasci herbam quandam Alhaut nomine, in rupibus, latè sese diffundentem, foliis ferè Capparis, cujus fructus germina sunt, sive capitula rotunda. Folia, radices, fructus, gustu su-
avissimi sunt, & cordi salubres, quibus indigenae ad colicos & stomachi dolores quosvis, praeter ad hepatis & pulmonum affectus utuntur, decoctam tota herba parato, cum Corallij albi pulvere.

C.B. pin. Capparis 6. sive Capparihus similes bar-
ta in Virginia. Sacquennummense haec planta, quæ in stagnantibus aquis reperitur, perinde occidit.

FINIS LIBRI XIII.



HISTO.



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XV.

FRUTICES SCANDENTES ENARRAT, VT
VITES, CONVOLVULOS, ET HIS ALIQUA RATIONE

SIMILES PEREGRINOS, ET AROMATA QUIDAM.

PLANTARVM genus quoddam est, quod non nisi alicrimope, ac sulcero sustinere se commodè potest, quas ob id quod dicitur & Theophrastus Graeci dixerunt, ut Vites, Convolvuli & hu similes. Quamquam Theophrastus, quem & Plinius sequitur Vitem inter arbores recenset: quod sane & de aliis quibusdam mox dicendis quoniam ostendit. Columella tamen diligentissimus stirpium cultor arborem esse negat, sed medium quoddam inter arborem & fruticem esse vult, ut si quis infra patebit. Vnde sit, scandentium illustratio vestiat, triplis ordine producenda. Primus per arborum & similibus huiusmodi alter scandentium pomiferarum, tertius scandentium filigosarum & leguminosarum, subsequens libris dicendarum.

VITIS VINIFERA. CAP. I.



OTIOR est Vitis vinifera, quam ut describi debeat, sed gratificemur frigido subiectis Septentrioni, ut vel lectione novisse discant no-



tissimi etiam ipsis nectarei liquoris parentem, qui nihil subiectis intuenti videri possit, alienae opis indigantiarum & pedamentorum adminiculo innitens tortuoso stipite, sulco, rimosoque cortice huiusmodi, quae ubi tepidioris benignioris coeli auram sentit, gemmas protrudit, in pampinos postmodum, ut familiari illis comparatione utar, Lupi salictarii abiturus, minime tamen inamena illa aspredine horridos, sed lato virore splendentes: ita uti diximus humo sublata capreo-
lori beneficio adminicula sua completa a contemptu vindicatum sese it, flosculorum suaveolentium, quin-

que fibrillis herbidis luteolos apices sustentibus compactilium racemis divitem colonosam speciem excitat uvarum, quas alias ne colori putes obligatam generalitatem, nequa: tanta talique saporum virumque varietate, quantam qualisque tam adversa quam securda valetudine quotidie experimur. Vitis (addit Celsus) quae ambigit inter arbores & frutices, florem non in summo fructus, sed in sede habet, ac plura semina in communi conceptaculo, brevi tempore ad magnam altitudinem crescit, ita ut nisi robora amputatione coarctetur, multitudinem vitium luxurians silvescat: folia fert ampla, variolaciniata, ut Ficus, quos pampinos vocant: flosculos parvos & candidos, ut Olea: racemos ingentes, onustos suis granis, quae uva appellatur.

Vitem arborem dicere videtur Theophrastus. sic enim scribit. Arbor est, quod ab radice caudice simplici ramosum, nodosum, surculosum, haud facile dissolubile assurgit, ceu Olea, Ficus, Vitis. Et inter ostenta in arboribus ait, Nigrum racemum edere candidum fructum; candidum verò nigrum tanquam prodigia, & praeter naturae normam accidere arbitrantur aruspices, ostenta esse aestimantes: solitum verò in Vite Capneia nullo pacto mirantur, nec interpretantur, quasi quae ratione regionis mutari soleant. Sed hoc ita fieri mirum, quoniam una tantum, aut duae, & haec rari per universum tempus mutantur. Et si aliquando ita sit, in fructibus potius discrimen, quam in totis arboribus percipitur. Nam talis rei temeritas, fructibus quoque nonnunquam contingit, ut Vitis caudice suo averso fructet, fructusque absque foliis producat. Meminit porro circa agrum Elephantum (ubi canit inter arbores quoque relecti) phan-

Descriptio
vitis
viniferae

Stipit.
Cortex.

Gemmae
Pampini

Capreoli.

Flosculi.

Racemus.

Folia.

Vitis.

Theophrastus.

Vitis vinifera.

Vitis arbor.

Vitis caudice.

Vitis raris.

Vitis raris.

Vitis raris.

Vitis raris.

Vitis raris.

Vitis raris.

Vitis raris.

Vitis raris.

Vitis raris.

HISTORIAE PLANTARVM

Vitis folia non decidere. Tandem de sativ arborum agens, cum subi his verbis etiam recenset. Vitium quoque differentia maxime numerosa est. Quot enim generatellus, totidem & vitium esse quidam affirmant. Verum inter eas, quae minis fructificant, gemmis crebrioribus constant, solidioresque sunt. Ex eodem Theophrastus haec habentur. Vitis corticem speciem radicis habere, nervosum, macilentum, cunicis multiplicem, quem auferunt cultores, medullam carnosam: materiem lentam: radices tenues, sobolem sursum versus procreantes, ideo evellendas, quae in summa tellure sunt: folia ampla, aliquatenus hila, longo pediculo propendentia, & tremula ex nervulo, & cortice, & carne constantia: fructificare ex novellis furculis: florem lanugineum amplectentem fructum: nam decidunt perforati: fructum congestum: luccum vinosum. Ex semine natam degenerare, ut pro nobili ignobilis, & saepe silvestris oriatur, adeo ut quaedam fructum non maturet, quaedam eundem non compleat, sed ad florem usque perducatur.

Marcum Varronem quoque Vitam arborem facere colligitur ex sequentibus. Praeterea quae arbores in ordine sativae sunt, eas aequabiliter ex omnibus Sol & Luna coquunt, quo fit ut uvae plures nascantur, & ut celerius coquantur, quas res duas sequuntur altera haec duo, ut plus reddant multum & precium pluris.

Columella, ut suo loco constabit, nec arborem, nec fruticem, Vitam proprie dixerit. Ejus autem genera haec tradit. Vitis, inquit, vel ad escam, vel ad effusionem deponitur. Ad escam non expedit institui vinea, nisi cum tam suburbanus est ager, ut ratio postulet in conditum fructum mercantibus velut pomum vendere, quae cum talis est conditio, maxime praecoques, & duracinae, tum denique purpureae, & humastae, dactylisque & rhodiz, libyae quoque & cerauniae, nec solidae quae jucunditate saporis, verum etiam quae specie commendari possint, confecti debent, ut stephanitae, ut tripedanae, ut unciae, ut cydonitae. Item quarum uva temporibus hyemis durabilis valis conduntur, ut venuculae, ut nuper in hoc usum exploratae in iunissiane. At ubi vino consulimus, Vitis eligitur, quae & in fructu valet, & in materia, quod alterum ad rectius coloni, alterum ad diuturnitatem stirpis plurimum confert. Sed ea tum praecipue est, si nec nimis celeriter spondet, & primo quoque tempore deflorescit, nec rursus tarde mitescit, quin etiam pruinas, & caliginem, & carbunculum facile propulset, eademque nec imbribus putrescit, nec siccitatibus abolescit, talis nobis eligatur vel mediciter fecunda, si modo is locus habetur, in quo gustus nobilis, pretiosusque fuit: nam si sordidus, aut vilis est, feracissimam quamque ferere conducit, ut multiplicatione frugum reditus augeatur. Ferè autem omni statu locorum campestris largius vinum, sed jucundius affertur collina, quae tamen ipsa modico statu caeli magis exuberant aquiloni prona, sed sunt generosiora sub austro, nec dubium quin sit ea nonnullarum vitium natura, ut pro locorum sit bonitate vini modo vincat, modo superetur. Saepe traduntur

Amineae excepto caeli statu nimis frigido, ubicunque sine etiam si degenerent, sibi comparata, magis aut minus probi gustus vina praebere, & ceteras omnes sapore praecedere. Ex, cum sint unius nominis, non unam speciem gerunt. Quas germanas cognovimus, quarum minor ocyus & melius deflorescit, habilis arboris nec non jugo, illa pinguiem totam, haec mediocrem desiderat, longèque praecedit majorem, quia & imbres, & ventos fortius patitur, nam major celeriter in flore dormipitur, & magis jugis, quam in arboribus, ideoque non est vineis

apta, vix eam arbustum, nisi praepingui, & uvida terra, nam nec mediocri valet, multoque minus in exili, prolixarum frequentia materia, imque foliorum, & uvarum, & ramorum magnitudine dignoscitur. Internodiis quoque rarior, largis mactibus a minore superatur, gustu non vincitur, & haec quidem utraque Amineae. Verum & alia dux gemina, quae ab eo quod duplices uvas exigunt, gemellae vocantur, austerioris vini, sed aequae perenniae. Earum minor vulgo notissima, quippe Campaniae celeberrimos Vesuvii colles, Surrentinosque vestit. Hilaris inter ceteros savoris status austeris affligitur. Ceteris itaque paribus Italiae non tam vineis, quam arbutis est idonea, cum praedictis regionibus commodissime jugum sustineat, materiam, fructumque, nisi quod duplicem non absimilem minorem germanae egerit, sicut major gemina minori germanae, quae tamen minor hoc melior est, quod fecundior etiam mediocri solo, nam illi nisi praepingui non respondere dictum est. Lanatam quoque amineam quidem maxime probant, quae hoc vocabulum non ideo usurpat, quod sola ex omnibus Amineis, verum quod praecipue canescit lanugine. Sane boni vini, sed levioris, quam superioris, crebram quoque materiam fundit, atque ideo propter pampini densitatem saepe parum recte deflorescit, eademque maturo fructu celeriter putrescit, super hunc numerum, quem retulimus, singularis habetur Amineae, majori geminae non dissimilis, primum specie pampini, & trunci, sed vini sapore aliquanto inferior, quamvis generosissimus sit, proxime praefenda etiam propriis virtutibus, nam & feracior est, & flore melius exuitur, spillaque, & albidas uvas, ac tumidioris acini gemit, gracili arvo non descescit. Atque ideo inter uberrimas uvas numeratur. Nomertanae vini nobilitate subsequuntur Amineae, fecunditate verò etiam praevenerunt, quippe cum se frequenter impleant. Sed earum quoque feracior est minor, cujus & folium parcius scinditur, & materia non ita rubet, ut Amineis, a quo colore Rubellianae nuncupantur, eademque feciniae, quod plus quam ceterae fecis afferunt. Id tamen incommo- dum repensant uvarum multitudine, quas & in jugo, sed & in arbore melius exhibent. Ventos, & umbres valenter sufferunt, & celeriter deflorescunt, & ideo citius mitescunt, omnis incommodi patientes, praeter caloris, nam quia minua acini, & duracutis uvas habent, cibus confiduntur. Pingui arvo maxime gaudent, quod ubertatem aliquam natura gracilibus, & exilibus uvis praebere valeat. In gendum, ac rosodum solum & caelum commodissime sustinent Eugeniae, dum sunt in Albano colle. nam

mutato loco vix nomini respondent suo, nec minus Allobrogicae, quarum viri jucunditas cum regione mutatur. Magnis etiam dotibus tres Apianae commendantur, omnes feraces, jugoque, & arboribus satis idoneae, generosior tamen uva, quae nudis foliis est, nam dux Lanatae quamvis frondibus, & palmitum pari facie florere, qualitate sunt dispariles, cum tardius altera recipiat cariem vetustatis. Pingui solo feracissimae, mediocri quoque fecundae praecoquis fructus. Ideoque saporis locis aptissime vini dulcis, sed capiti, nervis, venisque non apta, nisi maturè lecta, pluviiis, verisque & apibus afferunt praedam, quarum vocabulo propter hanc expopulationem cognominantur. Atque haec pretiosissimus celebritatis. Possunt tamen etiam secundae notae vites proveniunt, & ubertate commendari, qualis est Bitunica, qualis est Basilica, quarum nunc em Cocolubem vocant Hispani, longe omnium primae utraque proximae. Nam & retulimus vinum earum patitur, & ad bonitatem aliquam per an nos venit, iam verò ipsa fecunditate praestant omnibus, quas

quas antequam retuli, tum etiam patientia, quippe turbine, imbrésque fortissimè sustinent, & commodè fluunt, nec deficient macro solo frigora melius quàm humores sustinent humores co n nodis quàm siccitates, nec caloribus tamen contrahantur. Visula deinde ab his & minor Argitis terræ mediocritate letantur. nam in pingui nimis viribus luxuriant, in macra tenues & vacuæ fructu veniunt. Amiciores jugo quàm arboribus, sed Argitis etiam in sublimibus fertilis vastis materiis, & uvis exuberat, humillimis tabulatis aptior. Visula brevem materiam & latum folium exigit, cujus amplitudine fructus suos optimè adversus grandinem tuetur, qui tamen nisi primo quoque tempore maturi legantur, ad terram decidunt, humoribus etiam priusquam de fluat putrescunt. Sunt & Helvolæ, quas nonnulli Varias appellant, neque purpureæ, neque nigra, ab helvo (nisi fallor) colore vocatæ, melior est nigrior abundantia vini, sed hæc sapore pretiosior. color acinorum in neutra conspicitur æqualis, utraque candidi multi alternâ vice annorum plus, aut minus afferunt, melius arborem, sed & jugum commodè vestiunt, mediocri quoque solo fecunda, sicut Pretia minor & major, sed ex generositate vini magis commendantur, & frequentibus materiis frondent, & citò maturefcunt. Albulis utilior, ut ait Celsus, in colle quàm in campo, in arbore quàm in jugo, in summa arbore quàm in ima, ferax & materix frequentis, & uve, nam quæ Græcæ vites sunt, ut Marcotice, Thasiz, Plythiz, Sophoriz, sicut habet probabilem gustum, ita nostris regionibus & raritate uvarum & acinorum exiguitate minus fluunt, Inerticula tamen nigra, quam quidam Græci Amethyston appellant, potest in secunda quali tribu esse, quod & boni vini est, & innoxia, unde & nomen traxit, quod iners habetur in tentandis nervis, quamvis gustu nō sit hebes. Tertium gradum facit earum Celsus, quæ fecunditate solâ commendantur, ut tres Helvenatiz, quarum dux majores nequaquam minori bonitate, & abundantia multi pares habentur, earum altera, quam Galliarum incolæ Emarcum vocant, mediocris vini, & altera quam Longam appellant, eandemque Avaram sordidi, nec tam largi quàm ex numero uvarum, quas prima spes promittit. Minima & optima è tribus facillimè folio dignoscitur, nam rotundissimum omnium id gerit, atque est laudabilis, quod siccitates maximè perfert, quod frigora sustinet, dum tamen sine imbris sit, quod nonnullis locis etiam vinum ejus in vetustatem diffunditur, quod præcipuè sola acerrimum quoque solum fertilitate sua commendat. At Spionia dapsilis musto, & amplitudine magis uvarum, quàm numero fertilis, ut Oleaginea, ut Murgentina, eadem quæ Pompeiana, ut Numisiana, ut Venucula eademque Scirpula, atque Sticula, ut nigra Fregellana, ut Merica, ut Retica, ut omnium, quas cognovimus copiosissima Arcelaca major, à multis Argitis falsè existimata. Nam has nuper mihi cognitæ, Pergulanam dico, & Irtiolam, Ferreolamque non faciliè asseverem quo gradu habendæ sint, quod & si satis fecundas scio, nondum tamen de bonitate vini, quod afferunt, judicare scio, unam etiam præcoquem Vitæ ante hoc tempus incognitam græcâ consuetudine Dracontion vocitari comperimus, quæ fecunditate jucunditateve Arcelacæ Basilicæque & Bithuricæ comparari possit, generositate vini Amineæ. Multa præterea sunt genera Vitium, quarum nec numerum, nec appellationes cum certa fide referre possumus. Neque enim ut ait Poëta, numero comprehendere refert,

Quem qui scire velit Liberi velit æquorū idem

Discere quàm multa Zephyra versantur harena.

Quippe universæ regiones, regionumque penè sin-

gula partes habent propria Vitium genera, quæ consuetudine sua nominant, quædam etiam stirpes cum locis vocabula mutaverunt, quædam propter mutationes locorum etiam à qualitate sua discesserunt, ita ut dignosci non possint. Quare prudentis magistri est, studiosos ejusmodi nomenclationis aucupio, quo potiri nequeant, non demorari.

Plinium igitur consulamus naturæ miraculum, de Vitium natura & quibus modis ferant. Vites jure apud præcos magnitudine quoque inter arbores numerabantur. Iovis simulacrum in urbe Populonia ex una [Vitis] conspicimus, totævis incorruptum. Item Massiliæ pateram; Metaponti templum Junonis vitigineis columnis stetit. Etiam nunc scalis tectum Ephesiz Dianæ scanditur Vite unâ Cyprî, ut ferunt, quoniam ibi ad præcipuam amplitudinem exeunt. Nec est ligno ulli æternior natura [materia ver.] Verum ista ex silvestribus facta crediderim, quando hæc Vites consurâ annuâ coëscunt, & vis earum omnis evocatur in palmites, aut depriuntur in propagines, succique tantum gratia his pluribus modis ad cæli mores, solique ingenia. In Campano agro populis [fortè legendum Opulis] nubunt: maritæque complexæ, atque per ramos earum procacibus brachiis geniculato cursu scandentes, cacumina æquant, in tanulum sublimes, ut vindemiator autoratus rogum ac tumulum excipiat [dum ad putandam vineam conducitur, paciscitur, si forte casu perierit, & gum ac sepulchrum sibi fieri impendit, autorantis.] Nullo sine crescent, dividique aut potius avelli nequeunt. Villas & domos ambiri singularum palmitibus, ac sequacibus loris quoque, memoria dignum inter prima Valerianus quoque Cornelius existimavit. Una Vitis Romæ in Liviz portibus subdiales inambulationes umbrosis pergulis opacat, eadem duodenis musti amphoris fecunda. Vltimos quidem ubique exsuperant. Miratūmque altitudinem earum Auciæ ferunt legatum regis Pyrrhi Cineam facere luisse in austeriorem gustum vini, merito matrem ejus pendere in tam alta cruce. Rumbotinus vocatur, & alio nomine Populus [opul. Dalech.] arbor Italiz Padum transgressis, cujus tabulata in orbem patula replent, puroque producto [emerito palmite, multum annu durato. Sic vocant à squamis cortice & aspero, qualis est Draconum curis, vel à longitudine angustia, Scal.] Dracone in palmam ejus, inde in subrectos ramorum digitos flagella dispergunt. Eadem modicè hominis altitudine adminiculatâ sudibus horrent [barens ali] vineamque faciunt: & aliz improbo reptatu, pampinorumque superfluitate peritæ [superflua perulantia] domini amplo discursu atria inedia complentes [ha sunt rugata & compluvia Vites] Tot differentias vel sola Italia recipit. Stant provinciarum aliquarum per se Vites sine ullo pedamento, artus suos in se colligentes, & brevitate crassitudinem pascentes [brevitatem crassitudine pensantes, Dalech.] Vetant hoc aliubi ventu, ut in Africa & in Narbonensis provinciz partibus. Excrescere ultra suos [senos] pollices prohibet, semperque pastinatis [putatis Dalech.] similes [nam cum vinea pastinatur, sicut a suis administrantur sarmenta vinivores humi iacere patiuntur, quoad putata sunt, tum pedamentis alligant] herbarum modo vagantur per arva, ac succum terræ passim uvis bibunt, quæ ob id magnitudinem infantium puerorum in interiore Africæ parte exuperant. Vva non aliubi gravior [etiam] collo, ut inde possit invenisse nomen [a duru acinu] duracina. Namque genera magnitudine, colore, saporibus, acinis, innumera, etiamnum multiplicantur vino. Hic purpureo lucente colore, illic fulgent roseo, nitentque viridi. Candidans enim nigerque vulgares. Tument verd mammam modo Bimasti. Prælongis Dactyli porrigunt.

guntur acinis. Est & illa naturæ lascivia, ut prægravidus adhæreant parvi, mites, & suavitæ certantes: Leptoragas has vocant. Durant alia per hiemem, pensili concameratæ nodo [pensiles, conglomeratæ nodo, Dal. pensili conglomeratæ nodo, vet.] Alia in sua tantum continentur anima [horum conditura generum meminit Cat. & Varro] ollis fictilibus, & insuper dolis inclusæ, stipatæ vinaceis circumfundantibus. Fabriles. Aliis gratiam, qui & vinis, fumus affert [Fabriles vocat Aristoteli] fabrilis, iisque gloriam præcipuam in fornacibus Africæ Tiberij Cælaris autoritas fecit. Ante cum Rhætici prior mensa erat, & uvis Veronensi agro. Quin & patientia nomen acinis datur passis [sæpius Plin. Passas vocamus, quod ad stem ex-pavilant] Conducuntur & multo uvæ, ipsæque vino suo inebriantur. Alia decoctæ in musto dulcescunt, alia verò sobolem novam in matre ipsa expectant translucida vitro, additque acinis eandem, quam in dolis, amphorisve duratricem illam firmitatem austeritatis picis infusa pediculo: jam inventa Vitis [Allobrogica] per se in vino picem respiciens, Viennensem agrum nobilitans, Arverno, Sequanisque & Helvici generibus non pridem illustrata. Atque hæc Virgilij Vitis ætate incognita, a cuius obitu x. aguntur anni. Quid, quid infertæ castris summam rerum impemumque continent? Centurionum in manu Vitis, & opimo prænuo tardos ordines ad lentas perducit aquilas atque etiam in deliciis pernam ipsam honorat. Nec non vineæ oppugnationum dedere rationem: Nam in medicaminibus adeo magnum obtinent locum, ut per se vino ipso remedia sint. Genera Vitium numero comprehendere posse unus existimavit Democritus, cuncta sibi Græcia cognita professus. Ceteri innumera atque infinita esse prodiderunt, quod verius apparebit esse ex viris. Nec omnia dicentur, sed maxime insignia: quippe quæ totidem penè sunt, quot agri. Quamobrem celeberrimas Vitium, aut quibus est aliqua proprietate miraculum, ostendisse laus erit. Principatus datur Anuneis propter firmitatem, senioque proficiemem vini ejus ubique vitam. Quinque earum generum ex his Germana minor acino melior de flore scit, imbres, tempestatesque tolerat; non item major, sed in arbore, quam in jugo, minus obnoxia. Gemellatum, quibus hoc nomen uvæ semper geminæ dedere, asperimus sapor, sed vires præcipue. Ex his minor Austro læditur, ceteris ventis altur, ut in Vesuvio monte, Sorrentinisque collibus. In reliquis Italiae partibus non nisi arbori accommodata. Quinque genus Lanatæ, ne Seres miremur, aut Indos, adeo lapugo eam vestit. Prima ex Ammineis maturescit, ocyssimèque putrescit. Proxima dignitas Nomentanis rubente materia: quapropter quidam Rubellæ [Rubellæ Colum.] appellavere vineas. Ex minoribus fertiles vino, acinis & fecce nimis, contra pruinas fortissima, siccitate magis, quam imbre, æstu quam algore vexantur. Quamobrem in frigidis humidisque principatum obtinent. Fertior, quæ minor acino, & folio scissa minor. Apianis apes dedere cognomen, præcipue earum avida. Ex his duo genera [maior & minor, vel candicans & nigra] lanugine & ipse pubescunt. Distant, quod altera celerius maturescit, quamquam & altera properante. Situs frigidus non respiciunt, & tamen nullæ celerius imbre putrescunt [nulla celerius maturescit imbre, ma. M.] Vina primo dulcia, austeritatem annis accipiunt, & rubra fiunt. Nulla magis vineæ gaudet. Et hætenus potissima nobilitas datur, peculiaribus atque vernaculis Italiae. Ceteræ advenæ Chio, Thasove. Gracula non inferior Ammineis bonitate, præterea acino: & uva tam parva, ut nisi pinguissimo solo colere non possit [colere non possit M. i. a. deservere non possit, verisimiliter, L. Baub.] Eugeniæ Taurominiani

colles cum generositatis cognomine, misere Albi no tantum agro: quoniam transacta statim mutatur. Namque est aliquibus tantus locorum amor, ut omnem in his gloriam suam relinquunt, nec usquam transeant. Quod & in Rhætica, Allobrogicaque, quam supra Picatam appellavimus, evenit, do ni nobilibus, nec agnoscendis alibi. Fecunda tamen, bonitatis vice copiam præstant. Eugenia ferventibus locis, Rhætica temperatis, Allobrogica frigidis, gelu maturescens, & colore nigra. Ex his, quas adhuc diximus, sed etiam è nigris vina vetustate in album colorem transeunt. Reliquæ ignobiles. Aliquando tamen cæli aut soli opera non fallunt vetustatem, sicuti Fecenia [supra Rubellæ sic dicta, quod fecit plus asferat, quam cætera] & cum ea florens Biturica, acino rarior, nunquam floris obnoxia [tempestatibus obnoxia, quoniam folia antecedunt, Dal.] quoniam antecedunt, ventisque & imbribus resistunt, meliores tamen argenti locis, quam calidis; humidis, quam siccis. Vix ulla magis tam dense uvarum partu, impatiens variantis cæli, sed contra tenorem unum algoris æstusve constans. Quæ minor est ex eo genere, melior. In eligendo solo morosa, pingui putrescit, gracili omnino non provenit. Median temperiem debeat quærit, ob hoc Sabinis collibus familiaris. Uva ejus indecora visu, sapore jucunda, dissimulata protinus rapiatur, etiam non putrescens cadit. Contra grandines eam tuetur foliorum amplitudo atque duritia. Insignes jam colore inter purpureas nigrasque medio Helvole, sæpius varianti, & ob id Variatæ à quibusdam appellatæ. Præsertim in his nigris: utraque alternis annis fertilis: sed melior vino, cum parior. Et Preciæ duo genera magnitudine acini discernuntur, quibus materies plurima, uvaque ollis utilissima, solum Apio simile. Basilicam [Basilicam C.H.] Dyrrhachini celebrant, Hispani Cocolobin [Cocolobum Colum.] vocant. Rarior uva, æstu austrosque tolerat: capiti inimica, copia larga. Hispani duo genera ejus faciunt: unum oblongo acino, alterum rotundo: novissimas vinemiant. Quo dulcior Cocolobis [Cocolobum C.H.] hoc melior. Sed & austera transit in dulcem vetustate: & quæ dulcis fuit, in austeritatem tuncque Albano vino æmulantur. Tradunt vesicæ vitis utilissimum ex his potum. Albulis summis arboribus fertilior est, Visula inis. Quamobrem circa easdem satæ divestitate naturæ locupletant. Inerticula è nigris apellavere, justis Sobriam [Læti sic vocant, quod innoxia sit & iners sentandu nervi Colum.] dicturi, inveterato præcipue commendabilem vino, sed viribus innoxiam. Siquidem temulentiam sola non facit [ide. Græci Amethystin vocant. Colum.] Fertilitas commendat ceteras, principemque Helvenacam. Duo ejus genera: major, quam quidam Longam: minor quam Arcam [Arcum M. Emarcum Colum.] appellant, non tam fecundam, sed gratiorem haustu. Discernitur folio circinato. Verum utraque gracilis. Furcas subdere his necessarium: alioqui ubertatem suam non tolerant. Maritimo afflatu gaudent, roseo odore [roseo odore, Dal.] Nulla Vitium minor Italia amat: uva rara parva putrescens in ea: viro quoque, quod genuit, æstatem non exuperans. Nec alia macro solo familiarior. Græcinus, qui alioqui Cornelium Cellum transcripsit, arbitratur non naturam ejus repugnare Italia, sed culturam, a videlicet palmites evocantium. Ob id fertilitatem suam absumit, si non præpinguis soli ubertas lacrescentem sustineat. Carbunculari negatur, magna fides si verum est, aliqua in Vite cælo non esse jus. Astum fect Spionia, quam quidam Spineam vocant, quumque & imbribus pinguescit. Quinimo nebulis una alitur, ob id Ravennati agro peculiaris. Veniculam [Veniculam Colum.] inter optime de florescentes, & ollis

Sircula. ollis aptissimam, Campani malunt Sirculam vocare, alij Stacula, Tarracina Numisiana, nullas vires proprias habentem, sed totam perinde ac solum valeat. *Numisiana.* Surrentinis tamen efficacissima testis Vesuvio tenus. Ibi enim Murgentina è Sicilia potissima, quam Pompeianam aliqui vocant, Latio demum feracem: sicut Horconia [*fratris quam Arelacum maiorem Colum. vocat*] in Campania, tantum vilicis cibaria, sed ubertate præcipua. Tolerat & annos Mærica, contra omne sidus firmissima, nigro acino, vinis vetustate rubescens. Et hæcenus publica sunt genera: cetera regionum, locorumque, aut ex his inter se miscuisti. Siquidem Tusci peculiaris est Tudernis, atque etiam ejus nominis Florentia. Est optima Aretio Talpana & Etesia & Consemnia Talpana nigra candida facit mustum [*Talpana dicitur à colore Talpe. Etesia fallax [qua Etesia variat] quæ quò plus tulit, eò laudabilis fundit: mirumque fecunditate cessat [miraque fecunditate non cessat, Dal.]* Consemnia [*Consemnia cognomen hic proprii m. est. Alioquin Consemnata Vitis Col. m. diversi Vitis generibus confita*] nigra, vino minimè durante, uva maximè: post xv. dies, quàm ulla alia metitur, fertilis, sed cæbana. Hujus folia, sicut Labruscæ, prius quàm decedant, sanguineo colore mutantur. Evenit hoc etiam quibusdam aliis, pessimi generis argumento. *Irtiola.* Irtiola Umbriz, Mevanatiquæ & Piceno agro peculiaris est, Amiternino pumula. Idem Bannanica fallax est: amant tamen eam Municipij uvam Pompeij nomine [*Oppidum Neapoli vicinum*] appellant, quamvis Clutinis copiosiore. Municipij & Tiburtes appellavere, quamvis Oleaginam nuper invenerint à similitudine Olivæ. Novissima hæc uvarum ad hoc tempus reperta est. *Vinaciola.* Vinaciola soli novère Sabini & Laurenti. Nam Gauranas scio à Falerno agro translatas vocari Falernas, celerimè ubique degenerantes. Nec non Tarentinum genus aliqui fecere, prædulci uva. *Capnas & Bucconiatas, & Tarrupia,* in Thurinis collibus non ante demeruntur, quàm gelaverit. Pharia gaudet Pise, Mutina Prusina, nigro acino, intra quadriennium albescente vino. Mirum ubique cum sole circumagi uvam, quæ ob id Streptos vocatur. Et in Italia Gallicam placere, trans Alpes verò Picenam. Dixit Virgilius Thasias & Mareotidas, & Lageas, complurisque externas, quæ non reperiuntur in Italia. Sed sunt etiamnum indignes uva, non vino, Ambrosiaca, Duracina, sine ullis vasis in vite servabilis, tanta est contra frigora, æstus, tempestatumque firmitas. Nec Orthampelos indiget arbore, aut palis, ipsa se sustinens; non item Dactylites digitali gracilitate. Columbinæ acinosissimæ [*racem sistina Turm.*] & magis purpureæ, cognomine Bimammæ, quando non racemos, sed uvas alias gerunt. Item Tripedanea, cui nomen à mensura est. Item Sarpula passo acino. Et Rhetica in maritimis Alpibus appellata, dissimilis laudatæ illi. Namque hæc brevis, conferta acino, degener vino, sed cute omnium tenuissima, nucleo, quem Chium [*quod gygarum Thucyd. vocat*] vocant, uno ac minimo, acinum prægrandem unum alterumve habens. Est & nigra Amminea, cui Syriacæ nomen imponunt. Item Hispana ignobilium probatissima. In pergulis verò feruntur Escariz appellatæ, Ederæ acinis [*è duracina M. & C. H.*] alba nigraque. Et Bumasti thudem coloribus. At nondum dictæ Agra & Rhodia, & Vncialis, velut à pondere acini. Item Pucina [*pucina à pucis colore*] omnium nigerrima: & coronario naturæ lusu Stephanitis, acinos foliis intercurrentibus: & quæ torrensiles vocantur, celeres proventu, vendibiles aspectu, portatu faciles. Contra damnantur cum uva cinerea & rabuscula. & alinica: minus ta-

men, caudas vulpium imitata, Alopecis. Alexandrina [*Idea Theophr.*] appellatur Vitis circa Phalacram brevis, ramis cubitalibus, acino nigro Fabæ magnitudine, nucleo molli & minimo, obliquis racemus prædulcibus, folio parvo & rotundo, sine divisuris. Septem his annis in Narbonensis provinciæ [*arvo*] Alba Elvia inventa est, Vitis uno die deflorescens: ob id cussissima. Narbonicam vocant, quam nunc tota Provincia conferit.

Doctiss. Dalechampius apud Plinium vult Rubicolum Columellæ non esse arboris genus, sed arbuti gallici, vulgò de Hautins appellati, arboribus scilicet humilioribus & minimè frondosis confiti, eaque re ab arbutu Italico differentis: Duracinam Vitem, cuius uvæ magnitudinem infantium puerorum in interiori Africa parte exuperant, vulgò Piquep uille, Monspeffulanis verò Marroquin, à Marroch Africa civitate denominatam. An hæc intelligit Lugdunum ait. Sunt in regno Menin oppidi Syriæ nobilissimæ magnitudinis tum acini, tum racemi, quos ipsi lingua patria privatim vocant Alzibib: nam generi commune est nomen Haneb, nos à succo uvam. Illius vocis imitatione suas grandiores uvas corrupto vocabulo Provinciales dicunt Augibim. Helvicam, per se in vino picem respicientem, ab Helvis, Galliarum Narbonensis populis, hodie Vivarez; Ammineam, Gros plant. Quidam, inquit, scribunt cum duplici m, syllaba penultima correpta. Aufonius,

Solum qui Chium misceat & Ammineum

Alij cum simplici m, penultima producta. Serenus.

Succum Amineæ Vitis cum pane medetur. Virg.

Sunt & Amineæ Vitis fructissima Vitis.

Vitis Amineæ quintum genus, cuius folia lanugine vestiuntur, ait Marcellum Caniculatam vocare, veluti lanugine canescentem & hirtam: Apianam autem tradit esse Muscat, cuius uvæ è vinea longè suaviores sint, quàm pergulis, arbutu, jugo. Nos Moschatelinam observavimus duplicem in Burgundia, rubram & albam, & hanc rursus Stuegardiz; Græculam non inferiorem Amineis bonitate, Raisins de Corinthe; Rheticam, de la Vals. lina; Allobrogicam, quam Picatam Plin. quoque nominat, Viennensem, qui sent la violette; Bituricam, le plant d'Orleans; Bituricam minorem, Sabinis collibus familiarem, des Galles. Lugdunensibus vocatam; Visulam eam dictam fuisse ostendit Columella. Helvolam, sive ut ipse vocat Elveolam, olim fuisse dictam, Oleram & Eleram, & inde cognominari Elvelam, Oleram minutam, & Elveolam Vitem herbacei coloris, Titinium appellare, Lensi calid., Elvelam, Rapulam, & Rumices Scaligerum: Cocolibin esse eam Vitem ex qua vinum Monspeffulanis Piquardane, aliis Muscat Piquardæ, de Languedoc, dictum exprimitur. Forenses celerem proventu, uvæ aspectu vendibilem, ac portatu facilem, rusticis Lugdunensibus servato nomine des Foivars: Rabusculam, eandem facit cum Ravusculâ, colore ad ravam inclinante: Asiniscam ab asini colore denominat: Quæ Plinio Alopecis dicitur, is eam vulgò Raisins habus nuncupari tradit: seu Albam Elviam in Narbonensis provinciæ arvo inventam, Aubenas de Vivarez.

Tragus ne nihil fecisse videatur, paucis vulgarissimæ Vitium genera ipsi quidem cognita obiter ita recenset. In tractu Rheni plerumque ex Vites plantantur, maximè calidioribus locis, quas Muscateller & Traminer [*Muscatellina dixerunt & Traminea*] à loco Traminij dicto, vulgò vocant, licet posterius genus Rhetæ superiori & Alsatiæ familiare quonque sit. Præterea & eas quoque, quas vocant Germani Gros und Klein Frenschisch [*Francicas*] oder Edel und lauter Trauben/ h. e. Vitem nobilem. Ad Mosellam, Rhenum, & in agro Vormatiensi Vites procreantur Bisling appellatæ. Quæ verò uvas Frensch trauben

Druscher trauben vocatas proferunt Vites, ex in omnibus propè regionibus vulgarissimè habentur. Est & aliud Vitis genus quod uvas facit, **Drusch vnd Altsch trauben** nominatas, & in motanis Ladoix oppido imperialis nascitur. Ià & in agro qui & Neapoli oppido Palatinatus celebri adiacet, Vitis genus habetur, quod **Geissfassel** incolæ dicunt. Aliud deinde Vitis genus **Barbisch** vocatū propè Turckheimium & VVachheimium provenit. Prope VVeissenburgum denique (quis enim reliquarum provinciarum, Austriz inquam & Franconiz &c. Vitium innumera penè genera persequi queat?) Vites plantantur, quæ uvas **Früschwarz**, oder **Kleber** appellatas, neque non quæ **Grünfransisch** dictas, & quæ **Schwarzleimperstrauben** nominatas procreant. Atque hæc Tragus.

Vitem septies in anno fructu suum ferens Beilon. observavit in Thraciæ Callipoli in Augustinianorum monasterio Vitem fructu suo semper onustam, quam ipsi Monachi affirmabant septies in anno fructum, eumque maturum præbere.

Tab. m. et. Tab. ut plus quam ceteri sapivisse ducatur, præter
Vitem vulgarem, alias duas nominetenus duntaxat
icone exprimit, eas non describens, nec demonstrans
ubi terrarum observavit. Ipsimet incognitas fuisse
satis indicant quæ scribit. Folium & uva, inquit, vul-
gari non multum dissimilia: sapor autem ei constab-
bit, qui has uvas noverit. Quia igitur sapor ei non cõ-
stitit, certè eas non novit. Si sapor constitit, cur non
paucis eum expressit? Si solum & uvam vidit, cur
differentiam non annotavit? quid opus erat inania
pro necessariis & proficuis effundere verba. Inscri-
bitur autem prima, Vitis duracina major? altera, Vi-
tis chenopodia. Addit & tertiam, Vvam barbatam.

C.B. pin. Vitem dividit in sativā & sylvestrem. Sati-
va alia major est, inquit, cujus plurimæ species; alia
minor. Majoris uva & colore & magnitudine diffe-
rent; alterius namque acini, aut virides albicantes f-
ve aut fulvi, aut saturatorubore nigricant, aut czru-
lei, aut subrubentis coloris; alix acinis oblongis
magnitudine & forma prunorum, quæ Pergulana
dici potest; alix rotundis, isque vel magnis, vel par-
vis; alix acinis sunt frequentioribus; alix rarioribus.
Sunt quæ granis aut vinaceis carent, interdum uni-
cum vel alterum granum habent: Rarius uva barba-
ta reperitur. Minor verò est acinis nigris, rarissimè
albidis, aut fulvis, nucleo minimo ac molli. Sapore
etiam differunt, ut dulci, acerbo, muscato, quæ Vi-
tis Apiana Plinio.

In foliis quoque differentia, alia majora profundiùs incisa, ut Italica foliis ad pediculum usque in lacinias acutas divisìs: alia minora sunt: Sic alia tenuiora, alia crassiora, alia viridia, alia ruber tia, alia maculata: alia ad tactum duriora, molliora, alia lævia, alia denique sibi infusa.

In Indiâ insula Baly, Vites bis in anno uvas pro-
mittunt: Linc. par. 3. Ind. or. cap. 40. & in insulis Azo-
res, super meras rupes crescunt, quæ radices in me-
dios hiatus seu saxorum rimas immittunt, quibus
succum sibi necessarium proliciunt. Et in istis pe-
træ recessibus, Vites multò latius se proferunt,
quàm quæ in planitie sunt, quæ ad frugem perveni-
re nequeunt. Idem cap. 6. Sed in Hispaniola plan-
tæ exiguas uvas fundunt, nec admodum jucundi
saporis & serè Februario & Martio vindemiari so-
lent, auctore Benzoni, sive Americæ lib. 4. cult. & ut
Iosephus Acosta l. 3. c. 22. & l. 4. c. 32. nec in insulis, nec
in firma terra uvæ aut vinum nascitur. In nova Hi-
spania, vineæ uvas proferunt, sed nunquam prohe-
maturescunt, ut vinum confici possit, nisi in Peru &
Chile approbaturum nascitur: nam jam vites co-
lere didicere, & vineæ plerumque in convallibus
Peruanis nascuntur, juxta quas fossas ad aquam col-
ligendam excavant, quâ vites subinde irrigant.

VITIS CORYNTHIACA SIVE
Apyrina.

Vitium genera pluribus persequi, licet plerique
supervacaneum ducant, contenti Vitem in
cultivam & silvestrem distinxisse, attamen Docto-
rius cultivarum plures esse merito affirmat. Eas
autem in majores & minorem dividit. Minor, sive
parva, inquit, Idæa modò cognominatur, de qua
Theophr. lib. 3. hæc scribit. Nascitur Vitis in ea parte
Idæ, quam Phalacras vocant. Est autem fruticosa
virgulis parvis, & ramulis cubiculis
penè expottigitur, quibus acini laterales, nigri ad-
hærent, magnitudine Fabæ, dulces, qui vinaceis si-
mille quid [*καρπώδης*] continet. Palladio dicitur
vva sine granis. Plinius hanc Alexandrinam facit,
iisdem quibus Theophr. verbis ipsam describens.
Dioscorides silvestris Vitis alteram statuit speciem.

Nos malimus eam inter cultivas retinere. In offici-
nis hujus exigui passi acini, Passularum de Corin- *Passula de*
tho nomine veneunt. Idem Dod. frum, Passulas Co- *Cerambo.*
rinthiacas vocat. Cap. verò de Vacciniis ait: Nascitur
Vitis quam modo Idæam cognominant, non in al-
tissimis ac nivosis Idæ tradibus (ut Gesn. interpreta-
ri studuit) sed circa Idæam provenit: Idæam quidem
montem non Cretæ, sed Troadis in Asia minore,
quæ à Ptolomæo Geographiæ libro, Alexandri
Troas appellatur, unde & non temerè à Plinio Vi-
tis Alexandrina dicta est; non secus quàm illic enata
Alexandrina Laurus, à Theophr. nominatur. Huic
autem Viti similes apparent, quas Philostratus in
vita Apollonij apud Mæones & Lydos (haud pro-
cul à Troade sitos) nasci refert, cum iis Vitis il-
las comparans, quæ apud Indos ultra Caucasum gi-
gnuntur. Vites autem, ait, parvæ admodum, quales
apud Mæones Lydósque ibi nascuntur: vinum ta-
men ex illis expressum gustatu ac ore jucundissi-
mum. Traditur autem hæc Vitis, juxta Idæam nata, *Theophr. & al-
rie illustra-
tur.*
fruticis [*δυσκλίστρη*] instar esse virgulis [*παχίστης*] *παχίστης*
parvis; ramulis verò ad cubitum extensis, cir-
ca quos acini obliqui [*παχέας κατὰ γωνίαν*] nigri, magnitu-
dine Fabæ, dulces, intus habentes vinaceum quod-
dam [*χαρπυῖος τι*] molle: folium autem hujus rotun-
dum, indivisum, ac parvum. Describitur hæc à Pl-
nio lib. 14. cap. 3. iisdem ferè verbis, Alexandrina ap-
pellatur, inquit, Vitis juxta Phalacram brevis, ramis
cubitalibus, acino nigro, Fabæ magnitudine, nucleo
molli & minimo, obliquis racemis prædulcibus, so-
lio parvo ac rotundo sine divisuris. In quibus ver-
bis, pro eo quod Theophr. habet, *παχέας κατὰ γωνίαν*,
Plinius non acinos, sed racemos obliquos legit
quod Viti magis convenit. Cum descriptione autem
hac fruticulus Germaniæ Officinis Myrtillum di-
ctum, haudquaquam convenire satis manifestum.

De hac etiam Lob. agit Corinthia siue ^{πικρία} u- ^{Vitis Co-}
va quæ vocatur, nomen patrium testata, est gie ni- ^{riantia.}
hil planè differt à communi: Sed algidioris cæli im- ^{Alyria.}
paciens, gracilitate tantùm racemorum, & exilitate
acinorum superatur, qui gigantis carent, sunt quæ a-
^{πικρία} πικρία, ut quædam mala Granata anillis vacua. Botri
enim, siue racemuli ipsi, conflantur acinulis, piperi-
na aut sambucina grana æquantibus. Ad topiario-
rum pergulas & fornices deducuntur hedigæ in Itali-
cis & Pedemontanis hortis vites hujus.

Dalechampio apud Plinium, qui ejusdem Gra-
culam esse autumat, dicitur ^{Gracula} ^{Plin.} ^{Raisin de Corinthe.} Lugd.
Vix ^{απικρία} απικρία, Corinthiæ vulgè vocatæ. Ab eadem ^{Vitis Ma-}
vix Maderenses sine granis: ^{derenses}

C.B. pin. Vitis 3. live Vva passz Indicz gigantis ca-
repentes : Vva sine vinaceis seu apyrenos, ad Clus-
ius post. Eidem. Vitis 4. live Vva passz nanae,
vel Passulz Corinthiacz. Passulz, Trag. Vva pas-
sifera.

sed minores, acinis sine arillis, Montbelgardi etiam habentur in horto E.C.VV. Vite Bizuntio ex horto Dominorum de Granuelle illic translata.

Eidem C.Bauhino Phyt. Vux passa maior *Bapa* & Vitis a. dicitur.

VITIS FOLIO APII.



Peculiaris folii forma hanc vitem facile ab aliis dispescit, quippe non tantum plerumque minus virgineis vulgari-bus, sed & profunde dissectum, ex pluribus quodammodo foliis apparatum videri possit, singulis segmentis in Apii foliorum formam subdivisis, ita tenuiter, ut pluvius etiam vinitoribus, quibus

obtuli, non agnoscerentur pro foliis vitium, rarâ sane diuisura. *Borris* sicut albos, donatos acinis satis magnis, non multum compactis, sed paulo rarioribus, valde dulcibus & lapidis similes sunt vux hâ. *Borris* vux, quam Burgundi *Ratfin* siliant aut *sendant*. Germ. *Wurtemb.* *Gur Edel Reben* vocant, citò marescunt, & ut illi cibo expectantur.

Hoc pulchrum vitis genus observavi Vesuntii & nusquam alibi, in horto insignis Medici Turnonii, quod delatum dicebant ex Hungaria. Surculi inde delati apud nos feliciter prouenerunt.

Quo referendum hoc genus vitis nondum animaduorto, nisi comprehendatur sub Vitibus à Plinio dictis Pretis, quibus solum Apio simile. Scio. Guill. Penam & Lobelium pro ea exhibere Viam crispam, quam Grossulariam vocant: verum non mihi sit verisimile Plinium fruticem spinosum, cui nihil simile cum vitibus, cui non est vna, nec materies plurima, reposuisse inter vites: fortassis quod Plinius dixit duo genera & ovis vilissima, persuasit illis hunc fruticem Plinium intelligere: verum ille postea dicit. Venientiam [Vitis] inter optime desflorescentes & ovis apertissimam.

Vux alba dulces, dicta Montb. & Burg. Rains sendans, ou de l'hospital.

Longi his sunt Botri, plerumque rariore acini, valde dulces, citò maturi, albi, folia profunde diuisa, utrinque viridia, & pellucida. Germani in Ducatu Wurtemb. has *Gur Edel trauben* vocant, easque ab aliis separant, quia vinum bonum exiit, sed non durabile. In Burgundia integras ex eis plantant vineas.

Vux nobiles alba.

Vux, quas Germani & Alati vocant *Edel Trauben*, appellant Wurtemb. vinitores Tom. II.

weiss freuschen. Hæ vux ferunt acinos cute du-ras, non magnos, dulces, si bene maturi. Ex his fit *freuschen* vinum illud dulce, in Alatia celebre, *Rangens* *Rangens* *wein* dictum. In Than aliquando diligenter perquisiui an ex particulari genere vitis hoc fieret vinum? Verum comperi locum esse particularem, montem glareosum, qui vites illas fert, quæ nulla ratione differunt in figura, sed tantum variant vutâ ratione: ex enim sunt multo dulciores, & ad tactum viscidæ. bene & citò marescentes, quæ in superiore montis parte proueniunt. Eæ autem quæ in vicinis & potissimum inferiori loco producuntur, tardius marescunt, minus dulces sunt, & ad tactum non glutinosæ. Ceterum, quoniam ex his nobilissimum vinum parari existimant, nolunt quibusdam in locis alias plantare, quamvis minus vini, quam multæ aliæ reddant: apud nos Montbelgardi parum viles, quia tardius maturantur.

Vesuntii vocant Vites *Blanc gentil*, quibus vux acinis rotundis diâis similes: Lignum ferè simile, nisi quod paulo crassius ubi maturuit & rufum. Huius vuxesui meliores, ex quibus etiam melius fit vinum album, ut *Arbofiacum*. Vesuntii in colle *Ragor* dum putantur, triones relinquuntur palmitis. Audio in Ducatu Wurtemb. abundare, præsertim circa *Maulbrun*. Prope *Esslingam* referunt esse montem eâ vite consitum, cuius vinum vocant *Escubertwein*. Vux suspensæ diu durant.

Vux germanica dicta des Alemans, alba.

Nostri vinitores has Vites nostro solo commodas dicunt. *Borris* sicut magnis, factis, acinis etiam maiusculis, tunica duriuscula, mediocriter dulcibus: foliis subrotundis, angulosis, in tres partes diuisis. Vinitores nostri Germani in Ducatu frequenter excolli, ac dicunt *Elbe* & *Gur Elbe*: in Alatia autem *Rhein Elbe*, esse duo genera, vnum iam denominatum, alterum *Rauch Elbe* / cui facile decidant folia, quod in nostris Vitibus tollitur & extirpatur.

Vux Lausannensis alba.

Vux Montbelgardi dicta *Lausannensis* probantur pro nostra regione. Vitis eius profert folia rotunda ferè, parum profunde partita, utrinque viridia, vux dulces, acinis mediocres: Audio vocari in Ducatu Wurtemb. *Fiderling*. Solet esse fructifera, ut aiunt, & ex vuis eius fieri vinum laudabile.

Vux alba dicta Melons.

Viti dictæ folia sunt rotunda, angulosa, subtus tomentosa non profunde laciniata: vuis Lausannensibus similes vux: acini non magni, dulces, & his grauiore: sunt enim Lausannensibus paulo acidiores, ut indicant Vinitores, vinumque aiunt minus durabile, nesciunt nomen Germanicum. Ex quo Ill. E. C. Montbelgardi excolendas curauit Vites, multa milia surculorum ex Vitibus ad eiusdem E.C. urbem Grangianam, & arcem suam *Sohentweilin* monte sitam, sunt plantata.

Vux alba dicta Guacher.

Magna vux, acini crassi, minus dulces, ex quibus multum vini, sed minus laudabile: folia magna, in acutos angulos desinentia, subtus hirsuta. Suspicio dictas à Trago *hinsch trauben* & nonnullis *Scheiss trauben*. Vinez circa Epä-

Vitis alba gentilis

Locat.

Albe.

Daplex yv.

Fiderling.

Locat.

Binsch

trauben

Scheiss

trauben

manduodurum abundant his vuis in montibus dictis Champuermot. In hoc genere, ut asserunt vitatores, quædam malæ, ex scil. quibus vix decidunt priusquam maturescant, vnde etiam vinum earum austerum.

Vua alba, Raisins Brulans, dicta.

Hoc genus vinarum albarum simile est vuis melons, minus dulce, facile putrescens, ac vredine corruptibile: quippe facillime siccat: multas alioqui hoc Vitium genus fert vuas, & fructiferum est: folium eius quinquepartitum, subtus hirsutum. Hoc Vitatores, si viciniore aliquæ Vites occurrant ex meliore genere, extirpant.

Vua alba acinis minimis.

Bofe hunsichen

Præsentis vix Montbelgardensibus chenais quemadmodum Burgundis quoque dicuntur, vitatoribus VVirtemb. Bofe hunsichen. Vitis genus hoc minimos plerumque acinos profert, ita ut vel degenerasse, vel particularis generis esse videri alicui possit. Vtrum vis, asserere, mihi nondum planè constat. Nostri paulatim id extirpant, & meliores sensim in locum propagant.

Vua alba ensatis nuncupata. Ger. weyßflemmen.

Folia Vitis huius quasi farinâ aspersa conspiciuntur, alba, alibi racemi, dulces. Ex Burgundia bonum hoc genus Vitis defertur, ac in Willassan abundat.

Vua acinis se findentibus.

VValmer

Est in vineis Montbel. potissimum Ill. E. C. genus Vitis, delatum, [ni vitatores fallant] Stuttgarti, copiosa ferens vuas, cui nomen *malmer*: vuis viridis penè coloris, dulcibus, quibus acini magni, facile putrescentes. Abundant ad Nicatum circa Canstat & Turques. Frigore facile corrumpuntur, ac idè in Ducatu VVirtemburgico ante hyemem eas terrâ obruunt. Nos Montbelgardi neque has, neque alias humi sepelimus.

Vua maxima alba.

Groß lappen

Groß lein

Hoc Vitis genus Basileâ curavi deferendum pro horto Ill. E. C. vuis donatum longissimis, acinis etiam magnis, albis, carne firmâ, difficulter putrescente, suspensis diu conservabilibus. Audio vocari in Ducatu VVirtemb. *groß lappen trauben*, ubi tamen non frequentes.

De his hæc fortè scribuntur: Genus Vitium, quod vulgò vocant *groß lein*: omnium maximis vuis, & acinis maximis, quarum vltus tantum pro culina ad omphacium: vnica siquidem vua interdum reddit Omphacii semi-mensuram, ita ut seps vnica quandoque reddat Omphacii plusquam 30. mensuras. In pergulis hortorum coli desiderat. An ex his vuis parentur vix passæ maiores, considerandum.

Vua rubella.

Klemmer

Vites ex Alsatia & Richenvilla oriundæ, Germ. *Braulemmer* nuncupatæ, Montbelg. *des grises*, vuas ferunt elui valde gratas & dulces, quibus color rubellus. Sunt maiores & minores. Non copiose plantantur.

Vua Rhetica.

Veltliner

Vites Rheticas, siue Veltolinas [Veltliner] vocant Vitatores nostri delatas ex Stuttgar-

dia, vuas gignentes satis magnas, ex albo rubentes, cute tenui. Vineam ex eiusmodi Vitibus circa Eohenwilt conferi iussit Ill. Comes Wirtembergicus.

Vua rubra, Gamé.

EX Burgundia habetur genus Vitis, quod vocant *Gamé rouge*: vuas mittens, sicut & acinos non paruos, ex quibus excipitur copia vini, quæ de re eas Burgundia quibusdam in locis colere multum laborant. Verum Vesuntii non excoluntur, nec permittitur ut vinum ex iis in urbem inferatur, quia non durabile.

Vua nigra dicta.

Vitis hæc folio ornatur penè rotundo quadrupartito, sed non profundè, infera parte non nihil hirsuto. Vitatores vocant in Ducatu Wirtemb. *Schwartz flemmen* / *Außers flemmen* / *Schwartz flemmen* / *Klemmer*. Vix huius, quas Montbelgardi vocant *Noirins*, sunt purpureæ, siue rubræ, mediæ cum acinis magnitudinis, dulces. Ex his bona vna parantur, si mustum subito separetur à fructu. Vesuntii putando ramos, breues relinquuntur, loco potissimum macro & petroso.

Vua atra Traminea cognominata.

Inter vites rubras non vltimum obtinet locum Traminea, *Kostreuschen* Wirtemb. siue *Traminer*, seu & *Alsatia Schwartz flemmen* dicta, Montbelg. verò *surmentans rouges*. Eius vix valde dulcis est, ex qua in Ducatu VVirt. Ill. E. C. vinum curat parandum, *Saldmer* dictum.

Vua dicta Vesuntinis Grappenans.

Extollendæ hæc Vites loco declivi & petroso quod Solis orientis radii eò perueniant. Cæterum vuis modò dictis sunt acini maiores, quam in *Noirins* dictis, disti illius maturescunt, lignum quoque crassius. Vix elui non commodæ, sed si maturæ sint, optimæ sunt pro vino rubro faciendo, quod diu conservari potest. Satis copiosæ Vesuntii. His vix dictæ *Torpor* similes, sed minores, lignum magis ruber.

Vua Vesuntina.

Harum Vites sunt fertiles, cum coluntur locis calidis & petrosis, ubi tamen non deficit terra, nec peruenire possit ventus orientalis. In iurias cæli primo Vere & Æstate melius fert, quam reliquæ Vites. Vuas profert magnas, & acinos magnos, rotundos, nigros. Elui minus commodæ, quam alix, nisi suspensæ & reseruatæ vsque ad Natalitia Christi. Ex his habetur vinum, crassum, rubrum, quod diu reseruari potest, licet minus bonum, verum copiosum.

Vua Cressans.

Vesuntinis forma & colore Bræginæ similes, nisi quod carne firmiori & duoziora edendo sentiuntur.

Montbelgardi vocant *Gris* vuas rubellas minores, à colore mixto ex rubro & albo, dulces valde, facileque maturescentes. Germ. vocant *Traminer*. Sūt huius generis & maiores, quæ an

à minoribus differant, præterquam magnitudi-
ne, me latet adhuc.

Vua Arborescens rubra sine nigra.

Spectandæ pulchritudinis sunt vuz, quas
Montbelgardi *Arbois* vocant, à loco in Bur-
gundia, vbi vocantur à quibuldam *ceste d'oiselot*,
Vinitores in Ducatu Vviremb. dicitur *Ros-
welsch trauben*. Hæ rubræ vuz non conveniunt
nostro solo, quia difficulter maturescunt, acini
sunt magni, sublongi, ovales, carne firma, dulces
tamen. Vinitor meus extirpat has Vites, vt aliis
locum det, magis fructiferis & melius matu-
rescentibus. Velutii vocant etiam *Arbois* colote
pinus rubro vuz, vel, vt dicere solent, minus
nigro, parte acinorum pediculo hærente, ligno
crasso. Ex hoc genere vuarum scribunt fieri vi-
num rubellum, quod *Clairet* vocant, admixtis
vuis *Blanc gentil*. Sunt etiam, vt tradunt, *Arbois
blanc* eiusdem naturæ & formæ cum nigris.

VVA MONSTROSA BARBATA.



Iuvabit fortè
inter tot na-
turæ creata le-
gitima, eiusdè
quoque pecca-
ta detegere. Si
modò peccatù
sit, à consueto
cursu desiste-
re, & partus
legitimi vice
monstru oculis
nostris sub-
icere. Res
sanè rara, nec
vulgi modò
rumore sparsa,
sed principum
curâ cognita,
& ad prototy-
pum depicta.
Racemus vua-

rum est geminus, suo quisque pediculo commu-
ni ramo hærens. Hoc naturale. At vterque co-
mâ obseptus erat crinita, flavescente, ad duos ferè
cubitos longa, infernè in vnum iuncta & con-
fusa: Hoc verò novum est, atque monstro-
sum.

Picturam cum descriptione ex authentico ad
me misit Cl. D. Rentzius Fontis admirabilis Me-
dicus Bollenfis ordinarius. Dicitur ab Illustriss.
Principe Ernesto Marchione Badensi repertus
prope Fridelsheim in Palatinatu anno 1599. &
Dorlacum missus, vt novi spectaculi eicone te-
nus ad posteritatem quoque rediret. Huius e-
tiam rei fidem nobis fecit Laurentius Zysar, qui
& vidisse & diligentius consideratos manibus
palpasse ad eundem D. Rentzium scripsit.

Tabern. ic. & Hist. vocatur *Vua barbata*, *Vuz*
tertiū genus, quod ab aliis nonnihil variare
scribit, oblongo filamento, multo ex vua depen-
dente, ac barbam exprimente. Figura sanè posi-
ta à Comp. Taber. placet, sed displicet quod ge-
nus tradatur: nec tradatur nec, ascribatur locus,
vbi id proveniat

Αμνα & ἀνίσταται ἡ φύσις, Vitis vinifera sine
cultiva appellatur. Vitis quidem dicitur, quod
inuitatur ad vvas pariendas auctore Varrone.

Tom. II.

Hebr. *Gephen*, Trago, Arab. *Harin* seu *Karis*, siue
etiam *Karm*, Germ. *Käben*/weinkäben/weinstock/
oder *Käbstock* / Belg. *Wingacrt*. oft *Wynstodt*/
Gall. *Vigne*, It. *Vite & Vigna*, *Vite vinifera*. Vite do-
mestica Hisp. Cast. *Vid*. Port. *Vide*, Angl. *Wynde*
oft *Weintree* / or *Grape tree* / Boh. *Kywy wine*.
Hung. *Teu zolo*

Vitis porro arbutus, quæ maritata est arbo-
ribus, vt attestatur Had. lun. dicitur Græcè *ἀμ-
να & ἀνίσταται*, Ger. *Käben an bäumen* getzogen,
Belg. *wyngacrt an Een boom gestochten* / Gall.
vigne mariée aux arbres, ou qui rampe en arbre, It.
vite che rampa sopra li arbori, Hisp. *vid abraçada
con arbol*

Vitis vidua, non associata, nec maritata ar-
bori meminit Catul. in carm. nupt.

Vitis compluvata Plin. recti in modum longè
lateque fornicata, germ. *Käbstock weit vnn
breit zerlegt*. Belg. *wyngaert galerye wyß oner-
dedt* oft *gheleyt*. Gall. *vigne liée au long du rayon*,
It. *vite ligata & condotta à guisa d'arco, di valse, di di
figna*, Hisp. *vid parrada de paris, en arco de bameda*

Vitis pergulana Colum. Germ. *Käbgländer* /
Belg. *Wyngaert lünif oüerleyde wyngaert*,
Gall. *vigne qui est faite en treille*, It. *vite fatta in
guise di pergola*, Hisp. *vid sobre percha*.

Vitis iugata, canterata Colum. quæ pedamen-
tis canterisque transversa iugatur, Germ. *weith
rüb an einen ghad mit dwercklangen aufges-
richt*. Belg. *Wyn gaert met latten ofut reifen
dwercks geleyt*. Gall. *vigne eschallée, soustenuë de
perches traverses*: It. *vite sostenuta da perche tra-
versate*: Hisp. *vid sustentada de perigas astraver-
sadas*.

Vitis pedata, statuminata Plin. palis perticis
que firmata: Germ. *gestützet Käben*. Belg. *wyn-
gaert aen stöcken oft staecten gheset*: Gall. *vigne
eschallée, ou munie d'eschales*. It. *vite sostenuta & ap-
poggiata sopra pertiche & pali*, Hisp. *vid puesta en e-
stado, y sustentada de sus rodrigones*.

Vitis ordinata Colum. in quincuncem ferè
disposita: Germ. *Käben nach ordnung gepflanzt*,
Belg. *wyngaert der reye / oft Veruolgens
gheset*. Gall. *vigne Plantée par ordre*. It. *vite posta à
plantata per ordine*: Hisp. *vid puesta y plantada en
orden*.

Vitis luxurians, *ἀμνα & ἀνίσταται*: Germ. *Übers
flüssig schießend*: Belg. *weeldige wyngaert* / Gall.
*vigne croissant trop abondamment, qui porte trop de
branches*: It. *vite supradante, che cresce troppo*: Hisp.
vid superflua demasiada, que crece mucho.

Vitis lachrymans, *ἀμνα & ἀνίσταται*: Sotio-
nigerm. *Ein Trießende rüb*: Belg. *Een Druy-
fende wyngaert*: Gall. *vigne qui pleure ou degoute
une sorte d'eau*: It. *vite che lagrima*: Hisp. *vid quel-
lora*.

Vitis siderata Plinio *ἀμνα & ἀνίσταται* Bassia-
no, Ger. *perdorret wein rüb*: Belg. *werbrät doort
ouwerdet*, Gall. *vigne mellee & gassée du temps*,
Ital. *Vita prusiata & guasta per la tempesta*, Hisp.
vid pasmada.

Vimiradix Plin. Vitis quæ cum radice pangi-
tur *μύκημα*, Germ. *Seizling* / Belg. *wyngaert
mit den wortel gheset* / Gall. *vigne plantée avec la
racine*, Ital. *vite piantata con la radice*, Hisp. *vid.
baruada con rayzes*.

Propago Virg. vetula vitis humi depressa, Prop. 28.
quo ex vna plures emergant, *ἀμνα & ἀνίσταται*
Anatolio, Germ. *ein alter Käbstock wider eine
gelegt* / Belg. *Oude wyngaert Stoc meder tti
gheleyt*. Gall. *Prouin de vigne*, Ital. *prouina della
vite*, Hisp. *prouena del sarmiento de la vid*.

G. 2

Vitis arbutus

Vitis compluvata

Vitis pergulana

Vitis iugata

Vitis pedata

Vitis ordinata

Vitis luxurians

Vitis lachrymans

Vitis siderata

Vimiradix

Roswelsch trauben

Clus.

Locus.

Tab. repr.

*Nomina.
Linguarum*

Tradux

Tradux Varr. Rumpus eidem propago vitis ab arbore in arborem traducta, Germ. Übershägling, Belg. der ouerschüete / die haer in de ho ochdent in breeche wt Strecke, Gall. l'auantin, ou longue branche de vigne, Ital. rampollo, Hisp. Sarmiento para prouena, mugron de la vid.

Vitis partes

Generum Vitis appellationibus ita appositis, partium vitis Nomenclatura exponenda.

Palmet

Palmet igitur siue sarmentum Colum. pralonga luxurians vitis virga est, αλμια, αλμιας, αλμιας, German. die übrige gerten an den beschrittenen weinträben. Belg. wyngaert rancf, weleke blystant nietu hout te schieten, Gall. le viel bois de la vigne, Ital. palmire, dralcio, Hisp. el sarmiento de la vid, el pampano.

Palmet fo-
canoni

Palmet foecaneus Colum. qui in bifurco medius proficit, Germ. ein schößlin in achßlin / hurling / begerten. Belg. ein riefen oft byschüete, Gall. le reieron qui croist entre la source de la vigne, Hisp. sarmiento superon.

palmet fru-
ctuaris

Palmet fructuaris, racemarius, flagellum Vitis fructuarium, Germ. ein fruchtbar schod. Belg. Drüchtbare scheut / Gall. reieron fruitier.

palmet or-
bis

Palmet orbis Colum. qui nihil parit, Germ. Blinde räben ohne räbaugen / Belg. Blinde scheute daer niet aen en combe.

palmet p-
pampinarius

Palmet pampinarius Colum. Pampinarius Plin. colis, qui primo anno frondem sine fructu fundit, Germ. Räbschoß ohne träuben / Belg. de rancf die riet dan bladeren voortbrengt, Gall. Sarmen qui porte feuilles seulement sans fruit, Ital. Tralcio del primo anno, foglioso. Hisp. Sarmiento que no lleva fruta.

reflex.

Reflex Colum. almes subsidarius eidem Sarmentum annotinum quod putatur ad fructificandum: praesidiarius palmet Colum. palmet vinarius & custos Varroni, Germ. Ein gerten am räb gelassen / ein geschüttne gerten. Belg. de rancf die ghecort is / de rancf die geschneiden wort. Hisp. Sarmiento del cuerpo de la vid.

al malleolus.

Malleolus, nouellus palmet plantationi idoneus, malleolaris virga Colum. Germ. Jünge räbschoß, gürling / fnebel, Belg. Joot, Joughe rancf, Gall. prouin, Ital. & Hisp. pampano. Flagellum, summa palmitis pars & cyma, Germ. gerten, Belg. der bouensje rancf, Gall. fin, ou menu bout de la vigne.

Capreolus.

Capreolus Varr. Clavicula Cic. Colum. Viticula Plin. Crinis eid. Coliculus vitis cincinni in modum contortus, quo lucum serpendo capit, Annulus vitis Aureliano ianē, Germ. Gablen an weinträben, Belg. Eläuertsen. Gall. Fleaux ou veillei de la vigne, Ital. viticeio, dralcio che lega & se & la vite alli pali, Hisp. sifereta, dralcillo de la vid.

Pampinus.

Pampinus Cic. Folium vitis quod vestitur, oñap. Germ. Räbblat, Belg. wyngaertblat, Gall. pampre, feuille de la vigne, Ital. pampano, Hisp. pampana, hoja de la vid. Et hinc est pampinare, cacumina defringere Colum. coles enatos & sarmento tollere Catoni, frondium luxuriam tollere.

Gemma.

Gemma [quod omisit Hadr.] ea dicitur, à qua ineunte Vere oriens vua sese ostendit, quæ & succo terræ & colore Solis augescens, primo est peracerba gustatu, deinde matura dulcescit, vestitaque pampinis, nimios Solis defendit ardores.

Caput vi-
ti.

Quemadmodum autem flagellum illud Vitis vitimum & productissimum, caput quidam appellant, ita furculi nouissimam partem Sagittam vocant, siue quia longius à matre recessit, &

quasi emicuerit, atque profiliet: seu quia cacumine attenuata, praedicti teli speciem gerat.

Surculos autem qui nihil attulerint, Spadones apud Ruellium appellant.

Virgas tandem, quæ à radicibus aut caudicis lateribus prodeunt, quasi nepotum partu grauidis, Sobolem dicunt, rustici tamen malunt Suffraginem appellare.

Nunc, quod superest, palmites appellantur, quod in modum palmarum humanarum, virgulas quasi digitos edunt, Capreolus à capiendo dictus est, à quo & Veteribus Caprea vitis cognominabatur. Malleolus à similitudine rei nomen habet, quod in ea parte, quæ deciditur ex vetere sarmento, prominens utrinque malleoli speciem præbet: vel quod capitulatus utrinque & surculatus solebat feri: differt enim à Sarmento, sicut pars à toto, verum rostratam ostendit imaginem.

Sed iam ad Vitis partem veniamus. Vua constants scapo (scopo Ruell.) & acinis, ab vuido fonte, qui latex est, nomen traxit, vocaturque Græcè αἰνός, Germ. trauben, weinträuben, Belg. drüyne / wyndrüyne, Gall. raisin, Ital. & Hisp. vua. Scapus Varr. Scopus Ruell. Scopium Trago, racemus Virg. propriè ramulus unde acini dependent, Botrus, Botrys, Botryo Mart. Germ. der rapp eder drapp am träuben / der Cham / Belg. ein drüyne, Gall. la grappe, le racemo, grappolo, Hisp. uencerron de la vua.

Acinus, & Acinum, Acinus vinaceus Cic. Græcè ἀκίνη & αἰνός, Lat. etiam granum. ἰαζ' ἑρ' ἰδ' αἰνός τὸ κομῶν, inquit Democritus, Acinus siue ἰαζ' granum est vuz, Germ. träubenbe er. Belg. wyndbesye, Gall. grain de raisin, Ital. acino, grano d'vua, Hisp. granillo de racino.

Composita est autem acinorum substantia, ex membrana, siue folliculo, aut corio acini (ὀπλὴ Græci appellant) carne, humore (τὸ σαρπὲς οὐ ὀπλὴν) per carnem disperso, & semine, eiusdem acini, quod Vinaceus Varroni, Vinaceum Colum. nucleus Trago, νῦαπτο & νῦαπτο Græcis dicitur, Hebr. vt aliorum fructuum nuclei garei- nim, Germ. der kern / Belg. de kerren, oft farles oft steen wan ein drüyne, Gall. le marc de raisin, Ital. vinaciuolo, Hisp. granillo de la vua, Offic. arilla, quasi atiduli, quod sicci, & succum nullum præbeant: sunt tamen & vinacea Colum, quæ ab vuis expressis ac prælo subiectis reliqua sunt. Recrementa tamen hæc propriè σῦμφυα dicuntur, membranosi videlicet acinorum folliculi, & vinacea cum scapis. Sed Attici, inquit Galenus, quæ ex musto expresso supersunt σῦμφυα appellant: σῦμφυα verò, quæ ab Oliuis relinquuntur.

Vinearum genera quod attinet: alia sunt humiles, vt quæ appellantur iugata, vt plerique in Italia: quibus stat recta vinea dicuntur pedamenta, quæ transversa iunguntur, iuga, ab eoq. Vineæ iugata.

Iugorum genera quatuor, pertica, arundo, restes & vites. Pertica, vt in Falerno: Arundo, vt in Arpino: Restes, vt in Brundusino: Vites, vt in Mediolanensi agro, Iugationis species duæ, vna directa, vt in agro Canusino, altera compluiata in longitudinem & latitudinem, iugata vt in Italia pleræque. Hæc vbi domo nascuntur, vineæ non metuunt sumptum, vbi multa ex propinqua villa, non valde. Primum genus, quod dixi, maximè quærit Salicta, secundum Arundineta, tertium iunceta, aut eius generis rem aliquam, quantum Arbuta, vbi traduces possunt

Spad.**Suffrago.**
Palmetis o-
gum.**Capreolus.****Malleolus.****Vua.**
Scapus.**Botrus.****Acinus.****Corium &**
cin.**Arilla.****Vinearum**
genera.
Pedament-
ta.**Vinea i-**
gata.
Pertica. A-
runo.
Restes. Vi-
tes. Iugata
duplem.

*Tradunt
Opulos
Pedamentum
item.* possint fieri Vitium, ut Mediolanenses faciunt in arboribus, quas Opulos vocant: Canusini in harundinatione in ficis.

*Adys. Pa-
lus.* Pedamentum item sere quatuor generum. Vnum robustum, quod opimum, solet afferri in vineam de Quercu ac Iunipero, & vocatur Ridi-
*Arundine-
tum.* ca. Alterum Palus de perca, meliorque de dura, quod diuturnior. Tertium quod in horum inopia subsidio sit, Arundinetum. Quartum pedamentum est, ubi ex arboribus in arbores tradu-
*Vinea se-
ma.* tis vitibus vinea fit, quos traduces, quidam Rumpos appellant.

Vinea altitudinis modus, longitudo hominis. Intervalla pedamentorum, quae boue iuncti arare possint.

*Ther. Pri-
mogen.* De loco Vitibus apto ita Virg. in Geor. ca-
nit.

*Salsa autem cellus, & qua perhibetur amara
Frigibus infelix, ea nec mansuescit arando.
Nec Baccho genus, aut pomis sua nomina ser-
uat.*

Aptum, ait Florentinus, Vitibus solum, est omnis terra nigra, non valde densa, neque glutinosa, humiditatem habens.

Coli. Vitem (inquit Colum.) nos ceteris stipiti-
bus iure praeponimus, non tantum fructus dul-
cedine, sed etiam facilitate, per quam omni parte
regione & omni declinatione Mundi, nisi tamen
glaciale, vel praeseruida, curae mortalium respon-
det. Tamque felix campis, quam collibus proue-
nit, & in densa non minus, quam in resoluta, sa-
pe etiam gracili, atque pingui terra, siccaque, &
yginosa: Tum sola maxime utramque patitur
intemperiem coeli, vel sub axe frigido, & stiuo,
procellosoque. Refert tamen cuius generis, aut
quo habitu vitem pro regionis statu colere cen-
seas, neque enim omni caelo, solae cultus idem,
neque est idem stirpis eius genus, quodque
praecipuum est ex omnibus non facile dictum est,
cum suum cuique regioni magis, aut minus ap-
tum esse doceat usus. Exploratum tamen habebit
prudens agricola genus Vitis habile campo,
quod nebulas pruinaeque sine noxa perferat,
ceterique siccitatem, ventosque patitur: pingui, &
uberi dabit agro gracilem Vitem, nec natura ni-
mis fecundam, macro feracem, terrae densae ve-
bementem, multaque materia frondentem, reso-
luto & lato solo rari sarmenti, humido loco sciet
non recte mandari fructus teneri, & amplioris
acini, sed callosi, & angusti, frequentisque vina-
ceri, sicco recte contrahi diuersae quoque natu-
rae semina. Sed & post haec non ignorabit do-
minus loci plus posse qualitatem coeli frigidam
vel calidam, siccam vel roseidam: grandinosam,
ventosamque, vel placidam: serenam, vel nebu-
losam. Frigidamque aut nebulosam duorum gene-
rum Vites aptabit, seu praecoques, quarum matu-
ritas frugum praecurrit Hiemem, seu firmi, duri-
que acini, quarum inter caligines vix deflores-
cunt, & mox geliciduis, ac pruinis, ut aliae, calori-
bus mitescunt, ventoso quoque, & tumultuoso
statu coeli fidentes eisdem tenaces, ac duri acini
committet: rursus calido uberiores atque tenerio-
res concedet: sicco destinabit eas, quae plu-
uiis, aut continuis rosis putrescunt: rosei-
do, quae siccitatibus laborant: grandinoso, quae
foliis duris, latisque sunt, quod melius protegant
fructum: nam placida, & serena regio nullam non
recipit, commodissime tamen eam, cuius vel
vix, vel acini celeriter decidunt.

At si voto est eligendus vineis locus, & status
coeli, sicut censet verissime Celsus, opimum est
Tom. II.

Solum, nec densum nimis, nec resolutum, soluto
tamen propius: nec exile, nec latissimum pro-
ximum tamen uberi: nec praecipit, simile tamen
edito campo: nec siccum, nec yginosum, mo-
dicè tamen roseidum, quod sonubus non in
profundo terrae scaturiat, sed ut vicinum radici-
bus humorem subministret, eumque nec ama-
rum, nec salum, ne saporem vini corrumpat, &
incrementa virentium veluti quadam scabra ru-
bigine coëreat. Celum porro neque glaciale
vineae, nec prorsus & stiuosum desiderat, calido ta-
men potius, quam frigido letatur, imbris magis
quam serenitatibus offenditur, & solo sicco,
quam nimis pluuioso est amicior, perflatu modico
lenique gaudet, procellis obnoxia est. Atque
haec secundum Colum. maxime probabiles est
coeli & soli qualitas.

Caelo porro calido, ait Dod. Vitis letatur: &
stiuosissimum tamen non desiderat: frigidum ve-
rò ac glaciale non sustinet: In calidis idcirco re-
gionibus uberi est potentis vini prouentus, ut in
Hungaria, Austria, Italia, Hispania, Gallia, & aliis
locis calidioribus: in frigidioribus tenuius est, &
oligophorum, ac exiguum aquam admittens, vel
etiam omnino *apuduror*, quale est quod Louanum
& alibi apud Brabantos, tum quod & apud Bo-
hemos ac Saxones, ac circa horum fines, nascitur.
Validiores siquidem & potentiores vvas Sol
efficit, sed & dulciores, si multum calefecerit: ut
in Geoponicis Quintilius affirmans, qui & Lunam
ad maturitatem, ad dulcedinem verò nosces co-
ferre aiunt. Monspelii Vites abundant: verum
longè aliter coluntur, quam nostrae: stipites e-
nim vix excedunt cubitum: quoniam omnes se-
rè rami abscinduntur, reliquis paruis stolonibus,
nec vtuntur pedamentis. Verum quibusdam lo-
cis Narbonensis Galliae permittunt ut conscen-
dant arbores ordine confitas, inter Vites cres-
cente gramine. In Italia vulgare est, ut agri tri-
ferant, triticum, ligna & vinum: solent enim Ita-
li ordine in agris conferre Salices, Populos, lu-
glandes, quas conscendunt Vites, inter arbores
serunt triticum. Genesae aliquasita colunt & vo-
cant *des Huns*.

Iam [ne quid omittatur] cui vinea facere cor-
di est, praecipue caueat, ne alienae potius curae,
quam suae credere velit, neue merceatur vitigadi-
cem. Sed genus surculi probatissimum domi con-
ferat, faciatque vitarium, ex quo possit agrum
vineis vestire: nam quae peregrina ex diuersa re-
gione semina transferuntur, minus sunt familia-
ria nostro solo, quam vernacula, eoque velut
alienigena reformidant mutatam caeli, locique
positionem. Sed nec certam generositatis fidem
pollicentur, cum sit incertum an is, qui conserue-
rit ea, diligenter exploratum, probatumque ge-
nus surculi deposuerit, quam obrem biennij spa-
tium longum esse minime existimandum est, in-
tra quod utique tempestinitas seminum respon-
det, cum semper primum retulerit, exquisiti
generis stirpem deposuisse. Post haec deinde me-
minerit accuratè locum vineis eligere, de quo
cum iudicauerit, maximam diligentiam sciat ad-
hibendam pastinationi, quam cum peregerit,
non minore curâ Vitem conserat, & cum
seruerit, summa fidelitate cultura seruiat, id
enim quasi caput & columen est impensa-
rum.

Ut autem ea quae proposita fuerint suo quaque
ordine prosequamur. Vitarium neque ieu-
na terra, neque yginosa faciendum est, fue-

*Observa-
tiones de id:
faciendis
Genesae.*

*Primum
hinc
tempore.*

coram tamen & mediocri potius, quam pingui, tametsi ferè omnes Auctores huic rei latissimum solum destinauerunt, quod ego minimè reor esse pro agricola. Nam deposita stirpes valido solo, quamvis celeriter comprehendant, atque proficiant, tamè cum sint vitæ radices factæ, priusquam transferantur, retorrescunt, nec adolescere queunt. Prudentis autem coloni est ex deteriori terra potius in meliorem, quam ex meliore in deteriore transferre. Propter quod mediocritas in electione loci maximè probatur, quoniam in confinio boni, malique posita est. Siue enim postmodum necessitas postulauerit tempestiua semina tereno solo committere, non magnam sentient differentiam, cum ex mediocri terra in exilem translata sunt, siue latior ager conferendus est, longè celerius in vbertate coalescunt. Rursus tenuissimo solo vitiarum facere minimè rationis est, quoniam malleolorum pars maior deperit, & quæ superest tardè fit idonea translationi. Ergo mediocritas & modicè siccus ager vitario est aptissimus, isque bipalio prius subigi debet, quæ est altitudo pastinationis, cum in duos pedes & semissem conuertitur humus, ac deinde tripedaneis relictis spatiis, per quæ semina excoluntur, in singulis ordinibus, qui ducentos quadragenos pedes obtinent sexcenteni malleoli pangendi sunt: is numerus consumat per totum iugerum, seminum millia quatuor & viginti.

*Delectus
malleoli.*

Verùm hanc curam preuenit inquisitio, & electio malleolorum nam, ut sepe iam retuli, quasi fundamentum est prædictæ rei, probatissimum genus stirpis deponere. Sed electio dupliciter facienda est, non enim solum fecundam esse matrem satis est, ex qua semina petuntur, sed adhibenda est ratio subtilior, ut ex his partibus trunci sumantur, quæ & genitales sunt & maximè fertiles. Vitis autem fecunda, non tantum debet ea æstimari, quod vuas complures exigit: potest enim trunci vastitate id accidere, & frequentia palmitum, nec etiam eam feracem dixerim, cuius singulæ vix in singulis sarmentis conspiciuntur, sed si per vnumquemque pampinum maior numerus vuarum dependet, si ex singulis gemmis compluribus materiis cum fructu germinat, si denique etiam è duro virgam cum aliquibus racemis citat, si etiam nepotum fructu grauida est, ea sine dubitatione ferax destinari debet legendo malleolo. Malleolus autem nouellus est palmis innatus prioris anni flagello, cognominatusque à similitudine rei, quod in ea parte, quæ deciditur ex vetere sarmento prominens vtrinque malleoli speciem præbet. Hunc ex fecundissima stirpe legendum censemus omni tempore, quo vineæ putantur, ac super terram gemmis tribus vel quatuor exantibus diligenter obruendum loco modicè humido non viginoso, dum tamen antiquissimum sit considerare, ne vitis, ex qua is sumitur, ancipitem floris habeat euentum, ne difficulter acinus ingrandescat, ne aut præcoquem, aut sece maturitatis fructum afferat, nam illa volucris, hæc etiam tempestatibus hyemis infestatur.

*Vitis
feracis
granda.*

Cæterum fecunditas Vitis adiuvari potest cultoris industria, celerimèque inscriptionibus ad maximum numerum perducitur. Refert ut in transferendis seminibus similem statum cæli, locique, & ipsius Vitis habitum obseruemus, quoniam plerumque degenerat surculus, si aut situs agri, aut aeris qualitas repugnet, aut etiam si ex arbore in iugum deferatur. Itaque de fugi-

dis in frigida, de calidis in similia, de vineis in vineas transferemus, magis tamen ex frigido. Rara stirps potest calidum sustinere, quoniam lætatur tepore potius quam frigore. Sed & qualitas soli plurimum iuuat, ut ex macro aut mediocri transducatur in melius, nam quod assuetum est pingui, nullo modo maciem terre patitur, nisi læpius stercores.

Custodiemus autem, ut à prædictis locis, quos humerosos rustici vocant, semina legamus, tamen quæ attulisse fructum antea animaduertimus: nam si fortè vacua sint, quamvis à laudabili parte, nihil censemus ad feracitatem conferre malleolo.

Quare magnopere in eligendis seminibus adhibenda cura, uti fructuosâ parte Vitis palmities legantur ei, qui futuram fecunditatem iam toto fructu promittunt. Nec tamen contenti sumus singulis vuis, maximeque probandis, qui numerosissimis scrobibus conspiciuntur. An non opilionem laudabimus ex ea matre tobolem propagantem, quæ geminos enixa sit, & caprarium summittentem scrobis earum, pectum, quæ trigemino partu commendantur, videlicet quasi semper sit parentum fecunditati proles responsura, & nos sequamur in Vitis hanc ipsam rationem, tantò quidem magis, quod compertum habeamus naturali quadam malignitate desciscere interdum, quamvis diligenter probata semina, idque nobis poeta velut turdis veritati indulget dicendo.

Vidi lecta diu, & multo spectata labore.

Degenerare tamen, ni vis humana quotannis

Maxima quæque manu legeret, sic omnia sacris

In penis rueret, ac rursus sublapsa reserri.

Quod non tantum de seminibus leguminum, sed in totam agriculture rationis dictum esse intelligendum est.

Sequitur hanc eligendi malleoli curam, pastinationis officium, si tamen antè de qualitate soli constiterit, nam id quoque plurimum & bonitati, & largitati frugum conferre nihil dubium est. Ac prius quam ipsum perspiciamus, illud antiquissimum censemus, rudem potius eligendum agrum, si sit facultas, quam vbi fuerit seges, aut arbustum: Si tamen rudis terra non sit, proximum est vacuum arboribus aruum. Si nec hoc est, rarissimum arbustum, vel oliuetum quod non fuerit maritatum vineis, destinatur. Vltima est conditio restibilis vineæ: nam si necessitas facere cogit, prius quicquid est residuum Vitis extirpati debet, deinde totum solum sicco sumo, aut, si id non sit, alterius generis quam recentissimo, stercoreari, atque ita conuerti, & diligentissime resollas omnes radices in summum regei ac comburi. Tunc rursus vel stercore vultu, quia non pignit herbas, vel de vepribus egesta humo pastinatum largè contegi. Sed hoc in totum ad illud, quod vineis præcipue est idoneum, propriè considerandum, si facilis est humus & modicè resoluta, quam pullam vocitant, nec quia sola ea, sed quia sit habilis maxima vineis. Quis enim vel mediocri agricola nesciat etiam durissimum tophum vel carbunculum, simul atque sunt contracti, & in summo regei, tempestatibus, gelivæ, neominis æstivæ putrescere caloribus ac resolui, eosque pulcherrimè radices vitium per æstatem refrigerare, succumque retinere: quæ res alendo surculo sunt accommodatissimæ: simili quoque de causa probati solutam glaream, calulosumque agrum & mobilem lapidem, si tamen hæc pingui-

gleba permixta sunt, nam eadem ieiuna maximè
culpantur. Est autem [ut mea fert opinio] vi-
neis amicus etiam Silex, cui superpositum est mo-
dicum terrenum, quia frigidus, & tenax humoris
per ortum cuniculæ non patitur sitire radices.
Higinus quidem secutus Tremellium, præcipuè
montium uia, quæ à uerticibus defluentem hu-
mum reciperint, vel etiam valles, quæ fluminum
alluunt, & inundationibus concreuerint, aptas
esse vineis asseuerat me non dissentiente. Viti-
bus contrà inimica Cretosa humus quam argil-
lam vocant. Nec minùs ieiunus sabulo, & quic-
quid, ut ait Iulius Atticus, retorridum furculum
facit. Id autem solum vel vliginosum est, vel sal-
sum, vel amarum, vel siticulosum, vel perari-
dum. Nigrum tamen, & rutilum sabulonem, qui
sit humidæ terræ permixtus, probauerunt Anti-
qui. Gravis est rubrica, ut idem Atticus ait, & ad
comprehendendum radicibus iniqua. Sed alit
eadem vitem, cum tenuit, verum est in opere
difficilior, quod neque humentem fodere possis,
quod sit glutinosissima, nec nimium siccam, quia
ultra modum prædura.

Sed ne nunc per infinitas terreni species ena-
gemur, non intempestiuè commemorabimus
Iulii Græcini conscriptam velut formulam ad
quam posita est limitatio terræ vinealis. Idem
enim Græcinus sic ait. Esse aliquam terram cali-
dam vel frigidam, humidam vel siccam, raram
vel densam, leuem aut grauem: pinguem aut ma-
cram: Sed neque nimium calidum solum posse
tolerare vitem, quia iuratur, neque prægelidum
quoniam velut stupentes, & congelatas radices,
nimio frigore moueri non sinat, neque humidum,
quoniam cum se promunt vitæ, modico tem-
pore euocant humorem terræ iusto maiorem qui
putrefacit deposita semina. Rursus nimiam sic-
citatem destituere plantas dicit naturali alimen-
to, aut in totum necare, aut scabras & retorridas
facere. Perdensam humum celestis aquas non
sorbere, nec facile perflari, facillimè perumpi, &
præbere rimas, quibus sol ad radices stirpium
penetret. Eademque velut conclausa & coarctata
semina comprimere atque strangulare: Raram
supra modum velut per infundibulum transmi-
tere imbres, & Sole ac vento penitus siccare, at-
que exarescere. grauem terram vix vlla cultura
vincibilem, leuem vix vlla sustineri, pingui-
ssimam & latissimam luxuria: macrem, ac tenuem
ieiunio laborare. Opus est, inquit, inter has tam
diuersas inæqualitates, magno temperamento,
quod in corporibus quoque nostris desideratur,
quorum bona valetudo calidi & frigidi, humidi
& aridi, densi & rari, certo & quasi examinato
modo continetur. Nec tamen hoc temperamen-
tum in terra quæ vineis destinatur, pari momen-
to libratum esse debere ait, sed in alteram partem
propensius, ut calidior terra sit quàm frigidior, sic-
cior quàm humidior, rarior quàm densior, & si
quæ sunt his similia, ad quæ contemplationem
suam dirigat, qui vineas instituet.

Quæ cuncta sicut ego reor magis profunt, cum
suffragatur etiam status cæli: cuius regionem,
quam spectare debeant vineæ, vetus est dissen-
tio. Salernà maximè probante Solis ortum mox
deinde meridiem, tum occasum, Tremellio
Scrophæ præcipuam positionem meridianam
consente, Virgilio de industria occasum sic repu-
diantem.

Nunc tibi ad Solem vergant vineæ cadentem.
Democrito, & Magone laudantibus cæli plagam
Septentrionalem: quia exultant ei subiectas

Tom. II.

seracillitas fieri vineas, quæ tamen bonitate
vini superentur. Nobis in vniuersum præcipere
optimum visum est, ut in locis frigidis meridia-
no vinea subiiciantur, tepidis orienti aduertan-
tur, si tamen non infestabuntur Austris, Eurisq;
velut oræ maritimæ in Bætica. Sin autem regio-
nes prædictis ventis fuerint obnoxia, melius A-
quiloni, vel Fauonio committentur, nam seruen-
tibus provinciis, ut Ægypto & Numidia, vni
Septentrioni rectis opponentur, quibus om-
nibus diligenter exploratis tum demum pasto-
nationem suscipiemus.

Et hæc pleraque ex Columella: cætera verò
quæ tum ex sua tum ex aliorum sententia de vi-
tis Passinatione, Positione, Pampinatione, Ablaque-
tione, Puratione, reliquaque eius cultura prolixè
prosequitur, ex ipso fonte haud grauatum petet
Lector.

Natura vitis, inquit Palladius, cæli ordine,
solumque sustentat, si genera conuenienter ap-
tentur. Plano igitur loco statues vitem, cuius ge-
nus nebulas sustinet, & pruinas: collibus, quod
siccitatem durat & ventos. Pingui agro graci-
les, atque infecundas, macro feraces & solidas:
denso, validas atque frondosas, frigido & nebu-
loso, quæ hyemem celeri maturitate præueniunt,
aut quæ duris acinis inter caligines secundo flo-
rent: ventoso, stabiles, & tenaces: calido grani-
tenuioris, & humidi: sicco, eas, quæ pluuias fer-
re non possunt: & ne multa dicamus, eligenda
sunt genera quæ professione vitiorum tuorum
contraria loca diligant, in quibus durare non
poterant. Placida sanè regio, & serena tunc ge-
nus omne suscipiet. Vitium genera numerare
non atinet, sed notum est maiores Vuas pul-
chræ speciei, grani callosi, & siccioris ad mentem:
seracillimas verò, & cuius tenuioris, & sapore no-
biles, & maximè quæ citius deflorescant, vinde-
mus esse seruandas.

Loca naturam plerisque vitibus mutant. Solæ
Ammineæ ubicunque sint, vinum pulcherrimum
reddunt. Calidum statum potius quàm frigidum
sustinebunt. De macro ad pingue transire non
possunt, nisi sterus adiuerit. Harum duo ge-
nera sunt, maior & minor. Sed minor melius de-
florescit, & citius internodiis minoribus, & gra-
no breuiore. Si arbori applicetur, pinguem
terram: si colatur in ordines, mediocrem de sice-
rat. Imbres contemnit, & ventos, nam maior sæ-
pe vitatur in flore. Sunt & Apianæ præcipuæ.
Satis est genera ista dixisse. Industrius vir proba-
ta deligat, & terris talibus mandet, quæ imitari
eas possint unde sumuntur: sic merita sua qua-
que seruabit. Sed vitem vel arborem, melius
erit de exili ad pinguem transferre: nam si à pin-
gui terra ad solum exile transferint, viles esse
non poterunt.

Eligenda sunt sarmenta quæ pangimus de
Vite media, neque de summa, neque de infima,
quinque vel sex gemmarum spatium à veteri pro-
cedentia, quia non facillè degenerant, quæ de lo-
cis talibus transferuntur. Sumantur autem de
Vite fecunda, neque putemus brachia esse ferti-
lia, quæ Vuas singulas, aut binas producunt, sed
quæ multà vberitate curuantur: nam potest se-
rax vitis feracioris in se habere materias. Erit
& hoc signum fertilitatis, si de duro aliquo loco
fructum citabit, si sætu impleuerit ramulos ex
ima parte surgentes. Sed hoc signis potius per
vindemias est notandum. Ad pangendum, no-
uelligis palmes eligi debet, dum in se nihil habens,
& veteris sarmenti, quia hoc putrescente sæpè

Natura Vi-
tis omne ca-
lium & so-
lum susti-
net.

Forma Vi-
tis.

Electio sa-
rmentorum.

Forma Vi-
tis signum.

HISTORIÆ PLANTARVM

corumpitur. Summa flagella repudiemus, ac furculos, qui licet bono loco nati sint, tamen feracitate caruerunt. Pampinarius, qui de duro nascitur etiam si attulerit fructus, pro frugifero non est ponendus, in suo enim loco fecundatur à matre, translatus verò tenet sterilitatis vitium, quod renascendi conditione suscepit. Caput sarmenti, cum deponitur, torquendum non est, nec aliquo modo vexandum, ne demersa penitis fecundiore parte, quod sterili proximum est supra terram relinquatur: deinde quoniam ipsa tortura vexatio est, & pars ea, de qua radix futura prælumitur, iniuriæ nulli subiicienda est, cum qua contendere cogatur, antequàm teneat.

*Positio
tempus.*

Ponendæ sunt vites placidis diebus ac tepidis. Curandumque ne sarmenta Sole urantur, aut vento, sed vel statim ponantur, vel obruta referuentur. Martio mense, ac deinceps toto Vere vinea ponenda est regionibus frigidis, pruinosis, pinguibus campis, & humidis prouinciis.

*Mensura
sarmenti.*

Sit autem mensura sarmenti cubitus vnus. Vbi pinguis est natura terrarum, maiora inter Vites spatia relinquemus, vbi exilis, angusta. Nonnulli itaque in his vitibus, quas toto solo pastinato disponunt, ternos pedes inter singulas vites quoquouersus dimittunt. Sed hoc genere diuisionis in iugerali tabula pangentur tria millia tri-centa vicena sarmenta. Quod si duos & semis pedes inter vites relinqui placuerit, in eadē tabula ponentur vites quatuor mille septingente, quinquaginta tres.

*Positio
viti.*

Sed ad ponendum vitemur hoc ordine. Lineam seruatis iis spatiis, quæ placuerit custodire, candidis signis, vel quibuscunque notabimus: tunc tensa per tabulam linea, in eis locis furculos, vel calamos figemus, vbi vnaquæque vitis ventura est. Spatium totius tabulæ furculis complebitur ad numerum Vitium ponendarum, atque is qui panditurus est, proiecta circa furculos sarmenta sine vllō errore deponet: Præterea nō est vno genere vitium omne pastinum conferendum, ne annus iniquus generi spem vindemix totius extinguat. Et idē quatuor, aut quinque eximij generis sarmenta pangemus: sed maxime expedit genera tabulam disponi, & decimanis diuidi, nisi deterreat operis difficultas, quod si est vetus vinea, singulorum generum furculis tabulam poterimus inferere, & faciliè hoc genus colendi, quod est pulchrum, atque utile, consequemur. Ita & maturitatis & floris tempora, quæ in vite diuersa sunt, suis temporibus opportunitate obtinere poterimus. Nec paruo constabit, si legator maturitas cum acerbitate: dispendium, cum vnius tempestiuam vindemiam sequi, sit permixta cruditate vitiosum, & alterius seras maturitates expectare, damnum. Huic commodo adicitur, quod pro generum diuersitate per gradus accedente vindemia, minor operatum numerus eam poterit expedire, & generatim condere, ac melius puros sapes, sine luctamine alterius generis, vnaquæque vina seruare. Hoc si difficile videbitur, non alias simul conferas, quàm quæ & sapore, & flore, & maturitate conueniunt. Sed hæc in pastinis, vel sulcis ratio erit, in scrobibus verò per angulos 4. sarmenta depones: Sed [vt aſſert Columella] vineæ cum stercore mistam simul (parges, & si exale solam fuerit, pinguem terram scrobi inferes, vel aliunde portatam. Cum verò plinā, vel mallo-lam disponimus, modicè humido solo, sed potius

*De arboribus
in vineis
tempora
viti. dicitur.*

arido, quàm lutoſo, duabus generis vitibus, reliquis, sarmenta ponemus obliqua, & sic faciliè comprehendunt.

Quod si arbutū te habere, dicitur, plinā gen-
rolz vitis prius in seminario nature debet, inde radicata transferatur ad scrobem; cōtra, si iniuncta est. Seminarium verò dicimus, quæ scro-
sam tabulam pedum duorum semis altitudinis. In hac, quam pro numero ponendarum vitium, vel qualiumcunque plantarū protendis, aut contrahis, breuissimo spatio inter se sarmenta depones, si vallis aut humidus est campus, trium generarum, exceptis minutis, quas habebit asperum, & vbi conualuerint, hinc post biennium radicata vitis, vel arbutulas transferas, quas cum depones in scrobe, ad singulas materias redigere putatis omnibus, quæ scabra sunt, curata etiam radicibus, si quas potueris inuenire vexatas. In scrobe autem ad arbutum faciendum duas radicata vitis deponis, hoc seruans, ne se in radice contingant: sed lapides quinque prope librarum medios in vitamque constitues, & ipsas vites ad scrobis latera discreta coniunges. Mago aſſert, scrobem non primo anno esse complendam: sed subinde corquandam, quæ res vitem faciet altius fundare radices: sed hoc aridis prouinciis forte conueniet, humidis autem sacra putrescent recepto humore nisi statim terra cumuletur. Sed arbuta, qui faciet plantas arborum de his generibus ponit, si agro suppetit abundantia, Opulo, Vulnio, Frazino in montanis & asperis, in quibus, Vlmus minus læta est. Has etiam Columella dicit seminario debere nutiri. Mihi videtur, quod nulla prouincia sit, quæ non ex his quamcunque sponte producat. Sed si ager frumentarius fuerit, vbi arbuta disponis, quadragenos pedes inter arbores relinque, vt fer possit, in exili autem vicenos. In scrobe verò vitis ab arbore sua sesquipedis spatio distare debet. Nam vitis multum subiecta arbori, incremento arboris opprimitur. Caueis etiam munienda est aduersum pecoris appetentis iniurias, & arbori suæ protinus alliganda.

*Campus
dicitur de
transfere
de viti in
arbuta.*

Est & aliud de transferenda ex arbutis vite compendium. Fit ex vimine parua corbicula, quæ mensura pedis, vel aliquantō minus circini spatio possit amplecti. Hæc ad arborem, cui vitis inhæret, fertur. Et in fundi media parte pertunditur, quod sarmenti virgam possit admittere. Inducto itaque sarmento vitis eius, de qua transferre disponis, corbicula ipsa ex aliqua arboris parte suspenditur, & viva terra repletur, vt sarmentum terra possit includi, quod sarmentum prius intorquetur. Ita exacto annui temporis spatio, sarmentum quod clausum est, radices creabit intra prædictam corbiculam. Tunc sub fundo corbis incisum radicum sarmentum cum ipsa corbe portabitur ad locum quem vitibus arbutiuis destinabis implere, ibiq; obruetur circa arboris maritandæ radices. Hoc genere quantum volueris numerum vitium transferes sine ambiguitateprehendendi.

Vinez in prouinciis multis generibus sunt: sed optimum genus est, vbi Vitis velut arbutula stat breui cruce fundata. Hæc primo calamo iunatur, donec solidetur: sed alior sesquipede esse non debet, vbi robusta sic erit, sola confistet. Aliud genus est, in quo canis plantis vitæ dispositus, ipsa vitis per canas sarmentis ligatis in orbiculos flexitur se sequens. Vltimæ positionis vitis est, quæ per terram projecta discumbit. Hæc omnes & scrobibus ponuntur & sulcis.

Hoc

*Putatio
marum
communis
altorum,
Sed tam
lucum.*

*Focaneus
abrader
dum*

*Locis consi
derandis*

Hoc mense (Martio) locis frigidis aliquatenus, & temperatis vitium iusta putatio est. Sed ubi sunt multæ vineæ diuidantur, & pars earum, quæ Septentrionem respiciet, Vere putetur, alia pars aduersa clementioribus plagis, recidatur Autumno: Sed in putatione semper nitamur, ut vitis fiat in crure robustior, neue debili vincula duo duramenta seruemus. Auferenda sunt lata, intorta, debilia, malis locis nata sarmenta. Focaneus etiam, qui inter duo brachia medius nascitur, debet abradi, qui si pinguitudine sua brachium quodcumque proximum debilitauerit, illi decisio succedat. Erat tamen optimi putatoris, inferius sarmentum, quod bono loco natum fuerit, reparandæ vitis causa semper tueri, & ad vnam, vel duas gemmas relinquere.

In locis clementioribus altius vitem licebit expandere, in exilibus aut æstuosis, aut decliuis, aut procellosis, humilior est habenda. Locis pinguibus, singulis brachiis vitium bina flagella dimitte. Sed erit sapientis æstimare vim vitis. Nam quæ altius tollitur, & fructuosa est, plus quam octo palmites habere non debet, ita ut conseruemus semper in inferiore parte custodem. Circa crur quicquid nascitur amputandum est, si non desideret vinea reuocari. Quod si truncus vitis Sole, aut pluuio, aut noxiis animalibus est catus, purgamus quicquid est mortuum, plagasque eas amurcâ linimus, & terrâ aduersum prædicta.

Cortex etiam recisus & pendens à vite tollatur, quæ res minorem faciem reddit in vino. Muscus radatur ubicunque repertus. Sed plagæ, quas in duro vitis accipiet, obliquæ & rotundæ esse debebunt. Decisis sicut supra dixi, malè natis omnibus & veteribus, nouellis, & fructuarios serua. Vngues etiam custodem siccos, & annos nos recide, & omnia quæ vetera, vel scabra repeties.

Illæ, quæ altius coluntur, ut in iugo, vel pergula, ubi quatuor pedibus supra terram leuante steterint, quaternis brachiis habeant. Si macra Vitis erit, in singulis brachiis singula flagella dimittimus, si pinguis, bina. Sed providendum, ne in ima parte sint sarmenta, quæ seruas. Quoddum sit, vitis tanquam si fulgure tangatur, arcescit. Relinquenda sunt sarmenta, neque circa durum, neque in summo, quia hæc velut pampinaria minus afferunt, illa vitem nimietate fortius onerant, & longius ducunt. Quare in medio loco seruandæ sunt, quæ tuemur. Plaga non iuxta gemmam, sed aliquantulo superius fiat, & auertatur à gemma propter lachrymam defluentem.

*Putatio ar
borum*

Vitis, quæ in arbore collocatur, prima eius materia ad secundam vel tertiam gemmam præcidatur. Deinde omnibus annis aliquid per ramos crescere, subinde patiamur, vnam materiam semper ad cacumen arboris dirigentes. Sed qui fructum volunt maximum, materias plures per ramos submitunt qui vinum melius, sarmenta in cacumen extendunt. Fortioribus ramis arborum plures materiz, debilioribus imponendæ sunt pauciores. Putandi autem ratio talis est, ut & vetera sarmenta, quibus primi anni fructus pependit, omnia recidantur, & noua circumcisus capreolis, & ramulis inutilibus dimittantur. Sed providendum est, omnibus annis vitem resolui, ac religari, quia refrigeratur. Ita formandi sunt rami arborum vitiferarum, ne alter sub alterius linea dirigatur: sed loco pingui vltimus à terra octo pedibus, gracili vero se-

ptem sine ramo relinquenda est. In solo roscido & nebuloso rami arboris vitiferæ in Orientem, & Occidentem putatione dirigantur, ut latera vacua Solis radiis membra totius vitis ostendant. Agendum est autem, ut Vitis spissa non sit in arbore, & deficientibus primis arboribus substituendæ sunt aliz. In loco cluoso humilidæ rami arborum seruandi sunt, in plano & vliginoso altius. Palmites ad arborem non duro vimine ligentur, ne eos vinculum recidat, aut atterat. Hoc autem noueris quia palma quod extra ligaturam pendens habuerit, fructum induet, quod infra ligaturam, materiz sequentis anni deputabit.

Vites quas Prouinciali more velut arbusculas stare dixi, si instituere velis, ramos à quatuor partibus his relinques, & in eis brachiis sarmenta pro vitis possibilitate seruabis. Vites autem, quæ canis in orbem cinguntur sic putentur, quemadmodum ex, quæ nituntur radicis, aut palis. Illæ verò quæ sine admitticulis iacent, quod pro sola indigentia faciendum est, vel necessitate prouinciz, primo anno duas gemmas: deinde plures habebunt. Sed huius generis vinea strictius est putanda.

Nouellam vitem dicit Columella à primo anno ad vnam materiam esse formandam, nec recidendam totam, sicut Italiz consuetudo est. Anno secundo expleto, quia vel intereant vites in totum recisæ, vel infecunda sarmenta producant, quæ amputato capite velut pampinaria de duro coguntur exire: quare iuxta ipsam veteris sarmenti, vnam vel duas gemmas censemus relinquendas, quod est meritò in vincula fortiores seruandum, & sanè excipiendam calamus nouellam, vel exiguis palis, ut tertio anno robustiores possit accipere. Nam quadriga nouella, vbi latum solum est, tres materias meritò nutrire cogetur. Statim post putationem sarmenta decisa à vincis, & Rubi & impedimentum fossoris omne tollatur.

Hoc etiam mense [Martio] propagandæ sunt vites: sed vetus, & exesa vinea cuius duramenta longè processerunt, ut Columella dicit, mergis melius reparabitur, quam si in fossione totius corporis obruatur, quod agricolis certum est displicere. Mergum dicimus, quoties velut arcus supra terram relinquitur alia parte vitis in fossa. Nam (ut ait Columella) cum totæ stratz sunt, plurimis radicibus totius corporis fatigantur. Mergi verò post biennium reciduntur in ea parte, quæ supra est, & in loco iustas vites relinquunt. Sed [ut agricolæ afferunt] post biennium si recidas, plerumque infirmas habent radices, & repente simul pereunt.

Hoc Mense calidis & apricis locis optimè celebratur insitio, quæ fit tribus generibus. Sed ex his duo nunc fieri possunt, tertium reseruat ætati. Sunt autem genera inferendi hæc, aut sub cortice, aut in trunco, aut emplastro. Inferemus ergo sic. Arborem vel ramum, in loco qui nitidus est, & sine cicatrice, serrâ recidemus non lèso cortice. Post serraturam plagam serratamenti acutis nitidamus. Inde quasi cuneum tenuem ferreum, vel osseum, maximè leoninum, inter corticem, & lignum tribus prope digitis consideranter deponimus, ne corticis fascia dissepetur, & in eum modum subducto cuneo, statim furculum mergimus una parte decisum salua medulla, & cortice partis alterius, qui supra arborem sex, vel octo digitis emineat, Duos vel tres, vel plures furculos pro trunci qualitate constituimus, quæ-

*De Nouella
Causa part
ritone*

*Propagatio
vitis*

*Insitio tri
plex*

Cum

ternis digitis, vel ampliùs inter eos spatium relinquimus, tunc lunco, aut Vlmo, aut vimine stringimus, & supra lutum musco testum ponemus, ac ligabimus, vt quatuor digitis super lutum possit furculus eminere. Plerosque delectat strictum primo lectæ arboris truncum vinculis arctioribus in medio findere, & ibi furculos ex vtraque parte ramos in modum cunei, vt integra sit medulla demergere, præmisso antè cuneolo, quo subducto, depositus furculus redeunte in plagam materia, possit astringi. Sed hoc vtrumque genus vernum est, & fit crescente luna, vbi incipit gemma arborum turgescere. Surculi autem, qui inferendi sunt, sint nouelli, fertiles, nodosi, de nouo nati, ab orientali arboris parte decissi, crassitudine digiti minoris, bifurci, gemmis pluribus vbertati. Si arborem minorem desiderabis inferere, in qua sine dubio meliora incrementa proueniunt, circa terram secato, & quod melius est, furculos inter lignum, corticemque deponere, tunc stringe. Quidam rasum ex vtraque parte furculum convenientem soliditati arboris inferendæ sic in medio deponunt, vt cortex furculi vndique cortici arboris reddatur æqualis. Sed in nouella arbore terra mota vsque ad ipsum insitum colligatur, quæ res eam à vento, & calore defendet. Mihi asseruit diligens agricola, omne insitum sine dubio comprehendere, si depositis furculis viscum non temperatum in ipsa plaga pariter mergamus, quasi glutino quodam succos materiam vtriusque misturum. De emplastratione suo mente dicemus. Quantum genus Columella sic retulit: Gallica terebra vsque ad medullam arborem perforandam, plaga interioris leuiter inclinata. Ibi educto omni scobe, vitem vel ramum admodum foraminis impressi delibratum, succidum tamen, & humentem strictè imprimi, vnà aut duabus gemmis foris relictis, tunc argilla, & musco locum diligenter operiri, ita & vites in Vlmo inferi posse commissas. Hispanus quidam mihi hoc genus nouæ insitionis ostendit, quod ex Persico se assererat expertum. Salicis ramum brachii crassitudine solidum, longum cubitis duobus aut ampliùs terebrari iussit in medio & plantam Persici in eodem loco, in quo consistit, spoliata ramis omnibus, Solo capite relicto, per ipsum salicis manubrii foramen induci, tunc eundem salicis ramum terræ capite vtroque demerso, in arcus similitudinem debere curuari, foramen luto, musco, vinculis stringi: anno deinde exempto, vbi infra medullam salicis caput plantæ sic cohaeserit, vt vnitas sit ex duobus mista corporibus, plantam subterincidi, æque transferri, & aggerari terram, quæ arcum salicis cum Persici cacumine possit operire, hinc Persici poma sine ossibus nasci, sed hoc locis humidis conuenire, vel riguis, & salices aquationibus adiuvandas, vt & natura ligni vigeat, quæ delectatur humore, & superfluentem copiam succi germinibus ministrat alienis.

De fodiendis palan-
dis, ex li-
gandis viti-
bus.

Vitis rha-
vinea & fa-
cienda.

Nunc locis maritimis, & calidis fodiendæ sunt vites: vel (si hæc prouinciæ consuetudo est) exarandæ, & in eisdem locis palandæ, aut ligandæ sunt vineæ prius, quàm gemma procedat, cuius concussione, vel attitu incurritur grande dispendium. Theriacam vitem, cuius iste pro-
fectus est, vt vinum eius, vel acetum, vel vna, vel sarmentorum cinis proficiat, contra mor-
sus omnium bestiarum: sic facies. Sarmen-
tum, quod pangendum est, trium digitorum spa-
tio in ima parte findatur, & sublata medulla ad

eius vitem Thyriacæ medicamen addatur. Tunc terræ mandetur vinculo diligenter astrictum. Aliqui eadem sarmenta iam medicamine saturata, intra squillæ bulbum recondunt, & ternis prædicta ratione committunt. Aliqui antidoti eius affusione radices vitis infundunt. Sanè sarmentum, si de hac vite sumatur ad transferendam, potentiam materni medicaminis non tenebit, oportebit autem thyriacæ infusione assidua, vim succi senescentis iterare.

Est pulchra species Vux, quæ granis interioribus caret. Hinc efficitur, vt summa iucunditate sine impedimento sorberi possit, velut vnum omnium corpus Vuarum. Fit autem Græcis Authoribus hac ratione, per artem succedente natura. Sarmentum, quod obruendum est, quantum latebit in terra tantum findere debemus, & medullam omni sublata, ac diligenter exalpta, membra iterum diuisæ partis adunare, & vinculo constricta deponere, Vinculum tamen papyro asserunt esse faciendum, & sic in humida terra esse ponendum. Diligentius quidam sarmentum reuinctum quantum excisum est, intra squillæ bulbum demergunt, cuius beneficio asserunt fata omnia comprehendere facilius. Alii tempore, quo Vites putant, sarmentum fructiferum putat Vitis in ipsa vite, quàm possint de alio sublata medulla excuant, non diuisum, & calamo affixo alligant, ne possit inuerti. Tunc *inter xylomata*, quod Græci sic appellant, in excavata parte suffundunt, ex aqua prius ad saporem pinguedinem resolutum, & hoc transactis octonis diebus semper renouant, donec Vitis germina nouella procedant. Et in granatis malis fieri hoc posse affirmatur à Græcis, & in ceteris opus est experiri.

Vites quæ lachrymarum nimietate tabescunt, & deplorando vim roboris sui auertunt à fructu, trunco eorum lacerato Græci sinum fieri iubent. Si hoc minus proderit, radicum robur pingue rescindi, vt asserat medicinam vulnus impressum: tum insula amurcæ ad medietatem decocta, & refrigerata plagæ excisio perlinetur, & sub hac acetum acre fundetur.

Conditum vel absynthiatum, vel rosatum, vel violatum procedere spontè fertur ex vitibus [vt natura suscipiat, quod procurare luenit industria] si sarmenta in vas aliquod semiplenum supradictis potionibus mersa seruentur, & viuam terram simul resoluas ad lixiuii modum, donec oculi sarmentorum nitantur exire: tunc eadem sarmenta gemmantia in quo volueris loco, vitium cæterarum more deponas.

Vt Vitis botryones & albos asserre possit, & nigros. Græci sic fieri debere iusserunt. Si vicinæ sunt vites nigra & alba, cum putantur, sarmenta vtriusque inter se diuisa sic iunges, vt medios vtriusque generis oculos æquādo reddere possint vnitati. Tunc papyro ligabis stricto, & molli, atque humida terra curabis adlinire, & interiectis ternis diebus adquare, donec germen nouæ frondis erumpat. Hinc exempto tempore, si libuerit, genus efficies per plura sarmenta.

Martio mense locis frigidis putatio vinearum celebratur, de qua abundè Februario mense locuti sumus, vsque quò incipit gemma esse sus-
pecta. Vbi calor temporis coeperit, ligaturæ ipsi
pinnicillo circa yesperam tenuis debet frequen-
ter humor affundi, vt hoc alimento contrarium
cæli torrentis animetur. Cum ergo germen eru-
perit, & aliquod coeperit incrementum, calami
adiutorio debet annexi, ne motus aliquis fragi-
lema

Vux sine
granis.

Vitis rha-
vinea.

Vitis rha-
vinea & fa-
cienda.

Vitis rha-
vinea & fa-
cienda.

Vitis rha-
vinea & fa-
cienda.

lem procedentis sarmenti quasset ætatem. Vbi solidius quantumcunque processerit, vincula oportet abscindi, ne adolescentia mollissimi germinis nodo duræ constrictionis angatur. Aliqui infra terram semipedali spatio effossæ viti surculos inferunt, & beneficio congestionis accumulæ, ut hoc quoque novis sarmentis præter nutritis alimenta subueniant. Nonnulli circa terras melius asserunt inferendum, quia in altiori difficilius comprehendunt. Usque ad Idus, vel æquinoctium vites locis frigidis pangendæ sunt, seu passinato, seu sulco, seu scrobibus, more, quo dictum est.

Hoc mense novella vinea incipit pulverari, quod nunc ac deinceps per omnes Calendas usque ad Octobres faciendum est, non solum propter herbas, sed ne tenera adhuc semina, solidata terra constingat. Graminum radices, quæ plurimum vitibus nocent, extirpandæ sunt. Nunc locis frigidis vinearum fossio celebranda est: & palandæ, atque ligandæ sunt vites: sed novellam mollibus vinculis alligemus, quia eam teneram vincula duriora præcidunt. Palus maioribus vitibus solidus, minoribus ponatur exilis: propter umbræ molestiam statuatur ab Aquilone, & plaga frigida, spatio quatuor digitorum, vel semipedis, motus à Vite, ut possit ex omni parte circumfodi.

Vineas veteres nunc aliqui è terra altius truncant, studentes reparationi, sed vitiosum est. Nam plerumque vastior plaga Sole putrescit, & roribus: quare hoc genere reparatur. Prius oblaqueabitur altius, donec eius nodus appareat: deinde infra terram supra nodum recidatur, ut operata, de frigore & Sole nil timeat. Hoc faciendum est, si optimi generis vitis sit, & altè posita, Omnia supra dicta locis calidis primo mense, frigidis vero, post Idus ipsius exequemur.

Agros vites, vel quibus fructus arescit, circumfodiet, & vinam veterem suffundes. Item cinerem sarmenti, vel querci aceto mixtum subice, aut incisas circa terram lætamine resoueto, & quæ germinant, fortiora dimitte.

Cum Vitis bidente læditur aut ferro, plagam si terra iuncta est, adline stercore ouillo, vel caprino: tunc terra mista circumfossa ligare curato: si in radice læsa est, operiens liquidum lætamen admisce.

Mais mense consideremus novellæ vitis sarmenta, quæ protulit, & ei pauca & solida relinquamus, & adminiculis firmemus, donec brachia prolata durecant. Non enim amplius refectæ, & pullulanti viticulæ, quàm dux vel tres materiæ relinquuntur, & alligentur propter injuriam venti. Ideo autem tres materias dixi debere dimitti, ne dissipantibus ventis nulla remaneat, si in primordio reliqueris pauciores. Hoc mense pampinari conveniet: sed tunc est opportuna pampinatio, cum teneri rami digitis stringentibus crepabunt sine difficultate carpentis: hæc res Vuas efficit pinguioræ, & maturitati consilii Solis admissu.

Hoc mense Vites quæ ablaqueatæ fuerant occare, hoc est, operire iam convenit. Augusto maritimis locis vindemix apparatus vrgetur. Locis verd frigidissimis occasio vinearum fit. Hoc etiam tempore, si terra exilis in vinea est, & vinea ipsa inferior, tres, vel quatuor lupini modios in iugero spargis, atque ita occabis.

Quod ubi fruticaverit, emeritur, & optimum sterus præbet in vineis, quia lætamen propter vini vitium non convenit inferre vinetis.

Nunc locis frigidis pampinatur, locis verd feruentibus, ac siccis obumbratur potius Vua, ne vi Solis arescat: si aut vineæ brevitæ aut facultas operarum permittit. Hoc etiam mense extirpare possumus, carectæ, atque filicetæ.

Septembri locis tepidis maritimisque celebranda vindemia est, frigidis apparanda. Sed maturitatem vindemix cognoscimus hoc genere. Si expressa vua, vinacea quæ in acinis celantur sint sulca & nonnulla propemodum nigra, quam rem naturalis maturitas facit. Vuas quas servare volumus, legamus illas, neque acerbitate rigidas, neque maturitate defluentes, sed quibus est & granum luce penetrabili, splendidum, & tactus cum molli iucunditate callosus. Si quæ sunt corrupta, vel vitiosa resecemus, nec patiamur interesse, quibus inexpugnabilis acerbitas contra blandimenta æstivi caloris induruit. Tunc incisos botryonum tenaces calida pice oportet ambiri, atque ita in loco sicco, frigido, & obscuro sine luminis irruptione suspendi. Vitis cuius fructus humore putrescit, per latera pampinanda est, ante trigessimum vindemix diem, & sola frons illa servanda est, quæ in summitate posita Solem nimium defendit à vertice. Octobri ubi calidi, ac sicci ænis qualitas est, ubi exilis, & aridus est campus, ubi collis præruptus, aut macer, vites utilissimè ponuntur, de quibus satis mense Februario disputavi. Nunc locis siccis, calidis, exilibus, macris, arenosis, aridis, quæcunque de pastinis, de vitibus ponendis, putandis, propagandis, reparandis, vel arbusculo faciundo, antè dicta sunt, rectius fiunt ut contra exilitatem glebæ hybernis imbribus adiuvantur. Sic & humorem sitientibus conferunt, & recisa, vel mersa glacie non adurunt, quia talibus locis pruinarum vis, & natura nescitur.

Post Idus Octobris ablaqueanda est omnis novella vinea, seu in passino, seu in scrobibus, aut sulcis, ut amputentur radices superuacuas, quas produxit æstate, quæ si conualuerint, inferiores radices faciunt interire, & ita remanebit vitis in summitate suspensa, quæ res eam frigori obnoxiam faciet & calori. Sed hæc radiculæ non ad succum debent recidi, ne aut plures inde nascantur, aut nova plaga corpori vitis impressa, vel securi algoris utatur. Recidemus autem relicto digiti spatio. Et si placida ibi hyems est, apertas relinquemus vites, si perfrigida, aliquantulum columbini stercoreis sub ipsa hyeme circa viticularum vestigia largiemur, quod contra frigus nimium Columella dicit toto faciendum esse quinquennio. Hoc tempore idcirco locis quibus dixi, propagatio melior est, quia firmandis radicibus vitis incumbit, cum proferendi palmites eam cura non permouet. Græci iubent si Vuam nimius imber insuderit, postea quàm mustum eius primo ardore sernebit, ut ad alia vascula transferatur. Ita propter naturæ gravitatem remanens aqua subidet, & translatum vinum purè servabitur, relicto quicquid se illi ex imbri miscuerat.

Novembri toto mense locis calidis, & siccis, vel apricis, erit vitium celebranda positio. Nunc & propago iure dicetur, & locis frigidis novellas vites, & arborum plantas circumfodere, atque operire conveniet, & ante Idus. Nunc mergis,

Extirpationis
adventum
tempus

Maturitas
vitis
cognoscenda

Ablaqueandi
vineæ
novellæ

HISTORIAE PLANTARVM.

hoc est propaginis curuatura post triennium, quam pressa fuerat, recidetur à vite.

Nunc ac deinceps vinea verus, quæ in iugo est vel pergula, si robusto & integro trunco sit, ablataque a fimo satietur, & angustius putata inter quartum, & tertium pedem à terra viridissima parte corticis, acuto ferramenti mucrone feriatur, ac fossa frequentius incutitur. Nam (sicut asserunt Columella ex eo loco germen plerumque producit, & veniente Vere fundit materiam qua vitis reparatur antiqua. Nunc putatio Antumnalis celebratur in vitibus, maximè ubi inuitamur tepore prouinciar.

Remedium vitium sine fuge luxuriantium

Locis calidis, & apricis vitæ quæ fructu carent, fronde luxuriant & pauperiem sætuum compensant vbertate foliorum: nunc putare pressius conueniet: frigidis verdè mense Februario. Si permanebit hoc vitium, circum fossas arena fluuiali, vel cinere debemus aggerare. Quidam lapides inserunt inter flexuosa radicum.

Remedium steriles vitæ

Isdem temporibus, & locis vitem quæ sterilis, fuerit Græci ita præcipiunt esse curandam. Trunco eius fisso lapidem asserunt includendum, & ibi vitæ veteris humanæ quatuor cotulas circa truncum debere suffundi, vt ad radices instillaria ipsa descendat. Tunc adiicienda est terra admixta lxtamini, & circa radices solum omne vertendū.

Vi vitæ quæ in Ger in vitæ re feruanda

Græcis asserentibus, vt Vuam serues in vite vique ad Veris initia, circa ipsam vitem, quæ fructu plena est, loco vmbroso scrobem fodies trium pedum latitudine, altitudine duorum, & mittis sabulonem, & ibi calamos figis, in quibus retorques assidue sarmenta fructibus plena, & illis boryonibus alligabis, vt solum non contingant, & cooperies, vt imber eò penetrare non possit: Item Græcis docentibus Vuas in vite, aut poma in arbore si diu seruare volueris, vasculis clausa fistilibus ab ima parte pestulis diligenter à summo tecta suspende, quamuis poma & gypso cooperta in longam seruentur ætatem. *Et hæc sunt Palladii verba formalia.*

Vindemia quæ infertenda. Græci Misella quæ nigra

Vuâ tandem maturâ vindemiam ita fieri oportet, vt videas à quo genere Vuarum, & à quo loco vineti incipias legere: nam & præcox, & missella, quam vocant nigram, multò antè coquitur, vnde prior legenda, & quæ pars arbuti, ac vineæ magis aprica prius debet descendere de vite. In vindemiam diligentius Vua non solum legitur ad bibendum, sed eligitur ad edendum. Itaque lectius desertur in forum vinarium, vnde in dohum inane veniat, electa in secretam corbulam, vnde in ollulas addatur, & in dolia plena vinaceorum contrudatur: alia, quæ in piscinam seu Amphoram picatam descendat: alia, quæ in aram, vt in carnarium ascendat. Quæ calcatræ vix erunt, earum scopi cum folliculis subiiciendi sub prælo, vt si quid reliqui habeant musti, exprimatur in eundem lacum. Cum desit sub prælo fluere quidam circumcidunt extrema, & rursus premunt, & rursus, cum expressum, circumcisum appellant, ac seorsum, quod expressum est, seruant, quod respicit ferrum: expressi acinorum folliculi in dolia coniciuntur, eoque aqua additur, ea vocatur lora, quod lora acina, ac pro vino operariis datur Hyeme.

Curatio sum.

Lora

Vires vitis viniferæ. Capiti de

Vuarum conseruandarum & recondendarum meminit Cato de re rustica, & Phnius cuius verba ante recitauimus.

Vitis viniferæ folia cum clausulis (sanc, capreoli) trita & imposita, capitis dolores mitigant, itemque stomachi inflammationem & ar-

dorem cum polenta. Idipsum etiam folia per se imposita præstant: quippe quæ refrigerandi adstringendique viam habeant. Potus eorundem succus iuuat dysentericos, sanguinem excreantes, stomachicos, ac mulieres malaciâ laborantes. Eadem efficiunt macerati in aqua capreoli & poti. Lachryma vitium, quæ veluti gummi est, quæque circa illarum caudices concreuit, ex vino pota, calculos pellit: inuncta lichenas, pforas, leprasque nuro affricto preparatas sanat. Eadem cum oleo lapidis pilis illitis psyllothi effectum habet, maximèque liquor quem accensa sarmenta vitium viridia exudarunt, quo & perunctæ myrmecæ tolluntur. Cinis autem sarmentorum & vinaceorum detrahit circa sedem condylomatis & thymis illitus ex aceto medetur. Prodest & luxatis ac viperarum moribus: quin & contra lienis inflammationes proficit, cum rosaceo, Ruta, & aceto impositus.

Stomachi ardar.

dysenteria Malacia

Calculi Lichen.

Pfora.

Lepra.

Psyllothi.

Thymor.

Luxata.

Suppur.

morbus.

DE OMPHACIO.

Omphacium, succus acerbz atque nondum maturæ Vux, Sole desatus ac resiccatus, potest ex cuiusvis vitis cruda ac immatura Vua confici, licet Diose. ex Thasiæ solum aut Aminæ vitis Vua fieri referat, qui modum etiam resiccandi docet his verbis. Omphacium succus est acerbz Vux, seu Thasiæ, seu Aminæ nondum variatus. Oporteret autem ante Canis ortum expressum succum in ahenò ex ere rubro, quod linteum sit coopertum in solare, vique dum in densitatem coëat, intereaque semper totum id quod ipsi vasi concretum adhæserit liquido reliquo permiscere, atque noctu ipsum à locis subdialibus sub tectum referte: quandoquidem obstant nocturni rores, quominus spissescat cogaturve. Eligendum est flauum, friabile, petquam astringens & linguam mordens. Sunt qui coctione succum condensent. Prodest contra consillas, Vuam oris, vlcera, ginginas humore flaccidas, purulentasque aures, cum melle aut passo: item ad fistulas, vetera vlcera, nomasque ex aceto. Dysentericis & mulieribus fluxione vuluæ laborantibus elystere infunditur Oculotum quoque claudat confert, eorundemque scabrituæ angulique atroliis conuenit. Bibitur & ad recentem sanguinis excretionem etiam ex ruptis vasib; obortam. Sed eo admodum diluto & pauco vtendum: siquidem potenter exurit.

Omphacium.

retributa.

Dysc.

Ammon.

Delib.

Vires.

Vitis.

Flauum.

Omphacium [vt Galenus prodidit simpl. 4.] calidis morbis omnibus magno iuuamento adhiberi potest, quippe cum id omnino acidum sit, perfecte etiam refrigerat, vnicèque ardoribus prodest, siue ori ventris impositum, siue totis hypochondriis, siue cuilibet ali, quod refrigerare velimus, Omphacium quod in æreo vase inatuit, adstringendi ac insigniter resiccandi potentia pollet, particeps est & abstersionis ab æreo vase contractæ.

Purior Galeni.

Recentiores hodie Omphacium appellant, haud aridum Vux immaturæ succum, sed liquidum & consistentia vino similem, ex collectis ante maturitatem Vuis, præloque subditis expressum, qui deinde in vasa reconditus insolat, vel tepenti loco reponitur, vique dum effervescens & sordes quasdam à se abiecerit, & sæculenta resederint, & tunc quidem sale addito (vti acerbum permaneat) in vsum seruator. Galli & Belgæ du verius passim, Latini agrestem: linguæ Ital.

Omphacium liquidum recentiorum.

Nonios.

lingua.

Ital.

Ital. agresto: Hispani *agraz* appellant. Et hoc Omphacium liquidum, siue agresta, refrigerationem, resiccationem & egregie adstringentem facultatem habet, ori ventriculi gratum, nauseam, ac cibi fastidium tollit, appetentiam excitat, alui fluores reprimunt: ardores viscerum mingat, non modò sumptum, sed & foris admotum, sed tamen & iecinori lienibusque obstructis parum utile: sunt qui maiorem Omphacio adstrictionem comparent, & siuestrum vitium visus [imò etiam sili. pyris & pomis] illud exprimentes, non ad medicamenta tantum, sed etiam ad ciborum condimenta.

Vinum omphacites. Omphacio liquido non absimile est Vinum Omphacites, imò reuera specie haudquaquam differens. Hoc Dioscorides refert peculiariter fieri in Lesbos. Vna nondum planè maturà, sed adhuc acerba, ad tres quatuorue dies in cratibus siccata Sole, donec racemi in rugas contrahantur: ex his postquam expressum sit vinum, cadis insolari [Sole inueterari Plinius.] vim habere adstringendo stomacho amicam, & malacia laborantibus, ileosis, agrè concoquentibus & stomachi dissolutione vexatis, utilem. Credi & absorptum pestilentibus affectibus auxiliari. Ceterum huiusmodi vina non nisi post annos complures potui apta sunt.

Quilibet Vva recens aluum turbat, & stomachum inflat: quæ verò decerpta aliquandiu pendit, propterea quòd ea ventilatione magna humiditatis portio decessit, innocentior est, ac tum stomacho utilis est, tum & appetentiam ciborum restituit, atque aded agris languentibusve idonea est. In vinaceis & ollis seruat, ori stomachoque grata sunt: aluum sistunt [sed vesicam & caput tentant] & sanguinem excreantibus conueniunt. Similes porro sunt & quæ in mustum coniectæ fuere. At quæ in sapa aut passo conditæ sunt, stomachum magis infestant. Seruantur & in aqua cœlesti quæ prius Solem passæ fuerint: sed ex parum vinosæ: sunt siticulosis tamen, ardentibus ac diuturnis febribus utiles. Reconditi vinacei, inflammatis, præduri lacteque turgentibus mammis cum sale imponuntur. Eorundem decoctum infusumve dysentericos inuat, & cœliacos, itémque sceminas fluxione vulvæ laborantes, sed & ad deflectiones ac fetus vsurpatur. Ceterum acinorum nuclei adstringendi vim obtinent, stomachoque sunt utiles: iidem costi tritique ac polentæ vice inspersi, dysentericiis prosunt, itémque cœliacis ac stomachi dissolutione vexatis.

Vux [vt Galen. lib. 2. de alim. fac. memoriz prodidit] quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent: ita fugacibus omnibus magis nutriunt: minimumque prauis succi habent, præsertim cum exactam maturitatem fuerint adeptæ: porro quòd ipsæ nutrant, maximo argumento sunt ii qui vinearum fructum custodiunt, quippe qui tunc temporis Vuarum esu admodum pinguescant. Ceterum non omnes vno quidem modo nutriunt, quoniam quæ dulces existunt, cæteris succum habent calidiorum, ob id sunt siticulosæ, ac ventriculum inflant, & aluum subducunt. Contrarium efficiunt austere: siquidem & ventrem cohibent, parum nutriunt, agrèque concoquuntur. Acerbæ autem vitari prorsus debent vitæ quæ ventriculo aduersatur. Vux ed laudabiliores, quæ carnosiores fuerint, præsertim cum probè maturæ à vite decerpuntur. At pensiles, si prius maturæ sint, & dulces, cæteris minùs ventriculum inflant.

Tom. II.

& aluum conuenienter emolliunt.

Capillos demigrare grana Vux assata in testa infusa in oleo, & sepulta in fimo per mensem, si co oleo, vnguantur, testis Bayrus.

Vuarum grana reposita in sacculos qui hiemo calefiant in foraminibus fornacum ac pedalibus noctu apponantur magni facio ad eos non solum calefaciendos, sed etiam ad roborandos, ut minds fluxiones arthriticas recepiant.

VVA PASSA.

VVa passa alba, inquit Diosc. adstringentior est. Prodest esitata earum caro arteriæ, tussis, renibus, ac vesicæ. Estur & cum nucleis per se contra dysenteriam, itemque admista milij ac hordei farina & ouo, in sartagine cum melle trita sumuntur. Sed & eadem ad eliciendam è capite pituitam tum per se, tum etiam cum pipere commanducata proficit. Testium quoque inflammationes sedat imposita cum lomento fabarum & cumini farina. Epinyctidas verò, carbunculos, sagos, putrescentiaque articularum vlcera, atque gangrenas sine nucleis trita & cum ruta illita sanat. Conuenit & podagræ cum panacis succo adhibita: denique & mobiles vngues illita celerius extrahit.

De Vva passa. Gal. 2. de Alim. hæc prodidit: Vux passæ cum aliis Vis eandem habent rationem, quam caricæ cum sicubus. Multæ enim sunt dulces, acerbæ autem omnino pauca: plurimæ verò ex dulci & austera qualitate sunt mistæ: quanquam dulces non nihil quoque austere qualitatis habent: & austere dulcedinis. Ceterum ut dulces temperamento sint calidiores, ita austere frigidiores. Ad hoc austere stomachum roborant, & ventrem constipant, & his multò magis acerbæ: mediam autem quodammodò inter ipsas constitutionem dulces obtinent ut quæ nec aluum subducant. Dulcibus tamen, ut vis quædam semper inest contemperandi, ita & mediocriter detergendi: quibus duabus facultatibus exiguas mordicationes, quæ os ventriculi infestant, obtundunt. Et libro 8. cap. 7. de compos. pharm. sec. locos, idem Galenus sic inquit. Vva passa contemptibilis videri possit, ob familiarem eius usum. At verò hoc ipsa eam facit vtiliorem: nam cum familiaris sit nobis, in tantum adstringens est, quantum opus habet viscus affectum. Habet autem & vim concoctoriam crudorum humorum, & vim coercendi maligna, sique ipsa haud facillè putredini obnoxia: & vitra hæc secundum totam substantiam, visceri ipsi, hoc est iecinori, familiaris, & propria est. Item libro de attenuante victus ratione, sic habet. Vux passæ si non sint adstringentes, lie ni quidem, & hepaticis tumentibus non conducunt, thoracis tamen, & pulmonis affectibus conducunt. De Vis autem passis, ut cibus sunt, locutus est ipse Galenus lib. 2. de alim. fac. his verbis. Alimentum ex passis vis tali qualitate in corpus distribuitur, qualis ipsarum natura fuerit, dulce ex dulcibus, austere ex austere, mistum ex iis, quæ vtriusque qualitatis sunt participes. Quantitate verò copiosius ex pinguibus, ac dulcibus, parcius ex austere, & macris. Quod si passarum pinguium, ac dulcium, à quibus semina fuerint exempta, parum molem, cum pari Vuarum mole contuleris, passas valentius nutrire deprehendes. Huiusmodi sanè, ut minùs quam caricæ subdo-

H

cant, abstergeantque; magis tamen quam illa stomachum iuuant.

Ceterum *Vua passas*, quarum ubique vulgaris & frequens est usus, omnibus notissimas esse arbitror, inquit Matthiolus. Verumtamen non est, meo quidem iudicio, credendum, quod cum de *Vuis passis* mentionem faciunt Galenus, & Veteres alii, paruulas illes tantum intelligant, quæ hoc tempore ex quibusdam Aegæi insulis, ac Peloponneso, Venetias conuehantur, & in quibusdam etiam Italici locis insolantur. Siquidem Galenus nulla magnitudinis, vel paruitatis habitatione, omnes in vniuersum vuas Solis calore siccatas, passas appellat. Id quod ipse Galenus libro secundo de alim. fac. iis verbis declarat. Porro quemadmodum passarum differentia, quæ colore sumitur, nihil ad passarum facultatem confert, ita nec magnitudo: sola autem qualitas, quæ gustui inest, differentia, potest omnia. Ex his nimirum Galeni verbis satis colligi potest, ipsum omnis generis Vuas, quæ Solis seruore siccantur, nullo prorsus discrimine passas appellasse, nempe Damascenas ceteris grandiores [Zibibum officinæ vocant] ac pariter his congeneres, quæ à Smyrnis (ut aiunt) Cypro, & Creta comportantur. Præterea loco citato idem Galenus ita scribit: Nonnulli autem, & rectè sanè, è dulcibus, grandibusque, quales sunt Scybeliudes, priusquam mandant, semina eximunt: quæ & ipsa inueteratz, cutim duram, crassamque habent, easque prius in aqua coguntur macerare: nam & semen ipsum facilius sic eximitur. Aliæ quædam sunt his contrariæ, solidæ, & crassæ, quæ nullum prorsus semen habent. Crescunt hæ in Cilicia, colore subflauo. In Pamphylia autem Scybeliudæ, & colore nigra: quæ, ut dixi, sunt maximæ, hæc ille. Ceterum sciendum est, non omnes Vuas passas eiusdem esse facultatis: alia namque facultas inest dulcibus, alia austeris, alia vinaceos habentibus, alia non habentibus. Quæ itaque vinaceis carent, vel quod ita naturâ producantur, vel quod ii arte fuerint exempti, si dulces sint, adstringente facultate usque ad eod priuantur, ut etiam mirificè leniant: quàmobrem pectoris angustia, tussis, exasperatis faucibus, & renum, vesicæque vitis maximè conueniant. Id quod planè confirmat Galenus lib. 7. & 8. de comp. medic. sec. loc. ubi Vuas passas sine vinaceis leniendo pectori, ac iecinorosis plurimum commendat. Contrà verò, facultate omnino adstringente censeantur, quæ cum suis vinaceis manduntur. Quod cum non ignoraret Dioscorides, Vuam passam cum nucleis in dysenteria edendam esse tradidit. Hinc itaque fit, ut maximo in errore versari existimem Medicos alioqui ætatis nostræ celebres, qui alui deiciendæ gratia, Vuam passam paruam vulgarem, quæ ex locis supra dictis in Italiam deferretur, simul cum vinaceis deuorandam exhibent, quippe cum aluum fluidum facere in animo sit, eam potius cohibent, quàm leniant: idque potissimum, ubi Vuæ passæ temporis tractu succi partem amiserint. Quâ re perspectâ in hanc sententiam deducor, ut ad aluum emolliendam aptiores censeam Damascenas, Cyprias, ac Creticas [quibus tamen prius nuclei exempti sint, vel exsumantur, quæ sine nucleis nascuntur] quàm quæ minutæ passim in Officinis inueniuntur, quandoquidem hæ succi longè minores, quàm corticis, & vinaceorum continent, nisi sint omnino recentes, & diligenter asseruatæ. Quapropter si hoc tenui Vuarum passarum genere uti quandoque cogimur ad emolliendam aluum, eas eligi

præstat, quæ sine vinaceis producantur: vel si illæ defint: suppleant illæ, quæ à nucleis merint expurgatæ, tametsi Damascenis, & Creticis longè bonitate cedant: de quibus sanè intellexisse Galenum, easque ad pectoris vitia laudasse, planè suspicamur. In quorum genere hæc etiam temperate sunt, quæ semine carent, quemadmodum quæ Galeni ætate ex Cilicia conuehebantur. Illud porro animaduertendum est, quod ubi quis alium bonum facere contendit, non debet passum uti, quæ gustui acerbiterem, vel austeritatem relinquant: sunt enim tales frigidæ, ac terrestres, quibus utique facultatibus cohibent, adstringunt, & roborant, præsertim si cum vinaceis nucleis comedantur.

Vuarum passarum sciendarum rationem hanc tradit Columella. Vuas, inquit, dulcissimi saporis albas maximis acinis, nec spissis, Luna crescente: sereno, & sicco celo post horam quintam legi oportet: & in tabulas paulisper porrigi, ne inter se pondere suo pressæ collidantur: deinde abeno, vel in olla noua fictili ampla, præparatam lixiuiam cineris sarmenti calefieri contingat, quæ cum seruebit exiguum olei quàm optimi addici, & ita permisceri: deinde Vuas pro magnitudine binas vel ternas inter se colligatas in altum seruens demitti, & exiguum pati, dum decolorentur, nec rursus committere, ut excoquantur, nam quadam moderatione temperamentoque opus est. Cum deinde exemeris, in crate disposito rariis quàm ut altera alteram contingat. Post tres deinde horas vnamquamque Vuam conuerito, nec in eodem vestigio reposito, ne in humore, qui defluerit, corrumpantur: noctibus autem contegi debent quædammodum fici, ut à rore, vel pluuia tutæ sint: cum deinde modicè aruerint, in vasa noua sine pice operculata & gypsata, sicco loco reposito. Quidam Vuam passam foliis ficulneis inuoluunt, & afficentis alii foliis vitigineis, nonnulli plataninis femineatas Vuas contegunt, & ita in amphoras recondunt. Sunt qui culmos fabæ exurant, & ex eo, quod cremauerint, cinere, lixiuiam faciunt: deinde in lixiuiæ sextarios decem salis tres cyathos, & olei cyathum adiciunt: tum adhibito igne calefaciant, & cetera eodem modo administrent. Quod si videbitur in abeno parum inesse olei, subinde quantum satis erit adiiciatur, quod sit pinguior & nitidior Vuæ passæ.

Vuam autem passam præceptore Palladio, sic facies. Meliores acini, & dulcis, & lucidi botryones in ipsa umbra suspendis, & Vuam constictam cum ponis in vasculis subternis pampinos sicco algore frigentes, & manu comptimis, & ubi vas impleueris, item pampinos addis nihilominus non calentes, & operculabis, ac statues in loco frigido, quem nullus fumus infestet.

Montepessulani Vuam dumparant, recentes bittos hinc illinc filo ligatos vitiosis acinis fortiter detractis, seruenti lixiuiæ addito olei paulatim immergunt, quoad flacciscant tantum & contrahantur: deinde periculis imponunt, ut siccificent, ac post triduum quatrimumue insolant, ut & Columella docet.

Passas Græci vocant *παραβύθια*, quasi conculcatas, non quidem quod conculcentur, sed quod ob resuscitationem calcatis similes videantur.

MUSTUM.

Genera multa
in Plinio.

Genera musti hæc recenset Plinius lib. 14. c. 19. Cissibiles musti genus in Galatia nascens, & Halyncium in Sicilia. Medium inter dulcia vinumque est quod Græci Agleuces vocant, hoc est, semper multum. Id evenit cura, quoniam feruere prohibetur. Et lib. 27. c. 1. Musta differentias habent naturales has, quod sunt candida, aut nigra, aut inter verumque: aliæque ex quibus passum: cura differentias innumera biles facit. In plenum ergo hæc dixisse conveniat.

Nomina:
Linguarum.

Mustum, liquor videlicet recens ab vite calcatis, aut torculari subditis fluens. Græci *μῆλον*, *σῆλον*, *ταρταρον*, & *σῆλον* Epigram. Al. *Most*, *weinmost*. Belg. *Most*. Gall. *Mouff*. It. *Musto*. Hisp. *Mosto*.

Mustum laxum.

Mustum laxum Colum. protropium Plin. quod in lacum fluxit priusquam pressum sit. *μῆλον* *πρὸς τὸν ποταμὸν* Peducet, *μῆλον* *πρὸς τὸν ποταμὸν* Al. *Vorschußwein*, *trunßwein*. Belg. *Leeds weyn*, *most ban self gheleeds*. Gall. *La mere gupere*. It. *Vino mosto de giocota*, Hisp. *Mosto d vino del rinrin*.

Mustum tortum.

Mustum tortum Colum. quod post primam pressuram vinaceorum exprimitur, Al. *wein bem nachdruck*. B. *Most laese wurgpress*. Gall. *Vin on taint de pressurage*. Ital. *Mosto dultimo torchio*. Hisp. *Vino de mosto torcido*, *equo sale del biffu*.

Mustum Cr. tota durat anno.

Mustum si voles totum annum habere, M. Catone tradente, in amphoram mustum indito, & corpicem oppicato, demittito in piscinam, post trigessimum diem eximito, totum annum multum erit.

Mustum ut dulce permanens.

Mustum ut semper dulce, tanquam recens permaneat sic facito, inquit Columella, antequam pressum vinacea subiiciantur, de lacu quam recentissimum addito mustum in amphoram novam, eamque oblinito, & impicato diligenter, ne quicquam aquæ introire possit: tunc in piscinam frigida & dulcis aquæ totam amphoram mergito, ita ne qua pars extet: deinde post dies 40. eximito, sic usque in annum dulce permanebit.

Musti virtus & usus.

Mustum recens flatu ventriculum & intestina implet: difficile concoquitur: crassi est succi: & nisi celeriter descendat, nocentius etiam efficitur. Hoc autem vnum illi tantummodo bonum, ut Galenus ait, adest, quod ventrem deiciat. Cistissime autem secedit dulcissimum, ac ex maturis Vitis expressum. Quod verò ab acidis & austerris redditum, ad omnia pessimum est: magis inflat, difficilius concoquitur, crudiores ingenerat humores. Et tamen alio perturbata etiam descendat, colicos tamen sæpenuerò simul ingenerat humores, & calculi molestias adfert. Quod si verò aliud etiam non commoveatur, grauiora ac molestiora omnia sunt: frequenter verò & lienteriam & dysenteriam efficit: tale succo Vuarum respondet, & citò quoque descendit. Posterius vinaceorum, folliculorum, ac scaporum naturæ particeps, deterius est. Mustum omne, autore Plinio, stomacho inutile, venis iucundum, A balneis raptum & sine interpiratione potum, necat. Cantharidum naturæ aduersatur. Item serpentibus, maximè hæmorrhoidi & salamandræ. Capitis dolores facit, & gutturi inutile. Prodest renibus, iocinori, & interaneis vesicæ: colleuat enim ea. Priuatim contra supprellin valet: Contra meconium, lactis coagulationem, cicutam,

Tom. II.

toxicæ, dorycenium, ex oleo potum, redduntque vomitionibus. Ad omnia infirmus album, iucundius passum mustum, & quod minorem capitis dolorem afferat: Si quid animal, ait Columella, in mustum ceciderit, & interierit, uti serpens, aut mus, soréque, ne mali odoris vinum faciat, ita ut repertum corpus fuerit id igne aduratur, cinisque eius in vas, in quod deciderat, nigridus infundatur, atque rutabulo ligneo permisceatur, ea res erit remedio.

SAPA SIVE HEPSEMA.

Ex musto ingenii non naturæ operâ conficitur quod Græci *σάπῃ* vocant, Latini Sapa & defrutum: cui n. videlicet multum dulcissimi saporis ad tertias decoquitur, ut Columella ait. Plinius Sapa & Defrutum decoctionis modum describere attulit: & Sapa quidem fieri multo ad tertiam partem reducto: defrutum ad dimidiam. Sirxum, inquit lib. 14. cap. 9. quod alii *σάπῃ*, nostri Sapa appellant, ingenii non naturæ opus, multo ad tertiam partem merfuræ decocto: quod ubi factum ad dimidium, defrutum vocamus. Palladius his Caroenum adiicit quod ait fieri cum tertia perdita, duæ partes remanserint. Leontius in Geoponicis hepsema ex musti partibus octo, & vini centum, ad tertias decoctis conficiendum refert. Galenus tamen *σάπῃ* esse mustum plurimum decoctum testatur. Recentiores hepsema sine sapa, vinum coctum appellant. Mustum quamdulcissimi saporis decoquatur ad tertias, & decoctum, sicut supra dixi, Defrutum vocatur: quod cum defrutum, transfertur in vase, & reponitur: ut post annum sit in usu, inquit Columella, qui in huius coquendi ratione multus ac prolixus est.

Vim habet Sapa calfaciendi, non tamen æquè ut vinum, hoc autem crassior est, minus facile distribuitur, tardiusque per vrinas descendit, per ventrem verò libunde citius, nam hunc modicè seducit. Nutrit autem valenter, & corpus citò implet, in ventriculo tamen propter crassitatem aliquantisper hæret, ac iocinori aut heni minus idonea: concoquit etiam sapa crudos humores, pectori ac pulmone inhaerentes, eorumque citat expurgationem procurat. Tussi idcirco ac respirandi difficultati auxiliatur. Gal. lib. 3. de med. sec. loca, Sapa aurium etiam dolores leniri tradit. Refert autem non parum, ex cuiusmodi multo sapa confecta fuerit. Nam ex optimi ac generosi vini musto procul dubio præstior est, atque ad omnia superscripta efficacior: ex tenuis verò ac oligophori vini multo, imbecillior & minus efficax. Catennum Sapa Marcell. appellat, vulgò *Vincis*, ac defrutum *Refine*. Plinius Sapa in adulterium mellis excogitatam ait.

Confecta
sapa.

Viri
Virus.

Alimentum.

Tussis.

DE DEUTERIIS ET SECUNDARIIS.
vini generibus tribus.

Non possunt, inquit Plinius lib. 14. cap. 10. iure dici vina, quæ Græci Deuteria appellant, Cato & nos lotam, maceratis aqua vinaceis: sed tamen inter Vina operaria numerantur. Triecorum genera. [Leg. Decimæ parti musti quod expressum sit, pari aquæ addita, & ita nocte &c. Dulce Colum. & Diosc.] Decima parte aquæ addita, quæ musti expressa sit, & ita nocte ac die madefactis vinaceis, rursusque pressum subiectis.

Deuteria
vina generis
ra.

Primum.

Secundum.

H 2

Farium

Alterum, quomodo Græci facitavere, tertia parte eius quod expressum sit, addita aqua, expressoque decocto ad tertias partes. Tertium est, facibus vini expressum, quod sextarium Cato appellat. Nulli ex his plus, quam anno, usus.

Prioris Lore compositionem Columella etiam docet, ex tanta nempe aqua qualitate, quanta est musti expressa decima, vinaceis superfusa, sed adici ait præterea spumam defructi siue sapæ: & facem ex lacu confundito, & permisceto, eamque tritam macerari vna nocte finito, postero die pedibus proculcato, & sic permiscam pralo subdito: quod deinde fluxerit aut dolis aut amphoris condito, & cum defructu erit, obturato. Commodius autem feruatur in amphoris. Hanc ipsam loram M. Columella ex aqua vetere faciebat, & nonnunquam plus biennio innoxiam seruabat.

Loram se
faciat Dio-
scoridesDeuteria
PuriorTempus
Vires
Fini subfi-
niamCompositio
Lora diffe-
rentia duplex
Qual.Prid. Rem-
phylis Gu-
do de la.
Altera, deu-
teria Atro-
corum.
Vinum ady-
namonTertia lora
compositio

Dioscorides similem aqua ad mustum, modum ac proportionem retinet, sed à vinaceis loram expressam ad tertias recoquit, additque ad singulas metretas, talis sextarios duos, & huiusmodi Loram non modo *Aurum*, sed & *vinum* nuncupari refert his verbis. Lora, quam Græci Deuterian, alii potimon appellant, paratur hunc in modum. In vinacea, à quibus vini triginta metretæ expressæ fuerint, tres aquæ metretas adicio: ac ubi vinacea ipsa versaueris calcaverisque, exprimito: expressum decoque ad tertias partes, & in singulos residui congios salis binos sextarios addito, ac post hyemem in cados defundito. Eo post annum vitor: celeriter enim exolefcit. Conuenit porro agris, quibus vinum propinare dubitamus, & cogimur tamen ipsorum desiderijs obtemperare: itémq; à longa valetudine sese recolligentibus.

Galenus verò 2. de alim. facul. multò differentes huiusmodi Lore compositiones, & quidem duas habet: Vinaceis, inquit, in parua doli coniectis, tantum aquæ superfunditur, quoad omnia permeadeant, quod ubi satis visum factum fuerit, in doli fundo foramen aperitur, ut dilutum effluat, idque pro vino bibunt. Deinde purus, ait, aliam aquam, parciorem tamen prioris, vinaceis affundunt: sic ut hoc quoque portioni sit attemperatum: Priorem *symplocum* appellari refert, ab ipsis nempe vinaceis, quæ Græcis *symplocum*: Alteram verò *Atticæ* proprietatis curiosos propriè *Aurum* dici velle.

Secundam Plinii Loram Dioscorides quoque videtur descripsisse, sed tamen non tertiam ad mustum aquæ, uti Plinius, partem accipit, sed musti & aquæ æquales: fit & vinum, ait is, quod vocant adynamon, vinibus iisdem quibus Lora præditum. Pares aquæ & musti mensuræ leniter ac lento igne feruefunt, dum excoquatur aqua, reliquum ubi refrigerit, in vas picatum transfunditur. Aliæ aquæ marinæ & pluuiæ, mellis atque musti pares miscentur portiones, elutriant, & in Sole quadraginta diebus torrent. Huiusmodi portio ad eadem illa omnia post annum vtuntur.

Tertiam verò Lore compositionem, Dionysius Vticensis in Geoponicis Constantino Imperatori dicatis haud absimilem habet: *symplocum*, inquit, hoc est, *symplocum*, post musti de fluxum mox efficienda sunt, & in doli reponenda ac conculcanda. Etiam *symplocum*, id est, *symplocum*, ex his, quam patriæ

lingua *symplocum* vocant, haud iniunctos se ruraltibus potus. Confectur autem hæc lora, ex vinaceis pralo antè non subiectis, sed à quibus mustum tantummodo, citra pressuram defluxit ac percolatum est. Quid enim ab ipsis exprimi ulterius poterit citra liquoris affusionem, ubi semel pralo subditæ fuerint.

Vini genera.

Nunc genera vini prosequamur, quorum alia *Vini genera Plinio.* Nalis grauiora esse quis dubitet, inquit Plinius lib. 14. c. 6. aut non ex eodem lacu aliud præstantius altero germanitatem præcedere, siue testa [natura] siue sortuito euentu [arte]. Quamobrem de principatu se quisque iudicem statuat. Iulia Augusta, octoginta duos annos *Vini generis Plinio.* vixit *Pizzino de Istria* vino retulit acceptos, pro alio vlt. Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul à Timaño fonte, saxeo colle, maritimo afflatu paucis coquente amphoras. Nec aliud aptius medicamentis iudicatur. Hoc esse crediderim, quod Græci celebrantes uiridis laudibus *Pizzino de Istria* pyctanon appellauerunt, ex Adriatico sinu. *Græcorum.* Diuus Augustus Serinum [Seria oppidum in colle, à Tarracina paludibus quinque millia diffusum: hodie Sezza] prætulit cunctis, & seræ seculi principes, confecta propter experimenta, non temere crudelitibus noxiis [in ea salubra] ab ea salina. Nasctur supra forum Apii. Antea *Serinum.* Cæcubo erat generositas celeberrima in palustribus populeis, sive Amyclano: quod iam intercidit & incuria coloni locique angustia, magis tamen fossa Neronis, quam à Baiano lacu *Augus.* Oliziam vsque nauigabilem inchoauerat. Secunda nobilitas, Falerno agro erat, & ex eo maxime *Cæcubo.* Faustiano. Cura culturaque id collegerat, exolefcit quoque hoc, copiar potius, quam bonitatis, studentium. Falernus ager à ponte Campaniæ uia petentibus urbanam coloniam Syllanæ nuper Capuæ contributam incipit. Faustianus autem circiter quatuor miliaria à viço propè Cordias, qui vicus à Signessa 6. millibus abest. Nec vlli in vino maior autoritas: solo vinorum flamma accenditur. Tria eius genera austerum, dulce: *Faustiani tria genera.* tenue. Quidam ita distinguunt, summis collibus *Gauranum* [Gauranum ch.] gigni, mediis *Faustianum*, imis *Falernum*. Non omittendum autem nulli eorum, quæ celeberrime, iucundum saporem Vix esse. Ad tertiam palmam variè venere Albana ubi vicina, prædulcia [iucunda] subdulce esse, non prædulce. Athenæus lib. 1. ex *Albana.* Faleno asserit, ac rara in Austero. Item Surrentina in vineis tantum nascentia: conuulsiuibus maxime probata, propter tenuitatem libritatemque. Tiberius Cæsar dicebat consensisse medicos, ut nobilitatem Surrentino daret, alioquin esse generosum acrum. C. Cæsar, qui successit illi, nobilem vappam, Cæsaræ *Surrentina.* Mafica, *Mafica.*

[nec vergetis, rosula Mafica]

Horat.]

æquæ, ex monte Gaurano [Gaurano ch. in eand. Gaurano] piteolos Baiasque protectantia. Nam Falerno contermina Statana ad principatus venere non dubitè: palamque scere sua quibusque terris tempora esse sicut rerum proventus, occasusque. Iuncta his præponi solebant Calena, & quæ in vineis arbutisq; nascuntur, Fundana. Ex (ut) alia vicina vrbis Veluterna, Priuernatiquæ. Nam quod Signia nascitur, austeritate ni-

Vini genera Plinio.

Vini generis Plinio.

Pizzino de Istria

Græcorum.

Serinum.

Augus.

Cæcubo.

Faustiani tria genera.

Gauranum ch.

Albana.

Surrentina.

Mafica.

Statana.

Calena, Fundana, Veluterna, Priuernatiquæ.

in continentia vtile alio, inter medicamina numeratur. Quartum [auctoritatis & nobilitatis gradum. Sumpta metaphora ab aurigis, qui curru in Circo certabant:] curriculum publicis epulis obtinere à Diuo Iulio [is enim primus auctoritatem his tribuit, ut in epistolis (epulis) eius apparet] Mamertina, circa Messanam in Sicilia genita. Ex iis Potulana, ab autore dicta, in loco proximo Italix laudantur præcipuè. Est in eadem Sicilia & Taurominitanis honos, lagenis pro Mamertino plerumque subditis. Ex reliquis autem à superno mari Prætutia, atque Anconæ nascentia, & quæ à palma vna fortè enata, Palmesia, appellantur. In mediterraneo verò Cefenatia ac Mecconatiana [A Mecconate, Augusti familiari & fido amico, regio sanguine orto, quod Horatius palam facit.] In Veronensi item Rhætica, Falernis tantum posthabita à Virgilio

2. Georg. — & quo te carmine dicam

Rhætica? (Admirantis hoc esse Plinius existimat: Seneca verò incerti laudaturusne, an vituperaturus sit. Turn. cap. 16. lib. 29. Magis placet Plinii

expositio: Nam & ipse ea hauriens egregiè mirabatur terrenæ & conuallium sanguinis bonitatem.) Mox ab intimo sinu maris, Adriana. Ab infesto autem Latiniensia, Grauficana, Statoniensia. Hetrurix palmam Luna habet, Liguriæ Genua: Inter pyrenæum Alpelque Massilia gemino sapore, quando & condiendis aliis pinguius, [Nigrius & crassius] gignit, quod vocant succosum. Beterrarum (Bliteratum Dal.) intra Gallias consistit auctoritas. De reliquis in Narbonensi

genius asseuerare non est: quoniam officinam eius rei fecere tingentes fumo [vinum id Plato Comicus apud Athenæum *αἰθρῆν* vocat: Martialis fumos Massilitanos] utinamque non & herbis ac medicaminibus noxiis. Quippe etiam aloën mercantur, quæ saporem coloremque adulterant. Verùm & longinquiora Italix ab Ausonio mari, non carent gloria, Tarentina, & Seruutiana, & Consentia genita, & Tempia ac Babia (Balbia. Hermolani Diosc. Balbina vina eadem esse putat, quæ Athenæus Barbarina vocat.) Lucanaque antecedentibus Thurinis. Omnium verò eorum maximè illustrata Messalæ potu & salute Lagatina, non procul Grumento nascentia. Campania nuper excitauit nouis nominibus auctoritatem, siue cura, siue casu, ad quartum à Neapoli lapidem Trebellici, iuxta Capuam

Caulinis, & in suo agro Trebulanis [Itolorum vulgò Trebiano] alioqui semper inter plebeia & Trifolnis gloriata. Nam Pompeianis summum 10. annorum incrementum est, nihil lenectâ conferente. Dolore etiam capitum in sextam horam diei sequentis infesta deprehenduntur. Quibus exemplis, nisi fallor, manifestum est, patriam terramque referre, non Vuam: & superuacuum generum consecrationem in numerum, cum eadem vitis aliud aliis in locis polleat. His præbatur Lalerana (Lusitana M. Lalerana CH.) copia nobilitatur, elegantia verò Tarraconensia, atque Lauronensia, & Balearica ex insulis, conferuntur Italix primis. Nec ignoro, multa prætermissa plerisque existimatos, quando suum cuique placet, & quocumque eatur, fabula eadem reperitur: Diui Augusti iudiciorum ac palati peritissimum è libertis, censuram vini in epulas eius facientem, dixisse hospiti de indigena vino, nouum quidem sibi gustum esse eum, atque non ex nobilibus, sed Cæsarem non aliud poturum. Nec negauerim Scythia digna esse fama:

Tom. II.

sed de quibus consensus tui iudicauerint, hæc sunt.

Et eiusdem l. c. 7. Nunc simili modo transmarina dicemus: in summa gloria post Homerica illa, quæ diximus, fuisse Thasium Chiumque. Ex Chio quod Aruifium vocant (ab agro aspero & importuoso insulæ Chii: Strabo 14. Verg. *Vina, nonum fundâ calathis Aruifia nectâr*: quamuis aliqui legant Arethusia.) His addidit Lesbium Erasistrati maximi Medici auctoritas, circiter de. annum vrbis Romæ. Nunc gratia ante omnia est Clazomenio, postquam *parcis* mari condunt. Lesbium sponte naturæ lux mare sapit. Nec Tmoliti per se gratia, ut vino: sed cuius dulcia admisto, reliquorum duritia suauitatem accipiat, simul & ætatem quoniam vetustiora protinus videntur. Ab his dignatio Sicyonio, Cyprio, Telmesico, Tripolitico, Beryno, Tyrio, Sebennytico. In Ægypto hoc nascitur tribus generibus vuarum ibi nobile, Thasia, æthalo, peuce [Æthalo, quasi fuliginosa: Peuce quasi picea.] Post hæc auctoritas hippodamantio, mylico, cantharitz. (A cantharorum dolis. De cantharea vite Theophr. c. 20. lib. 2. de Causis) protropo Gnidio, Catacecaumenitz (quasi retortido, *αἰθρῆν* *αὐτῶν* regio 500. stad. longitudinis 400. latitudinis Myciæ vicina exultat similis, vino generoso celebris, de qua Strabo lib. 13. & 14.) peintz, Myconio. Nam melogiten capitis dolores facere compertum est: nec Ephesium salubre esse, quoniam mari & defruto conditur. Apamenum mulso præcipuè conuenire dicitur, sicut prætutium in Italia. Est enim & hæc proprietates generum, ut dulcia vique inter se non congruant. Exoleuit & Protagion, quod Italicis proximum fecerant Asclepiadis scholæ. Apollodoros Medicus in volumine, quo suavitatem ignotis, laudauit in Ponto Naspercenten, mox Oroeticum, Oeneaten, Leucadium, Ambracloten & quod cunctis, prætulit Præparentum: [Præparentium Turn. & nobis] sed minoris famæ esse dixit, quoniam post sex annos non placeret.

Et eiusdem lib. c. 14. Vinum omne dulce minus odoratum: quod tenuius, eò odoratius. Est vini genus quod vocat dulce Narbonensis provincia & in ea maximè Vocontii. Asseueratur eius gratia Vua diutius in vite, pediculo intorto. Ab aliis ipse palmes inciditur in medullam, ab aliis vua torretur in tegulis: omnia ex Heluenaca vite. His adiungunt aliqui, quod vocant diachyton, Vuis in Sole siccatis loco clauso per dies septem, in cratibus, totidem pedes à terra altè, noctibus à rore defensis, octauo die calcatis. Ita fieri optimi odori, saponisque.

Sunt & in vino prodigia, id perhibente Theophrasto, Athenæo & Plinio. Dicitur enim in Attica fieri quod fecunditatem [sterilitatem] Theophr. *ἀττικὸν ποτὶ* *σέμινος* importet, vitis rabiem. At in Achaia maximè circa Caryniam [Charmiam CH. Cabyniam Theophr. Ceryniam Athenæo. Addidit Theophrastus, canibus, si Vuas gustauerint, etiam caculos elidi.] abigi partum vino, atque etiam si Vuam edant gravidæ, cum differentia in gustatu non sit. Trezenium vinum qui bibunt, negantur generare. Thasios duo genera vini diuersa facere proditur: vuam quo somnus concilietur, alterum verò quo fugetur. Apud eisdem vitis theriace vocatur, cuius & vinum & Vua contra serpentium & medetur. Libanios thuri odorè, ex qua Diis

Lesbium

Clazomenium.
Tmolium
Sicyonium
Cyprium
Telmesicum
Tripolitico
Beryno
Tyrio
Sebennytico
Ægypto
Thasia
Æthalo
Peuce
Mylico
Cantharitz
Ephesium
Apamenum
Protagion
Naspercenten
Oroeticum
Oeneaten
Leucadium
Ambracloten
Præparentum

Ephesium

Apamenum

Protagion

Naspercenten
Oroeticum
Oeneaten

Vina dulcia
Diachyton

Vina prodigia
Atticum

Trezenium
Thasium
duplex

Theriacum

Libanum

HISTORIAE PLANTARVM.

Aspendium
Vnde dicitur.

prohibant. E diuerso Aspendios [Quidam sic di-
ctam interpretantur ab Aspendo vrbe Pamphy-
lia. Lego Aspendos, vel Aspendios, à particula
priuationis Græca & verbo *σπίνδω* libare, vt Vua
lit, cuius vino Diis libare nefas est.] damnata aris.
Ferunt eam nec ab alite vlla attingi, Thasiam V-
uam Egyptus vocat apud se prædulcem, quæ
soluit alium. Est contra in Lycia, quæ solutam
firmat. Egyptus & Echolada habet, abortus fa-
cientem. Vna in apothecis Canis ortu mutan-
tur quædam, posteaque restituntur sibi. Sic &
mari navigato cuius iactatus his quæ durauerint
tantum vetustatis adicere sentitur, quantum ha-
buerint.

Lycium
Egyptum.
Echoladum.

Setinum
De artibus.

Vini Setini, quod Plinius D. Augustum cun-
ctis præferre scripsit, recordatur etiam Martia-
lis.

Pendula Pontinos qua spectat Setia campos
Exigua vetulus misit ab vrbe tados.

Idem

Setinum dominaque nives, densique clientres:
Quando ego te medico non prohibente bibam.

Iuuenali.

— & lasso Setinum ardebit in auro

Iuuenali.
Cæcubum.
Galenus
de dictis.

Vicinum & Setiæ oppidum Signia, vino Signino
clarum.

Galenus porrò lib. 7. secund. loc. in. Arteria-
corum expositione Cæcubum vinum à loco di-
ctum minimè putat, sed ita vocatum fuisse quod-
uis vetustissimum, & ob vetustatem solum
πρῶτον, quod etiam 12. Meth. rursus confirmat, &
lib. 1. de Antidotis.

Trifolium
Delect.

Trifolina verò uina quorum supra meminit
Plinius, illa sunt, vt notat Dalechampius, quæ ter-
tio foliorum exortu, nempe tertio anno adhi-
bendum tempestiua forent: vulgò, *vin de trois
feuilles*. Martial.

Non sum de primo facor Trifolina Lyco.

Iuxta illud Est, est, est. Propter est, est, est, Domi-
nus meus mortuus est. Transmarina vt vocat
Plinius, Plautus in Pœnulo hæc memorat.

Vbi Leucadio, Lesbio, Thasio, Coe,

Vetustate vino edentulo acatem irriges.

Vini nomi-
na in gene-
re.

Vuarum succus defæcatus, iamque purus niti-
dusque apparens absoluta scilicet seruesactione,
sordibusque residens. Græcè *οἶνος* dicitur,
Al. Wein. B. Wyn. Gall. Vin. It. & Hisp. Vno: &
quidem propriè, Nam alii quidam succi ac li-
quores, vt malorum Punicorum, Coto neorum,
Pyrorum, Mespilorum, Sorborumue, vel qui ali-
unde veluti ex hordeo ac frugibus consunt,
haudquaquam simpliciter, sed addito no-
mine eius ex quo conficiuntur vna dicun-
tur. Ita vinum Rhœites ex Punicorum malorum
acinis expressum: Cydonites ex malis Cotonis:
Apytes ex pyris: *οἶνος κελύκος* siue vinum hor-
deaceum, quod & Zythum, ex hordeo composi-
tum. Cognomina tamen & alia quædam, & qui-
dem à stirpibus in iis maceratis vna accepere,
quæ ex vite tamen vna sunt: vt Absynthites,
Myrsinites, Hyssopites: factitia autem hæc di-
cuntur.

Vinum sim-
pliciter.

Propriè verò ac simpliciter vinum appellatur,
quod ex vitis uis expressum est, ac nullius alte-
rius mixturam admittit. Vinum merum, meracum
Cicer. purum, purum: *ἀκρατος* *ἀμικτός*, *ἐν ὕδωρ*
μῖδω. Eurip. Al. Lauter vnd vnghemengter Wein.
B. Louter pure suyuere / ein ongemende wyn.
Gall. Vin pur, clair, point mixtionné, Ital. Vno sber-
to, puro. Hisp. Vno puro y sin aqua.

Vinum di-
lutum

Vinum dilutum, lymphatum, *ὕδατος*. Al. Ges
wasserter Wein / vermischter Wein / mit der

wasserstangen geschlagen / Gbewatete Wyn.
Gal. Vin trempé, Ital. vino con aqua, acqua. Hisp. vi-
no agüado.

Villum Terent. *σινδένος*. Al. Weinle. B. Wynfen/
Heine oft schlechte Wyn. Gal. vinot, vinet, petre vin.
It. vinaccio.

Vinum generosum, nobile Horat. *ἀπαρτος*. Al.
Heblicher Wein. B. Schacher Wyn / Gall. vin deli-
cat & friant, Ital. vino delicato & piacevole, H. vino
delicado.

Vinum ge-
nerosum

Vinum ignobile, cibarium Varroni *καὶ ὅλος οἶνος*. Vinum
Al. ringher Wein / tisch Wein / B. Schlechte Wyns
tisch Wyn, Gal. vin ordinaire, ou de table, It. vino pi-
ciolo, de tavola, ordinario, Hisp. vino ordinario y de
mesa.

Vinum consistens, ferens statem, firmum Plin. & Virg.
ἀνέκτος, *πρόμνητος*, *οἶνος*, *ἰσχυρὸς* *ἐγ-
μῶν* *ἐμπιδιος*. Al. Bestendiger Wein. B. Dur-
achtige Wyn. Gall. vin durable. Ital. vino di lun-
ga dura. H. vino que se puede detener.

Vinum con-
sistens

Vinum fugiens Cic. exolefcens, dubium, in vi-
tium inclinans, ætatem non ferens, *ἐξολέσκων*,
πρόμνητος, Al. Wein der abfalt, ombfalt / absteht. B.
Abgends Wyn / ende die niet dūeren en mach /
Gall. Vin alteré, & point durable, Ital. vin corrotto, che
se guasta, che non può durare, Hisp. vino que no se
puede detener meno.

Vinum fu-
giens.

Vinum acescens, vappa Horat. marcidum
Statio, *ἐξήκτος*, *καρτερίας*, *ἐξολέσκων*, quod odorem, sa-
poremque genuinum exuit. Al. verrochner
vnde verdorbnen Wein. Boh. verschaelde / süere /
verdornen Wyn. Gall. vin pousse & corrompu. Ital.
vino suauito & guasto. Hisp. vino reborado, desua-
necido.

Vinum a-
cescens.

Vinum pendulum, quod lentescit. Al. Zager
Wein. Belg. Laughe Wyn. Gall. vin relant. Ital. dulum,
vino che fila. Hisp. vino liento, lo que bila.

Vinum pen-
dulum

Vinum [hornum, hornotinum, *οἶνος* *αὐτῆς*.
Al. Heuriger / oder lauriger Wein. Belg.
Farighe Wein / oft Wyn von diesem Jahre. Gall. vin
de ceste année, ou vin d'une année, Ital. vino di que-
sto anno, vino d'un anno. Hisp. vino de un año, d
que esta cogido este año.

Vinum hor-
num.

Vinum bimum Horatio, *διπλὸς οἶνος*. Al.
Zweyarige Wein. Bel. Tzweyarige Wyn. Gall.
vin de deux feuilles, Ital. vino di duos anni. Hisp.
vino de dos annos.

Vinum bi-
mum.

Vinum annosum, edentulum Plaut. vetustum:
πολυπὴς οἶνος. Al. Alter Wein. Belg. Oude Wyn.
Gall. vin viel. Ital. vino vecchio. Hisp. vino viejo.

Vinum an-
nosum sine
edentulum.

Vinum atrum Plauto, rubeum. Al. Dicker ro-
ter Wein. Belg. Roode Wyn, Wyn tint / Wyn van
Alicanten. Gal. teinture. Ital. vino rosso d uogro.
Hisp. vino tinto.

Vinum
heluolum

Vinum heluolum Colum. & Cat. Medium in-
ter album & rufum, *κρῖς οἶνος*, Galeno etiam
ἔαρδης, quod tamen vir doctus annotat esse rubei
coloris, sed erroris non vacuus, hoc est, rufum
pallens. Al. Schiller oder Schillerer Wein. Belg.
pilget, vel pillet, voce à Gallica decortà, quæ est
pillet, Wyn claret. Gall. vin clairer. Ital. chiarello.
Hisp. vino claro.

Vinum fragrans odoratum, flos Libeti Plauto
& Ennio, *ἀνδομας*, *ἐν ὕδωρ*, *καρτερίας*. Al. wol rie-
chende Wein. Boh. Wyn von goeden rüecker / wels
riechende Wyn. Gall. vin de bonne odeur, sentant
bon. Ital. vino de buon odore. Hisp. vino che ole,
chando de si odor.

Vinum
fragrans

Vinum aromatites Plin. *ἀρωματισμένος οἶνος*, *δύσος*
Herodoto, velut aromatica potio. Al. ge-
nurger Wein / hippocras / oder claret. Belg.
Hippocras / claret Wyn. Gall. hippocras.

Vinum
aromatites

Vinum

Vinum sac- Vinum sacrum Plin. *αμύριον* Poll. *αμύριον* Eu-
catum pol. Al. durch ein sack abgeziegener wein/ hip-
 pocras. Belg. door eenen sack gedaen oft ghe-
 gotin wyn.

Vini latic. Vinum igne eliquatum, vini latex. Al. brants-
 wein. Belg. Ghebrande wein. Gall. *eau de vie*,
eau ardenne. Ital. *acqua vita*, *acqua di vita*. Hisp. *a-*
gua ardente.

Vinum Vinum patrum, vinum indigena Plin. *ιδιαιτης*
αμύριον Hipp. *αμύριον* Athenzo. Al. & Belg. Landt-
 wein. Gall. *vin du pays*. Ital. *vino della patria*. H.
vinu di su tierra.

Vinum Vinum honorarium Cic. *μενέριον* *αμύριον*
 Hom. Al. Schenck wein/ verehrung wein/ Belg.
 Präsentarie wein/ stadepotten wyn. Gall. *vin*
d'honneur. Ital. *vinu da presentar*, *di far presente*. H.
vinu di honra, *y que se da*, quale principibus aut ex-
 teris Legatis offerri solet honoris ergo.

Vinum Vinum praezum Virg. Præliganeum Catoni,
 siue quod prae omnibus legitur & vindemiatur,
 siue quod in vsum familiae operatumque ex vuis
 ante instam maturitatem collectis sit. Al. Ser-
 erst wein im herbst. B. d'erstie wyn, vroech wyn.
 voertwyn/ *G. Vin premier vendangé*. It. *Vino dell'apri-*
ma vendemia. It. *Vino de la primera vendemia*.

Vinum Vinum operatum Plin. quod operatis expri-
 mitur. Al. Botten oder knechten wein, B. Dranch
 voor de botten eun verleden/ *G. Vin de ma-*
nouvriers ou de famille. It. *Vino di famiglia*. It.
Vino de obteros.

Vinum Vinum tortium, *βοτρυχίου* *αμύριον*. Al. Press-
 wein. B. Derffe oft gheperste wyn. *G. de pressurage*.
 H. *vinu de musto torcido*.

Vinum Vinum factum Varr. in dolia conditum, nec
 turbulentum amplius: doliare vinum Vlpiano,
 nouum necdum veteranum, ac proinde vilius. Al.
 süßr wein/ ghefaster wein. B. Doeder wyn, ges-
 vatte wein. *G. vin paré*.

Vinum Vinum molle Virgil. *λενε*. *αμύριον* *αμύριον* Plu-
 tarch. Al. Milder wein. B. Milde mondeltide oft
 Lieflyde wein. *G. vin saoureux & aimable*. It. *vin*
gustofo, saposo, di buon gusto.

Vinum Vinum asperum, *αμύριον*. Al. Barter wein/ der
 ranch/ onlieblich vnd hard ist. B. Straffe oft har-
 de wyn. *G. vin rude degouteux*.

Vinum Vinum mucidum Mart. Al. Ronachtiger/ nuchte-
 lender Wein/ wein der nach dem faß schmachet.
 Boh. Baenachstige. Riemachtige/ oft waetsche
 eun na t'uat schmackende wyn. *G. vin chané, moi-*
si. It. *vinu moffo*. H. *vinu muhoso*.

Vinum Vinum sacco castrate Plin. sacco frangere, sa-
 cellare Nebrissenis ponit, vini vites emedul-
 late *αμύριον* Plutarch. *αμύριον* *αμύριον* Eidem. Al.
 wein durch ein sack abziehen/ auf daß ihm die
 steerte vergehe. B. wein lecken.

Vinum Vinum elutriare Plinio. Vinum de vase in vas
 transferre, quod & tranuafare minus vñtate di-
 citur. *μεταχέειν* *αμύριον* *αμύριον* Poll.
 Al. Wien ablassen oder abziehen. B. Wyn verlas-
 sen van de monder treden. *G. Filater du vin*. It.
Tramutare il vino d'un vaso all'altro. Hisp. *Tras-*
gar vino.

Vinum Vinum atrum & asperum [austerioris gustus
 Plin.] Crucium vocat Festus, Gallam Lucilius: De
 hoc vino Plinii austerioris gustus, ut etiam de vi-
 no Rhetico & Allobrogico, aliisque pluribus, vi-
 denda plura antè de vitibus.

Vinum Commendantur hodie vinum Creticum, siue
 Maluaticum, Virgilio, Aruifium dictum, teste
 Hadr. Iunio, Chium & Monembasites *αμύριον* A-
 then. *αμύριον* *αμύριον* *αμύριον*. Al. Maluafey. Boh.
 Mallegic. *G. malnoisie*. Ital. *vinu maluatico, malua-*
 Tom. II.

Vina & marisla. Est autem Aruifium, unde nomen
 habet vinum, promontorium in insula Chio,
 vulgè dictum Maluasia, vel Maruifia. Belgii, in-
 quit Dodonæus, & præsertim Zelandix œnopo-
 la ex sapa & vino vñisque Hispaniensibus cer-
 ta proportionem permixtis vinum componunt
 miscellaneum, quod pro Cretico, vulgè Malua-
 tico nuncupato, substituunt ac venum expo-
 nunt. Alii accipiunt Galangæ, Caryophyllorum,
 Zingiberis, Macis ana drach. i. puluerem confi-
 cientes grossum, quem macerant spiritu vini in
 an vase ligneo bene obturato per 24. horas. Qui-
 bus peractis in sacculo vino per tres dies impo-
 nunt, ac ita vinum Maluaticum mentiuntur. Aut
 accipiunt mustum feruensatum cum quo triti-
 cum ad consumptionem tertiæ partis despuman-
 do decoquunt, colant, vasis imponunt. Hic sub-
 iungeremus rationem componendi vini Malua-
 tici artificialis ex aqua & melle, nisi passim apud
 Authores eius descriptio occurreret.

Vinum Apianum [vide antè, apud Plin. vi-
 tem apianam] siue Moscatellinum, Falernum, *αμύριον*
αμύριον Athenzo vocatum, Germ. Moscateller.
 Belg. Moscatelle wyn. Gall. *vin moscatel*, Ital. *vinu*
moscatello, *moscatella*. De vino Phalerno scribit
 Gal. ad Pison. dicens, Vinum autem illud sit opti-
 mum, quale Falernum, quod Faustianum ap-
 pellant. Idem de Antidot. lib. i. cap. 3. Eligenda
 sunt in conficiendis antidotis vina suapte natu-
 ra, inter quæ Falernum non hac re solum excellit,
 verum & omnibus aliis dotibus antistat, eligen-
 dumque ex Falerno id quod nondum est vetu-
 state amarum, ut aliqui faciunt, hac in re ab iis
 qui theriacam rectè conficiunt, aberrantes:
 Cum enim audierint, id quod semper ab omni-
 bus solet dici, senescere cætera temporis diutur-
 nitate præter vina, summè vetustum vinum ad-
 miscent.

Vinum moscatellinum ita adulterabis. Colli-
 ge flores Sambuci, abiectis petiolis in aëre exsic-
 ca, in dolum, dum mustum feruere incipit, sac-
 culum iis plenum suspendito, ac bis in die, quam-
 diu feruet mustum, sacculum in dolum expri-
 mito, tandemque flores abiectis, & sic saporem
 & odorem vini muscatellini conficito. Aut reci-
 pe Glycyrrhizæ Polypodii, Anisi ana Drach. ii.
 Nucis myrticæ Drach. iii. pulueriza grosso mo-
 do, & in vinum immittito: Aut musto feruenti
 Ocimum siccatum, aut Gallitricum sativum im-
 ponito. Muscatellinum rubrum conficies hoc
 modo: Collige flores Sambuci nondum planè
 explicatos, horum recipe vñc. iiii. Cinnamomi
 Drach. ii. coq. cum musto rubro.

Vina Maluatica, Muscatellina; Corsica, & alia
 ex Græcia, Hispania, Italia, & Languedoc nobis
 sunt valdè pernitiola in communi potu, licet o-
 prima ad cruditates ventriculi, ad colicum dolo-
 rem, & alios morbos à causa frigida: ac licet vina
 peregrina ex calidis regionibus aduecta videan-
 tur gustui grata, non temerè ea bibendam nò
 solum nocent qualitatibus manifestis, sed etiam
 aliis occultis, antipathia quadam nobis com-
 tratis, quia regiones nostræ diuersæ: cum tamen
 sint familiaria & amica per sympathiam incolis,
 vbi illa crescent.

Vina Gallica enumerat Nicol. Abrah. à Fram-
 boisier in regimine sanitatis. Vina Francica, in-
 quit, quæ circa Lutetiam proueniunt, & in tota
 Franciæ insula, maxima ex parte alba & rubella,
 calida & sicca primo gradu aut principio sec. oli-
 gophora: vbi benè matura, grati saporis, studio-
 sis apta, vrbium incolis, qui tranquilla & seden-

HISTORIAE PLANTARVM

aria vita vtuntur : vaporibus acerbis non re-
plent caput vt Aureliaca , interna non vrunt vt
Gasconica, Hispanica, & aliarum regionum val-
de calidarum : non replent corpus stercoreis ex-
crementis, vt vina cruda & acerba : non coacer-
uant humores melancholicos qui parunt ob-
structiones, vt vina crassa & nigra. Inter omnia
Franciae vina praestantissima existimantur vina ex
Consi : idem dicata & reseruata Regio potui: plz-
rumque sunt rubra aut rubella generosa, consi-
stentia mediocri, grati saporis & potui iucunda:
optima summe imbecillibus a Venere, & iis qui
magnam passi euacuationem. Inter Campaniae
vina primum obtinent locum bonitatis & per-
fectionis quae in Aproueniunt: rubella, subti-
lia, delicata, palatui admodum grata, ad Rubum
Idzum accedentia, expetita Magnatibus: prouo-
cant tamen defluxiones & caput laedunt iis qui
raram corporis texturam habent, bibenda ante
dies caniculares, postea enim minuitur eorum
bonitas. Inter vina Burgundica primum locum
obtinent Beaunensia, consistentia mediocri, co-
loris oculorum perdicum, saporis grati: generosa,
minus vaporosa Aurelianensibus, vnde vul-
gate prouerbum,

Vinum Belnense super omnia recense.

Vina Aureliana magnifunt in Francia ob gene-
rositatem & bonitatem: plzrumque rubra sunt,
mediocri substantia, boni saporis, ad Rubi Idzi
sapore accedentis, generosa, ventriculo com-
moda: magis calfaciunt & nutiunt quam Fran-
cica: verum prae ceteris caput grauant & cere-
brum laedunt: nocua sunt obnoxiiis Hemis craniz
& defluxionibus, & iis quibus viscera calida & sicca:
meliora sunt sec. anno. Diu conseruantur vina ex
Anjou. Vina ex Bar-sur-Aube, accedunt proxi-
me colore, sapore, & bonitate ad vina ex Anjou.
Vina Gasconica licet calidiora & sicciora vinis
Aurelianis, nihilominus non sunt ita vaporosa,
nec ita cito offendunt caput, vt experientia co-
gnoui, quia crassiora, nec ita subtilia.

De vino languente, vapescente, aspero, turbido, a-
cescente &c. vt & de vinorum adulteriis peculiaris
instruetur tractatio. Omne autem vinum vt plu-
rimum acescit, & in vappam transit circa Pleia-
dum occasum, & circa Solstitium hybernum, aut
efflorescente iam Vite, & circa Solstitium estiuu
& sub Caniculae aestum, & in summa circa om-
nes accessiones & frigoris & caloris, aut largo-
rum imbrium. Idem contingit & propter vio-
lentos ventos, aut vehemens tonitru, aut etiam
iuxta tempus quo Rosz florent, aut a fulgure
violento. Plura qui volet, videat Constantinum
Mizaldum, & Colerum.

De vini natura & facultate.

*Ante Sini
varias na-
turam.
Vina Getu-
sa, sensu
instrumenta
salutant.*

*Vina in-
flant.
Vina.
Acetate me-
dium, opri-
mum.
Coler
album.
Nigrum.*

Vini naturam pro aetatis ratione differre ne-
mo sanus dubitat. Vina vetusta nervos reliqua-
que sensuum instrumenta, laedunt, attamen gu-
stu suauiore, iucundioraque sunt: quare vitanda
iis qui internae alicuius partis imbecillitatem sen-
tiunt. Nihilominus in secunda valetudine vi-
num eiusmodi paucum & aqua dilutum innoxie
sumitur. At nouum inflationes parit, aere coqui-
tur, graula facit insomnia, vinasque dicit. Quod
vero aetate medium est, utroque illo vitio caret,
proindeque ad vsum sanorum, aegrorumque de-
ligendum. Insuper album [variat enim vinum
pro ratione coloris] est tenue ac stomacho v-
tile, facileque in membra diuiditur. Nigrum ve-

ro crassum est, & ad concoquendum difficile,
temulentiam facit & corpus auget. Fuluum
vtpote quod medium est, medias etiam inter v-
trunque vires obtinet. Album tamen tum in se-
cunda, tum & in aduersa valetudine laudabilis.
Sed & vina sapore distant.

Sapor enim atque quae vino admiscuntur, ea
differre faciunt. Siquidem dulce crassis parti-
bus constat & aere de corpore expirat, stoma-
chum inflat, aluum & intestina, vt & mustum,
turbat: sed minus inebriat, vesicæ ac renibus a-
ptum. Austerum vinas magis expellit, sed capi-
tis dolorem facit, ac temulentiam gignit. Acer-
bum ad ciborum per membra digestionem ac-
commodatissimum: aluum ceteraque fluxio-
nes cohibet. At vinum molle & sapore langui-
dum nervos minus tentat, minusque vinas pel-
lit. Passum & hepsima nigra quidem si fuerint,
crassa sunt & corpora multum alunt: at candida,
tenuiora: quae vero medio inter hæc colore sunt,
medias quoque vires sortuntur. Omnia tamen
astringunt, languidos pulsus excitant, & faciunt
aduersus venena quaecunque exulcerando ne-
cant, ex oleo pota & vomitionibus reddita, i-
temque contra meconium, pharicum, toxicum,
cicutam, & lactis in ventriculo coagulationem:
necnon & contra renum ac vesicæ rosiones &
exulcerationes: nihilominus inflationes pariunt,
& stomacho aduersantur. Priuatim confert Me-
lampsitium iis qui alui fluxione laborant. Al-
bum magis ceteris emollit aluum. Gypso condi-
tum nervos offendit, capitis gravitatem infert,
vilcera calore accendit, & vesicæ aduersatur: sed
contra venena ceteris aptius. Picata aut resinata
excalfaciunt, & concoctionem adiuuant, langui-
nem excreantibus inimica. Quae vero aparachy-
ta, hoc est, maris expertia dicuntur, & sapam ta-
men admixtam recipiunt, caput implent, temu-
lentiam gignunt, de corpore difficulter expirant,
& stomachum male habent.

In vniuersum vinum omne meracum & syn-
cerum, ac sua natura austerum excalfacit, facile in
membra distribuitur, stomacho conuenit, appe-
tentiam ciborum inuitat, corpus alit, somnum
conciat, robur auget, & colorem commendat.
Potum liberalius, auxilio est contra assumptam
Cicutam, Coriandrum, Pharicum, Ixiam, Me-
conium, argenti spumam, Taxum, Aconita, Fun-
gusve: nec minus contra serpentium morsus, &
omnium ictus morsusve, quae refrigerando ne-
cant, aut stomachum in vomitiones effundunt.
Facit & ad diurnam hypochondrii inflatio-
nem, rosionem, atque distentionem, itemque
singultum, ac stomachi, intestinorum, & ventris
rheumatismos. Vina conueniunt sudationibus, &
quibus corpus immodico sudore digeritur, ma-
ximè quae sunt alba, vetera, & odorata. At quae
sunt vetusta simul & dulcia, renum ac vesicæ vi-
tiis sunt accommodatiora: nec non vulneribus
inflammationibusque in succida lana commodè
imponuntur. Quin & iisdem feta, phagedæni-
ca, & affluentibus humoribus irrigua vlcera vti-
liter fouentur. Porro vina quibus aqua marinae
nihil additum est, austera, & alba, ad sanorum
victus commodè vsurpantur. In his praestant I-
talica: vt Falernum (quod inter Italica princi-
pem locum obtinet,) Surrentinum, Cerebium,
& permulta alia de Campano agro, itemque Pra-
tutianum, Adrianum & Siculum, quod Mamert-
inum appellatur. Ex Graecis, Chium, Lesbium,
& Phygilitès, quod in Epheso gignitur, Crassa
verò & nigra stomacho aliena sunt, statusque pa-
riunt

hont: attamen corpus augeat: tenuia autem & austeria, stomacho quidem prolunt, sed carnes alunt. At quæ sunt valde vetera, tenuia & candida, vehementius viuas ciunt, & dolores capitis infertunt: nervosumque genus largius pota tentant. In media ætate, vti à septimo anno, potui saluberrima sunt.

*Modus bi-
brere Gnde
desummen-
dus.*

Modus autem pro ætate, anni tempestate, consuetudine, & qualitate vini decernatur. Optumè vero præcipitur, ut ne sius immodica toleretur, & tantum potioris adhibeatur, quantum proliquis cibis sat sit. Siquidem ebrietas omnis, maximèq; ingis, frequentiorque perniciofa. Enimvero largior perpotatio nervos obseffos in dies remittere, morborumque acutorum initia quotidie introducere, consuevit. Attamen moderate aliquot diebus vino indulgere, maximèque post aquæ potum utile. Ita namque modo quodam, quæ sub sensum deinde cadunt rectamenta ex alto euocantur, & per cæca corporis spiracula repurgantur. Sed illi perpotationi aquam superbibere par est: siquidem i medicationis alicuius gratiâ factæ ex composito temulentia, remedium affert. E hæc hætenus de vini natura Dioscorides.

*De vino A-
lexandri-
num.*

Miror, inquit Alexandrinus, fuisse Galeni tempestate inuentos, qui Vinum, ex præstantia quadam potus maximè nomine dignandum, alere quidem dixerint, at alimentum, quod illis *τρεφν* erat, dicendum non esse contenderent, omnia animi peruicacia, & litigandi studio, idque verbo tenus: quoniam rem concederent, verbum negarent. *τρεφν δ' εἶναι, ἀλλ' οὐ δὲ τρεφν αὐτὸν ἐκτρέφει.* Alere & nutrire dicis, & nutrimentum non dicis? Quis hoc vnquam Sophista euincet? Illud potius dicerent, quum non deessent copiosissime dialecto voces, *τρέφω, ἰσχύω, ἰσχυρὰ, τρέφω* vtrumque esse, *δὲν τρέφω*: alterum vero *τρέφω*, & *ισχύω*: alterum *τρέφω*, & *ισχύω*.

Plurima alia, nec illa leuiis momenti, de nobilitate huius vitis Fructus, Vini, inquam, simpliciter sic dicti, Natura, differentia, qualitatibus varus, duratione, conseruatione, adulteratione, temperamento, viti, viribus & noxis, hic, cum ex Veterum tum ex Neotericorum, nostraque ipsamet observatione adicere erat animus: verum ne in inmensam excresecat noster Codex molem, reliqua quæ huius Loci esse possent, in peculiarem referuamus tractatum, breui prælis submitendum, in quo, ni nos spes fallit, Lectori beneuolo abundè satisfieret. Ac sic illis dimissis ad factitia vina, & factitios aliquot ex vino liquores propertanter pergimus.

Vina factitia.

*Vina facti-
tiosa.*

Factitiorum vinorum, aut si qui malunt, factitiorum, tot generum à Dioscoride descriptorum, nec pauciorum à Plinio, traditorum, quædam tantum in præfati adscribemus (cætera enim sibi quisque petere legenda de suo simplici potest: ne actum agendum cotes sit) ea scilicet, quibus apuorem locum adiuuenire haud potuimus. E hæc sunt vinum Melitites, Mulsum, Passum, vina marina siue salsa, & vina quædam dulcia.

Vinum melitites.

*Vires & v-
tes.*

Vinum igitur Melitites, autore Dioscoride, datur in longis febribus, iis qui Stomacho sunt imbecilli: leuiter enim aluum emollit, viuas ciet

ac stomachum expurgat. Prodest & articulatione morbo obnoxiiis, nephriticis & capitis infirmitate laborantibus: utile quoque mulieribus aqua potantibus: siquidem odoratum est: corpora que alit. Differt à mulso, quoniam sit illud è vino austero ac vetere, & melle exiguo: Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri mellis congio, & salis cyatho. Porro in magno vase fieri ipsum oportet, quod locus amplius ad vehementer effervesendum pateat, antedicto sale sensim asperso, quandiu effervuerit: ac vbi feruere desierit, in cados alios transfunditur.

Mulsum.

Mulsum præfertur, quod ex vetere vino austeroque & bono melle factum est. Tale siquidem minus itat, & celeriter in usum venit. Ac vetus quidem corpus alit: quod medix est ætatis, aluo utile est, vrinamque pellit. Sed à summo cibo sumptum, nocet: inter initia vero potum, stomachum implet, deindeque tamen appetendi auiditatem reuocat. Fit mulsum ut plurimum, duabus vini metretis admixta vna mellis. Aliqui quod promptius perfici exhibetque possit, mel cum vino coquunt, atque ita transfundunt. Alii impensa parcentes ad multi feruentis sextarios sex vnum mellis adiciunt, ac vbi ferbuerit, elutriant: dulce autem permanet.

Vina marina siue salsa.

Marina vina variè factitari, auctor est Dioscorides. Aliqui enim protenus videret calcatæque sunt vuz, aquam maris admiscunt: nonnulli prius in cratibus vuz Sole siccant, usque deinde calcatis marinam adiciunt. Alii passas prius vuz in delis aqua marinâ macerant, moxque calcatas exprimunt. Et eiusmodi quidem vinum dulce enadit. Quæ tamen austiore gustu temperantur, etiam in febribus subsidio sunt, siquidem meliora defuerint. Valent & ad aluum subducendam, protineque purulenta excreantibus, usque qui aluo sunt dura, quique facile ex vinorum Aminorum vtu capite tentantur: attamen & huiusmodi vina stomacho aduersantur, flatuque pariunt. Sicim porro facit, nervos infestat, & à valetudine sese recolligentibus haudquaquam idoneum est.

Vini falsi genera septem enumerat Plinius his verbis. Apud Græcos iure clarissimum nomen accepit, quod appellauerunt bion [abion Turner. bizon Vet.] ad plurimos valetudinum vsus excogitatum. Fit autem hoc modo: Vuz paulum ante maturitatem decerptæ, siccantur acri Sole, ter die versatæ per triduum, quarto exprimuntur, deinde cadis Sole inueterantur. Cui marinam aquam largiorem miscunt, à serui furto origine orta, sic mensuram explentis, idque translatum in album mustum leucochrum appellatur. In aliis autem Gentibus simili modo factum te-thalassimenon vocant. Thalassiten autem vasis multi deiectis in mare, quo genere præcox sit vetustas. Necnon apud nos quoque Coum vinum ex Italico faciendi rationem Cato demonstravit, super cætera in Sole quadriennio maturandum [toquendam Vuam] præcipiens. Rhodium Cou simile est, Phormium [Phorineum c. n. fortè, Rhormium, vel Formium] salius Cou. Omnia transmarina septem aut sex annis ad vetustatem mediam peruenire existimantur. Idem *Alibi aut. Factitium non potest videri, quod Bion*

*Febres.
Alum. Vri-
na.
Arthriti-
diphtheri-
Differt à
mulso.
Melitites con-
posuit.*

*Delectum
mulsi.*

Virus.

*Mulsi con-
posuit.*

*Vina mari-
na. Galle
salsa. amara.*

*Vires &
vires.
Febres.
Alum.
Pur.*

Suis.

*Vini falsi
genera se-
ptem Plinius
Bion.
V. Juv.
Compositio.*

*Leucochrum.
Te-thalasse-
menon.
Thalassiter.*

Coum.

*Rhodium
Phorineum.*

Bion Gires.

appellauimus, cum sit in eo sola pro arte festinatio. Prodest stomacho dissoluto, surculos non perficiens, praegnantibus, defectis, paralyticis, tremulis, vertigini, torminibus, ischiadicis. In pestilentia quoque ac peregrinationibus, vinum magnam auxiliandi habere dicitur.

Poleo dicitur

Quoniam, ut testatur Rhod. lib. 26. cap. 8. dicitur, quoddam ad vetustatem accelerandam assuto mari coqueretur. Marinam enim Veteres vinis miscbant, tum ut gratior sapor esset, tum ut celerior & praecocior vetustas contingeret. Maris expertis vinum Gal. 12. Method. 2. 2. 2. vocat. Hermol. in Diosc. a festinatione nomen impositum, quali violenter fiat. Plaut. in Rud.

Aparanthus

Quasi vinis Gracis Neptunus nobis affudit mare.

Itaque alium praeferat nobis salis pectus.

Vini Graci facienda rationem Cato docet.

Vini vero dulcis & Graco similis conficiendi modum Columella tradens sal vino additum id incorruptum seruare.

*Stillatitius ex vino liquor, vulgo
Aqua vita.*

*Aqua Graecae
fina ardens*

Elicitur ex vino liquor quem *Aquam vitam*, & *Aquam ardentem* vulgo appellant, quoddam veluti ex herbis aut aliis stillatitij liquores, eodem ac simili modo e generoso vino extrahatur. per organa videlicet ad hoc comparata, quae Alembica passim appellantur. Est autem eiusmodi liquor colore & consistentia cum ex herbis distillatis aquis, tum & simplici purae aquae, colore similis, sed facultate longe diuersus. *Vita* cognomen accepit, quoddam ad hominis vitam & conseruandam & prorogandam faciat. *Ardens* vero dicitur, quia facile flammam concipit. Cum enim vix aliud sit, quam generosissima ac tenuissima vini pars, cito admodum ignis flammam accenditur ac ardet.

*Aqua Graecae
cur distilla.
Aqua ardens.*

Temperamentum.

Calidissimus hic liquor est, & subtilissimarum ac tenuissimarum partium, tertio ordine calidus ac siccus, & quidem intenso, praesertim quae purior, quod enim purior, hoc & calidior, siccior, ac tenuiorum partium: puriorum efficiunt aliquoties repetita per organum distillationes.

*Vires
Sui.
Color naturae.
Sensus*

Cares

Prodest verò haec ex vino stillatitia aqua omnibus vel per longiorem morbum, vel per aetatem grauiorem refrigeratis, vti senibus ac decrepitis. Calorem naturalem & fouet & auget: vires tuetur, reparat ac intendit: vitam producit, sensus omnes vegetat, memoriā non modò conseruat, verum & redintegrat: vitium acuit: utilis contra lepra ac caro, si febris absit, occupatis, aliisque frigidis cerebri ac capitis malis laborantibus: facit ad cordis debilitatem, tremorem, ac palpitacionem: ventriculum languidum excitat ac excoquit: flatus tum in hoc, tum in hypochondriis, vel etiam in intestinis haerentes discutit: cibi concoctionem promouet, frigidis venenis potenter resistit. Tanta in corroborando corde, ac sensuum organis excitandis huius vis ac potentia est, ut non modò inter exigui cochlearis, vel etiam medii mensura sumpta, verum & foris admodum efficax reperiatur: natis videlicet applicata, vel temporibus, brachiorum item corporis illita. Subinde hoc modo usurpata etiam morientibus atque animam agentibus vitam ad aliquot horas producit, vel etiam restituit: quae purissima ac exquisitissima est. Dentium dolores in ore detenta sopit: lenit & nervosorum partium ex frigido contractos, illita. Sunt qui in quartanis ante accessionem, praesertim post morbi statum exhibere audeant. Exhibenda autem haec aqua

Homo moriens

Dignus

ex vino, cum magno in morbis est indicio ac delectu: cum enim impense calida sit, & partum teruissimarum, ac nec aliud, quam spiritus ipse vini, tenuissime permeat, ac cerebrum facillime perit ac ferit. Apoplexia idcirco occupatis, Comitiali morbo obnoxio, Hemiplegia, Cephalica, aut vertigine ex frigida licet causa laborantibus, non tamen tuto semper dari potest: nisi enim materia mori effectrix omnino sit exigua: & temperamento ipse agrotus, perquam frigidus, contra periculum exhiberi nequit: siquis siquidem humoribus caput amplius impletur, & morbi vis intenditur. Quod si verò & calidi adsint humores, veluti sanguis, inflammationes quoque non parum augentur.

Morbicatus

Nova

Nocet verò haec aqua in morbis naturae se temperamento calidis, humore biliosis. Iocur etiam offendit: rembus quoque haud vultus est, spiritus aut copiosius sumpta.

*Trium hoc
perficiendo
necesse.*

Chimistae quidam vini fortissimi non adulterati lib. xii. ampullae indunt, & per vase refrigeratorium, vulgari modo destillant, usque dum vini efficacia imminuat: tunc amoto vase quod ex capite vinum distillatum vitro amplo recondunt diligentissime, ne quid expiraret, & in aquam calidam ponunt, sinuntque ebullire per dies octo: postea in vapore balnei spiritum vini subtilissimum extillant. In hoc autem opere tria notari debent: primò ne vas in quo vinum digeritur altius aquae calidae imponatur quam vinum appareat: secundò, ut commissurae luto optimè circumlinantur: tertio ut spiritus inter destillandum rectè separentur à vino, caloreque moderato euocentur.

Potè videm Vinum Alcalizatum, ut vocant, parant, dum aquosam materiam ex distillatione vini relictam, exhalare sinunt ad succum feculentum usque: hunc deinde probè excoquant, conteruntque, & igne vehementi in calcem albam redigunt, quam sal vini appellant: Postea spiritus vini duas, salis eius semunciam miscent, induntque ampullae: hanc diligenter oclusam per dies 24. in cineribus sinunt. Mox ex eisdem primò lento, deinde fortissimo igne educunt: postea sal remanens iterum exurunt, conteruntque, & spiritu vini imbuunt, digerunt, euocantque ut prius, atque hunc laborem toties reiterant, donec sal per operculum extillat: sic nobilissimum vini spiritum alcalizatum prouocant, ad rerum colores extrahendos.

Vinum Alkalizatum

Vel Vini rubri valentissimi, ut Hispanici, aut Alatici, aut alterius similis, libras octo pellcano, aut ampullae vitreae satis amplae infunduntur, & vase diligenter obturato, macerantur in fimo equino, vel aqua moderatè calida diebus triginta: tunc oleosus liquor phlegmati innatare videtur: qui igne lento in ampulla frigidiusculè tandiu separatur, donec oleosum illud tenue vel spiritus vini vegetabilis à summitate operculi emanare desierit. Hic postea rursus in aqua calida digeritur per dies viginis quatuor: atque sic è libra vini emergit essentia scrupulus, verum ad vitam producendam praesidium. Ex hoc vini liquore subtilissimo essentia siue tinctura rerum, & aquae vitae parantur, dum stirpium planta & odoramenta, nec non metalla, aliaque terrae fossilia praeparata in illo macerantur, liquantur, extrahuntur, destillanturque. Experientia constare scribit Ringelberg. si vino exusto Linum immergatur concipere quidem flammam posse, sed non aduri.

Sal Gini.

De vini.

De vini.

Superest ut de Fæce Vini pauca dicimus. Hæc crustæ instar concreta vasorum ac cadorum vinariorum lateribus adhærescens, ad eam sicca & solida euadit, ut in puluerem atteri possit.

Tartarum.
Nomina
liagarum.

Hanc officinæ Tartarum appellant, Græci τάρταρος: Germ. Weinstein. Belg. weinstein. Gall. la graise: It. Faccia, Hisp. rasura de Vino. Laudatur verò à Diosc. è vino veteri Italico: sin minus ab aliò consimili. Nostra ætas eam commendat, quæ è vino albo colligitur, & Tartarum vini albi nuncupat.

Delectus.

Vitis huius facis ad multa. Habet enim vim, iuxta Dioscoridem, supra modum vrendi, detergendi, cicatricem inducendi, astringendi, & vehementer exedendi, siccandique. Et hinc ædemata per se & cum Myrto cohibet: ventris stomachique rheumatismos in cataplasmate adhibita sistit: muliebri profluvium abdomini & verendis imposita mitigat: panos nondum exulceratos, itemque tubercula discutit. Turgentes mammas sique lactis impatientes cum aceto peruncta exungit. Abundè ut Ægineta ait, desiccet ac discutiat. Adstrictoria ei subinde facultas ex vini specie, unde colligitur, accedit. Facit ad humiditas corporis affectiones, prodest cachexiæ ac hydro-

Vires &
vires
ex Diogeni.Delectus
Abundantia
vires.

pisi, præsertim Leucophlegmonia laborantibus. Vtilis & Argentariis. Argentum enim hac poliunt ac purificant. Sed & tinctores pannorum ad suos eam convertunt vius.

Vires ex
Ægineta.
Cachexia.
Hydropi.
Argentum
hac politur
Pannorum
tinctur.

Vritur hæc fæx non raro, ut Alcyonium, antè diligenter exsiccata. Sunt qui testæ novæ inditam igni largo cremant, usque dum tota in albescat, & linguam tactu vrere videatur, quod signum legitime ac perfectæ vitionis est. Alii ignitis carbonibus facis glebam obruunt, & similiter faciunt. Sic vltimam Græcis ἐπίσταλην appellari Ægineta ait: Officinis Tartarum vltimam & calcinatum. Vehementer causticam siue vrentem, abstergentem, ad cicatricem perducentem, astringentem, exedentem & valdè resiccantem vim, Dioscoride autore, habet: vngues scabros cum resina eiicit: medicamentis, quæ adurunt, Paulus ait, admiscetur. Utendum eà, inquit Dioscorides, recenti quoniam celeriter evanescit: vltima siquidem vini fæx, citò humida fit, ac in liquorem resolvitur. Idcirco qui ea uti volet, vitreo aut vitreato vase diligenter obstructo, in calido siccoque loco, repositam habeat oportet. Colliquefcit verò hæc & in liquorem resolvitur, si sacculo ex lino alicubi in cella subterranea frigida suspendatur. Lepras, scabies, impetigines, aliasque cutis & faciei lectiones citissime tollit: addita æquali mentura ex rosæ stillantia aqua, & tanto quâto ad linimenti consistentiam satis sit, quo vesperti affectus partes illinendæ sunt. Fit & liquor tartari aliis modis.

Vires ex
fæx.Vires ex
fæx.Delectus.
Repositio.
Oleum tartari.
Vires ex
fæx.

Cinere Vini & siccum vini, teste Trago, exustatum, quidam victum suum curant. Nam cum fæces destillare fuerint, quod reliquum est siccatur, & post in cinerem redigitur, quo ad colores, & ad saponem conficiendum utuntur. Vterque cinis Chirurgicis quoque magno vltimè esse potest, in fædis condylomatibus & thymis.

Cinere Vi-
num & fæ-
ces.

Vires.

Vires ex
fæx.
Vires ex
fæx.

Ex liquoribus, quicunque potus vini vices exhibent, penè omnibus sit acetum, natura & arte. Natura, cum vinum aut ceremisia in loco nimis calido detinentur, vel cum eadè nimis diu reterantur. Arte, cum vinum aut ceremisia co-

quitur, refrigeraturque fermentum, aut panis calidus hordeaceus [qui vnus omnium præualet] aut pisa, aut hordeum tostum imponitur. Alii panem tostum in aceto aliquoties reiteratis vicibus macerant & siccant, vinique aut ceremisie imponunt.

In tempore sic acetum parant aliqui. Sals, piper, fermentum, aut (quod citius & minori sumptu fit) lapides, lateres, aut chalybem candentem in vino extinguunt. Vide hæc de re Colerum lib. 2. suæ Oeconomiz. Si vasa stellaria (uvasia Gal. vocat) aut faui lauentur aqua, eaque decoquantur, fieri saluberrimum acetum, apud Plinium præcipitur. Rondeletio probabile non videtur, acetum ex melle fieri, sed potius ex propoli, quæ acidum oleat. Ast contra experientiam: Fit siquidem ex melle cocto cum aqua.

Acetum, quod secum quilibet deportari valeat, sic efficitur. Accipe tartarum, macera novem aut decem diebus in aceto forti, exsicca in Sole, idque repete secunda aut tertia vice, ad vsum. Si necessitas adsit, pulverisa, in vitrum vini parum impone de pulvere, & habebis acetum.

Dicitur à Græcis ἄξος. German. Essig/ Belg. Azyn/ Edict & Eed: Gall. vinaigre: Ital. Aceto: Hisp. vinagre. Boh. Ocet.

Ceterum acetum, authore Dioscoride, refrigerat & astringit, stomacho est vtile, & appetentiam cibi excitat: erumpentem vndeunque sanguinem potu infessive sistit: prodest alui fluxionibus, cum cibariis coctum, cruentis vulneribus idoneum est, ac inflammationes arceat, in succidis lanis aut spongiis impositum. Reprimat & procidentiam sedis vulvæ, item gingivas abscedentes & sanguine manantes. Est etiam efficacior ad nomas, erysipelas, herpes, lepras, lichentes & pterygia, si cum aliquo convenienti miscetur: phagedænas vlcera, nomasque totum continuo cohibet: podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur: sagillata tollit, cum melle imunctum. Contra capitis ardores, cum rosaceo in succidis velletibus aut spongia imponitur. Ad hydropem, auditum difficilem, auriumque sonitum ac sibilos, feruentis vapor proficit: earundem quoque vermes instillatum necat. Panos coërcet tepidi fotus, aut si imbuta eo spongia admouetur: & pruritus permulcet. Contra venenatorum morsus, quæ refrigerando nocent, calidi fotus prodest: uti frigidi, contra eorum ictus quæ exurens virus eiacularitur. Calidum potum atque vomitionibus redditum, adversus omnia venena, efficacior est, ac præsertim contra haustum meconium cicutamvè, sanguinem in ventriculo conglobatum, lac ibidem coagulatum, fungos, thiam, tæxumque, cum sale. Haustu voratus hirudines, si forficatur, eiicit: tussim veterem mitigat, & retentem lacescit. In Orthopnea, calidum commodè sorbetur. Sed & gutturis fluxiones gargazatum inhibet: anginis & laxæ columellæ convenit: nec non & calidum contra dendum dolorem colluitur. Aceti nequitia inest virtus magnos ad vltimè, inquit Plinius, sine quibus vita tutior degi non possit. Summa ei vis in refrigerando. non tamen minor in discutendo: ita fit ut infusum terræ spumet. Discutum est sapius, diciturque quoties cum aliis proflu Per se haustum fastidia discutit, singultus cohibet, sternutamenta olfactu, &c. Idem alibi aceto facile gummi elui, margaritas resolvi, murenasque gustu eius in rabiem agi scripsit. Metallis viridem colorem induci, si humectentur & aceto salso, innotat Margilbergius.

Acetum
artificiale.Rondeletio
not.Nomina
liagarum.Aceti virtus
ex vltima
Diogeni.
Stomachus
Sanguinis
signatur.Inflammatio
vulvæ.

Erysipelas.

Podagra
Sagillata.

Hydropi.

Pterygia.

Hirudines
Orthopnea.Aceti
virtus.Aceti virtus
Plinius.Fastidia
Margaritæ
resolvi.

HISTORIÆ PLANTARVM

Temper.

penetrat.

Facultates
Aceti variæ

In condimen-
ta
Obsoniorum
Genus.
Intinctus
ex copu-
latione

Embolus

Mors

Acrimonia
eius & re-
pugnancia

Sunt referendi nobis hoc loco, sicuti etiam in aliis fecimus, quicunque tractationem hanc ingrediuntur, præcipui Aceti in Medicina & culina vsus. Frigidum igitur naturâ omnium iudicio Acetum statuitur, longè autem magis siccans: Reuera namque exsiccantissimum. Cæterum in Aceto penetrandi, atque ad profundum se per omnia indendi vis, ambas hæc efficaces magis adiecit, ut his particulæ omnes imbutæ nihil putrefactionis causis obnoxium expositumve relinquant, ipsæ primò ficiore factæ, ne peregrinum humorem facillè excipiant, frigiditate autem cum externum calorem arceant, tum internum inuentum prius inclusumque coerceant. Iam ex calidis Aceti particulis, quamuis non multis, acrimonia sæpe tamen multa, quod acris omnia faciunt, ipsa quoque partem suam excludendis putrefactionis causis conferet, atque hac conditura res non minùs quàm ex sale custodiuntur. Condiendi cibaria, & opsonii præparandi ratio, ubi incidendi dissecandique facultate, potissimùm illi, quæ rerum constitutionis plenæque durities, & humorum crassities tollitur, attenuaturque glutinositas, acrimonia abstergitur, calidæ paulò magis partes frigiditatis potentia ad temperamentum deducuntur, ac si quæ frigidæ insunt, caloricam ex quoque vim sentient temperatiores factæ. Quapropter, quæ multa condire alia non poterunt: Acetum condierit, diuersarum atque etiam contrariarum facultatum viribus pollens. Quibus nominibus in condimenta opsoniorum penè omnia iure meritoque venire potest. Intinctus autem parantur ex eo cuiuscunque generis, modò sinapi, modò oleo, modò saccharo additis, modò odoratum herbarum seminibus, & aut aromate aliquo gratiam intinctibus addente, aut rosarum odore conciliato, maceratione earum. Sæpiùs ipsummet appositum per se dapibus multus Embolus fecit, quarum præsertim glutinosior crassiorque substantia, humorque extenuari postuleat, tum ex quibus timetur bilis, cuius humoris vim reprimere Acetum ætissimè iudicatur.

At idem in temperamento melancholico, affectibusque, peculiariter damnatum, nervis nervosisque partibus inimicum: vtero, intestinis, ventriculo, nisi bilioso, aduersum, mulieribus insuper noxium, & iocinoris virtutes debilitare existimatum: nempe nimio sæpè vsu, & intempestiuo, refrigerato viscere, quemadmodum nervosis quoque partibus qualitatibus eiusdem efficacia, sed & penetrabilitate officere maxime potest, acrimonia non minùs sæpè violentia læsis. Ventriculum quidem, cuiusque præsertim os, quod maior in hoc sensus, ita quandoque vehementer ingruens, afficit, ut manifestò veluti percussione eiusdem læsionem sentiat: os quidem nonnunquam ipsum, linguaque, ac palatum, non satis acrimoniam ferunt: sæpè etiam antequàm admoueat, os, perhorrescunt. Hoc quidem acerrimum facit, quod facillè aqua retundi, aut vino, aut mitioris alterius alicuius succi additione poterit. Saccharo alii, alii passulis, mitigant: sicuti è diuerso, paulò magis satuo ex aromate acrimoniam, pipete præcipue, & gingibere quæruunt.

Acetum porro mulsum, quod Oxymel vocant hoc modo à Dioscoride temperatur. Aceti heminas quinque, salis marini minam vnam, mellis minas decem, & aquæ sextarios quinque, pariter coquit, dum decies effervuerint: mox ubi restiterint, diffundit. Constat porro sumptum crassos

humores extrahere, atque ischiadicis, arthriticis & comitialibus opitulari. Est & auxilio contra morsum viperæ & lacertæ quàm Sepa vocant: itemque contra haustum meconium, iziamue, anginis denique vtiliter gargarizatur. De aceti natura & viribus, plura tract. part. quem de vite eiusque præcipuo fructu breui publici iuris facturi sumus.

Vitis vinifera filu. sine
Labrusca.

Cultivam hæc refert caudicibus, ramis, articulis sarmentis, foliis, claviculis, flosculis & fructu, quem tamen non perficit, sed immaturum, durum, ac austerrum relinquit.

In sarmentolam, ait Lobelius, arboreamque penè sobolem luxuriat, prolixitate anfractuum, unde sterilefcit, aut minores, minusque lapidas & maturas vuas fert, easque raras & perpaucas. Virg. in Bucol.

aspice ut autrum

Sylvestris raris sparsit Labrusca racemis.

Oenanthen à Labrusca separat Dioscorides, Labruscam duum statuens generum. Nos autem Oenanthen non vnius Labruscæ modò florè esse, sed vtriusque asserere non dubitamus cum Matthiolo: cum non aliud Veteribus significet Oenanthe, quàm Vitis florè, id quod ipse Dioscorides in proprio capite manifestè declarat: quippe qui tradat Oenanthen vocari Vitis filu. fructum, cum floret, nullius facta generis distinctione. Quin & idem alibi confirmat, ubi vini Oenanthini meminit, è seracis sylu. Vitis floribus fieri scribens. Ex his itaque abundè constat, non tantum infructiferæ, sed etiam fructiferæ Labruscæ florem Oenanthen vocari. His adde auctoritatem Galeni qui lib. 8. de comp. med. cap. 1. Oenanthen appellat Vitum filu. germen vñ cum floribus, ex quo succedentibus diebus Vua fiat.

Plinius lib. 12. cap. 28. Oenanthen vuam, non florem esse censet, Eodem, inquit, & Oenanthæ pertinet, Vitis Labruscæ vua: colligitur cum flore cum optime olet. Sed in his Plinii verbis rectè suspicatur Matth. mendu fuisse, rectiusque legendum esse cum Dioscoride cum floret, non cum flore. Quomodo enim quis vnquam vuam cum flore collegit? Cæterum ad Vitis silvestris genus pertinere scribit Dodon. quas Plinius Triferas & insanas vocari refert lib. 16. cap. 27.

Ab hac Vite silvestri ea est diuersa, quam Glycypicron, seu Amaram dulcem, postea vocabimus. Differt & ab illa Vite filu. Dalechampi, quam Clematin alteram lausoliam hoc loco inscribimus. Nec est Bryonia, quæ eandem appellationem apud nonnullos cum Oenanthæ sortita est.

Nostra, quam hic tradimus, filu. Vitis Græcis ζυμνὰ & ζυμνὰ, Latinis Vitis spontanea, Oenanthæ, & Labrusca dicitur. Germ. Wild rāben: Belg. Wilde Weinstock: Gall. vigne sauvage. Angl. wild de wine. Fructus eius Græcè ἐράβη, Hebr. Rosar & Reushim, Germ. Bertling trauben dicitur. Illud silentio haud dissimulandum est quod etiam domestica vitis flos Oenanthæ dicitur. Verùm quia silvestris Vitis vi multò magis adstrictior pollet, is per excellentiam Oenanthæ appellatur.

In squalidis agrorum marginibus variis in locis occurrit ac Prouinciæ & Narbonæ maritimis, altas plarumque scandens arbores. Nonnullæ ex hoc genere Iunio mense, ut satua Vitis, florem ostendunt.

Labruscæ folia, caules, & claviculæ, quibus repunt, vim habent cultuæ viti similem.

Ribe,

Vitis & v-
fos
Humores
crassi
Venena:
Angina.

Descriptio

Fructus

Dioscorides

Oenanthe
duplex

Plinius
gatur.

Aequinoct.
Glycypteron
Clematis
altera laus-
olia. Bryo-
nia.

Nomina
linguæ

Locus

Tempus

RIBES VULGARIS ACIDVS

ruber

CAP. II.



Ribes vulgò dictus frutex, multus stolonibus parvis crassis, bicuspidatibus & tricuspidatibus exurgit; cortice spadiceo aut cinereo, matetie infima, virente, cum ampla matrice seti medulla; folia Vva crispae foliis similia, sed multo latiora, sinuata, mollia, supernè virentia, glabra, infernè molli lanugine caescentia, sapore subastringente, acido & nonnihil acerbo; flores racematim coha-

rent plerumque ex pediculo tenui unciali & sesquunciali, aciduli, quinquè foliis pallidè virentibus, oris extorsum reflexis constantes, staminibus sex sessilibus exiguis albis umbilicum medium, qui colore obsoleto est, stilo virenti minuto bifido lacunam aperit ambientibus.

Veretibus, quantum reor, incognita, & silentio involuta, quam plures id esse contendunt, teste Bened. Curt. quod à Mauritanis Ribes dicitur, ut nonnulli etiam recentium Medici, sub hac appellatione illo in Medicina utantur. At ad stipulantibus Fuchsio, Matthiolo, Lugd. & aliis, Ribes Mauritanorum à nostro diversum est: nec enim respondet descriptioni Serapionis, licet Amati & Dodon. id asserant; ejusdemq; Ribes esse credant, vel ob saporem acidum cum quadam permixtum dulcedine. Verba Amati hæc sunt: Post Berberorum fruticem proximum erit citare, Ribes ferentem, quum de illo quoque antiqui nullam fecerint mentionem. Antiquos quum dico, velim intelligatis Hippocratem, Theophrastum, Dioscoridem, Galenum, Oribasium, Paulum Aeginetium, Caropem, Varonem, Plinium, Palladium, & Columellam. Inest huic fructui sapor acidus, cum quadam permixtus dulcedine, unde sumitur existerem, hunc ipsum fructum, quem nos Ribes appellamus, eundem apud Serapionem Ribes esse, quum eundem saporem Serapio suo tribuat, quem in hoc Officinarum gustamus, nec enim in ceteris notis Serapio ab hoc communi quicquam deviat, proinde nostros Ribes, Serapionis quoque esse crediderim. At Amatium ceterosque, qui putant hunc fruticem esse Arabum Ribem (de quo postea) hallucinari abundè constat. Siquidem, ut posteritatis memoriam prodidit Serapio, Ribes est arbor proferens capreolos colore viridi rubescens, & folia lata, magna, & rotunda. Quas sanè notas huic non respondere satis notum est; neque enim fert hæc capreolos, neque ejusmodi folia viret: tamen si fructu Ribem admodum referat, què diis gustui sit acidus simul & dulcis, qualem esse Ribis baccam auctor est Serapio. Sunt quoque nonnulli, qui esse existiment Poterium, de quo apud Dioscor. Plin. & Galenum. Sed errant & hi toto caelo. Descriptiones conferant & videbunt discrimen. Totum Ribis fruticem circumvestit lanugo subtilis v-

Tom. II.

lute pubescens; spinis Poterium horret. Nec desunt, qui hanc plantam esse arbitrentur, quam Galib. de comp. med. sec. loc. Vrsi uvam appellat. Quorum error ab ipsomet Galen: satis refellitur eodem loco: quandoquidem asserit hujusce Vvæ plantam Mazeyli foliis virefcere.

Matthiolus scribit Loniceram hallucinatum, Ribem vulgò dictum, Hallimum dixisse, id tamen non comperio apud Loniceram, meminit quidem alterius plantæ pro Hallimo ad eundem March. in post. comm. Lat. & Ital. & hist. germ. silvestre genus in collibus & montibus nasci tradit, hortensi simile, sapore tamen multo gratio, acerbiore, vehementiore. Genus quidem silvestre dulce vram nostram: nullum autem hortensi acerbius. Monachi autem hujus arbuti fructu omnes pharmacopoeos falsò pro vero Ribes uri: quid autem sit eos adhuc latere, Talia & Cardanus, Ribes loco, inquit, sumur frutice incerto, fructum in umbella dicitur dicere in racemo ferente.

Ribes vulgaris acidus ruber vocatur Grossularia rubra, à Lugd. (à qua & Vva transmarina) Tab. Dod. gall. & lat. cui etiam Grossularia transmarina dicitur. Cam. ad March. Grossularium rubrum & transmarinum. Vulgo gallico apud Ruell. rubra Grossula, & transmarina. Gesn. coll. Ribes vulgò dictum, Acinos divi Iohannis, Itemque Ceanothus levis. Trago Ribes, & hortense. Cam. Ribes, vulgare baccis rubris. Matth. Ribes officinarum an Ep. & hist. Ribes vulgaris. Clus. Ribes vulg. rubro fructu dulci. Ribes Fuchs. Lac. Cronenburg. Bon. Apoll. Tab. Cæ. qui & fruticem sine spinis nominat. Lob. Adv. Ribes rubra: Obs. & Ic. Ribes Arabum, Ribesium Dodonæi.

C.B. pin. Grossularia s. multiplici acino sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes officinarum: Ribes hortense, Trag. vulgaris fructu rubro, Eyl. Ribes vulgaris domestica, Matth. Cast. Ribes vulgo, Ang. Bellon. Cæ. Vva ursi, Dod. gall. Ribesium fructu rubro, Dod.

Germani nostri appellant Ribem Sant Johano Treubel. S. Johano Beerling quod è. circa divi Iohannis Baptiste diem ad maturitatem fructus pertingant, Belg. Vesicifens ouer zee: Gall. Griseleis, Griseles d'outrè mer: Ital. Vvæ a rossa: Hispan. Ribes: Boh. Jaboti S. Jana: HUNG. Apro sengori zola, hæc minor marina Vva.

Passim in hortis nascitur, eorundem pulvinos areas sapiens, florens Aprilis ac Maio, sub finem vero Julij quandoque, sæpius verò Julio mense bacca maturans.

Quæ de fructu Oxyacanthæ dicuntur, ea de acinis Ribis quoque ferè intelligi debent. Exhibendi sunt illi, Tragi consilio, agris, qui ardentibus laborant febribus, neque non his qui calidas alvi fluxiones patiuntur. Namque hi acini sicut & Serapia & eclegmata, atque Rob (ut vocant) de Ribes, sitim immensam restinguunt, vomitiones sistunt, cibi appetitum invitant. Quidam Saccharo has baccas condunt, sicut & Cerasa, quo pacto pucti variolis, aliisque alvi calidis profluvij laborantibus appetitum conducunt. Bacca Ribis in sole siccatæ, ad easdem affectiones asservari poterunt. Reliquas cum Oxyacanthæ eadem vires obtinet Ribes. Succus à bacca Ribes expressus, cum aqua Cichorij aut Acetose confectus ad febres ardentes & hujusmodi alvi profluvia, auctore Matthiolo, consistendo roborat ventriculum, & his qui cholera morbo afficiuntur subvenit. Idem facit contra hæmoptysin, cum aqua Portulacæ aut Plantaginis bibitus. Vvæ læ tumorem gargarizatus cum aqua rosacea curat. Fronti illitus, lachrymantes oculos adjuvat. Dentes quoque vacillantes & gingivas corroboret. Folia vehementer adstringere testis est Fuch-

sius, Ribesij nostratis, ait Dodonaeus, rubentes baccæ, quarum usus & non aliarum est, frigida & sicca temperamento sunt, ordine secundo satis intenso, & cum partium tenuitate nonnihil quoque adstrictionis obviunt. Ardores febiles restinguunt ac mitigant: bilem reprimunt, sanguinem contemperant; putredinibus adversantur, sicut vehementer sedant; ventriculi subversiones, & choleram morbum sistunt; dysentericis ex calida causa laborantibus utiles. Syrupus de Ribes conficitur, ut de Granatis, acidus, cui etiam facultate omnino respondet. A vulgo Montpellier. pluitis fit, quod rarior sit Ribes, quam Malum Granatum. Ribesium ad sepimenta utile, tum & ad topiarias scenas, quas non difficili opere convescit ac ornat.

RIBES VULGARIS ACIDUS, albas baccas ferens.

Vulgari similis foret, nisi cortice esset candidiore, floresque facile diffunderent, ita ut sæpe remaneant paucissimi baccæ, ac etiam singulares. Sed & alia differentia est; baccæ enim quamvis acidæ sint, alba tamen manent, pellucidæ, uniones penè referentes, ejusdem tamen cum vulgaribus magnitudinis. Hujus meminit Clus. hist. nomine Ribes vulgaris albo fructu, quem ait Hungaris incognitum. C. Bauh. apud Matth. dicitur Ribes baccis instar unionum candidis. Eid. pin. Grossularia 8. hortensis fructu margaritis similis: Ribes fructu albo, Eyst.

Montbelgardum Stutgardia ex horto Ill. Ducis VVirtemb. translata, ubi primùm observata est, flosset & fructum fert eodem tempore quo vulgaris.

RIBES FLORE RVBENTE.

Flemior huius frutex est vulgari, ac robustior, cortice rubescente vestitus; foliis hirsutis, ad tactum lavibus, angulosis ut vulgaris, sapore tantillum acidis; longis florum racemis, quos Maio in horto Ill. C. VVirt. Montbelgardensi profert, serè palmatibus; figura serè Vvæ crispæ floribus similibus, obsoleto rubore præditis, quorum umbra quinque partita albescit, sapore subacido.

An Clus. est Ribes vulgaris secundum genus amplioribus foliis & majore fructu, licet acidij saporis ut vulgaris: huius enim flos variat, quia qui in vulgari herbacei coloris est, in hoc eleganter rubet & puniceus est. An huic similis quam Ioannes Boissot in horto Bruxellis alebat? Hæc Clusius.

C. B. pin. Grossularia 6. hortensis majore fructu rubro: Ribes rubro flore, foliis & fructu majoribus, Clus. pan. & hist. Ribes baccis majoribus; Cam. major fructu rubro, Eyst.

RIBES MONOCARPUS.

Mittebat anno 1598 aliud Ribes genus ex Anglia acceptum ad Clusium Carolus de Tassis, quod Vvæ crispæ rubro fructu appellatione inscriptum erat. Postea tamen è Jac. Gareti epistolâ Londino missâ fructum ferre intelligebat vulgari similem, pauldè majorem, consertim tamen in eodem pediculo non nascentem, sed singularem ut in Vvæ crispæ.

C. B. pin. Grossularia 7. distinctis baccis.

RIBES ALPINVS. dulcis.



Ribes alpinus Desf. dulcis fruticat ut præcedens, tenui vimine, cinereo cortice connecto; folia ex alternis tuberculis, exeunt simul aliquot, cum flores, plusquam dimidio minora vulgaris Ribis foliis, Vvæ crispæ æqualia, in tres acutos angulos exeuntia, in ambitu serrata, levissimè hirsuta, superne atrovirentia, inferne lato virore splendentia, excurrente in angulos singulos

nervo satis elato, gustu subdulci, ex pediculis semuncialibus, hirsutis; flores ex tuberculis insidem racematum cohererent numerosi ut in vulgari, herbacei, sed floribus Ribis vulgaris magnitudini multum cedentes, foliis tamen quinis perinde & apicibus constantes, odore gratissimo; singularibus strobulis ad pediculum adnascitur foliolum concolor tenue & oblongum. Vvæ breviores quam vulgari; acini minimis rubri, subdulces, serè insipidi.

Gesl. h. est Ceanothi levis genus sylv. Rusticis Red beer. Eidem in app. Ribes sylvaticus. Lob. Obs. Ribes candidioribus foliis, acinis dulcibus. Lugd. Grossularia rubra, sive Ceanothi levis genus circa sylvas Gesneri. Clus. Ribes genus quoddam, quod Austriacæ & Stiriacæ Alpes alunt, nihil vel minus à vulgari differens, fructu tamen non acido, sed dulci. Clusius, quod non silendum, iconem habet, qualem Lobelius pro Ribe Arabum exhibet, cum inscriptione, Ribes vulgare fructu dulci. C. B. apud Matth. Ribes silvestris fructu dulci, aliàs à vulgari nil differens. Eid. pin. Grossularia 9. vulgaris fructu dulci: Ribes vulgaris fructu dulci, Clus. pan. & hist. Ribes minor fructu rubro, Eyst. Item, Grossularia 10. sive silv. rubra: Ribes silv. Matth. Gesl. app. Linn. Cast. Cam.

Vidi Geneva in monte Saleve, deinde in Thuiri, ac etiam in monibus circa Basileam.

RIBES NIGRVM VVLGO dictum folio olente.

Fruticat Ribes nigrum ceu vulgare, folia vitigena, lata, aversâ parte leviter pilosa, odore fortido; flores ex eodem tuberculo plures, aut racematum digetti, Vvæ crispæ floribus persimiles, concavi; quinque foliolis rubentibus extrorsum reflexis, totidem surrectis pallidè virentibus, alternante cum quinis fibris concoloribus sitis; stilus in medio viridis; odor, qui & foliis, gravis; baccæ oblongæ colore nigro, quæ sive maturæ, sive immaturæ acidæ sunt, cum sapore parum grato, parum ingrato.

Ruellium de hac loqui existimo quamvis descriptio ejus non placeat, quæ sic habet: Non est ornandum arboreum frugem apud nos esse, quo

quo velut vivi sepe latiores hortorum areas, venustatis potius causa, quam munus meriti, cingunt. Is altitudine ternum cubitorum inolevit, & virgineâ fronte viret, supra modum asperi, utrisque lateribus acuminatâ, medio in mucronem delinente, ambitu leviter fimbriato, satis ad Lupi siliatarij, vel albae Vitis folium accedente; ramos fundit breves, in quibus excusso flore primâ in bacculâ pendent virides, ut in Ligustro racematim coactae, quæ maturitate in adipiscentes nigrescunt, gustu & sapore piperis, sed mitiusculo. Ex prorsus rotundi Piperis faciem exprimunt: verum desideratur in eis retortida illa rugosâque maturitas, abest etiam illa validior amaritudo, gustum Piperis sapore complent, & os, quibus anima foetet, odoris jucunditate commendant. Piperolitores nostri nominant, quod atrum Piper colore & sapore forsitan amuletur, Sit ergo nostris Piperastrum, quoad melius vocabulum



invenimus. Vides itaque quàm circa sit harum rerum effigies.

Math. in Diosc. est Arbuscula piper racematim proferens, Venetiis visa, faciemque illius plantæ prorsus exprimens, quam vulgus Ribem appellat. Relinqueret appellatur Ribes nigrum. In epist. Cortusum scribit, se audire quosdam Dioscoridis Amomum esse recensere. Sed quantas nescit nugas, qui ut videatur singulare aliquid conspexisse, Piperis plantam Venetiis in horto Maphæi vigere fabulatur. Arqui si sentex ille Piper est, vel etiam Amomum, ut alij sentiunt, parum aberit, quin vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum (teste Guilandino esse possit.

Cum Amomum (ait Lobel. in Adv.) doctos diu excrucisset, & eos peregrina planta defecisset, nostram Ribes nigram opinati sunt, quæ vera non est. Esse scribit Apollo quosdam [est Angust.] qui Piper silvestre Syrium, Pimento del Rabo Lusitanis vocatum, cujus plantæ, tum Venetiis, tum Patavij in hortis quibusdam visuntur, Amomum existiment. Sed considerent docti, an Pimento del Rabo non falsè existimetur fructus Ribis nigri, visi Venetiis & Patavij, non autem plantæ Pimento del Rabo, sive Piperis caudati. Lon. Ribes silv. ingrati odoris. Hadr. Amomum, Piper hortense ab holitorum gente dictum. Tigurensum quidam apud Ges.

quadrup. vocat Palmienstauden nimis conumbri vocabulo. Is Pseudamomum esse conpicit, cujus folia & ramuli Sabinam herbam auresis urinam quodammodo redolent. Vocatur autem à Gesnero de coll. Ribes silv. aquaticum, Sabinæ ferè odore: de hort. Cearothus Ribes acinis nigris: Item Amomum Arguillatæ, Amomum falsum, Pseudamomum, Piper quorundam. Eid. cat. Amomum, in hortis præsertim Gallie Piperis vocabulo olitoribus nominatum; Pfeffer mâr bleter nûc Edr. armura: Piper obteres aliquibus Callis vocatum. Cam. h. Ribes baccis nigris, minoribus & majoribus. Eid. ad Matth. germ. Ribis silvestris quidam acinis nigris. Dodg. Ribes nigrum, Gr. silv. n. n. Bel. Schwere.

Tom. II.

te aelbesien. Lob. Obs. & Ic. ut & Tab. (cujus icon non in omnibus placet) Ribes nigra, Schwarz 30. hanc beer. Lugd. Ifos sive Oelos niger. Theophr. Grossularia nigra & alia Piperella. Officinis Ribes niger, Gallis Pourrier & Grosfleur nûr; fructus Gr. i. felles noires. Clus. Ribes vulgaris nigro fructu, Vngaris ignota. C. B. apud Matth. Ribes fructu nigro. Eid. pin. Grossularia n. non spinosa, fructu nigro: Ribes silvestre Trag. Thal. Ribesiu n fructu nigro, Eyst. Frutex Ribi similis fructu nigro, Cæf.

Copiosè se multiplicat in hortis: Februarij principio prorumpere incipit. Frutex Gesneri folijs Grossulariæ hortensis in multis Gallie, Italique locis in hortis colitur. Tiguri spontè nascitur, circa rivorum quorundam ripas, ubi facillè comprehendit translatus in hortos, quem acinos nigros piperi similes in calidioribus locis proferre aiunt, sed Tiguri, ni fallitur Gesnerus, sterilis est. Crescit abundè, si Camer. hort. rectè meminit, in montanis Misnia circa Annæbergam, atque ibi venenati quid istis baccis inesse asserunt, cum aliis in locis esui esse soleant. Sunt qui folijs cibos condiant.

RIBES VERVM Arabum.



Ribes herba Spica Celtica nascendi modo aliquo pacto naturam refert: siquidem ea sub nive ferè perpetuè degit, folio Lapathi acuti prædita, ni grandius esset & rotundius, & Papyrus accedens, Baccas fert ex firmo medio foliorum rubras, ut in Laurus Alexandrina, Hippoglossa & Rulco conspicimus; septena ut plurimùm à radice assurgunt folia, in quorum medio fru-

ctus veluti racematim dependet, ex quo is succus qui exprimitur, turbidus est lactisque albedinem habet: ideo aliquantisper sibi & in solari decet, donec clarescat & depuretur. Hactenus Bellonius, cui lucem addent quæ ex Rauwolfio paullo diversa (et si eandem videantur plantam ambo intelligere) subjicimus: nolumus enim in planta non visa, alterutrum corrigendi provinciam sumere. De Ribe ergo Arabum (parum Rauwolfius; Vera Ribes Arabum, caules habet asperos, longitudine ferè cubitali, crassitudine pollicari, colore viridi, infernè (ut etiam meminit Serapio) rubescere vel purpurascere. Autumno inveni Septembri mense, sine flore & semine, duobus tantum folijs præditum, tanquam primùm prorumpentibus, rugosis, rotundis, Petasididis folijs æqualibus, ex pediculis crassis, brevibus, quæ etiam grato illo acido succo, sicut & caulibus, plena sunt.

Sunt apud Serap. qui putarent Ribem esse, quam Acetosam nominamus, & Lapathum: alij Gratum acetosum quod asseritur ex Craschem. Illam Rhazes inter fructus recensuit. Bellonius vulgè (ait Matth. in post. comm. Ital.) Ribem Serapionis esse plantam repertam in monte Libano.

Verum nescio quomodo possit convenire cum Serapionis descriptione cum notas non habeat, quas tribuit ei Serapio, rotunda folia, capreolos, & arborem esse. Hicille, In meo quidem Serapione, arboris nulla sit mentio. Fructus est racemosus, ut scribit Bellonius: capreolos vero habere manifeste scribit Rauvolf. ad iconem, qui folia rotunda; & ipse Bellonius, rotundius Lapathum dicit. Card. var. lect. Ribes verum Bellonij in Libano. Rauvolf. Camer. ad Matth. Germ. & Lugd. in app. Ribes Arabum. Clus. hist. (qui libenter acquiescit sententiae Rauvolfij) Ribes legitimum. C.B. pin. Grossularia 12. Ribes Arabum foliis Petasididis: Ribes Serapionis, Cam. h. An idem cum hac, Ribes Serapionis foliis Oxylapathi, Bellon. de coniferis, Dod. & Lug.

In Libano nascitur, si à Cedris pauld altius usque ad præcipitium montis scanderis. Halepumi reversus Rauvolf. agnovit in Offic. Rob de Ribes ex veteri nomine & acido sapore. Non parva ejus ibi quantitas apparatur, alio etiam mittenda, inprimis vero ad Turcicum Imperatorem.

Ribes Serapionis frigida & sicca est ordine 1. Ex capreolis contritis exprimitur succus, qui coctione inspissatur. Ventriculum refrigerat, roboratque, confert cardiacis; sitim restinguit; fluxum ventris biliosum, & vomitum compescit; appetentiam excitat, utilis in morbillis & variolis; adversus hæmorrhoidas & ebrietatem. Sapa de Ribes stomachum calidum confortat, autore Mesue, vomitum colericum sedat, sitim extinguat, cordis ebullitionem mitigat, & ipsum confortat, biliosam vomitionem, seu fluxum colericum sedat, & alterat.

AN RIBES RAVVOLFI, AUT illi congener planta?



Inter plantas, quæ in sportulis Doctoris Colij, sive Coolmans reperit, unam etiam conspicebam (Clusij verba sunt Exot. lib. 4. cap. 21.) quæ licet mutila, nec integra, mihi in memoriam revocabat ea, quæ in Cl. V. Leonardi Rauvolfij Itin. Germanico sermone conscripto ante aliquot annos legeram. Is enim lib. 1. cap. 11. mentionem facit ejus plantæ quam Arabes appellant Ribes, ex qua Rob

Ribes plantæ congener

de Ribes conficiunt, ejus magnam copiam à monte Libano delatam in Iudæis Halepani horto videbat, ad Rob illud conficiendum, quod deinde Constantinopolim esset ablegandum. Et cap. sequente ejusdem libri, Ribes plantam numerat inter eas quæ ab ipso in monte Libano fuerunt observatæ. Libro autem quarto, qui seorsim postea fuit editus, & Plantarum figuras additis nominibus, dumtaxat continet, ejusdem Ribes primum è terra emergentis iconem exhibet, binis solummodo foliis præditam. Cogitabam itaque apud me, an illa, quæ inter chartas conspicebam folia cum suprema caulis parte, ad Ribes Arabum plantam referri possent (verisimile enim est, pluribus quam in monte Libano locis nasci, quandoquidem apud Medicos Arabes fre-

quens est ejus mentio) aliquot enim notas habere mihi videbantur non valde dissimiles iis, quas suo Ribes Rauvoldius tribuit, veluti foliorum formam, tametsi Petasitis, quibus Ribes folia comparat, foliis longè inferiorum, nec aded orbiculatiorum, ut ille Ribes folia pingit, sed mucronatorum, deinde extimam caulis abrupti partem quibusdam folliculis præditam, iis serè similibus capreolis, seu verisimiliter quas Ribes plantæ adpingit. Quam verò & folia, & caulis illa extima pars valde sicca essent, nihil mirum, si aciditate, quam fortè habuerit, in illis deprehendere non potuerim: nihil tamen asserere volo, sed meam opinionem dumtaxat dubius profero.

Qua porro in regione eam plantam observasset & legisset Colius, nihil in charta quæ folia involuta, erat adscriptum, nec quidem an aliquo in usu apud incolas esse comperisset. Operæ pretium tamen me facturum existimabam, si mutilam plantam qualem conspicebam, in tabellâ exprimendam curarem, quæ hic adponeretur. Cæterum, illorum foliorum quorum picturam hic damus, nonnulla orbicularis præne erant formæ, hoc est, quinque uncias longa, totidem lata, præsertim infimâ parte, pediculo cui videlicet inhærebant, proxima, summâ verò & aliquantulum mucronata; alia, tametsi ejusdem longitudinis & circa pediculum latitudinis, sensim tamen in mucronem desinebant, nec aded sphæricæ formæ erant, sed Hederæ folium angulorum expers, aut Còvolvuli majoris quodammodo referebant, ejusdemque formæ unum inter reliqua conspicebam, cujus longitudo & latitudo sex unciarum erat. Porro non valde densa sive crassa erant ea folia (nescio an siccitate id accidisset) & supinâ parte quendam viridem colorem retinebant, pronâ autem, ex albo pallescebant, & pediculis binas uncias longis nitebantur, à quibus nervus prodiens per medium folium secundum longitudinem protendebatur, & ab illo deinde alij minores tumentes nervi inæquali situ oriebantur, ex utroque latere quini aut ferè, qui ad folij oras usque excurrentes, intermixtis multis obliquis venulis, magram gratiam folio conciliabant: summi caulis abrupta pars, teretes quosdam & oblongos folliculos inter folia proferrebat, sed eos, ut mihi quidem videbatur, novellos & recentem natos, eosque inanes & siccos, ut facillimè confringeretur.

DE SAMBACH SEV ZAMBACH, & lasinio quædam in genere. CAP. III.

Zambach multis (& verisimè meâ quidem opinione) dicitur de Gelseminio, ut Ang. Dodg. Gal. Lob. Adv. Matth. Cam. h. Clus. & Bellunensi, qui scribit Zambach absolute sumptum, esse Liliū album. Gesnerus tamen in cat. credit Arabes per Zambachum intelligere Violam [Leucoium] quod non placeat. Præterea hist. quadrup. Virgilij Cassiam esse putat apibus gratam. At consideratis iis, quæ de Cassia scriptis Virgilius, non video quomodo conveniat cum ea. Verba autem Virgilij posita sunt capite de Cassia poetica. Idem tandem loco proxime citato pro Nerfin Ieseminum vulgò dictum, aut Leucoia potius, quam ullum Rosarum genus usurpare mavult. Nos tamen dicimus Rosam moschatam melius convenire cum Nerfin quam Ieseminum.

Sunt qui pro certo sibi persuadent lasinium unguentum Dioscoridis ex floribus fieri, quos in Italia Gelsemini vulgò appellamus, inquit Matthiolus. Quorum opinioni non parum suffragantur tum Hermolaus, tum Marcellus, qui inter Leucoij generis nostratem Gelseminum comprehendisse videtur, cujus sententia non probanda. Gelseminum differre à Leu-

Folia Petasidis

Itin. Clusij

Folia Hederæ

Agrostis

Liliū album

Leucoium

Cassia Vera

Gelseminum

Nerfin

Leucoia

Leucoia

Leucoia

Leucoia

Leucoia

Leucoia

Leucoia

Leucoia

*germinum
differt a
Leucoso.*
lesemin.
Zambach.
d. l. enc. v. abunde ostendit Serapio, qui alterum ab
altero diversis capitibus distinguit. Nec de Gelsemi-
no agens cap. 176. ullam Diosc. aut Galeni authori-
tate nadsert. Credimus ergo Diosc. ceterisque ve-
teribus incognitum. Ceterum Arabes lesemin ap-
pellarunt, tametsi vernacula eorum lingua Zam-
bach sive Sambach, vocitetur. Addit idem in com.
Ital. cap. 63. Gualterum Germanum Argent. manife-
ste errasse qui existimatit Diosc. intellexisse de vul-
gari Gelsemino. Matth. olim in Diosc. meminit ex
Serapione, Gelseminum floribus albis, cum luteis,
tum caeruleis reperiri, quale etiam se vidisse ait. Mo-
do autem in post. com. dicta de diversis coloribus
Gelsemini omittit, quasi ante scripserit non visa.

Isajus Diof.
non est Gelfeminum.

Isajus porro Diofcoridis non esse Gelfeminum comprobatur Lob. in Adv. dicens. Concinniorum quam certiorum ascivit sibi Gelfeminum vulgare flore albo appellationem de sententia doctiorum, quibus tamen dictum putatur, quasi Viola odora, quia solum esset istius floribus oleum apud Persas imbui, quod tamen gravius spirat, eoque arguit, non esse nostrum Gelfeminum. Et Viola latior significatio multo est, quam ut certam quampiam plantam designare valeat, nedum hanc quam Mauritani Zambach & Gelfeminum dicunt. Gelfeminum vulgare Cataspino videretur Diof. Smilax laevis esse: quinvis Diof. odorem floris subituerit.

Similis *Is-* *Isalminum* [*Isalminum*] quasi violaceum, à Violis quas
So. *is* vocant; vel Isine quasi Violæ odor; aut Isine
Nomin quasi medicatus odor: Sambach & Zimbach Arab.
liquar. quibusdam Apiariæ, quæd apes ejus floribus pluri-
mum delectentur. Germ. *Deylestraben*: Gall. *Issemin*:
Apiaria. Ital. *Gelsimin*. Amat amenos & calidos tractus ha-
becurque in viridariis & hortis.

Vires. Avicenna lib. 2. Canon. tract. 2. cap. 19. de Sambaco, Iasmin alba est calidior citrina, & citrina purpurea; & est universaliter calida sicca in secundo. Est subtiliativa humiditatum, & confert senibus ejus oleum. Delet panum quod ex ea humidum, & quod siccum, & facit possidere citrinitatem multitudine odoramento ejus. Ejus oleum confert aegritudinibus frigidis in nervis, & senibus. Ejus odor facit sorda: veruntamen cum hoc resolvit sorda factum à phlegmate, quando odoratur: & purum oleum ejus facit fluere sanguinem ex naribus calcfacti, cum ipsum odoratur. Serapio de temper. simpl. cap. 176. de Iesemin quod est Zambach tradit ex Isaac eben amram, esse quoddam ex eo album, habens florem, & quoddam citrinum, & citrinum esse minus in operatione sua, & citrinum reperiri in Babylonia.

Impetigo. Quam iteratim multumque aut necesse, & ponatur super impetiginem aut panum, expelli eos, & resolvi omnem superfliciatem frigidam, & conferre habentibus catharrum, & inducere dolorem capitis illis, qui sint calidæ complexionis, & oleum ejus esse juvatissimum in hyeme. Sed si calidus aliquis in complexione odoret ipsum nimis, timerendum esse ne faciat fluere sanguinem ex naribus ejus. Esse etiam speciem aliam ex ea, cujus flos sit celestis coloris.

Temper. Idem ex Aben mesuai ait esse calidum in principio secundi gradus, conferre humiditatibus & phlegmati salso, & senibus frigidæ complexionis, & conferre doloribus quæ fiant à phlegmate viscoso. Ex Mesurugia folia Ischemini humida aut sicca poni docet, super impetiginem aut panum, & auferre eos.



ridius donatum est,
corrice viridante in-
cedis: folia septem
ad unguem alligan-
tur, acuminata, Vi-
cia foliis terè paria,
glabra, atrovirentia;
flores veluti in um-
bella suavissimi o-
doris ex oblongo
gracili tubulo in ca-
lathū quinquepar-
tium explicantur,
colore cædido. Mat-
thiolo è seminibus
semen rarissimum
oritur, in aliquibus
tamē locis edix Lu-
pino simile. Cæ-
Cralescit vetustate
serè specie arborea

coëuntibus viticulis instar caudicis.

Sunt apud Lugd. docti, qui Pothon album à Syon.

Theophr. lib. 6. hist. cap. 7. memoratum, Iasminum album putant; Desiderium vertit Gaza. Plinius sic interpretatus est: Sed maximè spectabilis Pothos, alterum candidius. Avicen. Zambac, Sambach, vel Iasmin alba. Isaac eben aintam apud Serap. Iesemin sive Zambach album. Hermol. Ieseminum flore candido, & Viola Persica, Parthica & peregrina. *Viola Persica.* Ieseminum Marcello. Gesn. h. Iasnie floribus albis. *sica.* Lob. Adv. Gelsiminum vulgatius flore albo: Obs. & Ic. Gelsiminum vulgatius. Cxf. Gelsiminum floribus candidis. Cam. h. & epit. Gelsiminum sive Iasminum, Zambach Arabum flore albo. Tab. Ger. *Zambach Arabum.* Lugd. & C. B. Iasminum album; Miror Tabern. & asseciam ejus Gerardum pro Iasmino cæruleo ponere eandem figuram, quæ albi, ac etiam pro Iasmino luteo, cum luteum differat formâ. Cæruleum nulum vidi, nec invenio, qui intueus sit, quamvis ejus mentio fiat apud Matthiolum & post. illum apud alios. Iasminum primum Anguill. Iasminum Cord. in Diosc. Dod. Clus. Cam. apud Matth. C. B. pin. Iasminum i. sive vulgatius flore albo: Apiaria. Dod. Iasminum fl. albo Eyst.

Lobelubivis in hortorum angulis apricis ^{Loc. ubi} depro
prædiorum cavædis furculo pangitur, adque orna- ^{Tempus.}
menta pergularum, pèdamentis erigitur ad forni-
ces. Cæsalp. floret post Rosam diutius è singulis
solorum alis. Fructum apud nos nequaquam perfici-
cit. Hyeme amittit folia.

Iasminum album sicut odore flagrat, ita & vitibus multis pollet. Oleum ex hujus floribus confectum crudos discuit humores; frigidis ac catharro-
 sis confert, & hyberno utile tempore. Quibus autem temperatura contigit calidior, his dolorem excitat capitis, & si diutius odoretur, periculum adfert sanguinis & narium profluvij. Præcipua olei è floribus utilitas ad contractos, induratosque artus, articulos, tendones, nervosque calefacit, emollit, aperit. Vteri morbus arceat, non solum hypogastrio & locis muliebribus illitum, sed etiam potu aut enemate usurpatum. Simili modò prodest & doloribus colicis quos frigidus & viscidus humor concitavit.


Pures.
Oleum.
Temperatura calidior.
Calidior.
Calefacit.
Aperit.
Morbus uterini.
Colica.

IASMINVM HISPANICVM FLORE
 majore externè rubente.

COrsimiles progreſſus & incrementa habet cum *Dof.*
Clasmino vulgato, ſed omnibus modis contin-
 uus eſt; foliorum conjugationes tres quatuorve
 cum extremo imparialam complent, ac ſingularia
 folia ex oblongo rotundantur non in mucronem

13

vulgati more defluunt, iisque latiora, propolis ple-



Syn.

Gelsim. Ga-

Id. Hispan-

Locum et

Tempus.

rumque se mutuo contingunt, extremumque aded folium impar, contractus ac brevius, quam in vulgato existit. Porro autem & flores longe sunt majores speciosioresque ac fragrantiores, foliis obtusis (cum vulgato sint acuta) intus lacteo candore, foris puniceis.

Lugd. dicitur Iasminum puniceum Dalechampi. Gal. Iasmin rouge, & Iasmin large. Tab. Iasminum candidiflorum. Ang. Ge-

lmini [Zambach] species tertia. Lob. Obs. Chamgelsiminum grandiflorum petamenum, humile Gelseminum. Czf. Gelseminum humilium, flore grandiore, superne candido, inferne subrubente. Cam. apud Matth. & Epit. Gelsiminum Catalonicum, Germ. Frembd Veyelraben/oder Jasminen mit grossen blumen. Ger. Iasminum candidiflorum majus, Great white Gelsimine. C. Bauh. apud Matth. Iasminum Hispanicum grandiflorum. Eid. pin. Iasminum 2. humilium magno flore: Gelseminum humilium 1. Clus.

E Chio insula Genua primum advecta, inde Lugdunum. Qui Byzantium profecti sunt, affirmant plantam hanc in eo tractu & multis Peloponensi locis, à Græcis & Turcis studiosissime coli, & ubique in hortis spectari. Vt autem propagetur in vulgari inseritur. Floret Autumno & serè per totam hyemem Patavij, Lugdani, Basileæ & alibi in urecis penilibus culta.

IASMINVM SIVE SAMBACH.

Arabum, Alpino.



Dis.

Folia.

Flores.

Vires et

Tempus.

Oleum.

Tumores

utri.

Partes in-

gat.

Sambac, sive Gelsiminu, aut Iasmin Arabicu, ut autor est Alpirus, frutex est Cayri in Egypto, sarmentosus, qui sarmentis serper de alijs se extollit, folijs Mali aurancij proximis, flores albi, octonis folijs praediti, omnino similes vulgaribus folijs, magnitudine odoreque praevalidiori, ac suaviori.


Vius florum est magis ad oriturum corporis, quam ad

sanitatem: nilominus parant oleum, quo utuntur mulieres in balneis ad uterum calefaciendum & laxandum, ejus enim cirrhosis tumoribus maxime conferre expertæ sunt, ut parum etiam faciliorem reddant, oleum hoc & bibunt calidum, & ipso

liniunt extrinsecus uteri partes. Utuntur quoque eo externis irungentes thoracis regionem, tum per os ipsum calidum bibentes, ad tussim, anhelitusque difficultatem, & ad pleuritum lethalem, in qua spiritum maxima cum difficultate educitur, & ad peripneumoniam, atque ad dolores vehementes stomachi, intestinorum, atque uteri. Parant hoc nostri unguentarij ex dulcibus amygdalis atque Gelsimifloris seminibus, ex quibus odore florum Iasmini imbutus oleum expriment valde odoratum.

IASMINVM SIVE GELSEMINVM

luteum, & caeruleum.



Iasmini vulgati ritus fruticat, virgulis viridatibus, angulosis, striatis, in quibus folia, abas terna Polemonij Monspelienfium ritu, sed acutiora, firmiora quam in albo, interdum duodecuplo majora, ad Trifolij bituminosi cultu folia magnitudine accedentia, aliàs vero pinnata ex una duabusve conjugationibus costæ annexis ampari semper uno alam claudente flores eo ordine & situ quo in Iasmino sive vulgato, sive Hispanico, folijs obtusis, luteis. Fructus mediocris magnitudinis, niger, oblongus, bina continet semina magna, nigra, oblonga, quæ se mutuo spectant plana, altera parte modicè gibbosa.

Lob. Adv. Gelseminum luteum. Eid. ic. & Tab. Iasminum luteum, Geel Veyel Râben. Quem quis quæso cum eius imitatore Gerardo excusabit qui pro non viso Iasmino luteo ex sola phantasia ponit albi iconem. Ang. Gelsiminum flore luteo. Gels. h. Iasme, Iasminum luteo flore, quo nomine Eyst. & C. Bauh. id apud Matth. nominat, qui seorsim Iasminum vel Gelseminum luteis floribus inscribit. Eid. pin. Iasminum 2. humilium luteum: Gelseminum humilium alterum 2. luteo, Czf.

Pfortzheim in horto Grienningeri, qui hieme regit, adhuc viget Novembri: Argentina floret Julio & fructum maturat Octobri. Patavina & quædam Gallica vireta habent florens in æstate. Iasminum caeruleum nondum vidimus: An Arabes Ligustrum orientale, quod aliàs Syringa caerulea sicutur, intellexerint, Czf. dubitat: alij Clematide n caeruleam esse volunt.

Iasminum caeruleum, Tab. Ger. Iasminum 4. caeruleum Serapioni, C. B. pin.

PAVATE ARBOR FOLIIS MALI

aureæ. CAP. IV.

Frutex est non admodum ramosus octo aut novem pedum altitudinis, cui rara sunt folia, Mali aureæ minoribus folijs similia, excepta appendice quæ caret, utrimque eleganti virore prædita: flos exiguus, cardidus, quatuor folijs præditus, & cujus medio ex albo filia cuspidè viridi insignis, odore floris Pelymenis, cui procul aspicientibus persimilis.

*Stemmo-
chates.*

*Capri-
folium
Matrisilvia
perfoliatum.*

tum, & quod difficile evellatur. Considerans, quæ Hermo. præcedenti cap. de Clymeno scripsit, observabit facile eum Clymenum primum Plinij idem facere cum Periclymeno Dioscoridis. Dicit enim in Clymeno de Periclymeno actum est, quod nunc Caprifolium [perperam teste Cron.] & Matrisylva vulgè [Officina] appellatur. Ceterum id maxime Matthiolum ad credendum impellit, vulgatum Matrisylvam esse Periclymenon, quod non solum omnes hujusce ætatis rei herbarie peritissimi nos in hanc sententiam devenisse compererit, sed quod etiam ex notis, quas illi reddidit Dioscorides, ita esse cognoverit. Periclymenon, inter Diosc. notha, aliqui Eginetam [nomenclaturam à capris factam] alij Clymenon, alij Carpathum, alij Splenium, alij Hepaticum, alij Helixiren majorem, alij Clematium, alij Myrsinon, alij Calycanthemon, Prophetæ Pileum Veneris, Egyptij Turcum, Romani Volucrum majus, Aphri Lanath appellant.

Nascitur in arvis ac sepibus autore Diosc. convolvens se propinquis fruticibus, adminiculis quibuscunque, Plin.

Semen postquam ematuruit collectum & in umbra siccatum, si drachmæ pondere ex vino bibatur quadragenis diebus, lienem absunt, lassitudinem discutit; & orihopnoæ atque singultui prodest: sed urinas ciet statim à sexto die cruentas. Idem partum quoque accelerat. Sed & folia usdem sunt prædita viribus, ac tricenis septenis diebus epota sterilitatem in viris facere produntur. Eadem, si ex oleo perurgantur, si brium circuitibus redeuntium horrores abigunt.

*Ex Galeno
tempera-
mentum.*

Periclymeni ex mente Galeni utile est & semen & folia, siccandi simulque calefaciendi vim habentia, adeo ut etiam urinam cruentam efficiant, si diutius bibantur. In principio tamen solum urinam ciet. Si vero foris cum oleo illinantur, calefaciunt. Semen autem etiam siccatur. Et quidam tradunt si amplius bibatur, omnino effici ut bibentes non gignant. Quidam etiam certum dierum tempus præstunt tali potione: quemadmodum & Diosc. septem & triginta dies. Hoc etiam urinam cruentam reddi dicit à sexto die. Semen Periclymeni, ait Plinius, in umbra siccatum tonditur & in pastillos digeritur. Hi resoluti dantur in vini albi cyathis tribus, tricenis diebus ad lienem, eumque urinam cruentam, aut per alvum absunt: quod intelligitur à decimo statim die. Urinam ciet & folia decocta, quæ & orihopnoicis profunt. Partum quoque adjuvant, secundasque pellunt pota simili modo. Dictum autem est, Plinium aperte Clymerum cum Periclymeno confundere. Nam quæ de Clymeno tradit, ad Periclymerum pertinent: quæ verò ex Græcorum sententia scribit, ad Clymenum Dioscoridis spectant. Et in hoc sequutus est Theophrastum, qui & ipse Clymeno adscripsit, quæ Diosc. de Periclymeno prodidit. Illius sententiam sequutus quoque Marcellus à vero aberrat. Ecce enim magnum est utriusque herbarum discrimen.

Ex Plinio.

Error Plin.

*Marcellus
error.*

PERICLYMENON PLVRIMIS, SIVE Caprifolium duplex, perfoliatum, & non perfoliatum.

*Diser. van
perfoliatum.*


Hujus radix lignosa, reptatrix, tenuis, cum suis Hadnaus; flagella plura, altera epas indiga, tenuia, longa, lignosa & in ramulos parvula, sursum repentia, cauliculis & geniculis intercepta, leviter pilosa; folia ad genicula ex intervallis bina longiuscula & acuta, mollia, dilute virentia, in ætate tamen parte magis incanescunt; flores in summis ramulis complures pariter emicant, oblongi, antherisissimi, suavi odore, tubæ bellicæ directæ aut promissa-

similes ex corniculato angusto

PERICLYMENVM NON PER- foliatum.



PERICLYM. PERFOLIATVM.



nascitur acinorum Sambuci magnitudine colore rubro, dilutiore, ut ait Dodon.

Meminit Periclymeni Pandectarius, qui quidem nullum ejus discrimen tradit, sed in genere delineat his verbis. Matrisylva latine, græcè Splenion, vel Splenaria, vel Lienalis, vel Periclymenos. Herba est, cujus folia ex altero laterum subalbida, & ex altero subviridia; se involvens & adhaerens sæpius; cujus fructus est magnitudinis Cubebarum in principio viridis, & cum maturuerit citrini coloris tendentis ad rubedinem positi ordinariè, & conclusi in duobus foliis simul coniectis, existentibus in capitibus stipitum juxta eum.

Matrisylvæ nomine (inquit Cron. in comp. Mar- ciani) insignivit Periclymenon Græcorum Scrib. Largus, quam luculenter ex veteribus Dioscorides & Plinius aperuerunt, & Gal. 8. simpl. Volucrum majus quoque appellat, Pandectariusque Caprifolium nostrum declarat: nam notæ eum Periclymenon veterum satis conveniunt; unde doctissimis idem sonant, si Matthiolum & Amatum excipiamus. nam Caprifolium Pyxanthem asserunt. Mesue inter Volubiles terræ species ostendit.

Hermol.

principio in latius orificium satiscientes, laciniatæ timbræ ligularumque pulchritudine spectabiles; uscatæ, staminibus aliquot è medio excurrentibus; color albus ac interdum flavescent. Fructus acinis Sambuci similis cõglomeratus, per maturitatem rubens, in quo semen duriculus; succo abundante acini saporis ingrati.

Alterum genus (perfoliatum) Narbonense quale in horto habemus à præcedenti vulgari in Germania differt foliis penè glaucis rotundioribus & pediculis brevissimis, quarum quædam sunt sepe continua & à viticulis trajecta pertrusæ, suprema autem acetabuli instar modicè concava, saporis subacri; ex quorum coryla flores prodeunt præcedentibus similes; maxillimi, suavi etiam odore, colore ex purpurea albescente aut in luteum languescente, superioris similes, breviores tamen ac paulò minores. Dodon. ex tubulo eminet stamina albidia. Semen glomeratum

Perfoliatum.

*Periclymenon
Pandectarius
Scrib. Largus
Splénion
Splenaria
Lienalis
Periclymenos
Lienalis*

*Matrisylva
Scrib. Largus
Volucrum
Caprifolium
Pyxanthem*

Pyxanthem

Clymenum
Plinij
Periclymenum
Romanorum
Hermod.

Hermol. in Diosc. vocatur Clymenos Plinij prima, Periclymenum Dioscoridis. Ruell. Car. Steph. in coll. & Fuchs. Periclymenum Romanorum, Volucrum majus, Periclymenos Plinij: Sylvarum mater Scrib. Largi: Caprifolium & Matrisylva vulgi, licet Caprifolium, quam Matrisylvam vocant, teste Cornatio parum respondeat.

Caprifolium
Hermod.

Sunt (inquit Matth.) qui Periclymenum perpetuam Caprifolium appellant: Officina Matrisylvam vocant: Italici quia in sepibus & frutibus nascitur, addit ut saepe tam pertinaciter inhaereat ligetque adminicula, ut in ea imprimat vestigium, max. ad Vinciboscum si dicitur. Plane hallucinantur ij, qui Caprifolium, & Matrisylvam seu Periclymenum idem esse existimant, in quorum numero esse deprehenduntur Ruell. & Fuchs. (in p. f. c. m. n. f. ch. f. m. sed Mantum accusa.) In hunc autem lapsum hos fortasse deduxit Matthaeus Sylvaticus Pandectarum autor.

Vinciboscum
Hermod.

Siquidem is suum Caprifolium Matrisylvam nominat, cum tamen, ut subinde legitur, nil aliud Sylvatico Caprifolium fuerit, quam Dioscoridis Pyxanthum. Si Lycium, non autem Periclymenum, de quo seorsum sub titulo Matrisylvae Sylvaucus ipse differuit. Quod forte non animadvertentes ij, Caprifolium & Periclymenum idem esse putarunt. Ruellium autem, simul ac Fuchsium lapsos, falsè concludit Matthiolus, quum vulgò atque recentioribus herbariis Caprifolium vocatam asserant, nec propria sententia id statuunt: ipse autem affirmat Matrisylvam (repetens verba Dioscoridis sicuti & cetera in sua eius descriptione) semen praeurum & quod difficile evellatur habere, caule & radice simplici, quae an manifesta sint in Matrisylva aliis judicandum relinquimus. Matthiolus sua iconem exhibet Periclymerum perfoliatum.

Lycium

Matthaeus
Hermod.

Dod. gall. Periclymerum: In hist. duo ejus genera tradit. Vnum Caprifolium germanicum, alterum Caprifolium italicum; utrumque fruticem amplexilem, vicinis adminiculis sese circumligantem. Porro Sylvaticum reprehendit qui dixerit Lycium vocari Caprifolium & Matrisylvam. Ejus verba haec sunt: Matthaeus Sylvaticus Caprifolium & Sylvarum matrem cap. 137. rectè quidem Periclymeron, sed perpetuam Lycium & Pyxanthum interpretatur, Periclymenum cum Pyxanthum ineptè confundens, pejus vero etiam facit Caprifolio vires Pyxanthae ascribens. Sed cap. 131. Matrisylvam Periclymenon & Caprifolium rectè assent ac legitimas ejus Diosc. vires refert.

Matthaeus
Hermod.

Diosc. bis videtur Vinciboscum plantam describere, ait Cels. Periclymenum, modò Cyclaminum alteram vocans. Periclymeni descriptio in ceteris quidem congruit excepta radice, quam dicit crassam & rotundam. At Plinius radice non meminit cum in ceteris cum Diosc. consentiat. De altera autem Cyclamino inquit Diosc. folia fert Hederis mirora, &c. Vbi eadem prorsus facultates leguntur, quae in Periclymeno. Afferit quoque Plinius alterius Cyclamini descripti nequaquam diversam à Diosc. enarrationem. Ea quibus patet praedictam plantam magis convenire cum altero Cyclamino ob fructus molliorem & radicem supervacuam. Si igitur eidem accommodari possit Periclymenum, & fructus durities de semine intelligatur, auferaturque conditio radice rotundae, & crassae, error erit in repetitione ejusdem diversis nominibus. Probabilius igitur dicendum videtur legitimum Periclymenum adhuc non compertum esse, non tamen à praedicta planta multum differre. Plinius alibi Clymenum vocat.

Diosc.

Clus. hisp. & hist. Periclymerum vulgare, duplici genere constat. Illud quod in Septentrionalibus nascitur, extremis ramis multos flores, odoratos admodum & rubrum fructum in unum caput co-

Periclymenum
Clus.

atum profert alterum quod in calidioribus regionibus, veluti Italia, Hispania, & Narbonensi Gallia crescit, est latioribus foliis & binis aut ternis acetabulis extremos ramulos ambientibus, in quorum singulis seni plerumque flores exornantur praecociore & minus odorati quam in priore, quibus succedunt baccae serè puniceae.

Cam. ad Matth. Periclymenum perfoliatum: de hort. ait, Periclymeni Matrisylvae vulgò, sive Caprifolij radix etiam si Dioscoridis descriptioni repugnet, nihilominus tamen ex Crateva & Onbasio affirmatur convenire, qui dicunt radicem esse densam & longam. Hujus generis habui elegantissimam stirpem ex horto Ill. Princ. Landgravij Hassiae Vilhel. Periclymenum perfoliatum sive italicum flore odorato vocatum.

Periclymerum Hermol. Ruell. Carol. Steph. in Coll. Cord. in Diosc. Fuchs. Corn. Matth. Dod. gall. & lat. Trago, Ryfio, Cronemb. Gesf. hort. & de coll. stirp. Had. Junio, Turnero & plerisque. Dorst. sub titulo Caprifolij ineptè ponit iconem Hepaticae stellaris.

Lob. Adv. Periclymeni Periplocas hodiernis Graecis vocati, duplicem observari varietatem testatur ex folio. Italicæ sc. & Narbonensi vulgariori folium unum & continuum. Septentrionali, non perfoliatum. Idem Obs. duas habet figuras, unam horticola, Periclymenon perfoliatum calidarum regionum; alteram hoc, Periclymenon non perfoliatum; In le. Periclymenum perfoliatum calidarum regionum officinarum, Periclymerum non perfoliatum; Septentrionalium. Apollinaris romine Geisblam figuram ineptam exhibet, alia vero impressione penitus omittit. Tab. Periclymenum: Item, Periclymenum perfoliatum durschnige Spect. Lilgen. Com-

pilator Tabern. suis demonstrat suam imperitiam stirpem in nomenclatura Germ. tribuens Periclymeno perfoliato quod tribuitur Hyperico. C Bauh. phyt. Periclymenum, sive perfoliatum, ex purpureo colore nitens: aliquando & luteo asperso. Item Periclymenum, sive Germanicum vulgare. Eid. pin. Periclymenum, non perfoliatum germanicum: Caprifolium, Brunf. Gesf. h. & Lon. Germanicum, Dod. Periclymenum, Trag. Fuchs. Dod. gall. Turr. Cord. in Diosc. Gesf. h. Cam. Thal. Tab. Ger. Germanicum, Eyst. Periclymenum Septentrionalium, Lob. Clus. Item, Periclymerum, perfoliatum: Periclymerum, Matth. Ang. Lac. Lob. Adv. & Cast. alterum Dod. gal. Periclymeni species foliis unitis, Gesf. h. Periclymenum perfoliatum, Lob. Lugd. (& grandius) Tab. Ger. Eyst. Periclymenum vulgare alterum, Clus. hist. Vinciboscum vulgò, Cels.

Pseod. in p. Græc. Periclymenum Lat. Officinis & herbariis qui tamen parum Caprifolium, partim Matrisylvam vocant. alij Lilium silvestre, vulgus Lilium inter spinas, Lilium convallium, Narcissum & Volucrum majus appellant, Trag. Germ. Geisblat. Spect. aut Waldsilgen, Fuchio Wilgenconfort / Gesf. quadr. Waldwinde / Zeunling: Viennæ, Norimbergæ, Feldkirchij Rhætorum & alibi, Rosen von Jericho: in Misnia Ze lenger je lieber, Camerapud Matth. Belg. Gheystenblat & Mammesfens cruyt: Gall. Chevrefeuille: It. Matresylva, in ibosio & Caprifoglio: Hisp. Madrevelva. Angl. Woodbine & aut Bonysuckle: Brabant. Weyen.

Nascitur in silvis & in senticetis, & fruticibus, nonnullisque arbutis. Vere folia exeunt, flores quandoque Aprili, crebrius Maio ac Junio conspiciuntur; fructus sub Autumni tempus. Utrumque genus Belgicis & Germanicis hortis valde familiare, pergulas interdum vestit. Neutrum spontè nascitur quod sciat Clusius, in Vngaria, Austria & Bohemia. Frequens tamen est in Hircynia Saxothuringia-

Nomen
linguarum

Locum
Tempus

ca. cit.

ca circa Osterodam oppidum Ducum Grubenha-
giorum ubi dicitur Wildranden. Montbelgardi
passim in dumetis, sepibus & sylvis provenit; spon-
te folio non perfoliato, Basileæ etiam variis in
locis in sepibus: floret Maio, Junio, Julio, Augusto,
Septembri & Novembri Montbelgardi: In Alsacia
copiosè occurrit non perfoliatum: Monspelij per-
foliatum florens Aprilis & Maio in sepibus.

Vehementer calefacit & desiccatur, id quod gustu
etiam ipso deprehenditur. Folia siquidem, attestan-
te Fuchio, ærimoniæ quandam præ se ferunt gu-
stata. Ex facultatibus autem superius à Diosc. Gale-
no, & Plinio commemoratis, nemo non intelligit,
fruticem hunc esse Periclymenon: cum enim gustu
ærimoniæ præ se ferat, necesse est omnia hæc quæ
veteres Periclymeno tribuunt, possit. Quibus acce-
dit, quod recentiores etiam herbarij suo Caprifolio
eandem vires assignent. Exiccate enim ipsum tra-
dunt ulcera humida & sordida, sanare impetigines,
& alias cutis fœditates, lienem absumere, difficultati
spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos
pellere, faciei maculas abstergere, & alia posse quæ
non attinet referre. Cæterum Matrisilvæ in eorum
unguentorum usum venit, quæ ad capitis vulnera
parantur. Namque hæc in re efficacissimum est me-
dicamentum, quamvis è veteribus neminem hæc-
tenus invenerit Matthiolum, qui Periclymenon ea vi
pollere, memoriæ prodiderit. Hanc etiam herbam
commendavit Ioannes de Vigo, ad crurum ulcera,
quod eam ad hoc (ut ipse inquit) utilem esse tradi-
derit Galib. 8. simpl. Veruntamen id non legit Mat-
thiolum in suo Galeno. Præbuisse gravissimi erroris
pharmacopæis occasionem videtur Dodonæo Syl-
vaticus, qui succo foliorum & fructuum Periclyme-
ni densato, pro Lycio, maximo cum periculo utun-
tur. Natus hinc & alius error, quod videlicet folio-
rum Periclymeni decoctum, aut aquam stillatiam
ex foliis & floribus, non sine errore ad oris faucium,
que inflammationes incipientes, veluti adstringen-
tia ac refrigerantia vulgus medicamentum prodesse
temerè existimet. Periclymeni enim haud quaquam
frigida & adstringens, sed calida & attenuans est fa-
cultas. Et hinc merito in Saxonia ubi sua sponte co-
piosè provenit, aqua è floribus stillatitia in fre-
quenti est usu, ad faucium tumores, ubi à frigidis hu-
moribus nati fuerint. Liquorem Periclymeni stilla-
titiæ cum semine Lavendulæ solitus est ad partum
facilitandum ad 3. ij. vel ij. propinare Rondeletius.

PERICLYMENVM RECTVM FRV. ctu rubro & nigro.



Suo caudice nul-
lius sulci indi-
gum surgit hoc Pe-
riclymenon, fruti-
cibus annueran-
dum: cui folia Cor-
ni formæ vulgò
dictæ, molliora, mi-
nus nervosa, utrin-
que hirsuta, bina
opposita: quo nu-
mero quoque flo-
res uni eidemque
pediculo insiden-
tes ex foliorum alis
erumpunt, ex luteo
palescentes, Peri-
clymeni vulgaris
formâ, minores
tamen. Superiore

folio sursum reflexo, subriato; inferiore demisso,
angustiore, integro odore præto, quibus decidenti-
bus baccæ gemellæ subnascuntur eidem pediculo
testium instar appensi, per maturitatem ruben-
tes, Sambuci aquaticæ, sapore nausæoso.

Dod. gall. Caprifolij 2. species, existimata Peri-
clymenum & Caprifolium, cuius flores, fortè Dio-
scorides floribus Fabæ verè comparavit; fructus
Helvetis *Bundsthirsen* nuncupatur: Item, Peri-
clymeni species, Cerasum caninum. Eid. hist. Xylo-
steum, quod plerique Periclymenum stans appel-
lant: Germani alicubi *Bunde Birsen* & *Bunde*
Bersen: unde Xylosteo nomen datum. Sunt qui
Clymenon esse suspicentur, quibus Periclymenon,
ab huius similitudine, veluti convoluens se Clyme-
non dictum videtur. Sed Clymenon aliud omnino
stirpis genus, caule Fabæ, & folio Plantaginis: ut
quidem Dioscorides ait.

Gesn. h. Periclymeno cognatus frutex, Xylosteon,
Beinholtz à Tigurenribus vocatus: Eid. in fin. hist.
Cordi, Periclymenum erectum, vel max. de coll. Pe-
riclymenus minor gemellis acinis.

Clus. hisp. primi generis erecti Periclymeni repe-
tendam descriptionem non ducit, lectorem tamen
admonitum vult (in hist. ubi secundi generis Peri-
clymenum rectum. i. vocat: in xquales baccas non
ferre, quemadmodum nonnulli existiment, sed ge-
minas semper, easque perpetuò æqualis ferè ma-
gnitudinis, cum in Pannonia, Austria, Moravia,
Bohemia, ubi plurimum, tum in Allobrogum, Hel-
vetiorumque alpiibus & aliis locis, in quibus sponte
crescit. In Belgicis autem hortis cultum, vix unquam
æquales ad maturitatem perducere deprehensum
esse; at cum una [baccæ] excreseat & turgida fiat, al-
teram semper exilem, plenam tamen remanere, la-
genulamque gestatoriam, aut Cucurbitulam referre
quodammodo videri. Hoc porro Periclymenum re-
ctum. Clus. pann. ubi eadem scribit, duplex tradit
fructu sc. rubro & nigro, æqualibus porperuò habet
cis variis in montibus Hispaniæ satis copiosè reper-
tum. Lob. Adv. Periclymenum alterum Allobro-
gum, Cornus formæ effigie: Obs. & Ic. Allobro-
gum Periclymenum. Trag. Halimum (seu ut alij le-
gant Alimum) à Dioscoride descriptum esse existi-
mat. Sic & Ionic. Halimum Diosc. cum Trago esse
sinit, donec aliud quod melius conveniat produca-
tur. Sed uterque fallitur, nec enim convenit cum
Halimo hæc planta. Folia siquidem foliis Oleæ, ut
Halimi, proxima non sunt, sed multò latiora.

An Cæli frutex quidam in Alpiibus sine nomine,
similis Corno, brevior: fructu similis parvis Cerasis,
qui geminus in uno longo pediculo est rubens in
maturitate, coeuntibus aliquando ex toto graminis
singulis duo, aut tria semina continentur line ossæ,
bipartito conceptaculo, ipsa semina oblonga, ut e-
tiam grana, ut Corni, sapore amaro. Hæc Craspin
judicio, quoque Cornus formæ dici possit apud
Theophrastum. Contra Dalechampius vocat Vi-
tem Idæam Theophrasti.

Tab. Periclymenum rectum. Ger. Periclymenum
rectum fructu nigro, Blacæ berned woodbinde.
Cam. h. Periclymenum. (sic & Lugd. rectum, di-
ctum Xylosteon Dod. Thal. B. pin. Chamæcerasus Xylosteon,
spuma 4. sive Chamæcerasus dumetorum fructu ge-
mino rubro: Xylostium fl. albis vulgaris, Eysl.

Abundat passim in sepibus, fructu maturo Julio,
qui tum amaritudine dulcis est. Trago nascitur in-
ter cæteras sentes in dumetis & frutetis, Alsacia ad-
modum familiaris, qua regione sæcùs itinera & vi-
vis sepibus occurrit. Apud Helvetios & plerosque
alios Germaniæ populos, in sylvis locis saxosis re-
periri testis est Dodonæus: Aprilis aut Maio flores,
sed fructus Autumno appetente demum perfecti.

Tragus

Vires
Tragus
mo explodi-
tur. Tragus easdem vires quas Halimo tribuit quod Halimum existimant. Ait risu dignum quod postquam in descriptione dixisset baccas gustatas nauseam & vomitus creere, ex Solini sententia Halimum famem compescere scribat, quod equidem facile crediderit, siquidem ubi baccas illius vel semel degustasset, quamprimum satiatus fuit, nec ab eo tempore unquam tanta illum irasit fames, ut praedictum deinceps appetere fructum. Ait si cum Trago, quicquid famem compescit & gustu ingratum est Halimum esse dicendum sit, multae tales plantae reperirentur. De viribus huius fructus nihil compertum habet Dodonaeus.

PERICLYMENO SIMILIS.

Vitis silv.
unde.

Vitis silvestris (inquit Cordus in Diosc. l. 4. c. 18.) aliquam cum Vite similitudinem habet. Idemque hoc nomen invenit, improprie tamen. Non enim idem genus cum Vite sativa habet, ut sativa cultura tantum ab hac distinguatur, sed suum genus a Vite diversum habet. Germanis haec sylvestris Vitis *Speckelbein* appellatur & flores ejus *Speckelien* Periclymeno valde similis est. Videndum ergo erit ne cum eo confundatur. Haec ille. Quam vero plantam intelligat Cordus nondum intelligo: *Speckelien* dicitur de Periclymeno.

PERICLYMENVM RECTVM
folio serrato.

Defin.



PERICLYMENVM rectum vulgari multo humilius est, humanaque altitudinem rarissime attingit: multo graciliores & rariores habet ramos albicante cortice testos: folia priore teneriora, longiora, in ambitu nonnihil serrata, superne virentia, inferne minus incana, quam primitivellus germinibus enascuntur inter folia graciles pediculi unum interdum, sed binos ut plurimum flores

sustinentes, superiore minores & teneriores, non pallescentes ut illi, sed purpurascētes, quibus succedunt gemelli fructus aequae magni ac in priore, etiam aequales, nigri tamen, non rubri, succulenti, gustu ingrato. Radix dura est & lignosa.

Synon.

Clus. hisp. & hist. Periclymenum rectum 2. (ut & Lugd.) germ. Austriacis & Styriacis *Hundsbier*. Tab. ic. Periclymenum rectum 2. Sabaudicum, *Auffrecht Waldwind*: hoc ei quintum in hist. Ger. Periclymenum rectum Sabaudicum, *Saros Hoinfuchles*. C.B. pin. Chamæcerasus spuria 2. sive alpina fructu nigro gemino.

Locum
Tempus.

Rarum est in vertu, & unicum fruticem in Pyrenaeis montibus; binos aut tres apud Allobrogos in Sabaudicis; deinde frequentiores variis montibus Austris & Styria inveniebat Clusius; floret cum aliis Periclymeni generibus; semen Iulio maturat.

CHAMÆCERASVS GESNERI, VEL
Chamaependlymenon quoddam
Alpinum.PERICLYMENI HUIVS ET
sequens flores.

Frutex ligni meo *Defin.* dulla alba, facie tota ad Xylosteum aliquatenus accedit; brevis ille quidam, licet sit uti quatuor cubitos aequet, ramis adversis, fragilibus, cinereo cortice obdusis, folia Xylostei jam dicti, sed majora multo, acuminata, hirsuta, potissimum subtus, nec usquam serrata, binaria opposita; flores longiusculi, ad florem Periclymeni recti, seu Xylostei, accedentes, in stipulato hiantes, tubentes, ex adverso suis pediculis, longis, ex alis foliorum exortis insidentes; fructus ruber interdum geminus, tanquam ocellis rotatus, ex longo pediculo, Cerasi similis, succo insuavi & amaro plerumque, in se continet grana sex septemve aut plura, alba, lata.

Frutex hic si *Pe- Periclymenon rectum* cognatus videtur, Chamæpericlymenon appellabimus (inquit Gesn. in hist. Cordi) interea Chamæcerasus nuncupemus: nam & montium nostro-

rum incolae *Beigfrische* appellant, h.e. Cerasa montana. In literis quidem quod sciam, nulla hactenus ejus memoria extitit: Cerasa rubra sunt veris similissima, paulo minora, succo subamaro, croceo per maturitatem; semina sex septemve aut plura; fructus quidam gemelli videntur, gustu ingrato: singuli tanquam ocellis aut pupillis rotantur; folia Cerasi vel Arbuti, sapore ingrato, medulla ligni alba. Vocat de hort. cum Simlero de alp. Chamæcerasum montanum veteribus inditum.

Lob. Adv. Chamæcerasus sive alpigena humilis *Cerasa humilis*. Cerasus; floribus albidis, pallentibus aut luteolis, fructu binis; gigantis quiris aut feris; Obs. Chamæcerasus alpigena, (ita & ic. & hist. Belg.) Xylosteum alterum quorundam Chamæcerasus Cordi: Clus. hisp. Periclymenum rectum 2. *Chamaependlymenon*. *Periclymenum* 4. floribus gemellis nunc ex purpureo candicantibus, modo purpureis, fructu plerumque unico, rubro, succulento, transparente, duplici summo, ubi flores inhaerebant, stigmatibus notato, sed unicum granum [plura ego semper observavi] continente

nente. Cui non probatur eorum sententia, qui Plinianam Chamæcerasum esse existimant: cum ejus fructus nullâ saporis gratiâ commendetur, nullamque habeat tota stirps cum Ceraso affinitatem. Sed magis verisimile judicat (imò verissimum nostro judicio) Plinij Chamæcerasum non esse diversam ab ea, quæ plurimis Pannoniæ & vicinarum quarundam provinciarum locis spontè provenit, cujus historiam lib. 2. h. n. g. titulo Cerasi pumilæ prosequuti sumus. Nec ipsi satisfaciunt qui Ficum Idæam Theophr. lib. 3. hist. cap. 7. esse volunt: nam hæc planta nullam notam habet cum ipsius, nec cum Pliniana Ficu Idæa convenientem. Hæc Clusius, cujus iconem exhibemus sculptam sine floribus, quos in secunda tabella 1. loco depingimus: sicuti 2. loco sequentis flores exprimimus.

Xylosteum. Dod. in fol. figuram habet Plantini, & describit sub titulo Xylostei alterius, dicens, omnino humilem esse fruticem, cui nomen idem, quod Xylosteo posteritas dederit, cujus minor ac humilis species habeatur ac dicatur: falli qui Chamæcerasum appellant, cum non parum differant.

Tab. 1c. Periclymenum rectum 3. ut & in hist. ubi sexti titulum ei præponit, ac temerè flores appingit. Hæc planta apud Lugd. Idæa Ficus, vulgò Frangulæ, nomine exhibetur, ac pro Halimo Tragi & Loniceri depingitur, aliorumque Chamæmepilus esse dicitur. Sed eorum sententiam magis probat Dalechampsius, qui Idæam Ficum hunc fruticem esse putant, quod ejus historia à Theophr. descripta lib. 3. hist. cap. 17. huic sententiæ ad stipulari videatur: de qua Plinius lib. 15. cap. 18. ubi Alexandrinam vocat. Eandem rursus Lugd. Chamæcerasi Alpina titulo à Lobelio picta tradit, utemque Chamæcerasi Cordi, Xylosteique alterius quorundam, atque, quæ Pena tanquam de rara planta scripserit, Idæam Ficum ostendere videri. Hæc Lugd. qui confundit Periclymenum tertium Dodonæi sive Halimod Tragi & Loniceri cum Ficu Idæa Dalechampi. Nescio quis vocavit Chamæmepilum. Miscet etiam cum Alno nigra quæ Frangula Matthioli, duasque habet figuras ejusdem plantæ.

Reperitur H. Lugd. Confusio H. Lugd. **Synon. C. B.** C. B. pin. Chamæcerasus spuria 1. sive alpina fructu aliquando gemino in uno pediculo, rubente, aliquando ex toto coeuntibus seminibus in bipartito conceptaculo, in quolibet duo aut tria sine offe. Periclymenum rectum vel mas Gesn. h. Chamæcerasus, Cast. Xylostium aliis, quasi lignum osseum, ob ligni duritiem dicitur. An Corno similis frutex in alpinis, Cæf.

Locus & Tempus. Reperitur propè Genève in monte Salevæ & in Thuiri cum fructu Julio. In Wallenburg ditione Basileensium, & in montibus Wassersal cum fructu maturo Augusto. Plantata in horto feliciter provenit. Glaronæ circa Fabarias thermas alibi & Tiguri etiam in Albio monte nascitur, matura in fine Septembris; locis frigidioribus Augusto. Floret una cum Periclymenis, ait Dodon. fructus Augusto perficitur. Ex Germania in Belgium illatus frutex est. Frequens est Clusio in montibus Pyrenæis & Allobrogicis sed omnium abundantissimum in Pannoniis, Austriacis & Stiriacis, præsertim supra monasterium Neuberg, ubi, & in reliquis vicinis Alpibus plurimum provenit, florens Aprili & Maio, fructumque Julio & Augusto plerumque perficiens.

Vitis. Chamæcerasi montani nullum esse usum putat Gesn. audivit quidem quatuor aut quinque cerasa devorata vomitum eieci: aliquando etiam alvum.

Varius. alvum.

PERICLYMENVM RECTVM

fructu caruleo.

Descriptio. Eiusdem cum Periclymeno serrato folio altitudinis, sed crassiusculo est stipite, multos in ramos



diviso; nigricantes cortice obductos, qui scaber est, & plerumque multis locis hiat: interdum statim à radice in multos ramos sese dividit: tenelli ramuli purpurascunt, & incana lanugine pubescunt: folia contrario situ inter se disposita, ut in reliquis Periclymeni generibus, illi quod rubras baccas fert non similia, exsiccantis & amarissimi gustus: flos non fuerat Clusio cõspectus cum hujus historiam pri-

mum evulgaret; quandoquidem sub finem Julij solummodò observatus frutex suo maturo fructu onustus: at aliquot deinde annis elapsis, semine nata stirpes, tertio à satu anno, flores è tenellorum ramorum alis pediculo inhaerentes, protulerunt geminos [has cum præcedentibus floribus 2. loco depictos dedimus] rudimento fructus, ut cæterorum, innixos, pusillos, pallecentes, cævos & in quinque lacinias divisos: ut reliquorum Periclymeni surrecti generum flores, è quorum umbilico prodeunt quinque staminula flava appendice insignita, fructus singularibus baccis, utrimque inter folia brevi pediculo dependentibus, constat, Chamæmepilo Gesneri magnitudine æqualibus, sed longioribus paulò, coloris cærulei, quæ vino & acidiusculo succo plenæ, manus rubro colore inficiunt, & multa plana grana continent: radix lignosa latè diffunditur, & mulus fibris prædita est.

Videtur nobis habere multa communia cum Chamæceraso Gesneri. Clus. pan. Periclymenum rectum 1. fructu caruleo: Eid. hist. Periclymenum rectum 3. Tab. 1c. Periclymenum rectum 4. In hist. Periclymenum 7. Proponit autem descriptionem Clusij, & figuram à Lobelio exhibitam pro Chamæceraso, cui appinxit flores ad descriptionem effectos. Ger. (qui figuram Tab. 1c. tam proponit) Periclymenum rectum germanicum Germany Honyusdica. C. B. pin. Chamæcerasus spuria 3. montana, fructu singulari caruleo.

Crescit sponte ad radices cujusdam montis pago Maluz vocato contigui, ad sinistram à via quæ ad Taurum, superioris Stiria Salzburgensem ditionem pertingentis præcellum montem, ducit: nunc autem semine natum in quibusdam horis alitur. In Pannonia fructum diligenter colligunt, atque in tinctorum usum reponunt.

PERICLYMENVM PARVVM PRV- tenicum Clusij.

Descriptio. Ad Periclymeni etiam genera procul dubio referenda est elegans hæc planta, quæ cauliculis dodrantalibus est, quibus quatuor, sex, raris octo adherent folia ex adverso per intervalla sita, Phillyreæ Narbonensis, sive mediæ foliis similia, sed paulò majora, magisque nervosa, in mucronem delincentia, quinque costis ab ipso pediculo ad mucronem excurrentibus. E supremorum foliorum cavis duo veluti ramuli exeunt binis foliis eodem modo quo in caule, dispositis præditi, qui cacumine quaternaria

Solanum scandens. C.B. *Solanum scandens*, seu *Dulcamara*, à corticis sapore: Schvv. *Solanum rubrum*, *Solanum* *γλυκύμηλον* (ut & *Thalio*) flore saepius violaceo, rarius cado. Dulcis amara flore pleno, & fleruleo vulgarior, Eyst. *γλυκύμηλον* & *γλυκύμηλον*, sicut & *γλυκύμηλον* nominatur Græcè: Lat. Amara dulcis, Amarum dulce, Amarus dulcis & Amaro-dulcis, & *Dulcamara*, seu *Dulci-amara*: Ger. *Je lenger je lieber*, *Bynschfraut*: Belg. *Alfranc*: Gall. *Dulce amere*: Angl. *Sour bitter* & *selin Woord*: Boh. *Schlada Borka*.

Locum. Glycypicis aqua plerumq; subesse indicat. Aquosa enim & rigua amat, & hunc circa scrobes & fossas frequenter reperitur, sepibus aut fruticibus aliis innitens. Ramulus in aquam impositus, brevi radicularum emittit, instar Salicis. In terra etiam putant Gesn. surculum defixum facile crescere. Folia Vere erumpunt: flores Julio exeunt: Augusto baccæ maturæ sunt. *Monspeli*, *Patavij* & *Genevæ* floret Aprilis & Maio; *Basileæ* Julio & Augusto. Alui in horto flore albo.

Vires. Morbum, quæ patrio nomine (inquit VVeicrus) Warm vocant VVeistphali, feliciter potiunculâ curant ex *Je lenger je lieber* radicibus aliquot diebus exhibitâ, ex qua manet sudor gratus sequitur; nec abs re interna enim obstructione liberat, & ex ea ortos morbos solvit urinâ ciet; quare & contra hydropem cum fructu exhibetur. Accipe, præceptore Trago, lignum de hac planta libræ pondere, ac minutim in frutula tali ludicri instar concide, dein cū mensura vini albi in novâ ollam eamq; operculo (per quod tamē foramen in medio exiguum transfigito) probè contectâ, ita quidē ut cū farina ex aqua undiq; oblinatur, reponas, superq; carbonēs lento igne decoquito supra tertias, demumq; his utare, hæc portio manet hora una priusquā surgas, & vespere cū lecto te cōmittere velis, cyathi vulgaris mensura sumpta, morbum regium, præterum in veteratū leniter per alvū & urinā exigit. Quidā hoc decoctū adversus putridas vetriculi febres, ex quibus morbus regius oritur, exhibent. Nota est hæc planta pastoribus: nā solent illam pecori à collo suspendere adversus morbum quæ vocant *die Bynsch*, unde Germanicū herbæ nomē natum est, ut *Bynschfraut* vocetur. Facultate, autore Dodonæo, foliis, fructu calida, resiccans, abstergens & digerens est. Fertur ruptis & ex albo præcipitatis, aut casis etiam succum utiliter bibi. Creditur siquidem concretū alicubi in visceribus sanguinē dissolvere, & partiū laxa: ū sanitatem procurare. Calefacit, siccatur (ait Schvv.) tertio ordine, abstergit, digerit. Gustanti primū nonnihil amaroris exhibet calore & acrimonia linguā feriens, quæ tamen ilicō abeunt, perstante dulciculo & imbecillo quopiā sapore Glycyrrhizæ ingratiore fastidiū pariente, magis magisq; dulcorem ostendendo. Potū moderatē, citra vitium dispendiū viscerūve incēdium, egent per sudores urināq; aquas: atque obstructions demolitur, quæ sunt ieteri præviæ atq; alumnæ. Eadem facultate lac māmīs suggerere fructusq; potis est. Baccæ ex vino 40 diebus splenem liquant, & per urinā & alvum absumunt. Bibitur ad Orthopnœam, reliquas à partu purgant. Folia foris utiliter cōtra inflammationes & pruriginolos pedum tumores admoventur, plēbis vulgato experimento. Attegiis & topiariis operi conveniret, nisi gravior esset fruticis odor.

HEDERA VETERIBVS ET IN genere. C A P. VIII.

Disce summa differ. *et.* VETERES de Hedera consulamus. Ea multas in specie differentias sortitur apud Dioscoridem: summas autem genere tres: candida enim quædam est, nigra altera, tertiæque vocata Helix: Candida quidem fructum fert candidum; nigra, quam vulgus Dionysiam vocat, nigrum, aut Croci æmulum; at Helix fructum non gignit, tenues autem habet

viticulas, folia verò parva, angulosa & rubra.

Theophrasto quoq; Hedera multiplex est. Quæ Theophr. dam enim humi repit, alia in altum accollit. Atque Homil. excelsarū genera plura, maxime verò tria pateſcunt, Excelsa candida, nigra, tertiāq; Helix (i. e. Clavicula Gazæ, sed male.) Hirumitē species plures. Alia enim fructu solo, alia etiam foliis candida est. Rursus fructū tantū cādūm ferentiū, quædam grandiorē, densum, & veluti in orbem circūactum fructū producit, quam nonnulli Corymbian vocant, Athenienses Acharnicā, quæ in riguis nascitur, quædam minorē, sparsiorē, nigræ modo. Habet & nigra differentias, sed non ita perspicuas. At Helix [Clavicula Gazæ] maximis differentiis distinguitur. Etenim foliis plurimū differt, tum quoddā minorā, tū quoddā angulosa & concinniora sint. Sic Plinius & Gazæ interpretati sunt *γλυκύμηλον* & *γλυκύμηλον*. Quare Cornarij non placet emendatio, quæ in hac foli. r. Helicis delineatione apud Dioscoridem, *γλυκύμηλον* & *γλυκύμηλον*, i. e. folia habet tenuia angulosa, & rubra. vocem *γλυκύμηλον* legi cum perſiceret, quod nullus in foliis Helicis rubor conspiciatur, eque falsū in vulgari Theophrasti codicibus *γλυκύμηλον*, quæ concinniora Plinius reddidit, hūc *γλυκύμηλον*, id est succulentiora legit, in Dioscoride verò *γλυκύμηλον* eadem significatione, id est, crassa. Hederis autem reliquis rotundiora, & simplicia. Differt etiam flagellorum [intern. diorum, Gazæ] longitudine, longius enim porrigitur [hac Gazæ omittit.] Præterea quoddā sterilis sit. Quidam Helicem aiunt Hederæ naturam adipisci, mutarique in eam, cū perfecta jam adoleverit. At si in eo genere omnes in Hederam adoleſcant (hederæſcere Gazæ verſus) ut nonnulli volunt, ætate sanè & æſtate, non genitæ constabit hæc differentia, qualis est Piri à Pirastro. Tamen ejus Helicis folium ab Hederæ folio plurimū distat. Rarè autē & in paucis evenit, ut vetustate cōmutetur, velut in Populo alba, & Ricino (Quæ si expressisse videtur Plinius. Maxime foliorum unius in suo cuique genere permanet, præterquam Populo, Hedera, Croton, quæ & Cici vocari diximus.) Sunt igitur Helicis [Clavicula, Gazæ] genera multa, maxime verò nota & summatia. Prima est virens sive herbacea, quæ plurima est, secunda candida, tertia versicolor, quæ in Thraciam quidam nominant. Et singularum differentiarum quædam sunt. Nam virentis alia tenuiore est & longiore folio [Plinius habet, in ordinem digesti] densioreque. Alia minus hæc omnia habet. Et versicoloris alia majus, alia minus folium habet, & versicolorum varietatem in eo diffimilem. Similiter & magnitudine & colore distant candidæ folia. Facillime augetur herbacea, & altissimè allurgit. Manifestum esse aiunt Helicem in Hederam transmutari, in Hederam non solum foliis quæ majora latioraque gerit, sed etiam germinibus: protinus enim recta gerit, non inflexa vel inclinata, tum ob tenuitatem, tum ob longitudinem. Nam aliis Hederis [Gazæ legit rotunda, id est, herb. a. a. pro xrisobus] breviora crassioraque sunt germina. Nam Hedera cum semen patit, sublimè & rectum germen edit. Est quidem Hedera omnis, radice numerosa, densa, intorta, lignosa, crassa, nec valdè in profundum acta, sed maxime nigra, & inter candidas quæ asperitima, maximeque silvestris. Quare non sine damno arboribus adnascitur: omnes enim necat & arefacit sublato ipsis alimento. Crascescit hæc maxime & arboreſcit in tantum, ut per se arbor fiat. Maiore autem ex parte super aliud vivere solet, caulibus suis vicinas arbores velut amplexat do, tale quid statim habens sua natura. Etenim è germinibus assidue radices per media folia emittit, quibus quasi de industria à natura datis, mures & arbores subit, & his pertinacius hæret. Atque ita sublato humore, atque exhausto, ipsis tabefact. Quod si inferius succidatur, durat, nec emoritur.

LIBER XV

Differencia a fructu. tur. Est & huius non parva differentia a fructu sumpta. Nam alius dulcis est, & alius valde amarus, tam candida, quam nigra. Id demonstrant aves, quæ alio vescuntur, alio minime. Duo genera Hedera prima, inquit Plinius, ut reliquarum mas, & femina. Major traditur mas, corpore & folio duriore etiam ac pinguiore, & flore ad purpuram accedente. Vtriusque autem flos similis est Rois sylvestri, nisi quod caret odore. [Turpissime lapsus hic Plinius, quia de Cisso audienda sunt, non de Hederis, id Hederis, non de Cisso tribuit. Nec apud Theophrastum, nec apud Dioscoridum Hederis differentia statuitur e sexu petita.] Species horum generum tres. Est enim candida & nigra Edera, tertiaque quæ vocatur Helix. Etiamnum hæ species dividuntur in alias: quoniam est aliqua fructu tantum candida, alia & folio: fructum quoque candidum ferentium aliis densius acinus, & grandior, racemis in orbem circumactis, qui vocantur corymbi. Item Selenitum cuius est minor acinus, sparsior racemus. [Hæc aliter legisse videtur Plinius quam in gratia exemplaribus exaratum sit, in quibus Selenitum vox deest & Hederam corymbiam vocari legimus.] Simili modo in nigra. Alicui & semen nigrum, alij crocatum: cuius coronis Poetæ utuntur, foliis minus nigris, quam quidam Nysiam, alij Bacchicam vocant, maximis inter nigras corymbis. Quidam apud Græcos etiam. num duo genera huius faciunt, a colore acinoru Erythranum [erythraea drakon, Dal.] & chrylocarpum. Plurimas autem habet differentias Helix, quoniam folio maxime distat. Parva sunt & angulosa concinniora; cum reliquorum generum simplicia sint. Distat & longitudine internodiorum, præcipue tamen sterilitate, quoniam fructum non gignit. Quidam hoc etatis esse non generis exultimant: primoque Helicem esse, fieri deinde Ederam vetustate. Horum error manifestus intelligitur, quoniam Helicis plura genera reperiuntur, sed tria maxime insignia: herbacea ac virens quæ plurima est: altera cædido folio: tertia versicolor, quæ Thracia vocatur. Etiamnum herbacea tenuiora folia, in ordinem digesta, densiora; in alio genere diversa omnia. Et in versicolori alia tenuioribus foliis, & similiter ordinatis densioribus; est alteri generi neglecta hæc omnia. Majora quoque aut minora sunt folia, macularumque habitu distant: Et in candidis alia sunt candidiora. Adolefcit in longitudinem maxime herbacea. Arborea autem necat candidiora: roneumque succum auferendo tanta crassitudine augeatur, ut ipsa arbor fiat. Signa ejus folia maxima atque latissima, mamas [non mamas, sed ramos, Bacchi] erigentis, quæ sunt ceteris inflexæ: racemi stantes, ac subrecti. Et quoniam omnium Ederarum generi radicola brachia, huic tamen maxime ramosa ac robu-

stata ea nigra. Sed proprium alba, quod inter media folia emittit brachia utting; semper amplectens: hoc & in muris, quamvis ambire non possit. Itaque etiam pluribus locis intercisa, vivit tamen duratque: & totidem interia radicum habet, quot brachia, quibus incolumis & solida arbores fugit ac strangulat. Est & in fructu differentia alba nigraque; Ederæ: quoniam aliis tanta similitudo acini, ut aves non attingant. Est & rigens Edera, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum ob id vocata cissos. E diverfo nunquam nisi humi repens Chamæcissos.

Kissos & Kissos Græcis, Hedera Lat. Hebr. koste Aruch & assu, Serap. Cissus appellatur: Germ. Ephem: Belg. Deyl & Elsf: Had. Jun. Gall. Lierre: It. Hedera: Hesp. Teda, & Edera: Angl. Jun. Brab. oft Ecedsuel: Boh. Brectom: Hung. Folya borostyan quoniam videlicet serpsit. Kissos autem dictam putat a Cisso, quem pusionem Liberi patris fuisse Græci fabulantur, & in nominis sui fruticem conversum: dum minister cum eo Deo saliens, allisus terræ petiit. Athenienses Cicion Bacchum ipsum vocant, & apud se Acharnis vico, Hederam primò natam voluit. Quin & Hederam Dionysiam, a Baccho Bacchicam appellavit antiquitas, hoc honore Liberum patrem dignata, qui primus ex India in Græciam Hederam asportavit: itaque in tutela Liberi patris putabatur esse. Nam ut ille juvenis semper, ita hæc perpetuo viret. Nec secus omnia, quæ ille mentes hominum illigat. Mavult Lobelius [Kissos leg.] dictum a textura porosa & spiraculis in numeris ferè pervia, quæ vinum transmittit, quale Catoni & Varroni Cithymbion poculum est: quam a pusionis Citti saltantis in Hederam poetæ deformatione a Baccho verbi, ut fingunt Græci: q. & Kissos pumex porosus lapis ob fistulolas cavitates ita dictus sit. Vel potius Kissos Hedera dicta est a Kissos, i.e. a verme seu curculione, in Hordeo & Tritico nascere, qui cuspidula, aut acu, potius quam ore triticum hordeumque terebrat. Latini ab edendo Hederam dixerunt: Et enim arborum importuna amassa, & veluti assentatrix, cortice rimosa impacta, macescentes vetustiores demolitur, & radicatis propagationibus arbores amplexa, enecat & exedit: præsertim illa species quæ major & arborea vocatur. Papeus verò dictam censet Hedera, quod hæreat, vel potius quod edita petat. Hederam poetæ cognominant etiam lascivam (propter amplexus arclissimos, & hinc circumferunt illud, Lascivis Hederis ambrosiosior) & comantem, quod olim in Anthisteriorum, i.e. Boracum festorum (videntur autem illa fuisse, quæ Latini vocant Bacchanalia) ludis antiqui hæc coronarentur. Hæc natum habetur adagium: Hedera post Anthisteria. Quam serò quippiam adhibetur.

Diff. fructu

Nomen lingua

Cisso

Fabula Poetarum

Hed. modo dicta

Ephemer

Proferens

Adagium

Error multorum



Totum.

HEDERA COMMUNIS, major & minor.

Prioricon ex nostris cunctis majori rem Hedera exhibet, & altera minorem. In censu earum quæ adminiculis sustententur, Hedera etiam communis occurrit referenda, licet tamen & per se non nunquam consistat. Et quidem sarmentis, quibus longo & errabundo reptatu proximis arboribus aut maceribus innixa, alta petit us quæ semel apprehendit pro radicis usa, barbitio fibrarum propagato radices in alieno solo agens, cortice magnâ parte rugoso, cinereo, in novellis ramis viridi, materie albâ, firmâ: folia nullo ordine pediculis semipalmatis & palmatis appendis, magna, nervosa, rigida, crassa, superne ex atro-virentia & splendens, inferne ad luteum tantillum ex viroro declinantis, sinuosa, ut

Icones

Defir.

Sarmenta

Cortex

Folia

quetra, alias rotundata in mucronem exacuuntur, sapore siccante & acro; flores in sarmentorum extremitatibus, sex radiis foliis herbido colore præditis constant, totidemque luteis apicibus in orbem circumacti simul multi umbellæ instar: corymbi succedunt per maturitatem nigri: acini singuli semuncia longioribus pediculis insident bacis juniperi-
Corymbi
arab.
Semina
Trag. fr.
arab.
Asplen.
Poët.
Discremen
Hederarum
est ad r-
Curant.
res. non so-
parent He-
deras.
Exculu
arborescit.
Solia ma-
ior.

lis æquales, sessiles & quasi utrinque compressi, circulo umbilicato, cui abest ille reliqui acini nitor, inscripti veluti opercula imposito urceolo, cuius centrum designat prominulus niger stilus: intus distinctis sepimento membraneo, nonnihilque pulposo, loculis continentur semina, unum, duo, tria, quatuor, quinque, oblonga, gibba, turgidula, curcutioni convoluta similia, cuticula tenui connecta, intus pulposa contractæ orizæ cum gluma sua, aut pulchellæ & panis syncomisto non abimilia. Tragus hæc proponat unam tantum figuram & unam descriptionem, duas tamen ejus species nasci tradit. Quarum priorem Hederam minimam, *κλεινὴν*, Hederam terrestrem, *ἡλικὴν*, Claviculam, Hederulam, germ. Klein Ephew nuncupat; Alteram vulgarem, geminam Ephew; Dioscoridis *κλεινὴν*, *κλεινὴν* *ἡλικὴν*, & (quoniam olim hæc Hederæ Bacchus coronatus fuerit) Hederam Bacchicam, Mysicam & Dionysiam cognominat. Dicitur hæc quibusdam *ἀσπλην*, quod ad splen faciat, nec non, *παιον* quod hæc Poëtæ olim coronarentur.

Passores Hederæ crescentem ornate Poëtæ

Hederam vulgarem porro, acinos ferentem, Theophrasti *κορυμβή*, & *ἀχάριν* *ἀπὸ τοῦ ἀχάρι*; Exiguam vero, quæ appetente Autumno colorem varium acquirit, helicem & Thraciam cognominat. Recenset autem Tragus quàm paucissimis omnem hederæ historiam, quod nullum ferè discrimen observari posse credat, nisi ab ætate ipsa. Omnem namque hederam, dum in tenera sua ætate assiduo reptatu per terram vagatur, triangularis figuræ folijs spectandam se præbere; quamprimum vero arbores murisq; in vaserit, ilico foliorum figuram variare ait, quod vel Theophrastus dixerit maximam hederarum differentiam in ætate ipsarum positam esse. Nos quoque non separamus Hederas nostras, sequuti sententiam Tragi, existimantes unum tantum genus reperiri, ratione loci, ubi crescit, & ætatis, formam mutans.

Hedera, ait Casalpini, frutex est peculiarissimæ sortitus naturam: non enim solum radicibus in terram dimissis vivit, sed & germinibus alimentum exsugit & arborum caudicibus, quas scandit, nam præcisa juxta terram, non emoritur tamen, nisi à totis caudicibus avellatur; frequentissimas enim, easque breves per tota germina radículas, centipediæ animalis modo edit, quibus pertinacissimè heres arbores suffocat, & ædificia (quamvis robusta) tandem demolitur; expetitur tamen vitidarius; nam sponte nullo adminiculo totos parietes circumvestit, fronde perpetuâ exornans; ex cultu arborescit, caudice satis crasso, & ad magnam altitudinem latitudinemque distenditur, nisi desit quod amplectetur, cum ad eam ætatem accesserit, in qua fructum ferre possit, totâ mutat faciem, naturamq; nam per se erigitur, & quidem in tantum aliquando, ut nullum relinquatur conjunctionis vestigium cum repente Hedera. Quamdiu enim affixa est, folia fert in plures angulos desinentia, ad summum quinq; quorum duo utrinque prominent, unus in summo folio: quo autem magis adolescit, folia & pauciores edunt angulos obtusioresque, & ipsa majora fiunt, ac virentiora, & unicolora, cum ab initio eadem pusilla sint, nigra, & maculis albis distincta, aliquando inferne subrubentia; cum autem erigitur, folia rotundantur oblitteratis ex toto utrinque an-

guli omnibus, solo eo, qui in summo est, relicto. differentias alias non ætatis, sed generis adhuc non vidi, quamvis Dioscorides tria afferat genera: Theophrastus quoque & Plinius eadem tria in alias plures differentias distribuunt, pro sua autem magnitudine, sapore, & colore foliorum: sed de Helice, ambigit Theophrastus, utrum generis an ætatis sit differentia, ut multi putant, primum fieri Helicem, deinde vetustate in Hederam transire: appellant autem hederascere, & in Hederam transire, cum erigitur nullis affixa, quando, & simpliciora sunt folia rotundioraque, cum in Helice sint parva, angulata, & concinnè disposita ac sine fructu: commendat Plinius eandem genere differre maximè ob foliorum varietatem in Helice. Quandam enim herbaceo folio virentisque, aliam candido, tertiam verticillori constare, quæ Thracia vocetur: eandem Dioscorides tradit rubro folio, quod nemo alius notavit, sed non cogimur ob hæc Helicem genus diversum ponere cum in ea, quæ manifestè hederascit, variam foliorum & germinum naturam contemplerur, quod in paucis aliis reperitur, ut notavit Theophrastus: sit verò alicubi, ut Helix nunquam hederascit ob imperfectionem quandam, non speciei, sed individui, ut in arboribus plensque accidit. Patet ergo quàm quidam sine rationibus nos non habere Hederam contendant.

Dod. gal. duas habet figuras dicens ex tribus Dioscoridis Hederæ generibus priorem albam, Hederam feminam Plinij, nobis esse incognitam; secundam speciem Hederam nigram & *ἡλικὴν* Plinij, hederam marem esse, Neotericorum Hederam arboream, Hederam muralem, Gallis *Liaire noir*. German. *Schwarzer Eppich* & *Maur Ephew* aut *Baum Ephew*. Belg. *Ueyl*. & *Boouen wyl*. Tertiam vero speciem *ἡλικὴν*, Claviculam & Hederulam dici, Gall. *Petit Liaire*, Germ. *Klein Ephew*: Belg. *Eleyne Ueyl*. Dod. lat. autore Theophrasto Hederam in majorem & minorem distinguit: majorem rursus in candidam, nigram, & Helicem, cujus plures species Theophrastus tradat. Caterum, majorem sese in altitudinem attollentem aut assurgentem, Theophr. *κλεινὴν* *ἡλικὴν*, Gazam excelsum, Plinium rigentem Hederam, dicere scribit; recentiores vero Hederam arboream, quod arbores complectatur: muralem, quod secundum parietes nascatur: Esse tamen qui velint omnem assurgentem arboream cognominari, quibuscunque tandem illa concendens adhaereat, ad differentiam nempe alterius Hederæ terrestris per humum repentis. Minor denique, ait Dod. nigram similis est, ac *ἡλικὴν* vocatur; germanic. *Klein Ephew*. Dicitur & *ἡλικὴν* differens, tamen multum ab Hedera terrestris alibi describenda. Helicem sive Claviculam latine nuncupatam *Helix*, non pauci latini hanc existimant, sed Theophrastus *ἡλικὴν* ab *ἡλικὴν* differentem ostendit. Tertiam enim inter assurgentes facit.

Nec plures duabus (Hedera majore seu arborea & Helice sive minore) novit nostra ætas, ait Lobelius, differentias genericas: tamen si quamlibet multas dixerit species Dioscorides. Majoris multæ decernuntur varietates, quæ antiquis persuadere potuerunt, ut plures differentias, sive species statuerint. Hujus quædam arborescit, suapteque stat stipite, nulli innixa pedamento, qualem in sylvis quibusdam Angliæ meminimus, *Orthocissum* antiqui dicunt. Interdum etiam quibusdam locis xerampelino colore folia nitent. Pisis nobis ostendebant herbarij corymbos casij & albicantis coloris. Melanos subsuscos corymbos pleræque plantæ sicut in Italicis & Germanicis ex Campania & Apulia, hodie maturat. Humilis planè minor & infrequentior concinnè vocata Helix fuit, quia secundum sarmentosa stipes exarat

Theophr.
ambigit an
Hederæ
hæc sit ab arbo-
rea.

Plinio ge-
neris d. hederæ

Plinij opo-
nio repro-
batur.

Dod. gal.
concedit.

Hedera
major Dod.
domes.

Hedera ar-
borea.
M. gal.

Hedera
minor.

Hedera
Helix.

Differ. Lob.

hera clavículas, capreolove viticeos, qui humi pinguuntur, & propagatione quadam quasi in spicas & anfractus provolvuntur: interdum etiam serpen- do muscidis truncis & caudicibus advolvitur gra- cilioribus lumentis. Hæc Lob.

Prior vocatur à Matth. Cast. Lugd. Brunf. Gesn. h. (qui hujus speciem tradit luteis baccis) & Tab. He- deræ scandens, major, & arborea; à Trag. Ang. Cord. in Diosc. Dod. & Cam. ep. Hederæ; à Lon. (qui quamvis solum unius iconem exprimat, attamen tres ejus species nominat) Fuchf. Dod. gall. & Lac. Hederæ nigra; à Lob. Hederæ corymbosa commu- nis; à Tab. ic. Hederæ corymbosa major arborea; à Schv. Hederæ baccifera. Altera autem Hederæ mi- nor sive humilis à Matth. Fuchf. Brunf. Dod. Lac. Cam. ep. & hist. Lugd. Lon. Czf. Tab. & Ger. He- deræ helix; ab Ang. Hederæ sterilis; à Lob. Helix si- ve provoluta sterilis Hederæ; à Gesn. h. Hederæ ar- boreæ silv. genus semper repens; à Thal. Hederæ species; Helix vocatâ à Cast. Hederæ minor; à Schv. Hederæ minor reptans; à C.B. Hederæ; major ste- rilis: Eid. Hederæ 4. humi repens; Hederula Trag; Hederæ minor, *ὀνήνη*, Dod.

Hederæ passim nascitur ad arbores, in silvis, cam- pis, & hortis, & ad adinctorum muros. Sylværum opaca arida & strosa perreptat. Plutarch. in Ale- xandr. memoriæ prodidit Babylonicam regionem non ferre Hederam, rationemque reddit, quod ni- mis sit calida, cum loca frigida amet. Ederæ jam dici- tur apud Plinium in Asia nasci. Negaverat Theo- phrastus, nec in India, nisi in monte Mero. Quin & Harpalum omni modo laborasse, ut fereret eam in Medis, frustra. Alexandrum verò ob raritatem ita coronato exercitu, victorem ex India rediisse, e- xemplo Liberis patris: cujus Dei & nunc adornat thyrsos, galeasque etiam & scuta, in Thraciæ popu- lis in solennibus sacris. Inimica arbori fatisque om- nibus, sepulchrâque ac muros rumpens: serpen- tium frigori gratissima, ut mirum sit ullum hono- rem habitum ei. Hederam vidi in monte Saleve trunco crus æquante & sæpè crassior in plurimis Helvetiæ locis. In Castello l'Abbatie reperi seren- tem resinam rubram, odoratam, pellucidam, gustu acrem, chartam imbuentem olei instar, igni admo- tam, flammam concipientem, ut cætera resina.

HEDERÆ DIONYSIAS,

Dalechampi.



EX congeneti- bus nigris fo- lium habet minus atrum, minimè an- gulosum, crassum, carnosum, venosum, in acumen fastigia- tum, nec admodum densum: in corym- bis acinos luteos aureo nitore ful- gentes, ex conge- neribus aspectu ma- ximè pulchros. Hæc radicosis brachiis reliquarum modo vicinas arbores o- necat, succo earum exhausto. Rard in Gallia provenit.

B. pin. Hederæ 2. poetica: Hederæ

Dionysias, & Chrysocarpos Dalechampi, Lugd. Dionysias, aut Bacthica, quod ex Poëtarum co- Tom I.

ronæ confuerentur: Chrysocarpos, à fructu colore aueo.

HEDERÆ EQUIVOCA.

Præter Hederam communem & Dionysiam Da- lechampi, plures aliæ occurrunt plantæ Hederæ nomine donatæ, de quibus suo loco agemus, ut de Hederæ Cilicia Theophrasti, sub Smilace aspera hoc libro. Equivocè quoque, ob græci nominis simili- tudinem Hederæ nomen transi in Cistum marem & feminam, quibus flos Rosæ sylvestris inodorus, ut Plinius scribit ex Theophrasto, ubi in versione Gazæ, pravâ tamen lectione *κισσός* legitur non *κισσός*: de Cisto lib. 13. Sed & Chamæcissus herba Hederæ humilis, seu terrestris nomen sibi vendi- cat, ut videre est lib. 23. Per Hederam arboream sunt qui intelligant Apocynon Dioscoridis, minus rectè, in remediis ad gangrenam Theodorico, de quo paulò post, ut & de Smilace laxi, sive Convol- vulo majore, quem Hederam arboream cognomi- nat Dalechampus. Hederam terrestrem suspica- tur Dodon. Volubilem minorem, sive Helixinem Cissampelon, ut infra dicemus. Et non etiam *κισσός* Constantino *μαλακός*, h. e. Hederæ mollis dicitur. est hæc nobis Helixine Cissampelos, semine triangulo. Hederula [*ἡδερύλα*] seu Hederæ folium [*ἡδερύλα*] de Asclepiade dicitur apud Dioscori- dem. Tandem præter dicta genera esse & rigen- tem Hederam, per se stantem, & ob id solam om- nium generum vocatam esse Hederam, tradit Pli- nius: hanc Cæsalpinus Agnifolium esse censet: sed in Theophrasto non aliam intelligit, quàm ætatis perfectæ Hederam. Tandem quæ Hederula a- quatica & palustris à Lobac. Tab. & Bauh. phyt. vo- catur, à nobis Lenticula aquatica trifurca inscribi- tur. Quam demum Hederam saxulem C.B. cum Lobelio cognominat, est Alarina sterilis Sevenz Narbonensis agri.

VIRE ET TEMPERAMENTUM.

Omnis Hederæ, autore Dioscoride, acris est, ad- stringit, nervos lædit. Flores ipsius quantum ipso- rum tribus digitis capi potest, accepti & in vino po- ti, faciunt ad dysentericos, sed bis per diem bibere oportet. Faciunt & ad ambusta cum cerato triti. At tenera folia cum Aceto cocta, aut cruda cum pane trita, spleni medentur. Succus foliorum & corym- borum cum irino oleo, aut melle, aut nitro, naribus infunditur, & ad veteres capitis dolores commodus est. Irrigatur & ex eo caput, cum aceto & rosaceo. Aurium dolores & purulentas aures, cum oleo sa- nat. Cæterum nigræ hederæ succus & corymbi poti, debilitatem corpori inducunt, & amplior usus men- tem turbat. Acini verò corymborum quinque triti, & cum rosaceo in malcorio cacti, & in opposi- tam aurem instillati, dentium dolores mitigant. De- nigrant item capillos corymbi. At verò folia cum vino cocta ad omne ulcus imponuntur. Eadem im- posita velut dictum est cocta, ambusta, ulcera mali- gna, & maculas solares curant. Movent & menses corymbi triti subditi, & post purgationem drachmæ pondere poti, conceptionem impediunt. Sed & fo- liorum pediculus melle tinctus & utero appositus, menses & foetus educit. Succus autem naribus in- stillatus, graveolentias & putredines expurgat. La- cryma verò hederæ illita, pilos abolet, & pediculos occidit. At radicis succus cum aceto potus, com- morsus à phalangis opitulatur. Hederæ (inquit Gal. 7. simpl.) ex contrariis composita est facultatibus: habet enim quiddam adstringentis substantiæ, quàm ter- renam & stigidam esse ostendimus, habetque etiam nonnihil acris, quàm calidam esse vel gustus com- probat: nec deest tertia, aqueam namque substan- tiam quandam tepidam obinet, certè si viridis sit.

Vlcera.

Siquidem dñi arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manetq; quæ terrea est & frigida adstringensque, & ea quæ calida est & acris. Viridis autem, foliis ejus in vino decoctis, ulcera grandia conglutinat, quæque maligna sunt sanat, cum igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores autem ejus quodammodo validiores sunt, & ad lavorem redacti cum cerato ambustis conveniunt. Præterea succus medicamentum est errhinum, h. e. in nares fufum, capiti purgando idoneum, tum vetustas aurium fluxiones sanat, adhuc vetera ulcera tum in auribus tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo aut dulci oleo miscetur. Lachryma ejus pediculos necat, pilis nudat, usque aded calidæ potestatis, ut obscure adurat, est enim veluti aqueus quidam liquor, sicut omnes alie lachrymæ. Hederæ mira natura traditur à Plinio ad experienda vina, si vas fiet

Hederæ.

Ex Plinio.

Vas lignum.

ad experienda.

vina.

Iguaria.

Venerem.

exhalat Hederæ.

sufficit.

Calculus.

Pulsio Hederæ.

Dysenteria.

Siccus.

Menses.

Epilepsia.

Vlcera.

aperta.

restituta.

Epilepsia.

Vrina.

Frigidi articuli.

doloris.

Prognosis.

cum de vlcere.

tibi a flore.

Hederæ.

ex ligno ejus, vina transfluere, ac remanere aquam, si qua mixta fuerit. Theophrastus igniaria ex ea materia heri testatur, quoniam calida. Plutarchus auctor est, Hederæ suffuturam in Venerem trahere, & ebrietatem, ut vinum, inducere, furorēque efficere animi. Insignis vis seminis Hederæ nigræ, si vera quam Bayrus illi adscribit. Semen ait Hederæ nigræ facit cadere pilos & enasci non sinat. Acini Hederæ tusi ac pondere drachmæ in vino sumpti, calculum ex pellunt, experientia Tragi id attestante. Folia Hederæ cum aceto decocta ac lienī imposita, dolores ejus sedant. Hederæ florum siccatorum pulveris quantum trium digitorum apicibus comprehendas, ex vino bibitum, fluxum dysentericū sistit, ut legitur apud Matthiolum: Succus ē foliis cum vino acidulo tribus continuis diebus lienosus potu juvat: quibus etiam opitulatur pocula ē ligno vel radice Hederæ confecta. Acini drachmæ pondere cum vino assumpti, mirificè calculum pellunt. ad menses suppressos minimè fallax traditur remedium, si acini tres Hederæ arboreæ in pulverem triti, cum aqua stillatitia Pulegi & paxillo Croci bibantur calidè, idq; mane diebus aliquot continuis. quinque aut sex acini ante poculorum certamen comest, ebrietatem arcent. vapor ē decocto foliorum utero exceptus menses ciet ad cephalalgiam, sumuntur folia Hederæ septem, totidemque Persicorum delibrati nuclei, simul ambo in aceto & oleo rosaceo bulliunt, atque ita calida fronti & temporibus inducuntur. Ut cauteriorum ulcera aperta maneat, imponitur quotidie Hederæ folium, quod & humiditatem omnem exhaurit, & ne quicquam sinistri accadat prohibet. Mulierculæ ē solus Hederæ pileolos confectos capitibus imponunt infantum, quos achores infestant, siccant ita & certò curant. Sunt (prohibente Camer.) qui non sine utilitate contra epilepsiam exhibeant Hederæ lignum. Corymborum pulveratorum scrupulus unus ex aqua Menthe aut simili, efficax ad ventriculi dolores, alicubi & peste correptis exhibent, quibus sudores eliciunt potenter. Sunt apud Dodonæum, qui Hederæ corymbos ad ciendam urinam efficacē afferat, & calculosis ac nephriticis eapropter exhibeant. Nonnulli Tabern. teste, corymborum & foliorum Hederæ ex vino decoctum, aut eorundem pulverem cum vino ad febrium rigores exhibent. Valent eodem modo ad urinam ciendam. Ex corymbis exollatur oleum eo modo quo ex baccis Juniperi: alij oleum ita eliciunt ex corymbis, ligno & gummi. Prestant est oleum ad frigidos articulorum morbos. menses ciet, calciplos pellit, sordida ulcera exterget. Ad capitis dolorem accipit VVirt. Empir. Hederam quæ supra terram provenit, macerat in luxivio, quo abluit caput. Sebastianus Feudinger Pincerha illust. C. VVirtemb. homo curiosus affirmabat

anno 1605. quo hæc scribimus, se observare ex Hederæ flore hoc anno futuram coram vini, quia circa natalitium Domini nostri cilium floreret non defluxisse flores, ita non defluxuros etiam vitium flores, unde sæpè deficiunt Vvæ & vinum. Lignum Hederæ de radice resectum, ubi c assius esse consuevit, à sutoribus in eum usum parari solet, ut postquam cultellos suos ad corium dissecandum idoneos ad cotem exacerent, asperiores etiam nunc illos æquales levigatosque reddant ad dictum lignum ultra citraque ducendo. quod autem præ aliis idoneum esse judicatur fortè ob molliem substantiam ipsius, quæ tangentibus se talem offert. Vendibilis vini signum Hederam olim extitisse, probat illud vetus adagium: Vvino vendibili non opus esse Hederam suspensam. Exponit autem hoc dictum Erasmus, veram virtutem non egere alienis præconiis: aut res præclaras per se placere, neque desiderare exoticam commendationem.

Goreum
Hederæ pro
sutoribus.

HEDERÆ LACHRYMA.

Leba quæ Hederæ gummi nomine in officinis Desprostant, ex saturo rubore ferè nigrescunt, vitreo nitore, sed non pellucido, durâ latius compactaque consistentia, non tamen uniformi, rubiginosis intercurantibus micis: haud difficulter in pollinem redigitur, saporem imprimens siccum adstringentem, haud in jucundum, cum levi quadam amaritudine, salivam croceo colore tingens. Candele admodum claram & pertinacem edit flammam, nidore se-Thuris, & ne vel tum quidem liquefcit. admiscetur reperitur interdum Hederæ folia. Ipse etiam ex Hederæ lachrymam collegi Genève circa l'Abatiè dictum locum, anno 1570. mense Aprili, similem ei, quæ in offic. prostat.

GRANADILLA HEDERÆ
similis. C. A. P. IX.

Allatus Monardi ex Continenti herbæ fructus Locus. Est, quæ in Peruanis montibus, ubi spontè nascitur, Granadilla appellatur, quod nomen illi imposuerunt Hispani ob similitudinem quam cum Malis granatis habet, nam ejusdem serè est amplitudo, dinis, æque etiam coloris, quando maturus est, nisi quod coronâ careat: in eo resiccat, si agitur, solum edit semē intus oclusum, pyri semini simile, alicquanto majus, tuberculis quibusdam eleganter, elaboratum & aspectu jucundum: pulpa candida est, & saporis expers. Planta hunc fructum ferens Hederæ similis est, eodemque modo repit & scan-ta. dlit, quocunque loco ponatur. Elegans est cum fructu ornulla conspicitur, propter ejus amplitudinem: florent habet albæ Rosæ persimilem, in cujus foliis alique veluti passionis Christi figure delineatæ conspiciuntur, quas magnâ diligentia illic pictas existimemus, eam ob causam elegantissimus est flos: fructus it si sunt granatula jam dicta, quæ matura acidulo liquore abundant, & semine plena sunt: aperiuntur ut ova, & liquor ille cum magna voluptate sorbetur eam ab Indis tum ab Hispanis: nec, etiam si multos fortheas, ullam ventriculi gravedinem, sed potius alvum emolliam sentis. Herba rara est, quæ duntaxat uno in loco invenitur. Fructus temperatus esse videtur, & abquantulum humidus. Granadilla etiam meminit Petrus de Cieca, parte 1. hist. Peruanæ c. 28. his verbis: Amplamiskâ vallem de Lile diñâ, in qua oppidum Cali, mediam fecat flumē, cujus ripe abundant fructibus ejus loci, inter quos grati admodum saporis & jucundi odoris est Granadilla nūcupatus. B. pin.

Diser plan.

Flos passio-

nalis.

Tempera-

mentum

fructus.

HISTORIAE PLANTARUM

illis, sed tamen eandem esse non concedit. Salsa parilla (inquit Alp.) est Smilax aspera: Smilax tamen Zacynthi insulae, ex qua Salsa parilla, a Smilace aspera in Italia locis inventa multum differt. Sed quicquid sit, Smilax aspera radices habet non tunc in Salsa parilla similitudinis fortiter quantum haecenus persuasum doctis quibusdam fuit, ut dicitur cap. seq.

Smilax. Smilax simpliciter dicitur Theophrasto & Anguillarum; Smilax aspera Diosc. Ruell. Matth. Fuchs. Turn. Cordus Diosc. (cui & Hedera Ciliata) Theod. Golio in onom. Dod. Euchar. Roesslini (cui & Smilax trachyna) Bellon. Obs. Acosta (qui similem facit Chinae) Gesn. h. Lac. Lob. Cam. h. & epit. Cast. Cels. & Lugd. cui & Volubilis acuta, vel pingens; Smilax aspera vera Trago; Smilax aspera fructu rutilo, Clus. hup. & hist. Smilax aspera i. fructu rubente, C. Bauh. Hedera Cilicia Plinio (& post eum Gaz.) cui & Smilax, Nicophoros cognominata: Milax, Galeno; Volubilis aspera, Lonicer.

Trago. Ceterum, in Tragi figura apparent aliqua spina in foliorum dorso, ut in Fuchsi pictura (qui Smilacem nascentem non vidit, sed ex sicca transmissa pingendam dedit) quae in nostra icone, quae Guarimiana, omittitur. Nomen etiam gallicum apud Fuchsum Phaeoles spinosus non placet: mallem vocare Liseron spinosus. In Matthioli imagine in foliis nulla spina: in post. comm. cum mag. fig. duo tantum spinosa. In figura per C. nerarium facta ad Hist. germ. & Ep. folia in marginibus spinosa. In iconibus Matthioli & Fuchsi, ex qua nostra quae minus placet, flores appichi tantum, cum quinque foliolis. Com. pil. Tab. Smilacis asperae tres ponit figuras, nec indicat quae in redifferant.

Smilax aspera. Smilax aspera Græc. Lat. Smilax aspera; Ger. Stersend oder scharff Winden; ab aculeis quos habet apte denominatur: Gall. nostro iudicio, Liseron spinosus alius tamen Liser picquant, Tan. sive Smilax aspre: Ital. Ruvacervin: [Rubus cervinus sive Hedera spinosa] Hispan. gercu parilla, h. c. Rubivitecula appellatur: Angl. Scharpe Smilax. Aliqui inter notha Dioscoridis Hepatini cognominant, quasi lecorariam appellerent, alij Lycanthemon, quasi florem lupinum, alij Cynobaton, quasi sentem canis, alij Aniceton, quasi invictam, alij Heliophyton, quasi plantam solis, alij Anatolicon, hoc est Orientalem, alij Dyticon, occiduam, alij Helidem, Aegyptij Lyithe, Romani Merginam, Hetrusci Rhadian.

Smilacis vox. Smilacis vox, quod silentio non est praetereundum, valde est ambigua, ut quae quasdam cognatas vel similes plantas significet, ut Smilacem asperam fructu per maturitatem rubro, de qua in praesenti: Smilacem asperam minus spinosam fructu nigro, de qua mox; Salsam parillam Smilaci affinem, post dicendam.

Denotat & Smilacem levem, quae dicitur Convolvulus major Fuchsi. Dod. Matth. Lob. Rob. Constant. & aliis, a quibus dissentiunt Cels. & Turnerus: nos de Convolvulo postea agemus.

Smilacis levis speciem esse Volubilem minorem (quam nos vocamus Helxinen Cistampelon) satis manifestum Dodonæo. Eidem haud aliud est Scammonium, quam species Smilacis levis radice crassa. Celsalpino tamen Smilaci levi magis videtur convenire Gelsemium.

Cum Smilace hortensi phasiolifera, Cordo eadem est levis, de qua H. r. g. lib. 17.

Quasdam admodum discrepantes, & viribus plane contrariis pollentes, ut Smilacem arborem de genere glandiferarum de qua egimus inter Ilices lib. 7.

Smilacem quoque de Fraxino dici, ostendimus lib. 8.

Nec desunt indocti, qui magno sane errore Tatum Smilacem appellerent, ut videre est lib. 9.

Nascitur Dioscoridi in locis palustribus & asperis. Plinio autem in convallibus opacis. Dioscoridem imitatur Tragus, scribens, in superiori Helvetia uliginosis locis & tenebrosis provenire, quod non placet. Vbi enim legitur apud Diosc. in montibus malim legere cum doctiss. Dalechampio, vel Corn. malam Dioscoridis lectionem retinuit. Non nisi montosis & collibus servidiorum traiecit, Romania, Hispania, Linguagotia, pluri-
Tempus. mam provenire Lobelius testatur. Serius florescit, imò Autumno etiam ipso, cum suo fructu Octobri & Novembri florentem Clusius reperiebat: at frigidis regionibus culta & fictilibus adservata, Autumno duntaxat florescit, nunquam semen pergit. Magna ex parte altero duntaxat a satuo anno germinare incipit, nonnunquam & tertio. Perpetuo folia retinet: crescit variis Hispania locis, & in Narbonensi Gallia aspero & arido solo: nascitur & alius calidioribus regionibus: rara in Lusitania conspicitur. Monspelij olim observavi variis in locis, inter sepes locis siccioribus, florentem & baccasferentem autumno, quamvis toto anno habeat maturas & immaturas: folia in circuitu & in dorso spinis armata interdum ita destituuntur, vel rarissimas habent, ut non mirum si varie pingatur, ut Matthioli & Alpinus fecit. apud Frid. Meier vidi Smilacem asperam nitidorem in singulis vasis, quam hyeme reponit.

Folia fructusque contra venena efficacis antidoti vim habent, autore Dioscoride, sive ante, sive postea bibantur. Quin & memoriae proditum est, siquid ex his infanti recens nato tritum propinetur, nulla ei postea venena nocitura. Inciditur & ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta quibus venena arceantur. Plinius autem, ut ex ante dictis patet, alium utendi modum tradit, dum scribit, acinorum corymbos contra venenata omnia efficacissimos esse, in tantum ut acinorum succo infantibus sæpe instillato nulla postea venena nocitura sint. Smilacis asperae folia gustata acrimoniam aliquam habere, & si illis utamur calefacere legitur apud Galenum: alioqui calidam & siccam haud dubie Fuchsius credit. Fallopius cum in monte Iuliani Pisis vidisset Smilacem asperam, ea usus est loco Salsae parillae per biennium quod ibi fuit, saltem cum successu plurimos a huc venerea liberans. Certe nostratem Salsam parillam (quae Smilax aspera est, inquit Monardes) expertus sum simili facultate praeditam, cum illa, quae ex Hispania nova adfertur, ad quam magis accedit, quam ad eam quae in Honduras invenitur. Gustu insipido est, & sine acrimonia, nec ejus aqua, hordaceâ sapidior est.

SMILAX ASPERA MINUS SPINOSA, fructu nigro

Smilax cum priore sarmentis & claviculis pro-
Descriptio.xima quaeque amplectentibus nascitur, non est tamen adeo spinis horrida: folia etiam paulo breviora, atriora, molliora, nullis aut certe rarissimis aculeis obsita habet: flos alteri omnino formâ similis, sed colore differens, nam ex albo quasi carneus est, fructusque rudimentum, quod ex medio flore tanquam umbro prominet, rubescit, plenus autem & maturus fructus non est rutilus, ut in priore, sed omnino niger, & succulentior, quantum quidem Clusio videtur, officula conveniunt.

Smilax altera Clusij extremæ Baeticae incolis, sive de Perr. i. e. Vva carina, Lusitanis conterminis Romanis, Olyssipponensibus *Allegre-caron* appellatur. Icon hujus a Clusio hisp. & hist. proponitur cum inscriptione Smilacis asperae nigro fructu. Eandem etiam exhibet Lob. in l. sub hoc titulo: Smilax aspera al-

tera, facie Salsæ parillæ, aut congener. In obs. de-
pingit Smilacis asperæ & spinis varietatem, folio non
spinoso, sarmentosis viticulis, multo minus spinis
refertam; cæteroquin cæteris cunctis similibus, aut
iisdem, fructu nigro.

Ex his ita dictis clarum est C. Bauhinum in phyt.
multiplicare entia, nec sine errore Clusii Smilacem
asperam fructu nigro (quæ ipsi Smilax aspera 2. est)
& Lobelii Smilace aspera altera, facie Salsæ parillæ,
aut congener (Smilace ejus aspera 3. diversam sta-
tuere. Sed hunc errorem apud Matth. silentio invol-
vit, neutriusq; meminit: in pin. verd. correxit, com-
memorans & aliam varietatem foliis angustissimis
in Galloprovincia. Quam bene porro Clusii Smila-
cem asperam fructu nigro, cum Smilace aspera Lu-
sitania Tab. & Ger. (etiam adhuc in pin.) eandem
faciat, monstrant eorundem diversæ figuræ. Folia
in icone Clusii, sicut & Lobelii sunt absque spinis,
in Tabernamontani verd sunt spinosa.

Hanc plerisque Lusitaniz provinciarum locis, circa
sepes & collium convexa, & extrema Bæticæ parte,
qua Lusitaniz contermina est, Clusius cum priori
florantem conspicebat. Nobis visa est Heidelber-
gæ in horto D. Sprengeri Smilax aspera sine spinis.
Eadem etiam observata Argentine in horto D. Mei-
eri. Considerandum an eadem cum Clusiana: per-
pendendum etiam an eadem sit, quam Matth. in
post. comm. cum mag. iconibus exhibet pro Zarzæ
Parillia, de qua hoc seq. capite.

SMILACI AFFINIS SALSA parilla. CAP. XL

SALSA PARILLA.



Hanc ob simili-
tudinem quam
cum Smilace aspera
habet, facile post
Smilaces posuerim.
Qualis autem reli-
qua sit plantæ sa-
cies vix certi quic-
quam adferre pos-
sum. Radices verd
notissimæ sunt ad
deludationes eo-
rum quibus vagus
concupitus lucem
affricuit. Sunt au-
tem flagella longis-
sima, plurimaram
ulnarum, lunci ma-
joris crassitie, obse-
quiosa funiculorū
flexibilitate, striis
per longum decur-
rentibus, colore ex-

terius fusco, cui substantia farinacea, alba subest,
crassiuscula, mollis & digitorum attritu in pulviscu-
lum solubilis, Agaricum ferè referens, sapore glutin-
oso, amaricante, non ingrato tamen, medullium
verò lignosum nitidum, lentum, fractūque contu-
max. pendent porro flagella hæc ex pollicaris cras-
situdinis radice transversa, squammata, quæ sarment-
a crebra laticum mittit, virgineis non absimilia, pa-
rique crassitudine, veluti geniculis quibuldam in-
tercepta, striata, aduncis spinis minacia, coloris bu-
xæi, substantia intus Palmæ instar fibrosa, albicante,
sapore nullo evidente.

Cum icon Leb. adv. persimilis sit ipsi plantæ sic-
cæ, quam communicavit Dourez, eam assumpsi-
mus. Folio est (inquit in Obs.) Smilacis asperæ spi-
noso, & sarmento, is implexis viticulis, spinis adun-

is, horridis, & radice crebrisimplexa locis. Benzo-
tamen in Puna & sinibus Guajaquil & Portus veteris
Zarzam parilliam herbam racemosam Roboris
folio repetiri scribit.

SMILAX ASPERA ZACYN- thi, Alpino.



Monardes tri-
plicem describit. villosa tri-
plex Alp-
nardin
Carga-parilla, in-
quit, Hispaniæ no-
va est planta mul-
tis radicibus ni-
tens, duos cubitos
aut eo amplius
longis, colore ci-
nereo dilutiore,
quæ interdum tam
alte demittuntur,
ut, quin integræ e-
ruere velit, ei
profundâ fossione
opus sit, ramis no-
dosis & lignosis,
qui facile deli-
cantur: florèno
aut fructum pro-
ferat, ignoro. Ab
hac differens est
quam provincia
Honduras profert,
quod hæc cinerea,

nigrior atque crassior sit, illa verd candidior, ad pal-
lorem tendens, & gracilior. Nunc ex provincia
Quito inferri cepit, copiosè nascens vicinis ubi
Guajaquil locis, ad flumen ejusdem nominis maxi-
mum, cujus aqua admodum salubris, & multos
morbos curare dicitur. Indi & Hispani eam aquâ se
abluendo, & magnam ejus quantitatem sapidis
hauriendo manè, plurimum urinae excernunt; &
valdè sudant, & consequenter morbis liberantur.
Sunt autem qui putent ab hujus fluminis aqua Sar-
sam parillam facultates suas mutuari, quæ colore est
ex cinereo nigricante: majoribusque & crassioribus
radicibus constat, quàm quæ ex Honduras adfertur,
iisque interdum tam longis, ut altitudine humanâ
fodiendum sit, ut erui possint. Hujus tertii ad flu-
vium Guajaquil & in Puna insula nascentis, Petrus
Cieca part. 1. Chronici Peruviani c. 54. meminit, alte-
rius in plenisque Indiarum regionibus nascenti præ-
fert. At Cæsalpinus duas primas differentias ag-
noscit.

De Salsa-parilla sibi minùs constat Matthioli, *Matth. nat.*
in diversis locis ita scribens. Radix (inquit in com-
lat.) quam nuper aliqui Salsam, aliqui Spartam pa-
rillam nuncupare cœperunt, Ebuli tam ad unguem *Sparta pa-*
rillam nuncupare cœperunt, Ebuli tam ad unguem *rilla*
emulatur radices, ut quandoque crediderim Spas-
tam parillam & Ebulum esse idem, tamen id asse-
re non ausim, cum hæc enus ejus folia non viderim. *Radice*
Idem in comm. It. ait: Radicis Indicæ Hispanis Zar-
za parilla vocatæ parvus ramus ex Hispania mihi *Ebuli.*
missus, foliis est iisdem cum Smilace aspera, ita ut
existimem eos non creare, qui affirmant Zarzam
parillam aliam non esse à Smilace aspera. Cujus o-
pinionis primus autor fuit Ghinus. Non desunt ta-
men qui huic opinioni contradicant, quod videant
harum radices facie non parùm differre. cum Smila-
cis asperæ, nodosæ; Zarzæ parillæ verd rugosæ ha-
beantur. Ego quamvis neutram opinionem certò
affirmare possim, cogor tamen potius Ghino assen-
tiri, & Zarzam parillam scilicet esse dicendam Smi-
lacem asperam aut speciem ejus. Libro autem
in post. comm. cap. 140. ponit figuram nomine Zar-
zæ parillæ non spinosam: eam scribit sibi à quibus-
dam missam, affirmans aliquod discrimen inter Smi-
lax asperam & Zarzam parillam esse, interem ta-
men

men perseverat in sua opinione, congeneres esse plantas. Cuius autem plantae sit Salsae parillae figura Matthioli, asserere non audent. Considerandum num sit figura aliqua ad Smilacem minus asperam expressa. Mira sane fuit ejus opinio de radicibus Ebuli, quae obsecro similitudo inter Ebuli radicem & Salsam parillam vulgo dictam. Neque si similitudine forent, ideo continud eadem astruenda. Neque Colutea eadem est cum Sena, licet illa possit nonnulla eadem, quae hae praestare. Sed nec tantam Similax cum Salsa parilla in radice fortitur similitudinem, quanta haec genus persuasa quibusdam fuit. Siquidem Smilacis geniculatae, articulatis segmentis radices, candidae, foris nitentes, Graminis canini, aut Harundinis valatorii. At Parillae crebris locis prolixissimis, ab uno trunco radice magno, praeduro, strumoso, rugosisque capitibus, hinc inde subius, ut in Asparago, vel Rusco, oriuntur numerosi concolores lori, squabiles & sine geniculis vel nodis; recti, flexiles, cortice duriculis, pullo, rugis striato in longitudine, quam vicenum pedum interdum mensus est Lobelius. Intus farracea medulla, non ita ingrata, sed viscida, non nihil emplastica, amaricante, nec tamen calorem prodente. Et quanquam Zarza parillae & Smilacis asperae hispanicae radices similes Garcias concedat, tamen easdem esse jure negat. Reperiuntur enim saepe numero similes, quae tamen vel minimo aliquid discrimine differunt. Differentiam etiam caeli solique diversa constitutio adfert. Quare licet Zarza parilla, quae est novi Orbis sive Americae provinciae infertur, Smilaci asperae in Europa nata similis videatur & sit, viribus tamen differt. Neque enim soli calique diversitas ad formae modum commutationem aut alterationem facit; sed plurimum etiam ad qualitatem viriumque remissionem aut intentionem confert. Et sane calidis locis enata potentiora sepe, odorataque sentit: frigidis minus. Ita Zarza parilla Peruviana, quam provincia Honduras, & nunc etiam Quito profert, tametsi Smilaci asperae in Hispania nata similis sit, temperati tamen caeli occasione, tum & insus soligenio, longe efficacior est, quam vel in Hispaniis, aut etiam in Africa nata.

Zarza parilla Matth. Lac. Morard. Garc. & Lugd. qui cum Dodor. zo Zarza parillae etiam Americae meminit, ut & C. Bauh. phyc. qui hanc suam Salsam parillam 4. male meo iudicio separat ac diversam statuit, ab America, ejus scilicet Salsae parillae quinta. nunc autem errorem corrigit Bauh. in pin. ubi ambas sub Smilace aspera 4. Peruviana, sive Salsa parilla comprehendit. Ceterum apud Lugd. duae sunt figurae, quarum secunda, quae tantum radicibus constat, inversa est culpa typographica. Zarza parilla Peruviana. Dod. Zarza seu Salsaparilla, Cast. Zarza parilla, Cels. Salsaparilla, Lon. & Frag. Salsa parilla, Lob. & Tab. qui & Smilax Peruviana, & Ger.

Smilax aspera Zacynthi insulae Alpini o q agnovit esse vera Salsam parillam qua medicantur ad fanandam luem venter amantem dubius erat: quoniam omnes Smilacis asperae quas viderat exiles admodum brevissimae ac capillares radices habebant: sed in Zacyntho insula longas crassas, asportatis hispaniarum radicibus Salsae parillae omnino similes observavit plantam radicibus ab omni terra delectam impetuosa torrentis aqua, quam transiens Graecus, socii aecola & agricola Smilachiam nuncupavit. Ea nulum praese ferebant saporem uti radices Salsae parillae. Platanopoli ejus loci multum lucri se fecisse his radicibus ipsi affirmavit alid missis pro Salsa parilla: quam mercaturam clam faciebat. Cayri in Salsae parillae falsibus ex Hispania asportatis vidit portiones radicum nodosarum vel geniculatarum Asperae Smilacis, a quibus procedunt radices, qui-

bus utimur cum solus & ramulis spinosis. Zacynthi vero Smilacem asperam ab Italica diversam ostendit figurae foliorum varietas: sunt enim breviora radices habent etiam nodos quosdam qui non reperiuntur in aliis Smilacibus a peris. Hic tamen Carax parillae nomen indiderunt propter cognationem, quam cum Smilace aspera habet, quam i. Zarza parillam (quasi dicas Rubum viticulam) vocant. Parilla enim iis Matthiolo interprete, Vitis dicitur, & Parilla viticula, sive parva Vitis; Zarza autem, Lacuna teste, Rubus significatur.

Semper autem Salsa parilla deligitur nigrior, recens, non cariola, fructu contumax, quaeque assilatum frangitur, & ponderosa: nam quae carum seorsum sit, & dum frangitur pulverulenta est, inanis exitumatur.

Vitus Carax parillae Hispaniae ab hinc sexaginta annis circiter innotescere coepit, quoniam ea Indis pro praestanti medicamento erat, ad multos morbos. Longe alia erat ejus utenda ratio cum primum in medicinam recepta est, quam nunc est. tum enim Indorum consuetudo observabatur, quam in suis morbis curandis usurpare solent, ad quos profligandos maxime reperiebatur efficaciter. Verum nostri saeculi deliciae in causa fuerunt, ut eodem quo Guayaci aqua modo nunc propinquitur Carax parilla siliqua minutim concisa aqua macerabatur, deinde in mortario diu tundebatur, donec omnino in mucaginem quandam resolveretur. quam deinde colabant. Hujus liquoris ita expressi satis capax cyathum calidum mane hauriebant, deinde stragulis sese tegebant, & duarum horarum spatio sudabant. Quod si interdum suis urgeret, idem mucorillis potus erat. Sub noctem, alium ejus calentis cyathum hauriebant, atque tantandem temporis, ut mane sudabant. Hic ordo triuo integro observabatur, ut neque aliud ederent, aut tiberent praeter eum lentorem calidum expressae Carax parillae. Haec ratione praeparata meo initio plerumque propinavi: multosque melius curavi, quam nunc sanantur. Subsecuta est alia ejus propinanda ratio videlicet, duae unciae Carax parillae, lota, confraeta, & minutim concisa, in novum fidele cum sex aquae sextariis injiciuntur & viginti quatuor horarum spatio macerantur: obturato fidele, coquantur lento igne, & prunis incenso, ad quatuor sextariorum consumptionem, eadem ratione ut in Guayaco diximus refrigerantur, colantur, & fidele vitrato reconduntur. Eadem deinde Caraxillo ipso fidele aqua pleno maceratur, aliquantulum fervet, frigida colatur, & fidele vitrato asservatur. Purgatus, ut decet, aeger, & calido cubiculo se continens, mane decem uncias prioris Carax parillae aquae hauriet, sudabit duas horas; sudore deterlo, indusium & lintheamina mutabit, ut in Guayaci potione dictum est. Idem sub noctem, octo post prandium horis (nam sub undecimam prandebit) faciet: post sudorem uvae passas, amygdala, & panem hircocottum comabit, & de secunda aqua bibet. Quindecim diebus hunc ordinem observabit, nisi umbecilla fuerint vires, tunc enim conceditur usus carniū exigui pulli assilati, ferim quantitatem augendo. Lectos continebit minimum novem diebus prioribus, reliquis in cubiculo sedebit, aut deambulabit, frigus & aërem fugiens. Decimo quinto purgabitur leni aliquo medicamento. atque etiam trigesimo die, omnia ea observando quae in Guayaci decocto sumere debemus. Sed etiam post trigessimam diem bona videtur ratio, per quadraginta dies uteretur, vinumque abstinere & mulierum congressu. Hec est vulgaris aquae Carax parillae sumenda ratio, cuius praeparanda modos secretiores etiam expertus sum, quos hic recensere non pigebit, ne quideorum praetermittamus.

tamus, quæ ad çarçam parillam pertinent. quando-
quidem medicamentum est, cuius usus & facultates
maximè celebrantur. Iam annus est sextus & vicesi-
mus, quod syrupum confeci, non modò in hac ur-
be, sed tota Hispania laudatissimum, ad morbum
gallicum, atque alios profligandos: nam neque cal-
facit, neque inflamat, Guayaci videlicet siccitate
temperata, & çarçæ parillæ calore mitigato: hoc
modo. Çarçæ-parillæ unciz dñz, Guayaci quatuor,
ut suprâ dictum est, præparata, Zizipha sex & tri-
ginta, pruna passa viginti quatuor, utraque ossiculis
repurgata, florum borraginis semuncia, violarum
tandundem, hordei mundi aliquot grana, in sex a-
quæ sextariis lento igne coquuntur ad quatuor sex-
tariarum consumptionem: colatur, & decem hu-
jus decocti unciz, una syrupi violati admiscetur. Ca-
lidus mane & vespere sorbendus datur, eodem ser-
vato ordine qui suprâ dictus est, sudorem etiam (si
provocabitur) detergendo. Conceditur ab initio
esul pulli gallinacei exigui, & reliqui cibi suprâ enu-
merati, & bibitur simplex aqua çarçæ-parillæ, quæ
fit ex ejus semuncia in octo aquæ sextariis cocta, ad
duorum vel paulò amplius consumptionem. Ea ra-
tione curantur, cum omne genus morbi gallici, tum
reliqui, quos aqua Guayaci, Chinæ, aut çarçæ paril-
læ curari diximus. Fuit hoc serapium primò conscri-
ptum in gratiam Pantaleonis de Negro Genuensis,
qui licet jam multorum Medicorum operâ usus fuisset,
atque Guayaci decoctum aliq; medicamenta sum-
pisset, dejectissimus tamen erat viribus, scirrhoque
insuper in crure, & sævis doloribus afflictabatur: at
sumpto serapio, probè curatus est. Fit item alius sy-
rupus huiusmodi: çarçæ-parillæ octo unciz consta-
t & concisa, in octo aquæ sextariis ad sex consum-
ptionem coquuntur, in binis qui supererunt sextar-
iis, sacchari libræ quatuor injiciuntur, sitque syru-
pus, ut moris est. Ejus syrupi tres unciz manè, toti-
dem nocte sumuntur, prandium esto & cibi boni
succi, cæna sobria: potus è simplici çarçæ-parillæ a-
qua. Eo utatur donec assumptus sit, quo tempore
ad sua negotia peragenda egredi nõ vetabitur. Cu-
rat hic syrupus plerisque ex morbis suprâ enume-
ratis, sine molestia. Ex ea etiam si pulvis in hunc
modum: Nervo illo interiore seu matrice exempto,
çarçæ-parilla exsiccat, contunditur, & cribatur.
Hujus pulveris (purgato prius corpore) drachmam
manè jejunis sumit, atque simplicem prædictam
aquam haurit, idem noctu facit dormiturus. Cibus
sit boni succi, potus illa aqua simplex, vino absti-
neat. Vtilis est hie pulvis in lue venerea, aliisq; mor-
bis ab ea oriundis: nec non scabiem purulentam &
saniosam, in manibus & pedibus mirificè sanat, hac
ratione: Purgatus æger, etiam (si necessitas urgeat)
non purgatus, pulverem modo prædicto sumet,
simplicem illam aquam sumet, & rimis quæ in hoc
morbo à falsa pituita, corruptoque humore natæ, pe-
des & manus occupare solent, paululum aquæ su-
blimati rosacea simpliciore dilutæ plumulâ illinet,
deinde emplastrum Gualelmi ferventis vulgò ap-
pellatum, aut palmeum, panno sericeo tenuiter in-
ducitur omnibus locis quibus illita fuerit sublimati
aqua simplicior imponet, singulis diebus repetetur,
& quindecim dierum spatio perfectissimè curabi-
tur, nec alius medicamenti opus erit: abstergit en-
im, carnem generat, & ad cicatricem perducit. Ho-
die tam frequens est aquæ çarçæ-parillæ usus modo
prædicto, ut in omni morborum genere sumatur, si-
ve in de fluxionibus, flatibus, uterique morbis frigi-
dis, siue aliis quibuscunque, modò non sint acuti,
aut iis febris accesserit: idèoque non minore copia
multis locis asservatur decoctum simplex çarçæ-pa-
rillæ, quàm aqua vulgaris. Certum est tamen, his qui
calida, hepatis præsertim, intemperie laborant, non

convenire: nimirum etenim exalfacit: sed ventricu-
los frigidos fovet, & flatus mirificè discutit. Illud au-
tem animadvertendum est, has tres aquas non nisi
Autumno. aut Vere propinandas esse. Calida est &
sicca in secundo serè gradu. Duplex verd ejus Sa-
parilla, quæ ex provincia Quito caput inferri, exhi-
benda ratio apud illos observatur. Prior, quæ Indi
nunc utuntur, & ab initio usi sunt, hæc est: çarçæ-pa-
rillæ radices, quot opus erit, sumentes, nervo illo
interiore repurgant; corticem, si sicæ sint radices,
macerant, donec mollescat (virides maceratione
non egent) deinde minutim concidunt, & addita a-
qua contundunt, ut succus extrahi possit viscidus &
mucosus, cuius manè eam quantitatem sumunt,
quam uno haustu aut pluribus bibere possunt: le-
ctum deinde ingressi, plurimum sudant postea, mu-
tatis linteis, pullum edunt, & corticis illius succum
hauriunt, in prandio, in cæna (quæ levis erit) atque
interdiu: deligendus est tamen locus ab aère & fri-
gore liber. Hac ratione, & usu conservarum, neces-
sariarumque aliquot fructuum siccatorum permissi-
so, octo aut novem dierum spatio, omnibus mor-
bis liberantur, quos çarçæ-parilla curare solet: vali-
dum autem & robustis vinibus eum esse oportet,
qui hac curatione utetur. Altera conveniens est qui
inbecilliores sunt, nec superiorem, sine manifesto
vitiæ discrimine, ferre possent, çarçæ parillæ nervo
suo liberata, & ut superius, macerata, si sicca sit,
deinde contusa, quatuor unciz, plurè sive aut pau-
ciores (nam hic nullus ponderis aut mensuræ usus)
in octo aquæ sextariis ad dimidias decoquuntur, ex
ea aqua quantum possunt semel aut pluries bibunt;
in lectulo deinde se componunt, ad sudorem pro-
vocandum, qui tametsi adeò vehemens non sit, ut
superior, copiosus tamen est: mutata veste pullum
edunt, & eadem aqua (nam uno die coctura absumi-
tus) cum in prandio, tum in cæna, illis potus est:
ab aère & frigore sibi cavent: repetitum per quin-
decim aut viginti dies hoc medicamentum, omnes
morbos sanat, non sine magna omnium admiratio-
ne, præter febrem, aut morbos acutos, in quibus
çarçæ decoctum exhiberi non solet. Ut neque initio
diætæ, neque in media, neque sub finem sese pur-
gant, uti nos facimus (nam & medici & medicamen-
ta composita illis desunt) sed muliercularum dun-
taxat operâ utuntur, quæ illis hujus decoctum pro
arbitrio exhibent. Illud verò observatione dignum
in hac curatione, quod solus radices cortex, nervo ex-
empto, in usu est (efficax enim ille rerus inutilis,
imò operationem, nisi eximatur, impediens) idèoque
nunc eorum exemplum secutus, solo cortice in
hunc modum uti soleo. Quatuor corticis çarçæ-pa-
rillæ lotæ uncias in octo aquæ sextariis viginti qua-
tuor horarum spatio macco, deinde ad dimidias de-
coquo: quod si calorem in egro metuo, hordei mun-
dati dimidiam unciam inter decoquendum adjicio,
& in magno calore, vulgaris aquæ loco, cichorei stil-
laticium liquorem cum hordeo substituo. Hæc aqua
temperatissima est, & admirandos ejus effectus in
multis expertus sum. Observandum item est, ut
quanta possit quantitate æger hanc aquam, uti retu-
limus, bibat, siue uno haustu, siue pluribus, quia ma-
gnam quantitatem bibendo plus sudabit, & citius
certiusque sanabitur. Itaque hanc novam sumendæ
çarçæ-parillæ rationem maximè utilem fore puto,
faciliusque & breviori tempore curandos ægros.
Aliam addit Fragosus ejus præparandæ rationem,
quæ est: çarçæ-parillæ libra una bis lota, benè con-
tusa, & minutim concisa, in decem & sex aquæ sex-
tariis toto triduo maceratur, deinde lento igne co-
quitur usque ad integram serè consumptionem, h. e.
ut acetabulum seu scutella ejus decocti solidum rema-
neat: çarçæ statim ex prælo imponitur, succusq;
expri-

Çarçæ sy-
rupus prior

Syrup. 2.

Çarçæ pa-
rilla

Pulvis in
modo ratio

Çarçæ a-
qua usque
frequens

Quibus mor-
bis conveniat hu-
ius aqua

Çarçæ pa-
rilla
quæ ex
provincia
Quito

Çarçæ pa-
rilla
quæ ex
provincia
Quito

In quibus
morbis non
convenit

Çarçæ pa-
rilla
quæ ex
provincia
Quito

Quæ a po-
tente quantitate
bibenda

Çarçæ pa-
rilla
quæ ex
provincia
Quito

exprimatur ad uncias duas aut eo amplius, etiam si ex eo quod superfuit decocto quantitas augeri debeat. Lento igni imponitur: ubi servere coeperit, pulveris aloës optimæ 3.ij. myrrhæ selectæ, Nucis pōicæ magnitudinis, Croci momentū (sunt qui Ligni aloës pusillum addant capitis roborandi causa) inspicuntur & continuè agitantur, donec amyli crassitiem contrahant: ex ea massa catapotia formantur.

Exhibendi ratio.

Ex his duo singulis decem prioribus diebus devoranda dantur, & singula reliquis viginti, sub horam undecimam noctu. Si verd in veteratus sit morbus, & æger validus, tria singulis decem prioribus diebus, bina subsequentibus decem, singula reliquis sumi poterunt. Dimidia gallina elixa in aqua (cui salis & croci momentum, & aliquot ciceris grana injecta sint) meridie datur edenda, reliqua pars in cœna. Potus erit aqua garæ simplex: surgant hora decima, cubitum eant ante solis occasum. Iltis catapotia gravissimos dolores, & brachiorum crurumque paralytes curari experientia se consecutum scribit. Zarza parilla (attestante Benz.) Venereæ contagioni & aliis morbis medetur. Ea nempe duabus silicibus tria expressus & percolatus succus admisto aquæ calidæ modico egrotis bibendus porrigitur. Ii mox hausti & ejus potionis, quantum natura patitur, mensurâ, loco calido compositi, quoad tollerare possunt exsudent. Eo medicamento tres aut quatuor dies, ut visum est, utuntur: hiscocto tantum interea pane & pulli gallinacei assis paululo vescientes. Alij ejus herbæ ramusculos dumtaxat aqua incoquentes, jus eliciunt quod interdum bibunt: & eo sorbitionis genere nonnulli duos trêsvē continuos menses utuntur. Radicum decoctum exsiccat, si Lobelio credendum: sudores & urinas cit: cutem evacuat, & quæ cutem subierunt, educit. Pro Salvia patiglia ut & Ligno sancto se feliciter usum esse, Rosmarino, Sabina, Smilace spinosa, Junipero & Smilabus, autor est Bovius.

Uti facit.

Herbarum musculo.

Uti facit.

CHINÆ RADIX. CAP. XII.



Apoc. Jov.

Figura nostra est ex ipsa radice, cui etiam partem addidimus ex Lobelio, ut & solium spinoso pediculo ex append. Lugd. cujus figura, ut ait, ex recentissima China expressa est, quæ demonstrat eam sub terra serpente, ac variis ex locis teretes ac lignosos processus emittere, quibus nova radicum aliarum soboles adnascitur & incrementum capeffit, multis & tenuibus alioqui fibris capillata, quibus nutrimentum attrahit.

Est autem duplex China ab autoribus descripta: alia ex India occidentali, Hispania nimirum nova & Peru, quæ colore intus magis ruffo est; alia ex India orientalis regione Sinarum allata. Orientalem sic describit Garcias: Trium aut quatuor palmorum altitudine assurgit cauliculis tenuibus, quos rara folia cingunt, Mali Assyrii junioris similitudine: radix palni longitudine, interdum crassa, nonnunquam tenuis, quæ recens eruta admodum tenella est, & cruda aut elixa mandi potest: arbores Hederae modo scandit. Linschot. Ind. or. par. 4. c. 17. Chinæ radix fructibus more excresecit, foliis paucis, Aurantiorum forma. Acostræ Orientalis China planta est multis tenuibus spinosisque sarmentis prædita, Smilaci asperæ non dissimilibus, quorum maxima minimum manus digitum crassitie non superant, foliis Plantaginifoliz magnitudine: radices pugnum nonnunquam æquant, interdum minores sunt, solidæ, graves, candidæ, interdum etiam rubescentes, & multæ sæpenumero simul coherentes. Est occidentalis China Monardi Arundinis majoris radici similis, nodosa, intus alba, interdum rubescens, foris rubra. Saxoniz radix est Arundinis latifoliz, quam videntem se vidisse refert Venetiis in horto Petri Bosselli, idemque deceptum ait Acostram, ut qui arbitratum sit plantam esse arboribus adhaerentem, ut Hedera. Amatus quoque inter Arundines recensuit: at Casalpino, China orientalis potius ex genere Iridis, quam Calami videtur. Cæterum cum China suis sarmentis Smilaci asperæ dissimilis non sit & suis cauliculis Hederae modo arbores scandat, mered in scandentium classem refertur.

Considerandum quinam sint ij apud Auger. Ferr. qui Chinam & Apion, res & delineatione & facultatibus aperte diversas confuderint. Miror, inquit prædictus autor, doctos aliquot viros ex sola Chinæ figura turbinata Apion judicasse, quasi nihil sit, quod Pyrum referat præter Apion. Ego hac in parte Augerio non subscripsi: meo enim judicio non propter formam aut quoddam Veterum apion existimant, Apion vocarunt; sed ex eo quoddam China insipida sit.

Lob. Adv. sub Acoro aquatico, Schinæ (ita enim vocat) obiter meminit, appellatque Schinam Americi orbis. Titulo autem de Apio vera Chinam sive officinarum Apium & amio (propter nullam terminatam perceptibilem qualitatem, sic enim sonat Græcis) & non a quo cognominat, & Occidentis Floridæ Pyrisformam. Eid. hist. belg. videtur species Acori, Arundinis aut Cyperti.

Monardi, Ioub. Lac. Lob. ic. Cast. Matth. (huic & Cina) & Tab. China, cui & Schina, Boeckensburg. Chinna sive Cinna, Cæf. China radix, Frag. Garc. Acostr. & Lugd. qui in app. alteram figuram dat sub titulo, Radicis Chinæ Acostræ. Chinea radix, Cord. hist. China 1. C. B. Dicitur China & Chinæ radix, & China India regione, in qua copiosè nascitur: Vocatur hoc excellens medicamentum apud Acostram in Chinarum regione Lamparum, Lamparum vel Lamparon, in Decan Lampas, in Canarin Boursi, ab Arabibus, Persis & Turcis Ch. phibina.

Radix China primò innobrescere cepit post annum 1535. adferentibus Chinensibus, qui sunt Asiatici Scithæ, Goam India ubi unicam dumtaxat plantam perpusillam vidit Garcias. Iuxta arbores ferendam esse perhibent, quoniam Hederae modo eas scandat & amplectatur: nascitur in Chinarum regione vastissima, quæ Moscoviam usque extendi creditur: invenitur tamen etiam in Malabar, Cochinchina, Cranganor, Tanor & aliis locis. Monardes autor est etiam ex Occidentali India Chinam deferri, vulgò autem in Sina Orientalis India provincia, Szechuan atque Sericania finitima, maximis locis naici,

De radice *Arundinis*, aut *Vlyx* modo. Optimam esse recentem, sapore insipidam, pinguem, ponderosam, solidam, quæ neque teredinem, neque cariem lenferit. Mercatores autem foramina teredinum erosionem, aut carie facta obturant holo Armeniâ aqua diluta, velut cimento quodam, obducuntque extrinsecus pari fraude totam radicis molem, quæ fraus & nativum illius colorem ementitur & ei pondus addit. Melior candida quàm rubescens, Garcia. Linscotano tamen quo nigrior radix, eo melior.

Preparatio *Lobelii* quoniam omnis saporis expertus est China, gratissima est faciendo cotta luem veneream decocto, & a rad. Chinæ in orbiculos contectis 3ij. aq. fuantanæ sex aut septem libras. macerentur simul diem & noctem in fictili novo; postea lento igne coquantur, fictili bene operculato, aut in balneo maris, ut sit decoctum Salis, aut Guayaci, quoad satis videbitur. Huius decocti bibat quotidie bis, quantum tibi & Medico satis esse videbitur. Prodest hoc decoctum non tantum in lue venerea, verum etiam omnibus morbis sudores postulantibus. Tamen si potest non desit ex recentioribus, qui Chinæ radicem prout, sed immerito damnant, tamen non sine causa magnis effertur à Garcia laudibus, quoniam vel lue venerea infecti ut curentur, extremam illam victus rationem non egeant, qualis non citra molestiam in Guayaci usu observanda, sed tantum abstinendum illis sit à bubulis & suis carnibus, pisce & crudis fructibus. In magnis autem doloribus & inveteratis huius radicis uncia in septem aquæ sextariis coquitur, ad dimidij usque humoris consumptionem. Servatur id decoctum usui, vase aliquo vitreo, aut sigillato vitreato. Spuma vero inter bulliendum colligitur, & utiliter ulceribus tumorisque imponitur. Salutaris est etiam densus ille vapor, inter coquendum exhalans ipsius doloribus. Interdum calido decocto tumores si venimus: nonnunquam lineos pannos decocto madidos ulceribus imponimus, eaque mundamus. Solent Sineses majori quantitate in sua regione alluere, quod frigida admodum sit. Quos cum sciatica laboras imitari vellit ait Garcia, radicis duas uncias, additâ interdum semisse in precedenti aquæ quantitate decoquens, & calide hauiens, provocandi sudoris causa, ob primum medicamentum calorem, in tantos hepatis ardores incidi, ut universum corpus erysipelate & phlegmone laborare cœperit. Itaque meo periculo facti sapientiores reliqui, calido decocto potu, & tantâ radicis copiâ in posterum uti desierunt. Quare huius unciam in septem aquæ sextariis decoquimus ad medias, aut ad tertiam partem, pro morbi & ægri natura, subinde ea medicamenta injicientes, quæ huius radicis facultates corrigant. Eg. Si dolor capitis, aut nervorum addit. rosemarinum, aut rosæ injicio: si obstructio- nibus hepatis laboret, apium: si ardor addit cum obstructio- ne, intubum: si ultus vesicæ aut rerum infestet, aldo Glycyrrhizæ succum: interdum radici admisceo æquale pondus hordei. Soleo autem huius radicis decoctum sumptuosum, prius syrupis convenientibus purgare, & nonnunquam syropos Chinæ decocto diluere. Bene autem purgato corpore, radicis decoctum propinare incipio; post 15. diem, minorativo si opus sit, exhibito item alio interdum post 30. diem. Toto hoc tempore, naturâ, vel arte alvus libera sit. Quod si rimum incalcescat æger, radicem minus decoquo, aut decocto aquam intybi, vel sumocetæ, aut buxifoli injicio. Quod si nec hoc sufficit, decoctum subtraho, curationemque in aliud tempus magis opportunum differo. In singulas vero curas, radicis usus esse solet ad 3xxx. uncias totidem dierum numero, quibus cura perficitur, respondentibus. Ratio calidum decoctum exubeo, nisi in vehementibus & inveteratis doloribus, quando sudoribus

materiam evacuare oportet, bis in die mane & vespere. Efficacior est hæc radix in inveteratis, ubi videlicet magni tumores, & ulcera maligna adstant, quàm in recentibus morbis. Quidam in Balagate calido radicis decocto, ejusdem radicis extra 3j. b. injiciunt, quotiescunque mane & vespere sumunt. Sunt qui mane laminam conservæ ex huius radicis pulvere & melle (sive saccharo, si magnus adsit calor) paratâ edant, deinde radicis decoctum bibant. Augetur autem, aut minuitur pulveris quantitas in hac conservâ, & quandoque corrigitur, pro Medici arbitrio. Radice adhuc tenerâ Sineses cum carne elixâ vescuntur. Vile demum etiam est huius radicis decoctum præter eos morbos, qui cum contagio lue venereæ commune quid habent, ad paralytes, tremores, articulorum dolores, sciaticam, podagram, tumores schirroides & ordematides tum etiam strumas extirpat. Succurrit vetriculi imbecillitati, in veterato capitis dolori, calculo & vesicæ ulceribus. Intelligo illos qui hoc decocto utuntur, mulierum conspectu vehementer ad libidinem accendi. Quare consultum videtur, ut per curæ tempus nullæ ad ægros mulieres admittantur. Et hæc Garcia. Hæc radix adeo innoxia apud Acostam censetur ut eâ si nentibus, tamen nullam victus rationem observet, sed libere carnibus & piscibus vescantur, nihil in eo nodi adferre credatur. Vulgaris in Sinarum & Indiarum provinciis suæ huius decocti consuetudo est: ut radicis 3j. additis radicibus apij 3ij. decoquatur lento igne, sine fumo, in aqua 1b. xvj. ad 1b. vj. consumptionem reliquas in fictili vitreato adservat, sumuntque ægri singulis diebus 3j. recentis decocti (nâ facile corrumpitur, nec ultra diem adservatur) totidie mane plenam hauriunt, quibusque horis in lecto remanent, postea surgunt, duabus autem horis ante cenam totidie hauriunt, interdum de eodê frigido bibentes. Plurimæ tamen etiam dum sua negotia exercent & navigant, singulis diebus mane & vespere duas huius radicis in pulvere redactæ drachmas ex vino, aut ipsius radicis decocto felici successu bibere solent. Ab his magna quantitas radicis absurgit, qui Garcia plurimum fidunt, non modò in curandis morbis ab eo enumeratis, sed etiam in hemiplegia, in heren- tiis humoralibus & ventosis, in colli vesicæ & penis callis, eorumque ulceribus: veneret etiam admodum excitare creditur. Ex hæc etiam radice recenti aqua stillatitia elicitur, delicatioribus admodum familiaris: decoctum ipsa aqua præstantius est. Optimè conservatur radix, si pipere confracta involvatur. Hactenus Acosta. Solius radicis est usus apud Indos, inquit Monardes: propinatur ejus aqua in diuturnis, & acutis morbis, febribus præsertim; etenim sudores provocat, cuius rei gratia multi sanantur. Lusitani eam prædicant adversus omnis generis morbos, sed maxime luem veneream. Ejus autem paranda hæc est ratio. Radicis Chinæ minutim concisæ uncia fictili novo imponitur, huic adfunduntur aquæ sex sextarii, maceratur quatuor & viginti horarum spatio: fictili obturato, coquitur lento igne ex prunis incensis ad dimidias, quod ei ratione deprehenditur, quam in Guayaco edocui; frigescit, colatur, atque in fictili novo asservatur loco aprico, aut juxta ignem, ut diutius maneat incorrupta. Purgato, ut decet corpore, collocatus æger loco aprico & conveniente jejuniis diebus aquæ calidæ decem uncias hauriet; duas horas aut paulo diutius sudabit: sudore deinde absterito, indusium & linteamina mundis & calefactis mutabit; deinde in lectulo duas aut tres horas perdurabit; postea vestitus, calidè se in cubiculo continebit, quod neque ætè, neque frigus perireabit, genio indulgens, & lapidis colloquitis se oblectans. Circiter undecimam horam dimidium pullum coctum, aut gallinæ quartam partem cum paucis sale edet, initio prandij

HISTORIAE PLANTARVM

cyatho iusculi epoto: pro bellariis carnes cotoneo-
rum adponuntur: potus erit similis aqua, quam jeju-
nus sumit, quia decocti tantummodo unum ge-
nus est. A sumpto iusculo, uvas arillis emundatas,
aut pruna passa sine ossiculis, & panis benedicti
crusta, biscoctumve initio prandij odere poterit. Si
interdum bibere volet eadem aqua cum conserva ab-
qua propinetur. Octo post prandium horis lectum
denuo ingrediatur, alias decem aquae uncias quam
calide poterit, bibat, duas horas sudet, sudore deter-
so, indusium & lintea calefacta mutet, post horam
corinet conservam aliquam, aut uvas passas, aut a-
mygdala, & aliquantulum biscocti; de eadem aqua
bibat, postremo cotoneorum carne vescatur, potu
deinde absteineat. Hæc victus ratio triginta conti-
nuis diebus observanda, nulla alia purgatione adhi-
bita, sed per cubiculum calidum obambulans, & se-
se oblectans, ab omnibus absteineat quæ illum offen-
dere possunt. Purgatione absolutâ, bona victus ra-
tio servanda est quadraginta continuis diebus, vi-
nôq; abstinentium & mulieribus: potus erit & Chi-
næ superioris jam decoctæ, deinde in umbra rescic-
catæ, uncia una, in sex aquæ sextariis denud bullita
ad dimidias. Illud vèrò diligenter curandum, ut Chi-
næ radix per quatuor & viginti horas semper mace-
retur ante decoctionem, sive illa fiat in triginta, sive
quadraginta dierum potius usum. Ad varij generis
morbos utilis est hæc aqua, luen veneream cuius-
cunque generis, vulnera & ulcera antiqua, tumores
sclerotosos discutiens, articulorum dolorem solvens,
& qualemcunque podagram, sed coxendices præ-
sertim curans. In veteratos capitis dolores mitigat,
& stomachi defluxiones omnes & rheumatismos si-
stet, bonum colorem conciliat, icterum solvit, & om-
nem hepatis intemperiem emendat, ad quam val-
de celebratur. Paralyin & omnes nervorum mor-
bos sanat, atque vesicæ enterocelis utilis, quæ hu-
morem, unde generantur, absumit: frigidis omnibus
morbis & melancholicis convenit, ventriculi ro-
borat, & omnes status discutit. Febris diuturnis,
quotidianis, & erraticis prodest, sudoris insigni pro-
vocatione, quæ etiam in pestilentibus febribus uti-
lem quidam arbitrantur. Sicca est in secundo gradu
cum exiguo calore, idque deprehendere licet ex eo,
quod aqua, cum Guayaci, tum Sarcæ parillæ calefa-
cit, & sitim excitat, hæc neque sitim ciet, neque ca-
loris alicujus indicium relinquit. Ad pituitam con-
sumendam & ad juncturas, cerebrum & ventricu-
lum roborandum decoctum radicis Cynæ læpè ma-
ximo cum xerotantium juvamento à se fuisse com-
probatum scribit Franc. Indix de Gutta. Sed in Chi-
næ præparatione & usu quatuor castigatione digna
tradit Augerius, quæ quis datâ operâ ex ejus libris
repetere poterit. China radix ut annotat Saxonia,
accepit summam auctoritatem à Carolo V. Imp. qui
summo cum fructu primis serè omnium radicem
accepit & à morbo venereo antiquisque doloribus
est liberatus. Certum est Chinam ritè administra-
tam luen veneream superare, cutem mundare, do-
lores profligare, macies reparare: est in activis qua-
litatibus temperatissima. desiccatur quidem excre-
mentitios humores, alimentales autem vel reficit,
vel saltem conservat: Idem humiditatem habet obro-
sam atque firmam substantiam harentem, ut hac ra-
tione & diuturnam & multoties repetitam patiat
coctionem: si minimè cariola fuerit, neq; admodum
gracilis & sicca, sed mediocriter gravis, colore inter
album & rufum medio. Rad. Chinæ incise in
tabellas, unciam: infundatur in aqua q. vj. deinde
bulliant in vase oris angusti bene testato usque ad
consumptionem medietatis: præcipit Vesalius in
sua epistola de Chioa ut decoctum hoc calidum
conservetur, vel spugulis diebus recens fiat, alioquin

ait acidum fieri: sed experientia docetur oppositum
nec servatum 2. dies accessit: ex residuo fit aqua se-
cunda factâ decoctione in lib. 12. usque ad consum-
ptionem tertiz partis. Iterum vèrò quod residuum
decoquitur in totidem aqua libris ad eandem con-
sumptionem. De radicis Chinæ aut Vesalius inte-
grum librum scripsit.

CHINA SPURIA PYRIFORMIS sive turbinata.



Chinæ nomine Desca.
C nobis ante an-
nos plus minus
datum radicis
justam fragmen-
tum, quod ad
ad eum usque
hum teredine au-
tariem sensit, quod
haud scio qua
à Chinæ officina-
rum differat, con-
stentia eadem co-
loreque, sapore
dem nullo: fibrosis
nervis mediū trās-
euntibus, quemad-
modum figura ex
Lobelio exhibet,
alioqui in reliqua
substantia nullum

nervulorum fibrarumve apparet vestigium, tatum-
modo cortex, quo obtegitur, rugosus est, zonisque
præcinctus, uti ex iconc apparet. apophyses in hac
radice veluti & in China apparent. Quoniam vèrò
proximè accedit ad Chinam spuriam pyriformem
Lobelij, utramque conjunximus. Lob. suam in hunc
modum describit: Majusculæ sunt radices, & Pyri-
formâ tuberculis prægrandibus, Apium ab effigie
turbinata mentientes, colore vèrò & concretionis
Chinæ, pro qua ex India missæ sed saltim: adstringunt
enim potius substantiâ fibrosâ & densâ, colore &
micis Rhabarbari annulis, sine odore: foris color
ruffus. Quidam in India versati affirmant, nec Arun-
dinis, nec Acori, nec Cyperi radicem esse, quales esse
potest China dicta, sed cujusdâ magnæ arboris. No-
tandū autē ad sudores potius sistendos, quâ provo-
candos facere: id quia esse cōperiet, qui experi volet.

Nostra Icon est ex ipsa radice quam habemus, &
China spuria pyriformi sive turbinata Lobelij. In
adv. c. de Acoro Aquitanico, h. e. de China spuria A-
cori effigie, vocat radices prægrandes, turbينات, A-
merici orbis Schinam eminentes: Item c. de Apio,
Occiduae floridæ Pyriformem. B. pin. Chinam 2.
spuriam pyriformem.

PSEUDO-CHINA RADIX CLUSII.

Facile nobis persuademus jam dictam eandem
esse cū Pseudo-Chinæ radice Clusij Exot. quam
Londino ad ipsum pro Chinæ specie mittebat anno
à Christi nativitate 1594. Jac. Gæretus, & V. Vingen-
decaovy sive Virgineæ relata.

Valde autem nodosa crathæ radix, & in aliquot
tubera formata, subrutilo colore, farmentali quâ-
partem summo fastigio adhuc retinens, quale in
Smilace aspera conspicitur, duri, lignosi, multis ve-
nis, ut Smilacis farmenta prædit: ipsius radicis sub-
stantia etiam subrutila, ut in Butomi (vulgo Pseudo-
acorus nuncupari, & nostrâ adhuc etate à nonnul-
lis magno errore pro legitimo Acoro usurpati) radi-
ce, saltem initio saporis sive gustus, quàm videlicet ve-
tusta, deinde desiccantis.

Ulam

aque calida cyathis quinque denarij unius ponde-
re: & ad secundas mulierum efficax. Sed Græci
Clematida, & alias habent, unam quam aliqui E-
chitem vocant, alij Laginem, [alteram quam Lygon. &
lij.] nonnulli tenuem Scammoniam: & pedales, fo-
lios, non dissimiles, Scammoniz ramos habet [ea
viticulæ solidas non dissimiles simulatæ ramis habet, alij]
nisi quod nigriora minoraq; sunt, folia. Invenitur in
vineis arvisque. Efficit, ut olus, cum oleo ac sale: al-
vum tunc. Eadem a dysentericis cum Lini semine in
vino austero fortetur. Folia epiphoris imponun-
tur cum polenta, supposito udo linteolo. Strumas
impositæ ad suppurationem perducunt, deinde a-
xungia adjecta percurant. Item hæmorrhoidas cum
oleo viridi, phthiricos siccant cum melle. Lactis
quoque ubertatem faciunt in cibis sumpta. Et infan-
tibus illa capillum alunt. Ex aceto dentium dolo-
res sedant. Venerem stimulant. Est & alia Clematis,
Ægyptia cognomine, quæ ab aliis Daphnoides
nuncupatur. Gal. ab aliis Polygonoides vocatur, fo-
lio haust longa tenuisque, adversus serpentes ac
privatum alpidem ex aceto pota efficax. Ægyptus
hanc maxime gignit.

Ceterum, qui hoc in loco Centunculus à Plinio
nominatur, Alotio herba est quam Dod. pingit pro
Helixine Cullampelo: sed vites non conveniunt.

Placet magis Dalechampio Dodonzi judicium,
qui Herba impia genus Centunculum vocat.

De Clematide Ægyptia quam Plinius mirè cum
aliis confundit & perturbat, agemus postea sub ti-
tulo Clematidis Daphnoides.

Dalechampi sententia nobis non probatur refe-
rentis. Etenim Plinij ad priorem Dioscoridis Cle-
matidum: descriptiones enim multum discrepant.
De Clematidibus Plinij sub Convolvulo ex Ruellio
Julia dicemus.

CLEMATIS LATIFOLIA SIVE

Athyrae quibuldam.

CLEMATIS LATIFOLIA
integra.

Sarmentis ali-
quis luxuriat cras-
sis, iisque angulo-
sis, rugosis, junio-
ribus, siccis, subinde rubenti-
bus, obsequioso
flexu lentis: folia
quina, Dulcamaræ
æmula, alias inte-
gra alias dentata &
fimbriata, gustu a-
cria Clusio, viticu-
la media tortili,
quæ capreolorum
loco vicinis arbu-
stis implicata scan-
dit, adnæscuntur:
flores racematim
petiolis incanis in-
sident, suavesolen-
tes, candidi, qua-
ternis aut quinis

radiatis foliis constantes, quorum medullium ob-
sideret musculos flammæ pallidulum cinnabum,
flores excipiuntur non complures cuneatim indidem
ortu pinnate lanuginis tomento barbatæ: radix et al-
buscula, siccæ, siccis donata.

Ruell. cap. de Appelo, aqua, licet multa simul mi-
sceat, repetat, nec plantam describat, aut resq; non
citet, sed confusè transcribat: nos tamen per Viornam
& Hardeam, plantam à nobis descriptam ab eo
intelligi credimus, quamvis non competant ei, quæ

CLEMATIS LATIFOLIA
dentata.

Ruell. ipsi attribuit.
Verba ejus ita bre-
viter perstringemus.
Ampelos agri vo-
catur Vitis silv. pal-
mitibus longis, ut
Viticum; si Plinio
credimus, spissis &
candicantibus foliis:
pars acinorum ejus
æstu montur, prius
quam reliqua, qui &
foliostiales: universi
nunquam mature-
scunt, etsi prius quàm
tota Vva maturuit,
detur cibo; generi
gallinaceo fastidiū
gignit. Vvas appe-
tendi. Flos in race-
mis candidus de-
pendet: folium Sola-
ni per initia, post
&c. Vitis silv. annu

durat. Est ei similis quod Salicastrum vocatur: hanc
Plinius describit folio duro, cineræci coloris, sti-
culis callosis, rubentibus, qualiter flos quem Iovis
flammam appellat in Violis, ferentem semen punici
Mali in acinis ad eodem effectus. Propterea sunt &
recentioribus, qui hanc & Flammulam & Iovis flam-
mam appellarint. Sylvestris vitis ea mihi videtur,
quam rura modo Viornam, modò Hardeam vocant,
quod ramorum falcis ea perinde quasi viticulis li-
gantes distingat. namque viticulis prælongis aspe-
risque cernitur &c. [ex Diosc.] Hanc Plinius credit
esse Vvam taminiam.

Sunt qui putent plantam Germanis Waldraben
aut Lynen vocatam, Vitem esse albam. Sed errante
est enim, inquit Tragus, Dioscoridis duma & arcia,
h. e. Vitis sylvestris, cui Serapio cap. 35. florem canum
& lanuginosum tribuit, Butaniamque appellat: Vi-
tis silv. plantæ & Plinius mentionem fecit: & meo
quidem iudicio hæc planta Salicarium ejusdem fuerit.

Corn. in Diosc. altera Clematis, Volubilis appel-
lata, Nylen & Waldraben Germanorum dicitur,
non obstantibus aliis qui Waldraben Clematidem
Daphnoidem esse volunt. Fuch. est. Vitis nigra [sic
in Diosc.] ubi quidam annotavit in edit. Lugd.
ejus Vitem nigram videri esse Viburnum eam vul-
go Gallorum cum Virgilio dictum. Sed Fuch. cum
apud illum essem nominabat Vitem sylvestrem.
Corn. in Diosc. Pervinea alvum ducens, & Clematis
altera, ubi scriptum reliquit, quosdam codices, ut à
Gompylo editum, Clematidem alteram non habere: &c.

Alteram quoque hanc Clematida, ut Galenus refert,
Dioscoridē in fine quarti libri descripsisse, alias ve-
rò in principio libri quarti utraq; describi, sed mala.
Priorem enim in principio hujus libri adstringenti-
bus herbis propter vitium similitudinem conju-
xisse. Hanc verò quoniam alvum semē ejus duceret,
in quarti libri fine, ubi de purgantibus agit, descri-
psisse. Est autē Clematidē hanc duplicis differtē, &
quarū una grandis frutex sit, proceras arbores scan-
dens, & singulis annis incrementū sumēs, quoniam
caudex & viticula illi aliarū arborum modo durent.
Alterā verò per omnia huic similis sit, brevior ta-
men (quamvis & hæc interdum 15. pedum longi-
tudine adolescat) & Autumno caules sive viticu-
las amittat. Nasci hanc in pratis circa arbuscula, quo
inundationes pervenire queant illam in montibus
arbores & vinearum sepes ascendere. Vtramq; Ger-
manis Rebling vocati. Arborecentem tamen ma-
joris, & herbaceam minoris cognomen habere.

Hardeam
vocatam.Vva Tami-
nia.Vitis alba
non est.

Vitis silv.

Diosc. or.

Serap.

Butania.

Salicarium.

Clematis
altera. Vv.

Volubilis.

Vitis nigra

Fuch.

Viburnum.

Vitis silv.

Pervinea

alium dng

sem. pur-

Clematis
duplex.

HISTORIAE PLANTARVM

Saxones etiam Wilde rancem nominare, quod samentis Vitem emulentur.

Clematis altera. Matth in Diosc. Clematis altera, quam Vitalbis italicis vulgò vocatis plurimum facie respondere ait proptereaque sibi omnino persuaserit, Italianam Vitalbam esse Clematidem alteram (quam secundo loco reddiderit Dioscorides) contra eorum opinionem, qui acrem Clematidem eam plantam putant esse, quam quidam rei herbariae imperiti falsò Ligustrum vocant falsò, inquam, quoniam Dioscoridi Ligustrum arbuscula est, non herba, ut suo diximus loco. Fuchf. Vitalbam Matthioli, Vitem nigram esse existimat, sed errat, ut postea dicitur. Cam. apud Matth. germ. aliam apposuit figuram, dicens, quam Matth. vocat Clematidem tertiam, alias dicitur Viorna, & Vitalba, & quibusdam Atragea Theophrasti.

Viorna. Gesn. coll. Vitis sylv. caustica, Viburnum aliquibus, ac Gallis Viorna, ab usu urendi vulgò vocata. Flore enim, semine, cortice, & radice (inquit idem de hort.) vim urendi habet. Est hæc Clematidis plantæ cognata: quare à nonnullis recentioribus, similiter Flammula nominatur. Eidem cat. Labrusca, Vitis silvestris exulceratoria, Item Vitis sylv. foliis Solani; Viorna, Hardea. Sed Gesnerum de præfenti planta minus distinctè scripsisse, satis demonstrat vocabulum Labrusca & Oenanthes, quæ nomina huic non conveniunt.

Ryff. Clematis altera, & Gallorum Viorna. Lon. Waldraben/Lynen/ Vitis nigra vulgò, Bryonia nigra Græcorum, Vitis Chironia & Bucranium. Confundit autem nomina duarum plantarum, pingens Atragenam. An eidem in Diosc. l. 4. c. 8. Clematidis altera species, Flammula Officinis. Turn. Vitis nigra, Black Bryonye.

Atragea. Nihil invenit Anguill. quod melius respondeat Atrageæ, quam Vitem albam, quam Fuchf. pro Vite nigra posuit. Si Atragea haberet fructum racemosum, uti vult Diosc. suam habere Vitem silvestrem, eam esse diceret Anguillara. Rob. Const. in lex. adp. Jun Theoph. quam Plinius Vitæ silvestrem transulisse refert. Qua de re tamen Lob. adv. adhuc dubitat, dicens, Viorna vulgi, forè Vitis sylv. Diosc. & Atragea. Theophr. Non ergo pro Vite sylv. eam planè recipit. Acinis, inquit, est compluribus confertim stipata ab uno pediculo, aptis, rotundis, rubentibus ex fusco, compressis tamen: quare nonnulli docti, ubi *χίμα* legitur id est, sphærica figura acinorum vel granorum, leviuscula immutatione & commodiore sensu legi volunt, id est, rotundam compressam figuram. Ac tamen conjectura hæc ipsi non satis animam expleat, tamen multò minus ejus judicio respondent. Amara dulcis vocata, aut Bryonia nigra quas suis locis commodius & necessariò aptavimus, notis: Eidem. Obl. dicitur Viorna vulgi, & Vitis alba Italicorum, l. c. Viorna.

Cyclaminus. Dod. gall. l. 1. c. 11. Cyclamini species secunda. Cyclaminus alter, *χίμα*, *χίμα* & *χίμα* aliorum, quam postea eodem lib. cap. 48. Vitalbam & Viornam inscribit, speciemquæ Clematidis alterius haberi refert, sed sibi Cyclaminum alteram potius videri assent. Idem de purg. & hist. in sol. ait Vitalbam, Bryoniam nigram non esse, ut voluerit Fuchf. legitimam Bryoniam nigram aliam esse. Verum non negandum ad Clematidem alteram accedere atque ejus speciem esse, licet tamen & alia sit.

Thal. Clematis. Matthioli. Castori, cujus figura non placet, Clematis Italorum Vitalba. Matthiolum ignorasse, Clematidem alteram liquidò constare a bitratu Gailand, potè dixerit Matthiolum, quam gens Italica Vitalbam vocat à Diosc. sub Vitis sylv. nomine describi. Sôlerio, Clematis altera Diosc. Plinio

indicta, Vitalba Italicorum. Lugd. Vitis sylv. Dalechampi, Clematis; Matthioli. Dalech. in lib. 6. Egineta c. 77. est Celi & Latiorum Vitis Italica, Vitis sylv. Diosc. & Theoph. Atragea. Tab. Vitis nigra 2. Icon ejus nihil valet: Compiler etiam de hac planta confusè scribit. Ger. quoque pro Bryonia nigra sylv. Cordi, malè ponit iconem malam Vitis nigra 2. Tab. Sed ejusdem plantæ aliam exhibet meliorem, cui titulus Viorna, Theophrasti l. 1. c. 10.

Ad Clematidis alterius classem quin sit referenda quam Anguillara Atragenem Theophrasti conferat non dubitat Clusius, & insuper Plinio l. 16. c. 4. Vitis sylv. nomine notam fuisse assent, ut etiam cunctis utriusque scriptoris verbis conferenti faciliè apparebit. Sed Plinius lib. 2. aliam adhuc Vitem sylv. profert à Labrusca differentem geniculatam, rimato cortice, quam si quis conferat cum Vite sylv. Dioscori, unam eandemque stirpem ab eis describi competere. Eam autem Plinius esse credit, quam vulgus Vvam taminiam vocat.

Cef. Vitalba. Schw. Clematis seu Vitis sylv. Biphyt. Clematis live sylv. latifolia ad Clematidem Diosc. & Atragenem Theophrasti referenda. Eudipin. Clematis sylv. latifolia, in foliorum divisuris mirè ludens, & samenta aliquando brachiorum crassitudinis producens.

Secus marginès agrorum inter vepres & sentes crebro reperitur apud Italos, Germanos, Gallos, etiam Belgas, Iero secundoque solo autor est Dodonæus. Vulgaris omnibus, quas Clusius adit provinciis vicinis arboribus & sepius se implicans, Iulio mense flores, fructus plumis suis incanescentes Autumno, dependent. Passim provenit spontè. Basilex vidit florentem mense Junio & Augusto extra portam S. Albani: ibidem cum seminibus inter portam Stein & Eschen.

Gustus fervidus & acris calidam arguit vim. Vitis sylv. us ad circulos pro retinendo labente utero. Ad constringendos sales, veluti Salices & alia vincula, adhibetur.

CLEMATIS HÆTICA CLVSIO.



Peregrinum est hæc Clematis Bœotica genis, & à nemine quod Clusius sciat, antequam ejus historia evulgaretur, observatum. Longa autem habet samenta, lenta & ramosa, binos per intervalla capreolos contrarius semper inter se pediculis nascetes proferentia, quibus vicina arbores & frutices scandit, folia pyri ferè, imposita tamen, dura, viridia, in ambiguitate siye serrata, acris & fervidi gustus, singularia in singulis pediculis, sed plurima simul ex claviculæ articulis prodeunt, inter quæ, ex utroque samentorum latere pediculi exeunt, caliculus Tithymali caveolis seu latellulis similem sustinentes, ex cujus medio exiit capitulum ex multis seminibus milio æqualibus constans, quibus insident oblongi glandoni, & alba quodammodo villosa plumula.

Clus.

Synon.

Clus. hisp. & hist. Clematis altera Boreica. Lugd. & B. phyt. Clematis altera Boreica Clusij. Lob. Obs. 8. Clematis Boreica Clusij. Tab. & Ger. Clematis Boreica. Germ. Spanische Waldrahen: Angl. The traucilora Joet of Candie. B. pin. Clematis 3, peregrina foliis Pyri incis. Hanc stirpem primam inveniebat Clusius anno

Locu.

1569. inter Asindum (vulgo Medina Sidonia appellatum) & Calpen, secundum fluentem, vicinas arbusculas operientem & suo pondere deprimentem: deinde alijs Boreica locis, Ianuario jam suos concinnos expleantem. Non dubium est quin ad Asindum, curus Dioscorides lib. 4. meminit, referenda sit, cum & forma & temperamento sit illi valde similis.

Temper.

Temperamentum.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA

scandens tenuifolia alba.

Descriptio.



Clematis hanc per se summa, non nisi proximis sulca in altum nititur, neque tamen id illorum capreolorum ope facit, sed foliorum pediculis sepes amplectitur. Sarmenata habet striata, viridantia, geniculata: folia recta, caulibus Flammulae foliis similia, à Vitalba sive Athragene differunt longitudine, angustia & soliditate: tota etiam planta minor: flores albi, odorati, qui unda vi labia, si impru-

denter attigerint, inflammant. Semen succrescit phymaceà crista insigni: Huic similis si non eadem, parva admodum, foliis valde tenuibus à nobis observata est, seminibus cum prædicta isdem.

Gesl. h. Clematis, Flammula quorundam flore albo, in Gallia Narbonensi. Lob. Adv. (ubi falsò scribit Matthiolum hanc rejecisse, siquidem is eam non novit) Obs. & Ic. Clematis altera urens, vulgi Flammula. Dod. gall. Clematis altera vera, aliquibus Ambuxa & Epigotis, modernis Flammula nuncupata. Eid. hist. purg. & in fol. Flammula, Flammula adnuculis egenis, Flammula prior: Flammula pro Clematidis alterius specie habita [ipsius in gall. hist. suis eius opinionis] licet & semine & florum cum figura, cum colore & magnitudine ab ea differat. Lugd. Flammula, Flammula Dodonzi, quæ nulla melius respondet facie & viribus Clematidi alteri Dioscoridis, teste Lobelio. Cæs. Viticella. Tab. Clematis urens. 1. Lienn/Leinen aut Waldrahen. Cuius icon posset etiam competere Clematidi latifolia quam debebat eo capite Compiler ponere & non alio relegare, ubi eam vocat Vitimigran; oportebat annotare discrimen si non exus de coloribus scripsisset. Ger. Clematis urens, Ang. Wiggins Bower.

An Cam. h. Clematis altera flore albo, Flammula repens Dodonzi: An Gesl. coll. Salicastrum, quam ait esse Clematis alteram, plantam amplexicaulem & urentem? An Ang. Clematis.

C. Bauh. 1. B. phyt. Clematis sive Flammula. 1. repens. Eid. pin. Clematis 4. Flammula dicta, quod contusa ap-

plicata, vesicas flammæ instar excitet: folius est aliquando Apij modo divisus: est etiam simplex vulgaris, alia multiflora, quæ Clematis urens 2. Tab. Clematis urens multiflora, Ger. Idem per Clematis idem maritimam repentem forte intelligit nostram Clematidem parvam. Est autem ipsi hæc in pin. Clematis 4. Clematites, Angl. In prod. sic describit: cauliculos habet squamulosos, geniculatos & striatos, cubitales, atrovirente cortice vestitos: folia Flammulae erectæ instar oblonga, acuminata, nervosa, rigida, sed angustiora, quod communiter tria unipediculo, qui velut in capreolum abie, insident, & quædam per circumferentiam non nihil crenata, quæ vero in summo caule floribus subijciuntur, angustissima sunt: flores albi sunt, multis staminibus villosis albis, medullarum occupantibus, longis pediculis sustentati: quibus semina plana, subrotunda, rufescentia; ut in Flammula erecta, sed minora, bina, ternave juxta, singulis capreolo plumoso, veluti in aza crista donatis, succedunt: hæc acris sunt quemadmodum & tota planta. In maris Adriatici litonibus, ut in Venetorum Insula Lio & Litzeffina, suis sarmentis repentem observavi.

Spontè sua (describit Dod.) in Belgio nusquam exit, sed hortensis est: flores sub Augustum, semen semis succedit. Vidi ego in Rhætia florentem mense Junio; Monspeij Septembri, ubi sepes & arbores scandit. Eum etiam ramos ambientem observavi mense Ianuario & Martio, Patavij apud Cortusum. Clematis autem parva à nobis visa est in montibus propè Castelnovus non longè à Monspeio, mense Octobris.

Acris & valde calida est, sed tamen Flammula Ranunculo mitior.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA

stricta alba.



Fibrosam radi- Descriptio.
cem demittit & albicantem: sarmentis nullius opis indiga, suâ vi in duorum & plurimum cubitorum altitudinem nititur, larvia, teretia, propter terram nonnihil cubentia, fistulosa, & geniculis intercepta: folia cujusmodi serè in vulgi Flammula, aversa patte subhirsuta & serè incana, adversa vero atrovirentia: flores consimiles, copiosi, quadrifolij, candidi, apici-

bus viridantibus. non minus urida vi vesicas hæc excitat quàm cognata repens. Hæc ab us, qui diligenter observant, teste Clusio, duorum generum esse deprehenditur. Vna enim sarmenta rubescentia habet, quemadmodum & foliorum nervos & pediculos, præcoctiorque est, & odoratum fert florem. Alterius autem sarmenta cum foliorum pediculis viridant, & florem sepius proferunt. Humanam vero altitudinem antequàm sarmenta ut plurimum superant, & singulis annis nova, eaque frequentiora in eunte Vere (marcidis & corruptis prioribus) renascuntur. Huic prorsus similem sibi natam meminit

Clematis
flore alba
plena.

Clusius, semine ab amico sibi misso Clematis flore albo pleno appellatione. An verò talis reperitur, Clusium latet: ipsi certè nunquam videri contigit.

Flammula
Platensis.

Matth. existimat esse Flammulam Platearij: Dodonæus tamen Platearium de Flammula Ranunculi quadam specie citat, quàm de hac scripsisse crediderit, ac etiam recentiores ab acro & mordaci eius qualitate nominasse.

Matth. re-
darguer.

Matth. & Lugd. Flammula. Dod. Flammula altera. Lob. obl. & Ic. Flammula altera surrecta. Tab. Flammula, Flammula Iovis, Brentwurz / Bletterzug. Ger. Flammula Iovis surrecta, Vprigt Wirgen Bower. Clus. Flammula Matthioli, & Clematis altera; sic & Turn. Cord. in Diosc. Flammula frutex. B. phyt. Flammula 4. Eid. pin. Clematis 4. sive Flammula recta; sic & Cam. & Eyst. Centella herba, quæ trita tumoribus imposita pustulas excitat, in epist. ad Monardem huc referri potest.

Lacm.

Adeo frequens in Austria inferiore & Pannonia ut nullæ sint cedux silvæ præsertim circa Saviorum in Danubium delabentium ripas, illis tumescantibus inundari solitas, quæ eâ non abundant. Rarissima aliàs, Dodonæo, Germanis ac Belgis est, & hortensis tantummodo. Vere nova promit foliola, & cauliculos; æstate flores; Hyeme solæ reliquæ sunt radices. Basilex florentem mense Iunio & Septembri vidi in hortis.

Temp.

Viret.

aque.

Ex Flammula (rectam proposuerat) sæpius Matth. aqua n elicit, & misso vitreo organo in calentis aquæ balneo, quæ eadem, quæ herba ipsa, pollebat acrimoniâ. hanc compertum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (ut Platearius est auctor) exal facit siccatque ordine tertio. Sed quod imposita carnem non secus exulceret ac ignis, calidam ordine quarto rectius crediderim: Sunt qui Flammulam quartanariis edendam præbeant, magno (ut ferunt) iuvamento. Alij ejus oleum commendant ischiadicis, articulorum, illiisque doloribus, urinæ angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autem præparant hoc modo. Flammulæ folia tenuissimè concisa in rosaceum imponunt, quod vitreum vas exceperit, ac inde per æstram insolant obturato vase. datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Ex Flammula (inquit Camer.) scardente elicitur aqua, quæ spiritus vini instar servida est; folia carpo imposita vesicas excitant, & multis contra odontalgiam prodest, cujus etiam in febribus pestiferis usus est.

Temper.

Quartana

Oleum

articulorum

morb.

Odontalgia

Carapif-

ma.

Tumores suppurati difficles cataplasmatè ex Flammula (rectam describit) contusa cum oleo, tum maturat, tum aperi Tabernamontanus. Qui ex ea stillatitius liquor elicitur, intra corpus non usurpatur. quod si quis eo uti velit, in morbis frigidis, cum alius aquis est miscendus, ne viscera lædat.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA flore cæruleo & purpureo scandens.

Defert.

Concinnior est quàm vulgaris Flammula, foliis cad Athragenen propius accedentibus, ut quæ quàm Flammulæ breviora sint & latiora, & variâ specie Athragenes foliorum modo ludentia, modò integrâ, aliàs divisa semel aut iterum, minimè tamen serrata, lævia, atrovirentia, sapore acro, ex pediculis tenuibus, rigidis, subrubentibus, subhirsutis: sarnenus autè luis innititur depactis pedamentis non secus ac Flammula vulgaris repens sed præcipua est florum gratia, qui non tantum odore suavi placent, sed & colore purpurante oculos morantur, quatuor



foliis (quorum vel unum integrum Flammulæ vulgaris florem facile superet) crucis modò dispositis constantes: in quorum medio cinnannus staminum ex viridi pallentium, succedunt semina. An Matth. Iesse minum, sive Gelsenium cæruleis floribus: Est ei in post. comm. lat. Clematis clematis. tertia floribus purpureis: hist. Germ. Linnæus od. Walderben, Clematis altera: Dioscoridis. Geln. h. Clematis Flammula Colden-

bergij, flore rubro. An eadem ibidem Gelsenium cæruleis floribus? Dod. gall. Clematidis alterius altera species: Eid. hist. Clematis altera, & nonnullorum & nonnullorum Amburum, ut quidem Dioscoridis spuria habent: Hispanorum Gormadera, quasi Vomitoria. Lob. Adv. (ubi Dodonæum ait deceptum ab his, qui sibi persuaserint in Angliâ passim luxurigare) Obs. (ubi distribuit an Pothos Theophrasti sit) & Ic. Clematis peregrina cærulea & purpurea. Cam. h. Clematis altera flore purpureo, topiario operi aptissima. Hist. Matth. germ. posuit novam figuram, sub titulo Clematidis alterius Dioscoridis. Est & Castori Clematis altera, Ic. Vitalba purpurea, scandens arbores ut Smilax, floribus purpureis magnis, ex quatuor foliis. Cast. pro hac planta malè habet figuram Vincæ pervincæ. Apud Clusium hist. Clematidis alterius titulo simpliciter sine descriptione posita icon. Fortè hæc censenda verior Clematis, quia flores magis accedunt ad Clematidem priorem sive Daphnoideam, & upilla, sit topiaria. Cæf. Flammula flore cæruleo. Theophrasti & quorundam, Desiderium Gazz. flore liliatini. Tab. Clematis cærulea peregrina frembd blam Walderben. Cur hujus figuram repetit sub diverso titulo, qui est Clematis purpurea, Purpurbrun Walderben.

B. phyt. Clematis 6. sive cærulea repens: qui annotat, & rectè, Leonem Matth. germanici esse transpositam & sub Clematide tertia exhibitam; ad Clematidem Diosc. referendam, variare flore simplici ac pleno, ut Cam. in epit. unâ figurâ expresserit; colore etiam purpureo, cujus nomen Tabernæ duas figuras proposuerit. Eid. B. pin. Clematis 9. cærulea vel purpurea repens: Clematis tertia, quæ Flammula, Cæf. Clematis peregrina incarnato simpli flore? & Clematis peregrina purpurea simpli flore, Eyst. Ger. Clematis peregrina cærulea / Blonella diera Bower. Clematis peregrina. 2. rubra, Rod lae diera Bower.

Gaudet, ait Dodonæus, soli expositis, sed tamen non omnino aridis locis: læto & haud irriguo solo melius proficit. Apud Belgas hortensis, in Hispania verò & quibusdam Italiæ locis juxta sepes & agrorum margines spontè exiit. Augusto mense, & quandoque Julio, floret; semen Septembri perfrigit. Flammulam flore purpureo ex semine ratam habui Lugduni, florere tempore orto Maio. In Rhætia peregrina cum D. Gesnero in monte prope Münsterthal inveni plantam valdè similem, fruticosa parvam, flore magno ex longo pediculo, cæruleo, constan-

Lacm.
Temp.

constante quinque foliolis: florentem mense Julio: foliis magis serratis quam in ea, quam Lugduni habui.

CLEMATIS PURPUREA FLORE pleno scandens.



CLEMATIS hęc sarmētus & foliis scanditque in plexu per carum proxime de se pectus: flos verd, purpureus multiplici foliorum stipatu luxurians, saturatior, internā poulignā in foliorum facie, extrinsecus enī in lanugine ciniceā pubescent.

Clus. exor. appen. 2. ad. juv. historiam lib. 1. c. 36. Clematidis alterius nova species, illius quodam generis, quod florenti habet exeruleo purpurascen-

tes, sed alterius formæ multiplici se foliorum textura.

Bauh. phyt. & pin. Clematis cerulea flore pleno; Eid. pin. Clematis 10. Clematis altera flore pleno, Cam. ep. & Clus. cur. post. Clematis peregrina purpur. fl. pleno, & Clematis peregr. incarnata plena, Eyst. Flore est ceruleo, purpureo ceruleo, incarnato, ad purpureum colorem, sed ad modum dilutum accedente.

Clematidem flore purpureo pleno vidi Stutgard. in hort. Ill. D. VV. ubi Hicte sub tecto reservatur: florenti Junio & Julio.

CLEMATIS CERULEA SERRATO folio.



Sesqui palmatis hęc est, cauliculis pluribus oblongis, quibus singulis folia crebris divisuris infecta insident trigemina coherencia, ut in Anemone Geraniifolia; flos longissimo ac tenui pediculo ipsidet. ex quatuor tantum foliis compositus, coloris oblique purpurascens; semen non visum, nec rari, à Bauh. qui eam ex sicca descripsit.

A sarmētosa radice (ait Pona in d. ser. Baldi) ger-

minant multi caules vitiginei, magis subules, quam in aliis Clematidibus; lignosi, angulares, lenti, & tricubitalia, quibus surculi multi adhuc magis subules quatuor digitorum altitudinis, qui æqualiter bipartiti ad latera dividuntur: singulique obtinent tria folia iusto intervallo divisa, & pediculo brevibus.

sumo adnexi, formā nuttæ, tamen majora, satis profundè per ambitum secta, nervosa, rugosa, inæqualis magnitudinis, nigroque virentia: cit illi flos crucem repræsentans, foliis mucronatis, lanuginosis, ceruleis albicantibus, cujus mediū in acervulo quodam extremis foliolis (uti in Rosa Alexandrina apparet) decoratur. Est sarmētosa antipidi & perennis radice: tota planta aliā aliquantulum acris sapore prædita est.

C. B. Clematis 7. sive alpina Geraniifolia: Clematis cruciata Jungermanni. Clematis cruciata alpina, C. B. Ponz.

Onitur in altioribus Baldi rupibus, quibus Eurus dominatur. Bruma æscunt folia. Hanc eandem speciem, quam anno 1561. in mea peregrinatione per Alpes Rhetice observavi florentem mense Julio in monte propè Münsterthal, de qua ante sub Clematide cerulea sive purpurante.

CLEMATIS PANNONICA FLORE ceruleo surrecta.



Complures radix satis crassa à laceribus spargit fibras, fulvas, nervulo ligneo cardido factas, sarmēta inde complura, Clusio quaternia, aut quina, ad cubitum & sesqui cubitum exsurgunt, recta, dura, striata, argulosa, subhirsuta, nonnihil purpurascens, geniculata: ad quorum singula genicula, folia sine pediculis sunt bina opposita, Plantaginis majoris serè paria, minora tamen, similiter per longitudinem nervosa, acuminata, in ambitu lanuginosa, superne ex atro virentia, inferne diluora, lanugine quadam per nervos resperfa, Clusio Asclepiadis parè foliis respondentia, non valde dura, servidi gustus, quem admodum Flammulæ Matthioli folia; ex superiorum foliorum alis, pari incremento surgunt gemini adversi surculi, eodem modo se habentes quo sarmēta primaria, nisi quod minora sint multis numeris folia: atque tam in primariorum sarmētorum, quam alarum surculorumve extremis, flos rutabundus unicus magnus, quatuor foliis mucronatis crucis in formam, inquit Clusius, decussatis constans, modicè sursum reflexis, foris saturatè ceruleis, calicula, minus cerulea lanugine per margines obsitis, intus verd glabris, nec tam intensè, atque medium extimi folij, ceruleis: medium occupat villosus glomer fibrarum ex luteo albescens, quarum complexu continentur stamina alia glabra, viridantia, apicibus ex albo luteis, atque intra hæc tertia fibrarum virentium intorta phalarx; semen compressum magnum Clusio Pulsatilla semini serè simile plumatum, ut in Viorna vulgi Gallorum; nullius acrimoniae particeps autore Clusio.

Tametsi hæc fruticibus se non implicet, sed satis firma sit; nec ad miniculis egeat, Clematidis tamen nomen ei imposuit Clusius, quod ejusdem sit temperamentum & florem purpureum Clematidis serè similem habeat. In pann. hujus Clematidis duas figuras habet.

Clematis cerulea

Clus. not. habet.

HISTORIAE PLANTARVM

habet, primamque & secundam nominat, quæ meo iudicio unius plantæ sunt, cum etiam in hist. unam tantum describat, & depingat, quam quosdam Clymenum falso vocare refert, cum Clematis cærulea pannonica sit.

Tab. nat. Tab. Clematis cærulea pannonica, Vngerisch blaw Waldrebe: Item, Clematis cærulea 2. Blaw Waldrebe. Dux hæ sunt ejusdem plantæ icones ex Clusio & Tabern. mutuatæ, unam tantum stirpem denotantes. Lob. Obs. & c. Clematis altera longifolia minor. Cam. h. Clematis pannonica cæruleo flore, folio pæne Asclepiadis. Lugd. Clematis altera minor longifolia Lob. Clymenum quorundam. Ger. Clematis pannonica, busch Bomer: Item, Clematis major pannonica, great busch Bomer.

Tab. nat. B. ph. Clematis & cærulea erecta. Figura Lobelij (ait) & eam quæ simpliciter, & quæ pleno est flore exprimit: à Clusio Clematis cærulea pannonica prima, flore simpliciter, secunda pleno, pingitur. Tabern. duas habet figuras Clematidis cæruleæ pannonicæ, & Clematidis 2. nomine: ac utraque simplicem florem exprimit. Dumenim Lobelij figura nimitandam curavit non advertit apud Lobelium & plenum & simplicem florem. Hæc frater. Ego Clematidem cæruleam furrectam nunquam vidi flore pleno, nec Clusius qui figuram exhibet ullius meminit quæ pleno sit flore, nec etiam Lobelius: semen quidem dicit Clusius eam ferre planum, in capitula rotunda & veluti pullulas congestum, quale pingitur in figura Clusij & Lobelij, non autem flos. Eid. pin. Clematidis 2. magnitudine varians: hirc dux heuræ apud Clusium & Tab. Flore est cæruleo, raris albo.

Luu. Inventa à Clusio spontè nascens in pratis circa Stampfen duobus ultra Posonium in Vrgiriz miliaribus & aliis ad Danubij ripas sitis supra Posonium, medio serè iurere inter eam urbem & Tabern. Floret Maio & Iunio, semen maturum est Augusto. Caulis sive sarmenta singulis annis ad radicem usque marcescunt, & incunte Vere novella, frequenterque ex ipsa repululant. Stutgardia vidi in horto Ducis, mense Novembri semine maturo: Montbelgardia in horto Ill. C. V. Viri. provenit mihi ex semine & sequenti anno floruit Iunio & Iulio.

CLEMATIS DAPHNOIDES, SIVE prima Veteribus. CAP. XV.

Clematis [Dioscoridis] quam aliqui Daphnoidem [Dioscoridis] alij Smyrnoideam [Dioscoridis] alij Gal. & c. vocat. alij Polygonoidem [Dioscoridis] vocant apud Dioscoridem, gignitur lato, pinguique solo [Dioscoridis] sic & Orib. [Dioscoridis] sarmenta autem habet parva [Dioscoridis] sic & Orib. & Paulus [Dioscoridis] luno [Dioscoridis] crassitudine: solum parvum, Lauri [Dioscoridis] folio & figura & colore simile, sed multo minus. Caulis foliaque in vino pota alvi profluvia & dysenterias sedant. Cum lacte verdè & rosaceo, aut cyprino subdita in pesto, cruciatibus vulvæ medentur. Dolores dentium commanducata finit: imposita quoque venenatorum morsibus juvamentum præstat. Fertur & ex aceto pota, contra aspidum morsus auxiliari. Nascitur in incultis. Marcellus autem in vetustis quibusdam codicibus legit pro lato pinguique solo [Dioscoridis] in Aegypto [Dioscoridis] quæ lectio ut Corratio, ite & Sarraceno placet, quod & Plinius de hac Clematide agens, lib. 24. cap. 15. eam Aegyptiam cognominet, subdatque Aegyptum eam maxime gignere. Sed non probatur nobis eorum opinio. Nec propterea quod Plinius aliquam Clematidem in Aegypto nasci scribat, textus Dioscoridis est corruptus. Nihil etiam probat incultum solum, quod pro confirmanda eorum opinione facere credunt.

Non enim obstat, quod minus incultum solum etiam pingue lectumque esse possit. Sarmenta longa pro parvis legendum censet cum in C. c. Sarracenus, quod & Clematidem longam & tenuem non solum magnoscit Plinius loco jam citato. Sed & c. ita legendum admonet: Et se enim longa, in quæterdu longissima ejus Clematidis, quam Vincam pervinca nuncant, sit neta, seu vitiginea flagella. Nemis autem temere, iteque juheio. Clematidem Daphnoidem Dioscoridis, & Clematidem Aegyptiam Plinij, eandem cum Vincâ pervinca statim Sarracenus. Nos de Clematide Aegyptia Plinius diximus ante sub Clematide veteri n. Su. qui volunt, Plinium hanc tradidisse lib. 24. cap. 15. ubi Vincam pervinca describit hinc venit. Nam Vincâ pervinca semper vivet, in molu lineæ [Dioscoridis] seu virgula habet luno [Dioscoridis] [Dioscoridis] foliis geniculatim circumdata. Topiaria herbæ inopia neta non floram aliquando supplet. Hæc à Græcis Chama daphne vocatur. Andra tusa [Dioscoridis] [Dioscoridis] hydriopis datur in aqua cochlearis mensura, celeriterque reddunt aqua n. Eadem decocta in cinere, sparsa vino, tumores siccant. Auribus sacco medentur. Alvinis imposita multum prodest datur. Hæc Plinius, qui si per Vincam pervinca eandem intelligit cum Clematide, nullo hydriopis præscribitur: nec etiam placet quod ait Dioscoridis morsibus venenatorum bestiarum, & dolores uteri sanare. Vincâ pervinca quidem apud Dioscoridem eam Daphnoides vocatur, sed non Chama daphne. Hieronymus, ut demonstratur h. n. g. lib. 5. cap. 1. Chama daphne per Pervinca Plinij, eandem quam nos intelligit plantam. De Chama daphne igitur cathartica, ejus adstringens facultas dysenterias & diarrheas cohibet, verum id est, non autem de Clematide, quam Plinius cum illa ignoranter confundit.

Cærotum, Clematis Aegyptia [Dioscoridis] in proverbium abiit, & ipso dici solitum fuit in eos, qui corpore præter modum procero atque atrociori essent: natum haud dubie [Dioscoridis] ab ejus herbæ specie de qua meminit Dioscor. lib. 1. & Plin. lib. 24. cap. 15. Lælius in vita Zenonis Philosophi, ex adfinitate Apollonij scribit, Zenonem gracili fuisse corpore, statu procero, atrâ cure: deinde amorem citat Chrysippum, qui in 2. proverbiorum suorum libro scripsit, ob eam causam à quodam Clematide [Dioscoridis] reddit interpret Latinus Diogenes Laertius Aegyptiam fuisse dictum.

Licet porro una solummodo Clematis à Dioscoride notetur, tres tamen ejus differentias magnitudine differentes observari scribit Marantha: & quar. tam etiam, duplicem in flore soliorum exitum habentem.

CLEMATIS DAPHNOIDES ML. nor flore cæruleo, purpureo, violaceo, ut & albo, simpliciter ac pleno

Clematis Daphnoides septatrix planta, humo [Dioscoridis] non attollit nisi proximis sulcibus nixa: radice fibrosa, sarmenta multa, torvia, teretia, vicia, & geniculata, quæ quævisum per terram se spargit, & quæ ubi arq. venit, è geniculis propagatis fibris rursus radicat: folia è geniculis bina opposita, foliis Lauri similis, minora tamen multo, acuta, rigida, levia, brevibus pediculis appensa, superne saturato virore nitentia, inferè edulcorata, sapore adstringente, subamaro: flos pediculo è geniculis enatæ duas uncias longo, singulari singularis insidet, oblongus, Gelsemii modo, nunc simplex in quinque laciniis altiusculis & latis disse-

Dioscoridis

Sarracenus

in a pona

tenuem virgam

seu virgula habet

Chama daphne

Andra tusa

hydriopis

Chama daphne

per Pervinca

Plinij

in proverbium

ab eo dici

quod corpore

gracili fuisse

corpore

Chrysippum

scripsit

ob eam causam

à quodam

Clematide

reddidit

interpret

Latinus

Diogenes

Laertius

Aegyptiam

fuisse dictum



Color vari-
us.
Clematis
daphnoides
Ruell.
Ruell. com-
fug.
Pervinca
Trago.
Herba vel
Viola mor-
tuorum.
Laurachu-
m.
Nomenclat-
io varia.

Color vari-
us.
Clematis
daphnoides
Ruell.
Ruell. com-
fug.
Pervinca
Trago.
Herba vel
Viola mor-
tuorum.
Laurachu-
m.
Nomenclat-
io varia.

summo ad imum linea decurrit lactea, id quod & in
multiplici observatur, verum quæ multiplici est flo-
re, eam non alio quam purpureo, aut purpureo-vio-
laceo colore observavi & bicolori variegatoque di-
ctum: Anno 1600. observavi in alba partes capiteas,
quod ante nunquam animadvertieram quamvis à
plurimis annis in horto coluerim.

Hæc est illa (inquit Matzell.) quam Etruria nunc
Vincam herbam vocat, quæ defunctæ virginis in
gentem nostram ad sepulturam coronatæ effertur: &
quæ familiæ Florentinæ aliquæ gentili iure suo pri-
mum ingredientem urbem Archiepiscopus cor-
onatæ ad portam exiunt stipantque & per urbem
comitantur. Cognitum facillima est: in hortis passim
nascens, tenuissimis viticulis potius per terram ser-
pens, quàm virgis ut Dioscor. ait de Chamæda-
phne, à terra se extollens: foliisque oleagineis ma-
gis quàm laurinis similibus. Denique à Dioscoridis
Chamædaphne historia longè differt, & nihilomi-
nus tamen Vincæ pervincæ Plinij, L. 21. c. 11. descriptæ
respondet.

A Ruellio L. 3. c. 80 Clematis daphnoides inscribitur,
cujus si quis (artis) imaginem, naturam, effi-
giemque exquisitis exploret, ea censetur esse,
quæ L. 21. Vincæ pervincæ, officinis Pervincæ, vulgò
Pervincæ nominatur. Miscet autem Ruellius in hoc
capite diversissimas plantas, auctoritatem confun-
dit, nec sibi constat. Idem rursus suo nomine lib. jam
citato, c. 112. Herimolai verba de Pervincæ repetit.

Corn. Clematis prior, Vincæ pervincæ officina-
rum, & Chamædaphne Græcorum. Tragus Pervin-
cæ florem assignat ex purpureo cæruleum, quinque foliis
distinctum, instar Borraginis, prorsus inodo-
rum. Hanc, inquit, quod mortui eam coronari con-
sueverint, nonnulli germanicâ voce Todtenkraut
aut redten Violen, h. e. Herbam, siue Violam mor-
tuorum vocant. Commune apud Germanos Per-
vincæ nomen est Yngrün, à perpetuo illi virore in-
dictum, Officinæ Pervincam nominant. Est autem
illa ipsissima Clematis Dioscoridis, quæ Plinio &
Daphnoides cognominatur. Possit & Chamæda-
phne, h. e. Terrestris, seu humilis dici Laurus, aut
ut Romani dicunt Laurago, & Laureola & Vincæ
pervincæ, quæ admodum alibi meminit Plinius.
Apud Dioscoridem sequentia Pervincæ nomina le-
guntur, & quædam, quæ in multis modis variantur. Apud Apu-
leium v. c. 18. multa exant nomenclationes il-
lius, nimirum Eupelios, Daphnoides, Hypoglos-
sion, Eupetdon, Diglossos, Nycephyllon, Pelleon,
Idæa Daphne, Samostracia Daphne, Alexandrina
Daphne, Mirion, Danaë, Stephane Alexandrum,

Chamædaphne, Carpophyllon, Daphnitis. Latine
Pervincæ, Victoris folium, Laurus Alexandrina &
Macedonica, Laurago, Mustellago terrestris. In Plinio
nonnullæ ex his repetuntur, & aliz etiam ad-
ciuntur, videlicet Hypetale, Pelasgum, & Stephane
Alexandri. Sed quantum mihi quidem videtur, re-
ctius universæ hæc appellationes Laurus Alexandri-
næ quàm Pervincæ tribuentur. Licet verò contro-
versia nominum in hæc quoque plantam irreps-
erit, nihilominus tamen descriptio, quæ apud Plin.
L. 21. c. 11. extat, Pervincæ huic satis responderet.

Clematidem Daphnoidem, inquit Fuchsius, Pli-
nius L. 24. c. 15. Clematida Egyptiam nominat: lib. 12. c. 11. Vincam pervincam, aliòque nomine
Chamædaphnen dici tradit, quod scilicet humilis vi-
deatur Laurus, ut nomen sonat. Non est autem cur
eam Chamædaphnen putes, quæ Romanis Laureola
aut Laurago dicta est, hæc enim à Vincæ pervincæ
genere scilicet diversæ est, & scilicet illam
Chamædaphnen depingit Plinius L. 24. c. 15. et hinc
manifestissimum sit Plinio duplicem esse Chamæda-
phnen. Vna nam quæ sic appellant Dioscorides, Ga-
lenus, & alij Græci. Altera nam quæ privatim Vincam
pervincam alio nomine vocat Plinius.

Gordonius Diosc. Clematis, Pervincæ species, affert
gendi, & habens. Matth. Clematis principio ad-
Diosc. descripta, ac aliquibus Vincæ pervincæ dicta;
vulgò tamen Italica Provenca. In hac nullam reperi
notam scribit, quæ Clematidi primi generis recla-
mare videatur. Quamobrem eorum sententiam ex-
ploderem putaverit, qui Pervincam Chamæda-
phnen esse sibi persuadent, quàm vulgò Laureolam
appellant. Eid. hist. germ. Clematis daphnoides.
Cam. apud Matth. Clematidis Daphnoides quatuor
agnoscit differentias: flore purpureo, cæruleo, & al-
bo, & quendam pleno: In hort. Clematis Daphn. si-
ve Pervincæ apud Plinium, flore cæruleo, interdum
albo: & purpurea Austriaca, à Clusio missa flore ele-
gantissimo: In Epit. Clematis: & Clematis flore
multiplici.

Gordonius de cons. vita per Laureolam, quam ad
stomachum ventris infaptum (ad lienteriam & diarrhæ-
am Arnold. de Villan.) præscribit, plantam de qua
hic agimus, intelligit. Confundit turpiter Lonic.
in Diosc. L. 24. c. 15. Chamædaphnen Dioscoridis cum
Vincæ pervincæ, quæ Dioscoridi Clematidis species
est. Ejus verba hæc sunt. Chamædaphne i. e. terrestris
Laurus Alexandrina à similitudine, vel vitium parti-
tate: Daphnitis à Laurus: Hydragogus, quod aquæ
urina trahit: Laureola ut & Laurago à Laurus, non
Laurago: Laurinis Vincæ pervincæ: Germ. Yngrün.

Anguill. Vincæ pervincæ optimè correspondens
Clematidi primæ Dioscoridis. Gesl. Clematis æ
gyptia silv. flore cæruleo passim: hortensis purpu-
reo: transtulit autem purpureum è Sabaudia circa
Lobannam hortis Tigurum: In cat. Clematis daph-
noides vulgò Vincæ pervincæ. Dod. purg. & hist. pinus.
Clematis daphnoides, floribus colore ut plurimum
cæruleis; quandoque candidis; raris rubentibus.
Clematis (aquis) quidem dicitur, quia instat & hinc
repentes proferat cauliculos, quos ad hunc [sarmen-
ta] Græci vocant. Daphnoides verò, cum à Lauri so-
liorum figura, tum ad differentiam alterius [majoris]
vel etiam aliarum. Nam Plinius plures ejus nomi-
nis refert L. 23. c. 15. ubi & hæc Egyptiam cognomi-
nat. Polygonoides verò vox inter nothas appella-
tiones etiam in Dioscoridis exemplaribus reperitur.
Præter hæc sunt etiam quædam, quæ potius
admodum. Alio autem loco Plinius L. 21. c. 11. Vincam
pervincam & Chamædaphnen appellat, ubi per-
tinet legimus in modum lincæ pro Lauri. Describitur
tamen ab eodem, & à Dioscoride & alia Chamæda-
phne. De hac nos lib. 5. H. g. agimus.

Lob. Clematis daphnoides, Vinca pervinca: an Centunculus Plinij: Item Obs. Daphnoides, polyflora Clematis purpureo rubens. Lug. Vincam pervincam, sive Clematidem majorem peramœnâ florum duplicatione variare scribit, quod Lob. non dixit: nec nos majorem observavimus flore pleno. Cæf. Provincia vulgè in officinis vocata, in umbrosis nascens, flore caruleo; fructu oblongo, veluti siliqua bifurcata, in qua semina oblonga, depressa: Vinca pervinca Plinij. Tab. Clematis daphnoides; Vinca pervinca flore caruleo, purpureo & albo, & pleno.

Clus. Clematis prior, *in quâ* cognominata, vulgè Vinca pervinca, quo nomine etiam ab ipso Plinio vocatur, qui lib. 24. c. 15. Egyptiam quoque cognominare videtur. Ejus autem duæ sunt species: Una vulgatio, caruleo ut plurimum flore, sed qui eum etiam variat, ut nunc albus, nunc subpurpurascens conspiciatur, interdum & mediam florem complectatur.

C.B. Clematis daphnoides minor. Vinca pervinca, Brunf. Chamædaphne altera Dioscoridis, Eid. Brunf. 4. Clematis, Lac. Turn. daphnoides, Thal. minor fl. caruleo, albo, & purpureo, Eyst. qui tres figuras. Eid. B. Clematis flore pleno: Clematis altera flore pleno, Clus. hist. ap. alt. Clematis daphnoides fl. purpureo pleno, Eyst.

Clematis daphnoides vulgè dicitur & Vinca pervinca, Germ. Singrün / Ingrün / Wintegrün & Stryten / Geln. Berrind / aut Berwind. Tab. Wilder Singrün / Cord. in Diosc. Belg. Vincorde & Maechde palmen: Gall. Peruviche: Gallobelg. *anche & Pucelage*: Ital. Pervinca: Hispan. Pervinqua: Angl. Perwinckle: Fland. Vincorde: Brab. Maechden palm & Ingroen: Boh. Berrind. Hung. Clematis altera per sepes repens, *Feyer venghe*. Ceteroqui cum Clematis & Daphnoides appelletur, jam ante Dod. ostendit. Dicitur autem Vinca pervinca, quod humi terpat, & se in modum funiculi porrigat, vicina quæque vinciens, autore Fuchio. Ingrün à Germanis, quod semper, & particulariter Wintegrün [*Hemate viride dixerit*] quod hieme vireat, nominatur. Stryten similiter appellatur, quod coeptra singus certet, & victrix evadat.

Clematidem numerosis, umbrosisque tractibus, & senticetis, atque agrorum marginibus gaudere perpetuè virere; Martio tamen & Aprilis potissimum florere in confesso est. Clusius subpurpurascentem apud Allobroges spontè nascentem inter vepres observare meminit, præsertim circa Lausannam, eamque interdum alium florem medium complectentem. Vidi ego in montibus Euganeis florentem fine mensis Februarij, Inter Veronam & Castelfranc, Ferrariæ, Basileæ & Genevæ, flore albo Aprilis mensis principio; caruleo fl. circa collem l'Abbatie & in hortis adhuc Novembri, alias Martio: Montbelgard: frequentem Aprilis extra novam portam in collè in dumetis juxta fossas, & in horto. Videtur degenerare non transplantata.

Siquis habuerit vinum turbidum, quodque colorem amisit, accipiat tantum hujus herbe (Pervincæ) quantum pro quantitate & copia vini sufficit, vasque imponat, ac illud deinde obturet, obturatumque quindenam relinquat, quod cum fecerit, vinum brevi purissimum ac clarissimè reddetur, & genium suum colorem recuperabit: præstabit tamen, si ritè temperare voles, ut vinum prius in aliud vas transferatur, tumque herba ut diximus utiliter injiciatur. hæc ita se habere experientia certè comprobavit Tragus. Folia ore retenta sanguinis fluxum & naribus erumpentem compressisse sequenter vidimus, inquit Costæus in libro suo de stirpium differentijs. Farnobus adalagata viridia folia, mensium

abundantiam cohibent, & conceptus adjuvant. Capiti adalligata, & collo, gulæve circumducta, sanguinem & naribus manentem sistunt. Admittitur quoque utiliter vulnerariis emplastris, & potionibus. Refrigerat enim (authore Matth.) licet, roborat, cohibet. Apollinaris caudam & siccam facit tertio gradu, quum tamen ejusmodi caloris gradum sapor non indicat. Felix Plat. extrinsecus ad venas hæmorrhoidales apertas occludendas præscribit Clematidem. Obscurè admodum. Sunt enim vigintiquatuor plantæ, vel etiam plures, quæ nomen habent Clematidis. Vnde quis obsecro (nisi vide peritus stirpium) dicet quæ planta sumenda sit: pleræque causticæ sunt & vesicatoriæ. Nos sumendam censemus Clematidem daphnoidem vulgè Vincam pervincam dictam. Vires quæ videntur Pervincæ convenire apud veteres, sunt ante scriptæ sub Clematidis Daphnoidis, sive primæ veterum titulo.

CLEMATIS DAPHNOIDES MAJOR flore caruleo & albo,



Per omnia majore est hæc Pervinca vulgari: folia quæ opposita ex semicircularibus & longioribus pediculis pendentia & viticulis junco crassioribus oriuntur, tres circiter uncias lata, paulò longiora, nunc acutiora, nunc obtusiora, cum acrimonia amarescunt, saporis ingrati. Flores ex foliorum alis pediculis herent sextantibus, longo corniculo, divisione & formâ florum Pervincæ vulgarioris, sed, ut par

est, multò majores, coloris carulei, & albi; apud nos interdum frigore absuntur: in hac siliquis sive cornicula singularia observavimus.

Dod. purg. & hist. & Tab. Clematis daphnoides, major. Lob. Clematis sive Pervinca major. Cam. Matth. & hort. Clematis daphnoides major caruleo flore. Cæf. Provincia altera major, folio latiore, quasi hederaceo, grandioribus floribus caruleis; Clematis Egyptia Plinij. Clus. Clematis daphnoides latifolia. C.B. Clematis Daphnoides 2. sive major. Clematis Egyptia hortensis flore purpureo, Gesn. h. Pervinca major, Eyst. Clematis 1. major, Cast. Cur Gesneri purpuream huc referat, non ut C. B. currit: nunquam vidi purpureo flore, nec scio an talis tradita sit ab aliquo autore: minor sanè dicitur purpurea.

Lugd. Pervincam majorem Lobelij peramœnâ florum duplicatione variare scribit, sed præter Lobelij opinionem, qui hanc ab ea separat, nec con-

fundit ut Lugdunensis. Hanc nec purpureo, nec pleno flore observavimus unquam. Spontè nascitur, cum multis Hispaniæ locis, tum in Narbonensi Gallia, magnâ præsertim copia circa Monspelium, toto ferè anno florens, ibi spontanea floribus etiam albis quætur Frontignanum.


APOCYNON VETERIBVS
CAP. XVI.

A Apocynon, inquit Dioscorides, aliqui Cynanchon [xuvāf, xuvāf, ver.] nonnulli Pardalanchon [xuvāf, xuvāf, ver.] alij Cynomoron [xuvāf, xuvāf, ver.], Ald. alij denique Cynocramben [xuvāf, xuvāf, ver.], e. Brassicam caninam, ver. hucar, appellam. Et verò frutex [xuvāf, xuvāf, ver.], vulg. exempl. [xuvāf, xuvāf, ver.], p[ro]p[ri]et[ati]s [xuvāf, xuvāf, ver.], sunt qui unguis, [xuvāf, xuvāf, ver.], constans virgulis, villum modò obsequiosis [xuvāf, xuvāf, ver.], flexilibus, [xuvāf, xuvāf, ver.], add. Ald. grave plenti-
fca huc ferè invidis: folijs Hederæ, attamen mollioribus & per extremum acutioribus, gravi-
odore, quadratius viscosis, & luteo succo turgen-
tibus, stratus seu Sabarum siliqua debet longitu-
dine p[ro]tenditur, folliculari specie, minutis intus se-
minibus, duri [xuvāf, xuvāf, ver.], parvis [xuvāf, xuvāf, ver.], atque nigris [xuvāf, xuvāf, ver.], pr. qui v[er]o [xuvāf, xuvāf, ver.], Mariell. rex. [xuvāf, xuvāf, ver.], alba
legit. verus autem, duri, parvis, atque p[ro]p[ri]et[ati]s [xuvāf, xuvāf, ver.], d[ur]i-
tate. Hujus folia cum farina subacta [xuvāf, xuvāf, ver.], ad p[ro]p[ri]et[ati]s
um can. [xuvāf, xuvāf, ver.], in panes coacta & in coacta,
canes, lupos, vulpes, & pantheras necant, ac p[ro]p[ri]et[ati]s
causa quadrupedum coxendices resoluunt.
Alii inter: p[ro]p[ri]et[ati]s Dioscoridis apud C[ri]o. Par-
dalanthes, alij Cynochon, alij Phaleon, alij Oligo-
can, alij H[er]p[ro]manes, alij Onissin, alij Ophio-
don, alij C[ri]o, alij Phaleon, alij Oligo-
phete Paralanthes, Romani Brassicam rusticam aut
caninam vocant. A vi & effectu nomen accepit h[er]c
planta, inquit Columna: quæ quia integrum, no-
men a canibus habet, & [xuvāf, xuvāf, ver.], d[ur]i-
tate, & xuvāf, xuvāf, ver.], addit. rursus etiam à vi necan-
di Pantheras, p[ro]p[ri]et[ati]s [xuvāf, xuvāf, ver.]. Hinc verò, ut ab homini-
bus cavetur, quia venenosa sit, atque ne pro Alec-
piade, à similitudine decepti de-
cant, Dioscorides
u[bi]a quædam venenosa diligenter describit: at-
que notam illi puritatem ab Alecpiade aliena ad-
scribit, luteum scilicet luteum, quo turgere asserit.
Apocynon ex Plinio videtur homini salutare,
quadrupedibus verum esse. Galenus verò con-
tra ait Apocynum sive Cynocrambe, vocatur à
quibusdam Cynomoron, quoniam canes deterri-
me necat. Est autem hominibus venenum, herba
valde graveolens, & omnino utilis non ingenero-
re: non tamen iuxta proportionem sicca. Quare et-
iam imposita, multum discutiendi vim habet. Hæc
Galenus simplicium. Ex quibus ego, inquit Cor-
nar. movet, ut non rectam esse putem Plinij le-
gionem, ubi lib. 24. cap. 11. sic habet: Sic & p[ro]p[ri]et[ati]s
cos, & omnes lateris dolores. Apocyni semen ex
aqua, scilicet sanat. Quum enim Dioscoridius
num ad humanum corpus præferebat. Et Galenus
venenum esse hominibus dicit, & extra solum cor-
poris impositum, discutiendi vim habere asserat: me-
rid suspectum est Apocyni semen, ut ex aqua biba-
tur. Ego itaque verbarum & p[ro]p[ri]et[ati]s, & omnes la-
teris dolores ex aqua ad præcedentia pertinere pu-
to, quæ de Radicula traduntur, ita ut sequatur. Apo-
cyni frutex est folio Hederæ, molliore tamen, &
minus longis viticulis, semine acuto, diviso, lanugi-
noso, gravi odore: canes & omnes quadrupedes, ne-
cat in cibo datum. Et hæc Diosc. sententia consona
sunt. Aliqui fortè non abs te Plinium interpretan-
tur, ut Apocyni semen ex aqua, intelligatur impositum,
nam digerendi cum habeat facultatem, poterit
lateris dolores sanare: sed certè inter sumptum Plin-
ium, intelligere videtur, cum ad superiorum simili-
tudinem dicit. Sic, &c. Hoc tamen periclitato-
ribus est relinquendum. Caterum cur Cynocrambe,
quasi canina Brassica, item Brassica rustica nomi-

T. II.

netur à quibusdam, non video inquit Gesn. n. si
quoddam siliquas proferat similes fortè Brassicæ mari-
næ, cui si similia habet folia, nempe hederacea: simi-
liter etiam succo turgereat, quamvis Apocynon luteo,
illa candido. Habent insuper ramulos similes, nam
quales Dioscorides Apocyno tribuit, longos &
lentos: tales ipse in Brassica marina, id est, Solda-
nella, vulgò dicta observavit. Apocyno (quod
Matthioli depingit, ex Egypto autem primam
à Bellonio inventum & demonstratum arbitror)
prorsus congenerem herbam illam existimo, quam
aliqui ridiculo nomine, Noli me tangere vocant.
Notandum porò aliam esse Cynocrambem Apo-
cynon dictam, prorsus venenosam quam hoc loco
Diosc. describit: aliam Cyniam, quæ item Cynocram-
bes cognominatur.

Ceterum Apocyni nomine donatæ sunt sequen-
tes plantæ: Apocynon sive Periploca scandens so-
lio longo, purpurante flore, lacteo succo, cuius &
altera species Clusio, angustioribus folijs, quæ An-
guillare Apocynum alterum, Apocynon Dioscor.
sunt qui suspicentur esse Scamoneæ Egyptiorum flo-
re albo. Est & aliud Apocynon folio rotundiore,
Apocynon Matthioli non repens. Apocynum
facile folium ample vixit tertium Clusio, est Lobelia
Apocynon sive Periploca prior. Apocynum 4. la-
golum Clusio, est Scamonia Monfeliensis. Apo-
cynum Syriacum sive Palestinum Beidelzar Alpino.
Apocynum Diosc. Fabio Columpæ, alijs herbatis
Alepias flore nigro, quorundam. Apocynum a-
lterum, inquit Turfusus, quidam Itali cam, quæ
Hindianæ dicitur sed esse non potest. Inscribi
tur hæc à p[ro]p[ri]et[ati]s, Alepias sive Vincetoxicum mul-
tis. Per hederam arboream sunt qui intelligant
Apocynon Dioscoridis, minus rectè.

APOCYNVM SIVE PERIPILOCA
scandens, folio longo, flore purpurante.

T Opus operis D[omi]ni.
unbus ad per-
gulas obumbradas
expetita est ana-
dendras hæc plan-
ta, non aliter ac Pe-
riclymenon vicina
admicula solita
scandere, vicinis
pedamentis se-
convolvens (unde
Periploca, quasi
circumplectens; ed
quod proxima am-
plexetur, dicitur)
multis longissimis
sarmentis, quibus
teste Clusio, & iam
præaltum arbo-
rum (si vicinas nan-
ciscatur) cacumina
superat. Hinc verò

ea sarmenta dura, lignosa, lentiuscui in vicia, ruti-
lantis ex fusco coloris, multis nodis sine geniculis
distincta: è quibus bina folia opposita, Alepiadis,
sed ex minus lato principio sentim dilatata, ex inter-
vallis, lacteo præ-
antia succo: in mucronem acu-
tum paulatim incessentia, obliquis à medio nervo
venulis cis marginem desinentibus ut in Myrto lau-
rea, quarum extremitates colliguntur totum ambitu
circumcurrentes viridis; flores extrenis ramulis late-
ralibus quaterni, quini, aut plures, veluti umbellam
efficiunt, quorum singuli quique folijs radatis consistat.

M

quæ infernâ parte glabra ex luteo virescunt, super-
stare verò hirsuta, obsoletâ purpurâ (cujus mediam
aream rhomboides macula vindis obtinet) tincta
sunt, oris virecentibus: quâ verò foliorum concur-
rant exortus, corollam efformant vegetioris pur-
puræ, quinque ejusdem coloris staminibus in medio re-
curvis emissis, omnium autem medium occupat
quinquepartitum villosum albidum capitulum; flo-
ribus porro succedunt siliquæ Rhododendri ob-
longæ, corosæ, geminæ ut plurimum & extrorsum
aliquantulum inflexæ sive divaricatæ, deinde mu-
rone coalescentes, quibus dehiscenibus papposâ
lanugine involutum semen apparet; radix latè se
spargens & subinde germinans.

Rhododendri
siliqua

Apocyn.
Periploca.

Repentis
genus.

Matth. Apocynum, Periploca non modò repens,
sed & arbores proceras scandens. Camperd. hist.
& hort. Apocynum repens, vel potius arborescens.
Arbores enim scandit, & admodum altè crescit. Gi-
giatur in Græcia, ubi vocant *Periploca*: hanc cum
succum emittit & folia æ siliquas profert inquit O-
leandri. Dod. purg. & hist. Periploca altera repens
dicta, caulibus perennibus, defluentibus foliis, unde
repentis sortitis cognomen: floribus haud magnis,
quinque foliolis albicantibus: rara Belgio, & quæ-
dam ut Matth. scribit, etiam Italiæ ex Syria istuc af-
fertur ad Diosc. Apocynum referenda. Hanc plan-
tam Dodonæo non fuisse visam florentem satis de-
monstrat quæ annotavit de floribus. Ang. Apo-
cynon alterum. Lob. Periploca serpens angustio-
re Periclymeni folio. Column. Apocynum alterum
& Apocynum repens vulgare. Clus. hisp. Apocy-
num 1. amplexicaule. Eid. hist. Apocynum 2. an-
gustifolium. B. phyt. Apocynum 1. sive repens,
purpurascens flore: Eid. pin. Apocynum 1. folio
oblongo: Apocynum repens, Matth. Lugd. & Cam.
Apocynum foliis Oleandri, Ang. Periploca, Cat.

Locus.
Tempus.

Periploca
repens.

Semine ex Italia accepto Clusio nata est, cum in
Belgio, tum Viennæ Austriæ, perennisque est, deci-
duis tamen hieme foliis, serilis flores producens,
quàm ut fructus ad maturitatem (quemadmodum
& Rhododendri) pervenire posset. Apocynum
vidi Patavij in orto D. Cortusij, mense Januario ad
magnam altitudinem circumvolvens palos, verum
tunc erat sine foliis. Rauvvolff. misit semen Au-
gusta pro Periploca repente ex monte Libano: ea
primo anno vix dodrantalis, sequenti duos homi-
nès superavit, se involvens foliis longis ad Nerium
accedentibus, quibusdam tamen latioribus in acu-
tum delinentibus: pulchra visu planta, succo lacteo
turgens, necdum tertio anno florem profersens:
etiam in altissimam exarsit, hiemem facile fert: in-
teridum tamen gelu corrumpitur remanente radice.

APOCYNNO AFFINIS SECAMO-
ne flore albo.

Def.

Syracis
fere.
Rhododen-
dri siliqua

Scammonij
species.

Apocynum
Diosc.
Periploca.

Planta est repens, altius saliens, sequè aliis ar-
boribus convolvens. foliis duris, longis, seseli
Æthiopici proxima, sed majoribus, flores terti albos
styracis similes, à quibus produciuntur siliquæ ob-
longæ ac crassæ, quales in Rhododendro videntur,
plena lanugine albâ, ac seminibus parvis. ex hac
planta succus emanat flavus, urens, quædam scaturum
Egyptij valenter tenues humores purgare aiunt.
Egyptij referente descriptionis autore Alpino,
Scammonij speciem affirmant quam Secamone ap-
pellant, cujus tamen nullum usum in medicina apud
eos novit. Hanc plantam Apocynum Diosc. esse
suspiciatur Guilandinus, eamque putat, quam ali-
qui ex Syria venisse, Periplocam vocatam prodide-
runt.

Clus. hisp. Apocyni alterius genus 1. Eid. hist. Apo-



cyni secundi sive
angustifolij species
altera per omnia se-
re similis Apocyno
angustifolio dicto:
sed tenuioribus ra-
mis, multoq; angu-
stioribus foliis, non
minus tamen viri-
dibus & nervosis.
B. phyt. Apocynum
1. sive angustifolium
albo flore. Eid. pin.
Apocynum 3. an-
gusto Salicis folio.
Sponte hoc A-
pocyni genus nasci
non visum à Clu-
sio, sed in hortis se-
mine ex Italia mis-
so ab eo cultum.

APOCYNVM FOLIO ROTVNDIO-
re, flore ex albo pallescente.



BREVIS frutex D. ser.
Best stirps hac
neque proximis se-
advolvens, verum
suis in viribus se-
eta statim plures ra-
mos divisi, cortice
interiore folia ad sin-
gulos nodos ex ad-
versis binis nascun-
tur, hederaceis si-
milis non angulosa,
modice acuminata,
crassa & molli, un-
cialibus & scatan-
libus pediculis ha-
rentia, succum re-
mittentia ex albo
pallescens, ex quo-
rum non flores u-
berum emittit lon-

gis in nris pediculis, umbellam quodammodo emen-
dentes, candidæ quæ in oblongis foliis contexti.
Hanc Clusius describit: Hujus stirpis pollicaris est
crassitudine, brevis, cinereo cortice rectus, plu-
res alas sive ramos divisus, qui licet tenui sint & vi-
mines, raro tamen vicinis stutibus sese advolvunt,
aut impleant, sed nullo adminiculo egentes, per se
subsistunt. folia perpetuo gemina inter se opposita,
ad singulos ramorum nodos adnascuntur hederaceæ
formæ, molliora, quavis satis carnosæ, quibus avulsis,
aut fractis, ex albo pallescens succus emanat: flos pu-
sillus, albus, Asclepiadis non dissimilis, ex alarum si-
nu quasi umbellatim prodit. Fructum (inquit is) non
obscuro habam, sed Asclepiadis fructui parè similem
intelligebam: semine certe quod hoc nomine aliquando
ad me missum fuit, Asclepiadeo par erat, planum, in me-
dia aliquantulum intumescens, nigrum, albâ interio-
re pulpa, quod terre commixtum, non est namum. Plan-
tam autem ipsam satis crassâ radice, pingui succo
turgida & fragili accipiebam à C. V. Alphonsio Pan-
cio, Ferratie Ducis Medico & Academiae professore.

Asclepiadis
flore, fructu
& semine.

Apocynon, q. & Brassicam caninâ appellat, etsi
diu Matthiolo quidem incognita fuerit, ad eam ut eam
inter alias incomptas stirpes in amplissimo natu-
re viridario posteriorum explorationi relinquendam
putant: anno tamen 1554. è Pisis Lucas Chinus duas
ad ipsam misit siliquas, Rhododendri siliquis ad-
modum similes: quarum alteri inscriptum erat Peri-
ploca.

Brassica
canina.

plocarepens, alteri verò Periploca non repens, fuisse quoddam Syriacis nominant: inter eas tamen hæc erat differentia, quod repens Periploca siliqua eâ sine longitudine consistebat, quæ & Rhododendro, gracilior tamen erat alterius verò brevior. E longiori lata plantam provenisse ait, quæ non modo humi reperit; sed & arbores quantūvis proceras scanderit: è breviori verò aliam, quæ notis omnibus Apocynon retulerit. Vtrique potro non minus late abundavit, quam Tithymali omne genus: verum id repens omnino album fuisse: non repens verò suberocum. Hinc itaque factum est, ut Ghino plantæ subscripserit, & hanc cui omnes priores notas adscriptas credidit, Apocynon esse certò affirmavit. Siliquas autem, quas hunc suo Apocyno appinxit, siliquas fuisse, in comm. de lat. cum mag. fig. demonstravit, ut in quibus eas, & meritis, mutavit.

Apocyni prima species, inquit Angul. multas habens notas respondentes. Apocynon esset, si occideret canes. Periplocadis nomine intelliguntur omnes plantæ amplexicaules: nec est nomen particularis plantæ, ut quidam existimant.

Clusio ad veterum Apocynum, quod Dioscorides etiam à nonnullis *Periploca* appellavit (differentem tamen à Cynocrambe, de qua peculiariter capite agitur ante descriptæ plantæ & sequentes referendæ videntur, sed hæc, de qua hic agimus, omnium maximè. Est autem ei lusp. Apocynon & Eid. hist. Apocynon latifolium. Lob. adv. & c. Apocynum, Periploca æzæa foliis latioribus, hederaceis: Obf. Apocynum, Periploca æzæa, Apocynon Guilandini, Matth. & Italorum, Cynocrambe Galeni, & Cynomorpha Adversariorum. B. ph. Apocynum à subrotundo folio, non repens: Eid. pin. Apocynum à folio subrotundo: Apocynum, Matth. Aug. Geln. h. Lac. Lugd. & Cast. Cynocrambe Ron. Apocyni alterum genus, Cant. Periplocarepens, Cæf. Dixerat Bauh. in phyt. non repens, quod in pinnifolio involvit, & ex Cæsalpino repens facit. Quondam ex horto Patavino allatam, nominavit Apocynon Dioscoridis, & Zingiber caninum Avicenna, Guilandini.

In horto Ill. E. C. (unde delata nunc non recordor) quodammodo flores, sed siliquas hæcenus anno à multis annis non profuturè conservantur in vase & hieme reponitur. Clusio tam Vindob. Austria alobat, hieme quidam folia abiciente in illius autem inelemtiam facile ferentem.

Mauritius Thaurer, Laurentius Hyperius & Joh. Krug. Doctores & Cancellarij Ill. Princip. Guilielmi Landravij relictur apud And. Bertholum de Terra sigill. & Clus. de Apocynis se Apocyni g. f. dedisse eam, qui post semi-horam, licet partem vomuerit, nihilominus post symptomata crudelissima convulsionibus & tremoribus interiori: alterum verò canem, qui cum Apocyno partem Terræ sigillatæ equalem devoravit, tribus post summptionem horis debilem utique fuisse, postero tamen die convalescente, & maximo cum appetitu edisse, ut sumpti veneni vix minimum signum apparuerit. Historia hæc revocat nobis in memoriam quod evenit Mōt-belgardij gubernante Nobili D. Io. Iohemio à Mündelheim summo præfeco: Quidam de Chymicis dicitantes, quid perquirendo Chrysopram, aurum suum reddidissent totum potabile & comestibile & fame pene perirent, voluerūt ex Medicina quantum facere, quod consuetū est in modis impostoribus Chrysopram. Terram igitur Silesiacam supra dictam, ac ut suspicamur à prædicto Bertholo hæc, magno pretio divendere conabantur, pollicentes usilem aduersus omne venenum. Sed eorum pollicatio flagra digna erat: hoc enim per experientiam tractare non poterant: imperante enim Præfeco nostro duabus

Tom. II.

gallinis data radix Napellæ (verum minus in parva quantitate) nullum illis nocumentum experire coepit se, vel cum Terra Silesiaca assumpta: dato autem Sublimato utraque perit, eaque eisdem quæ terram assumpserat, quæ enim non sumpterat vomitu partim rejecto veneno, duens superavit, altera cum non potuerit vomere, terna consupante sauces, citius perit. Quare nulli intoxicato consiliumus dandam Silesiacam terram, nec veram Turcicam, ante rejectum venenum per vomitum, nisi parva quantitate cum multo liquore ad movendum vomitum. Considerandum an Andreas Bertholus non deceperit medicos isore (quod non declarat ipse, nec Clusius) terram sigillatam exhibuit cum multo liquore, unde calida veneni vis infracta & vomitus facilius subsequutus: quod forte commodius præstitisset sola aqua tepida, vel cum oleo, aut butyro, aut melle, aut Oxymelle & similibus: ledores vid. ant. imposturam quam descriptis lib. 4. hist. n. g. de Lign. Nephritico ceruleo, & flavo tingente.

APOCYNVM LATIFOLLVM

amplexicaule.



Longis, tenuibus, & frequentibus sarmen- tibus, quæque scandit, multiplice circulo, & arcto, ex illa amplexicaule, viridibus, glandulatis, foliis pinnatis, mollibus, sub- cæci coloris, lacteo, succo, ut etiam sarmen- ta, aded tur- gidis, ut vellevi- mo vulnere, non minus copiose, quæ ex quovis Tithy- mali genere pro- fiat. Flores ex ala- rum sinu multi am- bellæ ferè in ano- rem prædeunt, can- didi, parvi, quinque foliis perinde ac Atelepiadis flores constantes: aliquæ præterea similes, multo tomento & lanugine plene, quæ semen occultatum planum, ex cineraceo suseum, Atelepiadeo semini par. Molestissimæ huius radices, quæ sarmen- tosa & fibrose admodum, eadem ferè crassi tudine longissi- me hac illac serpunt, & latè vicinè circum loca oc- cupant, candidæ alioqui & fragiles, aded tamen vi- vaces, ut, si vel minima fibra sub terrâ latens oculos illam eruenus effugerit, proximo Vere germinare, & vicina loca occupare, conspiciantur. Itaque, non minus exola hæc planta rei herbariæ studiosis, quam Aristolochiæ & Clematidis illud genus, cui vulgus Sarcacenica cognomen imposuit. Huius cauliculi & sarmen- ta hieme exarescunt & percutiunt, sed novo Vere alia & frequentiora germinant.

Apocyni à latifolij ubique semine plenas pau- cos annos post meum (inquit Clus.) ex Hispania in Belgicam reditum, Pincia usque murebat Ioannes de longoy Fabricarum Istic Præfeco, hispanica in- scriptione addita, quæ trepa per les arboles. h. e. per arbores repit: postea radices aded multiplicata est, ut nemo esset in universo Belgio rei herbariæ studiosus, qui eam ex suo horto penitus aut non euperet.

M. 2.

Apocynum
Diosc. Dod. Dod. Periploca prior, potissimam ad Diosc. Apocynum referenda, rara Belgio, & quidem ut Matthiolus scribit, etiam Italix ex Syria isthuc allata. Nos Matthioli Apocynum ad hanc non referimus, potissimam quoad iconem.

Scammonium
Atomp. v. a. pictor. Lob. Lob. Obs. Scammonij Monspelici varietas: Apocynos sive Periploca prior Dod. & Belgarum quorundam. Cognata figuræ & naturæ est cum Scammonio Monspelienfi flore, succo, viticulis & longo radice reptatu subtus hincinde porrecta, quæ aded vivax est, ut semel in hortos acta, vix truncari delective queat, etiamque frustillo tantillo relicto repullulet: sed foliis longioribus, siliquis verò & semine Vincetoxici cujusmodi è littoreis Adriatici sinus & mediterranei maris in hortis Belgicis alitur.

C. B. phyt. Scammonium, & Scammonia affinis. Eid. pin. Scammonia, Scammonia Monspel. affinis, foliis acutioribus: Apocynum, Clus. hisp. 3. latifolium, Eid. hist. Scammonij quoddam genus, Cels. Volubilis marina, Tab.

Scammonia
Clus. Frater C. Bauh. misit semen (quale fuerit non recorder) nomine Scammonia Clusij, quod secundo anno non tulit florem; folia erant cinereo colore, crassa, turgentia lacteo succo, acri, acutiora & minora quàm in Monspelienfi, nisi immutet ætate formam: protulit hieniem unam in horto Montbelgardij, tandem perit: fortè hæc est Apocynos modò à Clusio tradita: suspicor me hæc etiam collegisse Lutetia in horto Robini pro Scammonia Monspelienfi.

SCAMMONEA MONSPELIACA flore parvo.

Deser.



Asarifol.

IN longis, teretibus, ter uibus, bicubitalibus sarmentis, vicina quæque amplectentibus, ramosis, vel ut ait Lobellus reptantibus & stratis humi viticulis, vel piscatorum ategus & Tamariscis advolutis quinque cubitorum, folia nascentur opposita, Aristolochia, Clematidis vel Asari, falcata ad pediculum, in mucronem desinentia, lara, densa, glabra, albidula, unciâ longioribus pediculis hæ-

rentia, succo lacteo pręgnantia; flores ex foliorum sinu pediculo orto multatido insident plures confertim congesti, parvi, stellati, albi, semine lobel o angulosum in utriculo minore quàm Aristolochia. Radix longa, digitaliter crassitudine, alba: longo inquit Lobellus reptatu, multum fibrosa, succulenta veluti reliqua plantæ.

Consuetud.
genus. De hac Clusius: Convolvuli genus observabam non multum dissimile proximè descripto Apocyno, cum in sarmentosis ramulis, tum foliis quæ magis quidam orbiculata: in mucronem tamen desinentia, cineracei coloris. Tota etiam planta lacteo succo pręgnans & vicinatum stirpium cauleculis sese implicans, cujus semen mihi non cõspicuum. Ejus autem iconem, qualis isthic florès & sine radice à Clusio fuit picta, studiosorum oculis subijcere libuit.

Lob. Adv. Scammonium, Volubilis marina communis Pharmacopœorum consensu facta, cujus flos à Volubili omnium floribus differt: Eid. Obs. & ic. Scammonium Monspelienfe. Apud Cord. in hist. lib. 4. c. 109. hujus Scammonia pictus est ramulus, quævis Cordus ejus, eo loco mentionem non faciat. G. s. h. Monspelienfis Scammonia quædam floribus exiguis. Rauhvol. Scammonium Monspelienfe, incolis Tripolitapis Moudhendi; Razil. ad Almanforem Conzyola. Cam. h. & Lugd. Scammonia Monspelienfis maritima. Clus. hisp. Scammonia Valentina & Monspeliana: Eid. hist. Apocynum 4. latifolium & Convolvuli genus: Valentini & Monspelianis Scammonia, dicta, plurimum tamen à legitima Scammonia distans. B. phyt. Scammonia sive Monspelica: foliis rotundioribus, Eid. pin. Scammonia Monspelienfis, Eyst. Scammonia Valentina, Tab. Ger.

Lob. copiosissimi in toto illo littore & sabulato, ab usque Rhodani ostio ad aquas Mariænas & Sinum Agathorfen: flores fert Junio & Julio. In regni Valentini & Narbonensis Gallia maritima, præsertim littore illo, quod inter Volcarum stagnum & mare Mediterraneum est, herbidis locis Clusius observabat. Ego Monspelij in maritimis copiosam vidi, florente in mense Augusto.

Massilienses cum succo istius herbæ & Colophonia adulterant Scammonium tam ex ad, ut vix cognosci queat. Succo lacteo concreto, quo multo tota turgit purgationes moliebantur, sed majore dosi (quam Scammonij) & minore effectu: quippe succo nihil additum erat, sed coctione coactus niger vel fuscus erat.

BEIDELSAR ALPINI SIVE APOCYNUM SYRIACUM. CAP. XVII.



Deser. fu.
Alp. Alpini in Patavio retulit D. Cherlerus Beidelsaris fructum, qui oblongus, pugnum crassitudine equat, pediculo hærens unciali, crasso, tereti, duro, incurvo: cortex externus membraceus, viridis, inferius croceus qui tenuem alutæ eleboratam æmulatur: utrunque committit filamēta villosi musci arborei referentia: integrum denique firum totius fructus implet tomum.

vel in holoserico mollitie nequitiam cedens, color candidum, semine involuto Cucurbitini formæ, nudum minus, compressiore, fusco, pulpa albicante, sapore amaro.

Est autem plura ipsa, uti scribit Alpinus herbacea, fruticosa, multis stoloribus ab radice rectis, sursum ad duorum ferè cubitorum altitudinem se extollens: foliis latis, oblongis, ut Aloë folia, crassis & candidis, ex quibus distillat lac album maris, tota plantæ lacte abundat: flores fert croceos Ranunculi floribus proximis hucus bini invicem alligati pederis hominis et subus similes in quibus alba lanugo semina parva, lata, Laëux seminum emula continetur.

Quia

Quia autem elegans hæc planta in terra nostra exsul ut plurimum est, non abs re erit, ut aliorum de ea observationes addamus. Assurgit autem, referente Christophoro VVeixio, ad duorum cubitorum, vel etiam ampliorem altitudinem, satis crasso stolone, in aliquot ramos diviso, qui multo succo ex candido pallescente abundant. Quantum verò ex resiccate plantæ parte (quam ipse VVeixius ex Egyptiaca, Syriaca, & Constantinopolitana peregrinatione redux, mihi, inquit Clusius, Viennæ Austriæ communicabat cum uno fructu, colligere potui, striato est caule, cui alternatim bina semper, contrariis inter se pediculis innascuntur folia satis magna, crassa, & quodammodo cutacea, ex viridi pallescentia, aliquot nervis, ex mediâ costâ satis crassa se spatagentibus, prædita, obtuso mucrone, gravis odoris, tenella folia extremis ramis adnascuntur, proflus incana sunt; ex foliorum alis alternatim emergunt crassi & longi ramuli bifidi, sustinentes aliquot flores longiusculis petiolis innitentes, unico quidem folio constantes, sed quinque profundis incisuris diviso, instar florum Apocyni, Aselepiadis & multorum aliorum, coloris, quantum conjicere licebat, foris pallescentis, internè obscure & obsolete purpurascentis: quibus succedunt singulares, binæ, aut ternæ crassæ, incurvæ, binas uncias longæ siliquæ, quibus hiscentibus, sub summâ siliquæ cute, inclusa apparent membranaceo involucrio, frequentia & quasi imbricatim disposita grana plana, qualia ferè Aselepiadis, & Apocyni vulgaris semina, quorum extrema & angustiori parte inhaeret candidissima & molliissima quædam villosa materia. Sine perennis an non, nihil affirmare possum. Qualem autem in VVeixio accipiebam plantam, ut commodius describere possem, paululum in aqua macerabam: deinde crassâ minervâ delineabam, observatâ in fructu addito eâ proportionem, ut dimidio minorem exprimerem, quam ille qui à VVeixio mihi donatus. Beidfar ab incolis appellati dicebat. Cum autem multas notas habeat Apocynum non dispares, non ineptè, meo iudicio Apocynum nuncupare poterimus sive Syriacum, sive Palestinum, & fortè etiam Egyptiacum; quandoquidem in Egypto, ut postea dicemus, crevit. Non dubium est quin ea sit, quam Alpinus Medicus c. 25. libri quem de Plantis Egyptiacis divulgavit, & circa Alexandriam Egypti observatam descripsit Beidellarnomine.

De hac porro planta consulamus Honor. Bellum, qui multâ diligenti observatione dignissima memoriz prodidit, cuius verba hæc sunt. Ossar frutex est stolones multos à radice proferens rectos, rotundos, leves, geniculatos, quibus circa genicula insunt folia longa, rotunda, crassa, per quorum medium nervus excurrit albus, & quo utrinque venæ exeunt diversâ foliorum parte satis conspicuæ, folia autem ex intervallis bina semper inter se opposita sine pediculis stolones undique ambiunt, ex quorum alis multi rami nunc erumpente incipiunt, non quidem ex omnibus, sed alternatim, ita ut si, à primo initio sumens, lineam ab uno ad alium ducas usque ad ultimum, perfusus sum lineam hebecem describes. Radice firmatur validâ in multas fibras divisâ, luteos flores profert, fructusque Mali magnitudine, cordis figurâ, colore virides, binos aut ternos ex uno pediculo pendentes, in quibus semina lata, lanugine quadam molliissimo candidissimoque serico sumillimâ involuta: Caules & folia incana sunt, lanugine quadam tecta, ut crassiore quam in farinâ tota planta conspersa videatur, quæ imbricibus eluitur, eoque tempore folia & caulis colorem ex viridi ad album tendentem contrahunt: pars caulis radici proxima albo cortice tecta est,

Tom. II.

fungoso, rimis dissecto, ut Sambuci caulis videri possit, & illius instar multa medulla alba refertus est. Stolonum cortex & foliorum nervus copiosè lacte amaro & acri abundant: breviter tota planta aspectu pulchra est, & quas in fœtilibus servo semine ex Egypto accepto natas, ad trium cubitorum altitudinem jam excreverunt, foliaque hieme retinent: nondum autem vel flores, vel fructum tulerunt. Planta hæc in Egypto vulgariter Ossar appellatur, fructus verò Beid el ossar, hoc est, ovum ex ossar, aut Italicè Ovo del ossar. Beid enim Arabicè ovum significat, & el est articulus, qui Italicè dicitur del. Huius fructus lanugine pulvinaria implent, lacte autem coria depilant. Sine dubio, hæc planta illa est super quam Avicenna & alii Arabes Saccharum Al-husar (mannæ speciem) inveniri scribunt: & quam Serapio ex Abanifæ sententia, Mutoño interprete descripsit his verbis: Haofer, seu Alafer, seu Alhusar, planta est quæ lata habet folia, singulis annis succrescens. Saccharum ex ramis extillans, & à foliorum cavis quod copiosissimè legitur, non parum quidem amarefcens: poma profert camelorum testibus non dissimilia, quibus res quædam caustica, adurènsve emanat, cauterius maxime accommoda, ex qua etiam & culcitæ, & pulvinaria sulciuntur, planta cuius Cherca nuncupatur folia autem Haofer incisa humorem destillant in Maio colligi solitum, in quo coria depilantur, adeoque exsudat, ut vas quàm capacissimum ex una, vel altera expressione adimpleatur: lignum verò Haofer leve est, crassum, erectum, pulcherrimum, ut non iniuriâ in suis carminibus tum brachia, tum crura formosarum sanæ mulierum, ligno Haofer Poëtæ bellè comparent. Est & alia planta Haofer nominata ex Tithymalo, quidem genere. Hæc Serapio. Sed animadvertendum est, veterem Serapionis interpretationem rectius huic plantæ quadrare, quàm Mutoño, ut utramque cum nostra conferenti faciliè patere poterit. Describitur etiam hic frutex ab Abembitar Medico Arabe Hispano, in sua Simplicium hist. & à Malahy sah Medico Persa, qui Abembitaris historiam in Epitomen contraxit: quorum libros manuscriptos apud Haym Abenxusem Medicum Hebræum Hispanico sermone vidi, qui mihi Ossaris historiam ex eorum scriptis ad verbum hoc modo humanissimè interpretatus est. Ossar frutex est Tithymalaceus, longus & parte superiore tenuis, folia habens lata, super quæ decedit manna quæ Zucur el Ossar vocatur (florem fert Oleandro similem) hoc addit Malahy sah: Abembitar enim nullam floris mentionem facit, sed fructus duntaxat: folia ipsius plana & levia sunt, caulem habet viridem, concavum: fert fructum quendam similem sacculo pendenti, qui intus continet particulas albas unas super alias, quibus utuntur Arabes ad accedendum ignem, nihilque (dicunt ipsi) ad hoc munus peragendum præstantium inveniri posse: pulvinaria etiam hac materia implent. Oritur in montium cavitatibus, sicut ubi mons iungitur monti, quandoque etiam in arenis nasci conspicitur. Si caulem aut folium incidas, lac magnâ copîa emanat, ita ut quatuor & amplius libra ex una planta exeant, quod quidem est acre, calidum & siccum, corrodit & incidit, ut sit in principio quarti gradus caliditatis, planta verò ipsa calida est in fine secundi aut principio tertij. Habitatores Mechæ pilos extrahunt à coriis, depilant videlicet coria cum hoc lacte, ea in ipsa insidentes: quod quidem est vehementius lacte omnium Tithymalorum: drachma enim una & semis per os assumpta interficit evacuando & excoiando: folia verò in pulverem redacta, & inspersa super ulcera maligna atque corrodentia amplius progredi non sinunt: ligna,

M;

Saxones etiam Wilde rancem nominare, quod samentis Vitem xmulentur.

Clematis altera.

Vitalba.

Ligustrum falsum.

Fuchsiarum.

Viorna.

Flammula Labrusca.

Hardeia.

Gesneria.

Bryonia nigra.

Turn.

Athragene.

Viorna vulgi.

Amara dulcis.

Viorna vulgi.

Cyclaminus.

Vitalba.

Bryonia nigra.

Thal.

Matth.

Matth. in Diosc. Clematis altera, quam Vitalbis italicis vulgò vocatis plurimum facie respondere ait, proptereaque sibi omnino persuaserit, italicam Vitalbam esse Clematidem alteram (quam secundo loco reddiderit Dioscorides) contra eorum opinionem, qui acrem Clematidem eam plantam putant esse, quam quidam rei herbarie imperiti falsò Ligustrum vocant: falsò inquam, quoniam Dioscoridi Ligustrum arbuscula est, non herba, ut suo diximus loco. Fuchsi. Vitalbam Matthioli, Vitem nigram esse existimat, sed errat, ut postea dicitur. Cum apud Matth. germ. aliam apposuit figuram, dicens, quam Matth. vocat Clematidem tertiam, aliàs dicitur Viorna, & Vitalba, & quibusdam Atragena Theophrasti.

Geln. coll. Vitis sylv. caustica, Viburnum aliquibus, ac Gallis Viorna, ab usu urendi vulgò vocata. Flore enim, semine, cortice, & radice (inquit idem de hort.) vim urendi habet. Est hæc Clematidis plantæ cognata: quare à nonnullis recentioribus, sicut liter Flammula nominatur. Eidem cat. Labrusca, Vitis silvestris exulceratoria, vira, Item Vitis sylv. foliis Solani, Viorna, Hardeia. Sed Gesnerum de præfenti planta minus distinctè scripsisse, satis demonstrat vocabulum Labrusca & Oenantes, quæ nomina huic non conveniunt.

Ryff. Clematis altera, & Gallorum Viorna. Lon. Waldraben/Lynen/ Vitis nigra vulgò, Bryonia nigra Græcorum, Vitis Chironia & Bucranium. Confundit autem nomina duarum plantarum, pingens Atragena. An eadem in Diosc. l. 4. c. 8. Clematidis altera species, Flammula Officinis. Turn. Vitis nigra, Blac Bryonia.

Nihil invenit Anguill. quod melius respondeat Athragene, quam Vitem albam, quam Fuchsi. pro Vite nigra posuit. Si Athragene haberet fructum racemosum, uti vult Diosc. suam habere Vitem silvestrem, eam esse diceret Anguillara. Rob. Const. in lex. de Theoph. quam Plinius Vitis silvestrem transulisse refert. Quæ de re tamen Lob. adv. adhuc dubitat, dicens, Viorna vulgi, sortè Vitis sylv. Diosc. & Atragena. Theophr. Non ergo pro Vite sylv. eam planè recipit. Acinis, inquit, est compluribus confectis stipata ab uno pediculo, apus, rotundis, rubentibus ex fusco, compressis tamen: quare nonnulli docti, ubi viti viti xia legitur id est, spicata figura acinorum vel granorum, xia viti leviusculâ immutatione & commodiore sensu legi volunt, id est, rotundam compressam figuram. Ac tamen conjecturâ hæc ipsi non satis animum expleat, tamen multò minus ejus judicio respondent. Amara dulcis vocata, aut Bryonia nigra quas suis locis commodius & necessariò aptavimus, notis: Eidem. Obl. dicitur Viorna vulgi, & Vitis alba Italarum, i. e. Viorna.

Dod. gall. l. c. n. Cyclamini species secunda. Cyclaminus altera, viti viti xia & viti viti xia aliorum, quam postea eodem lib. cap. 48. Vitalbam & Viornam inscribit, speciemque Clematidis alterius haberi refert, sed sibi Cyclaminum alteram potius videri assentit. Idem de purg. & hist. in fol. ait Vitalbam, Bryoniam nigram non esse, ut voluerit Fuchsi. legitimam Bryoniam nigram aliam esse. Verum non negandum ad Clematidem alteram accedere atque ejus speciem esse, licet tamen & alia sit.

Thal. Clematis, Matthioli. Castori, cujus figura non placet, Clematis Italorū Vitalba. Matthiolum ignorasse, Clematidem alteram liquidò constare arbitrat. Guiland. dicit dixerit Matthiolum, quam gens Italia Vitalbam vocat, à Diosc. sub Vitis sylv. nomine describi. Soleno, Clematis altera Diosc. Plinio

indicta, Vitalba Italarum. Lugd. Vitis sylv. Dalechampi, Clematis, Matthioli. Dalech. in lib. 6. Egineta c. 77. est Celi & Latinorum Vitis taminea, Vitis sylv. Diosc. & Theoph. Athragena. Tab. Vitis nigra 1. Icon ejus nulli valet: Compiler etiam de hac planta confusè scribit. Ger. quoque pro Bryonia nigra sylv. Cordi, male ponit iconem malam Vitis nigra 1. Tab. Sed ejusdem plantæ aliam exhibet meliorem, cui titulus Viorna, Theophrasti. Iste.

Ad Clematidis alterius classem, quæ sit referenda quam Anguillara Athragena Theophrasti confert, non dubitat Clusius, & insuper Plinio l. 16. c. 4. Vitis sylv. nomine notam fuisse assentit, ut etiam exhibet utriusque scriptoris verba conferenti facile apparebit. Sed Plinius lib. 2. aliam adhuc Vitem sylv. profert à Labrusca differentem geniculatam, rimoso cortice, quam si quis conferat cum Vite sylv. Dioscor. unam eandemque stirpem ab eis describi competere. Eam autem Plinius esse credit, quam vulgus Viam taminiæ vocat.

Cel. Vitalba. Schro. Clematis seu Vitis sylvestris Biphyt. Clematis sive sylv. latifolia ad Clematidem Diosc. & Athragena Theophrasti referenda. Eid. pin. Clematis sylv. latifolia in foliorum divisuris mure ludens, & samenta aliquando brachiorum crassitudinis producentis.

Secus margines agrorum inter vepres & sentes crebro repetitur apud Italos, Germanos, Gallos ac etiam Belgas, lero secundoque solo, autor est Dodonæus. Vulgaris omnibus quas Clusius addit provinciis vicinis arboribus & sepius sese implicans, iusto mense flores; fructus plurimis suis incanescentes Autumno, dependent. Passim provenit sponte. Basslex vidi florentem mense junio & Augusto extra portam S. Albani ibidem cum seminibus inter portam Scam & Eschen.

Gustus fervidus & acris calidam arguit vim. Vitis ejus ad circulos pro retinendo labente utero. Ad constringendos sales, veluti Salices & alia vincula, adhibetur.

CLEMATIS BÆTICA CLVSIO.



Peregrinum est hæc Clematis Baticeæ genus, & à nomine quod Clusius sciat, antequam ejus historia evulgaretur observatum. Longa autem habet samenta, lenta & ramosa, hinc per intervalla capreolos contrariis semper inter se pediculis nascotes proferentia, quibus vicinas arbores & frutices scandit, folia pyriferè, minorâ tamen, dura, vinda, in ambiguitate si sive serrata, ac

cris & fervidi gustus, singularia in singulis pediculis, sed plurima simul ex clavicularum alis prodeuntia inter quæ, ex utroque samentorum hinc pediculi exeunt, caliculum Tichymali, caveolis seu labellis similem sustinentes, ex cujus medio exilic caputulum ex multis seminibus milio æqualibus conflatum, quibus insident oblongi gineiani, & alba quodammodo villosa plumula.

Clus.

Synon. Clus. hisp. & hist. Clematis altera Boetica. Lugd. & B. phyt. Clematis altera Boetica Clusij. Lob. Obs. & Ic. Clematis Boetica Clusij. Tab. & Ger. Clematis Boetica, Germ. Spanische Waldrauben: Angl. The travellers Joce of Candia. B. pin. Clematis 3. peregrina folijs Pyri incilis.

Locum. Hanc stirpem primum inveniebat Clusius anno 1565. inter Asindum (vulgò Medina Sidonia appellatum) & Calpen, secundum fluentem, vicinas arbusculas operientem & suo pondere deprimentem; deinde alijs Boeticis locis, Ianuario jam suos concinnos exhibentem. Non dubium est quin ad *Asindum*, cuius Dioscorides lib. 4. meminit, referenda sit, cum & forma & temperamento sit illi valde similis.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA

ascendens tenuifolia alba.



Clematis hæc per se infirma, non nisi proximis fulta in altum nititur, neque tamen id illorum capreolorum ope facit, sed foliorum pediculis sepes amplectitur. Sarmenta habet striata, viridantia, geniculata: folia recticaulis Flammulæ foliis similia, à Vitalba sive Athragene differunt longitudine, angustia & soliditate: tota etiam planta minor: flores albi, odorati, qui unda vi labi, si impru-

denter attigerint, inflammant. Semen succrescit plumaceâ cristâ insignitum: Huic similis si non raderis parva admodum, foliis valde tenuibus à nobis observata est, seminibus cum prædicta isdem.

Gesh. h. Clematis, Flammula quorundam flore albo, in Gallia Narbonensi. Lob. Adv. (ubi falsò scribit Matthiolum hanc rejecisse, siquidem is eam non novit) Ohl. & Ic. Clematis altera, urens, vulgi Flammula. Dod. gall. Clematis altera vera, aliquibus Ambuxæ & Epigæti, modernis Flammula nuncupata. Eid. hisp. purg. & in fol. Flammula, Flammula adnuncialis egeus, Flammula prior: Flammula pro Clematidis alterius specie habita [ipsemet in gall. hisp. suis est opinionis] licet & semine & florum cum figura, cum colore & magnitudine ab ea differat. Lugd. Flammula, Flammula Dodonæi, quæ nulla melius respondet facie & viribus Clematidi alteri Dioscoridis, teste Lobelio. Cæs. Viticella. Tab. Clematis urens. 1. Lienc/Leinen aut Waldrauben. Cujus icon posset etiam competere Clematidi lausolia quam debebat eo capite Compiler ponere & non alio relegare, ubi eam vocat Vitimigran; oportebat aut notare discrimen si non cretus de coloribus scripsisset. Ger. Clematis urens, Ang. Virgins Bower.

An Cam. h. Clematis altera flore albo, Flammula repens Dodonæi? An Gesh. coll. Salicstrum, quam ait esse Clematin alteram, plantam amplexicaulem & urentem? An Ang. Clematis.

C. B. phyt. Clematis sive Flammula. 1. repens. Eid. pin. Clematis 4. Flammula dicta, quod confusa ap-

plicata, vesicas flammæ instar excitet: foliis est aliquando Apij modo divisis: est etiam simplex vulgaris, alia multiflora, quæ Clematis urens 2. Tab. Clematis urens multiflora, Ger. Idem per Clematidem maritimam repentem fortè intelligit nostram Clematidem parvam. Est autem ipsi hæc in pin. Clematidis 5. Clematites, Angl. In prod. sic describit: cauliculos habet sarmentosos, geniculatos & striatos, cubitales, atrovirente cortice vestitos: folia Flammulæ erectæ instar oblonga, acuminata, nervosa, rigida, sed angustiora, quod communiter tria uni pediculo, qui velutin capreolum abie, insident, & quædam per circumferentiam nonnihil crenata, quæ vero in summo caule floribus subjiciuntur, angustissima sunt: flores albi sunt, multis staminibus villosis albis, medullarum occupantibus, longis pediculis sustentati: quibus semina plana, subrotunda, infescentia; ut in Flammula erecta, sed minbra, bina, ternave jucta, singulis capreolo plumoso, veluti incana cristâ donatis, succedunt: hæc acina sunt quemadmodum & tota planta. In maris Adriatici littoribus, ut in Venetorum Insula Lio & Litzeffina, suis sarmentis repentem observavi.

Spontè sua (ut scribit Dod.) in Belgio nusquam exit, sed hortensis est: flores sub Augustum, semen sub. succedit. Vidi ego in Rhætia florentem mens. Junio; Monspelij Septembri, ubi sepes & arborescunt. Eam etiam ramos ambientem observavi mense Ianuario & Martio. Patavij, apud Cortusum. Clematis autem parva à nobis visa est in montibus propè Castelnov non longè à Monspelio, mense Octobris.

Acris & valde calida est, sed tamen Flammula Ranunculo minor.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA

surrecta alba.



Fibrosam radicem demittit & albicantem: sarmenta nullius opis indiga, suâ vi in duorum & plurimum cubitorum altitudinem nititur, lævia, teretia, propter tetram nonnihil rubentia, fissulosa, & geniculis intercepta: folia cujusmodi ferè in vulgi Flammula, aversâ parte subhirsuta & serè incana, adversâ vero atrovirentia: flores consimiles, copiosi, quadrifolij, candidi, apici-

bus viridantibus. non minus uridâ vi vesicas hæc excitat quàm cognata repens. Hæc ab his, qui diligenter observant, teste Clusio, duorum generum esse deprehenditur. Vna enim sarmenta rubescentia habet, quemadmodum & foliorum nervos & pediculos, præcociorque est, & odoratum fert florem. Alterius autem sarmenta cum foliorum pediculis viridant, & florem sepius proferant. Humanam vero altitudinem utriusque sarmenta ut plurimum superant, & singulis annis nova, eaque succulentiora in eunte Verge (marcidis & corruptis prioribus) renascuntur. Huic prorsus similem sibi natam meminit

Clematis
flore albo
pleno.

Clusius, semine ab amico sibi misso Clematidis flore albo pleno appellatione. An vero talis reperitur, Clusium latet: ipsi certe nunquam videri contigit.

Flammula
Platearij.

Math. existimat esse Flammulam Platearij: Dodonæus tamen Platearium de Flammula Ranunculi quadam specie citare, quam de hac scripsisse crediderit, ac etiam recentiores ab acri & mordaci eius qualitate nominasse.

Math. re-
dugatur.

Math. & Lugd. Flammula. Dod. Flammula altera. Lob. obl. & Ic. Flammula altera surrecta. Tab. Flammula, Flammula Iovis, Brentburg. Bletterzug. Ger. Flammula Iovis surrecta, Dprigt Wurgens Bower. Clus. Flammula Matthioli, & Clematis altera; sic & Turn. Cord. in Diosc. Flammula frut. B. phyt. Flammula 4. Eid. pin. Clematidis 4. sive Flammula recta; sic & Cam. & Eyst. Centella herba, quæ trita tumoribus imposita pustulas excitat, in epist. ad Monardem huc referri potest.

Lacm.

Adeo frequens in Austria inferiore & Pannonia ut nullæ sint cedux silvæ præsertim circa Saviorum in Danubium delabentium ripas, illis tumescitibus inundari solitas, quæ eâ non abundant. Rarissima aliàs, Dodonæo, Germanis ac Belgis est, & hortensis tantummodo. Vere nova promit foliola, & cauliculos; æstate flores; Hyeme solæ reliquæ sunt radices. Basileæ florentem mense Iunio & Septembri vidi in hortis.

Tempus.

Vires.

Aqua.

Temper.

Quartana

Clematis

articulorum

morb.

Ex Flammula (rectam proposuerat) sæpius Matth. aqua elicuit, de misso vitreo organo in calentis aquæ balneo, quæ eadem, quæ herba ipsa, pollebat acrimoniâ. hanc compositum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (ut Platearius est auctor) exaltat siccatur ordine tertio. Sed quod imposita carnem non secus exulceret ac ignis, calidam ordine quarto rectius crediderim: Sunt qui Flammulam quartanariis edendam præbeant, magno (ut ferunt) iuvamento. Alij ejus oleum commendant ischiadicis, articulorum, illiisque doloribus, urinx angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autem præparant hoc modo. Flammula folia tenuissimè concisa in rosaceum imponunt, quod vitreum vas exceperit, ac inde per æstam insolant obturato vase. datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Ex Flammula (inquit Camer.) scandente elicitor aqua, quæ spiritus vini instar servida est; folia carpo imposita vesicas excitant, & multis contra odontalgiam prodest, cujus etiam in febribus pestiferis usus est. Tumores suppurati difficiles cataplasinate ex Flammula (rectam describit) contusa cum oleo, tum maturat, tum apertus Tabernamontanus. Qui ex ea stillantius liquor elicitor, intra corpus non usurpatur quod si quis eo uti velit, in morbis frigidis, cum alijs aquis est miscendus, ne viscera lædat.

Clematis

Cataplasma

no.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA

flore caruleo & purpureo
scandens.

Defect.

Concinnior est quam vulgaris Flammula, foliis cad Athragenen propius accedentibus, ut quæ quam Flammula breviora sunt & latiora, & variâ specie Athragenes foliorum modo ludentia, modò integra, aliàs divisa semel aut iterum, minimè tamen serrata, lævia, atrovirentia, sapore acri, ex pediculis tenuibus, rigidis, subrubentibus, subhirsutis: samentis autè suis innititur depactis pedamentis non secus ac Flammula vulgaris repens: sed præcipua est florum gratia, qui non tantum odore suavi placent, sed & colore purpurante oculos morantur, quatuor



foliis (quorum vel unum integrum Flammula vulgaris florem facile superet) crucis modo dispositis constantes: in quorum medio cinnus staminum ex viridi pallidium, succedunt semina.

An Math. Iesse-
minum sive Gelle-
minum caruleis floribus: Est ei in post-
commutat Clematis
tertia floribus pur-
pureis: hist. Germ.
Linnæus od. Walde-
râben / Clematis al-
tera: Dioscoridis
Gesh. h. Clematis
Flammula Colden-

bergij, flore rubro. An eadem ibidem Gelleminum caruleis floribus? Dod. gall. Clematidis alterius altera species: Eid. hist. Clematis altera, & nonnullorum ditione, Latiporum Ambuxum, ut quidem Dioscoridis spuria habent: Hispanorum Gormadera, quali Vomitoria. Lob. Adv. (ubi Dodonæum ait deceptum ab iis, qui sibi persuaserint in Angliâ passim luxuriare) Obl. (ubi dicitur an Pothos Theophrasti sit) & Ic. Clematis peregrina carulea & purpurea. Cam. h. Clematis altera flore purpureo, topiario operi aptissima. Hist. Matth. germ. vsm. posuit novam figuram, sub titulo Clematidis alterius Dioscoridis. Est & Cassori Clematis altera, It. Vitalba purpurea, scandens arbores ut Smilax, floribus purpureis magnis, ex quatuor folijs. Cast. prof. hac planta male habet figuram Vinx pervinæ. Apud Clusium hist. Clematidis alterius titulo simpliciter sine descriptione posita icon. Fortè hæc censenda verior Clematis, quia flores magis accedunt ad Clematidem priorem sive Daphnoideam, & ugilla, sit copiarum. Czf. Flammula flore caruleo. Lugd. Pothos caruleus Matthioli [ind. Dalechamph] Pothos. Theophrasti. G. quorundam, Desiderium Gazz. Desiderium flore Hyacinthi. Tab. Clematis carulea peregrina. frenchd blaw Waldrâbe. Cur hujus figuram repeti sub diverso titulo, qui est Clematis purpurea, Purpurbrun Waldrâben.

B. phyt. Clematis 6. sive carulea repens: qui annotat, & rectè, Iconem Matth. germanici esse transpositam & sub Clematide tertia exhibitam; ad Clematidem Diosc. referendam; variare flore simpliciter ac pleno, ut Cam. in epist. unâ figurâ expresse-
rit; colore etiam purpureo, cujus nomine Tabern. duas figuras proposuerit. Eid. B. pin. Clematidis 9. carulea vel purpurea repens: Clematis tertia, quæ Flammula, Czf. Clematis peregrina incarnato simpli flore: & Clematis peregrina purpurea simpli flore, Eyst. Ger. Clematis peregrina 1. carulea / Blowe la diero Bower. Clematis peregrina. 2. rubra, Rod la diero Bower.

Gaudet, ait Dodonæus, soli expolitis, sed tamen non omnino aridis locis: læto & haud irriguo solo melius proficit. Apud Belgas hortensis, in Hispania verò & quibusdam Italiæ locis juxta sepes & agrorum margines spontè exit. Augusto mense, & quandoque Julio, floret; semen Septembri perficitur. Flammulam flore purpureo ex semine natam habuit Lugduni, florere tem ipsoorto Maio. In Rhætia peregrinans cum D. Gesnero in monte prope Münsterthal inveni plantam valde similem, fruticosa parvam, flore magno ex longo pediculo, caruleo, constan-

Locus
Tempus.

constante quinque foliolis: florentem mense Julio: folius magis serratis quam in ea, quam Lugduni habui.

CLEMATIS PURPUREA FLORE pleno scandens.



CLEMATIS hęc C. armęus & foliis scanditque in plexu per carum proxime d. s. p. similis: flos verd, purpureus multiplici foliorum stipatu luxurians, saturatior, internodi potissimum foliorum facie, extrinsecus enim lanugine cinerea pubescunt.

Clus. ex appen. 2. ad. jug. historiam lib. 2. c. 36. Clematidis alterius nova species, illius dem generis, quod florem habet exaruleo purpurascen-

te, sed alterius formę multiplici foliorum a textura. Bauh. phyt. & pin. Clematis cerulea flore pleno; Eid. pin. Clematis 10. Clematis altera flore pleno, Cam. ep. & Clus. cur. post. Clematis peregrina purpur. flore pleno, & Clematis peregr. incarnata plena; Eyst. Flore est ceruleo, purpureo ceruleo, incarnato, ad purpureum colorem, sed ad nodum dilutum accedente.

Clematidem flore purpureo pleno vidi Stutgard. in horto Il. D. VV. ubi Hicet sub testeo reservatur: florent Luna & Julio.

CLEMATIS CERVREA SERRATO folio.



Sesquipedalis hęc est, cauliculis pluribus oblongis, quibus singulis folia crebris divisuris infecta insident trigemina coherentia, ut in Anemone Geraniifolia; flos longissimo ac tenui pediculo insidet, ex quatuor tantum foliis compositus, coloris obscure purpurascens; semen non visum, nec rari, a C. Bauh. qui eam ex sicca descripsit.

A sarnier tota radice (ait Pona in d. sarnier Baldi) ger-

minant multi caules vitiginei, magis subiles quam in aliis Clematidibus; ignosi, angulares, lenti, & tricubitales: quibus surculi multi adhuc magis subtiles quatuor digitorum altitudinis, qui aequaliter bipartiti ad latera dividuntur: singulique obtinent tria folia iusto intervallo divisa, & pediculo breviss-

imo adnexa, formam nateę, tamen majora, satis profunde per ambitum secta, nervosa, rugosa, inæqualis magnitudinis, nigroque virentia: est illi flos crucem representans, foliis mucronatis, lanuginosis, ceruleis albicantibus, cujus medium in acervulo quodam extremis foliolis (ut in Rosa Alexandrina apparet) decoratur. Est sarmentosa, insipida & perennis radice: tota planta aliis aliquantulum acris sapore prædita est.

C. B. Clematis 7. sive alpina Geraniifolia: Clematis cruciata lungermannii. Clematis cruciata alpina, Cruciata Porz.

Oritur in altioribus Baldi rupibus, quibus Eurus dominatur. Bruma æscunt folia. Hanc eandem speciem, quam anno 1561. in mea peregrinatione per Alpes Rhetice observavi florentem mense Julio in monte propè Münsterthal, de qua ante sub Clematide cerulea sive purpurante.

CLEMATIS PANNONICA FLORE ceruleo surrecta.



Complures radix satis crassa & laceribus spargit fibras, fulvas, nervulo ligneo candido factas. sarmenta inde complura. Clusio quaternaria, aut quina, ad cubitum & sesquicubitum exsurgunt, recta, dura, striata, argulosa, subhirtuta, nonnihil purpurascens, geniculata: ad quorum singula genicula, folia sine pediculis sunt bina opposita, Plantaginis majoris ferè paria, minora tamen, similiter per longitudinem ner-

vosa, acuminata, in ambitu lanuginosa, superne ex atro virentia, inferne dilutiora, lanugine quadam per nervos respersa, Clusio Asclepiadis parè foliis respondentia, non valde dura, servidi gustus, quemadmodum Flammulę Matthioli folia; ex superiorum foliorum alis, pari incremento surgunt gemini adversi surculi, eodem modo se habentes quo sarmenta primaria, nisi quoddam minora sint multis numeris folia: atque tam in primariorum sarmentorum, quam alarum surculorumve extremis, flos rubundus unicus magnus, quatuor foliis mucronatis crucis in formam, inquit Clusius, decussatis constans, modicè sursum reflexis, foris saturatè ceruleis, canaliculatus, minus cerulea lanugine per margines obsitus, intus verd glabris, nec tam intense, atque medium extimi folij, ceruleis: medium occupat villosus glomer fibrarum ex luteo albescentium, quarum complexu continentur stamina alia glabra, viridantia, apicibus ex albo luteis; atque intra hæc tercia fibrarum virentium intorta phalarx; semen compressum magnum Clusio Pulsatilla semini ferè simile plumatum, ut in Viorna vulgi Gallorum; nullius actimoniae particeps autore Clusio.

Tametsi hæc fruticibus se non implicet, sed satis firma sit; nec ad miniculis egeat, Clematidis tamen nomen ei imposuit Clusius, quod eisdem sit temperamenti & florem purpurea Clematidis ferè similem habeat. In pann. hujus Clematidis duas figuras

Clematis cur. d. s. d.

Clus. nov. habet.

habet, primamque & secundam nominat, quæ meo
iudicio unius plantæ sunt, cum etiam in hist. unam
tantum describat, & depingat, quam quosdam Cly-
menum falsò vocare refert, cum Clematis exculca
pannonica sit.

Tab. nat. ar. Tab. Clematis cærulea pannonica, Ungarisch
blau Waldrabe: Item, Clematis cærulea 2. Blau
Waldrabe. Dux hæc sunt ejusdem plantæ icones ex
Clusio à Tabern. mutuatz, unam tantdm stirpem
denotantes. Lob. Obs. & Ic. Clematis altera longi-
folia minor. C. n. h. Clematis pannonica cæruleo
flore, folio pæne Asclepiadis. Lugd. Clematis al-
tera minor longifolia Lob. Clematis quorūdam.
Ger. Clematis pannonica, bush Bower: Item, Cle-
matis major pannonica, great bush Bower.

B. ph. Clematis 8. cerulea erecta. Figura Lobelij (a) & eam quæ simpliciter, & quæ pleno est flore exprimit: à Clusio Clematis cerulea pannonica prima, flore simpliciter, secunda pleno, pingitur. Tabern. duas habet figuras Clematidis ceruleæ pannonicæ, & Clematidis 2. nomine: at utraque simplicem florem exprimit. Dumenim Lobelij figuram imitandam curavit non advertit apud Lobelium & plenum & simplicem florem. Hæc frater. Ego Clematidem ceruleam strictam nunquam vidi flore pleno, nec Clusius qui figuram exhibet ullius meminit quæ pleno sit flore, nec etiam Lobelius: semeh quidem dicit Clusius eam ferre planum, in capitula rotunda & veluti pullulas congestum, quale pingitur in figura Clusij & Lobelij, non autem flos. Eid. pin. Clematidis 8. magnitudine variæ: hinc duæ figuræ apud Clusium & Tab. Flore est ceruleo, raris albo.

Lucas.
Inventa à Clusio spontè nascens in pratis circa
Scampfen duobus ultra Posonium Vrgaria milia-
ribus & aliis ad Danubij ripas sitis supra Posonium,
Tempus. medio ferè itinere inter ea urbem & Tabern. Flo-
ret Maio & Junio, semen maturum est Augusto.
Cayles sive sarmenta singulis annis ad raditem ul-
que marcescunt, & incunte Vere novella, sequen-
tioraque ex ipsa repululant. Stutgardie vidi in horto
Ducis, mense Novembri semine maturo: Montbel-
gardi in horto Ill. C. V. Virt. provenit mihi ex semine
& sequenti anno floruit Junio & Julio.

CLEMATIS DAPHNOIDES, SIVE
prima Veteribus. CAP. XV.

Clematis
Dioscoridis. **C**lematis [X. juvans] quam aliqui Daphnoidem
[*Scopodis*] alij Smyrnoidem [*Scopodis*]
sic Gal. & Pet. cod. alij Polygonoidem [*Scopodis*]
vocant apud Dioscoridem, gignitur luto, pinguique
solo [*Scopodis*, sic & Orib.] sarmenta autem habet par-
va [*Scopodis*, sic & Orib. & Paulus] luno [*Scopodis*] crassitudine:
folium parvum, lauri [*Scopodis*] folio & figura & co-
lore simile, sed multo minus. Caeles foliaque in vi-
no pota alvi profluvia & dysenteriaz sedant. Cum
lacte vero & rosaceo, aut cyprino subdita in pesto,
cruciatibus vulvae medentur. Dolores dentium
commanducata finit: imposita quoque venerato-
rum morsibus juvamentum praestat. Fertur & exa-
ceto pota, contra aspidum morsus auxiliari. Nasci-
tur in incultis. Marcellus autem in vetustis quibus-
dam codicibus legit pro luto pinguique solo [*Scopodis*]
in Aegypto [*Scopodis*] quae lectio ut Corra-
tio, ita & Sarraceno placet, quod & Plinius de hac
Clematide agens, lib. 24. cap. 15. eam Egyptiam co-
gnominet, subdatque Egyptum eam maxime gi-
gnere. Sed non probatur nobis eorum opinio. Nec
propterea quod Plinius aliquam Clematidem in
Aegypto nasci scribat, rectus Dioscoridis est corrup-
tendus. Nihil enim probat incultum solum, quod
pro confirmanda eorum opinione facere credunt.

Non enim obstat, quod minus inchoat in foliis, magis
pingue letū nque esse possit. Sarmientaloni *prof. lectio*
pro parvis legendum n censet cum n Corā Sarmienta
quidd & Clematidem longā n & tenuē n hō rā
lā nagnoscat Plinius loco jā n citato. Sed & *Caria*
ita legendum ad nō neat. Et sē em n longā, iud m
terdu n longissimā ejus Clematidis, quā n Vincam
pervincā n vocent, sit nenta, seu vinginea ilagella.
Nimis autem temerē, nō q. i. licio, Clematidem
Daphnoidem Diōscoridis & Clematidē n Egi
ptiā n Plinij, eandem cum Vincā pervincā sicut
Sarracenus. Nos de Clematide Egyptia Plinij
diximus antē sub Clematide viciem n. Surā qui
volunt, Plinij nā n tradidisse lib. n. c. n. ubi Vin
cam pervincā describit hīs verbis. Nam Vincā per
vinca semper viret, in modū vinee sicut nō viret
tenuem virgā nē extrimat, quod Diōsc. nō viret
seu virgula nō habet luncāgrasitū, Doreb. } foliis geni
culatim circumdata. Toparia herbā inopia n tā n
florē aliquando supplet. Hęc a Græcis Chamēdaph
ne vocatur. Andā tula (insp. n. p. n.) hydropi
cis datur, in aqua cochlearis mensura, celerrimēque
reddunt aqua n. Eadem decocta in cinere, sparso
vino, tumores siccāt. Auribus succo medetur. Alvi
nisi i nposita multū n prodest, dicitur. Hęc Plinius,
qui si per Vincā pervincā eandem intelligit
cum Clematide, mūdē hydropicis præscribitur: nec
etiā placet quod ait Diōsc. apponē moribus vene
natarū n bestiarū, & dolōres utri sanare. Vincā
pervincā quidem apud Diōscoridē n Chamēdaph
noides vocatur, sē nō Chamēdaphne. Hermo
phus, ut demonstratur h. n. g. lib. s. cap. d. Chamēda
phne per Pervincā Plinij, eandem quā n nos in
telligit plācam. De Chamēdaphne igitur cathar
tica, cujus adstringens facultas dynterias & diar
rhæas cohibet, verū n id est, nō statem de Clema
tide, quā Plinius cum illa nō noranter confundit. *Plin. rep. p. 10*

• Cretum, Clemaus Egyptia [*κλεμας αι γαια*] in
proverbium abiit, & loco dici solitum fuit in eos,
qui corpore præter modum procero atque atto-
fore essent: natum haud dubie (inquit Erasim.) ab e-
jus herbae specie de qua meminit Dioscor. lib. 1. &
Plin. lib. 24. cap. 15. Laetius in vita Zenonis Philo-
sophi, ex auctoritate Apollonij scribit, Zenonem
gracili fuisse corpore, statu procero, atræ ture: dein-
de auctor citat Chrysippum, qui in 2. proverbio-
rum suorum libro scripserit, ob eam causam a quo-
dam Clemaum [*παλιν γαρ reddit interpret Latine*
Diogenis Laertij] Egyptiam fuisse dictum.

Licet porro una solummodo Clematis à Diosco- *Diff. Cle-*
ride notetur, tres tamen eius differentias magni- *maridis*
tudo differentes observari scribit Marantha: & quar- *Marantha*
tam etiam, duplicem in flore foliorum exortum
habentem.

CZEMATIS DAPHNOIDES ML
 nor flore catulco; purpureo, violacto,
 ut & albo, simplici ac plerq.

Clematis Daphnoides reptatrix planta, humo
 non arcolle nisi proximis fulcris innixa: ra-
 dix fibrosa, fomentum multa, ter uia, teretia, virentia,
 & geniculis: quaquaversum per terram se spar-
 git: ubi arapuerit, è geniculis propagatis
 fibris rursus radicat: tur: folia è geniculis bina op-
 posita, folia laurinis similia, minora tamen multo,
 acuta, nigra, leuia, breuius pediculis appensa, su-
 perius saturato virore nitentia, inferius è diluore, sa-
 pore adstringente, subamaro: flos pediculo è ge-
 niculis enatus, duas uncias longus, singulis
 insidet, oblongus, Gellemin modo, rufus sim-
 plex in quinque lacinijs altiusculis & hinc disse-



aus, nunc aucto
foliorum numero
multiplex, quorum
interiora modò bi-
na, modò terna ad
imū integrā, su-
perius ut extrema la-
ciniantur denta-
ta, alijs peniculis
separata: color sim-
plici cæruleus cum
apicibus concolo-
ribus, sed diluoribus
parum: vel al-
bus cum stannulis
luteis, pistillo
albo, fundo cardi-
dis versibus striato:
vel pulcherrimo
spectaculo viola-
ceum florem per
singulas lacinijs à

summo ad imū linea decurrit lactea, id quod & in
multiplici observatur: verū quæ multiplici est flo-
re, eam non alio quam purpureo, aut purpureo-vio-
laceo colore observavi & bicolori variegato ut di-
ctum: Anno 1600. observavi in alba partes cæruleas,
quod ante nunquam animadvertentur quamvis à
plurimis annis in horto coluerim.

Hæc est illa (inquit Marcell.) quam Eithuria nunc
Vincam herbam vocat, quā defunctæ virgines in
gentem nostrā ad sepulturam coronatæ effertur: &
quā similiter Florentinæ aliquæ gentili iure suo pri-
mū ingredientem urbem Archiepiscopum corō-
natæ ad portam excipiunt stipantque & per urbem
comitantur. Cognitū facillima est: in hortis passim
nascens, tenuissimæ viticulis potius per terram ser-
pens, quā virgis ut Dioscor. ait de Chamæda-
phne, à terra se extollens: folijsque oleagineis ma-
gis quā Laurinis similibus. Denique à Dioscoridis
Chamædaphnes historia longè differt, & nihilomi-
nis tamen Vincæ pervincæ Plinij, L. 12. c. 11. descriptæ
respondet.

A Ruellio L. 3. c. 80. Clematis daphnoides inscribitur,
cujus si quis (artis) imaginem, naturam, effi-
giemque exquisitis exploret, ea censetur esse,
quæ Lat. Vincæ pervincæ, officinis Pervincæ, vulgò
Pervencæ nominatur. Miscet autem Ruellius in hoc
capite diversissimas plantas, autoremque confun-
dit, nec sibi constat. Idem rursus suo nomine lib. jam
citato, c. 112. Hermolai verba de Pervincæ repetit.

Corn. Clematis prior, Vincæ pervincæ officina-
rum, & Chamædaphnæ Græcorum. Tragus Pervin-
cæ florem assignat ex purpureo cæruleum, quinque foliis
distinctum, ipsarum Borraginis, proflus in odori-
rum. Hanc, inquit, quod mortui eā coronari con-
sueverint, nonnulli germanicā voce Todtenkraut/
aut todten Violē, h. e. Herbam, sive Violam mor-
tuum vocant. Commune apud Germanos Per-
vincæ nomen est Yngrün, à perpetuo illi virore in-
ditum, Officinæ Pervincam nominant. Est autem
illa ipsissima Clematis Dioscoridis, quæ Plinio &
Daphnoides cognominatur. Posset & Chamæda-
phne, h. e. Terrestris, seu humilis dici Laurus, aut
ut Romani dicunt Laurago, & Laureola, & Vincæ
pervincæ, quemadmodum alibi meminisse Plinius.
Apud Dioscoridem sequentia Pervincæ nomina le-
guntur, hæc sunt, quæ præcedunt, & præcedunt. Apud Apu-
leium lib. 5. multa exant nomenclationes il-
lius, nimirum Euphelios, Daphnoides, Hypoglos-
sion, Eupetalon, Diglossos, Nycephylon, Pelleon,
Idæa Daphne, Samothracia Daphne, Alexandrina
Daphne, Mirion, Danae, Stephane Alexandrum,

Chamædaphne, Carpophyllon, Daphnitis. Latine
Pervinca, Victoris folium, Laurus Alexandrina &
Macedonica, Laurago, Mustellago terrestris. In Plinio
nonnullæ ex his repetuntur, & aliæ etiam ad-
ciuntur, videlicet Hypetale, Pelasgum, & Stephane
Alexandri. Sed quantum mihi quidem videtur, re-
ctius universæ hæc appellationes Lauro Alexandri-
næ quā Pervincæ tribuentur. Licet verò contro-
versia nominum in hac quoque plantam irrepsit,
nihilominus tamen descriptio, quæ apud Plin.
L. 12. c. 11. extat, Pervincæ huic satis respondet.

Clematidem Daphnoidem, inquit Fuchsius, Pli-
nius L. 12. c. 15. Clematida Ægyptiam nominat: lib. Ægyptia.
aure n. 11. Vincam pervincam, aliòque nomine
Chamædaphnen dici tradit, quod scilicet humilis vi-
deatur Laurus, ut nomen sonat. Non est autem cur
eam Chamædaphnen putes, quæ Romanis Laureola
aut Laurago dicta est, hæc enim à Vincæ pervincæ
genere & facultatibus diversa est, & scorsim illam
Chamædaphnen deningit Plinius L. 12. c. 16. Et hinc
manifestissimū n. sit Plinio duplicem esse Chamæda-
phnen. Una n. quæ n. sit appellant Dioscorides, Ga-
lenus, & alij Græci. Altera n. quæ privatim Vincam
pervincam alio nomine vocat Plinius.

Gordonius Diosc. Clematis, Pervincæ species, altera n. Pervinca
gendi res habens. Matth. Clematis principio à Diosc.
Diosc. descripta, ac aliquibus Vincæ pervincæ dicta;
vulgò tamen Italis Provenca. In hac nullam repeti-
ri notam scribit, quæ Clematidi primi generis recla-
mare videatur. Quamobrem eorum sententiam ex-
plodendam putaverit, qui Pervincam Chamæda-
phnen esse sibi persuadent, quā vulgò Laureolam
appellant. Eid. hist. germ. Clematis daphnoides.
Cam. apud Matth. Clematidis Daphnoides quatuor
agnoscit differentias: flore purpureo, cæruleo, & al-
bo, & quandam pleno: In hort. Clematis Daphn. si-
ve Pervincæ apud Plinium, flore cæruleo, interdum
albo, & purpureo Austriaca, à Clusio missa flore ele-
ganti pleno: In Epit. Clematis: & Clematis flore
multiplici.

Gordonius de cons. vita per Laureolam, quā ad Laureola
stom. ventris infan. (ad lienteriam & diarrhæ-
am Arnold. de Villan.) præscribit, plantam de qua
hic agimus, intelligit. Confundit turpiter Lonic.
in Diosc. L. 12. c. 14. Chamædaphnen Dioscoridis cum
Vincæ pervincæ, quæ Dioscoridi Clematidis species
est. Ejus verba hæc sunt. Chamædaphne i. e. terrestris
Laurus Alexandrina à similitudine, vel virum pari-
tate; Daphnitis à Lauro; Hydragogus, quod aqua &
urinem trahit; Laureola ut & Laurago à Lauro, non
Lactago; Latinis Vincæ pervincæ: Germ. Yngrün.

Anguill. Vincæ pervincæ optimè correspondens
Clematidi primæ Dioscoridis. Gesl. h. Clematis Ægyptia silv. flore cæruleo passim: hortensis purpu-
reo: transtulit autem purpureum à Sabaudia circa
Lansaniam hortis Tigurum: In cat. Clematis daph-
noides vulgò Vincæ pervincæ. Dod. purg. & hist. Clematis
daphnoides, floribus colore ut plurimum
cæruleis; quandoque candidis; rariis rubentibus.
Clematis (artis) quidem dicitur, quia in stat. & in stat.
repentes proferat cauleculos, quos & in stat. (sarmen-
ta) Græci vocant. Daphnoides verò, eum à Lauri so-
liorum figura, tum ad differentiam alterius (nigioris)
veletiam altiorum. Nam Plinius plures ejus nomi-
nis refert L. 12. c. 14. ubi & hæc Ægyptiam cognomi-
nat. Polygonides verò vox inter nothas appella-
tionem etiam in Dioscoridis exemplaribus reperitur.
Præter hæc sunt etiam & in stat. & in stat. aut po-
tius & in stat. Alio autem loco Plinius L. 12. c. 11. Vincam
pervincam & Chamædaphnen appellat, ubi per-
ram legitur in modum liræ pro Lauri. Describitur Pervin-
cam ab eodem, & à Dioscoride & alia Chamæda-
phne. De hac nos lib. 5. H. n. agimus.

HISTORIAE PLANTARVM

Lob. Clematis daphnoides, Vinca pervinca : an Centunculus Plinij : Item Obs. Daphnoides, polyflora Clematis purpureo rubens. Lug. Vincam pervincam, sive Clematidem majorem perammonā florum duplicatione variare scribit, quod Lob. non dixit : nec nos majorem observavimus flore pleno. Cael. Provincia vulgò in officinis vocata, in umbrosis nascens, flore caeruleo; fructu oblongo, veluti siliqua bifurcata, in qua semina oblonga, depressa: Vinca pervinca Plinij. Tab. Clematis daphnoides; Vinca pervinca flore caeruleo, purpureo & albo, & pleno.

Clus. Clematis prior, *sequestris* cognominata, vulgò Vinca pervinca, quo nomine etiam ab ipso Plinio vocatur, qui lib. 24. c. 15. Egyptiam quoque cognominare videtur. Ejus autem duæ sunt species: Una vulgatio, caerulea ut plurimum flore, sed qui etiam variat, ut nunc albus, nunc subpurpurea conspicitur, interdum & medium florem complectatur.

C.B. Clematis daphnoides i. minor Vinca pervinca, Brunf. Chamædaphne altera Dioscoridis, Eid. Brunf. 4. Clematis, Lac. Turn. daphnoides, Thal. minor fl. caeruleo, albo, & purpureo, Eyst. qui tres figuras. Eid. B. Clematis fl. flore pleno : Clematis altera flore pleno, Clus. hist. ap. alt. Clematis daphnoides fl. purpureo pleno, Eyst.

Clematis daphnoides vulgò dicitur & Vinca pervinca, Germ. Singrün / Ingrün / Wintergrün & Stryten / Geln. Berwinck / aut Berwinck. Tab. Wilder Singrün / Cord. in Diosc. Belg. Vincorde & Naechde palmen : Gall. Pervenche : Gallobelg. Vanshe & Pucelage : Ital. Pervinca : Hispan. Pervinqua : Angl. Perwinckle : Fland. Vincorde : Brab. Naechden palm & Ingroeh : Boh. Berwinck. Hung. Clematis altera per sepes repens, Feyer venghi. Catero qui cur Clematis & Daphnoides appelletur, jam ante Dod. ostendit. Dicitur autem Vinca pervinca, quod humi serpat, & se in modum funiculi porrigit, vicina quæque vinciens, autore Fuchlio. Ingrün à Germanis, quod semper, & particulariter Wintergrün [Hiemale viride dixerit] quod hieme vireat, & miratur. Stryten similiter appellatur; quod contra frigus certet, & victrix evadat.

Clematidem numerosis, unibrosisque tractibus, & senticetis, atque agrorum marginibus gaudere perpetuè virere; Martio tamen & Aprili potissimum florere in confesso est. Clusius subpurpureascentem apud Allobroges spontè nascentem inter vepres observare meminit, præsertim circa Lausannam, eamque interdum alium florem medium complectentem. Vidi ego in montibus Euganeis florentem fine mensis Februarij; Inter Veronam & Castelfranc, Ferrariz, Basileæ & Genevæ, flore albo Aprilis mensis principio; caeruleo fl. circa collem l'Abbatie & in hortis adhuc Novembri, alias Martio : Montbelgardi frequentem Aprilis extra novam portam in collè in dumetis juxta fossas, & in hortis. Videtur degenerare non transplantata.

Siquis habuerit vinum turbidum, quodque colorem amisit, accipiat tantum hujus herbe (Pervince) quantum pro quantitate & copia vini sufficit, vasque imponat, ac illud deinde obturet, obturatumque quindenam relinquat, quod cum fecerit, vinum brevi purissimum ac clarissimum reddetur, & genuinum suum colorem recuperabit: præstabit tamen, si ritè rem perficere voles, ut vinum prius in aliud vas transferatur, tumque herba ut diximus utiliter injicietur. hæc ita se habere experientia certà comprobavit Tragus. Folia ore retenta sanguinis fluxum è naribus erumpentem compressisse sequenter vidimus, inquit Costæus in libro suo de stirpium differentis. Fæmoribus adalligata viridia sola, mensium

abundantiam cohibent & conceptus adjuvant. Capiti adalligata, & collo, gulæve circumducta, sanguinem è naribus manantem sistunt. Adduntur quoque utiliter vulnerariis emplastris, & potionibus. Refrigerat enim (autore Matth.) sicca, roborat, cohibet. Apollinaris calidam & siccam facit tertio gradu, quum tamen ejusmodi caloris gradum sapor non indicat. Felix Plat. extrinsecus ad venas hæmorrhoidales apertas occludendas præscribit Clematim. Obscurè admodum. Sunt enim vigintiquatuor plantæ, vel etiam plures, quæ nomen habent Clematidis. Vnde quis obsecro (pisi vade peritus stirpium) dicet quæ planta sumenda sit: pleræque causticæ sunt & vesicatoriæ. Nos sumendam censemus Clematidem daphnoidem vulgò Vincam pervincam dictam. Vires quæ videntur Pervince convenire apud veteres, sunt ante scriptæ sub Clematide Daphnoidis, sive primæ veterum dictæ.

CLEMATIS DAPHNOIDES MAJOR flore caeruleo & albo,



Per omnia maiora est hæc Pervinca vulgari: folia quæ opposita ex seminaibus & longioribus pediculis pendentia è viticulis junco crassiusculis oriuntur, tres circiter uncias lata, paulò longiora, nunc acutiora, nunc obtusiora, cum acrimonia amarescunt, saporis ingrati. Flores ex foliorum alis pediculis herent sextantibus, longo corniculo, divisione & formâ florem Pervince vulgarioris, sed, ut par

est, multo majores, coloris caerulei, & albi; apud nos interdum frigore absuntur: in hac siliquas sive cornicula singularia observavimus.

Dod. purg. & hist. & Tab. Clematis daphnoides, major. Lob. Clematis sive Pervinca major. Cam. Matth. & hort. Clematis daphnoides major caeruleo flore. Cael. Provincia altera major, folio latiore, quasi hederaceo, grandioribus floribus caeruleis; Clematis Egyptia Plinij. Clus. Clematis daphnoides latifolia. C.B. Clematis Daphnoides 2. sive major. Clematis Egyptia hortensis flore purpureo, Gesn. h. Pervinca major, Eyst. Clematis i. major, Cast. Cur Gesneri purpuream huc referat, non occurrat: nunquam vidi purpureo flore, nec scio an talis tradita sit ab aliquo autore: minor sanè dicitur purpurea.

Lugd. Pervincam majorem Lobelij perammonā florum duplicatione variare scribit, sed præter Lobelij opinionem, qui hanc ab ea separat, nec censuit ut Lugdunensis. Hanc nec purpurea, nec pleno flore observavimus unquam.

Spontè nascitur, cum multis Hispaniæ locis, tum in Narbonensi Gallia, magnà præsertim copiâ circa Monspelium, toto serè anno florens, ibi spontanea floribus etiam albis quætur Flouigna-num.

Fl. Lugd. montan.

Nomina linguar.

Vinca pervinca nomen vulg.

Vinde hyemale.

Lac. Turn.

Alcinum herbicum.

Vires.

Hamurha.

Temperamentum.

Apoll. ner.

Fel. Plat. repræh.

Disco.

Hist. Lugd.

Lapsum.

Lac.


APOCYNON VETERIBVS.
CAP. XVI.

Apoecynon, inquit Dioscorides, aliqui Cynanchon [xuvññer, xuvññer, ver.] nonnulli Parda-
lianthen [xuvññer, xuvññer, ver.] alij Cynomorou [xuvññer,
ver., Ald.] alij denique Cynocramben [xuvññer,
ver., Ald.] Brassicam caninam, *per. huc arer.* appel-
lant. Est vero frutex [xuvññer, ver., Ald.] vulg. exempl. *per. huc arer.*
longis [xuvññer, ver., Ald.] sunt qui uocat, *legerunt*
contineat virgulis, viduum modo obsequiosis
flexibilibus, *per. huc arer.* Ald. grave oleo-
sum. Rurque fore iocundis: folijs Hederae, attamen
mollioribus & per extremum acutioribus, gravique
odore, quod antenus viscosus, & luteo succo turgens
tubg. hucuscu Fabarum aliqua digitum longitudi-
ne protenditur, folliculari specie, minutis intus se-
minibus, duri [xuvññer, ver., Ald.] atque nigris
sunt, pro qua voce Rad. ex Marcelli sexu, *per. huc arer.*
L. ut. *per. huc arer.* duri, parvis utque p. in adunio, *per. huc arer.*
rere. Huius folia cu n farina subacta [xuvññer, ver., Ald.] *per. huc arer.*
ma cum. *per. huc arer.* in panes coacta & in cibo data,
canes, lupos, vulpes, & pantheras necant, ac pe-
trinis eorum quadrupedum coxendices resol. *per. huc arer.*
Alii inter reiectanea Dioscoridis apud Cor. Par-
dianthes, da Cynomorou, alij Phaleon, alij Oligo-
cor, alij Hippomanes, alij Oritan, alij Ophio-
radon, alij Cynanchon, alij Elaphoglosson, pro-
pheta Paraleon: Roman. Brassicam rusticam aut
caninam vocant. A vi & effectu nomen accepit hae
planta, inquit Columella: quae quia intermit, no-
men a canibus habet, *per. huc arer.* dicta, cui
virespondens etiam nomen illa *per. huc arer.*
ad huc rursus etiam a vi necan-
di Pantheras, *per. huc arer.* Hinc vero, ut ab homi-
bus caveamus, quia venenosa sit, ne pro Ascle-
piade similitudine decepti accipiant, Dioscorides
utaba quidam venenosa diligenter descripsit, at-
que nota nulli privatim ab Asclepi de aliena ad-
scriptis, huiusmodi folliculorum quo turgere essent.
Apocynum ex Plinio videtur homini salutare,
quadrupedibus venenum esse. Galenus vero con-
tra ait Apocynum sive Cynocrambe, vocatur a
quibusdam Cynomorou, quoniam canes celeriter
neceat. Est autem hominibus venenum, herba
valde graveolens, & omnino citida non in genero-
se: non tamen iuxta proportionem sicca. Quare et-
iam imposita, multam discutiendi vim habet. Hae
Galenus simplicia. Ex quibus ego, inquit Cor-
nar. moveat, ut non rectam esse putem Plinij se-
ctionem, ubi lib. 14. cap. 11. sic habet. Sic de pleuritico-
cos, & omnes lateris dolores. Apocyni semen ex
aqua, scilicet sanat. Quam enim Diosc. nullum eius
nomen ad humanum corpus praescribat. Et Galenus
venenum esse hominibus dicit, & extra solam cor-
poris impositam, discutiendi vim habere asserat: me-
tus suspectum est Apocyni semen, ut ex aqua bibe-
tur. Ego itaque verbarum & pleuriticos, & omnes la-
teris dolores ex aqua ad praecedentia pertinere pu-
to, quae de Radicula traduntur, ita ut sequatur, Apo-
cyni frutex est folio Hederae, molliore tamen, &
minutis longis viticulis, semine acuto, diviso, lanugi-
noso, gravi odore: canes & omnes quadrupedes ne-
cat in cibo datum. Et haec Diosc. sententia consona
sunt. Aliqui forte non abs re Plinium interpretan-
tur, ut Apocyni semen ex aqua, intelligatur impositum,
nam digerendi cum habet facilitatem, poterit
lateris dolores sanare: sed certe in id sumptum Pli-
nium, ita ingerere videtur, cum ad superiorum simili-
tudinem dicit. Sic, &c. Hoc tamen periclitari ori-
bus est relinquendum. Caterum cur Cynocrambe,
quasi canina Brassica, item Brassica rustica nomi-

T. 11.

netur a quibusdam, non video inquit Gesl. n. si
quoddam siliquas proferat similes forte Brassicae mul-
tae, cui similia habet folia, nempe hederacea: simi-
liter etiam succo turgens, quantvis Apocynon luteo,
illucandido. Habent insuper ramulos similes, nam
quales Dioscorides Apocyno tribuit, longos &
lentos: tales ipse in Brassica marina, id est, Solda-
nella, vulgo dicta observavit. Apocyno (quod
Matthioli depingit, ex Aegypto autem primum
a Bellonio inventum & demonstratum arbitror)
prorsus congenerem herbam illam existimo, quam
aliqui ridiculo nomine, Noli me tangere vocitant.
Notandum porro aliam esse Cynocrambem Apo-
cynon dictam, prorsus venenosam quam hoc loco
Diosc. describit: aliam Cynian, quae item Cynocram-
bes cognominatur.

Ceterum Apocyni nomine donatae sunt sequen-
tes plantae: Apocynon sive Periploca scandens folio
longo, purpurante flore, lacteo succo, cuius &
altera species Clusio, angustioribus folijs, quae An-
guillaria Apocynum alterum. Apocynon Dioscor.
sunt qui suspicentur esse Secamone Aegyptiorum flo-
re albo. Est & aliud Apocynon folio rotundiore,
Apocynon Matthioli non repens. Apocynum
latifolium ample vultu tertium Clusio, est Lobelin
Apocynon sive Periploca prior. Apocynum s. la-
tifolium Clusio est Secamonia Monspeliensis. Ap-
ocynum Syriacum sive Palestinum Beidelzar Alpino.
Apocynum Diosc. Fabio Columna; alijs herbaris
Asclepias flore nigro quorundam. Apocynum al-
bitratur, inquit Turnerus, quidam Italianam, quae
Hirudinaria dicitur, sed esse non potest. Inscribi-
tur haec a nobis, Asclepias sive Vincetoxicum mil-
tis. Per hederam arboream sunt qui intelligant
Apocynon Dioscoridis, minus recte.

APOCYNVM SIVE PERIPILOCA
scandens, folio longo, flore purpurante.

Topiarum opetis Destr.
tibus ad per-
gulas obumbradas
expetita est ana-
dendras hae plan-
ta, non aliter ac Pe-
dicymenon vicina
admicula solita
scandere, vicinis
pedamentis sese
convolvens (unde
Periploca, quasi
circumplectens; eo
quod proxima am-
plexetur, dicitur)
multis longissimis
sacmentis, quibus
teste Clusio, & iam
praeterea arborum
(si vicinas nan-
ciscitur) circummina
superat: sunt vero

ea sacmenta dura, lignosa, lenta, stratu invicta, ruti-
lantis est fusco coloris, multis nodis sine geniculis
distincta: e quibus hinc folia opposita, Asclepiadis
sed ex minus lato principio sensim dilatata, ex inter-
vallis, lacteo praeferentia succo: in mucronem acu-
tum paulatim latessentia, obliquis a medio nervo
venulis cis marginem delinentibus ut in Myrto lau-
rea, quarum extremitates colliguntur in rotundum ambitum
circumcurrentes viridis; flores extremis ramulis late-
ralibus quaterni, quinti, aut plures; veluti umbellam
constituti, quorum linguli quique folijs radiatis constat,

M

plocia repens, aliter vero Periplocia non repens, forte quod ita Syriaci nominantur: inter eas tamen hæc erit differentia, quod Periplocia siliqua ea sanè longitudine constabat, quæ & Rhododendro, gracilior tamen erat: alterius verò brevior. E longiori facta plantam provenisse ait, quæ non modò humi reperit, sed & arbores quantūvis proceras scanderit: è breviori verò aliam, quæ notis omnibus Apocynum retulerit. Vtrique porro non minùs late abundavit, quàm Tithymali omne genus: verum id repens omnino album fuit: non repens verò subroscum. Hinc itaque factum est ut Ghino plantæ subscripserit, & hæc cui omnes prorsus notas adscripsit credidit, Apocynum esse certò affirmavit. Siliquas autem, quas huic suo Apocyno appinxit, siliquas fuisse, in communi & latè magis demonstravit, ut in quibus eas, & meritis mutavit.

Apocyni prima species, inquit Anguila, multas habens notas respondentes, Apocynum esset, si occideret canes. Periplociadis nomine intelliguntur omnes plantæ amplexicaules: nec est nomen particularis plantæ, ut quidam existimant.

Clusio ad veterum Apocynum, quod Dioscorides etiam à nonnullis *apocynum* appellatur (disserentem tamen à Cynocrambe, ædè quæ peculiari capite agit) ante descriptæ plantæ & sequentes referenda videntur, sed hæc, de qua hic agimus, omnium maximè. Est autem ei Jusq. Apocynon, Eid. hist. Apocynum, latifolium. Lob. adv. & c. Apocynum, Periplocia præta foliis latioribus hederæcens: Obs. Apocynum, Periplocia præta, Apocynon Quilbandini, Matth. & Italorum, Cynocrambe Galeni, & Cynomorus Adversariorum. B. Ph. Apocynum è subrotundo folio, non repens: Eid. pin. Apocynum, folio subrotundo: Apocynum, Matth. Ang. Gesn. h. Jac. Lugd. & Cast. Cynocrambe, Lon. Apocyni alterum genus, Cant. Periplocia repens, Cæ. Dixerat Bauhin. phyt. non repentem, quod in pin. siliquis involvit, & ex Cæsalpino repentem facit. Quondam ex horto Patavino allatam, nominavit Apocynon Dioscoridis, & Zingiber caninum Avicennæ, Guilandini.

In horto Ill. E. C. (unde delata nunc non recordor, quot annis florēt; sed siliquas hæcenus anno r. 1733 à multis annis non producit conservari valde & hieme reponitur. Clusius eam Vienna Austria alebat, hieme quidem folia abscidentem, illius autem inelementiam facile ferentem.

Mauritius Thaurer, Laurentius Hyperius & Joh. Krugæ Doctores & Cancellarij Ill. Princip. Guilielmi Landeravij testantur apud And. Bertholum de Terra sigill. & Clus. de Apocynis, & Apocyni 5. 6. dedisse eam, qui post semel horam, licet partem vomuerit, nihilominus post sympcomata crudelissima convulsionibus & tremoribus interiret: alterum verò canem, qui cum Apocyno partem Terræ sigillatæ equalem devoravit tribus post sumptionem horis debilem utcumque fuisse, postero tamen die convulsum, & maximo cum appetitu edisse, ut sumpti veneni vix minimū signum apparuerit. Historia hæc revocat nobis in memoriam quod evenit Mōtbelgardij gubernante Nobili D. Io. Iohemio à Mündelheim summo præfeto: Quidam se Chymicos dicantes, quum perquirendo Chrysopogon, aurum suum reddidissent totum potabile & comestibile & fame penè perirent, vulnerit ex Medicina quæstum facere, quod consueti ejusmodi impostoribus Chrysopogonem, Terram igitur Silestiacam supra dictam, ac ut suspicamur à predicto Bertholo nacti, magno pretio dividere conabantur, pollicentes utilem ad erus omne venenum. Sed eorum pollicentiō flagiti digna erat: hoc enim per experientiam scire non poterant, imperante enim Præfeto nostro quibus

Tom. II.

gallinis data radix Napelli (verum nullis in parva quantitate) nullum illis nocūmentum experte eo per se, vel cum Terra Silestiacā assumptū: dato autem Sublimato utraq; periret, eaq; quid quæ terram assumpserit, quæ enim non sumplerat vomitu partim rejecto veneno diutius supervixit, altera cum non potuerit vomere, terrā consiliante fauces, citius periret. Quare nulli intoxicato consilium dandam Silestiacam terram, nec veram Tunicam, ante rejectum venenum per vomitum, nisi parva quantitate cum multo liquore ad movendum vomitum. Considerandum an Andreas Bertholus non deceperit medicos: forte (quod non declarat ipse, nec Clusius) terram sigillatam exhibuit cum multo liquore, unde calida veneni vis infracta & vomitus facilius subsequutus: quod forte commodius præstaret sola aqua tepida, vel cum oleo, aut butyro, aut melle, aut Oryzæmelle & similibus: lectores viderant imposturam quam descripsimus lib. 4. h. n. g. de Ligna Nephritico cæruleo, & flavo tingente.

APOCYNUM LATIFOLIUM

amplexicaule.



Longis, tenuibus, & frequentibus sarmentis proximæque scandit, multiplici circūvolutione & arcto flexuilla amplectens, viridibus gesticulatis, foliis hederæ mollibus, subcineracei coloris, lacteo succo, ut etiam sarmenta, adeo turgidis, ut vellevissimo vulnere, non minus copiose, quàm ex quovis Tithymali genere profusiat. Flores axillares, cum sinu multo umbellæ ferè in modum prædeunt, candidi, parvi, quinque foliis perinde ac Asclepiadis flores constantes: aliqua præterea similes, inquit tomento & lanugine pleni, quæ semen occultatum planum, ex cineraceo fuscum, Asclepiadeo semini par. Molestissimæ huic radices, quæ inter totas & fibrosæ admodum eadem ferè crassitudine longissimæ hac illac serpunt, & latè vicinæ circum loca occupant, candidæ alioqui & fragiles, adeo tamen vivaces, ut, si vel minima fibra sub terrâ latentis oculos illam evensis effingerit, proximo Vere germinare, & vicina loca occupare conspicitur. Itaque, non minus exosa hæc planta rei herbariæ studiosis, quàm Aristolochiæ & Clematidis illud genus, cui vulgus Sarcacenizæ cognomen imposuit. Hujus cauliculi & sarmenta hieme exarescunt & pereunt, sed novo Vere alia & frequentiora germinant.

Apocyni 1. latifolij siliquas semine plenas paucos annos post meum (inquit Clus.) ex Hispania in Belgicam reditum, Pincia ulque murebat Ioannes de loiggy Fabricarum istic Præfectus, hispanicè inscriptione addita, quæ trepi præ. s. arbores, h. e. par arbores reperit: postea, radicebus adeo multiplicatis, ut nemo esset in universo Belgio rei herbariæ studiosus, qui eam ex suo horto penitus erant non cuperet.

M.

Chrys. Sept.
I. V. ex
relata.

Quia autem elegans hæc planta in terra nostra exsul ut plurimum est, non abs re erit, ut aliorum de ea observationes addamus. Assurgit autem, referente Christophoro VVeixio, ad duorum cubitorum, vel etiam ampliorem altitudinem, satis crasso stolone, in aliquot ramos diviso, qui multo succo ex candido pallescente abundant. Quantum verò ex resiccata plantæ parte (quam ipse VVeixius ex Ægyptiaca, Syriaca, & Constantinopolitana peregrinatione redux, mihi, inquit Clusius, Viennæ Austriæ communicabat cum uno fructu, colligere potui, striato est caule, cui alternatim bina semper, contrarius inter se pediculis innascuntur folia satis magna, crassa, & quodammodo cutacea, ex viridi pallescentia, aliquot nervis, ex mediâ costâ satis crassa se spargentibus, prædita, obtruso mucrone, gravis odoris, tenella folia extremis ramis adnascuntur, prorsus incana sunt: ex foliorum alis alternatim emergunt crassi & longi ramuli bifidi, sustinentes aliquot flores longiusculis petiolis innitentes, unico quidem folio constantes, sed quinque profundis incisuris diviso, instar florum Apocyni, Asclepiadis & multorum aliorum, coloris, quantum conicere licebat, foris pallescentis, internè obscurè & obsoletè purpurascens: quibus succedunt singulares, bina, aut ternæ crassæ, incurvæ, binas uncias longæ siliquæ, quibus hiscentibus, sub summâ siliquæ cute, inclusa apparent membranaceo involucrio, frequentia & quasi imbricatim disposita grana plana, qualia ferè Asclepiadis, & Apocyni vulgaris semina, quorum extremæ & angustiori parti inhaeret candidissima & molliissima quædam villosa materia. Si ne perennis an non, nihil affirmare possum. Qualem autem à VVeixio accipiebam plantam, ut commodius describere possem, paululum in aqua macerabam: deinde crassâ minervâ delineabam, observatâ in fructu addito eâ proportionem, ut dimidio minorem exprimerem, quam ille qui à VVeixio mihi donatus. Beidfar ab incolis appellati dicebat. Cum autem multas notas habeat Apocynum non dispares, non ineptæ, meo iudicio Apocynum nuncupare poterimus sive Synacum, sive Palæstinum, & fortè etiam Ægyptiacum; quandoquidem in Ægypto, ut postea dicemus, crescit. Non dubium est quæ ea sit, quam Alpinus Medicus c. 25. libri quem de Plantis Ægyptiacis divulgavit, & circa Alexandriam Ægypti observatam descripsit Beidellar nomine.

De hæc porro planta consulamus Honor. Bellum, qui multæ diligenti observatione dignissima memorie prodidit; cuius verba hæc sunt. Ossar frutex est stolones multos à radice proferens rectos, rotundos, leves, geniculatos, quibus circa genicula insunt folia longa, rotunda, crassa, per quorum medium nervus excurrit albus, & quo utrinque venæ exeunt diversâ foliorum parte satis conspicuæ, folia autem ex intervallis bina semper inter se opposita sine pediculis stolones undique ambiunt, ex quorum alis multi rami nunc exumpete incipiunt, non quidem ex omnibus, sed alternatim, ita ut si, à primo initio sumens, lineam ab uno ad alium ducas usque ad ultimum, perfectissimè lineam helicem describes. Radice firmatur validâ in multas fibras divisâ, luteus flores profert, fructusque Mali magnitudine, cordis figurâ, colore virides, binos aut ternos ex uno pediculo pendentes, in quibus semina lata, lanugine quadam mollissimo candidissimoque serico simillimâ involuta: Caules & folia incana sunt, lanugine quadam tecta, ut crassiore quâpiam fatiâ tota planta conspersa videatur, quæ imbriculis cluitur, eoque tempore folia & caulis colorem ex viridi ad album tendentem contrahunt: pars caulis radici proxima albo cortice tecta est,

Tom. II.

fungoso, rimis dissecto, ut Sambuci clavis videri possit, & illius instar multa medulla alba refertus est. Stolonum cortex & foliorum nervus copiosè lacte amaro & acri abundant: breviter tota plantæ aspectu pulchra est, & quas in fœtibus servo semine ex Ægypto acceptonatas, ad trimum cubitorum altitudinem jam excreverunt, foliaque hieme retinent: nondum autem vel flores, vel fructum tulerunt. Planta hæc in Ægypto vulgariter Ossar appellatur, fructus verò Beid el ossar, hoc est, ovum ex ossar, Beid el aut Italicè Ovo del ossar. Beid enim Arabicè ovum significat, & el est articulus, qui Italicè dicitur del. Huius fructus lanugine pulvinaria implent, lacte autem coria depilant. Sine dubio, hæc planta illa est super quam Avicenna & alij Arabes Saccharum Al-husar (mannæ speciem) inveniri scribunt: & quam Serapio ex Abanifæ sententia, Mutoño interprete descripsit his verbis: Haofer, seu Alafer, seu Alhusar, planta est quæ lata habet folia, singulis annis succrescens. Saccharum ex ramis extillans, & à foliorum cavis quod copiosissimè legitur, non parum quidem amarescens: poma profert camelorum testibus non dissimilia, à quibus res quædam caustica, adurensve emanat, cauteriis maxime accommodata, ex qua etiam & culcitæ, & pulvinaria sulciuntur, planta cuius Cherca nuncupatur: folia autem Haofer incisa humorem destillant in Maio colligi solitum, in quo coria depilantur, adeoque exsudat, ut vas quàm capacissimum ex una, vel altera expressione adimpleatur: lignum verò Haofer leve est, crassum, erectum, pulcherrimum, ut non iniuriâ in suis carnibus tum brachia, tum crura formosarum sane mulierum ligno Haofer Poëtæ bellè comparent. Est & alia planta Haofer nominata ex Tithymalorum quidem genere. Hæc Serapio. Sed animadvertendum est, veterem Serapionis interpretationem rectius huic plantæ quadrare, quam Mutoño, ut utramque cum nostra confectum facile patere poterit. Describitur etiam hic frutex ab Abembitar Medico Arabe Hispano, in sua Simplicium hist. & à Malahy sah Medico Persa, qui Abembitaris historiam in Epitomen contraxit: quorum libros manuscriptos apud Haym Abenxussem Medicum Hebræum Hispanico sermone vidi, qui mihi Ossaris historiam ex eorum scriptis ad verbum hoc modo humanissimè interpretatus est. Ossar frutex est Tithymalaceus, longus & parte superiore tenuis, folia habens lata, super quæ decedit manna quæ Zucrar el Ossar vocatur (florem fert Oleandro similem) hoc addit Malahy sah: Abembitar enim nullam floris mentionem facit, sed fructus duntaxat: folia ipsius plana & levia sunt, caulem habet viridem, concavum: fert fructum quendam similem sacculo pendenti, qui intus continet particulas albas unas super alias, quibus utuntur Arabes ad accedendum ignem, nihilque (dicant ipsi) ad hoc munus peragendum præstantius inveniri posse: pulvinaria etiam hac materia implent. Oritur in montium cavitatibus, sicut ubi mons iungitur monti, quandoque etiam in arenis nasci conspicitur. Si caulem aut folium incidas, latè magnâ copiâ emanat, ita ut quot & amplius libræ ex una planta exeant, quod quidem est acre, calidum & siccum, corrodit & incidit, ut sit in principio quarti gradus caliditatis, planta verò ipsa calida est in fine secundi aut principio tertij. Hæmatodes Mechæ pilos extrahunt à cornu, depilant videlicet coria cum hoc lacte, ea in ipso infundentes: quod quidem est vehementius lacte omnium Tithymalorum: drachma enim una & semis per os assumpta interficit evacuando & excoicando: folia verò in pulverem redacta, & inspersa super ulcera maligna atque corrodentia amplius progredi non sinunt: ligna,

M 3

exsiccat ulcera fordida, humiditatem excrementi-
tiam, carnemque superfluum consumit; las confert
maculis cutem inficientibus. Hujusmodi stirpes
nonnullae Tripoli reperiuntur, nonnullae etiam
Cayd. Sed cavendum ne propinquius accedas ipsis,
aut sub umbra dormias. Bellonius lib. 2. Observ.
cap. 60. hanc stirpem forte intellexit sub arboris la-
nigeræ nomine, non tamen descripsit. Si verò hanc
lanigeram esse Theophrasti, aut Plinij putavit, valde
hallucinatus est: nam lanigeræ Theophrasti nihil al-
liud sunt quam Gossypium, quod in Arabia & Egy-
pto arborefcit, & multos annos durat: sed in Creta
hieme perit. Alpinus quoque hunc fruticem describere
videtur libro quem de plantis Aegyptiis edidit sub
nomine *Beid el fur*: sed ut ingenue fatear, ipsius de-
scriptione non satis allequor. Nescio enim quid com-
mune habeat hujus plantæ folia cum Aloës foliis, quibus
ipsa comparat; neque in quibus semina hujus con-
veniant cum Lactuæ seminibus: & icon quam spe-
ctandam proponit diligentioris pictorem requi-
rebat: semina verò & fructus satis rectè expressi: at
maiores sunt his quos ex Aegypto accepi, ut ex sic-
cis foliis & fructu cum sua lanugine & seminibus,
observare memini. De saccharo autem quod super
hanc stirpem inveniri scribunt, aut ab ipsa manare,
nihil adhuc compertum habeo: nam in novellis
plantis illud observare non potui. Illud tantum anti-
madverui, quod lac detracto folio emanans, successu
temporis circa vulnus conerefcit instar gummi cu-
jusdam albi, Tragacanthæ valde similis, dulcedinis
tamen expertis. Hucusque Bellus.

Syn. C. B. C. Bauh. pin. Lapathum silv. latifolium s. & Lapa-
thum Aegyptiacum lactescens, siliqua Asclepiadis:
Efula Indica, quibusdam.

Locus & Tempus. Anno 1595. Julij 1. Stutgardia in horto D. Hiero-
nymi Gerhart Vicecancelarij observavi parvas
plantas Beidelsar, quæ foliis correspondebant figu-
ræ ab Alpino propositæ; erant autem purpuræ gentia:
parvas etiam plantas in olla vidi Argentoræ in horto
D. Georgij Obrechtii Jurisconsulti ex seminibus
missis nomine Beidelsar à D. Agerio. Nascitur, au-
tore Alpino, in humidis locis propè Alexandriam
in ramo Nili Calig vocato & Cayri, propè el Mat-
tharia, loco ferè perpetuò humido ac ferè palustri
ex aqua Nili ibi diu remanente. Christ. VVeixius
Medicus circa Hierico nascentem ad flumen Iorda-
nem observabat & legebat.

Vires. Folia confusa, ut ait Alpinus, tum cruda, tum in
aqua cocta, emplastri modo apponuntur in frigidis
tum moribus & doloribus; ex lanugine parant cubi-
lia in sumum usum. Utuntur etiam ea ad excipiendum
ignem ex silice excussum, tanquam escæ ac pabulo.
Tota planta scaturit lacteo succo calidissimo & ex-
urentis facultatis, quem plures in quibusdam vasibus
excipiunt ad depilanda coria; nam si aliquanto tem-
pore in eo macerantur, pilis nudantur. Lac quoque
siccatum præstantius corpora solvit, atque dysente-
ricos fluxus etiam lethales facit. Est etiam præstan-
tissimum remedium, ad impetiginem curandam, &
ad plures cutis maculas & infectiones tollendas, si
eo partes illinantur.

ASCLEPIAS VETERIBVS.

CAP. XVIII.

Asclepias, ut ait Dioscorides, ramos producit
longos, in quibus sunt folia longa, hederacea;
radices habet multas, & tenues odoratas; flores
graveolentes; semen ut Securidacæ. Nascitur in
montibus. Radices in vino potæ auxiliantur tormi-
nibus, & contra beluarum venenatarum morsus.

Folia imposita, ad maniarum & uteri maligna ul-
cera faciunt.

De Asclepiade eadem apud Plin. leguntur. Ascle-
pias folia Hederæ habet: ramos longos; radices nu-
merosas, tenues, odoratas, floris virus grave: semen
Securidacæ. Nascitur in montibus. Radices tormi-
nibus medentur, & contra serpentium ictus, non
solum potu, sed etiam illitu.

Galenus de Asclepiade herba scripsisse dicit Dio-
scoridem, se verò nondum experimentum ejus ha-
bere. Paulus calidam & siccam & tenuium partium
esset testatur, & reliqua ex Dioscoride addit. Voca-
tur hæc inter notha Dioscoridis ab aliis Cission;
quasi Hederula; ab aliis Cassophyllon, hæc Hederæ
folijs prædita.

Falluntur vel Matthiolo nobis adstipulante, qui
putant Asclepiada eam esse plantam, quam vulgus
herbariorum Vincetoxicum vocat, quæ frequenter
in saxosis & asperis locis provenit, lævi admodum
caule; foliis Lauti acutioribus; flore albo, muscoso;
corniculis tenuibus, oblongis; radicibus innumeris
albicantibus. Quandoquidem hujus radices nullo
odore commendantur: flores virus aliquod non re-
dolent: semen non est Securidacæ simile. Adde et-
iam quod ex Orbasij lectione Asclepias non pro-
fert folia longa; cui subscrispsit Marcellus interpretes
fretus fortasse ut solet, probatissimis exemplatibus.
Præterea antiquissimus codex manu scriptus de ra-
dicibus non legit *maxæ*, hæc multas, sed tantum *maxæ*,
i. e. tenues, odoratas.

Veterum ergo Asclepiadem, esse neotericorum
Vincetoxicum, crediderunt, sed falsò, Trag. Fuchsi.
Corn. Lon. Cord. Lob. Dod. & Tabernamontanus.
Nos herbariorum Vincetoxicum mox inscribimus
Asclepiadem sive Vincetoxicum multis, floribus
albicantibus.

Nec minus etiam hallucinantur ij, qui Asclepia-
dis vice, quam in montibus nasci Dioscorides, nec
non etiam Plinius tradiderunt, eam herbam acci-
piunt, quam Hederam terrestrem cum quibusdam
alibi nominamus, quæ plerumque secus vias nasci-
tur & perpetuò humi serpit foliis rotundis. Siqui-
dem præterquam quod Dioscorides scriptum con-
reliquit Asclepiadam in vis publicis nasci, nusquam
etiam, quod legerim, prodidit eandem tam longo
reperere tractu, & folia rotunda proferre. Angustura
ait se Asclepiadem non nosse: Turnerus autem non
facile posse affirmari perhibet quænam illa fuerit.

Est porro etiam Asclepias altera flore nigro Lo-
belio, Camer. Tabern. C. Bauh. & Hore. Lusitanico,
quam Columna vult esse Apocynon plantam lethali-
sem, malè meo quidem iudicio. De hac paulò post,
ut & de Asclepiade Cretica Clusij.

ASCLEPIAS SIVE VINCETOXI-
cum multis, floribus albicantibus.

Numerosas, radix demittit fibras, benè habitas,
longas, albas, gustu nauseoso [Trago, odoratas,
contortas & implicatas, instar Hellebori nigri, adeoque in-
terdum ponderosas ut decem libras æquent, cuiusmodi à se-
iam olim in silva, quam Germani den ydar vocant pro-
pè arcem Birsensfeld reperta ait] caules surrigens
lentos, cubitum & sesquicubitum altos, hirsutos, ge-
niculatos: ad quorum genicula bina semper folia
adversa ex brevibus pediculis sursum vergentibus,
nonnihil per extremos margines & nervos hirsuta,
formâ hederaceorum, longiora, rugosiora: ex quo-
rum alis pediculi prodeuntes flores privatis insu-
per pedicellis donatos sustinent albicantes; quin-
que foliis constantes [Trago, ex candido palescentes]
eisdem apicibus concoloribus rotulæ modo, sessi-
lique



lique pistillo viridi, medium occupantibus. hisce succedunt cornicula selescunt aut amplius longa, semen tomento involutum continentia, rufum. Trago aculeata & oblonga siliqua, Ciconia rostrum imitantes, intus candida lana & lato semine Gentianae simili referta, quae si ad maturitatem suam pervenerint & aperta haverint, lanuginosum & quasi pinatum semen in auras evanescent.

An Asclepias Ruell.

An Ruell. l. 3. c. 26. hanc nostram plantam per Asclepiadem, quam alii Cassion, alii Cillophyllon, quosdam Hederalem nominasse refert, intellexerit, asserere non ausimus propter jejunam ejus descriptionem.

Asclepias Veterum, non est contra Trago.

Quo nomine veteribus sit appellata nondum satis constare scribit Tragus, tamen si omnino sit pronuncianda sententia, non inepte se facturum existimat, si Asclepiada eorundem nominet. Asclepiadem autem à Theophr. Pelicanum dici prodidit. Ast meminit quidem Theophr. lib. 8. c. 2. *μακρὰν*, vel ut vertit Gaza Securinge, verum eo loci nihil est quod Vincetoxicum conveniat.

Apocynum non est.

Asclepias an sit durius.

Quidam Herbarij Itali, cum Turn. in Italia ageret, Hirundinariam vulgi Apocynon arbitrabantur: verum cum nec succum habeat luteum, nec vina intoxicet, Apocynon esse negat. Porro quod Hirundinariae radices non sint odoratae, non facile affirmari posse scribit, veram esse Asclepiadem. Nec ullam hactenus vidit, quae cum Asclepiadis descriptione conveniat. Licet Cornarius Asclepiadem Dioscoridis, esse Officinarum Vincetoxicum, & Herbariorum Hirundinariam, descriptione tota & usu approbati sibi imaginatus fuerit. Sed est & Cordo in Dioscor. & hist. Fuch. Lon. Turn. Gesn. h. (cui & Herba cognata Apocyno, & Apocynum dicitur) Lob. Obs. & Ic. (cui & Vincetoxicum) Dodon. gall. purg. & hist. Lac. Tab. (cui duplex frustra effigies) Columnae, Cam. ep. & Cef. Asclepias, uti & Lugd. qui duas unius plantae dat icones. Prima inscribitur Vincetoxicum live Asclepias Fuchsi; altera Vincetoxicum Matthioli. Matth. Fuch. Montagnanae (cui & Herba Laurentij dicitur) Dod. gall. purg. & hist. Cam. hist. & ep. Cast. & Thal. Vincetoxicum.

Apocynum cognata.

Asclepias H. Lugd. nor.

Herba Laurentij.

Lob. redarguitur Dod. refutatur.

Lob. Adv. Asclepias Vincetoxicum, qui invehitur in eos (iniquè) qui Asclepiadem negant. Sic & Dod. Vincetoxici descriptionem, descriptioni Asclepiadis Diosc. conformem esse dicit, & tergiversari Matthiolum scribit. Sed exigui momenti ejus rationes. Radices (inquit is) opponens Matthiolo odoratas & similiter flores, maximèque locis montosis, nemo, cui incorruptum odoratus organum, esse negaverit: folia odore commendari, Dioscorides non asserit: non omnia *βασανιστά* virtus redolent, graveolentia enim omnibus haud aequè magna est: semen tamen non exquisitè quadrangulum, plantam tamen oblongaque figurà, magnitudinem et colore satis Secundacæ refert. Voces *μακρὰν* & *μακρὰν* omisit quid Matthiolo conferre poterunt: folia hederacea saepenumero longa; veluti Periclymeni & aliorum: & tenuis radice frequenter multiplex.

Ger. Asclepias: flore albo. Cam. h. Asclepias vulg. Asclepias flore albo: flore candido, Hort. Lus. C. B. A. Asclepias albo flore: Eid. apud Maith. Asclepias, Apocyno cognata herba. Dod. purg. & hist. Ger. & C. Bauh. Hederalis Ruellij, securè nimis. Hirundinaria, Brank. Trag., Gesn. h. & Lon. Asclepias vulgi, Apocynum Dioscoridis, Col.

Asclepias floribus albicantibus, Vincetoxicum dicitur ab Officinis; Hirundinaria ab Herbariis. Germ. Schwalbenwurz: Belg. Smalwe wortele: Dimpfe vom gall. Fuch. V. Strix toxici. It. Asclepiade & Vincetoxicum Ang. Swallow wort & white Swallow wort: aut Smalwort: Bohem. Lasswurt. Hung. Fecské fü, i. e. Hirundinis herba. Asclepias autem nominata est ab Esculapio, qui *Ασκληπιός* Graecis dicitur, antiquo Medicinæ autore, juxta illud:

Inventum Medicina meum est, opifexque per orbem
Ditor, & herbarum subiecta potentia mihi est.

Hirundinariae nomen haud dubiè sortita est, quod acuta & aperta ejus siliqua cum candida lanugine volanti hirundini formè similes sint. Licet hæc ipsa Hirundinaria appellatio, ad Chelidonium & Nummulariam quoque se referenda, sed diverso respectu. Vincetoxicum, vel rectius *μακρὰν*, quod illi insignis adversus venena visus sit.

Nascitur in altis, arenosisque montibus & sylvis, in nonnullis etiam rupibus, in primis verò incultis ac desertis locis. Hircania sylva ad Mosellam & in Valsgovia. In sylva ydar ut ante dictum reperitur 10. libras ponderans, autore Trago. Copiosissime nasci scribit Fuch. in monte haud procul a Tübinga sito, in quo olim arx posita fuisse fertur, Augusto mense florens. Ego Asclepiadem Basileæ vidi florentem mense Junio & Augusto in monte prope Leinach, cum seminibus in longis siliquis maturis: Monspeij & Lugduni florentem Maio & Junio: radix raro hieme moritur.

Eadem planè ex sententia Tragi facultates Hirundinariae obtinet, quas Aristolochia longa. Radix illius utilissima est evocandis mensibus mulierum. Potest verò intro sumi & foris quoque: tunc adhiberi Radices Asclepiadis in vino decoctæ & potæ subvertunt torminibus. Arcet & hæc potio venenum ne cor petat, in his præcipuè qui rabiosi canis, aliorumque venenatorum animalium motu infestati fuerint. Hæc radix pondere semilibrae per noctem in vino macerata, & deinde usque ad tertias decocta, manè jejuno stomacho calida pota, sudore interim provocato, misericè expellit aquam inter cutem, ad eam ut illa per pedum plantas erumpat: estque hoc singulare experimentum.

Mulieribus ad mensium provocationem magna efficacia in desensionibus semper usurpata: naturæ dolores juvat. Herba cum floribus tusa, mammis tumens cataplasmatibus instar imposita, tumorem deprimat. Pulvis ex herba & radice sordidis, putridis ulceribus medetur non secus atque Aristolochia: potestque hæc illius loco usurpari & illa vices hujus obire, si alterutra desit. Radix pota ab iis, quorum in corporibus sanguis ex casu coagulatus est, eum educere totum per urinas creditur. Matthiolum Asclepiadem moderatè calidam & siccam dicit. Marantia torminibus succurrere volens, ejus radicibus utitur: folia verò adversus vulvæ, mammarumque ulcera, quæ cacoethe vocantur, iis: it: floris & seminis nullum esse utum tradit. Apud Fuchium tamen contrarium scribitur. scilicet flores & folia siccata, mox trita vulnibus utiliter inspergi: sordida etiam ulcera purgare & ad cicatricem perducere, genitaliumque vitium, scriptis egregiè mederi. Post laborantibus hujus radicem in vino decoctam, potamque commendat Tabernomontanus. Idem ex radice & herba recentia aquam distillat, ac cum syrupo de quin-

Asclepias

Hederalis Ruellij an sit durius.

Nomina linguar.

Asclepiadis Erym.

Hirundinaria.

Vincetoxicum camunde.

Locus Tempus.

Virid.

Aristolochia facultate.

Tormina Canis rabidi morsus.

Hydropi.

Menstrua.

Ulceris.

Aristolochia subsp.

Temperamentum.

Cacoethe.

Marantia refut.

Valacra.

Rupera.

Refut.



ridi pallescentibus
in quibus folia mul-
ta, acuta, longa, un-
ciam. circiter lata,
ut plurimum terna
simul orientia, in-
terdum bina, ubi
rami dividuntur,
transversum fere di-
gitum in vicem dis-
tita, rigida, dura,
crassa, superiore
parte atrovirentia
ut Lauri folia; in-
ferne magis, pro-
pter asperas hirc
inde maculas, albi-
da, exsucca; supre-
mi rami in furculos
aliquot divarican-
tur, quibus insides
flores multi simul

Flores aut
rubentes,
aut albi,

Siliquis
perenni.

Rhodod-
endron Dio-
sc.

Lacuna le-
gis in
Dio. suffo-
ca.

Dio. sc. not.

Dio. sc. cor-
rect.

Dio. sc. res-
tutus.

Dio. sc. re-
plicatur.

Rhododen-
dron Plin.

juncti, odori, pulcherrime rubentes, qualiter co-
lore Rosae incarnatae conspiciuntur, aut albi, divi-
sura quinquepartita Clematidis daphnoidis: singu-
lisque divisionis partibus interne adnata quaedam
trifurca appendix, in medio apices quinque simul
juncti albi, pilosi: floris vero longi veluti calycis
immut extrinsecus obvallant foliola intense ruben-
tia, siliques marcidis floribus succedunt, quales Apoc-
yni vel Asclepiadis sursum spectantes, contrario
scilicet situ ei quem Lon. & Tragi figura demon-
strat, papposo semine plenas.

Nerion quibusdam apud Diosc. Rhododaphne,
aliis Rhododendron vocatum, frutex est notitiae
vulgaris, folia longiora [maxima] crassioraque [et
habens, quam Amygdalus. Lacuna legis non
placet cum legit, folia Amygdalo longiora vidi, sed non
lactora: praestat igitur legere, ut dicitur, ut
habent alia exempli.] Florem ad Rosae similitudinem
conformatum: fructum [etiam]. Miror Diosc. dicere
etiam in quo enim consistat, similiter
dondum mihi constat, et non siliquam, ut Sarrac.] Si-
militer Amygdalae, velut cornu [etiam]. Sarrac. legi-
tur Corn. seu potius et videretur.] et post aperturam ple-
num lanosa natura, simili pappi Acanthinis [etiam].
Sarrac. videretur, id est spinarum, seu Carduorum pap-
pis, ut meliores codices, et ipsa experientia testan-
tur. Similitudo siliquis Nerij cum Amygdalo intel-
ligenda prorsus est, vel adhuc exigua siliqua, et ado-
lescente, vel ob corticis viriditatem, et crassitiem,
alioquin haud recte adulta siliqua, angusta, oblon-
ga, nullo subiecto duro et lignoso nucleo, lanugi-
nosus tantum villis surcata cum Amygdalo compa-
retur.

Rhododendron, inquit Plin. l. 14. c. 11. quia ne no-
men quidem apud nos latum invenit, Rhododa-
phnen vocant, aut Nerium. Idem l. 16. cap. 10. ait.
Et quamvis herba dicatur Sabina, Rhododendron,
ut nomine apparet, a Graecis venit. Alij Ne-
rion vocarunt, alij Rhododaphnen, sempiterno

frondis honore, Rosae similitudine, caulibus frui-
cosum: qui locus falsi suspectus est. Sunt qui legant
Sabine, hoc est lingua Sabinorum, quibus non ac-
cedit Hermolaus, huncque ejus loci sensu nesciat.
Rhododendron Sabinam herba n. dici, et n. ta. non
in Sabinis primum orta non videatur, ex ipso no-
mine quod Graecum est: Sciendum enim aliud fru-
ticis genus Sabinam vocari, Graece brathy. Planta
vero est Lauri facie, non iniucunda spe latu, pra-
sertim suis floribus ornata, quorum similitudine
deceptus quondam L. Apuleius in Asinum muta-
tus, dum Rosas quæreretur, quarum pastu in pristi-
nam formam restitueretur, parum abfuit, quin im-
prudens eos devoraret. Verum qui in plantarum
Historia, & viribus cognoscendis diligentissimus
fuerat, recordatus Nerij flores asinis venenum esse
praestantem, statim labra substraxit, demissisque
auribus abiit. Idem Lucianus sibi in asinum quoque
transformato narrat accidisse. Sed Nerium
id est Laurum silvestre n. vocat, perniciosum
asino & equo cibum, cum afferant id comedentes
eversio non.

Matth. (qui in prioribus com. n. siliques male p. Matth. non
sunt, tanquam forte ab eo nondum visa) Canep. &
hist. h. m. q. u. & Lugd. Nerion sive Rhododaphne,
sive Rhododendron, Oleandrum vulgi, flore rube-
scente & albo. Matth. s. cum mag. fig. Turn. (qui
duas habet figuras frustra meo iudicio) Fuch. & Arg.
cui & Oleander in Candia, Oleandro & Neandro
Isalorum quorundam, flore albo & rubro, sive ro-
seo. Lon. (qui figuram malam exhibet, siliques
nondum nutant) Nerion, Rhododaphne, Lau-
rus rosea. Trag. cujus figura non bene appropinquat
siliques deorsum pendentes, uti etiam quondam
in Fuchiana) Nerion, qui idem Nerion Nicandro
vocari ait. Lob. Adv. Nerion, Oleander, Laurus
rosea, & Rhododendrum purpureum & album;
Eid. Obs. Nerion, item, Nerion albis floribus: Ic.
Oleander, Laurus rosea: Et, Nerion floribus albis.
Tab. hist. Nerion (Rhododendron addit in Icon.)
Item Nerion floribus albis. Ego cum nullum discer-
men noverim praeter colorem, frustra ab his duas fi-
guras poni existimo. Gesn. coll. Rhododaphne vera.

B. pin. Nerion i. floribus rubescentibus: Nerion,
Trag. Cord. in Diosc. Lob. Tab. flore rubro, Eyst.
Nerion, Matth. Fuch. Dod. gall. Gesn. h. Lac. Lon.
Cass. Lugd. Rhododendron. Bellon. Gesn. b. Dod.
Rhododaphne, Gesn. h. Cat. Eid. B. Nerion i. flori-
bus albis; Nerion candidis floribus in montis Ida
convallibus Bellon. Nerium sive Rhododendron
flore albo, Eyst.

Nerium, in Diosc. quoniam, in Diosc. dicitur: La-
tinis pariter Nerium, Rhododaphne, & Rhodo-
dendrum, Offic. & Barbans Oleander, Ger. Olander/
Unholdenfrant / Rosenblumlein. & Lobertosen:
Belg. Oleanderboom: Gall. Oleandre Rosee, Rosa
gine. Rosa Laura & Oleandro: Hisp. Adelfa, sive Elean-
dra, Ang. Olander: potest etiam vocari (inquit Tur.)
Rose tree / aut Baye Rose tree. Ast Nymphae sortassis Nerij cogn-
Nereides nomen dederunt, apertis alij Rhodo-
dendrum, quasi Arborem Rosam: vel Rhododa-
phnen, i. e. Lauream Rosam, vocitarunt. Rhododa-
phnem (inquit Fuch.) Graeci dixerunt a Rosae flori-
bus & Lauri foliis, quae fruticis hujus praecipuae sunt
notae. Nec refert quod Dioscorides Amygdalae foliis
ejus folia comparaverit: Lauro enim & Amygdalae
non dissimilis magnopere foliorum figura est. Fecit
idem Rosae flos & arbor, ut eadem gens Rhodo-
dendrum nominaverit.

Nasci in hortis arborum [etiam] & maris. Locu-
mis lotis, & juxta flumina, auctor est Dioscorides:
sciatere, Nerio silvas in Ponto, quod propagine &
semine ferunt, prodidit Plinius. Videri primum Ma-
thioli:

HISTORIAE PLANTARVM


thiolus ad Benaci ripas, & in Argentario promontorio in maritimis Senensibus. Verumque (inquit Anguill. in insula Candia abundat, sponte proveniens, apud Rulmina, ibique vocatur. Idem: In Italia notissima sunt, ut Venetis in hortis. Circa Trivolum in Syria, (ubi incolae vocant Nefle) Nerium spontaneum observavit Rauvvolff. Passim ad aquarum fluentia reperiri scribit Camerarius in Creta, nonnullis quoque Galliae locis, item Genuae, & in Hetruria prope Libornum. In montis Baldi parva insula Modachorum minorum D. Francisci abundanter provenit Nerium albis & rubris floribus ex saxis nudis prope aquam pullulans, testatur Pona. Copiosissime provenit in tractu maritimo alpino & montoso Liguriae, inter Niceam & Genuam, cum siliquis, ait Lugdunensis. Quo autem mense floribus & fructu praegnant, sit Nerion, non satis Fuchsio, constituitur: neque enim vel flores, vel fructus ejus ipsi videre contigit. Hinc est quod etiam pictura quam exhibet, ut semel careat. Monspelij vidi cum siliquis in Autumno ubi abundat, & hyemem fert, & floret mense Maio & Junio. Lugduni ubi reponitur, Julio & Augusto. Patavij cum siliquis. Vero, ut in horto Bembi sub tecto mense Januario cum siliquis nondum maturis. Rhododendron, inquit Bellon. in nonnullis Creta insulis ad edicularum trabes conspiciendis aptum est, cum aliqui parvum sit.

Dioscorides tradit Nerij flores & folia pulis, asinis, canibus, & quadrupedum plurimum venena esse, hominibus vero contra serpentium morsus conferre, & viho pota, eoque magis ruta addita. Imbecilles etiam animantes, ut pecus & capras, si aquam bibant in qua folia ea manducaverint, mori. Eadem planè tradit Plinius. Nerium jumentis, caprisque & ovibus viderum est. Item homini contra serpentium venena remedium: quæ iterum alio loco repetit. Mirum folia Nerij quadrupedum venenum esse, homini vero contra serpentes praesidium, ruti addita, & viho pota. Pecus etiam & caprae, si aquam bibant, in qua folia ea manducaverint, mori dicuntur. His inanimè refragatur Galenus in scribis. Nerion aut Rhododaphne notus omnibus frutex, folis quidem illius digerendi vini obtinet: intro vero in corpus assumptus, perniciosus ac venenosus, non solum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus est. At dicendum, inquit Matthiolus, Nerium funis hominibus à serpentibus non de mortis, perniciosum esse. Dioscoridis verò sententia idem iis remedium esse quos serpentes mordiderint, quæ ratione Carthades auctore Avicenna, à cane rabido de mortis medetur, & Euphorbium à Scorpione ictis, alia denique lethalia medicamenta aliis venenis ad verantur. Cordus alio modo conciliari posse hos auctores scripsit. Si intra corpus sumatur Nerium venenum est, si foras imponatur, contra venenatorum morsum auxiliatur. Sed rovera Nerium intro sumptum contra serpentum morsus ogitulari Dioscorides intellexit: fideliora enim exemplaria habent autem Nerium cum viho pota, videlicet flores & folia. Sic etiam in Plinio perspicue legitur, qui procul dubio videtur hec ex Dioscoride transcripsisse. Praeterea in Esdras antidotum, cujus contra venenata animalia praecipuus est usus, flores Nerij recipi, hanc enim medicamentum contra venena efficacem.

hæc vero apud Aetium, & Paulum compositione Ekdre male legitur flores Nerij, deinde paulo post Rose Rhododaphnes. Nerion enim & Rhododaphne idem est frutex, & Rose Rhododaphnes nihil aliud sunt, quam flores Nerij: Interpretatio & farum huiusmodi, quæ in margine notata, ab aliquo doctore in contextum inserta est. Id tamen verum est, si Cordus florem Nerij insinuat, pariter non semper accidere emittit quibusdam lo-

cis, & quibusdam temporibus, arborumque quibusdam temporibus venenata esse, ex cuius & Aconiti floribus in Ponto venenatum mel apes colligant. Scribit etiam Galenus achilleanum dorsum Rhododaphnis vellicari. Idem de Rhododaphne coloris & odoris. Caterum Bachanellus in suo consensu de cognoscendo simpli. contrarius Dioscor. & Plinio eandem cum Cordo distinctionem adhibet. Ego quomodo conciliandus sit Gal. & Paulus cum Diosc. & Plinio, hæreo, si Matthioli rationatio non recipitur. Dum porro scribit Diosc. Nerion è vino potum, ruta addita hominibus, contra morsus serpentum praesidium esse: Tragus eas facultates non ipsi Nerio, quin potius Ruta attribuit. Sed si Nerium vim non habet resistendi serpentum morsibus, sed tantum ruta id efficit, frustra ad id probatur à Dioscoride: frustra etiam admiratur Plinius vim illam. Quicquid sit consiliis omittendum usum internum medicamenti dubij, ne in iudicia valis artem figuram faciamus.

NERII FAGIE ARBOR.



Nerij facie arbori prope dent siliquæ de ramis & furculis, Sâbuci pulchris, medullosis, pallidis, pullis, nodosis, selquipalmum & pedem legis vaginis, cutaceis, uno cohusu septenis aut novenis, singulis gracilem Lamperam effigiantibus: iunctis firmitur pelliculis capaceis & tomentosis, adedem xivium, serpentis ementibus, & quiddam cadaveruli anguini simile involventibus, ut

quæ horrore sit & illudat: consimili florum, exortoblongi exeunt caliculi, herba Sancta, apte Stramoniz.

Tobadæ & ic. Nerij facie arbor, ut & Lugd. apud quem tamen vitulus transpositus est incunâ typographi. Est enim Palmaceæ pinnae spinosæ adscriptus, de qua egi lib. ad finem. Tab. Nerio similis arbor: sic & B. pin. cui etiam Nerion;

NERII SILIQVÆ EFFIGIE,

Kayæ Baka.

Teres, infæque minimi digiti crassitudinem erat siliqua, qui iteeger, sexunciarum longitudine superasse videbatur, immatura Nerij siliquæ formam quodammodo referens, denso cortice praeditus, si nigro solo striatogue, & veluti innumeris tuberculis oborto, instar onagricæ pellis, & corij, & quo vaginas suis cuticulis & acris acibus exspiciendis tegunt Turca, nigro alioqui, nisi ea parte quæ pediculo proxima sillæ enim rufescebat: an semina continerent, inquit Gulesor. l. c. incompertum, sed ipsam admodum duram, & quæ vix cuticelli invertebat, in eo observabam, quæ subacidi saporis præ se ferre fructum ostendebat Theodorici Clavus, Lugduni Patavij. Similem postea



dus, illi navigatione, triplex eductus, Kaye baki
 appellari aiebat, atque, dum recens est, edulem esse
 affirmabat. C.B.pin. Nerton + (sic) Fretus Ne-
 ri) filique figura.

VITIS ALBA SIVE BRYONIA
CAP. XX.



tibus undulatis ut in Eredas quam vocant recentiores; ex foliorum alis flores ligulati quorundam, e quibusque fisis compositi exeunt, colore albis in herbaceum languente, quibus succedunt acinisambucinis pares, per maturitatem rubri tunc croceo, nunc solo, granulisque turgentes.

Vulgarem potius Bryoniam esse veram Dioscori-
dis Vitem albam patet, ex multis notis, quas ei Dio-
scorides assignat, tam apte coherentibus, ut qui per
campos spargatur, illam primo oculo facile co-
gnosceret. immo & Dioscoridi gratiam habere de-
betet, quippe qui effodiendæ radicis tam vana la-
borem nobis enpuerit. nam qui cognoscere solam
hanc plantam affeclat, ut cum opus sit, usui adapret,
satis superque esse possint notæ à foliis, à viticulis,
à pampinis, à fructibus, à nascendi, & crescendi mo-
do, alijsq; quibuscumque : qui verd ad intendendum eam
accipere intendat, poterit radicem (si hac uti videret)
effodere. nam multis polleat remedijs hanc, vel ipse
Dioscorides docet. Quia autem eos qui vulgarem

Bryonia non esse veterum Dioscoridis Vitem al-
bam arguuntur ex hoc, quod notam dnam
notam non apponit, nempe radicem, quam ob
nimiam magnitudinem non reliquisset, si vera esset.
Stultos esse dicit Marantia, placet veterum de Bry-
onia hic subscribere historiam, quo veritas magis
elucescat.

[illegible]

Plinius quoque de Vite alibi scribens, ait a Graecis Plin de Vite
 Ampelolentem, ab alius Ophiothaphylon, alius Melo- te 400.
 thro, alius Psilochitum, alius Archezostin, alius Cedro-
 stin, alius Madon appellari hujus sarmenta longis &
 exilibus internodiis geniculata scandere: folia tri-
 pinosa ad magnitudinem Ederæ, dividi ut Vitis;
 radicem albam, prædem, Raphano similem in vivo; Radix Ra-
 ex ea caules Aspragi similitudine exire; senem in phans.
 uva satis acinis pendere succo rubente, postea
 Croci [Crocato legis exemplar Cornu] Novissid, qui
 omnia perficiant, illo enim uti eos.

Apuleius cap. 69. non contentus recitatis nomi-
nibus, plura adscribit: Græci, inquit, Brioniam, Che-
lidonium, & Melothron, & Archezostin sive Apia-
stellum; Itali Vvam taminiam, Vitam albam, Agriso-
lium, Dentarium; Egyptij Thidona, Dardiadona;
Syri Hugiadlessi, Dinuprila; Daci Docklea appellavê-
re. Herba virgultis atque foliis & corymbis ut vini-
fera Vitis, sed omnibus hirtis, quæ se colligit vicinis
fruticibus, fructu sive semine botruoso, longo, raro,
sulco, quo etiam tergora depilantur, thyriss emi-
tens primâ informatione à radice quæ sunt alpa-
gis similes. Humelbergio Bryonia hæc est quæ
aliò nomine Ampeloleuce, i. e. Vitis alba vocatur;
Teutonicè Schmirreurg. Est autem Græca appel-
lata Brionia, sic dicta à verbo *Brion* quod est extol-
lo & exalto, eo quod in propinquos frutices scan-
dens se extollat. Chelidonium dictum videtur à si-
militudine quadam foliorum, quæ similiter quadan-
tenus incisuris dividuntur. Melothron appellari
videtur à corollæ concinnatione. Nam Græci ut
etiam vocant *Caxallere* & *gallieriquate* i. e. colorum in-
fectiones & concinnationes: quod coloris forte ex
Bryonia alba fructu accedebat. Archezostin dicitur
quæ princeps cingulum *Zeus*; enim Græci, latine
cingulum est, *Zeus* princeps. Sic appellatum quod
inter alia principaliter propinquos frutices thyriss,
& implorando comprehendat. Apiastellum inter
Græcas appellationes ab Apuleio enumeratum, no-
minis sui (modo non sit corrupta dictio, quod im-
bigitur, nam latinam potius, quam Græcam for-
ma: n

Verum duarum drachmarum pondere pota, com-
moris à vipera auxiliatur, & fetus enecat. Ali-
quando verò mentem turbat aliquantulum. Et uri-
nas movet pota. Apposita verò utero, fetus & se-
cundas trahit. Sed & eclegma ex ipsa cum melle da-
tur his qui suffocantur, difficulter spirantibus, tus-
sientibus, latus dolentibus, ruptis & vulsis. Sple-
nem liquat trium obolorum pondere, cum aceto ad
dies 30. pota. Inponitur etiam commodè cum fico
ad eadem. Decoquitur ad infellus, ut quæ uterum
purgat, & abortum procurat. Succus è radice colli-
gitur Vere. Bibitur hic cum aqua mulsa ad eadem
ducens & pituitam. Fructus facit ad scabiem & le-
pram, cum illitus, cum impositus. Attrahit lac suc-
cus ipsius fructus [xux. de veter. codex, linc.] cum triti-
co cocto absorptus. Hæc Dioscorides. Ex omnibus il-
lud quod scribit attrahere lac, intelligimus purgan-
do, sive retrahendo à mammillis, non autem abun-
dantiam lactis facere ut Plinius tradit. Qui enim fa-
ceret lac virosa & maligna hæc planta, nisi per acci-
dens repurgando malè affectas morbidave nutri-
ces? Asparagorum Bryoniae usum contra Diosc. Pli-
nium & Galenum in cibis non probamus nisi assu-
matur loco medicamenti & ad evacuationem alvi,
quæ fortè moderatior si subsequatur, nō propterea
dixerimus cū Galeno fœtidam hanc plantā edulium
stomacho acceptum: quod etiam non placuit Do-
donæo, ut postea dicitur. Cæterum, Plinij verba
hæc sunt. Caules Asparagi similitudine decocti in
cibo alvum & urinam cient. Folia & caules exulce-
rant corpus, utique ulcerum phagedænis & gangre-
nis, tibiaturumque tradit cum sale illinuntur. Novère
seminis succum qui coria perficiunt, illo enim uti-
tuntur. Pforis & lepris illiritur. Lactis abundan-
tiam facit coctum cum tritico, potumque. Radix nu-
merosis utilitatibus nobilis, contra serpentium ictus
tritā drachmis duabus bibitur. Vitia cutis in facie
variosque & lentigines, & sugillata emendat & cic-
trices. Eademque præstat decocta in oleo. Decocta
datur [præstat in oleo decocta: datur & c. Corn.] & comi-
tialibus potus: item mente commotis, & vertigine
laborantibus drachmæ pondere quotidie anno to-
to. Et ipsa autem largior aliquanto sensus purgat
[turbat censet legendum Corn. ut habet Diosc.] Illa vis
præclara, quod ossa infracta extrahit in aqua im-
posita. Herba Brionia, inquit Apuleius, in cibo data
lienosis, per urinam lienem digerit & emendat.
Hæc herba tam laudabilis est, ut in theriaces etiam
compositiones mittatur. Item si in capite, vel in cin-
ctu eam tecum portaveris, nulla malæ cōtingent.
Ampeli leuces, autote Galeno 6. simpl. prima qui-
dem germina ab omnibus pro inore edi Vere so-
lent, utpote edulium stomacho, propter adstric-
tionem acceptum: sed & subamara sunt & modicè a-
crem adstriccionem possident: quare & urinam mo-
dicè cient. At radix & abstergentem & desiccantem
vim habet, & moderatè [omnibus & ubique legitur, sed
necesse sit dicitur] calidam: quamobrem & lienes
induratos liquat tum epota, tum foris cum ficibus
imposita: & pforam & lepram sanat. Porro fructus
ejus racemi speciem præ se ferens, iis qui coria de-
plant, est utilis. Scribit Dod. facultate Bryoniam
albam omnibus suis partibus calidam & siccam esse
tertium præsertim caloris gradum excedentem, cum
expurgandi vi potentissima, per quam non modo
biliosos ac pituitosos, sed & aquosos humores edu-
cat: Galenum notat in eo quod ab omnibus pro inore
per Ver edi, eduliumq; esse stomacho propter ad-
striccionem gratum dicat: de Vitis silvestris sive Ta-
mi asparagis, sed nequaquam de hujus Bryoniae ger-
minis us veritatem habere asserit: alba enim Bryo-
nia asparagos, sive prima germina nequaquam ad-
stringere, sed alvum vehementius commovere, sto-

Tom. II.

machoque gravem molestiam inferre: Dioscoridem
quoque scribentem corrigit, radice succum Vere ex-
primi. bibique cum aqua mulsa, pituitamque ducere: du-
cere autem addit, non modo succum, sed & radicis
decoctū, pituitam, bilem flavam, ac serosos aquosos-
que humores, & quidem validissime, unaque ven-
triculum ita sæpenumero perturbare, ut & eisdem
vomitione reddi procuret. conferte ejusmodi vehe-
mentem purgationem hydropicis posse, & quos
comitialis morbus, aut capitis dæturnæ & pertina-
ces vertigines detinent: sed tamen epilepticis non
quotidie, ut Dioscorides monet, exhibendas: subin-
de etenim de dille satis fore molestem, validū enim
esse remedium, violenter purgans, & nature vim in-
ferens. Plinium denique taxat, qui lactis abundan-
tiam facere scribit: videri enim magis lactis genera-
tioni adversari, quod acris sit, & eo vellera ac coria,
teste Diosc. depilantur. Præter quæ omnia hæc ad-
dit Mesues: Ex succo Bryoniae, melle & vino ana, fit
porio ad strumas experta, & emplastrum ex ipsius
radice & melle, eisdem delet. Ex Bryonia medica-
mentum à Democrito compositum apertè efficax
ad epilepsiam, paralyfin, vertiginem, & cæteros affe-
ctus frigidos cerebri, spinalis medullæ, & ortorum
inde utrinque nervorum, accipit radicis Bryoniae
mundatæ & tritæ lb. ss. sapæ uvarum passiarum lb. iij.
squillæ assatæ, strobilorum purgatorum an. 3. j. ss.
nucis moschata, Cardamomi, Macis, Zingiberis an.
3. ij. Caryophyllorum, Piperis longi, Stoechados
an. 3. j. ss. Seseleos, Salis gemmæ, Calliæ an. 3. j. spicæ
3. ss. Agarici 3. iij. Datur post sex menses à 3. ij. ad 3. v.
Idem accipit succi Bryoniae 3. v. Aceti scillini lb. j. a-
quæ coctionis Origani, Hyssopi sicci, Lybistici, Sese-
lios, Cardamomi, Stoechados an. 3. j. Sapæ uvarum
passiarum lb. ss. Mellis lb. ij. facitque Syrupum idem
pollentem, quod prior compositio, si detur uncis
duabus. Ex succo ejusdem & sapæ uvarum passiarum
eclegma ad tussim & asthma efficax filius Zesar cō-
ponit. datur autem radix Bryoniae ab aureo uno ad
aureos duos: succus autem à 3. j. ad 3. ij. Quendam
epilepsiā curatum esse tribus septimanis, solummo-
do purgando se succo Bryoniae depurato, addito
paucō saccharo legitur apud Arnold. de Villanova.
Magni sit à quibusdam radix ad arthritidem, quam
sectam macerant in aqua Vitis deinde distillant, lin-
tea madefacta in aqua calida imponunt parti dolen-
ti. Bayrus, radicē tenuit, & circa collum ligat, ac sic epi-
lepsiā tollit, & spasmū sanat. Idem fructu fricato pi-
los removet. Neutram Bryoniam esse in usu ad pur-
gandum asserit Fallopius, sed solum cum lenienda
alvus sit, inunctionem ex oleo radicis Bryoniae con-
venire. Sed q̄ vera scribat, patet ex hætenus dictis.
Ei præterea refragatur Mesues, qui Vitis albā inter
sua medicamenta dejectoria reposuit, & de ea hæc
ad sēsum scripsit. Vitis silvestris, quod hausta, quem-
admodum & Dracunculus vetriculo, & jecinori no-
xam inferat, danda non est, nisi aromatum pulvere
permista, aut addito mastiche, Cydoniis malis, aut
aliis adstringentibus, roborantibusq; medicamentis.
Succus è contrita radice expressus pituitā ejcit, uri-
nā remorantē trahit, & cerebrū mundat, quinetiam
pectus, & nervos à pituitosis, putridisq; excrementis
liberat, viscerū obstructions aperit, renes à calculis
expedit: subvertit itē vertiginosis, comitialibusque.
Præstat opem mixturæ tussientibus: & induratos tu-
mores resolvit, præsertim lienis, si cum vino & ficu-
bus tusa radix illinatur. Mēstrua elicit, & universum
purgat uterum, atq; etiam fœtum expellit, si in ejus
decocto insideant fœmina. Succus fabarum, aut ci-
cerum farinā exceptus, maculas in facie, & vulne-
rum cicatrices emendat, linimenti modo adhibitus.
Oleum excavatis ejus radicibus immixtum, cineri-
busque incoctum, sugillata delet. Præterea mulieres

N

*Vitis strangu-
latus.*

vulvæ strangulationibus obnoxias mirum in modum juvat, adeo ut eas à strangulatu liberet, & sanet. Equidem novi (inquit Matth.) mulierem quotidie ferè per plures annos hoc morbo vexatam, quæ tandem à quodam vulgari herbario edocta, ut vinum album biberet, in quo Vitis albae radices uncia effervibillet dormitum scera semel in hebdomada, cum hac medicinâ per annum usâ fuisset, optimè ex illo morbo convaleuit. Ceterum non placet ad dysenteriam decoctum Bryoniae, cuiusdam Empirici, cum Thymbra aromatica potum. Multò minus aridet phantasia Portæ phyt. L. 3. c. 17. dicentis, Bryoniae ex pallido albescens flores habens, pituitâ emendat: Item, radix ejusdem lactescens ostendit cauliculos cum tritico coctos, potosque, lactis abundantiam facere. Retulit Io. Stöffelius, radicem Bryoniae liquis summâ tellure refecerit, partem verò reliquam terræ inhaerentem excavaverit, amputatamque partem superiorem, tanquam operculum rursum imposuerit (cavendo ne quid pulveris sordidumque terrestri in cavum incidat) postero die detegendo cavum illud succo quodam lacteo plenû, etiam ad tertium usque diem reperiri. Hujus succi cochlear unum propinatum, clementer per inferiora, feliciterque purgare quemlibet hominem. Agyrtæ nonnulli mira quædam monstra ex hac radice effingunt, quæ cum aliquot dies sicæ areæ mandaverint, pro Mandragoræ postea distrahunt; alij immaniter per illam homines purgant, Tragus.

*Empirici
cuiusdam
phantasia,
et Portæ.*

*Succi colligi
genui raris.*

*Vitis et
descriptio.*

*Mandragora adul-
terium.*

BRYONIA ALBA MACULATA

Descriptio.

E Semine misso à D. Jacobo Zvingero pro Bryonia Cretica provenit mihi planta Montbelgardi in horto E. C. radice magnâ, albâ; viticulis, foliis (in quibus tamen sunt maculae albæ) & floribus ac uvis similis vulgari jam descriptæ. De hac frater C. Bauh. Radice est longâ, altè descendente (amplâ, Rapæ modò, dixerat apud Matth.) sed ad vulgaris magnitudinem non accedente, fusco cortice tectâ (quæ foris secus cum vulgari convenit, verum intrinsecus candida, nec circularibus lineis prædita) ex qua longâ & tenuia sarmenta prodeunt, quæ ambiunt folia aspera (qualis & tota planta) ad similitudinem Vitium, aut Bryoniae vulgaris divisa, sed minora, viridia, albis striis per medium discurrentibus, vel maculis albis notata, quibus capreoli ut in Vite adduntur. Flores habet pallidos, quinquefolios, striatos, vulgaris Bryoniae floribus majores, ex longis pediculis propendentes: cuilibet flori, fructus incedit semicircularis, supernè in partes duas divisus, viridis primum, at per maturitatem ruber, (qui vulgaris fructui major est, aliquando unicus, aliquando plurimus, ex longo pediculo dependens, aiebat apud Matth.) semina duo continens, quare dicoccos appellari potest. Hæc ille, cui dicitur in phyt. & apud Matth. Bryonia, sive maculata, à vulgari differens, quod minor sit, & folia per medium albis striis notentur: In prod. Bryonia. In pin. Cretica maculata: Bryonia dicoccos, frequentissimè in Creta proveniens, elegans, & ab aliis alibi natis differens: Bryonia Cretica, Ponz Italico.

Descriptio.

VITIS SIVE BRYONIA NIGRIS baccis. CAP. XXI.

Descriptio.

Quamvis videatur Bryonia nigris baccis posse paucis verbis tradi, nihilominus tamen eas libuerit Cordo particulatim eam delineare, placetque diligentem descriptionem proponere. Bryonia quæ nigrae baccis, ab una radice viticulas

emittit plures, tenues, longas, & angulosas, foliis asperis, scabris & formâ vitigineis similibus vestitis. Sæpe quæ singuli, longi, intortique exeunt capreoli, arbutorum virgas, & sepium sarmenta apprehendentes, quod facilius ipse viticula, alioquin infirma, sepes scandant, quas ubi ascenderint in omnes partes reptantes se expandunt: flores à Veris exitu, usque post medium Atilatis fert parvos, foliaceos, colore pallidos, pauca intus stamina habentes, quibus singule succedunt baccæ, seu acini, mediocri Pisi quantitate, formâ rotundâ, colore primâ virides, in maturitate verò nigrae, & in exiguos racemos congestæ, tactu molles, intusque lubrico & glutinoso succo plenæ, quibus quina senave semina continentur, cannabis colore & quantitate, sed modicè acuminata, in latitudinem compressa, & candidum nucleum intra se cludentia. Radice nititur perenni, secundum ætatem grandî carnosâque, longitudine plerumque cubitum excedente, crassitudine brachiij aut tibie, longo Rapo aut Raphano simili, capite multis seu verrucis tuberoso, in profundo induas vel tres partes distracta, colore foris in candido cineracea, intus autem candida, aut Buxi modo pallida, quæ gustu amara & subacris est, cum astringitione non pauca & aliqua nauseosa qualitate abundat. Eadem lubrico & glutinoso succo & gravem odorem spirat, baccæ sive acini, radicem qualitatibus æmulantur, minus tamen siccant. Colligitur primo Vere mox prodituris asparagis. Ex radice aqua, præfecto radice capite, & excavata radice, quæ in cavum (singulis diebus matutino tempore tollenda) confluit, schiadiis utilis. Nascitur in sepibus. Plurima in VVirttembergensi Suevia atque Rhena-na provincia, in Hesse, Saxonia, VVestphalia, Pomerania, Marchia, VVirttembergensi Electoratu & Misnia abundat. Lesiores considerentan C. Bauh. Bryonia hæc nigra quæ formâ foliorum non differt ab alba, eadem sit quæ veterum ut Diosc. Plinij & Galeni, quorum verba subiicimus.

Nigra Vitis, inquit Dioscorides, quam aliqui Bryoniam nigram, alij Chironiam Vitem nominant, folia fert Hederae, ad Similacis folia propius accedentia, sed majora: caules etiam huic similes; ac ipsa quoque vicinas arbores capreolis suis amplectitur; fructus racematim coheret, qui inter principia virescit, at post maturitatem nigrescit; radix foris nigra, intus buxo colore. Hujus etiam cauliculi qui primo germinum partu exumpunt, olerum modo in cibos recipiuntur. Urinas porro eunt, merles pellunt, ac lienem minuunt, nec non & comitialibus, vertiginosis, ac nervorum resolutione tentatis profunt. Radix isdem quibus alba viribus pollet, eademque præstat, sed inefficaciùs. Folia verò cum vino exulceratis jumentorum cervicibus efficaciter illinuntur, ac luxatis etiam similiter imponuntur. Nigram Vitem inter Dioscoridis notha alij Bucranium, Romani Vvam taminiam, alij Batanutam, Bateonda alij, alij Betisalcam, Daci Priadola, alij Peregrinam, Afri Lavothen vocant.

Bryonia nigra efficacior in eodem usu (cum alba, Bryonia ad extrahendum ossi infusa) cum melle & thure, ita tradente Plinio: Suppurationes incipientes discutit, veteres maturat & purgat. Ciet menses & urinam. Eclipsa ex ea fit suspiriosis, & contra lateris dolores, vullis, ruptis. Splenem ternis obolis pota triginta diebus consumit. Illinitur eadem cum fico & perrygiis digitorum. Ex vino secundas feminarum appositione trahit: & pituitam, drachmâ pota in aqua mulla. Succus radice colligi debet ante maturitatem seminis: qui illitus per se & cum oleo, latiore quodâ colore & cutis tenentate magonizat corpora: Serpentes fugat. Tuditur radix cum pingui fico, erugatque corpora si statim bina liadia ambulet: alius urit, nisi frigida ablatur. Lucun-

*Bacca Pisi
quantitate.*

*Semina can-
nabis.*

*Radix Ra-
phani.*

Caput.

Colligitur.

Schiad.

Descriptio.

*Vitis nigra
Diosc.*

Vitis.

Vitis.

Vitis.

Vitis.

Vitis.

Vitis.

Vitis.

Vitis.

Vitis.

Vitis.

Nomina. Iucundius hoc idem præstat nigra Vitis: quoniam alba prunum affert. Est ergo & nigra, quam propriè Bryoniam vocant, alij Chironiam, alij Cynecanthen, aut Aproniam, similem priori, præterquam colore. Hujus enim nigrum esse diximus. Asparagus ejus Diocles prætulit veris asparagis in cibo urinz ciendæ, lienique minuendo. In fructibus & harundinetis maximè nascitur. Radix foris nigra, intus buxæ colore ossa infracta vel efficacius extrahit, quàm suprà dicta. Cæterum eidem peculiare est, quod jumentorum cervicibus unice medetur. Aiunt si quis villam eâ cinxerit, fugere accipitres, tutasque fieri villaticas alites. Eadem in jumento hominèque phlegma, aut sanguinem, qui se ad talos dejecerit, circumligata sanat.

Locus. Vitis nigra, quam Bryoniam propriè vocari scribit Galenus, supra dictæ ad omnia similis est, nisi quod imbecillior. Quod autem non ausimus asserere hanc Cordi Bryoniam nigram [*ἡμπελον μέλαν*], quam in Diosc. in quibusdam similem statuit cum Vite alba] eandem esse cum Vite nigra Diosc. Plinii & Galeni, facit potissimum Dioscorides suâ diversâ descriptione in forma foliorum ab alba.

De Bryonia nigra Marcellus. Bryoniam nigram inventu ratiorem tradit Marcellus, ideoque cognitu difficiliorem: inventam tamen totam veterum scriptorum historiam confirmare. Sunt illi, inquit, per intervalla cum foliis dispositi racemi: & qui non ultra octo decemve acinos ostendunt: multo minore quàm in punice magnitudine, & colore ante & post maturitatem, quo ab hoc describuntur. Quos tamen Diosc. hinc caules vocat: nos potius viticulas dixerimus: earum enim speciem magis, quàm caulium habent. Maturescunt acini ejus extrema ætate: & ubi minus calet: umbrosisque locis Autumno. Nascitur & hæc, ut in alba diximus, in sepibus & inter fruteta propinquas stirpes ascendens & alligans. Minor hæc quàm alba est: nec tam latè ut illa viticulas suas spargit. Pares utriusque vires antiqui omnes esse tradiderunt: idèque sine discrimine uti ceu alteratrâ jussunt. Licetque id in Paulo Aegineta cognoscere, qui contra nigras cicatrices utriusque ope his verbis utitur, Nigras cicatrices delet Bryonia radice alba & nigra in oleo decoctæ &c. De ejus appellationibus non est quod dicamus præter quam Chironiam vitem vocari potuisse: aut quod Chiron Medicinæ & herbarum in Thessalia peritissimus ulceribus jumentorum & hominum ex ea primus remedium invenit: aut quod Chironis ulceribus eâ veteres mederentur. Quod autem in Dioscoride legitur Vvam taminiam dici à Romanis, falsum est. Alia enim à Bryonia taminia Vva est: quemadmodum Latini antiquiores omnes docuerunt.

Tempus. Ampelon melænam, aliquos Aproniam vocare autor est Hermolaus. Hanc etiam Tannum sive Tamnum quosdam putare, & vulgò Tamarum. Esse qui Tamnum quoque scribant, non Tamnum, aut Tannum. Ruellius Vitem nigram vocat, recitans confusè Dioscoridis, Plinij & Hermolai verba, quem non nominat. Cæterum credidit Fuchsius eam stirpem esse legitimam Vitem nigram, quæ Hetrurien-sibus vulgò Vitalba dicitur, ac à nobis Clematis latifolia inscribitur. Verum hæc ejus opinio nobis cum Matthiolo, pace suâ, planè reprobata videtur. Siquidem nostra Vitalba non habet radicem foris nigram, intus buxæ colore: non fert folia Hederæ majora, sed potius minora, & per ambitum lacinias: nec semen edit in racemi modum, sed simul compactum, nullâ cum Vvis similitudine. Adde, quod eadem suâ facultate exulcerat. Vitis verò nigra exulceratis boum cervicibus medetur, & luxatis ob adstringentem vim, quam habet, utilissimè imponitur. Vitem nigram Dioscoridis, temerè nimis Matth. her-

Chironia Vitis. **Ampelon melæna.** **Tannum.** **Tamnum.** **Ruell. not.**

Clematis latifolia. **Fuchsi opinio reprobat.** **Luxata.**

Tom. II.

bariorum & officinarum Sigillum B. Maris nuncupat. *Sigillum B. Maris.*

An Corn. in Diosc. Bryonia nigra, herbaris nota, fructibus & radicis colore ab alba tantum differens: Matth. in Diosc. cum mag. fig. Bryonia fructu nigro, quem ait Dioscoridem non vidisse. Is autem Vitem nigram legitimam non exhibet, ut sequenti historia dicemus. Fallop. Bryoniam nigram ait Psilothron vocatam à Græcis, eò quod usus ipsius attenuet pilos. Cam. h. & Hort. Lusit. Bryonia baccis nigris. Lugd. Vitis nigra quoad descriptionem, non verò quoad iconem, quæ est Vitis nigræ quorundam, de qua mox. Hanc eandem iconem eodem titulo retinet Lacuna, Cam. ep. & hist. Matth. germ. & Tab. Vitis nigra quoque dicitur Arnold. Gillen. Hort. Lus. & Ryffio absque icone, qui Fuchsius & alios falli scribit, qui nigram Vitem aliam esse plantam ab alba differentem arbitrentur, cum eadem sit & colore in radice, quæ huic nigra, alteri alba, & fructu tantum differant, quem alba Vitis rubrum, nigra verò nigrum proferat & in Norico agro copiosiss. cum alba proveniat, quamvis simul nascentes nusquam repererit. Dod. gall. Bryoniam nigram à nemine adhuc in Galliis cognitam esse testatur. In hist. eam paucis (ex Cordo ni fallor) describit. Bryonia nigre radix aliquando ad nostras manus venit, ait Cæsalpinus, nautis eam pro victu circumferentibus: vocitant Panem Turcharum: est radix brachiali crassitudine amplior, sed brevis, carnosæ, colore intus subrubente, ut divisa in taleolas, sarciminis speciem gerat. hæc quamvis multò antè eruta, adventante Vere germinare capit. Quamprimum igitur eâ terræ mandavi, ut plantæ speciem addiscerem: protulit autem caulem circumvolventem se adminiculis ad multam altitudinem, & folia Hederæ mucronata, colore subrubente, vixit usque in Autunnum, frigore verò adventante penitus extincta est. ejus neque florem, neque fructum videre licuit.

Gerar. Bryonia nigra silv. qui malè malam habet iconem Tabern. Vitis nigræ secundæ, quæ est Clematis latifolia, pro Bryonia nigra. C. B. phyt. Bryonia 2. sive nigra, seu Vitis nigra Diosc. Apud Matth. Bryonia seu Vitis alba altera nigricantibus baccis, fructu nigro Matth. Eid. pin. Bryonia 2. alba baccis nigris: Vitis alba baccis nigris, Cast. Differt à vulgari radicibus, & haccarum colore: hujus radix intus buxæ colore pallet: illius ex albedo sublu-tei coloris est: hujus baccæ maturæ nigricant, illius rubent. Siquidem autem hæc colorum differentia icone exprimi non possit, ejus picturam hic studio omittimus.

ἡμπελον μέλαν Græcis, & *Βρυονία μέλαν*, & *χαρὶ-τὴν αἵμα* Latinis Vitis nigra, & Bryonia nigra, & *lingua*. Vitis Chironia nominatur; Arabib. *Fesire sent animi*, *Alfesire sim*, sive *Fas. sim*: Ger. *Schwartz Stiefwurz*: It. *Vite nera*: Gall. *Contre-vert n. ire*.

VITIS NIGRA QVIBVSDAM, sive Tamnus Plinij, folio Cyclamini.

CAP. XXII.

Radix magna, crassa, tuberosa, rotunda ferè, so-
ris nigra, intus alba, profundè in terra demer-
sa, ut non nisi altissimè adacto ligone quis facilè
consequi possit, viridis à nobis gultata, saporem a-
crem linguæ imprimebat, non tamen ingratum, aut
amarum: siccata candidissimâ substantiâ accedit
ad Dracunculi minoris radicem nullis circulis do-
nata quales apparent in Bryonia, quæ facilè in pol-
linem redigi potest, nec rara ut illa, sed compacta, in
eo accedens ad Mechoacan, ab ea etiam diversa cir-
culis, sapore quoque est non ingrato, cum aliqua

Deser.

Sapor.

Dracunculi
radice.

Folio Cy-
claminis
ferè.Cyclamin.
altera.
Sigillum,
vel Tuber
Maria.
Malacocis-
sus.

culi, racematim coherentes, ex luteo virides sive chlori: quibus racemi succedunt uvarum rubentium, aut ex rubore fuscaram.

Ruell. Cyclaminos altera Diosc. & Plinij, Herb. & offic. Sigillum Mariz; Mauritanorum Bothormarien primum [Tuber Maria] nominatum, Malacocissus Democriti. Sic & Corn. Fernel. & Dalecham-
pio. Sed falluntur. Non enim radicem, aut facultates habet Cyclamini alterius.

Matth. Vitis nigra, Hetruscis vulgò Tamaro appellata, corrupto à Tamno vocabulo. Sunt enim (inquit is) qui hanc Tamnum, sive Tamum etiam vocent, unde Latinis ejus uva taminia dicta est. Viti nigra, quæ in Italia nascitur, illud obijci posse putaverim, quodd in uvarum colore à Dioscoridis diffidere inveniatur, quodd ejus Vitis uvæ post maturitatem nigrescant, nostræ verò perpetuò rubentes spectentur. Sed hoc nihil me movet, neque facit, ut mutare debeam sententiam, & credere hanc aliam esse à Vite nigra, quod sæpè viderim naturam plerumque in florum & fructuum colore ludere. Idcirco nil mirum esse debet, si in Italia Vitis nigra rubentes uvas proferat, alibi verò nigras, ut in Græcia, Asia, aliisque calidioribus, quodd hujusmodi discrimina sæpè numero cæli, ac soli diversitate contingant. Hac igitur ratione fretus, quæ, ni fallor, illam objectionem diluit, non dubitaverim asserere, hanc plantam, esse veram ac genuinam Vitem nigram, quoniam cæteræ omnes prorsus notæ illi ad stipulari deprehenduntur. Hæc ille, qui plantæ capreolos appingit, qualem observare nunquam potui. Amplectitur quidem proxima, sed non per capreolos: Racemi etiam in prioribus comm. malè exprimuntur: Radix quoque non tenuis, sed crassa, quam non observavit Matthiolus. Plantam præterea non describit, sed fictam tantum iconem proponit. Quare meritò in comm. cum magn. fig. eam mutavit, pingens melius uvam & radicem, licet capreolos reliquerit. Radicem ita longam, qualis est in postrema ejus iconem, ac etiam apud Dod. & Lob. ac in nostra, ad imitationem illorum facta, non observavi, sed pænè rotundam & tuberosam. Meliorem Cam. in epit. & hist. sub Vite nigra exhibuit figuram. Quis autem quæso plantam hanc eandem dixerit, cum Vite sive Bryonia nigra Dioscorideæ: folia huic non sunt angulosa, qualia esse solent albæ: fructus non niger: caret capreolis, quicquid Matth. ex descriptione Dioscoridis pingat: plurimum denique in figura foliorum ut in cæteris differt, cum tamen è contrario Gal. per omnia similem dicat. Tandem radix odore & sapore differt, quæ di-

Matth. f-
gura falsaIc. nostra
ex Lob. &
Dod. non
placet.
Matth. op-
mo refuta-
tur.

acrimonia, plures viticulas emittit quæ proximis quibusque se circumvolvètes in altum nituntur, nullis claviculis donatæ: folia alternatim longissimis pediculis hærent, Cyclamini foliorum ferè formâ, sæpè tamen acutiora & duplo triplòve majora, infra supràque lato virore splendètia, tenera, multis nervis sinuatis prædita, gustus viscidum. Flores inde oriuntur unde foliorum pedi-

versam vim ostendunt. Fallitur præterea Matthiolus hujus racemos uvam taminiam Latinos dixisse. Hæc siquidè Staphisagria est, autore Dalechampio.

Dod. Vitis sylvestris [seel nostre Dame] Bryonia ^{Vitis filv.} species, non autem Labrusca. Quod admonere voluit, ne quis cum Avicenna, Serapione aliisque Medicis Arabibus, falsò putet eandem esse Labruscam & Vitem sylvestrem. In quo & Plinium (in hist.) particulatim notat, ut cui utriusque ^{Bryonia speciei.} occasionem præbuerit, ut satis de his se explicare non potuerit, & l. 23. c. 1. utramque inter se confuderit. Hanc præterea ait Columellam & Latinos Tamum appellare, fructumque ejus uvam tamineam. Vvam autem tamineam, etiam Staphisagriam esse, sed hanc falsò ita nuncupatam Plinium confirmare, qui & Salicistrum vocet. Non esse refellendam eorum sententiam ducit, qui Cyclaminum alteram hæc esse velint, ^{Tamus Columella.} vel solam enim radice magnitudinem facillè hos redarguere. Cyclamini siquidem radix, quodd nullius usus [dixit] ac exigua sit, hujus autem magna & multi usus. Cum eo magis ipsi videretur agendum, qui <sup>Cyclaminus non abera-
nus est.</sup> <sup>Bryonia ni-
gra non est.</sup> nisi repertâ, & ab eo conspectâ legitimâ Bryoniâ nigrâ, sententiam mutaturum speraret. Sed tamen quid vetat & in hujus errorem animadvertere, & Tamum nò esse Bryoniam nigram docere? Caret capreolis Tamus; fructum non nigrum, sed pulchrè rubentem gignit. Bryonia verò nigra capreolos habet instar Vitis, & acinos profert nigras. Ostendunt hæc differentiam satis evidentem. Describit autem is Vitem sylvestrem, quodd longos, lignosos, mediocri crassitudinis, rimosi corticis, instar sarmentorum Vitis obscurè subrubentes promat coliculos; capreolis sive viticulis careat: flores candidos, muscosos odoratosque; proferat. Sed patet eum Vitem suam silv. ex libris, & non ad plantam, quod ei sæpius evenit, describere: verè quidem dixit adversus Matth. capreolis carere: reliquæ verò notæ non reperiuntur in sua Vite sylv. vel Tamo.

Vitem nigram silv. Ollingeri (si modo est eadem quæ Tanus Plinij, inquit Gesl. quâ Matthiolus pingit, quavis radicè non probè, fructu verò omittit: & capreolos addit, descriptione Dioscoridis in hoc, nò naturâ secutus.) ego cū capreolis nūquā vidi, sed viticulis tantum suis flagellisque se circumvolventem. Aut igitur Dioscorides lapsus fuerit ^{Matth. præb.} in hac planta nominando, aut nò propriâ significatione usus: aut Vitis nigra Dioscoridis hæc non erit. Accedit quodd fructu ejus primò viridè, in maturitate nigrum facit: cū Tani acini post viriditatem semper rubeant. Item quodd Dioscorides minùs efficacè hujus Vitis radicè facit, quæ albè: cū Tani radix exulceret, quæ meo periculo didici: Vitis albè non itè, aut non adeò. Interim hanc Vitem nigrâ esse non negabo, aut proximâ ei speciem: quoniâ non invenio aliâ quæ propius ad descriptionem accedat. Eid. Gesl. h. Malacocissus Democriti videtur Vitis nigra, quâ Ruellius Cyclaminum alterâ existimat, aut nò longè dissimilè. Eadem habet etiam in cat. pl. ubi præterea (sparsum tamen) Cyclaminum alterum, Tamum & Tannum, ac Vitem nigram appellat. Non placet autem quodd aliquando dixerit Tamum habere baccas nigras, maximè cum postea ex autopsia tales negaverit. ^{Tani radice exulcerat.}

Lob. adv. Vitis, vel Bryonia nigra, Sigillum Mariæ, an Cyclaminos altera: Obs. Vitis, sive Bryon silv. (ita & ic.) Tamus & Bryonia sylv. Dod. quem ait meritò, vulgatum Sigillum Salomonis [Maria lege] sive Bryoniam nigram, sylvestrem Bryoniam, Tamumve statuisse. Item alibi, Cyclaminos altera, Bryonia nigra quorundam. Lugd. Vitis nigra Matthioli, qui falsam ejusdem figuram retinet, quam etiam Tab. sub Vite nigrâ albâ primâ proponit, quem & Ger. imitatur, Bryoniam nigram appellas. ^{Lugd. Tab. & Ger. not.}

Schvv.

Schry. securè nimis pronunciat Sigillum B. Matris esse Cyclaminum alteram & Bryoniam nigram.

C. Bauh.

C. B. phyt. Bryonia 4. sive silvestris: Eid. apud Matth. Bryonia silvestris. Non autem convenit (quod fratri placet) descriptio Dioscoridis. Velim etiam ab ipso annotatum, ubi nigrescentibus baccis, ut ipse prodidit, repererit? Tandem quæ Theoph. l. 9. hist. c. 14. & 22. de Vite silv. scripsit, plantæ de qua accipitur, non quadant. Eid. B. pin. Bryonia 4. l. x. vis, sive nigra racemosa: Vitis nigra Matth. Ang. Lac. & Cast. Tamarum vulgo, Cæf. Vitis silv. Diosc. & Theophr. quibusdam. Sed florem capillaceum, muscosumque ei tribuit Diosc. qui in nostra non observatur. Aliis Cyclaminus cyllanthemos Diosc. Aliis Vva tamunia Plinij: aliis ejusdem Saltastrum, quod potius Amara dulci convenit. Baccæ maturæ aliquando rufescent, aliquando nigrescent.

Locum

Tempus.

Provenit à me plantata in horto E. C. collecta ex vicinis locis urbi Montbelgardensi, ut in colle versus Arbonam eundo ad planitiem in dumentis: item propè la Chau Vitium monte. Genevæ florentem observavi mense Maio in colle l'Abbatie. Frater C. B. in Hünningen collegit. Tigit in sylvis sponte provenit, ut & Porentrui cum baccis perfectis Augusto. Radicem valde profundè agit. Vitis nigra Matthioli frequenissima in Hetrutia provenit, quin & in Goritienfi comitatu, ubi Martio & Aprili mensibus ejus cauliculi pronascuntur.

Vitis

ejus

Tamari viticulas, quæ Vere primum erumpunt, quoddam Asparagis similes sint, eorum more decoctas, suam etiam tepestate madi Matthiolus prodit, quamvis non eam, quam Asparagi, cum palato inest gratiam. Ast comedat Matth. suos Asparagos, ejus ego

Matth. non

recipitur.

authoritati non confido, nec securè tum posse existimo. Comperitum est (inquit Lob. adv.) vel mulierculis, vehementissimè urinam, renumque sabulum & mensium saburram, impellere potu: verum venenit tantopere incantivam esse, non perinde assentiuntur quidam Commentatori quin potius experi

Vn aper-

tione.

ei eidem, conviciantur; conqueisti lumbos enervare, sanguinem, renemque, in flammam, plurisque esse sibi unam aut alteram Cynaram, quam incertam & periculosam suam Bryoniam: quam si propter calorem, venerem accendere vult, haberet sibi uni, aut

Matth. re-

prehendi-

tur.

Flammula vesceretur, ad sui Satyrii erithronij vires enerves supplendas. Planta à Matthiolo pro Bryonia nigra exhibitæ, legitima Turneri judicio non est;

S. aspidium

erithronij

Tempera-

mentum

tum quoddam hæc planta manifestè cum sit frigida, non eas habet facultates, quæ Bryonix nigra tribuunt Dioscorides, Galenus, & Mesuarius; affirmant enim earundem esse virium cum Bryonia alba. ac illa Matthioli tam valida non est. Mesuarius Bryonia alba, calida & sicca est in tertio recessu. Nigram manifestè

calidam statuit etiam, ubi ait non aded esse calidam ac albam, additque utriusque radicem frigidis conferre morbis &c. Iam verò utrum planta frigida, qualem

scio certò Matthioli illam esse, ejusmodi possit morbos persanare, doctis dijudicandum relinquo, & an frigida sit necne, periculo facto circa Solstitium æstivum, docebit sapor. Antè diximus ex Gesnero radi-

cem exulcerare, quod tamen nobis non constat, ex gustu sanè acrem comperimus: dubitamus etiam an

q. dicit Dod. radices sint calidæ & sicca ordine tertio: addit fructus ad similes facultate, attamen mi-

tiore utramque abstergere & digerere: Quod Galenus scribit de asparagis Bryonix ab omnibus pro-

more per Veredi, de Vite silv. sive Tamò, nequaquam de Bryonia alba veritatem habere: esse qui

asserant in Hispania Bætica in cibaria recipi: Dici à porcis hujus radices quæpi, dunt, ac cum voluptate

mandi, neque minus esse gratas quam Cyclamini orbicularis quæ inde Panis porconi nomen indeptæ

sint: Sed temerarium fore idcirco Tamuin Cyclamini

Tom. II.

mini speciem asserere, quoddam ejus radices porcino generi gratæ sint.

BRYONIA LÆVIS, SIVE NIGRA baccifera, C. Bauhini.

Radicem habet magnam, crassam, longam, succo glutinoso plenam; caules verò samentorum Vitis instar lōgos, lignosos, angulosos, quibus se, (licet capreolis careat) crebris circumvolutionibus vicinis fruticibus circumvoluit; folia hederacea, Smilacis lævis similia, magis tamen sinuata, tenuia, splendentia, & nervosa, longissimis pediculis donata: flores albi sunt, muscosi: ad cujuslibet folij exortum, in viticulis maximè superioribus, pedicellus brevis ex caule exurgit, qui baccam unicam ceraso minorem, virentem primum, ac per maturitatem rubetam, sustinet: cui semina satis magna, rotunda, nigraque, quaternæ, quinæve includuntur. Provenit in sylvis circa pagum Hünningen, Junio florens: at baccæ Septembris sine maturæ sunt.

Hæc à communi Bryonia sylvestri, quæ Tarnus dicitur, potissimum in his differt, quoddam communis florem minorem habeat, racemosa sit: hæc verò flore sit majore & baccifera. Hæc C. Bauh.

Est autem in prodiphi Bryonia 2. sylvestris baccifera: Eid. pin. Bryonia 5. lævis, sive nigra baccifera.

MECHOACAN. CAP. XXIII.



T Alex sunt ra- Difer.

dicis brachialis crassitudinis p transversum secte, cortice rugoso testæ, ex fusco cinereæ, cæteroqui cinereæ, per quas vix ulla apparet fibra, substantiâ molliuscullâ, sapore subdulci cum obscura quadam acrimonia, nauseam movete mastificando, circulos habet ut Bryonia, verum ab ea differt, quoddam compacta sit & non fungosa, nec sapore acri, amaro & viro-

so, qualis illa. Porentrui à Pharmacopæo nobis data Mechoaca tota fusca nescio unde, sapore nonnihil acri in qua circuli valde manifesti: altera radix secundum longitudinem secta externè rugosa cinerea, internè albicans.

Mechoacan Monardes duplex tradit, & tertium Mechoacan genus sylvestrius. De primæ verò Mechoacan ann. 1560. primum in provincia Mechoacan dicta, radices reperta planta hæc scribit. Video stirpem in magno vase terrâ pleno repositam Hispani in monasterio Franciscanorum, multis ramis supra terram expantis luxuriantem, colore fusco ad cinereum tendente, qui vicinas perticas aut pergulas (si adponantur) scandere, & multiplici nexu amplecti possint: foliis circinate, ferè rotunditatis in mucronem tamen desinentibus, nonnunquam admodum amplis, atro-virentibus, fibrosis, perennibus, aded verò delictus, ut humiditate cavere videantur: fructu, ut perhibent, Fructu Coriandri sicci magnitudine, racematum cohærente.

Radice
Bryonia.

Radice crassa, Vitis alba seu Bryoniae modò insipida, & sine acrimonia, quæ advehitur magnis & parvis fragmentis, partim in taleas concisis, partim manu contractis. Non defuerunt autem, qui huius radicem, cui Rhabarbari Indici & Mechoacani nomen inditum, eandem cum Bryoniae radice (quod huius modo crassa sit) esse putarunt, aut saltém ei congenerem; sed multum differunt. nam Bryoniae radix, cum viridis, tum sicca, admodum acris est: Mechoacan verò insipida & sine acrimonia.

Mechoaca
ex Continen-
ti.

Ceterum nunc ex Continenti advehitur Mechoacan, natum circa Nicaragua & in Quito (ubi diligenter colitur & magno in usu est, ob eius mirabiles effectus) longè præstantius eo quod ex nova Hispania adferri consuevit: cuius flos, semen, & ramuli etiam allati sunt. Erat verò is flos quasi Mali autem, quinque foliis constans maioribus, subsusci coloris, & cuius umbilico protuberat calyx sive vesicula quædam avellanæ magnitudine, membranâ constans tenui, albicante, quæ in duas cellulas tenuissimâ pelliculâ secretis dividitur, & in singulis bina grana, ciceris exigui magnitudine, colore per maturitatem nigro, gustu insipido continebantur.

Mechoacan
genus silv.

Mittit promontorium D. Helenæ, quod in eodem quo Nicaragua tractu est, aliud Mechoacan genus silvestrius quod simile est alteri cum folio, tum sarmentis, tum radice, sed per omnia minoribus: & ipsa etiam radix acrimonia non nihil habet. Scammonea autem hoc genus nuncupatur propter rationem inter vires adducendam. Hactenus Monardes, qui rursus de Ind. Occid. lib. 1. cap. 22. ait Mechoacan dici Rhabarbarum Indici, Rhabarb. novæ Hispaniæ, Rhabarb. ex Mechoaca: quosdam voluisse Vitæ albam esse, verum multum differre. Quam in re huic subscribit Lob. (cui dicitur Peruviana Mechoaca, Mechoacæ provinciæ planta Bryoniae similis. In obs. autem solum radix exprimitur; in l. verò folia, Bryoniae silvestris similia adduntur, ipsum denique florem pingit ex Monarde) Lugd. Car. Steph. in domo rust. germ. lib. 2. c. 76. cum Aegid. Everardo post. com. de Panacea herba sive Tabaco. Putat autem is maiorem cum Vite nigra affinitatem habere, aut cum Turbith, saltém quoad facultates. Inferius ex Monarde patebit, cur idem Scammoneum quoddam esse Americum cum Dodon. tradat, qui & Scammoneij speciem non temerè credit, etiamque Nil Americanum esse posse concedit, ac cum Carol. Steph. in domo rustica germ. Convolvuli speciem facit.

Turbith.

Scammoneum Ame-
ricum.Nil Ameri-
canum.

Convolvuli.

Genera duo
Clas.Semen ni-
gro.Semen
ruffo.

Tabac.

Missa sunt Clasio ex Hispaniis duo seminis Mechoacan genera: unum brevi calyculo sive siliquâ, semineque nigro, quale est Scammoneij, aut Convolvuli majoris: Alterum oblongiore aliquantum calyculo, & semine ruffo, & quàm superius longiorè teneriorèque: utriusque siliqua parte interiore lanuginosa est. Ex utriusque semine nata plantæ (quas hyemis iniuria sustulit) prodibant Scammoneij, aut Convolvuli modò, deinde multis sarmentis proxima pedamenta scandebant & amplectebantur: foliis Convolvuli majoris, sed tenerioribus, & colore magis fulvescente: radix pollicarem, vel maiorem crassitiem jam erat adepta.

Tab. duas ponit figuras, quarum prior inscribitur, Mechoaca i. Bryonia Peruviana, Indianis *Sannrâben* / *Mechoacan*; posterior, Mechoaca 2. Ponit autem priorem pro Mechoaca Monardis, appingens flores & capreolos, cum tamen capreolorum nullam hactenus invenerim mentionem factam à quoquam, nec ipse dicat, ubi, vel apud quem viderit: non ostendit quare re differat à secunda quàm Lobelio attribuit, cuius figure similem ponit sine capreolis. Dodonæus etiam nullos habet capreolos. Nos studio omittimus flores & capreolos, ne lente ponere minus incertum pro certo.

Lug. Mechoacæ tres habet figuras, uni titulus Mechoacan Penæ: alteri Mechoacan Dodonæi: tertiz Mechoacan Monardi. B. phy. Bryonia 5. Mechoacana, seu Mechoacan duplex: 1. ex Mechoaca novæ Hispaniæ insula; 2. ex Contiente circa Nicaragua, præstantior. Item Bryonia 6. sive Mechoacana sylvestris. Eid. pin. Bryonia 6. Mechoacana alba. Item Bryonia 8. Mechoacana sylvestris.

Locus ex hactenus dictis manifestè satis declaratus est. Nunc quod superest, fructus prioris Mechoacæ Monardis Septembri maturefcit: radix colligitur Octobri: semina alterius, molli & spongiosa terrâ excepta, commodè nascuntur.

Mechoaca calida est primo gradu, sicca secundo: tenuium autem esse partium, non nihil tamen adstrictionis possidere, ex eo patet, quod absolutâ purgatione, internarum partium robori nihil adimit, nec eas debilitat, ut reliqua purgantia medicamentum illa purgati, robustiores redduntur, quàm ante sumptum medicamentum erant. Hinc fit, ut nullâ correctione indigeat: solum vinum est ejus vehiculum, cum quo sumpta, facilius & efficacius operatur, quàm cum alio quovis liquore, nec vomitione rejicitur. Deligitur autem à Monarde recens, albicans, exteriore parte non nihil flavescens: improbat candida, nigra, cariola. Ab Aegid. Everardo (à quo domestica nominatur) præfertur recens, alba, compactior & solidior, gravisque aliquantum, non perforata: rejicitur leucophæa, aut subnigra, quàm ad purgandum imbecillem, ut silvestrem esse tradit, præsertim si linguam pungat. Hinc ineptè faciunt (pergit Monardes) qui illam in pulverem comminutam adservant, quoniam faciliè exhalet, & ejus vis infringatur. Ex radice fit conserva varij generis, Cy-

doniorum modo, sed etiam Gelatina ex saccharo & illius succo, quæ in deliciis esse possunt: nam ut radix est insipida, faciliè saccharum recipit, quocunque tandem modo paretur. Molesta non est hujus radicis sumptio, quia nullius mali saporis est particeps, idèoque omni tempore, omnique ætati, pueris, senibus, aliisque qui cetera medicamenta respuunt, utilis est, cum benignè & sine molestia purget. Cras-

fos, viscidos, putridosque humores, utramque bilem & aquas educit: lecoris, ventriculi, lienis morbos tollit, & earundem partium obstructions aperit, idèoque ægitudinibus inde provenientibus, hydropi, ictero utilis: inveteratos capitis dolores curat, cerebrum & nervos expurgat, cephalæ, epilepsie, strumis, articulorum, colicæ, & renum doloribus opitulatur: veteres defluxiones sistit: uteri morbis, qui plerumque ex frigidis humoribus aut stantibus generantur, tussi veteri, asthmæ, & reliquis pectoris vitis, antiquis febribus, & huc venerè vexatis

convenit, repetito, quoties opus fuerit, ejus usu. Nam in similibus obstinatis & inveteratis morbis, necessariae sunt plures evacuationes, ad penitus revellendum & expellendum humores qui tales morbos generant: itaque nihil mirum, si unicâ purgatione, ægri optatam sanitatem non consequantur. Hujus autem radicis sumendæ ratio talis est. Purgato prius corpore serapiis, clysteribus, aut sanguinis missione, & dictâ, pro medici judicio, sektionis hujus radicis leviter contusa pulvis vino albo maceratus, aut aquâ fœniculi, anisi, aut cinnamomi (si quis vinum non fert; quod etiam commodè dilui poterit, si quis dilutur cupit, stillatio in mybi, buglossi, vel scariolæ liquore) summo manè propinatur, dimidiæ drachmæ pondere pueris; unius drachmæ juvenibus & adultis: duarum verò drachmarum viris & mulieribus. Nec imprudenter datur ex syrupi rosati novem infusionum duabus uncis: aut violarum serapio, conservæ miscetur: & sapidis ex jusculo sumitur. Dimidiâ post sumptum hoc medica-

mentum

Lugd. nat.

Locus & Tempus.

Temperamentum.

Delectum

Asservatio

Conserva

Firma

Locus & Tempus.

Pulvis

Dosis.

mentum horâ somnus conceditur, iis præsertim qui vomitibus obnoxij sunt, sed brevis: nam purgari incipienti, nec somnus, nec cibus, nec potus convenit. Si verò qui hunc pulverem, vel aliud quodvis laxans medicamentum sumpserit, sibi à vomitu metuit, utatur eo quod sæpius expertus sum remedio, videlicet, ilicò à sumpto medicamento, albumen ovi assum & adhuc calidum digitisque attritum lineo panno raro involvat, & in nodum colliget, quem gutturis orificio imponet, & istuc retinebit, donec medicamentum laxare incipiat; etenim non modò vomitum prohibebit, sed etiam fumos & vapores à medicamento sublevatos reprimet. Factâ purgatione datur jusculum, & paulò post cibus, qualis his dari solet qui sese purgant. Peracto prandio neque somno indulgeat, neque bibat ante cœnam, quæ levis erit, & rerum boni succi. Postridie eluat corpus medicamento aliquo, & conservâ quapiam utatur, deinceps in victu & reliquis rebus necessariis sese gerat, ut decet. Fiunt nonnunquam ex eodem pulvere excepto electuario rosato Mesue Catapotia Coriandri sicci magnitudine ut facilius dissolvantur & citius opus suum peragant. In manu autem est Medici, aut ejus qui sumpserit, eam humoris quantitatem purgare quam volet, quoniam sumpto pauxillo jusculo aut aliâ re, ejus operatio ilicò cessat. Negat Io. Fragosus Regis Catholici Medicus, jusculo aut alio cibo injecto Mechoacan vim purgativam sisti aut infringi, & quotidianâ experientiâ id se observasse ait, eandemque nostri auctoris in Pimpinichi opinionem reprobat. Mittit Monardi promontorium D. Helens, quod in eodem quo Nicaragua tractatu est, aliud Mechoacan genus silvestrius, quod gravia symptomata excitat, ut vomitus immodicos, tormina, & alvi profluvia, quam ob causam Scammonea nûcupatur: sed nemo (periculo semel facto) utitur. Mechoacan agrestis gustu acedinem præ se fert, & domestica nigrior est vehementiusque & cum molestia purgat: quare magis noxia, autore Everardo.

BRYONIA MECOACANA nigricans.

Radice est Mechoacæ similis, sed cortice nigricante vestita, interius rufescente, quæ tessulatim incisa rotunda, magnitudine & figura calculo alicuius respondens, ex India Chelapæ sive Celapæ nomine ante annos undecim allata fuit. Ab Alexandrinis & Massiliensibus, Ialapium vel Gelapo vocatur: & à Massiliensibus, Mechoaca nigra, vel mas estimatur.

Gustu est non ingrato, & gummoso, & ob copiosam gummositatem, si carbonibus, vel igni admoveatur, flammam concipit. Facultate, vulgarem sive albam Mechoacam superat: nam ob gummi copiosum, fortius humores serosos purgat, cum imi venteris levi dolore, & præcipuè viscera, hepar & ventriculum roborat. Quare drachmæ unius pondere exhibetur tutò, & sine fastidio opus suum exequitur. Sunt qui ea in dosi, cum aqua Cichoreæ, aut simili stillatitia, seu jure actu frigidis, tribus horis ante prandium, ægrotis propinent.

Ex Bauhini prodromo, ubi eam sub Bryonia 3. Mechoacana nigricante exhibet. In pin. facit Bryoniam 7. Mechoacanam nigricantem.

RADIX QVIMBAYA. CAP. XXIV.

Meminit apud Clus. Petrus Cieça part. 1. Peruanæ hist. in Provincia Quimbaya, cufus metropolis Carthago, nasci tenues quasdam radices digiu

crassitudine inter arbores, quarum si fragmentum brachiali longitudine duobus aquæ sextariis per noctem maceretur in vase aliquo, majorem aquæ partem eâ nocte absumi. Ex ea quæ superest aqua, qui tres uncias sumpserit, ad eò benignè purgatur, & sine molestia, ut si Rhubarbaro purgatus esset. Cujus rei aliquoties periculum fecit magno illorum, qui sumpserunt, commodo.

Lugd. Petri Cieça radix Quimbaya. G.B. Radix Quimbaya: meminit etiâ Fragosus, sed succinotius.

BEXVGO DEL PERU. CAP. XXV.

Plantis illis quæ ex utriusque Mechoacan generis semine Scammonij aut Convolvuli modo prodibant forsitan similes erant, quæ ad Clusium Diepâ mittebat doctissimus vir Godofredus le Brû, Medicus Regius, Bexugo, del Peru appellatione, quarum drachmam sumptam, purgandi vim habere scribebat, præferrique Mechoacan & nucibus Indicis purgativis. Erant verò illæ, sarmenta verius, quam radices, longa, & qualis ferè ubique crassitudinis, digitalis videlicet, nonnulla etiam minora, lenta, & funiculorum, sive Athragenæ sarmentorum instar nonnihil contorta, cortice cineraceo obducta, valde nervosa internè, lentè gustûs initio, deinde nonnihil acris & salivam cientis, denique guttur & fauces urentis, breviter ad Athragenæ sarmenta proximè accedentia, ut quodammodo mihi persi videam Athragenes fuisse sarmenta illis in locis nascentis.

B. pin. Clematis & Peruviana.

RADIX PURGATIVA INDICA Matalista. CAP. XXVI.

Illustr. Princip. Frid. Duci VVirttembergico missa fuit hæc radix, nomine radice purgativæ Indicæ Matalista, quæ fibrosa erat, repræsentabatque quodammodo segmenta Helenij, fusca, rugosa, internè nonnihil flavescens & albicans, nullo sapore manifestò, nisi quidd diu masticata, acrimoniam quandam habebat. Hæc autem erant adscripta: Assumpta pondere 3.ij. pulverisatarum in aqua cordiali stomacho jejuno manè, refrigerat, valet in febribus cholericis & ardentibus. Syrupus ex hac radice paratus ex unc. iij. in lib. i. aquæ decoctis cum Sacchari pondere 3.ij. refrigerat, mundificat sanguinem. Sed quis non intelligit sacchari dosin nimis parvam esse. Syrupi dosis etiam erat adscribenda.

LVPVLVS MAS ET FOEMINA. CAP. XXVII.

LUPULUS MAS.



Nadèdras Lupulus, per le infirmus, facile ridicas, aut proxima adminicula, quæ arripuit, conscendit, non ille quidem capreolorum, quos nullos habet, ope, sed tortilibus, asperis, angulosis purpurascetibus & cœcavis sarmentis tenaci pedamentorum complexu in altum subnitens, ceterò qui humo se t allere vix potest, folia & geniculis bina, adersa, pediculis palmatis, asperis, ru-

Folium
Lupuli.

LUPULUS FEMINA.



bentibus adnexa, aspera, modò Mott folia imitata, integra, in mucronem abeunt, modò trifariam divisa totidem mucrones ostentant, tum hinc, tum illic per ambitum serrata: flores ex foliorum alis racemosi, cannabacei, colore herbidopalescentes, ex foliolis & totidem staminibus componuntur, qui in alis nullo sequente fructu evanescent, aliis squamis compactiles fructus semen continent rufum, amarum.

Lupuli
genera.

Lupulum dividunt aliqui (ut Trag. Lob. & Cam. ep.) in sativum & spontè proveniente, sive sylvestrem, facie non differentem, præterquam magnitudine & exilitate: nam sylvestrem aiunt florum conos minores, rariores, paucioresque habere.

Lupuli
species.

Alij distinguunt in marem & feminam. Mas (ait Cam. ep.) folliculos edit; femina flosculos. Non desunt qui marem appellant Lupulum, qui steriles habet flores; & feminam cui folliculares fructus; folia (addit C. Bauh.) circa radicem sine incisuris, serrata tantum, rotundiora, flosculi subpallidi, sine fructu pereuntes in pollinem luteum. Illud mirum eum qui floret non ferre semen [fructum C. Bauh.] & qui semen [fructum C. B.] non florem.

Lupuli
salicariae.
Bryonia.
Vitis
Septentrionalis.

Lupulum salicarium spontaneum in Græcia ætiænum hodie vernaculè *Γραϊν* vocari audit Lobelius: Sativum verò, Vitis Septentrionalium inscribit de qua dicit. Munificæ Phronæa misera algidiore regiones, eis largita est hanc quasi Vitem alteram, quæ quasi vitæ quæpiam suas portiones animarent, & salubriores efficerent. Quare sedulo coluerunt hæc vulgò Vitem, depactamque; è sylvestri urbanam fecerunt, jam tot locis, ut etiam tractus patientissimos vinearum superent, depactis multis pedamentis & radicis, quæ tenella clavicula & capreolos fulcrant atque mutant: hæc autem fulera, quia saligna ut plurimum sunt, idè fortè Salicarium vocarunt Lupulum: solo humentiore, lætore, pinguiore, radicem fibras inserit hodie Germania, superior præsertim, atque Fladria, Anglia & Northmania, unde uno aut altero anno se porrigunt vitæ propagines multis anfractibus prolixæ, post amplexantes obvia quæque arborum & arbutorum, lucosque efficiunt fornicatâ pulchritudine visendos: quippe lætior multò tota planta cõlta evadit, florumque thyrsis foliaceis & squammosis adulationibus, semine etiam multò majore. Vindemiæ tempore uvæ decerpuntur, & in saccos coguntur ad Bieræ sive Cerevisiæ confectionem.

Volubilis.

Volubilis, ut postea dicetur, plura habentur genera, quorum unum illud est, quod Lupulum appellant. Hujus etiã apud Medicos hac ætate frequentissimus sit usus; nihil tamen, quod Matth. equidem invenerit, Galenus, & Dioscorides, aliique veteres tam Græci, quàm Latini auctores, posteritatis memoria prædiderunt, quæquam non desint, qui venetum hunc Plinio esse Lupulum salicarium, ab eo tantum demine demonstratum lib. 21. c. 15. atque ibi inter eas herbas connumeratum, quæ spontè nascun-

Lupuli
salicariae.

tur, quibusque pleraque gentium utuntur in cibis.

Lupuli vocati latius meminit Mesues inter sua dejectoria facultatis medicamenta, ubi hæc ad sensum habet. Est & aliud [quartum Sylvius] Volubilis genus, quod Lupulus appellatur, folia habens aspera, Cucumeris modo: flores exhibus folliculis squammatim compactos, racematimque dependentes, colore subcinereo. Hanc plantam, inquit Tragus, Mes. c. 24. in simpl. Volubilem tertiam nominat, Barbarus credit Lupulum salicarium Plinij, & Græcorum *Βρυον*, quasi ad Bryoniam aliquo pacto pertineat dictum. Manardus Lupulum, Lupum reptitium. Tolophiam, Volubilem magnam & mediam, Habiolam, Habillam, & Brusculam vocari tradit l. 5. epist. Quorum sanè omnium sententiæ, ut non multum ab invicem distant, ita maxime mihi probantur. Sed cum iis convenire non possum qui Lupulum Corrudam interpretantur, cum Asparagus Corruda dicatur Theophr. l. 6. c. 3. Ceterum ut quid mihi de Lupulo videatur, explicem, existimo Lupulum eam esse apud Dioscoridem plantam, quæ illi *σμίλαξ πικρία*, h. e. Smilax aspera dicitur. Idem Tragus ait, quæ de Smilace aspera sua Plinius tradit, ea efficacius & certius præstare Lupuli florem odoratum (qui in Petro de Crescentiis Levertigo dicitur) se credere, idèoque Lupulum Smilacis asperæ genus esse se firmiter tenere. Sed ejus sententiæ, Cornario teste, tota Dioscorici Plinij descriptio repugnat, & in primis fructus racemosus.

Matth. Trag. Brunf. Turn. Dod. hist. Tab. Clus. hist. Cam. ep. Cast. Lug. Clus. & Cast. Lupulus. Lac. Fuch. Gesn. h. & coll. Lon. (qui & Humulum vocari scribit) Dod. gall. Lob. obs. Lupus salicarius. Lob. ic. Lupus salicarius (spontaneus sive Lupulus, & Vitis Septentrionalium. Schvv. Lupulus spontaneus mas, Lupulus sylvestris, Lupus salicarius, Wilder Hopffen/ Korn Hopffen: Item, Lupulus spontaneus sterilis. Lupus sylvestris femina, Wilder semel Hopffen: folio rotundiore, nec tam profundis, ut mas, incisuris dissecto, & juxta radicem potissimum sine incisuris. Eid. l. 2. Lupulus mas, & *Βρυον*, Lupus salicarius sativus, Lob. Humulus lætior majoribus capitulis & semine copiosiore.

C. B. ph. & apud Matth. Lupulus mas & femina. Eid. pin. Lupulus 1. mas: Lupulus sativus & sylv. Trag. Lon. Cast. Lugd. Item, Lupulus 2. femina, ut & Cam. ep. & h.

Lupum salicarium, sive Lupulum Fuchsius à Bryonia Græcis recentioribus Bryon vocari refert, & à vulgo Humulum: ab aliquot Italæ ruribus ad græcam appellationem alludentibus Brusculam, quasi Bryon scanfile nominari. Bryon quidem à Bryonia similitudine hand dubiè dictum: Lupum verò salicarium, quia subeat, scandatque Salices & arbuta omnia circumvolvendo sit appellatum: & hinc quoque Lupum reptitium nonnullis nuncupatum. Hæc ille. Quo verò auctore; Fuchsius Græcis *Βρυον* appellari asserat, nondum reperire licuit. *Βρυον* Muscus est. Dicitur & Caucahis *Βρυον* à Democrito, ut Orbasius testis est.

Lupulus Officinæ passim vocant: plerique Lupum, vel Lupulum salicarium: Germ. Hopffen; Belg. Hoppe & Hoppecruyt; Gall. Du Houblon. It. Lupolo, Brusculola: Hisp. H. mbrezillus: Angl. Hoppe: Boh. Chincl: Hung. Kon. lo.

In sepibus passim abundat ac ad dùmata & margines pratorum humentium luxuriat. Vitis instar colitur à Germ. Septentrionalibus capitulis & semine copiosiore. Capitula Augusto & Septembri colliguntur & coguntur in saccos.

Vires, temperamentum & usus.

Volubilis quarta Mesues Lupulus temperatus vel potius frigidus principio ordinis primi. Sanguinem

Volubilis 4.
genus Mesues.

Volubilis 3.
Mesues.

Bryon.

Tolophia.
Habiol.
Habilan.

Corruda.

Smilax aspera
Diosc.

Levertigo.

Synon.

Lupulus.

Lupus salicarius.

Humulus.

Bruscul.

Smil.

Bryon.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Lupus salicarius.

Sanguinem purgat. nem bile flavâ modicè purgat, eumque clarum reddit, & sedato ejus calore temperat, præsertim sero lactis infusa: iterum syrupus ex eo sanat, febribusque biliosis & sanguineis prodest. Ipsa quoque & succus ejus cum hordei polenta cephalalgiam calidam sanat, & ventriculi, ac hepatis intemperiem calidam. Cumque sit tam efficax medicamentum, mirari subit, cur à nostræ tempestatis medicis in usu tam rarò habeatur.

Cerevisia incoquitur. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.

Turiones. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.

Obstructiones. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.

Rennum. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.

Matris. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.

In aceteria. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.

Decoctionum. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.

Lumbrici. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.


Alopecia. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.

Defic. Qui cervisiam coquunt, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarè bona conficitur cervisia. Flores tamen cerevisiæ largiùs incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quàm utilissimus. Proinde tam flores quàm radices ejus temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes verd ac verni Lupuli turiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epæ & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed flores Lupuli vino decoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter mejendum, calculum vesicæ sentiunt. Turiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exiccat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venena, scabiem, lueem gallicam, & cæteros affectus, qui cutim extimam inficiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbricos ventris necat, urinas provocat & menstrua educit. Vulgus & vetulæ Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam factitare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertie partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam pallas Vvas à gigartis mundatas.

RADIX CAROLI SANCTI,

foliis Lupuli.

CAP. XXVIII.



Lupuli folio.

Lupulo similis est, & periculis se convolvit illius more; quibus si caeat, humi spargitur & diffunditur. folia etiam Lupulo similia, colore viridi, sed obscuriore, odore gravi: neque florem, neque fructum fert. Radix crasso capite est, ex

quo alix radices oriuntur digiti crassitudine majoris, colore candicante: cortex qui faciliè separatur, eumque usus, est odore aromatico, gustu amaro, cum quadam acrimonia; nervus radices cortice spoliatur, multis quasi filuris seu tabellis tenuissimis constare conspicitur, quæ sigillatim separari possunt.

Monard. Carlo Santo. Geof. lin. de pl. *Bois de Car-Santo*. Cast. Carolus Sanctus. Lugd. Radix contra venena Carlo Sancto. *R. phyt.* Lupulo similis Mechoacana. Eid. pin. Lupulus 3. Mechioacan: Indica radix, Monardi, par. alt.

Nascitur temperatissimis provinciæ Mechoacan locis solo neque nimium sicco, neque humido.

Calida & sicca initio secundi gradus. Radicis Caroli Sancti cortex manè aliquanto tempore commanducatus, multam pituitam, aliòsq; humores ex capite elicit, eamque ob causam rheumatismos, capitis dolores & defluxiones curat: in nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitatem à stomacho expellens, sed illius decoctum maximè cujus gratia ventriculorum noxiis humoribus liberat, eumque roborat: purgationem tamen præcedere necesse est. Idem commanducatus, gingivis abscedentibus auxilio est, dentes stabilis eòsq; à scabritia & corruptione liberat, orisq; halitum commendat: sed postea vino os eluendum, ad amaritudinem tollendam. Pulveris ejus exigua quantitas ex vino albo, aut Adianti Canellæque decocto sumptus, vulvam obstructionibus liberat, mensesque provocat, & flatus discutit, purgato videlicet priùs corpore, & alvo (dum ejus remediò utetur) ex æquis partibus Liquidambar & unguenti Dialthææ inuncta. Cordis affectibus, præsertim qui ex uteri sympathia oriuntur, auxilio est ejus pulvis, ut ante, sumptus, aut illius decoctum hoc modo præparatum: Radicis minutim concisæ drachmæ duæ in tribus aquæ sextariis coquuntur ad dimidias, corticis Citri in pulverem redacti drachmæ quatuor, pulveris Canellæ drachmæ duæ statim injiciuntur, ac denud fervent, deinde colantur. Illius decocti sex uncie singulis diebus manè addito saccharo propinantur, purgato tamen priùs, ut decet, corpore. Hunc pulverem, & decoctum nonnulli in morbi gallici affectibus, atque etiam epilepsia commendant. Alterum experiri non admodum necesse est, quod multis aliis ad eum morbum remediis abundemus. Alterius periculū faciendum in iis qui vigesimum quintum ætatis annum nondum excessere: nam epilepsiam in adultis tolli, non est verisimile. Descriptis his Carlo Sancto facultatibus, qui proximâ classè à Nova Hispania advenerunt, istam radicem Indicam cognominabant, eamque valdè estimabant: tantas enim illius facultates experientiâ comprobatas se habere dicebant præter modò enumeratas, ut plures de Rore-marino celebrari noti soleant. Ejus corticem in pulverem tritum puerperis obstetricum negligentia animi deliquium patientibus, propinant; plurimum enim sudorem provocando liberantur. Idem pulvis ex vino aut florum malorum Aurantiorum stillatio liquore datus, mulieribus partus difficultate laborantibus magnam utilitatem adfert. Monachus quidam ventriculi debilitate affligebatur, orta tam ex frigidorum humorum abundantia, quàm ex imbecillo calore naturali, sic, ut nec cibum concoquere posset, sed is corrumperetur, & in magnos flatus converteretur: has radices cum pro sua opinione in aqua decoxisset, caræ-parillæ modo, decoctum per multos continuos dies in prandio & cæna hauserit: id illi adeò feliciter cessit, ut & ventriculus roboraretur, & conalesceret, eademque opera cibos postea probè concoqueret, acidis nidoribus liberaretur, & flatus absumerentur. Aliud præterea consequutus est non speratum auxilium nam hernia (quæ

Carica usus.

Capiti dolores.

Dentes liberat.

Obstruções.

Menses. Flatus.

Affectus cordis.

Decoctionum.

Morbus gallicus.

Epilepsia.

Ventriculi debilitat.

Hernia per

per multos annos laborabat, sic, ut bracciis & ligaturis quasi assidue uti cogeretur, nec nisi certis quibuldam intervallis eas deponere posset) liberatum sese sensit, cum bimestri hujus radice decocto usus fuisset, nec braccas amplius adposuit, sed sine illis incessit. Vtile etiam est hujus radice decoctum ad os colluendum: nam gingivas roborat, dentes à corruptione præservat, atque si jam corrumpi incipiunt, ne latius malum serpat, impedit. Cæterum adversus hoc malum habeo remedium multorum jam annorum experientia comprobatum, ut videlicet æquis partibus aquæ & rosarum calycibus stillatiz, & aceti sciliciti subinde os colluatur: nam certissimum est dentes eâ collutione à putredine liberari, & si illa jam correpti sint, ne ulterius serpat, prohiberi. Hactenus Monardes.

SMILAX LÆVIS VETERIBVS. CAP. XXIX.

Smilax lævis, ita describente Dioscoride, folia habet hederacea, sed molliora, læviora, tenuiora; [λεπτότερα, & πιο μαλακά ut ver.] flagella æquæ ac prior [Smilax aspera] at nullis spinis horrida: quibus tamen haud secus ac illa arbores scandit, iis sese circumvolvens: semen verò gerit ceu Lupini [λίπιν: Auth. advers. Diosc. quidam legendum conjiciunt λαρπίν δ' ἐξοι δὲ διὰ δὲ] nigrum, exiguum, supra quod flores perpetuè visuntur, candidi, undiq; numerosi & orbiculati. Ex hac porro Smilace per statem topiarij operis umbracula faciuntur: at folia per Autumnum amittit.

Cæterum semen cum Dorycnio potum ternis singulorum obolis [τετρωδὴν ὀβολὸν ἑκάστην: Matth. τετρωδὴν ἀπὸ τῶν ἑκατῶν] ut somnia tum varia, tum etiam tumultuosa videantur, efficere perhibetur. Galenus hanc Smilacem lævem nominat, ac asperæ quodammodo similem esse, quoad vim attinet, refert. At Plinius contra lib. 2. cap. 10. nullius esse effectus scribit. Quidam, inquit, duo genera Smilacis dixere, &c. [vide titulum de Smilace aspera.] Alterum genus culta amare & in his gigni nullius effectus.

Quidam, ut Cordus, existimarunt Smilacem lævem eandem plantam esse cum Smilace Phasiolifera: ego eam opinionem refuto lib. 17. Ruellio Smilax lævis est grandis Phasellus. Non desunt, inquit Sarracenus, qui Smilacem lævem eandem esse cum sativa seu hortensi Phasiolifera existimarint: tum quoniam utrique descriptio propemodum eadem; virisque itidem eadem à Dioscoride tribuntur, tum quia Galenus & Paulus, Smilacis hortensis in simplicium censu nullà factà mentione, Smilacis lævis tantummodò meminerunt. At ego cum peritioribus rei herbariæ professoribus inter utramque manifestum discrimen agnosco, Smilacemque hortensianam eam esse credo, quæ λόβια seu phaseolos profert: hanc verò, ad asperæ differentiam lævem dictam, eam quàm recentiorum plerique Convolvuli majoris aut etiam albi nomine designarunt.

Alij autem contra Sarracenum negant, nec fortè sine ratione, Smilacem lævem esse Convolvulum majorem.

Quidam apud Corn. Smilacem lævem Helxinen Cissampelon vocant, malè.


Cæsalpino Smilax lævis est Gelseminum, quæ opinio fortè non rejicienda: lectores perpendant diligentius.

Smilacis æquivocationes alias posui lib. 7. ubi ago de Ilcibus: Item hoc libro ubi scripsi de Smilace aspera.

In lib. 6. Aginetæ cap. 84. in Theodorici remedio contra gangrenam intelligunt quidam per Hede-

ram arboream, Smilacem lævem, quibus assentitur Dalechampius.

CONVOLVULVS MAIOR.



Pergulis obumbrandis posset intervire Smilax lævis, ita subsidio proximi cujusvis sustentaculi in altum nititur, longissimis & veluti contortis tenuib; striatis viticulis, ex quibus, longis intervallis, pediculis unciâ longioribus hęcrentia prodeunt folia, hederaceis longè majora, acuminata, duas alas hinc & hinc juxta pediculum promittentia, lævia, nitida, viridatia, ex quorum sinu profertur pediculus longus singularis, cui insidet flos unicus magnus nivei candoris, calathi formæ, cujus imum tubulum folliculus complectitur; semina in capitulo Cerasi mediocri magnitudine rotundo continentur fuliginosi coloris.

Hanc ita delineavit Dodonæus: Smilax lævis major viticulosis ac sarmentosis cauliculis longis ac tenuibus sursum ac deorsum arboribus, fruticibus, vicinisque sepimentis obvolvitur circumligaturque: folio est lato hederaceo, sed molliore, lævigatioreq; flores exiliunt candidi, copiosi, rotundi, calathi effigie, colore candidissimi ac Lilia æmulantes; semina angulosum, sordido colore nigricans, exiguis sylvestribus Lupinis propemodum simile, capitulo ex tenuibus membranis continetur, radices longæ, crassioribus cirrhis similes, intus candidiores, hæc illæ per obliquum, infra terræ tamen superficiem feruntur.

Mesue Volubilis magna, Lactaria, Funis arborum dicta. Sylv. Cissampelos Dioscoridis. An Dioscoridi (quod Trago, Matth. Fuch. Dod. Lob. C. Bauh. Schvenck. & aliis placet) Σμίλαξ λόβια, folio Hederæ simili molliori? An præterea (quod Fuch. & Dod. affirmant.) Νόβια, Galeno & Paulo Aginetæ? Cord. in Diosc. Helxine Cissampelos Græcorum, Latin. Convolvulus, cujus flores Ligustrum interpretati sunt apud Virgilium, magno errore. Sed eodem planè lapsu existimatur quoque Ligustrum, de quo Martialis lib. 1. in Procillum scripserit. Quod si enim (ut dictæ opinionis autores sentire videntur) Smilax hæc Ligustri nomen aliquando sortitum sit, quoddam vicinis circumligetur, ac circumvolutionibus plurimis implicetur, non tantum non sola Ligustrum erit, sed & Vitis, Lupulus, Cuscuta, & infinitæ aliæ. Sed & ipsum quoque Ligustrum, Ligustri nomen non merebitur, cum per se erectum sit, nec vicinis se circumvolvat.

Tragus Volubilem suam majorem (ita enim Convolv. majorem inscribit) quam Germanos à forma florum Campanam candidam vocare scribit, eam esse dicit quam Mesues simpl. c. 24. Funem arborum, quod est (si germanicè interpreteris) Scilbaum; Avicenna l. 2. c. 735. Funem Papaverum; vel ut alij habent, Pauperum (quod sonat germ. Bettlers Scilb appellat; Alij autem Cymbalarem, & Campanellam vocant; Otho tandem Bructellius Volubilem cillo-

Folia hederacea.

Deser. Dod.

Sym. An Smilax lævis Diosc.

Campana candida.

Funis Pauperum. Funis Bettlers.

non sent. Ex his Scaligeri verbis, quæ opinioni
 Rob. Const. refragari videntur, colligitur, quæ be-
 ne Theophr. à Roberto corrigatur.

Similitudo.
cum Olea qu
quo consp
litur.

Olea floris autem similitudo cum latione, in quo
consistat, apparet ex cap. 12. lib. jam citati, cum ait.
Olea flosculi prostrati spectantur perforati. Sanè pluri-
mi sunt flores in eo cum latione convenientes, qui
licet appareant ex diversis foliis, tamen unicum sunt
solum, quod & decidens subsistit integram sine
conceptaculo; Leucoia verò omnia. Rosa, Cisti, Li-
lia, Trifolium hepaticum, & alij multi flores cum de-
cidunt, extra conceptaculum separantur, unde ma-
nifestò apparet, foliis pluribus constare. E genere
verò unifoliorum florum videntur esse Verbascum,
Philomides, Iasminum, Trifolium fruticosum lu-
teum, Sambucus vulgaris, Ebulus, Campanula ro-
mnes, Anthurina, &c.

Theophrastum l. 2. caus. c. 25. de plantis, quæ ali-
quid querunt, cui incumbant, hanc intelligere cre-
do, dicentem. Adde quæ arboribus sustentur, at-
que amplexu caulia constant. Hæc enim aliquid, cui
incumbant querunt, ceu inter minora Volucrum
[Gaza in cod. Veneto & Basil. *æsim*; aliq. ut Gesnerus &
Scalig. incertum. Rob. Confl. Lignastrum Virgilij secundum
Servium, i. e. Clematis sive Compulvulus] quod vitam a-
pud aliud agit [cod. *energebar ætner*, in Basil. au-
tem *corde intery melius*] quod si obtinere non valeat,
humile præcipit, atque humiculae [*quæ dicitur*] fit.
Hoc autem corpore levi constat, facileque arbores
scandit, offensatque. Et hinc noxam arboribus in-
fert perstringendo, obumbrandoque pabulum au-
fert, cetera prohibendo.

Plinius Iasionem in diversis in locis, diversis nomi-
nibus exhibet. Libro namque 21. c. 3. ait, Est flos non
diffinilis illi [*Lilio*] in herba, quam *Convolvulum*
vocant [ea est *Iasione* a The phr. & ab auctore dicta,
Dalech. ex Scalig.] nascens per fruteta nullo odore,
nec croceus intus, candorem tantum referens, ac
veluti natura rudimentum *Lilia* facere condiscen-

Plan. illu-
strant.
Lafine.
tis. Idem lib. jam citato cap. 17. inquit, latione unum
folium habet; [ad florem referendum, Hermol.] sed ita
implicatū, ut plura videantur. Addit autē l. 2. c. 22. Ec-
lacione olus silvestres [Lafine olus repens, alij] habetur.

Concilium.
Vires.
in terra repens, cum lacte multo; florem fert candi-
dum: Concilium vocant. Et huius eadem commen-
dano ad stimulandos coitus. Cruda ex aceto in cibo
sumpta mulieribus lactis ubertatem præstat. Saluta-
ris est plethysis sentientibus. Infanticum capiti illita,
nucit capillum, tenacioremque ejus cutem efficit.
Rectè Herimol. apud Plinium pro Lactine latione
legit, dicens. Quidam verbum Lactine corrumpunt

*Plin excus.
Lagine
Nomen
plurimi.*

Aequiſepa Taſione Scaligero eſt *Convolvulus*: Rob. Conſt.
Convolvulus minor. *Smilax levis* Dioſcoridis: Dalechamptio *Volvulus*
major, *Smilax levis* Dioſcoridis, *Convolvulus* Plin.
Nobis autem inter plantas jam denominatas,
melius placet *Convolvulus major*, ſive *Smilax le-*
vis diſta.

Convolvulus minor. Iakone Theophr. & Plinij censetur a Coropio, Lobelio, & Gesnero Convolvulus minor, quem Helzingen Cissampelon quorundam intra inscribimus, quique Ruellio, Cat. Stephano & Gorzo Liseron, sive Lasseron cognominatur.

Compositus. Convolvulum folio Altheæ ad quam plantam à veteribus descriptam referri possit, ignorare se fateatur Clusius, nisi fortè Iasione Plinij sit. Vocatur hic Clusij Convolvulus à nobis peregrinus, de quo paulò post.

Dodonæus videtur innuere suam Campanulam
 ceruleam hortensem esse Iasionem Phinij & Theo- *Campanu-*
la cerulea.
 phrast. Sic Pena & Lob. in adv. scribunt Campanu-
 lam hortensem merito putari Theophr. Iasionem.
 De Campanula cerulea agimus lib. 20.

litione Plinii, solus silvestris, lib. 22. c. 22. traditum,
non abhorret à Rapunculo, autore Cesalpino, ^{Rapunculo}
quāvis non repant caules, nec flos candidus 10 sit. ^{inf.}
De Rapunculo agimus lib. 10.

Alia verò est latione (aut idem *C. l.*) apud Theophrastum : de qua idem Plinius alibi, quam Aquilegia. *Aquilegia.*
gram puto. De Aquilegia scribimus libro.

Laginem Plinij, quidam malè censent, authore Lagine Pl.
Hermolao, ut jam ex eo scriptum eandem esse cum
eiusdem Iasione.

HELXINE CISSAMPELOS

veteribus.

CAP. XXXII.

Helixine [*Helixine*, cat. & *Helixine*] cognomen Cissampelosi
pelosi (addunt interpretes) solia habet He-
deræ similia, at minora: ramulos vero longos
[et] sic legitur & Caras. at vulgatum exemplar
quibus circumplectitur quodcumque con-
gerit adminiculum. Nascitur in sepibus, vineis ad
segetibus. Potus foliorum succus alvum solvendi
vim habet. Cissampeli quidem hoc in loco cogno-
menum rectè adijcit interpret ex Galeno & Paulo
ad distinctionem alterius Helxines seu Muralis her-
bæ [*Parietaria*] de qua suo loco agemus. Neque
porro existimandum Helxinem, de qua agit Plinius
l. 21. c. 16. harum alterutram esse. Siquidem alia est,
quam Ixinen verius nominare debuit cum Theo-
phrastus hist. l. 6. c. 4. ex cuius verbis summi-
pse histoniam deprompsisse videtur. Hoc vero capite descri-
ptam Helxinem, rectius Plinij Convolvulum, l. 21.
c. 5. commemoratum, esse dixeris, eo nomine dona-
tum, quod suarum vicularum ope vicinis sese ad-
volvât adminiculis. Quod autem Galenus & Plinius
huic Helixini vim tribuunt [*dissectum*], in eo
minimè (quod voluit Marcellus) Dioscoridi repu-
gnant, quandoquidem, teste Sarraceno, utraq; fa-
cultas & dissecti & solvendi alvum. potest contra
controversiam, uni eidemque plantæ competere.
Marcellus Virgilius malè Cissampeli Helxines ca-
put è Dioscoride, quasi adulterinum reject, nihil
minus tamen nomina ejus in Helxines (quæ Parietaria est)
capite, relinquens, ut sunt, Cissampelon,
Cissampelon, Melampelon & Cissanthemon.


Ex hæcenus dictis apparet duas diversas esse herbas à Dioscoride Helixines nomine descriptas. Vna Cusampelos ab interpretibus cognominata, quam Cordus in Diosc. Convolvulum à Latinis vocari sentit, cujus quidem species duæ habentur, major sc. & minor.

Helxine Cillampelo Elatnem similem esse scri-
bitidem Cord. in Diosc. quam quidam inibi Oro-
banchen nonnullos facere tradit.

Altera verò l'Helxine, Parietaria Latinis dicta, Ga- Parietaria
leno Perdicium & Herba muralis Cello.

Helxinen suam Plinius lib. 21. cap. 6. Ixon [*Ixon. Ixon*
qua Chamaleon albus est, Dodon. Theophr.] venius nominare
debat (inquit Sarracenus in Diosc.) cum Theo-
phrastō, ex quo suam ipse historiam desumpsisse vi-
detur. Et hoc ipsum Cordus in Dioscoridem admo-
nuat, cum dicit. Magno errore apud Plin. lib. 21.

HELIX



Atriplex folio.

tione tortili cōscendit, nullis ulā capreolis, sed viticulis suis, quas ex radice mediocriter crassā, multifidā plures emittit, interdū palmo paulūm altiores, aliās etiam sesquipedales, subrubentes, ad quarum genicula in pediculis longis nascuntur folia singularia, triquetra, Atriplicis (Ocymī Tragō, i.e. Fagotritici) nonnihil rubentia; flosculi racematim coherrent in pediculis ex foliorum sinu exortis,

parvi, albi, semine succedente triquetro (veluti Ocymī Trag. Fegopyri Dod.) acuminato, nigro.

Centunculus Plinij, Ang. Elatine, Cord.

Hæc est illa Centunculus Plinij l. 24. c. 15. Angulizarz, quam nihil aliud esse tradit, quam speciem Clematidis. Helxinæ Cissampelo Cordus in Diosc. Elatinem (ita enim hæc præsens planta ab ipso vocatur) flore valde exili, semine triquetro, lacteum liquorem non remittentem, quā solā notā eam à Cissampelo distinguit, similem esse, ac propterea Serapionem statim post Convolvulum eam describere, ac Athin corrupto ab Helxine & Elatine nomine appellare scribit.

Helx. cissampelos altera Atriplex cf. flos, Lob.

Lobelius in adv. à doctis persuasus, Helxinen cissampelon alteram Atriplicis effigie putarat legitimam Helxinen, cum tamen huic aliquantum dissimilis sit: Frequens namque (ait ille) amplexibus multis, vites arripit, nec secus aut ardet, aut enecat, vel iisdem pabulum surripit, atque Callytha; foliis est hederaceis, oblongis, in angustum Atriplicis facie & modo desinentibus; flores item Atriplicis albicantracematim; semine triquetro, nigro, Sesami Theophr. sed minore; radice exigua; ubivis magno proventu vinetis, frugibus, ac sepibus adnascitur. Sed de succo vel facultate subducendi alvum, mihi ignota, nisi quis Atriplicem putet, eoque lubricare posse alvum statuatur, multò tamen imbecillior illa maritima certum. Hæc ille, qui in obs. & ic. picturam habet sub titulo Helxines cissampeli alterius, Atriplicis effigie. Nisi Elatine, ait Amatin Diosc. alterius Cissampeli species sit, quæ illa sit ignoratur.

Atriplex.

An porro est herba illa Ruellio l. 2. c. 30. quæ Fabam, Cicer & Ervum suo brachiorum complexu circumligans enecat, & Orobanche vocatur; agricolis quidem Græcis Ospreoleon, vel Leontobotanon, h.e. Legumen leoninum, vel Leonis herba: rusticis Galliarum Tenia dicitur, forsā à tenendo, quo tenaci noxa obvolvatur, cincinnisq; vel citris tanquam brachiis strictim amplexetur, ut ea penitus strangulet. Ex hæc ille qui lib. jam citato c. 75. eam sequentibus describere videtur. Orobanche cauliculus sesquipedalis aut paulū exelior, subrubens, sine foliis, hirsutulus, pinguis, tener, flore subalbido in luteum vergente; radix illi subest digiti crassitudine, quæ dum ariditate flaccescit, scapus dehiscens in rimas diffilit. Legumina, inter quæ nascitur, strangulat, unde & nomen invenit. Est ut oleris vice. Placet tum cruda, tum patinis decocta sicut Asparagus. hæc specie per ætatem inter segetes & legumina identidem offenditur. A recenti Græcia Ospreoleon, quasi Legumen leoninum, aut Leonteos botane, quod est Herba leonina dicitur. Nec mihi succurrit idoneum

Leoninum legumen.

nomen, quo vulgus rurave passim utatur, nisi quod in Parisiensi agro Teniam suprā diximus appellari, ubi de Orobanche inter vitia frugum abundè dictum est. Ex his Ruellij verbis luce meridiana clariùs patet, eum duas diversas plantas confundere, vocando Orobanchen Teniam, quam posteriore hoc loco ex antiquis describit, quum prius longè aliam habeat nomine Orobanche & Tenia. Sed Ruellium nullus admiretur amplius. Est enim ei ordinarium & assuetum, plantas & diversis in locis repetere, & mirè inter se miscere.

Ruell. ro. fruh.

A Dod. gall. Helxine Cissampelos, Gall. Liferon Helxine noir inscribitur, ac Const. Imperatoris Max. alexand. Cissampelos. [Hedera mollis] Latinorum nonnullorum Convolvulus, aliorum Vitis, officinarum Volubilis media appellatur. Ad Smilacis autem lævis genus, Dodonæus Convolvulum suum nigrum sive Helxinen cissampelon de purg. & hist. pertinere scribit, ubi eam præterea Volubilem nigram, in gylu nigrā m. v. m. a. u. x. i. s. s. o. n. appellat, & hæc subjungit: Cissampelose cognominatur, non modò ad differentiam alterius Helxines, quæ & Parietaria; verum quod & Vitibus crebris amplexibus septenarium circumvinciatur. Reperitur hujus & multò alia, in exemplari quo Marcellus Virgilius usus est, descriptio, & appellationes complurimæ: sed Ruellij & Cornarij editiones magis probandæ. Plinius l. 21. c. 16. non de hac Helxine, sed de Ixine scribit. Exemplaria perperam Helxine pro Ixine habent. Ixine verò Chamæleon albus est.

Const. niger. Dod. lat.

De præsentī nostra planta Tragus verba facit, ubi l. 2. c. 33. de Orobanche, sive Cisso altero Serapionis agit. Inter vitia, ait, frugum non postremo loco habetur id, quod Germani Spyn/ seu Windfraut appellant, quam etiam Anginam seu Orobanche quandam esse judico. Cum verò Orobanche Dioscoridis descriptio huic non per omnia quadret, judicium candido lectori committo. Videtur sanè mihi quod præsens vitium altera Cissus Serapionis sit, de quo c. 41. scribit, ac Lobleb vocat, h.e. Volubilem minorem; German. Kleinwinden/ vel Schwarzwinden. Hæc ille. Id hic silentio prætereundum non est, cum Orobanche Diosc. semen in cibo ob dulcedinem ejus, quam præ se fert, edatur: hanc autem jumenta in cibo fastidiant, Dioscoridis Orobanchen esse non posse. Hanc porro, quam Ruell. & Tragus Orobanchen esse suspicantur, Gesn. coll. & h. Convolvulo similem herbam dicit præterquam flore. Et licet is locis jam adductis Orobanchen esse neget, attamen in cat. pl. non solum Orobanchen nominat, sed ad imitationem Ruellij cum ejusdem Tenia, planta valde differente confundit. Orobanche nominatur, inquit, quod Ervum strangulet, Leontobotanos. Forsan hæc fuerit, quam absurdissima quorundam imperitia, nescio unde, Hypocistis audet appellare, in Parisiensi agro Teniam appellant. Cam. epit. & hist. habet figuram novam cum campanulis sub inscriptione Helxines cissampeli, vulgò Volubilis minoris. Huic autem adscribit nomina linguarum Helxines cissampeli. Lugd. Helxine cissampelos Dod. B. phyt. Convolv. sive minor semine triangulo: Eid. B. pin. Smilax lævis s. sive Convolv. minor sem. triangulo: Volubilis media sive nigra, Thal. Volubilis nigra, Tab. Ger. Fromentone alterum genus, Carl. Polygonum hederaceum, Colum.

Orobanche seu Cissus altera Serapionis, Tra.

Trag. res. tatur.

Const. rubro simile her. in Gesn.

Hypocistis male.

Locus et Tempus.

Nascitur in culis locis, arvis, vineis, segetibus, ac sepibus circa Montebelgardum, etiam in horto E. C. Basileæ observavi mense Octobri seminibus maturis quæ nunc in Montez, Genevæ passim florentem & semine turgentem Junio. Vendemix tempore, autore Dod. semen perficitur, ex quo, nec aliunde, primo Vitis succrebit.

Tenia

Tenax nescis (sic enim ut Ruellius non absre dici posso quidam putant) quod non facile extricari possit, idem græci agriculturæ authores remedia adversus natales ejus exortus condiderunt. In arvis ut autem non prodibit, si in quatuor eorum angulis & medio Rhododaphnæ ramuli pangantur, hoc eodem remedio putant legumen omne à noxa vindicari. Qui volent hanc frugum pestem prorsus aboleri, quiq; testas creta depingunt, Heraculis effigiem leonem strangulantis, referentes, & in quatuor agrorum angulis atque in medio collocant. Sunt qui delincentiam eodem modo testam in area tantum in media hanc amoliantur perniciem, jubeant obtinui. Democritus affirmat Orobanchem herbam corlestim alui, si mulier quæ in menstruis est, solutis crinibus & nudo corpore, gallum in manibus tenens, arcem circummeat. Ita validiora coalescere legumina testantur, qui hac superstitione sunt imbuti, quippe cum herba gallinaceum verens gallum, desitescat. Sunt, & græcis qui longa probant experientia, quæ ferendo sane legumina galli cruore conspersa, nullam ab hac adversante herba sentire penitus injuriam, eoque toratu à nocuentis tuta esse asserunt. Cavendum tamen ne quæ semini destinantur legumina, bubulo cornu continentur, sic enim inania & casta vānescere produnt.

Quod si hæc planta alter Cuslus Serapionis, seu Trago videtur, fuerit, poterit in medicina usui parari (licet Cornelius nullum illius esse usum tradat) præsertim vero ad tumores lienis in aceto prius coctus, dein tulus, ac cataplasmati instat impositus, id quid non semel faciedum, sed sæpius repetendum. Quid vero præter hæc efficere valeat, usus quotidianus fortè docebit.

CONVOLVULVS PEREGRINVS pulchret folio Betonica.

CAP. XXXIII.



Floris cum Convolvulo similitudo facit ut hanc plantam, aliqui non congenerem superioribus, nec formā illis respondentem subnectam. Peregrina est peregrini Convolvuli elegantia, in foliis potissimum spectanda, quæ ex viticulis proxima fulera arripientibus tenuibus, pilosis, pedalis aut cubitalibus longis pediculis hæret, argentei coloris, splendido tomato villosa, infima quidem & radici quæ tenuis summo cespice vagatur proxima, Betonica purpureo foliis similis, sed multo minor, crispis serratisque marginibus, reliqua etiam laciniata & profunde incisa, gummosa Clusio si gustentur, subacria & sustinara flores inter Helxines cissampeli & Smilacis lævis flores medijs, his minores, illis majores, purpureascentes, calathi formā, ex continuo unico folio confiat, longis pediculis hærentes, quorum basin ambit folliculus ex pluribus foliis com-

Tom II.

positus. Radix Clusio tenuis, exilis, fissa per summos cespites repit & subinde alias plantas producit.

Ad quam Rursem Veteribus descriptam referri hæc planta, cui à viticulis vicinis fruticibus aut herbis se implicantibus, Convolvuli nomen Clusius hisp. & hist. indidit, ignorat: nisi quis fortè lasionem, cujus Plinius l. 22. c. 22. meminit, esse existimet. Valentini Convolvulum folio Althææ; Hispani vulgari nomine Campanilla, i.e. Campanulam; Lusitani Verdenilla appellabant, & ad vulnera curanda efficacissimam esse tradebant.

Lob. Obs. & ic. Convolvulus peregrinus Clusij, Convolvulus Scammonij facie, an Helxine cissampelos Dioscoridis? Advers. p. 274. Sed apud Adversaria nullam ejusmodi plantam invenio. Non etiam intelligere possum, cur dicat Scammonij facie, nisi referat ad florem. Tab. Scammonium minus Plinij 2. Klein Scammonium. Hujus iconem Gerardus habet, ac Papaver cornutum luteum minus; Small yellowe horned poppie inscribit. Lug. Convolvulus folio Althææ Clusij. B. phyt. Convol 6. (pin. 9. alijs Helxine cissampelos.) sive argenteus Althææ folio, flore ex purpura candicante, interdum omnino purpureo.

In colibus juxta Tagum flumen lato solo, in Baetica, plurimisque alijs Hispæniæ locis nascitur. Floret Martio & Aprili. Ad Tagum quidem, etiam Decembri florentem Clusius inveniebat. Mibi autem, cum essem Montepessuli, allata est mense Aprili ex monte Serii. Similem vidi apud D. Zwingerum Basileæ folijs fere pellucens.

CANTABRICA VETERIBUS.

CAP. XXXIV.

IN Hispania, inquit Plin. l. 25. c. 8. inventa est Cantabrica, per Divi Augusti tempora, à Cantabris recepta. Nascitur ubique, caule junceo pedali, in quo strobili oblongi, velut calathi, in his semina parva minuta. Ea cum Dictamno & radice Aristolochiæ, in vini hemina sæpius bibenda, contra serpentium morsus.

Cantabricæ nomine diversæ plantæ ab authoribus indignantur. Tucherò enim Cantabrica Plinij est Caryophylleus, quæ nobis est Betonica altissima, de qua pertractabimus lib. 29.

Lobelius in adv. videtur existimare Caryophyllos silvestres esse Cantabricam Plinij, de quibus jam dicto libro, sub Betonica altissimi silvestri agemus.

Cantabrica (inquit in nomen quidam) est forte Aquilegia (de hac lib. 10.) licet Ruellius aliam demonstrat, quam rura Colubinarum herbam vocant.

Sunt qui Cantabricam Plinij, teste Lugd. Convolvulum minimum Clusij esse putant. Vocamus hunc nos Volutum terrestrem, quem mox describimus.

Cantabrica minor rotundifolia Lobelij in adv. Cantabrica Plinij Angustifolia, est nobis Campanula parva, cujus memimus lib. 20.

Sed & Campanulam rotundifoliam minimam Cortusum, teste C. Bauh. phyt. Cantabricam Plinij nominat. Hæc qualis sit, vid. lib. proxime citato.

Herbam quoque Rapunculo spicato similem in Baldo, Cortusum Cantabricam alteram Angustifoliam cognominat. Tradimus hanc libro jam scilicet.

Tragopogon Hispanicum, siue Scorzoneram o-
pinantur aliqui posse referri ad Cantabricam, sed
non recte vel Camerario teste.

Cantabrica titulo extitit etiam Rhesceda, Plinij
Rhesceda flo. Neotectorum, Lobelij Belgarum Eruca peregrina
 ribus albi. Italica, quam nos suspicamus Rhescedam floribus al-
 bis, qua delineatur lib. 29. Per eandem tamen Tha-
 lius Rhescedam majorem flosculis luteis intelligit.

VOLVVLVS TERRE
Itis.



Volvulus terre-
stris, ex radice
crassa, lignosa & sic-
ca, nigricante, mul-
torum capitum, cre-
bros junceos coli-
culos tenues pro-
fert, duos vel tres
palmos ut plurimū
superflos, aliquan-
do etiam cubitales,
hirsutos, valētillos,
per quos cernuntur
nullo ordine folia
angusta, oblonga,
pilosa: exterius ra-
mularum insident
ex calyculis hirsutis,
flores ex albo pur-
purascentes, Hel-
xines Cusampeli,
catathi formā. Ex

Lobelia: addimus nostræ descriptioni, radicem ses-
quipalmum longam, albidam: folia gustu exsiccante,
nonnihil calfaciente.

Quamvis autem Icon Lobelij & Clusij, quam proponimus, variant non parum, ac etiam descriptiones, eandem tamen plantam existimamus, variantem pro diversitate locorum: ne tamen quicquam fallatur, nos hic subijcimus descriptionem Clusij quæ sic habet. Multis tenuibus, adeoque junceis ex eadem radice, prodeuntibus ramulis, prædita est hæc planta, humi procumbentibus, pedalis, interdum cubitalis longitudinis, duris, flexibilibus tamen, lanuginosis, qui in summo aliquot flores proferunt purpurascens, inodoros. Convolvuli æmulo, minores, unico folio constantes, sed ita implicato, ut quinque videantur, florum oris in totidem angulos desinentibus, & dum clauduntur complicatis, folia per ramulos nullo ordine sunt sparsa, longa, angusta, tenui lanugine obducta. Salicis foliis haud ab similia, glumifera si quis mordeat, & aliquantulum amara: semem fert in vasis Convolvulo non ab similibus, minoribus tamen, fuscescentibus, angulosum, inæquale: radix candicans singularis, infirma parte ramola est, & vivax.

Lob. adv. & ic. (ubi figura Clusi) Convolvini-
mus. Spica, foliis, vel Stechadis citrinæ, aut Linaræ.

Obli. Convolv. minor Spica foliis, sed ejus effigies
minis forte expressa adv. p. 174 Scammonium tenuis
Plinij quorundam. Scammonium minus Plinij
Tab. 3 Clus. hisp. & hist. Cantabrica quorundam
Casi Cantabrice Plinij. Ponx in Baldo Convolv.
minor Spica foliis Lobelij. B. phyt. Convolv. 4
fig. 11. 1 in aze folio Guilandini Helxine stans di-
cuntur Coralli Scammonia Patavina. Is recte an-
notat Lugdunensem duas figuras & duas descri-
ptiones unius plantae exhibere. Una enim planta
est Volubilis et ceteris Dalechampi; & Convolv.
minor Spica foliis Lob. auget.

Variat magnitudine, reperitur enim vix duas
tréve uncias altus: flore est communiter purpu-
reo, rarius albo.

Rariss inventu Convolv. minimus aliis regioni- *Locus &*
bus quam Galloprovinciæ, Allobrogum & Norbo- *Tempus*
na ad margines aridosatorum & Olivetorum, ubi
Junio & Julio florem promit. Fræquens est multis
Hispaniæ & Lusitaniz locis, Clusio. Postea illam
etiam inveniebat in colle Thermarum urbi, vulgò
Baden, imminenti, quarto ab urbe Viennâ Austria-
câ miliar. Floret Maio & Junio, nonnunquam &
Autumno. Apud Belgas semine ex Hispaniis acce-
pto nata, non nisi Julio & Augusto, ubi nullum se-
men perficere observabat, tamen magna diligen-
tiâ testateis conservatam: calidioribus autem locis
sponte nascitur, seménque fere dictum. Nos eam
descripsimus anno 1561. collectam quaitur Mon-
spelio Castellæni secus viam florentem Vere. Qui- *lasiæ q*
dam lasionem putant. Frater in montibus Euganeis *rudem*
inventi indicavit, & purgare.

SCAMMONIA ET SCAMMO-
nium Veteribus, & in
genere.

Слр. XXXV.

EXAMINATA, ex authoritate Dioscoridis, rati-
ones ab una radice profert multos [scilicet, aut quatuor] variis,
tuberciales [scilicet, ut per quatuor cubito-
rum] pingues & quadrantenus hirsutos [scilicet, in quatuor
decim] Ruell. nonnihil crassitudinis pre se
ferentes, sed priorem lectionem tenet Serapio, qui suam
historiam ex Diosc. transcripsit. foliis iudem hirsutis
Helxines [non Pargieraria sed Cissampeli.] aut Hederae
similibus, sed mollioribus ac triangularibus floribus al-
bis, rotundis, in modum calathorum [scilicet, in quatuor
decim] concavis & graveolenibus;
radice praelonga [scilicet, Lychnis, Orib. octonotus] crassitudine
de brachiali [scilicet, ita Orib. & Herm. et apud codex eu-
birali], que lectio non placet, cum nunquam nisi im-
proprie dicatur aliquid esse crassitudinis, sed longi-
tudine cubitali. Sed & Serapio iheptē verut. radice
grossā, sicut pollex] candidā & gravis odoris lactei-
que succi plerā. Succus legitur hunc in modum;
capite exempto radix ita cultro incavatur, ut excava-
tio sensim a latiore orbe in acutum desinat, pro-
indeque in id cavum confluit succus, qui conchis
demum excipitur. Alij postquam scrobēs in ter-
ra [Add. Lat. na ex vet. cod. na tui piz au xionterre d'ho-
dus formis. Orib. Scandis. i. mactaris instar] conca-
merato sinu effoderunt, juglandis folia inser-
nunt, in qua radicis incisae succus diffundatur, eum-
que inibi siccatum tandem auferunt. Bonitate Dikomi.
praestat qui pellucidus est ac levis, rarus & colo-
re glutini taurino similis, rimulis fistulisve tenui-
bus, atque fungosus, qualis scilicet ex Mylia re-
gione Asia deponatur. Neque verd in proban-
done animadvertere solum par est, utrum lingua Aethi-
acū albescat: hoc enim evenit etiam admisto ti-
thyrali succo, sed longe magis antea commemoratis
attendendum est: nempe si non vehementer
linguam exaltescit exurativē, id quod & milia ti-
thyrali argumentum est. Natione autem Syria-
cus & Iudaeus deterius habentur, graves, den-
si, erivi farina & tithymalo adulterati. Succus dra-
clima ydrius aut quaternū obholōrum ponderē
haustus ex aqua pura aut misca, per inferna bi-
lem pituitamque extrahit. Solvenda alvi gra-
via binos obolos cum Sesama aliore semine sum-
phile sat est. Efficacions etiā purgationis causa
dantur

dantur succi tres oboli, cum Veratri nigri duobus, & Aloës drachma una. Fiunt & purgatorij sales, drachmis viginti succi Scammoniz in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportionem virium: integer quidem, cochlearia tria: medius, duo: minimus, unum. Purgat & radice drachma una aut altera cum sis quæ retulimus. Ipsius quoque decoctum nonnulli ebibunt. Ex eadem decocta in aceto contritaque cum hordeacea farina, cataplasma fit ischiadicis utile. Succus autem vulvæ appositus in la-

na, partus enecat: tubercula quoque discutit, cum melle oleove perunctus. Eodem decocto in aceto illita lepræ auferuntur. Sed & eodem caput contra diuturnum dolorem ex aceto & rosaceo irrigatur. Vinum Scammonites ita fit. Radicis Scammoniz per menses effusa trita & linteo illigata drach. xv. in musti congium unum mittuntur ad dies triginta. Purgat hoc alvum, ac bilem & pituitam detrahit.

Scammonium, quod est Scammoniz succus, copiosum quidem in Italiam advehitur, præsertim Venetias, quo ex Alexandria Ægypti & Syria importatur: sed quod probatissimum sit, rarum admodum invenitur, nec unquam se consecutum esse ingenuè fatetur Matthiolus. Quod autem Scammonium illud, quo omnes ferè officinæ refertæ sunt, Tithymali succo fit vitiatum, hinc liquidò patere arbitratur quòd decem vel quindecim ejus grana alvum pluries resolvant, cum syneeri drachma, Dioscoridis testimonio, id vix præstare possit. Plantam è cuius radice Scammonium colligitur, vidit primum Neapoli, allatam (ut quidam Sephasianus assererat) ex Gargano Apuliz monte, quæ omnibus notis ejus quidem iudicio, legitimam Scammoniam referebat. Sed præfèd mirari nobis subit, quod Matth. in comm. n. non ampliùs Scammoniam Gargani montis meminerit, sed aliam tradat, depingat, ac Constantinopoli missam esse dicat. Hanc (Scammoniam Syriacam intelligit) ostendit etiam esse in annotationibus Andrea Martinelli supra Mesuem depictam.

Ignorantem & inscium herbarium se Euch. Roesslin ostendit, dum arborem Scammoneam facit, & liquorem ejus succum arboris cognominat, cum nec frutex sit, sed herba, id quod Plinius his verbis docet, Scammonium quoque dissolutionem stomachi facit, bilem detrahit, alvum solvit, præterquam si adjiciantur aloës drachmæ duæ obolis ejus duobus. Est autem succus herbæ à radice ramosæ, pinguis foliis, triangulis, albis, radice crassâ, madidâ, nauseosâ. Nasceitur pingui solo. Radix circa canis ortum excavatur, ut in ipsam confluat succus: qui sole siccatus digeritur in pastillos. Siccatur & ipsa, vel cortex. Laudatur Colophonium natione Mysum, Priense: specie autem nitidum, & quàm similitimum taurino glutini, fungosum tenuissimis fistulis, citò liquefens, virus redolens, gummosum, linguæ tactu lactescens [hoc signum fallax & incertum esse Dioscorid.]. Quàm levissimum, quàm diluitur albescens. Hoc evenit & adulterino, quòd fit erri farina, & Tithymali marini succo, in ludæa ferè, quod etiam strangulat sumptum. Deprehenditur gustu. Tithymalus enim linguam exalfacit. Vfus bimo, nec ante, nec postea utilis. Dedit & per se ex aqua, vel aqua multa, & sale, quaternis obolis. Sed utilissimè cū aloës, ita ut incipiente purgatione multum bibatur. Fit & decoctum radice in aceto ad crassitudinem mellis, quo lepræ illinuntur. Et caput ungitur in dolore cum oleo. Hæc Plin. quæ multum faciunt ad Diosc. intelligendum. Faciunt & ad Plinij lectionem rectam. Sunt enim de veteri codice transcripta. Nam vulgata exemplaria tribus locis emendant. Primum ubi dissolutionem stomachi legitur, in vulgatis stomachi vox in totum deest: Secundo ubi

erri farina habetur, in vulgatis herbæ farina falsò legitur. Tercio ubi usus bimo legitur, pro eo vulgata exempla habent, Bulbi more: quam lectionem falsam esse. sequentia verba declarant: nec ante, nec postea utile: quæ neque ad Bulbum referri possunt, sicut neque Bulbus ad Tithymalum, de quo præcedit quòd linguam exalfacit. Hoc tamen de Scammoniz succo Diosc. nò tradidit, quòd usus bimo sit, ut nec ante, nec postea utilis sit. Et profectò ego hodie novi in quibusdam officinis usum ejus ad decem annos servari. Et scribit Arabs Mesues Scammoniam per annos duodecim conservari. Scammonium Syriacum licet Dioscoridi improbetur, Plinius tamen contrarium sentire videtur. Commendatur enim illi præter Mysium & Colophonium, etiam Priense, quæ Priene civitas Syriæ est. Mesues Antiochenum & Armenicum laudat, Corascenum vituperat. Galenus in Simplicium censu Scammoniam præterit. Paulus Scammonia, inquit, calidam & discussoriam, & biliosa extergentem vim habet, & magis succus, qui etiam tubercula discutit, & fortis necat appositus, & lepras extirpat. Et in diuturno capitis dolore, caput ex eo cum aceto & rosaceo irrigatur. Sed & radix pota purgat, cum ipsa, cum decoctum ejus. At cum aceto & farina hordeacea cocta, ischiadicis imponitur. Idem l. 7. c. 4. Scammonia, inquit, similiter ut veratrum purgat, & magis flavam bilem. Verum magis quàm omnia purgatoria, stomacho noxia est. Detur itaque non febrientibus, & stomacho bene affectis, pondere obolorum quatuor cum sale, aut pipere, aut zingibere, aut quodam oxyporo citò transeunte, stomacho grato, aut cum melle. Fiunt & catapotia cum gummi. Aëtius l. 3. c. 25. ferè eadem habet. Et addit, ammiscetur ipsi sal, & thymi coma, aut pulegium. In his verò qui ferre possunt, præstat Aloën miscere. Datur & per se cum melle, aut ptisanæ succo, si clanculum exhibere volumus. Et hi ambo Scammoniz nomine succum solum intelligunt, & non radicem, aut herbam ipsam. Et hunc etiam solum utilem Theophr. 9. hist. dicit, & aliud nihil, τὸ δὲ σαμμόνιον, inquit, ὁ ὅτις ἐκ τῆς ῥίζης ἐκπίπτει. Recentiores Græci Scammoniam vocant σαμμόνιον, i. e. lacrymam, ex qua voce corrupta officinæ vocant Diagridium. Vfus ejus hodiè ferè est ad reliqua purgatoria medicamenta acuenda. Sed in his, quæ à veteribus de Scammonio produntur, duo sunt expendenda: ejus delectus, & in purgationibus dosis. Laudant enim illi leve, pellucidum, colore quàm similitimum taurino glutini. At vulgare nostrum squallidum est, & cineritio colore, & aspectu tristiore: quia non succus, aut liquor manans, aut lacryma Scammoniz ad nos adfertur, sed succus vi expressus. Scammoniz lacrymam, quam Venetiis apud Albertum Martinellum vidit Pena in Syriacis conchis allatam, Colophoniz concolorem, concretionem simili, ex sulco caruleam fuisse ait, cujus coloris non est Scammonium nostrum. Verum cum pura ac mora lacryma Scammoniz tam frequenter ului non sufficeret, succum multum vi expressum ad nos asportari oportuit: cujus maximè delectus habendus, quia nullus nisi variè adulteratus ad nos adfertur. Nam aliquando ex eodem corpore, eadem morbi causa, & eodem planè modo affecto, grana aliquot sumpta facit, & sine ullo cruciatu, bilem pituitamque expurgabunt, ex eadem profus gleba, frusto parvo extracto multò plura grana sumpta minus evacuant, nec sine molestia, & cruciatu. In causa est dissimilis molis concretio, quæ hinc plus, illic minus, aut lactis Tithymali, aut Lathyridis, aut alterius stirpis valentioris succi accepit: unde dissimiles purgationes consequuntur. Cum au-

Scammonij
duratio
Scammonij
delectus.

Tempera-
mentum.

Scammonij
correctio.

Dacry-
dium.

Conferat
Scammoni-
um nostrum
cum anti-
quum.

Veteres en-
tem veteres, aut drachmam, aut quaternos obolos, placentur.

aut maiorem aliquam dosim præscribunt, purum & merum succum imperant. Purgat Scammonij succus per inferiorem ventrem vehementer, nulli aliorum purgantium medicamentorum potentiâ cedens. Nulla enim parte, ut Oribasius ait, superatur ab iis quæ agitant & commouent. Efficit istud non vehementer aliqua calidâ facultate; sed aliâ quadam latente totius substantiæ proprietate. Nam gustu quidem nulla in eo caloris vehementia deprehenditur. Cuicumque siquidem liquori aut rei permisceatur, nullam ei vel amaritudinem, vel acrimoniam, aut alium ingratum saporem communicat. Quamobrem nec inter calidissima, ut plerisque videtur, sed inter moderatius calida & sicca habendum censet Dodonæus. Extergit autem & educit potissimum bilem flavam; serosos item tenuésque humores, & quandoq; pituitam, ventriculo tamen magis, quam reliqua omnia medicamenta, ut Paulus tradit, noxium est Scammonium. Mesue verò non modò ventriculo grave atque molestum, verum & intestina ipsam abradere; interna viscera erodere; venarum ora dilatare, totiusque suæ substantiæ essentia cordi visceribusque reliquis obesse sentit. Immoderatum & minùs oportunum idcirco ejus usum animi sequuntur deliquia, ventriculi subversiones, alvi fluxus, dysenteria & tenesmi. Occurritur his malis, eodem auctore, si Scammonium in cotoneo malo decoquatur; & muccagine psyllij, prunorum carne aut succo, alijve lentis similiter succis permisceatur, additâ mastiche, aut aliquo ex moderatè astringentibus. Plinius noxam ejus tolli posse affirmat admixtâ Aloë: Veteres Scammonium in malo cotoneo etiam decoxerunt, sed omisso Scammonio ipsum malum edendum præbuerunt, quod absque stomachi subversione alvum subduxit: ut lib. de facultatibus. Galenus scribit: & de simpl. Quinque de causis corporibus læsiones inferre potest. Prima est, quòd flatus quosdam mordaces gignit, usque ad eò ventriculum lacessentes, ut sumentibus nauseam commoveat. Noxa hæc tollitur, si in excavato cydonio malo, clibano, aut prunis inassetur, pasta urdique circumlitâ: præsertim additis aut sceniculi, aut dauci, aut apij semine, aut galangâ. Inflammat deinde acedinis exuperantia corporis spiritus: quòd fit, ut faciliè febres excitet, iis præcipuè qui obstructionibus viscerum, & humoribus putrescentibus obnoxij sunt. Sed id nocuum avertitur, admittis inter coquendum, quæ refrigerant, & fervorem extinguunt: cujusmodi est psyllij feminis spissamentum, prunorum decoctum, seu potius pulpa, rosarum & violarum succus, aut dilutum, aut aqua: quin etiam antè coctionem macefatur oleo rosaceo, aut violaceo, aut cotoneorum misti saporis succo, aut admixto rhoë, aut sacitio spodio. Adhæc, quòd magnâ tum attrahendi, tum aperiendi facultate sit præditum, immoderatas alvi fluxiones facit: vasorum enim oscula plus quam par sit, aperit. Hæc læsio adimitur admittis rebus astringentibus, cohibentibusque, nempe mastiche, cydoniis malis, succoque ab eis expresso, & myrobalanis, præsertim flavis. Abradit præterea acri succo, quo scatet, intestina: proinde & tormina, & dysenteriam, & tenesimum excitat. Sed deletur hoc incommodum additis humidis pinguibus, lentisque medicamentis: cujusmodi sunt tragacanthum, bdellium, amygdalinum oleum aut rosaceum: item prunorum pulpa per se, aut sacchago asservata, psyllij spissamentum, mastiche, cydoniorum mala post sumpta, & calida aqua post bibita: utpote quæ medicamentum oculis à ventriculo & intestinis expellant, & ita simul noxam prohibeant. Hinc est, quòd prudentes Medici, quòd celerius Scammonium à ventriculo & intestinis deiciant, hordei jusculum cum saccharo superbibent-

dum præbent. Obest postremo Scammonium cordi, jecori, ac ventriculo substantiæ suæ totius proprietate. Vitium hoc aboletur, si illi cum calida, tum frigida admisceantur medicamenta, quæ cordi, jecori, ventriculoque opem suam præstant. Dejicit Scammonium valentissimè bilem, quam à valis & à sanguine exhaurit. Ejus deijcendi facultas haud sanè aliis medicamentis absumilis est, quæ purgant cum labore & molestia.

De dosi Scammonij non consentiunt auctores, De dosi Scammonij nam Scammonium posse ad 3. usque turò dari censuit Dioscorides, quamvis rursus dicat posse interdum satis esse 3. s. ut liberalis fiat purgatio: duos verò obulos, h. e. scrupulum, posse commodè alvum ciere. Videtur itaque dosim ejus esse à 3. ad 3. Paulus verò ait dando esse iij. obulos, cum quo Aëtius & Actuarius consentiunt. Rufus usque ad 3. j. & radicis usque ad 3. ij. exhibet. Mesue tamen, quem omnes ferme juniores sequuti sunt, non audeat 3. dare, imò consultat non esse excedenda grana xij. sicuti minimum, quod dari possit, ut ventrem solvat voluit iij. esse grana. Eum autem loquutum esse puto proptè de Diagridio, de quo mox. Videtis igitur quanta sit varietas scriptorum. Vnde non est mirum quod Avicenna admiretur varietatem ponderum in hoc medicamento, quam varietatem ipse refert ad varietatem locorum, nã Dioscorides fortasse exhibet unam drachmam illius Scammonij, quod mite erat, & ortum in miti loco: vel quia Scammonium illud erat mite si non ratione loci, saltè ob vetustatem. Sed sit utrunque. Ego scio (inquit Fallop.) quod Scammonium aliquando exhibitum in pauca quantitate non evacuat: aliquando in pauca exhibitum evacuat præter modum: aliquando è contra: unde nescio quid dicam de dosi hujus medicamenti: consulto tamen vobis, ut semper exhibeatis paucam quantitatem, quæ quantitas sit potius pro calcari: vocatur autem Calcar pauca Scammonij quantitas addita medicamentis purgantibus pro rusticis, vel pro aliis robustioribus, & cervicosis quibusdam hominibus, quibus nihil fuisse videtur factum, nisi pharmacum eduxerit usque ad ultimum, & plurimum ut ita dicam cacarint; & idèd pharmaca pro hujusmodi hominibus debent habere calcaria, qualia etiam debent esse pharmaca pro Monachis, & eò magis quia difficile in ipsis fit evacuatio, quoniam cum vescatur malis cibariis semper abundant crassis excrementis, & viscidis humoribus. Vnde præparetis quantum velitis, semper tamen difficile moventur. Itaque utamini semper pauca quantitate Scammonij, & stetis potius in dosi Mesue, quam etiam non excedetis, quam in dosi Græcorum, quos nolimus in hac re imitemini. Tractatus qui pro quo, Scammonex loco aut Cucumerem agrestem, aut lac Tithymali, aut Euphorbium accipit Sed Sylvius in Antibal. Scammonio deficiente, Ricinum probat.

Scammonia, quam Diosc. describit, paulò diversa est, attestante Cæsalpino, à Scammonia ejus, floribus ex candido pallescentibus, ex semine è Syria misso enata. Est hæc nobis Scammonia Syriaca flore majore Convolvuli.

Scammoniam aliam quandam Monspelij ostendunt, Scammonia Monspeliaca, à Gesn. h. (qui portionem pingit in figura adhibita Scammoniz Cordi) Clus. Lob. Cam. & nobis vosata, cujus est & altera varietas.

Egyptij quoque suam Secamonem [Apocyno affinem] Scammonij speciem affirmant.

Camerario apud Matth. germ. lib. 4. cap. 38. Volubilis sive Convolvulus major videtur genus Scammonex.

Scammonia tenuis Plinij, ita tradentibus Cordo in Diosc.

Obest cordi.

De dosi Scammonij

Auctores de dosi Scammonij ut interpretandi

Calcar medicamentum

Substantia

Acquisita Scammonia Syriaca flore majore Convolvuli

Scammonia Monspeliaca

Apocyno affinis Secamonex

Helvine in Diosc. Ang. Cam. h. & Cæs. nihil aliud est, quam
Cissampel. Helvine Cissampelos.

Volubilis Planta, quam Tab. pro Scammonio minore exhibet, est nobis Volvulus terrestris.

Convolv. peregrin. Idem jam dictus autor exhibet & secundum Scammonium minus Plinij, quod Convolvulum peregrinum inscribitur.

An Nil Arabum quibusdam Testis est Cæsalpinus alterum genus pro Scammonia ostendi foliis subhirsutis flore cæruleo, quam Mesues Volubilem lanuginosum vocet. An hæc Nil Arabum quibusdam.

Mechoaca. Mechoaca Scammonij species, & non temere quidem, ait Dodonæus, creditur. Ob mala symptomata, quæ excitat Mechoacan genus silvestre, Scammonium à Monasde vocatur. Vide Mechoaca. Et de his omnibus præsentis libro pertractatur.

Thapsia Scammonium dici de Thapsia Dioscoridis l. 4. autor est Tragus l. 2. c. 8. & Brunfels in Onomastico. De hac nos lib. 27.

SCAMMONIA SYRIACA FLORE majore Convolvuli.

Deser. **E** Syria delata Scammonia, etiam nostro assuevit solo, licet nullum ad ecchylosin studium adjungamus: profert autem à radice longa, crassa, lacteo succo prægnante, multas aliquot cubitorum viticulas, proximis radicis sese convolventes scandentesque; folia triangula ceu hastilis barbatus, mucro, Smilacis lævis æmula, sed minora, glabra, tenuia; flores calathoides nonnihil purpureascentes, Helxines cissampeli floribus proximi.



Hanc ita describit Cæsalpinus. Tenuis viticulas fert, bicubitales: foliis triangulis, effigie sagittarum, parvis: flores ex candido pallescentes: fructus veluti pinguedine obductos, in quibus semina nigricantia: radicem grandem Raphano similem, succosam.

Cissampeli floribus.

Deser. Cæs.

De Scammonia Cordi.

De Scammonia nostra Syriaca Cordum loqui suppicar, si folia non diceret spinosa in hist. l. 4. c. 109. cum ait. Scammonia est, cujus liquor est Scammonium, Convolvulo per omnia similis, quantum ad viticulas, flores, lacteum liquorem & qualitates attinet: folia quoque ab hujus foliis parum discrepant; sunt enim ipsius foliis similia, sed pilosa, triangulata, atque in alata sagittæ figuram redactæ. De radice prius dixerat in Diosc. majorem esse Convolvuli radice. Et hinc etiam Cissampelum, tenuem Scammoniam vocari, quoniam multo tenuiorem radicem, quam Scammonia habeat. Verum hæc descriptio Cordi ex Dioscoride concinnata est. Figura quidem malè picta aliquatenus nostram Scammoniam Syriacam exprimit: ramus verò appictus, non est Scammonæ Cordi, sed Monspeliensis. Quintam speciem Volvuli Mesues, esse plantam illam scribit Fallopius, ex cujus radice emanet Scammonium. Græci (inquit Dodon. purg. & hist.) *καυμωνια*, Latini ferè Scammonium nominant; ita appellantes non modò stirpem ipsam, sed & densarum concretumque succum. Dicitur & à nonnullis *καυμωνια*, ab aliis

καυμωνια; officinæ succum crudum quidem Scammoniam; in cotoneo verò malo decoctum, Diagridium vocant: quasi *δαγρῖς*, i.e. lacrymulam. Est verò ipsum Scammonium (ut cap. de Campana cærulea affirmat) nihil aliud, quam species Smilacis lævis, radice crassa. Lactariam hanc, scanforiamque Volvulam (unde fortè, Lobelio adversè nomen Volvulo fuit) solo penicillo commentatoris pictor exprefit. Cum tamen paucæ sint plantæ, quas de facie & facultatibus, penitus notas habere, magis interfit boni Medici, & Pharmacopœi quam Scammonium hoc Syriacum, Antiochenum & Norbonense. Anno igitur 1562. indefessus ille herbarum novarum vestigator Venetus pharmacopœus Sequinus Martinellus, ex Syriaco Alepo miserat plusquam centum libras glebæ Scammonij Antiocheni succi concreti, cui exprimendo interfuerat: conchas etiam non paucas lacrymæ plenas, seu Diagridio antiquorū, cum seminibus angulosis Volubilis. Hæc seminata tum Patavij & Venetiis primo Vere terræ mandata, in luculentam Volubilem, seu Volvulum abiēre, addidit sinuosis Smilacis foliis, triquetris, vel potiùs Cissampeli foliis, floribus, & facie, ut planè nostræ Cissampelo eandem dixisset: verum radice insigni fuit, & mole grandem Bryoniæ radicem æquante atque teneritudine simulante: foris tamen pulla, aut cinericia, intus albidâ carne: cujus fissæ torulus sive cor medium exemptum, planè idem est, aut simile radici communis & probationis Turbith officinarum: verum faciliùs aliquantò frangitur hæc, tamet si perinde gummosa succoque lacteo præget, atque Turbith. Hanc eandem postea Antuerpiæ, quod semen miseramus ferendo meminimus, speciosam factam, floribus & viticulis quinum & ferum cubitorum, prorsum nihil diversam, cujus Guilielmus Dries, non minùs peritus pharmacopœus, quam probus civis Antuerpianus, adnata, radicemque pululationes excisas, exsiccataque ostentabat, addidit Turbith Alexandrinum ementita, ut discriminis perparum, aut nihil percipi posset. Hæc Lob. adv. qui in obs. figuram habet eandem cum Dodonæo, titulo Scammonij, Adv. 272. In ic. vocat Scammonium Syriacum; antiochenum, & Scammonium. Gesn. h. est Scammonia à Syria allata. Ang. & C. B. (cui prima) Scammonia Syriaca. Cam. h. Scammonia Antiochena: Eid. hist. & epit. ut & Lon. & Cast. Scammonia. Rauv. Scammonium verum. Cæs. Scammonia floribus ex candido pallescentibus, ex semine à Syria misso nata. Matth. in comm. cum mag. fig. Scammonia. Lugd. Scammonia Matthioli.

Habui Lugduni, Genevæ & Montbelgardi in hortis. Basileæ in horto D. Platei florebat Junio, & Julio, Augustoque, & Septembri. is hieme recondebat. In calidis, pinguis exit solo, veluti in Asia Myisia, Syria, aliisque similibus. Reperitur & in Creta insula, Bellonio teste. Verisimile est, ubi suæ spontis est, citò & plurimà deinde Æstatis parte florere: nam & in Belgio, ut Dod. tradit, æstivis mensibus subinde cum flore videri potest. Scammonia Antiochena Camerario aliquot annos duravit asservata in fidelibus per hyemem, & Æstatis initio floruit, sed semen nunquam absolvit.

Meminit idem Cortusum patritium patavinum, rerum naturalium summum indagatorem ex crassis radicibus aliquot uncias succi extraxisse. Aiunt si propè Tichymalum seratur, addidit ejus caliditatem accendi, & veneni naturam acquirat. Hujus tamen liquor caloris acrimonizque vi per ætatem amissâ benignior nonnihil evadit. Quod verò non eas notas habet Scammonium, quales illi Diosc. tribuit, causa esse putatur, quod hoc tempore non observent veterem parandi modum, ac non ex incisa, sed dissecta prorsus vel expressa radice, aut è stipitibus & foliis contulis paretur: alioqui tanta copia Scam-

Caloph. na.
Diagrid.

Smilax lævis.
Qu.
Scamforia.
que Volvula.

Turbith.

quod.

Isam.
Tempus.

Pars.

monij quo pacto quotannis ad nos adferri posset vel etiam lacte Tithymali lapias adulterant. Pulcrè mehercule alicubi Ruellius inquit: Nulla medicinz pars incertior, quàm quæ ab alio orbe quàm nostro petitur.

SCAMMONIVM, SVCCVS SCAMMONIÆ densatus.

Deser.

Vulneratâ Scammonia succus emanans lacteus concrefcit qui in magnas massas coagulatus importatur, tophosâs & satis leves taurini glutinis instar nitidas & veluti pelluentes, colore fulvo, nigricante aut cinereo, atque is quidem color potissimum elucet in pulvere, in quem levi digitorum attritu friatur, odore nauseoso, sapore amaricante & mediocriter acri.

Diagridium quid ex o-
ni propa-
ratio, per
concollo-
nem.

Scammonium, succus Scammonæ densatus, per coctionem, aut etiam per macerationem paratus Diagridium appellatur. Confectio autem ejus per concoctionem hæc est. Accipitur cotoneum, exhibiturque durior ejus illa pars media, quæ semina continet (recisâ tamen superiori prius laminâ) cujus loco in excavatam partem Scammonium inditur: mox laminâ, quæ prius fuerat recisâ, pro cooperulo additâ cooperitur, triticeâque pasta circumquaque malo cotoneo obducitur, ac ita coquitur in clybano, h. e. vase fictili crudo. Quidam tamen succo ex cotoneis expresso, Scammonium macerant, ac Diagridium parant. Accipiunt autem Scammonij partes duas, succi cydoniorum partem unam; miscent probè, ponunt in locum calidum & quotidie movent, donec mediocriter induretur ejus massa: deinde formant pastillos, eosque quantum satis est exsiccant. Alij alium probant modum, & quidem ex malis communibus, ita, ut acceptâ ollâ, aut testaceo mundo vase, malis primò fundum ad digitalem crassitiem sternant, mox itidem tantundem Scammonij superponant, & sic subinde donec vas plenum fuerit. Mox autem carbonibus accensis, ac in camino posito vasi eoque optimè triticeâ massâ o-

Modus
alius.

Optimus
modus
quæ?

perto, quantum satis sit, coquant. Satis autem cocta dicuntur, cum mala induruerint. Ex cotoneis autem, quàm ex aliis malis per coctionem tutior & cum minori molestia fit purgatio. Quare & amplior ejus dosi sumi potest. Ac rursum magis ex aliis malis, quàm ex maceratione in succo cydoniorum. Sicut & magis ad purgationem videtur facere, cum ex hoc succo paratum est, quàm si sine hoc detur. De dosi hujus ac etiam facultatibus vide plura ante. Officine Scammonium preparatum, quod ut diximus Diagridium vocant, compositionibus serè omnibus, crudi ac non preparati Scammonij loco admiscant. De hujus dosi loquutum putamus Mesuem.

NIL ARABVM QVIBVSDAM, sive Convolvulus cæruleus. CAP. XXXVI.

Deser.

Cæruleus Convolvulus tortilibus vitibus, tomentosis, proxima quæque arripiens, in altum nititur, texturis topiariis peridoneus, nisi longiorem vitam teneritudo, frigorū malè patiens negasset: folia palmum circiter lata, paulò longiora, formâ hederacè, in tres acutas lacinias sinuantur, lanuginosa, colore ex herbido in flavum vergente, priora ad folia Sigilli R. Martæ accedunt; folia Lob. ternis angulis singula, in teneriusculis pediculis; flores Smilacis lævis, cyaneo colore adblandiuntur, extra tamen in singulas quinque laciniarum zona excurrit albida, quo etiam colore totum floris in-

Ex his hederacè
ratis.

Ex his hederacè
ratis.

fundibulum tam extrâ, quàm intra tingitur, quinis solus herbæ concoloribus obvallatum, in quo stam-



ina & apices laci-
dei altè recon-
duntur; flores Do-
donæo sunt veluti
Smilacis lævis in-
star campanulæ, sed
per oras angulosi,
& colore in cæru-
leo purpurei; flori-
bus Lob. & pedicu-
lorum calice exeu-
tib; Jalmuni aut *Jalmuni flori*
Vince pervincæ si-
milibus sed ora
quinis stellatim p-
minentibus angu-
lis, Nola cæruleæ
vel asuræ effigie;
semen nigricans Do-
don. radix subest
parva, fibrosa (gra-
cilis, longa, Lob.)

lignosis nervulis fractu contumacibus fracta, Cicla-
clamen, Hederæve annosam imitata, nonnihil
hirsuta.

De hac planta hæc Serapio. Habel, i. e. Nil, est *Habel Sa-*
granum Indicum [*Granum Nil, Cartanum Indum, Ha-*
bix.] cujus planta, autore Isaac Eben Amram, similis
est plantæ Lebleb, adherens arboribus duobus bra-
chiis, vel tribus, habens ramos & folia viridia, & in
radice cujusque folij florem coloris purpurei, simi-
lem pomulis in figura sua, quo decidente apparet
semen in vaginis, in quibus latitant tria grana, mi-
nora granis Staphisagriz, lævia, tribus partibus divi-
sa, & ista grana sunt id quod de ea administratur in
medicina. Hujus etiam meminit Bellunenſis in in-
terp. in Avic. diceos. Habel Almesachin est herba
quæ dicitur Funis pauperum, & est species Lebleb. *Funis pau-*
Granum Nil est semen nigrum repertum in planta *perum.*
Volubilis cujus flos habet colorem azurum: & figu-
ram Campanellæ similem, tendentem ad longitudi-
nem aliquam, & hujusmodi planta non est herba, ex
qua Nil seu Indicum [*sive hæc est, & est folium Nil, ex sive men-*
quo exprimitur succus, ex quo conficitur Indicum tingens] *est.*
conficitur ut quidam putant, sed est species Volu-
bilis nota, & semen hujus plantæ granum Nil, in
Oriente administratur ad evacuandum humores
grossos phlegmaticos & melancholicos, sicut ait A-
vicenna à quo in cura vermium administratur. Ex
quibus ita dictis vel me tacente facile judicatu est,
opinionem Tagaultij non esse recipiendam, dicen-
tis in l. can. Mesue, Nil granum esse Isatidem Gra-
corum, & vulgò Gallis passim Gueida, du Gueide dici, *Opinio Ta-*
herbam notissimam, quâ insectores utantur in tin-
gendis pannis. Addam tamen verbis Bellunenſis
argumentum ex ipso Mesue desumptum quo Ta-
gaultij opinio sufficienter refelli videtur, nempe
quodd Isatidis semen vix possit mensurari pleno & *Isatidis*
vacuo: quum admodum compressum sit, nec quic-
quam simile habeat, cum reliquis fructibus, qui à
Mesue loco jam citato recensentur.

Hæc est illa planta, quæ à Monachis in Mes. Vo-
lubilis cærulea nominatur, cujus semen Bellunenſis *Volubilis*
dicit esse Granum Nil. A Dod. gall. dicitur *Liferan*
bleu; Conjugulum nigrum. Dod. purg. & hist. (ubi *Conjugu-*
eam pingit & describit) dicit accedere lævium Con-
volvulorū numero, optimè etiam exprimere Cam-
panam cæruleam vocatam vulgò Campanam laz-
ram, & Convolvulum cæruleum dici recentioribus;
exillimari autem Ligustrum esse nigrum, Colum. *Ligustrum*
lib. 10. Nec sine ratione, quando quidem Smilax læ-
vis

vis

vis major etiam album dicatur Ligustrum. Nam exeruleo purpureum colore in subinde nigrum dicitur veluti Viola nigra. Esse autem qui hanc Campanam granum Nil Avicennae esse velint, & 306. differens quidem ab eo Nil, quod describitur c. 512. Illud enim isatis Graecorum esse; illud verò peregrinam ac Indicam stirpem: ut non modò Avicenna, sed & Serapio testetur.

Convolvulus Non desunt & alix Convolvulorum species, quae ad Nil quoque Avicennae referuntur, uniculis, spinulis asper, alter absq; illis. Sed Mechoaca quoq; potest & Nil, & Scammonium Americanum esse. Anil etiam Arabum & Turcarum in Guzarate aplerisque Nil vocatur. Nil tandem Germanorū, Pöpholix est.

Nunc quod ad nos attinet per Granum Nil Arabum quibusdam distum presentem intelligimus plantam. Lob. in adv. hanc intelligit per Asureum luum, sive caeruleum Convolvulum hederaceum, vel simlaccum, exoticum, quem in le. pingit eodem titulo: in obs. autem inscriptione Asurei, sive caerulei Convolvuli, Campanulae lasuræ herbariorum, adv. 74. Noctu florentis Pleutonariae dicit.

Gesl. h. Convolvulus peregrinus, vel caeruleus, Nil Arabum. Tab. Ger. Cast. & Cam. h. Convolv. caeruleus, de quo hic ait: Nil Arabum, vel potius Habal Nil Serapionis, Latine granum Indicum. Halimien circa Alepum ubi multum crescit, Persis Asia, Italica Campanula Azura aut sive di. n. ste: quia noctu potissimum flores, sole oriente clauditur.

Lug. Volutus caeruleus, sive Campana Azura Lobelij. Dod. (ut ait Lug.) quidam Pothon caeruleum Theophrasti esse credunt, ornamento & umbratulis sepulchrorum laudatum antiquis. Alij Pothon illum esse malunt Convolvulum purpureum duplicem Cortusij.

C. B. Convolv. s. sive caeruleus hederaceo arguloso folio: Smilax caerulea Dod. gall. [non inventa ut ab eo dicitur] siniconone. Scammoniae similis flore caeruleo, Ang. Nil Arabum. Eyst. Campana caerulea, Dod. Bry. Convolvuli alterum genus, quod pro Scammonio ostenditur, Cast. Campanula caerulea hederaceo folio, Syver. Quibusdam Pothos caeruleus Theophrasti: quibusdam Volubilis lanuginosa Meluei.

Montbelgardi in horto E. C. floret Augusto & sequentibus mensibus, non facile autem maturescit semen. Hæc, inquit Lobelius, non nisi hortis Italiae, Galliae & Belgiae nota, ubi amenā purpurā portectis atextisque secus parietes & periculis sumibus viticis, gracilibus, umbracula conennant, atque foenices visu per jucunda. Peregrinam hanc stirpem, & aliunde illatam sub sine æstus, si calida, fervensque fuerit, in Belgio flores facere scribit Dodonæus. Gesnero flores ephemeri sunt: noctu enim se apertunt (unde florem noctis vulgo quidam in Italia nominant) postridie vi solis percunt. Satus varè provenit, nunc infra palmi altitudinem consistens, at florens tamen: nunc altius excresecens, semel etiam ad cubitos fere novem, quæ planta semen initio autumnu matureavit.

Purp. Granorum Habel Nil in medicina, ut autor est Serapio, propter est (ex Aben Mesirai) laxare phlegma, & mundificare ipsum. Preparatio ejus est, quod bene teratur, misceatur cum oleo amygdalarum dulcium. Et melius ex eo novum ponderosum, & non stypticum in sapore fito: & dosi à quatuor Kirat usque ad octo Granum Nil (ex Habix) est carum Indum, calidum & siccum in primo gradu, & habet hoc, quod quando miscetur cum medicinis, facit moram in intestino duodeno, atque in illo quod sequitur ipsum, & est propinquum meseraicis, & facit ibi punctiones, & quum sumitur in potu solum, non laxat eadem die, nisi completis viginti

quatuor horis post ejus punctiōnem, & quando admisceatur ei Scammonia, facit ipsum descendere, & tunc laxat phlegma viscosum, & operatio ejus est & tiam in educendo cholera, & fortassis accidunt ex potu ejus juvenibus stypticis in ore stomachi, & torsiones magnæ, & si nimis sumpserint, faciet eos vomere, & fortassis inducit tenasmonem. Et dosi ejus cum aliis medicinis est drach. semis, sed simplex nunquam vidi dari in potu, nisi admisceatur ei Scammonia, quia juvat ipsum ad expellendum phlegma, & cholera, quoniam ipsum expellit humores duorum diversorum colorum per seculum. Grani Nil semen, ut Bellunensis testatur, in Oriente ad ministratur ad evacuandum humores grossos, phlegmaticos & melancholicos sicut dicit Avicenna. can. qui Granum Nil, Carthamum Indum esse dicit, ac calidum siccum primo ordine statuit.

CAMPANULA INDICA.



Congener videtur rara hæc Campanula, ei quam Nil Avicennae nuperorum quidam esse volunt, corollis bus flagellis hirsutis rubescentibus circumpericaseo-volutis in altu nitens; folia hederacea sive Cyclamini, acuminata, qualia nōpe primū pululantia esse solent Campanulae lazare sive Nil Avicennae, ad pediculi uncia longiorem, rubetem, hirsutam, subtus supraq; pilosa.

flores campanulati seu calathi formæ, calyci insident in quinque acutis laciniis diviso, villoso, nigricanti, plures simul juncti ferè, pediculo ex foliorum ala prodeunte.

Primum viti Argentinæ apud D. Fridericū Meier qui Campanulam Indicam nominabat, nobis etiam Montbelgardo in horto E. C. provenit aliquoties, sed non maturavit semen.

An B. pin. Smilax lavis 7. sive Convolvulus folio subrotundo: qui 1. in prod. Convolvuli species altera, quæ ad Nil Avicennae referri potest, Dodon. Campanula azura, Syver. Campanula Indica purpureo-violacea, Bry. Convolvulus Indicus flore violaceo, Eyst.

CONVOLVULVS BONA NOX.

dictus, flore candido, grandi.

Scribit Clusius l. 2. exot. c. 28. scd doctiss. Viro Simon de Tenaribus illius primario Medico instructus exotico apud 1596. Hispal delatos, certum accepisse, cum magna affinitas erat cum Convolvuli aliquo genere, quod tota facies respondere videbatur, licet longe major esset, quam ullus similis generis ipsi unquam conspectus. Etenim calix qui florem contineret, quinque foliis undam ferè longis & lais invicem amplectentibus constabat, ut in Cappari quibus includebatur caput trigonum membranaceum, tria grana instar magnorum piso-

HISTORIAE PLANTARVM

rum continens, coloris ex fusco cinerasci, & pend
fuliginosi: tres autem flores ex longis pediculis de
pendentes crassiusculo tanto inhaesille apparebant:
similia porro grana illo ipso anno ab eo Convolvuli
peregrini appellatione, his additis verbis, accipiebat
Clusius.

Convolvul
peregrinus

Buenos n
ches



Buenos nches, pla
te ex occidentali In
dia delatae semina,
quae etiam stirps a
pud fortunatas In
sulas reperitur, ubi
Buenos nches voca
tur, voce Hispanis
consueti, qua se
congregientes vel
discedentes, vesperi
salutant. Haec vero
primo sui ortu bina
profert folia Cam
panulae Indici pri
mum nascentis fol
liis similia, sed ma
iuscula & crassiora,
cui etiam similia e
dit folia recens na
tus Mechoacanhus,
ante quam inna
scantur alia folia. Multi porro ab unica huius plan
ta radice caules prodeunt, qui pedamenta adfixa,
vel vicinas plantas multiplici ambiunt spiram, Simila
cis asperae instar, cui etiam similia habet folia, majo
ra tamen & molliora: in caulibus etiam aliquot ha
matas continet spinulas, quales & Smilax aspera
sed rariores ac minus horridas: flores autem pandit
caudicos, & grandes, mediocri disco pares, qui ma
tutino tempore dehiscunt, noctu illic flaccet
cunt, unde nomen accepisse videtur.

Canth

Spinula
Alia

Planta ex
seminibus
Buenos

Armenia

Tilia

Smilax

Ceterum ex seminibus à Tovarato acceptis, quae
amicus communicaverat Clusius, unica planta in se
quente anno nata est ornato viro Honesto Lopez,
quae initio prodibat simili modo quem Fonarius re
fert, deinde multa longa sarmenta proferebat, perti
ca, multis spinis & nexibus sese circumvolventia, &
tenellos veluti spinarum aculeos praefertim circa ar
ticulos, generantia, qui nihil aliud erant, quam ra
dicum rudimenta, ut in plerisque plantis, puta May
zo, Harandine, & aliis quibusdam similibus inter
dum contingere videmus, quae haud dubie compre
hendissent, si quis terra obmisisset: folia habuit valde
vindia, Convolvuli foliis similia, sed longiora, &
pleraque hederacearum foliorum instar angulosa,
atque in longum angustum mucronem desinentia,
ut Smilacis asperae folia: floram quidem gomas
ferre incipiebat, sed petiti nequiverunt, quia pre
matura pruina totam plantam corruerunt. Hic ille.
Ergo duo semina & portionem capituli trigoni pra
dicti Convolvuli habeo inter fructus delatos ex
Anglia 1605. per generum Cherlerum, qui pler
que acceperat ab honesto viro Jac. Garoto: grana
sunt instar magnorum Pisorum, non tamen maxi
morum, angulosa ex compressione ut evenit qui
busda Pisus, colore, qualis ei tribuitur à Clusio, dura
sunt ossiculorum modo. Est mihi etiam capituli ni
lillo trigoni pars una triangularis fere, medio ceter
fusca: Semina in aquam injecta non sident.
C.B. pm. Smilax aspera, Indici occidentalis.

CONVOLVULVS PEREGRINVS

caeruleis folio oblongo C.Baulini.

Radice est singulari, oblonga, rufescente, ex qua
caules multi, tenues, pinnales, interdum cubre

les, flexiles, ramosi, levissimis pilis pubescentes pro
deunt, quos folia oblonga inferiora quidem, uncias
tres, quatuorve longa, vix unquam lata, inordinatè
vestiunt, quae sensim minora redduntur, & per mar
ginem leviter hirsuta sunt: ex omnium fere folio
rum sinu, pedicelli tenuissimi, oblongi exurgunt,
quibus singulis flos caeruleus ad exortum pallidus,
Campanulae forma, unico folio constans, & ex cali
culo prodicens, insidet: floribus succedunt capitula
membranacea parva, quibus semina parva, nigra
includuntur. Planta sane ob florum copiam elegan
tissima, & quae ob cauliculorum flexibilitatem sulci
ri debet. Hic in horto meo ex semine, Campanulae
caeruleae nomine accepto, sepius crevit.

Prod. Convolvulus 2. Eid. pin. Smilax laevis
sive Convolvulus peregrinus caeruleus, folio ob
longo.

LOBVS CVM SEMINIBVS CONVOLVULO MAIORI ACCEDENTIBVS.

INTRA fructus & cetera quae generi detulit ex
Anglia, anno 1605. ab honesto viro Jac. Garoto
reperimus Lobum sive siliquam nigram magnitudi
ne articuli postremi pollicis simili quodammodo
sublongam unciam, tumidam, & leguminum modo
in duas partes sese separantem, cortice duro laevi,
qui nonnihil contrahitur, pediculo longiusculo
intus grana duo (an plura adhaerent nescimus. Lo
bus enim erat apertus) magnitudine pisorum me
diocrium fere, triangularia ut Convolvuli majoris
siliqua, continentem, quorum latera duo minora
fere plana, tertium vero gibbosum excurbat, leviter
hirsuta vel tomentosa, colore fusco tribus costis, qui
etiam circulo circa umbilicum cinereis, cortice du
ro, qui si abradatur flavescit. Quid contineant haec
ossicula nondum introspeximus, sunt enim nobis
tantum duo. Injecta in aquam fluitant.

BRASSICA MARINA, SIVE Soldanella. CAP. XXXVII.



QVIA Brassica
marina toto
genere (quia enim
ut inquit Adrian.
Spieg. flore & folio
herbae atque floris
Convolvulusente
te vero Scamonium
est) differt a reliquis
Brassicis, ideo non
Brassicis (de quibus
lib. 2. scribimus) sed
Smilacibus laevibus
& Convolvulis ea
subjungitur.
Brassica autem ma
rina, quae hodie offi
cinis Soldanella ap
pellatur perieram
suas spargit vitia
las, à quibus folia
prodeunt subrotun
da, retusis alis praedita, latiora quam longiora Che
lidonii minoris similia, crassiuscula, liquore lacteo
manantia, pediculis longis innixa: flos magnus,
purpureus, quadrantalibus fere campanulatus, non
abstrahit multum floribus herbae, quae pro N. Vi
cenna exhibetur, aut Smilacis laevis, in cuius semine

da retusis alis praedita, latiora quam longiora Che
lidonii minoris similia, crassiuscula, liquore lacteo
manantia, pediculis longis innixa: flos magnus,
purpureus, quadrantalibus fere campanulatus, non
abstrahit multum floribus herbae, quae pro N. Vi
cenna exhibetur, aut Smilacis laevis, in cuius semine

Defr

in oculis rotundis non tantum nigrum, sed & album, angulosum. Gustu est salso, subamaro.

Soldana.
Brass. marina
Diosc.

Soldanellam aliqui etiam Soldanam vocant, & eam Brassicæ marinæ à Dioscoride descriptæ plerique similem affirmant. Imò nos non similem, sed

Diosc. lectio
Varia.

planè illam ipsam esse cum multis aliis ex hoc maxime concludimus. Quòd Dioscorides hanc Brassicam à lativa evariare dicit, quo modo certè Soldanella à Brassica penitus evariat. Quæ marina Brassica

[*ῥαβδωδὴ δακτύλῳ: malè Lugd. δακτύλῳ: nec melius Ruff. in Diosc. δακτύλῳ*] inquit Dioscorides, dicitur, à lativa in totum evariat, habetque folia longa [*μακρὰ* fortè legendum *μακρὰ* *auth. Matth. δακτύλῳ, praelonga Ruff. qui tenuia addit, quam ob causam, ipse videtur*]

Liquor al-
bus.

Aristolochiæ rotundæ [*ῥοτουνδὴ ἀριστολόχια*] similia, quæ singula de ramis subrubris prodeunt, ex uno pediculo velut Hedera. Habet liquorem album, non multum, qui gustu subalsus est, & quodammodo

Raphanus
Theophr.

amarus, compage pinguis. Et hæc est illa, quàm prioris ævo Theophrastus l. 7. c. 4. Brassicæ [*ῥαβδωδὴ*] tertiæ agrestis cognomento intellexit, cui folium læve esse parvum & rotundum scribit, ac multis ramis, multisque foliis constare: huic præterea succum acrem inesse & medicatum, quo Medici ad purgandas al-

Raphani
genus Plin.

vos utantur. Eadem & Plinius tradit. Raphani, inquit, genus silvestre Græcis, cui lævia quidem [*ῥαβδωδὴ*] sed breviora ac rotunda, copiosaque atque fruticosa; sapor autem asper, & medicamenti instar ad eliciendas alvos. Ceterum licet Dioscorides prodiderit marinam Brassicam folia ferre rotundæ Aristolochiæ, longa, ac tenuia; ea tamen non abs re ab omnibus esse censetur, quàm vulgus officinarum Soldanellam appellat. Quippe quæ in maritimis nascatur, foliis lacteo succo madeat, ramulis constet rubentibus, è quibus prodeunt ipsa folia, Hederae modo, quæ gustu salsa, & amara, & quadantenus acia sentiuntur. Quamobrem Dioscoridis codicem hoc in loco, sicut & in aliis permultis, mendii suspitione non vacare cum Matth. puto. Facile enim evenisse crediderim librariorum incuriâ, ut folia *μακρὰ*, i. e. longa, pro *μακρὰ*, i. e. parva, hoc loco successerint: & certè facilis fuit unius literæ lapsus. Siquidem Soldanella vocata omnibus notis marinam Brassicam representat, exceptis foliis, quæ sunt Aristolochiæ rotundæ minora.

Textum
Diosc. Varie
laborat.

bellis Cas. Cæsalpinus autem sic aptius legendum putat, foliis rotundis, longæ Aristolochiæ similibus, & non ut vulgati codices legunt, transpositis dictionibus, foliis longis rotundæ Aristolochiæ. Et hinc congruè Dodonæus Soldanellæ sive Brassicæ marinæ folia tribuit Asari, aut Aristolochiæ longæ (non ut ipse, rotundæ) rotunda. Quo Dioscoridis loco sic commendato, Soldanella omnibus planè notis Brassicam

Error Ruell.

marinam Dioscoridis refert. Ruellius etsi in hoc nobiscum cæterisque consentiat, quòd marina Brassica hæc sit herba, quæ vulgò Soldana, & Soldanella dicitur, nullà etiam (ut inquit) reclamante notâ; in eo tamen manifestè aberrasse deprehenditur, quòd Soldanæ folia Aristolochiæ longæ, atque etiam prælonga reddiderit. Etsi rectè quidem videatur Matthiolus existimasse pro folia *μακρὰ* legendum *μακρὰ*, tamen in meis (inquit Dalech.) Dioscoridis exemplaribus non legi *μακρὰ*, sed *δακτύλῳ* [*praelonga*] pro quo lego *μακρὰ* porrecta, quod est verissimum. Hæc ille. ego etiam nolim tam manifesti erroris cum

Ruell de-
fundatur.

Matthiolo inculcare Ruellium, quòd dixerit foliis prælongis: fortè enim ad foliorum pediculos longos respexit. Nec video tantum Ruellij errorem, quantum dicit Matthiolus, quia dixerit l. 2. c. 54. Soldanam esse folio Aristolochiæ longæ: id quod optimè fecit (uti & Cæsalp. legit) melius enim longæ quàm rotundæ folia referre videntur: rotundæ enim folia sunt longiora quàm latiora: Soldanellæ autem latiora.

Matth. ref.

ut plurimum quàm longiora, sicut folia Aristolochiæ longæ, quorum longitudini latitudo æqualis: dein quoad totum folij ambitum & anchoræ formam, melius convenit Soldanella cum Aristolochia longa, quàm rotunda: deinde quoad pediculos, quibus prædita est longa, rotunda non item. Verum Matthiolo non fuit cognita longa, pro qua exhibuit Clematitin doctis multis nominatam. Cuius ad. dit Carolus Stephanus existimare Soldanellam esse dictam, quòd ad solidandas rupturas facia.

Videamus nunc quid Turnerum Anglum, unum ex multis, qui Volubilis speciem facit, impellat, cui Turnero.

adhuc dubitet an Soldanella sit Brassica marina, in d. cap. de Cochlearia neget. Etsi inquit ille, jam ab annis pluribus Brassicam marinam veram indagaverim, unamque invenerim à vulgò doctorum receptam, alteram verò quam ego solus pro vera Brassica marina habui: attamen cum utramque cum Dioscoridis descriptione confero, neutram per omnia

convenire comperio. Ea quam ego veram Brassicam marinam arbitraus sum, nascitur intra primas maris aquas in litore, in ripis rivulorum prata ir-

gantium, & lapidosis insulis quas interdum mare perluit. Visa mihi in Frisia Orientali circa Torden/ubi Luppelfruyt à cochlearis forma in folio, dicitur.

nec non in Anglia in Cestria occidentali, juxta Portlandiam & Portbecium, verum nullum nomen aliud audiui, quam Scurby mode aut Scurby wur-

te: posset etiam appellari Spounwurte. Vbi primum erumpit, folia habet quinque aut sex, modò pauciora, modò plura, erecta simul omnia ad modum Pyrolæ aut Betæ tenerioris. caulis longus, ter-

ram versus rubescit. folia pinguis, crassa, rotunda, Asari similia, minora, virentiora, sapore non nihil salso & amaro, gustanti fervida & acia, Brassicæ quodam sapore ingrato, fervore & amaritudinis conjunctæ ratione. caulis spithamam æquat ferè, in quo quæ nascuntur folia, longiora sunt, acutiora;

his, quæ statim à radice surgunt. flus albus, semen tenue, nigrum. Indigenæ contra Scorbutum utuntur. Ego verò non contra eum solum utilem expertus sum, sed & contra hydropem, quemadmodum Do-

ctiss. Reinerus Rector Scholæ Gruningensis, & Henricus Herbartus testari possunt. Non ausim tamen pronunciare, esse veram Brassicam marinam Diosc. præcipuè cum magna ejus quantitas parum;

vera autem Brassica marina vehementer purget: deinde etiam quòd nullum in eo lac aut succum lacteum animadverterim. Idem nunc subdit. Recepta passim in Italia, Gallia & Germania Brassica marina, Herbariis dicitur Soldana aut Soldanella. A

Matthiolo verò exhibita, quoad radicem saltè, non eadem est cum nostra Soldanella, quæ in Anglia & Belgio nascitur, neque quæ venalis habetur Francofurti & Antuerpiæ. Quippe, ut reliqua omnia totius plantæ similia sunt Volubili aut Helixiæ cissampelo, nisi quòd folia rotundiora sunt, non ita

acutata radix cum ejusdem radice convenit. nostra verò Soldanella procul intuenti Malvæ similis videtur, tum floribus, tum foliis: propius si accedat, tam similis est Volubili, ut nihil aliud, quàm Volubilem

quandam marinam dixeris. flores planè Volubilis vulgaris, campanam referunt, nisi quòd majores sunt, & ex cæruleo purpurascunt. Cùmque reliqua tota planta per sabulum serpat, flores recti stant & amœno decore litus pingunt. Semen aliorum Volubili inftar, nigricans, rotundum, Vicæ par, aut etiam majus. folia rotunda Aristolochiæ rotundæ aut Asari: sapore non adeò acri, ac Cochleariæ; pur-

gant pulverizata ad ʒij. sed non adeò vehementer, ut Diosc. annuere videtur de Brassica marina: inquit enim *μακρὰ καὶ αὐτὴ ὅλη, ἢ ὅλη ἡ ῥαβδωδὴ*. Plinius etiam de Brassica marina scribens ait vehementissime ex omnibus

omnibus

omnibus alvum solvit: neque tam sunt calida folia ac Brassicae marinae apud Diosc. Inquit enim *ἡ δὲ πικρὴ δεινὰ, αὐτὴ δὲ ἰσχυρὰ καὶ τὸ δεινὸν τὰ αὐτὰ ἔχει*. Cum igitur Soldanella, nulla habeat folia longa, sed omnia rotunda, neque tam vehementer purgantia, ac suam Brassicam marinam facit Diosc. neque ullam habeat qualitatem, sive in odore, sive sapore, cur Brassica marina debeat vocitari, cumque tota planta tam similis sit Helixinae cissampelo & Smilaci sylvestri, quarum neutri ea conferatur, dubitare posset quispiam an Soldanella sit Brassica marina Dioscoridis. Quod si tamen Soldanella non sit Brassica marina, potest nihilominus aquis hydropicorum detrahendis recte deservire, quemadmodum alia Helixines cissampeli & Volubilis mediterraneae genera idem praestant. Dicit Aëtius Smilacem sylv. quae ad aquas, fruteta & sepes conscendit optimam esse ad hydropem: idem habet Nicolaus Myrepsus, Aëtium forte sequutus. Scribit Diosc. Helixinen cissampelon alvum solvere. Mesueus de quinque speciebus Volubilis agens, omnes facit purgatrices. Quare mirum non est, Soldanam, cum Volubilis sit species, aliarum Volubilium modo purgare. Matthiolus, ut omnes tollat remoras, quae prohibere possint, ne Soldanella sit Brassica marina, inquit corruptum esse Diosc. textum, & *ἡ δὲ πικρὴ δεινὰ* irrepsisse: quod quidem verisimile videtur. nisi quod Aristolochiae folia aliàs sint longiora, aliàs breviora & rotundiora, ut in Cochlearia, & generibus quibusdam Malvæ, aliisque plantis: tunc autem Soldanella non fuerit Brassica marina. Verum enim verò apparet aut nullum in textu omnino esse errorem, aut antè multa saecula corruptum. Nam tum utraque vetus barbara versio Diosc. (ordine alphabetico) tum etiam Serapionis legit folia longa. In nullo autem codice græco, qui hodie extet, aut veteri interprete, invenio *ἡ δὲ πικρὴ δεινὰ*, seu folia tenuia, ut habet Ruellius. Quod miror non animadvertisse Matthiolum, hominem alioqui oculatissimum, ut multis in locis Commentariorum eius apparet. Haec tenus Turnerus.

Errat Matth. de Cachile Serapionis. Errat in hac planta, ut prodidit Matthiolus, Matthæus Sylvaticus pandectarum autor, quod crediderit Arabum Chachile Soldanellam esse. Cuius error aperte convincitur ipsius Serapionis testimonio: quippe qui Cachile suum Vsnæ simile fecerit, foliisque non Aristolochiam, sed Nasturtium imitari tradiderit.


Brassica marina. Brassica marina, Diosc. Ruell. Corn. Matth. Leon. Trago, Alton. Ang. Cord. in Diosc. & hist. Cast. Gelh. Dod. gall. Lob. Cam. Lac. Monach. in Mel. Lugd. Sylvio, Valeriolæ, Port. phyt. Alton. Moresc. Turn. Czf. Io. Agric. Ryffio, Euch. Roess. & Lonic. in quorum figuris capreoli non placent, & aliis plerisque. Soldanella Lob. Dod. Levin. Lemn. Cam. Gat. Gelh. Cord. Leon. Alton. Ang. Ryffio, Adolph. Occ. Cast. Lonic. Sylvio, Alton. Moresc. Monach. in Mel. Lugd. Valeriolæ, Euchar. Roess. Czf. Io. Agric. Tab. & aliis. Soldana Trago, Alton. Dod. Gatin. Brunfels. Apollini, Lev. Lemnio, Lonic. Lugd. & Fallop. Volubilis species, Mesue. B. phyt. Brassica maritima minor (hæc vox apud Matth. omissa) seu Soldanella officinarum. Eid. pin. Soldanella 2. Soldanella marina. Ger. Eyst.

Nomina vulgar. Brassica marina vocatur Græcis *νάρθη δεινὰ*, Germ. Meerwinde: Belg. Zee winde, i.e. Convolv. marinus: Gall. Choux de mer: Ital. Canolo marino: Hispan. Verca marina: Ang. See coole.

Locus & Tempus. In hortis plantata felicissime ex semine adolescit. Soldanella passim ad mare provenit, potissimum circa Venetias, Genuam & similibus locis: item ubique ferè in Belgico littore. Ad mare Monspelij æstate floret: autumno semen perficit.

Herba in totum stomacho inimica, acris vehementissime, alvum ciet in cibo cocta: coquitur propter acrimoniam cum pingui carne, Dioscorides. Marina Brassica supra quàm quoddam ventrem deiciat, utpote subfalsa & subamara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis usus, & ad omnia, ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea, Galenus. Brassica marina assumpta aquas ducit, præcipue prærogativæ in ascite. Utendi modus varius: siquidem folia ejus ex sale, aceto, & saccharo acetarij modo ad quinque aut sex bucellas comesta mirabiliter aquas per alvum ducunt. Eadem in jure carniū cocta, adjecto dein saccharo aut melle, propinantur. Posset & sicca in pulverem redacta ad 3. ij. aut ii. ex jure pulli bibi. Rectè autem cinnamomi pulvis & similia corrigentia addentur; alioqui usu nimio ventriculo nocent. Pulvis in catapotis ad 3. ij. deglutitur. Sunt qui scribant multos tertianarios Soldanellæ curatos, Matthiolus. Puerilis ad 3. j. & ulterius datur in conserva salviae vel rosmarini, Brasavola. In hydropo pro siccatione, & evacuatione aquæ, nullum vidi medicamentum præstantius, inquit Fallopius, & exhibetur vel in pulvere 3. j. pondere; vel in decocto; vel asparagorum modo, si planta recens habeatur, quo modo est suavissima, & siccatur, aperitque vias, & evacuat aquam. atque experientia hujus Brassicæ ductus ego exhibui etiam aliquando in hydropo asparagorum modo Volubilem minorem optimo cum successu. Sed hæc sola species Volubilis in usu est: aliarum verò specierum nullam utimur ad purgandum. Contrarium sentit Alton. de ascitis curatione agens. Quidam, ait, ex tumoribus suorum marinæ Brassicæ cum vino, aut sapa, seu aqua lactis approbant (hodie vulgus Medicorum Soldanam, seu Soldanellam appellat) cujus usum non valde admitto: namque ventriculo mirifice adversatur, & ipse pluries experientia vidi noxam inferre, potius quàm auxilium aliquod hydropicis præstare, imò quosdam citius perisse observavi.

CONVOLVULVS MARINVS Soldanellæ affinis.



Convolvulus *Defor.* Quidam rarus, cujus folia inferiora quidem, quæ uncialibus pediculis committuntur, salcata Phyllitidis in more sunt, adverso sine rotunda, vellecuna in medio exsculpta corculum imitantia, sescunciam circiter longa, unciam lata, nervis obliquis à medio recto in latus ex porrectis; superiora verò folia, Hemionitidis alterius peregrinae Clusij modo auriculis pulchris geminatis (in quas nervi excurrunt) pinnata; flores ex foliorum alis prodeunt magni ut in Smilace levi sive Convolvulo majore. Provenit in horto D. Zvingeri Basileæ.

An est Hermolai in Diosc. cap. 666. Iecoraria sive Ficatella Venetiis in littore passim nascens, & olitorio foro iuniorum tempore venalis, hederaceo ferè

An Hermolai Iecoraria sive Ficatella.

ferè folio; flore purpureo, Liliij pusilli effigie, se convolvens, quibus appropinquat; solvens alvum cocta & cruda oleris modo accepta.

Convulv.
Imper.
Herba la-
disia.
Lugd. nec.
Brassica
marina d-
lea Rauv.
Brassica
marina i-
sive maur.

Convolutulus marinus ad nostrum mare (inquit Imper.) se expandit supra terram, ad quinque vel sex cubitos, folia habens incisa, crassa, liporis salis, flores campanæ modo albos; semina cōtinet in folliculo triangulo, hirsuto, Soldanellæ modo, cui congener, & quia viribus similis illi, ejus est usus quum e terra prodit: est herba laçitèra. Lugdun ap. hujus iconem ex Rauvolfio ponit, ac Brassicæ marinæ genus inscribit, quod ab incolis Meudhendiâ Rhæ ad Almanforem Corigiolam nominari tradit. Sed nec Meudhendi, nec Corigiolæ nomen alteri suæ Brassicæ marinæ Rauvolfi. attribuit, verum Scammunio Mospeliensi.

Fatetur frater C.B. phyt. & apud Matth. (à quo Brassica marina i. sive major inscribitur) hujus libi Convolutuli marini nomine & plantam & semen Imperatum Neapoli misisse; folia autem ejus quædam laciniata esse, quædam non: omnia tamen parte superiore sinuata. In pin. Smilacis lævis generibus adscribit, & Soldanellam i. maritimam majorem vocat.

CONVOLVULVS EGY-

PTIACUS QUINQUE-

folius, Casp. Bau-

hini.

CAP. XXXVIII.

Deser.

Viticulis est tenuibus, geniculatis, lævibus: ex quolibet geniculo folium, longo tenuissimo



pedicello donatum, prodit, q. in quinque laciniis angustas longiusculas dividitur, & quandoque inferior una alterave bipartitur, & cuilibet laciniæ, tenuissimus mollisq; aculeus insidet. Supra folij exortum, pedicellus æquæ tenuis, duarum triumve unciarum longus & nudus exurgens, florem magnum purpureo cæruleum, aliorum Cōvolvulorum forma, sustinet. Semen non conspectum, cum solum hujus

ramum, Convolutuli Egyptiaci nomine, à nobilib. Cortusio Patavio ante viginti annos acceperim, inquit C. Bauhinus, cui in prod. est Convolutulus 3. foliis laciniatis, vel quinquefolius: Eid. pin. Convolutulus 7. Egyptiacus Bauhini, Bry.

DE LIGNO COLVBRINO

in genere.

CAP. XXXIX.

Ligni Colu-

brini Ery-

PLURÆ stirpes inventi plurimum dissimiles, eadem formâ tum nascendi modo, uno tamen eodemque nomine nuncupatas, Lignum Colubri-

Tom. II

num, quod singulæ mirum in modum utiles sint adversus colubrorum virulentos ictus & morsus, facile animadvertetis, qui sequentes earundem descriptiones diligenter contulerit. C. Bauh. Lignum colubrinum, Clematidem Indicam vocandam censet, quod pleræque sarnentitæ sint, & per arbores repant. Hoc verò lignum, sive potius radicem, ut Garciz placet, serpentium moribus prodrile, hoc modo deprehensum est. In Zeilan insula, Serpentis genus est coronatum, seu diademate insignitum, Lusitani Cobras de Capel. (nos Regulum dicere possumus) maximè noxium. Est item animalis genus magnitudine viverræ huic serpenti ininvicissimum, Quil, vel Quirpele vocant. Quotiescunque cum serpente congressurum est hoc animalculum, istam radicem (quæ multa istie nascitur) eâ parte præmordet quâ denudata est: etenim pars aliqua extra solum prominet. Præmorsâ radice, pedibus anterioribus salivâ conspersis, caput primum, deinde reliquum corpus sibi demulcet: postea serpentem aggreditur, nec eum dimittit, donec occiderit. Quod si illo congressu serpentem vincere non potest, denuò ad radicem confugit, ad quam se fricat, deinde in prælium redit, atque ita morsu serpentem necat. Hoc spectaculo edocti Chingalæ (i) sunt Zeilan incolæ) istam radicem venenis resistere cognoverunt.

Tria porro hujus ligni genera in insula Zeilan esse prodidit Garcias, de quibus in genere ait. Non modò adversus animalium vitæ jaculantium morsus ictusve efficax est hoc lignum, sive potius radix, sed etiam ejus pulvis lumbricos necare; papulas, exanthemata, & impetigines tollere creditur, & Cholera cholericam quam vocant passionem (incolæ Morde-morbus, xi dicunt) sanare. Similiter utile esse medicamentum ferunt adversus febrium circuitus, uncia pondere propinatum, prius tamen tritum, & aquâ maceratum, per vomitus expurgatâ multâ bile.

Nullum autem ex tribus Garciz Colubriini ligni generibus, cum Acoftæ ligni Colubriini bina stirpe convenit, quas describit. & in provincia Malabar inveniri tradit. Idem mentionem facit Scertij Colubriini ligni generis, vastæ arboris magnitudine, de quo in alio libro se acturum scribit, qui ad nostras manus nondum pervenit, nec cum oculis nostris videre licuit. His addit & aliud lignum Clusius, quod an illis congener sit, ignorat. Sed singulorum adscribimus historiam.

COLVBRINVM LIGNVM

I. Garciz.

DVorum aut trium palmorum magnitudine as- surgit, paucis virgulis, quatuor aut quinque duntaxat tenuibus: radix quæ maximè in usum venit, veluti tenuiorum nostrarum vitium radices, multis capitibus aut nodis se propagans, ita ut semper radix aliqua extra solum se exerat, & radice una exemptâ, aliæ in ejus locum succedant. Radix hæc ex candido cinerea est, solida admodum, amato gustu; folia Persicæ mali, magis tamen viridiora; flos longè à foliis racematim coheret, pulcherrimo colore rubens, fructus Sambuci, sed rubens & durus, racematim coherens, veluti in Persicæ fructu. ridymeno.

Primum & laudatissimum, secundum mentem auctoris, hoc est, à quo subsidium quaerit viverra, vocaturque incolis Rametui, Lusitanis Pao da Cobra, i. e. Lignum Colubrinum. Hujus ligni Colubriini Garciz, fragmentum trium digitorum transversum

P

rum longitudine anno salutis 1564. ostendit Clusio Salmantica Valerius, dono olim à Lusitania missum.

B. pin. Clematidis Indica; foliis Persicæ, fructu Periclymeni. Ligni colubri 1. genus, Garz. Frag. Palo del Cobra, i.e. Lignum serpentinum, seu colubrinum, Linscot. par. 4. Ind. or. c. 31. Pao de Cobralignum seu radix Lusitanis dicta, omnium venenorum antidotus, in Insula S. Laurentij Ind. or. par. 4. c. 7.

In Insula Zeilan, & multis aliis regionibus; & in Goz Continenti nasci tradunt.

Teritur primum hæc radix, & ex vino, aut aqua cordiali propinatur à serpente percussis: teritur etiā ad coctē santali modo, & vulneribus inspergitur.


Symb.

Locum.

Vires &
usum.
Serpentis
est. Gul-
neta.

COLVBRINVM LIGNVM II

Garciz, Clusio scandens.



Malopuni-
ca similis
arbor.

Diffr. Clus.

Arbor est (cū sola provenit nullis vicina arboribus) Malo punice similis, spinis brevibus & firmis horrida, cortice candido, denso, rimoso, & amaro, non tamen veluti prioris cortex; foliis est luteis, aspectu pulcherrimis. Hanc autem (si juxta aliam quāpiam arborem proveniat) per summos ejus ramos serpere, atque Cucurbitæ modò amplecti seunt.

De hoc ligno hæc Clusius. Secundi

generis Garciz descripti ligni fragmentum, quinque unciarum longitudinis, quodque ut conjicere licebat, duarum unciarum crassitudinem æquarat, mihi non modo ostendebat Londini anno 1581. C. V. D. Hector Nunez Medicus Lusitanus, sed etiam dimidiā ejus parte liberaliter donabat. Ejus porro materies firma erat, candida, venis quibusdam distincta, non dissimilis Fraxini ligno: cortex autem qui eam integebat, candicans & quasi cinereus, utraque verò degustata, amaro sapore prædita esse deprehendebantur. Ejus qualem accipiebamus à Clusio fragmenti iconem lectoris oculis sub jicimus.

Garc. Lignum Colubrinum secundum. Clus. ex. Ligni Colubri 2. fragmentum. Lugd. Lignum Colubrinum Acosta, qui debebat scribere Garciz. Tab. Lignum Colubrinum. B. pin. Clematidis Indica 2. spinosa foliis luteis: Ligni colubri alterum genus, Garz. Trag. & Clus. qui ligni frustum pingit.

Secundum hoc genus in insula Goa nasci ferunt, sed nunquam Garciz videre contigit.

Commendatur adversus venena veluti primum, eodēque modo usurpatur. Solent ipsum lignum cum cortice & radice permixtum exhibere. Præfertur tamen radix.

COLVBRINVM LIGNVM III.

Garciz, foliis Lentisci.

Ramos habet paucos, tenues, quatuor aut quinque cubitorum longitudine, qui, nisi alligati, sustentare se nequeunt, sed per solum sese distendunt; folia rara, lentiscinorum effigie, oblonga,

Diffr.

non viridia, sed maculosa, sive nigricantibus ex candido maculis respersa. Radix tenuis est, dura, nigra, & odorata.


B. pin. Clematidis Indica 1. foliis lentiscinis, candidis maculis aspersis: Ligni colubri 3. genus, Garz. Frag.

Cū Prorex in Iasanapatan insula Zeilan contermina esset, dono data est illi hæc radix. Similem in Continenti Goz nasci ferunt.

Hanc mirificè prædicabant, & adversus venena pollere aiebant.

COLVBRINVM LIGNVM HEDE-

raceum foliis Bryoniz, Acosta 1.



Nascitur in Malabar Hedera modo, colore Dracunculi majoris, sive Serpentaria; folia illi sunt Bryoniz ferè similia, integra tamen initio, nervoque prædita per longitudinem excurrente, & quinque aut sex venis in latera vergentibus; successu temporis accedunt exigua foramina, quæ paulatim cum foliis incrementum sumunt: donec tandem omnino folia scindat,

eaque Vitis foliis similia reddant; conspiciuntur enim interdum in eadem stirpe, folia integra, alia exiguis, nonnulla majoribus foraminibus prædita, omniāque adeo inter se dissimilia, ut ejusdem plantæ folia, minime esse videantur. Tantam verò habet hoc lignum cum colubro similitudinem, ut (Acosta tradente) qui non norit aut de die non viderit, si ad Lunæ splendorem noctu conspiciat, vivum colubrum esse existimet.

Acosta ex versione Clusij, Lignum Colubrinum præius. Cast. Lugd. Lignum Colubrinum 1. Acosta, B. pin. Clematidis Indica 4. Malabarensis foliis Vitis, color Dracunculi.

Vulgò præstantissimum censetur remedium adversus colubrorum [unde sibi commune cum aliis nomen Colubri ferat] & viperarum morsus: incolæ sanè dum in agros tendunt, magnā ex parte circumferre solent hoc lignum (sunt enim in ea Provincia multæ vipere, varæque serpentum genera) atuntq; solo ejus odore serpentes fugari, & si, dum colubros venantur, illos attingere hoc ligno queant, illico rumpi & extinguere.

COLVBRINVM LIGNVM DVDA

Sali Canarinis, Acosta II.

Ligni Colubri alterius (cui nomen apud Canarinos est Duda Sali) planta admodum brevis est & tenuis, triaque solummodò folia habet, mollia, lævia, saturatius virentia: flos aut fructus non conspicuus, nec quisquam se vidisse asserit: radix oblonga & tenuis est, minimo digito minor, hinc inde nonnihil extuberans & summā tellure sepiens, exterior ejus cortex valde tenuis est & cinereus, nullo,

Duda Sali.
Diffr.



pulso, dum gustatur, manifeste sapore praeeditus, deinde tamen gustum in ore relinquens suavem, & uti Moribus odoratum; fistis est undique hic cortex, & sponte se se expedit ab alio crassiore, flavoque cortice subtus nascente, qui odorem Loti silvestris, sive Trifolij odorati vulgaris refert, & saporem Glycyrrhizae dulciorem; praemansus odore admodum suavi, nec in jucunda mordicatione,

momentanea tamen, praeditus esse deprehenditur; ipsa materies lignosa est, candida, dura, & insipida; folia Napi saporem referunt; germen producit haec radix supra terram circiter quatuor uncias longum, in caput extuberans.

Lugd. Lignum Colubrinum 2. Acoetz. B. pin. Clematidis Indica 5. Malabarensis altera radice serpente; Palo della Calcebra; Cast. ap.

Invenitur in Malabar altera ligni Colubri stirps, proveniens in locis humidis & inter arbores, praesertim vero secundum illas, quae Angelini nuncupantur, nec procul a mari.

Tritam radicem cum aqua rosacea aut vulgari, vel cum vino indifferenter enim Canasini ut auctor est Acosta utuntur, praesens certumque asserunt remedium adversus omnis generis serpentum morsus. Plurimus etiam ejus est usus in febribus continuis, tertianis sive syncope, ventriculi debilitate, & cordis tremore; daturque adversus omnis generis venena. Multi mihi isane affirmarunt, dummodo manu hanc radicem tenerent, nullos serpentes, vel alia similia virulenta insecta formidare: & certissimum esse, serpentes & viperas ejus aspectum minime ferre posse, sed fugere, celerimeque in aliam partem sese propere, si quis ante serpentes projiceret. Periculis etiam censetur iis quibus anhelitus ab ore vitato aut dentibus corruptus foetet, modo eam continuo mandant, dentiumque cavis gestent.

COLUBRINUM LIGNUM CLVSII

Pao da Cobra dictum, forte
III. Acoetz.

Nvllum dictorum Ligni Colubri generum cum hoc convenire facile animadvertet qui descriptiones diligenter conferet: & haud scio, inquit Clusius apud Acostram, an Garciae ligno Colubri nocongener sit lignum illud, cuius iconem ad me mittebat Iacobus Garctus Londinensis Aromatarius; erat vero haec icon delineata, ex fragmento ligni cum tubete, sive superiore radice parte in nodum coacta. & suo etiamnum cortice (cujus superficies ex clavo pallidebat & rugosa erat, cortex vero ex albidus erat) testa; majoremque quam ipsum lignum amaritudinis, quod crassi alieujus fusticis non qualis a Garctis & Acostra nostro describitur, fuisse videbatur.

Fragmentum vero illud Pao da Cobra nomine insignitum repertum fuerat in magna illa navi Pizro-
Tom. II.



B. pin. eandem suspicatur cum Clematide sua Sym. Indica 6. quae est Colubrinum lignum 3. Acoetz.

RADIX MALACE QVADAM

toxicis sagittis resistens

Radice quandam in Malaca inveniri rumorem sparsit Garctus, quae adversus vulnera sagittis, toxico illitis facta praesentaneum exhibeat remedium.

B. pin. Clematidis Indica 7. Cur autem non ostendat quaequam causam Radicem hanc Malacae ad Clematidem referat? Indicare debet, si Clematidis sit appellanda, quae in parte aliquam cum ea habeat cognationem.

ARBOR ANGELINA

CAP. XL

Quae arbor sit Angelina, cuius Acosta sub Colubri ligno meminit, edoceri non potui, inquit Clusius, licet diligenter ab Hispanis & Lusitanis sciscitatus sim, atque ipsorum plerique existiment, peculiarem Malabar regionis arborem esse, nobis incognitam: quam mirum est Acostram non describere.

An C. B. pin. Lignum durissimum, ferri durissemum emulans 3. Angelina arbor apud Caginum, ex cuius continuo trunco naves Tonas vocatas extruunt tam grandes, ut una 10. vel 20. dolia aquatica vehi possint, cuius lignum adeo durum ut ferrum atterat, Linscot. part. 4. Ind. or. cap. 14. & par. 7. c. 27. An arbor cuius pars ima crassitie 24. orgyatum in Guineae insula Formosa; par. 6. Ind. or. c. 4.


HALICACABVM PEREGRINVM

multis, sive Cor Indum.

CAP. XLI

Non nisi adminiculo clavicularum quibus pernix advolvitur, humo surgit, caulibus striatis, glabris, foliis lato virore nitentibus, Apij alicuius fere divisura, gustu viscida, in iis pili quidam minuti, e quorum aliis pediculi exeunt floribus donati albis, quos turgida excipiunt vesicae grana continentes, Piso parvo similia, nigricantia partim, partim albida, in quibus cordis effigies pulchre delineata; radix subest digitali crassitudine, multo miore, fibrosa, lignosa, duriuscula.

HISTORIAE PLANTARVM



Cord. hist. sic de-
scribit; Dorycnium
ex brevi caulis tri-
co-plagis singulares
& striatas emittit
juncea gracilitatis
viticulas, duorum
plerumque cubito-
rum altitudine, te-
nuia affixa viticula
ascendentes. Equi-
bus per intervalla
striata pediculi tria
folia Apio similia
ferentes prodeunt,
& quodlibet eorum
in tres partes per
ambitum profun-
dius incisus dividi-
tur. hae quo sum-
mitati propinquo-
ra fuerint, eo mino-
ra etiam sunt [gusta visida, in foliis sunt quidam pili
minuti] sex foliorum alis singuli exeunt pediculi, lon-
gitudine digitali, gracilitate sua mediocri filo aqua-
les, in extremitate duobus brevibus, & retro flexis
capreolis contrario annexu sibiipsis oppositis, vir-
gultorum alas ac furculas apprehendentes, quod me-
dium viticulae ex ascendente & imbecillitati sua con-
tulerit possint. In fine pediculorum ante capreo-
los fert flores candidos, parvos, exiguis: ita luteo
colore flammibus, quorum magna pars caduca ap-
ud nos; qui vero abortivi non ceciderint, sed re-
manerint, & medio triquetros densos & acie infla-
tos emittunt folliculos, magnitudine Halicacabi
vesicis aequales, tenui admodum membrana co-
hærentes principio viride, mox in rufum pallescentes,
interius tribus membranulis a medio ad angulorum
intervalla usque transeuntibus in tres camerulas in-
terseptos. Qui interdum non tribus tantum sed qua-
tuor constant angulis, verum hæc non est propria
eorum, sed monitrosa forma ex superabundanti in
ea parte nutritiva humore caulam & originem
habentis singulis camerulis, ubi in medio folliculo
conjuguntur, singula semina innascuntur magni-
tudine parvi Pisi, figurâ rotundâ, colore nigra, ab
una parte, nempe in annexu candidam & suam ma-
gnam maculam habentia, figurâ quidam tenus A-
zari folium, vel latiusculum Cor imitantem, unde
etiam ipsa semina grana Cordis appellantur, ea foris
dura sunt, intus vero candidum & inflexo septo di-
stinctum nucleum complectuntur, sapore dulcem
radicem habet, digitali crassitudine, multis fibratam
cirris, [lignosis & durissimâ] Astiva est herba.

Hæc Cordi descriptio mihi placet, cui apposita
figura Tragi, & ascriptum a Gesnero, se nec Dory-
cnium putare, neque Solanis cognatum, etsi aliqui
Halicacabum peregrinum nominent. Cordus au-
tem in Diosc. prodidit nullum ex veteribus, tum
Græcis, tum Latinis Dorycni; herbam descripsisse,
præter Dioscoridem, qui historiam ejus ex Crateva
desumpserit: Plinium & alios quoddam credidisse,
Dorycnium idem esse cum Solano furioso, quod
salsum esse Nicander, Dioscorides & plures, alij te-
stentur. Revera autem esse hanc herbam Dory-
cnium opinatur Cordus. Seritur, inquit, a Vete-
ris Monachis, & à paucis in Germania Medicis her-
ba, quam Grana cordis & Halicacabum alterum vo-
cant, ab Halicacabi fructus similitudine. Habet hæc
omnes notas & vires, quas Nicander & Dioscori-
des Dorycni tribuunt [Reprehendit hanc opinionem
Matth. Lus. Gesn.] Nola tamen folia non conveniunt,
quæ Dioscorides Oleæ foliis similia esse dixit. Sed

hoc me nihil movet: Desumpta ex Crateva est hi-
storia, potiusque corrupta, deus iste, ut de foliis a-
giatur. Respondent candidi flores, folliculi, unde e-
tiam Halicacabus à veteribus & nostris appellatur.
Conveniunt etiam ad amissim in folliculis conten-
ta, rotunda, dura, levia & colore varia semina. Con-
venit etiam eorum numerus, & commanducata
laicum habent colorem & saporem, quas notas
Dorycni Nicander tribuit. Quinetiam somnifica
sunt ejus semina, nec sine periculo vitæ intra cor-
pus sumuntur. Quapropter cum omnes alie notæ
conveniant, verisimile est in foliorum comparatio-
ne mendum esse. Scimus hanc herbam, vidimus &
gustavimus. Propterea non ex aliorum relatione
ista de Dorycni scriptimus. Grana ejus comesta
suaviorem somnum quam Opium afferunt: Sed ca-
vendus est magnus illorum numerus. Hæcille de
Grano cordis, quod si vires possidet, quales illi tri-
buunt Cordus, non poterit esse Dorycnium Diosco-
ridis & Nicandri, qui omnino diversas illi adscri-
pserunt facultates.

Trag. Dod. gall. Euch. Roettlin, Vesicaria nigra si-
ve peregrina. Fuch. Ger. & Hort. Lus. Halicacabum ^{Vesicaria}
peregrinum. Matth. Vesicaria genus almd. Dod.
purg. & hist. Gesn. Cam. h. Tab. (cul & Cardispermis:
Nomen autem germanicum, Ser Balsam opffel
um ander Gieschledr/ non convenit) Euch. Roett-
lin, Lugd. (qui & Fuchsi) & Matthioli figuram exhi-
bet) & Lon. Halicacabus peregrinus. Gesn. coll. Ca-
pit. Monach. Halicacabus Fuchsi (supplet de hor.)
peregrinus, quem Fuchsinum & alios Solanum Vesi-
carium per eorum vocare scribit, cum tamen toto
genere a Solano Halicacabo distat, nec è Solano
genere sit. Non probat etiam (ut & Matth.
Colum. & Dod. qui cum Grano & Serapione Ab-
rongo & Abrugi dicto, convenire dicunt) Dorycnium
à Cordo dici.

Lob. ad dubitat, Pisum cordatum sitne, potius
Hopyrum, quam Melanthi, quædam species, aut Tri-
solum palustre: Mavult tamen amplecti amici cu-
jusdam sententiam quæ Hopyrum statuit, plantam
vulgò Cor Indicum vocatam, olivæ Halicaca-
bum peregrinum. Idem alio loco etiam ostendit si-
bi non placere eorum opinionem, qui Vesicariam
cordis effigie Dorycnium hantolantur. Eid. obi. & ic-
plate Pisum cordatum, ut & Schv.

Labellæ se opponit Solanum, dicens, neque Ve-
sicaria Indica, Pisum cordatum, vel Cor Indicum di-
cta, ad Penæ amplexu cujusdam sententia Hopyrum pu-
rata, Hopyrum est. Nec, ut idem Penæ scripsit, pha-
sioli nomen, quod nonnulli etiam folium intersec-
tantur, habet, quod ipse ignorans, Dodonæo obji-
cit, ut intellexisse videtur.

Cam. ep. & hist. Vesicaria sive Halicacabum re-
pens. Cast. Vesicaria altera. Solanum peregrinum,
Lac. Faba inversa recentiorum, Gesn. B. apud Matth.
Solanum 3. sive Vesicaria repens. Eid. pin. Pisum 10.
Vesicarium fructu nigro, albâ macula notato.

Halicacabum peregrinum multis sive Cor In-
dum, Ger. Münch. Fopflin/h. Calvariam Mona-
chi Schwarz oder Welsch Schulten / nigram seu
peregrinam Vesicariam appellare placuit Trago:
Cam. autem in ep. & hist. Serapionem & Herzfö-
ner nominat. Belg. dicitur Dod. gall. Vreinde Erics-
ten & Swerte Erieten vom over See, Gall. Halica-
cabon estrange, Fuchsius tamen halicacabon saniegetis
appellat: Ital. Cam. in ep. & hist. Vilucchio, Jac. sero.
Argl. Blot white herb.

Halicacabum peregrinum, huius mihi provenit, ^{Locus et}
sed semen non maturavit. Lugdun. Geneva &
Basilea cultam in hortis, & flores proferentem
observavi mente sumis, Iulio, Augusto & Se-
ptembri.

Cred:

Creduntur velle semen ad omnes cordis affectus, ob notam, quā insignitur. Matthioli etate scenas, aegias, tuguria, & pergulas inuēbrabat: quin eundem ad iuniorum fenestras topiario opere contegebat & operabatur.

CACUBALVM QVIBVSDAM vel Alline bacifera.

CAP. XLII.



Haud absimilis huius radice ab Hippia majoris, uti nec folia: ad samenta longissima, duriora, & reptantia, nec tamen transmittunt a quo cortex hirsutus facile stritu cedit, crebris geniculis tuberosis donata. verum florum hic prima est observatio, quæ turgidis Halicacabi nutculis vix tantillum foliorum, quæ numero quinque herbido pallore albescunt, apices buidos proferunt, penitus latentibus staminibus simul & bacca rudimento, quæ per maturitatem nigra, grana continens nigra, nitentia, rotunda, compressa.

Hanc ita describit Clusius: Samentis verius quam caulibus, usque numerosis, prædita est hæc planta, geniculatis, flexilibus, humanam altitudinem plerumque superantibus, præsertim si fructices, quos scandere possit, vicinos habeat, alioquin propter infirmitatem, humi diffusis: bina singulis geniculis & internodiis adnascuntur folia ex adverso sita, Allines vulgaris foliis figura & calore similia, longe tamen maiora, & ad Helxines foliorum amplitudinem accedentia, mollia: flores ex calicibus, seu folliculis prodeuntes ex herbaceo candidi sex foliis constant, quibus antecedunt acini Piperis nigri, aut granorum Juniperi vulgaris magnitudine, folliculo illo inclusi, initio virides, per maturitatem nigri, semine exiguo & plano pleni: radix cancellata, valde fibrosa, longa & samentosa: quæ singulis annis novos caules promit, aliis per hiemem marcidis & corruptis.

Lycet saporem insipidus & herbaceus secedit, ut eam ad Allines genera retulerit Clusius. Liberum tamen omnibus reliquit, ad quam voluerit classem referre. Sunt, inquit, quibus Alline repens, quædamque non (quam nonnulli Lucas Glynus, ad hunc Dodonæi Lobelii, & aliorum in hunc modum vocant) dicatur, quoniam multis cum Dioscoridis descriptione notis conveniat. Sed ob notas aliquas, quas cum Cyclamino altera habet, sic denominanda non erat. Non ipsius, ut idem esset, sed in omnibus conpense oportebat.

Recentiorum planta, Alline majoris facie, bacca solarij Cacubalum (aut Lob. Plinij) Intellexerunt Valerianum Dourez ascripsit hæc nomina: Cacubalum Plinij, Vera Polemonia Dioscoridis Galienij.

Geligerus autem negavit esse Cacubalum, aut Polemoniam: Lugdunensis contra Cacubalum Plinij esse asserere videtur, ita enim eam inscribit, ac Tom. II.

dicit esse aliorum Ocimoides repens: nec deesse, qui Clymenum herbam esse putent à Plinio l. 2. c. 7. descriptam. Alline bacifera (ita enim vocari potest magis particulariter) dicitur Alline repens à Clusio hisp. & hist. ap. alt. Lob. obs. & ic. Dod. Cast. & Cam. h. A Thalia Alline maxima fructu nigro. A Tab. Clematis urens 2. Leinnen oder Walderben / non laxi errore, quem sequitur Gerardus, qui Clematis urentem multifloram, Double flowered Virginæ Bower. Est B. phyt. Alline 9. In pin. Alline 6. five scandens bacifera: Cyclaminus altera Diosc. Chini.

In hortis in quibus alij quorundam suos renovat caules ex radice perenni, floret & baccas fert è semine collecto in Gallia Campania. Copiosa invenitur Salmanticensi agro, umbrosis locis & circa sepes: nostris etiam nunc in hortis frequens & pergulas scandens: aliquot vero post annis abunde observabam, inquit Clusius, pone attem Eberstori, loco paludoso inter arundines. Floret tota æstate. Secus, auctore Dodonæo, margines agrorum inter repes & sentes crebro reperitur apud Italos, Germanos, Gallos ac etiam Belgas, ubi lætum secundumque solum. Iulio mense huius flores: fructus plumis suis incanescens Autumnno dependens.

Dodonæi refrigerans hæc esse videtur & Alline sacculatae potentia proxima. Vim refrigerandi adstringendique obtinere, oculorum inflammationibus cum potentia illini, succum aurium doloribus infundi, & omnia, quæ Helxine dependens, prodidit Clusius.

NASTURTIUM INDICVM FO- lio peltato scandens.

CAP. XLIII.

Pregrege elegantia est ex Indiis delatum Nasturtium, cui cum nostri orbis Nasturtio, præter



saporem odoremque, nihil est commune: folia peltata, circinata, ferè rotundata, sæpè laciore quàm longiora, nonnunquam & Hederæ modo angulosa, superne glabra, inferne brevi lanugine hirsuta, medio ferè ut in Cotyledone, unde radij in ambitum porriguntur, pediculi excipiunt palmarem & sesquipalmarem subrubentem, tortilem & capreolorum, ritu bacillo depacto sese circumvolvent: quo

etiam complexu nituntur cum ramis caules: ceterum ex foliorum alis undatim tortiles pediculi rubentesque exorti florum sustinent delicias artificij arguti plenae: postea parte productum corniculum sextantem circiter longum ex flavo puniceum, in quinque laciniis digitatas, concolores; striatas, quæ reliquo flori committitur, faciens, quarum terna duo suprema florum folia, sursum explicata à tergo suffulcunt, colore luteo prædita, miniatis lineolis ad basin striata, per supremam oram subrotundâ mucrone brevisculo donata: quod in reliquis tribus est videre, minoribus licet & rotundioribus ac veluti cordatis radiatum digestis, quorū tamē basis nō virgata.

aut maiorem aliquam dosim præscribunt, purum & merum succum imperant. Purgat Scammonij succus per inferiorem ventrem vehementer, nulli aliorum purgantium medicamentorum potentiâ cedens. Nullâ enim parte, ut Oribasius ait, superatur ab iis quæ agitant & commovent. Efficit illud non vehementer aliqua calidâ facultate; sed aliâ quadam latente totius substantiæ proprietate. Nam gustu quidem nulla in eo caloris vehementia deprehenditur. Cuicumque siquidem liquori aut rei permisceatur, nullam ei vel amaritudinem, vel acrimoniam, aut alium ingratum saporem communicat. Quamobrem nec inter calidissima, ut plerisque videtur, sed inter moderatius calida & sicca habendum censet Dodonæus. Extergit autem & educit potissimum bilem flavam; serosos item tenuisque humores, & quandoque pituitam, ventriculo tamen magis, quam reliqua omnia medicamenta, ut Paulus tradit, noxium est Scammonium. Mesueus verò non modò ventriculo grave atque molestum, verum & intestina ipsam abradere; interna viscera erodere; venarum ora dilatare, totiusque suæ substantiæ essentia cordi visceribusque reliquis obesse sentit. Immoderatum & minus opportunum idcirco ejus usum animi sequuntur deliquia, ventriculi subversiones, alvi fluxus, dysenteria & tenesmi. Occurritur his malis, eodem auctore, si Scammonium in cotoneo malo decoquatur; & muccagine psyllij, prunorum carne aut succo, aliisve lentis similiter succis permisceatur, additâ mastiche, aut aliquo ex moderatè astringentibus. Plinius noxam ejus tolli posse affirmat admixtâ Aloë: Veteres Scammonium in malo cotoneo etiam decoxerunt, sed omisso Scammonio ipsum malum edendum præbuerunt, quod absque stomachi subversione alvum subduxit: ut lib. 1. de facultatibus. Galenus scribit: & 3. de simpl. Quinque de causis corporibus læsiones inferre potest. Prima est, quod flatus quosdam mordaces gignit, usque adeò ventriculum lacessentes, ut sumentibus nauseam commoveat. Noxa hæc tollitur, si in excavato cydonio malo, clibano, aut prunis inassetur, pasta urdique circumdabit: præsertim additis aut sceniculi, aut dauci, aut apij semine, aut galangâ. Inflammat deinde acridinis exuperantia corporis spiritus: quod fit, ut facili febris excitet, iis præcipuè qui obstructionibus viscerum, & humoribus putrescentibus obnoxij sunt. Sed id nocumendi aufertur, admittis inter coquendum, quæ refrigerant, & fervorem extinguunt: cujusmodi est psyllij feminis spissamentum, prunorum decoctum, seu potius pulpa, rosarum & violarum succus, aut dilutum, aut aqua: quin etiam antè coctionem macefatur oleo rosaceo, aut violaceo, aut cotoneorum misti saporis succo, aut admixto rhoë, aut saccharo spodio. Adhæc, quod magnâ tum attrahendi, tum aperienti facultate sit præditum, immoderatas alvi fluxiones facit: vasorum enim oscula plus quam par sit, aperit. Hæc læsio adimitur admittis rebus adstringentibus, cohibentibusque, nempe mastiche, cydoniis malis, succoque ab eis expresso, & myrobalanis, præsertim flavis. Abradit præterea acri succo, quo scætet, intestina: proinde & tormina, & dysenteriam, & tenesimum excitat. Sed deletur hoc incommodum additis humidis pinguibus, lentisque medicamentis: cujusmodi sunt tragacanthum, bdellium, amygdalinum oleum aut rosaceum: item prunorum pulpa per se, aut saccharo asservata, psyllij spissamentum, mastiche, cydoniorum mala post sumpta, & calida aqua post bibita: utpote quæ medicamentum ociosum à ventriculo & intestinis expellant, & ita simul noxam prohibeant. Hinc est, quod prudentes Medici, qui celerius Scammonium à ventriculo & intestinis deiciant, hordei jusculum cum saccharo superhiben-

dum præbent. Obest postremò Scammonium coti-
di, jecori, ac ventriculo substantiæ suæ totius pro-
prietate. Vitium hoc aboletur, si illi cum calida, tum
frigida admisceantur medicamenta, quæ cordi, jeci-
nori, ventriculoque opem suam præstant. Dejecit
Scammonium valentissimè bilem, quam à valis & à
sanguine exhaustit. Ejus dejecendi facultas haud
sanè aliis medicamentis absumilis est, quæ purgant
cum labore & molestia.

De dosi Scammonij non consentiunt auctores, De dosi
nam Scammonium posse ad 3. usque tutò dari cen- Scammonij
suit Dioscorides, quamvis rursus dicat posse inter-
dum satis esse 3. s. ut liberalis fiat purgatio: duos ve-
rò obulos, h. e. scrupulum, posse commodè alvum
ciere. Videtur itaque dosim ejus esse à 3. ad 3. Paulus
verò ait dando esse iij. obulos, cum quo Aëtius &
Actuarius consentiunt. Rufus usque ad 3. j. & radi-
cis usque ad 3. ij. exhibet. Mesueus tamen, quem om-
nes ferme juniores sequuti sunt, non audeat 3. dare,
imò consuevit non esse excedenda grana xij. sicuti
minimum, quod dari possit, ut ventrem solvat vo-
luit iij. esse grana. Eum autem loquutum esse puto
proptiè de Diagridio, de quo mox. Videtis igitur
quanta sit varietas scriptorum. Vnde non est mi-
rum quod Avicenna admiretur varietatem ponde-
rum in hoc medicamento, quam varietatem ipse re-
fert ad varietatem locorum, nã Dioscorides fortasse
exhibet unam drachinam illius Scammonij, quod
mite erat, & ortum in miti loco: vel quia Scammo-
nium illud erat mite si non ratione loci, saltè ob
vetustatem. Sed sit utrunque. Ego scio (inquit Fal-
lop.) quod Scammonium aliquando exhibitum in
pauca quantitate non evacuat: aliquando in pauca
exhibitum evacuat præter modum: aliquando è con-
tra: unde nescio quid dicam de dosi hujus medica-
menti: consulo tamen vobis, ut semper exhibeatis
paucam quantitatem, quæ quantitas sit potiùs pro
calcare: vocatur autem Calcar pauca Scammonij
quantitas addita medicamentis purgantibus pro ru-
sticis, vel pro aliis robustioribus, & cervicosis qui-
busdam hominibus, quibus nihil fuisse videtur fa-
ctum, nisi pharmacum eduxerit usque ad ultimum,
& plurimum ut ita dicam cacerint; & idè pharma-
ca pro hujusmodi hominibus debent habere calca-
ria, qualia etiam debent esse pharmaca pro Mona-
chis, & eò magis quia difficile in ipsis fit evacuatio,
quoniam cum vescatur malis cibariis semper abun-
dant crassis excrementis, & viscidis humoribus. Vn-
de præparetis quantum velitis, semper tamen diffi-
cile moventur. Itaque utamini semper pauca quan-
titate Scammonij, & stetis potiùs in dosi Mesuei,
quam etiam non excedetis, quam in dosi Græcorum,
quos nolim ut in hac re imitemini. Tractatus qui
pro quo, Scammonem loco aut Cucumerem agre-
stem, aut lac Tithymali, aut Euphorbium accipis
Sed Sylvius in Antibal. Scammonio deficiente, Ricci-
num probat.

Scammonia, quam Diosc. describit, paulò diversa
est, attestante Celsalpino, à Scammonia ejus, flori-
bus ex candido pallescentibus, ex semine è Syria
misso enata. Est hæc nobis Scammonia Syriaca flo-
re majore Convolvuli.

Scammoniam aliam quandam Monspelij osten-
dunt, Scammonia Monspeliaca, à Gesn. h. (qui por-
tionem pingit in figura adhibita Scammonia Cor-
di) Clut. Lob. Cam. & nobis vocata, cujus est & alte-
ra varietas.

Ægyptij quoque suam Secamonem [Apocyno affi-
nem] Scammonij speciem affirmant.

Camerario apud Matth. germ. lib. 4. cap. 38. Volu-
bilis sive Convolvulus major videtur genus Scam-
monem.

Scammonia tenuis Plinij, ita tradentibus Cordo
in Diosc.

Obest cordi.

De dosi
ScammonijAuctores
de dosi Scam-
monij ut in-
terpretandoCalcar pau-
ca medicamen-
tum.Substitu-
ma.Acquisita
Scammonia Sy-
riaca flore
majore Con-
volvuli.Scammonia
Monspeliaca.Apocyno af-
finis Seca-
monem.
Convolvulus
major.

Helxine in Diosc. Ang. Cam. h. & Cels. nihil aliud est, quam
Cissampel. Helxine Cissampelos.

Volubilis Planta, quam Tab. pro Scammonio minore exhibet, est nobis Volvulus terrestris.

Convolv. peregrinum. Idem jam dictus autor exhibet & secundum Scammonium minus Plinij, quod Convolvulum peregrinum inscribitur.


An Nil Arabum quibusdam Testis est Celsus alterum genus pro Scammonia ostendi folijs subulatis flore exulco, quam Mesues Volubilem lanuginosum vocat. An hæc Nil Arabum quibusdam.

Mechoaca. Mechoaca Scammonij species, & non temere quidem, ait Dodonæus, creditur. Ob mala symptomata, quæ excitat Mechoacan genus silvestre, Scammonium à Monarde vocatur. Vide Mechoaca. Et de his omnibus presenti libro pertractatur.

Thapsia. Scammonium dici de Thapsia Dioscoridis & autor est Tragus L. c. 8. & Brunfels. Onomastico. De hac nos lib. 27.

SCAMMONIA SYRIACA FLORE majore Convolvuli.

Defin. **E** Syria delata Scammonia, etiam nostro assuevit solo, licet nullum ad ecchylosin studium adju-



Smilacis folio.

Cissampeli floribus.

Defin. Cels.

gamus: profert autem è radice longâ, crassâ, lacteo succo prægnante, multas aliquot cubitorum viticulas, proximis radicis sese convolventes scandentesque: folia triangula ceu hastilis barbatus, mucro, Smilacis lævis æmula, sed minora, glabra, tenuia; flores calathoides non nihil purpurei, Helxines cissampeli floribus proximi.

Hanc ita describit Celsus.

Tenuis viticulas fert, bicubitales: folijs triangulis, effigie sagittarum, parvis: flores ex candido pallescentes: fructus veluti pinguedine obductos, in quibus semina nigricantia: radicem grandem Raaphano similem, succosam.

De Scammonia Cordum. De Scammonia nostra Syriaca Cordum loqui suspicaret, si folia non diceret spinosa in hist. l. 4. c. 10. cum ait. Scammonia est, cujus liquor est Scammonium, Convolvulo per omnia similis, quantum ad viticulas, flores, lacteum liquorem & qualitates attinet: folia quoque ab hujus folijs parum discrepant: sunt enim ipsius folijs similia, sed pilosa, triangularia, atque in alata sagittæ figuram redacta. De radice prius dixi, rat in Diosc. majorem esse Convolvuli radice. Et hinc etiam Cissampelum, tenuem Scammoniam vocari, quoniam multò tenuiorem radicem, quam Scammonia habeat. Verùm hæc descriptio Cordi ex Dioscoride concinnata est. Figura quidem malè picta aliquatenus nostram Scammoniam Syriacam exprimit: ramus verdè appictus, nō est Scammonæ Cordi, sed Mor speliensis. Quintam speciem Volvuli Mesues, esse plantam illam scribit Fallopius, ex cujus radice emanet Scammonium. Græci (inquit Dodon. purg. & hist.) *μαμασσηνίας* Latini ferè Scammonium nominant: ita appellantes non modò Arpem ipsam, sed & densatum concretumque succum. Dicitur & à nonnullis *μαμασσηνία*, ab alijs

μαμασσηνία; officinæ succum crudum quidem Scammoniam; in cotoneo verdè malo dectum, Diagridium vocant: quasi *μαμασσηνία*, i.e. lacrymulam. Est verdè ipsum Scammonium (ut cap. de Campana cerulea affirmat) nihil aliud, quàm species Smilacis lævis, radice crassâ.

Lactaniam hanc, scammoniamque Volvulam (unde fortè, Lobelio adversè nomen Volvulo fuit) solo penicillo commentatoris pictor exprefit. Cū tamen paucæ sint plantæ, quas de facie & facultatibus, penitis notas habere, magis interfit boni Medici, & Pharmacopœi, quam Scammonium hoc Syriacum, Antiochenum & Norbonense. Anno igitur 1562. indefessus ille herbarum novarum vestigator Venetus pharmacopœus Sequinus Martinellus, ex Syriaco Alepo miserat plusquam centum libras glebæ Scammonij Antiocheni succo concretæ, cui exprimendo interfuerat: conchas etiam non paucas lacrymâ plenas, seu Diagridio antiquorū, cum semibus angulosis Volubilibus. Hæc semina tum Patavij & Venetijs primo Vere terræ mandata, in luculentam Volubilem, seu Volvulum abiêre, aded sinuosis Smilacis folijs, triquetris, vel potius Cissampeli folijs, floribus, & facie, ut planè nostræ Cissampelo eandem dixisset: verùm radice insigni fuit, & mole grædem Bryoniæ radicem æquante

atque teneitudine simulante: foris tamen pulla, aut cinericia, intus albidè carne: cujus fissæ torulus sive cor medium exemptum, planè idem est, aut simile radici communis & probationis Turbith officinarum: verdè facilius aliquantò frangitur hæc, cunctis perinde gummosa succoque lacteo prægnat, atque Turbith. Hanc eandem postea Antuerpiæ, quò semen miseramus ferendo meminimus, speciosam factam, floribus & viticulis quinum & ferum cubitorum, profum nihil diversam, cujus Guilhelmus Dries, non minus peritus pharmacopœus, quam probus civis Antuerpiæ, adnata, radicemque pululationes excisas, exsiccatasque ostentabat, aded Turbith Alexandrinum ementita, ut discriminis perparum, aut nihil percipi posset. Hæc Lob. adv. qui in obs. figuram habet eandem cum Dodonæo, titulo Scammonij, Adv. 272. In ic. vocat Scammonium Syriacum, Antiochenum, & Scammonium. Gesn. h. est Scammonia è Syria allata. Ang. & C. B. (cui prima) Scammonia Syriaca. Cam. h. Scammonia Antiochena: Eid. hist. & epit. ut & Lon. & Cast. Scammonia. Rauv. Scammonium verum. Cels. Scammonia floribus ex candido pallescentibus, ex semine è Syria misso nata. Math. in comm. cum mag. fig. Scammonia. Lugd. Scammonia Matthioli.

Habui Lugduni, Genævæ & Montbelgardi in hortis. Basileæ in horto D. Platei florebat Junio, & Julio, Augusto, & Septembri. is hieme recondebat. In calidis, per qui exit solo, veluti in Afix Myfia, Syria, aliisque similibus. Reperitur & in Creta insula, Bellonio teste. Verisimile est, ubi suæ spontis est, citò & plurimâ deinde Æstatis parte florere: nam & in Belgio, ut Diosc. tradit, æstivis mensibus subinde cum flore videri potest. Scammonia Antiochena Cameratio aliquot annos duravit asservata in fide libus per hyemem, & Æstatis initio floruit, sed semen nunquam absolvit.

Meminit idem Corrusum patritium patavinum, rerum naturalium summum indagatorem ex crassis radicibus aliquot uncias succi extraxisse. Ait ut si propè Tithymalum feratur, aded ejus caliditatem accendi, ut veneni naturam acquirat. Hujus tamen liquor caloris acrimoniæque vi per ætatem amissâ benignior non nihil evadit. Quod verdè non eas notas habet Scammonium, quales illi Diosc. tribuit, causa esse putatur, quod hoc tempore non observent veterem parandi modum, ac non ex incisa, sed dissecta prorsus vel expressa radice, aut è stipitibus & folijs contulis paratur: alioqui tanta copia Scam-

monij quo pacto quotannis ad nos adferri possent vel etiam lacte Tithymali saepius adulterant. Pulcrè mehercule alicubi Ruellius inquit: Nulla medicina pars incertior, quàm quæ ab alio orbe quàm nostro petitur.

SCAMMONIVM, SVCCVS SCAMMONIÆ densatus.

Deser.

Vulneratâ Scammonæa succus emanans lacteus concrefcit qui in magnas massas coagulatus importatur, tophosæ & satis leves taurini glutinis instar nitidas & veluti pelluentes, colore fulvo, nigricantibus aut cinereo, atque is quidem color potissimum elucet in pulvere, in quem levi digitorum attritu friatur, odore nauseoso, sapore amaricante & mediocriter acri.

Diagridium quid sit & in præparatio, per concoctionem.

Scammonium, succus Scammonææ densatus, per coctionem, aut etiam per macerationem paratus Diagridium appellatur. Confectio autem ejus per concoctionem hæc est. Accipitur cotoneum, extrahiturque durior ejus illa pars media, quæ semina continet (recisâ tamen superiori prius laminâ) cujus loco in excavatam partem Scammonium inditur: mox laminâ, quæ prius fuerat recisâ, pro coopericulo additâ cooperitur, triticeâque pasta circumquaque malo cotoneo obducitur, ac ita coquitur in clybano, h. e. vase fictili crudo. Quidam tamen succo ex cotoneis expresso, Scammonium macerant, ac Diagridium parant. Accipiunt autem Scammonij partes duas, succi cydoniorum partem unam; miscent probè, ponunt in locum calidum & quotidie movent, donec mediocriter induretur ejus massa: deinde formant pastillos, eosque quantum satis est exsiccant. Alij alium probant modum, & quidem ex malis communibus, ita, ut acceptâ ollâ, aut testaceo mundo vase, malis primò fundum ad digitalem crassitiem sternant, mox itidem tantundem Scammonij superponant, & sic subinde donec vas plenum fuerit. Mox autem carbonibus accensis, ac in camino posito vasi eoque optimè triticeâ massâ o-

Modus alius.

Optimus modus quæritur.

perto, quantum satis sit, coquant. Satis autem cocta dicuntur, cum mala induruerint. Ex cotoneis autem, quàm ex aliis malis per coctionem tutior & cum minori molestia fit purgatio. Quare & amplior ejus dosi sumi potest. Ac rursus magis ex aliis malis, quàm ex maceratione in succo cydoniorum. Sicut & magis ad purgationem videtur facere, cum ex hoc succo paratum est, quàm si sine hoc detur. De dosi hujus ac etiam facultatibus vide plura ante. Officinæ Scammonium præparatum, quod ut diximus Diagridium vocant, compositionibus ferè omnibus, crudi ac non præparati Scammonij loco adnascunt. De hujus dosi loquutum putamus Mesuem.

NIL ARABVM QVIBVSDAM, sive Convolvulus caruleus. CAP. XXXVI.

Deser.

Caruleus Convolvulus tortilibus viticulis, tomentosis, proxima quæque arripiens, in altum nititur, texturis topianis peridoneus, nisi longiorem vitam teneritudo, frigorū malè patiens negasset: folia palmum circiter lata, paulò longiora, formâ hederacæ, in tres acutas lacinias sinuantur, lanuginosa, colore ex herbido in flavum vergente, priora ad folia Sigilli B. Mariæ accedunt; folia Lob. ternis angulis singula, in teneriusculis pediculis; flores Smilacis lævis, exantheo colore adblandiuntur, extra tamen in singulas quinque laciniarum zona excurret albida, quo etiam colore totum floris in-

Folia hederacæ.

Convolvulus caruleus.

fundibulum tam extrâ, quàm intra tingitur, quinis foliis herbæ concoloribus obvallatum, in quo stam-



mina & apices laticeti altè reconducuntur; flores Dodonæo sunt veluti Smilacis lævis instar campanulæ, sed per oras angulosi, & colore in ceruleo purpureis; floribus Lob. è pediculis calice exeuntibus, latissimi autem *tasini floris*. Vincè pervincæ similibus sed oris quinis stellatim prominentibus angulis, Nolzæ ceruleæ vel asuræ effigies; semen nigricans Dodon. radix subest parva, fibrosa (gracilis, longa, Lob.)

lignosis nervulis fractu contumacibus fracta, Cicladamen, Hederamve annosam imitata, nonnihil hirsuta.

De hac planta hæc Serapio. Habel, i. e. Nil, est *Habel sapientis*. granum Indicum [*Granum Nil, Cartanum Indum, Habix.*] cujus planta, autore Isaac Eben Amram, similis est plantæ Lebleb, adherens arboribus duobus brachiis, vel tribus, habens ramos & folia viridia, & in radice cujusque folij florem coloris purpurei, similem pomulis in figura sua, quo decidente apparet semen in vaginis, in quibus latitant tria grana, minora granis Staphisagris lævia, tribus partibus divisa, & ista grana sunt id quod de ea administratur in medicina. Hujus etiam meminit Bellunensis in interp. in Avic. diceos. Habel Almesachin est herba quæ dicitur Funis pauperum, & est species Lebleb. *Funis pauperum.* Granum Nil est semen nigrum repertum in planta Volubilis cujus flos habet colorem azurum: & figuram Campanellæ similem, tendentem ad longitudinem aliquam, & hujusmodi planta non est herba, ex qua Nil seu Indicum [*Usque hac est, & est solum Nil, ex usque quo exprimitur succus, ex quo conficitur Indicum tingens.*] conficitur ut quidam putant, sed est species Volubilis nota, & semen hujus plantæ granum Nil, in Oriente administratur ad evacuandum humores grossos phlegmaticos & melancholicos, sicut ait Avicenna à quo in cura vermium administratur. Ex quibus ita dictis vel me tacente facile judicatu est, opinionem Tagaultij non esse recipiendam, dicens in l. i. can. Mesue, Nil granum esse Isatidem Græcorum, & vulgò Gallis passim Gueida, *du Gueide* dici, herbam notissimam, quâ insectores utantur in tingendis pannis. Addam tamen verbis Bellunensis argumentum ex ipso Mesue desumptum quo Tagaultij opinio sufficienter refelli videtur, nempe quoddam Isatidis semen vix possit mensurari pleno & vacuo: quum admodum compressum sit, nec quicquam simile habeat, cum reliquis fructibus, qui à Mesue loco jam citato recensentur.

Hæc est illa planta, quæ à Monachis in Mes. Vo-*Volubilis carulea.* lubilis carulea nominatur, cujus semen Bellunensis dicit esse Granum Nil. A Dod. gall. dicitur *Liferon bleu*; Conjugulum nigrum. Dod. purg. & hist. (ubi eam pingit & describit) dicit accedere lævium Convolvulorum numero, optimè etiam exprimere Campanam caruleam vocatam vulgò Campanam lazuram, & Convolvulum caruleum dici recentioribus, existimari autem Ligustrum esse nigrum, Colum. *Ligustrum lib. 10.* Nec sine ratione, quando quidem Smilax lævis

vis

vis major etiam album dicatur Ligustrum. Nam & ceruleo purpureum colorem subinde nigrum dicitur veluti Viola nigra. Esse autem qui hanc Campanam granum Nil Avicennae esse velint, & non differens quidem ab eo Nil, quod describitur c. 312. Illud enim Isatis Graecorum esse; illud verò peregrinam ac Indicam stirpem: ut non modò Avicenna, sed & Serapio testatur.

Cathartica Non desunt & aliae Convolvulorum species, quae ad Nil quoque Avicennae referuntur, uncaulis, spinulis asperis, alter absque illis. Sed Mechoata quoque potest & Nil, & Scammonium Americanum esse. Anil etiam Arabum & Turcarum in Guzarate aplerisque Nil vocatur. Nil tandem Germanorum, Pöpholix est.

Nunc quod ad nos attinet per Granum Nil Arabum quibusdam dictum praesentem intelligimus plantam. Lob. in adv. hanc intelligit per Asureum suum, sive ceruleum Convolvulum hederaceum, vel similem, exoticum, quem in Lep. pingit eodem titulo: in obs. autem inscriptione Asurei; sive cerulei Convolvuli, Campanulae lasurae herbariorum, adv. 74. Noctu florentis Pleutonariae dictae.

Gesl. h. Convolvulus peregrinus, vel ceruleus, Nil Arabum. Tab. Ger. Cast. & Cam. h. Convolv. ceruleus, de quo hic ait: Nil Arabum, vel potius Habal Nil Serapionis, Latine granum Indicum. Halimien circa Alepum ubi multum crescit, Persis Asia, Italiam Campanula Asurea aut stirps de nocte: quia noctu possimdm flores, sole oriente clauditur.

Lug. Volutus ceruleus, sive Campana Azura Lobelij. Dod. (ut ait Lug.) quidam Pothon ceruleum Theophrasti esse credunt, ornamento & umbraculis sepulchrorum laudatum antiquitus. Alij Pothon illum esse malunt Convolvulum purpureum duplicem Cortusij.

C. B. Convol. 5. sive ceruleus hederaceo anguloso folio: Smilax cerulea Dod. gall. [non inventa ab eo] sine icona, Scammonia similis flore ceruleo, Ang. Nil Arabum, Eyst. Campana cerulea, Dod. Bry. Convolvuli alterum genus, quod pro Scammonia ostenditur, Cxf. Campanula cerulea hederaceo folio, Syver. Quibusdam Pothos ceruleus Theophrasti: quibusdam Volubilis lanuginosa Mosuci.

Montbelgardi in horto E. C. flores Augusto & sequentibus mensibus, non facile autem maturescit semen. Hae, inquit Lobelius, non nisi hortus Italiae, Galliae & Belgiae nota, ubi amena purpura portectis atroxisque secus parietes & perticas sumibus viticis, gracilibus, umbracula concinnant, atque foenices visu per jucunda. Peregrinam hanc stirpem, & aliunde illatam sub sine aestus, si calida, fervensque fuerit, in Belgio flores facere scribit Dodonaeus. Gesnero flores ephemeri sunt: noctu enim se apertunt (unde florem noctis vulgo quidam in Italia nominant) postridie vi solis pereunt. Satus varie provenit, nunc infra palmi altitudinem consistens, at florens tamen: nunc altius excrescens, semel etiam ad cubitos fere novem, quae planta semper in quo autumnus maturavit.

Vich. Granorum Habal Nil in medicina, ut auctor est Serapio, proprietates est (ex Aben Mesrai) laxare phlegma, & mundificare ipsum. Preparatio ejus est, quod bene teratur, misceatur cum oleo amygdalarum dulcium. Et melius ex eo novum ponderosum, & non stypticum in sapore suo: & dosis à quatuor Kitar utque ad octo. Granum Nil (ex Habal) est carum Indum, calidum & siccum in primo gradu, & habet hoc, quod quando misceatur cum medicinis, facit moram in intestino duodeno, atque in illo quod sequitur ipsum, & est propinquum mesentericis, & facit ibi punctiones, & quum sumitur in potu solium, non laxat eadem die, nisi completis viginti

quatuor horis post ejus punctiōnem, & quando admisceatur ei Scammonia, facit ipsum descendere, & tunc laxat phlegma viscidum, & operatio ejus est etiam in educendo cholera, & fortassis accidunt ex potu ejus juvenibus stypticis in ore stomachi, & torsiones magnae, & si nimis sumperint, facit eos vomere, & fortassis inducit tenasmonem. Et dosis ejus cum aliis medicinis est drach. semis, sed simplex nunquam videtur dari in potu, nisi admisceatur ei Scammonia, quia juvat ipsam ad expellendum phlegma, & cholera, quoniam ipsum expellit humores duorum diversorum colorum per fecesum. Granum Nil semen, ut Bellunensis testatur, in Oriente administratur ad evacuandum humores grossos, phlegmaticos & melancholicos sicut dicit Avicenna. can. qui Granum Nil, Carthamum Indum esse dicit, ac calidum siccum primo ordine statuit.

CAMPANULA INDICA.



Congener videtur rare hae Campanula, ei quam Nil Avicennae nuperorum quidam esse volunt, tortillis bus flagellis hirsutis rubescentibus circum petuacis volutis in altu nitens; folia hederacea sive Cyclamini, acuminata, qualia nepe primum pululantia esse solent Campanulae, lasurae sive Nil Avicennae, ad pediculi uncia longiorem, rubetem, hirsutum, biloba, subtus suprag. pilosa;

flores campanulati seu cal. thi formae, calyci insident in quinque acutis laciniis diviso, villoso, nigricanti, plures simul juncti ferè, pediculo ex foliorum ala prodeunte.

Primum visa Argentinae apud D. Fridericum Meier qui Campanulam Indicam nominabat, nobis etiam Montbelgardo in horto E. C. provenit aliquoties, sed non maturavit semen.

An B. pin. Smilax laevis 7. sive Convolvulus folio subrotundo: qui 1. in prod. Convolvuli species altera, quae ad Nil Avicennae referri potest, Dodon. Campanula azura, Syver. Campanula Indica purpureo-violacea, Bry. Convolvulus Indicus flore violaceo, Eyst.

CONVOLVULVS BONA NOX dictus, flore candido, grandi.


Scribit Clusius l. 2. exot. cas. scd doctiss. Vito Simon de Tovar turbis illius primario Medico instructus exortos anno 1596. Hispal. delatos, certum accepisse, cui magna affinitas erat ad Convolvuli aliquo genere, quod tota facies respondere videbatur, licet longe major esset, quam ullus similis generis ipsi unquam conspectus. Etenim calyx qui florem contineret, quinque foliis unguis longis & lais invicem amplectentibus constabat, ut in Cappari quibus includebatur caput trigonum membranaceum, tria grana instar magnorum pila-

HISTORIAE PLANTARVM

rum continens, coloris ex fulco cineracei, & penē
fuliginosi; tres autem flores ex longis pediculis de-
pendentes crassiusculo ramo inhaesile apparebant.
similia porro grana illo ipso anno ab eo Convolvuli
peregrini appellatione, his additis verbis, accipiebat
Clavius.

Convolvuli
peregrini

Buena nches



Buena nches, pla-
te ex occidentali In-
dia delata se nina,
quæ etiam stirps a-
pud fortunatas In-
dulas reperitur, ubi
Buena nches voca-
tur, voce Hispanis
consuetâ, quâ se
congruentes vel
discedentes, vesperi
salutant. Hæc verò
primo sui ortu bina
profert folia Cam-
panulæ Indicæ pri-
mum ascendens so-
lius similia, sed ma-
juscule & crassiora,
cui etiam similia e-
dit folia recondens
natus Mechpacatus,
ante quam inna-
scantur alia folia. Multa porro ab unica hujus plan-
ta radice caules prodeunt, qui pedamenta adfixa,
vel vicinas plantas multiplex ambiunt spirâ, Smilax
aspera instat, cui etiam similia habet folia, majora
tamen & molliora: in caulis etiam aliquot ha-
matas continet spinulas, quales & Smilax aspera;
sed rariore ac minus horridas: flores autem pandit
candidos & grandes, mediocri disco pares, qui ma-
tutino tempore dehiscunt, noctu illic flaccet-
cunt, unde nomen accepisse videtur.

Ceterum ex seminibus à Touaro acceptis, quæ
amicis communicaverat Clavius, unica planta in se-
quente anno nata est ornato viro Florentino Lopez,
quæ initio prædibat simili modo quem Fouarius re-
fert, deinde multa longa sarmentata proferebat, perti-
ca, multis spinis & nexibus sese circumvolventia, &
tenellos veluti spinarum aculeos præferunt circa ar-
bitrarios, generantia, qui nihil aliud erant, quam ra-
dicum rudimenta, ut in plerisque plantis, puta May-
zo, Harundine, & aliis quibusdam similibus inter-
dum contingere videmus, quæ haud dubie compre-
hendissent, si quis terrâ obmisisset: folia habuit valde
vidua, Convolvuli foliis similia, sed longiora, &
pleraque hederacearum foliorum instar angustola,
atque in longum angustum mucronem desinentia,
ut Smilacis asperæ folia: florum quidem gemmas
serre incipiebant, sed sæpe nequeunt, quia præ-
maturæ pruinae totæ plantam corruerunt. Hæc ille.

Ego duo semina ex portione in capitis trigoni præ-
dicti Convolvuli habeo inter fructus delatos ex
Anglia 1605. per generum Cherlerum, qui prælo-
que accepit ab honesto viro Lac. Garcto: grana
sunt instar magnorum Pisorum non tamen maxi-
morum, angulosa ex compressione ut evenit qui-
busdâ Pisus, colore, qualis ei tribuitur à Clavio, dura
sunt officulorum modo. Est mihi etiam capitis tri-
goni pars una triangularis serè, mediocriter
fusca: Semina in aquam injecta non siccant.

C.B. pin. Smilax aspera, Indiæ occidentalis.

CONVOLVULVS PEREGRINVS

cruleus folio oblongo C. Bauh. in.

Radice aut singulari, oblonga, roseiscentē ex qua
caules anguli, tenues, penales, interdum cubita-

les, flexiles, ramosi, levissimis pilis pubescentes pro-
deunt, quos folia oblonga inferiora qui demuncias
tres, quatuorve longa, vix unquam lata, inordinate
vestiunt, quæ sensim minora redduntur, & per mar-
ginem leviter hirsuta sunt: ex omnium serè folio-
rum finem, pedicelli tenuissimi, oblongi exurgunt,
quibus singulis flos cruleus ad exortum pallidus,
Campanulæ formâ, unico folio constans, & ex cali-
culo prodians, insidens floribus succedunt capitula
membranacea parva, quibus semina parva, nigra
includuntur. Planta sanè ob florum copiam elegan-
tissima, & quæ ob cauliculorum flexibilitatem salu-
ti debet. Hic in horto meo ex semine, Campanulæ
cruleæ nomine accepto, sæpius crevit.


B. prod. Convolvulus 2. Eid. pin. Smilax laxa, sive
Convolvulus peregrinus cruleus, folio ob-
longo.

LOBVS CVM SEMINIBVS CON- volvulo majori accedentibus.

IN Tria fructus & cetera quæ gener detulit ex
Anglia, anno 1605. ab honesto viro Lac. Garcto
reperimus Lobum sive siliquam nigram magnitudi-
ne articuli postremi pollicis simili quodammodo
sublongam, tunciam, tumidam, & leguminum modo
in duas partes sese separantem, cortice duro satis,
qui nonnihil contrahitur, pediculo longiusculo
intus grana duo (an plura adfuerint nescimus. Lo-
bus enim erat apertus) magnitudine pisorum me-
diocrium serè, triangularia ut Convolvuli majoris
siliquæ, continentem, quorum latera duo minora
serè plana, tertium verò gibbosum extabat, leviter
hirsuta vel tomentosa, colore fusco tribus costis, qui
etiam circulo circa umbilicum cinereis, cortice du-
ro, qui si abradatur flavescit. Quid contineant hæc
ossicula nondum inrospeimus, sunt enim nobis
tantum duo. Injecta in aquam fluitant.

BRASSICA MARINA, SIVE

Soldanella.
CAP. XXXVII.



QVIA Brassica
manna totò
genere (quæ enim
ut inquit Adrian.
Spieg. flore & folio
herbæ atque floris
Convolvulivitu-
te verò Scamoniū
est) differt à reliquis
Brassicis, ideo non
Brassicis (de quibus
lib. 2. scribimus) sed
Smilacibus laxibus
& Convolvulis ea
subjungimus.

Brassica autē ma-
rina, quæ hodie offi-
cinis Soldanella ap-
pellatur per terram
suas spargit vitici-
las, à quibus folia
prodeunt subrotun-

da, acutis alia prædita, latiora quam longiora Che-
lidonii minoris similia, crassiuscula, liquore lacteo
mansuetâ, pediculis longis innixa: flos magnus,
purpureus, quadrantaliter serè, campanulatus, non
abstulit multum floribus herbæ, quæ pro N. Avi-
cenæ exhibetur, aut Squillæ laxi, indivisi, semina
in lo-

in oculis rotundis non tantum nigrum, sed & album, angulosum. Gustu est falso, subamaro.

Soldana.
Brass. marina Diosc.

Soldanellam aliqui etiam Soldanam vocant, & eam Brassicæ marinæ à Dioscoride descriptæ plerique similem affirmant. Imò nos non similem, sed planè illam ipsam esse cum multis aliis ex hoc maxime concludimus.

Diosc. de
Varia.

Quod Dioscorides hanc Brassicam à lativa evariare dicit, quo modo certè Soldanella à Brassica penitus evariat. Quæ marina Brassica [*ἡ ἀπὸ τῆς θαλάσσης* : male Lugd. *θαλάσσια* : nec melius Riff. in Diosc. *θαλάσσια*] inquit Dioscorides, dicitur, à lativa in totum evariare, habetque folia longa [*μακρὰ* : forte legendum *μακρὰ* aurb. Matth. *μακρὰ*, prelonga Ruff. qui tenuia addit, quam ob causam, ipse videtur] Aristolochiæ rotundæ [*τῆς σπογγύλης ἀειπλοχίας*] similia, quæ singula de ramis subrubris prodeunt, ex uno pediculo velut Hedera. Habet liquorem album, non multum, qui gustu subtilis est, & quodam modo amarus, compage pinguis. Et hæc est illa, quæ prior

Rapum al-
lum.

Raphanum
Theophr.

revo Theophrastus l. 7. c. 4. Brassicæ [*ῥαφανίς*] tertiaræ agrestis cognomento intellexit, cui folium læve esse parvum & rotundum scribit, ac multis ramis, multisque foliis constare : huic præterea succum acrem inesse & medicatum, quo Medici ad purgandas alvos utantur. Eadem & Plinius tradit. Raphani, inquit, genus silvestre Græcis, cui lævia quidem [*ῥαφανίς*] sed breviora ac rotunda, copiosaque atque fruticosa; sapor autem asper, & medicamenti instar ad eliciendas alvos. Cæterum licet Dioscorides prodiderit marinam Brassicam folia ferre rotundæ Aristolochiæ, longa, ac tenuia; ea tamen non abs re ab omnibus esse censetur, quæ vulgus officinarum Soldanellam appellat. Quippe quæ in maritimis nascatur, foliis lacteo succo madeat, ramulis constet rubentibus, è quibus prodeunt ipsa folia, Hederae modo, quæ gustu falsa, & amara, & quadantenus acris sentiuntur. Quamobrem Dioscoridis codicem hoc in loco, sicut & in aliis permultis, mendi suspitione non vacare cum Matth. puto. Facile enim evenisse crediderim libranorum incuriâ, ut folia *μακρὰ*, i. e. longa, pro *μακρὰ*, i. e. parva, hoc loco successerint : & certè facilis fuit uaius literæ lapsus. Siquidem Soldanella vocata omnibus notis marinam Brassicam repræsentat, exceptis foliis, quæ sunt Aristolochiæ rotundæ minora.

Raphani
genus Plin.

Tertium
Diosc. de
Varia.

Quamobrem Dioscoridis codicem hoc in loco, sicut & in aliis permultis, mendi suspitione non vacare cum Matth. puto. Facile enim evenisse crediderim libranorum incuriâ, ut folia *μακρὰ*, i. e. longa, pro *μακρὰ*, i. e. parva, hoc loco successerint : & certè facilis fuit uaius literæ lapsus. Siquidem Soldanella vocata omnibus notis marinam Brassicam repræsentat, exceptis foliis, quæ sunt Aristolochiæ rotundæ minora.

Belio Cas.

Cæsalpinus autem sic aptius legendum putat, foliis rotundis, longæ Aristolochiæ similibus, & non ut vulgati codices legunt, transpositis dictionibus, foliis longis rotundæ Aristolochiæ. Et hinc congruè Dodonæus Soldanellæ sive Brassicæ marinæ folia tribuit Asari, aut Aristolochiæ longæ (non ut ipse, rotundæ) rotunda. Quo Dioscoridis loco sic emendato, Soldanella omnibus planè notis Brassicam

Error Ruell.

marinam Dioscoridis refert. Ruellius etsi in hoc nobiscum ceterisque consentiat, quod marina Brassica hæc sit herba, quæ vulgò Soldana, & Soldanella dicitur, nullâ etiam (ut inquit) reclamante notâ; in eo tamen manifestè aberrasse deprehenditur, quod Soldanæ folia Aristolochiæ longæ, atque etiam prælonga reddiderit. Etsi rectè quidem videatur Matthiolus existimasse pro folia *μακρὰ* legendum *μακρὰ*, tamen in meis (inquit Dalech.) Dioscoridis exemplaribus non legi *μακρὰ*, sed *μακρὰ* [*μακρὰ*] pro quo lego *μακρὰ* porrecta, quod est verissimum. Hæcille ego etiam nolim tam manifesti erroris cum Matthiolo incusare Ruellium, quod dixerit foliis prælongis : fortè enim ad foliorum pediculos longos respexit. Nec video tantum Ruellij errorem, quantum dicit Matthiolus, quia dixerit l. 2. c. 54. Soldanam esse folio Aristolochiæ longæ : id quod optimè fecit (ut & Cæsalp. legit) melius enim longæ quàm rotundæ folia referre videntur : rotundæ enim folia sunt longiora quàm latiora; Soldanellæ autem latiora.

Ruell de
funditur.

Matth. ref.

quantum dicit Matthiolus, quia dixerit l. 2. c. 54. Soldanam esse folio Aristolochiæ longæ : id quod optimè fecit (ut & Cæsalp. legit) melius enim longæ quàm rotundæ folia referre videntur : rotundæ enim folia sunt longiora quàm latiora; Soldanellæ autem latiora.

ut plurimum quàm longiora, sicuti folia Aristolochiæ longæ, quorum longitudini latitudo æqualis : dein quoad totum folij ambitum & anchoræ formam, melius convenit Soldanella cum Aristolochiæ longa, quàm rotunda : deinde quoad pediculos, quibus prædita est longa, rotunda non item. Verum Matthiolo non fuit cognita longa, pro qua exhibuit Clematitin doctis multis nominatam. Ca. n. l. i. ad. dit Carolus Stephanus existimare Soldanellam esse dictam, quod ad solidandas rupturas faciat.

Videamus nunc quid Turnerum Anglum, unum *Volubilis* ex multis, qui Volubilis speciem facit, impellat, cui *Turner.*

adhuc dubitet an Soldanella sit Brassica marina, in d. cap. de Cochlearia neget. Etsi inquit ille, jam ab annis pluribus Brassicam marinam veram indagaverim, unamque invenerim à vulgò doctorum receptam, alteram verò quam ego solus pro vera Brassica marina habui : attamen cum utramque cum Dioscoridis descriptione confero, neutram per omnia convenire comperio. Ea quam ego veram Brassicam marinam arbitratus sum, nascitur intra primas *Brassica* maris aquas in litore, in ripis rivulorum prata irrigantium, & lapidosis insulis quas interdum mare *marina* *ca.* *Locus.* perluit. Visa mihi in Frisia Orientali circa *Worden* ubi *Luppelshuyt* à cochlearis forma in folio, dicitur. *Cochlearia.*

nec non in Anglia in Cestria occidentali, juxta Portlandiam & Portbecium, verum nullum nomen aliud audiui, quam *Scurby* modo aut *Scurby* *Locus.*

re : posset etiam appellari *Spounwurte*. Vbi primum erumpit, folia habet quinque aut sex, modò pauciora, modò plura, erecta simul omnia ad modum *Pyrolæ* aut *Betæ* tenerioris. caulis longus, terram versus rubescit. folia pingua, crassa, rotunda, Asari similia, minora, virentiora, sapore non nihil falso & amaro, gustanti servida & acris, Brassicæ quodam sapore ingrato, fervore & amaritudinis conjunctæ ratione. caulis spithamam æquat ferè, in quo quæ nascuntur folia, longiora sunt, acutioraque; iis, quæ statim à radice surgunt. flos albus, semen tenue, nigrum. Indigenæ contra Scorbutum utuntur. Ego verò non contra eum solùm utilem expertus *Fires.*

sum, sed & contra hydropem, quemadmodum Doctiss. Reinerus Rector Scholæ Gruningensis, & Henricus Herbartus testari possunt. Non ausim tamen pronunciare, esse veram Brassicam marinam Diosc. præcipuè cum magna ejus quantitas parùm; vera autem Brassica marina vehementer purget : deinde etiam quod nullum in eo lac aut succum lacteum animadverterim. Idem nunc subdit. Receipta passim in Italia, Gallia & Germania Brassica marina, Herbariis dicitur Soldana aut Soldanella. A Matthiolo verò exhibita, quoad radicem saltè, non eadem est cum nostra Soldanella, quæ in Anglia & Belgio nascitur, neque quæ venalis habetur Francofurti & Antuerpiæ. Quippe, ut reliqua omnia totius plantæ similia sunt Volubili aut Helixiæ cissampelo, nisi quod folia rotundiora sunt, non ita acutata radix cum ejusdem radice convenit. nostra *Soldanella.*

verò Soldanella procul intuenti Malvæ similis videtur, tum floribus, tum foliis : propius si accedas, tam similis est Volubili, ut nihil aliud, quàm Volubilem quandam marinam dixeris. flores planè Volubilis vulgaris, campanam referunt, nisi quod majores sunt, & ex cæruleo purpureasunt. Cùmque reliqua tota planta per sabulum serpat, flores recti stant & amœno decore litus pingunt. Semen aliorum Volubilium instar, nigricans, rotundum, Viciæ par, aut etiam majus. folia rotunda Aristolochiæ rotundæ aut Asari : sapore non adeò acris, ac Cochleariæ; purgant pulverizata ad ʒ. ij. sed non adeò vehementer, ut Diosc. innuere videtur de Brassica marina : inquit enim *κατὰ τὴν ἀντιόχου, ἰσθμὸν ἡνδερῶν*. Plinius etiam de Brassica marina scribens ait vehementissimè ex *Diosc.*

omnibus

omnibus alvum solvit: neque tam sunt calida folia ac Brassicae marinae apud Diosc. Inquit enim *ἡ ἀλμυρὰ καὶ ἡ θάλασσα, αὐτὴν ἴσως αὐτῶν τῶν δεινῶν τῶν ἀλμυρῶν*. Cum igitur Soldanella, nulla habeat folia longa, sed omnia rotunda, neque tam vehementer purgantia, ac suam Brassicam marinam facit Diosc. neque ullam habeat qualitatem, sive in odore, sive sapore, cur Brassica marina debeat vocitari, cumque tota planta tam similis sit Helixiae cissampelo & Smilacei sylvestri, quarum neutri ea confertur, dubitare posset quispiam an Soldanella sit Brassica marina Dioscoridis. Quod si tamen Soldanella non sit Brassica marina, potest nihilominus aquis hydropicorum detrahendis recte deservire, quemadmodum alia Helixines cissampeli & Volubilis mediterraneae genera idem praestant. Dicit Aëtius Smilacem sylv. quae ad aquas, fruteta & sapes conscendit optimam esse ad hydropem: idem habet Nicolaus Myrepsus, Aëtium forte sequutus. Scribit Diosc. Helxinen cissampelon alvum solvere. Mesueus de quinque speciebus Volubilis agens, omnes facit purgatrices. Quare mirum non est, Soldanam, cum Volubilis sit species, aliarum Volubilium modo purgare. Matthiolus, ut omnes tollat remoras, quae prohibere possint, ne Soldanella sit Brassica marina, inquit corruptum esse Diosc. textum, & non pro *αλμυρὰ* sed *ἡ ἀλμυρὰ* itrepsisse: quod quidem verisimile videtur. nisi quod Aristolochiae folia alias sint longiora, alias breviora & rotundiora, ut in Cochlearia, & generibus quibusdam Malve, aliisque plantis: tunc autem Soldanella non fuerit Brassica marina. Verum enim verò apparet aut nullum in textu omnino esse errorem, aut ante multa saecula corruptum. Nam tum utraque vetus barbara versio Diosc. (ordine alphabetico) tum etiam Serapionis legit folia longa. In nullo autem codice graeco, qui hodie extet, aut veteri interprete, invenio *ἡ ἀλμυρὰ*, seu folia tenuia, ut habet Ruellius. Quod miror non animadvertisse Matthiolum, hominem alioqui oculatissimum, ut multis in locis Commentariorum eius apparet. Haec Aenus Turnerus.

Dubitat an sit Brassica marina.

Volubilis species.

Ruell. lectis quatur.

Error Matth. de Cachile Serapionis.

Brassica marina.

Lonic. nec Soldanella.

Brass. maritima.

Nomina arguat.

Locus et Tempus.

Errat in hac planta, ut prodidit Matthiolus, Matthaeus Sylvaticus pandectarum autor, quod crediderit Arabum Chachile Soldanellam esse. Cuius error aperte convincitur ipsius Serapionis testimonio: quippe qui Cachile suum Vinez simile fecerit, foliisque non Aristolochiam, sed Nasturtium imitari tradiderit.

Brassica marina, Diosc. Ruell. Corn. Matth. Leon. Trago, Altom. Ang. Cord. in Diosc. & hist. Cast. Geth. Dod. gall. Lob. Cam. Lac. Monach. in Mel. Lugd. Sylvio, Valeriolae, Port. phyt. Alson. Morese. Turn. Czf. Io. Agric. Ryffio, Euch. Roess. & Lonic. in quorum figuris capreoli non placent, & aliis plerisque. Soldanella Lob. Dod. Levin. Lemn. Cam. Gat. Geth. Cord. Leonie. Altom. Ang. Ryffio, Adolph. Occ. Cast. Lonic. Sylvio, Alson. Morese. Monach. in Mel. Lugd. Valeriolae, Euchar. Roess. Czf. Io. Agric. Tab. & aliis. Soldana Trago, Altom. Dod. Gatin. Brunfels. Apollini, Lev. Lemnio, Lonic. Lugd. & Fallop. Volubilis species, Mesue. B. phyt. Brassica maritima minor (hac vox apud Matth. omissa) seu Soldanella officinarum. Eid. pin. Soldanella 2. Soldanella marina. Ger. Eyst.

Brassica marina vocatur Graecis *καυμένη θαλασσία*, Germ. *Meeswinde*: Belg. *Zee winde*, i.e. Convolv. marinus: Gall. *Choux de mer*: Ital. *Canudo marino*: Hispan. *Uerça marina*: Ang. *Ece coole*.

In hortis plantata felicissimè ex semine adolescit. Soldanella passim ad mare provenit, potissimum circa Venetias, Genuam & similibus locis: item ubique ferè in Belgico littore. Ad mare Montspelij aestate floret: autumnò semen perficit.

Herba in totum stomacho inimica, acris vehementissimè, alvum ciet in cibo cocta: coquitur propter acrimoniam cum pingui carne, Dioscorides. Marina Brassica superà quàm quodd ventrem deiciat, utpote subfalsa & subamara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis usus, & ad omnia, ad quae tales qualitates accommodantur, idonea, Galenus. Brassica marina assumpta aquas ducit, præcipue prærogativè in ascite. Utendi modus varius: liquidem folia ejus ex sale, aceto, & saccharo acetarij modo ad quinque aut sex bucellas comesta mirabiliter aquas per alvum ducunt. Eadem in jure carniū cocta, adjecto dein saccharo aut melle, propinantur. Posent & sicca in pulverem redacta ad 3.ij. aut iij. ex jure pulli bibi. Rectè autem cinnamomi pulvis & similia corrigentia addentur, alioqui usu nimio ventriculo nocent. Pulvis in catapotis ad 3.ij. deglutitur. Sunt qui scribant multos tertianarios Soldanellâ curatos, Matthiolus. Puerulis ad 3. j. & ulterius datur in conserva salviae vel rosmarini, Brasavola. In hydropo pro siccatione, & evacuatione aquae, nullum vidi medicamentum præstantius, inquit Fellopius, & exhibetur vel in pulvere 3. j. pondere; vel in decocto, vel asparagorum modo, si planta recens habeatur, quo modo est suavissima, & siccat, aperitque vias, & evacuat aquam. atque experientiâ hujus Brassicae ductus ego exhibui etiam aliquando in hydropo asparagorum modo Volubilem minorem optimo cum successu. Sed hæc sola species Volubilis in usu est: aliarum verò specierum nullâ utimur ad purgandum. Contrarium sentit Altom. de ascitis curatione agens. Quidam, ait, ex tumoribus suctum marinae Brassicae cum vino, aut sapa, seu aqua lactis approbant (hodie vulgus Medicorum Soldanam, seu Soldanellam appellat) cujus usum non valde admitto: namque ventriculo mirificè adversatur, & ipse pluries experientiâ vidi noxam inferre, potius quàm auxilium aliquod hydropicis præstare, imò quoddam citius perisse observavi.

Viresc. Diosc.

Aqua de ascite.

Correptio Pulvis

Hydropo

Defectus

Virus Soldanella res

CONVOLVULVS MARINVS Soldanellæ affinis.



Convolvulus *Defect.* Quidam rarus, cujus folia inferiora quidem, quæ uncialibus pediculis committuntur, falcata Phyllitidis in more sunt, adverso sine rotunda, vel lacuna in medio exculpea corculum imitantia, fescunciam circiter longa, unciam lata, nervis obliquis à medio recto in latus expositis; superiora verò folia, Hemionitidis alterius peregrinae Clusij modo auriculis pulchris geminatis (in quas nervi excurrunt) pinnata; flores ex foliorum alis prodeunt magni ut in Smilace levi sive Convolvulo majore. Provenit in horto D. Zvingeri Basilez.

An est Hermolai in Diosc. cap. 666. *Reconaria* sive Ficatella Venetiis in littore passim nascens, & olitorio foro ieiuniorum tempore venalis, hederacco ferè

An Hermolai in Diosc. cap. 666. Reconaria sive Ficatella Venetiis in littore passim nascens, & olitorio foro ieiuniorum tempore venalis, hederacco ferè

ferè folio; flore purpureo, Lilij pugilli effigie, & convolvens quibus appropinquat, solvens alvum cocta & cruda oleis modo accepta.

Convulsi.
maritima.
Imper.
Herbula.
diversa.
Lugd. bot.
Brassica
marina.
la Ranv.
Brassica
marina.
sive marit.

Convolutulus maritimus ad nostrum mare (inquit Imper.) se expandit supra terram, ad quinque vel sex cubitos, folia habens incisa, crassa, saponis falsi, flores campanæ modo albos, semina continet in folliculo triangulo, hirsuto, Soldanellæ modo, cui congener, & quia viribus similis illi, ejus est usus quatuor terra prodit: est herba lactifera. Lugdun ap. hujus iconem ex Rauvolfio ponit, & Brassicæ marinæ genus inscribit, quod ab incolis Meudhendia Rhæ ad Almanforem Congiolam nominari tradit. Sed nec Meudhendi, nec Congiolæ nomen alteri suæ Brassicæ marinæ Rauvolfio attribuit, verum Scammonio Mospeliensi.

Fatetur frater C.B. phyt. & apud Matth. (à quo Brassica marina i. sive major inscribitur) hujus libi Convolutuli marini nomine & plantam & semen Imperatum Neapoli misisse; folia autem ejus quædam laciniata esse, quædam non; omnia tamen parte superiore sinuata. In pin. Smilacis lævis generibus adscribit, & Soldanellam i. maritimam majorem vocat.

CONVOLVULVS EGYPTIACUS QUINQUE-

folius, Cap. Bauhini.

CAP. XXXVIII.

Deser.

Viticulus est tenuibus, geniculatis, lævibus: ex quolibet geniculo folium, longo tenuissimo



pedicello donatum, prodit, q. in quinque laciniis angustas longiusculas dividitur, & quandoque inferior una alterave bipartitur, & cuilibet laciniæ, tenuissimus mollisq; aculeus insidet. Supra folij exortum, pedicellus æquè tenuis, duarum triumve unciarum longus & nudus exurgens, florem magnum purpureo exruleum, aliorum Cōvolvulorum forma, sustinet. Semen non conspectum, cum solum hujus

ramum, Convolvuli Egyptiaci nomine, à nobiliss. Cortuso Patavio ante viginti annos accepimus, inquit C. Bauhinus, cui in prod. est Convolvulus 7. foliis laciniatis, vel quinquefolius: Eid. pin. Convolvulus 7. Egyptiacus Bauhini, Bry.

DE LIGNO COLVBRINO in genere.

CAP. XXXIX.

Ligni Colu-

brini Eym-

PLURIS stirpes inventi plurimum dissimiles, cum formâ tum nascendi modo, uno tamen cōdemque nomine nuncupatas, Lignum Colubri-

TOM II.

num, quod singulæ mirum in modum utiles sint adversus colubrorum virulentos ictus & morsus, facile animadvertet is, qui sequentes earundem descriptiones diligenter contulerit. C. Bauh. Lignum colubrinum, Clematidem Indicam vocandam censet, quod pleræque sarmentitæ sint, & per arbores repant. Hoc verò lignum, sive potius radicem, ut Garciz placet, serpentium moribus prodesse, hoc modo deprehensum est. In Zeilan insula, Serpentis genus est coronatum, seu diademate insignitum, Lusitanis Cobras de Capel, (nos Regulum dicere possumus) maximè noxium. Est item animalis genus magnitudine viverræ huic serpenti inimicissimum, Quil, vel Quirpele vocant. Quotiescunque cum serpente congressurum est hoc animalculum, istam radicem (quæ multa istuc nascitur) eâ parte præmordet quâ denudata est: etenim pars aliqua extra solum prominet. Præmorsâ radice, pedibus anterioribus salivâ conspersis, caput primum, deinde reliquum corpus sibi demulcet: postea serpentem aggreditur, nec eum dimittit, donec occiderit. Quod si illo congressu serpentem vincere non potest, denud ad radicem confugit, ad quam se fricat, deinde in præhum redit, atque ita morfu serpentem necat. Hoc spectaculo edocti Chingala (ij sunt Zeilan incolæ) istam radicem venenis resistere cognoverunt.

Tria porro hujus ligni genera in insula Zeilan esse prodidit Garcias, de quibus in genere ait. Non modo adversus animalium virus & jaculantium morsus ictusve efficax est hoc lignum, sive potius radix, sed etiam ejus pulvis lumbricos necat, papulas, exanthemata, & impetigines tollere creditur, & cholericam quam vocant passionem (incolæ Morde-morbus, xi dicunt) sanare. Similiter utile esse medicamentum ferunt adversus febrium circuitus, uncia pondere propinatum, prius tamen tritum, & aquâ maceratum, per vomitus expurgatâ multâ bile.

Nullum autem ex tribus Garciz Colubriini ligni generibus, cum Acostræ ligni Colubriini bina stirpe convenit, quas describit, & in provincia Malabar inveniri tradit. Idem mentionem facit & tertij Colubriini ligni generis, vastæ arboris magnitudine, de quo in alio libro se acturum scribit, qui ad nostras manus nondum pervenit, nec cum oculis nostris videre licuit. His addit & aliud lignum Clusius, quod an illis congener sit, ignorat. Sed singulorum adscribimus historiam.

COLVBRINVM LIGNVM I. Garciz.

DVorum aut trium palmorum magnitudine assurgit, paucis virgulis, quatuor aut quinque duntaxat tenuibus: radix quæ maximè in usum venit, veluti tenuiorum nostrarum vitium radices, multis capitibus aut nodis se propagans, ita ut semper radix aliqua extra solum se exerat, & radice una exemptâ, alix in ejus locum succedant. Radix hæc ex candido cinerea est, solida admodum, amaro gustu; folia Persicæ mali, magis tamen viridiora; flos longè à foliis racematim cohaeret, pulcherrimo colore rubens, fructus Sambuci, sed rubens & durus, racematim cohaerens, veluti in Periclymeno.

Primum & laudatissimum, secundum mentem autoris, hoc est, à quo subsidium quaerit viverra, vocaturque incolis Rametul, Lusitanis Pao da Cobra, i. e. Lignum Colubrinum. Hujus ligni Colubriini Garciz, fragmentum etiam digitorum transversum

Sap.



nullo, dum gusta-
tur, manifesto sa-
pore præditus, de-
inde tamen gustum
in ore relinquens
suavem, & uti Mo-
schus odoratum;
fissus est undique
hic cortex, & spon-
de sese expedit ab
alio crassiore, fla-
voque cortice sub-
tus nascente, qui o-
dorem Loti silve-
stris, sive Trifolij o-
dorati vulgaris re-
fert, & saporem
Glycyrrhizæ dul-
ciorem, præmansus
odore admodum
suavi, nec in iucun-
da mordicatione,

momentaneâ tamen, præditus esse deprehenditur;
ipsa materies lignosa est, candida, dura, & insipida;
folia Napi saporem referunt; germen producit hæc
radix supra terram circiter quatuor uncias longum,
in caput extuberans.

Materies.

Symb.

Lugd. Lignum Colubrinum 2. Acoftæ. B. pin.
Clematis Indica 5. Malabarenfis altera radice ser-
pente; Palo della Calcebra; Cast. ap.

Indi.

Invenitur in Malabar altera ligni Colubrii stirps,
proveniens in locis humidis & inter arbores, præ-
sertim verò secundum illas, quæ Anglis nuncu-
pantur, nec procul a mari.

Pires.

Tritam radicem cum aqua rosacea aut vulgari,
vel cum vino (indifferenter enim Canarini ut autor
est Acofta utuntur) præsens certumque afferunt re-
medium adversus omnis generis serpentum mor-
sus. Plurimus etiam ejus est usus in febribus conti-
nuis, tertianisque, lyncope, ventriculi debilitate, &
cordis tremore; daturque adversus omnis generis
venena. Multi multi sanctè affirmant, dummodo
manu hanc radicem tenerent, pullos serpentes, vel
alia similia virulenta insecta formidare: & certissi-
mum esse, serpentes & viperas ejus aspectum mani-
fè ferre posse, sed fugere, celeritèque in aliam
partem sese propere, si quis ante serpentes proj-
ceret. Periculosum etiam censetur, iis quibus anhe-
tus ab ore vitæ aut dentibus corruptis feret, mo-
do eam continuo mandant, dentiumque cavis ge-
stent.

Serpentes.

Febres.

Symb.

COLUBRINVM LIGNVM CLVSII

Pao da Cobra dictum, fortè
III. Acoftæ.

N Vllum dictorum Ligni Colubrii generum
cum hoc convenire facillè animadvertet qui
descriptiones diligenter conferet: & haud scio, in-
quit Clus. apud Acoftam, an Garciz ligno Colubri-
nocongener sit lignum illud, cujus iconem ad me
mittebat Jacobus Garcetius Londinensis Aromata-
rius; erat verò hæc icon delineata, ex fragmento li-
gni cum tuberculo, sive superiore radicis parte in no-
dum coacta. & suo etiamnum cortice (cujus super-
ficies ex clavo pallidebat & rugosa erat, cortex
verò ex albidus erat tecta, majorisque quam ipsum
lignum amaritudinis, quod crassi alicujus succis
non qualis à Garcetio & Acofta nostro describitur,
fuisse videbatur.

Pao da Co-
bra.

Fragmentum verò illud Pao da Cobra nomine in-
lignitum, repertum fuerat in magnâ illa pavi Prazo-

Tom II



B. pin. eandem suspicatur cum Clematide sua Sym.
Indica 6. quæ est Colubrinum lignum 3. Acoftæ.

RADIX MALACÆ QVÆDAM

toxicis sagittis resistens.

R Adicem quandam in Malaca inveniri rumo-
rem sparsit Garzias, quæ adversus vulnera sa-
gitæ toxico illitis facta præsentaneum exhibeat
remedium.

B. pin. Clematis Indica 7. Cur autem non
ostendit quæ causam Radicem hanc Malacæ
ad Clematidem referat. Indicare debebat, si Cle-
matis sit appellanda; quæ in parte aliquam cum ea
habeat cognationem.

ARBOR ANGELINA.

CAP. XL.

Q Væ arbor sit Angelina, cujus Acofta sub Co-
lubrino ligno meminit, edoceri non potui, in-
quit Clusius, licet diligenter ab Hispanis & Lusita-
nis fascitatus sim, atque ipsorum plerique existi-
ment, peculiarem Malabar regionis arborem esse,
nobis incognitam: quam mirum est Acoftam non
describere.

An C.B. pin. Lignum durissimum, ferri durisem
æmulans 3. Angelina arbor apud Cachinum, ex
cujus continuo trunco naves Tonas vocatas ex-
truunt tam grandes, ut una 10. vel 20. dolla aquati-
ca vehi possint, cujus lignum adeo durum ut ferrum
atterat, Linscot. part. 4. Ind. or. cap. 14. & par. 7. c. 27.
An arbor cujus pars ima crassitie 14. orgyarum in
Guineæ insula Formosa par. 6. Ind. or. c. 4.

HALICACABVM PEREGRINVM

multis, sive Cor Indum.

CAP. XLI.

N ON nisi adminiculo clavicularum quibus per-
tex advolvitur humo surgit, caulibus striatis,
glabris; foliis lato virore nitentibus, Apij alicujus
ferè divisa, gustu viscida, in iis pili quidam minu-
ti, e quorum alis pediculi exeunt floribus donati
albis, quos turgida excipiunt vesicæ grana conti-
nentes, Piso parvo similia, nigricantia partim, par-
tim albidia, in quibus cordis effigies pulchrè deli-
neata; radix subest digitali crassitudine, multo mi-
nore, fibrosa, lignosa, duriuscula.

Defin.

Credunt valere solum ad omnes cordis affectus, ob notam, qui intelligitur. Martialis etate scenas, atque, euguria, & pergulas inumbrabat: quin etiam adium fenestras topiario opere contegebat & opacabat.

CACUBALUM QVIBVS DAM
vel Alline baccifera.
CAP. XLII.



Haud absimilis huius radix ab Hippia maioris, ut nec folia: ac sumenta longissima, duriora: resprantia, nervum transmittunt a quo cortex hirsutus facit. Itactu cedit, crebris geniculis tuberosis donata. verum florum hic prima est observatio, quae turgidis Halicacabi utriculis vix tantillum foliorum, quo numero quinque herbedo pallore albescent, apices bifidos protrahunt: per

titius latentibus ramibus simul & baccis rudimento, quae per maturitatem nigra, grana continens nigra, nitentia, rotunda, compressa.

Hanc ita describit Clusius: Samentis verius quam caulibus, inque numerosis, praedita est haec plantae, geniculatis, flexilibus, humanam altitudinem plerumque superantibus, praesertim si frutices, quos scandere possit, vicinos habeat, alioquin prope humilitatem, humi diffusis: bina singulis geniculis & internodiis adhaerentur folia ex adverso sita. Allines vulgaris foliis figura & colore similia, longe tamen maiora, & ad Helxines foliorum amplitudinem accedentia, mollia: flores ex calicibus, seu folliculis prodeunt, ex herbaceo candidi sex foliis constant, quibus succedunt acini Piperis nigri, aut granorum Juniperi vulgaris magnitudine, folliculo illo inclusi, initio virides, per maturitatem nigri, semine exiguo & plano pleni: radix candida, valde fibrosa, longa & samentosa: quae singulis annis novos caules promit, alii per hiemem marcidis & corruptis.

Licet lapor insipidus & herbaceus fecerit, ut eam ad Allines genera reputeret Clusius. Liberum tamen omnibus reliquit, ad quam voluerit classem referre. Sunt, inquit, quibus Alline repens, *Lucas* (quam nonnulli [Lucas Grynus] auctore Dod. & Lobelii) *repens* & *repens* in *repens* vocant) dicatur, quoniam multis cum Dioscoridis descriptione notis conveniat. Sed ob notas aliquas, quas cum Cyclamino altera habet, sic denominanda non erat. Non in pilulis, ut idem esset, sed in omnibus conuenire oportebat.

Recentiorum planta, Alline maioris facie, baccis solari, an Cacubalum (aut Lob. Plinij: Intellecta) an Valerandum Dourez ascriptis: haec nomen. Cacubalum Plinij, Vera Polemonia Dioscoridis Constantini.

Generum, autem negavit esse Cacubalum, aut Polemoniam, Lugdunensis contra Cacubalum Plinij esse Alline nare videtur, ita enim eam inscribit, ac

Tom. II.

dicat esse aliorum Ocimoides repens: nec deesse, qui Clymehum herbam esse putent à Plinio *h. 2. c. 7.* descriptam. Alline baccifera (ita enim vocari potest magis particulariter) dicitur Alline repens à Clus. hisp. & hist. ap. alt. Lob. obs. & ic. Dod. Cast. & Cam. h. A Thasio Alline maxima fructu nigro. A Tab. Clematis urens 2. Leinnen oder Waldre: ben / non d. vi errore, quem sequitur Gerardus, qui Clematim urentem multifloram, Double flowered Virgine Bower. Est h. phyt. Alline 9. In pin. Alline 6. five scandens baccifera: Cyclaminus altera Diosc. Chini.

In hortis in quibus alii quotannis suos renovat caules ex radice perenni, floret & baccas fert à semine collecto in Gallia Campania. Copiosa invenitur Salmanticensi agro, umbrosis locis & circa sepes: nostris etiam nunc in hortis frequens & pergulas scandens: aliquot vero post annis abunde observabam, inquit Clusius, pone aecem Eberstorf, loco paludoso inter arundines. Floret tota Aestate. Secus, auctore Dodonæo, margines agrorum inter vepres & sentes crebro reperitur apud Italos, Germanos, Gallos ac etiam Belgas, ubi latum secundumque solum. Iulio mense huius flores; fructus plumis suis incanescentes Autumno dependunt.

Dodon. refrigerans haec esse videtur & Alline facultate ac potentia proxima. Vim refrigerandi adstringendique obtinere, oculorum inflammationibus cum potentia illini, succum aurum doloribus infundi, & omnia, quae Helxine, emendat, producit Clusius.

NASTURTIVM INDICVM FO-
lio peltato scandens.
CAP. XLIII.

Peregrina elegantia est ex Indiis delatum Nasturtium, cui cum nostri orbis Nasturtio, praeter



saporem odoremque, nihil esse commune: folia peltata, circinata, ferè rotunditatis, saepe latiora quàm longiora, nonnunquam & Hederæ modo angulosa, supernè glabra, infernè breviter lanugine hirsuta, medio ferè ut in Cotyledone, unde radij in ambitum porriguntur, pediculus excipit palmarum & folij palmarem subrubentem, tortilem & capreolorum, ritu bacillo depacto sese circumvolvent: quo

etiam complexu nituntur cum ramis caules: ceterum ex foliorum alis undatim tortiles pediculi rubentisque exorti florum sustinent delicias artificij arguti plenas: postica parte productum corniculum sextantem circiter longum ex flavo puniceum, in quinque lacinias digitatas, concolores, striatas, quae reliquo flori committitur, faciens, quarum terna duo suprema florum folia sursum explicata à tergo suffulcunt, colore luteo praedita, miniatis lineolis ad basin striata, per suprema ora subrotunda mucrone breviusculo donata: quod in reliquis tribus est videre, minoribus licet & rotundioribus ac velut cordatis radiatum digestis, quod tamen basis non virgata,

Sed rhombocide maculâ miniatâ insignis, utrinque barbitio comans: Semen tricocon accedens ad Heliotropium tricocon, rugosum, mediocri magnitudinis.

Nasturtium Indicum folio anguloso.

Nasturtium Indicum quoddam foliis angulosis depingitur à Dodonæo, Lob. Obs. & ic. ac etiam Lugdunensi, quod quia verum non est, nos hoc præfenti hoc titulo omittimus, ac genuinam plantam duntaxat exhibemus, quam Nervij semine factam in pensilibus hortis alebat Jac. Plateau. Huic (inquit Lob.) folia peltata; semina Beta quadantenus, qualia nobis ostendit prædictus Cuculo Indiano ferè paria assererat D. de Brancioni, in siliqua admodum eleganti, qualem habeo à naudenis reduci-bus ex Peruanis Indijs. Siliqua autem, quam Dod. & Lob. obs. & ic. Nasturtio suo Indico appoluerunt, alterius est plantæ, de qua paulò post, nec semina continentur in siliqua: sunt enim qualia descriptissimus. Figura adhuc eorundem caret flore, ac propterea non undique placet. Meliorem Lugd. pingit, sub titulo Nasturtij peregrini Myconij, Peruanum etiam à Peru, unde advectum est, dicti. Alibi pingitur pro Flore sanguineo Monardis, semine ex Peru delato.

Item Dodonæi & Lobelij appropinquata siliqua non est Nasturtij Indici.

Flos sanguineus, Monardis.

Nasturtium Indicum.

Convolvulus.

Obs. no.

Plantæ folio nuda de Syria.

Cultiva.

Exat.

Ux regior.

Locus & Tempus.

Convolvuli speciem facit Dodonæus, in quorum classem etiam admitti posse putat. Nasturtij autem Indici nomē ipsi datum est ex eo, quod sapore Nasturtium referat. Et hinc dicitur Cam. h. Nasturtium Indicum Dodonæi: Item in Icon. annexis N. 31. Nasturtium Indicum: Et N. 32. Flores & semina Nasturtij Indici. Cast. & Eyst. Nasturtium Indicum; sive majus, B. pin. Monardi ex versione Clusij Flos sanguineus, ubi Clusio videtur Convolvuli genus, fructu xperuensis & formam referens, ex Hispanijs *Mastuerzo de las Indias*, h. e. Nasturtij Indici nomine missi. Sed nobis fructus xperuensis & formam referens alius est. Imò ipse apud Monardem in exot. suis fatur Nasturtium hoc Indicum non ferre fructum, Chrysalidi similem, sed tribus seminibus simul iunctis constantem. Mihi, inquit, & multis alijs semine nata est frequentibus sarmentis perticas scandens, folijs Asari modo orbiculatis, nunc minoribus, modò amplioribus, præsertim si fertile solum nata sit: flore admodum eleganti, aureo, Persicarum siliquolæ (quam vulgus Noli me tangere appellat) florem nonnihil æmulante, sed ampliore, quinque folijs constante, quorum terna inferiora, quæ umbilico adhærent, tenuia admodum & angusta, atque ubi in latitudinem sese expandere incipiunt, multis barbulis hirsuta, singula verò circa ungues puniceante maculâ insecta, & calcari quinque radijs prædico, in longum protensa, qui rarissime apud nos ad frugem pervenit. Surtuli terræ commissi satis feliciter proveniunt, & in Autumni finem egregie virer: subsequens tamen hiems plerumque corrumpere solet. Ceterum neque in Germania, neque in Belgio nata fert fructum Chrysalidi similem, sed tribus seminibus simul iunctis constantem.

Coronidis loco addamus, quæ pulchrè scripsit Arnold. Gillenius de Nasturtio Indico: Rectène is fecit, inquit, qui plantæ huic Nasturtij nomen indidit quod huius sapiat acritatem? An is qui à cinabarricis venulis, quibus aspersi flores, Florem cruentum appellavit? Cur non liceat ad Violas referre, quarum gratissimum flores spirant odorem? Cur non ad Regios flores, quorum faciem huius flores egregie exprimunt? Cur non ad Asarum, cuius folio est? Cur non ad Convolvulos amplecti: caulis enim est. Esto Nasturtium qd saporem quem verè exprimit, à quo maxime dependet efficacia; Indicum à l. co natali.

In hortis nō solum ex surculis, sed etiam ex semine deciduo facile pvenit, flores Iunio, Julio & Augusto.

Vires Nasturtio similes esse gustus demonstrat. Quare in acetarijs & medicamentis, idem qui Nasturtij usus. Inguiter calidus Flos sanguineus à Monarde dicitur.

NASTURTIVM INDICVM folio anguloso.



Iconē huius Dodonæo tantum videre contigit. Nasturtij Indici nomine missam, sed coloribus suis exprestam, plantæ Europæ peregrinæ, quam America, vocata Occidentalis India gignit, speciem exhibentem Convolvuli; folia lata angulosa & pulchrè depinguntur viridia; flos luteus recto propendens habet corniculum instar floris Regij quam Delphinium appellant.

Lob. obs. & ic. ac Lugd. Nasturtium Indicum ex Dodonæo.

Siliqua huic Nasturtio appropinquata, putatur à Dod. item Lob. & Clusio siliqua Nasturtij Indici peruviana, de qua mox dicendum.

NASTURTII INDICI PVTATA siliqua Peruviana.

Siliquam (huius icon in præcedenti tabella exhibitur) admodum elegantem habet Lob. à naudenis reducibus ex Peruvianis Indijs, ceretem, rotundam, unciali & duos digitos longam, coriaceam, strijs & rugis exarata, luteolam, lumino & imo ventriosam tantillum falcatam.

Diximus nos ante titulo de Nasturtio Indico folio peltato, hanc siliquam non esse Nasturtij ut Lob. loco citato annotavit, qui iuxta radicem Nasturtij Indici iconem huius siliquæ Peruvianæ posuit, quam etiam videre est in Icon. & apud Dod. hinc. Nos hanc siliquam etiam habemus, non occurrunt unde acceperimus. Et hæc est illa, de qua loquitur Clus. apud Monard. de Flore sanguineo cum ait videtur Convolvuli genus, cuius fructus Chrysalidos speciem refert.

An B. pin. Nasturtium Indicum 2. Peruanum Monardis, folio rotundo, Lenticulæ paulò maiori.

CYCLAMINVS ALTERA veteribus.

CAP. XLIV.

Cyclaminum alteram veterum Medicos ignovimus. Cræte eruditorum pace cum Ruellio dixerimus. Quin caput Cyclamini alterius, nuppius Dioscoridis quibusdam exemplaribus desideratur. In quibus autem habetur, sequentia leguntur. Cyclaminus altera, quam nonnulli Cissanthemon aut Cissophyllon vocant, folia fert Hederæ, sed minora; caules crassos, geniculatos, quique circa vicinas arbores capreolorum

Cyclaminus altera.

Cissanthemon aut Cissophyllon.

capreolorum modo sese volvunt. Flores visuntur
Diosc. lib. 1. candidi, odorati. Fructus vero *Adit. Lacuna ex vet.*
Garia. sed. *Diosc. 1. 1. 1.* uvæ acinorum instar, corym-
Vires. bis Hederæ similis, mollis, ac sapore aliquantulum
 acris, atque lentus: radix supervacua. Nascitur locis
 asperis. Hujus fructus drachmæ unius pondere po-
 tus [Goupylus esse scribit in veteri vestigia diversa cuius-
 dam scriptura, sed vulgaris, quippe qua optimum habeat
 sensum, veram esse existimare] cum vini albi cyathis
 duobus ad quadraginta dies, lienem liquat, ac per
 urinas & alvum absorbit. Bibitur & ad orthopnoeam:
Diosc. 1. 1. 1. ac potus [modicum, pota] quoque reliquias à partu
tumor. purgat. Quoniam autem alterius Cyclamini radi-
 cem supervacua esse scripsit Galenus, ista [sic] dicitur
 modicum purgat exhibita] vel ad reliquam plantam, vel
 potius ad ipsius fructum, vel acinos (quod facilius
 Sarrae crediderit) referenda sunt. Quare pro modico
 ac potu [epotu] legendum putat, nimirum xapm, cu-
 jus sit mentio. Verba autem Galeni de altera Cy-
 clamino hæc sunt. Porro altera Cyclaminus radi-
 cem quidem supervacaneam habet, sed fructum ad-
 modum efficacem: nam hic cum vino pluribus die-
 bus potus lienes sanat, urinam movens, ac ven-
 trem subducens: locos quoque ejicit, & asthmaticis
 prodest. Qualitas ejus gustanti aeris est & sublevis.

Hanc etiam Cyclaminum describit Plinius L. 5.
 c. 9. Dioscoridem ferè exprimens his verbis: Est &
 altera Cyclaminos cognomine cissanthemos, geni-
 culatis caulibus, supervacuis, à priore distans, circa
 arbores se volvens, acinis Hederæ, sed mollibus:
 flore candido, specioso; radice supervacua. Acini
 tantum in usu, gustu acris, sed leni. Siccantur in um-
 bra, tussique dividuntur in pastillos.

Cyclaminus uterque, autore Mesue, est medica-
 torius, calidus siccus initio tertij ordinis.

Pro Cyclamino altera varietas exhibetur plantæ.
 Cordus enim Glycypteron seu Dulcamaram, quod
 Lobelio non placet, pro Cyclamino altera exhibet.

Sigillum B. Mariæ quidam existimant Cyclami-
 num alteram, quorum opinionem falsam esse, facile
 intelliget, qui harum descriptiones contulerit. Nos
 Sigillum B. Mariæ, Vinum nigram quibusdam sive
 Tamum inscribitur.

Bryonia nigra est nonnullis Cyclaminus altera,
 quam sententiam non approbat Lobelius.

Placet Celsalpino Vinciboscam [Periclymenum à
 nobis inscriptum] convenire cum altero Cyclamino
 Dioscoridis, vel ob fructus molliorem, quod nobis
 non probatur.

Periclymenon alterum, autore Lobelio quibus-
 dam dicitur Cyclaminus altera, verum ea opinio ei
 non placet.

Alsinæ repens Lucæ Ghino est Cyclaminus alte-
 ra Dioscoridis. Nos de Alsinæ repente sub Cactu-
 lo quorundam hoc libro (ubi eam opinionem re-
 jicimus) agimus, ut & de jam dictis.

Dubitat Lob. in obs. & ic. de planta quadam He-
 deraceis foliis, an sit Cyclaminos altera, de qua jam
 dicendum.



hinc in obs. Her-
 ba est Hederæ fo-
 lis sinuatis pari-
 bus; in mollibus
 flexilibus, cubito
 prolixioribus, ni-
 labat memoria,
 cauliculis flores
 oblongi, galericu-
 lati, ex purpura
 pallentes.

Lob. obs. & ic. 3. 1.

An Cyclaminos
 altera, hederaceis
 foliis planta?

Lug. Cyclaminos
 altera hederaceis
 foliis. B. pin. He-
 dera s. sive hede-
 raceis foliis plan-
 ta.

QUAMOCLIT. CAP. XLV.



Planta est ana-
 dendras, foliis
 proliens oblongis
 & latiusculis initio
 binis sibi invicem
 connatis, quæ diu
 durant, etiam se-
 pteper in involente
 jam ipsa plantæ: re-
 liqua folia Myrio-
 phyllo alteri apud
 Matthiolum similia
 sunt ac tenuia ad-
 modum, ut Cof-
 volutus tenuis-
 lius non ineptè vo-
 cari possit: caulicu-
 li rubent, sed magis
 vergunt ad nigre-
 dinem; flores ele-
 gantissimo rubore
 placent in quinque

angulos collectis oris, Peti. florum similitudine; se-
 men in capsulis oblongis fert itidem oblongum &
 fuscum, quod aqua maceratum plerumque rumpi-
 tur, ut Campanæ Lazuræ grana. Sapor ipsius her-
 bæ est subdulcis & modicè nitrosus; capsula vero
 nonnihil piper vel brasma Piperis gustatu referunt,
 ut & semen, quod parum abest, quin hæc minore
 caliditate fauces nonnunquam afficiat.

Inferiore parte adjectos vides folliculos duos
 effractos, superiore vero florum calyculos duos, se-
 motas laminulas tres, & exempta semina trina.

Quamoclit plantam novam ex India allatam, & à
 Celsalpino sub nomine lasmini, folio Millefolij de-
 scriptam (cujus semen ipsi communicatum fuit à Jo-
 sepho de Casa bona) representare studuit Cam. in-
 ter figuras in fine horti sub 40. numero, quamvis
 ipsi Norimbergæ exilior creverit, quam in calidio-
 ribus regionibus. Sed hujus naturalem formam re-
 fert Pona, lasminumque Indicum alterum rubrum
 Myriophylli folio inscribit. Huic autem anno, 1604.
 virebat ex semine à Ferdinando Imperato acco-
 pto, fructumque ad maturitatem producebat.

B. pin. lasminum 6. millefolij folio: Gelfeminum
 alterum rubrum, Czl. Gelfeminum Indicum
 pennatum flore sanguineo, Pona li. Convolu-
 lus pennatus exoticus, Czl. Quamoclit, Cam. 4.
 lasminum americanum, Czl. cur. post.

CYCLAMINUS FORTE AL-
 tera, Hederaceis foliis
 planta.

SI quid conjectura captari potest, cujusmodi
 stirps fuerit Cyclaminos altera: cognata Hederæ
 & Cyclamini planta accipienda videtur: Hanc
 multa adumbrare videntur, nulla autem exple-
 re asseri potest. In Italiæ collibus, quo loci &
 quæ radice jam non occurrunt, reperta planta
 inque sportulas conjectæ sedulis vestigatoribus
 iconem & descriptionem exhibeo, inquit Lobe-

PIPER IN GENERE
CAP. XLVI.Dise. de
Pipere.

Philosophus Vini Piperis arborem assimilat, tum aliis partibus, tum fructuum racemis. Sed Dioscorides arborem piperiferam neque delineat, neque cuiquam alteri comparat, ita scribens; Piper brevis arbor [πῖπῆρ βρῆις] esse traditur, nascens in India, quæ inter initia prælongum fructum veluti siliquam promit, quod est longum piper, habens in-
tus [ἔνδον] addit Latun. ex vet. cod. aliquid tenui Milio simile, quod tandem in perfectum piper evadit. Id autem suis temporibus dehiscens, racemos emittit grana ferentes, qualia videmus. Ea acerba candidum piper faciunt. Piperis radix Costo similis est.

Candidum.

Delectum.

Eligendum est gravissimum, plenum, nigrum, non valde rugosum, recens, non surfurosum. Invenitur etiam in genere nigri, nutrimento destitutum, inane, leve, quod vocatur Brasina, de quo ceu & de Pipere nigro & albo postea plura.

Theophr. ge-
nera.

Theophrastus, qui πῖπῆρ tantum fructum esse dixit, ejus duo genera facit. Vnum rotundum [ῥοῦνδον] ut Orobos, cute, carneque constans, sicuti Lauri baccæ, subrubrum [ὑποερύθρον]. Alterum verò oblongum, [ὀβλόνγον] nigrum [Λυγδ. contra rotundum nigrum, oblongum subrubrum dicend. m. videtur] semina parva papaveris [παραπαρα] continens: longè hoc validius altero. Ambo calefacientia, idè conferunt hæc contra cicutam.

Piperis si-
milis arbor.

Plinius qui Junipero arborem comparavit ita scriptum reliquit: passim verò quæ piper pignunt arbores, Juniperis nostris similes, quanquam in fronte Cancasi solibus opposita gigni tantum eas aliqui tradidit. Semine à Junipero distant parvulis siliquis, quales in Faseolis videmus. Hæ priusquam

Piper loc.

gum.

Candidum.

Nigrum.

dehiscunt, decerpit tostæque sole, faciunt quod vocatur piper longum, paulatim verò dehiscences per maturitatem distendunt candidum piper: quod deinde tostum solibus, colore rugisque mutatur.

Brachmasia.

Verum & his sua injuria est, atque cæli intemperie carbunculantur, fiuntque semina casta & inania, quod vocant Brachmasia, sic Ludorum lingua significante abortum. Hoc ex omni genere asperissimum est, levissimumque & palidum. Gravius nigrum, leniusque utroque candidum. Non est huius arboris radix, ut aliqui existimaverunt, quod vocant Zingiberi, alij verò Zimpiberi, quanquam sapore si-

Radix non
est Zingi-
beri.Adulter-
ium.

mile. Piper longum facillimè adulteratur, Alexandrino Sinapi. Emitter in libras x. xv. Album x. vii. Nigrum x. iii. Vsum ejus adeò placuisse mirum est. In aliis quippe suavitas cepit, in aliis species invitavit: huic nec pomi, nec baccæ commendatio est aliqua, solâ placere amaritudine, & hanc in Indos peti.

Piperis in
Italia ar-
bor.

Quis illa primus cibus experiri voluit? aut cui in appetenda aviditate esurire non fuit satius? Vtramque sylvestre gentibus suis est, & pondere emitur ut aurum vel argenti. Piperis arborem iam & Italia hæbet maiorem Myrtho, nec absimilem. Amaritudo grano eadem, quæ piperi musteo credita est. Deest tostæ illa maturitas, idèque & rugarum colorisque similitudo. Adulterantur Juniperi baccis mirè vim trahentibus. In pondere quidem multis modis.

Adulter-
ium.

Genera tria.

Longum.

Galenus tria piperis genera prodidit. Piperis, inquit, radix Costo maxime viribus similis est. Fructus autem recens iam germinantis, est piper longum. Quare etiam humidius est, quam maturum. Signum humiditatis est, quod repositum facile perforatur, & non statim mordet: sed paulatim incipit, diutius autem perseverat. At fructus qui velut uva immatura est, album piper est, quod nigro acius est. Illud enim velut superassatum, & superexsiccatum est. Ambo verò vehementer calefaciunt & exsiccant.

Album.

Longum piper, audaciter præparatum deprehendes, si aqua maceraveris. Solvitur enim quod præparatum est. Quod vero nativum est, totidissolutum permanet. Est autem id quo piper, longum adulteratur, flavæ quædam herba, quæ ab externis adfertur; similis illi aspectu, non tamen gustu similis. Quare etiam facillimum est ipsam discernere à longo pipere. Verum par est monente eodem Galeno lib. de Thor. ad Pitonem te non ignorare fraudes quas in longo pipere struunt. Quidam enim ipsum confingunt verò Piperi longitudine æquale, & imposito Pyrethri vel Napyos aliquantulo, quia sensum hoc palato mordet, gustantem fallunt. Verum qui circa hæc peritus fuerit, & suave acutumque gustu dijudicare noverit, præsertim si pediculum ipsi adhaerentem accuratius inspexerit, verum piper invenit, & ab istis decipi non potest.

Lupi de
daberi.

Sicco pede prætercunda non sunt, quæ postea ti relinquere voluit Ludov. Vartom. Piper, inquit, suburbanus Calceuthi ager mittit: legunt etiam non nihil intra urbem cultores. Caulis piperis infirmus est admodum, instarque vitis absque adminiculo (pedamenta vocamus) consistere nequit, Hederæque non est absimile piper, quippe quod serpit, & altiore complexu proximam semper arborem vincere consuevit. Dicta arbor, imò frutex dispergitur in ramos complusculos, intra geminum ac tertium palmum longos. Folia eius Mali Assyrij figuram expriment, sed hæc crassiora pinguiscula nonnihil, intercurrentibus ex aduersa parte minutionibus venis. E singulis malleolis leni dependent racemi palmo haud ampliores, passulis non absimiles, confertiores tamen. Coloris est, qui & immaturioribus uvis. Legunt itaque mense Octobri atque Novembri in colorem prasinum adhuc inclinantes, ad solémque apricantem assandum imponunt tegetibus. Triduo nigrescit non aliter, quam huc affertur: absque ullo alio cultu putandi, minusque ligonizandi cura est illis, simplici ac sincero telluris proventu.

Lud. Vart.

Piper Ha-
dera non
absimile.

Apud Plinium lego, inquit Ruellius, Piperis arborem iam olim Italianam habuisse maiorem Myrtho, nec absimilem. Qui Lusitani regis diligentissimi studio, Libuenicis magnâ parte meridiana sitis ambitu Matritanæ circumvectis, in novum orbem se contulerunt, natales reliquâque faciem stippis ad nos reuersi repræsentarunt: ij autem qui plurimas se vidisse fatentur, fruticem non arborem piper edere harrant, alba vitæ in sepibus proreptâ simillimum, vicinas scandentem arbores, qui racemosum ostendat fructum, primum viridem, nec aliter quam in Ligustro coacervatum, quem antequam legitima maturitate nigrescat, lectum, sub sole palmeis tegetibus expandant: sicque baccas Solis æstis corrugari, vel passas nigrescere commemorant. In eodem frutice longum piper aut album offendi negant, sed alias arbores, quæ sapore piperis non nihil ferant oblongum, compactilibus callis racematim coherentibus, veluti Ponticæ Nucis julum, quod inibi longum piper incolæ nominant, namque tam æmulâ facie longum piper expriment, ut nisi sapor fallaciam proderet, nullo insigni discerniculo notarentur. Vidēs quàm dissimiliter exotica arbor à variis authoribus sit depicta, qui forsitan eam non viderunt, sed potius indigenam fidem sequuti repræsentarunt. Id ta-

Ruell.

Bryonia si-
milis piperi.Piperis longi
et Cr. albi
planta di-
versa.An similes
asperæ.

men non est omittendum, arboraceum fruticem apud nos esse, quo velut vivâ sepe latiores hortorum areas verustatis potius causa, quam minimentu cingunt. Is altitudine ternum cubitorum innotescit & vitiginea fronde viret, supra modum aspera, utriusque lateribus acuminatâ medio in inflexionem desinente, ambitu leviter sinuato, satis ad Lupi salictarij, vel vitis albæ solum accedente. Ramos sondit breves in quibus exculso flore primum bacula pedem virides,

videtur, et in Ligustro racematum coarctat, quæ maturitatem adipiscentes nigrescunt, gustu & sapore piperis, sed minusculo. Ex prorsus rotundi piperis faciem exprimunt, videri desideratur in eis recortida illa rugosaque maturitas: abest etiam illa validior amaritudo, gustum piperis sapore complens, & os, cuius anima torret, odoris inordinatitate commendans. Piperolitotes nostri nominant, quod ærum piper colore & sapore fortitan æmuletur, sit ergo nobis Piperastrum quoad melius vocabulum invenimus. Vides itaque quam exca sit harum rerum effigies. [Si licet, inditum nostrum adferre suspicor esse similitudinem asperam, piperastrum Ruellii.] Alij oculatâ fide referunt longum piper esse ex aliis arboribus veluti nucamentum quoddam, exilibus granulis squamatum compactum, quod veluti julus in Avellana nucæ, vermiculosa facie dependet, piperatò gustu: nunquam in album tamen vel nigrum piper coalescere. Qui Vitici assimilant julum compactilibus granulis coactum in eadem arbore fructum, veluti quendam convalescentis semini conceptum contendunt, quale forsan in salicibus apparere cernimus, & etiam Vitice, Nucæque ponticæ. Nec deest qui tradat visum sibi in India piperis fruticem, Hederæ modo amplexicaulem, folio Mali Assyrii, sed carnosiore pinguique, racemis palmaribus, coloris immaturæ uvæ: huiusmodi mense Novembri, ac insolatis singere. Necius ultra quæque adjunctis volutus fidem antiquorum placitis derogare. Vana sunt forsitan diversis regionibus arbores piperis: uti & varia palmarum multarumque stirpium genera, palmas tamen ferentia. In Ægypto ut Straboni placet, granum piperi simile, paulo tamen majus nascitur Cossion nomine, quod piperis vicem & acumen perferat, si alterius non detur occasio.

Lusitani, Matthiolo ita tradente, navigant, hoc ævo confectis per Oceanum Atlanticum versus Austrum primo, & hinc deinde in Orientem ad Calcut, Taprobanam, aliasque Indici pelagi insulas: item Hispani Liburnicis vecti ad Occidentales Insulas, Perù, atque alias complures regiones, quæ antiquos Geographos penitus lateverint, non modò pipere & huiusmodi odoratis simplicibus, universam repleverunt Europam, sed & stirpium historias, à quibus oriuntur posteritati memorie prodiderunt. Quod postea fecit, ut plane nobis ignorasse videantur Theophr. Diosc. & Plinius aut ob regionum distantiam (indigenam potius in hoc fide sequuntur, quam quod forte ea viderint, quæ de pipere scriptis tradiderunt) aut ob aliam quamvis causam, plantæ illius formam, ac notas, quæ piper in India gignit, ac quoniam modo piperis planta summe datur fructum, an scilicet racematum, an corymborum modo, an in siliquis inclusum, an baciferarum arborum more. At hi qui suis Liburnicis immensa traiecerunt maria, propriasque perlustrarunt regiones, ubi piperis utriusque plantæ virebant, nigrum ac rotundum gignunt a quibusdam infirmis viticulis, vicinas arbores altiore complexu scandentibus, acutæ Clematidis non dissimilibus, folio tamen Malum Assyriam æmulantibus. Quin & racematum profertur varium Liburnicæ modo, confertius tamen: deinde mense Octobri per maturitatem decerpi, & sub ferventi sole tegibus palmeis expantum toreri, quousque nigrescat, & rugosum evadat, quod induratum spatium plerumque sit. Longum autem ut inde testantur, alie ferunt arbores, estque velut nucamentum quoddam, exilibus granulis compactum, quod velut julus in pontica Nucæ, qui pulchre adspicitur, vermiculosa facie dependet piperatò gustu: nunquam tamen in album vel nigrum piper coalescit. Galenus indigenam hanc &

Dioscoridem sequens, eandem plantam tam rotundam quam longum piper edere credidit. Piperis faciem vidi Neapoli, qui Lusitanorum desertis poni maxime respondere visus est, quod viticulis caule esset, Clematidis acutæ modor. Sed & aliam arbuticulam piper racematum proferentem vidi Venetiis, quæ prorsus illius plantæ faciem exprimit, quam vulgus Ribem appellat. Viret hæc in horto Medici Maphæi à Maphæo, in quo plurima simplicia notatu digna visuntur. Quod sit ut mirum non sit, & in piperis historia videntur auctores. Quandoquidem cum variæ in Italia piperis habebantur arbutulæ, facile credendum est varietatis longæ majoris eas in India reperiri. Hæc ille, qui figuram sibi depictam à Portugalesibus exhibet. Matthiolum autem negligentem Botanicum fuisse apparet ex eo quod visum piper Neapoli non descripserit. Si bene considerasset plantam Venetiis visam, compertisset à pipere plurimum differre & nihil habere commune, nisi quod racemum fert: ea autem planta nihil aliud est quam Ribes nigra quibusdam de ea, de qua nos presenti libro. Iconem quam ponit falsam existimamus quales plures habet.

Nascitur piper apud Indos, ut Amat. scribit, eo modo quo apud nos Hederæ: sic enim piperis plantæ parietibus & arboribus hæret, circumvolviturque folio Mali Cotonei, sed rotundiore, quamquam piper quoque in planta folia vitis ferente nasci à nonnullis visum est, & hoc Venetiis in nonnullis hortis conspicitur. Nascitur enim prius piper, affixum ramulo, tanquam veruca carni, sed postea pediculis tanquam Hederæ bacca pendet. Virides namque piperis racemos aceto servatos, ex India ad nos amici transvexerunt: ex quibus exactè censemus, quod piper dicto modo crescat, nascaturque, sed quum ad maturitatem pervenit colligitur & in stercis ad torridum solem ponitur, ubi eo modo, quo nos corrugatum videimus, efficitur. Interdum autem granum hoc simpliciter ac immaturum est, albumque piper appellatur, ut ut piper nigrum, & album ejusdem sit generis fructus, nec in alio differant quam majori, vel minori maturatione. Diosc. & Galen. errant, quia piper longum ejusdem arboris fructum esse credant, quum revera piper longum alterius arboris fructus sit, quæ ex insula Sômatra, Taprobara dicta adferunt. Hæc Amantus qui in eo maxime decipitur, quod Piperis arborem folio Mali Cotonei tradat.

Cord. his Piperis genera describit, verum cum vix quicquam quod sit alicujus momenti, aut quod ab antiquis non sit dictum, tradat, nihil hic addimus, aut enim cum illis, sicuti & Monachi, omnia citis Piperis genera esse ex una planta. Ex Dodonæo etiam nihil aliud quam quod dicit Antuerpiam adferri ex India Piper conditum cum pediculis.

Salvo meliori judicio in defectu piperis albi, pro eo potius appendendum censent Monachi piper longum, quam nigrum: quia in simplicitate & confortatione magis convalescant inter se. Postetiam poni nigrum putant, quia quod album sit in medio, & de utroque ipsorum participet. Similiter si careat longo, potius præcipiunt accipiendum album, quam nigrum, quia album magis appropinquet longo, quam nigrum: Et è diverso in defectu nigri ponendum consulant album, quia propinquius sit. Item quoad utrumque dux ipsorum species desunt, per reliquam suppleudas arbitrantur. Sed quando simpliciter legitur piper, semper album intelligendum docent secundum aliquorum opinionem, quod etiam probat Nicolaus Praepositus in suis Analogis, quia (ut duntaxat Avic. & Sîm. Serap.) quod ipsum ponit auctoritate Galeni, piper album conloret stomachum, plusquam alia quæ species

Piper ni-
gram a-
crum can-
dido.

Diosc. m.

Cord. m.

Piper sim-
pliciter, &
nigro con-
fignat.

1. 1.

Piperum
quidam lo-
ci illud
m.

Candide
flamma.

Piper al-
b.

De acrimonia Piperum hæc Cordus hist. Verum-
que odoratum & gustu acerrimum, servidissimum,
que est, odoratius tamen acriusque candido nigrum
sentitur: ideoque medius habet candidum, inter
longum & nigrum qualitates: tardius enim longi-
tudinis candidi, citiusque autem nigri acrimonia gustu
percipitur, quamvis Dioscorides candidum (quod-
nam acerrimum sit) utroque ignavius esse tradat, quam
bene non video, cum absurdum quoddam inde ori-
atur: nam idem Dioscorides nigro ignavius can-
didum ideo esse rationatur, quoniam acerbius, hæc
immaturius sit nigro, ergo cum longum quoque a-
cerbius, immaturius, imperfectiusque sit candido,
sequitur necessario longum Piper omnium esse
ignavissimum, ergo videtur aut hæc ratio natio
nullum in veritate locum habere, aut Dioscoridem
male tradere, candidum tam longo, quam nigro
ignavius esse. Hæc Cordus qui Piper rotundum seu
nigrum, ex longo fieri odoratius, acriusque candido
dicit, sed male, Quod autem quum Piper simplici-
ter pronunciat, nigrum contra Monachos qui al-
bum præferunt, intelligat, nostro iudicio doctè
sentit.

Sed quid de Pipere referant, qui id se vidisse glo-
riantur, mox audiendum. circa Calecut (inquit Cro-
nemb.) in India copiose provenit piper, etiam in
urbe sed parvâ quantitate: truncus similis est Viti, si
plantetur juxta arborem, alioquin non potest assur-
gere: provenit Lupuli modo: plurimos fert ramos,
duarum aut trium palmarum longos; folia similia
Melangoli. Ex ramulis prodeunt 5. 6. aut 8. pediculi
paulo longiores digito, quibus adhæret piper par-
vorum hororum modo, sed magis angulosum, vi-
ret instar Agrestis. Mense Octobri & Novembri im-
maturi botri exciduntur, supra lintea exponuntur
foli per tres aut quatuor dies, sic exsiccatur & ni-
grum fit. Simile quid refert Ioan. Stadius, dicens:
duo genera Piperis in America sunt, alterum flave-
scens, alterum verò rubescens, eodem serè modo ac
formâ succrescentia: dum virescunt Cynoboti habet
magnitudinem; stutem per se humilis est, sesquicu-
bitum altus, folus exiguis, sed abundans Pipere,
quod acriter in ore mordicat: maturum decerpunt,
& foli expositum siccant. Est & tertium genus Pi-
peris, sed minoribus grandis, à prædictis non mul-
tum dissidens, quod similiter sub sole torretur. Sunt
illi radices Letiki dictæ, satis boni saporis, quas si
plantare instituerint, consueverunt eas in minuta fru-
sta, quæ terrâ obruta radices agunt, & abundè pro-
ducunt. Hæc attestari videntur Marantha cum ait,
Piperis arborem eam Dioscoridi videre non licue-
rit, atque ex aliorum scriptis ejus fructus describe-
ret, tria illius genera ejusdem arboris esse tradit: &
tamen hi, qui in novas Indias navigarunt, quique
arbore viderunt, diversarum arborum fructus ni-
grum, candidum & longum esse affirmant.

Illud portè Galeni lib. 9. c. 4. sec. locos
Viginti & drachmas candentem conijce flammam
In Græco sic habetur:

Οκτώ δ' ἀρπύριοι πρὸς τὴν εἰς τὴν φλόγα.

Appellavit itaque Cornarius candentem flammam,
ipsum Piper album, à flammeo fervore quem ha-
bet, unde etiam *πυρρὸν* dicitur, quasi ignitum candi-
dum, Philo dixit. Quemadmodum autem Philo Pi-
per album hoc loco enigmaticè *πυρρὸν* dicitur, dixit.
Sic Andromachus senior in Elegiaco carmine, quo
Theriacam ex viperis describit, à Galeno i. lib. de
antidotis relato, idem Piper album *ἀγλαῖον* appella-
vit, à nitore videlicet quem habet. Sic enim ait

Καλὰ καὶ ἀγλαῖον ἔστι τὸ ἀγλαῖον τὸ πῖπρον

Ἀγλαῖον ἔστι τὸ ἀγλαῖον τὸ πῖπρον. Id est

Thuridique miscetur mox, aglaiaque nitentem

Cum nigro mixtum in usum habet Piper.

Quod ipsum tamen neque à Galeno animadvert-
tum est. Hos enim versus exponens inquit, non
querere oportere de Aglaia, sed quænam aliter ali-
cuius pharvacii nomen sit, quum neque in pedestri
junioris Andromachi descriptione, neque in ea quæ
ad ejus ætatem per successione pervenit, alicujus
pharvacii nomen Aglaia reperitur, & ea omnia
quæ hoc pharmacum sex drachmarum pondere re-
cipit, consonè tum seniori, tum juniori Androma-
cho sunt felata, & omnino nihil extra illa additum
sit, ad quod Aglaia nomen referendum qui putet,
ut fortassis Aglaia epitheton Thuris, elegia autem
apponere visum fuerit. Sic Galenus. Ego itaque o-
mnino rem inquirendam, & quidem attentius du-
xi, & sanè repertam etiam mihi feliciter spero. Aglaia enim
Andromachus senior nihil aliud quam Piper al-
bum, velut dixi, appellavit. Piper autem al-
bum alias in versibus Andromachi non habetur,
quum tamen junior Andromachus ipsum ponat,
sed ita ut hac parte varient hæc hujus Antidoti de-
scriptiones, alias nullâ re differentes, quod videli-
cet senior Piper longum in principio xxiij. drach-
marum pondere posuit, & eo loco pro conjunior pi-
per nigrum habet eodem pondere: hoc vero loco
inter res quæ sex drachmarum pondere recipiun-
tur, senior album & nigrum Piper posuit, junior ve-
rò album & longum requirit, ita ut diversitas tantum
in nigro & longo pipere sit, quorum alterum aliter
xxiij. drachmarum pondere, aliter sex recipitur, album
verò in utroque inter res sex drachmarum pondere
amixtas habetur & *ἀγλαῖα* à seniore appellatur.
Hæc Cornarius.

Piperis igitur simpliciter dicti nomine, intelli-
gendum venit in primis Piper nigrum: In cujus ge-
nere Dioscoridi est Brasma, Plinio Brachmasis, sive
Abortus piperis. Præterea & Piper album, quod
Andromach. senior in Theriaca Aglaia vocabulo
insinuat, quamvis Dioscorides existimavit, esse epi-
theton ut annotavit Cornarius.

Piper insule Taprobanæ candidius Melaga dictum.

Piper caudatum, Piper longum, Piper Ethiopi-
cum siliquosum, Piper florida, & Piper longum Fel-
fel Alpini, de quibus mox ordine dicemus.

Piperis præterea genus, vel Piperastrum Ruelli
habetur, quod Smilax aspera creditur.

Piper etiam in horto Maphari à Matthiolo visum
est Ribes nigrum à quibusdam dictum: De his jam
egimus.

Piper Indicum sive Calecuticum siliquosum
Piper siliqua parva Brass. Piper siliquosum magni-
tudinis baccarum Asparagi. Piperis Calecutici pa-
vum genus, siliquis oblongis: de his lib. 2.

Note, Piper Lat. Germa. Pfeffer: Belg. Deper: Engli-
Gall. Poivre: Ital. Pepe: Hisp. Piment: Arab. Fulsul.
Boh. Deper.

Loca in quibus Piper potissimum provenit hæc
sunt. Malavar, Onor, Barfleur, Mangalor, Calecut,
Granganor, Cochín, Conlán, ubi lingua Malayar-
ca, *Melanga* appellatur. Crescit etiam in Quæda
prope Malacam: & Malay vicè *Lada* vocatur. Hoc
Piper potissimum versus Pegu vehitur & regiones
Septentrionales. Piper etiam sequentes
Provincias ferunt, Pedir, Camper, Andragir, Iambe,
Bares, Speriamon, Dampin, quæ regiones sunt Su-
matra: Item in Java Bantam, & Java plaga West-
seiten/ Anier, Chueonin, Molassery, Changabaya,
Cherola, Charita, Cheregin, Labuan, Buana, Il-
bongor, Pariban, & locus quidam quatuor milli-
bus distans à Bantam versus Onor item, Puceta vi-
cus. Hæc igitur omnia loca Piper alunt. Piper ma-
turefcit in Java mensibus Septembri atq. Octobri.
Colligitur Novembri & Decembri, & in Bantam, &
potissimum in Chinam vehitur. Lingua javanica
Sabang.

Saban vocatur. In regione Caraganora ubertim piper nascitur, quod torrent, ut scribit Iosephus ad calorem solis, ne forte satum alibi germinet in damnum eorum. Est & in regio Eli, Melibar, & Cedum in magna copia. Nam nemora (inquit M. Paul. Ven.) & campestris ejus plena sunt. Colligitur verò in Maio & Iulio, Linschor.

VIRE ET USUS.

Ex Hippoc. Piperis grana [περιστερα κόκκοι] quinque cum paucis Elateris muliebri lacte paulatim instillato, Hippocrates in vellere unguento intincto subicit, eodemque modo detrahunt. Inter medicamenta subditiua vehementer purgantia, quæ magis aquas, mucosa & pelliculas educere queunt, Piperis grana [περιστερα κόκκοι] majuscula quatuor, aut parva, si opus videatur, ad Elateris portionem admixta leviter terit & lacte muliebri instillat, cum paucis melle subactum, id ex lana molli pura circum pennam linteo tenui convolutum, unguento albo Egyptio intinctum supponit. Per diem autem adherere sinit, deinde, ubi detrahit, cervinum adipem subdit. Sed

Indic. med. & Indici medicamenti aliquantulum in lacte mulieris masculum lactantis, si ita visum fuerit, terit. Aut grana tria decorticata Indici medicamenti oculorum, quod Piper vocatur, & rotundi tria [κόκκοι οὐλῆς] cum oleo terebinthinae [περιστερα κόκκοι] leviter trita & vino veteri tepide diluta, circum volucris pennam in glandis formam obducit, huncque in modum intromittit. Hoc Hippocratis in loco *Περὶ ὁφθαλμῶν* tractatu legit, & grana Cnidia triginta assumi & teri vult, verum illum locum ex isto potius repono & Indici medicamenti grana tria trita sumi volo quod piper vocatur Hipp. ex lib. 2. *περι πνεύματος*. Vim habet in universum calefaciendi, urinam ciendi, concoquendi, attrahendi, discutiendi, exherendi ea, quæ pupillis tenebras offundunt. Commodum est etiam ad rigores per circuitum in febribus repetentes, cum si bibatur, tum si illinatur, & commotis à bestis venenatis auxiliatur. Educit etiam fetus. Putatur & conceptionem impedire, si post coitum apponatur. Tussi quoque & omnibus circa thoracem affectionibus commodum est, tum si delingatur, tum si in potu accipiat. Anginis item convenit, illud cum melle. Tormina [πένες] quoque dissolvit cum teneris Laurifoliis potum. Pituitam e capite detrahunt cum uva passa manducatum. Dolores sedat, & in sanorum usu multum est [ὅτι ὁ ἀνὴρ ῥεῖς λέγεται, ἀπὸ τοῦ Διόσκ. Κορν.] ac appetentiam moyet, & ad intinctus admixtum, concoctionem adjuvat. At pice excerptum strumas discutit. Detegit & vitiligines cum nitro. Torretur autem in nova testa pruinis admotum, & ut lenticula movetur. Cæterum, radix ipsius non est Zingiber, ut aliqui existimaverunt, quemadmodum satis declarabimus. Nam Piperis radix Costo similis est, calefacitque gustum, & humores provocat. Eadem si cum aceto imponatur & bibatur, splenem minuit. Pituitam verò de capite detrahunt cum Staphideæ gressi comminutata. Galeno simpl. lib. 3. Piperis radix vires Costo similes potissimum obtinet. Porro fructus nuper quidem admodum germinantis, longum piper est: quare etiam maturo humidius est: humiditatis ejus indicium est quod facile repositum perforetur, ac non protinus mordicet, sed post paulum incipiat, verum plusculum duret. Porro fructus qui velut omphax est, Piper album est, nigro quidem acrius. Nihil tam quasi superassatum est, & super exliccatum, verum utrumque valenter, tum exalcatum, tum desiccatur. Minus (inquit Gal. apud Ioh. Ach. Curzum) Piper calidius est quam Zinziber, quia in Piperis radicem funditur in materia valde tenui quæ cito absumitur, sed Zinziberis substantia est magis terrestri & solidior, ideo calor, sicut in pru-

nis, diutius in ipso conservatur, & hac ratione, quoties ventriculum refrigeratum calefacere oportet, nec tamen epiti vel sua natura, vel ex accidenti aliquo calenti, noxam inferre volumus, jubet nos Galenus pipere uti. Hujus enim calor in ventriculo & in primis viis deflagrat, nec pervenit ad epas secus quam contingit ex cinnamomo, zinzibere, aut aliis aromatibus. Ut annotatur in Schol. Salern. piper est balsamentum rusticorum, commiscet enim piper cum fabis & pis. Similiter etiam ex pane aslo cum cerevisia vel vino & pipere, sic balsamentum nigrum ad modum pulvis, quod etiam Piper vocant, & hoc effundere super carnes solent, aut pisces. Cæterò, quod paucum piperis provocat urinam, & multum ejus ventrem solvat, ita tradit Bapt. Fiera:

Ardes & in nervis, gluzinat & que phlegmata fertur

Sic piper, ut nullum sicces aroma prius.

Exacuat stomachum, molligo ventre superbit,

Hic caveas ferret si tibi bile iecur.

Corporis huic minimi numero laus damna rependit.

Plura movent alvum, meliore pauca subent.

Quod autem piper frigidum non sit, pulchre docet Leon Botall. his verbis: Piper plerumque usupatur solum felicissimo successu ubi gurgulio flammens est: unde plebei & qui parum exercitati sunt in rationibus medicis, audent dicere hoc argumento fulti piper frigide potentia esse, putantes calida tantum expelli à frigidis, ignorantes præcipuam inflammationum curationem absolvi à calidis resolventibus id quod parti hæret: ad magnos capitis dolores (ait V. Virt. Empir.) accipe 20. grana, contunde cum paucis vino & superliga vertici capitis. Vel, coque piper in forti aceto, postea exsicceetur redigaturque in pulverem qui in sacculum oblongum ponatur, effundatur prædictum acetum & aliquoties percoletur. Dum durabit acetum abluitur quotidie manè jejuno caput: statimque involvatur pannis calidis: hoc sæpe probatum fuit. Ut impediat canicula, ne venereum sentiat servorem, huic priusquam catulos habuerit, per novem dies manè novem grana piperis in cibo aliquo dat lac. Foulloux. Furfure & Pipere Magnes si alatur, referente Nic. Urbino Chirurgo, longè validius ferrum ad se attrahet, quam si Ferri scribe soveatur.

*Notam
quendam
digna.*

*Piperis in
suis viribus in
gurgulione
flammeo.*

*Piper frigi-
dum non est.*

*Dolor capi-
tis.*

*Causa ratio
dum.*

*Magis
alutium.*

PIPER NIGRUM.



PIPER nigrum Deser. racematum in ligula longa sine pediculis coheret, acinis Sabuci paulo minus, rotundum, cortice rugoso, nigro, aut fusco, quo detracto substantia conspicitur duriuscula & compacta, cujus exterior orbita ad viridem inclinat, interior albeat, & scrobiculum in medio vacuum ostendit, sapor servidus totum os & fauces adurens. in iisdem racemis hæret grana quædam multo

Deser.

*Sambuci
acini.*

Saper.

Brajma.

minora, maturitatem nondum affecuta, ideoque nigrosiora & evanida Brasmatum in morem. Nostrium piper nigrum solet esse crassius candido, potissimum

Ex Diosc.

Febris.

Ventris.

Fetus.

Tussis.

Angina.

Serum.

**Radix Pi-
peris non
est Zingiber.**

Ex Galeno.

**Tempera-
mentum.**

Error quorundam.

Lingua etiam cretensis.

Ignorantia Veterum.

Mali Assyrii folia.

Fructus racemosus.

Dioscoridi refutatur.

Racemi muria conditi.

Descriptio Clusii.

Clematidis aut Periclymeni flagella.

Folium de raco.

in illud quod minus rugosum; consuevit enim esse obductum cortice rugoso, & quod majus est ed minus rugosum videtur: vidimus enim sæpius Lugduni racemos ubi giana quod minora, ed magis rugosa erant & inania magis. Ex majori, quod maturius existimamus, facilius detrahitur cortex, eoque detracto albescit, ided à quibusdam perperam pro candido assumi observavimus.

Vocant Germani piper nigrum schwarzen Pfeffer & simpliciter Pfeffer: Angli Pepper: It. Pepe: Hisp. Pimiento; Belgæ swert Peper: Galli Poivre noir; Lusitani Bamba; Malayenses Mamba: Nomen verò est, inquit Garcias, lingua Malavaria Molanga; Malacitanà verò Lada; Arabibus tum medicis, tum vulgo Filsil; tametsi Avicenna l. 11. c. 549. & 550. secundum Bellunenens translationem Fulsul appellet, & Fulsel, quem secutus est Serapio lib. simpl. c. 307. In Guzarate & Decan Meriche, & in Bengala Moron. Mirum non est si Theoph. l. 9. c. 22. Diosc. l. 2. & hostequutus in plerisque Plinius l. 12. c. 7. piperis plantæ formam ignorarint. Quod verò Arabes in eodem errore versati sint, & nonnulli etiam ex recentioribus, illud mirum.

Garcias sic describit: ad arborum usque fastigium sese convolvendo scandere solet: foliis raris, Mali Assyrii effigie, sed minoribus, & per extremum acutis, virentibus, gustu calidis aliquantulum & folium Betre sive Betle sapientibus; fructus uvarum modo racematim coheret, minores sunt tamen Piperis racemi, & ipse fructus minor, semperque virens, donec liceatur & plenam maturitatem consequatur, quæ incidit circa medium Ianuarium; radix postea non Costo similis ut voluit Diosc. quandoquidem Costus radix non est, sed Lignum: Inter plantam quæ Piper nigrum fert, & ea quæ candidum, tam exigua differentia, ut à nemine quàm ab incolis dignosci possit, nisi cum uvas habent & illas quidem maturas.

Piperis historiam etiam describit Lud. Rom. sed paulum à Garcia variat. Racemis interdum cum Gingiberis radicibus muria conditis Antuerpiæ reperire licet, oblongos quidem illos & graciles, neque ita fæctos ut sunt uvarum racemi. Tametsi Garcias, & hunc sequutus Acoſta (quorum historiam aromatum ante multos annos latinam faciebat Clusius) de Pipere commentati sint: quia tamen his proximis annis Batavi qui in Iavam navigarunt, & ad Moluccas usque insulas etiam penetraverunt, aliquot ejus sarmenta cum foliis, ipsaque adeo radice, atque qui inter illos magis curiosi, etiam ramulos cum suo fructu immaturo inhaerente retulerunt; & horum unum cui folia & fructus inhaerebant, tum etiam sarmenta quædam, amici curâ & diligentia idem Clusius nanciscabatur: operæpretium se facturum existimavit, si ex illis notis quas in planta & ramis siccis observare potuit, ejus historiam concinnaret, & ramuli cum suo fructu & foliis, radicisque parte à perito pictore in tabella expressi figuram hic subiceret.

Aldè autem sarmentosa est piperis nigri planta, & adeo imbecillis atque caduca, ut nisi pedamentis fulciatur, aut juxta arborem aliquam circa quam se convolvere possit, pangatur, humi procumbat & spargatur, perinde ac Lupus salictarius; lenta verò & flexibilia sunt ea sarmenta, frequentibusque nodis sive geniculis distincta, & quæ humi sparsa, multas fibras ad singula internodia agunt, quibus se humi figunt, quemadmodum Clematidis aut Periclymeni flagella, ut in illorum nonnullis observabatur, quæ fibras adhuc retinebant: sic ut in illarum plantarum numero reponenda censetur, quæ facile pangi possunt, sarmenta porro ad singulos nodos singulare folium proferunt alternatim, hoc est,


nunc in hac, modò in altera sarmenti parte nascentis, hederaceæ quodammodo formæ, vel ejus Cyclaminis quod hederaceo constat folio, cui tamen anguli desint, neque adeo crassum, verum multo tenuius, interdum verò adeo latum, ut quatuor unciarum latitudinem æquet, & quasi orbicularem formam adquirat, nisi in mucronem desineret: maximà verò ex parte binas duntaxat uncias latum, quatuor longum, breviter Tambul sive Betle folio adeo simile, ut alterum ab altero vix discerni queat, nisi piperis folium paullo durius, & nervosillos per folij longitudinem excurrentes paullo crassiores habere videretur: nec illud in ambitu serratum est, ut quidam pinxere, sed prorsus æquale & nihil similitudinis habens cum mali Assyrii folio, ut nonnulli tradunt, omnia verò folia quinque nervis sunt prædita, quorum medius & crassior medium foliorum per longitudinem secat, reliqui quatuor minis crassius ab illo oriuntur, utrinque bini, in latera secundum folij partem longitudinem expansi, & illi quidem in nonnullis foliis æqualiter ex opposito nascentes (ea Acoſta feminei sexus ab incolis censeri scribit) in aliis verò inæqualiter oriuntur, neque istam

Folio Tambul sive Betle.

Folia non sunt mali Assyrii.

Piperis sexus.

PIPER NIGRUM CLUSII.



proportionem servant (hæc ab incolis masculini sexus appellatione donatur asserente eodem Acoſta) sintne porro quæ feminini generis censeantur, dilutior viriditate prædita quæ pro masculini generis foliis habentur, nihil pronūciare potest Clusius, sicca duntaxat folia vidit: sed quandoquidem in eodem sarmento utriusque formæ nata conspexit, vix sibi persuadet, colore inter se variate, illud autem observabat, utraque, licet resiccata, præhæ parte dilutiora esse, quàm supina, atque per universum folium venulas obliquas transversim evagari, insuper non mediocrem acrimoniæ adhuc retinere. Vix porro ad ramorum internodia nascuntur teretes & oblongæ, multis granis orbicularibus, nunc majoribus, modò minoribus ipsi scapo sine petiolo adnexis constantes; & illæ quidem non ex foliorum ala, h. e. inter sedem pediculi folium sustentis & ipsum sarmentum, sed ex altera sarmenti parte, folij pediculo videlicet opposita, quemadmodum ex adposita figura ad vivum expressa videre licet. Ceterum illam acrimoniæ non modò retinent sicca folia, sed etiam ipsa sarmenta, atque (quod magis mirum) ipsa radix quæ sub terra latuit, ut experiebatur Clusius. Piperis folium, quale in Bantam Iavæ emporio nascitur nullam similitudinem habebat cum Mali Assyrii foliis, sed Betulæ folium æmulum videbatur, non adeo tamen tenellum, sed magis firmum, duabus crassis venis ex utroque nervi medio latere versus aras excurrentibus, oblongiusculo mucrone præditum, quinque uncias longum in ambitu nunquid serratum, tametsi folia ampliora conspexerit. Ipsum porro monebat N. V. Fabricius Mordente, Indos solere, Piperis botros adhuc virides & immaturos in os indere: deinde ramulum, cui grana inhaerent, digitis prehen-

Acrimonia.

Piper in Bantam.

prehensum sensim extrahendo leviter dentibus premere, & grana in ore maneat illa postea manducare non sine voluptate. Idem ipsum factitasse, & gustu suaves deprehendisse, quia leviorem quandam acrimoniā cum pauxilla acerbitate conjunctam in illis deprehendebat. Idem Clusius in notis in Garciam ait: Putat errorem esse Garcias si Piper ab aliis *Fulful* dicatur, cum Arabes *Filfil* vocent. Sed cum omnes totidem literis scribant, & diversitatem diversi literarum apices tantum efficiant, in omnium arbitrio est, utro malint modo, pronunciarē *Filfil*, aut *Fulful*. Piperis plantam ita describit Auctor geographiae Arabicae: Et in insula, h. e. terra Mali, nascitur arbor Piperis, neque nascitur nisi in ipsa, aut in Candaria, aut in Gerbathan: & nulla invenitur, nisi in istis tribus terris. Est autem planta, cujus stipes aliquantum similis est stipiti Vitis, foliis instar foliorum plantae Volubilis sive Faseoli, longa, non alta, racemis instar racemorum Vitis, quorum unusquisque occultatur folio suo propter pluviam, quod inflectitur, adveniente pluvia. Piper verò album non inflectitur ab ea, superveniente illā initio aut ante. *Hachi* filius *Chari* dicit de eo, quod quum est pluvia, inflectuntur folia ejus super racemos istos, & defendunt eos à pluvia, quum recessit pluvia, attolluntur sive remouentur folia à racemis, neque revertuntur, nisi tempore pluviae. Revertente pluvia, revertuntur folia ad ipsos. & hoc est mirum. Hæc ille, quæ nisi fallor, ait Clusius, indigent peritorum hominum examine. Nam mihi suspecta sunt. Sed Arabes multa ejusmodi fabulantur, ut Iudæi.

AOSTA Piper aliud domesticum esse tradit, cujus usus sit aliud sylvestre, quod ob amaro-

PIPER NIGRUM
costæ.



rem negligatur. Domesticum, inquit is, planta sarmentosa est, scanditque Hederæ modo, arboribus, quas nancisci potest, sese circumvolvendo: nodis per intervalla prædita, ad quos nascuntur folia, Betele foliis similia, parte interiore satius virescentia, exteriori dilutiora, cuspidē mucronata, & gustu linguam vellicante. Horum foliorum alia aliis nigriora sunt: quæ dilutiora sunt fibratæque aqualiter nascentes habent, seminas cæsent (nam utrumque sexum in

foliis ejusdem plantæ constituunt) nigriora verò inæqualibus fibris, mares. Ad singula internodia, unde folia dependent, ex ipsa foliorum sede nascuntur uvæ, quarum maximæ circiter quinquaginta grana obtrinent, minores verò triginta. Radix pusilla est & summa tellure fibras agit. Summa autem similitudo est plantarum quæ nigrum Piper proferunt & album: alibi tamen folia tenuiora & molliora videntur: ejus etiam fructus magis aromaticus, meliorisque saporis quam nigri.

Lugd. quæ quatuor exhibet figuras, Galenum notat. Id Dioscoridem secutus eandem plantam piper longum, candidum & nigrum proferre falsò crediderit. Figuras autem quatuor sub his titulis exhibet Lugd. Arbor piperifera Theveti: Piper nigrum & album: Piper Matthioli: Item in app. Piper nigrum.

Tom. II.

grum Acostræ. Gileni sententiam Cæsar quoque repetit. Pingit autem racemus rotundus piperis & folia reperta lapidis inter grana, item longum piper, negat tamen in eadem planta crescere piper album & nigrum, sed consimili tantum, ut botros rubros & albos in diversis vitibus; rariores autem statuit esse plantas quæ album, quàm quæ nigrum piper proferant: piper nigrum ait arundinibus sustineri quem admodum ferè apud Belgas Lupulū. Caudem namque debilem esse, & sine ope alterius surrigi non posse, rami Juniperinis similes; grana viridia primum, dein matura facta atque siccata nigrescere.

Folia quæ pingit Linschot. non sunt Hederæ s. De hemib. milia, sed Lauro: Nos figuras diversas proponimus; Prior quam ponimus nobis abscentibus depicta est ex Clusio. (Hæc olim posita simpliciter pro Piperis uva; postremò verò pro piperis albi uva) vera quidem, verum per Sculptorem malè sculpta: ad latera additum granum caudatum, quod est Piper caudatū sub signo crucis; & Haeremia sub signo Stellæ, sed utrumque semen per Sculptorem corruptum. Icon secundæ, quam proponimus est ex Clusij exoticis, Tertiæ, quæ est ex Acostræ & figuris æneis, displicet nobis, verum certò asserere non possumus non esse plantam quæ melior icon: Camerarij folia piperis, exhibemus juxta iconem Piperis caudati sub litera A. Matthioli figuram non exhibemus, quia ei non consuetum veræ figuris exprimere, eam faciliè possemus asserere falsam & nunquam ei ita visam. Theveti effigiem non sine occasione omittimus, quam tamen Ambrosius Pareus assumpsit lib. 12. Chirurgia 26. cap. quia falsa est, quod apparet ex seminibus quæ pingit cum pediculis Hederæ modo adherentibus, cum uvam representent: Ex historia & iconē præterea Clusij, quam hoc capite ponimus, apparet falsis ineptè Thevetum appingere piperi truncum arborem magnum, licet scribat esse arbusculam: & cur scribit, Mali Medici foliis similia, & nihilominus in iconē sunt planè Hederaceæ.

B. pin. Piper 1. rotundum nigrum: Piper nigrum, Matth. Læ. Cast. Garz. Frag. Clus. & Lug. Tab. Piper rotundū nigrū, Cord. hist. Lob. adv. & Cæf. Piper nigrū in Calecut, Lud. Romano. Piper rotundū Hippocratis, Garz. Quid sibi velit Matthioli cū sua figura, & Cast. Lugd. Tab. & Gerz. habent, non assequor. de ea figura sic Gullandinus: si frutex ille Piper est, vel etiā Amomū, ut alijs sonant, parū aberit, quin vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum esse possit. Scribit Piperis planta hoc modo: sarmentū ejus seu ramū juxta prægrandē quæcūque arborem (magna certè ex parte juxta Faustel, ut Palmā plantatā vidit Garcias) aut palū defoditur, atque bubulū sterens, & cineres cū aqua insperguntur: infra annū deinde fructifera est, quodque vetustior est planta, eò feracior, quippe quæ ad ipsius arboris, cui maritata est, fastigiū sese circumvolvendo scandere soleat. In Cochinchina verò ubi plurimū nigrū nascitur, quinq; aureis emendat cæteræ libræ: sed post quadriennium aut quinquennium, qm in alias etiā regiones importari ceperit, quindecim aut viginti aureis emendat erant. Piperis autē nigri pretium in centenarum libras est duorum Lusitanicorum cum semisse, natali loco: ac in Bangala duodecim Lusitanicis emuntur totidem libræ.

Piper nigrum rotundum in Insula Sumatra provenit & præstas Cānas scādū. Maxima Piperis quantitas provenit in Malavar, tota ea maritima regione quæ à Promontorio Comorin ad Cananor usque pertingit. Nascitur etiā in Malacæ maritimis, sed honestate superiori cedens & magna ex parte inane. Provenit similiter & in Insulis Java vicinis, & Sunda, & Cuda, aliisque locis. Sed id totū in Chinæ regionem deportatur, & loco natali consumitur, præter id quod in Pegu & Martaban exportatur. Pous-

Piperis
nigrum
costæ.

Piper de
mestrum,
costæ.

Piper semina
ca. 17. m. 11.

Nigrum
album.

Lugd. not
Error Diof.
& Cæf.

Piper albū
& nigrum
non in ea-
dem planta

De hemib.

Matth. not.

Theveti.

Eius semen
di. v. m.

Pierium.

Locut.
Piperis non
rales.

Sima etiam ejus pars quod in Malavar gignitur, in
 usum incolarum cedit, tametsi regio admodum am-
 pla non sit: nonnihil etiam à maritimis ejus regio-
 nis populis absannitur: Pars desertur in Balagate
 bubulis coriis: & magna copia (tametsi regio man-
 dato sit vetitum) à Mauritanis per mare Erythrazum
 expottatur, id suffragantibus ipsis incolis. Ex sunt
 regiones quæ Piper gignunt, quamquam & inveni-
 tur supra Cananor, quæ Septentrionem spectat: sed
 adeò exigua quantitate, ut ipsis incolis non suffi-
 ciat, & externo importato opus habeant. Etenim
 non gaudet hæc planta locis desertis & mediterra-
 neis. Quàm verò procul à Caucaſo monte diſſitæ
 sint hæ regiones, ex topographicis chartis satis patet.

Piperis nigri foliis utuntur incolæ adversus dolores colicos aliósq; frigidos corporis affectus. Condiuntur acetosæ aut sale virentes adhuc & immaturi piperis nigri racemi & ului asservantur. Arabes & Persæ medici piper calidum tertio ordine constituunt. Sed Empirici cujusmodi sunt maxima pars Indicarum medicorum, frigidum piper faciunt, ut & pleraque alia aromata quæ exalfaciunt. Ejusmodi autem erroris causa fortè hæc fuerit. Quod ut ait *Fracas.* lib. 1. de Contag. dum mistio perstat, dum igneæ partes separatæ sunt & dispersæ, sepultæ quæ in aliis, alteratio nulla introrsum fit, quare & Piper & Euphorbium, & reliqua tractata manibus frigida sentiuntur. At ubi casu aliquo mistio illa solvitur & mutatur, & partes quæ ejusdem rationis sunt, in unum coeunt, & majorem quantitatem & potentiam ad agendum acquirunt, tum actu fiunt, & agunt jam, unde & Calx, & Piper, & Euphorbium jam calida percipiuntur, quàm prius potentia solum calida essent, actu verò aliter se habentia propter eandem causam, nec seminata intrinsecus se se alterant, quanquam è diversis consistant, utpote mista, quod autem in tam paucâ quantitate vis multâ inesse possit, declarant & Euphorbij, & Piperis, & similium particule minimæ & effugientes visum, quibus tanta vis à natura tributa est, adeò refert ignem in materia densa contineri, quanquam parva sit. Item: Quis putaret è Piperi, Iride, & Ptarmica sternutamentum conciliari? exhalant himirum ex omnibus his ac circumquaque feruntur insensibilia corpora, quorû diversæ actiones sunt & facultates.

PIPER ARBOTIVVM, BRASMA.

Reperitur etiam nunc Piper quoddam in genere
nigri, nutrimento defectum, cassum seu inane
ac leue, quod Brasilia [*Spizma*] Diosc. vocat. Hoc
non dubitamus nos asserere esse Piper immaturum.
Lugduni sæpius vidimus, racemorum instar, quale
habemus adhuc, de quo egimus in descriptione Pi-
peris nigri, id manifestè demonstrat longum Piper
à nigro nullum differre.

*Brachma-
fi.
Piper abor-
tivum.* Semina, inquit Plinius, cassa & inania vocant
Brachmasin Indorum lingua, sic significante abor-
tum. Cæz. Brassina. Cord. hist. Piper abortivum,
sive Brosma sive Brasma, Negociatoribus Gerbelor
nominatum. Sed nec Brasma vocabulum quod
apud Dioscoridem legitur, nec Brechmasin, quod
apud Plinium, unquam his in regionibus audivit,
aut auditum putat Garcias, cui Piper quod lingua
Malavaria à Canara nomen sumpsit.

Syn. C. 8. B. pin. Piperace. inane: Piper Canarium, Frag. Lugd. Lincot. 4. part. Ind. or. c. 8, Hoc ceruleum est, intus cavum, in cujus spatio granula quaedam continentur, quod paupercule plebis utilis codit, quare Canarium, i. rusticum vocari solet: & propter vilisatem ad externos non effertur.

Est hoc in me illoque uentur ad pſuitam à capi-

te evacuandam, dentiumque dolores mitigandos: *Dentes.*
nonnulli & in cholertico, quem vocant *Stectu*, ni- *Calica.*
ris laudibus celebrant.

PIPER ALBUM.

Piper album magnitudine videtur nigro cedere, Desir.
utrinque umbilico tantillum prominulo, e-
xiguo minimè rugoso, albido sive cinericeo: sub-
stantia ejus interior bicolor est quæadmodum piperis
nigri, & cava in meditullio (præter albâ pelliculam
quam habet) apparet; cortex, quo grana integuntur,
nigricans faciliè detrahitur, quod non fieret si eisset
immatutum, ut Galenus & nonnulli volunt; sapore
adeò est fervido præditum, ut jam supra triginta
annos in capsulis meis reservatum fauces igneo ar-
dore urat, quanto magis recens, quo argumento
convincuntur ij, qui piper album nigro immatutius
contendunt, nec aliâ ratione differre ex vestigiis re-
liquiarum corticum apparet delibratum.

Ceterum piperis albi meminisse constat Diosc. Diosc.
Piper am-
phacodes. nominantem *πῖπερ λευκόν*, *πῖπερ ἰμοκαστικόν*, quod commodum maxime dicit ad ocularia medicamenta & ad antidotos theriacalesque compositiones. Hoc Galenus lib. 1. de antid. ex Androm. seniore, per *ἀνδρομάδην* significat, quam Cornarius, uti dictum ante, Aglesia,
Blamona
candida cadentem Flammam. à flâmco fervore nuncupat, & *πυρίδης ἀσπύρις*, quasi igneum candidum Philo dicit.

Et licet Sylvius piper album ex longo fieri testatus sit : attamen piper candidum in propria planta provenit differente à nigro , ut Vitis albam ferens uvam, ab ea quæ nigram fert: Candidum quidem nigro calidius & odoratius est , vel Lobelio teste. Et hinc Cordo assentiri non possum, qui 4. hist. piper album ignavius nigro exultimat , Dioscoridem secutus, licet eum in eo interim reprehendat, quod candidum etiam ipso longo ignavius putat. Sed errat & Matthiolus, qui in hist. germ. piper rotundum album ante maturitatem colligi , idèoque nec tam acre & gratum esse dicit, quàm nigrum.

Candidi autem plantæ rariores sunt, nec nisi ætatis Malavar & Malacz locis rara nascuntur, auctore Garcia. Vidit Clusius Vlyssipone candidum piper, & inde secum attulit grano non rugoso, sed pleno, actiore & odoratiore quàm nigrum, Vlyssipone tamen neglectum. Ex Indiis verò copiosum saltèm quod medicamentis sufficeret, haberi posset, si Batiani pharmacopolæ paulò diligentiores essent. Invenitur interdum Antuerpiæ apud Myropolas nigro permixtum: sic & racemos nonnunquam cum Zingiberis radicibus muria conditis, ibidem reperire licet, oblongos quidem illos & graciles, neque ita sæptos, ut sunt uvæ racemi.

Matth. Lac. Garc. Frag. Chifad Garc. Cast. Eugd. *Synon.*
 Linc. 4. par. Ind. or. c. 18. Tab. Turn. & Lob. obs. Piper
 album. Piper rotundum album, Cord. hist. Piperis
 alterum genus candidum crassiori grano, Cels. Piper
 1. rotundum album, B. pin. cui & piperis alte- *C. Bauh.*
 rum genus, quod in Taprobana Molaga vocant,
 Lud. Romano. Sabanh pute, seu piper album, reli-
 quis paulo exilius, in Sunda, part. 4. Ind. or. c. 4. Nos
 cum Casalpino piper in Taprobana, Molaga voca-
 tum, à pipere hoc candido se jungimus.

Candidum piper solet magnatum, mensis inferri: *Vires*
eo enim utuntur quemadmodum nos sale: venenis *V. m.*
resistere & ocularibus medicamentis prodesse asse-
runt, quod & Diosc. annotavit, atque uti nam totam
hujus plantæ historiam tam verè descripsisset. Ota-
tos autem omnes Medicos volo, ut piperis candidi
loco (quod calidius est & odoratius) nigrum non
prescribant, nisi candidi sit penuria. Similiter ne
longum piper candidi aut nigri loco substituant.

PIER

PIPER INSULÆ TAPROBANÆ candidius Molaga

Piper pro-
cerius.
Molaga.

L Vd. Vartom. lib. 6. Indicatum rectum de pipere
insula Taprobana ita traditum in insula Sumatra
urbe Pyder, procerius piperis uberior est proven-
tus, miraque copia lingua patria piper Molaga dici-
tur, i. e. longè procerius illo quod huc advehitur,
multoque candidius, verum inane æmordax pluri-
mum, sed ponderosum minus venit, enim inibi pi-
per non pondere, sed mensura, ut apud nos Triti-
cum exponitur. Tanta est huius ubertas, ut inde an-
no singulo vicena naves onusta evehantur, hæ Ca-
taurum proficiscuntur, illic exponitur haud difficul-
ter ob frigidius cælum. Arbor vero, quæ piper hu-
jusmodi gignit procerius, crassioris est caudicis, am-
plioraque folia, eademque carnosiora habet arbori-
bus urbis Calecut. Cæf. Piperis alterum genus in Ta-
probana copiosum, & patrio nomine Molaga voca-
tum, quod maximè apud Tartaros dispensatur.

Arbor de-
scripsit.

PIPER CAUDATUM.

Piper cau-
datum un-
de dictum,
et quale.



Piper caudatum
nomen partum
à sapore, partim à
forma invenit gra-
na sunt pipere &
albo & nigro, ple-
rumque minora,
quedam equalia, ex
rotundo sublonga,
& pediculum ver-
sus turbinata, & ut
vulgare nomē præ-
fert, caudata, colo-
ris nigricantis vel
fuscæ, inter piper al-
bum & nigrum
medij, cortice cras-
sifusculo, extenso,
interdum non nihil
vel rugoso, vel cris-
po, medullam
comprehendente,
piperis vulgaris
modo bicolorem,
duriusculam, in cu-
ius cæmen medio
non conspicitur
vacuus ille scrobi-
culus: saporidem
nihilominus cum
pipere vulgaris iam
etiam supra an-
num trigelimum.

An Monachis in
Mef. dist. 1. prima
Cubeba Pandecta-
rij, sylvestris sortè,
cujus grana tra-
duntur minora &
sicut piper acuta.

Olim Antuer-
piam invecum pi-
peris genus, quod

Lusitani, *Pimenta*
del Rabo (de quo dubitat Scalig. exerc. 148. ne sit
Cubeba, quamvis nihil ailerat.) caudatum piper ap-
pellabant: Cubebis ferè simile erat ita describente
Tom. II.

Clusij) pediculo subnixum exiguo, rotundum, ple-
num, aliquantulum rugosum, nigricans, eadem a-
rimonia quæ piper prædictum, aromaticum, racem-
matum (ut ab iis qui racemos habuerunt, didicit)
coherens. Amomum nonnulli periti perperam e-
xistimarunt. Ceterum similes uvas septennio
post ex Guinea recens allatas, accipiebat ab hone-
stissimis isdemque humanissimis viris, V Vilhelmo
Pardūyn & Petro Gareto, Piperis ex Guinea appel-
latione. Erant autem illarum quædam breves &
unciales tantum, nonnullæ verò tres uncias ferè
longæ, tenui stilo inhærentes, longiusculo petiolo
grana rotunda, vel minora, vel crassiuscula conti-
nentes, vicena, tricena, interdum plura, legitimo
quidem pipere minora, non minus tamen servi-
di saporis, duravè & solida, ejusdem etiam penè
coloris. An porro ipsa planta periinde arbores &
perticas scandat, ut ejus quod ex Orientali India
adferretur, hætenus intelligere non licuit.

Quum caudati piperis figuram curavimus pa-
randam non visa erat racemosa Clusij: ea autem
cum à sculptore minis feliciter sit effigiata (ceu in
prima icone piperis nigri sub signo crucis videre li-
cet.) Clusij etiam figuram proponimus.

Anguillara, cui dicitur Amomum & Piperis
species, à Portugalesibus *Pimenta del rabo* di-
ctum, pro pipere Æthiopico vendi solitum, ait
in Syria vocari Piper sylvestre, plantam descri-
bi folio Vitis, quæ ipsi quondam visa sit Venetiis
& Patavij. Lectores perpendant an Anguill. non
existimant esse Ribes nigrum quibusdam dictum,
fruticem ferentem hoc Piperis genus, licet bacce
succulentæ nullo modo respondeant. Lob. ady.
Piper caudatum *Pimenta del Rabo* Lusitanis (Clus.
ad Garz. Frag. Lugd.) dicta, Amomo apta planta,
Peper met sterten vocata Belgis i. e. caudatum pi-
per, cujus folia prodidit esse foliis Vitis Anguilla-
ra. Eid. Lob. de Balsamo: Piper caudatum, Amo-
mum creditum.

Apollo, ex Anguillara hæc pro suis venditat:
sunt, ait, qui piper sylvestre Syrium, *Pimentum del*
Rabo Lusitanis vocatum (cujus plantæ tum Vene-
tus, tum Patavij in hortis quibusdam visuntur) A-
momum existiment, suffrutex enim est vitigineis
foliis, racemosis floribus, candentibusque, in acer-
rima semina Aphacz magnitudine terminantibus:
omni ex parte gravi, acrique odore præditus.
Lugd. Piper caudatum Clusio. Imp. hist. nat. *Pepe*
di Rabo, Piperis racemosi genus, quod adferunt Lu-
sitani, quidamque Amomum antiquorum existi-
mant, novum Piperis genus. B. pin. Piperis ra-
cemosum caudatum ex Guinea: Amomum Anguil-
laræ: *Pimento del Rabo*, Linscot. part. 4. Ind. orient.
fig. 15.

PIPER LONGUM.

Piper longum nucamenta betulacea æmulatur,
unciam aut sescunciam longum, teres, ali-
quando planum, coloris fusci vel cinerei, reticula-
to verruculatur plexu, in superficie asperum, cujus
pro numero grana pelliculis seorsim privatis in-
clusa, Sinapi granis paria, foris nigricantia, intus
subalbida, gustu non cedente nigro vel albo,
quanquam non statim apparente: pendent au-
tem hi juli ex pediculo gracili unciali, alteri fini-
serto.

Diosc. *mat. usque* dicitur, quod tandem in per-
fectum piper evadere credit.

Theophr. qui innuit longum piper diver-
si generis esse, vocat piper prælongum nigrum,

Amomum
non est.

Piper Guib-
nea.

Icon.

Amomum.

Piper Æ-
thiopico.
Piper silv.
Ang. met.

Amomum.

Apoll. ta-
natur.

Tab.

Diosc.

Piper lon-
gi generis
diversa.

Fructus Pi-
peris per-
longum.

semine papaveris. Galen. Fructus piperis jam ger-
minatus esse piper longum contendit, quod si frau-
denter preparatum sit, si aqua maceretur, solvatur, si
vero nativum sit, indissolubile permaneat. Magnitu-
dine vero Piper hoc aliud superare ait coruscumq; sub-
tiliorem & minus rugosum habere.

PIPER LONGUM MONARDIS.



Gal. & Dio-
scorid. re-
prehendunt.

PIPER LONGUM CLUSII.



Piper lon-
gum.

Gal. & Dio-
scorid.

Macro-
piper.

Folio Mori.

Arbor lani-
pero simile.

Arbor

Planta, inquit
Garcias, quæ lon-
gum piper profert,
longè alia est, ete-
nim non plus ha-
bet similitudinis
cum nigro & albo,
quàm faba cum
ovo. Nos piper
longum, quod à
viris doctis recipi-
tur, non provenire
in eadem planta,
in qua album &
nigrum, certò cre-
didimus non lecto
Garzia: erat enim
nobis piper lon-

gum & rotundum, cum pediculis qui demonstrabāt
diversam esse plantam: per illos enim apparebat,
longum in rotundum non posse diffundi; semina e-
tiam jam perfecta & matura medullā suā differe-
bant. Vt D. Presburger annotat, Gulandinus
piper Indum, Capsicum Actuarij, & piper longum
Diosc. idem esse uadit. Cord. in Diosc. facit piper
longum nigro & candido omnino dissimile. Idem
verò hist. (ubi describit) censet esse cum Diosc. Ga-
leno & Plinio rudimentum piperis albi & nigri.
Sed si piper est immaturum cur granula medullā al-
bā plena; cur in uvis piperis granum ejus integrum
apparet, ac etiam illa, quæ minora sunt, inania & id-
eò Brasma. Lob. obs. piper longum, quæ in melle, Ma-
cropiper. Eid. adv. ang. Lang pepperiger. Langen-
pfeffer; Belg. Lange peper; Hisp. Piment. Item pi-
per longum à pipere nigro diversa planta, folio
Mori. Tab. piper longum minus.

Et licet Calpurnius, cui piper tertium longum
dicitur, arborem à recentioribus describi neget, ac
Solinum & Plinium eam Junipero tantum similem
tradidisse scribat, non deluerunt tamen, qui eam
delinearint.

Piperis longi apud Aromaticos multi culci ple-
ni conspiciuntur: sed & Batavi nauclem magnam e-
jus quantitatem cum aliis aromatibus anno 1597.
ex Java advexerunt, & singulis annis adhuc adve-

hunc, q. cū differat ab eo cuius Nicolaus Monar-
des meminit libro de simpl. med. ex Novo orbe de-
latis, ejus rationem ad vivum expressam ex lib. 1. exot.
peritum post piperis nigri iconem, hic adiciendam
(inquit Clusius apud Garc. arom. lib. 1. c. 12.) putavi. Bo-
trorum maxima pars duarum unciarum longitudi-
nem, rard excedit, tamen si inter recens altatos re-
pererim ad triam unciarum longitudinem produ-
ctos, nullum vero minimi digiti crassitudinem ex-
quahent, sed graciliorem, & æqualis pene ubique
crassitudinis, quævis granis Mili repurati gran-
dum instat, oblique secundum longitudinem dispo-
sitis constantem, cinerici quodammodo externa
parte coloris, internā albi, servidi Japans. Plantam
igitur (pergit Clusius lib. 1. c. 10.) quæ longum piper
profert, ab ea in qua nigrum nascitur, longè dissi-
mille esse scribit Garcias, sed (quod ejus viri pace
dictum volo) plurimum fallitur, meā quidem sen-
tentia. Nam planta longum piper ferentis, ramu-
lum pedalem ternis folijs & binis fructibus prædi-
tum anno à nato Christo 1601. Amstelredam dono
accipiebam ab eruditiss. viro Doctore Lamberto
Hortensio, qui eodem anno ex Java redierat, ibi-
dem ab ipso decerptum: acceperunt & nonnulli ab
aliis illo etiam majores, sed omnium folia à pipere
nigri folijs non multum differre mihi videbantur,
nisi quidd paulò teneriora dilutioreque viriditate
præditæ essent, meā opinione, cum etiam brevior
pediculo subitæ, atque etiam pluribus nervis insi-
gnita, nam in medio illo nervo solium à pediculo
per longitudinem secante, non modò quaterni, ali-
j nervi exoriebantur, sed utrinque quini & seni, in-
terdum etiam & plures, pro foliorum videlicet am-
plitudine, illi tamen minus eminentes quàm in ni-
gri folijs, & inæquali ortu nati, multis etiam obli-
quis venulis per folium transversim evapantibus;
vellet resuscata essent ea folia, ac per multos men-
ses inter chartas adservata, non levitamen ærimo-
niæ erant adhuc prædita. Fructus qui juli quodam-
modo formam æmulabantur, oriri etiam conspicie-
bantur ad singula internodia, non in solij alā: sed
quemadmodum in pipere nigro, ex ipsius solij op-
posita parte, in altero videlicet ramuli latere, at-
que etiam alternis perinde ac in pipere nigro: e-
rant verò illi fructus modò longiores, modò bre-
viores, quasi ex multis granulis eleganti serie secu-
dum pediculi longitudinem congestis constantes,
virides tamen, quia ante maturitatem lecti, in qui-
busdam autem ramulis aded tenellum fructum
conspiciebam, ut jam primum natus videretur,
quàm ramuli abrumperentur. Horum etiam ramu-
lorum internodia live articuli brevioris spatio ab
invicem videbantur distare, quàm in nigro. Nulla
autem illius piperisamenta vidi, sed ut dixi, ramu-
los distinxat ab ipsa planta abruptos, quorum ma-
gis integrum in tabella adposita à pento pictore ex-
primi curabam.

Bry. frat. Leon. Ind. Orient. de pipere longo hæc
habent. Chiam est piper longum, crescit in Java, à
præstantioribus & opulentioribus incolis præfer-
tur, quippe quod rotundo Pipere salubrius putent.

C.B. pin. Piper 3. longum orientale: Piper lon-
gum, Matth. Lac. Cord. hist. Lob. Garz. Frag. Clus. ad
Garz. & exot. lib. 1. c. 12. Linscotto & Javanibus Pipi-
leni. Piper longum orientale, Cast. Macropiper
minus, Tab. Hujus arboris facies longè alia existit
Linscotto, non autem Clusio.

Garcia, qui longum piper Pimpiliu vocari ait, in
Bengala nascitur, quæ regio quinquaginta leuca-
rum spatio à Malavar distat, ubi candidum & ni-
grum gignuntur. prærium longi piperis in Bengala
est unius autem cum semisse in ungulas center as it-
bras. Aloys. Cad. Piper longum & Sams invent.

Piper

Defer Bo-
trorum Clusio

Defer plang

Error Gar-
cia.

Arbor

Clusio

Sams

Loco

*Piper
longum*

Piper longum intensâ mordacitate præditum est & subamarum, quoniam immaturum: antidotis item & theriacis medicaminibus accommodatum, Diosc. Nonnulli statim ab initio curationis uvulæ relaxatæ ob inflammatione pulvere piperis longi auxiliari conantur, quod quidem periculo non vacat.

PIPER EX FLORIDA.

Descri.



Styli sunt palmaris longitudinis, plus minus, haud ita Myosuri spicæ absimiles, crassitudine pari, fusci, veluti pulvere crispatis, nudi tamen & politi circa imum, obsequiosi, sapore acrisculo, ad piper accedente. In Musæi mei thesauro habeo à quadraginta fere annis titulo, *Poudre de floride.*

Considerandum an hoc piper sit idem cum pipere longo Monardis quod sic describit:

*An Piper
longum
Monardis*

Toto Obntinentis tractu (in quo Nāta, Carthago) & etiam in Novo regno, magnus est usus piperis cujusdam oblongi, quod majori acrimonia præditum est Orientali, magisque aromaticum, & jucundiores odorem spirat, quam Axi, seu Capsicum; quin etiam præfertur pipere nigro, cum saporis, tum suavitatis causâ. Alia cujusdam plantæ fructus est, oblongus, crassitudine quidem funiculi, at dimidij pedis longitudine, constans veluti multis granulis, circa pediculum oblongum conjuncto & continuo ordine dispositis, seminibus plantaginis modo, quibus ademptis, pediculus nudus conspicitur. Recens viridis est, sole maturescit & nigrescit. Calidum est tertio gradu.

*Capsici
odore.*

*An planta
peregrina
Clusij.*

Non est porro illa plantula peregrina, de qua Clus. exot. l. 4. c. 11. ita scribit: Habet hæc plantula cauliculum uncialis longitudinis aut ampliorem, valde gracilem, sustinentem ut plurimum binas, oblongas, graciles, quincuncialesque veluti spicas, longo pediculo subnixas, adeo oblique quaquaversum striatas & rugosas, ut exilium lumbricorum ficatorum, aut retium limularum formam quodammodo referant, coloris fusci & fuliginosi, subactis & calidi saporis, odore autem Melilotum penè referentes. Quoniam autem Iacobus Garretus, qui plantulam Clusio mittebat, nullum nomen adscripsit, nec unde habeat ipsi significavit, ideo ad cujus plantæ genus hæc referri possit, ignorat, quod nemo inficias ibit, cum difficile sit, de plantis nunquam antea conspectis, eisque mutis & corruptis, certi quidpiam statuere.

PLANTULA PEREGRINA Clusij.



Tom. II.

Monard. Ital. vocat suam plantam *Pepe longo di Carthagina*: Item ex versione Clusij, Piper quoddam oblongum. Ejus autem iconem antè posuimus cum figura piperis longi, quæ sanè non ita respondere videretur, ut descriptio. Lob. obs. & c. Piper longum Monardis. Cæf. Indiæ Occidentalis quoddam genus piperis, quo indigenæ loco piperis utuntur. Lugd. ex Monard. Piper longum. Tab. Macropiper majus. Hic cum Lob. & Lugd. proponit figuram Monardis. B. pin. Piper 4. longum occidentale (sic & Cast.) dimidij pedis longitudine: Piperis longi genus ex Carthagine, Frag. Piper longum incolis *Chabe* dictum, Linscot. 4. part. Ind. or. fig. 10. Ego hoc ad præcedens piper longum refero. Cæterum B. pin. plantulam peregrinam Clusij, ad piper longum Felsel Alpini pertinere scribit.

PIPER ÆTHIOPICVM siliquosum.



Siliquæ plures *Descri.*

Sex uno tuberculo pendent unciarum duarum, trium, quatuorve longitudine, rotundæ, pennæ anserinæ crassitudine, nigricantes, incurvæ aliquantum, thorulis pro contetorum seminum numero distinctæ, alioqui etiam rugosæ, fibris longis, lentis, tractuque cõtumacibus contextæ; interior substantia ex rubro nonnihil est cinerea: semina distinctis comprehen-

duntur loculis (carnoso pariete unumquemque distinguente loculum) ex rotundo oblonga, difficulter è siliqua avellenda, magnitudine minimi Phaseoli, foris nigra & nitida, medullâ duriusculâ rufescente, textura cancellata (præsertim juxta pelliculam, quâ integitur) favos apum imitata. Sapor tam sapor: siliquæ, quam seminum ad Piperis nigri saporem accedit.

An Lon. Cubeben? Certum siquidem est figuram *Cubeben* apud eum non esse Cubebarum vulgare, dubitamus igitur an piperis Æthiopici, licet non placeat *Piper æthiopicum* icon, nec etiam nostra, quæ per ineptum sculptorem corrupta. Lob. adv. & c. Piper Æthiopicum [ita etiam Tab.] Matthioli; Amomum officin. nonnullarum & Longa vita.

Habzelin (inquit Guill.) granum nominatur Serapioni Piper Æthiopicum. Verùm Piper Æthiopicum revera est aliud, in Barbaria dicitur *Crony*, formâ spectatur Phaseoli. Memini Venetiis Agyptam siliquas pro Balsami fructu venditasse quæ res & impostura doctis, ut audio, imposuit.

Siliquas nigras quas pro Carpesio Paul. Heissus ad Matth. misit, cur probe legitimum esse Carpesium, nihil penitus argumenti sibi sese offert. Etenim quum Galenus Carpesium, præter id quod herba sit figurâ & facultate Phlo similis, festuæ vel illi pulis tantum constare asserat, non siliquis, neque granis, non videt, quo pacto ejus acquiescat sententiæ, præsertim quum jampridem compertum habeat, hæc siliquas nil aliud esse, *Carpesium non est.*

Piper Ni-
grorum, Se-
rap.

quàm Piper nigrorum ita Serapioni vocatum, qui
ejus historiam posteritatis memoriz commendavit
his verbis: *Aethiopicum Piper Barbari nominant
Croni*, & est in forma sua Phaseolis non ab simile,
semina tamen minora habet, & cortices, siliquasve
breviores, colore nigro, & gustu ferè acri; veluti pi-
per, atque è Nigrorum plaga advehitur, dentium
doloribus non inutile. Quæ quidem notæ aded
conspiciuntur in hisce siliquis, & granis intus con-
clutis, ut nullus relinquatur dubitationis locus. Ad-
de quod mansum (ut experimento constat) den-
tium dolores perinde ac Pyrethrum in masticato-
riis mulceat. Et non ex Syria vel Pamphylia (ubi
Carpesij plurimum provenire testatur Galenus) sed
ex *Aethiopia* adferatur.

An Piper
Cardano
Dierp. in-
funt

An hoc intelligit Cardanus, cum dicit. Vidimus
Diepæ piperis genus quoddam ex India allatum,
muccolum & pingue valde, in vaginulis conten-
tum quæ nigre erant, cum ipsum piper colore esset
ferrugineo & majus nostro quod ex Oriente defer-
tur. Itaque cum plurimum habeat humidi concocti,
gratus est ventriculo jecorique: & maxime, quod
saporis sit mitioris & longo piperi simili. Est nobis
piper *Aethiopicum* siliquosum, pulcherrimum à Pa-
ludano missum sapore acri, vegeto.

Syn. C. B.

B. pin. Piper 6. oblongum nigrum. An Piper lon-
gum, Diosc. Habzeli & Piper nigrorum, Serap. Pi-
per *aethiopicum*, Matth. Lob. Cast. Lugd. Tab. Cro-
ne & Granum Anescen Avicennæ, Ang. Carpe-
sium, Cord. hist. Piperis aliud genus *aethiopicum*,
Frag.

PIPER LONGVM FELFEL Tavil, Alpini.


Deser.

Folia junce.

Tempera-
mentum.

Morbi fri-
gido.

Synon.



EST quædam
herba in viri-
dariis quibusdam
custodita, junci so-
lis, sed crassiori-
bus, è quibus se-
ctis succus quidam
flavus manat, val-
de acris ac exurès,
totaque planta est
calida in quarto
gradu, magis quàm
piper exurens. Ea
utuntur emplastri
modo appolita, ad
coxendicis dolo-
rem, nec non ad
frigidos articulo-
rum dolores; cor-
rigūt verò nimium
ejus calorem oleo
rosaceo, vel myr-
rhino.

B. pin. Piper 7. longum angustissimum ex Florida:
Piper longum, Felfel, Alpino. Plantula peregrina,
Clus. ex l. 4. c. 11. De Pipere ex Florida, cu & plantu-
la peregrina Clusij, nos ante diximus.

FRVCTVS SQVAMMOSVS cum granis piperis nigri; An Bra- sima Diosc.

Deser.

Nuci Fau-
sel simili.

EST Valachia delatus fructus, quem V. Villchmus
Pardunus, Clus. ex l. 2. c. 22. communicabat; e-
xilis erat, semineam magnitudine non superans,
exiguæ & immaturæ Nuci Fausel non valde diffini-

lis, exalbidis coloris, calice præditus quatuor squa-
mis constante, continens aliquot granà fusca, ro-
tunda, instar Piperis nigri, sed valde rugosa, quia
forsitan immatura, intus, alba, acris saporis; An Bra-
sima Dioscoridis?

An B. pin. Piper 9. abortivum: *Brasima* Diosc. pipe-
ris scil. nigri genus cassum seu inane, & leve, ob nu-
trimenti defectum. Brasima, sive Brasina, Cord. hist.

LOBVS ÆTHIOPICO PIPERI similis, acris.

LOBUS (inquit Clus. ex l. 3. c. 16.) non valde diffi-
milis *Aethiopici* Piperis lobis: nam & illorum
instar articulis distinctus, & grana in singulis conti-
nebat nigra, crassiuscula, rugosa, acris saporis: alio-
qui lobus crassior erat piperis *Aethiopici* lobis,
cortice denso constans, foris rugoso, coloris ex rufo
nigricantis, supernâ & infernâ parte duplici ner-
vo à pediculo ad extremum lobum excurrente:
pluribus aliquot articulis præditum fuisse verisimi-
le; nam post quartum articulum præcisus fuerat.
Hujus figura comprehenditur in sequenti tabella, *scil.*
i. loco. B. pin. Piper 8.

CROPIOT RVGOSVS FRVCTVS acerrimus semine simili piperi Aethiopico.



EXOTICUS fructus
Cropiot, quem *Cropiot*.
(autore Clus. exot.
l. 2. cap. 21.) orn. vir
V. Valichius Syvertz
anno 1599. de nau-
tis ex America re-
deuntibus redeme-
rat, parvus & rugo-
sus erat fructus, nō
valde dissimilis sin-
gularibus ejus fru-
ctus articulis, quem
piper *Aethiopicum*
appellant, & Avi-
cennæ esse putatur,
magnâ acrimoniâ
præditus, nigrumq;
semen continens,
ut piper *Aethiopi-
cum*. Solere autem
incolas eū fructum

admiscere Tabaci foliis, adscriptum erat: quum illius
fumum haurire vellent, ad capitis dolorem lenien-
dum. Erant autem aliquot ejus fructus funiculo tra-
jecti, ut in icone videre est: quod incolas facillè ar-
bitratur ad eos commodius resicendum, vel utin
promptu haberent, quando illis utendum. Hujus
icon 2. loco exprimitur.

BODAGLAM FRVCTVS EXOTI- cus, Paludano.



PIPERIS ferè ma-
gnitudine fru-
ctum exoticum no-
bis misit Paludanus,

cinereum, imâ parte angulosum nullo pediculo do-
natum, superna amplo hiatus cavernosum, interger-
minorum quorundam parietum beneficio in tres
cellulas distinctum, apertum, ceteroqui per ambi-
tum

tum ita æqualem, ut cultello dissectum, & mediam quandam fructus portionem dicās. Cellulas porro semini; quiddam continuisse suspicio est, quæ fortè exciderant, aut ad maturitatem non pervenerant.

*Forma Me-
spilo.* Totius alioqui structuram non malè fortè quis Me-
Sapor. spilo comparavit, nisi quod totus hic cavernosus, & semini; (si quod fuit) nil nisi vasculum cortico-
sum esse videatur, qui dentibus faciliè atteritur, sa-
pore est acriusculo & ferè evanido. Est & gemellus,
& compressiones quæ circa angulos imâ parte ap-
parent, plures cohesisse immediatè & sine pediculo
manifestè arguunt.

MUNGO.

*Avicenna
lectio va-
ria.* **E**st semen, inquit Garcias, viride, quod per matu-
ritatem fit nigrum, Coriandri fidei magnitudine.
Nasci ferunt in Palestina. Ejus meminit Avicenna
l. 2. c. 48. vocatque *Messe* [*Meisse habent nostrâ exem-
plaria & additum margini Mes, Mex Clus.*] Bellunen-
sis ejus interpretes *Mens* (Mex autem dici debere ab
eruditissimis Medicis Arabibus edoctus sum.) Huic le-
ctioni accedit ipsum ipsius Avicennæ testimonium
qui l. 1. Fen. 3. doct. 2. c. 7. prohibet aviculas Mex edere
ita ut, periculum sit, ne crudum adhuc Mex cum ea-
rum chilo ad hepar rapiatur: pabulum esse equo-
rum; interdum tamen etiam ab hominibus edi: Gu-
zarate & Decan incolæ in febribus hoc modo uti.
Febris. Febriticans cibo abstinet per decem, non nunquam
Decidit. per quindecim dies: post quos hujus fructus deco-
ctum illi propinaturum quo nonnihil pulpæ reman-
serit: deinde cortice delibratum Mungo & instar O-
tizz coctum febriticanti exhibetur: panis verò triu-
ceus non nisi post multos dies administratur: non
quod frumento careant hæ provinciæ: nam etsi nor-
stereorentur & colantur ægri, quemadmodum apud
nos, sed superficie tenus duratæ ærentur, nativâ
sua pinguedine & ubertate etiam interdum sine
pluvii frumentum Novembri mense sibi commis-
sum, medio Ianuario colligendum & maturum ex-
hibent. Mungo frigidus est, quantum ex ejus facul-
tatibus colligere licet.

*Tempera-
mentum.* B. pin. capite de Cubebis quarto loco dicitur Fru-
ctus niger Coriandro similis.

HAERMIA SERAPIONIS,
sive Piperella.

Deser. **H**ærmia nomine datum granum, piperi est sup-
par, Coriandro paulò majus, aliquando æqua-
le, rotundum, colore fusco vel citrino, pediculus te-
nuis qualis piperi caudato, ab ejus vestigio ad ad-
versum mucronem brevissimum, producuntur pul-
cherimæ striz crebræ, atque huic quidem cortici se-
parabili substantia subest compressa, solidiuscula,
punctis rubentibus guttata, in qua est sinus extul-
ptus, ad medium usque penetrans: sapor apparet ad-
huc aromaticus, ad Caryophyllorum saporem acce-
dens, etiam in iis granis, quæ totos jam triginta an-
nos & plures asservo, Lugduni per D. Val. Dourez
data: Clusius ait granum contineri nigricans calidi
gustûs. Icon est cum Pipere nigro ubi stellâ nota-
tur: ineptus sculptor malè eam imitatus est.

Haermia. Haermia, vel Piperella Serapionis est in figura sua
*Vel Piperel-
la Serapio-
nis.* sicut figura piperis minoris, nisi quia est in colore
suo quasi citrina. Est autem granum parvum, minus
pipere odoriferum, cujus odor est sicut odor ligni
Lugdun. Aloes. Lugd. Mungo similis fructus. Ceterum non
placet nostrâ Haermia pro Mungo: quia hoc semen
Valerandi non mihi videtur aptum febriticantibus,
& equorum pabulo, quod prædicatur de Mungo.

Animum. D. B. Paludanus 1598. misit nobis pro Anomo.

Misus est Valerando Dourez ex Ormuz (inquit
Clus. exot.) fructus piperis magnitudine, rotundus,
striatus, qui Coriandri grana ita æmulatur, ut pri-
mùm intuentibus Coriandrum videatur, majus ta-
men & nigrum, membrana superior granum conti-
net nigricans calidi gustûs. Non ineptè quadrare
videtur Negundo: sed neque etiam huic Mungo: *Negundo.*
cui exactissimè conveniret, nisi calidus esset, Mun-
go verò frigidus, quantum ex ejus facultatibus col-
ligere licet.

B. pin. Piper 7. sive Piperi similis fructus striatus: *Syn. C. 1.*
Haernia Serap. fructus cap. de Mungo additus, for-
tè Negundo, Clus. ad Garz. Caryophyllus Plinia-
nus sive Negundo, Imper. Negundo, Garz. Acost.
Fragoso. Nos de Negundo & Mungo sub suis ti-
tulis.

In Haernia duas esse virtutes contrarias scriptum
reliquit Serapio. nam testatur eam & caliditate & *Ymer* et
frigiditate participaret: interim nec humiditate care-
re, in doloribus frigidis gutturis & ventris siccitate
utilem esse: nonnihil eam abstergere.

NEGUNDO ARBOR MAS ET

femina.



Locus. **P**rovenit in Ba-
lagnate & Ma-
lavar arbuscula q-
da Perficæ magni-
tudine, frequen-
tibus tantis, qui reci-
si frequentiores le-
tioresque enascun-
tur, foliis Sambuci,
simili modo per
ambitum serratis *Sambuci*
& aliquatulum hi-
spidis: flos ex cine-
re candidus, fru-
ctus niger, piperis
magnitudine, aut *Fructus*
paulò major. Mala-
var incolæ eum suis
edulis Caril nun-
cupatis inspergunt.
Hæc Garcias.

De Negundo hæc
tradit Acosta: Dux
arbores multis In-
dix locis, præsertim *Acosta No-
gundo dicitur*
verò provinciâ Ma-
lavar inveniuntur.
Earum prior mas
cenfetur Amygda-
le magnitudine, fo-
liis supernè viren-
tibus, internè lanu-
ginosis & hirsutis,
foliorum Salvia mo-
do, in ambitu terra-
tis, quæ procul a-
spicientibus Sam-
buci foliis simili-
ma videntur. Alte-
ra Negundo femi-
na nuncupata. Ea-
dem magnitudine *Femina foli-
is populi.*
quæ prior assurgit,
folia verò habet
ampliora, rotun-
dioraque, neque in

ambitu serrata, foliis Populi albæ perquam similia:
utriusque folia Salviam odore & sapore referunt.

magis amara quàm mari & acra: in plurimis foliis parte aversa summo manè inhaerens conspicitur spuma quædam candida, quæ nocte ex illis emanat, flos cinerei coloris, plurimùmque ad Rorismarini florem accedit; fructus similis piperi nigro, acris gustus, minimè urentis uti Piper, at Zingiberi prope modum parus.

Vulgare nomen est, teste Garcia, Negundo quam nonnulli in Balagate *Sambali* appellant; in Malavar *N che*; qui Viticem esse contendunt, multùm errant. Acoſta ex verſ. Cluſij, duas arbores facit: priorem marem cenſet & à Canariis *Paralo Nigunda* appellari reſert: alteram Negundo ſœminam nuncupat quam ait *N. chilla* à Luſitanis, vulgo in Canaria *Nyergundi* dici; in Balagate *Sambali*, in Malabar *Noche*: utramque verò tam marem, q̃ ſœmina ab Arabibus, Perſis, & Decan incolis *Bache* vocari; Turcis *Ayr*.

Si Acoſta icon legitima eſt, folia quæ dicit Populi, ego potius Iuglandis dicerem, à forma quâ prædita ſunt & materia. Meritò Negundo ſubnectenda ſubjiciendæve hiſtoriz Haemii Serapionis, quandoquidem fructus qui exiſtimatur Haemia, traditur à Cluſio & Imperato pro Negundo, quem admodum & Cariophyllum quoque Plinianum quorundam, aliis Amomum Luſitanicum cenſetur.

Multis facultatibus prædita eſt hæc arbor, teneriorum ramulorum cum foliis decocto, aut iſpis elixis, aut contuſis, utiliſſimè contuſa ſovenitur, modò non adſit vulnus. Friguntur interdum iſdem ramum cum foliis in oleo, & contuſionibus applicantur, reſolvunt enim tumores & curant. Frequens eſt aded hujus uſus, ut in omnibus doloribus, ſtriſtum cum oleo, aut elixum exhibendum cenſeant. Non deſunt qui ſupra vulnera admoverint, unaque nocte dolorem ſuſtulſſe, materiãq; digeſſiſſe affirmant: deinde foliis contuſis, iſpis vulneribus impoſitis ita ea emundafſe, ut brevi ad cicatricem perducta ſint.

Vilem perhibent eſſe mulieres ad juvandum conceptum, ejus enim ſucco aut decocto epoto, uteros ad conceptionem præparari. Ego (ait Garcia) malim præmandi, valentiùs enim futurum exiſtimo medicamentum. Maſticata folia oris halitum commendant. Acnimoniz verò cuſjuſdam participant veluti Naſturtium: unde manifeſtum eſt calidam eſſe hanc plantam. Experti ſunt nonnulli veneris ſtimulos & impetus cohibere, eamque ob cauſam Viticem eſſe contenderunt. Arborem moderatè calidam faciunt, ut notat Acoſta, & ſemini paulò plùs caloris tribuunt. Folia, flores, fructus, contuſa aut in aqua decocta, vel in oleo ſtriſta, utiliter impoſuntur omnibus doloribus ex quacunque cauſa provenientibus: præſertim verò in articulorum doloribus ex frigida cauſa natis, atque in tumoribus & contuſionibus mirabilè præbet effectus. Vlceribus etiam vetuſtis folia tria imponuntur, ſelici ſucceſſu, quandoquidem eorum materiã digerunt, eaque emundant, & ad cicatricem perducunt, modò corpus non ſit impurum. Et ſanè in vulneribus, apoſtematibus, & contuſionibus aded utilem experiuntur, ut Chirurgorum operam minimè requirant. Mulieres horum foliorum decocto omni tempore univerſum corpus lavant: tantæque invaſit perſuaſio apud illas, Negundo folia, flores & fructus, utilia eſſe ad juvandum conceptum, ut eum, qui contrarium perſuadere conetur, lapidibus obruturæ ſint. Obſtetricibus etiam, quas illi *Dayas* vocant, apprime nota eſt hæc arbor. Aded frequens eſt hujus arboris uſus ad medendum in illis regionibus, ut niſi Deus præciſos ramos multiplici ſœtura renaſci faceret, jam diu fuiſſent conſumptæ arbores, aut certè maximi pretij nunc eſſent. Sed quo magis præciduntur rami, ed ſeliciùs renaſcuntur, perpetuè fronde viſent.

Cvbeba grana ſunt Piperi ſimilia, interdum *Deſer.* paulò majora, pediculo longo ſtili inſtar dona. *Piperi* ta, cortice ſulco, rugoſo, interdum erugato, extenſo. *grano.* que, nucleo ſubjecto exiguo, rotundo, foris nigricante, intus albo: aliquando caſſa reperiuntur, eque efficaci vel etiam efficaciore ſapore prædita, quam *sapo.* nucleata, ſuavi, aromatico, acri, ſed qui Piperis acrimoniz multùm cedat, pertinaci tamen.

Conſiderandum an Cvbeba pingantur cum Piperi caudato?

Cvbebarum quidem meminit Avicenna: verùm non deſcribit: quare conſiderandum an vulgares Cvbebas intelligat, vires ſiquidem reſpondere videntur.

Myrti ſylveſtris fructum ait Hermolaus Cvbebas Mauricè vocatas, quod quàm verum ſit, diligenter animadverti cupit, præſertim ab iſis diſſentiens, qui hoc affirmant: Galenum certè id, quod Cvbebas Medici appellant, Carpeſium vocare tradit, eſſe autem odoratum ſemen Carpeſium, h. e. Cvbebam, quam Paulus & Carpeſiam quandoque vocant: Mauros ſylveſtris Myrti baccas, Carpeſium, & Cvbebas eſſe putafſe.

Serapio (atteſtante Braſſav.) magno errore, arborem ferentem Cvbebas, eſſe Dioſc. Oxymyrſinem arbitrat. Recentiores etiam (ut Pandeſt. & alij) cum Serapione Carpeſium Oxymyrſinem eſſe putant, & tamen Cvbeba Oxymyrſine eſſe non poſſunt: nec Carpeſium Galeni.

Actuarius, referente Ruellio, Carpeſium à Barbaris jam ſua ætate Cvbebas vel Combebas dictas, eſſe profeſſus eſt, & hoc nomen officiis vulgaſſimum, longè aliam rem eſſe à Ruſco. Carpeſium autem Actuarij & Nicolai Myreſis Combebam vel Compedam nuncupari, & officiis Cvbeba dici, reſtat etiam Fuchſius de comp. med. qui Actuarium diſerte ſcribit quidd Combebas alio nomine Carpeſia dici annotari. Sed licet Actuarius vel *Actuarius* vel *Actuarius* etiam *Actuarius* vel *Actuarius* vocari ſcripſerit, Galeni tamen *Actuarius*, aut Dioſcoridis Oxymyrſine, ſeu Myrti ſylv. fructus (nam eum Carpiſiorum nò meminſſe legitur apud Silvium de comp. med.) Cvbeba eſſe non poſſunt, id quod Serapio & alij quidam Neoterici exiſtimant. Cvbebas verò longè diverſos eſſe à Carpeſio fructus, Cord. Lob. & Pena conſignant: exiſtimat autem cum Pena Lobelius fieri poſſe, ut ſit nigro piperi congener. Eſt ipſi obſ. Cvbeba offici. piper Hippocratis ſimpliciter & Piper rotundum Theophr. Guilandino.

Veris, aiunt Monachi, Cvbebis, ſi Plateario credimus, caremus: communes Cvbeba non ſolum non habent acutum ſaporem, ſed cum quadam pauca amaritudine inſipida ſunt, & nullam præbent aromaticitatem: tres autem Cvbebarum ſpecies eſſe ſcribit Pandeſtarius ex autoritate Plinij [apud Plin. non invenimus] quarum ultima, quæ pro domeſtica ſcribitur, poteſt eſſe communis Aromatariorum. Heus quàm depravatus, ſi non penitus abſolutus Monachorum guſtus & odoratus. In Cvbebis vulgaribus acrimoniam & aromaticum ſaporem ac odorem comperimus, quem concedunt & obſervant Hermol. Sylv. Fuchſ. Matth. & Ceſalpinus.

Quid hæc tempeſtate ſit Carpeſium arduum ſanè fuerit Matthiolo explicare. Tameſi Hermol. Ruell. Fuchſius ac etiam Monachi pro certo exploratum habent, Avicennæ, Serap. & Actuarij autontatibus innixi fructus piperi ſimiles, qui vulgè Cvbeba vocantur, legitimum eſſe Carpeſium: verùm eos in errore verſari exiſtimat, qui credunt (ut Hermol. Ruell. & Fuchſius) vulgares Sepſianorem Cvbebas, illas refer.

serre, de quibus scripsit Serapio, Avicenna & Actuarius, quando quidem qui dixerit Cubebas fructum vellem esse, eorum reperit neminem: nec huius probari posse putat, id aliquem dixisse Gilem: cuius scriptis fructus vulgares Cubebae sint, quid affirmare velit, non habet, cum ex Orientali plaga peregrina afferantur. Hæc Matthiolus qui scribit Monachos nostras Cubebas recipere, quod falsum est. Scribit Robertus sub vocabulo Opocarpas, *Opocarpia* autem *Opocarpia* aliud esse, quam Opocarpas, Actuarius *Opocarpas* appellare, & Nicolaum Myrepsum: sed Combebas, sive Cubebas Mauritiorum, vel *Græcorum* differre à Cubebis officinarum: *Græcorum* enim herbam esse Phu appellatæ generi similem.

Cubebæ (tradente Linschott.) crescunt in *Iava* sylvis sua sponte ad ripam Sunda. Vocatur ab incolis *Coumbi* & *Cumuc*. Malayvicè, *Cubachini*. In Sunda facies plenus, Barhut (mensura genus est) ponderis 56. librarum dum carè venditur: & in summo pretio est, sex aut septem millibus caras divenditur. Arboreæ earum pomis nostris haud absimiles sunt: racematim coherent grana, sicut uvæ vitium quæque tamen proprio hærent pediculo. *Iava* incolæ Cubebas coquunt antequam divendant, ac & alibi locorum seminantur atque proveniant.

Ab Arabibus Medicis, ut Garcias scribit, appellatur hic fructus *Cubebe* & *Quabeb*; à vulgo *Quabebchi*: in *Iaoa*, ubi frequens nascitur, *Cumuc*; à reliquis Indis, præterquam in Malayo, *Cubab* sive, & etiam à quibusdam *Cubachini*, non quod in Sina vel China nascatur, sed eo perseveratur: sylvestris autem est planta, & sponte nascent, non domestica, neque multorum generum, ut falsò Monachi putarunt: neque est folio Myrti: fructus autem neque piperis genus, neque Carpesium, neque Viticis semen, ut quidam asserere ausi sunt, quorum sententiam utriusque historia & facultates planè dissimiles satis convellunt. Putat Sylvaticus ex Arabum auctoritate Cubebas nihil aliud esse quam Dioscoridis Myrtum sylvestrem, quem Ruscum vocant; aut Carpesium Galeni. Sed fallitur.

Apud Acostram It. appellantur Cubebæ aromati-
cæ & venter; vulgo Arab. *Cubeba Chini*; incolis *Cubal Chini*, non quod in China proveniat &c. Hæc ille qui sua ex Garcia desumpsit. Ruellium autem & Monachos taxat, quod existimant Carpesium esse Cubebas Serapionis & Avicennæ, quia ubi Galenus ponat Carpesium, Serapio scripserit Cubebas. Verum Cubebas fuisse cognitæ Dioscoridi, & Galeno scitè negat. Lacuna per Carpesium intelligit radices, & ideo concludit pro Carpesio sumendas Cubebas Arabum. Monachi dicunt se vidisse varias species Cubebarum, quasdam sine sapore, alias amaras, & alias bonas. Sed fieri potuit amaras fuisse corruptas, bonas recentiores & melius conservatas. Ant. Musa & Serapio dicentes nos habere Cubebas, hallucinantur, confunduntque Carpesium cum Myrto sylvestri. Pandecharius existimans Galenum vocasse Cubebas Cauti, errat, quia est species Dauci sylvestris: Qui vult videre varietatem opinionum legat Monachos in Mes. de Cubebis, Braslavolam, Ant. Musam, Platear. Pandechar. Luminare majus, Sim. Ganuenssem. Serap. Galen. Avicen. Matth. Sylv. Hermol. Lacun. Matthiolum & alios.

Cubebæ nostræ non sunt Carpesium Galeni: sed nec ut Scalig. somniat, Plinij Caryophyllon. *Pimento del rabo* Lulitanis, quod significat piper caudatum, valdè veretur idem Scaliger ne sit Cubeba, nihil asserit tamen. Officina pro Cubebis substituerunt grana quadam odorata, formâ piperis, quem legitimi Amomi fructum putat Cæsalpinus. Sed & Cubebas vulgi; quas Medici accipiunt pro Carpesio,

putantes esse fructus Myrti sylvestris, potius Amomi fructum idem Cæsalpinus arbitratur.

B. pinguis Cubebas officinis vocatas, Actuario dicitur *Arabis* Arabibus Cubebe & Quabebe. Idem inibi cum Matthiolo negare videtur Cubebas i. vulgares esse Arabum Cubebas, aut Carpesium Galeni.

VIRES ET USUS.

Cubebæ ex auctoritate Avicennæ, calidæ & siccæ *Temperamentum Avicennæ* sunt, aperiunt, attenuant, Cinamomo ignaviores, utiles ad genitalium & gingivarum putrida ulcera, ac *ulcera* apthas; ore retenta vocem claram reddunt, hepatis obstructions aperiunt. Urinæ vias emundant, *obstructiones* arenulas extergunt, calculos pellunt tam renum, quam vesicæ. Salivam manzæ à capite alliciunt. *Saliva* Fiermol. Barbar de Cubebis vulgaribus dicit: Carpesium si ore contineatur claram vocem facit pronuntiantibus: ob id Berrard. Iustin. homo inprimis doctus, & eloquens nunquam sine hoc semine concionabatur. Sed & illum dotem prædicant: maiorem in coitu voluptatem sentiri ab iis, qui habeant in ore, quasi non sit in excitatione mens commotat: noli docemur quemadmodum nos Venus adiniciat, & violentior transversos auferat. Cubebæ vulgares (teste Matth.) excalficere valent tertij *Temperamentum Matth.* ordinis initio & siccant in fine ejus. Languentem ex pituita ventriculi, vel etiam ex flatu roborant: peccus à lentis crassisque humoribus expurgant, lienem juvant, flatum discutunt & frigidis ueteri affe-
ctibus auxiliantur. *Affectus ueteri frigidi.* Ductum Mastiche manzæ, pituitam à capite trahunt & cerebrum roborant. Cubebarum apud Indos, inquit Garcias, magnus in vino maceratarum est usus ad excitandam Venerem: tum etiam in *Iaoa* ad excalfaciendum ventriculum. VVirt. Emp. ad vertiginem accipere jubet 4. aut 5. Cubebas mastificandas, & retinendas in ore, expuendam hu miditatem quæ cumuletur, postremo etiam ipsis Cubebas. Idem ad eundem affectum suadet Cubebarum 5. j. Sacch. albi 5. j. s. reducendas in pulverem & accipiendum quantum supra humum grossum dictum manere possit manè & vespere: quæ autem accipiantur obrutandas esse nates, ut odor pulveris ascendat ad caput, sed & defluxionibus à capite obnoxio manè mastificandas præcipit Cubebas conditas vel non conditas. *Defluxiones.*

FRAGRE SERAPIONIS.

FRAGRE, ut autor est Aben Mesuaj, assimilatur Ciceribus, & est calidum & siccum in secundo gradu, & ingreditur medicinas quæ præparant stomachum. Fragra assimilatur ab Isaac Eben anram Ciceri, & habet interius granum parvum, nigrum, rotundum, de foris verò rubeum, & ex succo ejus fit collutio ad factorem oris, & confert, & nos utimur eo in Nodach, i. e. in pulverizationibus & unguentis. Fragaria non idem est, teste Cæsalpino, quod apud Serapionem Fragre vocatur. *Factor oris.*

AMOMVM IN GENERE.
CAP. XLVIII.

DE Amomo, quod apud Theophrast. 9. lust. c. 7. a. *Theophr.* dicitur ex Media, alij ex India advehi narrant, patet tamen, at vehementius odorem, ita differit Dioscorides. Amomum frutex est [chiu frutis, *Amomum*], velut botrus ex ligno perplexus sibi ipse. habet etiam florè quendam parvum velut Violæ albæ: folia verò Bryoniz similia. Optimum est Armenium colore aurum referens [aurum] habetque lignum subfulvum, admodum odoratum. At Medicum ed. *Armenium* quod in campestribus & aquosis locis nascitur, invalidi-
Medicum.

gatur eam cecinit *Matthioli* sententia ad stipulam deprehenditur Junior Andromachus, qui nunquam Botrym commemorat, sed Amomum tantum. Hic ille, qui quum nos (ait Amat.) vero carere Amomo sciret, ut illum tamen haberemus nos in Lusitaniam remittit, ubi ex India nunc delatum contendit: Amati tamen sententia salitur, cum hucusque Amomum verum incompertum sit. Sed Amato in Apologia refragatur Matthiolus dicens, nunquam meis scriptis affirmavi Amomum ex India in Lusitaniam conyehi, nec eo quemquam remissi. Scripsi quidem me à quibusdam non spernenda fidei Medicis accepisse jam primum ex India in Lusitaniam offerri Amomum, nec sane plura quam hæc.

Hamama quid significet. *Garcias* de *aprim.* Hamama Columbam, non pedem Columbarum, ut vult Garcias, significare scribit Clusius. Quod verò Garcias ait pedem Columbinum esse Diosc. Amomum, præterquam quod illi impositum est ab illo Iudæo, scire debemus Columbam scribi per He in fine, Amomum autem per Elif. quæ sola scriptiois differentia constituit & significationum differentias; ut Amomum vel ejus notio nullam cognationem habeat cum Columba. Itaque vanum est pedem illum Columbinum cum Amomo Dioscoridis conferre, propter solam allusionem nominum. An est Olivij Amomum, quod vidit in Musæo Calceolarij colore ad aurum vergente, pallente scilicet & uvam referente, quod Piperis genus esse apud Lusitanos non audeat affirmare. Observat Maronea (cujus sententiam videant lectores postea sub Amomo novo specie Cardamomi minoris) Amomi vocem antiquissimam, quæ Theophr. etiam utitur Indicam esse, non Arabicam ut existimant recentiores, qui dum Amomi Etymon ab Arabibus frustra perquirunt, ipse ea bis peccat: i. quidem duplici utuntur incertissimo fundamento, uno quidem, quia Amomi vocem asserunt Arabicam esse non Indicam; altero vero, quia possunt tanquam notissimum antiquissimam linguam Arabicam ab ætate Theophrasti ad hæc usque tempora suam integritatem servasse. Significat autem vox Amomi & fruticem ipsum, & etiam racemum, qui est præcipua pars quæ in usu medico. Theophr. & Galenus satis junctè pertractarunt de Amomo, cum ejusdem descriptionem omiserint. Verum Dioscorides & Plinius eas dederunt Amomi descriptiones, quæ si una conjungantur Amomi notitia & faciem & perspicuam faciunt. Recentiores autem, qui utriusque auctoris de Amomo descriptiones invicem se jungere student, ipsi veterum Amomo magnas tenebras offundunt. Diosc. & Plinij unanimis est consensus in Amomi historia describenda: explenda opinio recentiorum existimantium Plinium & Dioscoridem non convenire inter se in Amomi descriptione. Plinij est singularis diligentia, quæ ipsum superavit Dioscoridem in Amomo delineando, unde adhuc magis redarguendi recentiores asserentes Plinium ignorasse legitimum Amomum. Hætenus Maronea, qui diligenter consensum Dioscoridis & Plinij demonstravit, quem omittimus, quia patet ex utroque scriptis huic capiti præpositis, ac etiam ex iis, quæ excerpta ex Maroneæ Commentariis à nobis posita sunt postea sub titulo Amomi novi Cardamomi parvi facie sive Racemi Indici.

Acquisita.

Hamelberg.

Hamam.

Amomum Hamelbergio, apud Apuleium frutex est odoratus, transmarinus, cujus semen in usu esse scribit. Sed miramur Hamelbergium, cur non indicet, ubi sit in usu, & quale sit. Latet nos præterea, an Castoris Durantis, sive Hamanis & Hamanz icon vera sit, necne. Bellon. in obs. ait terram adhuc præferre Amomum: hoc verò Constantinopoli, qui volet habere,

petendum, nec (addit de neglect. cult.) sine adminiculo subsistere. Quale autem Amomum intelligat Bellonius nondum nobis constat. an fortè in Obs. per Constantinopolitani intelligit Amomum verum quorundam, de quo mox? Et de neglect. cult. aliud, nempe Ribes nigrum.

Volunt præterea aliqui Cardamomum vulgare esse Amomum.

Nec desunt qui per Amomum, Amomum novum Cardamomi minoris vulgaris facie sive Indicum racemum (de quo paulo post, quod Clusius spurium vocat) intelligi dicant.

Amomum, autore Hadr. in nomencl. est Piper hortense ab hortorum gente dictum. Hoc Piper Hadriani est Ribes nigrum.

Piper denique caudatum, Pimenta dactylo qui busdam Amomum nuncupatur.

Est & Amomum Garyophylli odore quorundam. Est & piper Æthiopicum Matthioli, Amomum officinarum nonnullarum.

Lob. in append. ad Icon. plant. & Cxf. (quod nobis nondum attidet) putant Cubebas legimum Amomum.

Rosa Hierichuntis multis est Amomum, quæ opinio quibusdam displicet & nobis etiam.

Pro Amomo Plinij vulgus Italorum Strychnodendron ostendit.

Botrys falsò æstimata à multis Amomum, & pro Botrys eo male usurpata fuit.

Sic quoque Sison, falsò Amomum officinis dicitur.

Ammi Alexandrinum etiam ab aliquibus male existimatur esse Amomum. Amomi nomine in officinis vendi Bibinella tertium genus scribit Gualterus Ryslin in reform. pharm. germ. l. c. c. 21. Est hæc nobis Saxifraga hircina.

Ceterum aberrare eos, qui pedem Columbinum faciunt Amomum demonstramus sub Geranio Columbinio. Et hoc nobiscum sentit Joh. Agric. Serapionem erroris incusans, quod Amomum pedem Columbinum esse putant.

Galenus l. c. simpl. sicut & codex de substitutis Acorum imponunt, quem sequitur Cordus in Aurea Alexandrina, in Diatrion. Meslin Theriaca, in trochiscis Hedichron, Placot, Borgarue, Matth. Turn. Lac. Bacchanell. & Apollo, quorum opinio minime improbanda videtur: quum Acori radix quam seplasia falsò Calamum odoratum vocant, & odorata sit & aeris & præter id adstringat siccetque. Quum Galenus Amomum similem Acoro facultatem obtinere scribat, præstaret, inquit Clusius, legitimum Acorum, satis videlicet jam cognitum, medicamentis Amomum recipientibus admiscere, quam alias plantas, quæ pro Amomo obtudi solent. Fuchsius quidem Amomi vice Acoro utitur, ait ejus penuria Galanga majore. Idem & Amatus, qui Acorum, Galangam crassam censet. Dispens. Col. Amomi loco ponit in troch. Hedr. id quod dicitur, Calamus aromaticus. Hunc sequitur Tab. apud VVirsling. dicens: Galenus scribit Acorum [Calamus] easdem habere vires cum Amomo: eo igitur utendum cenleo in defectu Amomi. Amomi live Pomi Hierosolymitani locum (sic Michael Neand. placet) explet Acorus. Hic si intelligit per Pomum Hierosolymitanum ut patet Rosam Hierico, nomen Pomi Hierosolymitani certe non placet.

Quid tandem Amomi loco accipiendum sit, & Diosc. & Galenum declarare dicit Marantha. Et hinc ex dictis Dioscoridis colligit recentiores Medicos magno in errore versari, atque in illo quidem duplici. Primum quidem, quod semen, necit quod, ex vera Amomi planta minime excerptum usui adaptent: Deinde, quia putant Amomi semen (si mo-

do verum reperiretur) accipiendum esse; cum potius ejus lignum utile à veteribus judicaretur, ut ex Dioscoridis lectione se accepisse gloriatur. Anquit enim adulterari ex Galeno solere Amomum herbam simili, quæ sit sine fructu: jam si fructus ad usum dicerentur, non posse plantam, quæ fructu careat, adumbrare: monere præterea Galenum fragmenta sugienda esse, & integros furculos capiendos. quod de fructu minimè intelligi possit, deligendum etiam esse, valde odoratum, modò cariem non contraxerit: cariem autem non ita semini videri propriam, sicuti ligno. Sed erroris hujus causa fortè Plinium fuisse qui lax. c. 13. Amomi uvam in usu esse asseruerit: Nec ipsum laterem in usu etiam fuisse Amomi uvæ, & racemos: ut 9. 2. 7. 1. cap. 3. ubi Asclepiadis pharmaca ad hydropem recenset Galenus: similiter & 2. 7. 1. in stomaticis Hieræ, Amomi racemos: & 7. 2. 7. 1. c. 9. Amomi uvæ. Sed dicendum esse præcipuam partem lignum, sive furculos fuisse, quos intellexerint, cum Amomi absolute mentio fieret: & cum aliam partem cuperent, veluti racemos, V. v. explicatè protulisse. Sed de Amomo aliàs longè plura.

Amomi
quæ pars
accipienda.

Asarum.

Amomi loco substituitur Asarum à Collegio Florent. in antib. Turnero, Borgarico, & Monachis in Mesuem dist. 1. cens. 8. quos videmus meritò quoddam substituant Asarum purgans medicamentum, pro non purgante, in quo magnum facultatum discrimen. Animadvertendum tamen ab Adolpho Occone in Bened. lax. Nicol. pro Amomo tolerabilius substitui Asarum, cum compositio sit purgans, quam in aliis compositionibus non evacuantibus.

Sabina.

Porro ab Avicenna pro Amomo poni Sabina duplicem planè displicet, ingratum medicamentum & parè fetidum pro odorato.

Cubeba.

Pro Amomo substituantur Cubebe à Cordo, Placotomo, Turnero, & Borgarico. Turnerus tamen deficiente vero Amomo uti posse putat Carpesio, quod quibusdam Cubebarum nomine notum sit.

Amomi.

Avicenna Amomi loco supponit Ammi quasi duplicem, ut & Fuchs in antiball. pro Amomo substituit semina A. neos, in Aurea Alex. & in Benedicta.

Caryophylli.

Amomi loco præstabit Caryophyllos substitueret, qui longè præstare videntur auctore Matthiolo, quod & ipsum Gesn. in Hedychroi pastillis non improbat, & nobis præsertim antiballomenis summe placet.

AMOMVM QVORVNDAM odore Caryophylli.

Amomum
Lusitanum
Dejer.

Clariss. Paludani munere missos fructus inscriptione Amomi verum Lusitanorum adservamus. Eisdem anno 1605 attulit ex Angliâ Cherlerus. sine nomine, datos ut censemus à Jacobo Garoto. Magnitudinem autem variat: quidam namque piper æquat, quidam etiam duplo ferè major est: omnes sunt cortice fusco, rugoso, umbilico, summo tenuis, non quo parti adhaerent, prædicti, quadrifido. Vnum vel duos continent nucleos nigros atroviscente membranulâ tectos, qui intergerino

Mal. Gra.
vari fructu.

AMOMVM NOSTRVM ex
ipso fructu.



Sapor.

ryophyllos accedente. Manifestè differt ab Haemina Serapionis, ut conferenti apparebit: inter cæte-

ras notis, huic non adsunt pulchre striz. Nos curavimus ex ipso fructu pingendum.

Garofalo Pliniano, semen aromaticum, inquit Imperatus, adfertur per Lusitanos, magnitudinis piperis nigri communis, odoris & saporis Caryophylli aromatici, odor tamen vetustate evanescit: Neoterici vocant nomine Indico Negundo: multum convenit cum descriptione Caryophylli apud Plinium. Ethæc ille qui alibi vocat Caryophyllum Plinianum, aroma nuper delatum ex India. Duos autem pingit fructus, & secundo loco Haemiam nostram.

Negundo.
Caryophyl.
len Plinij.

Amomi descripti Clusius exot. l. 1. c. 17. iconem & descriptionem proponit his verbis: Mittebat

AMOMVM CRUSTI.



ad me Londino Jac. Gareus anno 1601. fructum orbicularem, piperis grano plerumque majorem, nonnunquam etiam minorem, rugosum, fusci coloris, satis fragilem, qui apertus semen continere deprehendebatur rotundum, nigrum, in binas partes scissile, non minus aromatici odoris & saporis quam ipse fructus, atque aromaticos Caryophyllos quodammodo referentis: botri autem modum nascitur, ut ex multis

granis, quæ per longos adhuc retinebantur, & binis ternisque granis uni ramulo inhaerentibus conjecturam facere poteram: his adjecta erant folia, unius quidem formæ, sed magnitudine valde differentia: nam quidam septem uncias erant longa, tres lata, nonnulla quinque duntaxat uncias longa, duas cum semisse lata, alia trium unciarum longitudinem non excedebant, & vix duarum latitudinem attingebant, quæ etiam non longè missiora & angustiora præsertim quæ cum granis permixta reperta fuerant, pro loci quem in ramis aut ramulis occupaverant ratione: nulla autem inter illa reperi quæ serratas haberent oras sed æquales omnia, & multis tenuibus venis, à nervo folia per longitudinem secante, in latera oblique excurrentibus, prædita, eorum mucrone nunc angustiore, obtuso tamen, nunc latiore & quasi orbiculato, cineracei & ex spadiceo coloris, & satis acris saporis: ramuli qui additi fuerant, tenues quadranguli, cineracei coloris cortice tecti, annotini videlicet, qui verò postea nati, spadiceo, retinentes adhuc vestigia ubi folia adhaerant, quæ ut plurimum, ex adverso nata esse demonstrabant, & illi etiam acrisculi saporis, peninde ac folia nec ingrati odoris.

Culm. &
Sapor.

Additum præterea erat radices cujusdam fragrantissimi cubitalis longitudinis, à navis quos ex India rediisse scribebat, relatum cum prædicto fructu & foliis: intelligebat autem ab aliis fragmentum illud ab arbore, sive frutice folia illa & fructum ferente, recisum: ejus materia valde dura & firma erat interna parte alba, externa & sub cortice latente, fusca ob vetustatem forsitan: erat autem gemigo cortice tectum, interno quidem satis denso, fusci quæ coloris & acris saporis, interno verò brevior, ex cineraceo flavescens coloris (quem ex argillacea terra in qua planta nata contraxisse verisimile est) acerrimique

*Celsum
autem
fructum
dixit
Anderna-
cio not.*

*Martinell.
autem.*

*Ruell.
autem.*

*Racemus
ex Malaca
delatus non
conuenit
cum Amo-
mo.*

*Vnde dele-
tum legi-
mus &
notum.*

*Collegij
autem
fructum con-
ferimus.*

num: praterea ejus verba demonstrant diversum
esse à Diosc. Amomo, ita ut quilibet possit judicare
quantum valeat auctoritas Plinij, ut probet utrum
uvà Amomi & non ligno. Si Galenus intellexisset
Amomi fructum aut semen, dixisset *fructus* *aut* *semen*
aut *semen* *aut* *semen*, licet 14. ultimi libri de comp.
med. per gen. scriptum sit Andernaco interprete A-
momi uvæ, malè tamen id factum, ut etiam libro 1.
Antid. ubi idem nomen *Amomi* malè interpretatur
per vocem uvæ, in eo etiam reprehensus fuit à Fuch-
sio. Martinellus monstrat se parum in lingua latina
versatum, cum vult Diosc. per hæc verba, *Deligit re-
cens, seminu plenum, uvu parvu simile, grave, manifestè*
voluisse meliorem partè esse fructu similem racemis
parvæ uvæ. Traductio Ruellij uvis parvis simile par-
vum fidelis videtur. Cerchini racemus non est planta,
nec plâtæ pars quæ sit tota simul cõnexa & ex ligno
se convolvat, quavis sit sicut racemus: fallitur idè di-
cens omnes notas Dioscoridis cõvenire. Grana quæ
potius folliculi dici possunt nõ cõvolvuntur, nec so-
luta diffunduntur. Quod magis Cerchinus demonstrat
similitudinè Amomi cū Cardamomo, eò magis cor-
roborat opinionè, q̃ verissimè existimo, eorū qui di-
cunt ejus racemū esse Cardamomū: quandoquidem
grana hujus racemi sunt plena semine, clausa, colo-
ris flavi: semè contentū gustu acri, & non nihil ama-
ricante: differentiæ Martinelli nõ possunt impedire
quin sit species Cardamomi. Vti diximus racemus ex
Malaca figurà nõ cõvenit cū Amomo, non est ex li-
gno se cõvolvès: nõ ex Armenia affertur, sed ex In-
dia: & quavis hic racemus haberet omnes notas ve-
ri Amomi, cū tamen habeamus Armeniū, stultitia
esset usurpare Indicū: color granorū hujus racemi
nõ est aureus sed potius malè coloratæ paleæ in hoc
racemo nihil reperio quod possit dici lignū sed, sar-
metū, cui adhærent quidā folliculi. Sarmetū nihil ha-
bet rufi, sed est ejusdè coloris cū folliculis. Est ei ali-
quis odor, quia non potest dici odoratissimus: nullo
modo cõveniat ei voces, *grave, acre, gustu mordens,*
simplici colore non variante. Si Martinellus vult iā di-
cta verba referèda ad folliculū, leve est, in odorū, in si-
pidum: si ad semè nõ est grave, odorè habet, sed non
odoratissimum, nõnihil est acre, sed non mordicās.
Plinius non solus scripsit de Amomo Indico, sed an-
tè illum Theophrastus, ut apparet ex verbis ejus
ante citatis ac etiam ex aliis: Quodnam sit Amo-
mum Armenium considerandum.

Nic. Maronea Veronèsis Philol. & M. Doct. in cõ-
mēt. suo de Amomo inter alia hæc habet. In juria tẽ-
porū Amomi notitia deperdita est seculisq̃: nõnul-
lis Amomū latuit ad nostra usque tẽpora, quibus A-
momi uva denud in lucè prodiit operà & industrià
egregij & honestissimi Viri Cerchini Martinelli qui
ex remotissimis Indiæ regionibus verū & legitimū
Amomū ad nos transmisit, sanè hoc idè Amomū tā-
quā legitimū, nostrū Medicorū Veronèsiū Colle-
giū agnovit & multi alij viri doctissimi amplexati sunt.
Verū, quia diversa sunt hominū ingenia, fuerunt
aliqui, qui editis scriptis Indicū Amomū, tanquam
spurium repudiarent. Idcirco decrevi Amomi Indici
patrociniū suscipere, ipsā scilicet veritatē, atque o-
stèdere Indicū racemū esse ipsorū veterū legitimū
Amomū: quo usus est Io. Pona in cõponèdis suis an-
tidotis, Mithridatio & Theriaca, quia illū admisi, tā-
quā legitimū, quo tẽpore Collegij nostri nomine, e-
go unā cū exc. viro Iacobo Dionysio præfui ejus re-
censendis Antidotis, quæ publicè parabat. Sū autem
explanaturus Amomi historiam [Nos integr. m. nõ po-
nimus, sed hoc maxime faciendū cõtūm depr. minimū] quam
Dioscorides & Plinius nobis scriptā reliquerūt, quò
perferat quilibet possit, nū Racemus ex India al-
latus, possideat notas veri & legitimū Amomi, an ve-
rò, ut recentioribus placet, idè racemus referendus sit

inter species Cardamomæ, vel demū nova plâta exi-
stat, priscis viris prorsus incognita. Verū necessariū
esse duxi, hujus descriptionē, antequā ad ipsam ex-
positionē accedā, præmittere. Amomū igitur Indicū
cujus descriptionē facimus, nõ est integra plâta, sed
fructus: cujus etiā exhibemus iconē, exprimētē na-
turale Amomi magnitudinē. Est autè parvus racem⁹,
abiq; pediculis ex unico sarmeto enatus, sibi ipsi ar-
ctè cohærens, & convolutus in uvæ modum, cõtās,
denis, aut duodenis ad summū atinis, seu folliculis,
fibrosis, se mutuo cõprimētib⁹, tāquā de cõmuni
loco inter se decertantibus, adeo ut sibi invicē parvas
cavitates imprimāt. Racemū sustinet lignū teres,
pollicari lōgitudine, fibrosū, odoratū, acre, foliis cõ-
fertim exornatū, tū pusillis squamarū serie distribu-
tis, quā parte folliculorū est expert⁹, tū lōgioribus so-
liis, senis singulos folliculos ambiētibus, quæ vicem
quandā præstāt calycis illius, quē in Nuce Avellana
cōspicimus, ex lōgioribus foliis tria quidē cõtās lō-
gitudine semunciali, tria verò paulò breviora sunt,
eadē folia tenuia sūt, fibrosa, acia odorata: sed quæ
privatim folliculos cõplectuntur, æmula sunt foliorū
Mali punici, suis cacuminib⁹ spēs cõtacta, rarò inte-
gra, ut vix extra Amomi acinos emineāt, q̃ evenire
credēdū est, quia mutuo attritu foliorū summitates
cōstringuntur in lōgissimo itinere. Acinorū crassitudo,
& figura orbicularis existit, qualis mediocriſ uvei a-
cini, ornatur folliculi Amomi externis tenuissimis fi-
lamētis, seu nervis quāsi lineis, per longitudinē du-
ctis, ternis etiā præditi sunt parvis sulcis, totidēque
interpositis exiguis eminētis, quæ triplicē interno-
rū seminū seriē circūscribunt, singulos folliculos re-
plet tres seminū phalages, tenui mēbranā ab invicē
se junctæ, unaquæq; autē phalax pluribus cōstat se-
minibus angulosis, eadē tenui mēbranā involutis,
adeoq; strictim sibi cohærentibus, ut triū duntaxat se-
minū lōgiusculorū effigie præbeāt. Racemi totius &
ligni color idem spectatur in aliquo pallidus, in alio
cādidas, in alio verò ex pallido ad subrufum vergēs,
sed in cādido folliculo semina inlunt plerūq; evanida,
in subrufo semina solidiora, & perfectiora stre-
quētissimè observantur: seminibus angulosis color
externus ex rufo nigricās adest, internus albus, se-
mina interna eadē solida quidē sūt, sed fragibilia, nõ
fractu cõtumacia, ut Cardamomi semina. Racemo o-
dor inest validus, sed *Lat.* ingenitus verò, nõ asciti-
tius, qui vulgare Lavēdulā quodammodo redolet,
suavior tamē, exēptus à folliculo seminibus major o-
doris acrimonia inest, minor autē odoris gratia, eā-
dem ratione, & racemus, & nuda semina acri sapore
sunt prædita, sed in racemo hebetatur acrimonia, in
nudis seminibus vchemētiore percipitur, quæ vulga-
rē capsurā quodammodo sapit. Præmissa sic descri-
ptione, ipsā expositionē aggredior, in qua tria præ-
cipuè præstare conabor. Vnū erit expositionē afferre
verbis Dioscoridis sūmoperè consentaneā: alterum
erit, rei ipsius veritatē perferatari, in illis præsertim,
quæ Dioscorides partim ex sua sententia scribit, par-
tim ex auditu refert: quam sanè distinctionē cūm re-
centiores prætermittūt, Amomi doctrinam non par-
vū perturbāt: postremò suis cōgruis locis indagabo,
nū Indicus racemus eas obtineat notas, quas Diosc.
suo Amomo assignat. Hæc præfari volui, existimās, ea
allatura esse lucem illis, quæ à me post hæc dicentur.

Ad Dioscoridis itaq; verba hæc: *Amomum est par-
vum fructus* [supra] addo, *cuius fructus est*: alioqui
Dioscoridis sensus videtur mutilus & falsus. Suspicā-
dū etiā codicē Græcū mutilū esse, desiderariq; in eo
Myrtuosi nomē quo Plin. Amomi fructicē cognomi-
nat, seu aliā ejusmodi vocē adjungendā esse, vel Dio-
scor. deditā operā Amomi brevè notionē attulissā.
Est sicut in a racemus] Boreus seu racemi significa-
tio apud Græcos duplex videtur, una cõmuniſsima,
quæ

*Amomi fr-
uctus Racemo.
Indus dese.
Ala. onca.*

*Amomi fr-
uctus.*

*Color rac-
emi.*

*Odor rac-
emi.*

*Interpret-
atio verborū
Diosc. &
Maroneæ.*

quæ comprehendit omnes fructus racemosos. Al-
tera significatio denotat non univcrsum genus ra-
cemorum, sed illorum quandam notissimam spe-
ciem, nempe racemum uvæ: Hanc significationem
cognoverunt Marcellus & Ruellius, qui non nō
exposuerunt uvam vel uvæ racemum, quæ in-
ter se non differunt. Recentiores autem aliqui hanc
significationem ignorarunt, cum Ruellium
reprehendunt, tãquam malè interpretantem hanc
vocem *βῆρυξ* nomine uvæ, quæ in re suam prorsus
patet faciant in scitiam. Veteres sanè Amomi fructum
existimarunt esse racemum. Dioscorides declarat A-
momi racemum similitudine seu exēplo ipsius uvæ.

Ex ligno et si ligni nomen significare possit & in-
tegrum Amomi fruticem & singulas illius partes,
nepe stipitem, ramos, surculos, nihilominus tamen
hoc loco denotat tenue sarmentum, cui uvæ coheret.

Convolutum in se ipsum *Amomi racemum* sensus
verborum est Amomi fructus est similis illi uvæ ra-
cemo, qui est in seipsum convolutus seu complica-
tus. Verùm racemus ille dicitur complicatus in se-
ipsum, qui a contrariis omnibus locis sibi met coheret
& convolvitur, sunt verò loci differentie contra-
rie, ante, retrò, sursum, deorsum à dextris & à sinistris.

In seipsum *Amomi racemum* Vox relativa nostram confirmat
expositionem, vocem convoluti referendam esse
potius ad proximum substantivum racemum, quàm
ad remotiorem fructum vel fruticem. Recentiores
inquunt Diosc. describit plantam convolutam, sed
Indicum Amomum est racemus convolutus non
planta, quare non est Dioscoridis legitimum A-
momum patet solutio dubitationis ex Diosc. & Plinio,

quia uvæ ipsa convolvitur non planta. Recentiores
negantes Indicium racemum esse convolutum &
sensui adversantur & vocis significationem non
rectè accipiunt, si enim ex Plinio uvæ convolvitur,
cui Indicium racemus uvæ similis nō convolvitur etiā?
Eumvero recentiores hallucinati esse videntur, in
hac voce convolutus, tanquàm significet Amomum ali-
cui rei esse convolutum. Recentiores Indicium race-
mum illegitimum Diosc. Amomum dicunt, quoniam ra-
mulo adhæret herbaceo potius quàm lignoso, cum
idem ramulus flexibilis & venosus appareat: Sanè
verissime asseritur Amomi Indici pediculū flexibi-
lè & venosum, sed nō inde sequitur eundem ramu-
lū esse herbaceū. Duplex est lectio vulgata, una qui-
dem quæ Græci exēplaris seriem sequitur, altera verò
est Latinorum interpretū qui perturbant ordinē ver-
borū. Lectionē vulgatā nōnulla absurda cōsequun-
tur, si fruticē exponamus plantā expertē fructuum
Diosc. dupliciter errat. Sed quia Recentiores vulga-
rē insequētes lectionē existimant Dioscoridē decla-
rare Amomi plantā, exēplo ipsius uvæ, illorū par-
tes erant ostendere etiā alia Dioscoridis loca in qui-
bus plantas ipsas cōparatione fructuum illustraverit.

Adhuc uvæ exēplū ineptū est ad exprimendū fru-
ticem. Recentiores autem quandam excogitarunt
similitudinem cōmune Amomi plantæ & uvæ ra-
cemo quam vocarunt cōnexionem seu adhærentiam
partium tum fruticis tum uvæ. verū est similitudo
tenue summa, indigna prorsus Diosc. diligentia. Lati-
norum interpretū lectio (Amomū exigue fruticat ex
ligno se convolvens in uvæ modū) pluribus de cau-
sis repudianda, sensum Diosc. ammutat, obscura est.
Errarunt recentiores illi qui nuper adversus Indi-
cium Amomum scripserunt: siquidem illi vocem *βῆρυξ*
in amplissima significatione racemi acceperunt,
hoc pacto legentes: Amomum est parvus fru-
tex in seipsum convolutus veluti racemus. Ex hac
lectione sequitur falsum & impossibile.

Habet racemum & florem parvum veluti Viola alba, folia
verò *Viri albe similia*. Ita Diosc. coniungit florem
& folia descriptionē ad antecedentia ut nemo in-
Tom. II.

ficiari possit, quin antea Amomi fructū figuraverit,
quæ secundum nos exposuimus. Verū simile est solio-
rum & florum Amomi historiam Dioscoridem ac-
cepisse potius ab aliis scriptoribus quàm quod A-
momi flores & folia ipsēmet unquam vident.

Optimum est Armeniacum. Dignū inquisitione an
Amomū nascatur in Armenia, Pongo: causæ dubi-
tandi quia Theophr. antiquitus adnotavit, odorata
partim ex India, & Syria advehi, indeque mitti ad ma-
re, partim ex Arabia deportari. Adhuc scribit Plinius
Amomum in India provenire: Quibus accedit Dio-
scoridem persæpe exoritur plantarū suas ignorasse
regiones. Verissimum esse puto Amomi plantā indi-
genā Indici esse, ex qua olim deferrebatur primū in
Sinum Persicū, mox in Mediā, Armeniā, Pontum im-
portabatur, inde verò in Græciam & Italian pervē-
niebat. Equidem censo si Amomum in Media, Ar-
menia, Ponto nasceretur haud difficile esse, hoc tē-
pore ex illis regionibus illud exportare. Secūda fic-
cedit dubitatio an tres sint Amomi species, vel po-
tius sint tria individua sub unica. Quod autem *Coler*
colorem inclinat, habetque lignum subviride. *χολοειδές*
non significat ipsummet autē colorem prædicum
esse, sed ad autē colorem inclinare: sanè ejusmodi col-
or esse videtur medius inter album & aureū, quem
Plinius pallidum, atque secundæ bonitatis vocat digni
nomen intelligendum est tenue sarmentum, cui race-
mus hæret. *Subviride* color, *χολοειδές* magis ad fuscū
vergit quàm subaureus. Quod Diosc. Armeniaci A-
momi nomine non intelligat fruticem, sicuti recen-
tiores aliqui opinantur, non est difficile ostendere.

Odoratum valde & odore inanis. Theophr. lib. de odo-
ribus, vero Amomo tribuit odoris vehemētiam his
verbis: vehemētiora parcius adhibent ut Costum &
Amomum. Sanè Indicū racemum vehemētior nares
excitare, verissimū est, quāvis aliqui Recentiorū id
ipsum negare nō erubescant. Sed Medicū, quia in cāpe-
stris & aquis locis nascitur, in validū. *Magis*
subviride sicuti recentioribus Medicū Amomum sub-
viride exponamus fruticē ista coloris subviridis ob-
servatio in ipso frutice erit prorsus plebeia & indi-
gna herbario. racemo est adhibendus, cui Plin. etiā tri-
buit. *Et ad tactū molle, & venosum lignū* lignū sunt
ramuli, qui ipso racemoso fructus ferunt. Medicū A-
momū venosū est nō suis fructibus sed lignis, imo suis
fructibus est ad tactū molle, seu fragile fragile autē &
venosū sibi adversatur. Patet Dioscoridē de racemo
non de frutice loqui, nā si frutex venosus erit, sicuti
pleriq; interpretes exponūt, quid erit ad tactū mol-
le seu fragile nihil prorsus. *Odore ad virgani inclinat* *Odor origani*
te amari *χολοειδές* non denotat odorē Origani, sed
quod accedit ad Origani odorē, inter racemos Indi-
cos nullū adhuc observavimus subviridem. [Car Ni-
col. *Maranea* *χολοειδές* interpretetur ad Origani incli-
nante nescio, significat enim ad Rutam inclinate.]

Ponticum verò subviride citius color ex ruffo & ru-
bro commixtis enascitur, sed subviride ex pallido &
cirro fit. Ex Indicis aliquos observavimus subviridos,
eodēq; ceteris præstantiores eū odoratiore sunt &
graviore. Color subviride est racemo assignandus
non frutici, præsertim cum Plinius colorē ruffum ra-
cemis tribuat, nō frutici. *Non longum* Si Medici A-
momi racemus magnus est, est etiam longus: Hinc
Diosc. opponit Ponticum, non longum, de racemo
autem loquitur, non de frutice.

Neque fructu contumax Ponticum Amomum non
est fructu contumax, veluti exēpli gratia est Car-
damoni fructus: mediam obtinet conditionem in-
ter duritiē Cardamomi & Medici racemi fragilitatē.

Racemum *βῆρυξ* Ponticū Amomum est race-
molum, quia uvæ effigiem habet non racemi, tātū
cōmuniter sumpti: Amomū racemosū significat fru-
ctum, non plantā ut perperam recentiores scribunt:

verum quia negant Amomum racemosum esse fructu et hinc uix prædicitum, sed scripserunt esse plantam similem racemo: ipsorum partes erant, suam confirmare expositionem, Dioscoridis testimonio.

Fructu plenus] Si Amomum Ponticum est racemus, sicuti docuimus, inde colligitur eundem racemum ex acinis seu folliculis constare: qui intra propriam cavitatem fructus aut semina continet. Falsum est solum Amomum Ponticum esse fructus plenum, namque & Armeniaci Amomi racemus debet esse fructus plenus cum optimus existit Dioscoridis testimonio. Dioscorides parum videtur esse constans in usu vocum, ut in præcedentibus.

*Corpus et
sperma
Diosc.*

Hoc in loco obijciunt Viridocleus, Dioscorides non de Amomi planta sermonem habere, sed de fructu Pontico, quem dicit esse fructus plenum, propositionem esse nugatoriam, cum unum eisdem sit subiectum

*Recentiorum
falsitas.*

atque prædicatum, fructus est, fructus plenus, facile diluitur obiectio ex fructus & seminis significationibus. Namque subiectum est Amomum Ponticum, seu racemus Ponticus, qui ex pluribus fructibus, seu folliculis constituitur. Sed prædicati rationem habent interna semina angulosa, quæ in eisdem folliculis continentur. Falsum ergo est quod assumunt recentiores, idem esse in propositione subiectum & prædicatum.

*Oder an
sensum.*

Oder sensum ferientem] Homines recentiores qui Indico Amomo infestis sunt, racemi Indici suam validamque odorem suis scriptis extenuant, tanquam astutissimi. Opponimus testimonium ipsorum sensuum. Quæsi veritatem iure quispiam, quibus permoti conjecturis putaverint quod Amomo odor ascriptus. Recentiores frustra inquirunt, num Indici Amomi odor exillat in eisdem pericarpis vel in seminibus internis: cum Dioscorides ipse collocaverit in racemo toto.

Colores.

*Subviridis
color.*

Subruber

Eligito autem recens & album vel subrubum] Amomi color albus & subruber ipsius racemi existit, non fructibus, namque & Plinius eisdem colores racemis Amomi assignat. Omnes colores quos Dioscorides observavit, nos præter ipsum subviridem in racemis nostri Amomi observamus: verum hosce colores non observatos fuisse à recentioribus illis viris, qui Amomo Indico bellum indixisse videntur, facile crediderim. Subruber autem color esse videtur is, quem Dioscorides supra vocavit subcitrum: albus vero color Amomi non videtur esse simplex, sed remissior ob admixtam exiguam succedinem: si tamen de Veterum Amomo licet iudicium facere ex nostris Indicis racemis, quorum illi qui albi existunt, ita sunt albi ut ad colorem cineritum aliquatulum vergant. Quod spectat ad colorem album quem Dioscorides bonitate cum subrubro facit dicendum est vel eodice Græcum esse corruptum ut Marcel. Virg. suspicatur, vel Dioscoridem adverteri Plinio, qui pessimum esse candidum affirmavit, vel voce candidi intelligendum esse racemum subaureum, quem Plinius pallidum dixit: verum si lectio depravata est vel expungenda sunt duæ voces (album vel) legendumque, non album sed subrubrum.

*Diosc. textus
corruptus.*

*Adulteratum
racemum*

Non coactum vel connexum] ut est adulteratus racemus qui constat acinis seu fructibus, qui etsi à suo ligno aliis avulsi jam fuerint, postea tamen gummi liquido in unum factitium racemum, conglutinati aded fuerunt, ut unum continuum & solidum corpus præ se ferant potius quam racemum ex pluribus acinis constitutum. Suspiciari licet, in Græco codice fortasse desiderari aliqua verba, quæ significat ipsum Gummi liquidum, quo racemum

*Recentiorum
error ex
Ruell. Serapione.*

*Diosc. textus
corruptus.*

ambum adulterari Plinius scribit. Verum recentiores, qui Ruellii interpretatione sequentes existimant, optimum Amomum, neque autem coherere, neque esse coactum decipiuntur. Non coactum vel connexum (scilicet gummi liquido ex Plinio addendum est Marcello Virg. libenter asserit, verba isthæc esse expungenda, nisi ex Plinio haberem, valde precipua expositione modo enarrata.

Solum & diffusum] Dioscorides legitimum racemum denotat, qui collat acinis ab uno famento enatis, se quidem coniungatibus, non vero conglutinatis in unum.

Diffusum & solutum sunt voces polyonymæ, quæ excludunt coactum & conglutinationem minime vero nomen diffusum significare potest distans inter eos. Amomi fructus. Recentiores scribunt, quod exponit ipsam.

*Recentiorum
error.*

Seminis plenum] Græcis autoribus plures fructus & seminis significationes sunt, sed hoc in loco semel id significat, quod in pericarpis continetur. Amomum plenum est ipse racemus, cuius folliculi acinosi continent semina multa & perfecta, quæ tota eorumdem folliculorum cavitatem replent. Recentiores promittunt Veteres Medicos sola Amomi planta semper usum fuisse, neglexisse vero fructus & semina ejusdem Amomi, tanquam inutilia, sed non satis est affirmare, nisi etiam ex classicis autoribus id ipsum ostendatur.

*Recentiorum
error.*

Simile parvis uvis] Recentiores cum vident nomen uvule vel racemuli admodum favere Indico parvo racemo, cuius acini denos aut duodenos ad summum non excedunt, negant Dioscorides simile unquam Amomum eligendum esse simile parvis uvis aut parvis racemis, sed res est luce meridiana clarior, & significare parvâ uvâ vel exiguum racemum. Verum si Dioscorides in præsentia eligit Amomi plantam ut placet Recentioribus, illa non potest esse similis parvis uvis. Dioscorides voce parvi excludit Medicum racemum magni quævis (utpote invalidum) antea repudiavit.

Parvum.

Recentiores nova afferunt expositionem verborum Dioscorides. Eligito Amomum plenum semine simili parvis uvis. Sed ejusmodi expositio statim apparet falsa, siquidem seminis vox, quæ est secundi casus, regitur per plenum, & connecti non potest cum simili, quæ est tertii casus, quapropter expositio communis retinenda est, quæ ait, Eligito Amomum semine plenum, simile parvis uvis.

Parvum.

Grave] Recentiores qui Amomum Indicum reprobant, tanquam illegitimum, quia grave non sit, in eadem re multipliciter peccant, nam & sensui contradicunt & una simul confundunt signa Amomi tum legitimi tum optimi. Demum Amomi gravitatem faciunt absolutam, cum tamen sit comparativa, quæ dignosci non potest, nisi plures Amomi racemi invicem cõferantur.

*Recentiorum
error.*

Valde odoratum] Tanta racemus Indicus odoris fragrantia pollet, ut racemus quæ jam multo diebus aqua ferventi maceratum, postea exsiccavimus, suam quandam nativam suaveolentiam spiret: quam ob rem ignoro quid compulerit Recentiores ad negandum validam nostram Amomi uvis sensibus ipsis expositam.

*Racemi Indici etiam
macerati
odor conservant.*

Sine carie & acre] Errant Recentiores in inquirendo acrimoniam Amomi in eisdem particulis, quarum per se nullus unquam fuit usus, nepe in solis folliculis, vel in solis seminibus: siquidem veteres toto utebantur racemo.

*Recentiorum
error.*

Gustum mordens] Eligit Dioscorides quo excludat Medicum Amomum invalidum. Recentiores racemi semina gustu mordere negant, sed hac in re dupliciter errant, & quia negant sensibus apertissimam, & quia racemi acrimoniam absolutam faciunt, non comparativam.

*Recentiorum
error.*

Simplex color non varius] Color varius in uvis tunc existit, quando in uno & eodem racemo acinorum hic viridis apparet, ille purpureus, vel quando idemmet acinus ita existit. Sanè varius hunc colorem ignotum Recentioribus, in quibusdam Indicis racemis Amomi nos observavimus. Dioscorides hoc loco racemum ipsum describit, non totam Amomi plantam ut Recentiores opinantur. Varius autem color imperfectæ maturitatis est nota, ut in uvis ipsis possumus observare.

Color varius.

Adulterant vero aliqui Amomum ipsa uvis Amomum simili existente Amomo, in odore autem & sine fructu, quod non antiquis uvis, sed uvis Amomi] Omnes expositores Amomum tribuunt esse in odorem & sine fructu, non ipsi Amomo, verum ipse verborum cõtextus ostendit easdem voces adjectivas, connectendas potius proximiori substantivo Amomo, quam remotiori Amomidi. Deinde cum Amomi vox multiplex sit, quæ significat plantam absque fructibus & plantam fructibus onustam, atque fructum racemosum similem parvis

*Recentiorum
error.*

avis: Amomo inodoro & sine fructu, hoc est, Amomo immaturo ut Plinius etiam scribit.

Q: a nascitur in Armenia, florēque habet similem Orygano] Suspicamur quiddam noster auctor de Amomide scripserit, potius quæ apud auctores legerit. Amomi plantam Dioscoridi solo auditu fuisse cognita, non autem oculatâ inspectione compertam nobis suspicandi occasio: quoddam ex veteribus herbariis aliqui Amomum describentes plantam integram cum sua radice figuraverint, apud Plinium locum monstrabimus.

Oportet autem huiusmodi probationibus fragmenta vitare. Eligito autem quæ ab una radice habent surculos integros] Amomi radix non est utilis ad compositiones, quoniam radicem Amomi apud Veteres Medicos nulla unquam mentio habetur: sed radicis mentionem facit Diosc. ut manifestum faciat, ipsas plantas integras, suisque radicibus coherentes, non esse expositas dolis & fallacis. Recentiores ex incertiori Amomidis descriptione student confundere & perturbare certiorē & dilucidiorē noticiam legitimi Amomi racemosi. Hæc ex Maronea in Dioscoridem dixisse nobis sufficiat.

Interpretatio *Verè scripsisse & consona iis, quæ Dioscorides de Amomo tradidit: qui etiam apertè monstrat, Indicum racemum omnibus Amomi Pliniani notis insigniri: præterea comprobat, Plinium in describendo Amomo fuisse diligentiorē & dilucidiorē ipso Dioscoride. Nos ex Maroneana explanatione in Plinium, quædam tantum adscribimus, plura desiderantem ad ipsius Maroneæ commentarium relegantes. Sciendum itaque est, quoddam quando Plinius dicit: Amomi uva in usu est.*] Amomi nomen significat plantam ipsam, ejusdem verò plantæ fructus, dicitur uva Amomi. Recentiores qui Ruellio vitio vertunt quoddam Dioscoridis vocem *ῥακμῶ* perperam exposuerit uvam cum significet racemum, ejusdem erroris etiam Plinium ipsum tacite reprehendunt. Amomi uvam intelligit Plinius racemum, qui refert imaginem uvæ. Recentiores qui Plinium in Amomi frutice describendo anceps vident, inde colligunt, eundem auctore etiam uvam Amomi ignorasse, admodum fallaci argumento ducti.

Indica Vite Labrusca.] Aliqui ex Recentioribus reprobaverunt Plinij de Amomo historiam, quia illa admodum fævet nuper invento Amomo. Garzias autem audiendus non est qui Amomum in India nasci suis scriptis negat: non credendum est vel Garziam omnes Indiarum vastissimas regiones peragrasse, vel omnia simplicia medicamenta cognovisse.

Recentiores *Indica Vite Labrusca.*] Aliqui ex Recentioribus reprobaverunt Plinij de Amomo historiam, quia illa admodum fævet nuper invento Amomo. Garzias autem audiendus non est qui Amomum in India nasci suis scriptis negat: non credendum est vel Garziam omnes Indiarum vastissimas regiones peragrasse, vel omnia simplicia medicamenta cognovisse.

Folia Myrti.] Nobis arridet opinio, quoddam Amomi planta sit frutex Myrti effigie præditus, nâq; in Racemi Indici (ut sic loquar) pediculo folia insunt breviora, quæ non sunt dissimilia à foliis Myrtinis.

Punica mali folia simile.] Amomum quod est simile foliis Mali Punici, atque à Plinio laudatur, non est altera Amomi species, sed est Amomum antea descriptum, illud autem est Amomi fructus vel planta: Amomum quod folia obtinet Mali Punici similia, est ipsamet uva, non plâta. Indicus noster racemus in seipso continet folia emula foliorum Mali Punici, sена singulos folliculos ambientia in modum calydis. Recentiores autem quibus incognita sunt folia dicta, frustra obijciunt Plinio, quoddam Amomum descripserit longè diversum à Dioscoridis Amomo. Ex Plinio folia Mali Punici pertinent ad uvam Amomi, non ad plantam: sed ex Diosc. folia Vitis albæ spectant ad plantam Amomi, non ad fructum. Racemi quibus insunt folia integra & longiora, quæ extra Amomi acinos perspicue eminent, sunt pulchrioris visu & plerumque recentiores, & incorruptiores existunt: folia ante maturitatem decerpta, rugosa evadunt, quæ

Tom. II.

nondum animadvertere potuimus in Indicis racemis: sed acinos racemi rugosos. Plinius Amomo rufos primum bonitatis signum assignat: idem Nardo tribuit colorem rufum, nihilominus us tamen in Indicis racemis non videmus colorem illum, sed subrufum: subruffi autem racemi Indici Amomi plerumque omnium ponderosissimi & maxime odorati existunt.

Recentiores] Quis assentietur Recentioribus scribentibus Plinium ignorasse Amomi uvam, quam nullus Vnguentarius aut Medicus Plinij seculo ignorare poterat: Frustra laborant Recentiores, qui fingunt duas Amomi species à veteribus descriptas, cum illi unicum tantum cognoverint.

Folia Mali Punici & gummi liquido] Cum Amomi uvæ fragmentis in unum factitium racemum. Recentiores frustra obijciunt Plinio, solis foliis inodoratis Mali Punici & Gummi liquido effingi non posse fructus odoratos, qui legitimum racemum emulati possint: Plinius in sua narratione historica prætermisit Amomum friatum ut pote notissimum in ætate.

Minus venosa atque durior] vulgaris Codicis lectio hæc in parte mendosa est, legendum est minus venosa, atque dura.

Simile his & nomine & frutice Cardamomum] Confutanda opinio Recentiorum, qui scripserunt Amomum Indicum esse speciem Cardamomi racemosi. Docet Plinius, Cardamomum simile esse Amomi speciebus, nempe Armeniaco, Pontico, Medico: qui verò exponunt Cardamomum simile esse his, Amomo & Amomidis scilicet, illi perpetui faciunt unum Amomi genus & Amomidis, cum planta sit sui generis ab Amomo diversa.

Frutice] quoniam Plinius nunquam vidit Amomi fruticem, eadem ratione credendum est eundem nunquam vidisse ipsum Cardamomi fruticem, utpote peregrinum inutilemque Vnguentariis & Medicis. Estimandum cognovisse Plinium similitudinem inter plantas Amomi & Cardamomi vel ex veterum monumentis, vel ex ipsa similitudine fructuum Amomi & Cardamomi: Nostræ ætate nemo adhuc vidit (quoddam scilicet, Amomi & Cardamomi plâta: *Et nomine*] Amomum, Cardamomum, & Cinnamomum sunt vetustissima nomina, & sunt inter se similia: Ex hac verò similitudine nominum licet facere probabilem conjecturam unam & eadem regionem aluisse illas plantas atque nomen eisdem imposuisse. Quâobrem cum ex historiis nostri ævi notis apertè Cinnamomum in remotissimis Indiæ Orientalis insulis provenire, credendum est in eisdem insulis, vel saltem proximiori earundem insularum continenti cū Cardamomum & Amomum nasci, indeque in Europam deferri: Verum cum Plinius inter Amomum & Cardamomum duplicem similitudinem descripserit, scilicet fruticis & nominis similitudinem, Recentiores ipsi qui affirmant nostrum Indicū racemum esse Cardamomum racemosum fateri coguntur, inter Cardamomum & Amomum, tertiam reperiri similitudinem notatu dignam, nempe racemorum similitudinem, adeo ut uterque Amomi & Cardamomi racemus eodem modo cohereat, convolvaturque se ad uvæ similitudinem. Verum Veteres quidē vocarunt Amomum racemosum, sed Cardamomum nunquam dixerunt racemosum, vel quia Cardamomi racemus laxus, & rarus, nullam præ se ferat imaginem uvæ, vel quia Cardamomi fructus tenuibus hæreat pediculis & propterea suam racemi figuram diu servare non possit. Ex his colligendum est Galenum, Diosc. Plin. & alios veteres nunquam cognovisse Cardamomum racemosum.

Semine oblongo] Recentiores longitudinem seminis exponunt, tãquã similitudinem Amomi & Cardamomi: sed Plinius Cardamomum semine oblongo præditum esse dicit Amomi nullam mentionem facit. Plinius voce seminis intelligit Cardamomi fructum, qui externo folliculo, interni quoque seminibus constat, sed Recentiores

R ;

tiores hanc impugnant expositionem. Procul dubio omnes Cardamomi fructus cum sua theca oblongi; interna verò semina angulosa & brevissima sunt, non oblonga: quia verò eadem semina seriatis deposita sunt, sibi que invicem connexa tenui intercedente membrana, quā involvuntur inde fit, ut unaquæque series seminum, unci tantum longioris seminis ostendat imaginem, quæ recentiores in errorem induxit. Cum dicant Recentiores Cardamomi fructum non esse semen, veritati repugnant, nam ex Aristotele fructus & semen reidem sunt. Ex Theophr. seminis vox communissima, quæ sub se continet fructus & semina, tam nuda, quam in pericarpio contenta. Plinius ipse Balsami fructum semen appellat & nucleos Pineorum. Et si verò scripserit Plinius Cardamomum in Arabia provenire, attamen id falsum esse, novimus ex Neotericeorum historiis.

Recentior.

Contra Plin. Cardam. non adferri ex Arabia.

Cardamomum quadruplex.

Viridiss. dua significationes.

Indicum racemum hunc referri non potest.

Color.

Cardam. 3.

Varium.

Locus.

Quatuor eius genera) Cardamomum duplex existit, frutex scilicet quod inutile est, propterea etiam ignotum, atque semen oblongum: sed quoniam Plinius enumerat quatuor Cardamomi species, eadem esse fructus, qui pericarpio & seminibus intermixtis constant, nemo dubitare debet: siquidem harum specierum color est viridis, ex russo candidus, varius, atque ipsi acuti anguli, nostrum vulgare Cardamomum referunt non plantam: ex hoc loco apparet Plinium ignorasse Cardamomum racemosum.

Viridissimum] si Plinius Viridissimum Cardamomum intelligit illud quod herbaceo colore præditum est, nihil prohibet quin vulgare Cardamomum sit Plinij legitimum quamvis sit pallidum, siquidem vel maturitate, vel vetustate, vel æris intemperie color viridis evanescit. Quid prohibet etiam Viridiss. Plinio illud esse, quod recentissimè collectum fuit?

Pingue] significat oleosum & significat etiam crassum, & succo redundans, hoc in loco verò significat semina crassiora & vegeta ipsius Cardamomi.

Acuti anguli] Acuti anguli sunt in vulgaris Cardamomi theca, nam ejusdem interna semina angulosa quidem sunt, sed non sunt prædita acutis angulis, sed potius obtusis. Verum quoniam Indici racemi fructus orbiculares sunt, quasi ut æcini, ad hanc primam speciem Cardamomi redigi non possunt: nam etsi fructus Indici Amomi præditi sint tribus exiguis eminentiis, illæ tamen sunt leviter connexæ non angulata.

Contumax frangenti] Corrupti Codices legunt, Plinij lectio contumax fricanti. Verum ex Diosc. & Plinio locus corrigendus. Loquitur verò Plinius de integro fructu Cardamomi, non de internis tantum seminibus.

Proximum è russo candicans] Hic est nativus color Cardamomi vulgaris.

Tertium brevius atque nigrum] Tertia Cardamomi species breviori & nigriori semine constat. Semina autem breviora sunt ipsi fructus integri Cardamomi, quod constat suo pericarpio & seminibus internis, sed si liberè loqui licet, etsi seminum brevitatem denotare possit tertiam speciem Cardamomi, nihilominus tamen nigredo denotare videtur quandam à solis calore contractam exsultionem.

Præterea tamen varium] Varius color inchoatam maturitatem significat. Hæc autem quarta Cardamomi species non differt natura à reliquis speciebus Amomi.

Hic & apud Medos nascitur] Nullum est absurdum Cardamomum nasci in Arabia & Media, sed revera ex Neotericeis non habemus. Concludendum in Amomi historia plenam fidem adhibendam esse Plinio: tum quia vera & notissima scripsit, tum quia cum Diosc. consentit, quo etiam se diligentiores

præstitit. Quia verò in Indico nostro racemo omnia apparet legitimi Amomi notæ, recitat à Dioscor. & Plinio, asserendum est hunc Indicum racemum esse verum & legitimum Diosc. & Plinij Amomum.

Quod Latinis Amomum, Græcis, & Arabibus Hamana live Hamanu, & Constantinopoli in officinis Anama nominatur; mihi verò Amomum i. racemosum dicitur, ego (inquam Bauh. in pin.) verum credo Amomum, Martinelli & Ponæ, de quo Nicol. Marogna Medicus librum latinè scripsit, quem Ponæ Italicum dedit. Amomum spurium, Clusæ exot. auctario. Fructus è VValachia, Eid. exot. l. 2. c. 22. Amomum verum Ponæ, Clusæ, post. & ibidem sub Amomo.

CARDAMOMVM VETERIBVS ET in genere. CAP. XLIX.

Cardamomum (exorditur Theophr. hist. l. 9. c. 7.) Calij ex Media, alij ex India, cum Nardo & reliquis omnibus, aut plurimis advehi narrant. Hoc ad unguenta utuntur. Simile his [Amomo & Amomidi] est Plinio l. 12. c. 13. & nomine & frutice Cardamomum, semine oblongo. Meitur eodem modo & in Arabia. Quatuor ejus genera, Viridissimum ac pingue acutis angulis contumax fricanti quod maximè laudatur. Proximum de russo candicans. Tertium brevius atque nigrum. Præterea tamen varium & facile tritu, odorifq; pravi: qui verius Costo vicinus [quod verius Costo vicinus. Dal.] esse debet. Hoc & apud Medos nascitur. Precium optimi in libras duodecim [libras x. duodecim. Dal.] Cinnamomo proxima gentilitas erat, si prius Arabia divitias indicum conveniret, causasque quæ cognomen illi felicitis ac beatæ dedere. Cæterum ex quibus autoribus Plinius sua quatuor genera faciat, non constat, teste Matthiolo: Dioscorides enim, Galenus & cæteri Græci, unius tantum Cardamomi meminerunt. Quæ verò commentantur de his Cardamomis Plinij, vide cap. præcedenti apud Nicol. Maroneam de Amomo novo Cardamomi minoris facie, vel Indico racemo.

Diosc. de Cardamomo tractans id non describit, sed duntaxat quibus in locis nascatur optimum, qualesque illud sit, docet his verbis: Cardamomum optimum est quod ex Comagene & Armenia & Bosphoro affertur. Nascitur etiam in India & Arabia: Elige verò id quod agrè frangitur [ad præparandum] plenum est ac conclusum [quod] quod enim ejusmodi non est, exoletum est: quod item odore nares percellit, & sapore acre & subamarum est. Vim habet calefactoriam. Cum aqua potum facit ad Comitiales, tussim, coxendicum dolores & resolutionem: ad rupta item & convulsa, ac tormina, & lumbricum latum ejicit. Cum vino verò potum renum affectionibus, urinæ difficultati, à scorpione ictis, & ad omnia venenum ejaculantia commodat. Cum Lauri radice cortice, drachmæ pondere potum, calculos atterit. Fœtus etiam perdit suffitu. Et scabiem eximit illitum cum aceto. Miscetur etiam ad unguentorum spissamenta.

Temperamentum adscribit Galen. simpl. 7. Qui sanè adstruit esse facultatis admodum calidæ, non tamen usque adeo ut Nasturtium: sed quanto suavius magisque fragrans est Nasturtio, tanto ei imbecillior ei calida facultas inest: nec enim ulcerare idoneum est vel ipsum per se illitum. Porro ad unguem habere quiddam etiam amaritudinis quā lumbricos interficit, & cum aceto valenter piores detergit.

Apud Galenum in theriaca Androm. (quæ & l. And. & in lib. de theriaca ad Pisonem habetur) Indrum

Racemum Indicum l. 2111000000 Amomum.

Synon. C. B.

Locum ex Theophr.

Cardamomi 4. genera Plinio.

Precium

Plin. nec.

De Card. Diosc.

Delebat.

Vires Comitiales.

Renes.

Venenum Calculum Scabies.

Temperamentum ex Gal.

Indicum Cardam. Indicum Cardamomum non pro nigro, & Indorum colorem habente accipio (inquit Cornae) sed pro Indico & in India nascente, ut Dioscorides docet. Porro idem Galenus 7. c. 3. ejusdem operis, in confectioe Pamphyli, Cardamomum exenteratum habet sic enim ego *καρδάμωμον ἐξεντερωμένον* reddo: & accipio non id cuius interna pars evacuata & ejecta est, sed cui exterior cortex sive pellicula, in qua continentur, detracta est, ita ut interna pars in usum assumatur, & sit *ἐξεντερωμένον*, velut ex interna parte acceptum: contrario modo ei quo glycyrrhiza *ἐξεντερωμένη* probatur, ex qua ejecta est medulla, & radix reliqua in usum accepta. Quanquam autem in Scribonio, & Marcello Medico Latino vetusto, per me ex officina Frobeniana edito, *ἐξεντερωμένον* vox reddita legatur per vocem animatum: Nam & Nasturtium animatum, & cachry animatum, & misy animatum habent. & animatum ita pro exenteratum & inanitum, positum videri possit, per errorem exscribentium, qui animatum pro inanitum agnoverint: tamen velut etiam in relatis commentis meis scripsi, animatum pro pleno & integro, & evacuato contrario dictum esse potest, atque adeo pro integro, quod ad externum collatum, animatum, & velut anima praeditum haberi: atque ita Galenus de antid. dixit *καρδάμωμον ἢ ἁλόων χαλκίς*, & *ἐξεντερωμένον*: i. e. Cardamomi interni absque folliculis. Quanquam in Galeno ambiguum sit, an *χαλκίς* ad *ἁλόων* aut *ἐξεντερωμένον* vocem referenda sit. Quam autem *ἁλόων* usus nullus à Dioscoride praescribatur, *ἐξεντερωμένον* & quod supra *ἐξεντερωμένη* dixit, i. e. internum in capsulis comprehensum accipi debere videtur. Et hoc declarat Galenus ibidem, ex eo quod in sequenti medicamento *καρδάμωμον καὶ ἁλόων* accipere iubet. Acrius tamen 12. c. 47. *καρδάμωμον χαλκίς* & *ἐξεντερωμένον* habet, i. e. Cardamomi medulla privati, tanquam rejecto interno grano, capsulae ipsae accipiendae sint: sed ego vocem *ἁλόων* deesse puto, & legendum, *καρδάμωμον χαλκίς ἁλόων*, & *ἐξεντερωμένον*: ut sit eadem quae Galeni lectio.

Cardamomum duplex Avicenna. Avicenna de Cardamomo duobus distinctis capitibus tractavit. Priore de Cardamomo Sacola, de qua suo loco dicemus: altero de Cardamomo Cordumeni. Quo capite eadem planè vires ei assignat, quas suo Cardamomo Dioscorides. Ex quo perspicuum est de Graecorum Cardamomo Avicennam hic verba facere. Item Serapio nomine Cardamomi eadem prorsus refert, quae Diosc. & Galenus de suo Cardamomo. Sed Cardamomum ne Graecorum sit, quod vulgo in officinis habetur, id in controversia est. Gesneri quidem iudicio, Cardamomum Graecorum, aut illud ipsum est, quod nostri simpliciter Cardamomum vocant, (cujus tamen tres fere differentiae magnitudinis inveniuntur) aut pro eo rectè usurpari potest. Matthiolus suspicatur Melegetas vulgo dictas, Cardamomum majus esse: sed illae profecto longe calidiores sunt Cardamomo, & acrimoniae piperi non cedunt: & quod Matthiolus ignoravit, Arabicum seu Arabum Cardamomum sunt, Sacola etiam & aliis nominibus apud Arabes dictum, apud Aethiopicum modò *Cacila*, modò *Cachrys*, modò *Capsium*: quod postremum indocti aliqui in compositionibus quibusdam in Tapsiam mutant, (ut in Diamarg. Avicennae quadam descriptione) quae mortis quorundam occasio extitit, ut testatur Lacuna in sui Dioscoridis hispanici praefatione: alij verdò in *Capsiam ligneam*, ut Matth. in epist. sed Gesnerus Capsicum, i. e. Cardamomum Arabum esse legendum primus animadvertit. Quod si quis etiam Cubebis pro Graecorum Cardamomo uteretur non aberraret is ipsius iudicio. Ipsi Melegeta non videtur cum Matthiolo magis respicere aroma, quam alia Cardamomi nomine dicta semina: quae

quidem, cum non nihil subamara sint, ut Cardamomum in Gesnero visa sunt: Melegeta verò acerrima, absque amaritudine, nescit quid somniet Matthiolus, ut Melegetam potius Cardamomum Graecorum esse putant, quam id quod nomen retinuit.

Cordus praeter Melegetam, Cardamomi tria genera facit, magnitudine tantum distincta; Matth. duo solum. Ceterum cum omnia haec quatuor genera, sua semina folliculis includant, ridiculum est, quod nugatur Matthiolus, Melegetam sibi praeter ceteris videri Cardamomum Graecorum, quoniam folliculos habeat. Melegeta dicitur etiam *Nux sacra*, & *Nux sacra* Myrepto, quasi *Nux Cachrya* vel *Cachrys*. Temere etiam Matthiolus pro Cardamomo Myrti Cardamomum baccas supponit, corruptam Martiati Rotæ *Αντι-Cardamomum* versionem sectatus: melius Juniperi baccas aut Cedri substituisse. Piper Indicum seu Siliquastrum quorundam, primus Gesnerus ante plurimos annos Capsicum aut Cardamomum Arabicum sibi videri scripsit: in quo errasse se agnoscit: et si sententiam illam aliqui non indocti sunt sequuti. Ceterum minus Cardamomum Serapionis, nullo capitulo aut folliculo inclusum, ipsi ignotum est. Quod si quæ compositio Cardamomum duplex majus & minus requirit, Cardamomum quodcumque habetur, ex tribus illis magnitudine tantum differentiis, duplicatum ponere approbat, aut Cubebas pro altero. Pro Sacola autem & Capsia, vel *Capsia Cataldæ*, in lexico Graeco rei herbariae, quod D. Sambucus ad ipsum misit innumeris erroribus refectum, verba hæc inveniri scribit, *καρδάμωμον χαλκίς*, & *ἁλόων* *καρδάμωμον* *ἢ ἁλόων* *καρδάμωμον* *ἢ ἁλόων*. Melegeta verò vel granum paradisi vulgò dictum, non est Cardamomi species: sed sui generis, quod & precij vilitas indicat, & nulla odoris aromatici gratia. Graecis veteribus incognitum fuisse putat: recentiores Graeci *Capsium* nominant, ut Actuarius: & alicubi *Sitacium*, si bene meminit ab Arabico nimirum *Seitacengi* (quæ vox tamen alibi Lepidium significat) in recentiorum quibusdam antidotis *Capsia*, interdum etiam *Capsia* pro *Capsico* legi videt: vocatur & *Nux sacra*, & *Nux sacra*, & aliis barbaris nominibus, de quibus nunc inquirere non vacat. Quod autem Gesnerus Matthiolum Cardamomi duo tantum genera statuere scribit, se negligentem ejus lectorem ostendit, nos siquidem contrarium brevi ostendemus.

Cardamomi appellatione grana quædam in pharmacopoliis habentur, & gustu & olfactu admodum aromatica: Manardus & Antonius Musa contendunt nos (inquit Cordus) verò Cardamomo catere, quoniam ab authoribus descriptæ notæ granis Cardamomum appellatis non conveniant. Quod quidem verum esse ipse fateor, non tamen continuo proclamandum erat, nos vero Cardamomo catere. Dioscorides enim & Serapio integros Cardamomi utriculos sive fructus granis cōserctos, ut olim afferebantur, atque non rarè nostrā etiam ætate, descripserunt. Hodie verò ut plurimum cortices, quia lignosi & nullius qualitatis sunt, abjiciuntur, & sola grana folliculis inclusa, propter saporis & odoris fragrantiam ad usum reponuntur: hinc etiam est quod Graeci in compositis medicamentis semper expetant Cardamomum: *ἐξεντερωμένον* & *ἁλόων* Cardamomi, h. e. exenteratum & ex utriculis exempta viscera sive grana, Maius alterum & minus alterum. Arabes utrumque Cardamomum generali nomine, & *Cordumeni* & *Sacola* appellant. Itaque vehementer errant ij, qui *Cordumeni* apud Serapionem Carui agrestis interpretantur, idem enim est cum Cardamomo: nec aliquem suspendat quod Serapio, eandem rem alibi *Cordumeni*, alibi *Sacola* nomine describit: in capite enim de *Cordumeni* ea recenset, quæ apud Dioscoridem de *Cardamomo* le-

guntur: in *Sacolla* verò rem eo depingit modo, ut Arabes descriperant, & ut ipse viderat, & quemadmodum adhuc affertur Cardamomum. Iam cum Dioscoridis & aliorum Græcorum descriptioni, & *Cordumeni* & *Sacolla* apud Serapionem historiz per omnia conveniat, nemo diversum statuat esse Cardumeni & Sacolla. Arabes pulchrè etiam suis nominibus Cardamomi species distinguunt. Siquidem majus appellant *Heil*, minus verò *Heilane*, qui autem contrarium dicunt, errant. Cardamomum minus, nomen servat in Pharmacopoliis, Ger. *Cardamomle*, diversum à granis paradisi, quæ aliqui Cardamomum minus improprie vocant, minus fortè precio & viribus intelligendum: mole enim majora sunt, & aliqui majori Cardamomo substituunt. Habet idem Cordus in obs. silv. Cardamomum quoddam pinguius, acrius, odoratius, scabriusque veluti incultius quiddam.

Cardamomum pinguius.

Cardamomum triplex Corn.

Alnus eligendum.

Francofurti ad Mænum in nundinis Cardamomi tria genera hodie officinæ apud Cornarium agnoscunt [Manardus inter hæc, solum amaritudinem desiderat] majus quod ad fuscum & propemodum nigrum colorem declinat semen, medullam albam habens; minus, cuius color ruber est, tertium quod *Grana paradisi* vocant, fulvicoloris. Sunt autem omnia semina angulosa, & velut compressa. Sed ex his nullum propius ad Dioscoridis Cardamomum accedit, quam quod minus appellant, & est, ut quod sapore acre sit, & leviter amarum. Majus nec acre est admodum, nec amarum. Grana verò Paradisi, quæ vulgo *Paradisi Körner* vocantur, acrimoniam ad eam excellentem habent, ut fervorem linguz inducant, & piperis loco cibaria condiant, in multorum usu. Minore itaque Cornarius utetur, si ita usus ferat.

Cardamomum Græcorum & Arabum diversum.

Monachis confundit.

Error Januensis.

Cardamomum simplex.

Cardamomum Meis.

Cardamomum 4. generis.

Cardamomum Arabum non novit Monachi.

Monachis in *Mel. dist. 7. cens. 265.* auctoribus, aliud est Cardamomum Græcorum & aliud Arabum. Cardamomum Græcorum scilicet Diosc. & cæterorum, apud Arabes vocatur Cardamenum vel Cordumenum, sive Cardameni, vel Cordumeni. Arabes, ut Serapio & Avicenna, faciunt plura Cardamomi genera. Avicenna confundit species in diversis capitulis ut in capitulo *Cardamomum* & capitulo *Cobzague*, & capitulo *Elbue*. Interpres etiam Serapionis, Simon Januensis in capitulo de *Sacolla*, quod est de Cardamomo (videndum putant) erravit, ac etiam aliqua de suo addidit, videlicet Cardamomum majus esse *Heil*, & minus *Heilane* (quod putat minus corruptum) & esse masculinum: ut idem scripsit in sua clavi in litera Cardamomum: similiter erravit in capitulo 316. quod incipit Cardameni: quia non debuit intitulare ipsum de Carui agresti. Ut omnes communiter tenent, quando absolute est scriptum Cardamomum, semper majus est intelligendum. Bellunenensis in suis interpretationibus ait, *Elbue* est Cardamomum minus, & est granum apud Italos appellatum *Melegette* & dicitur etiam *Heilbue*. Quomodo Mesues ponit Cordumenum ut in Diamoro, & in Athanasia magna, & in Diasulphure, & in confectioe alsescere, & aliis pluribus: tunc non petit Cardamomum Arabum sed Cardamomum Græcorum, quod ipsi Arabes sub nomine Cordumeni describunt. Vnde sciendum quod Cardamomi sint quatuor genera, Cardamomum majus & minus, & *Heil* & Cordumenum: Et omnia quatuor genera tangit Plinius 12. lib. 12. Fatentur Monachi se nescire quid sit Cardamomum Arabum majus, & *Heil* penitus ignorant; & Cordumeni Arabum, scilicet Dioscoridis Cardamomum, quid certe sit adhuc non bene percipiunt. Minus Cardamomum quod aliter *Heilbue* appellatur auctoritate Bellun. tenent pro certo esse *Melegetam* siue *Melegheram* usitalem, quam omnes aromatare agnoscunt, & hæc ponent

da in trochiscis de ligno. Aloës Mesues. Loco Cardamomi majoris, ac etiam loco *Heil*, licet illis uti Cardamomo scilicet *Melegeta*.

Legitimum Cardamomum hæc tempestate non cognosci, ne ab ipsis quidem mercatoribus, qui ex Syria, vel Aegypto aromata ad nos covehunt, *Melegetam* compertum habet. Quo fit ut Medici ac pharmacopæi in componendis medicamentis æquè errent in Cardamomo, atque in aliis compluribus, quod Cardamomi loco variis quibusdam seminibus, odoratis tamen, indifferenter utantur. Quorum primum Cardamomum majus: secundum Nigellam quod Melathi est genus: tertium verò *Meleghera*, vel grana Paradisi nuncupant, cum tamen eorum nullum nec Græcum, nec Mauritanum sit Cardamomum, quandoquidem aliud Græci, aliud verò Asii pro Cardamomo intelligunt. Serapio Dioscoridis Cardamomum Cordumenum appellat, deinde auctore Isaach sui Cardamomi peculiare caput instituit, idque Saccollam nominat: quin & duum esse generum tradit, alterum majus, alterum minus, quorum nullum non modò Dioscoridis Cardamomo responderet, sed nec etiam ulli eorum, quibus officinæ indifferenter utuntur. Probatur itaque primum quod omne officinarum Cardamomum Dioscoridis Cardamomum esse non possit, pluribus tum notis, tum etiam qualitatibus. Quippe quod hæc in uniuersum parum, vel serè tantillum densa sint, frangenti non contumacia, & gustui nihil amaroris relinquunt. Quod præterea ab Arabicis distent, si cum illis comparentur, faciliè disparitas deprehenditur. Siquidem Serapioni majus Cardamomum semen est plantæ, quod oblongis quibusdam cõcluditur capitibus suis sanè similibus, quæ è rosis prodeunt, granis obnigris rotundis, Piper longè maioribus, in quibus minuta semina concluduntur, angulosa, sarcta, & odorata: minus verò nullo contegitur capitulo majoris modo, quanquam colore conveniant. Quod planè indicat, omne officinarum Cardamomum nec Arabum esse, nec pariter Græcorum, sed potius ab utrisque maximè differre. Quare putaverit Matthiolus, illud falsò sibi persuasisse Monachos, qui in *Mel. scripsere*, quod Arabum Cardamomum minus illud semen sit, quod Sephasia Meleghetas vocant, Andreæ Bellun. qui Avicennam mendis expurgavit, auctoritate freti. Sed cum Bellun. id asserat vulgari tantum opinione ductus, cumque notæ minimè eorum sententiæ ad stipulentur, errasse Monachi faciliè deprehenduntur. Semina enim quæ *Meleghera* appellant (ut omnibus planè constat) capitulis excepta suboriuntur, quod minori Serapionis Cardamomo non evenit. Crediderunt Ruellius in suis de natura stirpium libris, & Fuchs in sua methodo, id omnino Mauritanorum esse Cardamomum, quod nos Piper Indicum, alij Siliquastrum appellant. Verum etsi Piper Indicum in corniculis Rosarum serè modo suum includat semen, quia tamen reliqua Serapionis Cardamomo nullis notis correspondent, Mauritanorum Cardamomum esse nequit: hoc enim suis in vasculis globulos quosdam concludit, non lenticulis similes, sed rotundos, & pipere crassiores, qui intra se minutum quoddam semen continent. Huc etiam accedit, quod cum hoc Piper corniculatum, tum semine, tum corniculis ipsis tanta sit acrimonia præditum, ut non modò mansum, sed on tantum admotum statim quasi ignis exurat, absurdum utique fuerit credere Serapionis Cardamomum esse, cum dixerit ipse magis adstrictoria facultate pollere, quam acris. Cæterum scribit Avicenna majus Cardamomum grana cicetibus atque minus verò lentibus minora proferre. Quod cum fortasse Ruellius haud rectè perciperet, ei errandi ansam præbuit, quippe minori Cardamomo,

Cardamomum non præterea cognoscitur.

Nigella

Sacolla non est Cardamomum Diosc.

Monachis error.

Piper Indicum contra Ruell. & Fuch. non est.

non autem in maiori semina, lentium modo nasci ait Avicenna: quaquam Ruellius, ut suam tueatur sententiam, secus forte legit Avicennam. Tria genera Cardamomi ex Alexandria Egypti & India Orientali a Lusitanis adferuntur, inquit Matth. germ. & Italicus. Maius vocatur à quibusdam *Melegeta*, ab aliis Grana Paradisi. Medium & minus non certo scio an unum horum sit verum Cardamomum veterum.

Cardamomus generis.

Cardamomum minus.

Cardamomum minus.

Veteres testantur Cardamomum habere siliquas ut legitur apud Galen. Zenonem in suis remediis adversus venenarejecisse siliquas: præterea id videndum apud Gal. lib. 10. de antid. post Democriti descriptionem, in Theriaca carmine descripta: Item 1.7. de comp. med. secund. loc. cap. 1. Facile autem dicerem maius Cardamomum esse veterum verum Cardamomum, si non deesset amaritudo, quam requirit Gal. lib. 7. simpl. si odore caput offenderet, & non facile frangeretur. Neutrum volo asserere. Non male agunt qui Cardamomo vulgari utuntur loco veri Cardamomi. Cardamomum maius dicitur *Melegeta* propter similitudinem cum *Melegeta*, & propter gratum odorem quibusdam Grana Paradysi.

Cilius in fine Dod. gall. scribit, antiquis Græcis vocari *καρδαμύμη* Lat. *Cardamomum*, Arab. *Cardamum*, *Cardamuni* aut *Cardamuni*. Ab hoc Cardamomo aliud habere Arabes diversum, cuius maius genus vocetur ab eis *Sacalla* aut *Chachul*: minus autem dicitur *Heni* & *Hilbana*. Officinis utrorumque Græcorum & Arabum Cardamomum esse incognitum: pro his alia duo haberi genera, primum & maius Grana esse Paradisi. Idem in exot. auct. quale sit Græcorum aut Latinorum Cardamomum nondum cuiquam constare opinatur, certum enim ait esse ab Arabum Cardamomo differre.

Cardamomum minus.

Acosta de arom. c. 64. de Cardamomo scripsisse ait Avic. cap. de *Cardamom* & divisisse in maiorem & minorem. Magnam esse confusionem nominum huius medicamenti in scriptis Arabum. Et quamvis Serapio unum ex his vocet *Cardamom*, & alterum *Hilbana*, sciendum textum corruptum & scribendum esse *Cardamom*, *Hilbana* autem ut vocant omnes Arabes, aut *Cardamom* ut dicit Avicenna, vel *Elachi*, significare Cardamomum, si verò non habeat nomen apud Græcos & Latinos, id accidisse quia non cognoverint: & hinc credi Galenum non scripsisse de hoc. Dicere Dioscoridem melius adferri ex Comagene, Armenia & Bosphoro, adferri etiam ex India & Arabia, quod si ibi invenitur illud quod tradit Galenus & Dioscorides non esse Cardamomum quo vulgò utuntur in India, sed duo fore & non unum, si dicatur esse Avicenna & Serapionis Cardamomum, non esse quod contradicat, quia non sit id, quod Avicenna & Serapio vocant *Cardamom* vel *Hilbana*. Non competere etiam signa quæ Dioscorides attribuit Cardamomo, non enim difficile rumpi. Quod vulgaris usus (ait idem Acosta) vocetur Cardamomum, quum non sit Græcorum ac in causa Girardus

Cardamomum minus.

Cremoneſis in sua versione, quia non noverat hoc simplex præstitisset eum reliquisse nomen Arabicum. Non est etiam hoc Plini Cardamomum quia quatuor tradit genera. Vulgare Cardamomum diversum est admodum ab eo quod Valerius Cordus tradit, cuius unum genus maius est magnitudinis glandis, & minus magnitudinis Avellanae, quandoquidem

Cardamomum minus.

Cardamomum maius non excedit magnitudine Pruni nucleum. Ruellius dicit fruticem similem Amomum, ac colligi Amomum in Arabia, unde patet quod exhibet non esse Cardamomum, quandoquidem ex India fertur, in Arabiam, nec etiam ibi Amomum provenit. Dicit præterea ex Theophrasto auctoritate esse vicinum Nardo & Costo: verum in eo videtur deceptus, quia Nardus & Costus reperiuntur in Chio & Mando: *Cardamomum* autem vel Cardamomum in

Cardamomum minus.

Malabar. Dicit præterea semina alba, ita calida ut velicas excitant in ore quod non convenit Cardamomo vel Cardamomum enim albus & semen nigrum. Andreas Lacuna dicit demonstrari tria Cardamomi genera, maius & minus, & alterum quod est Nigella. Maledicit Arabibus sine occasione quasi confundant omnes species. Erravit Mercator, qui ei dixit ex Armenia veli Venetias tria genera Cardamomi si saltem verum erat Cardamomum, quia verum ex India venit Alexandriam. Cardamomum igitur Græcorum non est Arabum. Præter rationem Manardus & alij dicunt Cardamomum Arabum medicamentum novum & removere ab usu, quia Galenus & Diosc. eo non sint usi. Eo usi sunt Avicenna, Abenzoar, Haach, Rhafis & alij. In formulis medicamentorum Græcorum & Latinorum antiquorum qui non scripserunt post Arabes, accipitur Cardamomum Galeni, nec accusentur qui culpam vacant in compos. Arabum & Latinorum recentiorum assumatur Cardamomum majus & minus, quæ vulgaris & ejusdem figura, quæ quantitate tantum inter se differunt. Avicennam oportebat distinguere Cardamomum in majus & minus, quia diversis in locis proveniunt. Affirmatur reperi in Zeilan aliam speciem Cardamomi majorem & minus aromaticam vulgari. Cardia ab Ota vult ut utamur vulgari majori & minori: Minus magis aromaticum. Andreas Bellun. dicit *Cacule* esse Cardamomum majus & *Alcal*, vel *Hahalei*, vel *Cairbua* & *Elbua*, Cardamomum minus. Verum hæc nomina sunt depravata in libris arabicis, nec mirum si errarit Bellunenſis. Quod ait Mathæus Sylv. Indicos Medicos radice uti ad febrem, res non ita se habet.

Cardamomum minus.

Cardamomum minus.

Cardamomum minus.

Qui tandem novit Amomum Diosc. & Plinij, is teste Lob. adv. illicet noscet eorundem Cardamomum, utpote Amomum simile nomine, frutice, semine oblongo & idem discet nostrum siliquosum, Cardamomum officinarum, aut Græcorum non esse, aut descriptiones prorsum depravatas esse: Nam Galepi locus adductus de exenterato fructu Cardamomi, potest intelligi de glumis mundato: nec ullus locus advertatur ex Dioscoride. Neutiquam tamen contemnendi usui hæc siliquas putamus: tum quia tacito consensu & prærogativa usui receptæ sunt: & forte Arabum sunt. Earum quæ maxima, *Melegeta* aut *Melegeta*, nomine Grani Paradysi notissima est. E quatuor aliis siliquis quæ inter se perquam similes sunt, ea quæ officinis majus Cardamomum vocatur oblonga triquetra lapidi dactyli concolor. Triquetra etiam siliqua sed brevior est media vocata, quam verius putant Cardamomum. Minima pariter triquetra, sed vix nucleum Pruni æquat. Alia quædam recens allata ex Indiis occiduis, pusilla *Melegeta* penè par, gustu Gingiberi prorsum testante. Istas omnes siliquas Cardamomi esse, aut plantarum consimilium, nec Gingiberi ab similia, non abs re quidam peregrinator narrabat. Dùm Lob. in adv. notat Anguillaram, licet non nominet, non videtur observare Galenum meminisse *Cardamomum* sive siliquarum quod competit nostro Cardamomo. Item Diosc. dixit *Cardamomum*, plenum & occlusum quæ siliquæ optimè conveniunt. Anguill. sententiam videant lectores post sub titulo Cardamomi cum siliquis triangularibus. Minus distinctè scribit Lonicerus de Cardamomo & ejus viribus. Hic ponimus totâ ejus historiam ne quid desit lectoribus, Ille igitur inquit. Cardamomum est fructus arboris: grana similia Rutæ seminibus continentur in parvis tenuibus lobis inclusa. Est autem Cardamomum duplex, hortense & sylvestre, sive majus & minus. Ex his domestica, sive majora prævalent, magisque odorata sunt, lubrica, actia, cum quadam dulcedine. Sylvestria & minora non adde-

Cardamomum minus.

Cardamomum minus.

bona,

nomina substituerunt, eaque Cardamomum majus vocarunt: improprie tamen & male. Nam sapor quo piperi similia sunt & odore, plurimum à Cardamomo differunt: fructus tamen sive utriculi figura magnam habet cum majore Cardamomo similitudinem qui ovi plerumque magnitudine conspiciuntur, & granis (quæ novimus) onusta sunt Cardamomi instar.

Matthioli sententiam de Cardamomo & Meleggeta ante posuimus. Ejus facit tria genera in sua epitome: Majus ita describit, Majoris capitulum sicut pyri faciem refert, semine intus subrusescente, angulosoque.

Ruellij temporibus tota Seplasiarum caterva ad Mauritianos planè deficiens, hoc duplicis fastigij Amomo abutebatur, pro eo quod à Diosc. & veteribus Græcis perscribebatur. Vnum ostendebant, Amomum appellantes, alterum viribus prælatum, vulgò Malagreta Hispanis; nostris officinis Grana Paradisi nomenatum. Cardamomum minus hoc intelligunt quod vulgò Italis Melligreta.

Ostendimus autè ex Monachis, Cardamomum minus Heilbaugue Bellunenſi dictum esse Meleggetam & usurpandum in troch. de aloës Mesues & pro Cardamomo majori ac etiam loco Heil. Sylvius contendit Cardamomum Serapionis utrumque, tam majus, quod Granum Paradisi & Meleggetam vocatum putant plerique, quam minus nihil habere commune cum vero Diosc. & Galeni Cardamomo: sed Valerius Cordus contrarium asserit, nos sc. verum Cardamomum hodie non desiderare. Icon à Ritho exhibita videtur repræsentare Cardamomi maximum genus, de quo hoc capite agimus. An verò Rithus intellexerit quæ scripsit, considerandum: Apud Lonicerum icon ferè similis iconi Matthioli, pro Granis Paradisi vulgò & Cardamomo majore.

Tab. Cardamomum majus Arabum. Lac. Cardamomum majus, vulgò Meleggheta, & Grana Paradisi, Cardamomum Dioscoridis: Cardamomum hortense ex Ragusei opinione. Lacunam taxat Garcias, dicens, cum satis protervè in Arabes investum esse: ejus Meleggheta non esse Cardamomum Diosc. siquidem ignota fuerit Dioscoridi, neque Cardamomum majus coloris sit cinerei: Malaguetta sive Melegueta nonnullis Paradisi grana, cujus in Europa usus Cardamomi minoris loco, non esse Cardamomum, Avicennæ Combazge dictum: cetera vide paulò post sub Cardamomo siliquoso.

Clus. apud Garciam scribit Matthiolum Cardamomi iconem Ficis formâ exhibere: cum tamen nihil aliud sit quam Melegueta suo involuero tecta, quæ sanè inter Cardamomi vulgaris sive Saccolæ Arabum genera ex Garcie sententia recipienda non sit: Adhortamur nos ut videant lectores quæ antè annotavimus capite de Cardamomis cum siliquis: olim enim Cluius videbatur confundere Grana Paradisi cum Cardamomo siliquâ sive thecâ longiore.

Lobadv. Cardamomi siliquarum maxima Meleggeta aut Millegetta dicta à semine crebro, sarcto, occhulo & folliculo membranæo, Ficum solis effigians nomine Grani Paradisi novissima est, & ex Occidua Aphrica frequens allata.

Lacuna (inquit Acoſta) concludit primam speciem Cardamomi esse Melegghetam vel Granum paradisi, & esse Cardamomum de quo scripserit Dioscorides. S. d. Diosc. non vidit Cardamomum cum cortice, quandoquidem Lacuna dicit esse Meleggheta: neque hanc cognovit Diosc. nec scivit ubi nasceretur. Majus dicit habere colorem rubrum: sed est clarum non ita esse. Cardamomum minus non esse illud semen quo utuntur in Hispania pro Meleggheta, vel Granum Paradisi, constat per mul-

tos qui fuerunt in Meleggheta, qui affirmant se nunquam in Meleggheta vidisse Saccolam, vel Cardamomum. Si quis benè consideret, Avicenna vocat Melegghetam Cohenbague.

Platearius Cardamomum duplex assignat: majus quod dicitur domesticum, minus quod dicitur silvaticum & illud esse pilosum & subalbū. Ast Castor facit triplex, majus simile Ficui, medium longum, minus capitellum triangulare.

Cam. hist. ait Avicennam Cardamomum majus vocare Saccolam quebir; minus Saccolam ceguer; quo nomine etiam hodie, teste Garcia, cognita sint mercatoribus & Medicis; item Sacule & Elaste: putatq; Cardamomum nostrum antiquis, tam Græcis quam Latinis incognitum fuisse: Cordumeni autem Arabum fortassis esse Cardamomum Græcorum. Maximum quidem, cujus iconem damus, continere in Meleggetam, quæ à Cardamomis distinguenda veniat.

B. pin. Grana paradisi & Cardamomum sive officinarum: Cardamomum majus, Matth. Lon. Lac. (cui etiam Cardamomum hortense) Cast. Lugdun. Grana paradisi, Cord. in Diosc. Meleggeta seu Cardamomum piperatum, Eid. hist. Millegetta, Lob. Maliguetta, Garz. (cui & Combazbange Avic.) & ad Clus. cur. post. Cardamomum primum, Cam. epit. alterum, Cxf. Cardamomum Arabum majus, Tab. Grana paradisi seu Meligettas, Linscott. part. 3. c. 14. Hoc Cardamomi minoris loco aliqui utuntur, & Meleggeta dicitur, propter similitudinem, quam cum Melice semine habet.

Hujus folia sub Melegueta in prodromo sic describit: crassa sunt, uncias quatuor longa, tres lata, per quorum longitudinem costa elata fertur, à qua fibræ plurimæ per transversum abeunt, ut in Caryophyllorum foliis cum quibus maximam similitudinem habent: fructus satis cognitus habetur in officinis, ut & grana exempta: hujus folij pediculus sapor est aromatico, ipsis granis correspondente, non tamen ita acuto & aromatico, ut in foliis Caryophyllorum animadvertitur, quo signo potissimum à se invicem distingui possunt.

Cardamomum in India provenit, potissimum à Calcutio usq; ad Cananor. Itè in Malavar & Iajo, Cam.

CARDAMOMI CVM SILIQVIS sive thecis longis & brevibus.

PRæter Cardamomum, quod Meleggeta & Granum paradisi nomine innotuit, sunt & alia



tria, nisi duo malis, siliquati Cardamomi genera. Ex his maximum, unciam & ut seculum longam, gracilem, triquetram, striatam, coloris cinerei frætu contumacem siliquam habet, modicè turbinatam, seminibus numerosis, triplici varſu, membranæ intercedentibus tenuissimis candidis, farctam; color granis spadiceus & cinereus ferè, figura ut Meleggeta angulosa, rugosa; substantia alba; sapor servi-

Siliquati Cardamomi genera.

Lacuna.

Pol. oron. descr.

Sacule.

Amomum.

Malagreta.

Melligreta.

Cardam.

minus.

Malagreta.

Cap. law.

maior.

et.

4. 11.

Jul. 11.

R. 11. not.

Lacuna.

not.

Saccolæ.

Clus. not.

Mellegetta.

duos consimilis. Alterum genus semundialis longitudo habet siliquam, striatam, cineream, sed evidenter triquetram, ad tergemina Lathyridis semina accedentem, semine fæctam membranulis distincto, cinereo, (in his siliquis etiam rubente) anguloso, sapore & substantia prioris. Tertium affignant, quod sola magnitudine videtur hanc dicto differre, est enim siliqua omnium minima, ceterum quid differat præterea non video.

Icon.

In præsentī tabella Cardamomi siliquati duo priora depingimus; tertium verò omnium minimum, in iconē Cardamomi maximi effigiamus.

De Card. siliquatis Cardam.

Helban Arak Cardam. mediora.

Card. minus, mediora.

Matth. de Cardam.

Medium.

Minus.

Cardam. vulgaris minus.

Cord. in Diosc. Cardamomi genus alterum minus dicitur, quod fructum fert Avellanā ut plurimum minorem, triquetrum & minoribus granis, eisdem cum majore saporis & odoris, sed vehementius palatū & linguam penetrantibus, hoc frequentius est in usu & licet simpliciter hodie Cardamomum vocetur, in pharmacopoliis tamen Cardamomi minoris nomen servat & à Germ. Cardamomle dicitur & ab Arab. Helban. Idem describit hist. l. 4. c. 29. Cardamomum mediocre, figurā oblongum, triquetrum, utrinque acuminatum, colore in candido fuscum, quantitate grandis avellanæ nuci æquale, majore Cardamomo minus, minore verò majus, idcirco mediocre nominatum, intus dense in se fæctis, majorique Cardamomo similibus granis plenum: cortice constat prædicti instar, venoso, sed multo tenuiore, in tribus suis angulis, quibus maturum dehiscit, singulas commissuras habens. Gustu Cardamomo majori grana ejus respondent. Afferitur & hoc ex Ægypto & India, sed paucissimum, idque perquam raro, cum utroque Cardamomo. Et c. 30. Cardamomum minus mediocri per omnia simile est, paulo tamen minus, candidiori, paulo tenuiori cortice, & trium angulorum commissuris dehiscente vestitum, quo detracto semina apparent dense in se fæcta, nullis membranulis distincta, majori Cardamomo similia, paulo minora, magisque angulosa, in rufso cinerea, atque tam acutè sibi ipsis conjuncta, ut unum semen figurā bubulos renes æmulans, appareant esse. Saporem grana habent valde aromaticum, tenuem, majorique Cardamomo similem, sed paulo tenuiorem. Afferitur & hoc ex Ægypto & India, folliculis suis exemptum, nonnunquam etiam una cum folliculis, idque copiosius, quam majus, solūque vulgò hodie cognoscitur: majus enim cum parcius advehatur, paucissimis notum est: probatur quod majoris notas habuerit. Ceterum cum autores simpliciter scribunt Cardamomum ut ait in dispens. arom. rosat. minus Cardamomum [sufale] intelligunt.

Matth. hæc depingit & describit vocans unū Cardamomum medium, alterum minus, quamvis nec pro Cardamomo Græcorum, nec Arabum recipiat. In prior. comm. negat etiam cognosci Cardamomum, medicos & pharmacopæos reprehendens, quod semen quoddam pro Cardamomo majori exhiberent. Idem hist. germ. sit. ne Cardamomum Græcorum dubitat: non tamen eos peccare dicit, qui loco veri ponant. In epit. sic describit Cardamomum medium folliculo contegitur oblongo, colore minus rufescente. Minus minore constat capitulo, ipsoque triangulari, semine subrotundo, asperiusculoque, semen omnibus acre & odoratum, majorem tamen acius & odoratus [de quo sub Melegeta] minus ut medium acedinis vehementia superat, ita & odoris fragrantia. Nos quæ sit sententia Matthioli de his Cardamomis de ubi proveniant ante annotavimus. Cam apud Matth. distinguit in medium, minus & minimum, tres ponens icones.

Anguill. in genere loquens de Cardamomo, dicit se credere vulgaris usus Cardamomum esse ve-

rum & legitimum, idque argumentis conatur probare: sed frustra, non enim distinguit Anguillara minus à majore, forte quod similia semina, & siliquæ non multum differentes, nisi magnitudine.

Longemini Cardamomi majoris & minoris, si ve siliquis & sylvestris, ubi non dubitarim cum loqui de aliqua specie hic tradita: nos tamen cum obscure tractet, ea in genere proponimus, lectoribusque ea discernenda relinquimus.

Garciam de hoc Cardamomo crediderim locutum cum ait: Cardamomum quod vocant aroma est illis in regionibus probè cognitum in quibus magnus ejus usus est. Hujus etiam magna pars in Europam, Africam & Asiam evahitur. Quam verò rectè sit illi inditum Cardamomi nomen, aliis disceptandum relinquo. Avicenna l. 2. c. 159. sanè peculiare caput insinuat de Saccolaa quod duum esse generum tradit, Alterum Saccolaa quehir, i. e. magnum, alterum verò Saccolaa ceguer, i. e. minus. His nominibus cognatum est utrumque Cardamomum cum Medicis Arabibus, tum mercatoribus. In Malavar vocatur Eremelli, in Zeilan Encal; in Bengala verò Guzarate & Decan, interdum Hil, interdum Flabi, idque inter Mauritios: nam à gentilibus indigenis omnium provinciarum enarratarum Næ nuncupatur. Quod alterum Serapio Saccolaa, alterum Helban vocat, mendosum est exemplar, & Hil duntaxat scribendum erat. Etenim si Bane omnino adiciendum volumus, potius Bane dicendum erat, quod lingua Canarina magnum significat. Nihil igitur aliud Saccolaa est omnibus Arabibus nuncupatum, aut Saccole Avicennæ, aut Elachi, quam quod Cardamomum vulgò appellant, veteribus cum Græcis, tum Latinis plane ignotum, ut ex eorum monumentis colligere licet. Siquidem Galeni notæ nostræ Cardamomo non conveniunt. Nostrum Cardamomum in illas regiones deferretur à quibus Dioscor. suum de vehi scribit. Sed neque id frangenti contumax est, neque caput tentat, neque amarum, neque gustu adeo acro, ut Caryophylla. Plinius l. 12. c. 13. est quadruplex esse Cardamomi genus scribit, tamen Dioscoridi & Græcis unicum tantum extat Cardamomi genus. Sed nullum ex prædictis cum nostro quicquam commune habet, quod fragile esse debet, siliqua candicante, granis intus nigris. Scribitur verò id leguminum modo, altitudine, quando summa, cubiti, in quo dependent siliquæ granula interdum usque ad viginti continentes, non ut Cordus lib. 1. in Dioscor. scripsit, glandis avellanæ magnitudine. Gerard. Cremon. Saccolaa ignorans, nomen illi ex Græcis pro arbitrio indidit: tamen legitimum Arabicum nomen integrum & non mutatum reliquit præstitisset. Non multum forte refragaboris qui Cordumeni Arabum, Cardamomum Græcorum esse putant: quandoquidem Serapionis & Avicennæ Saccolaa Græcis est ignota. Quod verò Saccolaa utendum negent non concedo, multis enim experimentis improbatur, est, plerisque morbis peritile: eoque utendum censeo in omnibus compositionibus Arabum & recentiorum qui Arabes sequuntur. Malaguetam parit, si ve Melegietam à nonnullis Paradisi litana nuncupatam, ejus in Europa usus Cardamomi minoris loco, non esse Cardamomum didici, inquit idem Garcias alibi, quoniam sæpius cum in Hispania, tum hic in India percontatus eos qui in Lusitania in Malaguetam profecti fuerant, an illuc Saccolaa si ve Sacolaa (quod Cardamomum appellamus) nasceretur, negarunt omnes: tunc Indis interrogati an Malaguetam apud eos cresceret, negarunt & ipse. Deprehendebam tamen Malaguetam ab Avicenna Combarbagne dici, cumque scire ex Sofala, cur Malaguetam provincia contermina est, deserti verisimile autem mihi non videri Avicennam, visum adde-

Card. filio. & siliquæ.

Cardamomi nomen.

Saccolaa.

Serapio equi. vigilar.

Cardamomi minus vulgò. Veteribus. Græci insinuat.

Plus Card. 4. genera.

Saccolaa descriptio.

Contra. Cordum. Cremon. err.

Malaguetam. Cardamomi minoris loco.

peti.

peritum bina capita de eadem re scripsisse. His cogitationibus occupato anno, Tuscani mercatorem professione ludum in Cochini commodum reperio, qui diceret libi mandatum, ut prater cetera aromata cardamomum majus, emerget: quod me movit, ut sciscitarem in aliis etiam regionibus nasceretur. Tandem regiarum mercium in Ceilan curatos (Factorem vocant) mihi retulit, istuc quidem inventi, nostro quidem multo majus, sed minus odoratum: remque ita se habere compertum, illius specimine (me curante) ex Ceilan, delato. Accersitus, praterea in Balagate ad curandum illustrem Hamjam, cujusdam Regis in Balagate, nomine Verido, fratrem, de industria medicamentum, in quo Cardamomum majus & minus arabica lingua prescriptum, ut conspicerem possem: utrumque mihi exhibitum ad medicamenti compositionem, eadem quidem utriusque forma, sed magnitudo diversa, nulla tamen cum Malaguetta similitudo. Optimum autem censetur minus, quod odoratius est altero, & facultate majus dici potest, meo iudicio. Provenit utrumque in India, presertim vero ab emporio Calecut usque ad Cananor, tamen aliis etiam locis Malavar, & in Joa nascitur, non tamen adeo copiosum, neque cortice adeo candido. Multus ejus usus est in his provinciis, siquidem una cum Betre (veluti supra diximus) manditur pituitaque caput & stomachum expurgat, & serapis admiscetur. Falsum autem est quod Sylvaticus can. 7. scripsit, Indos ejus radice adversus febris circuitus uti, nascique in tuberibus quarundam arborum. Nam exili est admodum radice, nec nisi satum provenit, solo autem ignibus perusto, ut facilius enascatur. Pandestarium Cardamomi memisse invenietur alibi: in nostris autem exemplaribus apud Rhasim haud facile invenies. Nullam autem facultatem similem [qualem in prope-] rai Garzia] nostra Pandestarij, qui Matthaeus Sylv. est, exemplaria tribuunt. Ceterum, quicquid sit Garzias mihi videtur immerito Cordum, redargueret. vidimus enim hos fructus, eo modo, quo describitur, in quibus semina illa, quae passim in Officinis dicebantur Cardamomum, non enim loquitur de seminibus, in theca contentis: sed de toto fructu.

Clusius fin. hist. gall. Dod. cap. 20. tradit Cardamomum Officinarum majus, diversum a Grecorum & Arabum Cardamomo, quod vocat grana Paradisi, siliqua longa, duali, lignosa, ut nux [nux Gange] longius & angustius in quo multa grana angulosa, dura, firma, & boni odoris: Cardamomum autem minus Officinarum fructu duro, rotundo, instar Avellanae, aut minores, in quo etiam grana parva, angulosa, minora multo quam majoris. Idem ut Cardamomum antiquum & Arabum utrumque incognitum officinis: quorum loco duas alias habeat species: prima & major est Granum Paradisi. Iconem habet Clusius aliquo modo demonstratam nostrum Cardamomum majus, siliqua longiore: in ea Icone multae sunt siliquae simul haerentes, cum foliis Lupuli aut Vitis adpressis: habet etiam aliam Cardamomi minoris Officinarum cum ramis sine folijs: si ejus nodi plantae vidit, oportebatur plenius describere. Suspicamus etiam eum confunde- re Cardamomum majus siliqua longiore cum Melegetta. Pergit idem in exot. Amomum spiritum, cujus singuli uvarum fructus aliquam cum minore Cardamomo in Officinis vulgo recepto, similitudinem habent, quale autem sit Grecorum & Latinarum Cardamomum, nondum cuiquam constare opinor, certum est ab Arabum Cardamomo differre: certe uterque fructus triangularis est folijs. At Cardamomi vulg. recepti theca, oblongior & minus crassa, multus fructus distincta semina conti-

Fom. 11.

ners. crassiuscula, Melegetta seminibus non valde distincta.

Lob. adv. officinis Cardamomum majus vocatum, oblonga siliqua, triquetra, lapidi dactyli color est & par, semen codit angulosum Melegetta minus. Triquetra item siliqua sed brevior est media vocata, nec dispari semine, quam verius putant Cardamomum propter a natorem & acrimoniam non exigui. Minima pariter triquetra, sed vix Pruni nucleum aequat. Alii plura dignetur lector videre ante ex Adversariis tradita, quae non recipiunt pro veterum Cardamomo, ubi notatur Anguillara, quamvis non nominetur. In obs. quatuor Cardamomi agnoscit genera, majus, minus, minimum, & medium. Hunc sequitur Plantinus & Tab. Lobelius ergo & ex eo Plantinus addunt speciem non enumeratam in adv. quia hic non comprehendunt siliqua Gingiberis, ut factum fuerat in Adversariis.

Cardamomum Grecorum, ut vult Occo in el. Indo inajore, aut illud ipsum est quod nostri simpliciter ita vocat, aut certe pro eo usurpari potest. Verone in musco Io. ponæ reperit Maronea Cardamomi racemosa esse ramos & sparsos, Indici vero Amomi, densos, & in seipso convolutos; veteres Amomum dixisse racemosum, minime vero Cardamomum: idem observavit Amomi fructum ut imaginem referre, siliqua elegantem figuram diutissime servare, quia arcte sub ramulo adheret: at Cardamomi fructum etiam si sua natura racemosum forte, nihilominus tamen longe distare ab uva racemis: praeterea quoniam tenuibus haereat pediculis, suos racemos non diu servare integros: & hinc videntur Cardamomi fructus qui ad nos esserunt, sepe semper avulsi a suis ramulis. Sed de Cardamomo siliquoso de quo hic agimus legantiores ex Maronea praecedenti capite digna. Notandum tamen Maroneam sua iconem, cui titulus Cardamomi tres species, videri duas ejus species in uno & eodem ramo pingere, quasi ejusdem plantae: nos vero ante etiam meminisse duarum Iconum a Clusio olim exhibitarum.

Pin. Cardamomum majus officinarum Saccolia Arabum, aut Sacoule Avienae, Elachi Mauritanis: Cardamomum medium, Matth. Lon. Cass. Lug. Cardamomum majus, Cord. in Diosc. (cui Heyl Arabum) & hist. Clus. ad Dod. Linfcor. 4. part. Ind. or. c. 23. Cardamomum majus vulgare, Lob. Clus. in Garz. Cardamomum, Garz. Frag. secundum, Cam. ep. Eid. B. Cardamomum 4. medium, ut & Lob. & Tab. Cardamomum medioere, Cord. hist. Item Cardamomum 5. simpliciter in officinis dictum: Cardamomum minus, Mart. l. ac. Lon. Lob. adv. Eug. Tab. Linc. & Cord. in Diosc. & hist. cui & Helban Arabum Cardamomum verum, Ang. Cardamomum minus vulgare, Lob. Clus. in Garz. Cardamomum, Cass. 3. Cam. ep. Eid. B. Cardamomum 6. five minimum, ut & Lob. & Tab. Cardamomum 4. Cam. ep. Nos Cordi Cardamomum majus seorsum describendum ducimus, nec ad hic dicta referimus.

CARDAMOMUM MALVS MEL-
ligeitae simile, hucus modo tur-
binatum, Cordo.

Cardamomum majus Cordo hist. 22. l. 4. Mellegetta similis fructus est, minor tamen, longitudo rariore semine superas, superius junctura pythimena latior, inferius prope pediculum angustior, & huiusmodi modo turbinatus, nullam commissuram

habens quā aperiri queat, colore foris in cinereo subruſſus, venoſo & diſtractu difficili cortice coſtās; intus ſeminib⁹ crebrō membranulis interſectis ac diſtinctis. Colore, figurā ac magnitudine Melligettae graniſ ſimilibus, obtuſioribus tamē angulis, plenus. Saporem grana habent quemadmodum & odorem valdē iucundum, aromaticum, tenuem, ſubacrem, ac modicē amareſcentē. Cortici nulla eſt in gultu gratia, idēq; eo exempta ſemina ad nos ex Syria & Aegypto afferuntur, quamvis interdum etiam integri fructus, quales jam deſcripſimus, advehiunt. Eligito grana ejus nitidiora, ponderoſiora ac odoratiſſima. Fructus autem integri probantur maturi, h. e. ſuperficiem extētam habentes, undiq; praecluſi, neq; ex industria aperti, neq; terebinibus corroſi, pōderoſi, & conſummati denſe q; in ſe ſarctis ſeminibus pleni. Idem in Dioſcor. l. c. 5. Cardamomū majus hodie quod aſſertur fructū habet lignoſum, fractu contumaci, ſicis propemodum magnitudine & figurā: intus anguloſis & aromaticis graniſ Mali punici modo plenum: hoc parciis aſſertur, propterea quidam in ejus locū Grana Paradīſi ſubſtituerunt. Scriptum in annot. apud Cordum, Cardamomū majus dici arabicē Heil diverſum à Graniſ Paradīſi, quod cum parciis advehatur pauciſſimis notum eſſe.

Meminit Corn. Cardamomi officinarū, cujus ad ſuſcū & propemodū nigri colorē delinet ſemen &c. Ejus verba vide ante ſub Cardamomo maximo, Coſiderādum an intelligat Cardamomū majus, de quo hic agimus: Meminit etiā Cardamomi minoris quo utendum cenſet, de quo mox. Memor eſt etiā Cluſ. apud Garz. Cardamomi majoris propemodum magnitudinis Cordi, verū non demonſtrat, quam plantam intelligat. Exhibet Matthiplus pro Cardamomo majore ſic ſimilem iconem, quam ante cap. de Melegueta poſuimus, quam Cluſius, ut ante dictum, dicit eſſe Melegueta.

VIRIS ET USUS.

Vires ex veteribus jam antē à nobis traditae ſunt. Reſtatigitur hoc in loco, ut eas quas apud recentiores annotatas invenimus, adſcribamus. Cardamomū & Grana Paradīſi calida ſunt & ſicca: ordine ſecundo, inquit Lon. Incorrupta decem aſſervātur annis. Uſus eorū ſalutaris, ſipotimū laborantibus. Verogini medentur in potu macerata, ſicut & pulveriſata, in juſculo exauſta. Quin & ita uſurpata vētriculum roborāt, concoctionemq; juvant, Cardamomū cum tantundē ligni Paradīſi pulveriſatum ebibitumque ex vino generoſo, ruſtibus auxiliatur, & omniū Cordis tremorē pulveris hujus drachma ex vino ſumpta, dubio procul emendat. Anifo mixtum, cum vino propinatum appetentiam excitat. In omnibus affectibus internis à frigore obortis uti poſſumus Cardamomo, quod his magnopere conducit, praefertim muliebri ſexui.

MELEGVETA SIVE CARDAMOMVM male quibuſdam exiſtimatum Cluſio.

Elegantis alicujus plantae fructum, reor (inquit Cluſius ex l. c. 5. 3. decimum quartum, quae forſiſ creſcit Cannae Indicae vulgō vocatae modo: nā caulis ſuprema pars, capita ſive ſiliquis ſuſtinens, prout ſimilis mihi videbatur, lenta ut illius & ſiſbroſa, multiq; ſoliolis, ſeu appendicibus cepta: quae ſoliola, quem florē proferat, nemo indicare poterat, nam Pharmacopoeus qui hae collegerat, in ſeditu extinctus nullum nomen adſcriptum reliquerat.

Erant hae porro capita binas uncias longa, inferna parte cralla, deinde paulatim ad ſupremam uſq; partē gracileſcentia, quali triangulari forma praedita, obtuſis tamen angulis cartilagineoſa, externa ſulci ex ruſo coloris, interna veluti in ternas cameraſ ſe-

cundum longitudinem membranaceae quadam cartilagine diviſa, atque plena nigris, ſplendentibus ſeminibus, nullo majoribus, denſe ſi nullo congeſtis, & tenui membranula involuta, intus albis & quadam acrimonia praeditis. Nāſcuntur autem ea capitula in ſummo caule, quaternis aut quinis, atque veluti ex eodem oriſu prodeunt.

Caterum qui anno à Chriſti natiuitate 1601. ex Lava & Sumatra redibant, ſimiles fructus, etiam in Madagaſcar inſula lectos adſerebant, quos mihi obtrudere volebant pro Melegueta ſive Cardamomo majore vulgō credito. Verū, quidem eſt, ſimilitudine quadam eſſe in externa facie: ſed qui vel mediocri diligentia utrumq; fructum conſeret, diſcrimen obſervabit: nam Meleguetae fructus, magna ex parte brevior & craſſior eſt, hic verō gracilior & oblongior; Meleguetae cortex etiam minus iſtius cortice durus, imo ſatis fragilis: hujus praeterea grana nō tā numeroſa quam in Melegueta, majora tamen, ſuſca & ſplendentia, ſingulaque peculiari candicante membranula involuta. Meleguetae verō grana, licet trifaria quadam cartilagine diſtincta ſint & ſingula ſua peculiari membranula involuta videantur, minora tamē ſunt, magis ruſoſa & duriora iſtius fructus graniſ: praeterea nō ita ſplendent, & ſubruiſi ſunt coloris, acerrimiq; ſaporis. Si quis tamen Meleguetae eſſe gerchosiſ cōtendere velit, mihi cum illo litem eſſe non cupio, modō non legitimum, ſed ejus ſpuriū aliquod genus eſſe non diſſiteatur.

B. pin. Graniſ paradīſi ſive Meleguetae affinis fructus: Fruct⁹ 14. ſive Melegueta ſpuria, Cluſ. ex l. 2. c. 15.

CARDAMOMI FACIE FRVCTVS triangularis malignus. C A P. I L.

Exoticus fructus, quem accepi Cluſ. ex l. 2. c. 22. ex V Valachria à V Vilhelmo Paduyno, erat triangularis formae, ſemuncialis etiam magnitudinis, ex albidis coloris, tenui q; membranula tectus, Cardamomi officinarum fructū perbellē referens, continenſque multa grana inaequalia & ruſoſa, cineracei foris coloris, intus albi, omnia in globum congeſta, ſatis validi & gravis odoris & acris ſaporis, qui brevifſimo, & vix apparente petiolo plantae inhaerebat, calice tribus ſoliolis conſtante incluſus. Qui mittebat, conſulem ſux urbiſ unum, ex his fructibus edile ſcribebat, ex cujus eſu morbum contraxiſſet: quz adeo cauſa fuit, ut granum leniter duntaxat guſtate vellem, nihilo minus (an ex odore, an verō ex deguſtatione acciderit, ignoro) caput mihi dolere cepit, & haud dubie peris mihi accidiſſet, ſi devoraſſem.

AMOMVM VERVM QVORVNDAM C A P. L I.

Amomi nomine à Valerando Dourez inſigni Pharmacopoeo accepi aroma quoddā, magnitudine ſpicarum Stachadis Arabicae, cujus tamen portiones ſeparatae his anguſtiores erant & duas ſiliul junctas vidi Pedem columbinum hirsutum exprimentes. Conſtant autem ſoliolis multis ſquamularum imbricato poſitu, compactis, ex luteo albicantibus, ſimile aliquid & colore & forma cum Origani ſolite quorundam habentibus, odoratis, ſapore viſcolo, amareſcente & acro.

Garcias de Amomo ſcribens narrat ſe percontatū à quodā pharmacop. Hiſpano quid eſſet Amomum: cum reſpondiſſe Arabica lingua Hamama nuncupari. Ejus verō Scholiaſtes nobis præſentem exhibuit ad Valer. Doraug Amomi nomine & Ormuz celeberrimiſ Arabiciſ impoſito miſſant: non tamen cum Plinij & Dioſcor. Amomo convenire ille putat, ſi id forte ſit quo ſe Garcias donatum aſſert. Hamama verū

Pes colum-
binus.



vero interpretatur
pedē columbinum
significat: Medici
Nixamoxe Regis
in Decan potētis-
simi, dixerunt ist-
hic non nasci, sed
inter alia aromata
quæ ad Regem ex
Asia, Persia, & A-
rabia conficiendis
alexipharmacis p-
ferretur, Amomū
etiā adferri, cu-
jus ramulo me do-
narent. Hūc cum
Diosc. descriptio-
ne contuli, ad quā
venisset quadrat-
bat, & licet jās sic-
cus, Pedem tamen



Amomum
Avicenna

columbinum referebat. Sciendum est Amomum ā-
pud Avicennā nihil aliud esse quā Pedem colum-
binum. Hæc Garcias. Qui ut Clusi verbis utar, uti-
nam Amomi descriptionem pleniorē dedisset.

Acosta de Amomo nihil certū habet: scribit de eo
loqui Diosc. l. i. Lac. Matth. Amiatum enar. i. Serap.
Fuch. Galen. 6. med. & Ortam, dicentem sibi deno-
minatum Amama arabicē, quod significet Pedem
columbinum, & esse Amomum Avicennæ, verūm
quia non vidit, non describit.

Synon.

Ruellius dicit Cardamomum simile Amomo &
colligi cum Amomo in Arabia. Clus. ad Garc. Lug. &
Tab. Amomū. B. pin. Amomū 2. spurium foliosum.

AMOMIS SIVE PSEVDAMOMVM.

Deser.

AB eodem. Valerando pro Pseudamomo & A-
momide mihi exhibita sunt fragmenta seu par-
tes quædam. nonnihil Amomo præcedenti similes,
inter quas lignæ aliquæ portiones nigre, in quo-
rum extremitatibus apparent partes squamulæ
breviores quā in Amomo minus albicantes, saporis
viscidus, ut nobis videtur. Hujus figura sub Amo-
mo in præcedenti tabella in infima ejus parte.

Icon.

ROSA HIERICHO. CAP. LII.

Deser.

Ignosis & confertis statim ā radice natis fruti-
cat stolonibus, palmaribus, aut paullo majori-
bus, crassis, cinerei coloris, in numerosam famulo-
rum solum cancellatim divaricatis, superiore
parte omnibus in globum veluti coeuntibus, per
quos folia rara unciā sescunciāve longa, semun-
ciā lata, saginata, cinerea, hirsuta, flosculi secun-
dum ramos intussecus ubique racemum quodam-
modo nascuntur, candidi: quorum unumquemque
sequitur catadum, duobus loculis, membrula di-
scussis, totidem semina orbiculata compressa, tuta,
actia continens, binis supra loculos extrinsecus velu-
t auriculis prominentibus ex adverso positus, ex in-
tergeretino calycis parte surpete stylo longiusculo
rebus saus crassa, lignosa, simplex.

Amomum.

Rosa Hier-
icho.

Amomum, inquit Cord. ā Diosc. ut parens mens
Eudicus Cordus prodidit, est odoratus frutex, quē
Monachi Rosam Hierichō, & Rosam Martē vocant
cui sententia ego quodque subscribo. Antioris Mu-
sa tamē hujus iudicio contradicit, eo fretus arguer-
to, q. sola tribuatur Bryoniz. Si Bryoniz folia ha-
bet, maneat Amomū, si verō dissimilima, tūm pri-
mūm hæc de re merito dubitamus. Musam remora-
tur quod ea Rosa nates non vulnerat, quantum vis
reces, quod dictum quomodo intelligat, nō possum
cōjicere. A Diosc. probatur, quod nāz mōr. h. c. olo-

Tom. II.



referebāt. Dūc sunt
Hiericuntidis Ro-
sa (species unā insi-
pida, nec odorata
quæ Amomis: alie-
ra gustu aromatica
valde odorata, quæ
verē Amomū voca-
tur. Hæc Cordus,
cujus annotationi-
bus quidam addit,
non probari sibi
Rosam Hierichun-
tis vulgō dictam
Amomum vocari.
Huic autem adili-
pularum Coldemb.
qui absolute consti-
tuit, quod Rosa
Hierichuntis vul-
gō vocata Amomū
esse non possit. Ce-
terum hanc Cordus
sibi odoratam pro-
nūciat, cum tamen
nobis Rosa Hieri-
cho nec recens ac
virens, nec etiam
sicca odorata ob-
servata sit, nec folia
habeat Bryoniz.
Quare oportebat
eum tradere non
Rosam hanc vide-
rit odoratam.

Non paucis pla-
cuit Rosa Hieri-
contea vocata pro
Amomo: quod ta-
men minime de-
cuit eos asserere in-
certos foliorū, quæ
memini (ait Lob.

adv.) vidisse & crevisse D. Trevisiano Patavij. Cres-
cit enim haud difficile ex semine recentiterent au-
tem seminula complura, faciematim unā supata, glu-
mosa, longiora, intra fructus, cancellatim, re-
ticulatimque implexi glomum contenta. Non de-
scribit Lob. semina, sed vascula.

Coloniz vidi, ait Turners, suffruticem maris sin-
pugnam (contra) paullo minorem, per ora uis li-
uci ā Diosc. descriptio respondenti, quæ ex Iudæa
peregrinationis Hierosolymitanæ votā, defunctus
quidam secum tetulerat. Eodem Herbario, dicitur
Rosa Hiericuntis, i. e. Arg. Rose est Hiericho. Te-
runt, quotannis circum litem nata, uis uis, uis
unde ā quibusdam nominatur & hujus mōr. re-
f. Hōi psum censerem eorum esse Amomum, si odo-
rem haberet, quem in Amomo requirit Diosc., nec
non sola Bryoniz, in alius enim omnibus mōr. re-
conveni descriptioni, quæ in hujus generis plan-
tam incidat odoratam cum reliquis notis (ex Diosc.)
pro verō Amomo licet accipiat.

Gesh. inter, Amomum quod Eudicus Cordus vide-
batur Rosa Hierosolymitana, Aspalathum esse judi-
cat, & idem paulo post Radicem nigra Hippoc. nō
minat, germ. Rosen von Hiericho. Sed Rosa Hieri-
cuntea nihil commune habet, nec simile quicquam
cum Aspalatho & Radice nigra Hippoc. quæ quid
scribat Gesh. Nobiscū autem sentit Calp. Batmollus, q. d.
dicet Rosa Hiericuntina, verē Rosa non est, neq. A-
momū Dioscondis, neq. Aspalathus. Neque nāz
hoc repōr. in Palestina ā antiquis hortis, ut agri-

HISTORIAE PLANTARVM.

Quidam (inquit Scaligin lib. 1. de plantis Acri-
stochus scripto) cum excurrunt, specie figuram gerunt,
ac exinde postea. cusu nodi sunt qui in Arabia
dicuntur Benteli, & planta quae nominatur Helio-
scopium. Benteli apud ipsos Arabes quid sit, qua-
situm non inveni. Si non est Amomum, quid aliud
asseram nescio. Est enim Amomum id omnino,
quod Rosam Hierosolym, aut beate Marie vulgus
vocat, perplexo sarmentullo in racemi modum, quae
si nihil spirat odoratum, natalium humori. atque
vetustati est attribucendum: non autem detrahendum
speciei, propter accidentium absentiam quo-
rundam Athenaeus. Bentelos concha genus
margaritiferae prodidit apud Indos. Miror tanti
iudicii virum asserere, ita temere Rosam Hieroso-
lymitanam esse Amomum, cum nec recens, nec ve-
tus odorem spirat ullum. Idem mecum sentit Bras-
savolus: non desugere ait, qui Hierosolymitanam ro-
sam Amomum esse putarint: verum hanc non esse
dubito, quia non vulnerat nares odore. Confirmat
& hoc Agricola, quod vel Hierichuntis rosa non
sit veluti uva, quale est Amomum Plinio lib. 12. c. 13.
& Andromacho in descriptione Galen. Confirmat
idem & Sylvius & Fuchs lib. 2. de compos. med. & A-
marus in Diosc. lib. 1. c. 31. apud quem idem male posi-
ta cap. de Rosa. Et Rithus in Diosc. cum Lacuna.
Et Lohel. Adv. & icon. pag. 203. Tom. 1. Item Lugd.
Rosa Hiericonthea. Falluntur igitur cum reliquis
Michael Neander phys. part. 1. Andromachus in
med. vet. & Schovacom. 2. dial. 5. Frischlinus in
Nom. greco-latino. c. 22. Bened. Curtius, Rob. Const.
Lonic. & (teste Cronenburgio de compos. med. lib. 1.
fol. 5.) Euritius Cordus, quem imitatur Cordus ju-
nior & Dasypodus, qui omnes inepte Hierichun-
tis Rosam Amomum esse credunt. Ex horum nu-
mero est & Regin. qui & Lacum Hierichuntis, &
Vvath Di. sc. Galen. & Acri vocari scribit. Sed inter
hos adhuc deterius Frischlinus & 31. Aspalathum,
Rosen von Jericho esse scribit. Plus etiam iden-
dus Cordus quod Rosam de Hiericho Amomum
esse dicat: cum idem in expositione Theriac. nos
Amomo vero carere asserat.

Bellonio. Obser. plantae quae in valle Jericho na-
suntur, in memoriam revocant herbulam quam
quidam impossiores Rosam Hiericuntinam voca-
runt: & quoniam radice in aquam mersa expandi-
tur, impossitae hinc ansam arripuerunt, admirationi
suae spe tantibus, diuturnas in vigilia Na-
tali Domini durare aperiri, aut partus dolori-
bus constrictantibus feminis. Quibus ejus natura
incomposita: nunquam alias putant posse expandi,
id quod nihilominus falsum est: Argumentum de-
sumptum ex sacra pagina toto, sunt plantae Ro-
se Jericho. Quod locus intelligendus de Rosa vil-
gum rubra aut pallida, non autem de altera illa plan-
tula. Quae & alio fecellit plures, qui coniectura
huerunt, arbitri inter esse Amomum, cum Amomum
nequaquam sit. Nos eam invenimus in Arabia de-
serta, in litore maris rubri arenoso nascentem, a-
deoque in Jericho potius non provenit.

Et omnino expellenda sunt, teste Matthiolo, qui
per certo asserere non veretur, eam stipitem esse
Amomum, quam Hierichuntinam a Hierico Valesin
oppida appellant plantam. quae plerumque ad nos
& Hierico deferunt, quae si sanctissimum Rodem-
ptorem nostri sepulchrum petere proficiscitur. Ea
enim est quam nostrates nullates Rosam D. Maria
vocant. Constat hanc Amomum non esse, quod so-
la alba Vitis non proferat, nec ulli spirat odore.
Cordus lib. de cont. phar. c. 15. in eam. Reger de
Amomo asseruit, quippe in compositione aurea
Hierichuntis pro certo asserit Amomum novum esse
Rosam Hiericuntis in compositione aere. Thieriac,

lupinus oblitus habere nos Amomum negat. Verum
tur Hiericuntis nostrates, hanc est temporaria
ad investigandam parienti hofam, quandoquidem
(ut ipse fatentur) in aquam demissa, non prius fan-
sit, quam sorsus nasci incipiat tanta inter Christi-
colas utrophque superfluit.

Gabriel Giraudet in itinere hierosolymitano plan-
te hierosolymitanas proveniunt quidam flores qui
dicuntur Rosa et Hierico, quarum insignes vires.
Die natalitatis ea hora qua natus Dominus postea
se aperit & expandit et Rosa & sunt valde uti-
les puerperis: cum parturient imponenda in phya-
lam in qua aqua benedicta & subito Rosa aperitur,
tunc semina statim parit sine periculo. Vel haec sola
hist. Giraudet reddidit plurima eorum quae scribit su-
specta. Rosa Hiericho non meretur nomen floris,
quia flores minimi & non speciosi. Vires ejus tales
non sunt quales praedicat, quod quicunque eam im-
ponitur in aqua calida, expanditur: nec in eo partu-
rientibus confert, quod se aperiat.

Est Carolus Stephano Rosa species, quae vulgo
Rosa Hierichontis dicitur, Rose de Hiericho, ex qua A-
momum Dioscor. colligitur, ut putat is, qui dialo-
gum illum conscripsit, qui botanologicon inscribitur:
Cui etiam Marcellus & Barbarus assentire
videntur.

Cr. de Cubebis agens, inquit: Quae Amomis vo-
catur a Dioscoride & Plinio, hodie Rosa Hiericuntis vel
sancta Maria vocatur: fruticulus cuius radice pal-
maris, lignosus, ramulis frequentissimis impletus,
rotunda ligata, quasi Chamaleontis albi caput, an-
tequam dehiscat: fructus fert in mediis ramulis fre-
quentes, figura Myrti tenuiores, duos, candidiores,
qui idem est totius fruticis color: continetur in du-
plici cavitate paucula semina nigricantia, quibus satis,
aliquando provenit planta solus parvis ut Polygo-
ni, sed ad frugem non pervenit.

Oportebat Colerum anpotasse ubi viderit Ro-
sa Hiericho florere, vel auctore citare, qui id scripse-
rit. Falsum est eam in Natali Christi florere.

Cordus inconstanti, laune taxat Matthiolo, qui
tamen facile defenditur, ut notat Apollo, quo-
nam tamen Hiericuntis legum esse Amomum
contendit. Paucis tamen dehinc interjectis foliis,
nos vero Amomo carere, ne Rosam illam Hieri-
cuntinam desiderari, non ideo simplicius immemor ap-
pellandus, sed verius errore damnandus.

Rosa Hiericuntis vulgo dicta, Amomum esse
nequit. Sed aliquid (teste Cam.) semine habet com-
mune cum Thlaspi, parum tamen vel nihil acedi-
tis, quae gustu percipitur, nisi in radice & fuculis,
quorum sapor emulatur Raphanum. Infestat ad-
modum a campis viridibus, ut Nassarium, Eruca,
Brassica & congeneres herbae. Ejus sylvestrem spe-
ciem Syriae tectis & videntibus in palentem invenit
D. R. v. v. v. v. v.

Amomum tandem non esse Rosam hiericuntinam
testatur etiam Martene in com. de Amomo, ubi A-
momum fruticem esse ait in hoc eundem sed valde odo-
ratum, suaviaque natura humet coherentem, atque
multo arctius, quam ipsa sibi adhuc at Rosa Hieri-
cuntinam, nihilominus tamen idem fructus Anto-
ni non est similis, quia veris similibus destitu-
tis supponitur, & quia ipsius fari & fuculi nullo
modo possunt referre imaginem acidorum ex qui-
bus tacemus componitur.

Nimis secure scribit Bauh. quod Matthiolum de
Hiericuntis Rosa hiericuntis, quae esse spe-
cies alteram tamam lignosam insipidam, & inodo-
ratam alteram aromatum & ad odoratum. In
praedictis ei Rosa hiericuntis, vulgo dicta: A-
momum, Cordus in Diosc. lib. 1. c. 31. Amomis Dio-
sc. & Plin. Cal. Rosa Hiericuntis, Turc. Lon. Lib. Carz. Cast.
aperta

Benteli.

Amomum.

Rosa beate
Mariae
Hierosol.

Bentelos
concha.

Scaligin.

Non Amomum.

Error
Amomum
ella Amomum.

Rosa
Hierichuntis
Hierichuntis.

Rosa Hierichuntis.

Lonic.

Hierichuntis
Hierichuntis.

Rosa Hierichuntis.

Cordus.

Rosa Hierichuntis.

Rosa.

Rosa Hierichuntis.

Amomum.

Amomum,
Rosa Hierichuntis,
et. v. l. s.
Maria.

Cordus
Hierichuntis.

Cordus
Hierichuntis.

Amomum
Hierichuntis.

Rosa Hierichuntis.

Rosa Hierichuntis.

LIBER XV.

aperta & conclusa, Eyss. Rosa de Hiericho, & Rosa Mariz monachis, Lüg. Rosa Hierichontina 1. & 2. Tab. major, Ger. In hortis facile & crescit & floret: de hac Ion. Sturmius Lovaniensis professor, libellum superstitionibus plenum scripsit. Eid. B. Rosa Hierichontica 2. sylvestris: Rosa Hierichontica sylv. species, Rauv. Cam.

Münstero in cosmograph. teste, Rosæ hæc dictæ à Hiericho, non in agro Hiericho, sed ultra Iordanem, & regione Hiericho in Arabia nascuntur. Luteri habui semen ab hortulano regio Robin, quod satum Montbelgardi in horto E.C. plantam proferebat, quæ florebat Iunij principio.



Hollandi copiose invenerunt & vocarunt Blätterloß, quia nulla folia exadè habebat. Teneiores ramulos scorbuti curationi adhibuerunt non sine effectu. De hac planta apud alios authores hæcenus nihil invenimus.

B. pin. Rosa Hierichontica exsiccata similis: Blätterloß Holandis, fructiculus ad scorbutum, Ind. or. par. 4. fig. 11.

APHYLLON INDICVM.

Def. 3. B. R. y fratrib. icon. 4. part. Indix Orientalis scribitur, in Insula Sancti Laurentij plantam

FINIS LIBRI XV.

Tom. II.

3





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XVI

SCANDENTES POMIFERAE ET HIS AFFINES.

Scandentium classis altera, assurgendi modo ferè solo, arbores imitatur, sarmentorum naturâ ab herbis con-
ditione non multum recedens, sed prope ad ipso notabiliores, quod fructuum mole, vastâque magnitudine cum
ipsis addecens arboribus. Ad hos nunc gressum festinanter dirigamus.

COLOCYNTHE CUCURBITA VETERIBVS. CAP. I.

Veneranda
L. L. L.
D. D.

Cucurbita
Species
3. Hymn.

Q. D.

Lat.

M. G. G.

Columella



OSCORIDES quamvis colo-
rui dicitur (quam ad colorum dicitur
differentiam eisdem cogno-
minat) non describat, vires
tamen recenset, de quibus
nos infra.

Theophrastus lib. 7. hist.
c. 4. simplicem non esse Cu-
cubitum speciem affir-
mat, sed alias meliores, alias deteriores. Cucurbitæ,
aut, partim genera esse existimant, partim negant,
sed in uno eodemque genere alias meliores, alias
esse deteriores affirmant. Cucurbitam olerum ge-
nere cum seminibus ipsis flores efficit, quippe ei flos
in postremo fructus, & crescentibus fructibus flos
diu infixus servatur. Inter asлива brevem radicem
sortitur, tum propter tempus quâ & sortitanti magis
ratione naturæ, quæ tempus secuta est: parte am-
pliatur superna luxuriaturque: radice tamen pusil-
la inhaeret. Semina distantia ferè: succum aquosum.
Circa quintum diem erumpit, aut sexto, (vel ut ali-
volunt) septimo, sed postea stagnansque Cucu-
mere. Refert ad celeritatem proventum recentior
seminis ætas. In olerum genere Cucurbita vel ex
toto immatura atque incommutabilis permanet. Si
quis mollem, parvamque absconderit, ita ut alimen-
ti copia largè accedat, persequaturque, incremen-
tum quoque largè consequitur. Sic enim nulla pars
alimenti à sole detrahitur, nec flatibus resiccatur:
quibus causis moles augeri non potest. Dulciore
& molliore redduntur, pulverem furculo excitantes
sine rigatione, cum venti anniversarii perflant,
hoc generi rotundo convenit.

Magnam Cucurbitarum varietatem, diversita-
temque à seminis natura dependere testatur Colu-
mella, elegantissimis versibus, quos hic subijcimus:

prægnansque Cucurbita serpit.

Vna neque est illi facies, nam si tibi cordi
Longior est, græci capiti qua verrice pender,
E tenui collo semen lege, si ve globosi
Corpora, atque utero nimium qua vasta, rumesce
Ventre leges in medio, sobolem dabit illa capax:
Naricia picu, aut Alci mella Hymæti
Aut habilem lymphæ hamulam, Bacchæve lagenam.
Tum pueros eadem stuvium unare docebit

Docet itaque Columella in hoc carmine suo, quâ
ratione ex eodem semine, utrumque genus, longa
& rotunda Cucurbita fieri possit. Quod autem in
carmine jam recitato hac ipsa de re omisit, in prola
non multo post addit: Aquosis autem locis primo
quoque tempore, non tamen ante Calendas Mar-
tij, semen ponendum est, ut deferti possit. Equino-
ctio confecto. Idque de media parte Cucurbitæ se-
men in verso cacumineposito, ut fiat incrementi
vastioris: nam sunt ad usum vasorum satis idonea.
At si elefantas merci præparabis recto cacumine
de collo Cucurbitæ sumptum [semen] ferendum
est, quod prolixior & tenuior fructus ejus nascatur.

Sed jam unde digressa est, revertatur oratio no-
stra. Plin. l. 19. c. 5. de Cucurbitis hæc memoriz præ-
didit: Similis cum Cucurbitis natura
duntaxat in nascendo. Equè Hiementi odore. A-
manet rigua ac sinum. Servitur semine in terra les-
quipedali fossuri, inter Equinoctium vernum &
Solstitium: Parilibus tamen apertissimè. Aliqua ma-
lunt ex Calendis Martij Cucurbitas lerere simili
modo reptantibus flagellis scandentes parietum a-
spere in tectum usque, natura sublimitatis avida.
Vires sine adminiculo standi non sunt, velocitas
pernix, levi umbrâ cameras ac pergulas operiens.
Inde hæc duo prima genera: Cameratum & ple-
beum, quod humi repit. In priore nam tenui pedi-
culo

Rotunda
L. L. L.
D. D.

Escolema

Plin.

Cucurbita
prima ge-
nera duo.

culo libratur pondus immobile aure. Cucurbita quoque omni modo fastigiatur, vaginis maximè vitilibus, conjecta in eas postquam defloruit. Crescit quæ cogitur formâ, plerumque & draconis intorti figurâ. Libertate verò penitus concessâ, jam visâ est novem pedum longitudinis, cucurbitarum numerosior usus. Et primus caulis in cibo. Atque ex eo totum natura diversa. Nuper in balnearum usum venere urceorum vice, jam pridem verò etiam cadorum ad vina condenda. Cortex vindi tenet. Deraditur, nihilominus in cibis. Cibus saluber ac lenis pluribus modis existimatur, qui, perfici humano ventris non queat, sed non intumescat. Semina quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt: item ab imis, sed non comparandas supra dictis: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas brevioresque. Siccantur in umbra, & cum libet serere, in aqua macerantur. Cibus, quò longiores, tenuioresque, edgratiores. Et ob id salubriores, quæ pendendo crevere: minimùmque seminis tales habent, duritiâ ejus in cibis gratiam terminante. Eas quæ semini servantur, ante Hyemem præcidi non est mos. Postea fumo siccantur, condendis hortensiorum seminibus rusticæ suppellectili. Inventa est ratio, quæ cibis quoque servarentur, usque ad alios penè proventus: & id quidem in muria fit. Sed & scrobe, opaco in loco arenâ substrato, siccâque sicco operas, ac deinde terrâ, virides servari tradunt.

Proceras. Martio Cucurbitam ferendam esse annotat Palladius: amare verò solum pingue, humidum, sterco-ratum, solum. Hoc in Cucurbitis insigne esse, quodd longas pariant & exiles semina, quæ in earum cervice nascuntur: quæ in ventre fuerint, Cucurbitas faciant crassiores: quæ in fundo, latas, si in versis cacuminibus obruantur. Vbi adolescere cœperint, adminiculis adjuvandas esse. Quæ servandæ sint ad semina, usque ad Hyemem in sua Vite dependere debere, deinde sublata in Sole ponendæ, aut fumo, aliter semina putrefacta deperire. Diodes author est prope Magnesium Cucurbitas amplissimas gigni. Menodorus Erastriatus amicus Hicetij, Cucurbitarum, inquit, alia est Indica, quam & Sicyra nominant, alia est Colocynthe, nempe vulgaris. Indica ut plurimum elixatur, vulgarem autem etiam assant. Cnsidij etiamnum Indicas Cucurbitas vocant. Hellespontij, quæ longæ sunt, Sicyas nuncupant, rotundas verò, & globosas Colocynthas. Apud Athenæum Euthymedus Atheniensis lib. 1. de Oleribus, Cucurbitam vocat Sicyam Indicam, quodd ex India semen ejus advectum fuerit: Megalopolitæ verò Sicyoniam appellant. Attici uno vocabulo Colocynthen vocant: Phrynicus diminutivo nomine protulit:

Vel exigua maza parum quidpiam, vel Colocynthe.

Nihil omnino longius Marcellus de Cucurbita repetendum censuit: Græci, inquit, dulcem & quæ edendo est, Cucurbitam seminario genere in secunda declinatione *καλαμίσκος* dixerunt: Medicam verò & amaram, de qua nos pauld post seorsum attigimus, in quinta: & ab hac diminuta appellatione *καλαμίσκος* est. Est & illud animadvertendum in doli Cucurbita ex duplici genere, duplex etiam nomen esse: rotundæ, & in globum tumentis, quæ Cucumeri similis sit, *καλαμίσκος* tereti & in longitudinem extensa, *καλαμίσκος*: Latini utramque eodem Cucurbitæ nomine appellaverunt.

ÆQUIVOCÆ.

Cucurbitæ, sive Colocynthæ, & Colocynthidis sive Coloquintidis æquivocationes & substituta nunc proponimus. Cucurbita igitur, Græcis *καλαμίσκος*, sive *καλαμίσκος*, & *καλαμίσκος* id est *καλαμίσκος*, cognominata, Latini Cucurbita cameraria, Cucurbita plebeia, & Cucurbita laiva, est nobis Cucurbita folio molli, flore albo.

Sed & Cucurbitæ propriè dictæ genus quoddam est longum, ejus aliquot sunt differentiæ, Angurina dictæ.

Quædam habentur angusto collo, diversorum generu & ipsæ, magnæ & parvæ, Lagenariæ vocantur.

An plebeia Cordi referenda ad modò dictam?

Cucurbitæ folio aspero, flore luteo.

Cucurbitæ folio aspero, amaræ, diversorum quoque generum.

Cucurbitarum generi annumerat Anguriam Gesnerus. Nos Citrulum folio Colocynthidis latinia to nuncupamus.

Καλαμίσκος, Cucurbita silvestris, agrestis, silvatica, Colocynthis Cucurbita amara, Cathartica, ex Græcia, Cucurbitula, Cucurbita caprina, Cucurbita deserti, Cucurbita Elzei Prophetæ: Coloquintidis vulgaris, quibusdam silv. Barbara, marina & Somphos Plinij.

Cucurbitæ sessiles, capitatæ, clypeatæ diversæ generis, & eis affines.

Cucurbita silvestris & exigua, Græcis Somphos, Latinis Barbara, & Marina Plinio, de qua ex eo post Dodonæo autore adhuc incognita.

Cucurbita arborea Indica an Guanabanus, vel Higueru, de qua H. n. g. lib. 1. cap.

Cucurbitaceus fructus arboreus Clusij l. 1. c. 12. exot. traditur a nobis H. n. g. lib. 1. cap. sub fructu Indico pyriformi granis intus nigris.

De Cucurbitino fructu Indico magnitudine ovi Struthij vide postea hoc lib.

Cucurbitularum Americi Vespusij, Lagenularum Americarum Clusij exot. l. 1. c. 8. mentio fit in H. n. g. lib. 1. cap.

Kikajum lonæ Prophetæ non est Cucurbita, sed Ricinus, ut ostendimus H. n. lib. 3. cap.

Cucurbita canina dicitur de Bryonia seu Vite al. Bryonia, Basilio Fabro teste.

Chamæpitys dicitur Cucurbitularis Hadriano in Chamæpitys Nomencl.

SUBSTITUTA.

Si semina Cucurbitæ haberi non possint, accipienda suadet Platearius semina Malorum dulcium. Ego verò malum Melonum, vel Cucumerum substitui.

Cucurbita succo deficiente, Tract. qui pro quo sumit succum Violarum inspidiarum.

Ad quid Felix Platerus in clystere ad febres continuas præscribit Cucurbitæ seminum loco, semina ita feri quatuor majora ferè rancida, quæ corrupta & corruptione calidiora reddita sunt?

DE CUCURBITIS IN GENERE ex Neotericis.

Inter scandentes pomiferas plantas præcipuè nota est Cucurbita, quæ Græcis *καλαμίσκος*, & *καλαμίσκος* dicitur: Latini Cucurbita, Cucurbita edulis, & Cucurbita laiva: nonnullis verò *καλαμίσκος* per 7 ultima syllaba: ab aliis *καλαμίσκος*: à Plinio Cucurbita cameraria, quodd cameratas, testudines, pergulas, topiarias hortorum scenas scandat ac operat. Huic verò & altera, quæ nullis præpe assidentibus sulca humitrepit, plebeia cognominatur.

Arabibus autem Cucurbita *Haraballara*, seu *Charaballara*, & ut Trago placet, *Charaballara* dicitur: Germ. *Bürsch*: Belg. *Capwoorden*: Gall. *Courge*: It. *Zucca*: Hisp. *Cala*, *hiza*: Angl. *Courbe*: Bohem. *Tyfew*: Hung. *Tök*. Græci porro ex adverso vocabulum imposuerunt, *καλαμίσκος* nominantes, quodd scilicet pumili brevissque sint pævus, quos ipsa passim emittit, cum tamen corporis mole omnes herbarum arborumve fructus videantur superare. Cucurbitam verò Latini à concurvatu hand dubie dixerunt, quodd facile si quid obliterit, aut fuerit impedimento, quo minus extendatur, incurvescat.

Quod cito fit, cito perit, sic vulgo dici solet, inquit Tragus. Quod sanè dictum, si ulla alia de re, certè de Cucurbita quàm verissimè dicitur. Ea namque unà Æstate, in sublime ita conscendit, ut fastigia altissimarum arborum attingat. Autumno verò si vel unam pruinam senserit, deiecitur, foliis & palmitibus prorsus marcescentibus. Qui fit ut quotannis Cucurbitam serere necesse sit, id quod in nostris regionibus Aprilis mense facere solemus. Tum enim nonnulli ea accipiunt semina, quæ in ventre Cucurbitarum enata fuere, eorumque mucronatas partes in terram defigunt, pollicentes sibi hac ratione feliciorem Cucurbitarum proventum. Alij semina priusquam serant, in dulci lacte, aut aqua sacchari macerant, quò scilicet erumpant, & dulciores evadant fructus, id quod non raro contingit. Quamprimum verò bina prima ac pingua Cucurbitæ folia eruperint, continud rigare humum oportet, aliter tardius auferent. Iunio mense appetente, cum folia quaternaria aut quina Malvæ Romanæ haud dissimilia prodierint, tum & capreoli Vitium claviculis similes progignuntur, quibus natura sublimitatis avida, palos, arbores, aut quodcunque apprehenderit, conscendit Cucurbita. Post hæc flos apparet, atque is quidem duum generum. Primus namque lanuginosus, albæ Rosæ exiguae similis, quinis aut senis foliis præditus spectatur, qui tertio ab ortu die sine fructu decedit. Qui hunc subsequuntur flores (diversorum colorum) magis exigui sunt, in quorum sine fructus in pyri formam silvestris turbinatus, conspicitur, qui in dies flore marcescente admodum augetur, ac aut in orbem collectus intumescit, aut in longum propagatur, quidam cornu instar recurvus spectatur, alius rectâ figurâ contentus est, alius grandis, alius contra exiguus evadit, quæ sanè varietas, diversitasque à seminis natura dependet, quod Columellæ versus testantur. Huc usque Tragus, qui unicâ figurâ tres Cucurbitæ species exprimit, ac Hebraicè Cucurbitam Kikaion (Ionx 4.) vocat. Nos verò Guilandino potius assentientes Kikaion Ionx non credimus Cucurbitam esse, sed potius Ricinum.

Matthioli in Diosc. figuram habet non multum dissimilem, ab icone Tragi, tres Cucurbitæ species demonstrantem. Cucurbita sativa, inquit, quæ per Æstatem in cibum frequentissimè vario sumitur apparatu, in triplici censetur genere, nempe longa, rotunda, & sessilis. Sed quanquam Cucurbitæ inter se formâ dissimiles habeantur, non tamen propterea viribus, & naturâ sibi invicem repugnant. Siquidem (ut Columella tradit, & Plinius lib. 9. c. 9. refert) forma varia in Cucurbitis arte & manigonio fieri facile potest. Diligenter custodiendum est, ne eò mulieres accedant: namque earum contactu facile e-languescunt incrementa vitæ, & tantòque magis, si eis fluxerint menses, tunc cum solo oculorum intuitu tenebrosos enecant fetus. Amant Cucurbitæ mirum in modum aquas: nam si propè in patens vasculum aqua subiciatur, à quinque vel sex digitorum intervallo, ante posterum diem adrepentes cognoscuntur descendisse. Sine semine nascuntur, si per triduum antea spargenda semina oleo defamino macerentur. Camerarius quoque in ep. & hist. germ. Matthioli utriusque imagine, tria pinxit Cucurbitæ genera, nempe longam, rotundam, & sessilem.

De Cucurbitis, hoc titulo (Cucurbitæ, Sychia, Succha, Sira) præmissis, hæc scribit in Advers. Lib. Tanta est Cucurbitarum, Cucumerum, & Peporum inter se cognatio, ut antiqui Græci & Latini, nedum recentiores, minus accuratè nomenclaturas discreverint. Euthydemus siquidem in oleraceo libro Syciam Indicam nominat Colocynthidem: puta post Hippocratem: cui, uti etiam Theophrasto

videtur, quàmlibet varietatem & differentiam genericam horum fructuum *συχίαν* vox significare, quæ namque bullire est, unde *συχίς*, quæ vas, ollam & pyxidem significat, & sanguisugum vitæum, aut cornu instrumentum: indeque fortè Latinis Cucurbita, tametsi Varianâ curvando dicta putetur.

Aristoteles etiam Sycias Pepones appellat: & Galenus Pepocucumerem. Quare quò facilius percipiantur & discernantur ab invicem, quæ hodie in usum culinarium & medicatum venerunt, genera cuncta non incommode *συχίαι*, vel Cucumeres vocamus: quarum duo summa fastigia sunt, Cucurbitæ & Meloepones, varia nomina adèpta propter fructuum, foliorumque varietatem. Et rursus: Admodum verisimile fit, Zucchæ nomen, (sic enim Italicè vocant Cucurbitam depravatis elementis) *συχίαι*, aut *συχίαι*, vel *συχίαι* (utroque enim modo scribunt nonnulli Græci) designare: nam *συχίαι*, unde etiam Ficus Latini derivatur, generalissima fuit appellatio Cucurbitarum, Cucumerum, & Meloeporum. Quare Cucumerinæ familiæ maximè vocari possunt Cucurbitæ, & commodiorè etymo à curvando deduci, quasi curvando, ut loquuntur Vascōnes & Pyrenæi: Hæc ille. Quas alij Cucurbitarum differentias agnovimus, nunc est ostendendum.

Calabassi seu Cucurbitæ in India ad miraculum usque auferunt, quæ in hac sola provincia Chile nascuntur & Capallos nuncupantur: Cucurbitarum species propè infinitæ sunt, quædam immensâ mole monstruæ sunt, quæ dissectæ & resiccatæ exavantur, & ex his varia vasa effinguntur: ex minoribus pocula, aut pateras ingeniosè celatas concinant: Bauh. pin. ex Ioseph. Acosta lib. 4. c. 9.

CUCURBITA LONGA, FOLIO molli, flore albo.



Cucurbita ló. *Def.* Cuius viticulas digitali crassitudine, angulosas, perygias aliquot longas à radice tenerâ fibratâ emittit, quæ per terram sparguntur, alioqui pergulas & perticas capreolorum ope scandunt, folia rotunda, pedem, aut sex quipedâ lata molli lanugine tomentosa, cretis subinde nonnullis per ambitu incisâ, ex pediculo tenero, longo, concavo: Flores nivei candoris liliacei, quinquepartiti, intus villosi, exterius breviorè pilo obstiti, atque in quidam alius pediculis inmediate cohererent, talesque steriles sine fructu marcescunt, alias mediante fructus rudimento, qui delapsa flore succrescit, inque insignem adolefcenti magnitudinem, pedes quinque aut sex longus, cervicè crassâ, in ventrem modicè turgescens, qui, si quid, quod resistat, ostendit, curvatur: Cortex recentior tener, herbaceus, adulto durus, flavescens, medulla alba, insipida, modicè fungosa: semina uncia longioris fere, longa & plana, compressa, unâ parte lata, duobus angulis conspicua, inferius, quæ germinare solent, plures angulos habentia, & sub tunica

radice duritie alba, medullam includentia al-
bam, dulcem, elui potest.

Strigaria præter vulgarem longam, aliam ob-
ferre in nemini annuoris crassitudinis & longaudi-
nis, cortice candidiore.

Cucurbita De Cucurbita folio molli, flore albo cui compe-
terum tere videntur, quæ veteres hæc Cucurbita memoria
Cucurbita prodiderunt, hæc scribit Cordus: Cucurbita singulis
duo posita in Diole. dux sunt potiores differentie. Una lon-
res differ- gos ferè stultus, altera latus & sessilis: semine ejus
rentia. Medici utuntur. Modò autem dictum genus in hist.

Def. Cord. (ubi Pragi conallumpta) diligenter sic describitur:
Cucurbita cameraria, quæ ante camerarum fene-
stras ferat, viticulam ab una radice mittit, quæ in
multas alias angulosas, teneras, & modice concavas
viticulis dividitur, folia ex intervallò proferentes,
foliola ferè rotunda, nisi in us anteriori maxime
partes plerumque acuminati anguli eminerent:
eadem eminentiis quibusdam brevissimis, rarique
per ambitum circumvallantur, & tactu mollia sunt,
foliorum. Althæa modo, magnitudo eorum seu lati-
tudo secundum natalium diversitatem variat, for-
cundo autem aprico & humido solo, apud nos in
Germania pedem cum quadrante interdum latitudi-
ne excedunt: pediculus est longus, tener, levi-
ter hirsutus, modice concavus, & propemodum ter-
res, hirsutus modice canaliculatus est et eo latere, quo
superiori foliorum parti respondet, capreolos locus
folia producit singulos, quibus affixos baculos, &
pettias apprehendit, in magnam altitudinem ascen-
dens, flores juxta folia & capreolos fert figurâ illa-
ocis, partem stentiles, partem vero secundos, utriusque
quinis, candidis, intus hirsutis, sequitur quæ longioribus,
uncia paullo angustioribus, forasque modice
reflexis & repandis constant, his, differunt tamen
inter se. Siquidem steriles breviores habent in medio
apices & hirsutiores sunt, nec quæquam habent tumidi
post se (ubi pediculo junguntur) quod sequuntur
in his penitentiæ: fecundi vero in medio trifida
et fissi sunt, bifidaque stamina continent: nec im-
mediate pediculis junguntur, nam inter ipsos flores
& pediculum parvum & leniter hirsutum extube-
rat, quod tenera Cucurbita est, capitulum juxta an-
terum in angustum collum desinens, quod in arte
secente flore paulatim accrescit, deinde ab Autumno
in magnam molem, quam Cucurbitam vocamus,
autum maturescit. Magnitudo & forma non est ea-
dem omnibus Cucurbitis: quædam enim longæ sunt,
quædam vero inferius venter exsistunt, & superius
in angustum collum coarctantur. Cum apud nos in
Germania feliciter enata præcipue, longæ qui-
nos senosque pedes longitudine, & dodrantem cum
uncia assequuntur, maxime si pensili licentia con-
cessa, libere præpenderint. Ventrosa autem inter-
dum in altum pedum longitudinem & pedalem
latitudinem adoleſcunt: utrumque tamen gerit
frequenter minus capit incrementis. eum enim
magnitudinem quam posuimus non semper, nec
ubique consequuntur: color omnium: ei in ma-
turity flavus, durusque & ligneus cortex præstare
necesse est candidus, mollis, durus, manissimus, sub
fo, seminisque plena, præterquam in collo: nam
eo loco ventrosa nullum semen continent, longitu-
do semina: uncialis est, latitudo autem semina: ead-
em phanum & complerum est, atque antea
partes modice acuminatum, postea vero rotu-
lum, quod ubi emittentis corollam, corollam ha-
bet hirsutum candidam, acuminatum, compressum,
gustumque dulcem nucleum cludentem. Radice to-
ta herba nunc candida in multas senes partes di-
strahitur, quæ semina in hortis hirsuta per
ois & venter ascendit & obtegit, facitque juven-
tis frigidaque senes, laus solus solus arcens, lectus

stigmam, hirsutis penitibus, ante cameris: & fene-
stras, de dictum est unde hoc Cucurbita genus Ca-
merarium & omnino appellabatur, ut Plinius testatur.
Cord. eodem libro aliam tradit Cucurbitam, quæ an-
una sit Cucurbitis, quas postea trademus: fig-
namis, considerandum. Cucurbita plebeia, inquit,
viticulis, foliis, floribus & semine camerariae similis
est, fructum tantum dissimilem producit, cui duo-
rum dodrantum, aut nonnullam cubiti apud nos
est longitudo, latitudo vero quincunx aut sextans
forma sunt inæquali: nam inferius longum habent
ventrem, quo in longum, nec angustum collum
desinunt, interdum etiam incurvantur. Est & alia,
quibus distinguuntur, differentia. Cameraria aloru-
dinis avida est: Plebeia vero humi proreptit, quo
quoversus viticulas suas spargens. Saporem habet
dulcem, carnemque cum tenera adhuc est, quæ
dendo sit. Et hæc Cordus.

Cucurbitam longam folio molli, flore albo, vo-
cavit Loban. ad. Cucurbitam sive Zucham in obli-
& c. omnium maximam, angustam. Ger. ut & Dod-
gall, quæ tertio loco describit, Cucurbitam angustam
hirsutis Lobelii figuram habet, Cucurbitam longioram
Turn. Lon. Call. Cam. & Tabern. (apud quem icon
transposita per incuriam typographicam ut exiit.
namus, sub titulo Cucurbita Index minoris. Cu-
cubitam longam: & sic etiam Fuch. & Hort. Lusi.
appellaverunt. Eugd. Cucurbitam camerariam lon-
gam. Ang. ep. Cucurbitam Zucham longam, &
Hellepontorum. R. phyt. Cucurbitam. Idem pin.
Cucurbitam, sive oblongam flore albo, folio molli
Cucurbitam, fructu oblongo, Tragi. Cord. in Diole. Cu-
cubitam oblongam, Fuch. Cucurbitam, Gesn. lau-
vam longam, Call. Cucurbitam falcata figuram
crescentem, quandoque cervicem tantum habentem
recurvam, nonnullam rectitudinem servata
bicubitalem, incubitalemque acquirantem longi-
tudinem.

CUCURBITA LATIOR FOLIO
molli, flore albo.



TRAGUS hirsutis
fructum pin-
git, tres enim spe-
cies una effigie re-
presentat. Fuchsius
separavit & hanc
majorem vocavit
Zucham. Ger. ut
Call. Dodgall. Cucurbitam
camerariam majorem: hist. Cucurbitam
latiorem, ventrem
tam ac crassum ab-
que collo, & infe-
riore sed latorem,
pyramidalitatem, si-
quem quodammodo
retinentem.
Moll. Lusi. Cu-
cubitam rotundam.
R. phyt. & pin. Cucurbita sive in Josef. sessilis flore
albo, Cucurbita fructu in orbem collecto in hirsutis
Tragi. Cucurbitam sessilem, Lusi. ep. Cucurbitam
rotundam, Fuch. Turn. Latiorem, Dodg. Zucham ro-
tundam, Ang. Cucurbita sessilis fructu. Cord. in Dio-
Variat hæc, inquit, magnitudo & varietate colore cor-
ollæ, nam sunt virides, flavæ, candidæ, quædam in
collo corollæque sedulis distinctis, quædam in
CUCUR.

HISTORIAE PLANTARVM

CVCVREITA LAGENARIA.

Cucurbita lagenaria non variat foliis & flore, & longa prius descripta: verum fructu plurimum differt, collo angusto ventreque crasso, lagenas & phyalas representans: semina putamus magis fusca esse, quam longatam.

Autumnus de segetia.



Lagenariae has observavimus differentias. Lagenariam Cucurbitam vulgatiorē majorem, luteam, albedine cōspersam.

Lagenariam mediocri magnitudinis, longiusculam valde virentē, maculis luteis conspicuam. Haec saccharo conditur.

Lagenariam minorem maculis albidis insignem.

Lagenariam magnam, longo collo constantem, virentem, maculis luteis notatam.

Lagenariam, collo multo longiore, colore pallido, albisque maculis ornatam. Conditur & haec saccharo.

Vidimus tandem Cucurbitam mediam inter longam & lagenariam, corpore crasso totundo, magnitudinis circiter capitis, collo tenui cubitum pene longo.

Tragus appellat Cucurbitam camerariam & plebeiam Plinius, gēlin. Fleschen Kürbs. Turn. Fuch. Cucurb. minorem. Dod. gall. Cucurb. 2. minorem: hist. Cucurb. priorem. Tab. Cucurb. lagenariam majorem, & alteram minorem. Ger. Cast. & Lob. obl. &c. Cucurbitam lagenariam, hanc in Adv. duplicem agnovit. Lagenariam, inquit, vocē, ut quā peregrine proficiscentes lagena utuntur, praesertim in Gallia, Hispania & Italia: commodis namque gestatur vinum, quā vitreo aut figulino vase, quā onera sunt, & facilius franguntur. Semen illi minus, quā superiorum, folium alioquin, flores & reliqua non dissimilia. Ab hac tantum differt fructu minore, lagenulamque concinniore exprimente, & quae lubentius commodiusque gestatur itinerantibus. Semine, folio, & flore, delicatiorē, non diverso.

B. ph. & pin. dicitur Cucurb. hanc lagenaria flore albo, folio molli, Cucurbita. Brunf. Cuc. plebeia Cordi. Gesh. h. Cucurbita cameraria minor, Lug. Variat fructus quādoque lagenarum forma: aliquando ventricosa absque collo pyri turbinati figura.

DE LOCO IN GENERE.

Ante in genere ex Neoteris, seu etiam ex veteribus, quaedam de loco, tempore, satione, cultu, & mangonio, commemorata sunt. Quare hic illud duntaxat adscribimus, quod apud Dodonaeum in fol. lae legimus. Cucurbitae in hortis seruntur ac colliguntur. Sed Autumni tempus ad maturitatem demum perveniunt in calidis tamen regionibus, citius maxime praecoces: Prae oces autem Cucurbitae, tum & Cucurbitae sic redduntur, in Quintilianum tradunt. In copiosius aut. sicilia inutilia terra creberrata mittenda, stercore admixto liquidiore facta: & anticipato consueto tempore, Vere videlicet inchoante, semina implantanda, & cum sol surgit, & calor, & mo-

detata pluvia, copiosius sub dio expones. Quaeque Solis decursus in diuinum contestam inferes: atque hoc assidue faciendum, aqua irrorata, quando nix post ulaverit: postquam vero perfecte cessabunt frigora & glacies, copiosi sive dolia in locum subactum & ex cultum desodiendi, ita ut labra aequalia sint terrae, deinde reliqua cura adhibenda: sic ille ex Plinio.

VIRIS ET USUS IN GENERE.

Cucurbita quae editur, ex Dioscoridis quidem auctoritate, cruda trita imposita, tumores & abscessus mitigat. Ramenta ejus pueris infantibus, in partum circa cerebrum & membranas ejus inflammatione utiliter per sinciput imponuntur. Similiter ad oculorum & podagras inflammationes. At succus ramentorum expressorum, & per se, & cum rosaceo insusus, ad aurium dolores commodus est: & cuti summa a febris ardore ac aestu vexata illitus prodest. Totius autem Cucurbitae servescit & expressus succus, cum modico melle & mero potus, alvum leviter solvit. Et si quis in ipsam crudam excavatam insusum vinum per noctem sub dio exponat, & temperatum jejunus bibat, leviter alvum molliet.

Quantum porro ad ejus in medicina usum atinet, Galenus de simpl. humida frigidaque temperatura esse scribit, utraque qualitate secundi ordinis: Quae circa ramentorum ejus succum ad aurium dolores cum phlegmone junctos, cum rosaceo utilem esse tradit. Sic etiam quoque calidam illam calidas phlegmonas mediocriter refrigerare. In esu autem humidam esse & sitim propellere: crudam quidem ad esum in jucundam esse, & concoctioni extreme rebellem, adeo ut si quis ad ejus usum in alterius cibi inopia cogatur, onus frigidum in ventre situm sensurus sit: ut stomachus subvertatur, & ad vomitum concitetur, qui etiam solus liberare potest illum ab instantibus symptomatibus. Quare omnes homines, inquit, de Alimentis, post cocturam statim aut fastagine frizam, aut assatam edere solent. Dioscorid. scribit Cucurbitam parum nutrire, facile corrumpi, habitum corporis humectare, egei celeriter, bonum succum generare, si ex aqua & aceto sumatur, juvareque magis ventriculum, meliorem succum nobis suppeditare conditam in salgamum: potentius extenuare cum sinapi: concoqui minori negotio, ac excerni tessilem. Mnesitheus cenet, quae natura facile ab igne vincantur, & coquantur, ut Cucurbita, corpori alimentum subministrare, non multum sanē, sed humidius & nihil molestum. Epimarchus suo carmine videtur Cucurbitam seu inflatorem damnares.

Longe salubrius id erat, quā Cucurbita.

Plinius laqueos Dioscoridis sententiam ampliter explicat. Satis quoque rase succus sepe scitus autibus medetur: caro ejus interior sine semine, clavis pedum & suppuracionibus, quae Graeci apostemata vocant. Decocta autem universa succus, dentium motus stabili, & dolores in hibe. Vinum cum ea servet, oculorum etiam impetus. Folia ejus cum reconditis Cupressi, contusa & imposita, ipsa quoque fossa in argilla, ac trita cum adipe anseris, vulneribus medentur. Nec non ramentis corticis recentes podagra refrigerant, & ardores capitis & maxime infantium. Et ignes sacros vel frigentes his impositis, vel leniunt. Succus ex stigmatibus illitus cum rosaceo & aceto, febrium ardores refrigerat. Anide cinis impositus, mure combusta sanat. Glisippus medicus damnares in cibis. Sed omnium consensu Romacho utilissime, indicantur, & interaneorum, vesicarumque exulcerationibus. Quos itaque dicit Plinius capitis ardores, & maxime infantium, Dioscorides etiam exulcerationibus, & verum rase rase in quos inflammatio par-

Tumores.

Inflammationes.

Aurium dolor.

Alvum sit.

Temperamentum Galeni.

In esu mi.

Dioscorid.

At nascent.

Epimarchus.

Plinius.

Clavis.

Apodemus.

Demetrius.

Podagra.

Cenit.

Cupressi.

Diosc. exulcerationibus.

uum

trium circa cerebrum & membranas eius vexat. Ita enim Paulus dicitur habere: *συνέχοντι τὸν πυλῶνα τοῦ κεφαλῆς ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τῶν μενίσινγων.* Et ibidem mor etiam ipse Cucurbitæ ramenta ad fistiales præfcribit. Plinius alibi adustionem infantium, *σισιάσιν* vocat, ut l. 3. c. 15. Oribasius in canino fimo inventis, adustio infantium, quæ vocatur *σισιάσις*, ad alligatis emendatur. Et alibi infantium destillationes, ut l. 22. c. 21. Folia Heliotropii infantium destillationibus, quod *σισιάσιν* vocant, illita medentur. Alibi etiam simpliciter grecæ vocabulo utitur. at l. 2. c. 108 *Σισιάσις* q; infantium spongiâ frigida cerebro humectato, rana inversa adalligata efficacissime sanat, quam aridam inveniri affirmat. His itaque modis Plinius *σισιάσιν* seddere conatus est. Verum Alexander Aphrodisiæ l. 6. ptoibl. 98. *σισιάσις* vulgus dicere, ardorem habere ait. *σὺν γὰρ, inquit, τῷ πυρὶ ἐστὶν ὁ πυλῶν.* Et videtur sanè verbum à Sirio stella factum esse, de quo Poëta ait:

Syrinx ardoz

Ille sicini morbosque ferens mirralibus æris,
Nascitur & levo contristat lumine cælum.

Arvero quod ex stigmatum, (quæ ramenta Dio-
scorides vocat) luteo febrium ardores refrigerari
tradit, id dicit quod Dioscorides ait, cuti summa à
febris ardore ac aestu vexata illitis prodest. Cito-
rum, ut ad institutum redeamus, veteres Medici a-

Plin. Valer. pud Plinium Valerianũ de Cucurbita ita tenuerunt, ut eam aquam coagulata[m] dicerent. Galenus humida[m] putat virtutis & frigida[m], idq; ex eo probat, quod ipsa in cibo sumpta stomachum relaxet, bibendi desideria non excitet. Cetera etiam in Cucurbita talia, ut aperte frigida[m] potestatis exempla demonstret. Cruda & mitelenu[m]nt omnem tumorem. In cibo

Cucurbit. hu
mida et fr
gida.

Podocarpus
micrantha.

Vulnerability

1848

Sam Seabrook

1. **Not a**

Pentameris
subular.

Tragedy
prob.

1. *Extraction*
 of *congel*
la aqua

tur. Sani enim qui ceteras illas & mollesculas ad-
huc in cibis escitare solent, eo quò sequitur modo. Cor-
ticem exteriorem abijciunt, interiorem verò & can-
didam substantiam una cum mollibus ac immaturis
seminibus bulliunt, posteaque minutim confin-
dunt, ac cum cepa, butyro & sale coquunt. Illi-
bus ferè cum brassica capitata còcissa & cocta con-
venit, macilentisque hominibus prodest. Nonnulli
Cucurbitam immaturam orbiculatam instar malo-
rum scissim, cum butyro in sartagine ligunt. Qui-
dam purgationes ex Cucurbita conficiunt hoc pa-
cto. Cucurbitam recentem excavant, vinòque re-
pletam nonnullis spatio relinquunt, ac inanè jeju-
no stomacho, illud vinum bibunt. Aqua ex immaturis
Cucurbitis distillata, his qui ardentibus febribus ita
laborant, ut nullis aliis medicamentis calorem re-
stinguere possint, potanda exhiberi, nec non fortis
in epithemate cordis & jecinori, ut reprimatur calor
immodicus, ad moveri potest. Eadem ardori capitis,
quam syriacè vocant, maxime infantium, efficacis-
sime magno experimento in lincolis imponitur.
Quòd si aqua distillata non superpetur, succus luna-
tur, parique ratione usurpetur. Aqua stillantia &
succus immaturæ Cucurbitæ, non tantum aurium
dolori instillatu auxiliatur, sed & oculorum, om-
niumque aliorum membrorum inflammationes &
podagras refrigerant. De Cucurbita ita cecinit Fiera:

Succ. 1. annuē, currit rapidius Cucurbita, bilena

L'incit. et il a cum non bene coctaciet.

Ordin bene erat: cōmen, cōiūna; adnōxi a secundat.

Hic externa magis quam sua forma placet

Cucurbitæ folia retentia, secundum Matthiolum
(ex Cardano) iumentis illita, afflictaq; multas ab-
gunt. eadem mammis puerperarum admodum sic-
cant. Oleum q̃ e Cucurbitarum floribus paraturus
in oleo diutius insolatis, rerum calores inunctum
extinguit, & capitis dolores, præsertim in febribus
mitæet: aridæ cinis ambusta, & pudendum ulcera
sanat. Estur passim æstate in cibis cum iusculis eli-
xatū quoq; in oleo, aut butyro frigida, farinā prius
circumlita, & acerbæ uræ succo aspersa. Si infanti
dormienti parvis longitudinis Cucurbita, vel etiam
Cucumis, inquit Dodonæus, in lectulo adiungatur,
& febricitaverit, mox à febre liber erit. Editur &
Cucurbitæ pulpa cocta, quæ facili subidet, præci-
puè autem elixa, quæ & præter substantiæ sue lu-
briçatatem, cum & humiditatem, alvum emollit. Ac-
si vel frigida quàm plurimum de præpiti humiditate
deponit, atque idcirco minus facile descendit, nec
alvum adeò citò emollit. Semen urinx ætmoniam
contemperat, & eandem mediocriter provocat.
Quidam, teste Amb. Pargosificant sua industria lo-
co exsiccati eragisse, supponere frustum corticis cu-
curbitini exsiccati, ac coalescere, decipientes in e-
ignorantes. Diximus ante Cucurbitarum cortice
carne exinanito peregrè proficiscentes uscorum
vice frequenter uti, in eo vina condientes, quo per-
iter se à suis in iuriâ vindicare possint. Ceterum no-
tissimam ait Jobelinus, & e Cucurbitarum gener-
e conditum apertissimam, anguinam vocatam. Hanc
maxima copia in taleollis longas dulcissimam, saccha-
roque conditam. Lusitanos, Hispanosque venum
in Septentrionem adferre vocatæque Calbatæ: si-
neulos & xilu sebili vexatis grausissimas ostula-
telle.

Vnguentum ad achores singulare & certum (Timot. Roel. credimus) recipit Gutta bitum, in quo oleum Olivarum fuerit, admoveat igni, Scutella terrea excipit stillans oleum, ex jussu capit drach. iij. & tantumdem Salvia silvestris, coquendo simul in patella terrea nova, dum incipit bullire, tunc cetera cinerum Ficus nigrae, singulorum drach. liijam addit, ita tunc ab igne demit, agit itaque donec

HISTORIAE PLANTARVM

frigeratus. Cum vero uti necesse est, in aceto deco-
quit fuliginem, quo abluit caput, exsiccat, deinde
inungit unguento, semel in die, tertio quoque die
lavat per mensum & sanat: cum pili apparent, un-
guente melle calido.

CUCURBITA LONGA, FLORE albo, protuberante ventre.

AN 1608 sub finem Septembris ex horto
Princip. Montbelg. allata fuit Cucurbita, quae
longitudine sua plus quam tres spithamas equabat,
ventre oblongo orbiculari fere, nisi lacunae quaedam
depressiores, costarumque obscurorum secundum
longum procurrentium sinus aliquid adimerent,
ambitus ventris duas spithamas & semissem am-
pliatur, ad extremum quadam sui particula in
num magis latus vergebat, inclinabaturque: collum
cum capite spithama longius protendebatur, ambi-
tu suo spithama latius ampliusque extiterat, in me-
dio tenuius, caput crassius tertiusque evaserat, in
eam ipsam, quae ventris prius extremum, partem ma-
gis inflexum torquebatur, incurvabaturque, laevis
erat undique superficies, colore albido in luteolum
tendente, pediculum capiti infixum gerebat qua-
drangularem, & aliquantulum helicis in morem in-
torquente, in quatuor deinde superius alias pro-
pagines multiplicabatur. Aperta carne veram pro-
ximam cortici unciam crassam obtinebat subflave-
scens, subdulcem & aquosam nondum plene
maturam, reliquam carnem albiissimam, spongio-
sam, mollem intra se abditam condebat, cujus sub-
stantiae longa serie inhaerebant semina foris albi-
da, duriuscula, tunicâ albâ, pellucidâ, humidâque do-
nata, cum appendice ab eadem orta longiuscula. Se-
mina contracta sublutea sunt interius, modullâ de-
stituta, humore tamen aquoso repleta fere, dulcia,
esûque jucunda.

CUCURBITA LUTEA, COR- tice tenero.

Cucurbita haec lutea vix utraque manu amplecti
potuit palmum alta, Martio sulcis latis & costis
ut sulcos, cortice tenero, carne pallida, sapore a-
liarum Cucurbitarum. Est de genere, ni fallor, Cu-
curbitarum Sicilianarum capreolis carentium. Se-
men habet parvum, subrotundum duravit ad Aprilem.

CUCURBITA OVALIS FERE, variegata, parva.

Provenit Montbelgarbi in horto E. C. Cucurbi-
tae genus parvum, longitudine palmari, ovali
fere figura, quod manu amplecti non poterat. Haec
ut Cucurbita amara pyramidalis maculata est, minus
tamen rufa, lineis coarctatis laevioribus multo & magis
albicanibus, maculis etiam pluribus: carne albican-
te, saporis aliarum Cucurbitarum.

CUCURBITULA PILAE PALMA- ta non multo major, rotunda.

Cucurbitulae species maxima rotunda, pilae pal-
maris non multo major. Ista fuit in horto E. C.
Montbelg. an 1608. Octobri mensis. Foris erat
cortice tenui, fragilique, viridanti colore in summi-
tate circumspectaque imbuta, ad regionem autem pe-
diculi viror ille saevior sensim dilutus, cernebatur.

& in petioli ambitu partim luteola, partim etiam al-
bicans virebatur: caro ipsius interior dulcedine per-
fusa sentiebatur, cui semina multa interjecta, hinc
inde sparsim fuerant, reliquis Cucurbitularum se-
minis consimilia, quibus decorticatis pulpa alba si-
milis & nonnihil flavescens conspiciebatur & ad
dulcedinem gratam tendens. Hoc semen Româ de-
latum per D. ab Andlavv, Canonicum Moguntinu-
m, nobisque communicatum fuit.

CUCURBITA FOLIIS ASPERIS, sive Zucha flore luteo.

C. A. P. II.

Vlgaris notitia Cucurbita, flagellis sarmentis-
ve longissimis, canaliculatis, modice concavis,
crassitudine pollicari, asperis, late vagatur, & per-
ticas, si quas nata est, capreolorum innixu & volu-
minibus scandit: folia larga, Cucurbita flore albo
longe majora, humilioraque, ficulneis laciniis, aspera,
atro virore splendentia, & per ambitum serrata, ex
pediculis dodrantalibus, solidis, modice canalicula-
tis, & spithulis horrentibus: flores nonnihil odorati,
fundo acetabuli

CUCURBITA ASPERA
icones quinque.



Icon II.



linea lata, costis instar, pulpa candida, succi &
suavi.

Magna

Icon III.



Magna sane turba est & penè innumera Cucurbitarum folio aspero, quarum duas icones ex iis quas jam sculpeas eminus præmittimus: Tres quæ sequuntur sunt etiam ex imaginibus à nobis enatis. Secunda à nobis proposita, est apud Dodon. lat. in sol. nomine Peponis majoris oblongi. quartam ponit pro Pepone rotundo minore: Eadem apud Tragum extat sub titulo Cucumeris, sive Zucconis marini.

Tragus de Cucumere, seu, ut vulgè loquitur, Zuccomario hæc inter alia prodidit. Intra paucos annos quamplurima peregrinarum stirpium genera è longinquis regionibus in Germaniam deportata sunt. Inter cætera verdè, & hæc poma æstiva, quæ unà in Æstate tota suâ substantiâ adoleſcunt, florent & maturantur, ad nos commigrarunt. Eorum nonnulla magna, alia parva, quædam rotundæ figuræ, alia oblonga; rursus hæc dulcia, illa amara; quædam cerea seu aurea, alia luteola, sed pallida, nonnulla candida evadunt. Omnium verò eadem serè folia, idem caulis, idemque flores, licet hæc in his majora, in illis magis exigua appareant. Flores quidem fert duplices, luteos, cymbali formam representantes, quorum priores nullo post se relicto fructu decedunt. Qui verò superfluit manent, campanulæ similes, odore

suavi præditi, cum cortugari ceperint, illic pomus fructus consequitur, alius oblongus, alius rotundus, alius lævis, glabèrque, alius multis crassiusculis & prominentibus quasi costis striatus, alius albus, alius ex pallido luteus, alius nigricans, qui tamen cùm Autumni tempore maturaverit cerei efficitur coloris. Porro omnium horum generum poma, corticem seu cutem exteriori lignosam habent, intus crocei sunt coloris, maxime ea quæ foris nigricant, lato & dulci semine referta, ita ut ducenta unum quandoque pomum contineat. Porro quod inter semina & corticem in omnibus generibus medium est, præstantissimum censetur. Quæ candida, foris & quæ ex pallido lutea sunt poma, carnem habent candidam, Rapòque formâ & sapore similem. Univerſa verò eorum genera durare per annum possunt, nec interea temporis putrilagini obnoxia sunt, siquidem intè legantur, eaque quâ decet curâ conserventur. Possentidè quidd in his pomorum generibus aureo nitet, seu cereo colore, subinde mutatur, nam viridem rursus assumit colorem, quem mense integro servat, deinde aureum recipit, atque sic alternis mensibus, alio atque alio tingitur colore, quod non semel magnâ cum admiratione observavi. Sunt qui hæc poma Cucumeri adnumerent, asserantque Turcicos vocari Cucumeres, quorum sententiam probare non possum. Cucumeres enim omnes humidæ sunt qualitatibus, putrilagini facillè obnoxij, quare diu durare non possunt. Ego vero hunc fructum, Summer Opffel / h. e. Mala æstiva, & Indianisch Opffel / h. e. Indica Mala appello. possunt verdè cum multis eorum sint genera, ita suis appellationibus distinguantur, ut dicantur,

Mala Indica	{ Crocea Lutea Citrina Nigra }	Cem.	{ Safrangål Bleichgål Goldgål Schwarz }	Indianisch Opffel.

Vulgo Zucco marina dicuntur, quodd ex ultro-Zucco marina marinis regionibus, partim ex Syria, partim ex India ad nos primùm venerint, quod testantur appellationes ipsorum. Vulgo enim Zucco de Syria, Zucco de Peru dicuntur. Et hæc habuit Tragus quæ de nomenclaturis hujus plantæ diceret, quibus nos haud contenti, certiora & magis probanda in medium adferemus.

Cucurbitæ folio aspero à Fuchſio Cucumeribus annumerantur. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem vulgus Turcicum nominat, vulgari multò major ac procerior foliis, floribus, & fructu, qui ut in vulgari Cucumere non est maculosus, sed tamen oblongus etiam, & admodum flavus. Et hinc est quodd multi eundem privatim Citrulum, & Citreolum, quasi citrinum, h. e. flavum vocent. Hujus semina alba & lata sunt. Tertij generis Cucumer est qui marinus dicitur, Turcico, quod ad folia, flores, & semina atinet, serè similis, nisi quodd in hoc omnia sint minora: fructus verò rotundus. Vulgus Zucco marin vocat: Meer Cucumers Galli Concombre ou Concombre marin: Officinis perinde atque Turcicus est ignotus. Et hæc Fuchſius qui Cucumeris Turcici effigiem exprimit illâ icone quam secundo loco ponimus; Cucumeris verò marini imaginem illâ picturâ exhibet, quam quarto loco locavimus. Nos, ut liberè dicamus nostram sententiam, pronunciamus Fuchſium malè confuisse, miscuisseque Cucu-

Icon IV.



Icon V.



bitam aspero folio cura Cucumere vulgari, Citrulo & Melonibus. Magna sanè est differentia inter Cucurbitam aspero folio & Cucumerem vulgarem. Turcicum vero Cucumerem ineptè vocari ait Citreolum.

Zucha quinquae Cordus De quinque Zuchæ speciebus Cordus scripsit. Zucha major longa, inquit, viticulis, foliis, capreolis, floribus, seminibus, radicibus & asperitate, grandi oblongæque Colocynthidi similis existit. fructu verò ejusque sapore ab illa differt. siquidem figura est longus, in longitudinis circumferentia viginti sex plerumque uncias complectens, latitudinis verò ambitu octodecim uncias raro excedit. Pondere autem quinquelibras sex uncias superat, pediculo hæret crasso, anguloso, nigro, solido, & tactu aspero: à cujus annexu contigui inter se & tereti superficie exeunt anguli, ipsum fructum circa pediculum veluti crassioribus striis ornantes. colorem habet principio viridem, & candicantibus maculis conspersum: in maturitate verò citrinum, superficie constat aliquantulum tuberosa, cavernosaque.

Zucha major rotunda gustu dulcedinem resipit. Colitur in hortis. Zucha major rotunda, viticulis, foliis, capreolis, floribus, seminibus, radicibus atque asperitate jam dictæ longæ Zuchæ similis est, folia tamen figura aliquantulum ad Vitis & Ficis folia accedunt. Fructum fert globi modo rotundum, aut modicè in latitudinem depressum, crasso, anguloso, aspero, solidoque pediculo hærentem: longitudinis circumferentia viginti duas aut nonnunquam plures, paucioresve uncias complectentem, ambitu verò latitudinis viginti quatuor uncias nonnunquam excedentem, pondere autem quinquelibras atque octo uncias habentem, colore & cavernosâ superficie longam majorem Zucham æmulantem. saporem habet dulcem, aqueo succo dilutum. colitur ut longa.

Zucha rotunda mediocris Zucha rotunda mediocris, viticulis, capreolis, foliis, floribus, radicibus, asperitate, atque omnibus aliis proprietatibus oblongæ & grandi Colocynthidi similis existit: fructum verò habet globi modo rotundum, aut modicè compressum: in superficie modicè, ita ut vix appareat, tuberosum, quàm grandis, rotundæ Colocynthis [Colocynthis Cucurbita amara] paullo majorem, pondere civilis libræ unius cum dimidia: principio viridem, deinde maculosum, in maturitate verò luteum: qui dissectus luteam carnem ostendit, & in medio ejus sex latorum, oblongorum, acuminatorum, candidorumque seminum ordines, quibus candidus inest nucleus. Saporem habet fructus dulcem, semen verò dulciorem. scribitur prædictorum modo.

Zucha rotunda minor Zucha rotunda minor, per omnia mediocri similis est, præterquam quòd folia latiora habeat, fructus autem minores, sed eminentioribus angulis striatos, & in superficie magis tuberosos, quorum etiam cortex multò lignosior & durior est quàm mediocris Zuchæ, carnem habent ferè croceam, & senos seminum ordines. sapore mediocri Zuchæ respondet, cui etiam similiter colitur.

Zucha major rotunda viridis glabra Zucha magna rotunda, glabra, majoribus Zuchis viticulis, foliis, capreolis, floribus, seminibus, radicibus & asperitate similis est. fructum producit grandi & rotundæ Zuchæ figurâ similem, in longitudinis, quàm latitudinis ambitu viginti duas plerumque uncias complectentem, pondere autem quinquelibras duabus uncias excedentem, pediculo crasso, anguloso, aspero, nigro, solidoque hærentem, à quo omnes prodeunt anguli, undique per fructus latera transientes, donec circa floris vestigium collecti, rursus conjungantur. colorem habet etiam circa maturitatem in

nigro subviridè. Si verò serenus & tepidus fuerit Autumnus citrinum colorem induit, quòd si calum frigidum & triste fuerit tepido loco fovendus est, ut citrinescat. Colitur prædictorum modo. Et hæc Cordus.

Genus hort. Zuccam marinam Italis vocatam, Cucurbitæ speciem esse concludit, Zuchamve majorem rotundam apud Cordum Zucham Indicam Matthioli suspicatur. Sed & Matthioli *Zucche Indiane* (ita enim inscribit) inter Cucurbitas refert. Sunt & alia, inquit, Cucurbitarum variorum genera Italiæ peregrina, quæ diu per Hiemem recentes asservari possunt. Perunt has ab occidentalibus Indiis in Italiam venisse: unde Indicæ à pluribus vocantur. His in post.

comm. addit. Sed jam diu Italico solo proveniunt. Harum varia habentur genera, magnitudine, facie & colore differentia, referunt tamen omnes Melopeponum effigiem. Sed aliz magnæ, imò maximæ, ventricosæque, aliz parvæ, aliz mediocres, & aliz oblongæ, aliz rotundæ, vario colore, quæ quidem omnibus notiores sunt, quàm à me describi debeant. Fructus decerpuntur Autumno & asservantur Hieme totâ in culinis. Semen in ventre condunt magnum, amygdalini nuclei figurâ, in quo nucleus concluditur dulcis & suavis. Saporis subdulcis, non ut nostratibus usque aded insipidus: verum gustui insuaves sunt, nisi præcipuis condimentis saturantur. In hist. german. & epit. cum add. ubi eadem leguntur, vocat (ut etiam Castor p. 490.) Cucurbitam Indicam, Ital. *Zucche Indiane*, *ultramarine* & *marine*.

Dodon. gall. vocat Cucurbitam aspero folio *Pepo Dod.* pepem, eumque duplicem facit, longum & rotundum, ut ex iconibus patet. Longum vocat *Pepo magnus, album & viridem.* magnum [Pepo grand] iterumque duplicem facit, album, scil. & viridem.

Peponis 1. sive magni, ait, fructus est prægrandis, amplus & longus, duarum specierum, viridioniger, pluribus costis, cortice admodum duto, alter albus tectus cortice tenui, dulci.

Pepo 2. sive rotundus, folia habet minora, non ita profundè secta: sed & caules minores sunt, & plerumque in terram decumbentes: fructus nonnihil compressus, unus viridis, alter albicans, in quo semen minus quàm prioris, sed majus quàm Cucumeris vulgaris. Hoc genus quomodo describat Dodon. in sol. lat. haud scio. Icon. hist. gallicæ secundo loco exhibita, sit tertia in lat. quæ descriptioni non respondet. Iudicent igitur lectores, an Dodon. cognoverit plantas quarum habet icones & descriptiones.

Peporum species Dod. lat. Peporum (inquit in hist. lat. in sol.) aliquot reperiuntur species, vel magnitudine, vel formâ differentes. Peponi majori oblongo folia ampla aspera, aliquot profundis incisuris divisa: flores aut colore lutei: fructus magni, crassi, rotundi, oblongi, crassioribus striis veluti angulosi: color corticis quandoque obscure virens, aliàs albidus: virentis autem Peponis cortex durior est, ac veluti ligrosus, albidus verò mollior ac tenerior.

Atterum *Peporum* genus, *Pepo rotundus major*, caulibus & foliis utrisque asperis, tum & claviculis priori simile est; sed foliorum fissuræ minus profundæ, caulisque teneriores: fructus globosi, rotundiores, modò majores, frequenter minores: & quandoque virentes, duriorisque corticis: subinde cute molliore ac albicante: semina aliquando minora. Hujus generis & tertius est *Pepo*, asperis caulibus, folisque fissis ac serratis priorem referens. flos magnus, quoque ac luteus, veluti aliorum: fructus mediæ magnitudinis, cujus cortex

Cucurbita.

Zucche Indiane Matthioli.

Cucurbita Indica genera plura Matthioli.

Pepo magnus, album & viridem.

Pepo rotundus major.

Dod. lat.

Peporum species Dod. lat.

Pepo major oblongum.

Pepo rotundus major.

Pepo citrinus M. de simon.

tex tuberculis nonnullis exasperatus, veluti Maliciei cutis, qui per naturitatem similiter luteus est, proinde & Citrini malum eodem colore, tum asperitate referens. Quarti generis Pepon, sive latus, formā ab aliis plurimum differt: de hoc nos postea.

Pepo latus
Pepo non
latus

Pepo Cucumeralis

Turci
Marini
Hispantici

Græcis *πῆπων*: Latinis similiter *Pepo*. *πῆπων* autem omnes fructus perfecti ac inaturi communiter nomine dicuntur: unde Medici quidam, inquit Galenus, fructum hunc *πῆπων*, i.e. *Peponem cucumeralē* nominari oportere contendunt. Plinius lib. 9. cap. 5. Cucumeres, inquit, cum magnitudine excessere, *Pepones* vocantur: Germanis *Plutger* (in hist. gall. *Pfeben* nominari dixit.) Belg. *Peponen* / Gal. *Peponi*, *Paponi* & *Ponponi* vocantur. Majores à nonnullis Turci cognominantur: Secundi vero Marini; Tertij Hispanici: Quarti lati. Hæc Dodonæus, cui an perspecta fuerint sua *Peponum* genera dubitamus. Icones enim non respondent suis descriptionibus. Prima autem ejus imago in Hist. gall. & lat. exhibita, ponitur à nobis pro *Cucurbita aspero folio secunda*. Secundum ejus *Peponem* hist. lat. describit foliis esse fissis, cum tamen icon foliorum fissuris careat: Hunc nos putamus in hist. gall. non describi, esseque *Cucurbitam*, quam fructu maximo folio non fido cognominamus. Tertia quoque effigies in hist. lat. quæ in gall. pro secundo *Peponē* dabatur & describebatur, ut Tertium *Peponem* exprimeret, fructus tuberculis exasperatus, ut in descriptione habetur, pingendus erat, & *Citro* similis. De quarta iconē, latorum *Peponum*, quæ in hist. gall. tertio loco posita fuit, agemus sub titulo *Cucurbitæ clypeatæ* affinis ovalis ad *Citrum* accedentis.

Lib. Insulæ

Compressi
rotundi

Latiores
clypeiformes

Cucurbita aspero folio Lobel. in *Adversariis* descripsit verbis: *Sicopeponibus*, *Cucumeribus*, *Peponibus* sive oblongis, sive ovalibus, vulgarissimis, hortorum ruralium nullus vacat, eodemque vocat cuncta Germania & Anglia *Pepones* magnos, admodum *Meloni* vel *Citrullo* similes. Variant vero compressi, rotundi, *Meloni* effigie, folio minori, minusque inciso: cortice delicatiorē glauco, vel albidō, nitente: semine albo *Citrulli*. Latiores clypeiformes nihil prorsum distantes in ramis & foliis. Minus autem distincte scribit Lobelius de his fructibus. Nos *Clypeiformes* ut & *stremosum* aliū referimus. In Obs. p. 363. Icon. p. 641. dedit *Peponis* oblongi vulgarissimi iconem, quæ ad nostram tertio loco positam accedit: nomen germanicum *Pfeben* non placet.

Pepo max.
oblongus
Tabern.

Pepo Ind.
minor
Cucurbita
Turcica

Cucurbita
Indica
Synon.

Suspiciamus *Tabernmontanum* per *Peponem* maximum oblongum intelligere *Cucurbitæ aspero folio* genus, quamvis ponatur capite de *Meloni* bus; Itemque per *Peponem* indicum minorem oblongum. Videtur nobis etiam *Cucumis* ejus *Turci* cus nihil aliud esse, quam dicta *Cucurbita pictur* am, accedentem ad nostram iconem primam.

H. Lus. *Cucurbitam* indicam majorem & minorem tradit. B. phyt. & pin. *Cucurbita* 2. sive major rotunda flore luteo, folio aspero: *Cucurbita* Indica, Matth. Casti. *Zuccha* major rotunda, Cord. hist. *Cucurbita* *Zuccha* maxima Italis vocata, Gesh. *Cucurb.* rotunda, Cast. *Cucurbita* Indica rotunda, Lugd. *Cucurbita* Indica major & minor, Tab. *Citrullus* major & *Pepo* major sylv. Ger. quoad icon.

Varia hujus genera, magnitudine, facie & colore differentia: eorum namque quoddam genus est, quod utrisque vltis vix amplecti potest, & in insula S. Laurentij ejusmodi colore rubro, flavo & albo, & saporis longe gravioris atque nosirates ubertim proveniunt. Palud. in nouis ad

Lutec. par. 2. Ind.

Tom. II.

CUCURBITA ASPERO FOLIO. flore luteo, semine in morem intorta.

Cucurbita hæc nata fuit in horto Mphthelgard. Descri.
Anno 1607. in Autumno matura facta, uncias circiter novem longa, parte superiori longiori tenuiorque duas circiter uncias in latum porrigitur. Superius à pediculi regione deorsum versus ad quatuor plus minusve uncias in longum protensa, sensim à graciliori habitu ad crassiorē extumescit, undique rotundatur, atque in morem semineis intorquetur, in quibusdam vero ut in unguiculis arcuatur, sic in oppositam assurgit: colore in virenti adhuc recentique fructu saturato virore nigricanteque conspersa, matura autem, reserataque diutius flavescit, extremis tamen ejus partibus adhuc viridantibus: superficie per omnia lævi, nullisque exuberantibus asperata, nisi una alterave verruca occurrenti. observantur etiam in toto longitudinis tractu costæ plurimæ à suprema parte ad inferiorem protensa, neque tamen superficiem æqualem excedentes, asperiorēque reddentes. Inferior ejus pars latior est tres uncias, ventricosiorque & rotunda, costisque, ut superior, exarata, quæ tamen in ingrore illo viridis saturatoris coloris ferè oblescent, sub lineis appendicula cernitur protuberans papillæ mammarum persimilis, in medio albescent.

Cucurbitam folio aspero, flore luteo, fructu non magno, ex albo ad cinereum vergente, Augusto *Cucurbita* *quodam die aspera* mense vidi in Ducatu VVirtemberg. in pago Boll dicto, prope fontem admirabilem.

Cucurbitam folio aspero flore & fructu omnino nigro observavi in horto D. Io. Lutz Pharmacopœi in urbe Kirchen.

Data fuit olim ab eodem Lutzio *Cucurbita* tenuis, longa, sesquicubitalis, circa medium angusta, costis magnis, & colore virente celebri, macularave.

Novimus tandem *Cucurbitæ folio aspero* parvum genus, fructu non multo majore pugno, rubro, cum quibusdam maculis. Et hæc est *Cucurbita* 8. Bauhino in pin. sive *Cucurbita* parvum genus, fructu pugni magnitudine, cortice rubro, maculis asperis, & semine rubro, Joh. Bauhuni.

CUCURBITA ASPERA, FOLIO non fido, fructu maximo, albo lesili.



Fructus magnus, Descri.
caput terè æquans, si rotundus esset, & non comatellus, angulosus est & candidus: folia aspera ceteris similia, sicut & flores lutei. Observavi in Brisgoia Scitæ Chen arce Illustr. Equitum Rhodiensium, nondum maturū Augusto. Hæc *Cucurbitæ* genus, ut simile diligenter consideravi in Abbacia Mafinster mense Octobris, fructu maximo.

specioso, quem narrant interdum ponderare ad triginta libras. Albus erat, utrinque sessilis, costis eminentibus & latis distinctus: folia licet sint aspera admodum, differebant tamen ab aliis, quod non essent laciniata & fissa, sed rotunda, serè ad folia Peritonatæ sive Bardanæ accedentia.

*Peponum
in Linn.
pressus Lob.*

Lob. obli. & c. inscripsit Peponem maximum Indicum compressum: magnitudine à superioribus differentem, interdum 8c. libras pendentem: foliis rotundioribus.

*Peponum
in Linn.
pressus Lob.*

Dod. lat. eandem cum Lobelio iconem habet, nomine Peponis rotundi majoris: verum ut ante monimus descriptio non respondet iconi. Carl. dicunt Melonem sive Peponem modicè depressum & sessile. B. phyt. & pin. Peponem 2. compressum majorem, corticis colore & substantiâ varians; qui enim albedo est colore, substantiâ est molliore: qui obscure virente, duriore.

CUCURBITA VERRUCOSA.

*Cucurbita
verrucosa
fructu ab
aliis diff.
fer.*



Cucurbita verrucosa Dalechâpio apud Lugd. ea vocatur, quæ aliis Cucurbitis, radice, folio, flore, capiteolisq; similis est, sed fructu differt, qui in aliis lavi & plano cortice tegitur, costis tamen in Indicis e-lutis & eminentibus, in hac verrucarum acrochordonum modo nodis plurimis tuberosus est, ludentis lascivientisq; naturæ vilendo spectaculo.

B. pin. Cucurbita 7. (6 in phyt.) verrucosa Lugd.

*Color al-
bi.
in Sicyo-
pepon stru-
majus Lob.*

Montbelgardi lata nobis provenit in horto E. C. V. Virg. coloris albi.

Considerandum an ad hanc Cucurbitam verrucosam, referendus sit Sicyopepon, vel Cucumis Pepon Lobelij strumulosus, de quo in Adv. ait: Perelegans & rarus, foliis aliis ficulneis proximis, fructu Melonem magnum æquante, sed Limoria mala exprimente, tuberosoque cortice papillatim variegato: speciosa item tricolori strumarum bullatione: femine non dissimili, Sicyopeponibus puta sive Cucurbitis folio aspera.

CUCURBITA SESSILIS FLAVESCENS folio aspero.

Hæc Cucurbita flavescens est novem uncias in longum porrecta, diffusa vero novem uncias in latum, undiqueque levis, nisi ubi verrucosæ quidam eminentiæ, modò majores, modò autem minores, modò etiam dux tresve in unam quali corpus coalescentes, levorem ejus exasperant: costas levi impressione à se mutuo distinctas, diversimodèque latis & binex: latitudinis in medio sui ventrosi corporis sequentiunciam latus sunt: ad partem vero illam latorem, cui in medio flos caducus

adnatus affixus erat in angustis contrahuntur, sed raptè ibi latitudinis redditur ipsa, ut novem quoque uncias exeret, itaque complanata est: ut totum Cucurbitæ sessilis nomen tribuerit, quod, quod humi projecta sedere videatur: pediculus ipsius inflexus, virens, asperior & octangulus est: pulposa ipsius substantia inferius duas plus minùve uncias lata est, pallescens: cuius dein medium spaciolum in totum complent fibrola filamenta plurima seminum magnam copiam appensam inter se condentia: cortex durus.

Exprimitur hæc quodammodo iconem, quæ postea est sub titulo Cucurbitæ latoris folio molli, quod fructum attinet: folia autem diversa sunt, quia aspera, sicuti & flos.

In horto E. C. durant adhuc folia sequenti anno mense Januario.

CUCURBITA SESSILIS ALBICANS folio aspero.

Cucurbita hæc sessilis teres & albicans senas & amplius uncias longa, octoquæ in latum diffusa est ad floris regionem platiorem, costas habet sursum deorsumque summo levore politas, nullis que nisi quandoque duabus ad summum verrucosis per obliquum ventrosi corporis tendentibus eminentibus, asperiores redditas, superficialibusque sulcis ad invicem commissas: utque ad pediculum angulosum in angustum coarctantur, sic vice versa in parte subjecta ipsi è diametro opposita in latum primum diffunduntur, donec ad floris ambitum undique sinuosum argutioribus suis finibus rursus coerceantur. In horto, &c. Non multum differt hæc à præcedenti flavescente.

CUCURBITA MEDIOCROCEA.

Cucurbita mediocrocea variat magnitudine. Nam alias ad capitis humani magnitudinem accedit, sæpè etiam minor est. Coloris quoque situ variat: communiter enim mediâ parte sua superiore vel inferiore, vel laterali crocea sunt pomæ, reliqua viridia, pallidis maculis aspersa: sit tamen ut aliquando de hoc, aliquando de illo colore magis participant. Quæ junguntur colores, virides veluti pictarum regionum alpes in croceo elevat: cortex item durus, firmus, lavis: caro firmiuscula, sapore cucurbitino, subdulcemina alba, magna, per ambitum hirsuta.

CUCURBITA ASPERA MEDIÆ magnitudinis, turbinata variegati coloris.

Cucurbitæ asperæ genus mediocritatis magnitudinis serè pyriforme, variegati coloris provenit in horto E. C. quod suspensum se hypocaulibus duravit tota Hieme. Semina parva subrotunda, qualia ovata.

CUCURBITA TURBINATÆ majores albz.

Non nisi tres fructus Basilea à D. Jacobo Zwingero, quorum duo sex aut septem uncias, pyriformes, basi ventrosâ, propter pediculum turbinatâ, aliquantulum angulosâ: super-



superficies lœvis est, ex luteolo pallida: caro unciam ferè crassa, Cucurbitæ vulgaris aspero folio insipida penè, gustûque a-queo: semina ovata sunt, sapore dulci, grato. His similis tertius, nisi major esset, & turbine latiore & minus acuto, ac quibusdam tuberculis, vel verrucis rariis obfusus: Huic adaptamus figuram Guarinianam hunc fructum nostrâ opinionè satis commodè exprimentem.

CUCURBITA ASPERA
pyriformis, parva,
alba.



Cucurbita pyriformis foliis est asperis laciniatis; caules longi cum capreolis per terram sparsi, Cucumerum modo: flores lutei duplices, steriles & fructiferi, ut in cæteris Cucurbitis aspero folio: fructus pulcher, copiosus, albus, politus, longus uncias quinque vel sex, superius angustò collo, infra ventricosus, qui manu complecti potest: cortex, ubi maturus, durus: caro pulposa, dura, saporis ca-

terarum: semina qualia illis parva, lata, compressa, medullam dulcem & albam includentia.

An Ger. & Tab. Pyromelo, Byren Melonen. In hist. non describit, & cum Melonibus miscet. An B. pin. Melo 4. pyriformis.

Nulquam observavi nisi in horto Illustrum Equitum Rhodiensium in Heuterischen Brüggen, ubi mense Septembri supra terram sparsa adhuc florebat.

Hortulanus assererat comedi copiosè teneras cum oleo, aceto, pipere, & sale Cucumerum modo. Minus tamen sunt palatui meo grati, illis enim peculiaris sapor.

CUCURBITA ASPERA
minima, turbinata, pallida,

Clariss. Plateri munere & hanc habemus Cucurbitulam obiter turbinatam, cortice sub-

pallido, h. e. in flavum albicante: carne subdulci: at semine oblongiore quàm Cucurbitulæ sphaericæ, in subflavum etiàmque in citrinum vergente.

CUCURBITA ASPERA TUR-
binata, subcrocea.

Haud ita pridem ex Italia delatas binas Cucurbitas accepimus, æqualis ferè magnitudinis, pugno vix capaces, in pyramidem affabrè turbinatas, adeoque quàm proximè ad formam Pyrorum, à Germanis Spießbirn / quasi lardina dictorum accedentes, nullo collo angustiore, ut in cæteris Pyri-formibus, testâ subfirmâ, cui obducta cutis lœvis admodum & subcroceo lœvore splendicans, prorsus eleganti & rariori facie. Caro qualis in cæteris, sed paullo dulcior. Semina minuta, candidissima, subrotunda, cæteris Cucurbitæ generibus ventriosiora. Plantam nondum vidimus: ubi semen terræ commiserimus, tum demum ejusdem formam describemus.

CUCURBITA ASPERA
ovalis, flavo colore.

Minoris Cucurbitæ asperæ species perelegans. **O**valis Cucumeris majusculi penè magnitudine & figurâ quodammodo, spithamam longa, quam una manu non amplectaris. à pediculo per ejus longitudinem lœves & obscuri quidam sulci descendunt: cortice est lœvi, flavo, nec crasso testâ, & parum duro; circa pediculum angustior, parte oppositâ obtusior: colore est ex flavo croceo: caro cucurbitina, flavescens, digito non crassior; insigni cavitate semina itidem cucurbitina, parva, sed subrotunda claudit, qualia Pyriiformis variegata. Ejus planta tota aspera est & flore luteo.

Fructus calido loco suspensus fert Hiemem ad Martium usque: sapor qui reliquis Cucurbitis: satis provenit in horto E. C. Montb.


CUCURBITA ASPERA PY-
gillans, ex rotundo oblonga.

Haud inelegans Cucurbitæ genus in horto Montbelg. crevit ex semine, nescimus unde importato, quod majoris Pomi magnitudine ex rotundo in ovatam tendit figuram, cortice pallido subflavo. Caro uti cæterorum, subdulcis, etiam admodum grata.

CUCURBITA ASPERA MI-
nima sphaerica, crocea, variegata.

A Cl. D. Platero Cucurbitæ parvæ admodum genus accepimus, sphaericum ferè, flavum, & croceo emblemate Damasceni Pannolerici in morem pulchrè variegatum: caro dulcis ut cæterorum, crassiuscula: semina ex rotundo oblonga, candida, mediocria. Huic similis quædam amara descripta.

du Pepo
ind minor
Taber.



An est Ger. & Tab. in ic. & hist. (sine descriptione) Pedo Indicus minor rotundus, Flein rund Indianisch Deponen.

An B. pin. Pepo 4. rotundus Melonis effigie: Pepo oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trag. Pepo sylv. Dod. Pepo rotundus compressus Melonis effigie, Lobel. & Lugdunen.

CUCURBITA ALBA ASPERA, fructu longo collo.

Defr.

Cucurbita hzc, folio asperiori inumbrata, octo uncias longa, lagenæ figuram similem representat. Collum ipsius à petioli initio ad ventris confiniatendens, rotundo capite donatum, æquabile est, nec ullis striis intercurrentibus exasperatum, tres cum semisse uncias longum, unam unciam cum dimidia latum: venter majoris & oblongioris ovideam referens, longus est uncias quinque: & aliquid amplius, unciam verò unam & aliquotusque ulterius latus densusque, multis itidem asperioribus sulcis inæqualior redditus, sed lævorem quandam tactui gratissimum, per omnes suas partes ad capitis usque teretis extremitates exhibens: paucis iisque minutionibus alicubi tuberculis aspersus: cortice duro. Provenit Montbelg. in E.C. horto.

CUCURBITA LAGENAM EX- primens, parva, aspera.

Defr.

ANNO 1606. in horto E.C. crevit Cucurbita lagenulam exprimens, sulcata, palmum longa, ac etiam brevior, quam una manus amplecti non poterat, cuiusque pars inferior haud sessilis, sed veluti umbilico protuberans ad unciam semis; superior autem longum, curvum, satisque angustum collum præ se ferens: color externus albidus, nonnihil flavescens: pulpa flava: semina parva, inæqualia.

CUCURBITA ALBA VERRUCOSA.

Cucurbita hzc anno 1605. Martio mense ab as. sine Lutzio accepta, semicubitalis erat, alba, angulosa, sessilis, costis multis interstitiis latis elevatis, tota verrucosa: cortex tener: semen magnum album.

CUCURBITA VERRUCOSA parva.

EX Sicilianis sine capreolis, ni fallor, hzc una erat, tota verrucosa, infantis capite minor, & quodammodo pyramidalis, palmum alta, lutea: semine lato.

CUCURBITA FOLIO ASPERO plantatio.

Cucurbitæ folio aspero semine quotannis in hortis optimis & apricis proveniunt. Plantatio eorum sic se habet. Aprilis mense lata & dulcia semina (quæ Amygdalo putamine detracta ac purgata conferenda rectè duxit Tragus) in pingui solo panguntur, sed non nimis profundè, cubitali interstitio ab invicem distantia, requirunt enim latum spatium, siquidem feliciter provenire debeant. Decimo à satu die erumpunt, eruptione binum foliorum Cucurbitis similium, inter quæ alia majora aspera, & nigricantia, formâ Malvam Romanam seu hortensem referentia profiliunt. Cum ergo in caules & viticulas planta hæc exierit, quod unius mensis spatio sit, tum suffulcire illam ac in altum adminiculis promovere oportet, quod nisi feceris, brevi totum agrum obducet, solet enim se longè latèque diffundere, flagellisque suis perniti reptatu vicinis se alligare fruticibus veluti Bryonia. Fructus durare per annum possunt, nec interea temporis putrelagini obnoxia fiunt, siquidem ritè legantur, eaque quæ decet curâ conserventur.

Duratio.

Quandoquidem autem longo tempore à putrelagine tuta sunt universa hæc pomorum genera, necesse est, ut mediam quandam inter frigidum, calidum & siccum, temperaturam obtineant. Possunt ergo non tantum in cibo, sed & medicina usui esse. Omnium horum pomorum caro, à cute & interna medulla purgata in olla cum aqua modica, sale & butyro decoqui potest, quo ritu Rapas & Mala decoquimus, estque hic cibus non contemnendus, quod si loco aquæ vinum iis adjicias, gustum suaviorem obtinebunt, Malisque decoctis similem. Ex semine putaminibus repurgato juscula dulcia parantur, instar jusculi Amygdalini. Hæc decoctio stranguriæ, calculo, ardori urinae apprimè conducit. Si quæ alia hujus plantæ sint juvamenta, ea progressu temporis cognosci fortè poterunt. Cucurbitas Indicas, cum subdulci sint sapore, credidit Matthioli primo excessu refrigerare, & humectare secundo.

Temperamentum.

Usus in cibus.

In medicina.

Stranguria.

Cucurbita Indica semine.

Temperatura.

CUCURBITA CLYPEIFORMIS sive Siciliana, Melopepon latus à nonnullis vocata.



Cucurbita hzc Defr. Cerecta provenit absq; capreolis: folia profert Cucurbitis folio aspero non multum dissimilia: fructus fungum representans tenero est exteriori cortice, carne luteola, firmâ, saporis aliarum Cucurbitarum, semine penè circinnato, palmam manûs terè implet: labra reflectuntur & crispantur. In hypocausto duravit ad mensem Februarium, deinde putrescere coepit.

Memini & hoc, & aliud Cucurbitæ hujus generis in horto E. C. Montbelgardi observasse non rectum, longioribus ramis se spargentibus, quale pingit

Pepo latior fructus Dod.
git Dodonæus, qui eandem cum Lobelio iconem habet cum inscriptione Peponis latioris fructus.

Melopepones latiores
Lob. autem in obs. & ic. p. 542. Melopepones latiores clypeiformes vocat, & de his in adv. ait: Sicyopepones, Cucumeres Peponesve latiores clypeiformes nihil prorsum dissimiles in ramis & foliis [*à si yopepone compresso rotundo*] horti alunt, rotunda galeri specie, aut clypei umbilicati, & ambitu rimoso, atque plicis fimbriisque rugoso cortice, delicato, & concolori, nec diversi saporis à prædicto.

Cucurb sessilis Gesn.
Gesn. in ap. hort. vocat Cucurbitam sessilem, ram, albam, latam, compressam ab altera parte, paulo majorem Cucumere, marginibus partis latioris crispis veluti fimbriis eminentibus.

Cucurb Siciliana.
Nominavimus nos aliquando Cucurbitam Sicilianam, & cum quibusdam germ. *Muschel Kürbß*. Primum nobis visa Tubingæ & Esslingæ, unde semen delatum feliciter provenit in horto patris p.m. anno si bene recordor, 1561. Ego autem hæc scribo anno 1606.

B. pin. Melopepo 1. clypeiformis: Pepo latus, Dod. gall. latioris fructus, Eid. & Gesn. h. Cucumis, Pepove latior clypeiformis, Lob. adv. Melopepo latior clypeiformis, Lob. ic. Cucurbita lacinata Dalechampi, Lugd. Cucurbita sessilis, Gesn. app. Melopepo clypeatus, Tab. Pepo maximus clypeatus Ger. Nos de Peponelato Dodonæi postea sub Cucurbita clypeiformi cortice molli, & ramosa mox plura dicemus.

vsu.
Sicyopepones latiores clypeiformes in taleolas scissos, fractisque in sartagine, & farina aspersos, suaves admodum mandunt, in Belgio, Gallia & alibi, ut refert Lobelius.

CUCURBITA CAPITATA TABERNOMONTANI sive clypeiformis.

Icon Tab.



Cuc capitata C.B.
P. Ingit Tab. Cucurbitam hanc capitata, Bopffel Kürbß / cujus icon multa habet similia, cum Cucurbita clypeiformi sine capreolis, sive Siciliana, cujus etiam hæc genus est, quod minor à Compilatore alio capite fuisse positum.

B. phyt. dicitur Cucurbita 5. Eid. pin. Cucurbita 6. capitata: Cucurbita sessilis alba lata, ab altera parte compressa, Gesn. h. Cucurbita capitata, Tabern. Cucurbita

fungiformis, Ger. Cucurbita stellata sive sessilis, Cam. Cucurbita inter capitata Tabern. & sessilem (prædictam) Cucurbita Gesneri non distinguit.

CUCURBITA CLYPEIFORMIS cortice molli, & ramosa.

Deser. fr. Bm.

Hic fructus saturæ flavodinis, latam, planamque ferè, circa petiolum viridem, asperam, angulosamque superficiem gerit, unciam circiter latam: mollem item corticem habet, raris sulcis exaratum, extremam circumferentiam multis quasi lo-

bis mollioribus, rotundioribus, sibi invicem succedentibus exornatam obunet, supremam partem dimidix sphæræ, depressa tamen undique, minisque



convexæ similem exhibet, inq; medio sui foveolâ aliquam decidui floris latiore asperiorēque sedem spectandam offert, cortex corrugatur succellu temporis: duravit ad Februarium mensis: caro firma lutea: semina parva, circumnata ferè, iniqua.

An Dodon. gall. An Pepon latior, Dod. Peponum tertia species, Pepo latus, gall. Pepon large, belg. Breede Depocnen / & aliis Melons de Turquie,

Tordische Melonen / valdè similis Peponi rotundo, ramis procumbentibus, foliis & floribus, caulibus tamen non ita asperis: fructu compresso, lato, & rotundo, testâ cute leni & terui, rugato, in margine clypeum exprimente: semine albo, simili Cucumerino, majore tamen. De Peponelato in fol. lat. hæc scribit: Quarti generis Pepon, latorum Peponum nomen obtinuit: Ejus caules, folia, floresque aliorum Peponum similes sunt: fructus autem haud longus, aut globosus, verum latus & quodammodo planus, scuto alicui propemodum similis, in medio quidem crassior, per circumferentiam verò tenuior, & quibusdam locis reflexus, crispis in instar, cortex hujus mollis, tenuis ac candidus est: caro interior satis dura ac durabilis; semen quàm Cucumeris majus, formâ & colore conveniens: quia durior caro Peponum latiorum idcirco diutius, quàm reliqui asservari queunt. Et hæc Dodonæus, qui tum in hist. gall. cum lat. iconem exhibet plantæ non surrectæ, aut sponte se sustinentis, sed ramosæ & procumbentis, cui capreoli, quibus præcedens destituitur, in qua fructus, quales descripsimus ante, negleximus tamen observare qualis esset planta: hoc certò me non fugit fuisse in horto E.C. Cucurbitas fimbriatas procumbentes & se latè spargentes, sed illud non observavimus an capreolos habuerit: Præterea in hist. lat. ponit, ut diximus, præter modo dictam aliam iconem, nomine fructus Peponis lati, quæ eandem cum Lobeliana, de qua ante.

Peponis Indici minoris clypeati (Hlein Indias Pepon Indisch Schilt Peponen) icon apud Tabern. non multum differt ab iconem Dodonæi, capreolos habente.

B. pin. Pepo 6. minor clypeatus: Pepo Indicus minor clypeatus, Tab. Pepo Indicus fungiformis, Ger.

Lati Pepones eduntur non modo elixi, sed & in pingui aliquo fricti. Descendunt verò & per alvum haud segniter, alimentum autem adferunt, quale aliorum Peponum, i.e. Cucurbitarum folio aspero.

CUCURBITA CLYPEATE AFFLIS: sive Sicilianæ genus parvum, utrinque obrusum, quibusdam Melopepo rotundus.

In horto E. Canno 1606. provenit genus Cucurbitæ, quam Sicilianam vocamus. Ea pugno major est, uncias quatuor vel quinque longa, utrinque pe-

HISTORIAE PLANTARVM



ne scissilis, magno Granato non multò major, sed elatior, alba, costis uncialibus ex internodiis parvis distincta: cortex mediocriter durus: semina parva, qualia ferè Sicilianz sive Cucurbitz simbriatz. provenit in horto Montbelgardeni.

Melopepon
teres. Lob.
et Tab.



Lob. ic. p. 645. figuram habet sub inscriptione Melo-
peponis teretis. quæ foliis destituta minùs placet. Me-
lopeponis teretis fructus pinguntur apud Tabern. cum ipsa planta carente capreolis. Melonem autem vocari & cum Melonibus confundi non placet. Planta nostra capreolis non caret.

B. pin. Melopepo 3. sive teres, ut & Lob. & Tab. Pepo maximus rotundus, Ger.



B. pin. Melo-
pepo 2. compres-
sus: Melopepo,
Ang. Pepo maxi-
mus compressus,
Ger.

Provenit anno 1605. in horto E.C. Montbelgar-
di Cucurbitz sel-
silis genus (quod
videtur respon-
dere iconi Lobe-
lij & Tabern.) la-
tum quantum ex-
pansa manus am-
plecti potest, al-
tum quatuor un-
ciarum, costis ma-
gnis, elevatumq;
superiore par-
te, ad pediculum

compressa, & ferè plana figura.

CUCURBITA ASPERA, CORTICE molli, alba, magnitudine Arantij.

Cucurbitz genus magnitudine Arantij colle-
ctum in horto D. Felicis Plateri anno 1601.
mense Augusto, album erat & rotundum, costis
multis, quibusdam latis, aliis angustis, pulchro ordi-
ne distinctis: cortice molli & tenero: medullâ fun-
gosâ albâ exuccâ ferè, sapore nullo insigni: semine
pro pomi magnitudine satis magno, longiusculo.
In hypocaufto reservatum mensis Martij 16. die ru-
gas contraxit.

B. pin. Pepo 5. rotundus Arantij forma: Cucurbi-
ta Arantij forma, Eyst.

PEPO INDICVS MINOR, angulosus, Tabern.



Nihil habemus
adhuc certè &
notatu dignum de
Pepone Indico mi-
nore anguloso Ta-
bern. dicto, germa-
nic. Klein Indias
nisch edechig Pes-
ponen. Ejus ta-
men iconem & no-
men suspicamur es-
se genus aliquod
Cucurbitz folio a-
spero. An hoc ca-
pite bene ponamus
hanc iconem as-
serere non aude-
mus. Idem de se-
quēti dicimus. Cō-
siderandum item
verit, an quæ infe-
rius describitur, sit

eadem cum præcedenti

Cucurbita ista utrinque tuberosa, & extume-
scens, lra est uncias quinque, & quatuor ferè lon-
ga, petiolum habet inflexum, exasperatum, quin-
quar gulum, striis per longitudinem aliquot sulca-
tum: regio amplior (cujus medio infixus haret pe-
tiolus)

SICYOPEPON COMPRESSVS, rotundus, Melonis effigie.

Defer.

Pepo rotundus
compressus
Melonis ef-
figie Lob.

Sicyopepones, Cucumeres Peponesve compres-
si rotundi, Melonis effigie variant (à Cucurbitz
aspera folio). folio minori minùsque inciso, alioqui si-
mili nec dispari flore, aut fructu, nonnihil aliquan-
do orbiculatim striato: cortice delicatior, glauco,
vel albido, nitente: semine albo Citruli. Hæc Lo-
belius in adv. qui in obs. p. 165. & ic. p. 642. figuram
habet (ut & Lug.) sub titulo Peponis rotundi com-
pressi Melonis effigie. Hanc eandem effigiem exhi-
bet Dodonæus pro Pepone silvestri, quam nos Cu-
cubitam amaram vocamus: ea verò pictura accedit
ad iconem nostram ex Fuchsi pro Cucurbita aspe-
ro folio quarto loco positam, cui Dodonæus, ut mo-
nuimus, similem habet pro Pepone rotundo mino-
re. Nos peritioribus in horum pomorum cognitio-
ne indagandum relinquimus, uter melius, Lobelius
an Dodonæus accommodavit suæ descriptioni ima-
ginem.

B. pin. Pepo 4. rotundus Melonis effigie: Pepo
oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trago. Pepo
Indicus minor rotundus, Tab. Ger.

Vim.

Sicyopepones compressos, rotundos, Melonis
effigie in taleolas scissos, frictosque in sartagine &
farinâ aspersos suaves admodum mandunt in Bel-
gio, Gallia & alibi, Lob.

CUCURBITA GENVS, SIVE Melopepo compressus alter, Lobelio.

Melopepo
compressus
alter Lob.

Melopepo
compressus
Tabern.

Ob. hujus figuram exhibet in ic. p. 642. sub Me-
lopeponis compressi alterius inscriptione. Ex-
tat hujus descriptio, ni fallor, ni Hist. belg. sive teu-
tonica Lobelij, quam fratri mutuo dedimus, nec-
dum recepimus. Pingitur apud Tabern. Melopepo
compressus, Breyte Pseben / an ex ipsa planta me-
latet. Jac. Braun in hist. ipsius confundit cum Melo-
nibus, non sine lapsu.

tiolis) multis costis, modo majoribus, quasque geminis, modo minoribus, sinuque aliquem satum inter majorum interstitia reliquentibus inaequalior quidem, non autem alpera reddita est: costa ipsius majores plurimaeque à medio petioli centro descedentes, versusque ventrem excurrentes undique prominent; altera verò parte, quæ floris regionem spectat, eadem quoque sulcis à costis latioribus incutatis, & zonæ instar transversim Cucurbitam amplectentibus, donata est, sed in eo distat à priori regione pediculum respiciente, quod hæc tuberosa cum sit, non tamen in fastigium ita strictum confurgat, sed latus, ut aliquomodo sessilis inibi evadat, circa verò ventris extuberantiam, depressionem sortiatur, quæ in altera regione ipsi adjacenti minime conspicienda exhibetur, quia recta ad pediculi culmen usque fastigiatur.

Synon. C. 8.

B. pin. Pepo 7. minor angulosus: Pepo Indicus minor angulosus, Tab. Ger. Huc & Pepo hem minorem Indicum 4. Tabernomontani, referendum censet Bauhinus in pin. Nos hunc postea pingimus & describimus.

CUCURBITA INDICA MINOR Tabern.

Cucurb. Indica minor Tabern.



Pinxit Tabern. in Icon. Cucurbitæ genus hoc luteolum, sine capiteolis, titulo Cucurbitæ Indicæ minoris. Item Indiarum Turbæ. Verum in Hist. (ubi icon transposita, male sub titulo Cucurbitæ longæ) nulla differentia ab altera Cucurbita Indica, quæ ibi posita traditur, præterquam à magnitudine. Verum sic vera, & herba sine capiteolis provenit, genus erit pulchrum & à nobis nondum observatum. An ritè hunc locum ei demus, ignoramus.

An Cordo in obs. silya, Cucumis recto caule, fructu Melonis aut Peponis parvi?

CUCURBITA INDICÆ MINORI Tabern. accedens, tuberculis abundans.

Locum.

Deser.

Progenit hæc anno 1615. in horto E. C. Montbelgardi Cucurbitæ genus sessile, accedens ad iconem Cucurbitæ Indicæ minoris Tabernomontani. Ea palmis longior, crasso ventre, quem non utraque manu amplexus fueris, parte supremâ, in qua costa lata, & magni sulci, angustior multo, alba tota, multis tuberculis, & veluti verrucis exasperata: cortice mediocriter duro.

CUCURBITA INDICÆ præcoces.

Dæ Cucurbitis Indicis spacio 25. dierum à satumaturis scribunt Historiographi novi rerum

Indicarum, quæ meminit Quiqueranus Galus in libro de laudibus provinciarum. De magnis Cucurbitis quibus Brasiliens ad piscandum utuntur Jo. de L. Ofor. lib. 1. tit. 1. Port. parte 15. Cucurbitas ad notandum aptas commemorat Levinus Apollinarius lib. 1.

CUCURBITA INDICA PARVA.



Inter fructus rosos ostendit p. m. E. C. Princeps Fridericus, Dux Viremburgi. Cucurbitæ genus sere globosum, pugno paulo majus, versus pediculum nonnulli pyriforme, cortice crasso valde, subflavo, maculis fuscis notato: seminibus Cucurbitæ molli folio longo, minoribus, angulosis, cortice duriore, medulla alba, ejusdem saporis cum prædictis.

CUCURBITA CLYPEIFORMIS tuberosa & verrucosa.

Hæc Cucurbita lata depressaque est, planitie Deser. scuto alicui simili, dodrantalis propè latitudinis, quaternariumque unciarum altitudinis, circumferentia (à petiolo crasso, aspero, anguloso, albicante) ad summum ferme ipsius fastigium, hemisphaerice rotunditatis & longitudinis, cum adnatis quibusdam tuberculis inæqualis magnitudinis, eandem interverterent, inæqualioremque redderent: superiori sui parte uncialem undique planamque superficiem occupat, in quibusdam verò locis eadem declivior & prominentior, ad instar saxosæ extuberant, constituitur ob tubercula mammatæ, verrucosæque: plantæ medium occupat convexa quædam, omni ex parte declivans globositas, suis quoque sulcis & summa globi parte ad imam, nunc altius, nunc verò levius incisa, suisque tuberculis exasperata, summitas verò ipsius latiusculam sortitur est superficiem, quam sive tuberculum aliquod latum vocare malis, sive aliis culvis rei assimilis, licebit: Duri atque crassi est corticis parvæque. Pulpæ ipsius interior carnosa & firma, asseri itaque diu. Semen ipsi parvum, latiusculum, quale aliis Clypeiformibus. Alebatur anno 1607. in E. C. VV. horto.

CUCURBITA LATA, CLYPEIFORMI accedens, minus tuberosa.

Hic fructus flavidi coloris à tuberosa & verrucosa Deser. clypeiformi Cucurbita in eo dissidet, quod depressam undique, & in se confidentem corticem, tamve magis formam obtineat, siliis suis modo altius, modo verò levius cortici impressis, deinde quoque, quod superiori sui parte, non velle in nihilum plantæ medio incumbente, imminuere sustineat, sed recta sursum vertus, sulcis eisdem coarctandis mollior, claviculæque elevat.

Cortex
dumina.

tum a surgitque, inque sui summæ parte Bogis decidui vestigium albicans, latiusque genit, quâ parte pediculo hæret sessilis & nonnihil concameratum cortex non multum durus: semina planè clypeiformis similia, subrotunda sunt: pulpa lubriflva. Duravit ad Februarium usque sequentis anni 1607.

CUCURBITA CLYPEATÆ AFFL- nis, ovalis, angulosa, ad Citrum nonnihil accedens.


Deser.

F. H. H.

FRUCTUS hic ovalem figuram per omnia serè refert, longitudine sua ad quinque uncias protenditur, latitudine verò crassitieque quatuor uncias complectitur. ad petiolum viridem, angulosum, striatum, & scabrum, plures occurrunt majores striæ, juxta eminentias protuberantes, ex minoribus plurimis in ventris sinuoso ambitu obviis in unam petioli extremitatem concurrentibus striis productæ. Venter in orbem circumdatus per transversum multis magnis majoribus, minoribusque sulcis est exaratus, interque medios sulcos tubercula inæqualis eminentiæ circumquaque se visui spectanda offerunt. Ad extremum fastigio acuminatiori quam ad pediculi regionem apparobat, donatur. Colore est flavescente. Citrium medium æmulatur nonnihil: cortex durus: semina subrotunda ad clypeatas accedentia. Consideretur an huic, Pepo Citrio similis, quem capite de Cucurbita aspero folio ex Dodonæo delineavimus, conveniat: Icon cente non respondet.

CUCURBITÆ CLYPEATÆ AFFL- nis à pediculo in conum delinens.

Deser.



sum quali ambiente n. vitendum exhibeat, quæque ab alioribus sulcis ex latiore ambitu ad usque inum petioli centrum excavatur, venter etiam compluribus altis incisuris exaratus est, qui tandem secundum ductum suum continuum ad extremum usque verticem sensim disparent, vertex ipse denum colliculum gracilescenti fastigio donatum exhibet. Cortex durus flavescent, caro ejusdem coloris: semina subrotunda, inæqualia. Provenit in horto E.C. Montbelg. anno 1607. duravitque usque ad Martium anni subsequenti.

C. H. H.

Tabern. inscripsit Peponem minorem Ir dicum quartum. Hunc Bauh. in pin. cum Pepone suo 7.

sive Ir dico minore anguloso Tab. eundem facit quod non probamus.

CUCURBITÆ CLYPEATIS AFFL- nes utrinque aliquo modo turbinata.

Cucurbitæ genus folio aspero varians magnitudinem totius fructus, crassitiem ventris, ejusque etiam longitudinem, vel denique longitudinem, crassitiemque colli. Vnum enim genus, longum est in totum uncis octo propemodum. Venter verò ipsius in longitudinem quatuor unciam protenditur, suæque crassitie trium est unciam. Collum denique extensum est ad quatuor uncias, crassitudine verò sua duas uncias complet.

Secundum potè genus oblongum est secundum totum sex uncis, ventriositas verò ipsius extensa est ad quatuor & amplius uncias, crassa verò quatuor unciam. Colli demum spaciū inter ventrē & pediculum interjectum est unius uncie & dimidiæ. Crassitudo verò ejus adæquat duas uncias.

Tertia varietas integram longitudinem absolvit, quinque uncis. Ejus verò venter ad tres uncias & dimidiam porrigitur, crassus autem est trium & amplius unciam. Collum denique productum est ad duas uncias cum semisse, crassum verò trium & si quid est amplius, uncturum. Cæteroquin omnia genera in universum considerata in eo conveniunt, quod striis secundum ipsorum totum ductum sunt profusa, excepto primo genere quod usque ad ventriositatem suam sulcatum est, reliqua pars rotunda est ferè, omnibusque striis destituta, tuberculis tamen aliquibus hinc inde compressa diversæ magnitudinis. Dein verò sub finem ventris cujusque differentie tuberculum aliquod prominens conspicitur. Pediculus denique viridis, in medio autem ipsorum genere albicans visitur, angulosus & ad tactum asperior: cortex durus flavescent: semina qualia Cucurbitæ latioris. Hi fructus dum incorrupti conservantur.

CUCURBITÆ FOLIO ASPERO amaro. CAP. III.

Dodonæus lat. in fol. Pepones agrestes vocat & totâ naturâ silvestres, fructibus crassis, oblongis, striatis, durioris corticis ac colore viridibus, sed minoribus multo: pulpa & interiori medulla, una cum seminibus, acuti laterum, sed admodum amaris: semine quoque paullo minore. Horum veteres non meminerunt, inquit Dodonæus, qui conem habet, quæ non videtur multum differre, a sui Peponis rotundi minoris effigie, quæ eadem cum figura nostra pro Cucurbita folio aspero, quanto loco posita. Dodonæi imaginem Peponis silvestris Lobelius pro Pepone rotundo compressi Melonis effigie pingit. De Cucurbita verò aspero folio amaris in Advers. loquitur, ubi ait: S. tes C. c. cynthides in hortis Batavis, Gallicis & Italicis viciis simplicis aut quadruplicis varietatis: fructum nempe pusilla Cucurbitæ, aut pyri aut lagenule effigie, ex fusco viridante, cortice nonnihil maculis variegato, reliquâ foliorum facie Cucumerem silvestrem referente, teteritimo saporis. Membr. etiam exactè sphæricas, maximum Arantium aut Citræm vocatum Adami pomum æquiparantes, etiam per nihil variegato cortice. Videt & nonnunquam compressa rotunditatem, subilavi corticis, quorum omnium eadem vires, & diu amaror. Sapissimè pusilli, Peponis oblongi effigie, ovum anserinum aut elongetum æquat.

æquantur, corticis durioris, & visidi in atro, & cinereo maculati sunt.

De Cucurbitis asperis amaris nobis cognitis, deinceps seorsum acturi sumus. Et primum quidem eas describemus quas Cordus in hist. pl. delineat.

Cucurbita
genus a-
marum
Trago.
Trag. lat. vocat Cucumeris seu Zucco marini tertium genus amarum prorsus, veluti Coloquintides. Meminit in hist. germ. hujus Cucumeris sub nomina Indianisch Opffel.

Locum.
Alicubi locis incultis sponte Pepones silvestres (Cucurbitas folio aspero amaras) gigni concedit Dodonæus. Verum in Germania ac Belgio non nisi satos provenire.

Usetur
Usum.
Vti porro tota sua natura silv. Pepones valde amari sunt, ita quoque temperamento calidi, sicci-que, & secundo quidem ordine intenso: expurgandi quoque non minorem vim, quam silvestres Cucumeres obtinent, inquit Dodonæus. Vinum præterea quod calyci, exempta cum semine-medulla, infusum, tantisper in eo hæserit, donec amaritudinem plenè contraxerit, per alvum purgat, ac pituitosos biliōsque educit humores. In summa hujus succus idem quod Cucumeris agrestis præstat: resiccatu verò Elaterij loco succedere potest.

CUCURBITA ASPERO FOLIO, amara, grandis, oblonga, viridis.

Colocynth.
grandis ob-
longa, Cor-
di.
Radix.
Folia.
Floris.
Fructus.
Semina.
Colocynthis grandis, oblonga Cordi, ab una radice viticulam emittit digitali aut pollicari crassitudine, quæ in multas alias angulosas, undique per terram aliquot orgyiarum longitudine sparsas dividitur. hæ juxta exortum graciliores sunt. ac aliquantulum reptando progressæ digiti ferè crassitudinem consequuntur, eadem dodrantali intervallo geniculis præcinguntur, secus quæ capreolos emittit, & singula erigit folia, longitudine & latitudine pedali, in tres partes Lupuli modo secta, tactu aspera & brevibus aculeis horrida, pedibus aut cubitalibus, teretibus, asperis, concavisque pediculis insidentia, ab hisdem geniculis radices in terram demittit tenues, quibus nutriendo fructui succutrit, flores secus foliorum exortum profert duplicis generis, sæcundos & steriles. Steriles longo concavoque insident pediculo, Liliique figuram & quantitatem habent, præterquam quod intus hirsutus, & colore luteus sit, atque labrum ipsius in quinque tantum partes dissecetur, reliqua floris pars concava & continua est, in cujus medio cacheyi simile capitulum eminet, retro ipsum florem nullum extuberat tuberculum, quod sequuntur fructus spem faciat. Sæcundus autem flos breviori, solidiori & crassiori nititur pediculo, intusque tria crassa, hirsuta, luteaque tubercula, staminum vice continet, quibus in fundo floris melleus liquor circumfunditur: retro florem capitulum eminet, quod decedente flore in grandem & humi procumbentem excrevit fructum, longitudine plerumque dodrantalem, ea crassitudine, quæ utraque manu circumampliari vix possit, duarum civilium librarum pondo habet, is primum viridem colorem habet, postea candicantibus maculis conspergitur, in maturitate postremo totus in luteo pallet, & circa pediculum eminentibus angulis distinguitur. dissectus, corticem primum ostendit durum, lignosumque, mox flavam, cartilagineamque carnem, & in medio ejus sex ordines seminum candidiorum, acuminatorum, lutorum & planorum. In quibus candidus est nucleus. Radice nititur semestri & admodum brevi, à qua alie multæ candidæ in diversas partes exeunt, longitudine cubitales, & funiculorum modo tenues, quod si quis plantam hanc humi repere nolit, supra

ca neras petitis extructas ducat, ea enervatione capreolis baculos apprehendat, & atregias si vesicinas faciet. Saporem fructus habet amarissimi, & gravem odorem: seminis autem nucleus dulcis est. Scribitur spectaculi gratia in latis horrorum arcibus.

Colocynth.
grandis ob-
longa, Cor-
di.
B. pin. Colocynthis, oblonga: Colocynthis grandis oblonga, Cord. hist. Colocynthis grandis candida, solo colore ab oblonga differens, Eid. hist. Variat colore: alia enim primum viridem colorem in cortice ostendit, postea maculis candicantibus conspergitur, postremo totus in luteo pallet, fitque durus & lignosus: alia principio viret quidem, sed mox albicantibus maculis aspergitur, at in maturitate totus albicat. Cordus, hist. differentias sex proposuit, & ex eo Lugd. inquit frater.

Ego verò hinc primam Cordi differentiam describo, & de secunda nunc dicam. Tertia & quarta mihi est Cucurbita foliis asperis, sive Zucha. Quintam inscribo Cucurbitam aspero folio, amaram, turbinatam, &c. de hac mox, ut & de sexta, quam voco Cucurbitam oblongam, non angulosam, &c.

CUCURBITA ASPERO FOLIO, amara, grandis, rotunda, viridis.

Colocynth.
grandis ro-
tunda Cor-
di.
Colocynthis grandis, rotunda (ita à Cordo descriptionis auctore vocatur) oblonga grandis Colocynthidi, viticulis, capreolis, floribus, foliorum magnitudine, radicibus, asperitate, atque omnibus aliis accidentibus similis & æqualis est. duobus tantum differt. folia namque in quinque partes divisa habet, fructusque minores superficie æquali, pondere civilem libram excedentes & globi instar rotundos, aut modicè planos, utrinque tam circa pediculum, quam floris vestigium modicè eminentibus angulis distinctos: quibus color est primum viridis, in maturitate verò pallidus, qui dissecti substantia, seminum ordine & figura oblongis similes sunt. præterquam quod nonnunquam octonos seminum ordines habeat, ac totidem quoque oblongæ Colocynthidi contingere possunt. Sapore & odore oblongæ respondet.

CUCURBITA ASPERO FOLIO, amara, turbinata, flava candicantibus lineis inscripta, parva.

Colocynth.
turbinata
Cor-
Colocynthis turbinata, viticulas, capreolos, folia, & flores grandis & oblongæ Colocynthidi similes profert, & similiter per terram reperit, sed omnes partes tenuiores habet. fructum producit pyri turbinatum (cujus pyramis circa pediculum est) ovo majorem in maturitate flavum, & candicantibus lineis per longitudinem distinctum, foris durum & lignosum, intus autem lingosâ carne plenum, in qua quatuor oblongorum, planorum, parvorum ac candidorum seminum ordines continentur. Radicibus nititur prædictis similibus, sed minoribus multò, quibus semestris est vita, & geniculis autem nullas in terram demittit radices. Saporem habet amarum, ut prædictæ Colocynthis species, quibus etiam similiter colitur, inquit Cordus de Colocynthide turbinata, cujus descriptioni male Gesnerus, vel alius appoluit Colocynthis iconem ex Trago. Nec enim hoc capite Colocynthidem describere ei animus fuit.

CUCURBITA OBLONGA, NON angulosa, colore viridi, amara, folio aspero.

Colocynth.
oblonga
Colocynthis oblonga, glabra, auctore Cordo, viticulis, capreolis, foliis, flore & radicibus grandis

grandi & oblonga Colocynthidi similis & æqualis est, folia tamen quæquoversus dodrantem vix excedant, & non longè a mucrone duabus incisuris, sed non profundis in tres partes dividuntur: scutum habet oblongum, eidem Colocynthidi similem, sed sine angulis & omnino glabrum, minoremque. nam longitudinis circumferentia quindecim uncias raro excedit, latitudinis vero duodecim uncias complectitur; colorem habet primum viridem, in maturitate vero obscure luteum, ac in pallorem saturatum degenerantem; seminum ordine, colore, & quantitate, atque carnis substantia, colore ac sapore prædictas Colocynthides æmulatur, quibus etiam similiter in hortis colitur.

Tragus hujus meminit in hist. germ. nomine Colocynthidis: in hist. lat. vocat Cucumeris seu Zucco marini tertium genus, amarum.

CUCURBITA AMARA, MAGNA, folio aspero, colore vario.

Defec. Sapor nomen dedit. Nam Colocynthidis in modum amari car. Magnitudo capitis humani ferè est, aliàs major, aliàs minor, quæque certis limitibus coercere facile non sit. Cortex herbeus, guttis & maculis flavis persusus, portacinis, h. e. ex viridi flavescentibus lineis latis intersectus, durissimus cæteroqui, ac firmus, non ita tamen ut in Cucurbitis vulgaribus non amaris. Semen majusculum est, album, oblongum, quale in Cucurbitis aspero folio, quibus etiam similia folia, flores lutei, rami, & cætera.

Varietas. Anno 1606. proveniunt in horto E. C. quædam duobus pugnis multò majores, aliæ minores penè orbiculares, & quædam verrucosæ. Durant ad mensem Martium anni sequentis hæc Colocynthides, si ita appellare malis, quàm Cucurbitas.

CUCURBITA ASPERA, AMARA, fructu parvo, globoso, colore vario.



Montbelgardi in horto E. C. provenit Colocynthis folio aspero, parva, rotunda, pilis palmariis paulo major, amara, cortice duro, externe diversicolore. Novimus quoddam hujus esu sibi insignes vomitus provocasse.

Similem observavimus non amarum, quæ à nobis hic descripta minor videbatur. Ileo autem ex Guarinianis jam sculptis emptis, cum propositam Cucurbitam

eam amaram exprimere videretur eam assumpsimus. Et hæc fortè fuerit sate Colocynthidis secunda Lobelij, fructu maximi Arantij, de qua ante.

CUCURBITA SIVE. COLOCYN. this amara, pyriformis, variegata.

Defec. Longius paulò à Colocynthidis, quam officinarum ulus accepit, forma secus; præsertim so-



lis: sarmentis longissimis, asperis, canaliculatis, claviculæ beneficio in dicas topiarias coefferentibus: folio Cucumeris, magis laciniato, atrovi-
rente superius & molliore, inferius herbido & aspero: floribus Cucurbitæ folio aspero, duplicis generis, etocis: fructus succedunt pugillares, formâ pyri turbinatâ, viridantes, lirisquo albicantibus virgati, consimilibus quoque notis temerè maculosis: car-

ne candida, odoris gravis dum virent, saporis amari intolerabilis, cui semen immergitur copiosum, compressum, candidum, sive Cucurbitæ ulitatoris, folio aspero.

Hæc Cucurbita proveniens in horto E. C. non parum variat, seu anno 1607. deprehendimus. In eodem namque horto parvæ quædam mediocri pyri magnitudine proveniunt, quædam pugno crassiores, & quædam ferè rotundæ: cortice tenui, non valde duro, coloris supra dicti: seminibus parvis, sublongis.

Tragus Colocynthidem alteram sive germanicam vocat, ac diversi planè generis esse à Colocynthide vera, non solum ex fructu, verum etiam foliis, & universa formâ demonstrat. Spiræ à nonnullis, inquit, voluptatis gratiâ plantari consuevit. Semine quoque, quod habet latum, & Citrullis vulgè vocatis quadantenus simile, sentitur. Folia profert non cineracea, sed nigricantia, aspera, formâ verò Cucumerem luteum representantia. Caules ejus seu sarmenta rotunda & aspera humi repunt, sicut Bryoniz, neque unquam sublimia affectant, humili ac dejecto statu semper contenta. Per terram enim reptant, ita quidem ut una sæpe planta latissimum campum vestiat, nam plures obtinet claviculas, quibus vicinis se alliget fruticibus. Duo gignit florum genera, & ea quidem lutea, ac flori Cucurbitæ consimilia, quorum primum quidem cum nullum habeat in fine adjunctum fructum protinus evanescit; alterum verò fructum post se relinquit, in modum pyri mediocriter magni, maxime ejus quod Germani Negelsbyren vocant, turbinatum. Is ubi Autumno appetente maturecat, citrei cernitur coloris, intus fungosus, ac multis seminibus repletus, impensè etiam amarus. Hic bilem & pituitam leniter & citra periculum purgat. Colocynthis hæc arenosa & humidâ gaudet terrâ, fructum fert copiosum, ut non raro ducenta lata poma una de planta legerit Tragus.

Dod. lat. in fol. Cucurbitam sylvestrem inscribit, ac de ea ait: Viticulis, caulibus, capreolis, ac foliis molibus, ac veluti lanuginosis, sativam æmulatur, omnibus ac singulis multò minoribus. scandit verò & hæc scenas, unibracula, ac testudines hortenses: fructus Cucurbitæ ventricosus ac lagenulas referentibus, forma quidem similis, sed magnitudine longè inferior, omnino videlicet parvulus, nec vulgari pyro major, utpote qui & manu concludi ac compræhendi queat. cortex hujus exterior initio viret, postea durus factus ligni quoque colorem assumit, interior medulla humida, & admodum succulenta est.

est, in qua semen latet. amara autem hęc est, veluti silvestrium Peponum, h. e. Cucurbitarum asperarum amararum. Sunt quibus legitime hęc Colocynthis videtur, sed a veritate aberrantibus: Nam Colocynthis Anguria sylvestris est, cujus & tenuis cortex facile adimitur, & pulpa interior fungosa refecatur. Hujus autem Cucurbitę sylvestris durum ac lignosum putamen, medulla verò adeo humida, ut se non refecari, aut egrò admodum patiatur. In calidis regionibus sponte alicubi gignitur, sed in Germania ac Belgio non nisi lata reperitur, ubi & tarde ac raro perficitur. Hęc Dodonæus, cui ut suspicamur, non bene nota fuit, quam pro Cucurbita sylvestri exhibuit. Ea enim quę nobis nota, & ante tradita est, folio est Cucurbitarum asperarum filio, sive laciniato, floribus luteis, non Cucurbitarum mollium floribus albis: Icon quam exhibet Dodonæus foliis est laciniatis, quam rediffert a Cucurbita flore albo, quod monere oportebat Dodonæum. Nos ejus iconem proponimus, ut quę mediocriter nostram Colocynthidem pyriformem exprimat.

Colocynth. pyriformis. Lob. in obs. p. 97. Icon. p. 545. vocat Colocynthidem pyriformem, de qua ante ex Lobelij Adv. egimus. Tab. inscribit Colocynthidem feminam, B. phyt. & pin. Colocynthidem 4. sive pyriformem, seu Peponem amarum, Colocynthidem germanicam, Tragi. Colocynthidem 2. Dod. gall. feminam, Tab. Colocynth. turbinatam, Cord. hist. Colocynth. pyriformem, Lob. Lugd. & Ger. Colocynth. nigram, pyriformem, Cam. Cucurbitam silv. Dod. figurā pyri, Crf. Pseudocolocynthidem pyri formā, Eyf. Cucurbitam silv. Somphon dictam Plinio, quorundam.

Temperamentum. Ceterum facultate hęc Cucurbita calida & sicca est, nec minus quam Colocynthis, aut Pepones sylvestres [Cucurbita aspera amara] utriusque videlicet qualitatis ordine secundo: Est verò & insigniter amara, quamobrem & obstructos meatus expurgat, ac aperit: purgandi quoque vim per inferiorem ventrem, & quę ac silv. Pepones obtinet, si Dodonæo credimus. Vinum etiam, quod in excavatam hanc Cucurbitulam nocte totā permanferit, valenter quoque purgat, & biliosos ac pituitosos humores educit.

CUCURBITA AMARA PARVA, mediocris magnitudinis.

Colocynth. pyriformis. femina. Monspelio egregius Medicinę Candidatus, Anton. Dinoth, pro Colocynthide pyriformi nobis semina misit parva, Cucumerinis breviora, sed latiora, Cucurbitarum asperarum formā, in ambitu veluti linea lucida & splendentem circumducta, nucleum continentia non amarum, ac fere insipidum: cortice interim amaro. Planta quę nobis inde Montbelgardi enata, folia fert ceteris Cucurbitis asperis figurā similia, quędam profundius, alia minus profundē laciniata, quędam ad Xanthij folium quodammodo accedunt, ita aspera ac hirsuta conspiciuntur. Caules angulosi, flores parvi, lutei, ceteris alioqui similes: fructus parvus, pyriformis, albus. Caules summi valde amari, qui excreseunt ad multos cubitos, suis capreolis proxima quęque amplectentes.

CUCURBITA MINIMA lutea amara.

Cucurbita minima. Arantio similis, fuleata, lutea, cortex est durus, carne flavescente, amara: Tour. II.

semine parvo. Similem habemus ex Malinuster, pugno majorem, majorem verò precedenti, valde amarā, luteam cortice & carne: semine majore. Eadem forte cum precedenti.

CUCURBITA SESSILIS ET compressa, flava, amara.

Cucurbita hęc parva est & sessilis admodum, vix uncias quatuor alta, palmo latior, flava, cortice duro, seminibus parvis sublongis, insigniter amara. Accedit ad Sicilianam, non tamen simbiata. Provenit nobis anno 1606. Montbelgardi.

COLOCYNTHIS VETERIBVS, & in genere.

CAP. IV.

Colocynthis, quę aliis Cucurbita sylvestris [Dioscor. Cucurbita aspera. Corn. & Dod. legendum suspicatur] aliis Cucurbitula amara [Cucurbita aspera] & aliis Cucurbita Alexandrina [Cucurbita aspera] dicta est, samenta, foliaque emittit per terram strata, sativi Cucumeris similia, incisuris divisa: fructum verò rotundum, mediocris pilę similitudine, vehementer amarum: quem legere oportet, cum coeperit ad pallidiorē colorem vergere, Diosc.

Plin. l. 20. c. 3. Cucurbitam silvestrem asteram vocat, postquam enim de prima Somphos à Græcis appellata egit, sic ait: Colocynthis vocatur alia [Cucurbita silv.] ipsa plena, sed minor quam sativa. Utilior pallida, quando ejus sunt medicinz. Herbacea arefacta per se inanit alvum, &c.

Menses videtur marem & feminam facere. Præstantissima femina, inquit, præsertim si est magna, alba, lenis, rara, levis, uti ejus interior medulla albisima, rara, lenis, levis, &c. cumque languescere virore coeperit in luteum colorem mutati.

De Coloquintida apud Serapionem, præter ea quę de viribus ex Dioscoride, Galeno, Habix, Rase, Christiano, Aben Mesuai, & Abuberig habentur, hęc leguntur. Kandel, h. e. Coloquintida est Habix Melo agrestis. Et oportet quod ille qui colligit Coloquintidas, colligat eas in fine sui anni, quando sunt maturę, & color earum incipit fieri citrinus, & non colligatur illa, quę est viridis, quando videlicet incipit condensari sua Rosa, aut dum ipsa habet aliquid viriditatis, quoniam modicum ex ipsa occidit, & proprię illa quę reperitur sola in arbore sua occidit potantem se sine dubio, &c. Sed quando colligitur, postquam citrinatur pomum ejus, & est perfecte maturum, & hoc est, quando advenit frigus ei, videlicet quando accenditur lampas, scilicet in mense Septembri, in principio Autumni, consere potanti, &c. Et scias quod Coloquintida, quę oritur in rupibus & locis altis, est fortioris operationis, quam illa quę est propinquior aquis. Hęc fufius infra de viribus recensentur. Videtur autem Colocynthis, sylvestris, sponte nascentis Cucurbitę species illa, quam Morrem sive Exirium in cæcho, vocabant queribundi prophetę illi, qui apud Eliseum fame pressi, cum cibo indigerent, iussusque esset quidam incoquere pulmento olera, collectam magnam hujus copiam, ratus esse Cucurbitam eleulentam, olla indidit: Illi verò ut escitare experirent amarorem insistent, quasi in ortem detestati sunt, nec potit comedere potuerunt, tum ad Prophetam protinus exclamarunt, & Mori, inquit, Mori, est in cæcho,

quodammodo. Sed quando colligitur, postquam citrinatur pomum ejus, & est perfecte maturum, & hoc est, quando advenit frigus ei, videlicet quando accenditur lampas, scilicet in mense Septembri, in principio Autumni, consere potanti, &c. Et scias quod Coloquintida, quę oritur in rupibus & locis altis, est fortioris operationis, quam illa quę est propinquior aquis. Hęc fufius infra de viribus recensentur. Videtur autem Colocynthis, sylvestris, sponte nascentis Cucurbitę species illa, quam Morrem sive Exirium in cæcho, vocabant queribundi prophetę illi, qui apud Eliseum fame pressi, cum cibo indigerent, iussusque esset quidam incoquere pulmento olera, collectam magnam hujus copiam, ratus esse Cucurbitam eleulentam, olla indidit: Illi verò ut escitare experirent amarorem insistent, quasi in ortem detestati sunt, nec potit comedere potuerunt, tum ad Prophetam protinus exclamarunt, & Mori, inquit, Mori, est in cæcho,

Mori to. cæcho pro. Gerbing.

ne possunt pelli. Vates autem Elifens miraculis potens fructusque multis, farina adjecta pulmonum Colocynthisque silvestres dulcoravit, edendoque commodas reddidit: quare oportuit esse amarissimas.

PLANTA COLOCYNTHIDIS
nomine donata.

- Præter Colocynthidem vulgarem officinarum, Colocynthis nomen plantæ sequentes obtinuerunt. Cucurbitæ folio aspero amaræ, de quibus ante, ceu & de sequentibus.
- Cuc. aspera amara* 1. Cucurbita aspero folio, amara, grandis, oblonga, viridis.
 - Oblonga* 2. Cucurbita aspero folio, amara, grandis, oblonga, viridis.
 - Rotunda* 3. Cucurbita aspero folio, amara, grandis, rotunda, viridis.
 - Turbinata* 4. Cucurbita aspero folio, amara, turbinata, flava, candicantibus lineis inscripta, parva.
 - Non angulosa* 5. Cucurbita oblonga, non angulosa, colore viridi, amara, folio aspero.
 - Colore vario* 6. Cucurbita amara, magna, folio aspero, colore vario.
 - Fructu globo* 7. Cucurbita aspero folio amara, fructu parvo, globo, colore vario.
 - Pyriformis* 8. Cucurbita sive Colocynthis amara, pyriformis, variegata.
 - Cuc. lagenaria* 9. Cucurbita folio molli, flore albo, longa sive lagenaria.

GOLOCYN-
this.

Defr.

NOuora officinis poma huius quam herba, quæ per terram sparsa, striatis, asperis flagellis, folia per intervalla profert singularia, pediculis duarum triumve unciarum, vel etiam longioribus h-



rentia, aspera, incana & hirsuta, præsertim verò parte inferiore, pûdis albicantibus notata, lacinia, Citrulli divisa, sed minore, ad quorum pediculos exeunt tortiles capreoli, & ipsi quoque hirsuti. flores luteoli. poma pugno æqualia, Lob. subflava, virentia, virosaque: defecuntur exempto cortice flavescen- te: pulpa candida, fungosa, levissima, amarissima, horrenda & ingenter

amaro gustu, fauces, viscera, intestinæque lacerans, teste Lobelio, cui immersa semina parva compressa, dura (penèque lignum, Lob.) polita, sive, vel rufescentis, vel ut Dod. sordentis coloris.

Stemina longior.

Colocynthis hæc, fungosam obtinens medullam, græcè *κολοκύνθη*, latinè Colocynthis, Cucurbitula, Cucurbita amara, Cucurb. silvestris, Cucurb. caprina, Cucurb. deserti, Cucurb. Alexandrina, Thymbra, Autogenes & Tutrastra appellatur. Medicis Fel terrea & necem plantarum nominat: Scapius Kandel, Habix autem Melonein agrestem nuncupavit. Avicenna Hæanthel dixit. Apud Eliseum Prophetam Regum & Colocynthisdes *πάκος* s-

Edictura
Stem. agre.
su.

de, h.e. Cucurbitæ silvestres dicuntur à singulari nomen *πάκος*, h.e. Colocynthis. Vocatur autem in Ibraëlitica lingua *Chandel*: Germ. *Kürbiss*/Coloquint/ *Bitterkürb*/ *Wildkürb*/ *Geistkürb*/ *Erdegallen*: Belg. Quintappel: Gall. *Coloquinte*, seu *Courge sauvage*: Ital. Hisp. Angl. & Boheim. *Coloquintida*. Colocynthis porro, ut Cordus placet, diminutivum est à Colocyntha, i.e. Cucurbita. Apud Cordum in Diosc. quidam annotavit eam esse propriè Colocynthidem, quæ est fracta longiore: Alteram verò, quæ in pharmacopoliis utimur, Somphion esse. Idem in historia ejus l.c. 97. posuit Colocynthis huius iconem ex Trago. Verum hoc loco non ponenda erat, quia Cordus hanc Colocynthidem ibi non describit.

Dodon. in fol. lat. p. 373. figuram Lobelij exhibet: descriptio verò & reliqua conveniunt cum us, quæ tradita sunt in hist. purgantium. Idem p. 654. eandem rursus iconem habet sub titulo Colocynthis, inquit: silvestre autem huius (Anguriarum Anguria intellige) genus est Colocynthis dicta, de qua supra dictum fuit. Quia porro consimili esset facie cum Cucurbita sed multò minor tota, Cucurbitulam & Cucurbitulam, sive Cucumerulum vocarunt Hippocrates & Aegineta, ducti, ut ait Lobelius, potius soliorum aspectu, quam planè contrariis facultatibus.

Lob. dicitur Colocynthis sive Cucurbitula amara cathartica, ut Icon. p. 645. B. phyt. & pin. Colocynthis: sive fructu rotundo major. Cucurbita agrestis, Brunf. Colocynthis vera, Trago. Colocynthis, Matth. Ang. Cord. in Diosc. (& Cucurbita deserti) Gesn. h. (& Cucurbita silv.) Lac. Lon. Lob. (& Cucurbitula amara) Lugd. Cast. Cam. Ger. Colocynthis prima, Dodon. gall. mas, Tab. Dodonæ alicubi Anguria silvestris. Colore est viridi, magnitudine utramque manum replente.

In Germania (inquit Fuch.) sua sponte non nascitur, lata tamen provenit, sed rarsissimè perfectionem attingit, quòd frigidior sit ejus terra, quam quòd in ea fructum proferre possit. Ex orientibus enim & calidioribus locis ad nos defertur. Fuchio ad stipulatur Gesner. Cucurbita, inquit, silvestris species non reperitur, quòd sciam: nam Colocynthis, dicta Cucurbita silvestr. nescio ubi sponte nascatur, nisi in Græcia fortè. Lobelius perhibet hanc ferere Herbarie voluptatis studiosos Vere, in Gallia, Germania, & Anglia, fructumque decerpere Septembri, ac proinde purgationibus minùs aptum, eo qui ex Græcia, Hispanisque deferatur, exempto cortice. Nobis certè Colocynthis folio dissecto, sive officinarum Montheigardi sata sæpius in horto E.C. & alibi provenit, sine fructu tamen.

Vim habet medulla fructus purgatoriam, si ejus quatuor oboli ex aqua mulla sumantur: vel additis Nitro & Myrrha melle decocto excipiantur, & in pilulas cogantur. Ipsæ verò pilæ arefactæ tenentur, & utiliter infunduntur clysteribus ad coxandicum dolorem, paralyfin, & coli vitia: ut coxand. quæ pituitam bilem, strigmentaque, interdum etiam cruenta eliciant. Subditæ eadem, sicut enecant. Quòd si quis vinum exempta medulla obducatur luto, in eaque acetum ac nitrum fervesciat, decocti jus illud, dentium doloribus collutione proderit. Sin mulsis, aut potum in eadem decoquatur, & sub dio frigeat, potu crassum humorem, strigmentaque alvi detrahet: stomacho tamen supra modum adversatur. Sed & subditæ ex ea balneo alvi excrementa evocantur. Virentis denique succus prodest coxandicum dolori, si intretur, auctore Dioscoride. Gustu amara quidem est, inquit Galenus, sed quæ amarissimo medicamen-

to epo-

Repoto a sunt opera, ea evidenter efficere ne-
 quit ob peritiam facultatem, quam validam in
 se continet, nimiamque illis, quae expurgat, ante &
 ipsa per alvum excedere praeventens. Cucurbita, Co-
 locynthis vocata Plinio, herbacea arcta per
 se inane alvum. Infusa quoque clysteribus, inte-
 stinorum omnium vitis medetur, & renum, &
 lumborum, & paralyti. Ejecto semine, aqua mul-
 ta in ea decoquitur ad dimidias, sic sufficiens in-
 funditur obolis quatuor. Prodest & stomacho,
 farinae aridae pilulis cum decocto melle sumptis. In
 morbo vero regio utiliter semina ejus sumuntur,
 & prounus aqua multa. Curves ejus cum Ab-
 sinthio & sale, dentium dolorem tollunt. Suc-
 cus vero cum aceto calefactus mobiles sistit. Item
 spinæ & lumborum ac coxarum dolores, cum
 oleo si infricetur. Præterea mirum dictu, semi-
 na ejus si fuerint pari numero adalligata febrili-
 bus, sanare dicuntur, quas Graeci periodicas vo-
 cant. Et hæc Plinius, ex quo Dioscoridis loci
 declarantur, hætenus, ut ait Cornarius, à nul-
 lis interpretibus rectè intellecti. Primum enim
 confusa est lectio Dioscoridis græca & duo mo-
 di sibi vendi medullam ejus, in unum coaluerunt,
 paucis particulis elapsis. Sic igitur lectio distin-
 guenda est, velut etiam nos reddimus. *Quæ-
 ritur si hæc in ipso Dioscorido, vel ex eo tradita sit, an
 non sit hæc in ipso Dioscorido, vel ex eo tradita sit, an
 non sit hæc in ipso Dioscorido, vel ex eo tradita sit, an*
 Priorem modum docet aperte Aëtius lib. 3. cap. 35. Dan-
 tur ex medulla ejus scrupuli duo, in aqua mul-
 ta cyathis duobus. Posteriorem habet Plinius
 ubi ait: prodest & stomacho farinae aridae pilulis
 cum decocto melle sumptis. Deinde rectè dicit
 Plinius, Ejecto semine, aqua multa in ea de-
 coquitur ad dimidias. At in Dioscoride plerique
 contrarium intellexerunt, ipsam medullam vide-
 licet in aqua multa coqui debere: quod falsissi-
 mum esse Aëtius clarè ostendit eodem loco. Quod
 si mitius purgare volueris, inquit, sumito Co-
 locynthidem juxta magnitudinis, eamque aperito
 superne, & semen totum eximito. Deinde quic-
 quid tomenti speciem præ se fert in ipsa, rursus
 extra semen in ipsam indito, & repletam ipsam sa-
 pa, aut vino dulci veteri, per diem ac noctem
 macerari sinito. Deinde excolatum per pannum
 vinum calefactum bibendum dato. Hoc tamen
 interest, quod Dioscorides aquam Mulsam, aut
 Passum, in ipsa prius coquendum, deinde per
 noctem sub dio exponendum præcipit. Aëtius
 autem per diem solum ac noctem macerari sinit.
 Atque ita etiam Paulus lib. 3. cap. 13. Et hic sane
 usus hodie quoque frequentissimus est Medicis,
 qui illa utuntur, modum infusionis Colocynthidis,
 ipsi appellant. Medullæ hujus Colocynthidis (quam
 Hipp. *καυκινθιδος*, & *καυκινθιδος*, nominabat)
 apud varios Medicinæ autores, varia est dosis. Me-
 lites ceratâ decem: Paulus drachmam integram
 exhibere non veretur. Ruffus idem drachmam
 unam ex aqua multa propinat. At Aëtius scrup-
 ulos duos exhibet in aqua multa cyathis duo-
 bus: eodemque loco, imbecillibus etiam scrupu-
 lum unum sat esse scribit. Nonnulli volunt po-
 tum Colocynthidis, exemptâ medulla, simul
 & semine, lutozoumum incoqui aceto & nitro.
 Sed absurdum illud est. Modum præparandi di-
 cuti Colocynthidis plenius supra descripsimus ex
 Aëtio. Ruffus idem in libello de Purg. med-
 ullâ tamen medullæ factâ mentione, cum sic
 tradit: Quod si quis mitius purgare volet, semi-
 na Colocynthidis ejecta, affusaque intra coti-
 nem vino dulci, lento igne coqui ipsam oportet
 dum probe incaluerit, illud tandem potandum.

Tem. II.

exhibetur. Sed & Paulus lib. 3. cap. 13. eodem mo-
 do præparatum Colocynthidis dilutum in morbo
 conituali propinat. De Colocynthida Serapio
 ex autoritate Dioscoridis & Galeni tractat. Nos
 eorum verba ante recitavimus. Addit autem
 hæc ex opinione Hæbæ. Colocynthida, quæ
 est Melo agrestis, sumitur in potu, purgat phle-
 gma grossum, quod advenit juncturis, & illud
 phlegma quod emittit fumositates ad caput, &
 expellit humores qui aggregantur in corpore ex
 melancholia, & aliis malis humoribus. Et
 oportet quod ille qui colligit Colocynthidas, col-
 ligat eas in fine sui anni, &c. Illa quæ repen-
 tur sola in arbore sua occidit, potantem sine
 dubio, quoniam quando datur ex pulpa sua,
 facit torsiones fortes, & evomere fortiter, & est
 laxatio ejus sine juramento, & inducit tena-
 smonem, & anxietatem animi, & coarctatio-
 nem anhelitus, & frequentiam ejus & lyncopum,
 & sudorem frigidum, & fortassis interficit, sicut
 dixi. Pomum ejus perfectè maturum confert po-
 tanti, & expellit humores, quos volumus purga-
 re, & non est necesse, quod misceatur cum me-
 dicina alia. Sed est valde cavendum ne detur
 in potu in tempore magni frigoris, vel magni
 caloris, nam ista sunt duo tempora, in quibus
 nos docuit Hippocrates non debere dare medi-
 cinam laxativam, dixit enim in libro suo Apho-
 rismorum, Non oportet quod detur medicina la-
 xativa, quando ascendit scaphari, & in magna
 Hieme: & intelligit in Junio, Julio & Augusto,
 & per Hiemem voluit intelligi, in Novembri &
 Decembri & Januario. In istis igitur duobus
 temporibus anni non oportet quod detur medi-
 cina laxativa, & propne acuta, sed solum duo-
 bus temporibus aliis, volo dicere in Vere & Au-
 tumno. Quando igitur bibitur Colocynthida in
 hora magni caloris, nocet membris interioribus
 fortiter & nocet etiam stomacho, & expellit san-
 guinem per ora venarum, abradendo ea. Et
 quando datur in hora magni frigoris, facit arpa-
 uentem fortiter, quia natura non assentit ei,
 quare facit torsiones. Si igitur volueris Colo-
 cynthidam rectificare, & miscere cum aliis medi-
 cinis, purga ipsam primo à granis suis, & à cor-
 tice exteriori, adeo quod remaneat pulpa sua
 pura, deinde tere ipsam cum gammi Arabico &
 Dragaganto & Amilo cum omnibus istis, vel cum
 uno ipsorum, & quando addis et aliqua ex aliis
 Medicinis, pone de ea quantitatem æqualem ei-
 sed si vis admiscere ei omnes, pone de unaqua-
 que Medicina æqualiter, ita quod summa qua
 proveniet, sit æqualis Colocynthidi in pondere,
 & hoc quando facis medicinam laxativam, sicut
 sunt pilulæ. Verum quando vis ipsam ponere
 in Hieris, & medicinis magnis, non oportet
 quod temperes eam cum aliqua medicina alia,
 nisi cum illis, quæ ingrediuntur in medicina illa
 nec cures multum reprimere acuitatem eius. Et
 quantitas quæ datur ex ea, quando præparatur
 secundum istum modum cum medicinis aliis, est
 à quibus dauid [] usque ad unum Ki-
 [] Et scias quod Colocynthida quando
 extrahitur à pomis suis, & permanet sic diu, est
 minoris virtutis in laxando, & minuitur acuitas
 eius. Et quando tenetur, & dimittitur sic tem-
 pore longo, sit adhuc in hoc nuncius, & magis
 remissa virtus eius, sed quando dimittitur in po-
 mo suo, non recipit immutationem, nisi in lon-
 go tempore. Et oportet quod non colligatur Co-
 locynthida ex arbore, in qua ex una radice non
 est ortum, nisi pomum illud solum, quoniam
 argumentum totius radicis venit ad illud pomum.

HISTORIAE PLANTARVM

foliis, & auget in eo virtute a multam laxandi. Tanti igitur Coloquintidis in meritis propter acutitatem suam inuenitur, & foetida inquam, nam qui sumptus ex ea habet in danti, non retinebitur fluxus ejus, quousque me moratur. Etiam, quod ego vidi in omnibus hominibus qui degunt in terris magna fupiditate, quod in pluribus eorum videri super naturam eorum cholera nigra, quapropter non possunt in eis operari, nisi medicina fortis & acuta, sicut est Coloquintida, & sola ejus, proprie & folia, & Mezerion & Damasceni, & similia horum. Scamonea vero non est eis necessaria. Et oportet cavere, ne apponatur in aliqua medicina, ex cortice Coloquintidis, neque ex seminibus ejus, quoniam cortex est durus & sicus, & adheret vili stomachi, & intestinis, & pungi punctione sicut, & prohibet assellationes: similiter etiam facit cortex seminum, sed seminis ipsius oleum est calidum molliciatum. Et Arabes quidem infundunt semina ipsa in aqua pluviali donec recedat amaritudo eorum, & sic comedunt ea decocta, & alio aliquo modo, & prebet eis nutrimentum, verum quando comeduntur ex eis puris, inducunt fastidium, sed quando siccantur plantarum pedum in domo prima balnei siccatione forti, facit eos hanc siccatione egerere & vomere, & confert, & non augetur nutrimentum. Et quando fuerit necesse apponi Coloquintida in chistere aliquo, oportet quod apponatur in decoctione chistens inter gra sine constitutione & repressione aliqua, quia tunc confert colicam, & facit descendere humores grossos, crudos, & melancholicam. Sed folia Coloquintidis quando aliquis vult purgare cum eis, oportet quod colligantur ex arbore sua postquam maturuerint poma ejus & citrinescant, quando folia inquit ad refrigerari, in tempore videlicet quo chamus debet colligi poma ipsa, & siccantur in umbra, donec non remaneat in eis aliquid humiditatis, & sic tepinantur, & quando fuerit necesse, quod exhibeatur de iis in potu, oportet quod temperentur cum amido, aut Gummi Arabico, aut Dragaganto, cum vino islorum, vel cum pluribus, sicut diximus in Coloquintida ipsa. Quando igitur ponuntur cum eis, ex istis faciunt operationem mirabilem in expellendo melancholicam, & quando admiscantur cum eis medicinis convenientes ad hoc, sicut Alois, Anisum, & Epithymum, & Sal Indum, & si dantur in potu cum Fiera pira, est medicina purgativa multum. Et ego non vidi aliquam ex medicinis laxativis magis conferentem in doloribus melancholicis quam folia Coloquintidis. Et antiqui quidem desecrunt in memoratone ipsorum, & omiserunt usum eorum. Ita ego tentavi & dedi de eis in melancholicis, & alopecia, & tinea, & Lepra, & veneni iuvamentum magnum, & fortassis facient vomere illum qui sumptus ex eis, & nihilominus est in meritis in leprosis, & faciunt consistere agnitionem suam, & dolores suos & non petuntur augeri. Et scis tu quod ista est cura eorum, in quibus constituta sunt agnitione, nam a quibus membra coadherent, impossibile est quod remaneant eis propter hanc medicinam modo allegatam. Et scis quod Coloquintida quia vult in iis habet & hanc aliam, quae non est tabibina in modum placere, est siccioris & melioris operationis quam illa quae est propter aqua, & inhiabit ex eis & quoniam magis datur ex Coloquintida illi, qui est fortis, est pondus drachmarum, & ad danti danti, & est operatio quae conveniens hominibus qui sunt

danti parum ad laxandum, sicut illi qui degunt in regionibus humidis, & qui utuntur in cibis eorum lacte, & avena & mulibus, quia istorum natura non movetur, nisi per fortis medicinas, & quando ponitur in chistere, laxat humores crudos & melancholicam, & confert colicam, quando ponitur de ea in medicina, cum quibus chistezantur a drachmis in usque ad v. & coquitur & colatur aqua, & sic chistat cum ea. Et scis quid folia Coloquintidis quando accipiuntur ex arbore sua, & servantur, quousque annus unus pertranseat super ea, aut anni duo, aut tres, minuitur de virtute eorum & propter hoc necesse est, quod Medicus augeat in pondere eorum quando voluerit ex ipsis exhibere. Dixit Rasi quidam quod radix Coloquintidis est melior medicina quod esse possit punctura scorpionis, & Arabes habent ipsam pro conium & manifestam medicinam ad hoc.

Et dixit Rasi Arabs quidam quod scorpio pupigerat filium suum in quatuor locis corporis, & dedit ipsi in potu drachmam unam de radice Coloquintidis, & sedata sunt statim omnia, quae patebantur. Rectificatio ejus est cum Bdellio Chisthanus rem & linu super locum puncturatur, & daturque dolorem ejus, maxime radice Coloquintidis maleuit: nam foeminam aut mollem, albam, & esse debiliorem in hoc. Proprietas Coloquintidis est (ut ait Aben Mesua) quod mundificat cerebrum ab humiditatibus malis & expellit humores crudos, sed ipsa inducit punctiones, & tortiones, & tenationem in intestinis, & vomitum, & rectificatio ejus est quod admiscatur ei Dragagantum, & quidam admiscunt ei gummi Arabicum, sed Dragagantum est melius eo, quia juvat ad laxandum, gummi vero est stypticum & oportet quidem quod Coloquintida non teratur multum, ne adhareat intestinis, & ulceret ea. Melior autem est illa, quae est matura, sicciora in cortice suo, & interioris alba, & solenis. Cavendum vero est ab illa, quae est sola in sua arbore, quia est mortifera. Dosis Coloquintidis est a tribus Kiat[is] usque ad sex. Coloquintida (secundum Abuberg) purgat choleram admixtam humiditati viscosa, non illam quae est admixta sanguini, quemadmodum facit Helleborus niger, & Scamonea, sed ipsa trahit a membris nervosis, & ille cui convenit potus Coloquintidis est ille, qui habet agnitionem in capite suo, aut in velamine cerebri, quod est simile rectu, aut in alio velamine propinquo craneo, sicut est habens scotomiam, & hemieriam, & cephaliam, i.e. Ovum, & Soda, & habens stuporem & paralytiam, & spasmus, & humiditatem oculorum antiquam, & stichuram anhelitum ab humores grossos, & dolores puncturatum, & sciatum ab humores grossis, & agnitiones tenum & velicis. Et hanc Serapio ex au horitate Habix, Rasis, Chisthanus, Aben Mesua, & Abuberg.

Melurus Arabs inter alia huc reducere da vult ejus, potissimum cathartica, nobis sic descriptam reliquit. Immatura Coloquintidis sicut totum & molestissimos exuat, immodice purgat, ut est in fortis medicinis, & sepe mortem affert. pessima etiam ac venenosa est, quam produxit unicam tota una planta: quae plera si loco illo est unica, multo periculosior est fructum parum, praesertim si locus ille est ubiginosus, vel pulcherrimus, vel themas propinquus, vel serpentibus abundet praefantissima semina, praesertim si est magna, & sicciora quoque materia, alba, levis, rara, levis, uti eius interior medulla viscosa, rara, levis, quoque levior, eo melior: sicut ex agro laxo,

Cautio

Quoniam semina infusa in aqua pluviali

In Chistere quia deesse oportet in decoctione

Folia

Curatio

Amalgama quoniam quod daturur

Modus

Dosis

In chistere

Folia Coloquintidis

Et Rasi

Ita Rasi

Et Chisthanus

Et Aben Mesua

Dragagantum

Et Abuberg

Et Mesua

Immatura

Indica

Indica

Colligendi tempus. laxo, arenoso, libero, Autumno lecta, cum languescente virescente luteam colorem mutari. Calida est ac sicca ordine tertio, ignea substantia, et terrea per usum tenuat [seximie amara] consistat. pituitam & alios humores crassos & glutinosos, magis ex profundis partibus & distantibus, ut cerebro, nervis, musculis, juncturis, pulmone, thorace, quam ex venis attractos, ut Dioscorides censet, purgat: ac etiam bilem flavam, ut voluit Haiman. Quapropter distarum partium morbis mire subvenit, cephalalgia antiqua: dolori crani totius, hemicraniz contumaci, epilepsia, apoplexia, vertigini, aquosa fluxioni in oculum, podagra frigida, ischiadi maxime, ac reliquis nervorum juncturarumque affectibus; asthma item, ac tussi antiqua, dyspnoea ex thoracis repleti angustia, ac praeterea summè omnium prodest colico dolori, tam à pituita quam flatibus, & hydropi. Omnia autem haec sive sumpta, sive clystere, aut balano intestinali immissa praestat, utero autem imposita, foetum necat. eadem cum aceto forti afflicta, alios phos, lepram [psoram] elephantiam sanat. Oleum denique super cineres calidos incoctum, cortici ejus inanito, capillos illi nigrat, eosque nec cadant, firmat, canitiem tardat. Idem auri instillatum ejus dolorem ac tinnitum sanat. Acetum autem similiter incoctum collutione dolorem dentium sanat: incidit enim, tenuat, terget, digerit. Ne autem cordi, ventriculo, hepati & ceteris visceribus noceat turbando, subvertendo, violenter trahendo, miscenda ei sunt dictas partes roborantia, ut Mastiche, Gallia & similia, uti miscentur glutinosa, lubricando citius deturbantia, acrimoniam mordacem obtundentia, ut gummi, Tragacantha, Bdellium, Mastiche, & similia, ne amplius vias exulceret [per quas fertur] & ora venarum adeo vehementer aperiat, ut inde sanguis manet. Filius Serapionis Colocynthidem mulsam cui incocta fuerit Ruta macerabat [eius drachmā unam in mulsā cyathis duobus cum Ruta coquit Paulus, non Scapto] siccabat, levissimè terebat, ex multa praedicta dabat. Graecus quidam Colocynthidem rosato oleo fricabat, & cum aequali portione Ladani in cataplasia formabat, utilia praedictis affectibus. Ego autem eam minutissimè forcipibus incido, glutino & mucagine Tragacanthae aut Bdellij perlino, siccato, tenuissimè tero: cum Ladano, vel mulsā, vel Mastiche oleo rosato dissoluta, in pastillos coquo citra molestiam purgatorios. Quod si noxam corpori impresserit, multa, vel varum passiarum decoctum, cum oleo amygdalino, vel oleo nucum, eam abolet. Longam decoctionem sustinet, estque, ut mihi cum Serapionis filio videretur, contra filij Zesar sententiam, pulveranda tenuissimè, ut ejus facultas malefica permissa illi exquisitè alia plenius obtundatur, utque viscera celerius permeet, neque in ipsis ob partium minus tritarum crassitiem cesset: qua fortasse fit, ut in visceribus pigra retineatur, eaque ulceret, praesertim cum sensu perceptibiles fuerint ejus particulae. datur à iis sex ad decem, frigus & estum vitantibus. Agitur, attestante Trago, Colocynthidem vino maceratam, aut decoctam, his quos purgatos voluit, exhibere solent, ac ita quidem illos purgant, ut plerique suis concedant: hac arte ferè omnes Iudei inbuti sunt. ab his ergo Medicis, qui valetudini suae rectè consulunt cupit, abstinere. Semen Lobelio constat non tanta virulentia ad purgandum, quam caro ipsa sive medulla: dedimus namque, inquit, multo majorem dosim, quam medullae, majore

Colici dolor.
Ex Percol.
Alorbi in Sacerati.
Nona.
Aceto florentium est medicamentum.
Colocynth. germanica Trago.
Colica. Putrida. Ventriculi febres.
De dent. si ne dolor ex ferro extrahatur.
Cap. V.
Defectus in opusculo.
Semen co. no praef. tur.

enimodo, nullo aut longè minore tumulu. Scribit Dioscorides ejusdem semen ad mortuorum corporum conservationem ac condituram utile, praesertim Aloe ac Myrrha admixtis. Pater p.m. brevis prodidit, se ex clystere, quem Colocynthidis ingressa erat, summè debilitatum, & ferè mortuum fuisse. Fernelius Colocynthidem calidam siccāque dixit ordine tertio, amarissimam; lentam pituitam, crassosque, ac glutinosos humores, pariterque bilem utramque (quod vix alij concessum est) detrahente, & aquam citrinam, idque maxime ex articulis, & distantissimis reconditisque partibus. Conferre morbis inveteratis, contumacibus, quos neque Agaricus, neque Turpetum solverit. Vehementer autem ventriculum, viscera, corpusque conturbare, venas aperire, & sanguinem elicere, quam Aloe, aut aliud quodvis pharmacum, potens: intestina corradens gravibus torsionibus excruciare. Quocirca exquisitissimè tritam diluit oleo amygdalarum dulcium, additaque tragacantha, aut mastiche concinnari in trochiscos, vel coqui ex jure pingui, aut ex alio quovis liquore leniente. Nec puerorum, nec senum, nec praegnantium (foetus enim vel supposita enecat) sed aetate duntaxat florentium & robustorum medicamentum esse, vixque nisi aliorum permixtione tutum. Dari à scrupulo uno ad drachmam dimidiam. Quod si tandem omnino Colocynthide uti volis, accipere te jubet Tragus Germanicam nostram, pro similem, utpote in expellendo non tam firmam & immitem. Pilam ergo seu fructum Colocynthidis bene excavato, fungosamque ejus unā cum seminibus medullam cyatho vini inspicis, ac quatuor, aut quinque horis maceratam per linteorum exprime, expressumque succum, noctu cum cubito ire voles, bibe. quod si feceris, videbis luce appetente, pituitam, crassos ac viscosos humores, nec non bilem citra noxam leviter exigi. Idem medicamentum colicis prodest, & ad putridas ventriculi febres facit, hydropicis apprimè conducit.

Bayrus l.6. c.24. Colocynthidem silvestrem coquit, prius tamen tritam, & in aceto infusam, donec mellis acquirat crassitudinem, scarificat gingivas circa dentem, & jubet os claudere per modicum temporis, postea accipit dentem cum digitis, & sequitur sine dolore. Probet, qui volet. Nos fidem hujusmodi stultitiae non habemus, quamvis Schenckius l.1. obs. med. 424. de dentibus agens, eandem teneat opinionem.

CITRVLVS FOLIO COLOCYN- thidis secto, semine nigro, quibusdam Anguina.

C A P. V.

SPARGIT per terram firmenta fragilia, hirsuta, stipulis vestita amplis, in profundas laciniis diste-
dis, asperis & hirtis, & quorum sinu exeunt cap-
suli, nec non pediculi flores sustinentes lu-
teos, quos fructus excipiunt magni & rotundi,
quos ferè ambabus manibus ambias; cortex du-
nuculus, sed lavis, nullis tuberculis inaequalis,
atco-viridior, dilutissimè virentibus maculis per-
fusus: caro Cucumeris vulgaris, alba, firma, grati sa-
poris; semen fungosa medullam occupante sub-
stantia innascitur oblongum, latum, compressum,
nigrum, rugosum, duriusculo cortice praeditum; sub
quo medulla alba, esul grata, ut Cucurbitarum

Citruli ge-
nus aliud

Observavimus in horto E.C. Citruli genus majus, capitis humani magnitudinis equans, cortice cōtēctum duro, inæquali, anguloso, atro-virente, maculis ex luteo pallidis per longitudinem ex intervallis uncialibus notato. Pediculo herente gracili, si cum Cucurbitis eam conferas. Caro quoque quā cucurbitina, firmior est, saporis Cucumeris vulgaris. Semina Cucurbitinis minora,

crassiora, colore buceo obscuriore, nullis lineis per ambitum notata.

Spon.

Tetranguria

Sicya

Melopale

Sium

Cucum. Sa-

racen.

Cucumis

Vulgaris

Mila.

Cucum. ci-

trinum.

Anguria

Italor.

Angur. Ge-

ra

Citrull. offi-

cinar.

Melopepo

Semen e

qual. hor

matorib.

num.

Brassica

hollucina-

tur.

Cucumis

Hetruse.

Græcis Ge-

teribus

agnos.

An Citrulus hic sit Simeonis Sethi, cujus verba infra de viribus adscribemus, Anguria, Cucumis dicta, secundum verò communem sermonem Tetranguria, considerent lectores? Hermol. coroll. 166. vocat Sicyan quorundam, Angurium vulgi, & Melonem Palestinum. Serapioni dicitur Batecha. Chatha & Karusi, e Melo, Citrullus, & Cucumer. Iacob. Manlius Batecham Serapionis, & Albarbecam Avicennæ (quam nonnulli Cucumerem Sarracenicum, Anguriam interpretantur, & Languriam) unam & eandem plantam esse contendit.

Tragus Cucumeris genus facit, ac per omnia vulgari simile ait, sed magis exiguum, latis & phœniceis seminibus intus refertum: foliis Colocynthidi peregrinæ, aut Bryoniz similibus, multis incisuris dissectis. Hoc genus autem Citrullum, Citreolum, & Cucumerem citrinum vocat.

Fuch. quarti generis Cucumerem statuit, & officinas, quæ Citrullum vocant, respiciens, germ. Citrullen nominavit, gall. Citrulle. Cord in Diosc. Cucumeris quandam speciem vocavit, & Angustiam Italarum. Dod. in fol. lat. Gesn. de coll. stirp. & Tab. Anguriam. Gesn. h. Anguriam veram. Lob in Obs. p. 364. & Icon. p. 640. Citrullum officinarum. De hoc verò ait in Advers. Imitatur majorem aliquem Melonem effigie, & carne solidiore, fragili: sed sapore, vefcendoque magis Pepones vulgaros refert: unde Melopeponem, ut antipius natura, mixta de utroque nomenclaturâ dictum puto, nempe Mali sive Melonis circinâ rotunditate, non tamen torulis sulcata, & sapore magis Peponem, quàm Melonis dulcedinem melleam referente: quibus etiam, monente Galeno, discernitur à Melone. Semen verò unum è quatuor vocatis majoribus est; majus Melonis, minus Peponis, durior cortice septum, nigro, omnium durissimum: alioqui tota planta similis Peponum plantæ, sed foliis altioribus, laciniiis Colocynthidi propriis. Seritur etiam & manditur caro cocta, vel cruda, & plenisque Pedemontij, Italique hortis enascitur.

Citerum, hallucinari Brassavolam putat Matthioli, quod existimant veteres Græcos, præsertim Dioscoridem, eum appellare, Hetruseorum Cucurum, vel aliorum Italæ populorum Anguriam repræsentasse. Facile adducor, inquit, ut credam, Angurias veteribus Græcis incognitas. Eas nunquam vidisse, vel cognovisse veteres, demonstrat Fuchsius. Minus illis assentior qui Pepones Angurias esse dicunt. Anguria hæc, quam Dallaba appel-

lat Serapio, planta est folia torens Colocynthidi medicamentoſa, majora tamen, aspera, & perambitum divisa: caulē satmentosoſum, humi repentem, Cucumis & Pepo: florentem aureum, fructus magnitudine mirum in modum exuberantem, ponderosoſum, subrotundumque: cortice lavi, herbaceo colore, maculoso tamen, & eâ parte quâ humi facer, albicante, carne intus humida, aquosa, in quibusdam prædulci in nonnullis autem subacida, insipida, sique extinguendæ perquam idonea. Semen concludit latum, Peponum duplo majus, Cucurbitæ paulò minus, cortice solidiori, & nucleo grandiore. Est quoque seminis in colore differentia, quod uni nigrum, alteri rubrum innascatur. Seritur in hortis & viridariis, ac etiam in agris. Decerpitur fructus, & diu quoque asservatur in horreis. Trium enim acervis insidens, non solum à putredine detur, sed coquitur, si immaturus decerpatur. Hæc ille, qui Anguriam inscribit, vocatque germ. Anguriam, Gurden & Erdrapfel: hisp. Cagmora & gall. Comaire, meo judicio non absque errore.

Anguriz voce primo Aëtiua usum esse censuit C. Bauhinus, qui alias Citrullum vocari tradit à citreo colore, ac propterea Anguriam. Citrullum dictam vocat, variareque ait colore corticis, nunc virente, nunc maculoso, subcandidis maculis: carne nunc rubente & dulci, nunc candida: semine nigro, aut rubro, aut fulvo; rariis sine semine reperiri, Cæsalpino teste. Esse tandem narrat, qui Peponem Dioscoridis, Galeni & Plinij esse credant. Citrullus dicitur Trago, Gesn. h. Lon. Tab. officinarum, Lob. & Ger. Anguria, Matth. Ang. Lac. Gesn. coll. Dod. Lugd. Cast. & Cam. Cucumer, vel Cucumis citrullus, Fuch. Dod. Gesn. h. & Turn. Cucumer vulgo, Cxf.

In calidis regionibus Anguria suavior provenit, ideoque circa Romam, in Campania, Apulia, Calabria, & Sicilia, præstantiores habentur & mole vastiores. Dodonæus hanc in Germania raro ferri, raris verò etiam matureſcere scribit. Nobis tamen aliquoties feliciter provenit, ac maturuit in horto E.C. Montbelgardi. Genevæ ex semine dicto Citruli, floruit Junio, Julio, Augusto & Septembri. Basileæ in hortis colitur Citruli nomine, semen officinis vulgare, oblongum, latum, compressum, nigrum, & rugosum, in quo differt à Batecha, cujus semen læve, æquale, sive politum, nigrum & album, quod etiam majus.

Anguriz vires, quas hic primo loco tradimus, habet Simeon Sethi, non tamen asserimus cum intellexisse plantam, de qua præſenti capite sermonem institimus. Perpendant lectores an fortè Cucumerem vulgarem assignarit. Anguria, inquit, quæ Cucumeres dicuntur, secundum verò communem sermonem Tetranguria, ob frigidum & humidum temperamentum, noxia sunt, & mali succi. Ex his autem parvæ magnis anteferre oportet. Hæc utinam ducunt, & si in aceto macerentur, in acutis præſortim febribus, mitiorem calorem reddunt. Crebrior verò horum usus semen genitale minuit, in venere inque impetum aufert. Semen autem horum defecum, caliditatem quandam possidet, contrariamque his actionem efficit, urinamque magis provocat. Pivritam Tetranguria in ventriculo gignunt, quæ cruda per venas diffunditur. Propter ea qui his crebrius utuntur, illi propter humores temporis spacio in venis & aliis corporis cavitatibus coactos, longis corripiuntur febribus. Semen verò horum urinam cit, sed minus quàm Peponum, quoriam celerius in ventriculo corumpuntur. Meliora in his sunt, quæ habent semen exiguum. Calidus autem & siccos stomachos juvant, & si in ardente febre cum aceto porrigantur, valde profunt.

Pro-

Proprium vero horum est, nauseas, ventriculi calorem excitatis, sedari. Horum autem interiora esse oportet: nam quae foris sunt, mali succi existunt, & difficulter admodum coquuntur, & ferè venenata. Habent verò & alias proprietates, ut animo deficiente propter excedentem calorem reficiant. Si autem pituita in ventriculo nanciscantur, nauseas faciunt, & colicos affectus & hypochondriacas passionibus. Hæc ille. Anguria fructus, inquit Matthioli, frigidus est & humidus, ordine secundus, sit arcendæ apertissimus. Quo fit, ut Itali ardente Syrio, ejus pulpâ internâ se refocillent. Confert adurentibus febribus, & linguæ ariditati quàm maxime. Acutos humores vincit, & iis præsertim auxiliatur febrientibus, qui humorum malignitate magis, quàm abundantia scitent. Siquidem Anguria (ut Serapioni placet) alvum in principio fortiter non citat: idcirco in illis convenit, qui tenuis & imbecillis sunt temperamenti, macri & exangues: etenim his alterantibus magis opus est, quàm ducentibus humores, verum quamvis id effici possit acidis medicamentis, insipida tamen, quæ nonnullam dulcedinem habent (ut Anguria) hisce in casibus longè magis conveniunt. Impossibile enim est, quin acida, & quæ cum aceto parantur medicamenta, incidant & attenuent. Id quod imbecillia corpora, macra, & exanguia, haud quaquam sustinere queunt, quod e jusmodi acida potiones maciem augeant, & ventriculum lædant. Acqui etiam ubi quippiam acida adstringentia propinaverit, impossibile quidem videtur, ut obstructions non augeantur, si eas non cognoscere, & ejus meatibus extiterint. Etenim acida & adstringentia medicamenta exicant, & nihil prorsus humectant. Porro insipida, & quæ crassæ sunt substantiæ, quibus aliqua, ut in Anguria, dulcedo insit, suo quidem temperamento humectant, ac simul refrigerant, generantque in ipso jecinore sanguinem aquosum, qui flavæ bilis fervorem & malitiam coercet tam in jecinore, quàm in venis. Caterum, ut Dodonæus concludit, Anguriæ caro, quæ cortici subest, cruda, sed frequentius cocta comeditur: alimentum autem confert exiguum, idque frigidum ac humidum, sanguinemque ingeniat aquosum, qui internarum partium inflammationes mitigat, & bilis acrimoniam ac fervorem contemperat. Cruda in ore commansa linguæ in febribus asperitatem lenit, & sitim sedat. Semen facultate Cucumerum simile est.

CITRULO AFFINIS MELO

Indicus, sive Patheca.

CAP. VI.

Deser. **E**st apud Indos Melonis genus pregrande & rotundum, oblongius tamen aliquantulum, formâque quodammodo ovali, quod Lusitanis Indiam incolentibus Patheca (corrupto ab Indorum Batiec vocabulo) dicitur. Hunc Melonem per longitudinem non apperunt, ut Melopepones nostrates committunt aperiri, sed per trar. sverum secant. Et licet dulcedine à nostris superetur hic Melo, attamen suavis est, refrigeratque nigrum in modum & humectat, tota carne sese in quendam liquorem resolvente auctore Garcia (com. 1. c. 20).

Indic. **Batiec.** Reperiunt autem Arabes & Persæ primum hunc fructum ad se d. latum, eamque ob causam Batiec inde appellant i. e. Melonem Indicum, quo nomine etiam ab Avicenna multis in locis appellatur. Batiec enim eorum lingua Melonem sonat. In India verò ab ipsis incolis Calangari dicitur. Mentiunt hujus Avicennæ lib. 4. Fer. 1. c. 39. de tortana pura, ac eum multis laudibus commendat. Putarunt nonnulli id

Melonis genus, quod in Hispaniæ Castella nascitur, quodque Batiecas vocant, esse hunc Melonem Indicum & depravato à Batiec nomine Batiecas appellatum. Sed magnopere falluntur. Nam plurimum ab hoc differt cum solus, cum plantâ tota, quæ Melonum Indicorum modo per solum non extenditur & serpit, sed sese in altum extollit. Avicenna etiam in Africa Indicis similem nasci, sed cum non viderit auctor, affirmare hoc non ausit.

Loon. De Citrulo affine Melone Indico hæc scribit Linschottanus: In Java magni atque elegantes Melones aquatici proveniunt. Fructus hic suavis est admodum, obscure virens, intus albus, magnitudine Cucurbitæ oblongæ: quem incolæ suis hospitibus præcipui honorati loco apponere solent; propter insignem vim refrigerandi, qua pollent. In universa India appellantur Batiec.

Nos Citrulli officinarum semini lato, compresso & nigro simile, sed majus vidimus, magisque æquale, & lubricum, a viro celeberr. D. Theodoro Beza exhibitum, cujus duo genera, nigrum scilicet & flavum. Genevæ plantata duobus foliis productis perire. Ex India allata fuere.

B. pin. Melo 7. Indicus fructu oblongo: Batie Indici, sive Indicus Melo, Garz. Patecas, Anguria, sive Melo Indicus, Linsc. part. 4. Ind. or. c. 10. Melones aquatici in Java, Batiec in universa India par. 4. Ind. or. cap. 6. & fig. 20. An Comolanga Lud. Romani, Clusii Garz. Scalig. Lugd.

Utilis verò est in biliosis febribus & ardentibus adversus jecoris & renum ardore, ut experientia Garcias didicit. Urinas citet: solentque sani eum fructum edere, quatuor horis à jentaculo, quoniam tum maxime sit infestus calor. Melius tamen facere videntur, si ab eis suas mensas aspiciantur. Hujus semina (quæ ante maturitatem candida sunt, per maturitatem verò nigra) somnum provocant, eaq; reliquis seminibus frigidis, tametsi eis non carcamus, præstantiora æstimamus. Ignorabant eruditi hujus regionis Medici, istius Melonis in Medicina usum: non solent enim ad hujusmodi minutias sese abjicere, & in suis curationibus experientia & consuetudine duntaxat nituntur, sed à me (Garcia) edocti, eisuti coeperunt.

CITRULO VEL. MELONI

Indico accedens Camolanga.

Meminis Ioseph. Scaliger exerc. 3. par. 15. in Cor. Copal Indici provincie Camolanga fructus, qui estatur, & sesquipede major est, Cucurbitæ colore, humi, instar Melonis, jacentis, pulpæque plurimum habentis. Cum Melone vero Indico similitudinem quandam habere videtur Clusio apud Garciam, quam Ludovicus Roman. l. 5. navig. c. 15. in hunc modum describit: Habent in Calcut fructus quibusdam Cucurbitis similes, sed conditura priores. Res est non indigna memoratu, hinc non minus est Comolange. Oritur in culca tellure Peporum modo. An autem is est, cujus succum Turcæ, & Ungari in delitiis habent extinguenda suis gratia vel Napoca Bellonij Obs. lib. 2. c. 6. quam vulgari Arabica appellatione Copous nominari scripsit. Lugd. p. 187. vocat Camolangam. Muns. Cosm. lib. 5. Camolangam proveniente in Calcut. Portugalesis hist. gall. lib. 13. Malucanorum fructum, valde refrigerantem, Camulini vocatum.

CUCURBITINVS FRUCTVS INDI-

cus, magnitudine ovi Struthij.

Fructum hunc ex India allatum, accepi ab Illustr. fmes principissima, Ducissa V. Vintemberga, &c.



Page 2

7/4.

7/4.

CAP. VII.

Theoph.
Singer,
Saxa.

Shirley, Pa.
Pa.

Tempat:

Olson
H. J.

Sicyos tri-
genera
Labiatae
Syzalium
Boragin.

Temperature.

ANNALS OF
SOCIETY

Memorandum
for the President

См. 100.

Sig. eff.
Atto.

Sicya eß
Cucurbitas.
L. f. l. m. m.

100

videt quā
seruimus.

Cuc. Afric.
Cuc. Afes.

Oleum ad-
re.
Aqua de-
purat.

Langfami.

LIBER XVI

[illegible]

Cucumris
fructus
Diofco. De Cucumere sativa [see in the text] hinc scribit
Diofco. alio, stomachoque utilis est, refrigerandi vim obtinet, si modis non corruptum, ac
vesicę prodigiosa. Quę vero defetos animo recreat.
Sed & plus semon modice urinas cit, & cum lacte
aut pasto vesicę exulcerationibus lubvenit. Cere-
ruine iusdem folia cum vino imposita, catum prius
sustinentes ex melle verđ gummy odas. Idem de Pe-
Pepo Diofco. pone [see in the text] ait. Ipsa quoque Peponis caro
in albo limbo urinas impet. oculi vero inflama-
dones imposita lenit. Eius vero ramentum infan-
cium Enallab. erantum. in capiti imponitur: ac-
tionis quoque in maculiculis vice adligatur ad in-
hibendas venarum fluxiones. Porro luccus cum
limbo ad [see in the text] siccat. in Sole, satlem in-
gratus. nec repugnat alięque nrofentibus aliis. Ca-
terum sicca radix ex multa di. iud. pondere pota-
vomisones movet. Quod, u quis placide ac cura

Ecce nunc. Sapat quoque cum melle modica capis
 ulcent concretum modum favi, quae cernuntur.
 Et haec Dioscorides qui neque Cucumerem sativum,
 neque Peponem, ut vulgare nomen plantae, desci-
 pti, sed nec horum veterum ullus suis notis nobis
 illas representavit. Dioscoridis autem Pepones
 nobis quidem videntur hae Cucumides nostrae.
 Ejus vero Cucumeres, nostros Melones.

Cucumeres ut tradid Galeni, unum quidem, ut & Pepones cient, sed minus quam illi, quod ipso-
rum substantia minus est humida, adeoque non fa-
cile, ac illi, in ventriculo corrumpuntur. Invenias
autem qui ipsos bene concoquant. Qui autem eo
ipso sibi affatim sese impleverunt, tandem longo
tempore succum frigidum ac mediocriter crassum
in venis coacervant, quin ea concoctiones quæ in
venis fit, haud facile mutationem in primum san-
guinem recipit. Quam ob causam omnibus pra-
ter edulis abstinendum, etiam si ea quibusdam con-
coctu sint facilia. Nobis enim non advertentibus
præter succum ex ipsis post longum tempus in ve-
nis colligitur, qui postea æguam ad occasionem
putredinem nactus, febre malignas accendit. Et
hæc la. alin. Idem 8. simpl. Cucumeres esculentus ma-
turus quidem tenuioris essentia est, immaturus aut
tem crassioris. Sed & abstergendæ ac incidendi fa-
cultas eis inest. Quare & unum movens & corpus
splendidum reddunt, ac magis quoque si quis te-
mine arefacto, contusoque ac tribrato vico pulve-
ris absterforij utatur. Superat in eis frigida humi-
daque temperies, non tamen magnopere sed quasi
in secundo censetur ordine. At tamen si quis aut se-
men, aut radicem arefaciat, haud etiam humida fue-
rit natura, sed jam desiccantis, idque in primo quo-
dammodo ordine, aut etiam secundo, sed incipiente.
Est & in istis major abstergendæ facultas, quam in
fructu ipsius carne. Et lib. de euchym. & cacochym.
Sunt autem inter fructus Cucumeres, & Pepones &
Melo pepones. Sed quia bonitate succi tantum ab-
sunt, ut nisi celeriter transiant, in ventre corrupti
succum ex ea corruptione faciant mortiferis vene-
tis proximum. Huic sententiæ, ut assentiantur o-
mnes, ad stipulante ipsi etiam experientia, ut Di-
scipuli Carylji opinio reprehensione digna, qui apud
Athenæum Cucumerem noxium damnavit primum
idens, ut qui raphani modo visum feratur, ultimo
cibo in nocentioris esse, concoctusque sanctorum,
aliogque usum eis abdicavit. Contra eum prævisit
succo, ante alios omnes cibos sumendus, ut facilis
per alvum subeat, nec in eo corrumpatur, quod fa-
cile ei eveniet, si abis cibis postremus ingeratur.
Addidit his quæ vera sunt, ut nunc eo citius relin-
quendum habere, difficile in corpus distribuere, et
per venas in fractus evadere. Quia etiam horres
conitate, bilem creare, ventrem arere.

Plenissimo maxime gurgine in hortus Cucumeres, ^{plurimum} ^{increscant.} manifestumque capiunt incrementum, & ^{increscant.} mox maturioris echinoris inpleantur, ut tradit Athoræus, quod est aquei humidis incrementum. A multis Cucumeres expectantur, capitulisque mi- ^{A multis} ^{capitulis} ra eorum voluptate nec non odore emittis len- tius. Quare mutianda sunt cucumeraria, ne ir- rumpentes, ea depopulentur ac proterant.

• Martiamente inquit Pallonius, Cucumeres le-
minantur rari sulco foliis, & citrodinesque pedali-
laetudine pedum trium. Inter sulcos dēu pedum
trium erigunt relinquant, ubi possint vagari. Hoc
bis vivunt, ideo sarculo & runcator non indi-
gant. Sennā si ovillo lacte & mullo mactes, dul-
ce nascuntur, & candidi. Long. & teneri sunt, si
aquam in patenti vaticulo sub eis ponas, duobus
palms interiorē, ad quatuor folia. & c. les. etc.
Cren.

HISTORIAE PLANTARVM

Cucurbita Sine semine nascuntur, si prius eorum semina oleo sabino [seminis alij] perungantur, & herba ea quae Culex dicitur, tota conficiuntur. Aliqui florem Cucumeris cum viticulae suae capite cannae inforant, cui prius omnes nodos perforaverint: ibi Cucumis nascitur in nimiam longitudinem tensus. Oleum sic metunt, ut si iuxta posueris, uelut hamus plicetur. Quoties tonat, uelut timore perterritus conuertitur. Si eius florem sicut in sua vite est, in forma fictili claueris, ac ligaueris, qualem vulgum forma vel hominis, vel animalis habuerit, talem Cucumis figuram praestabit. Hec omnia Gargilius Martialis asseruit. Columella dicit, loco aprico & stercoreoso si Rubos habeamus, aut Ferulas, post Autumni Equinoctium, his iuxta terram rectis & excavatis ligneo stilo, inter medullas letamen immittamus, & Cucumeris semen addamus, hinc nasci fructus qui possent & inter frigora non necari. Hec enim, ut hyemen odit. Inuenta est ratio, ait Plinius, quae cibis seruantur Cucumeres usque ad alios proventus: & id quidem in muria fit. Sed & scrobe opato in loco arena substrato, saepeque sicco opercos, ac deinde terrae, virides seruari tradunt. Salgamarum hodie sale, aceto, Foeniculo, & Sampsucho condiunt. Alii trita sinapi cum aceto.

Cucurbita Sine graece dicitur, cognominaturque *huc* ad *huc* sc. differentiam: & Attico more *huc* & *huc*, & a Phrynichio Poeta *huc*. Demetrius uero, Athenaeo auctore, *huc* dictos esse ait *huc* & *huc*, i.e. quod uenerem ciant, cum contra ueneri refragentur. Inde proverbium fuisse commemorat Athenaeus *huc* *huc*, i.e. texens pallium mulier Cucumerem deuoret. Cum eam textrices magna ex parte, si Aristoteli creditur, sint impudice, ut in his ueneris imperus refragetur, adagium edendos Cucumeres textricibus consuebat: nam uenerorum auiditatem inhibere tradidit Diphylus. Quare *huc* *huc* nomen impositum fuit. At prius *huc* dicitur *huc* & *huc*, quod ad gignendos, spargendos, diffundendos ramos cauleque valde incitentur, non quod uenerem stimulent. Matron suis carminibus terrae filium nominavit. Heraclides Tarentinus Hedygeon, quasi terrae suauitatem. Recentiores Graeci Cucumeres *huc* uocant, & communi sermone, teste Simeone Sethi. *huc* Latinis uero Cucumis & Cucumer dicitur, a curuitate ut Varro placet. Arabes *huc*, *huc* & *huc* uocant: Germani Cucumer: Belgae Concomiteren: Galli Concombre & Cocombre: Itali Cocomero: Hetrusci Cedruso Hispani Cocombro: Angli Cucumbres: Bohemi *huc* Hung. *huc* & *huc*.

Cucurbita Tanta potest esse naturae cognatio, inter Cucumerem, Pepones, Melo pepones, & Cucurbitas, ut saepenumero & proprietates, & nomina Latini, Graeci, confuderint. Pepo enim, qui a Graecis Pepon, a Theophrasto Sicyos & Persicos dicitur, a Polluce Cucumerum generi contribuitur. Nec desunt, qui Sicyam hoc intelligant, quod vulgo Angurium & Palaestinus Melo dicitur. Athenaeus certe Sicyam ueteres pro Cucurbita uocare solitos affirmat, atque ita Nicandrum Poetam uti Georg. vol. 2. Apud Graecos certe Cucumeris appellatione Pepones quoque ueniunt. Plinius quoque tradit, ut ante annotauimus, Cucumeres cum magnitudine excessu Pepones uocari.

Cucurbita De Melone, Pepone, Cucumere & Citreolo in genere haec habet Tragus. In Italia & Gallia multa plantantur Melonum, Peponum, & Cucumerum genera, quae & in Germaniam commigrant. Habent uero Melones, Pepones, & Cucumeres ejusdem ferè formae folia, caules & flores, ac humi in sparguntur, quam in altum sele attollant, clavi-

Cucurbita culas, quibus proximos complectuntur fructus. Cucurbita longè magis exigua obtinent. Folia Melonum & Peponum rotunda sunt, aspera, ac minora Cucurbitae foliis. Ramuli seu viticulae duplici eoque luteo emicant flore, quorum alter decidit, alter uero (posterior) fructum facit, qui nihil aliud est, quam pomum quoddam, sed diversae formae, & coloris. Inuenias enim Melones & Pepones alios oblongos, alios rotundos, nonnullos luteos, quosdam uirides. Hi omnes foris cernuntur striati aut sulcati, intus uero succosi, seminibusque in utero lirata digestis refecti, odore suauissimi, jucundissimi, sapore uero satis dulces. Melonum & Peponum magna in agro Netherbergensi copia prouenit, nec non in Vngaria. Cucumeris folia asperiora sunt, majora & latiora Peponibus & Melonibus. Radices omnium rectae sunt, multisque ac candidis capillamentis fibratae. Maturantur uero eorum poma in nostris regionibus inter Aestatem & Autumnum, h. e. Augusto plerumque mense. Quemadmodum autem Dioscorides omnia Melonum, Peponum, & Cucumerum genera sub *huc* & *huc*, h. e. latini Cucumeris & Peponis uoce comprehendit, ita Germani omnia praedictorum generum poma, Melonen uocant. Cucumeres uero cum magnitudine excessu, Pepones, dictos Pseden / Galli P. pons nominant. At rotunda & citrei coloris poma, Melo pepones & Stapones a forma appellantur. Quae uero ex uiridi colore nigricant, gustique optimo praedita sunt, quidam Hircos & Hircinos (Germani Fodshoden) uocant. Galli Pepones Turqu. Cucumerem luteum, Columella Anguinum uocat. Reliquos Cucumeres uocant Citrinos, Citrulos, Citreolos, & Citrullus: Serapio Batetha, & Chatha, & Cura, i.e. Melonem, & Citrullum. & Cucumerem. Iac. Manlius Bathecum Serapionis, & Albathecum Avicenna (quam nonnulli Cucumerem Sarracenicum, Anguriam & Lar guriam interpretantur) unam & eandem esse plantam contendit. Hebraei Cucumeres Kishum, Chaldaei Kurrat (a qua uoce Chatheth Serapionis non multum abluat) Pepones uero Arthichum (quod a Batheia & Albatheia non multum abesse uidetur) & ut Thargum habet Hierosolymitanum) Malpanti uocant. Hac de re uide Num. xi. Et haec Tragus, qui una iconè plures comprehendit plantas, Melones, Pepones, Cucumeres uulgares, & Angurias, quae vulgo officinis Citruli dicuntur. Non distinguit praeterea inter Melones & Pepones.

Cucurbita Cucumerum genera Fuchsius sunt Pepones & Melones in quos statim degenerant, figura tantum & quantitate inter se dissidentes. Siquidem qui magnitudine excedunt, aut in longitudinem procedunt, quales multis locis nascuntur, Pepones quondam uocari fuerunt. Sed qui formam & effigiem Maiores sunt, & humi rotundantur, Melo pepones a Graecis uocantur, facti ex Pepone & Malo nomine, neque inter Pepones & Melo pepones aliud, quam quod ex figura quondam sumebatur, discrimen fuit. Totum hoc genus Palladius Melones, quasi pomos, a Malorum figura appellauit, quo nomine major pars hodie Medicorum simul enim officinis utitur. Sunt itaque in universum tria Cucumerum sanctorum genera. Primum genus absolute Cucumis, a nostrae aetatis Herbariis, & cum adiectione Cucumis citrinus, h. e. flavus, a colore quem habet cum maturum, appellatur. Aetius, quod ejusdem sciam primus Anguria uocari tradit, quae ueteribus, i.e. Cucumeres uocantur. Horum sane plura sunt genera: nos quatuor potiora commemorabimus quorum etiam picturas exhibemus. Primi generis est uulgaris Cucumer, sive oblongus oblongum & maculatum, germanice vocatur

catur germani Cucumern; gallicè simpliciter Concombre. Sunt qui illum privatim Anguriam appellant. Ad quod sanè nomen alludentes, Germani nostri alio nomine Gurchen nominant. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem vulgus Turcicum cognominat, priori multò major ac procerior, solius, floribus, & fructu, qui ut in primo non est maculosus, sed tamen oblongus etiam: Germani Turcisch Cucumeren nuncupant: Galli Concombre du Turc. Fructus ejus admodum flavus existit, hinc est quoddam multi eundem privatim Citrulum & Citreolum, quasi Citrinum, h. e. flavum vocent.

CUCUMER
TURCICUM.

CUCUMER
MARIN.

CITRULUM.

CUCUMERIS
ALTERUM
GENUS EST
PEPO.
CUCUMERIS
CERTIUM GE-
NUS EST ME-
LO.

FUCHS. re-
preh.

Dalech.
Per Cucu-
merem quid
intellexerit
Plinius.

Melo mini-
mus.

Gracum
CUCUMER
EST CUCU-
MERIS DALE-
CHAMPIUS.

Hujus semina alba & lata sunt. Tertiij generis Cucumer est, qui Marinus dicitur, Turcico quod ad folia, flores & semina attinet, ferè similis: nisi quoddam in hoc omnia sint minora: fructus verò rotundus: Vulgus *Zucca marin* vocat: Germani *Meer Cucumeren*: Galli *Concombre marin*. Officinis perinde ac Turcicus ignotus. Quarti generis Cucumer est, quam Officina hodie Citrulum vocat. folia habet ferè Colocynthis, multifariam dissecta & incisa, fructum rotundum, herbacei coloris, & in eo semina lata, & colore spadicea, h. e. in rufa atra. Ego officinas respiciens nominavi hunc Cucumerem Citrulum, germanicè *Citrullen*; gallicè *Citrulle*. Alterum genus Cucumeris est, qui nunc simpliciter Pepo, *and melon d'indes*, h. e. maturefcere dicitur. is enim mitis ac tener maturitate flaccescit: Germani *Pfeben* appellant, Galli *Pepo*. Tertium genus Cucumeris hodie Melon ab omnibus vocatur, Germani *Melonn* nominant, Galli *Mel. ns*. A priorè forma & suavitate differt: rotundior siquidem & Mali Cotonæ quali formam referens, minorque existit. Discremen hoc sentientes posteriores, Græci *melon* simpliciter dixerunt, quem nos privatim Cucumerem vocamus. Adjecta autem Peponis voce, hunc quem nostras gratias privatim Peponem nominat, *and melon*, i. e. Cucumerem. Peponem dixerunt, mitem sc. & maturitate tenerum Cucumin inuuentes. Sub quo eum etiam quem à tereti ac rotunda Mali effigie *and melon* peculiariter dixerunt, complexi sunt. Et hæc Fuchsius. Videtur autem valde indistinctè de Cucumere, Pepone, Melopepone & Anguriis scripsisse, miscens cum iis Cucurbita folio aspero. Præterea non sine errore Cucumerem sativum vulgarem, maculosum cognominat, & Anguriam dici credit: competunt siquidem ista duo nomina plantæ quam pingit nomine Cucumeris Citruli.

Dalechampsius author est Plinium Cucumeris nomine Gallorum Melopepones, vulgo *Melons* dictos, Cucumeres, Anguriasque complecti, & de iis diversa tradere, cuique suo generi tribuenda. Citrinos adhuc in Gallis vocari *Sucrades blanches*; nigros autem, *Sucrades rouges*. Cucumeres Italix virides Plinij, esse Pepones, i. e. Melones minimos & Malo Cidonio non ampliores, in Hispania adhuc cognitos. Idem apud H. Lugdunensem ait dubitari à multis an Cucumeris nostratis vires capite de Cucumere sativo. [*and melon d'indes*] exposuerit Dioscorides, an vulgaris Anguria. Sed Dioscoridem, cæterosque Græcos *and melon* nomine Cucumerem, Gallorum *Concombre*, intellexisse veris conjecturis affert eum esse Matthiolum. Dioscorides siquidem scribat Cucumerem silvestrem fructu solo à sativo differre, ejusque foliis, floribus, samentis que sativum prorsus referre. Quare cum iis omnibus Cucumis sativus silvestri prorsus similis sit, nemini dubium esse debere Dioscoridem de Cucumeris vulgaris, non de Anguriæ viribus *and melon* nomine tractasse. His accedere Plinij auctoritatem, ita scribentis: Cucumeres crescunt, quæ coguntur formæ, &c. Hæc enim de Cucumere nostro verissimè dici posse, minime verò de Anguria. Nam Angurias in Italia in

magnam excrescere molem, ac cum aqueæ sint substantiæ, ac prædulces cum maturæ fuerint, facillè à ventriculo descendere, quod Cucumeribus nostris evenire negat, quoddam frigido glutinosoque sint succo, ac ob id concoctu contumaces, nec non nisi longo tempore labi. Præterea Cucumeres eodem Plinio auctore, in fistula flore demisso, mirà longitudine crescere: & hoc in Cucumeribus nostris certè experientiâ se compertum habere. E quorum semine qui postea sint orti, eandem retinuerint formam, ut in vite sua pendentes longi, & angustum modo contorti spectentur. Adhæc natura oleum addisse mirè, ut idem scripserit, nec minùs aquas dilexisse. Dejectos quoque ad eas modicè distantes adrepsisse, &c. Hæcille. Cucumerem Dioscoridis nobis videri nostros Melones dicemus paullo post. Inquiremus etiam an nostri Cucumeres sint Pepones Dioscoridis.

Apud Theophrastum, inquit Cæsalpinus, & Dioscoridem duo tantum Citreoli genera traduntur: appellat Theophrastus alterum quidem Sicyon, alterum verò Sicyan: uterque vertitur à Gaza Cucumis, quamvis aliquando distinctionis gratia Sicyos Pepo, & Cucumer vocetur, Sicya autem Cucumis. Ex Theophrasti verbis colligere licet Sicyam significare Citreolum nostrum: hic enim figuram accipit loci, præcipuè genus illud intortum anguis modo. fortè & idem Sicyos intelligitur sc. Laconicus, qui melius evadit rigatus, id enim convenit nostris Citreolis: gaudent enim aqua ut Cucurbita longa: reliqua autem Sicyorum genera, quæ non rigata præstantiora sunt, optimè quadrabunt nostris Peponibus, & Cucumeribus, qui maturi cibis expetuntur: hi enim pulvere æstivo gaudent, aquas odorant. Dioscorides Sicyon masculino genere vocat; quam Theophr. Sicyan appellat; Peponem autem quem Theophr. Sicyon. Sicyos autem Dioscoridis vires Citreolis nostris conveniunt. Ex Peponis quidem nomine colligere licet Peponem accipi debere aliquem ex iis, qui maturi expetuntur in cibis, ut nostrum Peponem, aut Cucumerem, aut utrumque, sed ex eo usu, quo *and melon d'indes* i. e. ejus testa veluti calvaria pueris imponitur ad calvariam, significatur potius noster Cucumer; rotundum enim ejus cornu, & testæ modo fragile, & planitie ac levitate calvariam æmulatur: idem comprobatur & facultas refrigeratoria, & vis repellendi: hæc enim in Cucumere magis est manifesta, quam in nostro Pepone. Apud Galenum reperitur Sicyos, & Pepon, & Melopepon. Quæ autem de Sicyis inquit, ea profecto cum Sicy Dioscoridis conveniunt, i. e. cum nostris Citreolis. Quæ porro de Pepone scripsit, cum Dioscoridis Peponem concordant, & nostris Cucumeribus quadrant: Sed unum tantum anasam dubitandi præbet, quoddam inquit, homines in Peponibus, à carne intima, in qua semen habetur, abstinere: contra enim apud nos usu venit: gratior est Cucumeris interna caro, in qua semina, quam externa propè corticem. De Melopepone tandem quæ tradit, adamussim nostris Melonibus congruunt, sed eandem dubitationem afferunt, quam in Peponem indicavimus. inquit enim in Melopeponibus homines carnem intinam, in qua semina continentur, mandunt; idque ipsis ad dejectionem confert. Qui verò eorum quasi carne tantum vescuntur, non tam citò eam, ac Peponum excernunt: raro enim ex nostris Melonibus internam substantiam, fibrosam comedimus, sed tunc cum semine auferimus: idcirco suspitor errore aliquo commutata esse in eo loco vocabula Peponis & Melopeponis, ut rectius in hunc modum restituatur Galeni locus: Qui verò eorum quasi carne tantum vescuntur: non tam citò eam ac Melo-

Citreolus
Cæsalp.

Sicya 74m.
Theophr. est
Citreolus
Cæsalp.

Sicyon
Pepo D. J.

Cucumer.

Sicyos Gal-
leni est Ci-
treolus Cæ-
salp.

Pepo D. J.
et Galeni
idem est
cum Cucu-
mere.

Melopepo
Gal. n. sunt
Melones.

Galeni lo-
cus fuisse
ita resti-
tutus.

lopa-

lopeponum excernunt. Quasi hoc sit in causa, cur Melopepones tardiùs discedant, quàm Pepones: quia interna caro eorum non comeditur ut Pepo- num; vis enim ad dejectionem faciens magis in ea parte est: idèd si ex Pepone aliquis tantùm carnem duriorē assumeret, ut sit ex Melopepone, sentiret tardiorē Peponis descensum: huc accedit, quòd in Melopeponibus homines à carne intima, in qua semen habetur, abinent, in Peponibus autem mandunt, idque ipsis ad dejectionem confert. Plinius omnes hos fructus, Cucumeres vocat: nam Pepones & Melopepones inter eos recenset, quasi species. Cucumis tamen privatim ab eo intelligitur Citreolus noster Italicus, non solum parvus, sed & grandis, qui peregrinus est. Cùm autem inquit, Pepones vocantur, cùm magnitudinem excellere, consentit cum nostris Cucumeribus seu Anguriis. Cùm præterea ait, Ecce cùm maximè nova forma eorum in Campania provenit, Mali Cotonei effigie: fortè Melopeponas intelligit. Per non pendentes, qui statim à pediculo recedunt, manifestè Melones nostri indicantur.

Cucumeres
Plinij
quid?

Citreolus
Italicus.

Anguria.

MELONES. CAP. VIII.

De generibus
vitis.



Multorū generum Melones sarmentosis, asperisque & longis caulibus, per terrā se spargunt: foliis asperis angulosis, sed minùs, quàm Cucumerum, quorum respectu rotunda dici possent, quibus etiam magnitudine videntur cedere: è quorum sinu flores emicant lutei, cucumerinis similes, floribus pomorum Amoris pares, indidem plu-

res unà cum intortis capreolis, quos excipiunt fructus nonnihil pilosi, omnes ventrosi, modò sublongam aliam, contractiorem, rotundam figuram obinent, majores & minores, torosi & canaliculati, in superficie aliquas veluti à tineis corrosas semitas reticulatas habentes, colore virente, & cinereo: cortice duriorē, quàm Cucumeris. Caro subest per maturitatem coloris melini, mucilaginosa, humidula de fluens, ubi nimium matura, sapore suavi, moschum subinde redolens, aut saccharum resipiens: medullum occupat mucilaginosa quidam substantia, cui immerguntur semina, strobilis quodam modo similia, minora, candida, lapida, numerosa.

sapor.

Varietates.

Sicyo
Theophr.

Multiplex in fructu est differentia, non tantùm colore cutis, carnis, saporeque, & odore, verùm etiam formà oblongà, sessili, &c. Consideratis quæ Theophrastus scribit de Sicyo, nihil invenio, quod non convenire possit cum nostris Melonibus: ubi Theophrastus habet *αζυγι*, Gaza interdum vertit Peponem, sed plerumque Cucumerem: quin *αζυγι* sit Cucumis agrestis vulgaris neminem existimamus dubitare: is sanè majorem habet similitudinem cum nostris Melonibus, quàm cum Cucumere.

De Cucumeribus quæ tradit Plinius magna ex parte referenda mihi videntur ad nostros Melones vulgè dictos, cum quibus non fallimur, confunditur Sicya Theophrasti, sive Melopepones Galeni, & Cucumeres nostri vulgares: mihi faciliè persuadere si nam, à Tiberio Cæsare Melones potius expetitos, quàm Cucumeres vulgares. Quæ scribuntur de præparatione seminum, & de variis generibus, quæ etiam de Peponibus dicuntur, includè conveniunt, cum Melonibus, quorum sanè varia genera. quæ Dioleorides scripsit Sicyos lativæ nomine, videntur repugnare Meloni (nisi quis objiciat, quod ait *αζυγι*, quod potius videtur convenire Cucumeri vulgari) sola Cucumeris sylvestris, ut jam diximus, similia sunt, Melonum solis, quàm Cucumeris vulgaris.

Quæ Tragus, de Melonibus tradidit, ante posuimus. Dalech. apud Lugd. hæc particulatim habet. Sunt etiam Cucumerum species, Pepones & Melopepones. Sed ex Plinij verbis, *Cucumeres cum magnitudine excellere* etc. intelligere licet Pepones in genere Cucumerum esse, & Melopepones in genere Peponum: quos Palladius Melones appellat Mali Cydonij figura, quam referunt nomine composito Melopepones appellari. A Peponibus autem differunt, quòd Pepones majores sunt, magis striati, magisque succulenti, sed minùs grati, carne molliore & semine pauciore, oblonga figura, ut Cucumeres; Melopepones globosa. Hæc igitur Græcis, secundum Galenum *αζυγι*, h. e. maturum significat, quod omnibus aliis frugibus maturis convenit. Sed peculiarem fructum hoc nomine appellarunt, quomodo atramentum quo scribimus *αζυγι*, i. e. nigrum. Quare Medici non simpliciter fructum hunc nominare voluerunt Pepona, sed *αζυγι*, i. e. Peponem cucumeralem. Aristoteli *αζυγι* dicitur. & Polluci. Quir etiam *αζυγι*, de quo Dioleorides, Galenus & Plinius seorsum de Cucumeribus & Melopeponibus tractarunt, Gallis *Pepon* & *Poupin* dicitur. Ejus permulta sunt genera, quæ sapore, figurâ, & colore distinguuntur. Est enim ventricosus *Pepon*, qui à pediculo ad umbilicum usque striatus & canaliculatus est. Alius quam feminam vocant, *αζυγι* striatus. Quidam totum corticem texturâ quadam reticulatâ, nudo naturæ artificio conspersam habent. Aliquorum fructus grandis est, humani capitis instar, aliquando etiam major, nonnullorum longe minor. Sunt qui herbaceo sunt colore, alij flavo, alij pallido, nonnulli cinereo. Interior quoque pulpa varia: in quibusdam enim rubet, in aliis albicat, in nonnullis ex albo rufescit. In quibusdam dulcis & gustui suavisima, in aliis insuavis & insipida. Sunt item qui Hircini, & vulgo Turci dicuntur. Melopepones etiam varij sunt, nunc magri, nunc Mali Cydonij figurâ & magnitudine. Hortum caro interdum candida est, interdum flava, quandoque pallidior, aliquando solidior, aliquando laxior. Præferuntur candidi, solidi, ac sic dulces, ut saccharo corditi videantur, quos idèd saccharatos vocant, Galli *Sucirins* & *Succedes* vocant. Præterea quibusdam semen pulpæ finissimè inhaeret, ut cultelli mucrone particulatim evellendum sit, alij in medulla humida semen jacet, quæ concusso fructu separatur sponte, ac decidit à reliqua pulpa disjuncta. Sunt præterea qui olitorum mangonio Rosarum & Moschi odorem spirant, seminibus, qua parte germinant, parumper apertis, & aqua rosacea, quæ moschum exceperit, maceratis. Est generus quoddam hybernū, quod in area non maturat, sed flavescit laquearibus appensum, magna- que voluptate Hieme comeditur. Hoc Hetrusci melle saccharove condiunt Cærei pomi modo. Ac Citreus & Anguria Peponum etiam species sunt. Hæc

Sicyo
Dioleorides

Pepones
Dalech.

Melones
Palladij

αζυγι
Sicyo

αζυγι
Polluci

Pepones
Galli

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Pepones
Dalech.

Hæc omnia Peponum, Melopeponumque genera feliciter in Gallia proveniunt. Ex multis qui ex eadem planta nascuntur fructibus pauci sunt, qui bonitate excellent, ceteri sunt insuaves. Odor suavior, crassior pediculus, pondusque, bonitatis sunt indicia.

Videtur apud Dioscoridem mendosè scriptum pro *figura* positum fuisse, sicut etiam Dioscorides de Cucurbita dixit, *si de figura nunc tractemus*.

Ramenta ejus infantibus siccis vexatis simplici utiliter admoventur. Cornarius tamen vocis *figura* electionem non improbat, & significare contendit, sicut & apicem, ac summam Peponis partem, quæ recta cum utrumque præbeat; quem Cucurbitæ *figura*, q. e. ramentum.

Plinius, nisi mendosi sint ejus codices, Dioscoridi & Galeno planè adversatur, cum dixit radicem contra vomitiones sicari, ut legendum putat Hermolaus. Plinij lectio ita restituenta videtur Cornario: Eadem contrahit vomitiones: sicatur, & in farinam, &c. Et hanc emendationem perspicue approbat, sequens Plinij orationis contextus, sicatur, & in farinam tusa datur, &c.

Quod verò dicit radicis farinam in smegmate addi, an de eadem Dioscorides intelligat, cum scribit succum cum semine admixtum, ad farinam siccaturam in sole cogi ad smegmata, dubitari sanè potest. Nam et si radicem eandem quam Plinius vomitiones concitandi vim tribuat Dioscorides, nullam tamen adhuc radicis mentionem factam, ejus farinam qui potuit intelligere? At cum ad eum usque locum de Peponis carne tantum tractaret Dioscorides, cum etiam hæc Galeno absteigendi vi prædita sit, magisque semen ipsius, ejus carnis exsiccatæ farina hoc loco accipienda videtur, vel *si de figura* simpliciter farina aliqua vulgaris, ut triticea, vel hordeacea, quæ si non ad abstergendum, certe ad pastillorum formam effingendam, succo & semine admisceatur, eaque forma illa excipiantur. Quod porro radici Peponis tribuerunt Dioscorides & Plinius, Galenus ipsius Peponis carni adscripsit. Hæcenus Dalechampius, qui Peponis speciem Citrulum quoque constituit, dicens: Peponis sive Cucumeris species est, qui Citrus Medicis dicitur, quasi Citreolus, Avicennæ verò Batheca.

Est autem Batheca sive Batheca nomen commune ad omnes species Melonum, & Anguriarum. Scripio cum de Peponibus & Melopeponibus ex Galeni sententia dixisset, peculiare de Anguria caput subiecit, quam arabicè Dullaha appellat, in cujus historia & viribus exponendis, cum nulla Græcorum, sed Arabum duntaxat testimonia proferat, facile intellectum est Angurias veteribus Græcis penitus fuisse ignotas. Eam ob causam eos hallucinari, qui Pepones Angurias esse arbitrati sunt, in consilio est.

Fuchii iconem nomine Peponis habet, qualem nos ex eo proponimus, & genus Cucumeris facit, ut ostensum antehac, ubi ejus verba transcripimus. ibi sanè multa indistinctè tradita videntur.

Non desunt qui dicant Melopepones Galeni lib. 2. aliment. communes nostros Melones esse. Pepones verò, quos in eo genere Veneti vulgo *Pipone* vocant. Ego autem quamvis dubius sim (inquit Matth.) inclinor tamen animus ad credendum per Melopepones Galenum, nostros Melones intellexisse, si modo ipse eorum unquam habuit notitiam. Cum illis porro non mihi facile convenit, qui Venetas Piponas dictas Galeno Pepones esse existimant. *Item* Græcis, Peponem item Latinis, Mauritanis Batheca, seu Batheh: Germani Pseben & Melon & Melann: Gallicis Melons. Idem in comm. post. cum magn. fig. vocat vulgari nomine Melons & Pepones, addens

Tom. II.

diversas esse species, formam, colorem, & odorem. Differentias adhuc speciei meminit, quæ servatur ad primum Ver. In his. germ. vocat magnos Melones latine Pepones, parvos verò & rotundos Melopepones. Adhuc Melonum speciem reperiri ait tenuissimo cortice, errareque toto exlo, qui Pepones, vulgares Cucumeres faciunt. Sed errat ipse.

Lob. adv. vocat Melonem vulgi, Cucumerem antiquorum, & Melopeponem Dioscoridis, affignatque varietatem Peponum esse magnitudinis, coloris, & odoris. Invenit quippe speciem quandam Moschatelinam, quæ vix Colocynthidem aut Arantium superet, odore moschi, sapore delicatissimo. Esse & alteram cortice, carneque albam, sapore etiam perjugundo. Vel hoc uno argumento tandem asserit Melones nostros, sive vulgi Italici Pepones, esse antiquorum (præsertim Dioscoridis) domesticum Cucumerem, sive Siccam Levam, quia odore, eximie fragrantia, & Cytoni mali, aut Pomorum redolentium æmulo restitueret vires languidas & reficiat, spiritusque dissipatos revocet animo lapsis, ut idem Dioscorides author est: eoque Melones, quasi Pomolos, merito vocatos fuisse a recentioribus Græcis, quod omni ac stomacho, tribus sint gratissimus, omnium hujus generis.

In Obs. p. 364. dicitur ei Melo vulgi & Melopepo Dioscoridis: in Icon. p. 355. Melo vulgi & Cucumis antiquorum. Brunfels. & Trago Melo, ut & Gesn. de coll. (cum & Melopepo). Dodon. in fol. lat. vulgo Melones, Ital. Melone. Hisp. Melon. Gallic. Melons, Germ. & Bohem. Melon. Belg. Melocacen. *Item* autem Græcis pomum significat, proinde rectius Melocacen hic Cucumis Dodonæo appellandus videtur, Pepon videlicet Mali odorem referent. Nam hujus fructus odoriferis malis odore sæpenuerò vicini sunt, subinde verò & obscure moschum redolent, qui idcirco & Moschatellini cognominantur. Galenus hunc pro Cucumi habuisse videtur, qui Græcis *εὐκλινής*, Lat. Cucumis laevis.

Icon hujus proponitur a Tab. pro Melone, nec illa displicet: verum tunc ratione & imperitè per Nicol. Braun pro Melonibus & Peponibus proponuntur icones tredecim, multum inter se differentes, & diversarum admodum plantarum, nec tamen earum ullum traditum discrimen, nec ulla descriptio.

B. phyt. vocatur Melo i. sive vulgaris, nunc fructu varians. Est enim, inquit, nunc oblongus, alias contractior rotundioris figuræ, alias modicè depressus, & sessilis: subinde major, qualem Tab. & Ger. Melonis hispanici (de hoc nos Dioscorid. post dicemus, nunc pingis quandoque minor. Cortex alius asper, rugosus & tuberosus: & hic est Pepo strumosus, Lob. adv. alius laevis: nunc viridis, nunc cinereus, nunc pallidus. nunc varius. Pulpa alius rufa, alius candida, virensque, quibusdam suavior, quibusdam moschi odore, quorum Dodon. & Cord.

[in Dioscor. hist. Moschatellinorum Peponum nomine] commemorat. Aliqui æstivi, alii hyberni ad Hiemem perdurantes. Habentur Cameratio in oriente Americæ & abj. Italici, Patavini item Zatti dicti, & Neapolitani, in quibus semina adeo tenui cortice teguntur, ut excoctata videantur, idcirco Gymnospermi dicuntur: Sunt denique & Pilosi. Cucumerum genera censentur Pepones & Melones, qui videntur potissimum figuræ & quantitate differre: quoniam majores sunt & oblongi, Pepones dicti fuerint: qui vero formam & effigiem Mali referunt, Melopepones, quod nomen adhuc hodie in usu est. Sequens statim possunt Cucumeris genera, primū Cucumerem, de quo alias: Secundū Melonem, Tertiū Peponem.

Sycion.

Melo autem, Theophrasto Sicyon, Plinio Cucumis Mali Coronei elligie. Melopepo Galeni: forte Cucumis antiquorum. Haftenus C. Bauhinus, cui & in pin. Melo i. vulgaris: Melo, Brunf. Trag. (& Melopepo) Lac. Tab. Ger. Pepo, Matth. J. C. Fuchf. Lug. & Cast. Pepo, grandis Melo, Cord. hist. Cucumis Galeni & antiquorum, Dodon gall. Melo vulgaris, Melopepo in Graecia, Guil. Melo sive Pepo vulgi, Cucumis Galeni, Dod. Melo vulgi, sive Cucumis antiquorum, Melopepo Dioscoridis, Lob. Melon vulgo & Pepon, Sycion Theophrasti, Melopepon Galeni, Czf. Melopepo, Gefn. h. Lon. Lugd.

MELO RETICVLATVS.

Deser. fructus.



Melo reticulatus pedem ferè longus, qui crassitudine utrunque utramque manum implet, profunde corniculatus, cortice est ex nitido rubescente, deinde aspero, rimoso, reticulato, cinereo: carne sublutea, sive melina, satis firma, sapida, subacida: medulla intus fungosa, albescente: seminibus oblongis, subluteis: aqueo humore, subacido.

Hortulanus asserbat facile putredinem contrahere,

ubi pluvia tangatur, quem propterea magna cum difficultate colit Montbelgardi in horto E.C. maturum medio Augusto.

MELO HISPANICVS.



Invenimus apud Tab. & Gerardū Melonis hujus Hispanici figurā, verum nullā additā descriptione. Quare si nō sit signum, qualia nonnulla proponit, ejus delineationem i tandem addere poterunt Historiae nostrae, quibus notum erit Melonis hujus Hispanici discrimen.

B. in suo phyt. & pin. si scripta ejus intelligimus, Melonem vulgarem majorem modicè depressum & sessilem vocavit.

MELO MAGNVS CORTICE

virente, levi, semine parvo.

Melo capite pueri nuper nati paullo minor, longior nonnihil quam crassior, cortice exter-

nè virente, levi, lucente, quibusdam in partibus rugis habente asperas, quali inscriptiones: costis duas uncias latis, non admodum elatis. Sub cortice caro latet durior, unciam penè crassa, tenerior paullo, grata admodum, & odorata: licet anni constitutio parum comoda fuerit pro Melonum maturitate: semina sunt valde parva, latiuscula, alba.

Delatus hic Melo Vesutius, degustatusque mensis Octobris 7. die, in arce Bessfordiana, quo nec meliorem, nec gratiorem, & odoratiorem comperimus.

MELO TVRBINATVS.

Melo turbinatus primò non multum largior, quam manu comprehendi possit, pediculum versus in angustum desinit, ut solent pira. Costas ut cetera genera habet, satis eminentes, unciam politas, latis: in superiori parte cineritias, maculis rubris notatas, earundem costarum partes depressas, rubentes, pilisque quibusdam asperas. Maturus rugosus non fit, jucundum spirat odorem, coloremque non mutat, & cortice exteriori rubet. Caro dura, multa: mollis verò pauca, sed lutea, sapore gratissimo, & dulci: odore grato: paucis aqueo humore imbuta: semen angulosum, maturum in horto E.C. Montbelgardi Septembris principio.

MELO MOSCHATELLINVS,

rotundus parvus, & pyriformis.



Tam Möthelgardi in horto E.C. quam alibi Melonis hoc parvum genus provenire observavi, odoris & saporis gratissimi, de quo Lobel. in adv. verba fecit (quæ ante adscriptissimus) & in Icon. p. 640. iconem exhibuit pro Melone saccharato.

A Ger. & Tab. ic. & hist. (ubi sola icon) inscribitur Melo saccharinus, ger. Zucker Melon: A B. phyt. & pin. Melo i. sive rotundus parvus.

Dantur aurei, parvi, in modum pomorum Arantiorum, Cam. vel ut Casimiri rosei magnitudine. Meminit & Garzias Melonis genus in Hispania, quod Budiecas vocent. Eid. B. pin. Melo i. pyriformis moschatus: Melo saccharinus variegatus. Eyst. Nos iconem nostrā priorem Melonem moschatellinum demonstramus.

MELO LONGVS.

Melonem hunc pulcherrimum antehac nunquam visum observavi Grandi illius, longitudinis quatuor circiter palmorum, incurvum, ut cornu vaccinum, non ita crassum ut vulgarem Cucumerem, sed multo longiorem, sapore, ut refertur, pulpā, seminibus, ac etiam foliis idem, cum jam dicto.

Melo

Melo hic albus ita nobis denominatus, Montbelgardi in horto E.C. ex seminibus per eundem E.C. delatis provenit. Erat hic pingendus & describendus: verum oborto nris in tempestivo gelu, meque absente, id, me quidem adhuc dolente, neglectum fuit.

Locum.
Tempus.

De loco & tempore Melonum verba facere reliquum est. Melonum igitur & Peponum, ut ante ex Trago constat, magna in agro Norimbergenfi copia provenit: nec non in Hungaria. Maturantur autem Augusto plerumque mense. Scribitur teste Dodonzo, locis cultis: tumulos amat, Soli vel maxime expositos, terram verò mediocrem, non minus pinguem, aut stercoreatam. In Germania & Belgio non nisi serò, & cum astrum calens, ac sicca fuerit intemperies, ad maturitatem perveniunt. Melones in gulæ delictis crudos suavissimos habet universa Italia, Galloprovincia, Narbonensisque, & Valconia: nec non inferior Austria & Pannonia. Cæteris regionibus ad Boream, ut Franciæ, Belgio, & Angliæ agrè, aut insipidiore proveniunt, nec plerumque maturitatem consequuntur, præ imbrum copia, & caloris inopia. Nos Melonum differentias & genera varia vidimus Montpelij, Batilæ, Lugduni, Genevæ, in Alsatia & aliis locis, quos particulatim non annotamus. Julio & Augusto maturantur.

Vires &
Vj. m.
Temperamentum.

Vires, quæ Melonibus ex veteribus competere possunt, ante recensuimus. Dodonzo frigida ac humida Melonum caro est, difficilisque quam reliquorum Cucumerariorum concoquitur. Quod & Aëtius testatur, in ventriculo, si diutius hæreat, corrumpitur & malignis febribus occasionem præbet. Nos verò nequaquam Dodonzo concesserimus Melones difficiliter concoqui Cucumere vulgari, ipsa carne molliori odorata, contrarium, scilicet concoctionem minus difficilem, demonstrante. Ipse etiam qui ventriculo laboro frigido, & pituitam coacervante, non semel observavi, mihi Cucumeres facile nocere & difficulter ventriculum meum eos concoquere, ructu diu post eorum eisdem respicientem. Melones verò semper sine manifesta comedi noxa. Ne autem Melonum caro per concoctionem in ventriculo vigetur ac corrumpatur, noxamque aliquam facile inferat, solent Viennenses Austriaci, ditiores præsertim (quotannis enim serè non duntaxat domestici, verum etiam exteri regnorum adjacentium Melones divenduntur maxima in copia) cum pipere & saccharo eos comedere, vinumque generosum superbibere. Esitantur tamen etiam cum paucis sale & pane. Vocant Melones suo

Curelio.

Emulsi-
onem se-
minum de-
lousum.
Febri ar-
dens.

idiomate Bluzer / & seminum Melonum emulsionem Bluzer milch / h.e. Lac Melonum, præstantissimum in febribus ardentibus remedium. Seminum autem medullam aqua fontana aut alio aliquo liquore congruo prius contulam, per cribrum setaceum emulgent angustissimum, aut pannum ad institutum accommodatum. Seminibus hic Melo-peponum & Peponum cremor febrientibus utiliter ex hordeacea prisana, teste Matthiolo, propinatur, non solum enim refrigerat, sitimque extinguit, sed etiam obstructions tum hepatis, tum viscerum expedit, & urinam provocat. Datur tussientibus, tabidis, & marasmo affectis: atque etiam contra urinæ ardores valde prodest, additis pastillis ex Halicacabo, aut Glycyrrhizæ succo, Mannæ, Gummi Arabici, aut Tragacanthæ momento. Sed & magis confert, si seminum Papaveris cremor accedat, baccarumque Halicacabi, & Malvæ decoctum. Ex Melo-peponibus in particulas sectis, Ari, Bryoniæque radicibus, & Limonium succo, ac caprino lacte, quod hæc omnia superet additis, aqua vitreis organis, ut vocant, destillatur, qua faciem mulieres adornant, & concinnam reddunt.


Obstructiones.
Vrina ar-
dens.

Aq. destil-
lata.

Facies in-
concinnæ.

Tom. I L.

MELONES ABDELLAVI Ægypti.



EX Melonibus Descri-
Equosdam à no-
stratibus planè di-
versos Ægyptij
habens, quos Ab-
dellavi vocant, ad
differentiam alio-
rum quos Chaïar
[Melonum apud Æ-
gyptios genus Alpino
sine iconæ. B. pin. Me-
lo 6. (5. phyt.) sive
Melonis Ægyptii al-
terum genus,] no-
minant.

Quorum usus ad res
cibum haud mul-
tum jucundus per-
cipitur, cæterisque
omnibus insipi-
diores, ac molliori
pulpâ observan-
tur. Habent tamen semina, quæ aliis omnibus lon-
gè magis ad refrigerandum præstare putant. Qua-
dere, omnes ea plus aliis in usu frequentiori ha-
bent aliorum Melonum semina parvi facientes.
Planta à nostratibus non multum differt, sed fru-
ctus fert oblongos, acutos, extrema, & medium val-
de crassum habentes, Bahobab alibi narratis fructi-
bus proximis. B. pin. vocat Melonem 5. (4. phyt.)
sive Ægyptium.

Semina.

Planta effi-
gies.

Melo Æ-
gypti C. B.

MELONES INDICI, AM- plissimi.

IN Americæ insula Madagascæ, sive S. Laurentij, re-
ferente Theveti libri sui de America cap. 23. mi-
rabili crassitudinis Melones reperiuntur, & tantæ,
quantam quis ulnis amplecti possit, coloris ruben-
tis, & in quibusdam albi, alij lutei, salubriores mul-
tò nostris, potissimum Lutetianis, cultis in aqua &
fimo, magno sanitatis detrimento.

Color rubi-
rius.

MELONES PERUVIANI.

Melone in valle Peruana tantâ felicitate prove-
niunt, ut radix caudicis crassitudinem assequa-
tur, & viva aliquot annis in solo vigeat, quæ quot-
annis Melones profert, cujus luxuries non secus ac
cæterarum arborum amputatur: Ioseph. Acoſta l. 4.
c. 19. B. pin. Melo 8. Melo peruvianus.


CUCUMIS VULGARIS, VIRI- dis & albus.

EX radicibus rectis, multisque candidis capilla-
mentis fibratis, hirtis sarmentis, crassisque humi-
fufis, alternatim adnascuntur folia, palmi unius,
aut alterius quoque versum amplitudine, tactu a-
spersa, angulis hederaceis cæsa, & serrata, scanden-
tia, Melonum foliis asperiora, & majora, latiora-
que, è quorum alis capreoli exeunt, & flores (Lob-
lilacæ, ex luteo pallentes, conniventisque noctu,
aut marcescentes Volubilis ritu) quinquepartiti,
semuncia majores, duplices: quidam enim deci-
dunt sine fructu, alij producant fructus oblongos,

Descri-

X 2

utrinque turbinatos, viridanti colore, aut albo: viridantes autem ubi maturi flavescent, semipedem



Sapor.

longi sunt, pariter ventricoli, angulosis: verrucosis, subnigricantibus tuberculis asperatis: cortice teneriore, carne duriusculâ, candidâ, transparente, laxâ: sapore non ita grato, ut Melonum, inquit Tragus, sed peculiari quodam & agresti: semine copioso, pineolis putamine exutis accedens, compresso, angusto, Melonum seminibus adeo simili, teste Lobelio, ut nequaquam, nisi quia angustius [non omnibus Melonibus]

& pusillo apiculo subtus protenso donatum est, disceperet: medullâ lactescente, admodum suavi, & multi usus officinis.

Medulla.

An Sicya Theophr.

Plin. nat.

Cuc. vulgari.

Cuc. lan. gur.

An Peponem Diosc.

Sicya Diosc. est Melon.

Melo-peponem Galeno.

Anguria non est.

Cuc. luteus Tragus an guina Col.

Iam descripta à nobis plantæ, Cucumeri scilicet communi, an respondeat Sicya Theophrasti, considerandum? Eam autem, ni fallor, Plinius miscuit, cum Sicyo Theophrasti, non distinguens eam à Melonibus nostris. Eum namque nomine Cucumeris comprehendere nostros vulgares facile credimus, non autem longos illos, qui dicuntur artificiales. scio enim extare tale genus Cucumeris, præter Melonem longum: vidi recurvatos nullo subiecto oleo, ij dicuntur serpentini, de quibus post. An nostri Cucumeres vulgares à Dioscoride Pepones dicantur perpendendum, quamvis Matthiolus dicat non admittendam eam opinionem, nihil tamen occurrit quod repugnet, nisi obftet Galeni sententia de Peponibus. Indagandum præterea est, an radix Cucumeris vulgaris vomitum moveat? Quicquid autem in contrarium afferatur, conveniunt tamen ea, quæ Dioscorides de Sicyo sativo pronunciavit, cum Melone nostrate, ut antea monuimus.

Allubescunt ea, quæ Dod. in fol. lat. scripto prodidit. Passim, inquit, Cucumis pro eo habetur, qui Græcis *σικυα*, i.e. Cucumis sativus dicitur. Galeno autem non Cucumis, aut *σικυα*, sed *μυρμιρις* est. Nullius enim fructus Cucumerarij medulla, carove interior editur, sed omnis abjicitur, excepta hujus carne, quæ cum seminibus estur. Quod scribit Gal. lib. 2. de aliment. Homines, inquit, à carne Peponum interna abstinent, Melo-peponum autem mandunt: dicitur Belgis *Concomiteren*. Sunt qui Anguriam dici velint, sed omnino alius fructus est Anguria. Et hæc Dodonæus. Subjiciam aliorum opiniones, de nostro vulgari Cucumere.

Cucumerem luteum, quem Columella Anguinam vocat, Tragus ita delineat: In Cucumeris pomò luteo & oblongo multi prominent undique toruli, licet formâ & colore elegantius sit Melone & Peponem, tamen crassiorum est partium, & cibus non perinde gratum, atque illa, quippe quod peculiarem quendam & agrestem habeat saporem: intus candidum, ac acutis seminibus prorsus repletum. folia hujus asperiora sunt majora & latiora. gaudet mediocriter pingui Solo. Poma admodum oblonga sunt, præsertim si per harundinem flos deduca-

tur. Serapio *Kura* vocat: Hebræi *Kischuim*, Châl. *Kara*. dxi *Katrâia*, à qua voce *Chasbeh* Serapionis non multum abludit.

Monuimus ante, Fuchsinum vocare Cucumerem sativum vulgarem, sed confundere cum Anguria.

Non planè discerni posse putat Matthiolus, an Dioscorides reddat vires ejus Cucumeris, qui propriè Insubribus & Venetis Cucumis dicitur, Hebræi *σικυα* verò Citrullus, omnibus notissimus, an aliterius, Hetrusci scilicet qui aliis Italiz populis Anguria vulgò nuncupatur. Siquidem non ex Dioscoride modò, sed nec ex aliis veteribus hætenus quenkum reperit, qui Cucumerem, qui Græcis propriè *σικυα* appellatur, notis ullis repræsentarit. Sed quod Græci *σικυα* vocabulo Hetruscorum Citrullum, & Insubrium, Venetorumque Cucumerem, omnibus notissimum significarint, facile conjici posse credit ex ipso Dioscoride. Quippe quod Dioscorides asserat Cucumerem silvestrem solo fructu, à sativo discedere: Huic verdè ille, quem Hetrusci Citrullum, alij verdè Cucumerem dicunt, per omnia respondeat. Non possum igitur, ait, non liberè pronunciare, Dioscoridem Citruli nobis vocati, non autem Anguriz vires descripsisse. Quamobrem Fuchsius magno errore putat Cucumeres, quos Citrullus Hetrusci nominant, Angurias esse. Eadem repetit in comment. cum mag. fig. In hist. germ. refert quosdam in Bohemia vulgares Cucumeres, Citrullus vocare, propter similitudinem cum parvis Citriis. Sed necdum in epit. eorum admittit opinionem, qui nobiscum, & veriùs, nostro quidem judicio, vulgarem Cucumem, Peponem esse contendunt.

Sed & Corn. ait Cucumem sativum, Græcorum *σικυα* & *σικυα* (quam vocem in masculino & neutro genere proferit) esse: recentiores verdè Græcos *σικυα* vocare: Sic enim Simeonem Sethi habere: *σικυα* τὸ ἀγρὸν αὐτῶν, κατὰ τὸν ὅτι τὸν ἀγρὸν, frigida & humida secundo gradu. Ex hac autem appellatione Germanos partim Angurien, & partim *Gurken* vocare. Nasci hodie multum per omnem Scythiam & Sarmatiam, & apud Livones Pomum Rutenicum appellari.

Vide quæ Dalechampius de Cucumere sativo dixit, capite de Cucumere, Peponem & Melo-peponem in genere ex veteribus & Neotericis. Habes eodem hoc capite nomina linguarum, quæ prudens lector hic transtulerit.

Cucumer latinè, *σικυα* atticè, communis multis generibus dictio, omnem hanc in Latinis incertitudinem fecit, quod Cucumerem in Græcis ac Latinis audientes, ex ea quod nunc est, unum tantum genus, Cucumer vulgo appellatum, fructu oblongo, & maculoso, significari crediderunt: quum Græci *σικυα* nomine, genera multa numerent, quæ aut cartilagine, aut cute foris obducta, in oleraceis extra terram crescant, & si hoc quod nunc Cucumis dicitur, illis primum, & supremum genus sit, atque posteriores Græci *σικυα* simpliciter dixerint, Cucumerem vulgatum, quumque Brassavolus, non tantum Cucumerem vulgi, sed omnia Melonum genera, i.e. Cucumeres, Citrulos, & Angurias, comprehendendi annotaverit: verum per Cucumem absolutè, Anguriam intelligi oportere, quæ Hetruscis Cucumis dicitur: at per Cucumem citrinum, voce hæc adjectâ, nostrum Cucumerem significari, ideo Hetruscis Citreolum vocatum, diminutivè, à flavo citrij colore: quem in extrema maturitate ostendit. Matthiolus evaginato ense, ac si pro aris, ac focis digladiaretur, sub voce *σικυα*, ex còmuni omnium sententia, Cucumem Latinis ex Diosc. intelligi contendit: i.e. Hetruscorum Citrullum, quum illis Cucumis, nostris sit Anguria. Matthiolus autem etsi probe-

Sicyos

Sicyos (agrios addito) erraticum Cucumerem: at nullâ adjectione, vulgatum etiam significare, non tamen tollit, plura ex aliis denotare posse, ut secundo sui Coroll. Hermolaus facillè indicat: præterea Dioscorides alvo & stomacho perquam utiles haberi Cucumeres ostendit, qui quum aded difficilis sint concoctionis, ut etiam secundo die, ex Plinio, consentiente Matthiolo, stomacho immorentur, atque ex Gal. 2. de aliment. facult. cap. 6. suæ substantiæ proprietate, cocti sint difficiles, pravi que succi, quâ ratione alvo, & stomacho amicentur, non solum naturaliter, sed etiam ex symptomate, doceat obsecro, ait Apollo Rad. 1. supra El. Diarhod. commune, Matthiolus: nam sic omnia pari modo frigida, alvo accommoda dici possent: quicquid sit nostrum Cucumerem, & Hetruscorum Citrullum, pro Cucumere accipiam.

Cucumeres Anguil. Cæterum, Anguil. epist. 7. narrat Cucumeres inveniri & virides, & albos, & longos, & contortos, & glabros, & asperos, omnes notos: Anguinum dictum viridem esse & contortum, & serpentem.

Tab. nat. Apud Tab. effigies Cucumeris ex Hispanico semine nati proponitur sine descriptione, non indicato quidem discrimine à vulgari Cucumere, cujus imaginem ibidem quoque habet.

Synon. C. Bauh. phyt. & pin. itémque apud Matth. vocavit Cucumerem 1. sive sativum vulgarem: Cucumerem sativum Brunfels. Matth. Fuch. Dodon. gall. Lon. Cast. Cucumerem, Trag. Ang. Turn. Lac. Fracast. & Tab. Cucumerem vulgarem, Dod. Ger. Cucumer sativum, Cord. in Diosc. Cucumeres sativos & esculentos Lob. adv. & Ic. p. 638. obs. p. 163. Cucumim esculentum: Citreolum vulgo Cæsalpini: Sicyon Galeni quorundam, & ejusdem Melopeponem aliorum: fructu maturo subluteo: toto etiam albo: toto etiam viridi: magnitudine quoque & formâ vario, longum, recurvum: lævem, asperum.

Locus & Tempus. Seritur in hortis: pinguis & aprica amat loca. Julio & Augusto mense fructus edules, cum ipsis seminibus, sed Septembri demum ad perfectam maturitatem proveniunt.

Vires & Virtus. Dioscoridis vires de Cucumere & Pepone posuimus ex veterum sententia, eæ eaz quæ circa Cucumeris vires memoriz prodidit Galenus. Dodonæus eligit virides, nondum maturos: maturi siquidem & jam citrini facti esui haud sunt idonei. Semen frigidum quidem, sed multò minus quàm fructus. Aperiendi vim atque extergendi præterea obtinet: urinas movet: jocineris obstructions aperit: pectori ac pulmone inflammatione laborantibus prodest: contusum, foris-
Ussus pectoris. que absterforij loco adhibitum, cutim splendidam reddit: Galeno autem non Cucumis, aut citius, sed Melopepon est, &c.

Qui calidioris temperaturæ sunt homines, inquit Tragus, aut ab incunte ætate ejusmodi cibis assueti, huc vesci possunt. At qui frigidioris sunt præditi ventriculo, si hoc cibo frequentius uti voluerint, facillè in febres incidere possunt. Cucumeres intrinsecus ad calidas affectiones usurpari possunt. Extrinsecus succus cum semine adjectâ farinâ, siccatus in Sole, cogitur in smegma, quod faciem repurgat, & nitorem affert, sed cum vino illinire oportet: mulieribus hæc medicina convenit. De Cucumere ita cecinit Baptista Fiera,

*Sic nunc humescens Cucumis, gelidusque Citrullus,
Et tremuli ardores corda dolore levet.*

*Ne diuturna tamen sit concomitata a cævo
Febri, in aspidnos si dasur es a cibos.*

*Micibilem, subigirque firmit, si machoque calenti
Gratus erit medicus si sapit arte coqui.*

Vires Anguriz sive Cucumeris Simeonis Sethi posuimus capite Colocynthis folio citreoli, siue L. Tom. I. l.

ciniati. Lobelius vulgari Cucumeri vires Cucumeris Dioscoridis adscribit. Miror autem eum in obli. Cucumeri vulgari attribuere vires ex Dioscoride, & Galeno, itémque Egineta Cucumeris eorum sativum quum in Adverl. dixerit, Melones nostros, sive vulgi Italici Pepones, esse antiquorum (præsertim Dioscoridis) Cucumerem domesticum, ac etiam scribat in iisdem Observ. quali sibi contrarius, Melonem vulgi esse Melopeponem Dioscoridis, ibidem Melonis iconem ponens, subjiciensque Peponis vires ex Dioscoride. Cucumer vulgaris, major quidem, decorticatur, ac transversim in orbiculos tenuissimos, quoad fieri amat, discatur sale aspergitur paropsidæque duplici excipitur, agitando eousque donec aqueus humor majori ex parte eliciatur, deperdaturque. Sic agitati Cucumeris orbiculi, cum Pipere, oleo & aceto comeduntur. Parvi aceto, sale, Pipere & Fœniculo quodammodo conduntur: inferuntur etiam quandoque Garyophylli: per totum annum conservantur. Mirè, præter cæteras vires, appetentiam excitando, & fluanti ventriculo conferunt.

CUCUMER MINOR, PYRIFORMIS.



CUCUMEREM hunc minorem Ger. & Tabernmontani, *Hein bis ren Cucummern*/Cucumeribus aliis minorem eiq; similem, nisi piro pareisset, ineptè, meo quidem iudicio, Nicol. Braun capite de Cucumere silvestri collocavit.


Bauh. phyt. & pin. vocat Cucumim 4. sive Pyriformem.

CUCUMERES LONGISSIMI.

CUCUMIS flexuosus, auctore Lobelio, sive anguinus prorsum similis est vulgari flagellis, foliis & claviculis. Nos autem observavimus, ei similia esse minùs asperâ, quàm in vulgari, quædam etiam subrotunda, parùm laciniata, & angulosa, alia magis: fructus longi instar serpentis se contorquentes, albi, quasi canaliculati, & striati, pulpâ albâ, sapore vulgaris: semine albo. Ex his liquido constat, hallucinatum esse Lobelium.

Plinius per Cucumeres in fistula flore demisso, mirâ longitudine excrecentes, Cucumeres nostros longissimos in uere videtur, eôq; arte tam longos fieri & quidem è vulgaribus credidit. Ego autè negatos hos longissimos specie à vulgaribus differre, asserere non vereor, & tales naturâ, nō arte esse, quicquid dicat Matthiolus, cui ut in plenisq; aliis suis cre-
Citrullus anguinus melleo contortus didimus. Vidi, inquit, Citrulos nostrates adhuc florescentes in fistulas cōjectos mirâ longitudine crevisse. E quorum semine, qui postmodum orti sunt,

*Cucumis
longus et
dem.*



Icon Cam.

Cam nat.

Cuc. oblongus, Dod.

Cuc. flexuosus, Lob.

*Citreolus
anguis modo
intortum
Gaf.*

*Meloe Flo-
rentia.*

*Sicya Theo-
phrast.*

*Cuc. angui-
nis, Tab.
C. Bauh.*

eandem retine-
unt formam, ad-
ed ut in vite pen-
dentes, anguini
modo contorti vi-
derentur. In hist.
germ. vocat Cucu-
meres longos, an-
guinos, recurvos,
sulcatos, albos, as-
peros, sapore &
odore eodem cum
vulgaribus: foliis
asperis, ut Melo-
num. Camerarius
in hist. germ. Mat-
thioli pingit Cu-
cumeres longos, à
longis Matthioli
quodammodo di-
versos, vocatque
germ. Ein ander

arr langer Gurken / h.e. speciem aliam Cucume-
rum longorum. Iconem autem ex ipsa planta viva,
ut ait, depingi curavit: folia ejus Melonum simil a
scribit, itemque flores: Caterum, fructum nūc
canaliculatum, tuberculis interin inaequalem, vul-
garis ad modum sed semen longè minus. Hos im-
brium frequentiam perferre non posse, multoque
gaudere sole, uti Melones, quibus similes penè so-
rent, nisi differentiam faceret suavis sapor, atque
forma. Nos alius discernendum damus, an differat
Camerarii Cucumis, à Matthiolino & nostro, quia
in epit. simpliciter pro Cucumere Matthioli longo
suam iconem proponit. Verùm in hist. germ. dicit
quodammodo diversam, & aliam speciem, ut ex re-
citatis ejus verbis ostendimus.

Dodonæus oblongos Cucumeres artem & cul-
turam primò ut fortum produxisse narrat, & crebè
recurvos reperiri, indeque anguinos vocari.

Quem Loban Obi. p. 363. & ic. p. 639. Cucumim
anguinum, flexuosumve inscribit, tenerà cute, ni-
tore herbido, cum in Advert. incurva gracilitate an-
guinum flexum, & longitudinem, & crassitiam æ-
quare scribit, indeque nomen habere.

De hoc Caxalpinus ait: Alter Citreolus est fru-
ctus non ab simili à Citreolo ut id. h.e. Cucumere] sa-
pore, qui crudus ante maturitatem carne tenera, &
fragili gratus est, sed formà dissimili: crescit enim,
quà cogitur formà, ut plurimum anguis modo in-
torta pluribus sulcis, vel potius striis discurrentibus,
simili modò horridus, colore candicante. Florentiz
Mellonem vocant, sed huic minor autoritas quàm
Citreolo. ejus planta assurgit in pergulas magis, un-
de fructus pendent, qui si permittantur ad justum
incrementum pervenire, crassescunt in longitudine
multum, ut Cucubita. Nuper tertium genus [Cu-
cumis Aegyptius Chate, ut opinor, de quo deinceps agen-
dam erit] advectum est fructu cubitali tenerissimo.
prædicti ergo fructus recentior orti & immaturi gra-
viores sunt, quàm perfecti & maturi, omnes oblon-
gà figurà constantes. Cucurbitis longis proportio-
ne respondentes. Caterum, ex Theophrasti ver-
bis colligere licet, ejus Sicyam, Citreolum nostrum
significare, præcipuè anguis modo intortum.

Tab. Cucumim anguinum, germ. Schlangen
Gurk appellat, miris aptè. B. phyt. & pin. dici-
tur Cucumis 3. sive flexuosus: Cucumis anguinus
& tortilis, Lac. Cucumis anguinus, Ang. Geln. col.
Lugd. anguina, Tab. Ger. Cucumis sativus 2. Caxl.
Citreolus alter formà anguis, Caxl.

Ejus autem speciem haberi ait fructu cubitali. Sic
in regno Congiano insignis magnitudinis & suavi-

tatis haberi: par. led. or. l. 2. c. 1. Videtur hæc nobis
Cucumis Aegyptius Chate. Nec Caxalpini deline-
tio abhorret.

CUCUMIS AEGYPTIUS CHATE

Cucumis Aegyptius folia habet minora, albiora, Diser.
molliora, ac rotundiora, quàm nostrates, fru-
ctus admodum differentes, longiores, viridiores:
cortice plano, molli, æquali, sapore dulciori.

Vocant hoc ge-Chate Ae-
nus Cucumerum Egypti Alp.
Egypti Chate.
quæ planta à com-
muni Cucumere
alia quidè re non
differt, nisi magni-
tudine, colore &
mollietate, Alpinus.

An est hic Cu- An Citreoli
cumis Caxl. Citreo. 3 genus Caxl.
li tertium genus,
nuper advectum,
fructu cubitali, te-
nerissimo? An Bau-
hino Cucumis ter-
tij, sive flexuosi
species fructu cu-
bitali. Idem vocat Cuc. Aegy-
Cucumim 5. sive Citreoli
Egyptium rotun-
dofol.
dofolium. Bauh.




Horum usum corporibus in cibo ipsis tum cru-
dis, tum coctis vascantibus, salubrem esse apud o-
mnes eorum locorum incolas creditur. Sunt enim
concoctu faciliores. Medici aliqui ibi nonnullis fe-
bricitantibus crudos etiam mandendos concedunt,
præsertimque peste affectis, quibus Cucumeres hos
crudos esitatos summè conducere omnibus (qua
ratione nescit Alpinus author) persuasum sit. Co-
ctos in ardentibus febribus, utiles esse ratione con-
firmatur, quando refrigerent, atque humectent. In
renum & vesicæ calidis morbis, cum lacte coctos
Cucumeres multis diebus non sine multa utilitate
in cibo sumuntur. Lac etiam ipsorum seminum pro
iisdem malis per os sumere sæpè solent. Ad oculo-
rum verò, aliarumque partium calidas inflamma-
tiones pulpa contusa Cucumerum lacti mixta u-
tuntur. Et ad sedandos podagricos dolores à causa
calida concitatos, succum lacte, oleoque rosaceo
mistum, partes liniendo, adhibent. Sullatiam a-
quam ad libram ad jecoris caliditatem corrigendi-
dam, & ad sanandos renes tum inflammatos, tum
à calculis vexatos multis diebus ægros bibere con-
sulant, quibus ipsam satis iis confectæ experientiâ
compertum est. sunt aliqui, qui ad hæc eadem
mala aquà stillatitiâ lacti eorundem Cucumerum
seminum mistâ, uti solent.

CUCUMIS SILVESTRIS SIVE aspinus. C. A. P. XL

Cucumer aspinus Seplassis dictus, Melonis fo-
lium quodammodo refert, sed mollius, quàm
Cucumeres vulgares, iis etiam magis incanum, præ-
sertim parte infernâ, vel cineritium, crassius, & aspe-
rius, longis & hirtis pediculis appensum, ex flagellis
ramosorum caulium teretibus, striatis & hispidis e-
natum: flores satini floribus multis numeris mino-
res sunt, quinquefolij, calathi formâ, colore ex al-
bido herbaceo, tanullum in dilutiorem flavedinem
decli-

declinante, saturatius tinctis apicibus medium occupant: huius fructus majorem glandem cerri æquat.



cui & formæ ovarii respondet, superficie spinulis crebris, brevibus horrente, qui maturus levissimum tactu virosi succum cum lubrico semine violentè ejaculatur: pueris, ubi sponte provenit, notissimus, inquit Lobelius, qui fructum turgentem vix dum tactum digitis ludibundi in faciem invicem elidunt semina, succoque per amaro & viroso, os, oculisque perfundunt. Semen pullo esse colore, vel cinereo-nigricante constat, Colocynthis non dissimili, sed minore: radicem longam, crassam, albam, paucis adnatis donatam. Lobelio repens est planta, humilis, non topiaria.

Sicyo fil.
Dise.

Cucumis silvestris [*σίκυς ἄγρος*] solo fructu à sativo differt, multò minorem eum habens, oblongis glandibus similem: folia verdè & sarmenta sativo similia sunt: radix alba & magna, frutice in totum amaro: Dioscoridi.

Sicyo fil.
Theophr.

Theophrastus Sicyon silvestrem vocat, sativo penitus incomparabilem, sed aspectus tantùm similitudinem gerentem: loca argentia quærentem, ex cujus fructu medicamen liquatum, Elaterium [*ἑλᾶτεριον* *ἡ γὰρ ἡ ἑλᾶ*] vocatum fiat.

Digitata
vinum.

Pl. Cuc. fil.

Cuc. an.

Quinque.

Sat. in

ma. or.

Delosm.

Cucumin silvestrem (inquit Plin. l. 20. c. 2.) multò hunc esse apud nos, qui Arguinus vocatur, ab aliis erraticus, arbitrantur, quo decocto mures de ejus sparsa medicina non attingunt: est multò infra magnitudinem sativi, ex eo fit Elaterium succo expresso ex semine, cujus causa nisi maturius inciditur, semen exilit, oculorum etiam periculo. Aliqui in Arabia natum magnificant, mox Cyrenis, alij in Archadia tradunt, similem Heliotropio, cujus inter folia, & ramos provenire magnitudine Nucis juglandis semen. esse autem ad speciem scorpionis, caudà inflexà sed candidà, aliqui etiam ab eo scorpionum Cucumin vocant, efficacissimum contra scorpionum ius, & semine, & elaterio, sed hoc genus apud nos non visum est.

Cæterùm, à Theophrasto maximè dissentire videtur Dioscorides: quippe qui Cucumerem silv. solo fructu distare à sativo dixerit: Theophrastus verdè sativo penitus incomparabilem pronunciaverit. Et sanè qui ambos Cucumeres contulerint, magnam inventient in sarmentis, foliis & radice differre etiam, quicquid hallucinatus dixerit Fuchsius.

Fuch. hallu.
cinatur.

Synon. cum

nomine

linguar.

σίκυς ἄγρος Græcorum, est Cucumer silvestris Matthiolo, Arg. Fuch. & Lac. Cucumis silv. Trago, Lon. Cast. Czl. Cam. Dod. gill. & lat. fol. p. 73. ubi iconem habet & descriptionem in lib. purgat. med. exhibitam: nomine Cucumeris silvestris, nec plura addit, quàm in Purgant. historia fecerat: Eandem figuram alibi p. 65. repetit eodem nomine, inquit: Hujus autem (intellige M. loris) vel etiam superioris (puta Cucumeris) silvestre genus est, quem *σίκυς ἄγρος*, & silvestrem Cucumerem vocant: Nec aliud addit. Quid autem opus erat figuram repetere, quemadmodum in aliis etiam fecim. Idem in Lobelij l. c. fit, ita ut diversos ejusdem iconis faciant u-

Dioscor.

tilos: ad quæstum. Cucumis agrestis, Brunf. Lugd. & Cord. in Dioscor. ubi notat in Dioscoridis capitè quædam absurda reperiri. Cucumis anguinus, Cor. do in hist. Turn. & Gesn. de coll. Cucumis erraticus Gesl. h. cui & asininus, ceu quoque Tab. Ger. & Eyst. Cucumer agrestis Brunf. & Lugd. Cucumer silv. Elaterij, Cucumis asininus officinarum, Lob. adv. obs. p. 363. l. c. p. 646. Cuc. silv. asininus C. Bauhino. Arab. *Ch-se al mir*, & *Kate al benei*, & *Cheha al hamar*. Germ. Wilde Cucumer / Esel Euermer / & Springs Kirsb: quibuldam etiam Pompen / propterea quidd semen & humorem ejaculetur, quemadmodum michinæ quæ lam aquam, quam Germani Pompen appellant. Sunt tandem quibus *ἑλᾶτεριον* / quod sonat, Erinacei, sive echini Cucurbita. Belgis Wilde Concommeren: Gall. *Cucumbre sauvage*. It. *Cocumero salvatico*. Hisp. *Cogombri de amara*. Angli, inquit Lobelius, Noli me tangere vocarunt, quod nomen tamen propriè aliis plantis quoque debetur. Non immeritò autem Cucumerem agrestem potiùs dixerunt, quàm asininum aut silvestrem: quia omnium hujus generis plantarum suapte sponte, importunòque admodum provenit: oriatur, circa mœnia, areas, & stabulorum fineta, in Italia, & Narbonensi, Provincialique Gallia.

Augusto mense floret, atque subinde Autumno fructum tempestivum producit in Germania, quod sciam, inquit Fuchsius non nisi sativus provenit. Semel autem sativus pluribus inde annis facilè renascitur, teste Dodonæo, non tamè à radice revirescens, sed ex seminibus sparsis proveniens. In plerisque calidis regionibus in rudibus, subulosis, aliisque incultis locis circa Autumnum fructus maturantur atque eo tempore ad Elaterium conficiendum colligitur, de quo posthac dicendum erit, ubi & vires hujus Cucumeris recensimus ex veterum & recentiorum opinione.

CUCUMERIS SILV. SVCCVS.

Elaterium.

Elaterium verum ex medulla plurima Cucumeris silv. & pauca ei hærente mucagine medullo-la non ex ipsis Cucumerulis parandum esse colligitur ex Plinio Cucumin (inquit l. 20. c. 1.) silvestrem esse diximus, multò infra magnitudinem sativi. Ex eo fit medicamentum quod vocatur Elaterium, succo expresso è semine [*est ἑλᾶτεριον* *ἡ γὰρ ἡ ἑλᾶ* *Plin. silv. in Plin. med. in tempestivè redd. & Dalech.*] Cujus causa nisi maturius incidatur, semen exilit, oculorum etiam periculo. [*Nam cum ex lit à pedic. & acrem. succum emittit, Plin. dilu. qui. c. l. c. cont. thuladit. Del.*] Servatur autem decoctus unà nocte: postero die inciditur harundine. Senem quoque cinere [*l. inge aliter hoc Dise.*] conspergitur, ad coercendam succi abundantiam: qui expressus suscipitur aquà cœlesti, atque subsidit, deinde sole cogitur in pastillos, ad magròs mortaliū usus. Obscuritates & vitia oculorum sanat, gerarumque ulcera. Tradit hoc succo tactis radicibus Vitium, non attingi ut as ab avibus. Radix autem ex aceto cocta podagris illinitur: succoque dentium dolori medetur. Arida cum resina impetiginem & scabiem, quæ pforam & lichenas vocat: parotidas & panos [*τὰ ἐν ὤφθαλμοις, τὰ ἐν τῷ στόματι, τὰ ἐν τοῖς πόροις, τὰ ἐν τοῖς ὤφθαλμοις, τὰ ἐν τοῖς πόροις*] panos similes, sub sanctorum & auribus ac inguinibus. Nonum in O. tione,

Qui me miserum miseriorem reddit, quàm pauperem.

sanat, & cicatricibus colorem reddit. Et foliorum succus auribus surdis cum aceto instillatur. Elaterium tempestivum est Autumno. [*in m. planta Arg. p. 73. res. fructum autem Septembri periturum. Dal.*] Nec ullum ex medicamentis: magrò vero durat. Incipit à trimatu. [*Dioscorides in prolog. præter veratrum mi-*

grum & album, alia medicamenta, scribit inutilia esse à trimatu: Elaterium verò à bimatu ad decennium utile esse deiectionibus. Dalech.] Si quis recentiore uti velit, pastillos in novo fictili igne lento in aceto domet. *Quesum.* Melius quo vetustius: fuitque jam ducentis annis servatum, ut author est Theophrastus. Et usque ad quinquagesimum lucernarum lumina extinguit. [Dioscoridi lucernarum luminibus obiectum, facile flagrat & ardescit. Dal.] Hoc enim veri experimentum est, si admotum prius quàm extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Pallidum [cum candore nonnihil humidum, Dal.] ac læve herbaceo aut scabro melius, ac leniter amarum. Putant conceptus adalligato semine adjuvari, si terram non attigerit. partus verò, si in arietis lana alligatum inscientis lumbis fuerit, ita ut protinus ab exitu rapiatur extra domum. Ipsum Cucumin qui magnificant, nasci præcipuum in Arabia, mox Cyrenis, alij in Arcadia tradunt, similem Heliotropio, &c. [Herbarij omnes comparant cum sativo. Suspiciatur autem Dalech. in autore Græco, unde Plinius hac sumpsit, scriptum fuisse ἀγρον οἶνον ἢ ἀλλοτρίον, alteri Cucumeri similem esse, Plinijque legisse ἡλιότροπον. Quidam tamen Heliotropio similem esse colore foliorum interpretantur.] efficacissimum contra scorpionum ictus & semine & Elaterio, & ad purgandum uterum, alvòque. Modus portione virium à dimidio obolo ad solidum. Copiosius necat. Sic & contra phthiriasin bibitur & hydropises. Illitum anginas [morbum faucium gravissimum, Plaut. in Mostell.]

In angina ego nunc me velim verti, ut venefica illi Fauces præbeam, atque enicem scelestam stimulatricem. Lucillius apud Nonium.

In sperato abijt, quem una angina abstulit hora.

& arterias cum melle & oleo vetere sanat. Idem eodem libro c. 2. Multi hunc esse apud nos qui anginus vocatur, ab aliis erraticus, arbitrantur. Quo decocto sparsa mures de ejus medicina non attingunt. Idem podagris cum articulorum morbis decoctum in aceto, illinunt præsentaneo remedio. Lumborum verò dolori semine solo siccato, deintrito, triginta denariorum pondere, in hemina dato aquæ. Sanat & tumores subitos illitu cum lacte mulierum. Purgat eas Elaterium. Sed gravidis abortum facit. Suspiriosis prodest. Morbo verò regio in nares conjectum. Lentigines ac maculas è facie tollit in Sole illitum. Multi eadem omnia sativis attribuant.

Diost. De Cucumeris silvestris viribus, ejusque succo Elaterio sic inquit Dioscorides: Totus frutex amarus est. Succus foliorum instillatus ad aurium dolores facit. Radix cum polenta imposita, omnem veterem tumorem discutit. Eadem cum resina Terebinthina imposita, tubercula rumpit: cum aceto cocta & imposita, podagras discutit. Ad coxendicum dolorem per clysterem infunditur. Decoctum ejus in dentium dolore colluitur. Arida trita vitilignes, lepras, impetigines exterit: cicatrices nigras & maculas in facie depurgat. Succus radices lescuoboli pondere minimum exhibitus: & cortex quartà acetabuli parte, bilem & pituitam purgat, maxime in hydropicis. Facit purgationem citra stomachi læsionem. Sumenda autem est radices selibra, & cum duabus libris vini, præsertim Libyci, terenda: & ex hoc dandi sunt cyathi tres jejunis, tribus interpositis diebus, donec tumor satis contrahatur.

Adompra parando Elaterium. Quod verò Elaterium dicitur, ex fructu Cucumerum paratur, hoc modo. Cucumeres qui ad tactum defiliunt electos ac repositos per noctem linito. Postridie cribrum non densum crateri imposito, & ad cultum supinum aqua sursum conversa, singulos Cucumeres ambabus manibus prehenso dividito, & humorem per cribrum in suppositum craterem

exprimito, ita ut insuper etiam quod carnosum in ipsis est, & cribro adhæret, exprimas, quo & ipsa in craterem illabatur. Quum verò totum expresse- ris, finito ipsum subidere. Deinde in pelvim appo- sitam quæ expressa sunt mittito. Quæ verò secta sunt, in cribro acervata, & dulci aqua affusa expres- sa, ipsa quidem abjicito: humorem verò in pelvi turbatum & linteo contectum, ad solem exponito. Et quum subsederit, omnem supernatantem aquam unà cum eo quod concretum superstat, diffundito. Et hoc sæpè facito, donec superstans aqua constite- rit: quæ diligenter guttatim expressa, ad quod subsi- det in mortarium missum terito & in pastillos ef- formato. Quidam quò humor citò resiccat cinere cribratum per terram sternunt, & medio ex- cavato, triplex linteum supertendunt, & super hoc Elaterium cum humore fundunt, resiccatum autem in mortario, velut dictum est, terunt. Alioqui pro aqua marinam affundentes lavant. Alij in postre- ma lotionem aquam mulsam affundunt. Optimum Elaterium esse putatur, quod cum albore hume- tum est, non grave, læve, gustu amarissimum, & ad lucernam admotum facile ardens. Quod verò pra- sinum est, asperum, aspectu turbulentum, Ervo & cinere plenum, hoc grave est & vitiosum. Quidam ad Cucumeris succum ammiscent amyllum, quo le- vitatem & candorem consequatur. A bimatu porro ad decennium usque, idoneum est Elaterium ad purgationes. Perfecta ejus potio est obolus: mini- ma semiobolus: pueris ærei duo. Amplius potum periculum affert. Movet purgationem sursum ac deorsum pituitam & bilem ducens. Purgatio per ipsum optima est difficulter spirantibus. Proinde si per alvum purgare voles, duplo sale ammixto, & de Stibio quantum ad colorem inducendum satis est, cum aqua efformata catapota Ervi magnitudine exhibeto. Sorbeat autem insuper aqua tepida cya- thum unum. Ad vomitum verò, aqua ipsum diluito & locos sub lingua penitissimè cum pinna illinito. Si verò difficulter vomant, oleo aut unguento irino diluito: & ne dormiant, prohibeto. Cæterum, his qui nimium purgantur, assidue vinum & oleum ex- hibendum est. Vomentes enim restituntur. Si verò vomitus non cessent, aqua frigida, & polenta, & posca, & pomorum fructus, & quæcunque sto- machum densare possunt exhibeantur. Movet Ela- terium etiam menses, & in pello appositum foetus enecat. Idem cum lacte in nares intusum, morbum regium depurgat & diuturnos capitis dolores sum- movet. In anginis efficaciter illinitur cum oleo ve- tere, aut melle, aut selle taurino.

Cucumeris silvestris fructus ipsius succum, Ela- terium vocatum, & non minimè radicis aut folio- rum ad medicationes perutilem esse ipse quoque Galenus prodidit. Elaterium, inquit, menses ciet, & foetum interimit appositum ceu alia omnia amara & subtilium partium, maxime si aliquam habeant caliditatem, veluti Elaterium. Summè liquidem a- marum est, leviter calidum, ut ex secundo sit ordine calefacientium. Porro tale protinus quoque dige- rendi vim obtinet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo vetere. Bo- num item est regio morbo affectis sursum cum lacte in nares. Hoc etiam usu dolores capitis sanat. At- que Elaterium quidem ejusmodi est. At radicis suc- cus, ut & foliorum, licet similem vim habeat, imbe- cilliores tamen. Sed & ipsa radix ad similem taculta- tem possidet, abitergit namque, digerit, atque e- mollit. Porro cortex eo potentius delicates.

Ex Mesues autoritate in comm. Silvij hæc adde- runtur. Cucumer agrestis, folio sativi Cucumeris, sed asperiori, fructu ejusdem, sed parvo, asperimo, amarissimo: cujus perfecti ac præcipue ex eo succi

Humor in
cristo resica-
tur.

Elaterij de-
lectum.

Dofu in pe-
rone.

Per al-
vum pur-
gat, sed per
vomitum.

Partus mor-
tuus.

Angina.

Galenus.

Tempero-
mentum.

Doloris ca-
pitis.

Adfuo.

Fructus
perfoliatus
tuta.

laus est, secunda radicis. Idem fructus jam absolutus, si maturitate palleat, viridisque esse desierit, & amaritudine sit eximia, succumque remittat album & subpinguem, est calidior. Imperfectus autem tam est noxius ut sanguinem educat. Succus autem exeunte Aestate excipitur, radix sine Veris colligitur. Eadem in medicamenta multum efficacia & celebria recipitur. Calidus est & siccus ordine tertio: substantia ignea, & terrea usque constat. Purgat potenter pituitam vomitu & deiectione, & interdum bilem, si vacuari parata est: serosum ^{non} ~~serosum~~ ^{ut Silv. legit.} excrementum, etiam & evulsum contumax, atque adeo à juncturis mirifice trahit, praesertim succo & radice, ob id earum dolores sanat, ischiadem etiam juvat aperte cataplasmate impositus, vel clystere injectus. Vim namque purgatricem Scammonio proximam ei tribuit Ioannitius. Si enim vacuet immodice etiam sanguinem trahit. Radices item ejus cum absinthio in aqua & oleo percoctae, hemigraniam molestam & curatu difficilem sanant, si ipso decocto tempora soveantur, & iisdem radices eadem, & herbarum tritum cataplasmate applicentur. Succus quoque ipsius, naribus injectus cum pauculo lacte idem efficit. Excrementa enim cerebri evocat, & nasi foetorem ab horum putredine ortum per sanat: cephalalgiam quoque veterem, & epilepsiam. Idem cataplasma, praesertim si sterus caprinum addatur, tumores magnos, dueros, & strumas resolvit. Succus quoque, & decoctum tum fructus, tum radicis hydropem juvat potu (valenter enim aquas serosas vacuat) & iterum, & obstructionem hepatis & lienis. Pulvis radicis cum melle cicatricem foedam tenuat, ecchymomata contusionibus succedanea dissipat. Succus radicis cum farina Fabarum, sordem faciei & sordiditatem cutis illius terget. Radix ex aceto forti alphis affricata, eos delet & lentigines. Resolvit enim, tenuat, terget, siccatur, solvit molestiam, & tardè aperit obstructa, & ora venarum. Ne ora venarum aperiat & ulceret hic succus, & cum torminibus, & anxiam molestiam vacuet: datur cum Bdellio, vel Tragacantho, vel lacte dulci recenter mulso, aut mulsa, & sale: promptius autem purgat cum pauculo sale gemmarum & aromatibus. Succus autem ex fructibus per maturitatem pallentibus clementer sine compressionem multum extractus siccatur, ut Scammonium & Aloë. Nonnulli inter siccandum ei immergunt aromata nodulo ligata, quem extrahunt, dum siccando cogi incipit: alij aliam mittunt pro scopis variis. Triennio servatur, post sex menses utendus. Noxam autem ab eo corpori impressam delent aqua hordei, mulsa, vinum, oleum. Datur succus à granis 10. ad drachmam unius partem tertiam: Pulvis radicis à granis quindecim ad drachmam semissem. Radice hujus multum utuntur practici Montpelienenses, cujus efficacitatem deprehendas ex unguento Agrippae, Ciclamini, & aliis etiam internis, ut Anasarca & Ascite.

Rondeletio primum & post Lobelius ex Plinio conjectura fuit Elaterium verum ex medulla seminis candida plurima (quae minus quam fructus, aut folia ingrata est, quaeque praesertim Sole siccata, flammisque admota, tota urendo deflagrat) ex paucula ei haerente mucagine medullosa, & non ex ipsis Cucumerulis parandum esse. Perquam autem celebre fuit antiquis catharticum, ut de Hippocrate & Theophrasto liquet, Elaterium, quasi dicas exagitant, tunc sive ciens medicamentum: vehementer namque supernè, infernèque alvum citabat, pusilla dosi, nempe oboli, vel scrupulo semisse, per se, vel adjecto talis altero tanto, & Stibij quod colorando satis esset. Probatissimum fuit, laxum, non asperum, nec ponderosum, sed album, nec aridum, vel exuatum, vehementer amarum, & lucernae obiectum

facile flagrans. Quae notae lectori plantarum consulto, non rixandi, sed cognoscendi cupido, facile retegunt planè perviam hujus loci in Theophrasto & Dioscoride salebroso intellectionem: cum namque ex Cucumerulis istis succus effluat admodum tenuis, viridis, aqueus, igneque densatus, inaequalis, nigricans, ac obiectus lumini neutiquam flammam alens, paucisque annis mucidus, putrisque futurus, verisimile Lobelius quidem fuit, vel Theophrasti, vel Dioscoridis Elaterium dici non posse, tum propter illas omnes, jam quas dixit, reprobis notas, tum quia nec durat, nec flagrat. Quare ipse superioribus annis cum in Gallia Narbonensi parasset Dioscoridis & Theophrasti instituto, curassetque parandum multis modis: tandem maximam Cucumerulorum copiam colligendam curavit, è quibus super cribro incisis, seminis tusi, & crebrò manibus pressi, medullam sive mucaginem Psillij similem subter cribrum transmissam excepit, Cucumerulorum eorundem succo affuso, & aquae fontanae nonnihil, quò facilius gluten remitterent trans cribrum: istud partim Soli sub dio expositum nigricans habuit, partim verò igne aut sub cineribus exsiccatur, albidum & pullum. Vtrumque tamen lucernae admotum actutum flammam dabat, & alebat suam pinguedine: quin etiam quale ipsi adhuc in muscolo longè aridum superest, facilius uret, cujusmodi nunquam poterit parari ex sola Cucumerulorum aqua, mucosave carne, ut probè norunt, qui saepius periculum fecerunt. Eapropter Plinius videtur ceteris melius & verius ex Theophrasto, aut quopiam alio classico authore, ad Dioscoridis sententiam accessisse: quum ex fructu, & semine faciendum censet: nimirum ut obiectum flammæ flagret, quale optimum tradit Dioscorides: quem suum ducem ignavè hic deserit Senensis commentator, & insulse fugillare videtur, dum contentiosas textit ambages auctoritatum sarragine. Sanè par est, quo dictum modo, commodius, tutiusque purgare, adeoque diutius non putre durare, quia aeris virulentusque succus medulla pingui seminis retunditur & mitescit, nec perinde (qua oleaginosum pingue) putrescit: mitior etiam vis in semine & par ratio, quae in Colocyntide.

Nunc à Theophrasto maxime dissentire videtur Dioscorides: quippe qui Elaterium dixerit à bimatu ad decennium deiectionibus utile esse. Theophrastus verò idem ducentis annis virtute mirabili servatum esse scripserit. Cordustandem Aeginetæ sententiam magis laudaverit, qui illud probat, quod ad viridem colorem inclinat, Dioscorides verò candidum. Impossibile siquidem contenderit viridem per se succum, cum exsiccatur, candidum fieri. Sed esse & alia quaedam in hoc capite absurda scribit.

BALSAMINA CUCUMERARIA. CAP. XII.

EX radice parva, fibrata, semestri pronascuntur viticulae unius aut duorum cubitorum, tenues, striatae, angulosae, quae claviculae ope, quas ad folia singula emittit, perticis se circumvolvunt: folia Bryoniae, vel potius Vitis foliis similia, minora, concinnius divisa, hilaris virore nitent, penitus glabra, pediculo unciam aut sescunciam circiter longo, amarore quodam & acrimonia levi praedita. è foliorum alis flores prodeunt, ex quinque foliolis acuminatis compositi, colore ex albido lutei, staminibus etiam luteis, quos extipiunt fructus sublongi, qui maturi rubent; vel ut ait Lobelius, superficiei, carneque nitentis purpureae phoeniceae, turbinati, Cucumeris formam, eodemque modo tuberculis horridis

Temperamentum.

Silv. corrig.

Ischiad.

Scammonia.

Excrementa cerebri.
Fasciaria.
Epilepsia.

Struma.

Icterus.

Pulvis radicis.

Cuius sada.

Lentigo.

Correctio.

Noxa corporis.
Dosis.

Vera compositio Lob.


Catharticum.

Coloratio.
Delictum.Theophr.
Diosc. cap.
Pamur.Plinius ad
Dioscoridis
sententiam
accedit.

Matth. reprob.

A Theophr.
dissentit
Diosc.Aeginetæ
sententia
probat.Diosc. cap.
put man-
cum.

Diosc.

Balsamina
malis.Balsamina
cucumeri-
na.
Cucumer
puniceum.Pomum mi-
rabile.Pomum
Hierosol.
Balsam. 1.Bals. Mo-
mordica.Charantia,
Charatia.Momordi-
ca.

Viticella.

Pomum
Balsami-
num.Cucurbita
genus, Som-
phos Plinij.

ridis bullati, carne punicea: semine Citruli, vulgo dicti, copioso, fusco, longiore, quam latiore, modicè acuminato, compressoq: & aspero.

Balsamina esse multi ignorantes Apothecarij credunt, ut etiam Luminare majus in Martiat. dicit, sed non rectè. Cognata facie Cucumerino generi cum sit, verius cum Lobelio, qui in Obs. p. 69. Icon. p. 648. etiam puniceam

cognominat, Balsaminam cucumerinam, aut si maior nobiscum Cucumerariam vocabis, vel cum Cordo Cucumerem puniceum, quo nomine eam in hist. describit, id quod figura à Gesnero apposita quoque declarat. Alij, ut Tragus, Balsaminam Ligurum Padanorum, Pomum mirabile Gallorum, h.e. *Merveille*, & *Pommes de Merveilles*, nominant; nonnulli verò Pomum Hierosolymitanum cum Hetrulcis appellant. Balsamine 1. dicitur Anguill. epist. 13. Trago, ut & Fuchs. cui & mas. Balsamine alia Gesn. h. Eid. in app. Balsamina Momordica dicta, de coll. stirp. Balsamina pomifera herba. Charantia Hermol. Lon. Dod. gall. & lat. Garantia vulgò Gallorum, Gesl. Charatia Italarum Fuchsio, quoniam septi modo in hortis, fenestrisque per cancellos opere topiario facile digeratur. Momordica Matth. Cast. & Bapt. Sardo: Mamortica nonnullis: Viticella aliis. Germ. *Balsamöpfel* & *Balsamkraut* / h.e. Pomum Balsaminum, & Herbam Balsaminam. Balsamina nomen inde accepisse videtur, quòd fructu ejus, sive pomo in oleo macerato, balsami vice ad vulnera utantur. Italis est *Garanza*, *Caranza* & *Garanzi*. Videtur nobis illud Cucurbitæ genus esse, quod à Plinio Somphos nuncupatum legimus.

B. pin. Balsamina 1. (2. phyt.) rotundifolia repens, sive mas: Balsamina sive Pomum mirabile, Trag. Balsamina, Matth. Lac. Lugd. & Cæs. alba Gesn. h. Cucumis puniceus, Cord. hist. Balsamina mas, Cam.


& Ger. Fructus maturus colore variat, modò puniceo, modò luteo rubescente. Balsamina mas fructu puniceo, & Momordica fructu luteo rubescente, Eyst.


Non nisi lata provenit: melius ac felicius in Italia calidisque regionibus proficit, quam in Germania ubi Augusto plerumque mense floret, & nunquam, aut tardè & tardè fructus maturefcit. Vbi verò primùm excaulescere capit, sarmentis seu palis suffulcienda erit, ut illis alligata à ventorum injurià tuta esse queat.

Obtinent fructus Balsamines, tum & folia eximiam resicandi vim cum moderata quadam frigiditate temperiei mediæ proxima. Vulnera recentia conglutinare folia imposita feruntur: cum vino verò assumpta coli, intestinorumque dolores sopire, & ruptis, convulsisque utiliter exhiberi. Oleum, in quo fructus exempto semine, vel insolatus, vel in calentis aquæ balneo decoctus, vel in fimo [malè si mo D. d.] equino maceratus, vulnerum inflammationes arceat: eadem & facile accitò unit ac per sanat.

Doloribus ac ulceribus mammillarum auxiliatur: uteri exulcerationes ac inflammationes injectum curare posse existimatur: punctis ac vulneratis nervis vulter adhibetur: adversus combustionem, ex aqua, oleo ve fervente, ferro ignito, vel igne multum confert: cicatrices extirpat. ramices quoque hujus unctione sanescunt, si foliorum pulvis aliquot diebus interea exhibeatur. Steriles quoque hoc fecundas reddi affirmatur, si post balnei convenientis usum partes circa pubem ac uterum isto inungantur, ac demum viro mulier misceatur. Nonnulli (inquit Fuchs.) pomum oleo prius imbutum aliquot dies insolant, deinde vel fimo, vel terrâ tantisper obruunt, dum prorsus intabuerit, sic Balsami vires glutinarias vulneribus adscissere pollicentur, inde tractum Balsaminæ vocabulum. Quid multa? in vulneribus sanandis Telephio non inferiores esse conjicio, hincque Balsaminam appellatam. Ego verò de ea peculiarem experientiam nullam habeo.

Poterunt itaque alij si lubet earundem virium facere periculum. Addit Tragus ex Hermolao: Oleum ex Balsaminæ primi generis seminibus exprimi ad vulnera præcipuum. Alij asserunt poma hæc in oleo macerari, idque postea vulneribus glutinandis mirificè prodesse, ita quidem ut si equo nigro auriculam præscindas, albo postea equo, cui itidem sua præcisa sit, vi hujus olei agglutinare possis. An verò sic se res habeat mihi non constat. Author Pandectarum multa de illa scribit.





HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XVII.



SCANDENTES SILIQVATAE LEGVMINOSAE.
ALIAEQVE SIMILES, NEQ SCANDENTES:
VT TRIFOLIA.

TERTIVS scandentium ordo, est filiquosarum. Saneque ha illa filiqua, qua legumina sinu suo comprehendunt, *καρπια* quoque dicta, qua tamen si lubet, & *λίβος* dicat cum Graecorum nonnullis, & Phaseolos cum Latinis, *φασέλιος* cum Dioscoride, & *φασίλιος* cum Galeno & plerisque, & *δολίχος* cum veteribus. Est quidem filiqua neque caro, neque lignum, neque cartilago, si propria loquere: neque temere aliud nomen inveniatur, quam membrana, vel corium: quod duplex: carneum & mollius, exterius superinsectum: ac interius durum, quanquam tenue, quodque nullum edomare queat stomachus. Maximus sane illarum stirps. Siliquarum adiacimus Trifolia, non una similitudine illis affinia, sed nec multiplici varietate illis cedentia.

PHASELVS, PHASEOLVS, PHASIOLVS, DOLICHVS ET
SMILAX HORTENSIS IN GENERE.

CAPUT I.



SCANDENTIS ergo procedant filiquatae, primumque Phasoli qui tum multitudine, tum elegantia, tum raritate ceteras multum antecellunt.

Distinguunt Phaselum [φάσελος] à Phaseolo sive Phasiolo [φάσιλος]

Galen. Paul. Cord. in Diosc. Dod. Corn. Matth. Turn. Cas. & passim alij. Sed distinxit & Diosc. qui tamen pro Phaseolo Phasiolum legit, ac rursus pro Phasiolo, Smilacem hortensem [σμίλαξ κηρία] reddit. Quod autem distinguat, id non solum diversa Phasoli & Smilacis nomina sub diversis ac multum à se invicem separatis capitibus, sed discrepantes quoque earundem historias satis superque comprobare arbitror.

Sunt, inquit Gal. de alim. facult. qui Phaselum eundem cum Lathyro esse dicant: alij autem ipsius speciem. Dolichorum nomen à Diocle quidem scriptum est. scriptum etiam est in libro Hipp. de rat. vict. Existimo autem ipsos sic appellare semen plantae hortensis, quam nunc vulgo numero multitudinis bisariam nominant: quidam enim *λόφος* [filiqua] alij *φασίλιος* [Phaseolus] nuncupant, vocem ipsam quatuor sillabis proferentes, eoque modo diversum ab eo, quod tribus sillabis pronunciant, *φασίλιος* scilicet efficientes. Quod ad Dolichos attinet, con-

jectare quis possit, eos nominare plantas hortenses, vel ex iis, quae Theophr. 8. de plant. hist. scripsit. Ex eo autem quod ligna longa iubet affigi, posset quis conjectare, ipsum verba facere de iis, quos nunc Phaseolos, & Lobos [filiquas] diximus. Ipse autem id lobos [filiquas] appellat, quod semen leguminum continet. Et sane ipsos quidem Dolichos lobi [filiqua] continent: ob eam opinor causam fructum totum vulgò nunc lobos [filiquas] nominant. Cum Hipp. nullam prorsus Lathyrus [Cicerula] aut Phaseli mentionem fecerit, suspicari quodammodo possumus, illorum seminum quoddam licere appellare Dolichon. Quod si quis Phaseolos quoque in Lathyrorum [Cicerularum] genera reponat, negare saltè non poterit, quin Lathyrus [Cicerula] in praedicta oratione Dolichi appellari queant. Nam & Diocles in leguminum catalogo Dolichos reponens, Lathyrus verò nomen praetercens, eandem praebet dubitationem. Diceretamen quis possit & Ochros [Ervilia] & Lathyros [Cicerula] & Phaseolos unum esse genus, verum pluribus appellari nominibus: fortasse autem propter quasdam differentias, quae in ipsis apparent. Veruntamen quod Dolichi non minùs bisariam nutriant, tum quod aequè ac Pisae statu careant, iudicio esse debet, Dioclen Dolichos appellasse, quos nunc Phaseolos nominant. Vocet quisque quo libeat nomine, quos nunc vulgo Phaseolos & Lobos [filiquas] appellant, dum sciat ea talem obtinere facultatem, cuiusmodi Diocles

Coniectura Galeni. Dolichos esse Phaseolos.

Lobos Theophr.

Hipp. Phaseli non nominat.

Diocles Dolichos.

Doli-

Phaselum à Phasiolo distinguuntur.

Distinctio Diosc.

Phaselum de Lathyro, Gal. Dolichi.

Lobi Phaseoli.

Phaseoli.

HISTORIAE PLANTARVM

Hipp. illi
frat.

Dolichis attribuit, ad cuius sententiam Hippocrates propè accedit, cum inquit: Dolichi [Phasioli sive filiqua Corn.] pilis magis per alvum secedunt, minùs inflant, & probè alunt, nam ita res habet, nisi quod integros, & etiamnum virides, unà cum suis siliquis ex oleo & garo ut plurimum homines mandant: nonnulli autem etiam vinum adpiciant. Ex: Phaseli & Ochri semina homines & Fœnugrecum, priùs in aqua quoad radicem prodixerint, macerantes, ventris subducendi gratia mandunt ante alios cibos.

Distin-
Pauli.

Paulus etiam de Phaselo, & Phascolo, quem Dolichum nominat, ut de diversis eodem capite tractat. Ochron, inquit, & Phaselum maceratz donec etiam radices succreverint, ex garo ante cibum sumpta, alvum subducunt, ac plus quàm Fœnugrecum alimenti exhibent. At Phascolum & Dolichon integra cum siliquis vinidia comesta, excrementitia magis redduntur.

Dist. Cord.
Phasolum
quid.

Nonnulli, ut Cord. in Diosc. perhibet, Phaselum à Phasiolo distinxerunt, ita ut Phaselus sit legumen simpliciter nunc vocatum ab Italis Phasiolus; Phasiolus verò idem cum Dolicho. Sed istam differentiam nullus autor adhuc, neque ipse Dioscorides observavit. Quapropter cum videam, ait is, à multis diversas has plantas confundi, distinguam eas, quibus ab invicem dignosci possint. Sunt enim ambz legumina, magnam in foliis, floribus, siliquis, & seminibus affinitatem habentia. Phascolum igitur nostro iudicio quem Dioscorides hoc nomine recenset, quemque plurimi distinctionis gratia Phaselum, seu ut Itali dicunt, Phasiolum vocant, est Phascolum vulgaris Italicus, humilis minor albus cum orbita rubente, vel nigricante, caules sine adminiculo surrigens, quam plenius infra describimus. Alter verò, qui Dolichus ab aliquibus appellatur, propriè Smilax hortenlis [quid a? xptaia] vel fativa Phasiolifera vocatur, idque ad differentiam ab omni alia Smilace. Cordi gravem errorem, Smilacem phasioliferam, levem vocantis, vide postea de Smilace hortenli.

Dist. Dod.

Neque Dodonzo placet, ut quidam existimant, φάσιλον ac φασιλον idem esse legumen diversis nominibus appellatum, sed fructus diversos ac differentes, veluti Galenus ostenderit. Idem autem suam sententiam ita confirmat. Galenus primùm de Phaseli, deinde de Dolicho, qui Phascolum dicitur disputat: & licet videatur addubitare, quale legumen sit à Theophr. Diosc. Hipp. & plerisque aliis Dolichus appellatur, tamen Dolichum colligit & resolvit fructum esse in Italia hortenlis plantæ; in Caria verò, in agris nascentis, qui formam habeat Lathyris longiorem, ac Phascolum nominetur. Huic accedit Egineta de Phaselo & Phascolo, quem Dolichum nominant, ut diversis tractans. Iam & Phaselus, Italiz quidem ac Romæ vulgare fuit legumen: Dolichus verò peregrinum. Nam sationis Phaseli, Columella & Palladius meminerunt. De satione verò Dolichi nemo Latinorum scripsit, utpote qui in Italia rarus fuerit, atque in hortis tantùm satus, veluti Galenus innuit, cum subindè plantam hortensem nominans, ac in Caria scri referens; & similiter Dioscorides Smilacem hortensem cum nuncupans. Qui etiam scortim, separato capite hanc perstringens, aliam ac differentem Smilacem hortensem sive Dolichum à Phaselo esse, quem Phasiolum; nonnulli φάσιλον ac φασιλον, latinè Silquam, nuncupant, e-videnter demonstrat. Quas ob rationes dubium esse nequit, Phaselum trium syllabarum, à Phascolo quadrissyllabo diversum esse; non minùs quàm Cicer, Cicercula & Cicera differunt, quæ tamen nomenclaturis affinia sunt: ac à veritate recessisse eos, qui unum legumen diversimodè appellatum esse existimant. Hæc ille, qui sibi ipsi apertè contradi-

Dolichus
Galen.

Hortenlis
plantæ.

Phaselum
Italia le-
gumen.

Dolichum
peregrinum.

Smilax
hor. Diosc.

Phaselus est
Diosc. Pha-
siolus.

Error mul-
torum.

Dod. ut.

cite ejusdem Pemptadis quartæ, l. 2. ca. dum ait. Cùm apud veteres nullum aliud reperitur, quod Bonæ similis esse queat, quam Phaselus, Bonam eandem cum Phaselo esse consequi videtur: quem Græcorum complurimi φάσιλον, Dioscorides φασιλον, Simeon Sethi φάσιλον nominavit. Habet enim in primis Bonæ fructum Dolichus similem, at majorem, quæ major est, cujusmodi Phaseli esse Dolichus innuit, diminutivà voce, à similitudine Phaseli, φασιλον nuncupatus. Iam & Bonæ alta proceràque est, qualem Phaselum esse Columella testatur.

Et gravem Atropici [at triplici malè legit Dod.] consurgit longa Phaselus.

Vulgarem item olim per Italiam fuisse Phaselum, ex libris Columellæ, Palladij, Virgilij novissimum est, sationis enim ejus & tempus & modus in his docetur: Bonæ verò hac ætate nihil familiarius. His accedit, quod minoris Bonæ fructus, Sparti fruticis sive Spartij Lobum magnitudine ac formâ, & non raro colore, proximè referat: at Spartij lobos Diosc. tradit veluti Phasiolos. Phasioli autem quibus Sparti fruticis lobi à Dioscoride similes perhibentur, idem sunt cum Phaseli. quam ob rationem quadrissyllabus φασιλον per iota, à trissyllabo per iota φασιλον differre nequit. Vides ita contradictionem, φασιλον [Phaselum] quadrissyllabum, à φασιλον [Phaselo] trissyllabo differre & non differre. Hanc quidem contradictionem tollemus, si dixerimus φασιλον quadrissyllabum Dioscoridis, à φασιλον trissyllabo plurimorum non differre: differre autem φασιλον aliorum, seu φάσιλον, qui est Smilax hortenlis Diosc. [quid a? xptaia] à φασιλον plurimorum, qui est φασιλον ejusdem, quod Dod. non absque contradictione simpliciter asserit. Phaselum autem non esse Bonam [Fabam] præter rationes infra in cap. de Faba adducendas, vel hæc solùm id tam manifestè innuunt, ostendunt atque demonstrant, ut nullus dubitandi locus superfit. Nihil similis, inquit, est Bonæ, quàm Phaselus. Sed an illum fugit, quia omnis similitudo claudicat, nec quod simile est, idem numero cum simili dicitur. Adde Phaselus à Bonâ multùm dissimilis est. Bonæ folia subpinguia sunt, Phaseli non item: Bonæ siliquæ crassæ, carnosæ, mollibus ceu floccis lanosæ & hirsutæ sunt, non autem Phaseli: Bonam tegit oblongus dilutè virens unguiculus, nec Phaselum: Bonæ caulis quadratus, Phaseli rotundus. Bonæ igitur Phaselus esse non poterit.

Cur Dioscorides de Phascolo agit, & rursus de hortenli similiter repetit, si eadem res est Smilax & Phascolum? Duo traduntur esse genera Phascolorum, candidum & subfulvum, ait Cornarius. Candidum, quod Diosc. Phascolum vocat. Cornarius meo iudicio perperam φάσιλον & φάσιλον quosdam appellare scribit. Sicut etiam falsò à Phaselo separat, quem absurdè φάσιλον [Cicerculam] aut ejus speciem esse credit. Eos autem Germanis reprehendit, qui Phascolos, ceu etiam Smilacem Welschbonen, quasi dicas Fabas Italicas, nominant, siquidem idem faciant, quod in aliis rebus ignotis & peregrinis facere soleant. Omnia enim hujusmodi Welsch voce, ad rei alicujus nomen additâ appellant. In Phascolis tamen hoc gravius est, quod rei ignotæ penitus nomen fingunt. Ceterùm Phascolum subfulvum. Smilacem esse concludit.

Matth. Phasiolum in duo summa fastigia quoque partiti videtur, in campestre sc. & hortense. Hoc Smilacem hortensem, variis coloribus præditum est. Sc. aut; illud autem Phascolum à Diosc. descriptum, candidum ac vulgare in arvis in Italia.

Is non assentior, inquit Turnerus, qui legumen quod mihi Dioscoridis Phasiolis putatur ejusdem generis esse aiunt cum Dolicho Theophrasti, Smilace Dioscoridis, & Phascolo Galeni. Primo, quia in toto

Phaselus de
Bona Diosc.

Phaseli
Phasiolum
differre.
Dod. con-
tradictio.

Phaselus non
est Bona
campestris.

Phaseli
Bona diff.

Dist. Corn.
Phascolorum
duo genera.
Corn. ut.

Errores ali-
Germani.

Subfulvum

Phascolum
duo fasti-
gia.

Phaseli
Diosc. non
est ejusdem
generis cum
Smilace.

totò opere suo non consuevit Dioscorides duobus capitibus longè diffitis, de hortensi & siluestri planta eiusdem generis, sed eodem capite, aut ferè proximo agere. Atqui de Phaseolo agit lib. 2. cap. 101. de Smilace hortensi cap. 140. eiusdem libri, quod non fecisset utique si naturalibus duntaxat (ut Matth. velle videtur) differre credidisset. Quæ ratio si nõ valet, nec valebit Matthioli Secacul' faciendis Eringium, aut laurũ Alexandrinã & Hippoglosson esse distincta. Altera ratio est. Dolichus Theophrasti, Smilax Diosc. & phaseolus Galeni pereunt, neque ad frugem perueniunt nisi adminiculis fulciantur. At phaseolus Diosc. in Longobardia feliciter satis sine adminiculis ad frugem peruenit. Non est ergo phaseolus Diosc. idem cum Dolicho Theoph. Smilace hort. Diosc. & phaseolo Galeni. Postremò ab ipsis dissentis quòd auctoritates, quas pro se adducunt in nonnullis penitus contra ipsos faciunt. Scriptum est enim ex auctoritate Hipp. apud Galenum, Diosc. & Aetium, Dolichos minus esse statulentos, At phaseoli Diosc. non tantum statulenti sunt, verum status etiam excitant. Galenus quoque eo loco, ubi Dolichos & phaseolos eodem facit, absque omni dubio duas facit Dolichi species, eodemque modo phaseoli duas. Cum enim in principio ferè capituli dixisset ex auctoritate Theoph. Dolichos putrescere & interire, nisi adminiculis suffociantur, eiusdem capituli sine ostendit esse præterea genus quoddam, quod adminiculis non egeat. Atque hos ego phaseolos censo Dioscoridis, qui multum à Smilace differunt. phaseolus ergo Diosc. & eiusdem Smilax hortensis duo sunt distincta legumina.

Phaseolos Antiquorum nequaquam esse eos, quos vulgò *Phaseolus* vocamus (Cæsalpini verba sunt) patet ex eo, quòd Ætate seruntur, perficiuntur in Autumno, seruantur optimè incorrupti, & facillimè coquuntur. Galenus quoque phaseolum testatur alium esse à phaseolis: comedi in Alexandria, &c. Genus candidum recipitur in compositione quadam ad renes, sed eo loco phaseolus legitur, non phaseolus. Dioscoridis Smilacis hortensis descriptio partim Phaseolos nostrates ostendit, præsertim siliquæ similitudo cum Fenugræco, partim Turcicos vocatos, cum seminis varios colores tradit.

Tria etiam sub genere Phaseoli, specie inter se diuersa cognoscit Manardus legumina, *Phaseolum commune* [italicum] Phaseolum, quem & lobum vocari ait, & *Eruilium* [Pisa] & *Smilacem*, de quibus singulis separatim dicemus, à Smilace initium facit.

SMILAX HORTENSIS.

Descriptio **S**ARMENTORVM longissimorum beneficio sperticas & pergulas proximas, sese iis circumvoluens, conscendit, foliis donata ternis, ex vno pediculo aptis, hederaceorum non anguliformum similibus, asperis, satis nervosis, palmo quoquo versus amplioribus: Flores surculo peculiari coherent plures, Pili floribus multò minores: Siliquæ peniles succedunt, palmum & sesquipalmum longæ, siliquarum Pisorum crassitudinem mediam attingentes, semina continentia nouena, vndena, longa, renes imitata: sinu in medio impressum habentia, leuore eximio, colore mirum in modum vario, cinereo, eburneo, luteo, glauco, rubente, omnibusque his inter se mixtus striato,

Tom. II.

gutrato (Phaseoli vulgò appellati) inueniuntur aut



omnino nivesci, aut nigri, aut flauo, aut purpurei, aut amethystini, aut cerulei, aut rubri, aut lateritii ferè coloris, vel albi nigris venis aut lituræ distincti, ac etiam cinerei, & carnei coloris similib' venis insignes (Clus.) sapore viscido, leguminosus, nec omnibus grato. C. Bauh. Smilacem hortens-

Phaseolum
vulgare,
C. Bauh.

sem duplicem recte, vulgò, aliud, aliud peregrinum vulgare, aliud maiorem, fructu longiore, & tenuis tormani melius referente, qui communiter candidus: aliud minorem siliquâ angustiore: distant etiã crassitie & tenuitate. Hic variat floribus & seminis colore: flores plerumque candidi, pallidi, flauo, purpurei, aut amethystini, & ut Cordus hist. censuit, floribus colorem fructus sequuntur.

Verum in semine fructuque maior est coloris varietas, sunt nivesci, flauo, ex flauo obsoleti, purpurei, rubri, lateritii ferè coloris, amethystini, violacei, atro violacei, nigri, initio purpurei deinde atrii: vel alibi nigris venis & licetis distinctis item albi purpurei, orbibus albis variegati, vel spadiceis nigris maculis aspersis: nonnulli incani, atro colore, vel ab una parte, vel utrinque notati. Non minor sanè est varietas in Phaseolis ex America, Africa atque aliis regionibus, procul ab orbe nostro remotis, quam in his quæ in Europa nascuntur. Sunt enim maiores, minores, miræ colorum varietate inter se discreti. Illorum nonnulli, aut prorsus candidi, aut flauo, aut cinericei, aut fusci, aut atrii, aut rubri, aut amethystini, aut variis coloribus non vno modo distincti: interdum albo & nigro, rubro & nigro, flauo & nigro: sic alius ex flauo & spadiceo simul mixti coloris, at circa hilum candidus: alius roseus, in quo rubri non nihil elucet.

A Dioscoride ita describitur. *Σμῖλαξ ὀρεῖα*, cuius fructus *καρπός*, & non semen, ut falsò quidam legunt lobia [quasi siliquula dicat] & à pratur. nonnullis asparagus vocatur, folia habet Hederae [ὑπό] similia, molliora tamen: caules tenues & capreolos propinquis fruticibus implicatos, qui cò usque adolescunt, ut topiarii operis attegias seu cameras opacent, ut tentoria & scenas efficiant, alius. Fructum autem *καρπός* profert Fenugræco (ἡν) similem, longiorem tamen & insigniorem, in quibus semina similia renibus concluduntur, non æqualia quidem colore, sed ex parte subfulva.

Quæ sit Smilax ita declarat Aëtius. Qui nunc ab omnibus Lobi nominantur, apud omnes Veteres Dolichi & Phaseoli appellabantur, & ab aliquibus Smilax hortensis. Lobi quidem, hoc est, Siliquæ, quoniam præ aliis præcipue, ex omni siliquarum genere, quæ indumento interta sunt,

Smilax
hortensis

HISTORIAE PLANTARVM.

hæ folia vna cum filiquis, siue tegumentis suis
vt plurimum comeduntur.

Hæc est Smilax laevis, Hermol.

Hermol. doctè sentit nobiscum quidam nomen
[Smilacem hortensem] non eandem esse cum
ea, quæ lævis à Diosc. cognominata est: Recen-
tiores cum Aetio Phasiolum à Dioscoride per
Smilacem hortensem intelligere non candidum
sed rubentem, qui & Lobus & Dolichus dicitur
& lat. Siliquula.

*Siliquula. Marcell. re-
linguitur.*

Sed non sapit hæc nostra & Hermolai opinio
Marcello, qui tamen ipse, qualis sit Smilax hort.
& quibus in regionibus inueniatur, nescit dice-
re. Sed rationem, ob quam nostram opinionem
despicit, ipse perpendito. Parum verisimile mihi
videtur, inquit, ad eam altitudinem & frondium
copiam posse legumen aliquod augeri, vt scenas
& tabernacula vestiens inumbret. Theophrastu
si inspexisset, intellexisset vtiq; Dioscoridi eum
auctorem fuisse, cur inter legumina Smilacem hor-
tensem in tantum ascendere scripserit, vt topia-
rium opus efficeret, satis quidem commodè ad
exprimendum vocis & verbi captum.

*Marcell.
repreh.*

Quare Manardus meritis Marcellum reprehē-
dit dicens: Phaselum esse, qui nunc vulgò Pha-
seolus dicitur, quem & Virgil. vilem fuisse nun-
cupauit. Quod si animaduertisset Serapio, sub Lu-
bia nomine, quod certè à lobo Græcà voce de-
flexum est, Phaselos cum Phaseolis i. e. Erulia
minimè confudisset. Marcellus explodit senten-
tiam quam refert Hermol. non alio argumento,
quàm quòd verisimile non videtur ad eam alti-
tudinem legumen aliquod augeri, &c. sed semet-
ipsum proprio gladio iugulat, siquidem ipse Smi-
lacem, quicquid ea sit, in leguminum genere nu-
merandam dicit, ac ipsomet interprete tanto in-
cremento esse dicit Dioscorides, vt scenas & ten-
toria inumbret. Fateri igitur oportet, aut verbu
Dioscoridis *eximium* esse, non bene à se conuerti,
aut Smilacem, quæ ipsomet teste legumen est,
adèd posse crescere, vt tabernaculi instar Solem
arceat, atque, vt sequens est, eius argumento eos,
non reuinci, qui Phaselolum pro Smilace intel-
lexerunt, Serapio & Auicenna de Phasiolo nunc
vulgò vocato ea prodiderunt, quæ Diosc. de hor-
tensi Smilace. Nuper tamen etiam cognoui ve-
ram Smilacem in summam proceritatem ascen-
dentem, grana quoque in filiquis producentē,
Phaseolo communi præterquàm colore (rubra
enim, vel crocea sunt) similia. Multò tamen du-
tiora videntur, quàm communes Phaseoli.

*Smilax Ge-
ra Manard.*

Gortzius err.

Gortzius cur Smilacem fruticem hortensem
vocat? Quid quæso Smilax cum frutice participat.
Frutex à radice caudice multiplici, ramosusque
attollitur. Smilax verò legumen à radice folia-
tum, sine caudice prouenit.

*Brunfelsii
error.*

Gortzum Smilacem vocando fruticem malè
sequitur Brunfelsius.

*Marcell.
repreh.*

Dolichos, qui Galeno & Eginetæ Phasioli co-
gnominantur, Siliquam Theoph. & Smilacem hort.
Dioscoridis esse retinet Tragus, nec errat: ac aliter
etiam Marcellum, si is Smilacem hort. viridem
vidisset, pronunciaturum fuisse existimat.

Lonic. pro Dolicho & Smilace hort. falsò ico-
nem Pisorum exhibet, nec minùs verè Smilacem
læuem dicit.

Simili errore & Cordus læuam Smilacem ean-
dem statuit cum satia, quam Dolichon etiam
appellat. Phasioli altera species, inquit is, Pha-
seolo Dioscoridis, quæ aliqui distinctionis gratia
Phaselum vocant. [Phasiolo sc. albo, Italico, vul-
gari, humili, seu minori cum orbita rubente, vel
nigricante] formâ foliorum similia. Circumvol-

uitur hæc arbores & hælis, suntque ex ea coro-
næ. Estate: longiores hæc filiquas fert, propterea
ab aliquibus Dolichus vocatur, & fructus eius
lobi, quoniam insignes sunt filiquæ, in quibus fi-
gurâ Phaseli semina nascuntur, nec tantum can-
dido colore: nam inueniuntur nigro, croceo,
ruffoque colore, & mixtis etiam pluribus colo-
ribus simul. Hic Phaseolus, Smilax hort. & sati-
ua etiam appellatur: cum propriè loqui volu-
mus, Dolichum, Smilacem læuam siue satiuam, &
filiquas eius lobas appellamus. Germaniæ pere-
grinum fuit legumen hic Dolichus, nunc à plu-
rimis non tantum ciuibus, verum etiam rusticis
vmbra & ostentationis causa lenitur. Læuam au-
tem Smilacem eandem esse cum satia, Dolichus
appellatâ, palam fiet, si quis alios auctores de
Smilace legat, qui eandem herbam, lenem & sa-
tiuam esse iudicant, & duo tantum Smilacis ge-
nera esse dicunt, sc. asperum & lenem, quod in
hortu nascitur. Adhæc si vtriusque descriptio &
vires in Diosc. considerentur, quilibet iudicabit
eandem esse herbam lenem & hortensem Smi-
larem. Propterea ipse Diosc. errauit, quòd credi-
derit lenem Smilacem proprium genus à satia
haberi. Dioscoridem in hac re secutus est Gale-
nus, qui ait lenem Smilacem asperæ similes vires
obtinere, quod falsum est. Nam lenis Smilax ter-
restri constat substantia, vt omnia ferè legumi-
na: propterea etiam grauiora & tumultuosa facit in-
somnia. Asper verò Smilax longè alio constat
temperamento, quod ex gustu percipi potest.
Sapore enim nihil commune cum leni Smilace
habet. Cum autem plantarum temperamenta &
facultates, ipso Galeno teste, ex sapore iudican-
tur, necesse etiam est, asperam Smilacem nihil in
viribus eum leni Smilace commune habere, vt
Diosc. etiam indicat, qui Smilacem læuam tumul-
tuosa insomnia facere dicit, asperam verò contra
lethalia venena antidotum esse. Cum igitur tibi
breui Galenus lenis Smilacis vires perstringat, &
minimè verum temperamentum illi assignet, fa-
cile colligitur, ipsum nesciuisse, quid lenis Smilax
esset. Et hæc Cord. in Diosc. qui in hist. quoque sa-
tiuam & læuam Smilacem eandem facit, ac Doli-
chum vocat. Eum autem licet inter Botanicos
magni faciã, nihilominus tamen temerè nimium
erroris accusat Dioscoridem & Galenum: nec vi-
demus tantam similitudinē in descriptione Smi-
lacis lenis & hortensis, quantam facit Cordus:
conferatur descriptio seminum & filiquarum,
præterea non conueniunt Phaseolo nostro Smi-
lacis lenis flores, nec etiam quod dicitur hanc fo-
lia per Autumnum amittere: quemadmodum
Smilax phasiolifera in totum perit. Vires etiam
non respondent. Quis obseruauit Phasiolos præ-
stare, quæ Diosc. de Smilace læui prædicat: nos
sepius comedimus, nec tumultuosè somniamus.
Videtur igitur Dedoncus non malè sentire
addita fuisse capiti Dioscoridis de Smilace hor-
tensi illa verba, *grana semina facit*. Andaster ni-
mè falsitatis accusat Galenum, cui nota erat
Smilax læuis, differens à Phasiolifera & Smilace
aspera, non solum figura, sed etiam viribus. Quæ
Galenus scribit de Smilace excusant etiam Dios-
coridem ab errore, & demonstrant non idem
esse Smilacem hortensem & læuam: ac indicant
ipsum & Cordum nesciuisse, quid esset Smilax
læuis, & malè confudisse cum Smilace Phasiolife-
ra, ambasque turpiter vnā & eandem dixisse.

Matth. in pronunciando & determinando quid
esset Smilax hortensis, sibi minùs constitit.
Nunc enim credidit illos, à veritate haudqua-
quam

*Dolichus
cur vocatus*

Loba.

*Est Smilax
laevis Cordus
sed falsum.*

*Diosc. non
tur. & Gal.
lenus.*

*Smilax læ-
uis & satia
ma Cordus.
Cord. tamen
tur.*

*Dioscoridis
locus suspectus
&c.*

*Galenus ex
Diosc. non
dicitur.*

Phaeolus
Diosc. Mat.
stus.

quam descivisse, qui dixerint Phaeolorum genus priori loco à Dioscoride descriptum, esse Smilacem hortensem. Nunc autem eos putavit nequaquam hallucinatos esse, qui asseruerint Phaeolos coloribus infectos (quos nihil ab hortensi Smilace differre existimat) Dolichos esse Theophr. Gal. & Pantl.

Turica
multicolor
Faba
Phaeolus
Turicus
Compil. co-
fusus

Lob. *Phaeolus vulgaris*, *Turica multicolor* Fab. *Smilax hort.* Dioscoridis, *Dolichus* Aniquorum, An Lobos Galeni?

Cardano *Phaeolus Turicus*.

Compilator Tabern. non distinguit Phaeolos, ponit tantum figuras duodecim generum, nullâ additâ descriptione: plerumque autem figuræ nil demonstrant: ita confuit historiam.

Cæsalpinus, qui suam particularem habet opinionem, Smilacem hortensem facit Phaeoli genus peregrinum, quod in Italia feri ait in hortis opere topiano, viticulas vero ferre longiores, adminiculis egentes: siliquas breviores, sed latas & falcatas, instar Siliquæ arboris: semina grandiora Phaeolis italicis, ac magis depressa, lævioraque ac nitentia: colorem alius ex toto candidum inesse, qui magis probentur in cibis: aliis melleum, alius maculosum: aliis lineas nigras in candido circumagi, Phaeolos Turcos vocari: hos recentes insitantes esse, perfectos coqui in cibis, ut reliquos, qua in res fallitur. Siliquæ enim recentes coctæ non sunt insitantes, sed gratæ esui, coctæ cum iure carniū, vel butyro recenti, ut verè dixerit Diosc. olerum modo esui aptam esse siliquam cum semine Asparagi modo elixam. Sed de viribus & usu mox plura suo loco.

B. pin. *Smilax hortensis* siue *Phaeolus vulgaris* i. vel maior: *Phaeolus*, Brunf. *Phaeolus*, Dod. gal. & Cam. *vulgaris* (vel *Faba Turica multicolor*) Lob. Clus. pan. & hist. *albus* Ger. *Smilax hortensis*, Brunf. (quoad descriptionem Trag.) (cui & siliqua Theop.) Matth. (& *Phaeolus hortensis*) Fuch. Turn. Lac. Cord. in Diosc. Geln. h. Lugd. Tab. [qui, ut & Ger. fructus duodecim generum pingit] & Cam. *Smilax sativa* siue *lenis*, vel *Dolichus*, Cord. hist. *Dolichus* Theophrasti. Ang. *Dolichus* [siue *Phaeolus*] Dod. & Lon.

Porta napol.

Porta Neapolitanus pro Smilacis hortensis siue Phaeoli figura malè ponit Pisi maioris iconem.

Synonyma
linguaria

Smilax hortensis & *albus* Diosc. *Sinapi* Hipp. Diosc. Theophr. & plerisque aliis cum Galeno & Aëtio, cui etiam *agrostis*, nonnullis quoque *albus* ac *albus*, Lat. Siliqua. Botan. vulgò *Smilax hortensis*, & plurima ex parte *Phaeolus*, Arab. *Lubia*, autore Fuch. Germ. *Faseln* / *Welschbonen* Matth. *Strigfaseln* / *Windthoben* malè apud Fuch. *Sprengelbonen* / vocavit aliquando Geln. *Grassfaseln* / *Phaeolus* / *Welsch Erbo* / *Rothodertheil* / *vnd ander viel farben*. Belg. *Roomschbonen* / Gall. *Fèves printes*, *Faseoles*, It. *Fagiolo Turchesco*, Hisp. *Peyones*, Angl. *Kidneybeans* Boh. *faseoli*, Hung. *Törör borse*, Turcicum *Pisum*.

Smilax quidem nominatur, quod Smilacis similitudine conscendat & vicina adminicula aut frutices apprehendat. *albus* autem ac *albus* à siliquarum magnitudine. Sed verbum *Lobia* æquivocationem facit: nam apud Dioscoridem fructum Smilacis significat: apud Galenum verò & Aetium Lobos est Phaeolorum siliqua.

Æquinoct.
Ita.

Breviter hic in memoriam revocare conveniat amplam Smilacis æquivocationem. Item enim ita vocant, arborem glandiferam. *Taxum* similem Abieti, genere simplicem, *Fraxinum* ambiguum,

Taxus
Fraxinus
Smilax

Smilacem asperam, cuius plura genera, *Smilacem peralancem*, vel *Convulvulum maiorem*, *Smilacem horrensem* Dioscoridis, qui Dolichus est Theophrasti, de quo præsens nostra tractatio, *Smilacem lævem* minorem, quam *Helixem* ciliampelon cum campanulis vocamus, existimat tandem *Tragus* *Leptum* esse Smilacem asperam. Apium eum Scammanum Smilacis lævis speciem esse asseruit Dodonæus. Et *Gelseminum* repens videtur Cæsalpino *Smilax lævis*.

Smilacem hortensem habui variorum colorum in horto E. C. Montbelg. satam. Observavi Lugdun. Basileæ & passim alibi. Dolichum [siliquam vertit Gaza] ligno longo affixo ascendere, & frugiferam fieri, alioqui vitiosam reddi, ut est Theophrastus, idemque invidere videtur Columella scribens:

Et gravis Atriplex confert longæ Faseln.

Faselos teste Plinio, ferere qua velis terra licet, ab Idibus Octobris in Calendas Novembriis, Virgilius autem occidente Bonte ferere iubet.

Si verò Victamque feret, vilemque Faseln,

Haud obscura cadens misceat tibi signa Bootes.

Dolichos (ex autoritate Galeni) propter humiditatem topiosiorē non reponunt, cuius occasione solent corrumpi. Quod si quis eos quoque securè velit reponere, sicuti Pater ipsius faciebat, siccare ipsos penitus oportet. Sic enim hieme tota manent impures & incorrupti, eundem nobis usum, quem Pisi præstantes.

Coquuntur fructus vna cum semine, ut iam antè obiter ex Dioscoride relatum, & velut Asparagus, oleris modo editur. Ciet vinam & gravia somnia facit [hoc postremum perperam à nonnullis adiectum] autore eodem. Nutriunt quidem non minus quàm Pisi, Dolichi, consimiliterque flatus expertes sunt, verum iucunditate, & in alui directione illis cedunt, ut testis est Aetius.

Simeon Sethi apud Fuch. & Mauritani in primo ordine calidis & humidis esse Phaeolos statuerunt. Galenus etiam de alim. facult. humidiores natura esse assent. Reliqua ex Galeno vide antè. Quæ iis magis rubri sunt, pergit Sethi, calidiores. Manifesta quoque in iis humiditas, quod citò putrescant. Humorem generant crassum & pituitosum. Medium locum habent, ut ait Galenus, inter ea quæ faciliè & difficulter concoquantur, celeriter & tardè transiunt, inflant & non inflant, partim & multum nutriunt. Arte alios cibos cum sapâ sumpti, venere proutant. Cum Sinapi oblatis, plurimum noxæ deponunt. Albi igitur Phaeoli crassiores & difficilioris concoctionis, ac humidiores sunt quàm rubri. Proprietate autem quadam turbulenta somnia faciunt, sed ad bonam habitudinem corporis conferunt, & vinas movent. Et horum decoctum menses movet. Porta sibi persuadet Smilacem hortensem suis floribus papilionem ostendere, ac ided Venerem irritare & augere. Is tamen vti dictum, non Smilacis, sed Pisi maioris iconem exhibet. Sed Smilax sit, flos papilionem referat, ergone venerem excitat? Aut quæ consequentis necessitas, quæ necessitatis ratio? Vanitas & superstitio. Aut præterea, florem creare ex purpureo versicolore, fructum nigerrimum & rubrum, & propterea flatuosam habere naturam, ægrè perfici, brutaque in somnia parere, nos existimamus eum (ut & Matth.) scripsisse non ex experientia, sed secutum fortè Simeonem Sethi, & suam phantasticam imaginationem. Sethi autem opinio trahit originem ex lectione Dioscoridis prævâ. Nec persuadebit nobis clami-

Smilax la-
vis.
Smilax hor-
rensis.

Helixem cili-
ampelon cu
campanulis.
Lupulus.
Scammanum.
Gelseminum.

Locus.

Tempus.

Repositio.

Vitæ & vici.

Primum.

Cor.

Diosc. locus corruptus.

Tempera-

mentum.

Alum.

Correctio.

Diosc. mensis.

tans, deteriores nigros & rubros Phascolos albis aut variegatis: coloris enim ratione solā non examinamus variam esse vim Phascolorum, licet eandem sententiam tenere videatur Matth. ita scribens: Phascoli exalfaciunt & humectant ordine primo: atqui sului. flauī & rubri albis calidiores sunt. In cibis sumpti inflant, & ventriculo laborem faciunt, semen tamen generant, & venerem sollicitant, & praesertim si cum longo Pipere, Galanga, & Saccharo aspergantur. Id autem valentius praestant, si ex lacte bubulo coquantur, quousque rumpantur. Redduntur in cibo innocentiores, si cum Sinapi, aut Carni semine edantur cornicula dum viridia sunt: & tenera elixantur, & cum Pipere in acetariis eduntur. Phascoli masticati & illiti sanant equorum morsus. Adduntur etiam in fucis, quibus mulieres faciem concinnant. Ang. Gall. tradit agros impinguare, ac facere ut vermes non rodant frumentū.

PHASIOLVS VIOLACEVS.

CVM Smilacis hortensis in altum se extolentis quæ tentoria & scenas facere potest, ut scribit Diosc. vari coloris fructus passim obseruauerimus, ac etiam ipsi in horto E. C. ex diuersis locis conquisitos coluerimus, eos nunc enumerare fas erit:

Stuttgartiā igitur nobis misit D. Schnart. Phascoli violacei nomine f. uctum, Smilaci hortensi similem, sed paruum, ut Phascoli Italici sunt, totum purpureum, siue violaceum, excepto umbilico albo lucido. Eundem misit D. Phil. Steph. Sprengerus nomine Phascoli Aegyptiaci. Habui quoque Basileā datum à D. Mart. Chmielezio, cui prouenit in horto siliquis valde longis & tenuibus.

PHASIOLI NIGRI.

LONGA & lenta habet sarmenta reliquū tum generum instar, quibus perticis & pedamentis (si adponantur ait Clus.) se circumuoluit, & innititur: alioqui aded infirma, ut humi procumbant, & se spargant: his innascentur folia numero terna, longo pediculo inhzrentia, ut in vulgaribus Phascolis, & eiusdem cum illis amplitudinis, neruosa: sarmentorum nodis vnde prodeunt folia, nascuntur oblongi pediculi, in quibus flores bini, quaterni, seni, interdum etiam octoni, ex aduerso ut plurimum nascentes vulgatum formā, hoc est, floris Pili instar parē formati, coloris purpurascens, seu verius Amethystini: quibus succedunt totidem oblongi teretes lobi, initio virides, deinde maturitate flauescens, in quibus bina, terna, quina, sena, vel etiam octona grana, vulgatum quidem formam referentia, sed minora, & coloris, quando matura, nigri.

Clus. hist. Phascolus, Aethiopici appellatione missus ob nigredinem, ut verisimile est, vel forsitan quoddam ex Aethiopiā prima eius origo. B. pin. Phascolus Aethiopicus vel niger, siue 1. Aethiopicus lobis flauescens fructu nigro.

Lugduni Batavorum notus, semine ex Italia misso. Floret cum vulgaribus, vel etiam aliquando paulo maturius.

PHASIOLI TVMIDI, NIGRI, splendentes.

IN Kirkheim vrbē Vvirmbergica, in horto D. Ioan. Luzzii insignis Pharmacopzi obseruati Phascolos nigros, splendentes, tumidos, cum paruo hilo albo, ac similes Phascolis humidioribus minoribus nigris: his tenuiores sunt violacei. Et hic est forte Clus. deamur tertius.

Idem Clus. hist. Phascolus 13. ex Italia misso semine, Phascoli Aethiopici appellatione, similis nobis prouenit Francofurti.

Floret paulo maturius superioribus, eam ob causam semen facilius ad maturitatem peruenit.

PHASEOLI ATRO VIOLACEI

SUNT nobis Phascoli non multum differentes à nostris nigris, tumidis, nisi quod videntur paulo longiores & maiores, ac atro violacei, & minus tumidi, splendens ut dicti, eis est hilus, vel umbilicus albus, non multum etiam sanz dissimiles à violaceis, accedunt fortē ad Clus. Phascolum 15. initio scilicet purpurascens deinde atrum.

PHASEOLI FVSCI, FOLIIS CRASSIS & pinguibus.

PHASIOLVS Clus. 16. ex Guinea delatus suo lobo exemptus, terræ creditus Pharmacopzo Delphensi creuit, ad speculi symbolum, ad palmarem altitudinem, cauliculo satis firmo & rotundo, binisque aut ternis foliorum alas protulit, in quibus, ut reliquis Phascolis, terna folia, sed valde crassa, & pingua, longēque minora, Trifoli Asphalitis foliorum magnitudinem non excedentia. Ipse Phascolus semunciam magnitudinem non superabat, satis densus & crassus, coloris fusci cum spadiceo commixti.

B. pin. Phascolus Guinensis 1. seu Au fusco spadiceo: Phascolus peregrinus 16. Clus. hist. Sunt maiores & minores.

PHASEOLVS VVLGARIS ITALICVS HV-
MILIS, SEV MINOR ALEVS, CVM ORBITA
rubente, vel nigricante.

HV = c sic describit Matth. Phascoli albi, & magis vulgares, qui passim in campis seruntur, mense Maio, & quandoque post mensem sine pedamento per se subsistunt, sed in latum sese pandunt foliis hederaceis, maioribus tamen, & mollioribus, venosis, tortuis, ex vno pediculo prodeuntibus: flores emittunt candidos, Piso maiores, & quibus palmaria cornicula prodeunt, teretia, & in acutum desinentia, primo quidem exortu viridia, & per maturitatem albicantia. In his semina plura, quæ Phascolos appellamus, continentur, facie quadrupedum renibus similia, alba præter umbilicum qui tantum in his nigricat: In hoc capite Dioscorides de candidis tantum ac vulgaribus Phascolis differunt.

Non probamus Matthiolum dicere, semina similia quadrupedum renibus, videretur enim mihi non bene obseruasse eorum renes, hæc semina humanis renibus, magis similia sunt, quam illis, Iconem habet Matthiol. non nihil differentem à Smilace, quæ diuersa valde est ab icone Camerarii, quam hic posuit in ep. & hist. pro Phascolis: ei enim appositæ duæ siliquæ: in icone autem Matthioli, cum parua, cum magna (quamvis flores, malè pingantur) sunt plures flores & siliquæ: ita ut ad septem ex vno pediculo numerentur. Hinc colligo eam Camerarii non esse Phascolorum vulgatum, sed alterius generis de quo paulo post. Ipse etiam scribit in hist. se per Phasolum 4. Clusii non intelligere eum, quem in editione Matthioli proposuerit. Clusius autem ut paulo post dicitur, tradit suum Phasolum binos flores magna ex parte sustinere, nuda circa hilum nigra macula insignitum, quæ omnia demonstrant Iconem illam Camerarii ab eo non bene positam pro Phascolo Italico vulgari.

ſine Matthioli.

C. B. Scher. Hac eadem censura dignus Casp. Barb. qui in
suo renouato Martiolo pro his rhasiolis iconem
ponit Camerarii, quod non placet, ob causas iam
dictas, & postea repetendas.

In pin. vocat *Smilacem hortensem* siue *Phaeolū vulgarem* 3. *siliqua sursum rigente*, & *Phaeolum paruum italicum*: *Phaeolum*, Matth. album, Lugd. *Phaeolum* & *Phaeolum*, Ang. Cord. in Diof. & hist. *Phaeolum*, Czf. Flore est, inquit, maiore candido papilioni simili, foris in viridi colore palleſcente: foliis nullam asperitatem habentibus: sunt maiores & minores: sunt albi, subnigri, illi maculā nigrā, hi albā notati: est & minor albidus, cum orbita rubente aut nigricante.

An Dolich. An Dodonxo hist. frdm. & in fol. Dolichus alius minor (hanc vocat Bauh. in pin. Smilacem hortensem nunc Phascolum vulgarem 2. & hortensem minorem: dubitat autem an sit Phascolum Turneri: aut forte Phassoli illi, quos Tral-
Phascolum
parvum.
Alexand. lianus lib. 7. *gargures purp.* & lib. 11. Phasiolos Alexandrinos nominat, si modò per Fasiolum parvum Dolichos veniat intelligendus, quod verifimilimum videtur.

Loniceri 2-
p=.

Lobis. pingit hoc titulo **Groß fäseln / rhafe-
lus**, **rhafeolus** & **rhasiolus**; in descriptione ta-
men confundit cum eo **rhafeolum** Tragi, siue
pisum maius flore purpureo.

Cass. Dur.
Cast. Phasiolus non se attollens, semine albo.
Quamvis autē dicat hunc se non attollere, pingit
tamen pro eo Smilacis hortensis modo ad perti-
cam vultum.

An de hoc agit Bezz. obs. l. i. c. 8. In Creta Scarus piscis est saxatilis, qui delectatur mora circa rupes, vescitur etiam parua herba, quae ei placet, & quae alibi non prouenit, quae occasio, ut Scarus in Creta insula maneat. Incola qui norunt Scarum oblectari herba Phasiologum; in agris serunt, ac folia imponunt in nassis in mare diluendum (Siliquas pro se reseruant) ut attrahant eos, ac capiant, hinc illi nominant *Scarobalano*. Quod in Scaro melius est, est herba quae vescitur, cuius semper magna copia in eius ventriculo inuenitur. Hos esse credimus, qui à Galeno de alim. vocantur Dolichi, quique in Caria seruntur, figura cicereulis longiore.

Phascolus. PAſſIO dicitur Phascolus albus, qui compoſ. ten dem ex cicadis, ingreditur. Manard. l. 1. ep. 4. Phaselus communis, qui nunc vulgò Phaſcolus, quem & viſem nominat. Item l. 9. ep. 24. Phaſcolus, vel Phaselus communis.

CASALI. Phascelus, qui vulgò Fasolus, cui
semen candidum, maculâ nigra. Plura hac de re
videto antè.

Locus & tempus. • Seui in hortu E. C. Phascolorum Italicorum semina, quæ prius vidi Tubingæ, floruerunt Augusto. Patavii frequenter in cibo usus sunt. Matthiolo seruntur in agris mense Maio, & quâdoque post messiem.

βαρβαλ. Dioscoridis inflat, & flatus mouet,
& ægrè concoquitur. Coctus autem viridis, si e-
datur, aluum mollit, ad vomitionem autem ido-
neus est.

parant, ut dictum, quoq; rhasiolis muliebren-
tium hoc modo: sumunt rhasiolorum alborum
mixtæ panis triticeæ albißimi, an. lib. i. Cucur-
bitam longam, teneram, vitentemq; vnam,
dilectâ prius cucurbita, macerant simul
omnia ex lacte caprino nocte vna, deinde
addunt feminum Meloëponum vnc. v. nucleo-
rum petlicorum mandatorum vnc. ii. nucleorum

pincorum delibratorum lib. 5. Conterunt per se omnia in lapideo mortario, & deinde addunt pullum columbinum domesticum vnâ cum plumis in particulas dissectum, abiectis tantum intestinis, & omnibus simul mistis, ex vitro organo, ad hoc parato, in vase feruentis aquæ collocati, aquam distillant, & subinde diligenter custodiunt. Siquidein huiusce aquæ lotionem nitorem faciei conciliant, & cuti molissimum addunt lenorem. Reliquas vires & vsus, sicut & temperamentum iam autè tradidimus.

PHASEOLI TVMIDI MINORES
MIVEL.

Magnitudine vulgares phascolis minores
perlungue, nec ut illi, sinuati circa umbilicum.
Interim pulvinati magis, & tumidiores
omni ex parte pro portione sua. Colore niuri
sunt, & splendicantes, veritate vero abolescunt
& in eburneum, tandem etiam in pallidum mi-
grant.

Sic describit Clusius: Totâ formâ, & nascendi modo à vulgari haud differt: valdè tamofa enim habet samenta, quæ vicinis perticis sese aduoluunt, easque scandunt, oblongos pediculos ex foliorum (quæ s. mpe terna, vt in vulgari, simul nascuntur) suâ promentia: in quibus bini, quaterni, interdum etiam seni nascuntur flores, ex aduerto semper siti, vulgaris Phaleoli floribus magnitudine & formâ respondentes, initio, dum recens aperti sunt, candidi, postea verò pallescentes: quos excipiunt oblongæ, propendentes, vt in vulgari siliquæ, seu Lobi: quina, septena: & plura interdum candidissima, & quali ex ebore



tornata semina
cōninentes, mi-
nora & tumi-
diora, quàm al-
bi vulgaris.

Clus. pann.
Phaseolus. siue
minor mucus,
siue de Guati-
mela. Phaseolus
Porkirchou-
nus alter. Ex Hi-
spaniis an. 1586.
missus. *Frijoles
blancos de Guati-
mela*, hoc est
Phaseoli albi ex
Guatimela (que
noui orbis pro-
uincia est) Vere-
fatus egregie
creuit, & ad fru-

gem peruenit. Idem Hist. Phaeolus peregrinus
2. cui nomen apponit Cluius, quæ apud Lobeliū
nomine Phaeoli vulgaris exeat.

An Taber. scisse bonen von America. Phaeolus albus Africanus. Quem si compilator per suum signum cum capreolis non intellexit, nescio quam plantam intelligat: Phaeolum hunc accepi cum hac inscriptione: *Frizelas blancas de Guatimela*. Sacus in horto E. C. Montebelgardii provenit, sed non maturuit. Iulio flores, tructus Augusto, nonnunquam etiam mense Septembri, matrescit. Dum Viennae vixit, semine ab amicis communicato Clusio natus, nec antea ipsi conspectus.

PHASEOLVS NIVEVS, MINOR,
circa hilum nigrâ maculâ insignitus
ET PVMILO NIGER.

Descriptio
Lob.



Caret longis
sarmentis,
& breui, firmo-
que caule con-
stat, pedalem
longitudinem
raro excedente,
& in breuissimos
ramos diuiso, ad
quorum folia
quidem superio-
ri similia nas-
cuntur terna nu-
mero, sed bre-
uiori pediculo
inherencia, qui
non purpascit,
vt in proximè
descripto [Smi-
lace hortensi, si-
ue Phasiolo Ana-
gyridi simili fe-

re, colore rubescente.] Pediculi ex alis prodeun-
tes, longi, crassiusculi, firmi, binos etiam flores
magna ex parte sustinent, forma, colore præce-
dentis flori simillimos, deinde binos lobos illius
cylindræis siliquis paullo longiores, & teretes,
in quibus fructus forma par, sed colore differens,
nam niueus est, circa hilum nigrâ maculâ infi-
gnitus, & quibusdam nigris punctis interdum in
lateribus notatis. Satis præcox hic est, nec ullis
pedamentis eget, cum (vt dixi) breui, firmoque
sit caule.

Lobi
Lob.

Classo descriptionis authori in Pannon. Pha-
seolus de folijs 4-lobi Americani minores, sine Pumi-
liones. Item Phaseolus tertius, Alubias de Indias, id est, Lobi
minores.

Lobi
Lob.

Figura Clusii sub dictis nominibus, non habet
binos flores: sed plures, ideo aliò relegenda, &
huc transferenda figura, quæ est sub alieno titu-
lo, nempe Phasioli tertii, siue Americani elatio-
ris, verè enim comperimus in hist. Clusii transpo-
sitam iconem, ubi iconposita sub titulo Phasioli
peregrini 4. cui additæ sunt siliquæ, quæ dee-
rant.

Phaseolus
pumi-
liones.

Camer. Phasioli pumi-
liones albi, & nigri, quo-
rum hi magis, quàm illi aliosci sunt, quamvis
ambo frigiditate nostræ plagæ sapius à maturita-
te prohibeantur. Intelligo autem, quorum ico-
nem dedimus in Matthioli editione, & quos Clu-
sius in Pann. quarto ordine proposuit. Existimo
autem ego Clusii Phasiolum quartum, diuersum
à Matthioli Phasiolo, qui in Italia frequens, quâ
ob rem Camerarii figuram ad hoc caput reduco,
& separo à Phasiolo Matthioli.

Phaseolus
Brasilianus

Taber. Phaseolus Brasilianus Eresilthen booni.
Quantùm indicare possim ex figura elicta
ad Clusii figuram, ad hoc caput referenda i-
con.

C. Bauh.

C. Bauh. in suo Matth. proponit eandem figu-
ram, quam Camerarius, sub inscriptione Phasio-
li. Non autem placet Camerarium, & C. Bau-
hinum iconem eius plantæ, quæ Clusio Phasiolus
4. ponere pro Matthioli Phasiolo vulgari: diuersi
siquidem, vt antè dixi, quod facile apparebit,
conferenti utriusque iconem, nisi dicatur Mat-

thioli icon falsa.

Erd. B. pin. Phaseolus peregrinus 6. minore fru-
ctu, albo, nigrâ maculâ insignito: Phaseolus pe-
grinus 4. Alubias de Ind. as, Clus. pann. quoad des-
criptionem: & Hist. Phaseolus albus, Lugd.

Creuit etiam hic mihi [inquit Clus. Viennæ
anno 1576. donatus à Dodonæo S. C. M. tum
Medico, qui eius fructum præcedente anno, dum
Præge esset, in arcis horto obseruauerat, & le-
gerat.


PHASIOLI PARVI, ALBI, CVM
ORBITA MINIMA, RUBENTE,

Habemus paruum genus Phasiolorum albo-
rum, non tamen candidorum, cum mini-
ma orbita rubente, & paruo hilo albo.

PHASIOLI MINIMI, ALBI,
orbita magnâ rubente.

Sunt nobis Phasioli minimi albi, minores quàm
Phasioli cum orbita nigrâ: nescimus an tem-
perales [ascriptum erat repositos inter aroma-
ta] his sanè similes sunt: orbita magna est, sed
rubens, cum hilo in medio albo.

PHASIOLI PARVI, PALLIDI
albi, ex America delati, Lobelio.



A Lob. in l-
con. pin-
guntur Phasioli
parui, pallidi
albi ex America
delati, Idem in
Histor. Belgica
Orange ghe-
maciberde bo-
onensis. Fieri
potest, vt vnus
præcedentium
paruum Pha-
siolorum esse
deberet: Pha-
seoli parui ex
pallido albican-
tes ex America
Lobelio delati
pin. Pha-
seolus Ameri-
cantus vel Brasi-

liand 5. minor: Phaseoli parui ex America Lob.
Lugd. Phaseolus Brasilianus. Tab. Huius ma-
gna varietas, quare fructus duodecim genera.

PHASIOLI PARVI ITALICI,
NIGRI, CVM MACVLA ALBA.

Gener Cherlerus attulit nobis ex Italia Pha-
siolos paruos, nigros: parte caua hilus par-
uus albus: parte verò superiore, gibbosa, longa
& lata maculâ.

PHASEOLVS NIGRICANS HYLO
PROMINENT

Phasiolus alter, Phasiolo vulgari haud dissimi-
lis est, sed minor, densior, nigricans, & hy-
lo pro-

lo prominente, & renis formam minimè referente. Clus. apud Monardem. Eadem tradit Lob. in Obs. ex Clusio.

**PHASIOLVS LATA SILIQVA, FRVCTV
EXIGO NIGRO, VMBILICO CANDIDO.**



Vidit Clusius nō procul Olylipone in monasterio quodā Phaseoli genus vulgari aded simile, vt vulgare putaret: perguilas istie vestiebat opere ropiaris, flore purpureo: at siliquæ scabre sunt, breuiiores & latiores, quàm nostri vulgares, fructus est exiguus, Pisi vulgaris magnitudine, totus niger, nisi qua parte sili-

quæ adherent, quæ candida est: Brasilianis frequentem esse audiuit. Clus. apud Monard. & ex eo Lob. obs. & Icon. & Tab. Phasiolus alter Brasilianus. Audiuit Lusitanis apud Brasilianos habitantibus, *Fava brava*, id est, Fabam illustrem nuncupati.

Phasiolus alter Indicus Clusij: Phasioli genus vulgari simile. B. pin. Phaseolus Americanus vel Brasilianus 2. siue alter, fructu nigro, pisi magnitudine.

act, contrariâque, quæ sarmentis inheret, ex atro purpurascit: flores in oblongis petiolis, plurimèque bini, magni, Pisi formâ, foris ex candido pallescentes, interiore verò parte ex purpura exarulei: his succedunt totidem prælongi lobi, teretes, & quasi cylindracei, in quibus fructus reliquis Phaseolis minor, Anagyridis legitime fructui penè similis, rubescentis coloris.

Civ. pann. Phaseolis, genus, Lobi Americani maiores, Phaseolus verius Americanus elatior. Acceptus ex Hispania cū hac inscriptione: *Alubim de India*, id est, Lobi Indici.

Figura huius Phaseoli, vt mihi videbatur posita erat pag. 723. sub alio titulo, nempe Phaseoli Pucherani secundi, quod non pertinet, id demonstrante manifestè numerus florum: quæ omissio, vt ad hoc caput reducere visus ex Clusio suam figuram: in quo nos bene egisse apparet, ex ejus Hist. lib. 6. cap. 49 vbi ponitur pro Phaseolo peregrino tertio.

**PHASIOLI RUBENTES FIGVRA PENÈ
nostratium cum linea clatâ.**

Pulchro rubente colore splendicam, cortice & circa umbilici ambitum coccineo, Umbilicus niger forniculi majoris magnitudinis, supra quem macula nigra, sulco diuisa. Parte opposita, quæ dorsam Phaseoli dici potest, linea elatior per longitudinem excurrit, & totum Phasiolum usque ad hilum circumscribit. Nostratibus etiam sunt paullo ventriosiores, habitioresque, ac ad Anagyridem accedunt formâ, & magnitudine.

Acceptimus ab Illustrissima Principissa, & à D. Thoma Platero, Medico Basileensi, qui ex Hispania se importasse retulerat. Considerandum an affines, vel fortè idem, cum Phaseolo Clusij Anagyridi simili.

non habebitur post eum Phaseoli indici parui maculati Icone.

**SMILAX HORTENSIS, SIVE PHASIO-
LV ANAGYRIDIS SIMILIS FERÈ, CO-
lore rubescente.**



Habet hic Phasiolus oblonga sarmenta, ex singulari caule statim secundum radicem ipsam prodeuntia, & in multos ramos diuisa, læta, oblique se contorquentia, & humi procumbentia, nisi per tectis, aut pedamentis sustineantur, quibus sese circumvolunt, reliquorum Phaseolorum modo: purpurascent ea juxta alas, ad quas etiam adnascuntur terna folia, minùs amplâ superioris toliis, & diluore colore virentia, longo pediculo inherentia, qui ea parte, quâ folia susti-

**PHASIOLI EX GVINEA PALVDANO,
spadicei, minimi.**



Et hos quoque pulchellos cum aliis multis exorice elegantia Clariss. Paludano descripsimus. Parui sunt, Africanos magnitudine vix superâtes, splendido luxore, spadiceo, aliâ diluore, aliâ obscuriore, plurimum tamen æquabili colorati, hilum verius nonnihil angulosi: Hylo, qui pro corpusculi mo-

dulo sat magnus candidusque, modice, linuati. Pulpa subest cortici callosa, subtila, gustu phaseolaceo.

Considerandum an differant, vel quantum à Clusij Phasiolo quinto, Baburni fructu.

Flores.

Lobi
Fructus.

Lobi, Anagyridis
Fructus de
India
Icon. Clusij
transposita.

Descrip.
Corpora
Umbilicus.

Anagyridis
Fructus
Locus.

Descrip.

Hylo
Palpa.

An Phasioli
Fructu
Baburni.

PHASEOLI AFRICANI PARVI
nonnulli albicantes.

Descriptio.

Folia.

Florus.

Altera.



Phaseoli ex
Insula D.
Thoma
Locus &
tempus.

garibus angustiores, vix eulmum late, grana claudunt nonnulli candicantia, dimidio minora, Phaseolis nostratibus, circa germen fusca.

Phaseolorum Africanorum, parvorum, nomine missi per Carolum Paludanum Ill. E. C. Wirtemb. Accepi etiam cum hac inscriptione: Phaseoli ex Insula Dni Thome sub Aquasore sua.

Satum huius Phaseoli semen in horto Ill. E. C. Montbelgardi floruit Augusto, & Septembri, quo mense quidem maturuit semen.

PHASEOLVS LABURNI, FRVCTV
ex nigro subuirescente, siue Aegyptius
flore luteo.Descriptio.
Sarmen.

Folia.

Florus.

Color.

Thema.



citur] foliis perquam similia, ex atro virentia circa pediculum purpurascencia: flores in spica modum congesti, magni, nisi vulgaris forma, & magnitudine ferè, coloris flauo, in oblongo, crassiusculoque pediculo ad foliorum exortum prodeunte nascuntur: lobos non observabam quia flores duntaxat produxit ipsa planta, totque val-

DE Phaseolorum quoque more scandit & præsens plantæ folia terna, minora, strictioraque multo quam in vulgaribus, paulo duabus vnciis longiora, non totam semunciam lata; nervosa, glabra, crassa: flores ex obsoleta quadam fuligine in luridum pallorem languescunt, vix dehiscences: siliquæ sesquipal-mum longæ, vul-

de caducos propter advenientia frigora: Breves tamen angustolque esse intelligebam ab his, qui conspexerant, & terna, aut quaterna grana continere: quæ verò accipiebam parva erant admodum, Laburni grana non maiora, utroque tamen microne plarumque obrutiora, pulli coloris, seu potius ex nigro subuirescentis.

Clusio hist. Phaseoli peregrini genus. Phaseolus Aegyptiacus Patavio missus à Bernardo Paludano ex Syria & Aegypto reduce; anno 1578. qui terra anno sequenti creditus, crevit quidem, sed serò admodum, deinde perit. E seminibus conservatis & anno 1582. demum satis, aliquot plantæ egregie provenerunt, quarum una florem Septembri duntaxat mense tulit, ac ad frugem minime provenire potuit ipsa tamen plantæ Calendis Novembris perbellè adhuc florente: hoc semen A. Paludano; ac deinde ex Italia Aegyptiati Phaseoli nomine simile accepi. Et tunc Phaseolus hic peregrinus Dolichus est Bellonii.

Aduertes apud Clusium in pann. iconem quæ est p. 729. sub titulo Phaseoli quinti Aegyptiaci, non esse Phaseoli, quem intelligit Clusius, sed sub hoc titulo reponendam iconem, quæ est pag. 727. sub nomine Phaseoli tertii, Alubras de Indias In pann. p. 730. est alia icon, cui titulus Phaseolus quintus, siue Aegyptiacus: quam iconem Clusius omnino omisit.

Cambr. in hort. Phaseoli Aegyptii à Clusio picti in pann. observationibus sine siliquis quas nos addidimus.

PHASIOLVS INDICVS PARVVS,
maculatus.

Icon eadem cum ea qua lib. III. c. 88. habetur.

PHASEOLUS est vulgata magnitudine penè æqualis, utrinque turgidus lucidus, colore pullo, maculis notato, præsertim circa umbilicum, longiusculus, quem portio quædam alba, extuberans, cingit. Est ex fructibus illust. Cels. Wirtembergicæ.

PHASEOLVS INDICVS, PARVVS
rubens, hilo nigro.

PHASEOLUS parvus, sinuatus, hilo nigro, reliqua parte obscure rubens. Ill. Ducissa terra commissæ, apud quam visus & depictus.

Icon eadem præced. habetur.

PHASIOLI NIGRI, FACIE
feminis Peronix, splendicantes, umbi-
lico albicante. h.

Alter

Alter *Aegyptius minimus*.

Magnitudine & figura ad semen *Paeoniae* semina quam proximè accedunt. Quippe ex rotundo sublonga sunt, nigerrima pulcherrimè, & Succini nigri, politi instar, splendicanti, eà tantum parte, qua adherent, quam umbilicum dicere solemus, albicantia. Existimamus, nisi fallit memoria nos accepisse à

D. Paludano, qui Ill. nostro misit. Perpendat lector, an possit esse idem cum Phasiolo præcedente, latè siliqua Clusii.

Est mihi præterea minimus phasiolus missus per insignem Pharmacopœum Tossanum Carolum Burgundum Phasioli *Aegyptii* nomine, qui Piper magnitudine vix æquat, angulosus, sublongus, colore spadiceo, ac terè nigricante, splendente, umbilico candido, longiunculo, cuius parte opposita impressio sinum efficit.

Exon eadem cum ea qua l. 3. c. 92.

PHASEOLI PARVI EX AMERICA delati, Lobelii, ex fusco purpurascens.

Lobelio in l. & hist. Belg. dicuntur. *Clein boonfens* don America / In lateyn Phasioli parvi ex America delati: An Eid adu. Permultæ acceptæ à Naucleris, Fabæ, Phascoliæ ex America nouo orbe, æque *Hesperia* *Aphrica* allati, qui mixtæ naturæ videntur, sed propinquioris Phasiolo: nam eorum quidam exiguus, minor multum Phasiolo, ex fusco purpurascit.

Lugd. Phasioli parvi ex America dicuntur. Ego autem, ut verum fatear, quales sint hi Phasioli, nescio, quia eorum nullam inuenio descriptionem, de qua certus sum.

PHASIOLI EX ANGOLI.

Paludano, pallidi, variegati, hilo magno, spadiceo.

CL. Paludani munificentia in Naturalium nostro thesauro aliquot horum adseruamus: qui vulgaribus ventrioliore, læues, maculis insigniti, colore varii. Quidam namque obscure flauescens, seu melini, dilutiore luteolo conspersi: quidam pallidi, & ferè albicantes, pullis maculis insigniti, & horum ubiuis varietas in colore notabilis. Hilo donantur magno, spadiceo, aut nigricante, à suprema parte, plusquam mediā tructus longitudinem excurrente, minimè sinuato, sed eminente. Tanta portò eorum durities, ut ex eorundem collisione Auelanarum instar sonitum edant: considerandum an aliqui in figura Lobeliana pictorum, nomine

Phascoli Indici rubri huc referri possint.

Hunc eundem ab Illustrissima nostra Principissa accepimus, qui vna parte latior est, altera angustior, in ceteris cum nostris qui iam sculpti erant, planè similis.

Exon habetur ante eam Icone phascolorum ex Guinea Paludano missi, l. 3. c. 92.

PISVM AMERICANVM COCCINEVM, aliis Abrus, & idem nigrum.



Icon alia Clus. Exor. l. 4. c. 25.



Americanū *Pisum* coccineum nostrati est minus, granorum *Paeoniae* semine in morem ex rotundo oblongum, nitidum, mirificè durum, coracè tectum vel penitus nigro, vel bicolori, ita ut germinis regio nigricet, reliquū vel hilari atro splendeat, vel tristiori spadiceo colore sit tinctum: medulla insigniter durā, bifiida; hauescit, sapore leguminoso. Habemus etiam tota nigra: & alia, quæ colore spadiceo sunt, nihilominus nigra macula notati. Quod an naturale ipsi sit, an hoc accidat per vetustatem, experientia obseruatorem itarum rerum curiosum docebit.

Hoc *Pisum* sic describit *Alpinus*: Est arbor fruticosa, sarmentosa, volubilis, Lablab modo serpens, ac aliud se extol-

lens, latiusque se expandens, foliis vel Tamarindi planè similibus, sed longe minoribus, mouentur etiam ad Solem: occidente Sole clauduntur, totaque clausa manent, quousque Sol denud oriatur, quo tempore rursus aperiuntur. Flores audio ferè Phascolis proximos, atque siliquas, quæ intus habent semina parua, rotunda, rabra, dura, Phascolis omnino similia, quæ Corallia planè emulantur. Hic addit *Honorius Belus*: Fructus figura Phascoli non est, sed ouali, Orobi grati.

Clus. in suis Exor. aliam iconem proponit sub titulo *Viciae Africanae*, de qua haec scribit: Eius semina a nautis Batavis à Guinea redeuntibus

Descrip.

Cortex.

Medulla.

Sapor.

Alpinus Descriptio.

Folia.

Siliqua Semen Coralliorum amala.

Fructus Orbi Descriptio Clus.

1. Descrip.

Color.

2. Phasiolus Aegyptius minimus.

Phasioli ex America.

Quales sunt autem sub scriptis.

Descrip.

3. In

*Nascentia
modis.
Folia.*

Cauliculus.

Culiculus.

Flor.

Siliqua.

Semina.

*Vicia A-
fricana.*

*Alpin.
Arab.*

Pisa rubra.

*Coccineum
Americum
Pisum.*

*Santalum
rubrum.*

Phasiolus.

Arab.

magna copia subinde sunt allata, & ramulos cum suis siliquis, siue lobulis propendentibus, etiam mihi videre contigit. Sæpe porro istius plantæ semina terre à me sunt credita, sed maxima ex parte non nata: imò [quod magis miram] post tricennium in terra erant, adeo incorrupta reperta, ac si pridè duntaxat sata fuissent. Semel tamen contigit, ut quæ recentia à Cl. V. Honorio Bello acceperam e Creta missa, terra in sicili commissa nascerentur quidem: sed plantæ, licet omnem diligentiam adhiberem, ut coiservare possem, breui contabescerent. Prodiabant autem illæ, Viciæ, aut Lentis modo, duobus duntaxat crassiusculis foliis initiò, ipsò videlicet semine bifariam se dividente, & in folia formante, ut in Leguminibus accidere solet: inter ista verò folia nascebatur cauliculus sustinens aliorum foliorum alas, quæ ex multis foliolis contrario semper nascentibus constabant, denis, duodenis, aut pluribus, nullo impari alam finiente, instar Viciæ siluestris, aut Lenticulæ: valde caduca est planta, quæ nisi falcietur, procumbit, Pisorum instar; inter foliorum alas, quæ sarmenta aut caules amplectebantur, satis firni & oblongiusculi exoriebantur pediculi, sustinentes alternis denos, aut duodenos flores, Viciæ, aut Lentis floribus [ut arbitror] non dissimiles; mihi enim eos videre non contigit, sed oblongum duntaxat pediculum ressecatum apud honestissimum virum Christianum Potretum, deinde anno 1602. alterum si nilem mihi donatum ab honestissimo Viro Petro Gareto. Istis pediculis inhærebant deni, duoeni, aut plures pediculi breuiusculi, satis crassi & rugosi, quorum singulis graciliore, breuioreque adhuc petiolo dependebat siliqua rugosa, spadiceæ foris coloris, vnciam, aut paulò amplius longa, semunciam lata, illaque aliquantulum plana, mucrone instar hamuli curuo, interna parte albi, in qua continebantur quaternæ, aut quina semina durissima, orbicularis ferè, vel ovalis formæ, prorsus rubra & nitentia instar corallii expoliti, quum probe matura sunt, summa autem parte, quæ siliquæ inhæserant, omnino atra, & præ laeuore splendens. Huic plantæ, *Vicia Africana* nomen indebam quia ex Africa eius semina semper delata memini. Cl. V. Prosper Alpinus lib. de plantis Egypti, cap. 21. *Abrus* appellat, arboremque inproprie [mea quidem opinione] facit, quandoquidem volubilem, *Lablab* [quod Phascoli genus] modo serpentem, latiusque se expandentem, esse scribit, & ridice se conuoluentem pingit. An Aloys. Cadamur Arborea quadam, quæ in regno Senegæ Faxiolas producant rubentes, cum macula nigricante, quæ est illis pro insigni, & à nostris oculus dicitur, alii hilum appellant. Phasioli autem, qui nusquam elegantiores videntur, instar nucis Avellanae faberrimè facti sunt, diceret toro aliquo insculptos ac striatos, adeo variantis naturæ ars in eis ludit, res visu conspicua,

Gesl. Pisa rubra ex nouo orbe allata. Lobel. Obs. & Ic. Coccineum Americum Pisum; An Orobi species? Pisa ex nouo Orbe delata, non delata, non decerpta ex quadam arbore, ut quidam putarunt. Cæsalp. Santali rubri semina. Alpin. Phasiolus ruber, Abrus vocatus. Cam. h. Phasiolus Indicus; vulgò falso Pronia Indica vocatus: missus est, Ginge & Abrus nomine. Lugd. l. 4. c. 41. Pisum Americum; Pisum coccineum, Americum. Eid. c. 12. Pisum Americum, Indicum nuc. B. pin. Pisum Indicum minus coccineum; Fabarum genus quod Egyptiis Abrus, part. 2. Ind. or.

c. 4. Et hic maior coccineus nigra macula notatus, reperitur. Accepi inquit Honor. Bellus, semina phascoli ex Iemen, (ex Arabia felici quæ terræ commissa felicissimè nata sunt, quæ ab Alpino sub Abrus nomine describi paro, licet ipse fructum non rectè [meo iudicio] descripserit.

Hæc ex Lincho. In vniuersa insula Madagascar, item in China, Phascolorum genus quoddam crescit, quod Latini Abrus vocant. Malayentibus autem *Condui* appellantur, & Iauanis *Saga*. Perelegantes sunt, parui, rotundi, nigra macula insigniti. Viuantur his tantum ad pondus, non ad cibum. Sunt enim sapore perquam amaro: quidam etiam arbitrantur venenosos esse.

Pisum Americanum, coccineum, siliquis plantauimus in orto E. C. sed non genuit, sequenti interdum anno reperimus integrum. Frater misit semina nomine Pronia Indica, & Phascoli Indici atro-rubentis ex Creta. Accepi- mus etiam Lutetia cum denominatione *Bas de Bresl*. Plura semina huius etiam Parauio ad nos misit Saxonia. Datum præterea nobis est aliquando nomine Ginge Ethiopici, & Abrus Egyptiorum, à Paludano pro Phascolo Indico.

Hæc grana coccinea, nigra macula insignita, dura admodum sunt, diuque in terra latitant, quorum interdum Cameratio prouenerunt rudimenta, instar Pisorum, sed ad frugem planta non peruenit. Semina vetusta nequeunt, vlla maceratione vinei, sed recentiora intumescunt intra horas duodecim, vel citius, ac duplò fiunt maiora, colorem autem coccineum vertunt in sordide purpurascens, quæ si degustare volueris, deprehendes saporem Pisi nigri detracto cortice, adeo sabaceum aliquid recipiunt: Mirtuntur ad nos nominibus Ginge & Abrus. Asferente Alpino Phasiolorum gustum habent, Egyptii in iure elixis velsi conueuerunt. Sunt vero præ cæteris omnibus concoctu difficiliora, ex quo stomacho maxime infesta sunt, statulque multos concitant & Hypochondriacis valde noxia obseruantur; parum succum generant. Cæterum, quum difficillimè propter duritiem incorrupta maneat, serico filo traicta, è collo monili instar suspendi, & Armillarum loco in brachiis gestari possunt, ad ornamentum; quod nonnullis nobiles virgines, quibus similia grana donabantur, interiectis paruis vnionibus tacere obseruatur, nam non modò corallinos globulos natui coloris elegantia prouocant, sed etiam vincunt. Quidam teste Camer. perhibent utiliter adhiberi, in dentitionibus, febribus & spasms puerorum

PISVM AMERICANVM SIVE

Abrus coccineum maius, compressum, maculatum & non maculatum.

Perelegantes tanè & visendi hi fructus, *Abrus coccineus* dicti veluti degeneres esse videntur. Pisi maioris amplitudinem æquant, eamque planè, quam hic pictam damus. Duri sunt, ex rotundo nonnihil oblongi, æquabili aliqui ferè circinatione, modicè compressi. Quorum alter mino- ro diluore tinctus, nigra macula saturatius ru- bente lineâ circumscripta, tertia sui parte in ambi- tu conspicuus. Alter saturatius coccineo ru- tilus, nitidus, & prædicto ventriosior, nullo ni- gro vestigio notatur: vtrique verò lineâ pyri- formi concolori, acuminè velut germone quod

*Pisum
Americum.*

*Phascoli
ex Iemen.*

*Abrus
Alpinus
Indicus.*

*Abrus
Cameratius
Lugd.
vius.*

*Abrus
Vindob.
Loeb.*

*Pisum A-
mericanum
Pisum Bre-
silianum.*

*Bas de
Bresl
rapta.*

*Vires
vius.*

*Silicula
nucis.*

Defectus.



Aut colore nigro, subfusco, variegato, umbilico
tinnente.

PISVM AMERICANVM ALIVD
magnum, bicolor, coccineum & ni-
grum simul, siue Phaseolus
bicolor, *Anacok* dictus.

Descriptio
Color.

Diversa
magnitudi-
ne.

Umbilicus.

Medulla.
Sapor.

Phaseolus
Indicum.
Faba Indica.

Item Clusii
male posita.

Phaseoli ru-
bri Indica-
rum.

Descriptio

verique exiguum)
protenso nota-
bilis.

Pro descri-
ptione & pictu-
ra misit amicus
noster Iacobus
Zuvingerus qui
se accepisse per-
hibet à Beinbo
Nobili Patavi-
no. Interna ins-
picere haud li-
cuit, quia noster
non erat fru-
ctus. Phaseola-
cum tamen esse
non ambigim-
us.

B. pin. Pisum
Indicum t. ma-
ius. Variat fru-

est, in medio tumidior & pulvinatus, levis, splen-
dens, durus, solidus, in aqua subsidens, extrema
parte (quæ nimirum suæ vaginæ, aut lobe adha-
sit) veluti diducto & hianti osculo supernè paulo
elatiore, & aquilino præditus, duobus duntaxat
coloribus constans: superior enim pars ab ela-
tiori rostellæ parte; quasi lineâ ad alterius extre-
mitatis infimam in fructu partem obliquè ductâ,
tota utrinque atra est, Eburni nigredine & nitore,
inferior verò, omnino aurea, cui admixtum sit
pauillum Minii, præmaturi Mali aurei colo-
rem refert, & ut altera nitet. Eius pulpam, des-
cribere nequeo, cum confringere noluerim, ut
pote qui vnicus sit, inter reliquos exoticos fru-
ctus etiam seruandus.

Pingit Clusius duos phaseolos, aut potius vnus
duas facies sine planta. Ille verò in pann.
duas etiam pingit facies phaseoli modò dicti
cum planta, sub titulo quinti *Ægyptii*: verum
ibi obseruandum errore typographico accidisse,
ut sub dicto titulo tabella illa posita sit: phaseo-
li quidem *Ægyptiaci* icon & tabula est p. 727. sub
titulo phaseoli tertii.

Hoc præterea notandum Clusium in hist. l. 6.
c. 41. iconem prædictam ex pann. posuisse pro
phaseolo peregrino primo, siue lato albo, cum ve-
nis nigris: verum abtulit phaseoli siue risi duas
facies, quæ iuxta radicem erant pictæ, quæ res-
pondebant nostro riso Americano, siue *Ana-
cock*. præterea pann. pag. 731. depictum habet
nostrum risum, sub titulo phaseoli Indici, nullâ
additâ descriptione in hist. tamen loco ante citato
eam addit. Tandem in Exot. inquit: Hone-
stus vir Walichius Syuerus anno 1599. de nauris
quibusdam ex America reductibus fructum *Ana-
cock* redemerat, cuius usum ipsi ignorabant: Er-
rat autem phaseoli genus binis coloribus distin-
ctum, rubro & nigro.

Item l. 3. c. 3. de hoc fructu sequentibus agit
Eruditus vir Simon de Tovar Hispanensis Medi-
cus phaseolorum tertium mihi communicabat,
qui erat elegantissimus: isque duorum generum,
maior & minor, & magis orbicularis forma: col-
or in utroque bifariam diuisus, nam mediâ ex
parte corallii instar rubebat, alterâ prorsus
ater erat, levis & splendens. Similem,
maioris videlicet generis, multos ante annos
Viennæ Austriæ accipiebam, eiusque mentio-
nem faciebam l. 6. in earum plantarum
Historiâ, capite de phaseolo. Vtriusque porò
generis anno salutis humanæ 1597 Londino ac-
cipiebam ab honesto viro Ludouico Miræ Cl.
V. Mathiæ Lobelii Genero, ipsi à naura quodam
ex India reduce donatos, & asserente, inquilinos
tribus, aut quatuor maioribus in polline tritis
vri ad vomitum prouocandum: è minoribus au-
tem filo traiectis armillas, fieri aduersus Epilep-
siam gestandas, arbitrati forsitan iisdem faculta-
tibus pollere, quibus rationis grana: sed orna-
tus potius causa gestari existimeim, intelligebam
autem, ab incolis appellari *Anacok*.

Taber. phaseolus *Ægyptiacus* *Ægyptische*
fasel oder *Bonen*.

B. pin. phaseolus Indicus 6. peregrinus ex ru-
bro & nigro distinctus.

ANACOCK ACCEDENS PHASEOLVS
totus ruber.

Gener Cherlerus ex itinere Anglicano &
Belgico attulit secum phaseolos de generis

Icon in temp.
posita.

Atque
miser.
Descriptio

vsu.

Armilla. Bi-
pupia.

Anacok.

Phaseolus
Ægypti.

Anacock (v. existimo) **Anacock** : sunt enim eiusdem formæ, ventriosiores, maiores, quam staphylo- dendri fructus, ferè ouales, inæquales tamen. Color ruber, idem ferè cum Anacock, minùs tamen viuidus & splendens, nullà maculà nigrà, umbilicus idem, sed maior, circulus etiam elatus, flauescens : durus est, & in aquam iniectus, fundum petit : hic fortè fuerit idem cum Phaseolo Indico rubro Lobelii sine maculà nigrà, quamvis nulla icon eum demonstret.

PHASEOLI INDICI RVBRI

durissimi Lobelii, cum nigra maculà : & alterum genus sine maculà, alterum cum longa tenui maculà.

1. **Phaseolus** corallinus coloris cum maculà nigra
2. **Phaseolus** aliter ruber.
3. **Phaseolus** ruber cum linea nigra.
Medulla.

Magnitudine & figura sunt fructuum staphylo- dendri, laevis eximii, rubore coral- lino, inuicta duritiei, altera parte lucente ni- gram maculam habentes, medullà prædicti in- signiter durà, sapore non ingrato. His non ab- simile figura est secundum genus, paulò tamen maius, & oblongius : nulla nigra maculà dona- tum, tantè etiam duritiei, & tam pertinacis, ut à Wenceslao Tserclaes satum semel in totum in terra minimè mutatum latuerit. Tertij gene- ris Phaseoli præcedentibus duobus maiores, co- lore rubro obsoleto, ex oblongo rotundi, utrin- que nonnihil compressi, quemadmodum Casta- nea equina, quibus secundum longitudinem al- tero latere macula est nigra, longa, tenuis : me- dulla insigniter dura, sapor amarus.

Lobel. hist. Belg. Roode seet harte Indianis seche Boontens. Icon. Phaseoli rubri Indiani du- rissimi.

Nos hoc in loco priorem Phaseolum macula- tum referendum esse ducimus ad nostrum Pisum sue Phaseolum bicolorem, magnum, alterum.

B. pin. phaseolus Indicus 4. ruber, ex phœniceo croceus, & ex rubro spadiceus splendens. Nos de hoc non agimus.

PHASIOLVS, SIVE PISVM

Indicum, compressum, sanguineum, Lupini quodammodo facie.

Descript. Magnitudo. Color. Umbilicus.

Figura ex triangulari in rotundum vergit, ita tamen, ut veròbique ferè sessilis videatur. Ma- gnitudo Lupini aibi ferè est. Color corticis san- guineus, lævis, pulchrè splendens. Umbilicus impressior, albicans, secus quem macula parua, nigricans, conspicitur. Accepimus ab Illustriss. Ducissâ Wirtembergica. An idem sit, an tantum varietas pisi Americani magni iam antè descripti, pro certo non affirmamus. Habet tamen cum eo magnam adfinitatem.

PHASIOLVS INDICVS EX RVBRO

spadiceus, splendens.

Descript. Cortex. Umbilicus.

Vncie trientem non superat, latitudine se- munciali, modicè compressus. Cortice te- gitur inter rufum & spadiceum medio, & ad Tannè Gallis dictum accedente, lævi, splendido, umbilico dilutiore, utique magno, per medià longitudinem eleuato. Parte oppositâ gibba : Estque ex iis quoque quos ab Illustrissima Ducis- sa Wirtembergica dono accepimus.

Eius Eicon antè prædicta cum Leone Phaseoli Indici parui maculati.

PHASIOLVS INDICVS OVATVS,

spadiceus, umbilico albicante breuiore.



Phasiolis In- dicis, san- guineo & nigro magnitudine suppar est, quip- pe paulò bre- vior, angustior- que. Color in- tercurrentibus maculis quibus- dam dilutioris coloris spadiceus est. Sed va- rietas in umbi- lico, qui extu- bedine albicat, & ultra mediàm lateris longitu- tudinem non explet. Visus a- pud Illustrissi- mam Principis-

Descriptio

Color.

Umbilicus

sam Wirtembergicam, quæ seuit, ideoque intensius contemplari non fuit datum.

PHASEOLVS SANGVINEVS

ouatus Indicus.

Perelegans & exotica raritate spectabilis est hic phaseolus. Vnciam ferè longus est, digiti parui crassitudine, figurà ouatà, colore sangui- neo. Hilus latiusculus, atque niger per mediàm ferè longitudinem excurrit. Dono nobis dedit D. D. Thomas Platerus Medicus, & naturalium solertissimus vestigator, ex Hispania allatum, ex India tamen primò inuectum esse, rerulit. Eun- dem, cum jam figura nostra esset sculpta, com- municauit nobis Illustrissima Ducissâ Wirtem- bergica, itidem (ut sciebat) ex India sibi allatum, qui prædicto paulò compressior, in cæteris planè similis est. Anno 1605. gener Cherlerus rediens, ex Angliâ & Belgio attulit similem fructum, v- trinque compressum, ut euenit pisi, durum, splen- dentem, qui iniectus in aquam subito sudebat.

Descriptio

Locum !!

PHASIOLVS INDICVS

ouatus niger.

Phasiolo Indico sanguineo iam descripto magnitudine, & figura ferè æqualis colore au- tem variat. Nam torus niger est, & præ nigredine, atque lauore splendet. Hilus itidem niger, magnitudine, & posita, ut in priori. Estque etiam hic ex fructibus apud Illustrissimam Ducissam Wirtembergicam visis, quem aperire, cum terra esset, creditura, non licuit, ideoque nec interiora, vel saporem addere.

Descriptio

Color. Hilus.

Eius autè habetur cum Phaseol. Ind. ex. spadiceo E. icon.

PHASIOLVS INDICVS FVLVVS.

Nostratibus Phaseolis Lævis est, vix tamen longior. Color fuluus est, & mustelinus.

Descriptio

Umbi-

Viniblicus. Viniblicus magnus & longus, niger in area, ipso fructus cortice leuiter splendescente atque dilutior, & quodammodo ex ruffo albicante constitutus. Etiam hic ex iis est, quos apud Ill. Ducisam Wirtembergicam descripsimus, referuauit pro satione.

PHASIOLVS, LATO, STRIATO,
siue radiato semine: alter punctatus,
cupula atro virente.

1.
Siliqua
Semina.

Siliquæ magnæ, latæ, compressæ. Semina vnciam circiter longa, paulo minus lata, renis formâ, in terminis regione sinuata, nigra, frequentibus albis striis virgata. Huic similia alia

paulo minora, quæ licet radiata, siue virgata, variant nihilominus dispositione radiorum. Minoris huius genus, quod pictum in superiore parte nostræ tabellæ paulo minus, quam sit, misit insignis Medicus Hercules Saxonia primariæ Cathedræ Patavinæ Professor, is colore nonnihil variat, qui atro rubens etiam radiatus. Sunt

nobis alia semina, quorum icon infima parte tabellæ nostræ, quæ alba dici possunt, punctis nigris guttata, maculisque rubentibus versicoloria, a germine latiore maculâ, ad, & circa extremum, seu capula expansâ atro-rubente.

Similem
describit
Clusius,
caulis.

Folia.

Ramuli.

Floris.

Siliqua.

Fructus.

Phascolus
Africanus.
Purkiche-
rianus.
1700 1701.
disquis.
1701.

Clusius similem plantam sic describit: Caulis statim à radice in aliquot oblonga sarmenta diuiditur, lenta, vicinos stipites & virgulta reliquorum Phascolorum modo amplectentia: in lingulis alis terna folia vulgaris Phascoli foliis similia, atriora tamen, ex eodem pediculo nascentia, extremo, (vt in vulgaribus) impari: ex iisdem alis breues ramuli prodeunt, multis floribus vulgari haud abtutibus, minoribus tamen, albis, vix in modum congestis, onusti: quibus succedunt oblongæ siliquæ: seu lobi, vulgaribus multò latiores, continentes ternos, aut quaternos fructus, planos, communibus Phasiolis latiores, albos, sed multis nigris maculis, siue venis, ab hilo in latitudinem ductis elegantissimè depictos.

Clus. dicitur Phasiolus primus siue Africanus, Phasiolus minor, varius, siue Purkiche-rianus. Ed quod huius fructum D. Purkiche-rianus primus in Pannoniâ intulerit ex Neapolitano regno delatum, singulisque annis coluerit & eius genus vt dixi, conseruauit: quam ob causam apud rei herbariæ illius regionis studiosos, Purkiche-rii cognomen inditum, & vt Phascolus Purkiche-rianus nuncuparetur, obtinuit. Ante multos verò annos similem planè mihi missum memini, Phascoli Africani nomine: & ex Africa Italos primùm accepisse, verisimile est. Idem

Totum II.

in Hist. Phascolus peregrinus primus. Item Phascoli peregrini primi genus alterum.

Ponit quod animaduertimus, Clusius in Hist. postrema, pro Phascolo peregrino primo, iconem quæ est in Pannon. pag. 229. Phascoli 5. siue Egyptiaci titulo: verum ex ea tabella ademit duo semina, quæ infra separatim erant picta; pro genere altero apponit figuram, quæ est in Pannon. sub titulo Phascoli primi siue Africani: verum non demonstrat, qua inrediderant. Icon autem phascoli peregrini primi Clusii, est nobis in tabella capitis Phascoli bicoloris, seu Pisi Americani alterius, bicoloris: in eo Clusium imitati sumus, cum nesciremus diuersam plantam à seminibus bicoloribus appictis. Phasiolum, qualem pinxit Clusius, radiatum, qui etiam inferiore tabellæ nostræ parte pictus est, misit Ill. Landgr. Guilielmus, nomine Phasioli Americani: in descriptione tamen Clusii variare videtur: dicit enim album cum multis nigris maculis, aut venis: meus potius dicendus niger cum albis venis.

An Tabern. Icon. & Hist. Breslgen Bonen 1. Phasiolus Brasilianus primus. Nescimus, quam ineptam figuram proponat Compiler, quæ huc referenda videtur, considerato titulo. An Thomæ Hariot in hist. Virginæ Insulæ, Okendgier.

Clusio Georgius Purkicherus Posoniensis in Vngaria Medicus primarius communicauit, cui ad pergulam, aprico loco situs singulis annis fructum maturum dedit. Mihi deinde anno 1582. & aliquot sequentibus, egregiè prouenerunt aliquot eius stirpis, quarum nonnullæ lobos dederunt, qui matura semina protulerunt: interdum etiam, quos ad maturitatem peruenire posse existabam, ob Solis radiorum defectum, spem meam frustrati sunt. Prouenit nobis in horro Ill. E. C. Wirtemberg. folio Smilacis vulgaris, ex semine missò, ab Illustriss. Landgrauio, cui (vt scripsit) excreuit ad lanceæ altitudinem, sed tantum floruit; nobis verò ad maturitatem ferè prouenit. Ab aliis etiam acceptum semen terræ commissum, aliquoties siliquas protulit, sed nunquā semen maturuit. Si nanciscamur deinceps tempestiue in vase plantabimus, & sub rectum proponemus, donec calum in calefcat, vt exponi possit.

Phascolus
peregrinus
1.
De Iconibus
Phascoli
latis.

Phascolus
Americanus.

Phascolus
Brasilianus.
Tab. rep.
hondgier
Okendgier
Locus &
Tempus.

PHASIOLORVM INDICORVM
latorum tres species, & Clusii latus.



Est nobis Phasioli Indici nomine à Doctore Paludino datus, seculatè ferè longitudine, latitudine vnciali, compressus: cortice obtectus flauo, ruffo colore variè intersparso, splendente quidem, sed non vsque quaque laui. Hilum album est longiusculum, arcu obscurè rubrâ circumdatum.

Huic quodam

2.

HISTORIAE PLANTARVM.

modo similem vidimus apud Illustrissimam Ducissam Wirtembergicam, sed minorem: quippe longitudine vnciali, latitudine vnciam mediam non multum superante, itidem compressum. Sed color albus erat, rubris tamen maculis interstinctus, cuius picturam ex ipso etiam fructu effictam exhibemus.

Similiter & tertium quendam apud eandem conspeximus, praedicto magnitudine tantum cedentem, quantum is primo loco descriptus, compressum, sed colore etiam variantem, quippe ex nigro & albo variegatum, ita ut insignis sinus, albicans, punctis fuscis aspersus, totam ferè fructus nigri longitudinem utrinque peruat.

Ue Clus. refert apud Monardem, Londini emit in Mercatorum porticu de Gollo Naucleio Phasioli genus, quod è Brasiliæ noui Orbis prouincia aduectum asserbat. Nostro vulgari maior est is Phasiolus, latiorque, nec minus colore variat: etenim nunc flouus est, aut omnino niueus, modo ater, aut purpureus, aut albis pupureisque maculis distinctus. De simili planta natum referebat, qualis Europa est, nostrumque saporis gratia & leuitate longè superare, si eodem modo decoquatur. Londini satum prouenit vulgari similibus sarmentis & foliis, sed ad frugem non peruenit.

Videtur nobis Clusius, primum nostrum Phasiolum iam descriptum pintisse, ac fortè eadem tabella album, de quo capite sequenti.

PHASEOLVS NOVI ORBIS LATVS, TOTVS CANDIDVS AM- LICI HOETENSIS AFFINIS.

Descriptio.



STRIATO NOVI Orbis Phaseolo minor est, à gemine ad partem oppositam, vnciam latius, longitudine scilicet, eburnei candoris & leuoris.

Dicuntur Lob. in Belg. editione parte 2. Phasioli ex America albi. Et Leon. Plantin. Phasioli magni, latius, albi, Thevet. America-

Synonyma.
Phasiol. ex
America.

Americano-
rum Faba.

Locus.

notum Faba, omnino alba, valde compressa, n. strati-
bus latiores & longiores.

Habeo ab Ill. E. C. mislos à D. Paludano, & deinde mihi cum hac inscriptione: Phasioli Brasiliæ, maiores: ex quibus nos curauimus depingendos cum duobus minoribus Lobelij eadem operà, ac etiam Phaseolos rubros Americanos, signatos, planos.

PHASIOLVS LATVS ALBO EX NIGRO varius, angustifolius.

Descriptio.

SARMENTA statim à radice habet multa prodeuntia, Purkitcheriani, siue in ordine [Clus-

sio rariorum plantarum Historiæ] primi Phaseoli modo, quæ, licet eadem ratione vicinis petiis sese circumvoluant, non tamen aded luxuriant aut altè assurgunt. Ad horum nodos folia enscuntur terna, ut in aliis Phaseoli generibus, multò tamen angustiora, Sexti [nobis Phaseoli lati, coloris tegularum, cum striis per longitudinem nigris] foliis, quem Coloniz apud Hoperi viduà conspicebat Clusius, non valde dissimilia: ex horum alis emergebat digitalis longitudinis cauliculi, paruos flores in vix modum congestos sustinentes, albos initid, sed, ubi senescunt, pallescentes: iis succedebant planæ, latæque vaginæ, Primi [Purkitcheriani] lobis ferè pares, breuior tamen, initid virides, quæ maturæ fuluescunt, seménque continent planum, Primi iam dicti graniz minus, sed similibus coloribus albo & nigro varium, nunc in longitudinem extensis nigris striis, nunc confuso ordine sparsis maculis nigris maioribus, aut minoribus per vniuersum Phaseoli corpus: nonnunquam integro fructu nigro, vel exiguis albis maculis consperso, aut dimidià duntaxat ex parte. Florebat Iulio, & Augusto: semen etiam maturum præbere incipiebat Augusto.

PHASIOLI LATI, CANDICANTES VIRGVLIS NIGRICANTIBVS NOTATI secundum longitudinem, vel nigricantes: flore albo.

PLVIBVS sarmentis assurgit, eisdem cum peregrino iam descripto, [septimo Clusij] vel cum tepioris, longitudinis, quæ vicinis palis sese applicant, & eos scandunt: ubi sese in ramos diuidunt, adnascuntur folia, Primi [Phaseoli lati, striato semine] foliis similia, terno numero, sed paulò minora: flores ex alis profert etiam Purkitcheriani, seu Primi, floribus similes, albos, vultate pallescentes, vix instar nascentes: quibus & planæ, ut in præcedente, succedunt vaginæ, illis haud maiores, continentes bina, terna, aut quaternaria grana, plana, superioribus magnitudine respondentia, non aded candicantia, sed colore interdum exalbescente, aliquando nigricantibus virgulis secundum longitudinem, vel confusè notata, interdum toto etiam præ fructu, ut in superiore, nigricante.

Numeratur hic Phaseolus apud Clusium in hist. Peregrinus octauus seu emissà Pannonicarum stirpium Historià, alter, qui Viennæ Austriæ, semine peregrè accepto, ipsi prouenit.

PHASEOLI LATI, MAGNI TOTVS ALBI, EXCEPTIS QVIBVS- dam radiis.

PHASEOLVM hunc adquirebam, inquit Clusius, senene, quod N. V. Ioannes Boissot ex Hispaniâ acceperat, mihi communicato, natum, erat verò is fructus Purkitcheriano maior, sed totus albus, nisi quidam radij sparsim varium quodammodo fecissent: terræ creditum semen producit, creuitq; Purkitcheriani instar, similibus sarmentis, foliis, floribus, & vaginis, sed cum ætas sublequeretur rardior, humidior, & frigidior, neque hic, neque alij, quos seneram, Phaseoli exotici, ad frugem peruenire potuerunt.

Est autem hic Clusij rariorum plantarum Hist. Tertius, siue ordine peregrinus nonus, lib. 6. c. 4. phaseoli

Folia.

Conticuli.
Flos.
Vagina.

Semen.

Tempus.

Descriptio
Sarmenta.

Folia.
Flores.

Vagina.
Semen.

Synonyma.

Locus.

Descriptio.

Synonyma.

PHASIO LI LATI, PRORSVS
NIGRI.Descrip.
Rami.

Folia.

Rami.
Flosculi.

Vagina.

MULTI sunt ab vna radice assurgentes rami, sepe circumvoluentes, ex viridi purpurascens, nodosi, & geniculati, quibus adnascuntur folia, Octavi foliis similia, secundum tamen articulationes, quibus connexa sunt, purpurascens: ex alis etiam prodeunt digitalis longitudinis ramuli flosculos, superioribus magnitudine & forma, respondentes, vix quoque instar congestos, ferentes, sed quorum galea, seu cassis obsoletè purpurascens, bina lateralia folia, coloris sunt floridioris: his succedunt planæ, latæ, fusæ & nigricantes vaginæ, semina continentes plana, Purpuracherianis, siue versicoloribus Africanis minora, per maturitatem proflus nigra. Quartus est Clusio Hist. siue ordine Phaseolus peregrinus decimus.

PHASIO LI LATI COLORIS
REGULARVM CVM STRIIS PER
medium nigris.

Descriptio.

Folia.
Flosculi.

VNDICIMO Phaseolo nascendi modo & reliquis ferè notis, per omnia ferè similis: sed huius flores Decimi floribus valde similes, paulò tamen dilutiùs purpurascens sunt: fructus autem magis dilutè rubedine præditus, regularumque colorem quodammodo refert, quem rari per longitudinem nigra stria varium faciunt, aliquando autem plurimæ totum prædant reddunt. Hoc genus mihi natum semine, quod communicabat Cl. Vir. Ioachim Camerarius Inclitæ Reipub. Nambergenis Medicus primarius: reliqua fructu ex Hispanijs misso. Clusio ex sex Viennæ natis vltimus, est ordine hist. pl. duodecimus.

PHASEOLVS CAPOTILLO
DEL ALDANA, SPADICEI
coloris.

Descriptio.

PHASEOLVS (inquit Clus. Exot.) peregrinus tertius, ab eruditissimo viro Ioan. Castaneda Medico Hispanensi ad me missus anno 1600. cum hac inscriptione: Capotillo de Aldana: semuncialis erat magnitudinis, lævis, spadiceique prorsus coloris, excepta parte supina, quæ suo lobo adfisse videbatur, durus & solidus.

PHASEOLVS BRASILIENSIS
CVM SVO LOBO, FABA SPADICEI
coloris, & circa hilum fuscum
candicans.Descriptio.
Lobi.

PRÆLONGVS (ait Clus. Exot.) erat hic lobus: nam decem vnciarum longitudinem habebat, vnius autem vnciæ latitudinem, aut paulò ampliorem: cartilaginea porro cute tectus erat, & quaternis dorso nervis à pediculo ad extremum lobum, secundum longitudinem excurrentibus, insignitus, fuscæ extrinsecus coloris, intrinsecus ex cineraceo candicans, tenui quadam membrana singulas Phaseolorum sedes (decem
Tom. II.



*



*

autem continuerat) distinguente præditus: ipsi verò Phaseoli longi, semunciam lati, spadicei coloris & circa hilum fuscum candicans.

Phaseoli.

Hunc autem lobum ab us, qui recenter à Brasilia aduenierant, redemptum, Viennam Austriæ ad me [Clusium] mittebat, Richardus Garth, anno à nato Christo 1585. cum aliis quibusdam fructibus exoticis, quos sciebat me summa diligentia conquirere.

Locum.

PHASEOLVS NOVI ORBIS EX,
ATRO PURPUREVS, AUT SPADICEVS compressus duum
generum.

IN nigro relucet color glaucus aut purpureus, longitudo vncia minor, latitudo semuncialis; germen album, sapor leguminosus, Huius generis politior vnus, maior, minus rugoso cortice, & eo quidem spadiceo.

Color.

Sapor.

Ioh. Bauhino dedit Ill. E. C. cui miserat D. Paludanus nomine Phaseoli Brasiliiani.

PHASEOLVS AMERICANVS
MAXIMVS, LOBVS FABA OBSOLETO
rubente, hilo longo,
albo.

CLARISSIMVS Vir, D. Carolus Paludanus dedit Serenissimo nostro Principi, siliquam nomine Phaseoli Americani, ex breui, crasso, ligneo pediculo, palmium longam, vnciam & ferè latam: cortice crasso, duro, externè fusco, internè albo. Secundum commissuræ longitudinem, veluti sulci aut costæ laterales dux: est bivaluaris, & apertæ se contorquens, sapore nullo insigni. Membrana intus spongiosa, inter quas fructus

siliqua.

Cortice.

multi phasiolacei, vñgne longiores, coloris ob-
tolece rubentis, videbantur nondum maturi.
• *Hylus longus*, albus, per longitudinem fructus,
non eleuatus, necesse est candore, qui in Leblab,
eo etiam multo est minor: sapor sabaceus: denti-
bus facile atteruntur.

Sapor.

PHASEOLI RVBRI, AMERI-
CANI, STRIATI, PLANI.

Descriptio.

ROTUNDIORES sunt, quàm Phascoli magni,
toti candidi, amzndè rutilantibus lineis stri-
ti, Porphyritæ marmoris instar, precedentibus
minores, nonnihil rotundi, & plani, maiores, la-
tioresque Phascolis vulgaribus: ex quibus aliqui
oblongi sunt, subærulei, aut nigri, artificiosè
fluis albis variegati. Lobi. Similes, si non eos-
dem Clus. sic describit: Sarcmenta, alè etiam as-
lurgentia, similia folia, & flores in digitalibus ra-
mulis vix modo congestos, paruos, octau-
[Phascoli lati candidatis] generis lobis similes, in
quibus semina terna, aut quaterna, plana, dilutè
rubedine prædita, quæ nigris venis, siue radio-
lis secundum longitudinem distincta sunt, non-
nunquam magnis, vel exiguis nigris maculis con-
fusè aspersa: interdum etiam vtrinque prorsus,
vel alterà duntaxat ex parte, nigra, emicantibus
sparsim paruis rubentibus maculis, vt ex mar-
more aliquo *mutila* torquata videantur.

Descriptio.
Sarcmenta.
Flores.

Sarcmenta.

Lob. in hist. Belg. Rot Orange gheimarbe de
Boonen. Icon. Plant. Phascoli rubri.

An Clus. hist. ex sex Viennæ natis quintus, a-
liis ordine Phascolus Peregrinus vñdecimus.

Econ ante habetur cum Phascoli lati striati &c.
Icone.

PHASEOLVS SANGVINEVS,
compressus, vmbilico albo.

Descriptio.

ELEGANTISSIMVM hoc Phascoli genus,
exotica lux pulchritudinis exhibet notas.
Torus sanguineus est, vulgari Phasiolo latior,
multoque compressior. Per ambitum nonnihil
angulosus. Vmbilico in medio paruo, albo. A quo
ad oppositum tranuersim obsecuræ, nec nisi Lyn-
ceis ferè intuentibus oculis excurrunt venulæ,
obscuriore ex atro rubentes, quarum diuatic-
atione in extremo nihil pulchrius conspici po-
test.

Vmbilico.

Fruuntur hoc ex liberalitate magni nominis
Medici Patuini Herculis Saxoniæ, vt & plurimo-
rum aliorum, exotica elegantia.

PHASEOLVS VVLGARI MINOR
ET PLANIOR, SVBRVRO COLORE,
foliis angustus.

Descriptio.
Folia.

ELEANS genus Colonie conspexit angu-
stis foliis Clusius, fructu vulgari Phascolo
minore & planiore, subrubro colore, ex Hispa-
niis accepto, *Frazoles Guadeli* appellatione. Quin
Dodonzus eius descriptionem in suam novam
Stirpium Historiam intulerit, non dubitat.

Eidem hist. Phascolus peregrinus sextus. Dod.
in fol. Phascolus peregrinus, perticis & vicinis
admiculis sese quoque circumvoluens, cui
terna ab vno pediculo folia etiam dependent,
veluti Phascolis, sed singula angustiora multo, ac



similiter ni-
gnora: Sil-
quæ breui-
res, planiores,
ac magis com-
pressæ, pau-
ciores fructus
obtinent.

PHASIOLVS LABLAB ALPINI.



PHASIOLVS
niger, La-
blab vocatus Al-
pino de pl. E-
gypti est arbor
sarcmentosa, quæ
crescit ad Vitis
magnitudinem,
sarcmentisque,
Vitis modo, ex-
tenditur, acer-
panditur foliis,
figuraque simi-
lis est omnino
vulgari Phasio-
lo, flores ferè
bis anno, Vere,
ac Autumno,
Phascolorum
floribus aliqua-
tenus similes, à
quibus siliquæ

Lablab.
Descriptio.

Sarcmenta.

Flores.

Siliquæ.

Semen.

Longitudo.

Vitis.

Menses.

Tuscia.

Genera.

Nigra.

longæ, instarque Fabarum latissimæ cernuntur, quæ
semina nigra, Phascolis planè similia, continent,
quorum alia nigra, alia subrubra cernuntur.

Hæc arbor vivit annos centum & amplius,
perpetuoque viret. Egyptiis frequens in cibis,
nostrisque non minus suavis. Mulieres vtuntur
decocto cum croco ad excitandos menses, præ-
terea utilis ad tussim, & dispnæziam, & ad vñnam
suppressam mouendam.

Clus. ab. Il. viro Io. Pinello duo Lablab gene-
ra à Prospero illi communicata accepit: vñnum vi-
delicet nigrum, vt quod descripsit in Pannoni-
cis, alterum rufum: De Lablab autem quod as-
firmat Prosp. Alp. vivit annos centum & amplius,
est difficile creditu iis, qui Phascolorum & legu-
minum naturam norunt.

Honor. Bell. in epist. ex Cydonia Crete ad
Clusium Augusto mense scripta. Iulio nuper præ-
terito ex Egypto, semina accepit *Leplap* diuersi
ab eo, quem in Pann. Clus. describit, quæ terræ
commissa felicissimè nata sunt, maximè suæ vo-
luptate: differt fructu, siliqua, coloreque: nam
hic siliquas profert magnas, longas, latas,
caulis

Descriptio.

caulis color purpureus, ad nigrum tendens, pediculi & nervi foliorum eiusdem sunt coloris: flores plures vno pediculo inhaerent: Ab Alpino recte planta delineatur: sed flores valde differunt: nam non in fine caulium, sed è foliorum cauis exsertuntur longo pediculo plures, quasi spicatum, magni, figurà aliorum Phaseolorum, sed colore atro purpureo, qui Italicè *Panumazeo* dicitur, Phasiolique ad rubram tendunt nigris maculis insigniti, longo hilo (ut niger,) & albo.

PHASEOLVS LEBLAB NIGER ET SPADICEVS, HILO LONGO, ALBO.

Descriptio. **EX** Phaseolorum genere quoque est, quod *Leblab* barbarà voce nuncupant. Magnitudine est Phaseoli vulgaris, cortice tegitur spadiceo, laui, saturè rubentibus punctulis asperso. Cuius ambitus partem tertiam cingit hilum eminens, candidum, decoram elegantiam fructui conchians.

Curat. Cl. Paludanus *Leblab* nomine misit fructum, descripto iam figurà similem, sed planè nigrum, & aliquantò minorem, & ad cuius hilum duæ maculae flavae conspiciuntur.

Aludgerus. Est nobis *Leblab* genus quoddam totum nigrum, excepto hilo, indè candido, eminenti, ac iam descripto simili, magnitudo prædicto æqualis. Huicque similem habemus alium, colore ruffo, plus minus diluto: est etiam colore ferè rubro, nec non colore ferè flavo. Dentibus faciliè atteritur hic Phasiolus: sapor eius leguminosus quidem, sed nobis valde ingratus.

Leplap. Clusius Pannon. & hist. rar. depingit & describit hoc Phaseoli sine leguminis genus, quod Paludanus misit, cui *Leplap* nomen inscriptum erat, his verbis: Siliqua brevis & lata est, quaterna quæ grana oblongiuscula, nigra, hilo nihilominus albo, admodum longo, prædita, continens.

Locus. Clusio aliquoties acceptum, & terræ, opportuno tempore, creditum, nasci noluit, respuens forè regionum Septentrionalium frigidiorē aciem. Sunt nobis siliquæ prædicti *Leblab*, quales pinguntur à Clusio, sicut & semina eorum ex diversis locis missa, videlicet à Paludano, ut dictum, alia mihi data per D. Iacobum Zvingerum, & fratrem Casparum Bauhinum ex Creta delata. Verùm ea fuerunt simul mixta per incuriam. Basilicæ ptouenit *Leplap* in orto D. Iselii, simile caulibus & foliis Smilaci & Phaseolis vulgaribus, nisi quod folia multa, quaterna proferat. Gener Cherlerus rediens ex Anglia & Belgio diversorum colorum *Leblab* attulit.

**PHASEOLVS PEREGRINVS ORBICV-
LARIS, CINEREI COLORIS, TECTVS
atra tenuique membrana.**

Descriptio. **M**ITTEAT ad me [inquit Clus. Exot. lib. 1. c. 14.] anno 1600. honestiss. vir V. Vilhelmus Parduus Phaseolum peregrinum, qui lobo inclusus fuisse videbatur, planus, vncialis magnitudine, orbicularis panè forinæ, medio tumidus, arque in binas partes diuiduus, cineracei coloris, atrâ, tenuique membrana tectus, cui nullum nomen erat in-

scriptum.

Tom. II.

**PHASEOLVS PEREGRINVS ANGVSTVS,
NIGRICANS, ALBA, TENVI MEM-
brana tectus.**

Descriptio. **P**HASEOLVS alter peregrinus, Clusio [etiam in Exot.] missus, anno 1600. per V. Vilhelmum Parduus vncialis quidem erat longitudinis, sed angustus, solidus & durus, nigricans, in binas similiter partes diuiduus, tenui quadam membrana tectus, albâ, quæ in latere vestigium retinebat, quo lobo inhaerisse videbatur.

**PHASEOLVS BRASILIANVS MVLTIS,
SPADICEVS, MAGNVS CVM MAGNO
hilo nigro, plurimum ambiente**

Descriptio. **C**ASTANEA magnitudine est, orbiculatus, vnciali plus minus latitudine, pulvinatus, cortice tectus rugoso, spadiceo, dilutiore, saturatiore, circa hilum verò dilutiore & ferè albicante, cuius orbitam ferè totam ambit, hilum pulchrum, eulmum latum, sulco medio secundum longitudinem exaratum in principio punctum impressum habens.



Alius. Huius generis etiam alium dono accepimus ab Illustrissima Ducissa Wirtembergica cuius hilum utrinque eminet, veluti crispas habet simbras. Anno 1598. Cl. vir Paludanus misit nobis pro Fabis Brasilianis: quasdam etiam antè habebamus, non recordamur unde. Icon nostra facta ad iconem, quæ est apud Lobel. in Iconibus, & Clusium

apud Monardem. Faba autem facta secundum nostrum fructum.

Faba latissima. An Lobel. & Pena in Adv. de hac aiunt, Faba (vel Phasiolus) quædam latissima & candida, compressa rotunditatis, ambitu ferè vnciam æquat, gustu, concretionē, & Phaseoli similitudine: hæc non demptam ex arbore Phasiolifera, ut quidam putant, norunt amici quidam, qui teneruat, legumenque non ita dissimile Phasiolo habuerunt.

Lob. Obs. & Icon. Plant. picturam ac descriptionem Clusii exhibet simili titulo *Phaseolum Brasilianum* à Brasilianis *Macoma* vocatus, ex cineritio candidans. Tab. Icon. & hist. *Phaseolum Brasilianum*. Bressilgenbonen. Hist. Lugd. *Phaseolum Brasilianum* Clusii. Qui, cum Olysiopone esset, quemadmodum apud Monardem perhibet, donatus est Phaseoli genere ex Brasilia Americæ provincie delato admodum recenti, pollicari latitudine, crasso colore tuffescente, magno hilo, & parte extremâ veluti sessili. Eiusmodi quatuor, aut quinque singulis siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tuss & impositi bubones venereos curant.

Z

Cortice.
Semen.
Erant porro illi lobi diuersæ quidem longitudo, equalis tamen latitudinis, non valde crasso, sed cartilagineo potius cortice recti, eoque rugoso, quia immaturi, fusci coloris, breui, ruffaq; lanugine obducto, quam adhuc retinebat in lacunis, ubi attrita & deteria non fuerat, superna, & inferna parte veluti duplici triffa sinuosa, & & semunciam ferè lata, à pediculo ad mucronem vsque lobi producta, prædita: Phaseolos autem continebant penè vnciam latos, orbicularis formæ, non tumentes tamen in medio, sed depressos, quia plenam maturitatem nondum erant adepti, in ambitu vndiqueque ferè veluti anulo cinctos, vt plerique similes Phaseoli, valde duos & rigros, nucleo tamen albo præditos, quo recente vesci licuisset, quia ingrati saporis non erat. Istorum autem lorum vnus, quaternas vncias longus erat, tresque Phaseolos continebat: alter ternas duntaxat, & binos Phaseolos habuerat; vterque autem binas penè vncias latus.

PHASEOLVS BRASILIANVS
MAIOR PICTURATVS: ET
alter dilutiore colore.

Descrip.
Cortice.
Hilum.
FLOVRA sunt oblonga, & ad circularem accederent, nisi segmentum, quod parte sessili ad circuli perfectionem requireretur, deesset. Magnitudine præcedentibus superiores sunt, longitudine fescunciali, latitudine ab hilo ad sessilem leuiter sinuatam partem: vnciam facillè superante. Nec minùs ventrioli videntur, quàm prædictæ duæ species descriptæ. *Cortice* color spadiceus, per quem foliacea quædam emblemata sunt sparsa eleganti aspectu. *Circa hilum* dilutior, & ferè flauescens. *Hilum* nigrum quoque, sed angustius, & vix culmi minoris latitudinem adæquat, ast quàm in cæteris magis eminet. Eadem tamen ratione fructus ambitum comprehendit, sicut in iam descriptis, hoc est, ad partem sessilem vsque. *Circa hili extrema* nec caput nigrum, nec stria transversa conspicitur. Maior quoque inter vtrumque hili extremum distantia quàm in prioribus. Hanc habuimus ex fructibus à Paludano datis Ill. C. Wirtemb.

Huius generis vidimus etiam minorem apud Illust. Principissam Wirtembergicam, & colore pallidiore, seu dilutiore, in cæteris ferè iam descripto similem.

PHASIOLVS BRASILIANVS
MAGNVS, TOTVS NIGER,
splendens.

Descrip.
Cortice.
CORTICE obiectus est duro, toto nigro, clauo, atque splendens. In cæteris ferè, cum rubro splendens conuenit, sed eo paulò minor est. Hilus etiam totus niger tres fructus partes ambit, ipsoque fructu cl. nor est. Rotundus esset, nisi pars sessilis rotunditatem cauere. Illustrissima Principissa Wirtembergica seuit, apud quam videre, describere, atque depingere datum fuit; aperire, vt pen-



tius introspectetur, non item.

Eicq; eadem cum ea qua lib. 3. c. 68.

LOBVS PEREGRINVS CARTILAGINEVS, PHASEOLO EX PUNICEO nigro tanquam annulo cincto.



ANNO 1599. Inquit Clus. vt videre est in Exor. peregrinū quendam lobum nanciscebar, cui similem ante videre non memineram: propterea illius historiam peregrinè natis lobis adiungendam esse coniebam.

Quatuor autem vncias cum semisse longus erat hic lobus, binas, aut paulò amplius latus, cartilagi-

neo potius, quàm duro & lignoso cortice constans, dorso insignitus duplici, veluti cistâ cartilaginea, & sinuosa, ad extremum vsque lobum protensa: rugosus autem erat cortex, & coloris nigri verius, quàm fusci: licet porro ea longitudine esset præditus, tres tamen Phaseolos duntaxat continebat orbicularis formæ, mediâ parte aliquantulum tumentes, circiter vnciam latos, in ambitu ferè vndequeque tanquam anulo cinctos, valde duos, & ex puniceo nigros. Quæ arbor, siue planta hunc lobum protulisset, quæve in prouincia nasceretur, intelligere non potui, tametsi omnem diligentiam adhibuerim.

PHASIOLVS SECVNDVS NIGRITARVM, non magnus pro lobi amplitudine.


ALTER lobus ex Guinea allatus, circiter septem vncias longus, fescunciam latus, quem

Clusius redimebat anno 1595. dura cuto tectus erat, coloris externâ parte ex fulco cineracei (eius dorsum tribus æquis lætundum longitudinem insignitum, vt in plerisque similibus lobis) interne veluti membranâ sustulatus, aliquot Phaseolos continens non valde magnos, pro lobi amplitudine, nigros, longo hilo siliquâ sitit lobo inhaerentes.

Accipiebat autem hoc breuiorem eodem anno ab amplo viro Simone Parduyn consule Mediburgensi in Walachia Zelandiz. Et biennio post his non dissimiles à natis Batavis ex Madagascari insula allatos, Amstelredami conspicebat. Traditur hæc historia Exot. lib. 3. cap. ii.

PHASIOLVS PEREGRINVS
MAGNVS, COLORIS CASTANEÆ,
cum magno hilo, læuis

Descriptio.
Curtis.



pulpa in conspectum sese dat, superficie quidem tenuis rati coloris, intus alba, dura, sapore viciæ.

Descriptio.
Clusii.

An Phaseolus tertius Nigritarum, ex Guinea aduectus, quem Clus. Exot. lib. 3. cap. ii. his verbis descripsit: Secundo [precedenti] non dissimilem, vncias cum semine longum octo, sed nervis secundum longitudinem in dorso excurrentibus


magis eminentibus, interna autem parte nulla membrana (nisi atrita fuisset) præditum, cineracei ex fulco coloris, Phaseolos continens superioribus maiores, spadiceo coloris, nec hilo ad eam longo præditos, vt illi, quos honestus vir Petrus Garetus, Iacobi frater, Amstelredamo ad me mittebat.

An Geln. epist. tertium Fabæ genus ab Adolpho Deconemissum?

Lobel. Obl. & Icon. Siliqua Phaseoli Brasiliæ. Sed videtur nobis hæc siliqua Lobeli non esse Phaseoli Brasiliæ: sed Fabæ, de qua hæc agimus capite.

Iac. Theod. Tabern. Icon & hist. Phaseoli Brasiliæ terti siliquæ. Schoten der dritten Bree silgen Bonen.

FABA, VEL PHASEOLVS INDICVS
MAGNVS, RUBER, SPLENDENS.



APRIMI similis est iam descripto Phaseolo peregrino magno, coloris Castaneæ: eundemque dicemus, nisi color manifestè distingueret, leui interim quoque interueniente figuræ atque proportionis discrepantiâ.

Descriptio.

Vnciam vnâ & semis adæquat an. plitundine, quamvis circinnæ rotunditatis non sit: Nilam.

quippe parte vnâ rotundiore, alterâ latiore, compressus, & vnciam mediâ vix crassior. Hilum insignne, ac nigrum, duas ambitus partes comprehendit, reliquâ parte tertiâ hilo vacuâ existente. Cortex rubeus est, insigniter læuis, splendens, ac subdurus, quem aperte potestas non data fuit, quod Illustrissima Principissa terræ committere decreuerit, apud quam vidimus, descriptissimum, depinximus.

Correctio.

Icon eadem cum ea qualib. lib. III. cap. LVIII.

FABA INDICA, SIVE PHASIOLVS
MAGNVS, COLORE EX PHOENICEO
croceo.

Descriptio.
Color.

PRECEDENTI iam descripto figura & magnitudo respondet. Sed suo colore variat: nam phœniceus ex croceo, hic ex illo ita emicat, vt cuius lustrum præualeat non temerè dixeris, concomitante pereleganti læuitate, atque splendore quam in prædicto tamen multò inferiore. Hilum quoque non nigrum, sed fructui ferè concolor, quamvis saturatus. Dono accepimus ab Illustriss. Ducissa Vvitembergica.

PHASIOLVS SIVE FABA ARBORESCENS
ex Guinea, Paludano latissima, ferè quadrata.

FRUCTVS, quem misit D. Bernardus Paludanus titulo Phaseoli, sive Fabæ arborescentis ex

Descriptio.



Cortex.

Substantia.

Guinea, Pur-
gatricibus no-
ui Orbis Fabis
compressior
est, trium vn-
ciarum latitu-
dine, acutior
ad hilum, op-
posita parte
latus, & ran-
tū non qua-
dratus, longi-
tudo fescun-
cialis: cortex
Castanearum
corticem cras-
situdine æ-
quat, ex spa-
diceo nigricans,
oblique stria-
tus, amaref-
centem substantiā

claudens, quæ situm iam in superficie contraxe-
rat, penitus verò nigricat, & odorem ingratum
spirat.

Eundem fructum dono nobis dedit Illustrissi-
ma Ducissa Vvircembergica, sed figurā paulū va-
riantem. Nam ad ouatam figuram quam proxi-
mè accedit, ac prædicto latitudine quidem cedit,
sed crassitie superat. Cortex, & quæ intus latet
substantia, cum prædicto eadem; sed paulū dilu-
tior, fortè quia maturior. Nam in vniuersum præ-
dicto est habitior. Conferant lectores historiam
duarum sequentium Fabarum arborescentium
Clusii: ex sanè cum nostris respondere viden-
tur.

FABÆ ARBORESCENTIS LONGISSIMVS lobus, Phaseoli, lau, plani, spadicei.



Cortex.

Cortex.

VA I D È
magnuse-
rat lobus, in-
quit Clus. Exot.
Lugduni Bata-
uorum conspe-
ctus apud Hæ-
ricum Tilman-
num Mercato-
rem, qui diu in
Lusitania vixe-
rat, cumquæ ex
Guinea delatū
allētebat. Nam
viginti vnciarū
longitudine,
duroque &
crasso cortice
erat præditus,
atque rugoso,
coloris externa
parte nigrican-
tis, & fuliginosi, intēnā autē ferè spadicei (eam
enim videre poteram, quia propter nimiam sic-
citatem, & calorem in binas partes cum strepitu
dissiliat) continens magnos septem Phaseolos
binas vncias cum semille longos; fescunciam la-
tos, valdè planos pro magnitudine, & mi-
imè densos, coloris ex spadiceo nigricantis; & splen-
denti. Ipsum quidem lobum libenter in tabella
exprimendum curalem: verū quia in binas

partes dissiliat, & illa instar cornuum arietis se-
se contorserant, commodè fieri non poterat: sed
ex alio simili iconem in tabella expressam hūc
substituendam curabam.

Eam porro iconem suis nativis coloribus in
charta eleg inter expressam, servata lobi magni-
tudine & latitudine, mittebat ad me anno 1601.
doctiss. vir Franciscus le Clerc Montifaux Medi-
cus Tornacensis, cum vno Phaseolo ex ipso lobo
exempto. Lobus autem vnā vnciā minus longus
erat eo, quem apud Tilmannum conspiciebam:
nam eius longitudo nouemdecim vnciarum dū-
taxat erat, latitudo verò eadem cum illo, qui Til-
manni, circa pediculum tamen paulū angustior:
color externus fuscus, quem crassiores venæ, siue
strix nigre, à pediculo ad extremum usque lo-
bum secundum longitudinem ductæ exornabant,
internus color ex spadiceo ad rubedinem ten-
dens: ipse Phaseolus planus, niger, & splendens,
illi penè similis; qui in lobo Tilmannico: quā
autem parte lobo adhererat, paulū angustior il-
lo mihi videbatur, deinde in latum se expandens.
Vnde autem hunc lobum habuisset, non adscri-
bebat.

Locus.

Locus.

FABA ARBORESCENS, SIVE PHASEOLVS LONGE MINOR, PLANVS, RUGOSVS, spadicei coloris, nervo emi- nentiore.

Lobo haud dubiè inclusus fuerat alter Pha-
seolus, superiori quidem formā non valdè
dissimilis, sed longè minor, fescunciam videlicet
tantū longus, vnciam latus, planus, rugosus,
spadicei quodammodo coloris, nervo, qui eum
ambiebat, eminentiore, & in binas partes diui-
dum esse indicante, vt Fabæ vulgares. Hunc
Clusio, quemadmodum ipse Exot. lib. 3. cap. 7. te-
statur, Paludanus ostendebat.

Descriptio.
Phaseolus.

FABA ARBORESCENS, PHASEOLO plano, longo, nigro.



PPhaseolū ac-
cipiebat
Clus. libro 8. & Locus.
capite modò al-
legatis, à Cl. V.
Paludano, Fabæ
arborescentis
appellatione;
quæ ex Guinea
delata esset, & Descriptio.
ex simili lobo, Phaseolus.
qualis Fabæ ar-
borescentis lon-
gissima, exem-
ptus esse crede-
batur: erat au-
tem valdè pla-
nus, binas vn-
cias longus, aut
amplior, fescun-
ciam latus, eius-
dem penè co-

loris cum eo, qui superiore capite descriptus, mi-
nus tamen nigricans, quia forsitan minus matu-
rus, non minus tamen splendens illo.

Similem etiam, sed maiorem, crassiorē, & spa-
dicei coloris nanciscebat anno 1597. in Madaga-
scara.

Locus.

carinulâ natum, ab eis, qui illo anno ex Italia
Amstelredamum redierant.

FABA ARBORESCENS, SIVE
Phaseolus ovo columbino ferè simili,
exalbidi coloris.

Descrip.



lignitus, laevis alioqui, & splendens, grauis, &
ponderosus.

FABA ARBORESCENS, SIVE
Phaseolus niger, ad ovum
columbinum accedens.

Descrip.

Phaseolum quartum (pergit Clus. lobo etiam
comprehensum fuisse, non est dubium nullum
ad me mittebat anno redemptionis humanæ
1597. ornatiss. vir Iacobus Platau, rei herbariæ
peritissimus. Erat porro crassiusculus, eiuſdem
penè magnitudinis cum superiore, totus niger,
præter exigua maculam subalbam, quâ procul
dubio inhehærat lobo, durus autem, & solidus,
atque in aqua subsidens.

PHASIOLVS NOVI ORBIS, SIVE FABA
purgatrix laevissima, cordis figurâ.

*Partes
Fabarum.*



Phaseolus,
inquit Clus.
Exot. qui lobo
inclusus fuisse
videbatur: di-
uersa erat eius
forma, nam co-
lumbinum o-
vum ferè ex-
primebat, lon-
gior vncia, am-
bitu seseuam
ferè compre-
hendens, exal-
bidi coloris, cui
flavi quidpiam
circa extremâ
partem, quæ
lobo inhehæ-
rat, fuliginosâ
maculâ erat in-

Variz ma-
gnitudinis
purgatrices no-
ui Orbis Fabas
seruo, aliàs vn-
ciarum duarum
latitudine, aliàs
seſcuali, vtrâ-
libet orbicula-
tas ferè, latiores
tamen paulò, v-
ti sinus parvus,
quâ siliquæ
adhæserunt, ca-
uas, digiti ferè
crassitudine,
modicè com-
pressas, spadi-
ceo, duro, stria-
to, & lucente
cortice intestas:



quod intus co-
tineatur, cello
Clusio, album,
firmum, & in
duas partes na-
tura sectile, vt
sunt omnia
phaseolaceæ. Sa-
pore primæ,
quali ferè sunt
omnia legumi-
na, sed illud
liogam me-
dicante, & acri,
quo fit, ni fal-
lor, vt purgan-
di facultate sint
præditæ.

Fabam iam
descriptam re-
perimus inter
Valeradi Dou-
rez selecta, cui-
us hæc erat in-
scriptio: Faba
purgatrix, vel
potius Phasio-
lus Peruvianus:
Sunt nobis tres
species, vnus
sonat, alter nō,
tertius flacci-
dior, & com-
pressior, qui im-
maturus vide-
tur, quem ha-
bui ab Illustrat.
E. C. missum à
Bernhardo Pa-
ludano, nomi-
ne, si bene re-
cordor, Fabæ
Brasilianæ.

Quartum anno
1605. accepimus inter ea, quæ Gener adferebat ex-
stinere Anglicano & Belgico, magnam, plenum,
pulchrum, atro-durum, non sonantem, sine no-
mine. Adhæc anno 1608. tres alias purgatrices
Fabas dono habui ab Ill. mea Principillæ. Erant
autem dux nigræ, compressæ, vtrique ferè pla-
næ, tertia coloris penè castanei, vnâ parte pla-
nior, alterâ gibbula valdè, sinum cordatum mi-
nùs demonstrans.

An Lobel. & Pena in Adv. de supra dicto lo-
quantur, dicentes: Phasioles, siue Fabas per-
quàm raras habemus, quas ferunt reperiri ma-
gnâ copiâ ad Cornubæ littora, & quod non pa-
rum mirum, eo loco nullam meminit vllus na-
uem illisam, nullumve naufragium factum, & ta-
men quotannis nouæ inueiuntur, partim flui-
tantes, & partim effodiuntur immerse sabulis
littoreis, quasi, vt putant Cornubiensis maris
Anglici accolæ, secundis Austris, aut Zephyris è
nouo Mundo appulsi fuerint. Tenebras, nobis
equidem iudicibus, effundunt Aduersaria, quæ
omnis generis ambiguitates & dubia continuò
pariunt. Fabas perquàm raras, sed quales rogo,
quantas: describere fas erat, nefandum videri in-
cedere nominibus: nec enim his docetur quid
res sit, sed per descriptionem ea tandem intelli-
gitur.

Lobel. Obs. Icon. Plant. Phaseoli noui Orbis,

Sap.

*Faba pur-
gatrix.*

*Phas. Per-
uianus.*

*Faba Bra-
siliana.*

*Faba per-
quàm rara.*

*Lob. cy. Pa-
na repræ-
sentat.*

Locu. Fabæ purgatrices Clusii. *Clusio* apud Monardem nascitur in insula D. Thomæ dicta. & cordis effigiem, ut vulgò pingi solet, imitatur: idcirco à quibusdam *Cor Dni Thomæ* nuncupatur. Eius obitetur meminit Petrus Cæcia part. 1. Chron. c. 111. Phasiolus maior Fabæ purgatricis nomine missus.

Phasiolum marinum. Ceterum silentio minimè premendam idem Clusius existimavit opinionem, quam Nortuagios de hoc Phaseolo habere intelligebat: illos enim prius sibi persuadere scribebat doctissimus vir ipsi amicus, marinum esse Phaseolum, atque idem in Farris insulis nasci inter Algæ, & ex profundo erui, quin & folliculos ostendere, quibus contineri nugantur, quum tamen nihil aliud sint (nam vnum quem mittebat, conspexit) quàm ouorum *Raja* piscis putamina. Ipsi à forma renem marinos appellant, nonnulli etiam *Bona ferris calculos*; siue, quoddam calamitatem à domo possessoris, siue etiam, quoddam incantamenta, & nescio quam noxam, ab heri pecore arcere vel propellere, credantur. Similem præterea cum suo lobo proponit capite octavo lib. 3. Exotic. qui non minus crassus erat (ut ex iconè, quam suis colonibus expressam, eruditissimus vir Franciscus le Clerc Medicus Tornacensis ad ipsum mittebat, coniecturam facere poterat) quàm lobus, qui ex Wingandecaovv relatus, & hoc libro descriptus est: quem quidem lobum videre sibi non coniugit, nihilominus eius iconem, secundum eam, quæ ad illum missa, in tabella secunda expressam adpositam hic volebat.

Reperitur in Bona ferris calculis. Is autem lobus non erat valde longus pro eâ crassitudine, quam pictura, quæ ad vinum affabre expressa, referebat, sed quinque vnciarum longitudinem duntaxat habebat, binarum verè latitudinem, duro, crassoque cortice constans, coloris ex cineraceo fusci, de crasso pediculo pendens. Binos Phaseolos solummodo continuisse videbatur, quorum alterum cum ipsius lobi cone ad ipsum mittebat; binas vncias latum, fescunciam longum, sumpta ab hilo, quo lobo adhaererat, ad infimum fructum mensurà, planum, medio tamen, aliquantulum extuberantem, lauem, coloris nigri & splendentis, quia perfectam maturitatem adeptus erat, aliàs ex fusco spadiceo: plerique autem omnes, quos videre Clusio contigit (multi certè & quidem variz magnitudinis persæpe sibi sunt conspecti) cordis, ut vulgò pingitur, formam habebant, hoc est, eà parte, quâ lobo adhaererant paullulum erant caui, atque propter hanc formam, & quia in insula S. Thomæ (carnetis in aliis etiam Africæ regionibus inueniri non dubitem) nascitur, & inde plerumque Phaseoli illi allati, *Cor S. Thomæ* à quibusdam appellatur. *Hæc ex Clusio.*

Descriptio Lobi. Hos exhibet Iacob Theod. Tab. ic. & hist. sub titulo Phaseoli Americi purgantes, Purgierend Bonen auß America. Eisdem quoque Hist. Lugd. depingit, ac describit, vocatque Fabas purgatrices Monardis. An porro Fabæ vulgaribus similes, quarum meminit Ferdinandus Lopez de Castagneda Hist. Indicæ lib. 7. cap. 78. quæ vomitum cient, & aluum valenter purgant?

Locu. Fabarum purgatricum solum fertile Carthago, Nomen Dei, & insula D. Thomæ dicta. Sed Clusius in Africæ etiam aliis regionibus inueniri non dubitat. Ceterum, ut Monardes præcipit, pellicula illa tenuis, quæ per medium illas interfecat, & caparum tuniculam exteriorem æmulatur, vnà cum cortice abicienda est, alioqui tantà vehementiâ supernè & infernè purgant, ut in vitæ discrimen lumentem coniciant. Assandæ deinde sunt, ut illarum acrimonia infringatur, deinde in puluerem comminuendæ. Datur hic pulvis vino, aut saccharo exceptus, ad cochleare vnum, deinde haustus vini sumitur. Apud Indos hoc medicamentum celebre est, ob sumendi facilitatem: nam sine molestiâ bilem, pituitam, & crassos humores, multò lenius, & facilius, quàm superiora medicamenta [nuclei pinci cathartici, Aucellæ purgatrices &c.] purgant. Dantur in febribus diuturnis & importunis, in coli doloribus, & articulorum morbis. Dosis esto assaturum (quod cum in hoc, tum in præcedentibus obseruandum est, torrerem enim singula præstat) à quaternario numeto ad senarium, plurimum, aut pauciorum, pro ægri viribus. Calida in secundo, sicca in primo.

Phasioli. Vnde habuerimus Phasiolū noui Orbis longiorem non recordamur. In easumus opinione, Clusium in Exot lib. apud Manardum cap. 49 huius meminisse, cum post traditam Fabam purgatricem formam cordis, scribit: Illi similes, hoc est, magnitudine, & colore respondentes, sed longiore formâ præditos Phasiolos videre memini.

Phasiolus, MACOUNÆ, SIVE Phasiolo Brasiliano similis. Phasiolus Macounæ similis, hoc est, spadiceo nigricante, sed planiore, longioreque formâ, hilo non admodum magno, Clus. de fructibus peregrinis. Est autem ipsi, fructus peregrinus secundus, pag. verò 43. Phasiolus Macounæ similis dicitur, cuius ad epistolam Petri de Osma Nicolæ Mo-

Sumendi ratio. **Facilitas.** **Descriptio.** **Temperamentum.**

PHASIOLI NOVI ORBIS, SIVE FABÆ purgatricis laussimæ, variatio longior.



A hilo, **Descriptio.** Quod eminentius est, nec sinum facit, ad oppositam partem duos pollices, cum dimidio est latus, longitudo duarum est vnciarum, sic, ut ab orbiculata superiorum figurâ non parum desciscat, color spadiceus, dilutior, lubricitas & nitior, ut videtur, maior, crassius par.

Vnde habuerimus Phasiolū noui Orbis lon-

giorem non recordamur. In easumus opinione, Clusium in Exot lib. apud Manardum cap. 49 huius meminisse, cum post traditam Fabam purgatricem formam cordis, scribit: Illi similes, hoc est, magnitudine, & colore respondentes, sed longiore formâ præditos Phasiolos videre memini.

PHASEOLVS, MACOUNÆ, SIVE Phasiolo Brasiliano similis.



Phasiolus Macounæ similis, hoc est, spadiceo nigricante, sed planiore, longioreque formâ, hilo non admodum magno, Clus. de fructibus peregrinis. Est autem ipsi, fructus peregrinus secundus, pag. verò 43. Phasiolus Macounæ similis dicitur, cuius ad epistolam Petri de Osma Nicolæ Mo-

HISTORIÆ PLANTARVM

Haba de India may larga.

ardes in scriptam postremâ editione meminit, quique Diuo Maximiliano secundo Cæsari ex Hispaniis missus fuit, *Haba de India may larga*, id est, Fabæ Indicæ prælongæ nomine. Aqua merus imum petit. Jac. Theod. Tabern. Icon. Fructus peregrinus II.
Eicon eadem cum ea qua lib. III. cap. 46.

PHASIOLVS INDICVS BREVI SILIQVA tumida atque ruga.

Descrip.

Inter alia naturalia præcipue raritatis, quæ D. Paludanus Illustrissimo ac Clementissimo meo Principi Duci V. Wirtembergico obtulit, est siliqua hæc Indica, vniâ latior, longitudine dupla, pulvinatis instar tumida, nigra, aut fusca, corticis Cassiæ fistularis in modum, modicis striis, rugosa, lucida. Ex cuius extremo altero eminet pediculi vestigium: Parte verò oppositâ angulus incurvus. Porro hæc siliqua in hypocausto collocata, à colore satiscens, in duas dissiluit partes, quæ contorquebantur instar reliquarum siliquarum leguminosarum,

Cult.



quæ tamen madefactæ aquâ, facili in pristinam figuram extendebatur. Colore erant intus viridante, ipse verò cortex sîmbria clauderetur albicante. Latebant intus in siliquæ angulo fructus proprio pediculo hærentes, gemelli, nigri, lenes, latitudinis præne circinatæ, compressi, ut cultri dorso non multum sint crassiores. Saporem non addo, quod integri fructus terra fuerint concrediti ab Illustrissima Ducissa. Pictura facta ad ipsam siliquam, sed paulò minor propter ligni formam.

Icon.

Descrip. Clusii.

Prædictus fructus à Clusio in Exot. depingitur, ac describitur, sub titulo lobi membranacei nigri. Erat autem hic lobus binas vniâs longus, vnam latus, prorsus alii coloris tumidus instar lobi Cicetis, nec formâ valde illi ab similis, maior tamen, membranaceo cortice satis duro cõstans qui præ siccitate dehisceret, & conuoluebatur, quemadmodum penè leguminum lobi, seminâque continebat bina, aut terna, nigra, circinatæ ferè rotunditatis, plana tamen (quod mirum in aded tumido lobo) formâ non multum dissimili articulis lobi Acaciæ, non aded tamen turgentis in medio, tenui admodum membrana tecta, eaque etiam nigra. Eam lobum cum aliis quibusdam exoticis, mittebat ad me Amstelredamò Petrus Garetus. Similes postea apud alios etiam videbam.

LOBVS QUADRANGVLARIS.

Descrip.

Exoticum, inquit Clus. lib. 3. cap. 17. nec vulgare leguminis genus esse videbatur, semel

duncaxat mihi conspectum, quadrangulari lobo constans, quatuor crassioribus & eminentioribus nervis prædito, quadrantem longus, & citius semunciam crassus, cortice satis denso, pro legumine, præditus, eoque obliquè striato, coloris ex fulco fuliginosi, septena grana continente quadrangula, in binas partes aliorum leguminum instar didivisus, quæ vetustate duritiem contraxerant. Hæc paucula de eo legumine ex eius notis apparentibus, & manifestis dicere poteram, quæ lectorem boni consilium arbitror

Corren. Color. Semina.

LOBVS MEMBRANACEVS planus, niger.

Lobus hic omnino planus erat, aliqui formâ valde similis superiori: binarum enim vniârum longitudinem habebat, vnius latitudinem, extremitas paulò latior erat, color ex atro spadiceus. Wilhelmus Pæduyn, ab his qui anno 1598. ex Guineâ redierant, accipiebat, & mihi [Clusio Exot.

Descrip. Lobus.

Color. Locus.

lib. 3. cap. 16. Immutus dabat, ut eius historiam describere possem, quia quum vnicus illi esset, ad se redire volebat, quem adseruaret: porro maturum esse, an immaturus, nihil pronunciare queat sed quum lobum esse constaret, nec agnitus strepitum ederet, opinio magis inclinât, cum ante maturitatem fuisse lectum.

FABA CYAMOS LEGVMINO SA IN GENRE.



O Pes ac diuioz. Indix. Americæ, Africa, aliarumque exterrarum regionû in præcedentibus historiis de Phasiolis ad nostras terras apportatæ fuerunt atque traditæ: quid nostra ferat tellus nostris & peregrinis exhibere aggredimur à Cyamo exoriri, quem recentior ætas Fabam appellat, radicem parum est rectâ,

Faba. Radix.

Caules. recta, partim terpenia, stammosa, & fibris donata: ex qua caules surriguntur duobus cubitis latiore solo altiores, quadrati, inanes; foliis aduersis, ex-lis, ex oblongo rotundis, ad vnam costam an-nexis: ex quorum alis flores oriuntur simul ali-quot iuncti, congeneribus. Pili similes, quorum supremum folium vagae purpurascens albi-dum, stius purpurantibus praeternit, duo late-ralia in medio nigra, in ambitu alba, stamina occultans, colore est ex albo herbaceo: semen in siliquis magnis, et assis, carnis, hirsutus, surrectis, oblongum omnibus notum.

Semen. Sed veniamus ad ea, quae de hac Theophras-tus atque Veteres scriptis promulgant. Is igitur huius lib. 3. cap. 1. Frumenti prima & maxima genera duo trahit, alia quippe frumentacea, ve-Tritum, de quo lib. 8. Alia chedropa, ut Fabi Cicer, de quibus posthac agendum erit. Horum autem omnium generatio simplex, & vna est, quippe ex semine omnia exeunt, nisi quid- dam paraeque radice prosiliat. Ex leguminibus quidem Fabam maturem feri possit: hanc enim suz debilitatis gratia radices agere ante Hieme deli-derat. Sunt tamen, qui hanc sero audeant ferere, si minus primis sagibus expedire potuerint. Legu-mina quarto die, aut quinto, proueniunt. Fabis ex-ceptis. Hae enim intra dies plures etiam quam fru-mentacea exit, quibuldam enim in locis vel in de-cano, quinto, alijs etiam vigesimo: hanc enim dis-tililline omni prouenit, & si eadem lata fuerit im-ber plus atque successerit, vel prouentu omnino difficillima reddetur. Sed an ea, quae tempore verno seruntur, celerius exeant, cogitandum. Ceterum germinando eadem ex parte radicem fundit & caulem, qui nimirum parte siliquis semen adne-ctitur, inque ea veluti principium quoddam germinandi haudquaquam oblitum: quod vel

Difficill. prouenit. ad pudendi formam effigiatum sane inspicere possis, ut & in Cicer, sed maxime in Lupino: his enim radix deorsum versus, solum vero, & cau-til sursum tendunt. Sed & multis folijs exit Fa-ba, usque rotundis, qualiter leguminum maxima pars, quae radice singulari subnixta, multos super-ne ramos ex caulibus, gerunt, Fabis tantum ex-ceptis, quae inter legumina sola potissimum etc-cto, caule consistit, qui geniculatus est, atque ina-nis, quumobrem culmus vocatus, ceteris legu-minibus lignosior. Quot vero diebus hanc flo-reat, sic declarat idem Theophrastus: Legumi-num florid utina producit, atque inter cetera Erui, Cicerisque diuturnissima. Inter omnia ve-ro Fabam quidem summo deservimine, & longissi-mo tempore floret: quadragesima namque die-bus florere prodita est: sed alij, subinde alio at-que alio emergente, florere assignant: particula-ri enim florere aiunt, alij simpliciter referunt. Hos enim spicatis confertum Leguminibus om-nibus particulatim emergit. His enim primum pars inferna floret, quae cum defuerit proxima incipit, atque ita ad supernam itur successu affi-duc. Hinc huius lib. 7. cap. 3. hanc (intellige flo-rendi modo) cum Ocymo comparat, scribens: Ocymum vero particulatim primum inferius, deinde cum ea defloruerit parte, florere supe-rius incipit. Unde fit, ut diutius istud floreat, quemadmodum Fabam. Eam porro diebus quo-que quadragesima perfici volunt: ita tamen, ut in-tra tantundem spatium temporis hanc florere, at-que perfici nata sit: cum cetera intra dies pau-ciores consummuntur. Nancin Leguminum ge-nera, colorum, saporumque ratio differentiam facit. Candida siquidem in omnibus generibus

Germen. praestant dulcedine, ut Cicer, Fabam, & alia gene-ris eiusdem. Quae, ut omnia Legumina, siliquis a-steret, & veluti quoddam principium inde obinere minens non concidit, ut Lupinum. Ac licet imber post sationem superueniens om-nibus praestodit, exspicit tamen agere germi-nans Fabam, quae florescens praecipue modo huius cupit: ob id sero tam serere voluit (ut dictum est) quoniam diu floreat: sed postquam deslo-ruent, parum omnino, quae desiderari affirmant. Consummatio enim iam in vicino est. Hanc for-tem illud pulchre sublequitur, quod de cicer, lib. 4. cana memoriae prodidit: post florem etiam, si adhuc humida, tenellaque assatu vehementer vexetur, facile perit. Discitur enim quod in his tenuissimum est, & confectata inter se euacuat. Hanc ex ceteris nonale optimum praestat, quam-vis frequens feratur, fructumque ferat copiose. Iam quod cultoribus scitu per necessarium, aquas fluentes huius magis prodelle, quam coactas af-firmant. Apud Philippos cum ventilatur, eius loci vento, perflata, si cocta facilis est, sic difficilis. Et hoc sane mirum, quod cum alias minime molesta est, sum etiam tellurem raritatis suae, ac putredinis causa stercoreare putatur. Ob id, qui circa Macedoniam atque Thessaliam colunt, cum Fabam florent, arua inuicere contulerunt. Ver-miculi etiam in Fabis, quam quidem celeritate in-leguminum genere erodunt. Midia ab aliquibus dicta nascuntur. Singula namque pro suo humo-re peculiare animal creant, cum secutis se im-bribus calor repentinus humorem inclusit. Sed ita eosam, si credere nonnullis fas est, reple-ri posse affirmant. Ceterum Midia, & aliarum herbarum & fructuum impetum dum alimena sua consumpserint, pereunt. Igitur ad hanc omnia tractum natura ut irimim refert, nec temere iam enim caelum diuersum caliditate, aut frigidi-tate, aut humiditate, aut siccitate constat: hoc autem fructus reddere, consummareque possi-mè patet. Quapropter quibus locis fieri solent, non semper sunt. Seminibus autem non vis ea-dem ad germinandum, ac referendum utique datur. Quaedam enim germinant, consumman-turque celeritate, & referunt egregie possunt, ut Panicum, Milium. Quaedam germinant quidem, sed non celeriter, seu Fabam, & praecipue, quae faci-le percoquitur. Apud Apollonium maris Ionii Fabam nullo pacto erodunt, ideoque seruanda reponi. Quin & circa Cicerum diu durare potest. Quod autem Fabam tardi prouentus sit, causam assignat, crassitiem putaminis ambien-tis. Si praeterea late impluerit, adhuc multo tar-diùs eam prouenire nosse anthothenbit, quali terra tunc patiminetur, solideturque. Tertio, Quod vero Fabam, & aliud quicquam ex legumi-nibus minis fructet, imbecillitati certe tribuen-dum hoc est. Quae de causa maturus hanc serere s-lent, ut priusquam (ut iam saepius dictum) Hiems adueniat, radiceantur. Fabam tamen adeo detrimentis multus est, frequenterque, obnoxia, ut quamvis mature prouenerit, tamen perfici plerumque non possit. Imbecillitatem autem eius vel sensu percipere licet: rest enim corpore solido ac inani: nec radice numerosa subnuitur: quas ob res a quavis causa statim offenditur. Mature igitur serere Fabam solent, quod Hie-mem anticipare debeat, quod possit radicare, & simul quia imbrem in flore amet, quia laxa est. Inter legumina autem magis, & ruginem lentis, tum quia folia vndique gerit, tum quia densa se-ratur, tum quia fructum ferat proximam gerit.

Figies. Folium. Tom. II.

Caules. recta, partim terpenia, stammosa, & fibris donata: ex qua caules surriguntur duobus cubitis latiore solo altiores, quadrati, inanes; foliis aduersis, ex-lis, ex oblongo rotundis, ad vnam costam an-nexis: ex quorum alis flores oriuntur simul ali-quot iuncti, congeneribus. Pili similes, quorum supremum folium vagae purpurascens albi-dum, stius purpurantibus praeternit, duo late-ralia in medio nigra, in ambitu alba, stamina occultans, colore est ex albo herbaceo: semen in siliquis magnis, et assis, carnis, hirsutus, surrectis, oblongum omnibus notum.

Semen. Sed veniamus ad ea, quae de hac Theophras-tus atque Veteres scriptis promulgant. Is igitur huius lib. 3. cap. 1. Frumenti prima & maxima genera duo trahit, alia quippe frumentacea, ve-Tritum, de quo lib. 8. Alia chedropa, ut Fabi Cicer, de quibus posthac agendum erit. Horum autem omnium generatio simplex, & vna est, quippe ex semine omnia exeunt, nisi quid- dam paraeque radice prosiliat. Ex leguminibus quidem Fabam maturem feri possit: hanc enim suz debilitatis gratia radices agere ante Hieme deli-derat. Sunt tamen, qui hanc sero audeant ferere, si minus primis sagibus expedire potuerint. Legu-mina quarto die, aut quinto, proueniunt. Fabis ex-ceptis. Hae enim intra dies plures etiam quam fru-mentacea exit, quibuldam enim in locis vel in de-cano, quinto, alijs etiam vigesimo: hanc enim dis-tililline omni prouenit, & si eadem lata fuerit im-ber plus atque successerit, vel prouentu omnino difficillima reddetur. Sed an ea, quae tempore verno seruntur, celerius exeant, cogitandum. Ceterum germinando eadem ex parte radicem fundit & caulem, qui nimirum parte siliquis semen adne-ctitur, inque ea veluti principium quoddam germinandi haudquaquam oblitum: quod vel

Difficill. prouenit. ad pudendi formam effigiatum sane inspicere possis, ut & in Cicer, sed maxime in Lupino: his enim radix deorsum versus, solum vero, & cau-til sursum tendunt. Sed & multis folijs exit Fa-ba, usque rotundis, qualiter leguminum maxima pars, quae radice singulari subnixta, multos super-ne ramos ex caulibus, gerunt, Fabis tantum ex-ceptis, quae inter legumina sola potissimum etc-cto, caule consistit, qui geniculatus est, atque ina-nis, quumobrem culmus vocatus, ceteris legu-minibus lignosior. Quot vero diebus hanc flo-reat, sic declarat idem Theophrastus: Legumi-num florid utina producit, atque inter cetera Erui, Cicerisque diuturnissima. Inter omnia ve-ro Fabam quidem summo deservimine, & longissi-mo tempore floret: quadragesima namque die-bus florere prodita est: sed alij, subinde alio at-que alio emergente, florere assignant: particula-ri enim florere aiunt, alij simpliciter referunt. Hos enim spicatis confertum Leguminibus om-nibus particulatim emergit. His enim primum pars inferna floret, quae cum defuerit proxima incipit, atque ita ad supernam itur successu affi-duc. Hinc huius lib. 7. cap. 3. hanc (intellige flo-rendi modo) cum Ocymo comparat, scribens: Ocymum vero particulatim primum inferius, deinde cum ea defloruerit parte, florere supe-rius incipit. Unde fit, ut diutius istud floreat, quemadmodum Fabam. Eam porro diebus quo-que quadragesima perfici volunt: ita tamen, ut in-tra tantundem spatium temporis hanc florere, at-que perfici nata sit: cum cetera intra dies pau-ciores consummuntur. Nancin Leguminum ge-nera, colorum, saporumque ratio differentiam facit. Candida siquidem in omnibus generibus

praestant dulcedine, ut Cicer, Fabam, & alia gene-ris eiusdem. Quae, ut omnia Legumina, siliquis a-steret, & veluti quoddam principium inde obinere minens non concidit, ut Lupinum. Ac licet imber post sationem superueniens om-nibus praestodit, exspicit tamen agere germi-nans Fabam, quae florescens praecipue modo huius cupit: ob id sero tam serere voluit (ut dictum est) quoniam diu floreat: sed postquam deslo-ruent, parum omnino, quae desiderari affirmant. Consummatio enim iam in vicino est. Hanc for-tem illud pulchre sublequitur, quod de cicer, lib. 4. cana memoriae prodidit: post florem etiam, si adhuc humida, tenellaque assatu vehementer vexetur, facile perit. Discitur enim quod in his tenuissimum est, & confectata inter se euacuat. Hanc ex ceteris nonale optimum praestat, quam-vis frequens feratur, fructumque ferat copiose. Iam quod cultoribus scitu per necessarium, aquas fluentes huius magis prodelle, quam coactas af-firmant. Apud Philippos cum ventilatur, eius loci vento, perflata, si cocta facilis est, sic difficilis. Et hoc sane mirum, quod cum alias minime molesta est, sum etiam tellurem raritatis suae, ac putredinis causa stercoreare putatur. Ob id, qui circa Macedoniam atque Thessaliam colunt, cum Fabam florent, arua inuicere contulerunt. Ver-miculi etiam in Fabis, quam quidem celeritate in-leguminum genere erodunt. Midia ab aliquibus dicta nascuntur. Singula namque pro suo humo-re peculiare animal creant, cum secutis se im-bribus calor repentinus humorem inclusit. Sed ita eosam, si credere nonnullis fas est, reple-ri posse affirmant. Ceterum Midia, & aliarum herbarum & fructuum impetum dum alimena sua consumpserint, pereunt. Igitur ad hanc omnia tractum natura ut irimim refert, nec temere iam enim caelum diuersum caliditate, aut frigidi-tate, aut humiditate, aut siccitate constat: hoc autem fructus reddere, consummareque possi-mè patet. Quapropter quibus locis fieri solent, non semper sunt. Seminibus autem non vis ea-dem ad germinandum, ac referendum utique datur. Quaedam enim germinant, consumman-turque celeritate, & referunt egregie possunt, ut Panicum, Milium. Quaedam germinant quidem, sed non celeriter, seu Fabam, & praecipue, quae faci-le percoquitur. Apud Apollonium maris Ionii Fabam nullo pacto erodunt, ideoque seruanda reponi. Quin & circa Cicerum diu durare potest. Quod autem Fabam tardi prouentus sit, causam assignat, crassitiem putaminis ambien-tis. Si praeterea late impluerit, adhuc multo tar-diùs eam prouenire nosse anthothenbit, quali terra tunc patiminetur, solideturque. Tertio, Quod vero Fabam, & aliud quicquam ex legumi-nibus minis fructet, imbecillitati certe tribuen-dum hoc est. Quae de causa maturus hanc serere s-lent, ut priusquam (ut iam saepius dictum) Hiems adueniat, radiceantur. Fabam tamen adeo detrimentis multus est, frequenterque, obnoxia, ut quamvis mature prouenerit, tamen perfici plerumque non possit. Imbecillitatem autem eius vel sensu percipere licet: rest enim corpore solido ac inani: nec radice numerosa subnuitur: quas ob res a quavis causa statim offenditur. Mature igitur serere Fabam solent, quod Hie-mem anticipare debeat, quod possit radicare, & simul quia imbrem in flore amet, quia laxa est. Inter legumina autem magis, & ruginem lentis, tum quia folia vndique gerit, tum quia densa se-ratur, tum quia fructum ferat proximam gerit.

Faberum

Quomodo
sit, coctum
difficilis
Stercorat.Vermiculi
Midia.

Durantia

Cui tardus
prouentus.Faba imber
inducit.Maturus se
runda.Atque.
Frustrum
ra prou-
ent.

Anacock (v. existimo) Anacock: sunt enim eiusdem formæ, ventriosiores, maiores, quam staphylo- dendri fructus, ferè ouales, inæquales tamen. Co- lor ruber, idem ferè cum Anacock, minùs tamen viuidus & splendens, nullà maculà nigrà, umbi- licus idem, sed maior, circulus etiam elatus, fla- uescens: durus est, & in aquam iniectus, fun- dum petit: hic fortè fuerit idem cum Phascolo Indico rubro Lobelii sine maculà nigrà, quam- uis nulla icon eum demonstret.

PHASEOLI INDICI RVBRI

durissimi Lobelii, cum nigra maculà:
& alterum genus sine maculà, al-
terum cum longa tenui maculà.

Magnitudine & figura sunt fructuum sta- phylo dendri, laeuoris eximii, rubore coral- lino, inuicta duritiei, altera parte lucente ni- gram maculam habentes, medullà præditi insi- gniter durà, sapore non ingrato. His non ab- simile figura est secundum genus, pauld tamen maius, & oblongius: nullà nigrà maculà dona- tum, tantè etiam duritiei, & tam pertinacis, ut à Wenceslao Tserclaes fatum semel in totum in terra minime mutatum latuerit. Tertijs gene- ris Phaseoli præcedentibus duobus maiores, co- lore rubro obsoleto, ex oblongo rotundi, ytrin- que nonnihil compressi, quemadmodum Casta- nea equina, quibus secundum longitudinem al- tero latere macula est nigra, longa, tenuis: me- dulla insigniter dura, sapor amaricans.

Lobel. hist. Belg. Roode seer harte Indiani- sche Boonsens. Leon. Phaseoli rubri Indiani du- rissimi.

Nos hoc in loco priorem Phaseolum macula- tum referendum esse ducimus ad nostrum Pisum siue Phaseolum bicolorem, magnum, alterum.

B. pin. phaseolus Indicus 4. ruber, ex phæniceo croceus, & ex rubro spadiceus splendens. Nos de hoc non agimus.

PHASIOLVS, SIVE PISVM

Indicum, compressum, sanguineum,
Lupini quodammodo facie.

Figura ex triangulari in rotundum vergit, ita tamen, ut verobique ferè sessilis videatur. Ma- gnitudo Lupini aibi ferè est. Color corticis san- guineus, læuis, pulchrè splendens. Umbilicus impressior, albicans, secus quem macula parua, nigricans, conspicitur. Accepimus ab Illustriss. Ducissa Wirtembergica. An idem sit: an tantum varietas risi Americani magni iam antè descripti, pro certo non affirmamus. Habet tamen cum eo magnam adinuitatem.

PHASIOLVS INDICVS EX RVBRO

spadiceus, splendens.

Vncie trientem non superat, latitudine se- munciali, modicè compressus. Cortice te- gitur inter rufum & spadiceum medio, & ad Tannè Gallis dictum accedente, læui, splendido, umbilico dilutior, utique magno, per medià longitudinem eleuato. Parte oppositâ gibba: Estque ex iis quoque quos ab Illustrissima Ducis- sa Wirtembergica dono accepimus.

Eius licet antè prædicta cum Leone Phaseoli Indici parui maculati.

PHASIOLVS INDICVS OVATVS,

spadiceus, umbilico albicante
breuiore.



Phasiolis In- dicis, san- guineo & nigro magnitudine suppar est, quip- pe pauld bre- vior, angustior- que. Color in- tercurfantibus maculis quibus- dam dilutioris coloris spadi- ceus est. Sed va- rietas in umbi- lico, qui extu- bedinè albicat, & ultra mediam lateris longitu- tudinem non explet. Visus a- pud Illustrissi- mam Principis-

Descriptio

Color.

Vmbilicus

sam Wirtembergicam, quæ seuit, ideoque interius contemplari non fuit datum.

PHASEOLVS SANGVINEVS

ouatus Indicus.

Perelegans & exotica raritate spectabilis est hic phaseolus. Vnciam ferè longus est, digiti parui crassitudine, figurà ouatâ, colore sangui- neo. Hylus latusculus, atque niger per mediam ferè longitudinem excurrit. Dono nobis dedit D.D. Thomas Platerus Medicus, & naturalium solertissimus vestigator, ex Hispania allatum, ex India tamen primò inuectum esse, retulit. Eun- dem, cum jam figura nostra esset sculpta, com- municauit nobis Illustrissima Ducissa Wirtem- bergica, itidem (ut ferebat) ex India sibi allatum. qui prædicto pauld compressior, in cæteris planè similis est. Anno 1605. gener Cherlerus rediens, ex Anglia & Belgio attulit similem fructum, v- trinque compressum, ut euenit risi, durum, splē- dentem, qui iniectus in aquam subito sudebat.

Descriptio

Locum

PHASIOLVS INDICVS

ouatus niger.

Phasiolo Indico sanguineo iam descripto magnitudine, & figura ferè æqualis: colore au- tem variat. Nam totus niger est, & præ nigredi- ne, atque læuore splendet. Hylus itidem niger, magnitudine, & positu, ut in priori. Estque etiam hic ex fructibus apud Illustrissimam Ducissam Wirtembergicam visis, quem aperire, cum terra esset creditura, non licuit, ideoque nec interiora, vel saporem addere.

Descriptio

Color.

Hylus

Eius antè habetur cum Phaseol. Ind. 4. spadiceo &. icon.

PHASIOLVS INDICVS FVLVVS.

Nostratibus Phaseolis læuor est, vix tamen longior. Color fuluus est, & mustelinus.

Descriptio

Vmbi-

Vmbilicus. Vmbilicus magnus & longus, niger in area, ipso fructus cortice leuiter splendescente atque dilu-
tione, & quodammodo ex ruffo albicante consti-
tutus. Etiam hic ex iis est, quos apud Ill. Ducif-
sam Wirtembergicam descripsimus, referuauit
pro satione.

PHASIOLVS, LATO, STRIATO,
siue radiato semine: atrox punctatus,
cupula atro virente.

1.
*Reliqua
Semina.*

Siliquæ magnæ, latæ, compressæ. Semina vn-
ciam circiter longa, paulò minùs lata, renis
formâ, in terminis regione sinuatâ, nigra, fre-
quentibus albis striis virgata. Huic similia alia



paulò minora,
quæ licet radi-
ta, siue virgata,
variant nihilo-
minùs disposi-
tione radiorum.
Minoris huius
genus, quod pi-
ctum in supe-
riore parte no-
stræ tabellæ
paulò minus,
quàm sit, misit
insignis Medi-
cus Hercules
Saxonia prima-
riæ Cathedræ
Patauinæ Pro-
fessor, is colore
nonnihil va-
riat, qui atro-
rubens etiam
radiatus. Sunt

nobis alia semina, quorum icon infima parte ta-
bellæ nostræ, quæ alba dici possunt, punctis ni-
gris guttata, maculisque rubentibus versicoloria,
a germine latiore maculâ, ad, & circa extremum
ceu cupula expansâ atro-tubente.

Clusius similem plantam sic describit: Cau-
lis statim à radice in aliquot oblonga sarmenta
diuiditur, lenta, vicinos stipites & virgulta reli-
quorum Phaseolorum modo amplectentia: in
singulis alis terna folia vulgaris Phaseoli foliis
similia, atriora tamen, ex eodem pediculo nas-
centia, extremo, (vt in vulgaribus) impari:
ex iisdem alis breues ramuli prodeunt, mul-
tis floribus vulgari haud abimilibus, mi-
noribus tamen, albis, vix in modum conge-
stis, onusti: quibus succedunt oblongæ siliquæ
seu lobi, vulgaribus multò latiores, continentes
ternos, aut quaternos fructus, planos, communi-
bus Phasiolis latiores, albos, sed multis nigris
maculis, siue venis, ab hilo in latitudinem ductis
elegantissimè depictos.

Clus. dicitur Phasiolus primus siue Africanus,
Phasiolus minor, varius, siue Purkiche-
rianus. Ed quod huius fructum D. Purkiche-
rianus primus in Pannoniam intulerit ex Neapoli-
tano regno delatum, singulisque annis coluerit
& eius genus vt dixi, conseruauit: quam ob cau-
sam apud rei herbariæ illius regionis studiosos,
Purkicheri cognomen inditum, & vt Phaseolus
Purkicherianus nuncuparetur, obtrinit. Ante
multos verò annos similem planè mihi missum
memini, Phaseoli Africani nomine: & ex Afri-
ca Italos primùm accepisse, verisimile est. Idem

Tom. II.


in Hist. Phaseolus peregrinus primus. Item Pha-
seoli peregrini primi genus alterum.

Ponit quod animaduerrimus, Clusius in Hist.
postrema, pro Phaseolo peregrino primo, iconem
quæ est in Pannon. pag. 229. Phaseoli 5. siue Agy-
ptiaci titulo: verùm ex ea tabella adeinit duo se-
mina, quæ infra separatim erant picta; pro gene-
re altero apponit figuram, quæ est in Pannon. sub
titulo Phaseoli primi siue Africani: verùm non
demonstrat, quæ inredifferant. Icon autem pha-
seoli peregrini primi Clusii, est nobis in tabella
capitis Phaseoli bicoloris, seu Pisi Americani al-
terius, bicoloris: in eo Clusium imitati sumus,
cùm nesciremus diuersam plantam à seminibus
bicoloribus appictis. Phasiolum, qualem pinxit
Clusius, radiatum, qui etiam inferiore tabellæ
nostræ parte pictus est, misit Ill. Landgr. Guiliel-
mus, nomine Phasioli Americani: in descriptio-
ne tamen Clusii variare videtur: dicit enim al-
bum cum multis nigris maculis, aut venis: meus
potius dicendus niger cum albis venis.

An Tabern. Icon. & Hist. Brasilgen Bonen
1. Phasiolus Brasilianus primus. Nescimus, quam
inepam figuram proponat Compiler, quæ huc
referenda videtur, considerato titulo. An Tho-
mæ Hariot in hist. Virginæ Insulæ, Okendgier.

Clusio Georgius Purkicherus Pofoniensis in
Vngaria Medicus primarius communicauit, cui
ad pergulam, aprico loco situs singulis annis fru-
ctum maturum dedit. Mihi deinde anno 1582. &
aliquot sequentibus, egregiè prouenerunt ali-
quot eius stirpis, quarum nonnullæ lobos dede-
runt, qui matura semina protulerunt: interdum
etiam, quos ad maturitatem peruenire posse exi-
stimabam, ob Solis radiorum defectum, spem
meam frustrati sunt. Prouenit nobis in horto Ill.
E.C. Wirtemberg. folij Smilacis vulgaris, ex se-
mine missò, ab Illustriss. Landgrauio, cui (vt scri-
psit) excreuit ad lanceæ altitudinem, sed tantum
floruit; nobis verò ad maturitatem ferè proue-
nit. Ab aliis etiam acceptum semen terræ com-
missum, aliquoties siliquis protulit, sed nunquâ
semen maturuit. Si nanciscamur deinceps tem-
pestiue in vase plantabimus, & sub rectum pro-
ponemus, donec calum in caleseat, vt exponi
possit.

PHASIOLO RV M INDICOR VM
latorum tres species, & Clusii latus.



Est nobis
Phasioli In-
dici nomine à
Doctore Palu-
dano datus, se-
scunctali ferè
longitudine, la-
titudine vncial-
li, compressus:
cortice obte-
ctus flauo, ruffo
colore variè in-
tersparso, splen-
dente quidem,
sed non vsque
quaque laui.
Hilum album
est longiuscu-
lum, arcu obli-
què subrà cir-
cumdatum.

Huic quodam

Z.

*Phaseolus
peregrinus
1.
De Iconibus
Phaseoli
latus.*

*Phaseolus
Americani.*

*Phaseolus
Brasilianus.*

*Tab. repre-
henditur
Okendgier
Locus &
Tempus.*

*Similem
describit
Clusius,
caulis.*

Folia.

Ramuli.

Floris.

Siliqua.

Fructus.

*Phaseolus
Africanus.
Purkiche-
rianus.
1582.
1583.
1584.*

modo similem vidimus apud Illustrissimam Ducissam Wirtembergicam, sed minorem: quippe longitudine vtriusque, latitudine vtriusque mediam non multum superante, itidem compressum. Sed color albus erat, rubris tamen maculis interstinctus; cuius picturam ex ipso etiam fructu effictam exhibemus.

Similiter & tertium quendam apud eandem conspeximus, praedicto magnitudine tantum cedentem, quantum is primo loco descriptus, compressum. Sed colore etiam variantem, quippe ex nigro & albo variegatum, ita ut insignis sinus, albicans, punctis fuscis aspersus, totam ferè fructus nigri longitudinem vtrinque peruat.

Ut Clus. refert apud Monardem, Londini emit in Mercatorum porticu de Gallo Nauclero Phasioli genus, quod è Brasiliensi noui Orbis prouincia aduectum assererat. Nostro vulgari maior estis Phasiolus, latiorque, nec annulis colore variat: etenim nunc flavus est, aut omnino niueus, modo ater, aut purpureus, aut albis pupureisque maculis distinctus. De simili planta natam sefebat, qualis Europea est, nostrumque saporis gratia & leuitate longè superare, si eodem modo decoquatur. Londini satum prouenit vulgari similibus sarmentis & foliis, sed ad frugem non peruenit.

Videtur nobis Clusius, primum nostrum Phasiolum iam descriptum pintisse, ac fortè eadem tabella album, de quo capite sequenti.

PHASEOLVS NOVI ORBIS

LATVS, TOTVS CANDIDVS EMILACI HORIENSIS AFFINIS.

Descriptio.



Synonyma.
Phasiolus ex America.

Americana-
rum Faba.

Locus.

STRIATO
SNOVI Orbis Phasiolo minor est, à germine ad partem oppositam, vtriusque latius, longitudine scilicet, eburnei candoris & leuoris.

Dicuntur Lob. in Belg. editione parte 2. Phasioli ex America albi. Et Icon. Plantin. Phasioli magni, latius, albi, Thevet. America-

nam Faba, omnino alba, valde compressa, à Brasiliensi latius & longior.

Habeo ab Ill. E. C. missos à D. Paludano, & deinde mihi cum hac inscriptione: Phasioli Brasiliensi, maiores: ex quibus nos curauimus depingendos cum duobus minoribus Lobelij eadem opera, ac etiam Phaseolos rubros Americanos, striatos, planos.

PHASIOLVS LATVS ALBO EX NIGRO

varius, angustifolius.

Descriptio.

SARMENTA statim à radice habet multa prodeuntia, Purkitcheriani, siue in ordine [Clus.

sio rariorum plantarum Historiæ] primi Phaseoli modo, quæ, licet eadem ratione vicinis perticis sese circumvoluant, non tamen adeo luxuriant aut altè assurgunt. Ad horum nodos folia enascuntur terna, ut in aliis Phaseoli generibus, multò tamen angustiora, Sexti [nobis Phaseoli latius, coloris regularum, cum striis per longitudinem nigris] foliis, quem Coloniam apud Hoperi viduam conspicebat Clusius, non valde dissimilia: ex horum alis emergebāt digitalis longitudinis cauliculi, paruos flores in vix modum congestos sustinentes, albos initio, sed, ubi senescunt, pallescentes: his succedebant planæ, latæque vaginæ, Primi [Purkitcheriani] lobis ferè pares, breviores tamen, initio virides, quæ maturæ fuluescunt, semineque continent planum, Primi iam dicti granis minus, sed similibus coloribus albo & nigro varium, nunc in longitudinem extensis nigris striis, nunc confuso ordine sparsis maculis nigris maioribus, aut minoribus per vniuersum Phaseoli corpus: nonnunquam integro fructu nigro, vel exiguis albis maculis consperso, aut dimidià duntaxat ex parte. Florebat Iulio, & Augusto: semen etiam maturum præbere incipiebat Augusto.

PHASIOLI LATI, CANDICANTES

VIRGULIS NIGRICANTIBVS NOTATI
secundum longitudinem, vel nigricantes: flore albo.

PLURIBVS sarmentis assurgit, eisdem cum peregrino iam descripto, [septimo Clusii] vel cum superiore, longitudinis, quæ vicinis palis sese applicant, & eos scandunt: ubi sese in ramos diuidunt, adnascuntur folia, Primi [Phasioli latius, striato semine] foliis similia, terno numero, sed paulò minora: flores ex alis profert etiam Purkitcheriani, seu Primi, floribus similes, albos, vultate pallescentes, vix instar nascentes: quibus & planæ, ut in precedente, succedunt vaginæ, illis haud maiores, continentes bina, terna, aut quaternagrana, plana, superioribus magnitudine respondentia, non adeo candicantia, sed colore interdum exalbescente, aliquando nigricantibus virgulis secundum longitudinem, vel confuso notata, interdum toto etiam pæne fructu, ut in superiore, nigricante.

Numeratur hic Phaseolus apud Clusium in hist. Peregrinorum octauum seu emissum Pannonicarum stirpium Historiæ, alter, qui Viennæ Austriæ, semine peregrinè accepto, ipsi prouenit.

PHASEOLI LATI, MAGNI TOTI

ALBI, EXCEPTIS QUIBUSDAM RADII.

PHASEOLVM hunc adquirebam, inquit Clusius, senene, quod N. V. Ioannes Boisor ex Hispaniâ acceperat, mihi communicato, natum; erat verò is fructus Purkitcheriano maior, sed totus albus, nisi quidam radij sparsè varium quodammodo fecissent: terræ creditum semen producit, creuitque Purkitcheriani instar, similibus sarmentis, foliis, floribus, & vaginis, sed cum æstas sublequeretur tardior, humidior, & frigidior, neque hic, neque alij, quos senenam, Phaseoli exotici, ad frugem peruenire potuerunt.

Est autem hic Clusii rariorum plantarum Hist. Tertius, siue ordine peregrinus nonus, lib. 6. c. 41.

phaseoli

PHASIO LI LATI, PRORSVS
NIGRI.Descrip.
Rami.

Folia.

Rami.
Flosculi.

Vagina.

MULTI sunt ab vna radice assurgentes rami, superioribus quidem altitudine æquales, sepe circumuoluentes, ex viridi purpurascens, nodosi, & geniculati, quibus adnascuntur folia, Octavi foliis similia, secundum tamen articulationes, quibus connexa sunt, purpurascens: ex alis etiam prædeunt digitalis longitudinis ramuli flosculos, superioribus magnitudine & formâ, respondentes, vix quoque instar congestos, ferentes, sed quorum galea, seu callos obsoletè purpurascens, hinc lateralia folia, coloris sunt floridioris: his succedunt planæ, latæ, fuscæ & nigricantes vaginæ, semina continentibus plana, Purpuracherianis, siue versicoloribus Africanis minora, per maturitatem proflus nigra. Quartus est Clusio Hist. siue ordine Phaseolus peregrinus decimus.

PHASIO LI LATI COLORIS
REGVLARVM CVM STRIIS PER
medium nigris.Descriptio.
Flos.
Fructus.

VNDICIMO Phaseolo nascendi modo & reliquis sepe notis, per omnia ferme similis: sed huius flores Decimi floribus valde similes, paulo tamen dilutiùs purpurascens sunt: fructus autem magis dilutè rubedine præditus, regularumque colorem quodammodo refert, quem rari per longitudinem nigra stræ varium faciunt, aliquando autem plurimæ totum præteritum reddunt. Hoc genus mihi natum semine, quod communicabat Cl. Vir. Ioachimus Camerarius Inclitæ Reipub. Nonbergensis Medicus primarius: reliqua fructu ex Hispanijs misso. Clusio ex sex Viennæ natis vltimus, est ordine hist. pl. duodecimus.

PHASEOLVS CAPOTILLO
DEL ALDANA, SPADICEI
coloris.

PHASEOLVS (inquit Clus. Exot.) peregrinus tertius, ab eruditissimo viro Ioan. Castaneda Medico Hispanensi ad me missus anno 1600. cum hac inscriptione: Capotillo de Aldana: semuncialis erat magnitudinis, levis, spadiceique prorsus coloris, exceptâ parte supina, quâ suo lobo adfisse videbatur, durus & solidus.

PHASEOLVS BRASILIENSIS
CVM SVO LOBO, FABA SPADICEI
coloris, & circa hilum fuscum
candicans.Descrip.
Lobus.

PRÆLONGVS (ait Clus. Exot.) erat hic lobus: nam decem vnciarum longitudinem habebat, vnius autem vnciæ latitudinem, aut paulo ampliorem: cartilaginea porro cute textus erat, & quaternis in dorso nervis à pediculo ad extremum lobum, secundum longitudinem excurrentibus, insignitus, fuso extrinsecus coloris, intus secus ex cineraceo candicans, tenui quadam membrana singulas Phaseolorum sedes (decem Tom. II.



*



*

autem continuerat) distinguente præditus: ipsi verò Phaseoli longi, semunciam lati, spadicei coloris & circa hilum fuscum candicans.

Hunc autem Locus lobum ab us, qui recenter à Brasilia aduenierant, redemptum, Viennam Austriæ ad me [Clusium] mittebat, Richardus Garth, anno à nato Christo 1585. cum aliis quibusdam fructibus exoticis, quos sciebat me summa diligentia conquirere.

PHASEOLVS NOVI ORBIS EX
ATRO PURPUREVS, AUT SPADICEVS compressus duum
generum.

IN nigro relucet color glaucus aut purpureus, longitudo vncia minor, latitudo semuncialis; germen album, sapor leguminosus, Huius generis politior vnus, maior, minus rugoso cortice, & eo quidem spadiceo.

Ioh. Bauhino dedit Ill. E. C. cui miserat D. Paludanus nomine Phaseoli Brasiliæ.

PHASEOLVS AMERICANVS
MAXIMVS, LOBVS FABA OBSCURE
rubente, hilo longo,
albo.

CLARISSIMVS Vir, D. Carolus Paludanus dedit Serenissimo nostro Principi, siliquam nomine Phaseoli Americani, ex breui, crasso, ligneo pediculo, palmum longam, vnciam & semis latam: cortice crasso, duro, externè fusco, internè albo. Secundum commissuræ longitudinem, veluti sulci aut costæ laterales duæ: est bivaluaris, & aperta se contorquens, sapore nullo insigni. Membrana intus spongiosa, inter quas fructus.

Z 4

multi phasiolacei, vixne longiores, coloris ob-
toletè rubentis, videbantur nondum maturi.
Hylus longus, albus, per longitudinem fructus,
non eleuatus, nec eo est candore, qui in Leblab,
eo etiam multò est minor: sapor sabaceus: denti-
bus facillè atteruntur.

Sapor.

PHASEOLI RVBRI, AMERI-
GANI, STRIATI, PLANI.

Descriptio.

ROTUNDIORES sunt, quàm Phascoli magni,
toti candidi, amantè rutilantibus lineis stri-
ti, Porphyritè marmoris instar; præcedentibus
minores, nonnihil rotundi, & plani, maiores, la-
tioresque Phascolis vulgaribus: ex quibus aliqui
oblongi sunt, subcærulei, aut nigri, artificiosè
striis albis variegati. Lob. Similes, si non cos-
derit Clus. sic describit: Sarcmenta, altè etiam as-
surgentia, similia folia, & flores in digitalibus ra-
mulis vix modo congestos, paruos, octau
[Phascoli lati candidatis] generis lobis similes, in
quibus semina terna, aut quaterna, plana, dilutè
rubedine prædita, quæ nigris venis, siue radio-
lis secundum longitudinem distincta sunt, non-
nunquam magnis, vel exiguis nigris maculis con-
fusè aspersa: interdum etiam vtrinque prorsus,
vel alterà duntaxat ex parte, nigra, emicantibus
sparsim paruis rubentibus maculis, vt ex mar-
more aliquo marmorata torquata videantur.

Descriptio.
Sarcmenta.
Flores.

Icon.

Lob. in hist. Belg. Ror Orange ghemarbe de
Boonen. Icon. Plant. Phascoli rubri.

An Clus. hist. ex sex Viennæ natis quintus, a-
liis ordine Phascolus Peregrinus vnde cimus.

Econ autè habetur cum Phascoli lati striati &c.
Icon.

PHASEOLVS SANGVINEVS,
compressus, vmbilico albo.

Descriptio.

ELEGANTISSIMVM hoc Phascoli genus,
exotica suæ pulchritudinis exhibet notas.
Totus sanguineus est; vulgari Phascolo latior,
multoque compressior. Per ambitum nonnihil
angulosus. Vmbilico in medio paruo, albo. A quo
ad oppositum transtuersim obsecut, nec nisi Lyn-
ceis seie intuentibus oculis excurrunt venulæ,
obscurores ex atro rubentes, quarum diuaria-
tione in extremo nihil pulchrius conspici po-
test.

Vmbilicus.

Fruuntur hoc ex liberalitate magni nominis
Medici Patuini Herculis Saxoniz, vt & plurimo-
rum aliorum, exotica elegantiæ.

PHASEOLVS VVLGARI MINOR
ET PLANIOR, SVBRVBO COLORE,
foliis angustus.

Descriptio.
Folia.

ELEGANS genus Colonie conspexit angu-
stis foliis Clusius, fructu vulgari Phascolo
minore & planiore, subrubro colore, ex Hispa-
niis accepto, Frizdes Guadeli appellatione. Quin
Dodonzus eius descriptionem in suam novam
stirpium Historiam intulerit, non dubitat.

Eidem hist. Phascolus peregrinus sextus: Dad.
in fol. Phascolus peregrinus, perticis & vicinis
admiculis sese quoque circumvoluens, cui
terna ab vno pediculo folia etiam dependent,
veluti Phascolis, sed singula angustiora multò, ac



similiter ni-
griora: Sili-
quæ breuior-
es, planiores,
ac magis com-
pressæ, pau-
ciores fructus
obtinent.

PHASIOLVS LABLAB ALPINI.



PHASIOLVS
niger, La-
blab vocatus Al-
pino de pl. E-
gypti est arbor
sarcmentosa, quæ
crecit ad Vitis
magnitudinem,
sarcmentisque,
Vitis modo, ex-
tenditur, ac ex-
panditur foliis
figuraque limi-
lis est omnino
vulgari Phasio-
lo, flores seie
bis anno, Vere,
ac Autumno,
Phascolorum
floribus aliquat-
enus similes, à
quibus siliquæ

Lablab.
Descriptio.

Sarcmenta.

Flores.

Siliqua.

Fruens.

Longana.

Vitis.

Menses.

Tupia.

Genera.

Nigrum.

longè, instarque Fabarù latissimæ cernuntur, quæ
semina nigra, Phascolis planè similia, continent,
quorum alia nigra, alia subrubra cernuntur.

Hæc arbor viuit annos centum & amplius,
perpetuoque viret. Egyptiis frequens in cibis,
nostrisque non minus suavis. Mulieres vtuntur
decocto cum croco ad excitandos menses, præ-
terea utilis ad tussim, & dispnæam, & ad vnam
suppressam mouendam.

Clus. ab. II. viro Io. Pinello duo Lablab gene-
ra à Prospero illi communicata accepit: vnum vi-
delicet nigrum, vt quod descripsit in Pannoni-
cis, alterum rufum: De Lablab autem quod as-
firmat Prosp. Alp. viuit annos centum & amplius,
est difficilè creditu iis, qui Phascolorum & legu-
minum naturam norunt.

Honor. Bell. in epist. ex Cydonia Cretæ ad
Clusium Augusto mente scripta. Iulio nuper præ-
terito ex Egypto, semina accepit Lepidus diuersi
ab eo, quem in Pann. Clus. describit, quæ terræ
commissa felicissimè nata sunt, maximà suâ vo-
luptate: differt fructu, siliqua, coloreque: nam
hic siliquas præfert magnas, longas, latas, caulis

Descriptio.

caulis color purpureus, ad nigrum tendens, pediculi & nervi foliorum eiusdem sunt coloris: flores plures vno pediculo inhaerent. Ab Alpino recte planta delineatur: sed flores valde differunt: nam non in fine caulium, sed è foliorum cauis exerunt longo pediculo plures, quasi spicati, magni, figurâ aliorum Phaseolorum, sed colore atro purpureo, qui Italicè *Panmarzo* dicitur, Phaseolique ad rubrum tendunt nigris maculis insigniti, longo hilo (ut niger,) & albo.

PHASEOLVS LEBLAB NIGER ET SPADICEVS, HILO LONGO, ALBO.

Descriptio. **Curio.** **Albugo.** **Leplap.** **Locus.** **EX** Phaseolorum genere quoque est, quod *Leblab* barbarâ voce nuncupant. Magnitudinis est Phaseoli vulgaris, cortice tegitur spadiceo, laui, saturè rubentibus punctulis asperso. Cuius ambitus partem tertiam cingit, hilum emittens, candidum, decoram elegantiam fructui concilians.

Cl. Paludanus *Leblab* nomine misit fructum, descripto iam figurâ similem, sed planè nigrum, & aliquantò minorem, & ad cuius hili umum duæ maculae flavae conspiciuntur.

Est nobis *Leblab* genus quoddam totum nigrum, excepto hilo, iudem candide, eminenti, ac iam descripto simili, magnitudo prædicto æqualis. Huicque similem habemus alium; colore rufio, plus minus diluto: est etiam colore ferè rubro, nec non colore ferè flavo. Dentibus facile attingitur hic Phaseolus: sapor eius leguminosus quidem, sed nobis valde ingratus.

Clusius Pannon. & hist. rar. depingit & describit hoc Phaseoli siue leguminis genus, quod Paludanus misit, cui *Leplap* nomen inscriptum erat, his verbis: Siliqua brevis & lata est, quaternaque grana oblongiuscula, nigra, hilo nihilominus albo, admodum longo, prædita, continens.

Clusio aliquoties acceptum, & terræ, opportuno tempore, creditum, nasci noluit, respuens forte regionem Septentrionalium frigidiorum acier. Sunt nobis siliquæ prædicti *Leblab*, quales pinguntur à Clusio, sicut & semina eorum ex diversis locis missa, videlicet à Paludano, & dictum, alia mihi data per D. Iacobum Zvingerum, & fratrem Casparum Bauhinum ex Creta delata. Verùm ea fuerunt simul mixta per incuriam. Basileæ ptouenit *Leplap* in horto D. Ischii, simile caulibus & foliis Smilaci & Phaseolis vulgaribus, nisi quod folia multa, quaterna proferat. Gener Cherlerus rediens ex Anglia & Belgio diversorum colorum *Leblab* attulit.

PHASEOLVS PEREGRINVS ORBICVLARIS, CINEREI COLORIS, TECTVS atrâ tenuique membranâ.

Descriptio. **M**ITTERAT ad me [inquit Clus. Exot. lib. 3. c. 14.] anno 1600. honestiss. vir Vvilhelmus Parduus Phaseolum peregrinum, qui lobo inclusus fuisse videbatur, planus, vncialis magnitudinis, orbicularis parè formæ, medio tumidus, atque in binas partes diuiduus, cineracei coloris, atrâ, tenuique membranâ tectus, cui nolum nomen erat inscriptum.

Tom. II.

PHASEOLVS PEREGRINVS ANGVSTVS, NIGRICANS, ALBA, TENVI MEMBRANâ tectus.

Descriptio. **P**HASEOLVS alter peregrinus, Clusio [etiam in Exot.] missus, anno 1600. per Vvilhelmum Parduus vncialis quidem erat longitudinis, sed angustus, solidus & durus, nigricans, in binas similiter partes diuiduus, tenui quadam membranâ tectus, albâ, quæ in latere vestigium retinebat, quo lobo inhaerere videbatur.

PHASEOLVS BRASILIANVS MVLTIS, SPADICEVS, MAGNVS CVM MAGNÔ hilo nigro, plurimum ambiente

Descriptio. **Curio.** **C**ASTANEÆ magnitudine est, orbiculatus, vnciali plus minus latitudine, pulvinatus, cortice tectus rugoso, spadiceo, dilutiore, saturatiore; circa hilum verò dilutiore & ferè albicante, cuius orbitam ferè totam ambit, hilum pulchrum, eulmum latum, sulco medio secundum longitudinem exaratum in principio punctum impressum habens.



Huius generis etiam alium dono accepimus ab Illustrissima Ducissa Wirtembergica cuius hilum & quinque emittens, veluti crispas habet simbras. Anno 1598. Cl. vir Paludanus misit nobis pro Fabis Brasilianis: quasdam etiam antè habebamus, non recordamur unde. Icon nostra facta ad iconem, quæ est apud Lobel. in Iconibus, & Clusium

apud Monardem. Faba autem facta secundum nostrum fructum.

An Lobel. & Pena in Adv. de hac aiunt, Faba (vel Phaseolus) quædam latissima & candida, compressa rotunditatis, ambitu ferè vnciam æquat, gustu, concretionē, & Phaseoli similitudine: hæc non demptam ex arbore Phaseolifera, ut quidam putant, norunt amici quidam, qui seuerunt, legumenque non ita dissimile Phaseolo habuerunt.

Lob. Obs. & Icon. Plant. picturam ac descriptionem Clusii exhibet simili titulo *Phaseolus Brasiliensis* à Brasilianis *Macana* vocatus, ex cineris candicans. Tab. Icon. & hist. *Phaseolus Brasiliensis*, Bresilgenbonen. Hist. Lugd. *Phaseolus Brasiliensis* Clusii. Qui, cum Olysiopone esset, quemadmodum apud Monardem perhibet, donatus est Phaseoli genere ex Brasilia Americæ prouinciæ delato admodum recenti, pollicari latitudine, crasso colore rufescente, magno hilo, & parte extremâ veluti sessili. Eiusmodi quatuor, aut quinque singulis siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tui & impositi bubonibus venereis curare di-

Faba latissima.

Monard.

Phaseolus ex Brasilia colore rufescente.

Cortex. Erant porro illi lobi diuersæ quidem longitudo, equalis tamen latitudinis, non valde crasso, sed cartilaginoso potius cortice recti, eoque rugoso, quia immaturi, fusci coloris, breui, ruffaq; lanugine obducto, quam adhuc retinebat in lacunis, vbi attrita & deterfa non fuerat, supernâ, & infernâ parte veluti duplici cristâ sinuosâ, & & semunciam ferè latâ, à pediculo ad mucronem vsque lobi productâ, prædito: Phaseoleos autem continebant penè vnciam latos, orbicularis formæ, non tumentes tamen in medio, sed depressos, quia plenam maturitatem nondum erant adepti, in ambitu vndiqueque ferè veluti anulo cinctos, vt plerique similes Phaseoli, valde duos & rigros, nucleo tamen albo præditos, quo recente vesci licuisset, quia ingrati saporis non erat. Istorum autem loborum vnus, quaternas vncias longus erat, tresque Phaseolos continebat: alter ternas duntaxat, & binos Phaseolos habuerat: vterque autem binas penè vncias latus.

PHASEOLVS BRASILIANVS
MAIOR PICTVRATVS: ET
alter dilutiore colore.

Descrip. **F**IGVRA sunt oblonga, & ad circularem accederent, nisi segmentum, quod parte sessili ad circuli perfectionem requireretur, deesset. Magnitudine præcedentibus superiores sunt, longitudine fescunciali, latitudine ab hilo ad sessilem leuiter sinuatam partem: vnciam facit superante. Nec minùs ventriosi videntur, quàm prædictæ duæ species descriptæ. **Cortex** color spadiceus, per quem foliacea quædam emblemata sunt sparsa eleganti aspectu. Circa hilum dilutior, & ferè flauescens. **Hilum** nigrum quoque, sed angustius, & vix culmi minoris latitudinem adæquat, at quàm in cæteris magis eminet. Eadem tamen ratione fructus ambitum comprehendit, sicut in iam descriptis, hoc est, ad partem sessilem vsque. Circa hili extrema nec caput nigrum, nec stria transversa conspicitur. Maior quoque inter vtrumque hili extremum distantia quàm in prioribus. Hanc habuimus ex fructibus à Paludano datis Ill. C. Wirtemb.

Huius generis vidimus etiam minorem apud Illust. Principissam Wirtembergicam, & colore pallidiore, seu dilutiore, in cæteris ferè iam descripto similem.

PHASIOLVS BRASILIANVS
MAGNVS, TOTVS NIGER,
splendens.

Descrip. **C**ORTICE obiectus est duro, toto nigro, glæui, atque splendente. In cæteris ferè, cum rubro splendente conuenit, sed eo paulò minor est. Hilus etiam totus niger tres fructus partes ambit, ipsoque fructu clatior est. Rotundus esset, nisi pars sessilis rotunditatem caueret. Illustrissima Principissa Wirtembergica seuit, apud quam videre, describere, atque depingere datum fuit; aperire, vt pen-



tius introspectetur, non item.

Eicæ eadem cum ea qua lib. 3. c. 68.

LOBVS PEREGRINVS CARTI-
LAGINEVS, PHASEOLO EX PV-
niceo nigro tanquam annu-
lo cincto.



ANNO 1599. inquit Clus. vt videre est in Exot. peregrinū quendam lobum nanciscebar, cui similem ante videre non memineram: propterea illius historiam peregrè natis lobis adiungendam esse coniebam.

Quatuor autem vncias cum semisse longus erat hic lobus, binas, aut paulò amplius latus, cartilagi-

neo potius, quàm duro & lignoso cortice constans, dorso insignitus duplici, veluti cristâ cartilaginea, & sinuosâ, ad extremum vsque lobum protensâ: rugosus autem erat cortex, & coloris nigri veriùs, quàm fusci: licet porro ea longitudine esset prædix, tres tamen Phaseolos duntaxat continebat orbicularis formæ, mediâ parte aliquatulum tumentes, circiter vnciam latos, in ambitu ferè vndequeque tanquam anulo cinctos, valde duos, & ex puniceo nigros. Quæ arbor, siue planta hunc lobum protulisset, quæue in provincia nasceretur, intelligere non potui, tametsi omnem diligentiam adhibuerim.

PHASIOLVS SECVNDVS NL-
gritatus, non magnus pro lobi
amplitude.

ALTER lobus ex Guinea allatus, circiter septem vncias longus, fescunciam latus, quem

Descrip.
Lobus.

Descrip.

Clusius redimebat anno 1595. dura cute tectus erat, coloris externâ parte ex fusco cineracei (eius dorsum tribus nervis secundum longitudinem insignitum, ut in plerisque similibus lobis) internè veluti membranâ suffultus, aliquot Phascolos continens non valde magnos, pro lobi amplitudine, nigros, longo hilo siliquâ siliulo inhaerentes.

Accipiebat autem hoc breuiorem eodem anno ab amplo viro Simone Parduyn consule Medioburgensi in Walachia Zelandiæ. Et biennio post his non dissimiles à navis Batavis ex Madagascar insula allatos. Amstelredamî conspiciebat. Traditur hæc historia Exot. lib. 3. cap. 11.

PHASIOLVS PEREGRINVS
MAGNVS, COLORIS CASTANEÆ,
cum magno hilo, lauis

Descriptio.
Curtis.



pulpa in conspectum sese dat, superficie quidem tenus rari coloris, intus alba, dura, sapore viciæ.

Descriptio.
Clusii.

An Phascolus tertius Nigritarum, ex Guinea aduectus, quem Clus. Exot. lib. 3. cap. 11. his verbis descripsit: Secundo [precedenti] non dissimilem, vncias cum semelle longum octo, sed nervis secundum longitudinem in dorso excurren-

MEMINI aliquando me Phascoli cuiusdam siliquas vidisse, quales pinguntur à Lobelio Brasiliæ Clusii nomine, à Brasiliæ tamen & purgatrice Faba diversa grana continentes: hæc enim minora, illo materia orbiculata, semunciali latitudine, cortice duro, leui, spadiceo obducta, leniter compressa, quorum hilum profundius, canaliculatum, non pullum, ut in Brasiliæ, sed reliquo cortici concolor, nec ita etiam latum, longumque, ut quod duas duntaxat tertias orbitæ cingat, cum Brasiliæ Phascolus breuem isthmum relinquat. Cortice separato, qui crassiusculus multum de intenso illo colore remittit,


tribus magis eminentibus, interna autem parte nulla membrana (nisi attrita fuisset) præditum, cineracei ex fusco coloris, Phascolos continentes superioribus maiores, spadiceo coloris, nec hilo adeo longo præditos, ut illi, quos honestus vir Petrus Garetus, Jacobi frater, Amstelredamî ad me mittebat.

An Gein. epist. tertium Faba genus ab Adolpho Deconè missum?

Lobel. Obl. & Icon. Siliqua Phascoli Brasiliæ. Sed videtur nobis hæc siliqua Lobeli non esse Phascoli Brasiliæ: sed Faba, de qua hoc agimus capite.

Iac. Theod. Tabern. Icon & hist. Phascoli Brasiliæ tertii siliquæ. Schoten der dritten Bree silgen Bonen.

FABA, VEL PHASEOLVS INDICVS
MAGNVS, RUBER, SPLENDENS.



APRIMA similis est iam descripto Phasiolo peregrino magno, coloris Castaneæ: eundemque diceremus, nisi color manifestè distingueret, leui intetum quoque interueniente figuræ atque proportionis discrepanti.

Descriptio.

Vnciam vnâ & semis adæquat an. plititudine, quamvis circinatæ rotunditatis non sit: Hilum.

quippe parte vnâ rotundiore, alterâ latiore, compressus, & vnciam mediâ vix crassior. Hilum insignne, ac nigrum, duas ambitus partes comprehendit, reliquâ parte tertiâ hilo vacuâ existente. Cortex rubescens est, insigniter lauis, splendens, ac subdurus, quem aperire potestas non data fuit, quod Illustrissima Principissa terræ committere decreuerit, apud quam vidimus, descriptissimus, de-

Curtis.

Eicon eadem cum ea qua lib. III. cap. LVIII.

FABA INDICA, SIVE PHASIOLVS
MAGNVS, COLORE EX PHOENICEO
croceo.

Descriptio.
Curtis.

PRÆCEDENTI iam descripto figura & magnitudo respondet. Sed suo colore variat: nam phœniceus ex croceo, hic ex illo ita emicat, ut cuius lustrum præualeat non temerè dixeris, concomitante pereleganti lauitate, atque splendore quàm in prædicto tamen multò inferiore. Hilum quoque non nigrum, sed fructui ferè concolor, quamvis saturatius. Dono accepimus ab Illustriss. Ducissa Vitembergica.

PHASIOLVS SIVE FABA ARBORESCENS
ex Guinea, Paludano latissima, ferè quadrata.

FRUCTVS, quem misit D. Bernardus Paludanus titulo Phascoli, sive Faba arborescentis ex

Descriptio.



Cortex.

Substantia.

claudens, quæ situm iam in superficie contraxerat, penitus verò nigricat, & odorem ingratum spirat.

Eundem fructum dono nobis dedit Illustrissima Ducissa Vvitembergica, sed figurâ paullo variantem. Nam ad ouatam figuram quàm proximè accedit, ac prædicto latitudine quidem cedit, sed crassitie superat. Cortex, & quæ intus latet substantia, cum prædicto eadem, sed paullo dilutior, fortè quia maturior: Nam in vniuersum prædicto est habitior. Conferant lectores historiam duarum sequentium Fabarum arborescentium Clusii: ex sanè cum nostris respondere videntur.

FABÆ ARBORESCENTIS LONGISSIMVS
lobus, Phaseoli, lati, plani, spadicei.



VA i n magnuse-
rat lobus, in-
quit Clus. Exot.
Lugduni Bata-
vorum conspe-
ctus apud Hæ-
ricum Tilman-
num Mercato-
rem, qui diu in
Lusitania vixe-
rat, eumquæ ex
Guinea delatū
alletebat. Nam
viginti vnciarū
longitudine,
duroque &
crasso cortice
erat prædurus,
atque rugoso,
coloris externa
parte nigrican-

ti, & fuliginosi, internâ autem ferè spadicei (eam enim videre poteram, quia propter nimiam siccitatem, & calorem in binas partes cum strepitu dissilierat) continens magnos septem Phaseolos binas vncias cum semisse longos; sescunciam latus, valde planos pro magnitudine, & minimè densos, coloris ex spadiceo nigricantis; & splendens. Ipsum quidem lobum libenter in tabella exprimendum curassem: verum quia in binas

partes dissilierat, & illæ instar cornuum arietis se se contorserant, commodè fieri non poterat: sed ex alio simili iconem in tabella expressam hîc subiiciendam curabam.

Eam porro iconem suis nativis coloribus in charta eleg inter expressam, servata lobi magnitudine & latitudine, mittebat ad me anno 1601. doctiss. vir Franciscus le Clerc Montisaur Medicus Tornacensis, cum vno Phaseolo ex ipso lobo exempto. Lobus autem vnâ vnciâ minus longus erat eo, quem apud Tilmanum conspiciebam: nam eius longitudo nouemdecim vnciarum duntaxat erat, latitudo verò eadem cum illo, qui Tilmanni, circa pediculum tamen paullo angustior: color externus fulcus, quem crassiores venæ, siue striæ nigre, à pediculo ad extremum vsque lobum secundum longitudinem ductæ exornabant, internus color ex spadiceo ad rubedinem tendens: ipse Phaseolus planus, niger, & splendens, illi penè similis; qui in lobo Tilmannico: quâ autem parte lobo adhaeserat, paullo angustior illo mihi videbatur, deinde in latum se expandens. Vnde autem hunc lobum habuisset, non adscribebat.

Locus.

Lobus.

FABA ARBORESCENS, SIVE PHASEOLVS

LONGE MINOR, PLANVS, RUGOSVS,
spadicei coloris, nervo emi-
nentiore.

Lobo haud dubiè inclusus fuerat alter Phaseolus, superiori quidem formâ non valde dissimilis, sed longè minor, sescunciam videlicet tantulum longus, vnciam latus, planus, rugosus, spadicei quodammodo coloris, nervo, qui eum ambiebat, eminentiore, & in binas partes diuiduum esse indicante, vt Fabæ vulgares. Hunc Clusio, quemadmodum ipse Exot. lib. 3. cap. 7. testatur, Paludanus ostendebat.

Descriptio.
Phaseolus.

FABA ARBORESCENS, PHASEOLO
plano, longo, nigro.



Phaseolū ac-
cipiebat
Clus. libro &
capite modò al-
legatis, à Cl. V.
Paludano, Fabæ
arborescentis
appellatione;
quæ ex Guinea
delata esset, &
ex simili lobo,
qualis Fabæ ar-
borescentis lon-
gissimæ, exem-
ptus esse crede-
batur: erat au-
tem, valde pla-
nus, binas vncias longus, aut
amplior, sescun-
ciam latus, eius-
dem penè co-

Locus.

Descriptio.
Phaseolus.

loris cum eo, qui superiore capite descriptus, minus tamen nigricans, quia forsitan minus maturus, non minus tamen splendens illo.

Similem etiam, sed maiorem, crassiorē, & spadicei coloris nanciscebat anno 1597. in Madagascariâ.

Lobus.

carinulâ natum, ab eis, qui illo anno ex Italia
Amstelredamum redierant.

FABA ARBORESCENS, SIVE
Phaeolus ovo columbino ferè simi-
lis, exalbidi coloris.

Descriptio.



lignitus, lavis alioqui, & splendens, grauis, &
ponderosus.


FABA ARBORESCENS, SIVE
PHASEOLVS NIGER, AD OVVM
columbinum accedens.

Descriptio.

Phaeolum quartum (pergit Clus. lobo etiam
comprehensum fuisse, non est dubium nullum
ad me mittebat anno redemptionis humanæ
1597. ornatiss. vir Iacobus Pl. rau, rei herbariæ
peritissimus. Erat porro crassiusculus, eiu-
dem penè magnitudinis cum superiore, totus niger,
præter exigua maculam subalbam, quâ procul
dubio inhehærat lobo, durus autem, & solidus,
atque in aqua subsidens.

PHASIOLVS NOVI ORBIS, SIVE FABA
purgatrix laussima, cordis figurâ.

Partes
Fabarum.



Phaeolus,
inquit Clus.
Exot. qui lobo
inclusus fuisse
videbatur: di-
uersa erat eius
forma, nam co-
lumbinum o-
uum ferè ex-
primebat, lon-
gior vicia, am-
bitu fescuiam
ferè compre-
hendens, exal-
bidi coloris, cui
flavi quidpiam
circa extremâ
partem, quæ
lobo inhehæ-
rat, fuliginosâ
maculâ erat in-



quod intus co-
tinetur, testa.
Clusio, album,
fimum, & in
duas partes na-
tura sectile, vt
sunt omnia
phaeolaceæ, sa-
pore primæ,
quali ferè sunt
omnia legumi-
na, sed illic
lioguam mor-
dicante, & acri,
quo fit, ni fal-
lor, vt purgan-
di facultate sint
præditæ.

Fabam tam
descriptam re-
perimus inter
Valeradi Dou-
rez selecta, cui-
us hæc erat in-
scriptio: Faba
purgatrix, vel
potius Phasio-
lus Peruvianus:
Sunt nobis tres
species, vnus
sonat, alter nō,
tertius flacci-
dior, & com-
pressior, quæ
maturus vide-
tur, quem ha-
bui ab Illustris
E. C. missum à
Bernhardo Pa-
ludano, nomi-
ne, si bene re-
cordor, Fabæ
Brasiliæ.

Sap.

Faba per-
uiana

Phas. Per-
uiana

Faba per-
uiana

1605. accepimus inter ea, quæ Gener adferebat ex
itineris Anglicano & Belgico, magnum, plenum,
pulchrum, atro, durum, non sonantem, sine no-
mine. Adhæc anno 1603. tres alias purgatrices
Fabas dono habui ab Ill. mea Principissæ. Erant
autem duæ nigre, compressæ, vtinque ferè pla-
næ, tertia coloris penè castanei, vnâ parte pla-
nior, alterâ gibbota valdè, sinum cordatum mi-
nute demonstrans.

An Lobel. & Pena in Adu. de supra dicto lo-
quuntur, dicentes: Phasiolos, siue Fabas per-
quàm raras habemus, quas ferunt reperias ma-
gnâ copîa ad Cornubæ littora, & quod non pa-
rum mirum, eo loco nullam meminisse vllus na-
uem illisam, nullumve naufragium factum, & ta-
men quotannis nouæ inueniuntur, partim flui-
tantes, & partim effodiuntur immerse sabulis
littoreis, quasi, vt putant Cornubiensis maris
Anglici accolæ, secundis Austris, aut Zephytis è
nouo Mundo appulsæ fuerint. Tenebras, nobis
equidem iudicibus, effundunt Aduersaria, quæ
omnis generis ambiguitates & dubia continuo
pariunt. Fabas perquàm raras, sed quales rogo,
quantas? describere fas erat, nefandum nudis in-
cedere nominibus: nec enim his docetur quid
res sit, sed per descriptionem ea tandem intelli-
gitur.

Lobel. Obs. Icon. Plant. Phaeoli noui Orbis,

Faba per-
uiana

Lob. & Pe-
na repræ-
sentant.

Locus. Fabæ purgatrices Clusii. Clusio apud Monardem nascitur in insula D. Thomæ dicta, & cordis effigiem, ut vulgò pingi solet, imitatur: idcirco à quibusdam *Cor Dni Thomæ* nuncupatur. Eius obiter meminit Petrus Cieza part. 1. Chron. c. 112. Phasiolus maior Fabæ purgatricis nomine missus.

Phasiolum marinum. Cæterum silentio minimè premendam idem Clusius existimavit opinionem, quam Nortuagos de hoc Phaseolo habere intelligebat: illos enim prorsus sibi persuadere scribebat doctissimus vir ipsi amicus, marinum esse Phaseolum, atque idem in Farris insulis nasci inter Algæ, & ex profundo erui, quin & folliculos ostendere, quibus contineri nugantur, quum tamen nihil aliud sint (nam vnum quem mittebat, conspexit) quàm ouorum *Rasa* piscis putamina. Ipsi à forma tenes marinos appellant, nonnulli etiam *Bona* *ferris* *calculos*; siue, quoddam calamitatem à domo possessoris, siue etiam, quoddam incantamenta, & nescio quam noxam, ab heri pecore arcere vel propellere, credantur. Similem præterea cum suo lobo proponit capite octavo lib. 3. Exotic. qui non minus crassus erat (ut ex icone, quam suis coloribus expressam, eruditissimus vir Franciscus le Clerc Medicus Tornacensis ad ipsum mittebat, coniecturam facere poterat) quàm lobus, qui ex Wingandecaovv relatus, & hoc libro descriptus est: quem quidem lobum videre sibi non contigit, nihilominus eius iconem, secundum eam, quæ ad illum missa, in tabella secunda expressam adpositam hic volebat.

Icon secundæ de loco posita est Clusii. Is autem lobus non erat valde longus pro eâ crassitudine, quam pictura, quæ ad viuum affabre expressa, referebat, sed quinque vnciarum longitudinem duntaxat habebat, binarum verè latitudinem, duro, crassoque cortice constans, coloris ex cineraceo fusci, de crasso pediculo pendens. Binos Phaseolos solummodo continuisse videbatur, quorum alterum cum ipsius lobi icone ad ipsum mittebat; binas vncias latum, sescunciam longum, sumpta ab hilo, quo lobo adhaererat, ad infimum fructum mensurâ, planum, medio tamen, aliquantulum extuberantem, lzuem, coloris nigri & splendentis, quia perfectam maturitatem adeptus erat, aliàs ex fusco spadiceo: plerique autem omnes, quos videre Clusio contigit (multi certè & quidem variz magnitudinis persæpe sibi sunt conspecti) cordis, ut vulgò pingitur, formam habebant, hoc est, eâ parte, quæ lobo adhaererat paululim erant caui, atque propter hanc formam, & quia in insula S. Thomæ (tametsi in aliis etiam Africæ regionibus inueniri non dubitem) nascitur, & inde plerumque Phaseoli illi allati, *Cor S. Thomæ* à quibusdam appellatur. *Hæc ex Clusio.*

Cor S. Thomæ. Hæc exhibet Iacob Theod. Tab. 1. c. & hist. sub titulo: Phaseoli Americi purgantes, Purgierend Bonen auß America. Eisdem quoque Hist. Lugd. depingit, ac describit, vocatque Fabas purgatrices Monardis. An porro Fabæ vulgaribus similes, quarum meminit Ferdinandus Lopez de Castagneda Hist. Indica lib. 7. cap. 78. quæ vomitum cient, & aluum valenter purgant?

Locus. Fabarum purgatricum solum fertile Carthago, Nomen Dei, & in insula D. Thomæ dicta. Sed Clusius in Africæ etiam aliis regionibus inueniri non dubitat. Cæterum, ut Monardes præcipit, pellicula illa tenuis, quæ per medium illas interfecat, & caparum tuniculam exteriorem xmulatur, vnâ cum cortice abicienda est, alioqui tantâ vehementiâ supernè & infernè purgant, ut in vitæ discrimen lumentem coniciant. Assandæ deinde

sunt, ut illarum acrimonia infringatur, deinde in puluerem comminuendæ. Datur hic puluis vino, aut saccharo exceptus, ad cochleare vnum, deinde haustus vini sumitur. Apud Indos hoc medicamentum celebre est, ob sumendi facilitatem: nam sine molestiâ bilem, pituitam, & crassos humores, multò lenius, & facilius, quàm superiora medicamenta [nuclei pinci cathartici, Auellana purgatrices &c.] purgant. Dantur in febribus diuturnis & importunis, in coli doloribus, & articularum morbis. Dosis esto assatarum (quod cum in hoc, tum in præcedentibus obsequandum est, torrerem enim singula præstat) à quaternario numeto ad senarium, plurimumue, aut pauciorum, pro ægi viribus. Calidæ in secundo, siccæ in primo.

Sumendi ratio.

Facilitas.

Deser assatarum.

Temperamentum.

PHASIOLI NOVI ORBIS, SIVE FABÆ purgatricis laussimæ, variatio longior.



Ab hilo. Quod eminentius est, nec sinum facit, ad oppositam partem duos pollices, cum dimidio est latus, longitudo duarum est vnciarum, sic, ut ab orbiculata superiorum figurâ non parum deficiat, color spadiceus, dilutior, lubricitas & nitor, ut videtur, maior, crassius par.

Color.

Vnde habuerimus Phasiolū noui Orbis longiorem non recordamur.

In ea sumus opinione, Clusium in Exot lib. apud Manardum cap. 49 huius meminisse, cum post traditam Fabam purgatricem forma cordis, scribit: Illi similes, hoc est, magnitudine, & colore respondentes, sed longiore formâ præditos Phasiolos videre memini.

PHASEOLVS, MACOVNÆ, SIVE Phasiolo Brasiliano similis.



Phasiolus Macounæ. similis, hoc est, spadiceo nigricante, sed planiore, longioreque formâ, hilo non admodum magno, Clusio de fructibus peregrinis. Est autem ipsi, fructus peregrinus secundus, pag. verò 43. Phasiolus Macounæ similis dicitur, cuius ad epistolam Petri de Osina Nicolæ Mo-

Caulis. recta, partim terpena, stumosa, & fibris donata: ex qua caules surriguntur duobus cubitis latiore solo aliores, quadrati, infanes; foliis aduersis, sessilis, ex oblongo rotundis, ad vnam costam annexis: ex quorum alis flores deuntur simul alii: quotiuncti congeneribus Pisis similes, quorum supremum folium vogue purpurascens albidum, stius purpurantibus pictum est, duo facia in medio nigra, in ambitu alba, stamina occultant, colore est ex albo herbaceo: semen in siliquis magnis, crassis, carnosiss, hirsutis, surrectis, oblongum omnibus notum.

Folia. Sed veniamus ad ea, quae de hac Theophrastus aliique Veteres scriptis promulgant. Is igitur lib. 8. cap. 1. Frumenti prima & maxima genera duo tradit, alia quippe frumentacea, ut Triticum, de quo lib. 18. Alia chedropa, ut Fabas Cicer, de quibus posthac agendum erit. Horum autem omnium generatio simplex, & vna est, quippe ex semine omnia exeunt, nisi quid aliud parteque radice profiliat. Ex leguminibus quidem Fabamaturè feri possit: hac enim sear debilitatis gratia radices agere ante Hiemè desiderat. Sunt tamen, qui hanc serè audeant serere, si minus primis sapibus expedire potuerint. Legumina quæto die, aut quinto, proueniunt. Fabis ex cepis: Hæc enim intra dies plures etiã quàm frumentacea exit, quibuldam enim in locis vel in decimo, quinto, aliis etiã vigesimo: hæc enim difficillimè omnino prouenit, & si eum lata fuerit imber plus æquè successerit, vel prouentu omnino difficillimè reddetur. Sed an ea, quæ tẽpore verno seruntur, celerius exeant, cogitandum. Ceterum germinando, eadem ex parte radicem fundit & caulem, quæ nimirum parte siliquis semen adnectitur, inque ea veluti principium quoddam germinandi haudquaquam obscurum: quod vel

Semen. ad pudendi formam effigiatum sanè inspicere possis, ut & in Cicer, sed maxime in Lupino: his enim radix deorsum verius, folium verò, & caulis sursum tendunt. Sed & multis solis exit Fabamque rotundis, qualiter leguminum maxima pars, quæ radice singulari subnixa, multos super ramos ex caulis gerunt, Fabis tantum excepis, quæ inter legumina sola potissimum erecto, caule consistit, qui geniculatus est, atque inanis, quæmobrem culmus vocatus, cæteris leguminibus lignosior. Quot verò diebus hæc floreat, his declarat idem Theophrastus. Leguminum floris diutina productio, atque inter cætera Erum, Cicerisque diuturnissima. Inter omnia verò Fabæ quidem summo deservit, & longissimo tempore floret: quadraginta namque diebus florent prodita est: sed alij, subinde alio, atque alio emergente, florent assignant: particulam enim florent aiant, alij simpliciter referunt. Hos enim spicatis confertum Leguminibus omnibus particulam emergit. His enim primum pars inferna floret, quæ cum defuerit proxima incipit, atque ita ad supernam itur successu affluo. Hinc hist. lib. 7. cap. 3. hanc (intellige florenti modo) cum Ocymo comparat, scribens: Ocymum verò particulam primum inferius, deinde cum ea defloruerit parte, florent superius incipit. Vnde fit, ut diutius istud floreat, quemadmodum Fabæ. Eam porro diebus quoque quadraginta perfici volunt: ita tamen, vel intra tantumdem spatium temporis hæc florent, atque perflorata sit, cum cætera intra dies pauciores consumuntur. Nancin Leguminum genere, colorum, saporumque ratio differet in locis. Candida liquidem in omnibus generibus

Difficill. prouenit.

Pudendi ef. figies. **Folium.**

Caulis. erectus.

Faba flore.

Faba p. erigens.

Faba p. erigens.

Faba p. erigens.

Faba p. erigens.

Faba p. erigens.

Faba p. erigens.

Faba p. erigens.

Faba p. erigens.

præstant dulcedine, ut Cicer, Fabæ, & alia generis eiusdem. Quæ, ut omnia Legumina, siliquis affixet, & veluti quoddam principium inde obiter geminens, non concavum, ut Lupinum. Ac licet imber post saturationem superueniens omnibus præsidat, excipitur tamen æquè germinans Fabæ, quæ florentes præcipue in defici cupit: ob id serè tam serere volunt (ut dictum est) quoniam diu floreat: sed postquam defloruerit, parum omnino æquè debet assidant.

Consummatio enim iam in vicino est. Hæc forte illud pulchrè subsequitur, quod de c. lib. 4. cap. 14. memoriz prodidit: post florentiam, si adhuc humida, tenellaque affatu vehementer vexetur, facile perit. Discitur enim quod in his tenuissimum est, & confictata inter se cuncta sunt. Hanc ex cæteris notiale optimum præstat, quamvis frequens seratur, fructumque ferat copiose. Iam quod cultoribus scitu perneccessarium, aquis fluentes hinc magis prodelle, quàm coelites asserunt. Apud Philippos cum ventulatur, eius loci vento perflata, si eodem facilis est, sit difficilis. Et hoc sanè mirum, quod cum alias minime molesta est, tum etiam tellurem raritatis lux, ac putredinis causa stercorare putatur. Ob id, quæ circa Macedoniam atque Thessaliam colunt, cum Fabæ florent, arua inuettete consueverunt. Verum etiam in Fabis, quæ quidem celeritè in leguminum genere erodant. Midæ ab aliquibus dictæ nascuntur. Singula namque pro suo humore peculiare animal creant, eum secutis sc. imbribus calor repentinus humorem inclusit.

Sed ita etiam, si credere nonnullis fas est, repleri posse assidant. Ceterum Midæ, veltiarum herbarum & fructuum impet, dum alimenta sua consumpsissent, pereunt. Igitur ad hæc omnia tractuum natura id irimudum refert, nec temere, iam enim eorum diuersum caliditate, aut frigidityte, aut humiditate, aut siccitate constat: hoc autem fructus reddere, consummareque potissimè patet. Quapropter quibus locis fieri solent, non semper sunt. Seminibus autem non vis eadem ad germinandum, ac reseruandum vique datur. Quædam enim germinant, consummanturque celeritè, & reseruati egregiè possunt, ut Panicum, Milium. Quædam germinant quidem, sed non celeritè, eum Fabæ, & præcipue, quæ facile percoquitur. Apud Apollonium maris Ionii Fabam nullo pacto erodiant, ideoque seruandam reponi. Quin & circa Cizicum diu durare potest. Quod autem Fabæ tardi prouentus sit, causam assignat, crassitiem putaminis ambiens. Si præterea late impluerit, adhuc multo tardius eam prouenire noxer, author scribit, quati terra tunc pacimoniter, solideturque. Tertio, Quod verò Fabæ, & aliud quicquam ex leguminibus minus fructet, imbecillitati certè tribuendum hoc est. Quæ de causa maturius hæc serere (lent, ut priusquam (ut iam sæpius dictum) Hiems adueniat, radiceatur. Fabæ tamen adeo detrimentis multis est, frequenterque, obnoxia, ut quamvis maturè prouenerit, tamen perfici plerumque non possit. Imbecillitatem autem eius vel sensu percipere licet: est enim corpore solido ac inani: nec radice numerosa subnitur: quas ob res à quavis causâ statim offenditur. Maturè igitur serere Fabam solent, quod Hiemem anticipare debeat, quod possit radicari, & simul quia imbrem in flore amet, quia laxa est. Inter legumina autem magis ruginem leuit, tum quia folia vndique gerit, tum quia densa seminat, tum quia fructum terræ proximum gerit.

Quomodo fiat, eorum **difficilis** stercorare.

Percoquitur Midæ.

Cur tardè proueniat.

Faba imber illius.

Magis se rend.

Frugo. Fructus in terra prouenit.

Frugo. Fructus in terra prouenit.

Frugo. Fructus in terra prouenit.

Frugo. Fructus in terra prouenit.

Frugo. Fructus in terra prouenit.

Frugo. Fructus in terra prouenit.

Quasi quo
ratione Fa-
ba coctilis,
aut incocti-
lis fiat.

Quid coctile
et incocti-
lit

Coctile, va-
rium.
Incoctile;
durum.

Alimentum
tamen.

Loca cali-
da.

Ager cocti-
lis.
Ager incocti-
lis.

Terra fri-
gida inco-
ctilis pro-
fert.

Loca palu-
stria.

Imbrebus
abundantia
causa.

Ager frigi-
dus.

Putrescunt enim inferiora potissimum, quoniam
minus persistantur. Interea tamen maxime rara, &
fertilis flore, fructusque multoties parit Solo leui-
gaudet. Ceterum non minus utilis, quam iucun-
da agitur quæstio, quamobrem Fabæ, ut & re-
liqua semina coctilia, aut incoctilia fiant. Verum
ratione agri, an aeris, an certæ affectionis: &
omniane, an aliqua tantum perdura effici pos-
sint. Fabis enim ac lentibus (inquit Theoph. de
caus. lib. 4. cap. 13.) id potissimum evenire vide-
mus. Fit sæpè, ut & ager alias coctilis, alias & in-
coctilis ferat, tamethi eodem modo colatur: & ex
continuis segetibus sulco tantummodò arcente,
altera incoctilia, altera coctilia profert. Semina
quoque alias ex incoctilibus coctilia prodeunt,
alias contra ex coctilibus incoctilia, vbi in exortu,
germinatione, crassatione, copiâ, bonitateque
nihil intersit, vtrum coctilia sint, an incoctilia.
Ergo de his, & si quid aliud possit huic quæstio-
ni subiungi, primum illud dicendû, quod coctile,
& incoctile, ad servationem, resolutionemque atq;
(ut summam dixerim) ad nostri vñs rationem
dici solitum est. Quod enim resolui facile po-
test, & cocturâ celeriter immutatur, id coctile est:
contrâ quod resolui, immutari nequit, vel
quit, vel quod ægrè mutatur, hoc incoctile est.
Tale autem sit vtrumque necesse est, si alterum
raturum molleque sit, alterum densum, durumque.
Sic enim alterum caliditatem, humiditatemque,
quibus resolutio agitur, suscipere valeat, alterum
nequeat, sed sua densitate, duritateque indomi-
tum semper resistet. Cum igitur coctile, & inco-
ctile ad hunc modum distingui debeat: animad-
vertendum, quibusnam rationibus ea ipsa eue-
niant. Simplex igitur, veraque ratio illa est, quam
& inter primas disputationes reddidimus: quod
alimenti causâ hæc omnia faciliantur, i. e. quali-
tate, quantitateque eius. Sic enim alimentum
commutare nimirum potest. Euenit namque, ut
quæ in locis calidis, stercoreosis, tenuibus, soli-
que expositis sint, alimentum leue, atque facile
habeant: itaque fructum raturum, mollemque
præstant. Hæc enim de causâ non nisi coctilia
sunt in Lemno, quia huiusmodi solum est: quip-
pe omnino agrum eiusmodi coctilem quidam ap-
pellant, atque in eo coctili coctilia volunt. Sunt
& quæ affert Ægyptus coctilia, soli, & aeris cau-
sâ: calor enim coctilitati, atque omnino diges-
tioni pernecessarius est. Quapropter quæ ster-
corantur, vicenis ferme diebus germinant. Quæ
igitur agro feruenti, leuique proueniunt, his de
causis coctilia sunt: contrâ quæ terrâ frigidâ,
spissâ, lentâ, & quasi figulari, atque etiam pra-
tensi, madidâ, & palustri exurgunt, omnia hæc
incoctilia propter copiam, viresque alimentum, &
densâ, duraque sunt, ex permissione terrenæ, at-
que frigida partis. Congelatio enim & condensatio,
ex eisdem, quibus induratio fieri solet: ex quo
fit, ut locis palustribus, atque præmadidis, inutilia
ex toto creentur. Nihil enim remitti in aqua pos-
sunt, quamobrem non nisi suum pabulo sunt.
Hæc ferè causas tribuere solo debemus. Sed cum
aquæ quoque celestis, & aeris qualitas alimentum
augeant: idcirco imbribus incoctilia potius
sunt, vtpote cum plis alimentum, & crudius sub-
ministratur. Hoc enim idem propè solum quo-
que eiusmodi facit, & aer, si eâ frigiditate sit, quæ
non statilis, sed aquatilis quædam consistet: sic
enim coarctet, spissabitque. Cum igitur causæ in
hæc digerantur nihil verat, quominus ager etiam
idem, alias coctilia, alias incoctilia ferat, vbi scilicet
ex pluvie, ac celi conditiones non similes, sed

aduersæ, inceserint. Etiam segetum, quas sulcus
tantummodò dispergat, altera coctilia facere po-
test, siquidem solum diuersum sit. Vt enim in me-
tallis, sic & in aruis putandum, venas spariari vi-
cinas, diuersas inter sese, quæ suis viribus diffe-
rentias reddere possint, tamethi æneis idem status
seruatur. Itaque interdum segetis quoque eun-
dem aliquam talem esse particulam, patitur ratio
naturæ. Idem eueniet, & si aeris, statimque frigi-
ditas talis accedat, ut vel totum, vel pars concre-
cant: quod etiam in corruptione euenire vide-
mus, cum alia diuersa, alia similia sint. & si qua in
ipsis seminibus dissimilis habundat. Infirmitas
enim facilis affici certum est. Infirmitas autem
vel natura fieri possit, si quam mutationem rece-
perit. Quæ de causâ nihil prohibet inter fabas, &
caulis eiusdem, alias coctiles esse, alias incocti-
les. Idem & in eadem siliqua euenit, ut quidam
referant, si verè aunt. Etenim fieri potest, ut alia
valida, alia inutilis sit. Fabæ infirmitas argu-
mento, vel illud potest deduci, quod sola mutatio
suum colorem videtur, ut nigra ex candidis effi-
ciatur. Concretionem verò, condensationemque
esse vi frigoris, quæ incoctilia reddat, testificare
illud quoque videtur, quod apud Philippos ene-
nise Fabis solitum est. Flatus enim in eo loco ve-
hementer frigidus est, & Fabæ incoctiles ple-
que efficiuntur. At si in paleis torrefactis in ære
relinquantur, nihil se mutant, sed incoctiles per-
manent: cum enim a paleis, cum suo mutuo con-
tactu teguntur, simulque terra calore conseruantur.
Contrâ si exaltentur, sublimisque capiuntur,
flatus amplius valet, nulloque tegmine defen-
dente, facile subit, atque coarctat: tum etiam dis-
poliata, tunc primum suis paleis, & calore cir-
cumplectente destituta, infirmitas sunt. Ma-
gna autem commutatio mouere plurimum po-
test: sed si postquam tempus præterit, & quasi
firmius sibi iam consistere, diuidentur, nullam
offensam ex flatu capiunt. Iam enim & putrescentia
ambiens id robustius factum est. Incoctile
autem effici, si diuîus relinquantur sub di-
uo, ut quidam aunt, ratio est. Plus enim,
quam modicum sit, refrigerant, simulque
indurantur. Huic proximum quodammodo est,
ut pluvia, quæ protinus à satione secuta est, inco-
ctilem reddat: quod enim in pullulando infir-
mam inuenit, rigere vehementissime facit: quod
quidem ad cocturam, non ad exortum nocet.
Nec temerè dixerim, eorum alterum abesse, cum
vis illa in aliis, proptereaque alia sit. Tum enim
infecundum, & germinis sterile, vel difficulter
audile quicquam redditur, cum in eâ generatio-
nis vruntur. Ex coctilibus quoque, satis, iterum in-
coctilia fieri, ratio est, nam ab eisdem aduerso mo-
do dispositi, non temerè facilitas percoquendi
proueniet. Itaque si aer, aqua, & solum ita se ha-
beat, quidnam causæ sit, cur non semina quoque
mutentur. Sin autem euenit, ut putamen cocti-
lium remittatur, incoctilium obtundatur, ut qui-
dam aunt: & altera oscitate colorem suum im-
mutent, altera minus, & soluora cum demerun-
tur, coctiliora reddantur [etenim id quoque nar-
ratur] nihil absurdum: quippe obtentio illa du-
ræ concretionis, crassationisque est: quoniam
nihil alienum ab his est, quæ sunt incoctilia. Et
nihil immutari habere posse, illius tanè est,
quod prædurum, indomitumque possit persiste-
re: aduerso autem reddi aduersum debet. Minus
quoque in inesse resolutum, diuîus, concretionem
datur. Quod enim durum admodum est, resolutum
haud facile potest: quod etiam in atali euenit.

sic, incoctilia fieri quidam dixerunt: sed hoc minus verisimile est: Solis etenim siccitas, etsi insipidiora minus, suavia reddat, coctilia tamen nibilo minus, sed magis potest efficere. Ceterum si verum id etiam est, prioribus rationibus nihil repugnat: nec quicquam dissonat, si cum vetustescunt, incoctilia reddantur.

Sicciora G. de.

Sicciora enim sic quoque efficiuntur, tam ex aere circumfuso, quam exhalatione humoris interna. Celerius quoque, magisque corrumpi, quae incoctilia sunt, ratio exigit: duriora enim haec sunt, & proinde magis possunt animalia gignere. Concocta quoque eadem plenius sunt, quod etiam ipsum facit, ut celerius immutentur. Et haec dari praedictis rationibus possint. Sola autem ex leguminibus, vel etiam ex omni frumentorum numero Fabam & Lentem incoctilia fieri falsum existimandum. Sed quod haec maxime experimur propter usum frequentem, hinc sola haec incoctilia dicimus. Ceteris item mollia frangentes ut sollemus, his autem integris, quae certe non parua differentia est: etenim si attenuatis his quoque uteremur, non aequè incoctilia esse percipiamus. Ceterum si quis illa tantummodò incoctilia esse contendat, nec istud irrationabile est: sunt enim ceteris ferme debiliora, debile autem facilis affici necesse est. Quod vulgariter quiritur, quamobrem ea, quae cornu contigerit, incoctilia fiant. Numquid stulta omnino quaestio sit: lapis enim multo durior est, cui semina saepe occurrunt: & nullo minus incoctilia fient, etiam si in cornu nihil offenderint, nec bobus atetur. Atque de his satis. Quemadmodum igitur ad coctionem, & omnino ad senescationem incoctile aliquid est, ita etiam ad exortum, germinationemque esse potest. Et hoc enim seminum imperfectio quaedam est, pariterque in omnibus euenit. Verum de his cogitandum amplius est. Validiora, vegetiora, suaviora, insuavioraque, atque ad usum cibarium meliora, deterius autem, pro locorum natura redduntur, ut diximus: quod si ciora, spissiora, constantioraque procreantur locis montuosis, quam planis, atque etiam magis, quam pluuijs. Sunt enim illa spirantiora, & in vegetando temperatiora: non enim cum semina plurima, crassissimaque euadunt, suavia quoque eadem esse necesse: sed alia opus est habitudine. Sarratio quoque plurimum confert ad suauitatem videtur, iuuat & vegetiora demeti, humore namque vniuerso consumpto, cum ad cibum deteriora, tum minora efficiuntur. Legumina verò, ut melius legantur, vegetiora demetunt, arefacta enim desunt.

De cornu stultia quae sit.

Sarratio.

De Faba Plin.

Lentum aut.

Plurima ex haecenus dictis, quae de Cyamo ne, tradidit Theophrastus, Plinius lib. 18. cap. 12. Fabae conuenienter tribuit, sic de us scribens: Sequitur natura leguminum, inter quae maximus honos Fabae: quippe ex qua tentatus sit etiam panis. Lomentum appellatur farina ea, [farina eius CH.] aggrauaturque pondus illa ex omni legumine. Iam verò & pabulo venalis. Fabae multiplex usus omnium quadrupedum generi, praecipue homini. Frumento etiam miscetur apud plerasque Gentes, & maxime panico solida, ac delicatius fracta. Quin & prisco ritu Fabacia [Fabaca Turn. & CH.] suae religionis Diis in sacro est, praualens pulmentati cibo, & hebetare sensus exillimata, insomniis quoque facere. Ob haec Pythagorica sententia damnata: ut abtradidit, quoniam mortuorum animae fiant in ea. Qua de causa parentando utique assumitur. Varro & ob haec Flaminem ea non vesi tradit, &

Tom. II.

quoniam in flore eius literae lugubres reperiuntur. In eadem peculiaris religio. Namque Fabam utique & frugibus referre mos est auspicii causa, quae ideo *refrigit* appellatur. Et auspicibus eam adhibere lucrosam putant. Sola certe frugum etiam exesa repletur crescente Luna. Aqua marina, aliisque falsis non percoquitur. Virgilius eam per Ver feri iubet, circumpadanae Italiae ritu. Sed maior pars manit fabalia matris latronis, quare trimestrem fructum eius. Namque siliquae, caulesque gratissimo sunt pabulo pecori. Aquas in flore maxime concupiscit: cum vero desoruit, exiguas desiderat. Solum, in quo lata est, lauscat sterconis vice. Idem circa Macedoniam, Thessaliamque, cum florescere incipit, verumtamen nascitur & sua sponte plerisque in locis, sicut Septentrionalis Oceani insulis, quas ob id nostri Fabarias appellant: item in Mauritania siluestribus passim, sed praedura, & quae percoqui non possit. Nascitur & in Aegypto spinoso caule: quae de causa Crocodili oculis timentes refugiunt. Longitudo scapo quatuor digitorum est, amplissima crassitudo. Nec genicula habet, molli calamo. Simile caput Papaueri, colore roseo. In eo Fabae non supra tricenae: folia ampla: fructus ipse amarus, & inodorus Dal. Sed radix perquam laeta incolarum cibis, cruda, & omnino decocta, harundinum radicibus similis. Nascitur & in Syria, Ciliciaque, & in Torone Chalcidis lacu. Circa Philippos Ateramnon [Ateramum CH.] nominat in pingui solo herbat, quae Fabae necatur: Terant non, quae in macro, cum vdam quidam ventus affluit.

Exesa repleta.

Fabalia.

Stercorati.

Locus.

Caule spinoso.

Scapus.

Fabae magnitudinem exprimit multorum fructuum ad eam collationes. Theoph. Torobinthi semen, magnitudine Fabae esse scribit similiter & Loti, Vitis Idae. Taxi denique fructum, Fabae minorem affimar. Plinius Tithymali Parali sancti, magnitudine Fabae esse ait. His iungito Aristotelem, qui & ipse animal. lib. 6. Fabae magnitudinem expressit his verbis: Pullus ab incubitu decimo die totus perspicuus: oculi capite grandiores, qui Fabis [xviii] maiores. Et licet Aristoteles ita senserit, antiquorumque Fabulae, siue Fabellae pusillae sint, tamen non illos nostrates & Fabarum censu amouent [inquit Aduers. Lob.] ut Dodonzo placet: sed id nos docent, eorum Fabam fuisse minorem, quam hodierna, nec tamen specie diuersam, sed congenerem, & potius fructu, magnitudine, figura, quam plantae natura, temperamento, aut lineamentis, distare. Nam Theoph. & Plin. Fabam, qualis nostras est, describunt caule recto, & unico, solamque inter legumina, ut plurimum culmo tradunt, & multis locis Diof. caulem Fabae quadratum dicit, & florem Fabae Perylimeni asserit. Sed id euenit quia variant magnitudine, colore, effigie latiore, compressiore, tereti, rotunda. Et frequentissima hodie Fabae nostra maior, raro vspiam tamen nisi lata prouenit, serunt quippe in scrobillis paxillo depressas. Quare ut non est difficile nosse istam vulgarem Fabam, maiorem, longiorem, minusque rotundam esse, quam Antiquorum Fabae fuerit, sic eandem Phasiolum, Dolichumque asserere, neutiquam licet per eosdem auctores. Altera Fabae, quae minor, non multum videtur abesse à Graecorum Fabae, Venetijs vulgo *Faba menada* dicta. Lob. Obs. Fabae maior recentiorum, *Bona* siue Phaselus Diof. Dodonzo. Is etiam meminit Fabae maioris, coloris ex rubro purpurantis. lc. Pl. p. 57. Tom. 2. Teut. 65. Tom. 2.

Dodon. vt. p. 18.

Faba Veterum minor, quidem sed non distincta.

Phaselus non est, ut Diof. scribit.

Faba menada.

Quod quidem eorum opinio plane reuocatur.

HISTORIAE PLANTARVM.

da sit, qđi Fabam non esse, sed alterius nominis legumen, nimirum Phaseolum esse prodiderunt, confirmat Hist. Lugdunum dicit. Dicat mihi quis- so aliquis, parum, illud nigrum, quod lunina Fabae adhaeret, & quod hilum dicitur, in quo alio legumines, quā in Fabā nostra reperitur? Nam quod in Americo Piso, Indicone nigrum specta- tur circa germinis exitu cauum, atra nota est impressa cortici, non verò laciniolum hilum, quod integro cortice auelli queat, vt in Fabā. Quae verò de Fabarum forma, & magnitudine sparsim apud auctores leguntur, & quibus illae Fabis nostris differunt, tanti non sunt momenti valententiam nostram possint conuellere. Nam diuersis in terris maiores & minores producun- tur, & cum crescere incipiunt, & cum perfectae sunt.

His adde Had. Iunium, qui etsi Rombertus approbare nitatur, Phaseolum Veterum, esse vulgarem Fabam, agere tamen persuaderi po- test, cognitionem legitimum, tantopere in vsu mortalium semper habui, ita propterea abolam, atque ex animis hominum erasam, vt nunc demum velut redituam ab inferis, aliam nomenclaturam reuocare necesse sit, itaque bona Romberti venia, cum maxima doctorum turba, receptam ubique temporum, praerogatiua, vocem seruabit, dum omnium consensu veritas obtinuerit. His meritis subscribit Turn. dicens: Nos cum Ger- manis ab annis multis Graecorum Cyāmon Fa- bam vocamus. Verum Tragus contrarium pro- bare conatur. Bona nostra radicem habet singula- rem, vt Fabā Theoph. caulis est rectus, quadra- tus, concavus, [Diosc. de Clymeno cum Theoph. l. 7. c. 3. idem Fabā tribuit] folia rotunda, flori lu- gubribus notis pictus [de Fabā Plin.]. semen non conuenit: Galeno multis locis Fabā rotunda, no- stra Bona oblonga est, non nihil compressa. Hinc obiectioni si respondeo, facile soluerentur ratio- nes Tragi & aliorum. Hand facile in his regionibus semen, quale Galenus describit pro Fabā, in- uenias, cum planta notas habeat ab aliis scrip- tas. Quod si Bona nostra non sit Fabā Veterum, ostendat mihi quispiam, quod genus leguminis in Italia, Hispania, Anglia, Germania, aut Gallia sit Veterum Fabā: Tragus Cicerculam veram [ipsi incognitam] putat esse Fabam Antiquorum. Sed cum Cicercula non sit rotunda, nec recta surgat, sed obliqua, nequit esse Fabā. Habet etiam Cicercula folia oblonga, cum Fabarum folia, au- dente Theop. sunt rotunda. Amarus & Dodo- naeus, adiuti rationibus Tragi negant Bonam esse Antiquorum Fabam, sed quale legumen sit, non indicant. Ita nobis Fabam auferunt, sed ni- hil ei substitunt, quod fecit Tragus audensius, quam doctius. Ex iisdem duo Bonam vo- lunt esse Faseolum, Sed Bonam non esse Phaseolum, ex ipsius Dodonaei verbis probō, qui scri- bit Faseolum esse Phaseolum Dioscoridis. Sed Phaseolus non nisi adminiculis adiutus sur- git: suis tamen vinibus stat Bona nostra, non est ergo Bona Faseolus. Galen. quoque de alim. fac. c. de Dolichis inquit, Dicere posset quis omnia haec, Erulias, Cicerculas, & Phaseolos vnum esse genus, verum pluribus nominibus appellari. Et paulo post, de iisdem scribens, ait, siue l. x. vt dixi vnum genus, siue vnius generis differentia sint. Attamen scribit Theoph. Cicerculas & Erulias, oblique, non recta surgere, instar Fabae. Siue igitur Faseolus idem sit cum Cicercula & Erulia, siue eiusdem generis, vt scribit Galenus, tum crescit Faseolus oblique, vt reliqua duo, quae auctore Ga- leno, solo nomine differunt. Ergo cum Bona & o-

stra recta surgat, Faseolus esse nequit. Praeterea in- quit Galenus Faseolum medium esse inter statu- lentas & non statulentas, At Bona, vt ait Dodo- naeus, citans Dioscoridem, est statulenta. Cum ergo inter statulenta & non statulenta, medio modo se habeat Faseolus: Bona autem tam sit sta- tulenta, vt Cumino addito opus habeat ad status auferendum: Bona Faseolus esse non potest. Miror interim Dodonaeum citare Dioscoridem de fa- cultatibus Faseoli, cum nusquam eius memine- rit, nisi Dodonaeus Faseolum & Phaseolum pro- no eodemque recipiat. Quod si faciamus rursus- sum subit, cur duobus capitibus distinctis de Fa- selo & Phaseolo agat, si vnum & idem sunt. Mi- ror etiam, cum facultates Fabae Veterum tribuere Bonae Faseolo, quas nemo Faseolo tribuit, nec tamen Fabae Veterum nomen etiam nostrae Bonae con- cedere. Neque enim Galenus, neque quisquam alius dixit Faseolum conferre inflammationibus, testiculorum, & mammarum affectibus. Sed & Gal. & Dioscorides eas vires proprie Fabae Vete- rum ascribunt. Quare videtur Dodonaeus, inuenit, quatenus Fabae Veterum facultates nostrae Bonae concedit, Bonam nostram facere Fabam Vete- rum. Ex rationibus supra dictis perspicuum euadit, Bonam nostram nec Phaseolum esse, nec Faseolum. iam Tragi & affectuum eius rationibus responde- mus. Quod ad Fabae crescendi tarditatem, non alia mihi videtur responsione opus, quam ipsius Theophrasti: satis enim respondet eodem loco, his verbis: Sed an ea, quae tempore verno leran- tur &c. Plinio de radicem multitudinem, iam res- ponsum est a Theoph. scribente: Fabam plures non habere radices. Quod ad Fabarum secundi- tatem Plinio memoratam, ascribendum totius co- cunditatem de Agricola vir sapiens scribit Veterum pondera & mensuras ex granis & leguminibus non posse restitui, propter eorum diuersitatem ex regionum diuersitate. Quod ex Diosc. adducit de Fabae rotunditate ex cap. de Iuniperi in nullo e- mendato codice nec latino, nec graeco inuenitur. Si quis textum Dioscoridis secundum Serapionem obiciat, non alio argumento melius probauerim Fabam non debere esse rotundam, quam ipsius Se- rapionis verbis, ita scribentis: Quaedam reperitur, cuius fructus est parvus sicut Fabā, nisi quis ipse est rotundus. Videtis hic Dioscoridem, vt ait Se- rapio, Fabam non facere rotundam. At enim haec Iuniperi minoris paruas esse instat Fabae, nisi quod rotunda sint, non vt Fabae. Quod ad ratio- nem de Fabarum rotunditate, ex Galeno deduc- tam, respondeo aut Galenum suam Fabam sub legumine aliquo comprehendere, quod nos pro Pisi genere accipimus, quemadmodum censent quidam apud Diosc. sub Fabis contineri Pisi, quo- niam nulla Pisorum apud Dioscoridem fac- mentio: aut certe eius Fabam in hac nostra Europa, nisi multum fallor, non reperitur. Plinius Pisi fa- cit quadrata: secundum, eum igitur nostra Pisi alba, rotunda, aut sunt Galeni Fabae, aut Cicera alba, quae Plinius rotunda alba facit, Cicere arie- tino minora. Hallenus Turnerus. Quia porro auc- toritate fretus Fabam tam audacter Bonam vocet haec tamen haud constitit, nisi, vt ita dicam, Ger- manismo fultus, diomateque Alemannico abusus, vt aliis doctior videretur, nomenclaturam nouā hanc excogitavit. Si Bona & Fabā diuersae sunt plantae, cur differentiam veram non ostendit cur non utramque diuersis descriptionibus & iconibus expressit?

Faba (in h. Hermoli Coroll. 128.) graece vocatur ad differentia Aegypti. A. Gel- lins &

R. dix. fa-
gulari.
Caudis re-
stus.
Folia rotun-
da.
Obiectio
Tragi.

Bona nostra
Faba Vete-
rum.

Cicercula
non est.
Amarus &
Dodona-
eus. &
Tragus.

Bona non
est Fase-
olus.

Bona non
est a.

Dod. record.

Respondet
ad obiectione
nes Tragi.

Diosc. Fabam
non facit
rotundam.

Fabulum. & Festus Fabam etiam Fabulum appellant. Aliter Theodorus Teramon, & Ateramon siue Ateranon apud Theophrastum accipit, pro coctibili sc. & incoctibili, non autem pro herbis ita nuncupatis, ut Plinius. Theophrastus certe alio loco facile significat, veriosum Theodori, quam Plinii sensum fuisse. Ateramna vulgò legumina Græci vocant, inobsequiosa & contumacia, quod genus seminis etiam Cerasbolon vocatur à Platone superstitionis origine, quasi sterilia & irrita proveniant, quæ per hominum cornua serendo cecidissent in terram. Interdictum esse Pythagoricum cibo Fabam miscere inualuit opinio contra verum, sed venerem intelligi demonstrat oportere Gellius. Totà Insulà & Liguria recentes Fabæ, vendentium voce, nuncupantur *Baiana*. In Etruria & Latio *Staphytrum*que originem habet eruditam: Nam & Baianas Apicius appellat, & Scapos Fabarum Plinius.

Baiana. Scribit Cord. in Diosc. Cyamum Græcos, Latinos *Fabam* vocare, Germanos *Bonen*, de quo non opus sit dubitare. Differre Fabas secundum colorem & magnitudinem. Describit autem in hist. lib. 2. triplicem differentiam cap. 162. *Fabam vulgarem sativam*, *Fabam nigram minorem*: & cap. 164. *Fabam nigram maiorem*.

Phasioli. Tragus, si quis *Bonen* (Fabas) ad Phasiolos Dioscoridis referat, cum eo minime contenderit. Serapio (ait idem) cap. 116. *Mes*, & fructum eius *Rohilas*, nigras habere maculas scribens, videtur mihi, quod verisimilius sit, fabas nostras germanicas intellexisse. Quarum aliz (inquit cap. 14.) sunt magnæ, aliz exigue, ex his quidem aliz rufæ, aliz candidæ. Vulgares agrestes Fabæ, tres, aut quatuor, quæ maiores plerumque binæ, drachmæ pondus æquant. Nostræ Fabæ descriptio, quam Germani *Bonen* dicunt, ei minime competit, cuius veteres rei herbariæ scriptores meminere. Phasiolos potius, quam Fabas, siue Cyamos, apud Dioscoridem vocatas sentio. Fabæ apud Auct. *Narbatius*, Serapioni verò *Hachille* dicuntur, Hebræis *Pol* Ezech. 4. Mirari satis non possum, Barbarum & Manardum, & alios plerosque à Fabis adeò abstinuissè.

Cyamum nigrum. *Matth.* in comm. cum magnis icon. Lat. & Ital. & ep. p. 182. Fabas (xviii) alias asserit magnas, alias parvas, subrotundas alias, alias cōpressas & alias colore albicantes, subruilas alias, alias subnigras.

Fabæ gener. *Angularia* tradit solum magnas, parvas, rubras, nigras, albas. Gesn. de hort. albas, & rubeas. Bellon. per Fabam Ægyptiam intelligit Fabam veram, edulem, natam in Ægypto. Videtur illi, Galenum etiam intellexisse lib. de alim. de Fabis communibus, ubi de Ægyptiis loquitur.

Cyamum. Fabam denique appellant [ut nobis author est Dod.] *πυραυ*, unde *πυραυ* Athenensium festa Apollini sacra, quibus *πυραυ* [Fabæ & legumina] coquebantur, à quibus rursus mensis, quo hæc celebrabatur, *πυραυ* nuncupatus est, qui serè cum Octobri convenit. Nominantur *κύνες* etiam testiculi: quod sint, *κύνες* autem, pariendi autores. Ab his *Cyamis* abstinendum Pythagoram præcepisse plerique interpretantur. Quo symbolo eum detestatum aiunt rei veteris vltum, non autem elculentarum Fabarum.

Faba fresa. Faba fresa, aut fracta *ῥαγία* græcè appellatur, aut *ῥαγία*, & Fabæ fresa farina *ῥαγία* dicitur. Fabæ Græcis *ῥαγία*, Diosc. etiam Phasioli, Lat. *Faseli*, Offic. & vulgò dicuntur, Germ. & Belg. *Bonen* Phaselus maior, aut *Faseli* sativus minor. Belg. *Grote Bonen*. Altera potest dici *Faseli* minor, res. *petre* *Vene* Gallicè. Brabant. *Zeusch* *Boonfens* & *Peerden* *boonfens*. Fabam vulgarem non esse *Cyamum* demonstratur in Hist. Rugum, & Toin. II.

in fol. Bonamajor ut plurimum candida, subinde ex rubicundo colore purpurascens, semidrachmæ sæpè numero pondo. Hanc veterum Græcorum *κύνες*, ac Latinorum Fabam esse non solum Officinæ, sed omnes passim crediderunt, quæ in re à veritate absunt. Dioscorides Ægyptiā Fabam, vulgarem Græcorum magnitudine superare tradit: quæ tamen & ipsa parva est, Bonæq, longè minor. Pendet enim Ægyptia Faba auctore Galeno semibolum tantum. Bona verò semidrachmam, i. e. obolos integros tres, sæpè complet. Bona igitur non Faba, sed omnino alterius nominis videtur, Faseli sc. quem Græcorum complurimi *ῥαγία*, ac Diosc. *ῥαγία*, Simeon Sethi *ῥαγία* nominavit. Phasioli autem Diosc. dē sunt cum Phasiolis à Galeno, in lib. de alim. facul. appellatis. Bonam germ. dictam, veterum Græcorum & Latinorum *ῥαγία*, Diosc. *ῥαγία* esse, dubitandi nullus locus superesse videtur. Minor Bonæ colore alias subalbicans, aut subflava. Secundum admodum legumen, quod maiorem multitudine foliorum & florum, silicarumque numero superat: alias nigra. Brabant. vñ cum Flandris, Hollandis, Zelandis, ac aliis finitimis vulgò *Peertsboonen*/ hoc est, Bonam equinam, & *Klein boonfens*/ parvas Bonas, appellant, plerique etiam *Zeusch* *boonfens*, Zelandicas Bonas. Est verò hæc Bona, Phasiolus quidam, & potissimum ille, quem Diosc. videtur solum novisse. His & alijs rationibus, si Dui placet, firmissimis, quibus Dodon. vulgarem, venotemque sententiam non tantum infirmare, sed funditus evertere frustra se torquet, quid respondendum sit, ex antè dictis clarè elucescit.

Faba semen est, ut apud Celsalp. legumina inter legumina maximum, & quod maius, ed magis in longitudinem depressum est: minora autem rotundiora sunt, & modicè oblonga: color alius albicans, alius niger: rubras quoque Fabas ipse vidit. Faba, Theophrasto, Plinio, Varroni, Galeno, Dioscoridi. Plura antè ex Plinio, & Varrone.

Schuu. Faba maior, *κύνες* Diosc. Faba maior sativa, *Grosse rote Bonen*/ *Deutsche bonen*. Faba minor, siue rubra *Klein rote bonen*.

Pro Faba, Viciz aliquod genus verius exprimit Petr. Crescentius.

C. Barb. apud Matth. Faba. *κύνες* à fertilitate, inter legumina maximum: Sunt ut plurimum candidæ, sunt nigra, & ex rubicundo colore purpurascens, & flores aut candidi lituris nigris conspicui, aut ex purpura nigrescentes: *luna* est maior, & minor, *Fabulum* Gellio & Festo.

Had. Iun. Faba fresa Plinio nominatur, quæ contracta est, *ῥαγία* Al. *Gewelte Bonen* Belg. *Gesloten* est *gecapte*/ est *gemalen bonen*. Faba tunica, *concha* Faba Scribon. *Valvulus* Columel. *opercula mentum*. *ῥαγία*, *ῥαγία*, *ῥαγία* Nicand. *ῥαγία* Aristoteli, *ῥαγία*, *ῥαγία* Hesychio, *ῥαγία* Apollonio. Gall. *La gousse*. Siliqua, folliculus. Colum. *cōcha*, *valvulus*, à valvis simili operculatura, non autem à vallo, ut Nebrissenis putat. Theca generaliter, quæ vestiuntur legumina. *ῥαγία*, *ῥαγία* Theophrasto. *ῥαγία* Aristotel. Faba oculus, *ῥαγία* Arist. Umbilicus Fabæ, ubi bifores Fabarum valvæ committuntur. Fabæ scapus, fabalis stipula Ouid. *ῥαγία* *ῥαγία* Al. *Bonen stengel*/ *bonenstalm*. Belg. *Boonstroo*/ *bonenstangel*. Fabæ bilum, Nigram in summa Faba. Belg. *estward* *baide Bonen*. Gal. *Le noir de la Fève*. It. *Il nero della Fava*. Hisp. *El negro de la Hava*. Fabalis Plin. *Fabago* Cat. *Fabaginum* acus. *ῥαγία*: quilibet & purgamenta Fabarum. Belg. *est* *baide bonen*. Lomentum, farina fabacea, *ῥαγία*.

HISTORIAE PLANTARVM.

Faba. Germ. Bonen meel / vt & Belg. Gal. Farine de Fèves. It. Farina di Fave. Hisp. Harina de las Hervas. Conchis Martiali, Iuuenali, Faba cum corticibus suis elixa. Germ. Bonen die man vns gemelt Bochet. Belg. Ongepelde boonen geboodt Gall. Fèves bouillies avec l'efforce. Ital. Fave bollite con le sue gusce. Hisp. Hana cozida con su corteza.

Nomina
linguar.

Faba vulgaris, *uau* & plerisque Herbariis, Germ. Bonen, Belg. Bone, Gall. Fèves, Fèves, Ital. Fava, Faba verò recentes & virides, Baccella. Hisp. Hana. Ang. Braues. Bohem. Bob. Hung. Bab. Arab. Hachib, Habale, & Bacchale.

Egyptia.

Lupinum.

Locus &
Tempus.

*Plantae
Fabarum
pro iugero*

Ex modo
centum.

Adferenda.

Cyath nomine, fabæ complures apud Herbarios inveniuntur: vulgares quippe, magne, albe, & purpureæ: parue, albe & nigre. Lupinum eleganter depingit Auicenna lib. 2. cap. 451. nisi quod illic fabam Ægyptiam affirmat: Quæ eadem cum Colocasia Diosc. à Plinio scorsum traditur.

Fabam in locis validis, non calamitosi feri præcipit M. Cato. Tempus assignat Varro, & Palladius. Huic circa septimum Idus Decembris feri potest. Nam post exactam brumam malè seminatur. Illi optimè feritur in Virgiliarum occasu, & quidem modii quatuor in iugero, sed nonnullis locis paulò amplius, aut minus si enim locus crassus, plus; si macer, minus; quare obseruabis, quantum in ea regione consuetudo est ferendi, ut tantum facias, quantum valet regio, ac genus terræ, ut ex eodem semine aliubi, cum decimo redeat, aliubi cum quinto decimo, ut in Hetruria, & locis aliquot in Italia. In Sybaritano dicunt, etiam cum centesimo redire solitum. In Syria, ad Garada, & in Africa, ad Dyrrachium iisdem ex modio nasci centum. Illud quoque multum interest in rudi terra, an in ea seras, quæ quotannis obrita sit, quæ vocatur restibilis, an in veruato, quæ interdum requirit. Cui Agrius. In Olynthia quotannis restibilia esse dicunt, sed ita ut tertio quoque anno, vberiores ferant fructus. Licinius. Agrum alternis annis relinquere oportet, aut paulò leuioribus sationibus ferere, i. e. quæ minus sugunt terram. Dicitur, inquit Agrius, de tertio grana, de nutritionibus, atque alimonis eorum. Licinius. Quæ nata sunt, inquit, in fundo alesunt, adulta concipiunt, prægnantia enim sunt, matura pariunt poma, aut ipicam, sic alia simile ei, à quo profectum est, reddunt semen. Itaque si florem, acerbumve pium, aliud quid decerpseris, in eodem loco, eodem anno, nihil renascitur, quod prægnationis diem bis habere non potest: ut enim mulieres habent ad partum dies certos, sic arbores ac fruges. faba & legumina in oleariis vasis oblita cinere perditu incolumia coaceruantur.

Ceterum Dodonæo sentur maior in agris & hortis, fleret Aprili ac Maio mensibus & particulatim quidem ac dur: fructus Iunio ac Iulio ad maturitatem peruenit. Minor feritur in agris & frequentius apud Zelandos. Ego autem fabas vidi florentes Monspellii mense Februatio, & Florentiz mense Aprili esui aptas. Genue mensis Maio & Iunio florentes, maiores & minores, nigras & albas. Basileæ itidem obseruavi florentes mense Maio, & Iunio aptas esui, solent ibi maiores habere albas & purpureas, vel rubentes, quales etiam vidi in Watvilet Alsatiz; Montbelgardum Basileæ curavi utriusque coloris adferendas & ferendas in Horto Ill. E. C. valgo solent habere minorem albam & nigram.

Antequam verò Vires & esum aggrediamur, scito, quid Fabarum arroser, dicatur, qui in creandis magistratibus sua vendit suffragia, & quibus hinc quæritus est, Fabæ visitare dicuntur. Fabilibus visitat etiam dicitur de Homine qui sordidus est, & qui præ nimia parsimonia quovis cibos esitat, ut impensis parcat.

Iam verò facultates etiam, quas Fabæ Veteres tribuerunt, annotandæ veniunt. Hippocrate igitur auctore, Fabæ aluum sistunt, & inflant: quia meatus aliud insuper accedens alimentum non suscipiunt. Aluum sistunt, quia totam alimentum faciem habent. Fabarum putamina [inquit Theophr.] arborum radicibus aut germinibus appolita vitam penitus tollunt: non tamen omnibus, sed iis, quæ super prosilire, viresque imbecillioribus, quia sua duritia, siccitateque, alimentum, partim trahendo, partim arcendo auferunt: alimento enim destituta protinus moriuntur. Faba græca (pergit Diosc.) flatus ac ventos gignit, ægrè concoquitur, graui somnia inducit. Tussi tamén comoda est, & carnes gignit, medium inter caliditatem ac frigiditatem obueniens. Cocta verò cum posca, & una cum cortice in cibo accepta, dysenterias & alui profluvia cohibet. Sed & ad vomitum in cibo idonea est. Minus autem inflat primæ aquæ de coctura diffusæ. At viridis, & stomacho magis incommoda est, & magis flatuosa. Farina Fabæ tum per se, tum cum polenta imposita, inflammationes ex plaga mitigat, & cicatrices concolores efficit: & maritimas grumoso lacte turgentes, ac inflammatas iuuat, & lac exinguit. Cum melle verò & Exougræci farina, furunculos & paronidas, & sugillata discutit. Cum Rosa autem, & Thure ac oui candido, oculos proidentes & staphylomata ac tumores ipsorum reprimunt. Eadem cum vino subacta, confusiones & plagas oculorum sedat. Faba ipsa sine cortice commansa, ad fluxiones sistendas fronti imponitur. Et cocta in vino, testium inflammationes curat: & ad pubem puerorum imposita, impuberes ipsos diu conseruat. Exerit item vitiliginis. At cortices Fabarum impositi, euillos pilos graciles, ac tenues renasci faciunt. Cum polenta verò & alumine scisso, & veteri oleo impositi, strumas discutunt. Et ipsorum decoctum lanas tingit. Faba decorticata in duas partes diuisa, quæ parte ex natura coaruit, ad sanguinis ab hirudinibus eruptiones imponitur, ipsaque cohibet, si secundum semisecundam partem apponatur.

Fabæ, ut memoræ prodidit Gal. lib. 7. simpli. med. in exsiccano, & refrigerando secundum utrumque ad medium temperamentum propinquissime accedunt. Caro Fabæ paulum quid abstergentis facultatis continet, sicut cortex nonnulli adstringentis. Idcirco Medicorum nonnulli totam Fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, cæliacis, & vomentibus, quos *epitimes* nominant, exhibuerunt. Porro, ut edulium, flatulenta est, ac coctui difficilis, si quid aliud: excretionibus ex thorace & pulmone idonea, ut medicamentum verò, sorsim imposita, sine molestia desiccatur. In podagricis ea sæpe numero vsi sumus ex aqua decocta, & deinde adipi suo admixta. Ad necrosum tum contusiones, tum vulnerationes, sarnam eius cum oxymellite imposuimus. Ad eos, quos ex ista iam phlegmone occupauerat, cum polenta. Sed & testium, & mammarum aptum est cataplasma. Nam hæ partes, cum phlegmone tenentur, moderate refrigerari amant, maxime cum mamma ex lacte ipsis concreto phlegmonem patientur. Quin lac quoque ab eo cataplasma

Adagium de Fabæ

*Putamina
tenent
germinis
noua.*

Temperamentum

Alui profluvia

*Inflammationes
ex plaga
maritimas
efficit.*

Oculi proidentes

Pilo euillos

*Sanguis
ex capto
ab hirudinibus*

Temperamentum

Caro

Caro

Dysentericis

Flatulenta

Podagricis

Mamma

Phlegmone

mate

mate exunguitur, sicut puerorum pubes sanina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet. Et lib. i. de alim. facult. sic inquit: Inflat is cibus quocunque modo apparetur: nec per quamvis longam decoctionem id vitii potest amittere, quod pisanæ minimè negatum est: deponit enim per illam quicquid habet flatulentum. Qui porro affectus singulos cibos sequi natos, animaduertere, & mente consequi volet, quandam totius corporis tensionem, quasi à flatulento spiritu persentiscet, maximeque, qui ad huiusmodi esculentum non fuerit assuefactus, aut ipsum minus rectè coctum assumpserit. Habent autem Fabæ nondensam, nec grauem, sed fungosam, lenemque substantiam: quæ tamen ipsa nonnihil absterloria possidet facultatis, similiter pisanæ. Etenim manifestè fabacea farina cutis sordes detergere conspicitur. Quod intelligentes mangones, ac mulierculæ, in balneis quotidie hac vtuntur, velut alii nitro, atque aphronitro, & in vniuersum iis, quæ abstergent. Illinunt præterea & faciem hac, quemadmodum pisanæ: nam quæ in summa cute eminent lentes exerit, & maculas velut ex Sole contractas. Huius ergo facultatis nomine in alui quidem transitu diu cunctantur, sicut quæ glutinosa, & crassi succi sunt sine vlla abstergendi facultate, quæ hæc Halicam, Tragum, Similaginem & Amylum esse perhibuimus. Cum porro ferculum ex fresa Fabæ paratum, quod *ῥαβία* Græci nuncupant, flatibus non careat, multò amplius integrè Fabæ inflabit cibus, quamquam fricta (nam hoc modo aliquando pro bellariis) statim deponit, sed tum concoctu perdifficilis, tardoque descensu incommodior redditur, & crassi succi alimentum in corpus diffundit. Quod si viridis, immatura, nondumque arefacta edatur, communè omnium fructuum, quos ante perfectam maturitatem ingerimus, rationem obtinens, corpori humidiorum alimoniam exhibebit, ac proinde maiorem excrementorum vim non tantum in visceribus: sed etiam per vniuersum corporis habitum producet. Merito igitur minus quoque nutrit, sed promptius delicietur. Plerique autem hominum non crudas solas Fabas comedentes, vñ eas cum suillâ carne decoquunt, veluti olera consueuerunt: ruri verò etiam cum caprina, & ouilla. Alii fabas inflare sentientes, Cepas admiscunt, cum in ollis ex illis pulmentum struunt. Sunt qui non simul elixatas, sed cum pulmento Cepas ingerant erudas. In omnibus namque dapibus quicquid flatuosum continetur, per calefactionem, & extenuantiam corrigi comparatum est.

Auxiliatur & morbis faba, inquit Plinius: Namque solida fricta, seruensque, in acre acetum coniecta torminibus medetur. In cibo fresa, & cum Allio cocta, contra deploratas tussis, suppurationesque pectorum, quotidiano cibo sumitur. Et commanducata ieiunio ore, etiam ad surunculos maturandos, discutiendosue imponitur: & in vino decocta, ad testium tumores & genitalium. Lomentum quoque ex aceto decoctum, tumores maturat, atque aperit. Item liuoribus, combustis medetur. Voci eam prodesse, autor est M. Varro. Fabalium etiam siliquarum cinis ad coxendices, & ad neruorum veteres dolores, cum adipis suilli vetustate prodest. Et per se cortices decocti ad ærtias, sistunt aluum. Nota est officinis (pergit Corn.) Faba, cum suo lomento. Hinc forsitan existit & illud Martialis:

*Gratum munus erit, scisso nec iuuile ueneri,
Si clare Stephanus balnea lute pascas.*

A Fabis abstinento. Huius ænigmatis varia reperitur interpretatio. Plutarchus enim ad hunc enarrat modum: Abstinentum à tractandis Reipub. muneribus, propter quod antiquitus in creandis magistratibus suffragia per fabas calculorum ierebantur. Et rursus dicit ob id dam-natas fabas, quod Lethes & Erebi sint cognomines. His autem quid sibi velit, non satis constat, nisi dicatur Lathyrum & Erubanthum Ciceris genera esse, quæ nomina a Latho & Erebo deducantur. Lethes autem Græcis obliuionem sonare, Erebum verò à caligine nomen habere: inauspicatæ voces, sapientiarum studiosis. Sed idem ædopol in probl. physicam affert causam, cur Pythagoras à fabis abstinentum iusserit, nempe quod omnia legumina spiritum & humorem impurum ingenerent corporibus, atque hanc ob causam ad venerem incitent. In eadem sententia Cicero fuisse videtur, cum scribit ad hunc modum: Iubet igitur Plato lib. i. de Diuin. sic ad somnum proficisci corporibus affectis, ut nihil sit, quod errorem animis, perturbationemque adferat. Ex quo etiam Pythagoreis interdictum putatur, ne fabæ velcerentur, quod habeat inflationem magnam in cibis, tranquillitatem mentis querenti verè contrariam. Aristoxenus refellit hanc opinionem, affirmans Pythagoram nullo legumine sapiens vsum, quam fabam, quod is cibus sensim aluum subduceret, & læuigaret. Porro Gellius, quod in cibis Cyamus repudiaretur, causam erroris fuisse putat, Empedoclis carmina, qui disciplinas Pythagoricas sectatus est, inter quas versus hic inuenitur.

Ah miseri à Cyamo miseri subducite dextram.

Opinati enim sunt plerique *κύαμος* legumen vulgò dici. Sed qui diligentius, scitiusque carmina Empedoclis arbitrati sunt (Gellii verba sunt) *κύαμος* hoc in loco testiculos significare aiunt, eosque more Pythagoræ opertè atque symbolice *κύαμος*, appellatos, quia sint eis *κύαμος* *δὲ* *κύαμος* *δὲ* *κύαμος*, ad conceptum efficaces, causæque conceptionis, & genituræ humanæ vim præbentes. Idcirco Empedoclem versu isto non à Cyamo [Faba] edendo, sed à rei veneris proluvio voluisse homines deducere. Patet ergo quantum à vero aberret Gell. in explicatione Fabæ Pythagoricæ, cuius verba hæc sunt. Pythagoras interdicto illo, quo à Fabis abstinere iussit, per Fabas oia intellexit, à quibus nimirum non aliâ ratione abstinere voluit, quam à quorumvis animalium carnibus, par homini fore scelus existimans in aue aut auis quò peccanti. Itaque eius discipuli quotidianum illud iactabant, *κύαμος* *δὲ* *κύαμος* *δὲ* *κύαμος*, quod est, non differre comedisse oua, & parentum capita. Vocauit autem ouum Cyamon, quod quasi *κύαμος* [ferura animalis] esset, & conceptum eius intra se clauderet. Apud Aegyptios porro, referente Theone grammatico, tanta est fabarum religio, ut eos neque ferant, neque comedant, imò nec aspicere fas sit. Quin, Herodoto teste, apud Romanos inter funesta habebantur: quippe quas non tangere, nec nominare Diali flammis liceret, quod ad mortuos pertinere putarentur. Nam & lemaribus iacebantur, lauis & parentalibus.

Cæterum fabas venerem stimulare voluit etiam Palladius, ita enim scribit: Præuones, cum Idibus Februariis calere incipiunt, fabæ leniter torrefactæ in libidinem prouocantur, si eis quinto quoque die tepida præbeat. Sex Cyathi vni sufficiunt. Nunc iam contra proinas sterco ingerrant Persici, vel fæces vini, quod maxime pro-

A Fabis abstinento.
Plutarchus
Respub. muneribus.

Plutarchus
Respub. muneribus.

Lathyrum
Erubanthum
Lethes & Erebo
obliuio.
Erebus, caligine.

Inflatio à
Fabis.

Pythagoras
abstinentum
Fabis.

Cyami sunt
testiculi.

Gellius non.

Aegyptii
fabas videre
noluerunt.

dest, cum aqua, in qua faba decocta est, permittit. M. Cato in bonis cibaria annua in iuga singula sumit fabæ modios viginti. Columella nauseantibus suis salutaris habetur eburnea scobs sale fricta, & fabæ minutè fresse commista, ieiunilque prius, quàm in pascua prodeant, obiecta.

Fabæ recentes [ut mea fert opinio], inquit Trag.] innoxie sunt in cibo, iis ergo utemur: siccas operariis relinquentes. Sunt qui ex farina fabarum placentas mellitas conficiant, alii, ut Alfiati, ea in saginandis porcis utuntur, ad quam rem accommodatissima est, siquidem brevi tempore ea saginantur porci. non aliter, atque armenta Cytiso. Chirurghi collectiones & tumores locorū, fabaceā farinā in aceto & vappa decoctā, ac calidā impositā, oleoque admixto discutere ac sanare consueverunt: eadem farina vino decocta, ac calida imposita omnibus tumoribus imprimis conducit, siue si in mammis mulierum, siue in locis genitalibus, aut quibuscunque aliis oriantur. Fallopius de thermis cap. 11. Vnum habet præcipuum inter alia, licet sit empiricum medicamentum [in ardore urinx] & est aqua extracta è floribus fabarum, vel ex siliquis ipsis recentibus, ad sex uncias exhibitā, per tres vel quatuor horas ante prandium, vel cenam, addito Syrupo de Liquiritia, vel de Papauere. Idem in eodem casu approbat Baccius de therm. lib. 3. c. 3.

Faba nostra (Adv. loquuntur p. 394.) legumen neutiquam contemnendum, imò tanti faciendum hodie, ut Vere & tota Æstate, multis in regionibus, magnum sit annonæ supplementum, & non parum multa gentes panes ex fabis deplant veterinarie, etiamque plebecule non incommodos: farinā autem, aut ipsa tota fresa faba pulvis lapidas, & placentas conficiant, efficiantque ut de hac nostra faba dictum putemus, quod Antiqui scribunt, fabæ maximum honorem habitum fuisse, ut quā panis attentatus sit. Bona maior, siue faselus, quod ad facultates eius attinet, in alimentorum numero (inquit Dod.) non postremo loco, arida ut cætera legumina, decocta, & in cibis assumpta: nam recens quidem inflat, & flatus gignit. At resiccata & arida, probeque deinde cocta, minùs aut parum admodum flatulenta est, corpori alimentum mediocriter, & aliud mediocriter confert: descendit autem cum putaminibus quidem, nec omnino facilè, nec omnino tardè, absque his autem alium constringit, & potentius quidem, quæ rubra est. Farina Bonarum, cataplasmatibus præsertim resiccantibus, deficiente fabarum, eius loco hac ætate admiscetur, & non inutiliter quidem. Sicut eius enim temperies parum à medio recessita ad multa utilis est. Talia siquidem medicamenta, auctore Galeno, multis aliis miscentur, seu materiæ quedam. Abstergerendi autem facultatem fabaceæ farine, Bonarum nō habet. Cæterum facultate ac temperamento Bonaminor admodum similis majori est, non tamen, tam hominum cibo, quàm equorum saginæ seruit, ac utilis est. In cataplasmatibus, farina huius idem, quod maioris potest. Ut pueri puellæque non pubescent (auctore Cardano) lomento fabarum assidue loca ea laubis: dētergit enim atque ita prohibet donec cutis solidetur humore glutinoso. In Dysenteria feliciter dedit panem paruum, factum è farina fabacea, cui nucem moschatam & bolum præparatum admiscebat, & piston coquendum dabat. Io. de Mont. exp. ad calculum vesicæ & renem accipit culmos Fabarum, comburit, cineres reponit in sacculum, asfundit vinum, & ter colat supra cinerem: agro

in balneo dat uncias duas vini, mane & vespere, quod lapidem mirabiliter frangit. Herc. Saxonia perhibet, Polonos ut ad Plicam [morbum pilorum] lixivio fabis alterato. Gonorrhæam virulentam multi curant (teste Jac. Douyneto) vsu caulium fabarum in cinerem redactarum. Canles deurantur: cinis in aqua fluuiiali 24. horas maceratur, colaturque per inclinationē: dosi est ad ʒiij. per se, singulis diebus noua maceratio faciendā est: vsus erit triūm dierum tantum. Sal [ut Querc. defend. Herm. perhibet] siliquarum fabarum inter alios mirum in modum causticus est & vrens, qui tamen ex iusculo iusta dosi exhibitus admodum diureticus est, ut nihilominus viscerum offensionem efficacissimè operetur: Gallinas, si crebrò putamina fabarum edant, steriles fieri testatur Apollonius.

ARACVS FABACEVS, ET FABA Kayrina, cui semina minora.

CAP. III.



Legumen
L plus quàm cubitale, cuius caules satis crassi, angulosi, inanes, nonnulli hirsuti: folia quaternā, vel sena, coniugationibus duabus digesta, costæ adhærent longiusculæ. Fabæ vulgaris foliis similia, hirsuta, nigricantia, neque vllum est sobū, quod imparitatem faciat, pediculus enim, siue index in ca-

Descriptio
Caulis
Folia
Pediculus

preolos abit, quibus proxima apprehendit: verum ubi cauli pediculus annectitur, pinnæ adnascuntur binæ, veluti in Pisib: atque ex eodem oriuntur loco flores purpurei, similes serè floribus Viciæ, vel Aphacæ, quibus decidens superueniunt siliquæ mediocriter longæ, magnæ, hirsutæ, quibus semina continentur. Pisi serè magnitudine, grauissimæ, & ingratissimi saporis, & odoris, per maturitatem nigra. Flos, quod Dodonæo placet, Bonarum formā, colore è puniceo nigricans: siliquæ interiori sua parte, albos, mollesque floccos continentes in quibus semina tria, quatuor, aut quinque rotunda. Eruliz formā & magnitudine, subinde paulum maiora, colore nigra, paruum, candidum umbilicum habentia, quorum septem, octo, aut subinde nouem semidrachinam pendunt. Substantia horum seminum rarior est, ac minùs dura, solidius, quàm Bonarum maiorum: dum autem manduntur, fertorem veluti quemdam ingratum excitant.

Anno 1607. Augusto mense in horto Fr. C. Bauhini Basileæ provenit, nōmine Fabæ Kayrina, siue Egyptiæ, Augusto mense siliquæ erant maturæ, seminata semina Septembri in horto Montb. Ill. E. C. floruit Maio: flores purpurei

Faba Kayrina

Tumor.

Aqua è floribus.

Dysenteria.

Culmi epl. montum.

quidem, ed internè striati, singulares, duz coniugationes foliorum in vno pediculo ac etiam ternæ: saporis ingrati: siliquæ maturæ lunio, nigra, asperæ: tactu angustiores, quàm in cocco vico Honorii Belli, in his semina septem, magnitudinis parui Pisi, rotunda, nigra veluti pannus holosericus velutim vocatus: sapor legumina- ceus primò, postea odiosus, & quasi sulphureus, cum tantilla acrimonia.

Huius, ni fallor, fit mentio apud Matthiolum in Diosc. cum magnis figuris Lat. & Ital. Fabam siluestrem, *Fauam siluestrem*, sunt qui velint Galeni lib. 11. alim. Aracum domesticum, quæ in re fortasse non malè sentiunt, nec vult is eorum sententiæ contradicere. Huic assignat in Epic. flores in purpura albicantes, semen rotundum fabaceo sapore. In Matthioli iconè folia quaternæ, flores & siliquæ singulares. Camerarii autem icon folia quædam habet quaternæ, quædam sen- na. Idem in hist. germ. apud Matth. refert, Ara- cum Galeni velle aliquos Fabam sylu. quam opi- nionem nqn in totum reiiciat Matth. In horto tandem, Aracum Fuchsi facit, vt Gesnerus pictu- ra inscripserit, vulgo Viciam Romanam voca- tum, Faba sylu. Matthioli, & Piso nigro, seu Pha- scolo Dodonzi cognatam plantam. Ego contra Camerarii mihi planè persuadeo, Aracum Fuchsi Gesnero non diuersum à Faba siluest. Matth. vt etiam ex eius scriptura demonstrare etiam nunc possumus. Quum adhuc anno 1560. morar- er Tubingæ cum celeberrimo meo præceptore Leonhardo Fuchsi, prædictam plantam primò vidi in horto eius florentem Augusto, quam in- bi denominauit *Aracum*, quo etiam nomine plan- tam siccam cum descriptione misit D. Gesnero, quum curaret suas plantas pingendas. Aracus Fabaceus collectus Monspeli, quadrifolius est, qui item Tubingæ.

Dod. gall. Phasiolus sylu. dicitur, gall. *Fene sau- sage*, & *Fene noire*, Faselus sylvestris, & Faselus ni- ger Belg. Wilde Boonen & Swerte Boonen & Moortens. fortè est Cyamos & Faba. Idem hist. frumenti siluestris Quæ de Faba sparsim apud Theoph. aut alios veteres reperit, multa cum hac Bona conueniunt. Icon placet in latin. hist. in gall. siliquas binas pingebat, non singulares.

Lob. & Pena Adu. fabam sylu. præ cæteris credimus delineationem Græcæ fabæ explere. Tab. & C. Bauh. apud Matth. *Fabam sylu.* vocant. Malè ab Hist. Lugd. eadem planta sub duabus de- scriptionibus & figuris traditur, duobus diuersis in locis. pag. quidam 451. sub titulo faba sylu. pag. verò 472. Phasiolus siluestris, siue agrestis. Gesn. de hort. accuratius perpendendum ducit, an Phaselus siluestris, vel niger à Dodon. dictus Phaselus Veterum sit, fabamque Veterum esse negat.

Schvven. cat. Sil. fabam nigram appellat, *Pisum nigrum*, Schwarz boonen/ Wilde Erbsen, Mohren Erbsen. Pisum æge- ium.

Prouenit spontè in Apulia campestribus locis, in Narbonensi Gallia, ac Aquitania. Apud Bel- gas rarum est legumen, neque alibi, quàm vbi sa- tum est, prouenit. Siccitatibus in Belgio gaudet. imbribus ac humido calis statim æruginosum effi- citur, maxime cum in flore est, paucis à latrone diebus exit, citòque extollicur. Monspessuli men- se April. florentem & siliquas habentem in iti- nere versus Freopugnanum inueni. Genevæ ha-

bui in horto meo ex semine misso per D. Zuin- gerum Basileæ, florentem Maio: sequenti anno ex semine deciduo; item Martio. Basileæ copio- sum vidi in prædio D. Plateri. In Italia spontè pro- uenientem reperi. Montbelgardi habeo in horto Ill. Principis ex semine Stutgardia & Argentina misso, per doctissimum Medicum D. D. Melchio- rem Sebitzium nomine Schuurg Erbsen. Se- mina matura obseruari Iulio: mihi etiam missa nonnè fabæ sylu. Matthioli Stutgardia, circa Apri- li, florebant Iunio.

Sunt, inquit Matth. qui dicant, eandem cum domestica faba vires habere. Nos autem, si Mat- thiolus eandem plantam per Fabam sylu. intelli- git, quam hic tradimus, eandem vires, & faculta- tes concedere non possumus, huic enim ingratus est sapor, Hunc quoque si gustasset Schvvenck- feldius, aliter quàm pares cum Faba maiore facul- tates habere sensisset. Apud Dodonæum nullum Bana huc habet vsum.

ARACVS FABACEVS SERRATVS, ET Cocco vico semine maiore.



EX montibus Euganeis circa Patavium attulit plantam D. Agertus Med. Argent. Bona sylu. Dod. folio serrato nomine præcedenti si- milè caule, flore, vt existi- mo, purpureo Vicix lepiam, & siliquis, quæ, vt illæ, latæ, vncias tres longæ, sin- gulares, ex bre- ui pediculo præ- rentes, in cir- cuitu hirsutæ: in his sex Pifa nu- merauimus,

qualia me latet, quia non erant matura. In foliis tres coniugationes pulchrè dentatæ, præter alas binas: folia in capreolos desinunt, ad quorum latus præter coniugationum, foliolum vnum so- lum adest, minus cæteris.

Anno 1608. Septembri seminus Montbel- gardi, in horto Ill. C. Wittemb. semen, cuius in- criptio erat: *Cocco vico*, Honorio Bello. Hoc anno sequenti plantam produxerat, quæ florebat Ma- io: similis autem erat præcedenti Araco fabaceo priori, verum flores bini, omnino purpurei, in- ternè non striati, pictiue in foliis: ternus ordo paruorum foliolorum, quorum quædam planè similia sine serraturis, alia verò cum serraturis: alæ in principio pediculorum cristatæ, vt in Ara- co fabaceo serrato. Sapor non displicet in siliquis latus numerati septem grana, sapor in virentibus leguminosus, cum aliqua ingratitudine.

An hic idem sit cum serrato nostro conside- randum, folia quidem maiora, sed id à cultura ac- cidere potuit.

Mense Iunio siliquæ maturæ, latiores multo, quàm in Faba Keitina, Pifa autem duplè maiora, nuda nigra, cum hylo albo: sapor idem.

Vires:
Matthioli
error.

Schvvenck-
feldius.

Locus:
Bona sylu.

Descriptio
Flos.
Siliqua.

Semen.

Folia.

Locus.

Cocco vi-
co.
Tempus.
Flos.
Folia.

Ala.
Sapor. Sili-
qua.
Semen.

Tempus.

Aracus
Faba sylu.
Aracus Fuchsi.
Vicia Ro-
mana.
Camer. er-
ror.

Phasiolus
sylu.

Bona nigra.

Dodonæi
icones.

Hist. Lugd.
pag.

Pisum ni-
gram.

Locus.
& tempus.

Cultura.

LUPINVS VVLGARIS SEMINE ET
flore albo, fabus.

CAP. IV.

Descriptio.

Caulis.

Folia.



Flores.

Siliqua.
Semina.

Sapor.

Radix.
Lupini Sem-
de dicti.Lupini Co-
ntra.Terra
mat.Variet
condum re-
gionum.

Lupinus vul-
garis, cubitalis &
sesquicubitalis
est herba, caute
mediocriter
crasso, ex viridi
flauescente, te-
reti, hirsuto, ra-
moso: folia al-
ternatim oriun-
tur, glauca su-
perne, & gla-
bra, inferius
magis albican-
tia & lanugino-
sa, in quinque,
sex, aut septem
segmenta radi-
catim ad pedi-
culum usque
teretem, vncias

duas, aut tres longum, incisa: sapore subamaro,
leguminoso: flores ad diuicationem ramorum
peculiaris furculo enato insident, colore albidio,
pallidescente, calypino stios candicans, aurad ex-
tremum vergens, folio vno latiusculo sursum re-
flexo, lateralibus duobus quatuor rostro caru-
leo (sub quo apices latent croci) insigne am-
plexus: sequuntur siliquae pro florum numero
plures simul iunctae, sabacearum, instar surrectae,
villosae, pulposae, compressae, in ambitu crenatae,
intus glaucae, in quibus semina quina, senaue,
membranis dissepita, orbiculata, & nonnihil an-
gulo la, compressa, quae se parte siliquae adherent,
cauitatem quandam, veluti umbilicum exiguum
habentia, foris alba, intus lutea, sapore amaro, ra-
dix dura, alba, multifida.

Lupinorum autem appellatio non aliunde du-
cta videtur, quam quod sicut lupus terram appe-
tit, & in fame terra vescitur, ita Lupinus tellurem,
ut Plinius ait, aded amar, ut quamvis fructuoso
solo coniectum inter folia, vepresque, ad terram
tamen radice perueniat. Lupinus etiam, velut lu-
pis expositus & relictus, dictus videri potest, ex
eo, quod, ut idem Plin. ait, impunè iacet, vel dere-
lictus, si non protinus secuti imbres, ab omnibus
animalibus amaritudine sua tutus. Duo sunt Lu-
pini genera, Dioscoridi, Plinio & Galeno, latius
& sylvestris. Nos de hoc agemus pauld post. Re-
medium eius (latius) ne metentes fugiat exilien-
do, ut ab imbre tollatur ait Plin. lib. 18. cap. 14. Nec
vilius, quod feritur, natura assensu terrae mirabi-
lior est: Primum omnium cum Sole quotidie cir-
cumagitur, horaque agricolis etiam nubilo de-
monstrat. Terram amat, terraque operiri non
vult. Cetera, quae de hoc Veteres prodidere, sa-
tioni, cultui, loco, tempori, viribus & vsui refer-
uauimus.

Ceterum, Lupini cognitionem, ut & multa-
rum aliarum plantarum, nonnunquam impedire
potest regionum varietas. In Hecuria enim ac
quibusdam aliis locis (ut Maranthe obseruauit)
amarissimus est, atque iumenta eum maxime auer-
santur: in Campania verò modicam aut nullam
habet amaritudinem: estque iumentorum ita

gratum pabulum, ut eo per Hiemem vescan-
tur.

Auicenna, Traei testi monio. Lupinum elegan-
ter depinxit, nisi quod falsè Fabam esse Aegypti-
acae affinitatis id quam à veritate ablit nonni
obscuro esse potest. Serapio tria Lupini genera
commemoratur, vnum sativum, & duo sylvestria,
vocaturque *Tarinius*, & primum genus *Regales*, A-
uerroes *Tarmos*. Apuleio *Thermos orinus*, Lupinus
montanus. Dioscoridi *Q. vicia*, & *Brechen*
appellatur. A Galeno, ob varias quibus pollet,
vtilitates *auxeris* dicitur, Apud Hebraeos *Tal-
tan* vocatur, vide *Aruch Monstici*.

Nulli pestiferis, auctoritate Matthioli, plantis
strangulatur Lupinus: cum ipse noxias omnes
strangulet herbas, quae illi adnascuntur. A Mau-
ritanis *Parinus*, *Arinus*, seu *Termus* appellatur.

Lupinum (inquit Corn.) *Seigbonen* appel-
lant, quasi *Ficus Fabam* per antiphrasim &
Luporum *Pisa*, quasi dignum sit illis edu-
cium.

Sed nec ita procul (Lob. & Penà iudicibus in
Advers.) absunt à Fabaceis, & Phaeoli fructus,
quos *Epiphras* Graeci vocant, quia calidiores exco-
ris leguminibus essent, aut potius, quod *Epiphras*
[calida aqua] lauantur, & macerantur, quae
amarorem exuerant, tristem & molestem, quo
etiam *amur* dicitur, unde Virgili Epitheton, *Tristis*,
que Lupini *Sustuleris calamos*. Idem Obl. inter
alia fabae siculneae nomen huic tribuunt. Icon.
verò Plant. p. 64. Tom. 2. Lupinus sativus.

Notat Hoff. Lugd. quod folia huius sub vespere,
Solis occasum veluti praesentientia, staccida
facta deorsum vergant.

Illud tandem memoratu dignum, quod Ca-
mer. in horto perhibet: Lupini albi, inquit, in
quorum genere repertiuntur maximi, flore ante-
quam aperiantur, subcaeruleo, intus verò albo.

Plautus nominat Lupinos, Aurum coniectum
nam in scena nummis ex Lupino factis, pro au-
reis utebantur Comici. Et nunc etiam in Italia
pueri ex his nummos efformare solent, unde
Horatius:

Nec tamen ignorare, quid distent ara Lupinis.

Voluit namque hoc versu significare, illos mini-
mè latere, sed scire quantum probati nummi di-
stent à falsis, itemque boni vini à malis. Notabis
autem Salomonem Albertum apud Horatium
hoc in loco legere *Erva*, pro *ara*.

Ceterum Lupinus sativus omnibus passim au-
toribus & officinis Lupini simpliciter dicti no-
mine innotescit. Graecis vocatur *Q. vicia*, *Q. vicia*,
Q. vicia; Germ. *Wich bonen* / *Seigbonen*, *Wolff-
choeren*, *Wolffschbonen*: Belg. *Vichboonen*
& *Lupinen*. Gall. *Lupins*: Ital. *Lupino domestico*,
Hisp. *Entramucos*, & *Entramocos*. Ang. *Lupines*.

Ne porro, quae distulimus, hoc in loco negli-
gamus, ad Veteres reuertimur. Lupinum igitur
[autore Theop. lib. 8. hist. cap. 11.] exis, quae sil-
vestria quasi putantur proprietatem quandam
tum in generatione, tum in germinatione sorti
planè videtur. Nisi enim hoc protinus [licet ro-
bustissimum sit, ab arca terrae mandauerit, male
proveniet. Atque in totum condi hoc legumen
subter terram recusat: quae de causa ne subarantes
quidem id ferunt, & saepe si in materiem, aut her-
bam praedentiam quampiam incidat, eam vi sum-
ma impeller do deducit, radicemque terram con-
tingit, & germinat. Et vnum hoc [pergit Plin.
lib. 18. cap. 14] feritur non sarato sarato. Nihilque
aliud nullo impendio constat, ut quod ne seren-
di quidem graui opus sit asserere. Protinus feritur.

Apuleio lib.

Lupinus sat.

Termus.

Termos.

Thermos.

Brechen.

Arinus.

Taban.

Faba.

Pisa.

Lupinus.

Pisa.

Thermos.

Epitheton.

Aurum co-

mition.

Nomen d.

linguarum.

Satio.

Cultura.

Duratio.

Locus.

Tempus.

Vires & v.
sus.

Cursus.

Salsus.

ex aruo [ex area Theoph.] ac ne spargi quidem possit decidens (ponit). Coli non vult, itaque aded non eget fimo. Lupinum teste Theoph. Cicere & Eruo, quæ omnium maxime durat, longe diuturnius est. Condi in fimo maxime conuenit, quoniam in humido vermiculi umbilicum eius in sterilitatem castrant. Si depastum sit in fronde, in arari protinus solum opus est.

Quærit maxime sabulosa, & sicca, atque etiam harenosa loca. Ex densiore terra rubricam maxime amat. Cretosa tantum limosaque odit, & in iis non prouenit, teste Plinio, Theophrasto quoque perhibente, solum arenosum & vitiosum potius poscit, atque in totum cultus prouenire non vult. A nobis Montbelgardi plantatus in horto E. C. feliciter prouenit, sed à muribus deuoratur, ut euenit anno 1588. Matthiolo sentit in agris, sterili solo in Hetruria.

Primum omnium feritur, secundum Plinium, nouissimum autem tollitur: utrumque Septembri serè mense, quia si non antecessit Hiemps, frigoribus obnoxium est. Ter præterea floret. Apud Germanos quidem (Dodon. loquitur) sub finem Maij: deinde Iunio, aut initio Iulij: tertio verò Iulio, aut Augusto mensibus, si anni tempestas calida siccaque fuerit, fructus sæpe ad maturitatem peruenit. Nobis semen maturum factum Augusto, Septembri & Octobri, floret Iunio. Genevæ florentem habuimus Iulio, Basileæ etiam Maio. Cæsalpino sentit mense Augusto, ac paulò ante colligitur.

Lupino, iuxta Plinium, multiplex usus: nam non duntaxat homini, & quadrupedum generi ungulas habenti, communis: sed pinguescere hoc etiam satum, arua, vineasque dixit, ita ut optimi fimi vicem repræsentet. Sed ad terram rubricam alendam post tertium florem verti debet, in sabulo post secundum. Maceratum autem calidâ aqua homini in cibo est. Puerorum ventribus impositum pro remedio est. Bouem vnum modii linguli satiant. Lupini semen, πολυχενος est, inquit Galenus lib. 1. Alim. Elixum enim, deinde in aqua dulci maceratum, tantisper dum in hac omnem sibi ingentiam exuerit insuauitatem, ita demum manditur cum Garo, ac Oxygaro, veletiam sine his, sale mediocri conditum, non quomodo Hordeum, & alia, quæ variè apparantur. Lupini dura ac terrestris est substantia: quocirca ipse concoctus difficilis est, succumque crassum gignit ex quo non probè in venis concocto, succus, quem crudum vocant, procreatur. Cæterum cum inter parandum, quicquid habeat amaritudinis, depomat, nec amittit, qualitatis, quæ sensu deprehendatur, experibus, similis euadit. Par igitur est ipsum, neque ad deiectionem, neque ut adstringentia ad fluxum ventris cohibendum esse accommodum, sed tardè descendere, & difficilè delicij, ac pertransire. Idem lib. 6. simpl. Lupinus edi potest coctus, multis antè diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita, sitque tunc nutrimentum succi crassi. Cæterum ut medicamentum ita præparatus, ex genere est emplasticorum. At ubi natua etiam dum manet amaritudo, extergendi, digerendique vim obtinet: interficiat lumbricos, tum illicus, tum addito melle linctus, tum ex posca potus. Quin & decoctum eius lumbricos eicere potest, tum etiam foris identidem persulum, vitiligines, achoras, pustulas, psoras, gangrenas, vlceras maligna iuuat, partim extergendo, partim citra mordacitatem digerendo, sicandoque: expurgat iecur & lienem, cum Ruta & Pipere maceratus grana, asinum

ptu. Elicit menses, ac factum cum Myrrha & melle impositum. Porro Lupinorum farina sine mordicatione, digerit. Nec enim liuida tantum, sed & chæradas, & ophymata curat: sed tunc in aceto, aut Oxy mellite, aut posca coquatur oportet: idque pro agrorum temperamento, & affectus diuersitate, quod ex usu est eligendū. Digerit item, quæ liuida sunt: & quæcunque modò diximus, præstare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt verò etiam, qui cum ichthyadicis cataplasmatibus modo illinunt. Lupinum satium notum esse, Diosc. tradit, & eius farinam cum melle delinctam, aut cum aceto potam lumbricos expellere. Sed & ipsos aqua maceratos, si amari adhuc edantur, eadem facere. Et decoctum ipsorum cum Ruta & Pipere potum, idem facere. Vnde etiam splenicis prodesse: & gangrenas, vlcerasera, theniomata appellata, scabies incipientes, vitiligines, maculas, pustulas, vlceras capitis manantia, ipso vtilissimè persundi ac foueri. Idem etiam menses & scetus deerrare, cum Myrrha & melle appositum. At farinam purgare cutem & liuida. Cum polenta & aqua mitigare inflammationes. Cum aceto verò, coxendicium dolores, & panos lenire. Strumas dissipare Lupinum in aceto coctum, & impositum. Ita etiam Carbunculos rumpere. Cum aqua verò pluuia coctos, donec succum remittant, faciem depurgare. Cum Chamæleonis nigri radice coctos, oculi scabiem sanare, si decocto tepido eluatur. Radicem autem in coctam cum aqua, & potam, vitriam mouere. Edulcatos tritos, cum aceto potos Lupinos, stomachi fastidium lenire, & appetentiam ad cibum facere.

Seruntur (inquit Matth.) in Hetruria non modò ad alimentorum usum, sed ad agros impinguandos: Dulcorantur in Italia, ibique frequentè eduntur cum sale. Excalfaciunt & siccant manifestè, abstergunt, aperiunt, digerunt, resoluunt, & attenuant. Cæsalpino teste, Lupini semen aqua calidâ præmaceratum, amaritudine demissa, gratum gustui redditur, ut citius aliam coctionem existerit. Quod Theoph. dixit, viderem à nullo animali mandi propter amaritudinem, de fructu intelligendum est: nam hodie etiam probum pabulo feritur inter rapas. Lupinifari (ut vult Aug. Gall.) impediunt vermes frumentum rodentes, & agros macilentos impinguant.

LUPINVS EXOTICVS HIRSVTISSIMVS



Elegan-
tissimum
huncce Lu-
pinum Cl. D.
D. Felix Pla-
tus Agra-
re: Basileen-
sis summo
amicus no-
ster in pete-
leganti suo
Herbario sic
eò habet. A
quo mutua
acceptam
plantam hoc
loco descri-
bere ac de-
pingere pos-
est. Ramus
cubitalis, vti

Mense.

Physi.

Ichthy.

Lumbrici.

Gangrena.

Inflammationes.

Carbunculi.

Quam scabi.

Fastidium.

Tempor.

Theoph. explicat.

Agris sim.

Faba.

Flores.

Siliqua.

Lupinus sil-

vest.

Candia.

Semina.

Color.

Locus.

Descriptio.

Clusius.

Folia.

Flores.

Tempus.

longissima hirsutie byssea oblit, in ramos brachia-
tus, qui folia longis pediculis harentia emittunt;
quinquepartita, penitus villosa, folia Lupini
latius alioqui haud multum dissimilia. Ramorum
summitatibus flores insident aliquot caerulei, hirsu-
tes, minores quam Lupini vulgaris, succedunt
siliqua alterno suo pedice, penitus villosa, surre-
cta, unciales, longiores, nec dum fructum con-
tinentes, brevibus pediculis harentes, ad quo-
rum extortum alia quaedam lanuginosa, praean-
gusta folia prodeunt.

Huius semen existimamus esse, quod floren-
tia à Casabona magni Ducis Hetruriae hortu-
lano, nomine Lupini silvestris Candia accepti-
mus, quodque hinc sua magnitudine appingi cu-
ravimus, maius nimirum & crassius vulgari. To-
tum luridum est colore, & aliquantum variega-
tum, compressum, asperum, eo loco ubi umbili-
cus, exactum.

In horto Cordolacastrensi provenit Lupinus
caeruleus, Hispanicus, latifolius, hirsutissimus, quē
in dicto horto legimus anno 1608. pulchrē flo-
rentem. Omnino is respondet iconi huic no-
strae. Aiebat plantarum studiosissimus Arnold.
Gilenius Med. Cand. Castellae nomine Lupini
Indici missum, cum illi plantam ostenderemus.

Clusius hunc, ni fallor describit, nomine Lu-
pini caeruleo-purpurei. Natum, inquit, quoddam
Lupini genus fuit Lugduni Batavorum, semine
peregre accepto, crevitque in cubitalem, aut
maiorē altitudinem, latus siccum scapo & in ra-
mos diviso praeditum: cui, ut in aliis Lupini ge-
neribus, inharebant folia ex vno longo pedicu-
lo dependentia, septena, aut plura, molliora ta-
men, quam in eo, qui flavum profert florem,
paullō etiam laxiora, longiorēque lanugine ob-
lita: flores extremum caulem, & ramos, tribus
quatuor, aut pluribus ordinibus ambiunt, ver-
ticillatim, aut coronae instar, in orbem dispositi,
quaterni, & quini, iis qui albi sunt, serē aequales,
sed coloris ex caeruleo purpurascens & elegan-
tis: quibus successerunt siliquae non dispares
vulgari sativo, in quibus fructus illo non minor,
verum alterius coloris. florebat Iulio mense,
semen Septembri maturum fuit. Cum anno
1565. è Lusitania per Batuniam in Granatense re-
gnum transiret, meminit rebruario mense agros
Lupino consitos videre, cuius flores albi, aliquid
caerulei commixtum haberent: an huius fuerit
generis, ignorat Clusius.

LUPINUS LUTEUS FLORE, semine compresso, vario.

Descriptio.

Folium.

Genista.

Olor.

Semina.

Siliqua.

Folia.

Caulis.

Lupinus luteus insignibus aliquot notis à
vulgari distinguitur, potissimum autem flo-
re luteo, adeo ut deceptus pro Genista fallat,
verticillatim dispositus, interposito spatio saepe
duos, vel tres, nonnunquam etiam septem ob-
servavi verticillos. Odore grato ad Leucostru-
tei accedente: deinde verò semine, quod compres-
sa forma & magnitudine albo serē par, colore va-
rium est, albo fuscoque, maculosum, areolā albā ceu
zonula circa germinis regionem cinctum, sili-
quis lanuginosis clausum, reliquis plantae vul-
tus, sativo, seu albo Lupino similis, folia digita-
ta, utriusque hirsuta: caulis teres, brachiatus, vil-
losus: radix simplex, recta.

Dodon. Hist. gall. & latina videtur iconē Lu-
pini silvestris lutei, luteum hunc representare.
Lob. & Pena Ad. Lupinum floribus Genista



vocat, fructus
amaro. Leon
Plant. pag. 64.
Tom. 2. Lupinus
flore luteo.
Caus. hort. Lu-
pinum luteum
flore odoratissi-
mo, Leucostru-
te, vnde & Eli-
spanicum Vo-
lunt nominant,
dicit. Apud
Mathiol. verò
germanicum,
Lupinus silve-
stris flore luteo
quibusdam Lu-
pinus Hispani-
cus. Et tandem
in Hist. Lupi-
nis silvestris

Lupinus

Vicia

Lupinus

Vicia

Tirenscher Veiel. Tab. Geel seigbonen / Lupi-
nus luteus. Caus. Bauh. apud Math. Lupinus
sili. luteus Germ. Viola Turca. Se nina spo-
re amarissimo. Hist. Lugd. Lupinus sili. Dodon-
zi. Clus. Hist. Lupinus flavo flore.

Lupinus luteus siliqua me latus in horto E.
C. provenit: sed semen non maturavit. florentem
vidi mense Augusto & Septembri in horto Ge-
nerosi D. Barons à Moronie Bessfordia, eius au-
tem coniunx vocabat Spanisch Veiel. Mense
Octobri pulchrē aliquando floruit & semen se-
rē maturo fuit in horto E. C. anno 1594. latus A-
pud floruit Iulio quoque anno 1598. cum D. Guil-
helmus Landgravius misisset, sed non maturavit
ob siccitatem anni, ut puto. Geneta habui pri-
mum in horto, flore odorato luto, foliis mino-
ribus, quam in vulgari, maioribus, quam in ce-
ruleo. Basilea vidi in horto D. N. Felici: semina
etiam mature collegi in horto Generosi D. Baro-
nis à Polviller. Anno tandem 1597. Augusto
mense in horto Montbelgardensi plantae albae flo-
rentes, alie semine in tuto vario efficit, cum se-
ptem florum verticillis observavi. Gen. lo. Hent.
Cherl. attulit Montpeho, confirmavitque autho-
ritatem Lobeli, scribentis: Montpeli in suis &
cultus, herbariorumque hortis visitur Lupinus
floribus luteis. C. Bauh. licet apud multos spon-
te oriatur, apud Germanos tamen hortensem fa-
cit. In Germania verò provenit Dodonensis scri-
psit, etiam saepe ad maturitatem.

Locus &

Tempus.

LUPINUS SILVESTRIS, PURPUREO FLORE, SEMINE ROTUNDO, vario.

EX silvestrium Lupinorum genere est vhus
caule cubitali, robusto recto, tereti, striato,
solido, alis satis frequentibus concauo, & ramo-
so: folia Lupini sativi, nonnihil hirsuta: multo
minora, in quinque, sex, vel septem radios lon-
gos, angustos, fissa: pediculo harent longo, sa-
pore ingrato & odioso: flores longa serie crebri
agminatim ascendentes, Cicercularum & Pifo-
rum flores referunt, coloris purpurei: quibus suc-
cedunt siliqua rectae, semina continentes parva,
stigmatibus variata, rotunda: radice potius demissa
satis profunde, non magnam tamen glandulis ad
fibras adnatis strumosa.

Diodoridis videtur silvestris & luteus Lupinus
sili. sativo in omnibus similis, minor verò. Quid
in loco

Descriptio

Folia

Flores

Siliqua

Semina



in loco; autore Cornario, Diosc. dicit *mixtum* pro *mixtum*. Sed declarat rem hanc Plin. lib. 22. cap. 25. Lupini quoque inquit, silvestres sunt; omni modo minores sativis, præterquam amaritudine.

De hoc Matthiol. Ital. cum magnis fig. Lupini silv. floribus roseo colore rufescentibus. Lupinus

agrestis, Ital. *Lupinus sativus*. Aliter apud eundem Hist. germ. Vbi figura notata est litera N. suæ Epitom. Camerac. Lupinus silv. flosculis è cæruleo purpurascens, aut subrubentibus: fructus minuti, colore sordido, vario & nonnihil liuente aspersi: *milde feigboné*. Idem in horto paruitatem fructus exprimens, Lenti comparat, crassiores tamen affirmat. *De hoc & sequentes.*

Czsalp. Lupini genus sponte prouenit in locis arenosis, breuius: foliis angustissimis: siliquis tenuibus, flosculis cæruleis. Tab. *Blein feigbonen*, Lupinus minor flore rubente. C. Bauh. apud Matth. De Lupino flore purpurascens, latifolius, hirsuto, seu silvestri Dioscoridis, dicitur in historia exhibitâ simul figurâ, prout sponte in loco Gramuntio propè Monspelium prouenit, qui luteo altior & ramosior est. Lupinus cæruleo flore angustifolius [cuius iconem proponit ex Tabernam.] foliis multo angustioribus, & minoribus, vt figura ostendit, communiter in septem partes diuisus: flosculis quàm in illa minoribus, quibus siliquæ multo minores succedunt, vix conspicuâ lanugine hirsutæ, quibus semina minuta, rotunda, colore sordido, variis maculis aspersa & amara reconduntur. *Hæc Frater*. Ego verò Lupinum purpurascens, quem Monspelii obseruavi, etiam apud nos cultum, latifolium dicere non possum, nec etiam hirsutum, quia ita leuis hirsuties, vt eius mentionem non fecerit Lobelius in sua descriptione; nec etiam Camerarius. Cur separemus Lupinum minorem Tabern. à Monspelulano purpurascens, consideratâ solâ iconem, non videmus. Nec Tabern. dicit suum Lupinum cæruleum, sed *Rotled* / subrubrum. An Anguill. Lupinus silvestris Dodon gall. Lupinus est silvestris, cæruleus, & ruber, quem postea in Hist. frum. Lupinum silv. purpureum vocat: in fol. autem Lupinum purpureum, flore ex purpurâ cæruleo, aut subrubente. Lob. & Pena Adv. Obs. & Ic. Pl. p. 65. Tom. 2. Lupinus silv. flore purpureo, & puniceo, fructu minore, guttatis, aut fortuitus asperso maculis pullis, cineri ceis & cæsis. Sed horum Icon cum floribus verticilli modo dispositis non placet, in luteo tantum obseruavi. Clus. vocatur Lupinus flore cæruleo.

Lupinum silv. flore purpureo Monspelii primum, dein Florentiæ florentem in agris Aprili mense vidi. A Landgrauio Hassiæ missa grana nomine Lupini cærulei, florem mense Nouembri & Decembri, Montbelgardi Autumno clemen-

Tom. 11.

tiori primò produxerunt. Habui etiam Argentinâ ex horto D. Friderici Meier, quæ satis vix maturare quod tardius florent, quàm luteus etiam, aut albus. Matthiolo silvestrium Lupinorum innumera exoriantur plantæ in Hetruria, quæ Maio mense in campestribus visuntur. Lobelius in satis & cultis Gramuntio loco circumiectis non procul Monspelio sæpè occurrit. Lupinus flore cæruleo (pergit Camer.) crescit sive sponte in Italia circa Viterbium, & Pisam, Neapolim & Romam, ac apud Samnites & alibi. In inferiore Germania, ait Dod. fructus rariis ad maturitatem peruenit. Clusius tandem in Gallia Narbonensi inter segetes non procul Monspelio ultra fluvium Ledum sponte natum obseruabat.

Differunt circa vires Diosc. & Gal. Ille enim hunc eadem, quæ sativum, præstare scribit. Galenus autem amariorem dicit, & ad omnia valentiores sativo, facultatisque valentioris. De vinibus & vñ Lupini silv. ita Plinius nobis sentire videtur. Lupini quoque silvestres sunt, omnimodè minores sativis, præterquam amaritudine. Ex omnibus quæ eduntur, sicco nulli minus ponderis est, nec plùs utilitatis. Mitescunt cinere, aut aqua, calidis. Colorem hominis frequentiores in cibo exhilarant: amari contra aspidas valent. Vlcera atra, aridi decorticatque triti, supposito lineteolo, ad viuum corpus redigunt. Strumas, parotidas in aceto cocti, discutunt. Succus decoctorum cum Ruta & Pipere, vel in febris datur ad ventris animalia pellenda, minoribus triginta annorum: pueris verò inpositi in ventrem ieiunis profunt. Et alio genere tosti, & in destuto poti, vel ex melle sumpti, lidem auiditatem cibi faciunt, fastidium detrahunt. Farina eorum aceto sebacta papulas, pruritusque in balnei illita cohibet, & per se siccata vlcera. Livores emendat. Inflammationes cum polenta sedat. Sylvestrium efficacior vis est contra coxendicum & lumborum debilitatem. Ex iisdem decocta lentigines corrigunt: si verò ad mellis crassitudinem decoquantur vel sativi, vitilignes nigras & lepras emendant. In silv. Lupini semine, ait Porta, guttatim & fortuito asperse macule pullæ & cinere, verè à serpentum designationi lausfacit: unde contra aspidas valet,

Vires & sus.

Color.

Vlcera.

Struma.

Animalia ventris.

Farina.

Aspid.

CICERA ANTIQVIS CAP. V.

Cicera Columellæ bubus Erui loco fresa datur in Hispania Bætica, quæ cum suspensa mola diuisa est, paulum maceratur, dum lentescat. Atque ita mista paleis subtritis pecori præbetur. Sed Erui duodecim libræ satisfaciunt vni iugo; Cicera sexdecim: eadem hominibus non inutilis, neque iniucunda est. Sapore certè nihilo differt à Cicerula, colore tantum discernitur. Nam est obscurior, & nigro propior, feritur primo, vel altero sulco mense Martio, ita vt postulat soli lætitia, quod eadem quatuor modis, nonnunquam & tribus, interdum etiam duobus, ac semodio iugerum occupat. Nos sanè de hac Cicera penitus nihil, quod dicendum occurrat, apud alios inuenimus, quàm quod à Cicere ouino, teste Cornario, sit diuersa.

Vires.

Sapor.

Satus.

CICER IN GENERE CAP. VI.

Ciceris duo fastigia summa licet Diosc. Gal. & Plin. constituent, atramen Theoph. qui hos

Minor fa-
milia.

Latifolius.
Hirsutus.

B. Bauh.
Tab.

Locus &
Tempus.

tempore multum antecessit, aliter longè sentit, ita siquidem scribit.

Epistolar [Cicer] magnitudine, & sapore, & odore [*ἡ τοῦ κικέρους ὡς τοῦ κικέρους* : succis & coloribus] & formâ plerasque differentias ostendit, ut Arietinum & Columbinum. Candida inter omnia dulcedine præstant.

Columbinum

Satiuum

Porro summa illa duo genera *satiuum*, & *silvestre*. Satiui quidem differentia aliquot.

Dioscorides satiui alterum genus Arietinum appellat. Silvestre, foliis satiuo simile dicit, aut odore acri [gravi, Plin.] semine differens.

Plinii differentia

Arietinum

Columbinum

Venerum

Cicercula

Plinius differentias Ciceris plures sumpsit etiâ à magnitudine, figura, colore, sapore. Est enim, inquit, arietino capiti simile, unde ita appellatur, album, nigrumque: est & Columbinum, quod alij Venerum vocant, candidum, rotundum, leue, Arietino minus, quod religio perugiliis adhibet. Est & Cicercula minuti Ciceris, inæqualis, angulosi, velut Pisum. Dulcissimum autem id quod Eruo similimum: firmissimum quod nigrum, & rufum, quàm quod album. Patet ergo & Plinium duo hic fecisse Ciceris genera, Arietinum, & alterum Columbinum, quod & Venerum dicitur: *ἡ τοῦ κικέρους* id, ætipe Eruium Theophrastus vocat, quod his declarat: dulcissimum autem id quod Eruo similimum.

Columella

differe.

Panicum

Falens diff.

ferens.

Eruium

Columella hoc Punicum appellauit, qui & ipse duo Ciceris genera tradit, inquit: Cicer Arietinum vnum vocatur, & alterum Punicum, quod toto mense Martio feri potest. Tandem Galenus quoque duorum generum meminit, Arietini videlicet & Eruii [*ἡ τοῦ κικέρους*]. Ita namque scribit Alim. lib. 1. cap. 22. Cicera nigra exigua, in Bithynia maximè prouenientia, Arietinaque ipsa nuncupant. Item simpl. 6. Erebinthus [Cicer] legumen est flatuosum. Quod verò Arietinum appellatur, &c. At alterum Eruium appellatum, Erebinthus sc. agrestis, ad omnia efficacior domestico est, hoc est tum calidior, tum sicior, quantò & acrior & amarior.

Cataph.

differe.

Theophrastus (autore Cæsalp.) Arietinum & Columbinum differre scribit. Aetius & Columella quoddam Orobianum cognominant, Eruo simile. Dioscorides satiuum & silvestre tradit: inter satiuum, quoddam Arietinum. Silvestre genus videtur significasse Theoph. cum dixit quoddam odore differre: & Aetius Orobianum hoc idem videtur appellasse, nam ei vim tradit, quæ profectò Ciceri satiuo per se non inest, nisi cū Eruo admisceatur, ut Diosc. adinaduerit. Est ergo Cicer silu. Hæc Cæsalp. sed malè. Nam apud Theoph. pro Columbino, ut vertit Gaza, legitur *ἡ τοῦ κικέρους*, & pro odore in versione Theop. Gaza, legendum colore. Dioscoridis primum existimamus idem, cum Orobiano Theop.

Cæsalp. & Gaza

differe.

Plinius, teste Cornario, Cicerculam contextui suo inseruit, Cicerque dixit, imprudenter sanè duas diuersas res confundendo: de Cicercula sub Lathyro dicetur. Cur Cicer præterea Serpillum à quibusdam appelletur, videre est ex Marcello hist. g. lib. 1.


CICER ARIETINVM.

Defci.

Caulis.

Folia.

Sua vi surrigitur Cicer, caulibus hirsutis, durioribus, ramosis: folia pinnata, hirsuta, clanicularum expertia, quorum singularia haud malè foliis Ononidis comparaueris, denticulata, siue serrata: ex quorum alis flores emicant singulares, colore purpurascete, vel albo: filiqua te-



retes; farcta semina, Pila æquali, colore albo, ruffo, aut nigro, cuius capiti appositum corniculum: sapor ad Pila accedit, ut & radix.

Cord. in Diosc. *Cordi diff.*
Est quoddam *rufum.*
genus rufum, *Rufum.*
quoddam can- *Candidum.*
didum, quod *Columbinum.*
Columbinum dicitur, & tertium nigrum, *Nigrum & rufum.*
quod priuatim Arietinum appellatur. Describit hoc in

Hist. cui Gesn. figuram ex Trago addit.

Trag. Cicer, Germ. Zysen Erweissen. Rufum germ. Korb Zysen. Nigrum, Schwarz Zysen. Album, weiß Zysen. Auic. lib. 2. cap. 132. nigri meminit Ciceris. Omnis Ciceris species ad Pila referenda nobis videtur. Erebinthi appellatione (meo iudicio) à Diosc. comprehensa lib. 2. cap. 95. Serapio cap. 80. Cicera *Chempis*; alba, *Karsenna*, nigra verò *Chaber* nominat.

Fuch. Tria præcipua sunt Cicerum genera, album, rufum, & nigrum. Nos ex iis tribus nigri tantum picturam damus. Differunt potissimum in floribus: hoc enim, purpureos, album verò candidos flores producit.

Corn. Cicer alterum Columbinum, quod & Venerum dicitur Plinio, est, quod *ἡ τοῦ κικέρους* [Eruium] Theoph. dixit, & Columella Punicum appellauit. Nostri Bibern corrupta voce Latina dicunt. At verò Cicera à Cicere omnino differunt. Officinæ etiam hodie Cicer rufum, ac nigricans albo præferendum sciunt.

Cornarii

differe.

Columbinum.

Venerum.

Orobianum.

Punicum.

Rufum.

Matth. in Diosc. In Cicerum genere habetur candidum, quod & Columbinum vocatur. Est & rubeum, Venerum dictum. Habetur item & nigrum, cæteris minus, quod Arietinum appellant. Eadem tradit Matth. in post. com. Italicis, quo in loco & mihis pingit, & describit.

Matth. diff.

ferens.

Angul. Ciceris species tres, albi, ruffi, Arietini. Albi duplices, Arietini & Eruii, à se inuicem tantum figurâ differunt. Vnum simile capiti arietino, alterum politum, ut Eruium, id demonstrat Gal. lib. 9. de comp. med. l. loc. Arietini meminit etiam Hippoc. Ruffi duæ etiam species, Arietinum & Eruium. Niger simplex colore tantum differens.

Dod. Gall. *ἡ τοῦ κικέρους*, Lat. Cicer Arietinum, offic. Cicer. Idem de frum. postea describit, floribus aut candidis, aut ex purpura rubescentibus, seminibus colore aut candidis, aut ex subrubente purpura nigris.

Dod. diff.

rufum.

Lonicerus duas habet figuras, quatinus una sufficeret.

Lob. & Pena Adu. Cicer satiuum Arietinum Dioscoridi, Offic. Cicer rubrum; color albus quibusdam: alia obsoletè nigricant, plurima ex fulco purpurascunt. Obl. Cicer satiuum Arietinum. Ic. Pl. Cicer Arietinum Diosc.

Cæsalp. Cicer semen propè testiculis simile, colore aliis ex candido pallefcit: aliis ruffus: aliis niger. Erebinthon Græci vocant.

Camer.

Camer. Epit. Cicer. Item horti, Cceres albi, purpurei, & nigri.

Tum quoque tria constituit genera. Arietinum, Nigrum, & Columbinum, vel Venaceum, quod non meminisse vidisse.

Nomina
Linguae

Cicer, Cicer Arietinum, Cicer sativum Hist. Lugd. Epit. Germ. Ziser / Birkhern / Ziser: Unde Rücher Erbs. Belg. Ciceren. Gall. Ciche, & Pois ciche, & Poix Pechu. It. Ceci. Hisp. Granancos. Arab. Chemp, Hamos, seu Arhamos. Angl. Ciche. Boh. Cygeua. Hung. Bagolychborso / Bubonis Pisum.

Locus &
Tempus.

Cicer rubri à nobis sati in Horto E.C. Montbelgardi, facile proueniunt, si eos non inueniant mures, qui auidè colligunt, tempore pluuioso facile corrumpuntur. Habemus etiam Ciceres flore & semine albos, quorum semina missa Stutgardia: Aprili sata, florere Iulio. Geneuæ etiam mihi missi sunt rotundi flauescetes, omnium quos videris, minimi, politi, qui sati prouenire cum flosculis albis, florescentes Augusto: Geneuæ alioqui frequentes, satis magni, angulosi, & copiosi, Monspellin esu vulgares. Geneuæ, Lugduni, & Basileæ, Ciceres magni, flauo, rubescetes vel nigricantes, flore subpurpureo, frequentes in hortis. Cicer nigrum recepi ex Anglia missum per D. Gargillum, & Stutgardia. Seritur Vere, autore Matth. appetente, pingui solo, & maturefcit Æstate, demetitur arescentibus siliquis: nam si citius extirpetur, semen rugosum euadit. Dod. In Italia, Hispania, & Gallia passim in agris seritur. Fuchs. pullo, crassoque solo gaudet. Floret Iunio & Iulio mensibus, atque subinde in siliquis semen producit.

Vites & v-
sus.

Cicer, ut placet Dioscoridi, sativum alio commodum est, urinam ciet, flatus gignit, bonum colorem inducit, menses & fetus educit, & lac gignit, Cataplasmatibus modo imponitur, maximè cum Eruo coctum, ad testium inflammationes & fornicarias verrucas. Cum Hordeo verò & melle, ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetigines & cancrorsa, ac maligna vlcera. Alterum porro ipsorum genus Arietinum appellatum. Vtrumque ciet urinam, si decoctum ipsorum cum Rosmarino detur, ad morbum regium & hydropem. Lædit autem & vesicam exulceratam, & renes. Cætera, quæ Diosc. de curatione verrucarum prodidit, tanquam superstitiosa & magica hæc à nobis commemorantur. Sunt autem hæc: Contra myrmecias & acrochordonas iubent aliqui noua luna earum capita eminentiæ sue singulis Ciceribus tangere, deligataque in linteolo semina illa post se abicere, ut acrochordones decendant. Non admodum consuetum est, autore Gal. Alim. vrbani hominibus ex Ciceribus pulcem conficere, à rusticis verò nonnunquam vidit parari: quemadmodum & ipsorum farinam cum lacte elixari. Non enim ut Fabæ & Pisæ possunt comminui, ut ex ipso fracto pulmentum, quod *spyrus* dicitur, fiat. Apud multas autem gentes mos est Cicera in aqua elixa mandere: nonnulli verò nuda ipsa sola, alii sale modico condientes, esitant, nostrates verò ex siccis caseis quiddam farinæ simile facientes, id ipsis aspergunt. Est autem Cicer edulium non minus, quàm Fabæ, flatulentum, sed valentiùs nutrit, quàm illa. Ad venerem autem incitat, creditumque est etiam semen generare, unde quidam equis admissariis ipsum exhibet. Inest præterea Ciceribus facultas abstergendi maior, quàm Fabis, aded ut quidam ex ipsis calculos in renibus constantes manifestè comminuant. Nuper autem cum de Fabis ageremus, sermonem

Tom. II

fecimus omnibus immaturis fructibus communem. Eadem porro & de fructu Ciceribus audiuisse existima, quæ de Fabis fructu diximus. Quandoquidem friza omnia flatum quidem deponunt, verùm difficiliter coquantur, & ventrem magis sistunt, crassiorisque lucci alimentum corpori exhibent. Quæ præter iam dicta lib. 6. simpl. tradit, hæc ferè sunt. Cicer ventri commodum, ciendæ urinæ idoneum, lacti generando aptum: prolicit verò & menses: porro, quod vocatur Crisum, hoc est Arietinum, cæteris efficacius urinam prouocat: decoctum eius calculos renum confringit: alterum verò Cicerum genus (vocat autem Orobæum) eadem vi possit, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi & modicè humidi, participes item sunt amaritatis: cuius vi & lienem & recur, & renes expurgat: psorasque (Gerard. addit & lepras) & lichenes extergunt, tum abscessus post aures prouenientes (modè Græci vocant) & testes induratos discutunt: tum etiam vlcera, quæ Cacoëthe vocant, cum melle sanant. Quorum vltimum in cibis idem supra docet. Nigra autem sunt ea, & exigua, in Bithynia præcipuè nascentia, Arietinaque vocata. Huius ex aqua decoctum potare præstiterit. Vescuntur & virentibus adhuc Ciceribus homines, ante adeptam maturitatem, quemadmodum & Fabis. Cæterum de viribus Ciceris Plinius agens, etiam silu. genetis meminit, velut etiam Galenus fecit & Diosc. quem ita declarat: Cicer & silu. est solus satiuus simile, odore graui. Si largius sumatur, aliis soluitur, & inflatione contrahitur, & tormina. Tostum salubrius habetur. Fanna vtriusque vlcera manantia capitis sanat, efficacius siluestris. Cornuales & iocinorum tumores & serpentium morsus. Ciet menses & urinas grano maximè. Emerda. & lichenas, & testium inflammationes, regium morbum, hydropicos. Lædunt omnia hæc genera exulceratam vesicam & renes. Gangranis vtiliora cum melle, & his quæ cacoëthe vocantur. Verrucarum in omni genere primà Lunâ singulis granis singulas tangunt, eaque grana in linteolo deligata abiciunt post se, ita fugari vitium arbitantes. Nostri præcipiunt Arietinum cum sale discoquere, ex eo bibere cyathos duos in difficultatibus urinæ. Sic & calculos pelli, morbumque regium. Eiusdem foliis, sarmentisque decoctis in aqua quàm maximè calida, morbos pedum lenit: & ipsum calidum, tritumque illitum. Columbini decocti aqua, horrorem tertianæ & quarianæ minuere creditur. Nigrum autem cum Gilla dimidio tritum, oculorum vlceribus ex passo medetur. Hæc ille. Cicera difficiliter cor coquantur, inquit Simeon Antiochenus, & excrementa gignunt. Venerem stimulant, magisque quàm Fabæ nutriunt, obstructions tollunt, & menses educunt. Habent salam simul, & dulcem qualitatem, & ob saluginem ventrem mouent, propter dulcedinem autem urinam. Inflationes quoque faciunt, & lac gignunt extergendique facultatem obtinent. Nigra medicamentosam vim habent: urinam enim vehementissimè mouent, & calculos renum, & vesicæ frangunt. Nullam verò legumen sic, ut Cicera, præcipuè autem nigra, & parua, lapides frangere potest. Id verò magis eius ius: quod tamen vesicæ morbis supra cætera legumina officit. Cicera verò rubra calidiora, & crassiorum sunt partium, quàm alba. Omnia autem urinamducunt. Madefacta nocte vna in aqua, & sumpta, lumbricos eiciunt, sed qui vitur, se exciuiet horas oportet. Imposita ut cataplasma

Bb 2

Tumores.
Scabies.

Dissect. et
Galenum mo-
tatur.

Reiicitur o-
pium Tragi.

ma parotidib. molliunt & discutunt tumorem. Farina horum aceto subacta, & scabiolis inuncta prodest. Iuseorumdem ichericos iuuat, & urinam albam reddit. Oportet verò eis neque ante cibum neque post vi, sed in medio. Tragus dicens ciceris in aqua decocti ius calculum pellere, melius placet, quam qui euidenter frangere affirmare non erubescunt, inter quos est Diosc. & Gal. Si tanta vis est cicerum, maximè Bithyniensium, ut euidenter frangat calculos, pretiosiores erunt auro & ceteris omnibus lithonhryptis: nullum enim existimamus veraciter diei posse frangere calculum, nec etiam si fieret, euidenter id apparet. Cur porro Tragus primum decoctum effundat, conderatione eget. Matth. non reiicit primum decoctum, quia ita scribit. Puerperis confert in aquam infusum: manè bibitum, ita ut post sex horas nihil comedatur, lumbricos ex intestinis eicit: prouocant, absterunt, attrahunt discutunt, incidunt, & flatus excitant. Farina ex Intybi stillatiua aqua decocta & illita, iocinoris tumores resoluit, & serpentum moribus medetur.

CICER SILVESTRE MUL- TIFOLIUM.

Descriptio.
Radix.



Folia.

Cicer silvestre multifolium, perenni radice, crassa & dulci donatum est: ramos bicubitales & altiores profert, striatos, tortuosos, concauos: folia hirsuta, pinnata, satini ciceris positi, sed longiora, angustiora, nec per ambitum crenata, ad Lætis maioris folia propius accedentia, nisi in obrusum

& subrotundum mucronem desinerent, subdultia: coniugationes multæ, ad tredecim supputari, ex foliorum alis pediculus palmaris exit, rigidulus, spicam breuem sustinens florum sublateorum, quibus racematim coherentes succedunt folliculi breues, ventriosi, hirsuti, semina continentes, autore Dod. exigua, dura, plana, splendentia, gustu Phasioli.

Flora.
Folliculi.
Semina.

Radix.

Matth. in
Hist.

Dolemus iconem nostram depictam nobis absensibus, ex iconè, quæ non placet, quæ est apud Lobelium, ac ex non bona deteriore factam.

Cicer silu. 1. Tab. Icon. wildt Zifererba. Cicer Matth. in Hist. Lugd. & Cicer silu. 1. Dalech. Sed hic duas icones vnius plantæ exhibitæ existimo. Cicer siluestre Matth. Clusio exili candicante flore.

Cicer silu. omnibus ferè notum esse, Matth. in Diosc. quidem scribit, ast nec describit, nec depingit. In post. com. cum mag. icon. & Italicis ponit figuram, sine descriptione. Idem in Epit.

Cicer silu. satino simillimum esse dicit, sed saba non denticulata, & siliquis minores, rotundioresque, plantam verò in vniuersum hirsutiorè, atque asperiorè. Cicer autem, de quo hic agimus, non est hirsutius, neque asperius satino, neque etiam simillimum, icon quoque Matthioli non tale demonstrat: suspicamur eum eiusmodi imaginariè scripsisse, in com. siquidem non describit.

Cicer silu. Camer. Epit. Matth. Eidem in horto, fructu tamen nonnihil differens, quia maior & oblongior.

Cicer silu. herbariorum aliud, Lob. & Penz. Ad. folliculis Coluteæ, quod longius videtur recedere à Diosc. silu. Cicere. Matthioli huius picturam mentionemque ridiculè inculcat in indice, non describit. Obseru. & Ic. Pl. Cicer silu. Herbariorum. Cicer silu. ad me [Geln. horti] Dalech. Lugduno misit. An Angul. Cicer siluestre.

Ciceris silu. quemadmodum à Matth. depingitur, fructum, aliquando ad Dodon. Cl. Cortulius misit. Odor autem herbæ qualis sit, compertum Dod. non habet: is autem si fuerit, semis dubio procul. Videtur eidem in Hist. cicer hoc silu. primum magis quam reliqua cum silu. cicere conuenire.

Cicer siluestre Matth. Petrus Turn. Angl. mihi Heidelbergæ attulit, dicens radicem crassam, dulcem, saporitque Glycyrrhizæ habere. Plantam siccam D. Agerius dedit, & semina, quæ per me facta in horto Ill. E. C. Iulio mense floruerunt. Gignitur, ut Hist. Lugd. scribit, in saluoso saliceto, quod Rhodanus aluit prope Lugdunum.

CICER SILVESTRE MAIUS THALII.

Cicer silu. maius. scribit Thalius in Hare. Silu. conuenit ferè cum eo, cuius Matth. iconem exhibet, nisi quòd folia non sint rotunda, ita ut Icon Matthioli habet, sed oblonga, nigra, hispida, non dentata (quam ipse quoque notam in suo requirit, Lenticulæ foliis similia. Sunt & costæ, quibus folia inhaerent, Matthioli plantæ costis longiores multò, pluribus itidem foliis præcinctæ. Caulibus virgineis humi reflectitur, brachiatis, ac latè expansis. Flores profert in densa spica conferum conglomeratos, Lenticulæ similis, luteos, quos subsequuntur membranæ vesicæ, agminatim coherentes, sublaues, pilosæ, in acutum mucronem prominentes, minores siliquis ciceris Arietini, quibus conduntur paræ siliiculæ plenæ seminibus rotundis, paruis, flauescens, similibus ferè Loti satini seminibus.

Vocat autem hanc speciem maioris nomine, quòd eiusdem dux aliæ species reperiantur, quarum altera mediam magnitudinem obtinet, altera longè minor est.

Misit mihi ramum pro cicere Thalii Cl. D. Doldius, quod an ab antè à nobis tradito diuersum, dicere non ausim: tredecim in eo coniugationes foliorum: flores planè similes videntur: verum foliola apparent longiora, quàm demonstrat Icon Camerarii: verum ea varietas pendet fortè à cultura, talem habeo collectam Argentinx in horto Frid. Meier: non sunt tamen hispida, quod de suo prædicat Thalius, vix apparent pili, quemadmodum etiam in præcedenti.

De hoc autem hæc Doldius scribit. Hanc pro cicere silu. maiore Thalii agnosco, omnia respondent, excepto eo, quòd vesicæ dicat habere agminatim

Folliculi
Coluteæ.

Cicer silu.
herbariorum.

Loca &
Tempus.

Folia.

Caulis.
Flora.

Vesicæ.

Siliiculæ.
Semina.

Inflorescentia
raro.

Varietas.

minatim coherentes, subflauas: cum huius sint nigrae, neque vesicæ siliculas inesse intelligere possum, sed ipsæ siliquæ agminatim inductæ, vesicæ singulas referant, semen subflauum, compressum. Serpit longè, folia dulcia sunt, & radix, ut ad Glycyrrhizæ silu. referri possit.

Prouenit, auctore Thilio, Cicer silv. maior, locis pratensibus, Minus autem, quod duplex, in montibus Hircinæ adiacentibus, ac meridiano Soli expositis nascitur.

CICER SILV. TRIFOLIUM.



Digitalem demittit radicem, singularem aliquando, alias in paucas fibras diuisam, lignosam, lodrantalem, quæ terrâ versus in plura capita, squammatâ diuidi incipiens, ex singulis vnum, vel plures tollit caules cubitales, & in ramos aliquando subdivisos, linquescentes: hirsutos: pediculis autem longis

tria hærent coniunctim folia, maiora quàm satui Ciceris, rotunda, hirsuta, circumquaque serratæ: flores Ciceris, medioctiter magni, quos siliqua excipiunt binæ seræ, ex vnico longo pediculo, vnciâ longiores, hirsutæ.

Cicer silv. 2. Tab. Ic. mld. Zisererbe 2. Cicer silv. verius, è Sabaudorum herbis. Non abs re quis coniecerit, inquit Lob. Oblit. Dioc. silv. esse: flores purpureas, semina Ciceris multo minorâ, compressa, & potius Cicerula similis. Item. Ic. Pl. Cicer silv. verius. Cicer silv. Dodon. in fol. alterum, quod ad iconam, tertium, quod ad descriptionem. Ponz tandem in Baldo, Cicer silv. alterum Dalech.

Geneuz prouenit in monte Saleuz.

OCHROS IN GENERE.

CAP. VII.

Ochri (Eruliz Corn.) Pisis magis secedunt, minus instant, & probè alunt: ex autoritate diuini Hipp. de diet. lib. 2.

Theop. Ochrorum meminit, vnico tantum in loco. Hist. sc. lib. 8. cap. 3. dicens: Legumina alia oblongiori sunt folio, ut Ochros (Cicera.) Caulis autem procidens.

Mulcè plenius de hoc egit Gal. alim. lib. 1. 29. cap. Ochron [scilicet Eruliam vertunt] homines, quomodo & Fenugrecum, prius in aqua, quoad radicem produxerint, macerantes, venis subducendi gratia mardant, ante alios cibos, garo infingentes. Succum autem cum coctus est, atque in corpus distributus, hærent copiosioris alimentum, quàm Fenugrecum. Atque in Alexandria iu-

Tom. II.

uenem quandam nouit arti Medicæ deditum, qui per annos quatuor singulis diebus solis his præ obsonio, utebatur, Phascolos, dicit, Fenugrecum, Eruliam, & Lupinos. Attingit autem interdum & Oliuas ex Memphitide, & blera, & paucos fructus, ens, qui citra coctionem manduntur. Propositum enim ei erat, ignem nunquam accendere. Omnibus certè illis annis sanus fuit, nec vlla in re habitu corporis, fuit deteriore, quàm ab initio. Mandebat autem fructus huiusmodi cum garo scilicet, oleum aliquando solidum ei adiciens, nonnunquam etiam vinum, alias acetum, interdum verò salem tantum, sicut & Lupinos. At de salubris quidè victus ratione in lib. de tuend. sanie, copiosè tractauimus: tractabimus autem postea etiam summatim in opere hoc. Nunc autè illis, quæ de Eruliz & Phascolis dictæ sunt, id quoque addatur, hæc ædulia medium quodammodo locum obtinere inter ea, quæ succum hominum, aut præsum, generant, inter concoctu facilia & difficilia, tardè & celeriter transcurrentia, flatulenta & flatibus expertia, parum & multum nutriendia. Nullam enim efficacem habent qualitatem instar quorundam, quæ acres, aut acerbos, aut salios, aut amaros, aut dulces habent sapores. Et cap. 16. Læthyrus [Cicerula] substantiâ Ochris (Eruliz) & Phascelis similis. Tandem cap. 28. Ochros (Eruliz) Hipp. Diocl. Ceterum vide plura sub Phascolo & Dolicho, Veterum.

Theodorus (Cæsalp.) Eruliam vertit id quod à Theophrasto Ochros vocatur, quamuis aliquando Cicerum vertat, quasi putauerit idem esse, Eruliam, & Cicerum, & Ochrum.

PISUM IN GENERE, EX
Veteribus & Neotericis.

CAP. VIII.

Pisum, quantum quidem ex Theophrasto colligere licuit, oblongius producit folium, caulem verò humi procidentem. Huic morbus, ut omnibus seminibus, ob alimentum, & liquet temperiem euenit: videlicet tum plus, minusue est, vel etiam cum non tempestiue humescit. Sic enim & vermes Ciceri, Cicerula, Pisi que in nascuntur, & erucæ. Pisum omnium maxime fragile est, nam & rubigini est opportunissimum, propterea quod folia habeat numerosa, & radicem imbecillam.

Ceterum, quemadmodum Dioscorides Fabam, cuius vires indicat, non describit, ita quoque nec Pisum describit, nec eius meminit. Vnde turpiter errant, qui Cicer arictinum Dioscoridis censent esse Pisum vulgare, quod germanicum Erucisen sono accedat ad Erebinthum: necnon ii, qui putant Pisum, Germanis Erba dictum, Eruliam esse Latinorum & Orobum Græcorum, vocabuli similitudine adducti. Nihil enim probat vocum ista similitudo in linguis tam diffitis. Ita enim Pulegium Polium fuerit, inquit Turnerus, quia Germani Poley interpretantur. Ieiunum ergo & infirmum apparet esse eiusmodi omne argumentum, à nudo nomine petum, nisi descriptio & facultates conueniant: at descriptionem & vires Pisi cum Orobo & Erebintho non conueniunt, ut dictum est locis. Erebinthus, auctore Theophr. in terram non procedit, sed oblique surgit, Pisi autem in terram eaduca sunt. Ergo. Pisum folia habet longa, Erebinthus non item, Ergo. Galenus de Cicere arictino, & Pisi, ut de duobus diuersis leguminibus, duobus distinctis agit capitibus.

Glycyrrhizæ silv.
Locus.

Caulis.

Folia.

Flora.

Silqua.

Cicer silv.
Dioc.

Locus.

Eruliz.

Ochri.

Oblongius
folium.
Caulis,
procidens.

Corradis.

Theod.
ror.

Pisum
morbis.

Rubig.

Error
morbis
Non est Cicer
arictinum.

Non est Eruliam.

Plinius quoque vno capite Cicera à Pisis separat. Erebinthus itaque, latinè Cicer, non est Pisum. Orobum Theoph. obliquè crescere affirmat, At Pifa nostra cuiuscunque generis, sunt *Eryngium* [humili strata.] Galenus etiam scribit omnia Orobi genera, planè esse amara, At omnia Pisorum genera, planè dulcia sunt, sine omni amaritudine, Ergo. Ceterùm, verba Plinii de Pifo, nos in dubium vocant, ancipitesque faciunt, an ei cognitum fuerit, necne Pisum. Ita enim inquit: Cicercula nūti Ciceris, inæqualis, angulosi, veluti Pisum.

Eruilium
Vulg.
Mes. Almes
jabulis.

Legumen, quod Eruilium vulgò vocant, teste Manardo, non est id quod Arabes *Mes*, vel *Almes*, vel *Meise*, neque id, quod *Almelic* vocant. Auicenna asserit *Almelic* esse Erbum. Quod verò Erbum Auicennæ (Orobon Græci appellant) nos Eruum, sit tam ab Eruilia nostra, quàm *Mes* Auicennæ diuersum, clarum est: Eruilia oculum non habet. Scribunt præterea Auic. & Isaac in cortice *Mes* esse ponticetatem, [ita enim ipsi appellant saporem acerbum {*erubrum*} linguam adstringentem, qui sapor ab Eruilia alienus. Eruilia quoque non sunt Pifa: scribit enim Plinius, Pifa habere angulos, vt Cicercula, quos in Eruilia nostra non videmus. Quoniam nomine hæc res ab Antiquis censeatur, quam Eruilium Plinii voce nonnulli, vel parùm ab ea deflectendo *Rouilliam* vocant, *Pisaretos* Veneti, *Rodiones* alii, hoc operosius est valdè iudicare. Sunt tamen quæ ipsum mouent, vt credat Eruilium esse id, quod Theoph. & Dioscles Dolichon vocauerunt, & Galeni tempore Phasiolus, vel Lobus dicebatur, & à Theodoro Siliqua appellatur: quamquam Siliqua existimanda est aliud legumen iuxta Latinos Auctores. Eruilix folius inter legumina edi ab hominibus siliquas simul cum semine, nemo est qui nesciat: cum & crudæ aliquando ab otiosis, & coctæ à nobilibus, confecto præsertim ex his delicato quodam pulmento, libentissimè mandantur, aliorum leguminum siliquis in cibum iumentorum proiectis: Si igitur, Eruilix sunt Dolichi, quis ambigat malas esse, & esum harum prohibendum fuisse vulnerato prope genu. Hæc Manardus existimans Eruilium esse. Pisum. Sed falsum & infirmam eius esse opinionem quotidianus ostendit vsus. Hodie enim non vnus solum plantæ siliquæ eduntur, sed duarum, nempe Pisorum vulgatum, cuius varix species, & Smilacum hortensium, siue Phascolorum dictorum vulgò. Sed dicere quispià poterit [autore eodem] de Phasiolo i.e. de legumine, quod Latinè dicitur Eruilia, sub Phasioli nomine scripsisse Dioscoridam.

Manard.
not.

Eruilia.
Ph. folium
Dugl.

Orob. non
est.

Quod ad Orobum attinet. Mundella in exam. simpl. med. Ant. Mulz Brail. eum existimat nequaquam Eruilium esse posse domesticam, quæ Ianuario mente seritur, & paxillis quibusdam postea inhaerens, eosque scandens, fructum parit, de qua Manard. lib. 1. sed Eruilium, quæ Ferrariensisibus *Rauione* dicitur. Quicquid autem illud est, certum est nullo modo Orobi facultates Eruilix conuenire posse, cum quia Orobus grauediosus traditur à Diosc. & sanguinem per vrinæ meatus, si, vt ille & Galenus aiunt, largius sumatur, euocans, tum quia in cibis eius vsus damnatur, tanquam ingratiſſimus, amarusque est secundum Galenum. Satiua verò Eruilia Brixianis lingua ipſorum vulgari *Rouier*, nostris autem Veronenſibus *Ris* appellata, neque amara est, sed potius dulcis, & ad cibum homini non tantum non damnata, sed suavis, & quæ plurimum come-

dentes oblectare possit. Sanguinem verò per vrinæ ductus, quod quidem aut Mundella viderit, *vsus* *et* aut aliunde acceperit, nunquam ciere visa est: neque capiti grauitatem adfert, vt ex his, qui ea creberrimè velci consueverunt, manifestum est. Quare plurimum hallucinantur Pharmacopolæ, qui Orobi vice Eruilium altilem seruant, eamque pro Orobo vendunt. Præterea quis vnquam suspicari posset in Eruilia hac nostra illam secundæ sedis exiccationem inesse, quæ in Orobo ad curandas gangrenas pollet:

Pisum *Lat.*
cyth.
Nisi *h* *autem* *græc.* Pisum Latin. dicitur, Officinis hoc nomine notum. germ. *Erbs* oder *Erbsen*. gall. *Pois*. Sic autem à Pifa, loco, in quo copiosissimè nascebatur, nominatum est, inquit Fuchic. Hist. c. 240. Duo apud nos genera Pisorum reperiuntur. Vnum in aruis caducum, humi serpens, quod gentes Germani *Rhein felder Erbsen* nominant. Huins, vt pote vulgaris, picturam haud damus. Flori papilionis forma circa vmbilicum, grans r. turdis, & vt Plinius lib. 18. c. 12. ait, angulos multos, inæquales, habentibus: mirari satis non possum, vnde plerisque suspicio orta sit, vt Pisum nostrum legitimum esse dubitauerint. Scio autem esse, qui legumen hoc, quod hodie passi *P. sum* appellatur, putent esse cicer Arietinum: quorum sententiā probare non possum, quod Plinio teste, cicer Arietinum non sit dictum, quia valulæ effigiem arietini cornu exprimant. At non placet Fuchium discrimina florum & seminum in Pisis non ostendere.

Cicer *Arietinum.*

Pisorum, sic enim vocant vulgò, sed perperam, *Pisum* *tria* in Germania tria satius genera celebrant, quæ *genera* *Ger.* *Tragus* *felder Erbsen* / *Blotts Erbsen*, *man perpe-* *ram* *Pisa.* & *Pfal ober groß garten Erbsen*, dixit. *Pi-* *sa* *agres-* *tia*, flore candido: Ex his nonnulla reperiuntur, quæ subrubricant, vbi decocta fuerint, *reses* *flore.* floribus veluti rosei coloris comantia. Inter leguminum genera vix vllum vsitatus est Pisis, præsertim verò agrestibus, quæ nullo adminiculo sulcata, humi serpunt [potius decumbunt.] Omnia Pisorum genera alſiosa sunt, Hiemisque impatientissima.

Pisi nomen huic legumini vno consensu imponunt omnes. Manardus statuit Phasiolum & Dolichum. Ego cicer Arietinum Diosc. esse iudico, quod ille lib. 2. cap. 59. sub Erebintho describit, quæ vox cum germanica appellatione *Erbsen* *fue* *Erbsen* satis conuenit. Hebræi siue Thalmudistæ potius, *Par Kedan* vocant.

Arabes, quod sciam, Phasiolorum haud meminere, nisi fortè *Mes* ad eos pertineat Peregrinos Phasiolos tertio loco à nobis descriptos. Serapiqn. *Mes* *Rouillas* esse iudicamus.

Duas figuras habet Lonicerus cum his titulis, *Groß oder Blotzerbeyß* / & *klein oder feldt Erbsen*. Item *Erbsen* *Græcis*, vnd Latinis *Pisum*: magna dicuntur *Groß Hogerbeyß*, *groß garten Erbsen* / parua *föld Erbsen*. Varix sunt species colore, magnitudine, & figura, satius & siluestres. Et Paulò post aliam Pisorum figuram ponit sub hoc titulo, *klein fasselen Dolichos*: eundem in descriptione longè aliam plantam intellexerit. Ibidem in prima descriptione ex duabus plantis, nempe Phascolo Italorum, & Phascolo Tragi, vnā fingit descriptionem: omnia pro suo more confundens. Pisorum duas habet figuras Matthioli sub titulis *Pisi maioris* & *Pisi minoris*: sic duas Pisorum faciens differentias: traditque Dioscoridem de Pisis non scripsisse, ac præterea Brassauiolam credidisse Eruilium, quæ Theoph. Gal. ac Paulo

Ochros

Ochros appellatur, legitimum esse Ervum, nominis vicinitate deceptum.

Pisum. Piscolus vulgò Cæsalp. teste, appellatur semen candidum & rotundum: flores colore aliis rubente, aut vario, cui in siliqua pauciora sunt grana, grandiora & rotundiora: cui plura, eadem minora sunt, & magis sarcta. Græci Phasiolos & Phaseolos appellant, ut Galaninaducrius, alios à Phatelo: Siliquas lobos appellant, vnde & ipsi Phasioli lobii, id est, siliquæ dicuntur: eisdem Dolichos appellari testatur apud Theoph. Hippoc. & Dioscorid. Siliquam apud Theop. Theodorus vertit. Dioscoridi Phasiolus, Plinio Faseolus vocatur.

Phasioli. Pifa à Pifa loco (inquit C. Bauh.) ubi olim copiose nascebantur: quæ diuersorum generum sunt, maiora quæ hortensia, cuius fructus dum virides rotundi, resiccati angulosi fiunt: colore candido, alius sordido: hæcque duplicia, vel sine folliculis comeduntur, vel simul cùm folliculis, & leptoloba dicuntur: sunt quadra: sunt minora, quæ vel hortensia, & ramis affixis in altum scandunt, & ramulare Pisum dicuntur: vel in agris feruntur, & humi serpunt, & sunt alba (quæ maiora & minora) vel viridia, vel cærulea, quæ rariora, vel ruffa, quæ nostris cinerea dicuntur. Est Pisum proliferum, ubi plures siliquæ simul iunguntur: sunt ipsa Americana rubra, sunt & siluestria, de quibus omnibus in Historia.

Diff. Causa. Nomen, Pisum, Germ. Erbs. Gall. Pois: It. Pisello. Pise: Angl. Pease. Boh. Prach: Hung. Borso.

PISA POTISSIMUM VULGARIS, parva, alba, siue aruensis.

Generali quadam notione Pifa circumscribemus, quorum differentias petet studiosus lector ex synonymis. In genere ergo hoc legumen, sicuti alia, brevis durationis, tenuis est radice, fibrosa: caules fistulosi, alienæ opis indigi, & nisi palis sustententur procidui: folia genicula aduerso situ ita complectuntur, ut

ab eo transadigi videantur: quæquam in adnatis furculis, eorundem sit pinnata dispositio, eo quod furculi superest, in capreolus textiles, quibus proxima quæque accipit, abeunte: flores ex geniculis pediculis nudo insident, forma ad Genistæ flores accedentes, sed colore albo, vel purpureo, vel ex albo virecente, vel variegato: siliquæ his succedunt, binæ ferè, cylindricæ, pensiles, biflores, & carnosæ pulpa, minus tamen multo, quàm in Faba, in quibus reclusa ad commissuram annectuntur pifa, aliàs maiora, aliàs mino-

ra, nunc rotunda, nunc quadrata, interdum flava, rubra, & virecentia.

Cæterum Pisorum, titulo iam à nobis propositum, Eruliz nomine meminisse existimamus Mundellam & Manardum: de hac nos autè, Blein oder feldt Erbeis/ Pifa flore albo, minora alba. Fuchf. Pisi vnum genus in aruis caducum. Trag. Veldt Erweyssen, Pifa agrestia flore candido.

Dolichi non sunt illud Pisorum genus, ut rectè contendit Matthiolus, quod Antonius vulgò dicitur Rouiglione, Tridentinis verò Arabeia, ut Manardo placet. Quandoquidem hanc sub Ochri nomine, tam Galenus, quàm Paulus descripsere. Idem in com. cum mag. figur. Pisum minus duum generum statuit, album & cinereum, quod Ervum vocant quidam, Ananienfes & Tridentini Arabeia, alii Rouiglione, atque Tragum perpetam putasse Pisum cicer esse Arretinum. Et in com. Ital. cum mag. fig. Piselli minus si semen bianco & l'altra beverino. In Epit. Cam. Pisum minus, græc. miv uixep. It. Pisello minore, duum generum, album & subnigrum. In Hist. germ. Bleine feldt Erbsen. Pisum minus. Flores albi. Hæc variis in locis Matth. quem miror vni minorum Pisorum suorum tribuere modò colorem cinereum, modò subnigrum.

Meminit Cam. in horto in genere Pisorum vulgari & siluestri. Huc tandem quoque refero Tab. 6. & Hist. Pisum minus 2. Die Fleine feldt Erbsen, quamvis Compiler nihil eui de eo scribit.

Ex Pisis, parvis, albis Montheigardi agri conferuntur, vii etiam in horto Ill. E. C. Vidi Bessfordia adhuc in horto in fine Augusti. Apridis gaudet locis, autore Fuchfio, frigoris namque impatientissimum. Tepidum itaque locum, & cælum frequentis humoris desiderat. Iunio & Iulio mensibus floret, & subinde etiam semina in valulis profert.

PISI PVLCHRA SPECIES folio anguloso.



Pisi varietatem in horto Fridenici Meieri, quem Argentinz colit, collectam dedit D. Agrius. Cuius viticulæ, quàm vulgari multo teneriores, delicatioresque apparent: at foliorum origines foliola binata, Aphacæ Dodfolius quodammodo & mulanda, obtusiora, ima vtrinque partè angulosa, &

quasi ferrata. In pediculis verò, qui in capreolos desinunt, quaternæ tantum foliola hærent gominâ oppositione. Pisi vulgaris minora, plerumque etiam denticulata. Flores singulares tenuibus pediculis hærent quàm in his multis.

Bb 4

Descrip.
Pisi varietas.
folia.



Radix.

Caules.

Folia.

Floris.

Siliqua.

Locus.

Descriptio.

minores, rubelli in sicca planta: quibus singulis singula succedunt filiquae.

PISA PARVA VIRIDIA.

Pisa viridia, minora, rotunda, eiusdem valde magnitudinis cum Pisis ex purpureo variegatis, ni minora, quaternis, vel quina vna in filiqua, coloris ex albo virentis, unicoloria, dempta ea parte, quâ filiquae adherent, quae pars nigricat, in foliis discrimen non animaduerto.

Pisi tertia species, Dod. gall. fructu albo, aut viridi, interdum cinereo, aut nigricante. Graecè *ἄρα* Plin. Erulia, Gal. *Pis*, Germ. *Erweyssen* Belg. *Erweten*. Ital. *Rouiglione*, Venetis *Pisarel- li*. Idem in fol. & frum. Pisum minus, flores vt plurimum candidi, aliquando tamen ex purpura obscuri: semina vt plurimum luteo, subinde vi-

renti colore. Graeci *ἄρα* à luteo ochra colore quem interior fructus medullâ refert. Plinius & alii Latini auctores Eruliam, Recentiores ac Officina passim Pisum, & Pisum minus nominant: propter similitudinem cum Piso, licet fructus rotundus, & non angulosus, quale, Plinio teste, Pisum est. Mirum Dod. in post. omittere Pisa alba, & alios colores. Figura sui Pisi minoris est cap. precedenti sub titulo Pisi maioris. In frum. hist. figuram eandem habet pro Piso maiore & pro Piso minore. Quid existimem de Pisi figura, quam olim posuit pro mediocri & minore Piso, dictum sub comoso, quod non bene distinxit nec historiam, nec figurâ à ceteris, quamvis minoribus magis conueniat.

Pisum peregrinum [ait *Casalp.*] & in Italia semen Piscolo nostro paruo in ceteris simile, sed colore viridi etiam cum perfectum est, diuque durat incorruptum. Piscolus viridis appellatur: foliis paulò oblongioribus: floribus purpureis. Theoph. folium ei tribuit oblongius, Plinius eadem confirmat: frigoris impatientissimum, idè in Italia non nisi verno tempore feritur. Serapio ait Oculum habere pupillam albo nigra. Galenus Pisi substantiam tradit similem Fabis. Ast nos in nostris Pisis viridibus, non animaduertimus folia paulò oblongiora, nec flores purpureos. quamobrem iterum diligentius erit consideranda huius Pisi planta.

Lob. & Pena Adv. Obs. & Ic. Pl. Pisum minus ex luteo virefcens. Mirum non meminisse Lob. Pisi albi. Sui Pisi minoris figuram bis ponit hoc loco, pro minore & antè pro maiore.

Pisa minora viridia mihi prouenere Montbelgardi lata in horto Ill. E. C.

PISA MINORA EX PURPUREO variegata, Viciis similia.

Parua haec sunt, nec Viciis multò maiora, in quibus tamen puncta quaedam ex cineritio purpurea conspiciuntur, vt in viciis vulgaribus, à quibus idè non ita facile distingui possunt. Herba verò, caulis, vt filiquae, multum à Viciis vulgaribus differunt, quia angustiores, rotundiores, nec hisutae.

An Dod. gall. Pisum tertium colore interdum cineritio. An Matth. in Diosc. cum mag. fig. Pisum minus cinereum & in Ital. *Seme beretino*.

Prouenere mihi in horto Ill. E. C. etiam eodem loco culta, quo cetera Pisa & Vicia, eodemque etiam tempore matura.


PISA MINORA, RUBRA, VARIEGATA.

In agris cum aliis Pisis albis hoc Pisi genus non raro ipse collegi. Est autem forma & colore maiori simile, flore purpureo, semine variegato.

TRAG. hist. germ. *Das klein geschlecht Faseln*. Quidam volunt Acabum *Mes*, aut *Almes* esse Pisum. In Auic. scriptum est *Meise*. In Serap. *Mes* & *Rouille*, existimo intellexisse die kleine braune, feldt *Erweyssen* / aut nostras Fabas germanicas aut tertium genus peregrinum Phasiolorum. Et Hist. lat. Phasiolorum secundum genus.

Camer. hort. Pisa rubra, Trago Phaselus (minor.)

PISA MAGNA, RUBRA, VARIEGATA.



Hominem magnitudine multum excedit hoc Pisi genus, flores fert purpureum in medio, & in latiori parte roseum, in superiore filiqua magna, succulenta, Pisa intus valde magna, non rotunda, vt minora, sed angulosa, vel potius compressa, pulchri coloris, variegata ex rubedine & albedine, coarctae, crasso vbi coquantur, à

Germanis magni sunt in cibo.

Cam. hort. Pisa rubra, Italica, grandia, Phaseolus Trago. Tab. 20. & Hist. Pisum quadratum Plinii *Fasel* *Erbsen*. Trag. Hist. germ. *Faselen*. Diosc. lib. 2. cap. 99. *εὐρίων*. Si quis etiam velit *Ciceres* non reluctabor. Idem in Hist. Lat. Phasio. *Cicero*, li. *Faselen*.

Paulus Phasiolos, Dolichos cognominat. Diosc. tamen si cognouisset Phasiolos Dolichos quoque Graecis cognominari, ex Theoph. vtiq; & aliis id indicare potuisset. Existimamus ergo Phasiolos esse eos, quos Germani *Faselen* vocant. Si quis tamen ad Cicera referat, cum eo minime contenderim. Phasioli differunt maxime in eo à Piso maiori hortensi in geniculis, qui inter folia & ramulos visuntur non planè purpurei apparent, quod in nullo Pisorum genere deprehendas: flores non albi, vt in Pisis, sed in anteriore quidem sui parte rosei coloris, in posteriore verò purpurea saturata: semina habent rotunda angulos: alia quidem spadicæ: nam plura eorum sunt genera. Tragus pro Phaseolis exhibet figuram, quam pro Piso quoque ponit.

Lob. & Pena. Adv. Pisum angulosum hortorum, quadratum Plinii, semine ferrugineo, & rufoso colore, videntur angulosa Plinii Pisa. Obs. *arce*. An Pisum angulosum hortorum, sit quadratum Plinii? Pisum maius Dod. Perperam *Cicera* arietinum Tragi. Hist. *Arneiac*.

Lobel. non distinguit Pisa, vt Tragus, nec dissind

stinē de Pisis scribit. Figura, quam habet, est pagina sequenti pro Piso minore.

Lonicer. confundit hoc Pisi genus cum Phasolo Italorum.

Dod. gall. Huius Pisi mentionem facere videtur. Item de frument. & in sol. vbi figura cum inscriptione: *Pisi maioris alia icon.* Sed iam ostensum Dodonæum non exactè distinguere Pisi maiora.

Loc us
Tempus.

Pisa magna rubra variegata colimus in horto Ill. E. C. Montbelgardi, colunt etiam alij. Basilex & Geneuz vidi. Montbelgardi Iulio matura quidem, & Augusto adhuc florentia.

PISA MAIORA, ALBA.

Descriptio

Flo.

Semen.

Icon.



Pisa alba maxima, Pisis vulgaribus sunt similia, flore nunc purpureo, nunc albo: semina quidem alba, non autē ita angulosa, siue compressa ut illa: maiora quam sint Pisa comosa, nec ita rotunda.

Fuch. hist. Pisum alterum germ. Gross garten Erweissen. Item Ic. Pisum maius, Gross

Erbe, Fuch. non scribit an cultum intelligit: si illud curauit depingendum, quod suspicor, non placet quod in generali descriptione Pisi dicit, florem circa umbilicum purpureum: non enim omnia Pisorum genera partem habent purpuream.

Pisum maius.

Lob. & Pena Adu. Pisum vulgatius maius. germ. Erweissen / Angl. Pease Stock Erwinich. E' quadam vrbe Pisa inter Allam & Olympum montes sita Pisum allatum, & dictum volunt, græcè αἰκυδὴ quasi dicas oui vitellum: flore effigie Papilionis, albicante, sui medio purpureo: quibusdam Germaniz locis spontè germinant. An Lob. benè distinguat Pisa, iudicent lectores. Pisum maius album nihil habet in floris sui medio purpurei: optatim etiam annotatum locum Germaniz vbi spontè proueniat. Ic. Plant. Pisum vulg. maius.

Lob. repræsentat.

Dod. gall. *Pois ramier*: gall. *may* & αἰκυδὴ, Pisum. Brabant. Groote Erwtien / Roomsche Erwtien / quibusdam Stock Erwtien: hæc species verum Pisum descriptum à Plinio & Antiquis: in hist. frug. ostendit, non esse Faselum aut Dolichum. Flores purpurei: semina sicca, angulosa & cinerea [gris.] Figura, quam Dod. ponit est Fuchiana, nec mihi videtur bene describere, neque distinguere Pisa maiora: quanquam in Hist. gall. potissimum tradere videatur, Pisa maiora, varia. Idem in Hist. lat. frug. & in sol. Nostri, inquit, vulgè Roomsche Erwtien & Groote Erwtien / aut Stock Erwtien appellant, ac Latine Pisum Romanum, aut maius. Theophrastus & alii Veteres Græcè *may*, Latine Pisum. Plinque etiam

Pisum Plin.

alvum, sed parum propriè. Lecythos siquidem non peculiare aliquod legumen, aut frugis genus, sed pulmentarium ex leguminum farinis est, uti Gal. lib. de Euchymia & Cacoehymia testatur. Hæc Dod. cui flos candidus cum purpurea nota circa umbilicum. Apparet Dodonæo non bene notas differentias maiorum Pisorum ex descriptione: pro maiore figuram habet Pisi minori, Lobelii, quanquam apud Lobelium etiam posita sit pro maiore: ea ponenda erat capite sequenti, vbi figura maioris Pisi non bene posita pro Pisi minore. Addit præterea Dodonæus etiam figuram cum inscriptione: *Pisi maioris alia icon*, quæ conuenit cum Pilo vario minore.

Tab. icon. & Hist. Pisum minus i. Klein Erbsen. Quum Tab. compiler ponat suo more indistinctam figuram sub prædictis titulis sine descriptione, quod referam nescio, nisi hoc loco ponam.

Lonicerus quoque huius Pisi meminit, non tamen describit, picturam tantum ponit.

Math. pluribus in locis de hoc agit. In com. in Diosc. cum mag. fig. Pisum maius. Pisum rotundo & candido semine: flore papilionis figura, circa umbilicum purpureo. Idem in Ital. com. cum mag. figuris. *Piselli maggiori*, i. e. Pisa maiora: fructu albo, flore in quibusdam albo, in aliis purpureo. Item in Epit. cum add. Cam. Pisum, Græcis *may*, Ital. *Pisella* & *Biso*. Alterum maius semine rotundo & candido. Flores umbilico tenus purpurei & quandoque in vniuersum candidi. Tandem Hist. germ. Pisum maius flore cæruleo [leibfarb] aut albo: errant qui Cicer Arietinum volunt Gross garten Erbeyssen. Nec Math. videtur bene distinguere Pisa: maius semine candido, nihil habet purpurei in flore.

Pisa alba maxima Basilex, Geneuz, Montbelgardique vidi Iulio matura, ea habemus in horto Ill. E. C.

PISVM ERECTIVS COMOSVM

Erectius vulgari Pilo, caule firmiore, crassius, suā vi assurgit: ex intervallis foliorum alas, costā mediā, cui annectitur, in tortiles capreolos abeunte, producēs, sed nullo flore, nullo scuto, præterquam in summo caulis fastigio; quod floribus albis, numerosis, in orbem positus densè stipatur, quos siliquæ vtilgato sativo eodem radiatā serie comantes, excipiunt, geminæ, aut tergemine eidem pediculo appensæ. Pisa continentes alba, sativis vulgatis minora paulo, orbiculata, ad arvensia accedentia: permixtis pinatis foliis, quam in reliquo caule minoribus, radix fibrosa ut in cæteris.

Camer. hort. Pisa atro-carpa. Compiler Tabern. Ic. & Hist. ponit figuram sine descriptione, hoc titulo: *Pisum proliferum*. Büsch Erbsen.

Iconē Tabern. assumpsit C. Bauh. apud Matth. pro Pilo maiore, quod non placet.

Trag. Pisorum genus Klorz Erweissen & Psah floribus albis. Dod. gall. Pisum 2. flores plarumque albi: fructus rotundus, etiam sicca. Dodonæus videtur innominato Trago, ex eo suum genus secundum facere: figura, quam ponit nomine Ochris ex Erulia *Pois moyens* & *petiss*, huic plantæ non conuenit, sed potius minori: An Pisum comosum, flores alterius coloris habeat, præterquam albi, nescio. Dodonæo non fuisse notum hoc Pisum, & noluisse citare Tragum, satis demonstrat omisum in postremis hoc Pisi genera

Lecythos

Dodonæo

Tabern.

Lonicer.

Math. so. prob.

Locus & Tempus.

Descriptio

Siliquæ

Pisa.

Pisa atro-carpa

Locus &
tempus.

scriptis. Verùm alienis se ornare plumis, hoc ei commune.

Pisum, quod comosum voco, antehac mihi non visum, Stutgardia missum, & à me in horto Principis plantatum, ad altitudinem hominis non excreuit, maturuit cum cæteris Iulio. Anno 1594. missa per D.D. Schwartz/ cum hac inscriptione: Pīsa magna, quorum plures siliquæ vno pediculo, seu caudice continentur. Sata Aprili floruerunt Iunio

PISA SINE TUNICIS DVRIORIBVS IN SILIQUA MAGNA ALBA.

Descr.

Pisum album ramosum in magnam altitudinem excreuit, siliquæ albæ magnæ, sine duriori tunica, totæ mandi possunt. In cæteris vulgari Pīso correspondet.

Cam. hort. Pīsa leptoloba, quæ simul cum foliulis comeduntur, cuiusmodi Lobel. memorat è Vīda Lituaniæ oppido allata.

Locus.

Habui ego in Sulz/ vrbe Alsatiæ ex horto nobilis viri à Pfaffenlap munere vxoris eius Claræ à Rinack, quæ in horto Ill. E.C. sata prouenerunt Montbelgardi sæpius, ac aliis in hortis.

Vires &
vſus.

De Pīso maiore anguloso, aliàs sordido, agens Dod. has ei facultates assignat. Pisum veluti Hipp. tradit, minus Fabis inflat, per alium autem magis secedit. Galenus, Pīsa cum Fabis totâ substantiâ quandam habent, inquit, similitudinem, eodemque cum Fabis modo sumuntur: his duabus tamen rebus ab eis discrepant, tum quod non eque ac Fabæ sunt flatulenta, tum etiam quod detergendi facultatem non habent: ideoque segetius quàm illæ per alium secedunt. Idè de Pīso minore, colore luteo subinde virente: Facultate & viribus Pisum istud Faselo simile est, nullam effectricem qualitatem insignem habet, & medium quodammodo locum obtinet inter ea, quæ boni ac prauī sunt succi: multum ac parum nutriunt: facili ac difficili concoquantur: tardè & citò descendunt: flatulenta sunt ac flatūs experta, veluti Galenus lib. de aliment. facult. de his, & Faselis scriptum reliquit. Mart. Rolandus in Balnear. lib. 1. classe 3. cap. 1. ad scabiem, lepram, vitæra, & omnia cutis vitia, balneo vitur sæpius experto, ex Pīs cum foliis Quercūs in aqua fluuiali decoctis. Idem eiusdem operis. lib. 1. classe 3. cap. 4. ad achoras, &c. Pīso. Miii. decoq. in siliquæ: horum iuri admiscetur tantundem laxiui fortis, & facta ebullitione reseruetur viui. Caput eo lauetur quotidie ante cibum, & mox siccetur. Sunt, qui scribunt, autore Matthiolo, Pīso iure hausto purgari puerperas, & lactis copiâ augeri, auriginolos sanari, & aquæ intercuti succurri. Sed procul dubio decipiuntur, quod hæc haud possit præstare, quod refrigeret & siccet. Verùm errandi ansam cæteris præbuit Tragus, quippe qui perperam putarit Pisum Cicer esse arietinum. Errorem hunc debent diligenter vitare, qui suis puerperis Pīso iure propinant: quin etiam iis, qui sumperant purgatiuum medicamentum extergendi ventriculi gratia. Nulla enim Pīs inest absterforia facultas, vī docet Galenus. Idcirco Pīsa dimittantur (inquit Saxon.) & in eorum locum Cicer, Faba, Lupini, aliaque id genus absterforia addant Poloni in balneis ad Plicam tollendam. In Germania, teste Trago, nullum in culinis frequentius legumen habetur Pīs, tam diuicibus,

Cuius virtus.

Vires.

Trag. repr.

quàm pauperibus familiare: cum radice Petrose lini decoctum, in cibo puerperis vtilissimum est: nam co iure per vrinam superflua multa purgantur, præsertim si decoctioni Macis & Rosmarini quid adiciatur. Adfert quoque lactis copiam, vnde facili colligi potest, Pīsa, boni [vī vocant] nutrimenti esse. Breuiter extra periculum in omnibus ferè morbis iure decocti vī possumus, neque hic curo, quid alii assenserent, aut negent. Horstius ad dysenteriam pestilentialem scribit Pīsa [Erbſen] nocua: cæterum, inquit Schola Salernitana de Pīs,

*Sunt inflata cum pelibus atque nocua,
Pelibus ablatis, sunt bona Pīsa satis.*

Turnerus tandem omnibus, quotquot ventriculum, aut lienem habent flatibus obnoxium, nimum Pīso vsum, quacunque ratione præparatorum esse fugiendum suadet, nisi addatur Anisum, aut Cyminum, aut Mentha, aut aliud aliquid æquum. Coqui igitur puluerem Menthe pul- ti Pīso addant.

**PISVM GVINEÆ ALBVM,
sive Cicer.**

EX his aliis, Ciceribus & Pīs nostratibus paria, alba maiora, omnia ex rotundo nonnulli oblonga, & nitidaque superfiore, virescenti, flauescente, nisi quod germen album, zonulaque modò rubliqua, modò, recta, latior, nunc angustior dilutius flauescit. Saporidem qui nostratibus Pīs, quemadmodum & consistencia.

De scriptis



Idem Pisum adhuc siliquæ suæ inclusum dono accepimus ab Illustriss. Dacissa Wirtembergica. Magnitudinem siliquæ, quæ minus Pisum continet, sua proportionali magnitudine docet pictura. Maiores habet Ill. Principissa. Cæterum singula siliqua singula continet Pīsa. Siliqua autem non dura est, sed qualis ferè cæterarum, per ambitum compressior, & velut cristata, colore extrinsecus ex ruffo & flauo mixto & variegato: extrinsecus scabra, intus læuis. Ista Pīsa misit Cl. Paludanus Ill. C. prædictæ, nomine Phaseoli Guineæ, nobis verò anno 1598. utulo, Cicerum Indicorum.

Phaseoli
Guineæ
Ciceri
dici.

Tertius lobus (inquit Clus. Exot. lib. 4. cap. 16.) paucis ab hinc annis ex Guinea inferri capit ab Hollandis & Zelandis, qui exercendi mercimoni gratiâ illuc commeant; illum autem Ciceris genus esse arbitrat Clusius, eam ob causam Cicer Nigritarum appellabat. A variis porro ipsi communicabatur, à Cl. V. Paludano videlicet, Wilhelmo Parduyn, & Francisco Pennino. Erant autem hi lobi parui, semunciam magnitudinem non

non excedentes, tumidi: mucrone, hamipendē
instar, incuruo: rugosi foris, & ex spadiceo fusci
coloris, internē candicantis, & laues: eos vnicum
semen continere obseruabat, quasi orbiculare,
Descriptio. minoris Pisi modo, non vnius tamen coloris,
nam vel proflus album, vel omnino nigrum, vel
rubens, vel interdum etiam mixtum, ex albo & ru-
bro variē distinctum.

PISVM BRASILIANVM FLAVESCENS area fusca germen tingente.

Descriptio.



Piso Guineæ
per simile,
magnitudine
par, aut etiam
maius, itidem
ex rotundo o-
blongum, cor-
tice flavescente:
verum Brasilia-
no huic germē
candidum ma-
ius est, figura
ouata, cuius cir-
cumscriptiōe
cingit vndique
area latiuscula
coloris fusci. A
germinis verō
parte vna per
vniuersum fru-
ctus ambitum
zona quædam

candicans apparet, manifestum diuisi Pisi, sicut
nostratis, argumentum:

*Phasiolum
Brasilianum
Cicer Indici-
cum.*

Phasioli Brasiliani nomine misit D. Paluda-
nus ad Ill. E. Comitissam, ex cuius dono ha-
bui. Idem misit anno 1598. nomine Ciceris In-
dici.

PISVM BRASILIANVM PHOENICEVM & nigrum.

Descriptio.

A Cl. Paludano hoc nobis est, Ciceris Indici
nomine: Piso Brasiliano magnitudine sup-
par, Ciceri æquale, aliàs serē phœniceo, aliàs ni-
gricante lauore conspicuum, non tamen rotun-
dum, sed angulosum: hilo candido, fusca area cir-
cumsepto, à quo vtrinq̃ue elauata quædam ex-
tenditur costa, fructui concolor. Hoc idem no-
bis missum Stutgardia, per Ill. nostram Principis-
sam D. Sibillam Anhaltinam, Ducissam Wirtem-
berg. & per hortulanum Ill. C. W. pro Faba Æ-
gyptia duorum colorum: phœnicei, & nigri.
Gener Cherlerus rediens ex Anglia & Belgio
anno 1605, attulit coloris phœnicei & rubri, in-
sta in aquam fundum petierunt: denubus facile
confringuntur: nucleus albus in duas partes fin-
ditur: sapor nostrorum Pisorum.

Eicon cum præd. habetur.

*Faba
ægyptia;*

PISVM INDICVM VARIE- gatum.



Magnitu-
dine no-
strum Pisum
maius variēga-
tum æquat, ve-
rūm rotundius
paullō est, co-
lore ex rubro
& albo variē-
gato, alba ma-
ximē area circa
umbilicū exi-
stente: qui ma-
gnus satis ac-
penē fuscus,
cuius partem
oppositam ru-
bram striz alba
peruadunt,
*Eicon eadem cum
caqua lib. III.
cap. XII.*

Culm.

PISVM INDICVM QVODDAM rotundum, fuscum.

Iam descripto Piso paullō maius est, orbicula-
tius, & à perfecta rotunditate non ita multū
abscedens: colore obscuriore, & propē fuscū
co, obscurē maculatum, summotenus area albi-
cante insignitum. Visus ac depictus apud elo-
mentissimam meam Ducissam Wirtemb.

Color.

PISVM INDICVM MAIUS NIGRVM

Pisi Indici magni genū ab Ill. Ducissa Wir-
tembergica datum, Piso vulgato duplo maius
est, penē orbiculatum, nigrum, parte quā umbili-
cus est, comprēsa, per cuius medium costa elat-
ior descendit.

PISVM INDICVM VMBILICO eminente.

Pisum Indicum quoddam esse facies arguit &
figura: cicere paulō maius est, sed orbicu-
latus, coloris pulli obsoleti, maculis subcinereis,
aut candicantibus distinctum. Umbilicus parte
superiori eminet, quod in aliis Pisis non obserua-
tur. Etiam huius vsuram & picturam impertiuic
Ill. Cels. V. Wirtembergica. Huius ut & trium imme-
diatē præcedentium Icones habentur antē, sub
titulo, *Pisum Brasilianum flavescent, &c. Et Pisum
Indic. variegatum.*

PISA INDICA FOLIIS LONGIVSCVLIS

Pisi Indici pictura ex vna planta à nobis ex-
primitur. Hoc neque Pisorum cæterorum,
nec etiam Phasiolorum modo excrescit, sed folia
profert multa, terna, longiuscula, magna & par-
ua, ex longis pediculis hærentia: Floiculi mini-



LATHYRVS SIVE CIGER
cul in genere.

CAP. IX.

Leguminū folia, ut scribit Theoph. alia oblongiora sunt, ut Lathyrī [cicerulæ], caulis verbū humi procidens. Huic & vermes innascuntur, quum priusquam fuerint resiccatae dies interim seruidi accesserint.

Lathyrus (cicerula) inquit Gāl. substantiā quidem Ochris [Eruiliis] & Phaselis est assimilis. Vtuntur autem his, ut plurimum in nostra Asia rustici, & potissimum in Mysia & Phrygia, non modò quemadmodum in Alexandria, & aliis plerisque urbibus, Ochris [Eruiliis] & Phaselis, sed etiam, ut phacoptissanā parantes. Succum autem habent Phaselis & Ochris [Eruiliis] facultatibus quidem consimilem, sed consistentia crassiorem. Ob eamque ipsam causam plūs aliquantò, quàm illa nutriunt. Arācos semen est Lathyro [cicerulæ] semini consimile, fueruntque nonnulli, qui putarūt ipsum non esse generis à Lathyro (cicerula) diuersi, quandoquidem & vñs ipsius, & facultas Lathyrī (cicerulæ) facultati est adsimilis, nisi quòd Araci duriores. Sunt quoque qui Phaselū eundē cum Lathyro [cicerula] esse dicant alii ipsius (speciem) Diocles Ochri [Eruiliæ] & Lentis, & Ciceris, & Orobi mentionem faciens, Lathyrī [cicerulæ] nomē prætermittit. Dicere quis possit Ochros, Lathyros, Phaselos, vñū esse genus, verūm pluribus nominibus appellari. Est & cicerula, auctore Plinio, minuti ciceris, inæqualis, angulosi, velut Pisum. Cicerula etiam nū magis in aīuo proficit. Cicerula, ait Columella, quæ Pīso similis est, mense Ianuario, aut Februario feri debet, lato solo, czloque humido.


Cicerulam, inquit Cornarius, Columellæ Plinius quasi tertiam ciceris speciem recenset, quòd illi suum esse finimus. Nam re vera cicerula est, quæ aduget Græcis dicitur: cicerulam insuper cicer dixit, & duas res diuersas confudit.

Ceterū, cicerula diminutivum videtur à cicerā, non cicerē, alioqui diceretur cicerulum.

mixta foliorū principia: sapor manifestus nullus.

Pisa Indica anno 1608. fatalis mense Iunio erant, qualia icone in præsens exprimimus.

LATHYRI MAIORIS SPECIES
flore rubente, & albido minore, dumetorum, siue germanicum.



Germanicæ Lathyro Descriptio. longissima sunt flagella, adcurbicos aliquot porrecta, angulosa, & membranulis aucta, in varios ramos diuisa: folia ex pediculis palmo longioribus, longa, venosa, & acuta, bina in unum pediculo, inter vtrumque in capreolos abeunte, proxima fulcrā amplexutos, flores longis hærent pediculis.

Pisum amuli, rubentes, minores quàm Narbonensis Lathyrī: siliqua rubra, angusta, penè rotunda, grana continent minora quàm Vicæ satiuæ, quædam oblonga in Lathyrīde, sine cataputia minore, nigricantia, rugosa nonnihil & maculosa. Hæc mediam partem seminis occupat: sapor leguminosus: radix subest perennis, longa, digito crassior, singulis annis germinans. Eadem est, ni fallor, quam repert, colore partim albo, ac nonnihil ex luteo pallido.

Trag. in hist. lat. pingit sub titulo Borchern non tamen benè simpliciter ponitur, videtur enim tradi ab illo in hist. germ. sub titulo Pisi silu. wilde Borchern & Vogels wickben, breuiter nimis describens, dicit: Recentiores legumen, quòd nos Pisum Græcorum interpretati sumus, Eruum & Orobum non sine errore occupant.

Apud Fuchsiā eadem icon est sub his nominibus Eruī ruffi, & siluestris Orobi, gall. Vesse noire, Ers. & descriptione autem Fuchsi, quæ serè nulla, non possum iudicare quam intelligat plantam, non distinguit suum satiuum Eruum à siluestri, nisi colore seminis. Icon, quam ex Fuchsiā repræsentamus, benè conuenit cum nostro Lathyro germanico, à nobis iam descripto.

An Eruum Guilandini, quòd Mochum in Italia nuncupari sentit? sed plantam, quam Matth. pro Eruo ex Fuchsiā supponit, Mochum esse pernegat. Mochum Eruum esse verè dicit Matth. interim tamen Mochum ignotam sibi plantam statuit, quando non Mochum, sed vagam aliam stirpem pro Eruo picturā exprimit.

Apud Cordum in Hist. non benè ponitur icon ex Trago, pro Phascolo ipsius Cordi.

Eruum officinis, inquit Matthioli, Orobus Græcis, vulgò Moch, Arabibus Herbum, Keisene, siue Kersene, Italis Eruo, Germ. Eruen, Hisp. Ernos, Gall. Ers. Eruum frequentissimum in Hetruria nascitur, ac feritur. Figura Matth. non malè conuenit cum Lathyro magno, flore minore germanico, vel cum Lathyro maiore angustifolio flore maiore. An descriptio competat iconi considerandum. In postremis com. suam omisit effigiem, relinquens verba, quæ posuerat, & aliam surrogans nomine Climeni latiore folio.

Dodonæ

Dodon. vocat Lathyrum silueftrem, floribus rubentibus, negatque effe Eruium quod perperam plerique aliquando crediderint. *Loniceri* descriptio non placet, videturque Lathyrus species confundere, dicens: *Bithern*, Græcis Lathyros, Latinis cicercula, aut Pisum Græcorum,

An Lobel. & Penz sit Cicercula altera considerandum: an Phaseolus Diosc. Nonnulli Phaseolum suspicati sunt: Ego, vt verum fatear, Lobelium non intelligo, hæc descriptio videtur posse conuenire cum Lathyro Narbonensi, nec demonstrat qua in re differat à sua Lathyride Narbonensi quam negligenter describit, non demonstrans flores.

An Camer. hotti, Lathyrus siluestris alius angustifolius, de quo sub Lathyro maiori flore.

Hist. Lugd. Lathyrus satiuus angustifolius, quem Erui nomine depinxerat Matth. priore commentariorum in Dioscoridem editione, id est, in hoc genere, quod latioribus est foliis Matth. Clymenum esse vult, Cord. Eruium satiuum, Trag. Pisum Græcorum. Et Lathyrus silu. Dodon. Eruium satiuum Fuchsi: flores rubescunt: semen vt in Lathyro satiuo cōpreßum, inæquales habet angulos, verum minus est, & durius, & colore in atrum degenerante. Malè assumptis Hist. Lugd. pro suo Lathyro iconem Matthioli, cui non sunt siliquæ latæ: absque iudicio præterea dicit Lathyrum silueftrem Dodonzi esse Eruium satiuum Fuchsi. Pisum Græcorum Tragi non est Clymenum Matthioli, sed Lathyrus anguloso semine, cuius figuram non habet Tragus.

Clus. in Pannon. Clymenum Matth. siue Lathyrus Dodonzi, vel Eruium satiuum Cord. Item Hist. Lathyrus silu. Dodon. Clymenum Matth. Eius duo genera latifolium & angustifolium. Lathyrus Dodonzi, nostro quidem iudicio, diuersa est à clymeno Matthioli, quamuis eius sit species. Eruium satiuum Cordo esse non potest, diuersum indicante ipsa voce satiuum. Icon quidem, quæ apposta est Cordi Phaseolo, est eius plantæ, quam intelligit Clusius pro Lathyro Dodonzi, ni fallor, quamquam icon in post. Hist. Exot. non sit huius Lathyrus, sed clymeni Matth. Lathyrus igitur angustifolius Clusii, est noster germanicus, de quo hoc loco agimus.

Eruium, Cæsalp. loquitur, quod vulgè *Rubiliam* vocant, tanquam Phaseolus siluestris est: vendunturque eius grana recentia, aliquando pro Phaseolis: deprehenduntur autem, quoniam decoctione rufescunt, & duriores permanent: cum perfecta sunt, nigra redduntur, sed decorticata, pallida sunt: gracilior eorum siliqua: folio constat bipartito, angusto, digitali ferme longitudine, medio capreolo, flore purpureo, qui geminus in longo pediculo est: caules fert Phaseolo similes: oritur spontè inter segetes. Quoddam genus in siluis nascitur, pluribus in eodem pediculo floribus, roseis: siliquis tenuibus, nigris. Plinius modò Eruium, modò Eruiam vocat. Theodorus Eruium vertit id, quod Theophrasto Ochros vocatur, quamuis aliquando ciceram vertat, quasi putauerit idem esse, Eruium, & ciceram, & Ochrum. De Ochro Theoph. & Gal. De cicera mentio est apud Columellam, qui pabuli potius generibus, quam leguminibus eam adnumerari testantur: nam bubus datur Erui modo. Hæc Cæsalp. Sed, vt verum fatear, nondum asserere possum, de quibus plantis scribat: Lectores igitur considerent, an fortè intelligat Lathyrum nostrum maiorem germ. & Narbonensem.

Eruiam, autote Anguill. hodie & Antiquis di-

cta & xer. Hodie in Italia Bononiensibus *Roniori*, Patavii *Erbegegga*. At perquirendum quæ planta dicatur Bononiensibus *Roniori*, & Patavii *Erbegegga*, & an conueniat nostro Lathyro mogno, Germ. vel Narbonensi.

Lathyrus maioris speciem flore rubente Montbelgardi habui in horto Ill. E. C. à me latam: provenit copiosè in dumetis inter *Chasseny* & lapidem limitum Montb. viâ verius *Charmant*, & in monte vitium *la Chaux*: aues semina perquirunt & siliquas perforant, vt ea deuorent: abundat etiam circa Bessordia castellum in sepibus, præterea inter *Mendiere* & *L'Isle*. Inveni aliquando vno miliari à Basilea prope *Brenzach* in monte Marchionum Badensium mense Augusto cum siliquis & floribus prope *Marimont* in vitium colle, quem deserunt, abundabat mense Augusto siliquis serè maturis in dumetis. Inter *Connariam* & *Poluveiler* anno 1595. 9. Iulii. Prope *Thun*, mense Augusto observavi cum flore suo rubente eodem anno: Iulii 4. inter *Colmarium* & *Sleltadium* observavi Lathyrus magni speciem à præcedente non differentem, quod adhuc animadvertierim, nisi florum colore albo: ceterum in arvis & inter dumeta provenit, inquit Fuchs. Læto, ait Dodon. pinguique agro circa eorundem margines prope sepes, dumos, ac senticeta nascitur, quæ capreolo suo apprehendens conscendit & superat.

LATHYRVS MAIOR LATI- folia, flore maiore purpureo, cuius flor.



Nostri siue german. Lathyro omnibus partibus speciosior, membranis albis; venosis, secundum caules prolixos apertis: folia bina, nervosa, rigidiora, in obtusum mucronem desinentia, vniâ circiter lata, pediculo membranaceo in circuitu facellente adnectuntur: flores sin-

gulari appendice, dodranti interdum, nituntur, multi iuncti, magni, purpurei, & colore grato, quos sequuntur siliquæ, vniâ tres longæ, aut etiam maiores, vix semunciam latæ, nonnihil compressæ.

Matthiolo in Diosc. clymenum dicitur, licet quæ planta sit clymenum in Italia nondum potuerit inuestigare: proponit tamen figuram plantæ, quam D. Cortusius ei misit, quæ satis representare videtur Lathyrum maiorem, latifolium, absque tamen vlla descriptione.

Lathyrus Narbonensis (aiunt Lobel. & Pena Adu.) latiore folio, valde verisimile est, à Lathyridis cataputæ granis, quæ Orobinis similia Diosc. dicit, nomen factam. In Narbonensi agro fre-

Locus
Tempus

Lob. minor

Clymenum
Pisum Græcorum.

Hist. Lugd.
notatur.

Duo genera
Clus. notatur.

Eruium
Rubilia.

Pisum

Caules
Loci.

Cæsalp. com.
figur.

Flora.

Siliqua.

Clymenum.

Cataputia
granis.

Lich. n. n.

quentior erumpit ea, cui latiora, supernè acuta, bina, nervosa, per intervalla oriuntur folia, sic & emulatione auricularū lepusculi arrectarum, aut Bupleuri Herbariorum. Item Obs. Lathyrus Narbonensis latiore folio, Anglis Eichelinge/ clymenum Matthioli, Erum sativum cordi, Pisum Græcorum Tragi, Adu. 398. Ic. Plant. Lathyrus latiore folio. Figura Lobeli melius convenit cum Lathyro maiore, angustiore folio. Pisum Græcorum Tragi, quod descriptionem attinet, differt à Lathyro Narbonensi, vti etiam figura Lathyrus germanici. Erum Cordi sativum, est Lathyrus sativa, non clymenum Matthioli, nec Pisum Græcorum Tragi, quod antè monuimus. Lobel. nimis obiter hanc plantam describit, nec demonstravit discrimen inter hanc & Lathyridem suam, & cicerculam secundam, Nec placet quod Lathyridem hanc, non potius Lathyrum vocet; Lathyrus enim dicitur de cataputia minore officinarum.

Cultura.

Chy. m.

An Thalo Lathyrus silu. maior, seu purpureus, caulibus quadratis. Hist. Lugd. Lathyrus sativus latifolius: Clymenum Matthioli. Camer. horti, Lathyrus silu. latifolius, Clymenum Matth. flos dilute rubellus, imprimis elegans est. Planta ipsis pedamentis sulca, satis altè surgit, ideoque topiario operi commoda est. Clus. Pannon. clymenum Matth. siue Lathyrus Dodonæi. Item hist. Lathyrus silu. Dod. clymenum Matth. duo genera, vnum latifolium. Sed diximus antè Lathyrum silu. Dod. diuersum à clymeno Matth. Icon ab eo proposita, eadem est cum Lobeliana. Verum per genus Lathyrus latifolii ego intelligo clymenum Matthioli.

Clymenum Matth.

C. Bauh.

Scribit Pona in descript. montis Baldi, Erum sativum Cordi, Pisum Græcorum Trago. Matthioli pro clymeno pingit, nos autem dicimus tres diuersas plantas.

Casp. Bauh. apud Matth. clymenum Matth. Lathyrus, siue cicercula Dod. Lathyrus latifolius silu. Lugd. cicercula Cæsalpino. Ego aliter quàm frater C. Bauh. sentio: separo enim Dodonæi Lathyrum à clymeno Matthioli. Cicercula Cæsalpini esse non potest, quod satis demonstrat descriptio: tribuit enim ei siliquam latam & breuem, semen album, quæ non competunt clymeno Matthioli.

Locus & Tempus.

Lathyrus maior, purpureus, repertus à nobis vetno tempore in itinere Monspelio versus Perroux in sepibus, inter Valentiam & Vienne in agris. Florentem insuper vidi Argentinx in horto D. Friderici Meieri Iulio, & Augusto, & Septembri. Iac. Gurgillus Scotus misit mihi ex Anglia eam, cui latiora folia, cum hac inscriptione: *cicercula purpurea maxima Anglica.*

LATHYRVS MAIOR NARBONENSIS ANGUSTIFOLIUS.

Locus

Descriptio.

Locus & Tempus.

Hanc Lathyrus speciem cum longioribus & angustioribus foliis, Monspelii obseruavi, vnde etiam similem attulit Gen. Chertelus p. m. Folia huic sunt bina cum capreolo in medio bifido, vt in latifolio, folia ad originem pediculi solati & laciniati quaterna, quorum duo maiora, & alia minora duo, quæ minds scilicet in nostra icone expresse: flores magni, ex longo pediculo, latifolio similes figura, & flore purpureo.



Camer. horti, Lathyrus alius angustifolius à priore tantum hac notâ discrepans, & facillimè Hiemis feruorem tolerans.

LATHYRI SPECIES LVTEA.

Lathyrus quædam species nobis visa fuit primùm anno 1608. florens Iulio in horto D. Friderici Meieri, cuius semen ei missum fuerat pro segetum semine. Similis alioqui Lathyro silu. Narbonensium flore rubente, vel albo, folia enim habet bina, longa, ex quorum medio capreolus in aliquot partes supernè diuisus profilit, flosculus luteus diuersus à nostrate Lathyro siluestri luteo dumerorum, cui flores sunt simul in vnopediculo iuncti: folia etiam sunt minora, & tota planta multò maior, ramosiorque, quatenus hucusque obseruare potuimus.

Locus & tempus.

Semen segetum.

Flores. Folia.

LATHYRVS LVTEVS SILV. DVMERORVM.



Ex radice repente, angulosis fistulisque flagellis late se propagat, infirmis tamen & humi prouolutis, ni sustineatur bi-enitabbus & altioribus: folia quædam calamos pinnatis alis amplectuntur, alia extremis adnatorum insident, bina, opposita, vt Lathyro siliquis hirsutâ, vel cicerculæ breuiora, inter quæ

Descriptio. Radix.

Folia.

Flores.

tortiles capreoli enascuntur: flores cæteris Lathyrus similes, ex longis pediculis parui, lutei: siliquæ succedunt glabræ, quæ maturæ, nigre, striatæ, interdum nonnihil incuruæ. Semina parua sex, vel septem, penè rotunda, lactida, non variata.

Semen.

elegata, subluta.

De hoc Dodon. agit in Hist. dicens: Terræ glandibus simile quoddam legumen. Huius meminit & Tragus Hist. germ. vocans wild Fiebern mit gälten blömen. Et Hist. lat. nomine Pisi silv. Græcorum flore luteo & vogels wiesen Advers. Aracum appellant, & Ciceram luteo flore: & Ochez viciū quorundam.

Thalio in Hærcynia, dicitur Lathyrus silv. floribus luteis.

A Gesnero de coll. stirp. sit Aphæx, vel vicia, aut potius Orobi species, floribus flauis.

Tab. Ic. & Hist. viciam appellat, Geel wiesen/ium. Vicia, Gall. l'effe. Belg. vissen. Magno sanè errore Lathyro luteo Compilerator accomodat nomina Vicia simpliciter dicit: denominati non describunt.

An Cæsalp. hunc intelligit, quando ita scribit: Aracus exilis est plantæ, dodrantis altitudine: foliis Cicerulæ: flores fert luteos: siliquas longiores, tenuiores, rotundas, & nigras, in quibus semina rotunda, nigra & scabra: oritur inter segetes, gracili solo.

Aratus, inquit Theophrastus, in Lente nascitur: semen scabrum & durum. Galenus idem testatur ex Lente, inquit, degenerat: semen ineptum cibis, alibi inquit. Quod Aracon vocatur in Asia silvestre quoddam rotundum, ac durum, Ervoque exitus, in fructibus cerealibus repertum, quod seligentes proiciunt. Alibi Aracus ab eodem vocatur, semen Lathyro simile, aded ut multi putarint, ab eo nequaquam genere diversum esse, quandoquidem & usus ipsius omnis, & facultas Lathyræ facultati similis est: nisi quod Araci duriores sunt, minusque facile elixantur, & idè concoctu difficiliore. Hæc Cæsalpinus, ex quibus pauca quædam conveniunt cum nostro Lathyro luteo.

Lathyrus flore luteo Montbelgardi in horto Ill. C. Wirtemb. spontè & plantata florens Iulio: passim etiam circa sepes, & in pratis, ut in ferarum horto E. C. flores adhuc Augusto cum siliquis. Obseruavi copiosam circa Bæffordiam, Bæflez mense Aprilis & Maio, ac Iunio extra portam lapideam. Lugduni au. b. de la bonne Allemande florens Martio, cum radice nodosa. Genevæ in pratis, sicut & Montpelii. Quidam volunt Erui genus, quidam cicerulam silv. Fuchsius præceptor meus, cum apud illum essem, Lathyrum. Frater Casp. attulit Patavio nomine ciceris Latino. Passim, inquit Thalio, locis exduis ac prætenibus provenire intutus sum.

LATHYRVS SILIQUA hirsuta.

Radice est singulati, tenui, annua: angulosi caules, cubito longiores sunt: folia bina Lathyræ eius, quæ flore albo, & rubro est: at florum purpurascensium pediculi longi sunt, sesquipalmes aliquando, licet & vix palmares interdum existant, in quorum fastigiis plures dispositi flores, qui delapsi siliquas relinquunt, longiores, quàm in Lathyro flore albo, rubroque, angustioresque, verùm breviores & latiores, quàm in maiore germanico, sesquicentiam fere longas, non totam semunciam latus, hirsutæ, speras: semina comprehendentes maioris germanici seminibus similia, minora, fuffa, vel nigricantia, rotunda, superficiei crispæ.

Dodon. suum Aracum sic describit: Similis Tom, II.



Lathyro Aracus est, caule enim, folisque, eum omnino refert: flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinantes, siliquas paulo minores atque in his grana angulosa quoque & Lathyræ similia, sed minora, durioraque, minusque compressa, colore obsoleta, nigroque proxima. Rarum & hoc etiam legumen,

quod neque ab aliis, quàm rei herbarie studiosis scribitur.

Gal. lib. de Alim. facul. & Aracum appellat scribit, & posteriorem nominis syllabam, per x, in Aristophanis Hæscadibus, notatam inveniri, ad deferentiam videlicet alterius Arachi, per x, qui cerealium frugum vitium est. Latini Ciceram nominant.

An Anguill. Aracos & Aracis. In Italia Mocho, in Græcia hodie Araca?

An Adv. Aracus, aut ciceræ. Quamvis, inquit, distinxerit Galenus Aracum citra aspirationem scribendum, ab Aracho aspiratione scribi solito, vitiumque & exitium quoddam illud posterius Lentium & aliorum leguminum dixerit: tamen utrumque videtur ab indole sui cognati leguminis quasi in spurium abiisse. Est enim prorsum cognatus & similis, fortassis idem ille Aracus, quem quidam cicerulam alteram volunt: nec abs re, cum eius grana sordidius nigricantia inter Pisi, Orobos, & Vicias pullulent, à quibus videntur degenerasse. Quod idem Columella affirmare videtur, quando nihil sapore, sed tantum colore à cicerula diffidere, eoque ciceræ vocari asserit. Tandem Obs. & Ic. Plantæ Aracus, aut ciceræ, Ital. Mocho, Adv. 398.

An hist. Lugd. ciceræ, cuius icon ex Lobelio proponitur, descriptio autem ex Dodonæi Arace siue ciceræ. Verùm nos dubitamus an Lob. eandem intelligat plantam.

Lathyrum siliqua hirsuta reperi in agris Char. Locum, necnon versus Chasteloy circa agrorum Tempus. limites: item versus Audincourt florentem Iulio & semine maturo Augusto. Transiit in hortum Montb. Ill. C. Wirtemb. ubi in magnam excrevit altitudinem. Lugduni quoque vidi. Frater C. Bauh. obseruavit Bæflez. Hunc etiam conspexi, ni fallor, florentem Genevæ Maio & Iunio. In ducatu Wirtemb. propè fontem admirabilem Augusto, & in horto Friderici Meier Argentinæ.

LATHYRI SPECIES QUÆ BASILIA SILVESTRIS DODONÆI.

Angulosos, aliarum Lathyrorum instar, caules profert cubitales & bicubitales, quibus, nullo intercedente pediculo, amplexiculia ad-

Pisum silv.
Aracus. C.
lura
Ochre vici-
um
aphæx spe-
cies.
Vicia.
Cicerul. cr-
ror.

Aracus.

Locus.

Locus &
tempus.

Defec.

Floris.]

Semina.

Alia def-
cript.



nascentur folia, oblonga, modò simplicia, modò in capreolos abeuntia, non raro non tantum in hos degenerantia, nouam foliorum sobolem è lateribus, aut mucrone, iucundo naturæ lula, parientia: flores ex foliorum sinu prodeuntes, singulares, & breuibus pediculis hærentes: siliqua vn-

ciat duas longæ, semenciam latiores, secundum longitudinem pinnatæ, quibus quina, sena, plùs minus continentur *Pisamelina*, & obscurâ quadam flauedine, non exactè rotunda, sed ex mutuo compressu vtrinque sessilia, lineâ quadam albicante mediâ longitudine prædita: magnitudine *Pisiculi* vulgaris, cum quo magna similitudo: idem quoque sapor.

Matth. in Diosc. cum magn. figuris Latin. & Italicis, *Arachis niger*. Planta, cuius imaginem expressimus, *Arachum* secundo loco à Galeno descriptum, & Theophrasti per omnia refert. Matthioli suo more proponit solum iconè sine descriptione: ea icon accedit ad *Eruiliam* siluestrem Dod. non tamen placet flores ex longis pediculis plutes pingui Epitome dicit caulem subasperum, siliquas *Pisiculi* minores, in quibus semen asperum, rotundum, pullo colore, quæ non respondet nostræ plantæ. Cam. & C. Bauh. alias icones habet, in quibus flores melius dispositi & appicti: considerent lectores, an in descriptione epitomes Matth. non idem eueniat quod in figura, nempe mixtam, & confusam ex duabus plantis.

Dodon. gall. dicitur *Eruilia* silu. *Pois sauvage* flores albi, siliquæ rotundæ, semen rotundum: *Pisiculi* simile, minus, amarum, vinde, durum admodum siccum. Herbarii serunt in hortis. *Pisiculi* quarta species videtur, *Pisiculi* siluestris species nominatim ea, quæ *Eruilia* siluestris *Hermolao* Barbaro dicitur. Eidem de fram. *Eruilia* silu. siliquæ *Lathyrus* similes, minores, in quibus rotunda semina, *Eruilia* minora, & duriora, colore sublutea, sapore subinde subamara. Rarum & peregrinum legumen, quodque à studiosis herbarum tantum ac raro quidem in hortis feritur. *Eruilia*, siue *Ochra* siluestrem appellauimus alio destituti nomine. A veritate recessit Matthioli, qui legumen istud *Arachum* & quidem nigrum fecit, plus huic similitudinis cum legitimo *Eruo* est. Item Hist. colore sublutea, aut nigra, sapore subinde amara. Huius leguminis cum *Eruo*, si non idem, affinitas maxima, & tanta quidem, ut pro *Eruo* succedaneo extra errorem haberi queat, atque omnibus medicamentis eius loco adhiberi. Suspecta nobis est descriptio Dodonæ, cui pro ratione stat voluntas, qui variè, prout voluit, & ipsi placuit, semen descripsit.

Lob. & Penz Adu. *Ochra* silu. siue *Eruilia*. Siluestris indolis, velutique degeneres à *Pisiculi*, *Ochrisque* *Eruilia*, quasi emendæ & eliciendæ


dictæ, rariùs nisi in hortis Septentrionalium Herbariorum hodie feritur: iuxta tamen sepes, vias, in *Linguagotia* spontè reptat imbecillioribus viticulis, membranula triplici, aut duplici secundum longitudinem veluti pinnatis, ima folia oblongiora & latiora, in clauiculas desinentia ferentibus: supernè foliola verè parim in plura & minora diuiduntur, partim etiam clauiculis donantur candidis, & interdum purpureis, flore & siliqua *cicerculæ*, cui admodum similis. Item Obl. *Ochra* silu. siue *Eruilia* Adu. *Cicer Orospides* quondam. Ic. Plant. *Ochra* siue *Eruilia*, Teut. 79. Tom. 2. Lobelius in Obl. proponit figuram Dodonæ. Dubito an proueniat in *Linguagotia*, siquidem inibi non obseruauimus quod ait de foliis, quæ supernè in plura & minora diuiduntur, dubium mihi mouet, quia non responder figuræ: si ipse non posuisset figuram Dodonæ, suspicatus fuisset, cum tradere *Lathyrum* flore albo, quæ *Montspeli* prouenit in segetibus, ubi etiam quædam flore rubente.

Geneuæ prouenit mihi in horto, à quo tempore præterire triginta anni, quibus nunquam, visa, donec anno 1601. ex semine dato per D. Fredericum Meierum nomine *Ochri* Dodonæ in horto Montbelgardenti Ill. E. C. sata excreuerit, quæ tandem Augusti mensis principio exaruit semine maturo.

Locus & tempus.

LATHYRVS ANGULOZO semine.

Angulosus, prolixis satis caulis præditus, in ramos multos diuisus: folia pediculo hærent latiusculo, duabus ad exortum appendicibus, caulem complectentibus: sunt ea verò gemina, oblonga, acuminata, glabra, striata, inter quæ proficiens pediculi reliquum in tortiles abit clauiculas, quibus proxima apprehendit: ex pinnatarum appendicum siue pediculi exeunt singulares, flores gerentes vnicum, maiusculum, album, quem excipit siliqua lata compressa, semina, claudens angulosi, candida, radix fibrosa, gracilis.



Quidam volunt, inquit *Tragus* Bntz. *bern* / *cicer* *Arietinum*, alii *columbinum*, per nos quidem licet, verum dicimus *Pisum* *Græcorum* veterum: dicentem *Plinius* lib. 18. c. 12. *Cicerculam* habere angulos ut *Pisum*. Idem in Hist. Lat. *Pisum* *Græcorum* satiquam quod quidam *Eruum* & *Orobolum* non sine errore nuncupant. Icon, quæ est apud *Tragum*, non est *Lathyrus* satui, sed maioris siluestris.

Officinis & Græcis apud *Lonicerum* *Orobolum* Latinis *Eruum*, Germanis, *Erben*.

Fuchius

Pachis Erum album, & sativum, leg. in Grecis:

Tachys floribus candidis, vel in candido caeruleis, aut puniceis: Verum is nimidum obiter describit, non distinguens sativum à silvestri, nisi solo seminis colore. Quidam apud Fuchsum in Hist. Lugduni impressa annotat, cicerculam magis videri. Idè de comp. med. Orobum, ait, hodie non cognoscitur à nostratibus Pharmacopoeis. Non enim est hoc semen, quo pro eo aliquot annis uti cœperunt: Ochri enim semina sunt.

Lathyrum Fuchsius, præterea teste Matth. in Diosc. halucinatur in suo plant. volumine, Cicerculam vulgò vocatam, sativum Erum esse existimans: etsi omnes rei herbarie periti à Galeno Lathyrum appellari non dubitent. An Cicercula Anguillaris à Theophrasto *αἰθυρα*, in Italia, *ceserba*, *esera* & *manaroba* vocata.

Erum album ex Italia Gesn. appellat, quod Italici *Morbo* in Hetruria dictum sit, quorum verum quoniam summa illa amaritie quam Orobo, i. e. Eruo, tribuit Galenus, caret, Jan verus sit Orobus dubitari potest. Eruditi quidā, ut Fuchsius, ni Gesn. fallatur, pro cicercula accipiunt.

Phasolus Phasolus minor est, ut vult Cordus, qui ab aliquibus angulosum Erum appellatur. Flores eius candidi, & semina colore candida. Radice tuberculis exiguis plerumque plena. Ast Cordo icon alterius plantæ ex Trago non bene addita.

Bellonius scribit in Alexandria Egypti abundare genus Pisi, quod Greci vocent *αἰθυρα*, Veneri *Manerette*, Romani *Cicerba*, Galli *des Sars*.

Cicercula prima Dodonæo gallico, *αἰθυρα*, cuius flores albi, semen quoque album, angulosum, Columellæ & Palladio Cicercula. Lathyrus non est Erum, ut quidam existimant. Idem lib. frum. & hist. lat. in folio. Dodonæus olim posuit iconem Fuchsi, quam etiam nos proponimus pro Lathyro, siue Cicercula. In post. hist. lat. eam exhibuit pro Araco, siue Cicera, quod non placet: non tamen displicet nova icon, quam in lat. ponit pro Lathyro, siue Cicercula.

Lathyrus Lathyridem Narbonensem alteram constituent Aduersaria, angustiore gramineo folio, cui ibidem enata in vdis, folia admodum angusta, graminea, venosa, & mucronata, hina, & pediculo in tortiles, capillaceasque clauiculas desinente, Catanance [leguminaceæ] ferè sunt adfluxis albidis, & luteolis floribus succedit siliqua compressior, duplè breuior, latior superiore [Narbonensi] latiore folio, ubi grana angulosa, pusilla, Pisi, aut Eruliz sapore. Obs. Angustiore gramineo folio Lathyrus Adv. 398. Lobelii descriptio non convenit, eo quod non distinguat à sua Lathyride latiore folio, cui nimis similem facit: icon demonstrat eam, quam nos hoc capite tradimus an florè luteolo extet, sub iudice lis est, miror etiam Lobelium albedo flore dicentem, & non albo. Illud præterea notandum, quod dicit semina pusilla, qualia fortè in spontanea, non item in sativa. Quæ causa sit ut in Iconibus Plantini, omittatur icon proposita in observ. me fugit. Malè tandem Lathyrus Lob. & Pena dicitur, cum Lathyrus dicendum erat.

Cicercula Cicerculam vocat Casalp. scribens, semen esse alterà parte depressum, quasi effigie cunei: cortice levisimo, albo, aut nigricante, aut vario, in siliqua brevi, & lata: plantam autem breviorē Erulio, humi procumbentem, multis ramis: folia simili modo bipartita, & angusta, brevioraque: flores purpurascens: serigraculi solo: caput ten-

Tom. II.

tare, & officere luminibus.

Cæterum Cicerculam hanc refert frater C. Bauh. ad Clymenum Matthioli, cui penitus assentiri non possum, ut suo capite dictum.

Grecis *αἰθυρα* dicitur (quemadmodum apud Hist. Lugd. legitur) Latinis, ut Columellæ & Palladio, *Cicercula*: Galli *des Gesses*: caules habet angulosos: flores candidos, siliquas latas: semen album, latum, compressum, inæqualiter angulosum. Hunc Erui nomine depinxerat Matth. figura Matthioli quam proponit Hist. Lugd. nullo modo convenire potest, siliquæ enim non sunt latæ.

Lathyrum Dodonæi Camer. horti appellat, flore purpureo, & alterum albo. Pisi angulosum vulgò tam à viticolarum, quam seminum angulis dictum, *Ederbes*. Orobum Fuchsi, Phasolum minorem sativum Cordi. Cicerculam vulgarem, sativam, flore albo Clus. in Hist. nominat, cicerculam Plinii & Columellæ, *αἰθυρα*, Lathyrum, Galli *Cerres* & *Puis cerres*, appellant: *Pasientes des Sars*.

Sicut in horto Lathyrum flore albo Montbelgardi semine Stutgardie in horto Ill. Ducis collecto. Semen maturum fuit Augusto. Monspelii vidi in segetibus florentem April, annua est herba. Stutgardie autem in horto Ducis observavi florentem Iunio, flore omnino albo, ac etiam partim albo, partim rubente, qui quantum differat à sequenti, hæreo.

LATHYRVS FLORE RUBRO, & alius albo.

Flore & foliis proximè accedit ad Lathyrum Defect. flore albo, inter segetes Monspelientes obuius: *stys* ruber, quales *siliqua* & *semen*, iam non succurrit. April florebat Genevæ in horto.

Idem fortè cum præcedenti, sed colore varians.

An Dodonæi gall. cicercula minor, *αἰθυρα*, Aracus, Lat. Cicera flore rubente. Item Hist. frum. & in fol. Similis Lathyro Aracus est, caule enim, foliisque cum omnino refert: flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinantes, siliquas paulò minores: atque in his grana angulosa quoque & Lathyris similia, sed minora, durioraque, minusque compressa, colore obsoleta, nigroque proxima.

Rarum & hoc etiam legumen, quod neque ab aliis, quam rei herbarie studiosis feritur.

Gal. lib. de aliment. facult. *αἰθυρα* appellari fertur, & posteriorem nominis syllabam, per x, in Aristophanis Holcadibus, notatam inveniri, ad differentiationem videlicet alterius Arachi, per x, qui cerealium frugum vitium est. Latini *cicera* nominant, quod videlicet cicerculæ similitudinem habeat, atque solo potissimum colore ab eo differat. Cicera, inquit Columella, sapore nihil à cicercula differt, colore tantum discernitur: nam est obsoletior, & nigro propior. Item Palladius, in Martio, nunc cicera feritur, quæ distat à cicercula solo colore, quo sordet, & nigrior est.

Est porro & alius Aracus, flore, fructuque candidis, cæterum magnitudine & formâ seminis, reliquisque omnibus, priori similis, quem non Aracum, sed Lathyrum minorem esse, fortè quis dixerit.

Lathyro similis est cicera, ut Hist. Lugd. quoque tradit, caule & foliis. Flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinantes. Hanc Lathyrum

Cc 3.

rum Hist. ex Dodonæo tradit, & ei adaptaticone-
nem ciceræ, quam Lob. posuit pro Araco, aut ci-
cera. Verum hæremus dubii, an Dodon. & Lob.
eandem tradant Aracum.

LATHYRVS QVÆDAM, QVIBVSDAM Ægyptia Aracus.

Aracum
Ægyptiæ
Caulis.
Folia.

Flor.

Aracus Ægyptius Lathyro albo similis, infir-
mus, clauicularum ope bacillis iuxta depa-
ctis sese implicat, caulibus angulosis, quibus
membranulæ secundum longitudinem adnatæ:
foliis culmum latis, acuminatis, crassiusculo pedi-
culo adnexis, binis, striatis, inter quæ capreoli o-
riuntur: ad basim autem pediculi duæ veluti alæ
& flores ex longo petiolo inflexo singulares in-
sident, Pisi floribus æquales, supremo folio la-
to sursum expanso, foris carneo, intus cæruleo,
excepta infimâ orâ rubente, colore prædito, alis
duabus foris coccineis, macula cærulea medium
pingente, intus cæruleis, excepta angusta pur-
purascens orbita: carina ex herbaceo albicat:
siliqua lata, sescunciam longæ, compressæ non ni-
hil, insigni sulco fimbriato altius exarata, semi-
na continent bina vel terna, magnitudine La-
thyri albi, angulosa, ac ferè quadrata, à crassiori
latere ad oppositum deuexa, & in angustum
compressa, coloris infusci, minutissimis maculis
anthracinis conspersa, gustu Pisorum dulcescen-
te, & dentium attritu substantia qualis Pisorum
æquabili.

Cicerula Ægyptiaca, autore Clusio, à sativa
vulgari non valdè differt, floris color diuersus, in
hac internè elegans, cæruleus, foris ex cinera-
ceo purpurascens: granis frequentibus maculis
nigris insignita. An Bellonio cap. 19. Obs. lib. 2.
Græcis vulgò Lathyrus?

Existimo Clusium eandem nobiscum tradere
plantâ, quamvis icon non in omnibus responde-
re videatur, folia enim breuiora & latiora, quàm
in nostro albo, vel Ægyptiaco.

Locus
Ægyptus.


Est nobis in horto Ill. E. C. missus per Dom.
Ioach. Camerarium pro Araco Hispanico, flo-
rens Iunio & Iulio. Redditus etiam nobis à D.
Iacobo Zuingero Basileæ eodem nomine.
Missus præterea pro cicerula Ægyptiaca per D.
Scholæzium. Argentinè obseruatus in horto D.
D. Melch. Sebizio, & Frid. Meieri cum flore & si-
liquis Augusto. Adhuc D. Doldius misit Norim-
bergâ siccam plantam nomine Araci Camer. &
Lathyrus Ægyptii, ascribens: flos pulcherrimus
candidus, cæruleis lineis aspersus, quandoque
cæruleus cum puniceis: semer angulosum, la-
tum, & maculosum: caulis membraneus folia op-
posita, & diuiscantia. Clusio primùm hæc
planta nata Viennæ Austriæ, semine in Ægy-
pto collecto, & Constantinopoli misso: flo-
res tulit Iunio & Iulio, atque etiam in Septem-
bri: semen maturum fuit Augusto, & Septem-
bri, Francofurti etiam singulis annis prouenit ex
semine communicato.

LATHYRVS FOLIO TEN VIO- re floribus rubris.

descriptio
idæ.

rei.

Hæc aliàs est cubitalis, aliàs vix palmaris, ra-
dice tenui fibrosâ: coliculi crebri, per quos
filia tenuissima, longa, Caryophylli holostei,
vel graminei: flores rubri, pro plantæ proportio-
ne magni, similes Lathyro flore rubro: eadem
fortè fuerit cum modò dicta, foliis tantùm ludēs.



Hanc Gener.
Cherlerus atten-
lit Monspelio,
nomine Lathyrus
graminei, cubi-
to multò altio-
rem: siliquis la-
tis, in quibus
semina tria, qua-
tuorue, Orobie-
xistimati magni-
tudine, vel Vici-
æ luteæ, pend
rotunda, aspera-
ta, fuscis macu-
lis obsita hilo li-
neis fuscis pi-
cto.
An Lob. icon.
Lathyrus angu-
stior gramineo
folio?

Locus
tempus.

Quà itur Monspelio Frontignanum repeti-
mus, locis siccis & siluestribus mense Aprili flo-
rentem. Cuidam docto viro videbatur hæc
esse Araci species, vocarique vulgò gallicè A-
rance.

CATANANCE IN GENERE.

CAP. X.

Catanance [κατανάνχη] altera folia habet lon-
ga, inquit Diosc. velut coronopodis: radi-
cem tenuem, iuncam: capita [καταὰς Dod. ex
vet. exempl. ἡ δὲ ἑλὸς,] vertit siliquas, veluti
Eruum] lex, aut septem: in quibus semen simi-
le Eruo. Curuatur hoc ficutum ad terram, &
milui exanimati vnguibus simile euadit. Altera
mali parui magnitudinem habet: radicem ma-
gnitudine Oliuæ: folia & figura, & colore simi-
lia foliis Oleæ, mollia, per terram strata & fissa:
semen in virgis paruum, multis partibus perfo-
ratum velut cicer, puniceum. Catanancen Thes-
saliæ herbam qualis sit, Plinius vt describat,
superuacuum docuit: cùm sit vltus eius ad amato-
ria tantùm. Illud non abs re est dixisse, ad dete-
gendas Magicas vanitates: electam ad hunc vlti
coniecturâ, quoniam arescens contraheret se
ad speciem vnguium milui exanimati.

Folia Caro-
næ
Dioscor.
Idem.

Cæterùm cùm Catanance prima ignota adhuc
omnibus ferè rei herbariæ professoribus existat,
si quando in plantam incidas, cui omnes cata-
nances notæ correfpondeant, caue, inquit Ma-
rantha, turberis, quodd non senna aut septena,
sed alio quopiam numero capitula habeat: nam
si hunc numerum, quia à Diosc. illi constituitur,
necessariò illi adesse tibi pertrahes: fortasse eni
nunquam assequeris.

Catanâces nomen Cornarius ex vi & coactio-
ne impositum arbitratur. Galenus & posteriores
Græci de hac herba siluerunt. In catanance alte-
ra mali magnitudo suspecta est.

Scribit Dod. hist. n fol. æqualis, in quibus semē
catanancen ferre Diosc. scribat, non capitula,
sed siliquas hoc loco interpretari debere: nam
catananche κατανάνχη, veluti Orobum habere, Di-
oscoridem asserere: at Orobum non capitula ge-
rere sed siliquas.

Catana.

CATANANCE LEGUMINOSA
quorundam.


Descriptio

Caulis,
Folia.

Flores.

Siliqua.

Semina.



Catanance legumino-
sa dicta, La-
thyrum familiæ
congener legu-
men est, tenui-
bus, ramosis
caulibus, quibus
nullæ aptæ mē-
branz: folia &
longitudine
graminea, in-
terdum angu-
stiora pediculis
destituuntur,
venosa, acuta:
flores tenuibus
pediculis insi-
dent ex foliorū
sinu ortis, pal-
mum nonnun-
quam longis: sili-
qua vncias tres longæ, plūs minūs angustæ, gra-
na decem, duodecim, aut plura continent nigri-
cantia, rotunda: radice nititur inutili.

Vocat D. Agerius Lathyrum angustifolium, ip-
se in huius radice obseruauit Orobranchen. Dubi-
tant Advers. Eruum silv. Herbariorum, sitne
καταράχη, siue Amatoria, aut Necessaria, non bul-
bosa Vnguimilua Diosc. Quasi necessitate in-
concussa, & fatali adigeret ad amandum, Cata-
nancem vocarunt, quasi amoris illicium necessa-
rium. Plinius: eiusque coxui cordari viri, consulto
figuras harum tacuerunt: nec Diosc. vires, sed
historiam duntaxat alienam citat. Quodpiam ge-
nus leguminis fuisse hanc descriptio ostendit, cui
non malè quadrat ea herbula, quæ Lagopi an-
gustifolii solis visitur. Alteram catanancem ci-
ceris nomine non nouerunt. Dubium idem mo-
uent Obs. & Ic. Plan.

Geneæ prouenientem intuitus sum catanancem
leguminosam, quemadmodum & prope
Schneeghausen in Suncouia. Et quia folia grami-
nea sortitur, facili ab olitoribus euectitur, ideo-
que radix eius annua non est, licet anno sequenti
ex semine decido spontè regerminet.

Hæc, teste Lobelio, in hortis Herbariorum Iu-
lio & Augusto siliquas fert: visitur etiam in agris
littorum maris Septentrionis.

LEPORIS AVRICULA
Cæsalpini.

CAP. XI.

Descriptio.

Folia.

Flosculi.

Leporis auricula vulgò appellatur, auctore Cæ-
salpino, herba multis ramis, humi stratis: Fo-
lia indiuisis, prælongis, instar leporinæ auriculæ:
flosculis luteis in summis ramulis, vt Securidacæ:
siliquas fert longas, tenues, hirsutas, inuicem im-
plicatas: seminibus distantibus: prouenit læto
solo.

Dioscorides Clymenum vocat: ei, inquit, cau-
lis Fabæ, quadratus: folia Plantaginis: folliculis
supra caule inflexis, vt Polyporum Citri: proba-

tissimum est ē montibus: celebratur succus ad
sanguinem sistendum.

Plinius clymenum à Rege quodam appellatum
scribit: vnum quidem solis Hederæ, ramosum,
articulis præcinctum, graui odore, seminibus
Hederæ. His intelligit, quam alibi Periclymenū
vocari diximus.

Alterum Græcorum sententia, Plantagini si-
mile, caule quadrato, folliculis inflexis, vt Po-
lyporum citri.

ISOPYRON. VETERIBVS.

CAP. XII.

Ισόπυρον aliqui Phasiolum vocant, vt nobis au-
tor est Diosc. eò quòd Phasiolo simile sit. & in
summo folio pampinum ferat [Ἰσόπυρον τὸ πῖ-
ραλον Ἰλιν. Dalinquit quidam πῖραλον legūt.] In sum-
mo caule sunt capita, tenuia, seminibus resecta, si-
milibus Melanthio in gustu. At folium Aniso si-
mile est. Huius semen cum aqua mulla potum
dolores circa thoracem, & tussis sedat. Conuenit
etiam sanguinem spuentibus & hepaticis.

Hæc paulò aliter Plinius ita refert: Isopyron vo-
cant aliqui Phaseolum [iuxta vetens codicis le-
ctionem. Nam vulgata exemplaria Phasioli vo-
cari non habent, Corn.] quoniam foliū, quod
est Aniso simile, in Phaseoli pampinos torque-
tur. Capitula sunt in summo caule, tenuia, ple-
na seminis Melanthii. Contra tussim & cæte-
ra pectoris vitia, cum melle, aut aqua mulla,
item iecinori vtilissima.

Galeno Isopyron, aut Phasiolon, semen ama-
rum & acerbum habet. Proinde extergit, & se-
cat crassos humores, simulque contrahit, ac ad-
stringit corpora. Et ob id reiectiones sputorum
ex thorace adiuuat, & hepar repurgat. Et san-
guinem spuentibus non aduersari sed ipsos insu-
per adiuuare creditur. Nam propter mixtam tē-
periem conuenire videtur, etiam ad contraria.

Ignotum est hodie omnibus, quod sciam Iso-
pyron, inquit Corn.

ISOPYRON CÆSALPINI.

Semen est simile Erulio, atrum, rotundum,
Squod dum viride est, coquitur, vt Piscolus, sed
perfectum negligitur: eius planta spontè pro-
uenit inter segetes, caule ferè simplici, cubitali,
procumbente in terram, nisi adminicula habue-
rit: folia fert non diuisa, vt cæteris leguminibus
contingit, sed integra, ternorum digitorum lati-
tudine, in tres capreolos desinentia: florem in alis
foliorum fert luteum, siliquam Piscolo, teste Cæ-
salp. tenuiorem.

Aliqui, vt Diosc. notat, Isopyron, Phasiolon
appellant, nonnulli verò, vt Plin. perhibet, Faseo-
lon vocant.

PISVM SILVESTRE.

CAP. XIII.

Tres, quatuorue singularum foliorum coniu-
gationes cōstæ aptantur in capreolos desi-
nenti: sunt ea autem Capparum foliis æqualia,
modò leuiter acuminata, obliquis venis striata:

Cc 4



ex algefinu(r)-
culus longus
enascitur,
thyrium co-
mosum gerens,
flauum, Vicia
maiorē paul-
lō: siliqua suc-
cedunt Pisi
aruenfis pa-
res, nonnihil
compressæ,
glabræ, semen
claudentes.
Foliorum ma-
gna similitudo
cum vicia ma-
xima siluatica,
sed firmiora &
magis polita.

Cam. horti
vocat Pisum

siluestre Pannonicū, in Fraconia alicubi darms-
gichstrau. Tabern. verd icon. Pisum silue-
stre, wilderbisen. Pisum siluestre, de quo aiunt
Aduersaria, in Heluetia, & superiore Germania,
non secus ac Phaselus siluestris [Galega verna]
obuiam se dat peregrē eunti. Quidam in suo vi-
nius paginæ rariortum stirpium libello, affirmat
in faxis littoreis, nulla terra opertis, tantam se-
getem Pisorum spontē enatam in Angliæ Suffol-
cia inter Otfordum & Alburnum, etiam Au-
gustino 1555. vt mille hominibus suppetere.

Hoc Pisum diu siccum habui sine nomine, ne-
scio vnde: verū anno 1591. Tossanus Carolus
doctus pharmacopæus Burgundus eius semina
misit nomine Pisi Indici, quæ Plantæ in horto Ill.
E. C. & hortulo meo Montbelgardi, nec primo,
nec secundo anno florem protulerunt. Pisum
siluestre Clusio primū conspectum ultra Dra-
uum flumen in Pannonia, iugis arcu Greben
vicinis, anno 1579. copiosē inter saxa nascens:
vnde postea Ill. Heros Balthasar de Battyan, qui
Clusium in eant prouinciam deduxerat, matu-
rum fructum illi adferri curauit. Subsequente
deinde anno aliis locis Viennæ vicinioribus ob-
seruabat, veluti in siluoso illo monte supra Gum-
postkirchen, item supra Pofonium, & in Ley-
tenberg. Floret Iunio, semen maturum sit Iulio.

APHACE IN GENERE ET EX Veterum placitis.

CAP. XIV.

*Aphace dif-
fert ab A-
phia: item
ab Aphaca
arbor.*

Aphaca differt ab *Aphia* quæ olas item est, vt
Aphaca: differt & ab *Aphaca*, quæ arbor.
Aphacam Theoph. modō leguminum generi,
modō inter olera connumerat, & vt verum sa-
teatur Hermolaus, idem, an diuersum genus sit,
ferē ambigit. Sed Aphacam [teste Corr.] Plinius
ita describit, vt Dioscoridem exprimat, aut certē
eum autorem, vnde Diosc. transcripsit. Meminit
Aphaces aliquot locis Theophrastus, sed in his
ambiguos reliquit Lectores, an de olete, aut fru-
ge loquatur. Strangulārī certē Aphacas à Securi-
daca lib. 8. hist. palām dicit. Gal. lib. 1. aliment.
Aphacen cum Vicia, quam *Brius* apud Asianos
vocari dicit, coniungit. Et quamvis Theoph. A-
phacam non inter legumina, sed inter Cichoracea
describat, ait Celsus. attamen videtur aliquando
etiam eam inter legumina recensere, vt cum in-

Gal.

quit, celeriter perit, vt Dolichus, eius siliquæ le-
uiter latæ: in Aphacis nascitur Securigada: ferē
inter legumina sentitur, sed in his videtur aliquam
speciem Lentis significare. Gal. Securigadam non
in Aphacis, sed in Phacis [Lentibus] nasci scribit.

Aphacem autem tanquam Viciæ affinem tradi
ad brutorum pabulum colligi solitam à rusticis.
Plinius Aphacen vocat, vt ab altera Aphaca di-
stingeret, quæ inter cichoracea reponitur. A *quæ*
tandem frutex [thyrium] paruus est, autore Diosc.
nascens in aruis, altior Lente, tenuibus foliis, quæ
verō in ipso nascuntur siliquæ maiores Lente, se-
mina continent tria, aut quatuor nigra, [in cod.
Basil. *μεγάλων, προμεγάλων*] Lente minora. Aph-
aca, inquit idem, tenuia admodum folia habet, po-
sillo altior Lenticula est. Siliquas maiores fert, in
quibus terna, aut quaterna semina sunt, nigriora
& madidiora, & minora Lenticula. Nascitur in
aruis. Aphace & viciæ seminum figura non est
rotunda, veluti Fabarum, vt Gal. tradit aliment.
lib. 1. cap. 36. sed aliquantō latior, quomodo Len-
tium. Ceterū Viciæ nomen apud nos quidem
est tritum, coque solo nominatur. Attici verō
εμπύκτων, aut Fabam appellant.

Aphacæ semina, autore Diosc. vim habent ad-
stringentem, vnde alui, & stomachi fluxionem
sistunt, si siccat, & fresa Lentis modo coquantur.
Naturam ad spissandum Plinius Aphacæ tradit
efficaciorem, quā Lentis. Reliquæ autem vius
eisdem. Hanc quoque cum ipsis siliquis inte-
gram plantam rusticæ reponunt, vt brutis pecu-
dibus sint pabulo. Per famem tamen quosdam
noti, ait Galenus, qui hanc quoque comederint
potissimū Vere, cum etiam nū virent, quemad-
modū Fabas, & cicera esitare consueuerūt. Sunt
autem non insuauia modō, sed conebit etiam
difficilia, aluumq; inhibent. Perspicuum ergo est
quidd, cum natura sint eiusmodi, alimentum,
quod ex ipsis distribuitur, haudquaquam boni
succei, & crassum, ad succum melancholicum gi-
gnendum idoneum, ceu de Lente dicitur. Verū illi
quidem multa bona insunt, his autem nihil
honorum illius adest. Idem Gal. 6. simpl. Aphace,
inquit, vim habet adstringentem, quemadmodū
Lentis. Sed & similiter vt Lentis, editur, & ægritū
quidem, quā illa concoquitur, sed validius sic-
cat. Caliditate quoque moderata participat.

VICIA VULGARIS SATIVA.

CAP. XV.



ANNVA
est planta
Vicia coli soli-
ta, caulibus cu-
bitalibus &
procerioribus,
angulosis,
striatis, hirsu-
tis, cauis: folio-
rum coniu-
gationes decem,
aut duodecim
costæ adhe-
rent longæ,
tandem in
tortiles clauic-
ulas, quibus
proxima arri-
pit adminicu-
la, desinenti-
vicalis, aut

Descriptio.

*Tempera-
mentum.*

*Vires & v-
su-
flauores.*

paullò minora, angusta, per extremum lata, hirsuta, eadem interdum alternatim rachi alligantur, ex vniuscuiusque costa *stus* aliquando enascitur vnus [interdum plures] quem *siliqua* excipit quadrantalìs & longior, vnciam ferè lata hirsuta, semina claudens Pisis aruensisibus paria, nigricantia, compressa.

Brussellio *Eruum*. Inuenit Hermol. & Recentioribus, qui viciam esse Aphacen existiment. Ast cum Marc. Virg. non facile Aphacen ratiocinetur aliquis Viciam notissimam omnibus frugem esse: & si congener, aut similis illi sit, illustrem existimandam esse.

Tragus in Hist. germ. vocat *wischen*, aut Viciam *Roswischen* / *Grosowischen* / *Zam vndt feldewisch* / Lat. *Eruum*, Aut. *Erbum* & *epicos*, cui opinioni tamen resistit Mahardus. Is autem dicit *Orobum* Græcorum, *Eruum* Latinorum, & *Aluelis* Arabum esse *wischen* in Virgilio *Vile*, in Serap. *Heise* & *Kesen*, aut *Keser*. Hæc Tragus, qui meo iudicio Viciam satiuam & maiorem vocat, picturam autem eius non exhibet.

Vicia maior, inquit Gesn. *Is schier wie Erbo*. Fuchl. Vicia & *Erbum*, quo Officinæ non sine magno errore pro *Orobo* videntur. Hunc Germ. *wischen* simpliciter, vel cum adiectione *Zamwischen*. Gall. *Vesse* vocant, de qua Varro. Estigies Fuchl. *similis* conuenit: videtur enim composita ex Vicia multiflora, & vulgari satua, folia enim similia Vicia multifloræ, flores autem vulgari, quam ille, quum ei Tubingæ conuierem, vocabat Aphacen maiorem: nos Vicia satia v. r. iorem figuram iungimus.

Quibusdam, vt Dodon. placet, Os mundi dicitur, Belg. *Duisen*, nec est *Eruum*. Idem de *Fruement*. & in fol. Vicia, de qua Varro. Gal. in Asia Pergami *Erbum*, ab Atticis v. r. d. *epicos*, aut *epicos* nominari ait. Officinæ plerique perperam *epicos*, ac *Eruum*.

Theoph. Aphaces leguminis meminit: hæc cum Vicia nostra conueniat, considerandum est.

Dodon. gall. habens iconem Aphaces Fuchl. pro Vicia & pro Aracho, merito in post. eam reiecit, tanquam ex duabus compositam.

An Anguill. Vicia nigra? Lob. & Penz Adv. *Ciaur*, Vicia, de qua Varro. *epicos* Atticis. Item Obs. *Vicia*, Angl. *Siche* / Belg. perperam *Orobis*. Ic. Plant. *Vicia* Teut. 83. Tom. 2.

Cordo in Diosc. *Orobum*, *Eruum*, omnes passim Germ. *wischen* / sed errore seducti: est Latino-rum Vicia, & Græcorum Aphace, seu *Bicia*.

Figuram habet Lonicerus sub titulo *Zamwischen* / *Roswischen* / quæ Vicia non videtur.

Existimo Matthiolum in Diosc. per Aphacen intellexisse plantam, de qua hoc loco agimus, quamvis viciarum genera confundat, vti etiam earum nomina, & icon eius aliam plantam denotare videatur, quæ vt Fuchl., ex variis plantis composita est: nec se correxit in post. com. Italicis. In Hist. germ. huius plantæ Historia confusior, quia Aphacen, germ. *wild wischen* vocat, i. e. Viciam siluestrem. Figuram eandem habet, quam olim pro Aphace. In Epit. Matth. cum addit. Cam. simpliciter dicitur *Bicia*, Vicia, Ital. *Veccia*.

Mihi quidem Camerarii figura placet: ast Matthiolo patrocina, nullam attulit ei lucem, nec patrocinaus est.

Clus. Pann. Vicia vulgaris satua. Item Hist. Vicia. Hic Veram viciam expressimus (inquit Hist. Lugd.) Matth. autem nomine Aphaces depinxit, quam Gal. cum Vicia coniunxit. Hist. Lugd. intelligere Viciam vulgarem satiuam non

dubito, verum quicquid sit veram non exprimit: nam Aphace pictura Matthioli est Vicia inter frutices provenientis.

Vicia secunda C. Bauh. apud Matth. siue angustiore folio, Vicia Matthioli, Vicia vulgaris satua Clusio, Aphace vera Lugd. Arachus Dod. gall. Cracca primum genus Dod. in fol.

Matthioli figuram Frater retinet, quæ falsa: sunt enim appensæ siliquæ foliis: an Matth. intellexerit satiuam viciam, non abs re ambigitur: ei enim Vicia semen est minus, quam in Aphace: præterea in Vicia veraque, tum satua, tum silv. folia non sunt acuminata. Vicia satua non bene meo iudicio dicitur angustiore folio: multæ siquidem silv. Vicia sunt magis angustiore folio, quam satua. Hist. Lugd. habet quidem Matth. figuram falsam, sed per eam non intelligit Viciam satiuam. Dod. Arachum vocans, de silv. Vicia loquitur, non de satua, nec etiam figura eius Fuchliana conuenit cum satua, aut silv. Dodonzi in hist. Lat. Cracca primum genus, non est Vicia satua, sed silv. Satia laudabilem figuram posuit p. 341. pro Vicia.

Vicia, auctore Casalp. semen est nigrum, aut maculosum, Lente rotundius: flores purpurei, aut in cæruleum vergentes. Differunt semina inuicem, crassitie, rotunditate, amaritudine: amarior, quod tenuius est, & rotundius: huius siliquæ breuior & aspera.

Vicia vulgaris satua copiose in agris Montbelgardensibus feritur, & potissimum circa *Blamontium*, vnde Montbelgardum adfertur, pro pabulo Columbarum eis gratissimo, quum interea Gallinæ, vti mihi affirmatum, non facile his vescantur, anates verò, si comedant, moriantur. Semina maturatione Julio & Augusto.

VICIA ALBO SEMINE

Minifico *siliarum* lusa penè imponat alicui, veluti Proteus aliquis, vt eadem non eadem putari possit: ex his enim alia ferè rotunda, alia longa, & angusta: *stus* vnicus, vel geminus, multa purpuræ pictus, quæ in se à Vicia, Aphace dicta, seiungitur, breui pediculo hærens: *siliqua* diuersæ quoque, *seminibus* copiosis (nouem etenim grana in vna numerant) grauidæ, albis penitus, aut subpurpureis variis, aut vitore pallentibus, ad Pisorum viridium minorum (quæ magnitudine quoque adæquant) figuram, palloremque accedentibus: à quibus tamen seiunguntur, quod quæ siliquæ adnectuntur, non, vt illa, nigricant.

Huius meminit Tragus in Hist. germ. sub nomine *wisch wischen* / suspicaturque Fabam Veterum. Idem in Hist. lat. *Eruum* candidum vocat, coniicitque esse Fabam Veterum. Inter Ciceris Arietini genera reperitur, quoddam coloris pallidi. Hoc genus Erui (quod germ. *wisch wischen* vocant) Pisum esse proclui errore quis iudicare posset: sed neque ad Pisa, neque ad Orobos commodè referri potest. Hoc *Eruum* Fabas esse eas, quarum Veteres seorsim sub *Cyami* appellatione mentionem fecerint, suspicatur Tragus. Anguill. Vicia alba.

Habui Montbelgardi in horto Ill. E. C. Adhæc propè Bessfordiam reperi in agro satam cum Pisis. Argentinz Iulii principio dedit D. Agerius plantam virentem cum siliquis delatam ex Molzheim nomine Pisi gallici, ita nominantibus

Isauris, qui semine eius vescuntur.

Arach.
Cracca,
C. Bauh.
Germ. Lap.
341.

Locus &
Tempus.

Folia dupl.
era.
Ela.
Siliqua.

Locus &
Tempus.

VICIA VULGARIS SILVESTRIS
semine paruo & nigro, frugum.

A Vicia, lat. fe-
ruine potissi-
mum differre
videtur, quod
admodum par-
uum & rotun-
dum, copio-
sum (ad octo-
na eximere
memini) in si-
liquis angu-
stioribus, lon-
gioribus, ma-
gisque tereti-
bus, quam Vi-
cia. Sepium,
minus hirsutis
& fere glabris,
quae sicca ni-
grescunt.

Aphace al-
tera Manard. (de qua Diosc. & Gal.) inter legu-
mina reponenda: Vicia adeo similis, ut eius no-
men etiam hodie adhuc apud rura retineat, &
silu. Vicia dicatur quae in agris saepissime sponte
nata videtur.

Trago in Hist. lat. Vicia minor, & Vicia tertium
genus. Idem Hist. germ. Das Erv wicken
geschlecht: potest comprehendi sub Orobanche
aut Erui angina Theoph. Hoc licet non pinga-
tur à Trago, descriptio tamen, & iam dicta nomi-
na huc referre cogunt.

Viciam minorem appellat Gesn. Vogel wick
cuius siliquae subrubrae, antequam maturescant
tuben wick.

Matth. in Diosc. nomine Vicia nostram Vici-
am vulgarem silu. semine paruo intelligere vide-
tur: nulla tamen descriptio commoda, figura ac-
cedit iconi Fuchsi, quod folia attinet: siliquae
cum floribus appensae folius, figmentum certe:
quisnam vidit tale aliquid in genere Viciarum.
In post. com. Ital. nihil correxit: dicit errare eos,
qui hanc Viciam Aphacen putent, ut olim dixe-
rat. In hist. germ. idem figmentum habet nomine
Viciz & wicken. Qui eius patrocinium suscepit,
nihil hic patrocinatur. Aphaca Viciz species,
quam nostri (ait Corn.) vogel wicken, & wild-
wicken appellant.

Caesp. Bauh. qui Viciam vocat apud Matthiol.
falsam eiusdem figuram reuinet, ac sativam vul-
garem esse: cui cur assentiri non possim, ante di-
ctum.

Dod. gall. & arachum Galeni lib. de
alim. facult. dicit, & nominat gallice Vesse, aut
Vesse sauvage, Belg. Krod. Idem hist. frum. &
in fol. Cracca primum genus. Hoc vitium Gra-
cis & arach, Gall. Vesseron, quasi Viciolam, aut Vi-
ciastrum, Germ. Wild wick & S. Christoffels
Brant / Brabantis Croc. Ruellius etiam Craccam
appellari refert. Fuch. Aphacen appellat. Matth.
vero Viciam fecit, sed uterque à veritate recessit.

Figuram Fuchsi habebat olim Dod. quam me-
rito in postremis reiecit: an Aphace Fuchsi, sit
eius Cracca, ut vult, dubito, figura non indicat:
an potius descriptio conveniat, iudicent alii.

Lob. & Ponz Adu. Arachis, sive Arachis & Cracca, Arachis
maior. Vicia silu. Semina non compressa, ut
Viciz & Aphaca. Item Obl. Aracus, Gallis Croc-
que, An vera Aphaca Diosc. Dalechampi.

An Anguil. Aphaca, Patavinis Viciome, & Ce-
setone.

Aphace, Cordo Vicia est, quae sponte in arvis
nascitur, quam Germani Feldwicken.

Loniceri figura, quam sub his nominibus pro-
ponit, Wild wicken / feldwicken / S. Christoffels
Brant / Graecis Aphace, vulgo Vicia siluestris:
non convenit Vicia vulgari minori.

Hist. Lugd. Aphaca vera, Vicia Matthiolo.
Aphace recte fortasse dicitur legumen, quod
Matthiolus nomine Vicia exhibuit. Hist. ean-
dem nobiscum Viciam intelligere facile existimo,
verum figura Matthiolo falsa: non bene con-
uenit.

Abundat in agris Montbelgardenibus: eandem, Locum &
ni abbat memoria, florentem repertum cum suis flo-
ribus purpureis passim in segetibus circa Mont-
pelum mense Martio, Aprili, & Maio.

Huic affinis, si non eadem, angustius folia
ac tenuissimis, longiusculis, flore pulchro, pur-
pureo, à me reperta, cum essem Montpeli, inter
saxa, quae iter Fronignanum mense Aprili, Frater
C. Bauh. similem Basileae collectam misit. Dedit
nobis D. Agerius Viciam, ex cuius radice erum-
pit, ut in Cistis, & Ledo, Orobanche, cortulea.

VICIA SILV. QUASI INCANA
flore albo.

M Vltos ex eadem radice, quae perennis est, Descriptio:
profert ramos, teretes, striatos, pedales, e-
tiam cubitales interdum, quos ambiunt foliorum
alis, quemadmodum in vicia vulgari laeva, & sil-
uestri, sed densiore lanugine obducta, & quasi
incanx: capreolis, quibus, vicino gramine se im-
plicat, extremam alam occupantibus: flores in
superis foliorum alis, terni plerumque, Vicia
vulgaris floribus persimiles, candidi coloris, su-
periore tamen folio, obsoleto coloris venis inter-
ne distento, inferiore foliolo eiusdem coloris:
floribus succedunt siliqua, seu vaginæ planæ
(quantum videlicet ex illarum rudimentis colli-
gere licuit) Vicia vulgaris siliquis similes: radix
fibrosa est, tuberculisque ut Leguminum plerae
que radices vivaces, donata.

Clusio dicitur Vicia silu. albo flore, tam in Pan-
nonia, quam in post. Hist. sive genus primum.
Hungaris Waryw borso / hoc est Cornicis Pisum,
nuncupatur.

Nascitur in arvis desertis apud Ebyzreg op-
pidum in Pannonia situm. Maio mense floren-
tem anno 1579 Clus. duntaxat observabat.

VICIA SILV. FLORE AL-
bo alia.

Viciam siluestris flore albo in Austria col-
lectam dedit nobis D. Agerius, ea videtur
similis foliis luteis, pilosis: flor in sicca pallidus
apparet: siliqua principium, quod ad-
fuit, latiusculum, pilosum.

VICIA LUTEO FLORE SILV.



EX vna radi-
si, idemque fle-
xuosi exeunt
cauliculi, angu-
losi, in alas al-
ternatim diuisi:
quibus folia ha-
rent Viciae sati-
uæ similia, dena,
duodena, plus
minus, quorum
costa in tortile
clauiculam ter-
minatur. Alarum,
foliorumque
commisuris flo-
res singulares,
ex brevissimis
pediculis pen-
dent, speciosi la-
tis, ex luteo pal-

lidi, quibus siliquæ succedunt vulgatæ Viciae sili-
quis breviores, habitiores, crassiores, latioresque,
alba hirsutæ pubescentes, in quibus semina qua-
terna, aut quina, fusca, maculata, aliquantulum an-
gulosa, compressaque: sapore leguminoso.

Montepeli observavi mense Martio & Aprili.
Montebelgardi mense Maio: semen maturum lu-
nino. Quotannis ex semine deciduo repullulat, ac
totam Hyemem perfert.

VICIA SEPIVM PERENNIS.



Prope sepes
provenit;
caule duorum,
triæ cubito-
rum longiti-
dine, foliis non
multum à foliis
Viciae vulgaris
satiuæ abluen-
tibus, subindeta-
mè variantibus,
in tarsu dispositis
per conjugatio-
nes, quales ali-
quando in vno
folio tredecim
numeraui, quan-
quam soleant
multo etiam
paucioribus cõ-
stare: singula-
ria folia à Vicia

satiuæ ed potissimum differunt, quod quâ parte
costæ adnectuntur, latiora sint, indeque sensim
attenuantur in mucronem [licet & quædam ro-
tunda satius reperiantur] minus hirsuta, sapore sa-
tuo, viscido, flores unico pediculo rebenti harent
plures, ad sex vsque, quod non bene exprimitur
in nostra Fuchsiana iconè, è calyce purpureo, vi-
nicolores, non bicolores, ut in Vicia sativa & sil-
vestri vulgariori: quamquam intentionem quan-
dam, & remissionem coloris in partibus floris
est observare: siquidem folia eius inferiora satu-
tiores purpura tincta sunt, & penè nigrescent:

superiora dilutius purpurascunt. Siliquarum infi-
gne discrimen: tam feliciter siquidem florum
vbertatem vna duntaxat, aut altera siliqua exci-
pit, minor, multoque brevior, latiuscula interim
& compressa, glabra, non ut sativæ hirsuta, per
maturitatem nigra, præque nigredine penè lu-
cens, semina claudens Pisi sapore, medullâ luteâ,
formâ variâ, modò longiora, interdum sulque de-
que aut aliters compressa, non exactè ro-
tunda, plus quàm dimidio sui siliquæ adhæres-
centia, intercedente apophysi longissimâ, ut in
Lathyro maiore, minora quàm Viciarum sativa-
uarum, coloris albi, punctulis discursantibus,
quantum hætenus observare licuit: radix pe-
rennis, reptatrix, Ar. stolochiz clematis instar, fi-
bris multo minoribus, dulce quid [saporum legu-
minum de more] respiciens.

Trag. germ. sub titulo *Das ander wicken ge-
wächs wald wicken* & Orobi silv. sepium Vi-
ciam pingit. Latinus verò, nomine alterius maio-
ris Viciae generis, & Viciae maioris silv. An au-
tem in descriptione, & inter nomina sit secun-
dum genus, dubium movet, quod ait, semen
grandius, quàm in sativa, quod hætenus non-
dum observavi.

An Gesn. de hort. Vicia floribus rubicundis,
eidem de coll. stirp. Aphace Fuchsii, genus Viciae
silvestris?

Apud Tabern. dicitur *Cracca maior*, *wicken*.
Græc. *ἀφάκη*, Vicia, & *Cracca*, Arab. *Apaki*. Ital.
Aphaca. Belg. *Croek*. Boh. *wicken*. Quàm bene
autem Tab. distinguat nomina Viciarum, faciliè
peritioribus constare poterit.

Fuchsio dicitur Aphace, & vulgò Vicia silv. &
Os mundi. *wild wicken* germ. Aut *S. Cristoffels*
Franz. Gall. *Vesse sauvage*, aut *Vesseron*. Figura Fuchsii
satis commodè exprimit Viciam nostram, ait de-
scriptio minus placet. Dodonæus olim suæ Vi-
ciæ Fuchsii accommodat, quamvis aliam plan-
tam intelligeret, quod in Hist. frum. & in folio de-
monstravit, ubi suæ Viciæ veriorem figuram ag-
posuit.

Aberrant tandem, qui censent Aphacam nihil
à Vicia differre ut ostendit Galenus.

Plinius Dioscoridis Aphacam ad verbum retu-
lit, inquit Matth. *ἀφάκη* Græc. Lat. Aphaca & A-
phace. Arab. *Apaki*, *Asaki*, siue *Albika*. Ital. *Apha-
ca*. Germ. *wild wicken*, & *Vogelwicken*. Figu-
ram eandem, quam Fuchs. pro Aphaca habet
Matthiæus, verum descriptio non placet. In
post. cum. Ital. & Hist. germ. eandem figuram
proponit, non demonstrans de qua planta lo-
quatur. In Epit. tandem Matth. cum add. Ca-
mer. alia Aphacæ species nuncupatur. Vicia se-
pium figuram aliquam fortè ponit Lonicerus, sub
dictione *wicken* quævis de ea non loquatur in
contextu. Multum etiam differt Vicia silv. Lobe-
li Obs. quamvis eandem faciat C. Bauh. apud
Matth. dicens: *ici a latiore folio*, Aphaca Matth.
Vicia maior silv. Trag. Vicia silv. Lob.

An potro Clus. Pannon. & Hist. Vicia pluri-
mum in Belgica vepribus se implicans?

Minimè tandem gentium Vicia vera cum A-
phace Matthioli, quod Hist. Lugd. placet, conue-
nit. Diximus enim antè figuram Matth. non con-
gruere cum Vicia sativa, est namque Vicia quam
sepium perennem vocamus.

Copiosè provenit in sepibus & pratis circa
Montebelgardum, nec non spontè in horto Ill.
E. C. florèt Aprili mense. Circa Bessfordiam quo-
que florentem observavi in sepibus Augusto, &
in fine eiusdem mensis cum semine deciduo;

Siliqua

Semen

Orobi

Aphace

Cracca

Tabern.

Os mundi

Nomina

linguarum

Matth.

Tabern.

C. Bauh.


Hist. Lugd.

Locus

tempus

Basileæ & alibi quoque à me observata est.

VICIA SILV. LVTEA CVM
galea fusca.



Vicia sil-
vestris
nomine dedit
mihi ramum
D. Agerius, col-
lectæ circa Bo-
nontiam, cui
tribuebat florē
luteum cum
galea fusca: in
sicca sanē infe-
riora labra lu-
tea apparent
& nescio quē
obscurum co-
lorem habet,
flore maiores,
quā luteæ à
nobis descri-
ptæ, bini ex
breuibz pedi-
culis iuxta fo-

lium, vt in illa: folia verd diuersa, quinque tan-
tū coniugationes supputauit, foliola breuiora,
latiora, ad foliola Vicia sepium perennis acce-
dentia, pauld rotundiora tamen, folia desinunt
in capreolos: siliqua etiam quamuis nondum ma-
tura nobis videbatur, attamen ad modū dictæ
Vicia siliquam, eam suo tempore accessuram,
colligere haud difficile fuit.

VICIA MULTIFOLIA CVM
latis siliquis.



Pulchrum
Vicia ge-
nus accepimus
à Doñ. Agerio
Med. Argen-
tinenti, cui
folia omnind
similia Vicia
nostræ multi-
floræ: foliorum,
vt in illa, coi-
ugationes plu-
rimæ, ad duo-
decim suppu-
taui: angusta
sunt, in acumē
desinunt: in iis
magni pili: flo-
res parui, sin-
gulares, ex
breuissimis pe-
diculis siccil-
lei apparent:

siliqua singulares etiam, primd valdē hirsutæ, po-
stea minus, sed tactu asperæ, vnciam vnā & se-
mis breuiorē, & vnciam semis ferē latæ, in iis
grana quinque obseruauimus, cuius sint coloris:
vel magnitudinis, dicere, non possumus, quia
immatura.

HELENIVM ÆGYPTIVM EX
genere fortē Viciarum.

Planta gracilior, quā sequens, in asperis &
petrosis nascitur: dodrantalibus cauliculis e-
rectis: foliis ab radice longioribus sequenti, nul-
lā fermē diuisurā, in caule autem crebris diuisu-
ris, gracilioribusque: silesulos fert veluti in capi-
tulis rubentes: & exiguas ac breues siliquas foli-
culis inclusas: radice nititur tenui, colore hu-
reo. Huic & sequenti non absimile videtur He-
lenium Ægyptium apud Diosc. descriptum ex
sententia Crateuz.

LUPINVS SILV. ITALORVM
rusticorum, Crasip. dictus.

Planta hodie à rusticis [Italicis] Lupinus siluestri
vocatur: oritur prope flumina præcipuē in
maritimis: caulibus humi repentibus, cubitalibus,
circa radicem subrubentem: folia fert diuisa Len-
tis modo: foliolis sc. coniugatis in pediculo dis-
positis, colore, & figurā Lupini, infernē candi-
cantibus, supernē virentibus: flores in racemulis
oblongis, colore sanguineo siliquas vaginā inclu-
sas, tenues, asperas, interceptas, ac depressas, quā
Lentes, inuicem hærentes: eā pinguescunt iume-
ta, & à morbis curantur.

VICIA MULTIFLORA PEREN-
NIS, NEMORENSIS, SIVE DV-
metorum.

Per antonomasiam floridæ nomen meruit hæc
Vicia, quippe quæ velut iubam, numerosissi-
mōs confertim, eodem vergentes, paruos, cæru-
leos, aut purpurascētes flores Vicia proferat,
spicæ æmulos, in furculo peculiari ex alarum si-
nubus orto: folia angusta admodum, acuminatā,
hirsutā, in alam digesta, Vicia vulgaris satiuæ fe-
rē instat, in agro squalidiori natæ, costæ extre-
mum in capreolos abit quemadmodum in Viciis
& Lentibus: caules bicubitales, striati, in ramos
satis rectos diuisi.

A Clusio ita describitur:

Cubitalibus est ramis, striatis, lentis, infirmis,
& humi, nisi capreolis sese sustineant, procum-
bentibus, oblique, modd in hanc, modd in alte-
ram partem, secundū foliorum alas, inflexis, e
quibus frequentes plerumque ramuli enascun-
tur: foliorum alæ oblongæ, tenues, deorsū incur-
uæ, seu nutatæ, & in binos capreolos desinentes,
duodenis, vicienis, vicienis senis, aut pluribus, in-
terdum oblongis, angustisq; foliolis surrectis,
& ex aduerso nunc æqualiter, modd in æqualiter
nascentibus, præditæ sunt: silesuli elegantes, Vi-
cia silv. albo flore, quasi incanæ floribus formæ
non dispares, minores tamen, & Astragalū mon-
tani (Clusio Onobrichidis quartæ) silesulis pro-
pæmodum respondētes, coloris ex cæruleo pur-
purascētis, vicieni nonnunquam, aut plures, spi-
cæ instar in oblongis nudis ramulis, ex superio-
rum alarum sinu exeuntibus, nascuntur: deinde
vncialis longitudinis siliquæ exiguum semen
continentes: radix tenuis, latē serpens, & sub tel-
lure se condens, singulis annis nouos, frequen-
tioresque ramos proferit.

Est apud eandem Pannon. Vicia filu. spicato flore: & Hist. post. Vicia filu. Pannon. a Hungaris Warym borso [Cornicis Pilum] quoque dicta, [omne namque filu. Viciae generis nuncupant] quae plurimum à Belgica, vepribus se implicante differt.

Aphace
Orobanch. Trago germ. die fänffe wild/ Aphace Diosc. germ. S. Christoffels Braut. Lat. Os mundi. Quibusdam Schwarz linsen. In Lat. autem, Vicia filu. altera, Vicia alia in dumetis, Vicia quinta, Vicia postrema, quae in dumetis nascitur, & dñm.

Dod. gall. Vicia secunda filu. prima quae potest vocari Arachis: gall. Veffe saunage. germ. wild wischen Belg. wilde Wüsen. Item frum. & Hist. in sol. Nostri wilde wizen, hoc est, Viciam filu. aut germanicam, non impropiè Galegam filu. aut germanicam quis ipsam nominarit: nam Galega quaedam species videtur.

Gesl. de Lunariis, Trago Viciae genus in dumetis nascens. Et de coll. stirp. Vicia quaedam filu. floribus caeruleis. An eidem ibidem Viciae quaedam species [an Aphaca.]

Tab. ic. & Hist. Aracus, Vicia, Aphaca. Vogels wischen.

Locu. Viciam multifloram habemus in horto Mont. belgardi C. W. in med. co., & ferarum, passim etiam abundat in dumetis & pr. tis. Obseruavi Basilex florentem Iunio & Iulio, Bessordiz prope castellum etiam in pratis, & Montspeli cum flore Maio in segetibus prope Castellneuf. Aliquando Gesnero plantam siccam cum descriptione misit, sine nomine. Frater C. Bauh. attulit ex horto Patavino nomine Anthyllidis primae Dioscoridis Galindino.

VICIA PARVA, SIVE CRACCA MINOR CVM MULTIS SILIQUIS HIRSUTIS.

Descriptio.
Cons.
Folia.



EX radice exili & inuolu, quadrati, tenues, & infirmi exeunt coliculi importuna alarum vberitate luxuriantes: folia Lentis foliis paria, laeua, pinnata, raro sibi mutuo respondentia, ad medium nervum annexa, ad septendecim, qui in cortices capreolos variè partitios faciens segetem infesto complexu attripit, strangular, excrecens interdum ad tres cubitos; ex foliorum alis hinc inde enatis pediculis stostati insident racemazum, quatuor, vel quinque, eodem spectantes, pusilli, ex albo subpurpurei, quos siliqua excipiant, seminales, hirsutae, quarum singulis bina grana insunt Viciae sepium-minora, rotundiora, magis maculata.

Trag. germ. das flein weisgraw wischen: potest comprehendere sub Orobanche, aut Erui angina Diosc. & Theophrasti. Idem. in Lat. Orobanch. Tom. II.


minima Vicia: quatuor & genus. Tragi Viciam minimam, quod referam non video, nisi sit Cracca minor.

Tab. ic. Cracca minor Klein wild wischen Hist. etiam Vicia, Aphace & Aracus.

Lob. & Pena Arachum vocant, siue craccam minimam: & Aracum, siue craccam minorem, habentque figuram Dodonzi, dicuntene in Aduersariis quatuor granula contineri in siliquis, quod nondum animaduerti, sicut nec etiam Dod. qui bina tantum in illis deprehendimus. Dicitur autem Dod. gall. Vicia filu. 2. Arachi species I. Hist. verò frum. & Lat. in sol. Cracca alterum genus, Brabantis Eroc.

Abundat in agris, etiam in horto Ill. E. C. à me sata, quae se propagat semine deriduo quotannis. Frater C. Bauh. attulit Patavio pro cicere filu. Cortusi: iis Basilex obseruavit, genere florentem & siliquas habentem vidi Iunio & Iulio. Montbelgardi florentem & semine maturo Augusto.

VICIAE, SIVE CRACCAE MINIMAE SPECIES CUM SILIQUIS GLABRIS.



Est praecedenti tenetior, foliis similibus interdum, tamen rationibus, pediculo tenuissimo, longo, ex foliorum alis nato: flos innascitur vnicus, suae purpurascens, saepe vel duo, vel tres, quem sequitur siliqua, praecedentis cracca siliquae par. glabra, torosa, duo, tria, aut etiam quatuor grana continens.

Hanc fortè Lob. & Pena confuderunt cum Dodonzi cracca altero genere, de quo ante.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. & passim in agris floret Iulio mense, semine maturo Augusto. Hanc & Geneuz quondam obseruavi in agrorum limitibus.

VICIA SILVATICA MAXIMA PISO siluestri similis.

Omnium Viciarum, quotquot haecenus videre licuit, maxima est, multorum cubitorum, foliis ad Viciae sepium folia accedentibus, multo maioribus, & Piso siluestri respondentibus, f. scuncialibus, viciam latis, modicè obtusis: flores siliquae cuiusdam longissimi extremum occupant numerosi, purpurascens, subsequenter siliquis pari cum Psorum magnitudinis, compressioribus, latis, glabris: radix crassa, nodis intercepta, reptatrix, cuius complurimum propagine fertilis, perennis.

Memini hanc Tab. icon. & hist. credimus, & hoc quidem titulo Pisi filu. minoris, Klein wild wischen.

Cracca minor.

Aracus.

Locu.

Tempus.

Descriptio.

Locu. & tempus.

Descriptio.

Folia.

Flora.

Pisum filu. minor.

D.

Locus



Viciam fil-
maticam autē
voco Vicia
genus hoc à
me olim re-
pertum pro-
pe Tigurum.
Hac mihi
prouenit
Montelgar-
di in horto
Ill. E. C. Ean-
dem copiose
reperi circa
fontē admi-
rabilem Bol-
lensem cum
flore & sili-
quis mense
Augusto, &
veniēdo
Rheinfeld in-

ter Weil & Basileam cum siliquis Nouembri.

VICIA ALIQUA.

Descriptio. IN ramorum cacumine flores congestos possidet, Polygalis Gesneri pares, nec absimili figura, sed colore caeruleos: folia pinnata costae annexa, Viciz foliis longitudine paria, angusta: costa extrema in capreolos desinit.
Nobis attulit Gener Cherlerus, ubi collegit, non recordatur.

VICIA SILV. CVM LENTIS
siliqua.

Caulis.

Folia.



D Odcan-
talē ha-
bet caulem gra-
cilem, angulo-
sum, glabrum,
ramosum folia
duarū, triū-
ue vnciarum,
rarsi effigie,
singularia,
cracca minimae
foliis non ma-
iora, per extre-
mum obtusa &
veluti cordata:
costae extremū
in tortiles cir-
rhos abit: ex
asque sinu enatus
pediculus vn-
cialis florem ge-
rit vnicū, Len-

tis flori similem, quem excipit siliqua vncia longior, semunciam lata, glabra, compressa, duo, aut tria claudens semina, orbiculata, Lentis maioris.


Pictor noster male pinxit folia acuta, quum sint cordata quodammodo.

Nemausi in Gallia Narbonensi collectam mihi attulit Gener Cherlerus.

VICIAE PARVVM GENVS, FOLIO
longo.

Locus

C Vbitalem Montpelio allatam dedit ramum
Frater C. Bauh. angulosum, foliis latis, costae



in capreolos
facessente: sin-
gularia folia se-
muncialia, &
duarum vncie-
rum, & aminea
vix culmū lata,
in acumen de-
finientia: stocu-
li longo surcu-
lo peculiari he-
rent, multi, o-
blongi: sequun-
tur siliquae crac-
cae minores,
nonnihil lon-
giores.

Folia

Florus.

Siliqua

VICIAE PVLCHRVVM GENVS MVL-
tisolum, siue Galega species
quibusdam.



C Oste lon-
gez in ca-
preolum defi-
nienti alligan-
tur folia inter-
dum viginti, in
acumen defi-
nientia, glabra:
florū idem po-
situs ex longo
pediculo, pau-
ciores, vt ani-
maduertere
adhuc liquet,
paullō maiores
singuli, quales
ferē Viciz se-
pium, purpu-
rascentes, nisi
fallat sicca plā-
ta. Ramosa est
hæc Vicia.

Folia

In foliis siccis nullam manifestum animaduertimus saporem.
Argentinæ anno 1595. habui ex plantis siccis D. Ageri, qui postea anno 1600. dedit nomine Galega alicuius ex monte Apennino.

Locus

VICIA, QVAE PITINE ANGVIL-
LARE, LATA SILIQUA, FLO-
re luteo.

P Itine Anguillaræ dicta, legumina est, ex caule tenui & annua caules plures proferens angulosos, cubitales, dodrantes, & sesquicubitales, ramosos, tenues, imbecilles, nec nisi capreolorū ope, quibus se proximis circum voluit, humo surgentes: folia ex internodiis bina, opposita, cauliculis sine pediculo adnascuntur, triquetra, Helxines cistampeli, laxa, tenera, striata, sursum plerumque spectantia, & caulem veluti complexa, ex quorum alia subinde fami prodeunt, foliis itidem vestiti, nec non clauiculæ tortiles, itidemque pediculi duabus vncis longiores, quibus singulis singuli insident stipes lutei, Lathyrus luteus floribus.

Caulis

Folia



floribus similes, quos *siliqua* excipiunt viciales, aut sescunciales, latiusculae, modicè falcatae, compressae, in quibus sex, septem, & semina, Lenticulus minora, non ita compressa, sed paulò rotundiora, quae modò nigricant, modò rubescunt, modò variegata videntur.

Hæc est illa, quam Dod. passim *apocynum*, Aphacem, & Aphacen Diosc. & Plinio, ac Galeno dictam scribit. An autem nomina Italica *Vicioni* & *Ceserone* quæ Lob. & Pena in Adv. & Obs. huic plantæ tribuit, conveniant dubium mouet, quoddam Anguillara ea alteri adscripserit. Nunc si Gesnero fides non abroganda, malè Anguill. *trium* ex Theoph. conuertit. Pitine namque pro Serpillo corruptum apud Theoph. esse vocabulum, obseruauit primò Gesn. quod idem postea, ad plantam siccam, quam ei inter alias Monspeliasas transmissi, annotauit.

Aphaca, Camer. horti teste, seu Pitina Theoph. depingitur à Dodon. Lob. & Lugd. Lugd. quidem hæc vocabulis: Orobanche, legumen, aut leguminis vitium, *οὐρανία* Theoph. Gal. & Plinio. Aphaca Dod. quam Theod. in Theoph. Erugam vertit, alii Erui anginam. Sed dicam liberè, hæc planta non placet pro Lugdunensis Orobanche, Cæsalpini sententiam potius approbarem, qui Cuscutam Orobanchen putat. Eius tamen opinionem, & eorum qui eum sequuntur, apprime recipio, qui Aphacen statuit: Theophrastus enim scribit Securidacam in Aphaca nasci, quasi satius sit Aphaca.

Cæsalp. porro hanc vocat Aphacam flore luteo. Diosc. Gal. & Plinii. Aphacen, cui semina madidiora, & minora Lenticula: per madidiora verò significare videtur, lubricum lentorem, qui peculiaris est in Aphace seminibus. Dicitur à Tab. *Élatine* tertia.

Quotannis semine deciduo se propagat in horto Ill. E. C. aliàs spontè Montbelgardi copiosè prouenit inter segetes. Monspelii obseruauit, nec non in Italia, vt Bononiæ. Basileæ florentem & siliquas habentem mense Maio. Hanc Genæ vocant *Pesere*.

VICIE FOLIIS ARACVS Anguillarz.

ARACOS Galeni prouenit inter segetes foliis similibus Viciæ, sed angustioribus. Flos est coloris rufi, & semen simile Erui, verum caret, Inquit Anguillara, nomine vulgari.

An non fortè à nobis sub alio nomine tradita, Lectores inuestigent.



Tom. II.

LENS.

CAP. XVI.



Lens maiori



Defec. Canio.

Legumen hoc infirmis caulibus humi prostratur, nisi in propinquo habeat cui capreolorum amplexu innitens sese erigat: radix iisdem pusilla: *folia* pinata Viciæ, minora, hirsuta: flores purpurascunt, vel albescent: *siliqua* breues, compressæ, *semina* duo, aut tria continent, circinata, compressa, colore albido, vel subnigro, seu fusco, parua, valde læuia, quæ cortice dempto in duas partes scinduntur.

Folia

Floris

Siliqua

Semina

Lens aliâ

Est & alia vulgari Lente omnibus partibus speciosior & maior, [ob id dicta meritò *maior* Lens] herbæ, foliis, flore albo, siliquis, vt & semine, quod Lentis vulgæ duo aut tria grana faciliè æquat.

De Lente hæc scripsit Theoph. Lenti caulis in latus tendit. Hæc præarida sine villo odore, maximè inter legumina fertilis est, & summam, quæ semen ferunt pusillum. Lentem porro [cuius in leguminum genere sera sauo est] vt crassecat, paxillo demittunt.

Inuenio apud authores, inquit Plinius, æquanimitatem fieri videntibus eâ. Hinc Rhodig. [vt Dalech. notat] lentos dictos vult patientes, lenes, minimè iracundos, quamuis & pigros, incuriosos, legnes, sic etiam vocent. Genera Lenti in Ægypto (pergit Plin.) sunt duo, alterum rotundius, nigriusque: alterum suâ figurâ. Vnde vario vsu translatus sit in Lenticula nomen.

Hinc etiam Marialis rem exiguam & serè nullius momenti significare volens, ita canit:

Accipe Nilivæ Pelusiam munera Lentem

Vilior est alica, carior illa Faba.

Cæterum, infit Tragus, Lens, quæ Theoph. Lentis vulgaris, seu agrestis, grana alia subrufa, alia

Æquanimitatem per vici.
Lenti qui dicantur.
Genera duo Plinio.

Ægypti triplici menti.

Differentia Tragi.

Pd 2

ex laete pallida, nonnulla ex cano nigricantia apparent: humida verò calis tempestate prorsus nigra euadunt. Serap. *Hader*, Hebr. *Asdach*, Chald. *Tamma*, aliàs *Theluscha*. Lens sativa maior & latior. Lentis vulg. granula haud temere supra quatuor in siliqua. Lentes in Vicia degenerant.

Lonicer. pingit, dicens: Linsen vocati Græcis Phace.

Dodonæo in fol. additæ duæ sunt icones: vni titulus *Lens*, alteri *Lens minor*; cum tamen duarum in descriptione non faciat mentionem. Sed illæ, quod dicitur, *Lenticulam attingit*. Quemadmodum enim olla fictilis Lentem amare videtur, ac velut vltro venire ad Lentem: ita Dodon. ad exhibendum absque descriptione figuras vehementer propensus, ac velut ad id natus, duas nullâ additâ descriptione proponit.

Lentem ex Erymi vi dictam esse *Cornario* videtur, quasilenis dicta sit, lentitatisque significationem habeat. Nec Germanos aliter Linsen appellare, quàm velut Linde.

Nomina *Græcis* [autor est Matth.] eadem quæ *Lens* Latinis. *Hader* Arab. *Lentichia* Ital. Germ. *Linsen* / Hisp. *Lenteyas*, Gall. *Lentille*, Boh. *Sfocovice*. Et quod Matth. omisit, Belg. *Lensin*, Angl. *Lentiles*. Idem in post. com. Ital. duas facit species, minorem albam, cineritiam paulò maiorem. Et Hist germ. Lentem maiorem, & minorem.

Aduersaria nomenclaturam dictam, non tantum non habent, sed nihil insuper addunt.

Anguill. præter iam recensita nomina, *Lente* in Italia dici perhibet. Frustra denique mihi videntur à Lob. Obs. & Ic. Pl. duæ poni figuræ: præterea magis vulgarem existimo minorem, quàm maiorem.

Gesner. cum *Cordo* contentus nominibus vulgaribus, vt & Tabic. & Hist.

Lentem Italicam *Cam*. horti grandiore dicit, & candidiorem vulgari.

Lentes in *Aracum* mutari obseruauit Marant. *tha*.

Lentis in A. raphanum *vari.* *Lens* *Cæsalpino* semen est candicans, aut rufescens, flosculis candicantibus, vel purpurascantibus: differunt amplitudine seminis, & exilitate: probatur satum & candidius, rufum & paruum deterius est: perfectum Græci *Phacom* vocant.

Casp. Bauhin. apud *Matthiol.* Lentium genera duo habet, maius & minus. Gerard. *Græc* lentis Lentem maiorem, minorem verò lentile appellat.

Locus & tempus. *Cæsum* amat, inquit *Plin.* siccum, solum autem tenue magis, quàm pingue. *Lens* floret *Montspeli* Aprilis, *Lugduni*, *Geneuz*, & *Basilez* frequens. *Montbelgardi* eâ conferuntur agri. Maior ex semine *Stutgardia* misso prouenit, Aprilis floret, Iunio & Iulio maturescit. *Lens* vulgaris seu agrestis, autore *Trago*, solo gaudet mediocriter pingui, soletque appetente verno tempore feri, erumpit è terra instar *Vicia*. *Lens* satina non ita pridem è *Lotharinga* ad me allata. Teste *Schvv.* calidiore solo, & iudo profleri gaudet. A *Cæsalp.* feritur locis aridis.

Vires & vias. *Lens* si assidue edatur, ex *Dioscor.* autoritate visum hebetat, ægrè concoquitur, stomacho incommoda est, inflat eum, & intestina: aluum autem sistit, si cum cortice edatur. Præstat, quæ facile coquitur, & quæ dum maceratur, nihil nigri remittit. Vim habet adstringentem. Vnde alui sistit decorticata prius, & diligenter cocta, pri-

ma in coquendo aqua diffusâ. Nam primum ipsius decoctum aluum sistit [*Plin.* Cod. Basil. non *Cornario* en. *malpighi*, vt videtur *Corn.* legitur contra *Gal.* mentem:] Inducit lens graui somnia, ad neruosa, & pulmonem, & caput incommoda est. Melius autem suum opus perficit ad alui fluxiones, addito ad ipsam cum aceto intybo, aut *Portulaca*, aut *Beta* nigra, aut *Myrti* baccis, aut *Malicorio*, aut *Rosis* siccis, aut *Mespilis*, aut *Sorbis*, aut *Piris*, aut *Palmulis* *Thebaicis*, aut *Cotoneis* *Malis*, aut *Cichorio*, aut *Plantagine*, aut gallis integris, quæ post cocturam abiciuntur, aut *Rhoc*, qui obsonis inspergitur.

Oportet autem acetum diligenter cum ipsa coquere, alioqui aluum perturbat. Tringinta Lentes decorticatæ ac deuoratæ, ad stomachi subuersionem profunt. Lentæ etiam *Podagram*, cocta cum polenta & imposita. Cum melle verò, sinus glutinat, crustas rumpit, & vlcerâ repurgat. At cum aceto cocta duritias & strumas discutit. Cum *Meliloto* verò, aut *Malo* *cotoneo*, oculorum & sedis inflammationes curat rosaceo ammixto. Verum in maioribus sedis inflammationibus, & magnis sinibus, cum *Malicorio*, aut *Rosis* aridis decoquitur, ammixto etiam melle.

Ad nomas gangrænicas similiter, aut ammixtâ etiam aqua marina, Ad pustulas autem, & herpetas, & sacrosignes, & pernioles, velut antea dictum est. Cæterum ad mammas lacte turgentibus, & lacte in ipsis in grumos coacto in aqua marina cocta, & imposita commoda est. *Plinius* vsum eius medicum ferè velut *Diosc.* habet. *Lens* optima inquit, quæ facillimè coquitur, eâque, quæ maximè aquam absorbet. Aciem quidem oculorum obtundit, & stomachum inflat, sed aluum sistit in cibo, magisque discoccta celesti aqua: eadem soluit, minus percocta. Crustulas vlcerum rumpit eaque, quæ intra os sunt, purgat, & adstringit. Collectiones imposita sedat, maximèque exulceratas, & rimosas. Oculorum autem epiphoras cum *Meliloto*, aut *Cotoneo*. Et paullo post: Ad sedem cum rosaceo aut *Cotoneo*. In his, quæ acius remedium exigunt, cum putamine *Punici*, melle modico adiecto. Et rursus: Propter dissolutionem stomachi tringinta grana *Lentis* deuorantur. In cholera quoque & dysenteria, efficacior est in tribus aquis cocta in quo vsumelids semper eam tortere ante & tandem, vt quàm tenuissima detur, vel per se, vel cum *Cotoneo*, aut *Piris*, aut *Myrto*, aut *Intubo* erratico, aut *Beta* nigra, aut *Plantagine*. *Pulmoni* est inuulsi, & capitis dolori, neruosisque omnibus, & fellis: nec sono facilis. Ad pustulas utilis, ignique sacro. Et mammis in aqua marina decocta: in aceto autem duritias & strumas discutit. At *Galeno* teste, Lentes adstringunt quidem, sed non validè, & caliditatis & frigiditatis in medio consistunt, & secundo ordine siccant. Proinde corpus quidem ipsarum siccant, & ventrem sistit. Decoctum verò propellit. Quapropter etiam prior aqua diffunditur, cum cohibendi gratiâ sumuntur. Et rursus: Nemo ex Lentibus panem facit: arida enim sunt, ac friabiles, corticemque habet adstringentem, & quæ ipsorum est veluti caro, crassus est succus, ac terreus, austeram qualitatem habens exiguam, cuius cortex multæ est particeps. Succus verò in ipsis est adstringenti contrarius. Quocirca si quis in aqua Lentes coxerit, deinde aquam sale, aut garo, aut cum ipsis oleo conditam sumpserit, potus in aluum deicit. At ex his coctis Lentibus, ad eum modum, quem diximus, paratus cibus facultatè habet succo contrariam, vt quæ ventris fluxus

Cornario en.

Somnia.

Acumen.

Vlcera.
Struma.
Inflammas.

Ad mamma.

Lens optima.

Oculi.

Dysenteria.

Nos.

Cypus.

Dodonæo

Serap.

Dysenteria. Ecce, stomachum, intestina, & totum denique ventrem corroboret. Quamobrem celiacis, & dysentericis, cibus est accommodus. Lens verò decorticata, ut illam adstringendi vehemētilam, & ea, quæ ipsam consequuntur, amittit: ita magis nutrit, quam quæ cortice spoliata non est: verum succum crassum ac paruum gignit, tardèque comseat, non tamen alui fluxus desiccet, ut ea cui cortex non est ademptus. Aegineta quum subruentæ pustulæ euaserunt [à morfu vipere] ipsas scarificat, ita ne excoriet, deinde multā aquā fouet, Lenticulam roctam cum melle obducit, dum consanescant. Considerandum sanè, an consultum sit applicare Lentem, quæ adstringit, morfu viperino: vereor ego quidem adhibere, ne venenum intrò repellatur. Qui igitur Aeginetæ subscribit, is cum illo *Lenticulam angulo tener* [negotium, quod fieri nullo pacto potest, tentat] siquidē Lens angulis careat. In caliditate & humiditate, inquit Scvhenkt. medium tenet, desiccet tamen ordine 2. valenter quoque adstringit, ventrem sistit. Decoctum verò prouocat, inflat, lenit, glutinat, extinguit, purgat, discutit.

Cafal. ro. prob. Præparat. Sed in *Lente unguentum* [in Lenticula fabulam] Cæsalpinus narrare videtur. Ineptè enim vili legumini mirandum effectum adscribit, qui minime congruit, nec in tempore adhibetur. Dum enim Dioscor. & alii Lentem & oculorum acie hebetare, stomacho grauem esse, intestinis noxiam, neruis, pulmōni & capiti inimicam, & turbulenta insomnia gignere, scribunt, isq; Arabum sententia decoctum earum ad febres pestilentes, quas lenticulares vocant, laudat, quia exanthemata in illis erumpentia, Lenticulas representant. Sed eum plura inter se dissimilia confundere, quis non videt? Eum mercedè imitatur, qui mentionem inducit vilis cuiuspiam aut nihili vel hominis, vel alterius rei, aliis de egregiis verba facientibus, in quem adagium hoc quadrat, in *Lente unguentum*.

Adagia. Ceterum, mera aut egregia nulla de *Lente*, minutum enim est, ac vile legumen. Prouerbiū autem est, *Mira de Lente*, apud Græcos dici solitum, quoties res humilis & pusilla splendidis excomis, magnificisque laudibus attolleretur.

Porro, *Dives factus iam desit gaudere Lente*. Pauperum siquidem ac tenuium cibus est, quæ fastidit simulatque lautior fortuna contigit. Prouerbiū in eos est, quibus ad vberiore conditionem euectis, fastidio sunt ea, quæ prius inopes boni consuebant. Dixit hoc Aristophanes in adolescentem, qui cum pauper haberet consuetudinem cum anu, nactus diuitias, cepit illam fastidire. Et licet dictum sit Lentem esse pauperum cibum, non tamen conuenit ut eadem ad fastidium iterentur, ne Athenæi trimeter prouerbiolis obiciatur:

Te Lens Deus corripit & fortuna Lens

Sed de his satis. Nam Zenonius est & Lentem cognere, id est, Sapientis est, in re minutissima se artificem declarare.

OROBVS SIVE ERVVM IN genere.

CAP. XVII.

Eruium. *gratum.* *anar. quæ. fer.* **M**vtant semina & pro temporum ratione vt leuiora, facilioraque reddantur: vt si [ser] Eruium, quis Vere [serat], faciliè, gratumque Tom. II.

exit, non graue, quemadmodum si Autumnò seratur. Floris inter cætera legumina, diutina productio est. Hinc porro quemadmodum Ciceri & Fabæ, primum pars inferna floret, quæ cum desierit, proxima incipit, atque ita ad supernam itur successu assiduo: qua de causa multoties Eruium auulsà semen ex ima parte defluxisse cernitur, vi-
Caulis. rente adhuc omnino, herbæque supernæ. Causam habet in latera magis dispersum. Numeratur inter ea, quæ omnium maximè durant. Serere inter radicias consueuere contra papilionēs [rad. Jazedæ] Seritur aliàs maturius, sit tamen, ut non prius ante Ver. Candidum in omnibus generibus præstat. Et licet semina eius siliquis Cylindricis inclusa proueniant, attamen non interseptas, sed quasi inuicem contingentia constant. Fructus rotundos Geln. esse dicit, modo Piperis, quod apud Theop. nondum reperio.

Ufus. *Delectum.* *Geln. nota.* *calur.* *Eruium.* *off.* **O**robis [Eruium] inquit Diosc. patius frutex [Bauyonæ] omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis (i. e. acobis) habet.

Apud nos (Galenī verba sunt) semen quoddam siluestre, rotundum, ac durum, Eruiumque exilius in fructibus cerealibus repertum, quod Arachum nominant.

Erui, quod Plinio faciliè concesserimus, non operosa cura est. Hoc amplius quam Vicia runcatur. Nasitur & Phalangion in Erui, bestiola Aranei generis, si Hyems aquosa sit.

Locus. *Tempus.* Eruium autem, si Columellæ credimus, lætatur loco macro, nec humido, quia luxuriā plerumque corrumpitur. Potest & Autumnò feri, ne minus post brumam Ianuarii parte nouissimè, vel toto Febuario, dum ante Calendas Martias, quem mensem vniuersum negant Agricola huius legumini continere, quoddam tempore latum pecori sit noxium, & præcipuè bubus, quos pabulo suo cerebrofos reddat, quinque modis tugerum obseritur.

Vfus. Cicera bubus Erui loco fresa datur in Hispania Bætica, quæ cum suspensa mola diuisa est, paulum aqua maceratur, dum lentescat. Acque ita mista paleis subtritis pecori præbetur. Sed Erui decoctum libris satisfaciunt vni iugo, Cicera sexdecim, eadem hominibus non inuili, neque iniucunda est. Saporem certe nihilo differt à cicercula, colore tantum discernitur. Nam est obsoletior, & nigro propior, seritur primo, vel altero sulco mense Martio, ita vt postulat soli latitudo, quod eadem quatuor modis, nonnunquam & tribus, interdum etiam duobus, ac semodum tugerum occupat. Erui ruffi meminit Aetius, cuius auctoritatem confirmat Hermolaus, dicens: *Eruium, Herbūm, aliud candidum, aliud ruffum.*

Eruium et. sum. *Herbu.* Erui præter notas à Diosc. ei attributas, hæc ferè addit Marantha: Eruium semen habet Parahii Tithymali, aut catanances primæ: magnitudine Æthiopidis seminis, aut Lithospermi, aut Dorycnii, aut Lathyridis. Ex hac descriptione facilièprehenditur error multorum, qui varias plantas, pro Erui ostendunt: quatum nulla descriptio aridet: cum omnes semen habeant longè maius semine Lithospermi, aut Æthiopidis: nam vel ipse Theoph. Orobi semen minus Sambuci acinis esse asserit, quod cum Diosc. consentit.

Catanances similis semina. Orobis plurimis qui angulosus, quem duplicem faciunt. Matth. in primis com. proponebat iconem pro Erui, quæ mihi videtur esse Lathyris, quam Germanicam voco flore rubente.

Matth. rotatur. *Brassauolus error.* *Eruium non est Eruium.* Brassauolus credidit Eruiam, quæ Theoph. Gal. ac Paulo Ochros appellatur, legitimum esse Eruium, quoniam vicinitate fortè deceptus.

Nec ad stipulandum is est, teste Matth. qui Erubiam Pisi genus, Eruum esse contendunt.

Hallucinatur Fuchsius, qui cicerculam vulgo vocatam, Eruum sativum esse credidit.

Hunc eundem errorem committit Turnerus, dicens: Ego Orobum Fuchsi cicerculam esse putato, quam Galenus Lathyrin vocat.

Eruum videtur Cornario, altera Vicia species esse. Nostri enim, inquit ille, maiorem & minorem Viciam latinâ voce parum corruptâ, distinguunt. Officina peregrinum ab externis petatum Orobum habent in usu quum tamen verus Orobus etiam apud nos proveniat.

Cornarius se opponit Turno, cum ait, Galenus, Paulus & Aetius, nulli Eruo omnem auferunt amaritudinem, In Eruo autem Fuchsi, cum nulla sit penitus amaritudo, Eruum esse nequit. Quin ipse Fuchsi de compos. med. testatur eos omnium maximè errare, qui pro Eruo seu Orobo Vicia siliu seu Aphace vtantur.

Vires & v-
sus.
Farina

Farina orobina ad medendi vsus conueniens. Capiti onerosum est, inquit Diosc. alium esu turbat [μαρμαρ] Sanguinem per vrinas trahit [δρι]. Boves autem pinguescit, si coctum apponatur. Præcedentia non legit Oribas. autore Matthiolo. Præparatur Erui farina hoc modo: Habinora & candida grana deligito, & aqua permiscendo respergito: ac vbi sufficienter combibere fuerit, tum demum torreto, donec cortex disrumpatur & decidat. Deinde molita, & tenui cribro extracta reponito. Est Erui farina aluo commoda, vrinam ciet, bonum colorem inducit. At vberior eius vsus, in cibo, aut potu, cum torsionibus [torminibus, μετὰ τὸν] sanguinem per aluum & vesicam ducit. Purgat autem vlcera cum melle. Lentigines item, & maculas Solares, itemque alias, & totum corpus. Sistit etiam nomas, & duritias [σκληρώματα] Lacuna ex vet. cod. σκληρώματα] ac gangrænas. Mollit quoque duritias in mammis.

Phara.
Lentiginos.

Et ferina vlcera, & carbunculos, & fauos emarginat, ac rumpit. Cum vino subacta & imposita, canum, hominum, & viperarum morsus sanat. Cum aceto verò, vripæ difficultates, & tormina, & ad egerendum contentiones [tenesmos] sedat. Commoda est & his, qui alimentum ex cibo non percipiunt, nucis magnitudine sucta accepta cum melle. At Erui decoctum affusum, perniones, & pruritus in vniuerso corpore fouendo sanat. Hæc Diosc. quem Plinius ita declarat, vt ex ipso transcripsisse videri possit. De Erub, inquit, quædam in mentione eius diximus, nec potentiam ei minorem Veteres, quàm Brassicæ tribuerunt. Contra serpentium ictus ex aceto, ad Crocodilorum item, hominumque morsus. Si quis Eruum quotidie ieiunus edat, lienem eius absumi certissimi

Barbæculi.

Animalium
morsus.

Erugum.

Erub.
Farina.

Autores affirmant. Farina eius varos & maculas cutis toto corpore emendat. Serpere vlcera non patitur, in mammis efficacissimum. Carbunculos rumpit ex vino. Vrinæ difficultates, inflationem, vitia iocinoris, tenesmus, & quæ cibum non sentiunt, atrophæ appellata, tostum, & in nucis auelanæ magnitudinem melle collectum, denotatumque, corrigit: item impetigines ex aceto coctum, & quarto die solutum. Panos in melle suppurare prohibet impositum. Aqua decocti perniones, & pruritus sanat fouendo. Quin & vniuerso corpori, si quis quotidie ieiunus biberit, meliorem fieri colorem existimant. Cibus idem hominis alienum. Vomitiones mouet, aluum turbat, capiti & stomacho onerosum. Genus quoque degrauat. Sed madefactum pluribus diebus misceat, bubus, inmentisque vtilissimum. Siliquæ

Colore cor-
poris com-
modat.

et vitides, prius quàm indurecant, cum succo, foliisque contritis, capillos nigro colore inficiunt. Cæterum Eruum medicaminis vim obtinere, epistolis D. Augusti (qui per hoc curatus) memoria extat.

Boves tum apud nos, ait Galenus, tum apud alias plerasque gentes Eruum prius in aqua dulcoratum pascuntur: homines verò ab hoc semine prorsus abstinere. Est enim insuauissimum, & prauis succi. In magna tamen fame, quemadmodum Hipp. quoque scripsit, necessitate coacti ad ipsum nonnunquam accedunt. Nos verò ad eundem modum, quo Lupinos, præparentes, Orobis cum melle vtimur, cæu medicamentis crassos thoracis, ac pulmonis, humores expurgantibus Porro inter Orobos albi minis sunt medicamentosi sili, qui ad flauitiem, aut pallorem recidunt. Qui verò cocti bis fuerint, & in aqua identidem dulcorati, insuauitatem quidem deponunt, sed vñ etiam cum ea abstergendi & incidendi facultatem, vt sola in eo relinquatur terrestris substantia, quæ alimentum sit, quod citra insignem amarorem desiccandi vim habet. Et hæc traduntur in lib. de Alim. simpl. vt & sequentia: Orobus deficcet quidem excessu secundo inteso, calefacit autem primo. Porro quateus amaritatis est particeps, eatenus incidit, extergit, atque obstructions expedit. Cæterum si sumatur copiose, sanguinem per vrinas euocat. Idem de Antid. Candida Erui farinam admiscet Scillæ: nam quæ candida non est, amara supra modum esse consuevit. Et rursus de comp. med. Vitat hanc non solum in dolore capitis, per consensum stomachi oborto, sed omnibus aliis etiam circa caput obortis affectionibus. Articulos etiam dissoluit.

Therat.
Palme.
Orob. albi.

Tempora
maturæ.

Animaduertendum præcipit Matthioli, quod quanquam ad eruinam farinam conficiendam, candidus Erui semen Dioscorides elegerit, Galenus tamen candidum pallido, ac rufescente, longè minis præstare scribit. Eapropter & Brasauolum Galeni rationem minimè habuisse: cum sibi ex Dioscoridis tantum sententia persuaserit, album Erui semen in medicamentorum vlu, tam rufum, quàm pallidum viribus antecellere. Sed de hisce Matthioli commentariis, nostrum quoque, si animus est, percipito iudicium: Galenus quidem Erui candidam farinam Scillæ admiscet, at solam eam ob rationem, quod candida supra modum amara non sit, tamen nostro iudicio si talis esset, amaritudinem in Scillæ trochiscis haud sugeret: ipsa enim Scilla est valde amara: Adhuc ignoro, cur præferat albam, si alia viribus antecellat.

Animadu-
uersio.

Autorum
iudicium
de farina
Erui.

Nunc quis non cum Marantha irridendos censcat, qui Eruum se nunquam potuisse cognoscere asserunt: propterea, quod in nulla planta (etiã si delineationi respondere videretur) vim educendi sanguinis per vrinam animaduertent: nam vel huius rei nunquam periculum fecerunt vel si facere aggressi sunt, non ita vt decet, sunt experti: Vnicæ enim exhibitione, paucæ quantitate contenti, effectum hunc exposcebant, non considerantes Dioscoridem velle, non nisi largis in cibo, aut potu assumptum id efficere.

Error quæ-
rendam.

Quæsieram tandem ex Gesnero, quid de Erui sentiret. Miror equidem, respondit, Galenum in trochiscis Scillinis, Erui loco panis micam eis addi iubere: cum hæc dulcis, Eruum verò (ipso teste) amarissimum sit: adeò vt vel totam Theriacam suo sapore amaro inficiat. Ego pharmacopolis nostris suasi, vt Diocamni vulgaris radicem [id est]

est Fraxinella. Erui loco potius quam panis medullâ ponant: nam & amara ea radix est, & vim contra venena ac pestem non vulgarem habet. Inter legumina præter Lupinum, nullum adhuc amarum inueni: posset autem Erui loco etiam Lupinus, præsertim siluestris, ut pote amarior, sicciorque accipi.

OROBUS SIVE ERVVM multis.



Cauliculi huic Orobo quadrati, tenues, multis alis concavi: folia ad nervulum palmarem annexa Lentis, vix tamen exacte ex aduerso respondentia: stipe & ex alis, & ex coliculis, Lentis, albidis, infimo folio maculâ fuscâ notato: siliqua tenues, cylindricæ, longitudine circiter vnciali, articulatis

torulis, in quibus semen rotundum (angulosum redditur ubi siccum) leguminoso duntaxat gustu.

An semen, quod iam afferunt pro Orobo Siculico, quodque Fuchs. de comp. med. Cicerculam potius arbitratus? An Orobus, species leguminis in Creta proueniens, quo Lob. Obs. vititur, & adhuc nomine gallico caret.

Matth. in com. suis in Diosc. editis sibi minus constat, ita enim in prioribus scribit: Ervum officinæ Græcorum more Orobum appellant. Cæterum, quod ex Alexandria, Syriaque, Venetiæ conuehitur, aliud semen representare censet, quam Erui, quod frequentissimum in Hetruria nascitur, ac scribitur. Folia mittit Ervum, quod vulgè *Marcho* vocant, Lathyri, vel Cicerculæ vulgè vocatæ zmula: florem Pisorum modo, admodum rufescentem: siliquas formâ teretes, ac oblongas, in quibus semen, colore in aliquibus pallido, in nonnullis candido, in quibusdam verò rufescente. Ignorandum non est, quod et si Ervum ab agricolis seratur, habetur tamen inter sponte nascentia: namque & per se inter segetes frequens oritur. Verum cum à paucis cognoscatur, illud inter viciæ species annumerant. Idem in Epit. edita anno 1571. scribit Ervum duum esse generum, candidum, & rufum: Galenum verò tertium addere, pallidum. Orobum esse plantam samentosam, foliolamque, humi procumbentem, ramis sese implicantibus, foliis parvis, longiusculis, Lente minoribus: flores edere paruos, subpurpureos, & quandoque candidos: siliquam Pisi breviorē, gracilioremque, in qua rotundum concludatur semen, conclusâ inter granum & granum siliquâ. Proponebat primum iconem Matth. representantem nostram Lathyrum maiorem flore rubente, siue nostram germanicam

Tom. II.

valde differentem à planta, de qua hoc capite scribimus: In Epitome verò omittit, & reponit aliam iconem satis commodè exprimentem nostrum Orobum angulosum. In com. cum magis anni 1583. meliorem habet: omittit autem ea, quæ in præcedentibus scripserat, ponitque sequentiat. Non diu est, quod legitimum habetur & scribitur Ervum, iam ubique in Italia. Alterum quoque vidimus Erui genus, quod Creticum vocant, nostrati ferè simile, sed minuiore semine, & siliquis gracilioribus. In com. Ital. cum mag. 1628. quæ sunt ante modò dictam editionem anni 1583. eadem tradit: verum ibi duas habet icones, priorem similem modò dictæ, sub titulo *Eruo*: alteri inscriptum est, *Orobo di Candia*. In Hist. germ. iconem comment. cum mag. fig. habet, ubi etiam *Eruo* & *Eruum*. Sed ut dictum sibi contrariis videtur Matth. nec fortè scit, quid scribat. In primis enim com. & Epit. statuit Ervum frequentissimum in Hetruria nasci, & vocari *Marcho*, ab agricolis seri, per se inter segetes frequenter oriri. In post. com. omittit nomen *Marcho*, ac non diu esse asserit, quod legitimum habeatur, & seratur: nihilominus tamen in iisdem post. com. retinet verba antè citata, quod agricolæ serant, quod sponte frequens oritur, & inter viciæ species numeretur. Præterea plantæ, quam in post. com. exhibet pro Orobo, quæ eadem cum nostro Ervo, non inest amaritudo, quæ eo autore requiritur in Antiquorum Ervo.

Camera ad Epit. Matth. iconem novam ex Gesnerianis, ut puto, sub titulo Erui apposuit.

Orobus hodie si Angullaræ credimus, in Abruzzo vulgaris, retinet nomen antiquum corruptum ex *Eruo*, ac vocant *Ieruo*.

Eruo Dod. gall. Cicet sativum, Columbinum, Venereum, & Orobizum [*ig. 1628.*] Lat. Cicet ervillum, non est Ervum, ut multi Neoterici putant, qui Theriacæ, & aliis medicamentis indunt: Et hoc idem affirmit Hist. Frumentorum.

Orobus, inquit Gesn. à Græcis dictus est Ervum, quod ad Theriacæ compositionem requiritur. Legumen est multis capreolis, siliquis secundum semina interceptis, ut in furnis coniuncti panes: semen totis album, in eis rufesce. Facile provenit. Circa Lugdunum (unde semina accerui) agros eo conseri audio. Inuenitur & siluestris: sed non in Germania, quod sciam.

An Ervum Guiland. in Theone, quod in Italia *Marcho* nuncupari cum Matthiolo sentit, cuius hic tamen interea *Marcho* ignotam sibi plantam statuatur.

An qui vulgè, Cæsalp. autore, in Etruria *Marcho* appellantur, serunturque in alpihus ad pabulum brutorum: Planta in totum similis cicerculæ tenuioribus foliis: seminibus simili modo angulosis, candicantibus, vel nigris, minoribus, & in sua siliqua magis sarctis, atperioribusque: hæc columbis gratissima est ad fortificandum. Dioscoridès Orobum vocat. A Theodoro apud Theoph. Ervum conuertitur. Sed & Plinio Ervum, Galeno autem Orobus dicitur. Si Cæsalp. eundem nobiscum Orobum intelligit, comparatio cum cicercula non placet.

De hoc Lob. & Pena Adu. Cicet orobum tantoperè simile est Narbonensiu Orobo: Dioscoridis sativo, Cicet eundem fecit Orobum vulgatum & receptum officinis Dodonæus. Orobus receptus Herbariorum: *Robus*, color rufus. Antiquus fuit, qualis in russis bobus, & Orobis cernitur. Hodie nihil panè ab illo dudum dicto

Dd 4

Matth. (M)
centratum.

Ieruo.
Cicet ervillum
samentosum.

Lot. 4.

An. Matth.

Orobus f.
bar. 100
Robus.

HISTORIÆ PLANTARVM

diffidet receptus in officinis Italicis & Norbonensibus. Orobus semine & filiqua præsertim, nisi quia huius altero tantò minor est, compressior, nec vno loco, sed variis ex alarum geniculis, secundum summum & imum caulis exorta, pendula, alioqui terna & quaterna claudit feminas, Cicere minora multò, tangenti hebetius angulosa, & vno latere aliquantulum acutiora, gustu Lentis, folio & facie Pisi, Lentis, aut Vicie: ramosis, sparsis, luxuriantibus, caducis serè ramulis: minus tamen est *maritima* hic, quàm Cicer Orobrum, & satium, minusque ingratus gustanti: nec enim nostro ingenio conuenit, stirpium vel figuras, vel qualitates, plumbeà, Lesbiaue ad nostram sententiam exigere, aut flectere, vt nimis multi faciliant: sanè par est alterutrum horum leguminum, verum esse Orobum, cum è tam multis nihil penitus similis occurrat.

Item Obl. Orobus receptus Herbariorum. Ital. *Macho*. Hisp. *Terno*, & *Ternos*. Prouincialibus *Eres*, quasi *Ernum*. *Mochus*, siue *Cicer satium* Dioscoridis Dodonæo. Idem Ic. Pl. Tom. 2. pag. 72.

C. Bauh. qui duas icones proponit, quæ paulò meliores nostrà emptiua, quæ nobis non placent, apud Matth. ita scribit: Orobus, *spobus* quibusdam *mapa* *ni* *ipistadu* *vno* *ni* *cony*, quodd eo boues vellantur, & saginentur: *Ernum* Lat. quod satium est, & siluestre. Satium, vel maiore filiqua, & semine, vel graciliore filiqua & semine: rursus qui maiore semine, candido est, aut pallido, aut ruffo: Siluestre, varium est. Hic tantum de satiuo. *L. Orobus satius maiore filiqua* C. B. *Orobus & Ernum*. Matth. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Cast. Lugd. *Orobus receptus Herbariorum* Lob. *Ernum verum*, siue *Orobus* Camer. Tab. *Cicer satium* Dod. gall. *Mochus*, siue *Cicer satium* Dod. in fol. II. *Orobus satius minore filiqua* C. B. *Orobus Creticus Matthioli*. (in cuius editione postrema, & iconibus, figura non habetur) & Lugdunensi.

Orobus Matthioli Genæ in horto nostro proueniebat facilè, virens adhuc Decembri ex semine deciduo, florens Maio. Lugduni quoque habebam. Basileæ frater C. Bauh. Montbelgardi ex semine Stutgardia missò, & sato, Aprili & Iunio floruit: semen maturum Iulio. Honorius Bellus ex Cydonia Cretæ misit, hæc additâ inscriptione: *Orobus* *spobus* siue *pobus*, quod rustici ferunt angulis annis, & boues eo saginant Antiquorum more. Nos non videmus, qua in re differat à semine, quod nunc existimatur & perhibetur Orobus: est enim serè triangulare cum umbilico nigricante: color totius ex albo cinereo: sapor leguminosus, & Pisorum vulgare. Huic simile paulò maius legumen misit Araci nomine: sapore & formâ non differens, sed colore serè glauco. Nascitur Hispaniæ & Italiæ compluribus locis. In Germania verò, ac Belgio si vera Dod. perhibet non nisi in hortis, & à paucis feritur. In glareolis affatum oritur. *Adærf*.

OROBVM CICER LOBELII.

Cicer Orobrum Theoph. ab Orobo nigredine tantum distans. Difficile tamen sit statuere quodnam sit Dioscoridis domesticum primum nam nouum, quod hic damus, tantopere simile est Norbonensium Orobo, filiqua præsertim, vt tactos nos reddat, esse illud, quod dulcissimum &

Erub. simillimum à Plinio dicitur: sed ambigimus iam, sitne idem istud cum Diosc. satiuo: cui eundem fecit Orobum vulgatum, & receptum officinis, doctus & perbonus scriptor Dodonæus, qui nondum hanc nouisset.

Norbonæ & Gallo-prouinciæ plerique satis per messes flauet hæc, *culmo* assurgens sesquipedali, geniculato lateratim, quasi in obliquum flexo, leuiter striato, fistuloso: *foliis* in uno nervulo protolito hærentibus, Lentis, aut Araci: à medio item ramulis donatur, & foliatis pediculis: & iuxta summos alarum geniculos complures confertæ *filiquæ*, vno serè exortu nixæ, sese tangunt & stipant, cylindricæ, vnciam longæ, rectæ, teretes, inter transuersa pusilla interualla foras protuberantibus singulis quasi torulis, ternis & quaternis, articulatim distinctis: ipsa intus *semina* nullâ membranulâ distincta. Pisum Arietinum serè æquant, obtusè triangula: Orobi duplò maiora, colore albida, pallida, & subfulua, non ingrati saporis, Ciceris aut Pisi.

Cicer orobum Theophrasti Lob. & Penz Adu. & Ic. Pl. Obl. autem *Cicer orobum* Adu. p. 400. *Cicercula* Plin. F. Pennini.

OROBO SIMILIS LATHYRVS Cretensis Honorii Belli.

Semen, quod misit nobis Honorius Bellus ex Cydonia Cretensi, huius inscriptionis: *Lathyrus*, *aracæa*, dicens à rusticis quotannis ferri: Hoc sanè Orobo antè dicto, vel Araco Cretensi ab eo missis, simillimum est: adeò vt nullum discrimen adinuadueriam, nisi in colore, qui medijs est inter Orobum & Aracum ab eo missum: sapor idem, cum Pisorum sapore. Satum Montbelgardi in horto Ill. C. Wittemb. prouenit.

OROBO SIMILIS ARACVS Cretensis Honorii Belli.

Misit nobis ex Cretæ Cydonia Honor. Bellus semen, quod ita inscripsit: *Aracus*, *aracæa*, à rusticis quotannis feritur. Id sanè vix differt ab eo, quod misit pro Orobo: triangulare enim, vel quadrangulare quoque est, paulò tamen maius, & colore ad glaucum accedente: sapor leguminosus, qualis Orobo, & Pisi. Si prouenerit satum, obseruabimus qualia folia & flores.

ARACVS VETERIBVS.

CAP. XVIII.

Aracus res scabra & dura in Lente videtur, autore Theoph. qui Arachidnam ipsi similem scribit. De hoc Gal. inquit: *Aracos* Aristophani in Holcadibus. Semen hoc Lathyro [Cicerculæ] semini est adsimile. Fueruntque nonnulli qui putarunt, ipsum non esse generis à Lathyro [cicercula] diuersi: quandoquidem & vsus ipsius omnis, & facultas, Lathyri [cicerculæ] facultati est adsimilis, nisi quodd Araci sunt duriores, minusque facilè elixentur. Quæ causa etiam est, cur Lathyris [cicerculis] concoctu sunt difficiliores.

ARACHIDNA

Loca

Defect

Folia

Siliqua

semina

Lathyrus

Aracus

Theoph.

Arachidna

similis

ARACHIDNA VETE-
RIBVS.

CAP. XIX

Fructus:
Radix.Locus.
Folius diffi-
cultur.

Arachidnæ radix, eiusque, quod simile est Araco, &c. Pars ipsa carnosâ radicem simplicem, crassam, altius infigendam mittit, ceteras verò, quibus insidet, fructus tenues, ac summo cespite cohzrentes agit: loca arenosa potissimum amant: neutrum folia gerit, neque foliis quicquam simile, sed quasi binorum fructuum, partibus inter se appositis, secunda potius extant, quod mirum profecto est. Et hæc apud Gazam Theophrastus testatur, cuius textum Honorius Bellus corruptum suspicatur, ut mox videre est, sub eius Arachidna.


ARACHIDNA, AVT POTIVS
Aracoides Honorii
Belli.

Locus.

Dentaria.

DE Arachidna Cretica, cuius plantam siccam, & semina ad nos misit ex Cretæ Cydonia, hæc ad nos perscripsit Honor. Bellus: Planta omnino noua est, & nullum Botanicum huc usque vidi, quicquid plantarum genus aliquod descripsit, quæ æquiperat à Theophrasto vocantur, sicut Cæsalp. Dentariæ speciem Arachidnam faciat, quæ cum Theophrasti Arachidna, meo quidem iudicio, nihil commune habet.

Planta autem nostra, cum utrinque fructu ferat, id est, & infra, & supra terram, merito mihi Arachidna, aut potius Aracoides vocata videtur. Et licet Theoph. lib. i. cap. ii. Arachidnâ, aut id, quod Araco simile est, foliis carere affirmet, tamen textum corruptum esse, merito quis dubitare potest. Nam cum Theoph. stirpem similem

Arachidna,
Aracoides.Textus
Theophrasti
corruptus.

Araco describat, necesse est similitudinem harum esse, aut floris, aut fructus, aut foliorum. Aracus verò duplex ab Authoribus habetur, vnus Lathyro similis, qui inter Lentes nascitur, & græcè per x scribitur. Alter verò per x teste Galeno i. de alim. fac. c. 17. Siluestre quoddam semen rotundum, ac durum, Eruoque exilius, quod & Theoph. l. 8. c. 8. affirmat, asserens: quod Amcus in Lente oritur, res scabra, & dura. Cum autem planta nostra, caule, foliis, & lobo similis sit Lenti, semenque durum, & Araco non dissimile ferat, Orobo, Lathyroque minori, fructumque sub terra circa radices, & in caule gerat, merito Aracoides dicenda videtur. Et ea Theop. verba, quod folia non ferat, ad Arachidnam Ægyptiam potius referenda videntur, quàm ad Aracoidem

nostram, quam ita describo. Herba est dodrantalis, foliis leguminosis Lentis, vel Viciz, minoribus, obtusis, cordatis. Vigniculis tenuibus, quorum extremis flores hærent purpurei Viciz. Circa radices sub terra fert filiquas paruas, Lenticulæ similes, in quibus modò vnum, modò bina semina, rotunda, nigra, in altero verò non nigrum, sed Orobo simile. At quos fructus in caule proferat, pluribus occupationibus præpeditus hæcenus obseruare non potui.

A rusticis *ayemodxi* [agrestis Lens] vocatur. Inter segetes & legumina inuenitur, negligiturque, idcirco vobis radices tantum fructum mitto. Mitto etiam Orobi semina, Araci, & Lathyræ, ut horum leguminum in hac insula nascentium differentiam commodè obseruare possitis. Hæc ille.

Nostra hic restat obseruatio. Nigrum semen Viciz fatiuræ simile est, dentibus durum atrox: sapore Pisorum: medulla alba. Album verò simile formâ, sapore, & duritiâ: eius figuram ex planta sicca, quam misit, parandam curauimus: lata enim non prouenit.

Iconem quoque Clusii, quamuis falsa videretur, delineandam curauimus. Proponit autem illam Exot. lib. 4. c. 16. quam ita describit:



An Theophrasto Araco opus sit? Non minus admirabilis est huius plantæ natura, quàm eius, cuius rariorum plantarum Hist. l. 4. cap. 5. Arachidnæ appellatione meminisse: propterea illam esse suspicabar, quam Theoph. lib. i. Hist. pl. cap. ii. Arachidnæ coniungit, & *ayemodxi* esse, fructumque supernè inferno mino-

rem ferre, scribit, tamen si folia, aut quidpiam foliis simile habere neget. Quem sequutus est Plinius.

Istius plantæ semen cum suis filiquis, tam supernis, quàm sub terra latentibus in Creta lectum, ad me ante aliquot annos Honor. Bellus mittere memini, quod à me latum, & quibusdam etiâ amicis communicatum, nulli est natum, an ob nimiam vetustatem, ignoro. Eam ob causam eius historiam, ut auebam, in meum librum enulgatum inferre non potui. Quum vero Io. Pona anno 1603. semina mitteret in Lugduno-Batauæ Academicæ horto ferenda, inter quæ nonnulla à Bello communicata cognoscebam, cum illis integram huius plantæ stirpem, siccitate prorsus contractam reperiebam, quam, ubi aliquot horis in aqua maceratam explicassem, ut commodius describere possem, exprimendam curabam.

Statim porro à radice hæc planta in plures ramulos diuiditur, semipedalis, aut dodrantalis, ad summum, longitudinis, tenues, angulosos: quos alternis ambiunt exiguorum foliorum alæ, Lenticulæ, aut Araci foliorum alis similes: ea folia extimâ parte latiuscula, & quodammodo cordis (ut

Descriptio:
Folia.Flores:
Siliquæ:
Semina.Agrestis
Lens.Anturum
obseruatio.

Icon, Clusii.

An Theo-
phrasto Araco
opus sit?

Locus:

Descriptio:
Ramuli,
Folia.

HISTORIÆ PLANTARVM

vulgo pingi solet) formam imitantia, per mediū, secundum longitudinem, neruo secta, qui extimā foliorum partem nonnihil superat: nascuntur autem in singulis alis ex utroque latere quaterna aut quina, vel ex aduerso sita, vel inæquali serie, ipsa verd extrema ala in capreolum desinit, & se se conuoluit, vt in Lenticula, & Vicia. Illius florem non conspexi (quem Lenticulæ, aut Araci flori similem esse autumo) sed siliquas duntaxat in alarum sinu nascentes, latiusculas, unciam longas, aut paulo ampliores, fuscas, nonnihil villulas, mucrone incuruo & quasi hamato præditas, continentes bina, aut terna semina nigra, rotunda, non angulosa, vt Araci, quæ maturitate dissiliunt: radicem habebat Lenticulæ, aut Araco similem, è cuius capite summā quasi tellure plures paruas, tenues, albas fibras quaquauersum spargebat, è quarum singulis dependebant singulares, interdum geminæ, siliquæ breues, & rotundæ, extrema parte in curuum mucronem desinentes, tenellæ, & candicantes, continentes vnicum, vt plurimum semen, nonnunquam [quæ maiores] & alterum, rotundum, illo non minus, quod siliquæ in plantæ ramis nascentes proferunt, sed albicantis, aut subfusci coloris. *Hæc Clus.*

Arachidna Cretica, an potius Aracoydes Theoph. verè *ἀραχιδνα* Hon Belli, cum suis fructibus, inferno sc. & luperno. Hæc Ponz in descript. montis Baldi ex semine inferiori crescit, & in hoc obseruauit, & vnica radice duos diuersos cauliculos, & folia oriri, vt ex eius figura patet.

Postquam ipsam plantam ab Honor. Bello acceptam, in qua nullas obseruari capreolos, descripsissem iam, atque icone propriâ effigiatam proposuissem, Pona, sicut & Clusius etiam iconem exhibuere. Clusius igitur iconem, additis ex Ponz figurâ floribus, expressam quoque damus.

Ceterum, consideratâ planta, quam Pona nobis misit, & collatâ cum ea, quam accepimus ab ipso Honorio, quamque curauimus depingendam, obseruatâ etiam descriptione Clusii, non possumus nobis persuadere illas siliquas, in curuum mucronem desinentes, sub terra crescere, aut vnquam creuisse ramos in icone cum siliquis longis plantæ alterius censemus, ceu Viciæ aliquis: si quis haberet plantam integram, cum varisque siliquis in caulibus & radicibus, & videntam, saltè communicaret, rem gratam faceret, tollereturque nobis suspicionem nostram, iconem quippe per incuriam ex duabus plantis compositam.

CHAMABALANVS LEGUMINOSA.

CAP. XX.

EX radice argumento Chamabalanon, quasi terrestrem glandem dicas denominarunt: siquidem ex filis tenuibus, longissimis, pendulis subsunt glandes, crassiusculæ, oblongæ, pulpâ candidâ, dulci, non nisi altâ fossione inueniendæ: vnde infirmi emergunt *coliculi*, sed longi, cubitales, vel maiores, ramosi, humi procumbentes: in quibus obseruare est bina serè folia, eaque subaspera [si credamus Matth.] ex aduerso sita, Viciæ similia, vnciam circiter longa, reliquo pediculo in capreolos abeunte: flores leguminosi, *Pis*, plures congesti, priuato inhzrent



furculo, purpurei, Matthi-olio puniceo, & odorati: inde siliquæ oriuntur.

Apios Ruellii, & Ischada, aliis Chamabalanus. Rom. radix silu. Plinio & Theoph. etiam Apios.

Ruell. se veram Ischiada inuenisse putat, inquit Cord. in Diosc. sed fallitur.

An Cordo Ornithogalum flore purpur-

co, quod ait se ignorare, an à Diosc. descriptum? Notatum à quodam apud Cord. Arachidna Theoph. quoddam Erdnus interpretari: & alibi *Thymum* Apion Fuchsi, Astragalum facere. Verū Cord. eo capite nec Apion Fuchsi tradit, nec Astragalon Turneri, nec historiam Chamabalani nostræ leguminosæ, de qua hic agimus.

Trago hist. germ. pingenti, vocatur Erdnus/ Serebrot. Lat. *Panis potius*, *Nux terra*, *Ficus terra*, *Erdseigen*/ *Erdmandel*. A quibusdam *Arachidna* Auicennæ, & *Buchur marian* Serapionis, & *Malum terra*, aut *Cyclaminum* Di. si idem habetur cum Erdnus. Sed aberrant, quamuis M. Virgil. Florentinus, & Peothus id existimant. Is (Tragus) dicit esse Raphanum silu. qui in Theoph. *ixas*, & in Diosc. *ἀμαξ* dicitur: vocat Chamabalanum terrestrem, *Aster*, & *Grund Fychel*.

Tragus in Hist. lat. non reprehendit Marcellum Virg. & Peothum: sanè si Marcelli verba considerentur, quibus ait, radice subdulci, pecori gratum esse Cyclaminum, quis posset suspicari de hac radice loqui? verum si cõserat, quæ paulo p̄st dicit: vidimus nos aliquando cyclamini radicem globosam, & latitudine amplissimi panis, ex qua folia erumpebant, & inter folia flos pediculo potius, quàm coliculo. Planè concludet Marcellū ibi de vera Cyclamino locutum, & nō de Erdnus/ quamuis malè dixerit pecori gratam Cyclaminum.

Apios quoque Fuchsi dicitur, Erdnus/ *Erdseelen*. Gall. *Raué Re-fort*, aut *Ciche saunage*, quæ nomina gallica non placent. A Dod. gall. *Bele* Erdnoten & quibusdam *Niysen met steerten*. Neotericis Chamabalanus, & glandes terrestres. Quidam docti Astragalum existimant à Diosc. descriptam: ab aliis Apios. Item Hist. lat. vbi quoque figura. Belg. *Erdseelen*, & Nuces caudatæ: nominant quidam *χάμυκαδάν*, Terre glandes. Et de frum. cum Apio non conueniunt, Astragalo similiores sunt.

Quibusdam, inquit Corn. in Diosc. Ornithogalon ea radix rectè dicitur, quæ à nostris Erdnus & Serebrot/ & Erdseigen vocatur. Alii Interim ad Cyclaminum referunt. Alii rursus Apio esse volunt. Quod autem Apios non sit, vis eius purgatoria obstat. Considerandum porro, an Cornario sit Astragalus, & Iris astragalitis, Erdsmoren. de quo scribit in Diosc. lib. 4. cap. 52. De quibus agemus titulo de Astragalo Veterum, vbi etiam Astragali æquiuocationes.

Radix.

Siliqua.

Semen.

Tragus.

Siliqua sub terra non crescunt.

Arachidna.

Raphanus silu. 3

Tragus in lat.

Fuchsi rep.

Glandes terrestris.

Apios non est. Et no. siliqua. 1.

Cyclaminus.

Apio.

Tragus.

Defect.

Coliculi.

Folia.

Flora.

Apios Lonic. vulgè panis porcinus, Sc. obrot / Nux terræ, Chamæbalanus.

Apion, cuius picturam damus (inquit Riff. in Diosc.) Fuchsius falsè *Betel fern* *Erdnuß* / *Schwembrot* / siue *Schweinbros* appellavit, nominibus scilicet rebus aliis dicatis, ut Cyclamini, & Ornithogalo: quo nomine germanico, siue gallico, hodie appellatur, scire nondum potui. *Hæc Riff.* Nobis autem iudicibus, germanica nomina huic plantæ melius conveniunt, quàm Apios nomen.

Sentenæ Ruellii de Apio, Matthioli haud subscribendum iudicat: siquidem Apios falsus, & non verus, ut crediderunt, Fuch. Tragus, & Lonicerus. Ital. *Noci della terra*, hebet figuram propriam. Suspiciatur Lusitanum pro Astragalo eam plantam accepisse, quæ Fuch. & quibusdam ex recentioribus, Apios Diosc. esse creditur: sed magnas inter has plantas differentias.

Amatus porro, quantum videt, Tragopogonum putat, quam Fuch. Apios admenitur. Germani plantam hanc, Terræ nucem appellant. Sed quam habeat cum Tragopogono cognationem, sane nullam videt.

Non placent Winckeri verba, qui *Erdnuß*, Apium vomitorium vocat.

Nescit Baccan. an Ruellio credendum, qui dicat Apion familiarem herbam. Apud Cam. hort. Apios Fuch. Astragalus aliorum. Chamæbalanus *Erdnuß* Tab. ic. & Hist. Apios, Herbam esse, dicit Faardus. Apios quorundam, Apios Herba Hieron. Bock. Eidem & Fuch. radix silvestris: ipsi viderint, inquit Gesn. Fuch. Roel. *Erdmandel* / Apios, Arachyda, Ficus terræ. Theop. Galus & Amatus Apion nominant simpliciter.

Astragalus Turnero, non est Apios. Quare errant Amatus, Trag. & Fuch. Et rursus, Astragalus circa Coloniam nominatur *Erdeselen* / Belg. *Erdnute* / Germ. *Erdnuß*. Angl. *Peeffe* *Eartthnt* / à foliis Pili, aut Ciceris, & radicibus Nuculæ terrestris similibus. Etsi reliquæ omnis descriptio conveniret Dioscoridis, tamen in humidis quibusdam locis quia radicem comperit parum admodum adstringentem, dubitare cepit: at rursus eum in locis siccis manifesta adstrictione præditam animadvertit, nihil amplius cubitavit Turnerus, quin verus esset Astragalus, etsi Fuch. contendat esse Apion. Descriptio Astragali Dioscoridis, convenit cum planta, quam Turnerus exhibet, in omnibus, quantum indicat, exceptâ radice: tota enim radix non est Raphani radicis similis, etsi glandulosi tuberculis sit donata, ut species quardam Raphani. Quem autem exhibet Matth. folia habet rotundiora, non tam longa, & serrata, ut Cicerum. Expendant docti, eamque eligant, quæ descriptioni optimè quadrat.

Fuch. Apios longè abest à legitima *Urtica* / vardz / autorib. Aduers. Anglis & Germanis. An autem Terræ glandes, siue Pseudo-Apios Germanorum Astragalus Diosc. Germ. *Schwartz Rettig* / Raphanus niger. Item Obs. vbi figura, *Terra glandes*. Perperam Ornithogalon & Apios Cordo. Belg. *Mus caudatus*. Et Ic. Pl. *Terra glandes*. Ego quidem vbi Cordus Apion dixerit, quod Lobel. perhibet, haud inuenio. Est & apud Hist. Lugd. figura, sub titulo *Apios Fuch.* A Thallio in Hæc. *Astragalus arvensis*, seu *Chamæbalanus* appellatur. *Glandes terra*, vel *terrestres* Clus. vocat, Hung. *Fodi monyaro*, hoc est, terreæ auellana. Dicit C. Bauh. apud Matth. esse *Pseudo-Apios* Matthioli. Autumasse quoddam

Matthiolum Astragali nomine in prima editione exhibuisse. Apios Fuch. & Tragi Heros Lus. *Terra glandes*, *Erdnuß* / *Erdeselen* appellantur. Sed cui cognita Apios satis apparet, quantum discrimen: quam contrariæ facultates.

Ex Burgundia accersitam in horto Ill. E. C. Month. plantauit: postea, reperi in agris non longè à pago *Charmontey*. Montbelgard & Burgundiones vocant *des Magassans*. Balileæ reperi extra portam lapideam in agris supra collem quærit Binnigam, ad dextram, florentem Iunio flore rubello, profundè radice: erquisui fodiendo priusquam reperi. Qui radices perquirent, caueant ne perstringant tenues radices à quibus pendet bulbosus. Patavi vidi in horto D. Cortulii, & Genæ copiosè in vineis extra portam à S. Gerualdo denominatam.

Seri & semine & radice (inquit Dod.) potest, sed radice citius perficitur: vna enim glans lata in plures breui tempore multiplicatur. Seorsum marginibus multis in Brabantia locis gignitur. Floret Iunio & Iulio. Post messem effodiuntur & colliguntur radicum glandes. Pseudo-Apios Matthioli floret Iunio mense præcipue: Passim nascitur vbiq; in Bohemia in campis & præsertim in vineis.

Vidit Ruellius per inopiam frugum ruri pauperes hac radice vesci. Pastores quandoque his nucibus vescuntur: Ceterum experientia didicit Tragus, nauseas, & vomitiones illas ciere, aliis eius iudicio planè innoxie sunt. Sed vereor ne Tragus, qui putabat *Erdnuß* esse Apion, sibi etiam persuaserit, eas & vomitiones ciere. Adhæc Terræ glandes, quod Dod. asserit, coactæ in cibo sumptæ, difficilis, quàm Rapa, aut Pastinaca, concoquuntur, sed alimentum tamen non minus: quàm Pastinacæ subministrant: minus quàm ille inflant, tardius descendunt, ventrem etiam adstringentes, Crudæ difficilis concoquuntur, & ægrius descendunt. Temperamentum autem obtinent calidum quidem mediocre, sicum verò paulò intensius, cum non exigua vi adstringentia, unde etiam non solum ventris fluxum, sed & sanguinis fluores, præsertim ex utero, aut per vesicam, reprimunt. Hæc Tragus Chamæbalano vires assignat. Quarum quardam ex Astragalo adscriptæ videntur. Dixit enim Dod. glandes istas alium constringere, non secus ac Astragalon. Radices sunt (inquit Lob.) nequiquam purgantes, imò ab opihonibus escari solent: mirati sumus Augerum Ferrerium libello de lue vener. hanc radicem sibi, aliisque adeo veram esse Apion persuasisse, ut profiteri ausus sit, se preparatas, ministratasq; istas rapulas veneris egrotis dedisse, adque lotiones & fomenta vsurpasse: monuisse potuerunt illius primæ qualitates alimentosæ, & ignauæ potius, quàm medicatæ. Saporem illis subdulcis, glandis, aut Castanæ adstringens, ac vi Castanæ tardius conficiuntur, statulentum, suauem tamen, succum creant. Veneris incentiuæ sunt. Sanguinis vteri, renum, & ventris fluores compescunt. In Bohemia, vbi abundant multi comedunt Castaneorum modo. Et licet edantur ad satietatem, teste Matthiolo, mouent quidem nauseam, sed non euacuant per aluum. Nunc autore Cam. horti, ex huius floribus aquam destillant quidam, quæ ita rosaceam ementitur, ut pro illa non raro vendi soleat.

Locus & tempus.

Satio. Cultura.

Vires & vires.

Nausea.


Temperamentum.

Veneris.

Aqua.

ARACI, VEL APIOS LEGVMIL-
notæ species Tossano Carolo.

CAP. XXI

Descriptio
Caulis.
Folia.

Caulis est cubitali, vel maiore, tenui, glabro: Folia ex intervalis quaterna vno pediculo nixa, duarum, triumve uncia- rum longitudi- ne, culmum lata, in acutum mu- cronem desine- tia, striata, viri- dantia: flores ex- tremo furculo hæcēt, quinque, vel sex conge- sti, pediculis mediocriter lō- gi, magni, Ga- legæ vernæ, co-

Radix.

Flos.

Arachni.
Apios.
Locus

lore purpureo præditi, vel ex purpureo ad in- carnatum vergente, cælesti, pulchro, scribebat qui mittebat: radix ad Galegæ vernæ radicem accedit. Pictor ordinem foliorum non bene ex- pressit, qui erat pingendus, qualis est in Orobo pannonico, radice bulbosâ Clusii, quem æmu- lari videtur.

Carolus Tossanus stirpium diligentiss. inda- gator ascripsit huic plantæ: *Arachi*, vel *Apios Fuch- si species*.

Ex *Champagnole Burgundiæ* planta tum sicca, tum virens in horto Ill. E.C. plantanda missa an- no 1590.

ASTRAGALVS QVIBVSDAM
Aracho Tossani Caroli similis.

CAP. XXII

Locus

Flos.
Radix.
Caulis.
Folia.

Dedit nobis D. A- genus legumi- notam plan- tam, nomine Astragali, col- lecti in editio- ribus prati- circa Bononiâ cuius flores, va- rio constât co- lore, albo quippe, luteo & leuiter ru- bescente. ra- dix bulbosa, v- Pæoniæ: caule cubitales, an- gulosi: foli- duas, tres, qua- tuorue con- iugationes ha-

bent, quæ *Arachi* foliis longiora sunt, de cæte

ro eis valde similia, sed non in capreolos defi- nentia: florum pediculi palmo minores, angulosi, in quorum extremitatibus flores plures, quales *Lathyro siluestri germanico*, vel *luteo* iuxta principium foliorum, & pediculorum appendi- ces acutæ.

OROBVS QVORVNDAM
radice bulbosâ, flore albo.

CAP. XXIII.



Graciles Desq. Gpromit cauliculos, ere- ctos, firmos, angulosos, pe- dales, & cubita- les: folia per in- tervalla, vni co- stæ inhæren- tia, quaterna plerumque ex aduerso sita, e- recta, angusta, trium serè un- ciarum longi- tudinis, gultu aliquantulum acido initio, deinde amariu- culo, nullis ca- preolis prædi- ta, quod caules

fatis firmi, adminiculis non egeant: flores in lon- gis nascuntur furculis spicæ instar cōgesti, florum Pisi, aut *Viciæ* formâ, seni, aut octoni, candidi coloris: deinde oblongi lobis nigricantes, prioris lobis [*Astragali maioris Fuchsi*] pares, semine ni- gro, interdum etiam maculoso, pleni, qui per maturitatem cum strepitu dehiscences semen abiciunt: radicibus nititur quinis, aut senis, mi- nimi digiti longitudine, crassiusculis, *Asphodeli*, aut *Pæoniæ* semine minoris, oblongis bulbis serè similibus, minoribus tamen, foris nigris, in- tus albis.

Est *Orobus Pannonicus Clusii* [cuius descri- ptio iam proposuimus] tertius, albus primus, si- ue *Asphodeli* radice.

Inuenitur magnâ copia in pratis non procul *Walterstorf / Maarpach / Medeling / & ther- mis Bidentibus Austriæ vicinis*. Obseruabam e- tiam in montosis ultra *Danubium* locis, ad ex- duarum siluarum margines.

Floret cum superioribus [*Galegæ minore ver- na, & Astragalo maiore Fuchsi*] semenque per- ficit Iunio.

GLYCYRRHIZA

CAP. XXIV.

Est frutex, autore Diosc. virgas habens longi- tudine duorum cubitorum, circa quas folia densa, *Lentisco* similia, pingua, & ad tactum glutinosa. Flos est *Hyacintho* similis. (Sed hoc, inquit *Marantha*, ad colorem solum referri de- bet, figurâ enim *Staphydis Agriæ* floribus simi- les sunt.) Fructus magnitudine pilularum *Platanis*: asperior

asperior, qui *siliquis* habet instar Lentis, fulvas, parvas [Matth. exempl. *πύρεμας*, i.e. fulvas, longas] Radices longæ sunt, buxi coloris [Ca. *πύρεμας*, fulvo colore] Gentianæ modo, subacutæ, dulces quæ expressæ succum reddunt, *λαύανον* 7. Hæc addit Lac. Lycium.

Plinius, quæ Glycyrrhizon inter spinosa foliata numerat, foliis eius aculeatam mordacitatem inesse scribit, & à quibusdam Adipson appellari. Hist. lib. 21. cap. 14. Et rursus: Sunt qui est Acanon Eryngio adscribant, spinosam, breuemque, hac latam herbam, spinisque latoribus. Alii Eryngem falsò eandem putauerunt esse, & Glycyrrhizæ quæ subungi eam protinus refert. Et ipsa sine dubio inter aculeatas est, foliis echinatis, [Plin. malè legit, *εχιν*, pro *χιν*, Lentis] pinguius, tactuque gummosis, fructuosa binum cubitorum altitudine, flore Hyacinthi, fructu pilularum Platan magnitudinis.

Nascitur plurima in Cappadocia, inquit Diosc. & Ponto. Esse præstantissimam vult Plin. in Cilicia, secundam in Ponto, radice dulci, & hanc tantum in usu. Capi eam Vergiliarum occasu, longam, ceu Vitem, coloris buxi. Melioremque nigram & leptam, quam fragilem.

Facit succus, autore Diosc. ad arteriæ asperitatem, quem linguæ subditum eliquare oportet. [Meum exemplar addit Matth. habet *αἷον* si *αἷον* *lux*, medium autem inter caliditatem.] Conuenit & ad ardorem stomachi, & ad thoracis ac hepatis affectiones, scabritiemque vesicæ, & renum affectiones, cum passo potus. Idem situm eximit sub lingua eliquatus: & vulneribus commodè illinitur, & ad oris affectiones manducatur. Quin & decoctum radicum recentium ad eandem facit. At radix sicca in puluillum detrita pterygiis vuliter inspergitur. Quædam [ait Plin.] exiguu gustu famem ac sitim sedant, conferuntque vires, ut Glycyrrhizon, Hippacæ, & butyrum. Quod autem situm, famem quoque

dedet, Adipson idè quidam appellauere eam, & hydropicis dedere, ne sitirent. Idè & commandata stomatice est, & vlcibus oris insperfa sæpè & pterygiis. Sanat & vesicæ scabiem, renum dolores, condylomata, vlcera genitalium. Dedere eam quidam potui in quartanis, ʒij. pondere, & pipere, hemina aquæ. Commandata sanguinem ex vulnere sistit. Sunt qui & calculos eâ pelli tradiderunt. Glycyrrhizæ, siue dulcis radice succus Galeno in primis utilis est similiter, ut eius fructus radices, dulcis, simulque leuiter adstringens. Proinde asperitates lenire potest, nec modò in arteria, verùm etiam vesica scabra, idque temperatura mediocritate. Quocirca fuerit sanè natura eius familiaris nostræ temperaturæ: nam tale monstratum est esse dulce: sed eum adstrictio quædam coniuncta sit, vniuersum eius temperamentum quantum ex caliditate & adstrictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quam proximè accedens ad symmetricum. Porro quoniam temperie quoque est humidum, id, quod modicè est dulce, iure sanè etiam sui congruens medicamentum est. nimirum modicè humidum, simul & humanâ naturâ frigidius. Refert Diosc. radicem siccam ad leuorem redactam, pterygiotum, seu vnguium oculorum, adoneum esse illitum remedium.

GLYCYRRHIZA DIOSCORIDIS

ECHINATA NON REPENS.

VT minus nota, ita minoris hodie usus Dioscoridis Glycyrrhiza, cui, non ut vul-
Tom. II.



gata, radio Radix, et tenues, cum quaque, repentes, sed crassæ, latè, re- & quæ depa- & simplices, brachii longi- tudine ac cras- siue, buxi in- quit Dod.] lu- teus intus co- loris, foris ra- rø alterius, sed tamen quan- doque nigri- cans, minori- verò dulcedi- nis gratia, (Dod. ait dul- ci sapore cum austeritate

quadam. Stolones autem plures, virgultei, ho- minis proceritatem subinde allequuntur: siliæ Lentis, maiora, acuminata, coniugati rachi al- ligantur, viridis laturati. & tactu nonnihil glutinolo: flores è florum alis exeunt parui, cærulei: sequuntur fructus ex pluribus oblongis siliquis echinatis glomerati, ad imum coherentibus, quorum singulis singula insunt.

Summitatem Glycyrrhizæ echinata appingit Matth. vulgari Glycyrrhizæ repenti. In Epist. an- ni 1571. peruerit descriptionem Dioscoridis. Qua de re consules caput proxupè lequens.

C. Bauh. apud Matth. Glycyrrhiza echinatis si- liquis. Dulcis radix Matthioli in compendio. Glycyrrhiza Matth. in mag. figuris. Et hæc Fra- zer, cui non concedo Matthiolum hanc intelle- xisse pro Glycyrrhiza. Et hoc satis demonstrat ra- dix in eius iconè, præterea ipsemet fatetur pri- mum pilulas: adde illum scribere suam frugife- ram copiosè in Germania pronenire in Bamber- gico agro, quis autem nescit Glycyrrhizam vul- garem radice repente, ibi crescere, & non echi- natam, ut vult C. Bauh. Nec est ea igitur quo- que, quæ à Cæsalp. traditur.

Nunquam potui, inquit Lacuna, in Italia, nec alibi videre fructum nostræ Glycyrrhizæ ordi- natæ, donec mihi Dodonæus demonstrauit ra- mulum collectum Antuerpiæ in horto Guiliel- mi Andreæ: omnia exemplaria Diosc. sunt cor- rupta, legendum in siliquis pronenire grana similia Lenticulæ. Flori tamen potest, ut reperiatur aliud Glycyrrhizæ genus cum siliquis similibus Lenti- culis, quod nobis describit Dioscorides, a me non visum, nec etiam ab vilo alio, quod intelle- xerim. Apud Lacunam in margine, quidam notat, Glycyrrhizam cum fructu spinoso non producere radicem longam, ut cetera. Propo- nit autem Lacuna ineptam figuram, ramuli si- quidem non bene exprimunt Glycyrrhizam echinatam. Nec nouit discrimen inter hanc & se- quentem.

Nunc Glycyrrhizam Italicam ad descriptio- nem Dioscoridis melius accedentem à Con- denbergio auidam cum fructu echinato missam accepi.

Dod. gall. Glycyrrhiza vera, Glycyrrhiza Diosc. Et Hist. in fol Glycyrriza vera Diosc. officinis & vulgò incognita.

Glycyrrhiza echinata (aiunt Lob. & Pena) sique est stentis, ut Matth. sibi se verà certè esse audi-
Ee

Color

Sapor.

Stolones? Folia

Flores Fructus. Semina.

Matth. not.

Glycyrrhiza echinata in siliquis

C. Bauh. not.

Diosc. refertur.

Icen Lacuna inepta.

Glycyrrhiza incognita in Matth. rep. prob.

uone postremis commentariis prodit, tres sortent Glycyrrhizæ species: nobis quot notæ, tot frugiferæ: Ac primum Dioscoridis dulcis radix, cuius usus officinis rarior. Dedit Valer. Dourez Glycyrrhizam spinosam Anthiochenam, sed nihil nisi siliquas vidimus. Et Obs. Glycyrrhiza echinata Dioscorid. Scythice & Callisibetur. Germ. Süßholz/ Süßwurtzel. Ang. Licorea. Gall. Raigulisse, & Raiglice. Hisp. Regalicia & Regaliza. Ital. Regalicia, quæ nomina vulgaria quam bene huic Glycyrrhizæ tribuantur iudicent Lectores.

Antiochena, quam à Valerando acceperunt, non est mihi diuersa ab echinata, qualem facit Compil. Tabern. dicens: Glycyrrhiza echinata Diosc. Süßholz.

Lob. meminit etiam alterius, quam nominat spinosam Anthiochenam. Glycyrrhizam echinatham Diosc. Anglicè hedgehogge licorice nominat. Glycyrrhizam veram Dioscoridis Schvvenckfeldius.

Locus & tempus.

Semina & siliquas sæpius habui, seminariique, sed non prouenit, præterquam semel Montbelgardi vbi tertio anno echinos produxit: semen autem maturum factum Octobri: excreuere magni caules bicubitales: radix crassa, magna. Planta hæc, (teste Lob.) in hortis Germaniæ, & Belgicæ tantum voluptatis causâ colitur, longèq; vulgaratâ dulcedine, & gratiâ vincitur. Flores, inquit Dod. Æstare, Autumno pilula cum siliquis perficiuntur. Vere herba regerminat, nouosque caules producit. Hieme siquidem cum caulibus folia intermoriuntur, radice interim viuace.

SCYTHICE RADIX VETERIBUS.

CAP. XXV.

Scythices natura haud ita cognita hodie, quemadmodum aliarum radicum dulcium. Imò cum raris in terris etiam olim propagaretur, haud mirum si pauca ab Autoribus tradita hisce etiam temporibus extant.

Scythica Theophr. Locum.

De hac autem ita scribit Theophr. Dulcis autem etiam Scythica [Σκυθική] & quidam eam ὀβυζαντίαν vocant: nascitur apud Maiotim. Valis ad anhelitupsi [ἀνελίτψι] tussim siccam, atque in totum ad thoracis affectus, & ad vbera in melle. Potest & sitim sedare, si quis in ore teneat. Quâ de causâ tum eâ, & Hyppace Scythas vndecim & duodecim dies durare credunt.

Scythica Plinio.

Sed hæc paulò clariùs, Plinius ita tradit. Inueniunt herbas & vniuersæ Gentes. Scythia primum eam, quæ Scythice vocatur circa βοροτία [Μοροτίδαν Corn.] nascens, prædulcis. Aliam [prædulcem aliâs Corn.] vtilissimâ [vtilissimamque] ad ea, quæ spasmata [asthmata] vocant. Magna & ea cōmēdatio, quod in ore eam habentes, famem, sitimque nō sentiunt. Idem præstat apud eisdem Hippice [Hippace Corn.] dicta, quod in equis quoque eundem effectum habeat. Traduntque his duabus herbis Scythas in duodenos dies durare in fame, & siti.

Hippace Equæstris.

Cæterum, Hippacen apud Theophrastum, Gaza Equestrem vertit, quasi radix esset dulci radici par, ad abigendam sitim famemque: Sed caulem equinum, inquit Gesnerus, non radicem, aut herbam esse, Dioscoridis Pliniique testimonio constat. Hermolaus vnâ literâ discernit, sic ut Hippice herbam, Hippace caulem designet. Et

Hippace apud Theophr. legitur. Quare non probatur Gaza, qui Equestrem transtulit. Sed in hoc etiam errauit Gaza, quod sitim tolerare vertit, vbi græcè simpliciter ὀβυζαντίαν [vitam agere] legitur: ut intelligamus Hippacen cibilibus, Glycyrrhizâ verò sitis remedium esse. Apparet etiam Plinium errasse, qui vtriq; Hippacæ & Glycyrrhizæ, vtrumque seorsim attribuit remedium.

GLYCYRRHIZA RADICE repente, vulgaris, Germanica.



Armentosa Radix. Radices longè lateque, implexu vago reptant, colore buxo; foris nigricantes, saporie melleo cui flos multiplex dulcedine cedit, subhirsutus, nonnihil purpureascentis: folia in alam Fraxini instar disposita, quorum singulata minora, per ambitum integra, atrouerentia, modicè viscosa, dum adhuc tenera: sa-

pore acerbo, & subacido, Tragæ autem, Dictamnino vulgari aut Ciceri sunt similia: flores racemosi, purpurantes, Dod. dilute cœrulei, singulatis Trifolii bituminosi floribus persimiles: hos excipiunt siliquæ glabræ, in quibus semina parua.

Dulcis radix, huc Glycyrrhiza, autore Cordo, eadem est cum Scythica. Errauit Plinius, quod dicit sine dubio inter aculeatas esse Glycyrrhizæ, folisque eam echinatis [aculeatis] describit. Decepit Plinium duorum istorum vocabulorum similitudo ὀβυζαντίαν & ὀβυζαντίαν. Nam facilis est ex vno in alterum lapsus.

ὀβυζαντίαν, inquit Tragus, Latini radicem dulcem: nostri Liquiritiam, & Glicoriciam vocant, Serapio autem Sus nominat. Dioscorides ei varia attribuit nomina. Theophr. Scythicam appellat. De hac radice dulci legatur Gal. & Auic. & Constant. Mirari satis non possum cur aculeatis plantis Glycyrrhiza à Plinio annumerata fuerit, & echinatis solus descripta. Hinc necesse est, ut dicamus Plinium folia Glycyrrhizæ nequaquam vidisse, aut asperas illas, quas diximus, siliquas intellexisse.

Sed miratur Tragus Plinium, qui ipse interim haud mirandus solum, sed potius omnino reiciendus. Pingit enim siliquas hirsutas, & asperas tradit, quod ego non obseruaui, quasque ab eo visas non credo: sed in Diosc. duntaxat legisse, & iconi suæ falsò appinxisse. Nec præterea assentior Glycyrrhizam Pabergensis agri esse eandem cum Diosc. Glycyrrhiza, de qua antè egimus, cui siliquæ glabræ, non verò hirsutæ, vel aculeatæ, quas pingit, id quod etiam testatur Dodonæus.

Euchl. qui Scythicam Theophr. quoque statuit & ὀβυζαντίαν quibusdam vocari tradit, non describit, sed inatè descriptionem Diosc. huic attribuit.

huius quæ plantæ, quam iconem proponit, non conuenit.

Sed quid de hac Matthæ intelligamus. Dulcis radix, ait, quam Græci Glycyrrhizam, & Officinæ græcum nomen corruptentes, vel potius Barbaros secuti, *Liquiritiam* vocant, & Hetrusci vulgè *Regulitia*, planta est paucis non cognita. Sed non possum non valde admirari Plinium, quod Glycyrrhizam inter aculeatas numerarit plantas. Sine controuersia dici potest Plinium Glycyrrhizam minime nouisse: Cuius erroris causa illud facile esse potuit, quod sui potius Græci codicis fidem secutus fuerit, quàm rei veritatem, in quo fortasse facili, lubricoque Librario- rum non aduertentium lapsu *ex* pro *oxy* scriptum legebatur: vel quod græcæ linguæ non exactè peritus, vocabulorum, vorumque simili- tudine deceptus in hoc errauerit. Hæc huiusmo- di opinio adeo firmiter veritati coheret, ut faci- le et quoque deprehendi possint à veritate des- ciscere, qui credunt Glycyrrhizam olim spinis fuisse præditam, sed mangonio longi cultus edo- mitto rigore spinarum aculeos amississe, & tan- dem mitigatam esse: cum ea etiam, quæ hoc rursus sponte per se nascitur, nullibi aculeata spectetur. Hæc ille, cuius icon non representat Glycyrrhizam Diosc. ea enim est radice Gentianæ, fructu aspe- riore: Matthioli verò, radice est reptante, siliqua glabrâ. Plinius non errauit, ut ille ait, ob imperi- tiam linguæ græcæ, aut latinæ, quam multo me- lius intelligebat ipso, Cuius peritia [non dicam ignorantia] in lingua Græca, & Latina, qualis fuerit, satis nota plurimis est. Adde adhuc in com- muni mag. ic. Glycyrrhizam re vera duum ef- se genorum: vnam frugiferam, alteram verò Re- ptantem frugiferam [quam describit Diosc.] fructum proferre pilularum Platani magnitudine. Hanc primum ad se misisse Io. Heilum Medic. Norim- berg. Nec antea vsquam à se visam. Et hæc eadem com. Ital. cum mag. quoque icon. ascribit, sed v- trobique ineptam ponit iconem, relicta meliori, confundens duas plantas: priori namque suæ iconi demit summitates, & supra ponit fructum echinatum Glycyrrhizæ Dioscoridæ. Falsè etiam scribit eam, quæ pilulas fert, non longè à Norim- berga prouenire: facili crediderim ei missas pi- lulas Norimbergæ ex horto aliquo, in quo culta fuerit particulatim. Frustra tandem aliquam Gly- cyrrhizam sterilem dicit. Vtinde falsam habet eandem figuram, Iconum p. 3. ex duabus plan- tis compositam. Dioscoridis etiam descriptioni præter veritatem addit radices samentosas, quod postea figmentum penes consulam des- criptionem in Hist. germ. repetit.

An Anguill. de hac agit, quando scribit: Gly- cyrrhizam, quam descripsit Diosc. (non) habemus in Italia, verùm inueniunt versus Thraciam quæ flores edit glomeratos, spheræ instar, quibus superueniunt siliquæ spinosæ: radix nostrati si- milis omnino. Sed intelligere velim Anguilla- ram, si per Italianam, eandem, quam nos, intelligit, falleretur enim in radice, quæ differt ab ea quæ spinosæ fert siliquas, quæ non repit.

Glycyrrhiza lauis à Lacuna vocatur, Castill. *Regaliza*, aut *Orosuz*. Catal. *Regaliza*, Port. *Regoliz*: cui non bene perspectum fuit discrimen inter Glycyrrhizam vulgarem, quam pingit pro laui, & echinatam, de qua scriptum, Dulcis radix communis Glycyrrhiza.

Glycyrrhiza communis, aut Glycyrrhiza ger- manica Dod. gall. Eadem in fol. Glycyrrhiza vulgaris. Hanc etiam esse, inquit idem, palam est

Tom. II.

Officinæ corruptè vo. e. *Liquiritiam* vocant. Theoph. *Scythica*, & ut ait, nonnulli *Scythica* Plin. *Scythicam* herbam. Et verè *Scythica* siue multum dulcis, hæc dici potest: est enim om- ninò dulcissima, & quàm altera Glycyrrhiza dul- cior. *Scythice*, à *Scythia* regione, in qua gigni- tur, nominatur. Potest & hæc *Scythica* citra aspi- rationem & *Scythica* propriissime nuncupari: exi- guo siquidem gustu famem & sitim præcipuè le- dat.

Lobel. & Penz Glycyrrhiza siliquosa, com- munis, quæ dulcedine echinatam vincit.

Glycyrrhiza, quæ vulgè corruptè *Liquiritia*, suffrutex est (autore Casalp.) cuius radices sunt prælongæ, digiti crassitudine, laementosæ, intus fluæscentes, serpunt in terra, virgas ferentes multas, bicubitales, lignosas, annuas tamentis il- liquæ breues. Dioscorides fructiculum inquit esse. Theoph. *Scythicam* vocat. Plinius folia tribuit ei echinata, præ Schinò [Lentisco] Echinum legens. Quæ Glycyrrhiza Casalpini non ea, quæ echina- ta, ut voluit Casp. Bauhinus.

Proponit Tabern. consulam & figuram, & descriptionem, dicit enim siliquas asperas.

Sic & Gerardi figura non bona, potissimum quoque si spectes siliquas, quæ vix diuersè pin- guntur à Dioscoridæ Glycyrrhiza. siliquis fig- mentum ex Tab.

Schvv. in cæ. Sil. Glycyrrhizam vulgarem, & radicem dulcem Francicam vocat, *Lafferiz*; Si- lesis, Gemein *Eusholtz*.

C. Bauh. apud Matth. Glycyrrhizam alteram si- liquosam appellat, quæ quibusdam malè sterilis censetur.

Glycyrrhiza radice repente, vulgaris, germani- ca, à nobis dicitur, Germ. *Eusholtz* / & *Eus- murgel*, Belg. *Suythout* & *Calsesir*: aut *Cal- listichout*. Gall. *Riglice*, *Rigolisse*, & *Regolisse*. Ital. *Regalizia*. Hispanis verò *Regaliza*, & *Regali- tia*, Gerard. *Sed gehogge Licorice*. Angl. *Lic- cores*. Boh. *Lcorice* / Polon. *Lafrycia*. Hung. *edos gyoser*.

Glycyrrhiza [inquit Fuch.] multa, nec ignaua [frugifera Matth.] aliquot Germaniæ nostræ locis, Bâbergensi præsertim agro, producit. Et hodie nusquam ferè non feritur in hortis: his, quæ se- mel comprehenderit, tam pertinaci ferilitate co- hæret, ut vix vnquam possit radicibus extirpari, tam restibili fecunditate regerminat. Audio & Fullac in Carinthia prouenire: & illic etiam in Franconia Bambergæ, in agris coli: tertio, aut quarto anno effodi, hoc modo: sulcus longus, nempe per totum agrum ducitur, duos ferè pe- des latus: profundus tres, aut quatuor dodrantes: sic maiores radices eximunt, relinquunt mino- res. Iulio mense, teste Frago, appetente, flosculi prodeunt. Tam folia, quàm caules Hieme quo- tannis pereunt, quo fit, ut quotannis radice om- nia hæc nouo pullulascere necesse habeant. De dulci radice Germania gloriari potest, in primis verò Bâbergensis ager, qui vnicus toti Germaniæ satis Glycyrrhiza suppeditare potest. Abundat hac (autore Matth.) Apulia, præsertim Gargano monte, vnde quotannis succus in pastillos con- densatus ad nos conuehitur, & radicem, quàm plurimam. Visitur etiamnum in viridariis, pluri- bus locis in Italia, non modò ad spectaculum fa- ta, sed ad medicamentorum usum. Pleiadibus oc- ciduis [inquit in Hist. germ.] radix colligitur. Nas- citur & in nostro hortulo [ait Gesn. hort.] in quo duobus, aut tribus annis absque flore, & stultu caulem edidit incubitalem ferè, quanto primùm

Ec a

HISOTRIAE PLANTARVM

Plurimum
radice
plantatur

anno flosculos, & siliquas ostendit. Hæc cum scriberem ad cubitos quatuor excreuerat, decem, aut pluribus (aliquot enim resecueram) ab vna radice caulibus sub finem Iunii mensis: neque dum tamen flores ostendebat. Prouenit autem plurimum plantata radice. Folia tactu glutinosa sunt, & leuiter subolent nescio quid aromatici Calami serè, sub noctem præsertim: quo tempore folia omnia demittuntur, interdum verò surriguntur. Idem de coll. stirp. inquit, floret Iulio, & semen fert Septembri. Communis, nullis non nota, pergit Lobel. quæ ex Hispaniis Londinum, Antuerpiam & Lugdunum defertur, & vili vbique locorum distribuitur, non paucis Gallie Narbonensis locis multum sponte oritur, etiam prope *Lactra* oppidum. Iunio, & Iulio siliquas fert. Schuuenkfeldio Augusto & Septembri floret. Habebam ego Montbelgardi in hortu Ill. C. Wirt. allatam Stutgardia, & Lugduni ex fasciculis Francofurto missis. His ita hæcenus dictis, addit Dodonæus: Frequens est in Hispania, & Belgarum horti hac non destituntur. Rariùs autem in Germania ac Belgio floret, ideoque etiam sterilis à nonnullis, sed temerè, credita: cum tamen floret, sub finem Æstatis floret.

Vires
Viuæ

Viribus antea ex Theoph. & Plinio sub titulo Scythice enarratis, adiungamus eas, quas Tragus Matth. & Dodonæus in præsentem testantur. Quare præstantissima hæc, nobilissimaque planta secundum commentariorum suorum librum, Tragus concludit, dicens: Non solum radix hæc vnà cum succo extracto magni facienda, verum etiam suo modo vtilior, commodior, & salubrior ipso Saccharo esse mihi videtur, ita quidem si altero ex his carendum mihi foret, Saccharo sanè, quàm Glycyrrhizæ carere mallet. Pro illo namque mel vsupare possem, quemadmodum & Veteres non Saccharo, sed melle pleraque medicamenta temperasse legimus. Saccharum equidem, sicut & alia aromata, ad officinas & diuitum culinas spectare potius videtur, qui verò tenuioris sunt fortunæ, melle, & dulci radice contenti erunt, & plus commoditatis inde, quàm ex Saccharo & aromatibus percipient. Nemo enim ignorat amara, & Saccharum sitim excitare, quàm dulcis radix & succus eius resingunt. Dolendum est autè tam præpostero nos præditos esse iudicio, ut noxia expetamus, salutaria respuentes: id quod in ægris, præsertim verò febricitantibus competimus, quibus confectionibus Saccharo aliisue aromatibus permixtis, sanitas non confertur, sed aufertur, sitisque non adimitur, sed additur, quæ tamen aliis & commodioribus medicamentis resingenda erat. Sed ut ad Glycyrrhizæ vires propius accedamus, Matthiolum inspiciamus, & Dodonæum. Cæterum autem quandoquidem hæc radix dulcis est, temperatè quoque calida & humida est. Cortex eius amaritudinem quandam tamen habet, & calidioris est qualitatis particeps, sed hunc abradere oportet: Humectat autem magis recens, & succo plena radix, quàm arida. Vtilis est ad raucedines, tussis, difficilem respirationem, perineumoniam, pleuritidem, sanguinisque ac puris sputationem, phthisim, & ad omnes thoracis morbos, exasperata lenit, inflammationes sedat, acrimoniam, & falsilaginem humorum mitigat, contemperatque: crudiores humores concoquit, & sputi exitum faciliorem promouet: vlcera expurgat in eclegmate, vel alio quouis modo sumpta: aut ali-

Tempera-
mentum
Cortex.

quandiu manfa, succus sub lingua detento. De-

codum eius renibus ac vesicæ exulceratis confert: vrinæ stillicidio medetur, ac in vniuersum omnibus malis occurrit, ab acerbis, salis, & mordacibus humoribus excitatis. In quibusdam monasteriis Hollandiæ (addit Hist. gall.) ex succo Liquiritiæ & aliis aromatibus paruos panes efformant, qui tussi profunt frigida & inueterata, & aliis similibus pulmonum & thoracis affectibus.

Ducim
Humor
salsi
Tussi

FOENVM GRAECVM SILVE- stre, siue Glycyrrhiza siluest. quibusdam



Cassa radi-
cis nititur,
cubitus, & tes-
quicubitus
longa, albo sa-
pore dulci: ra-
mos vimineos,
per terrâ spar-
gens, tres aut
quatuor cubi-
tos longos, ac-
que etiam in-
terdum lon-
giores, teretes,
glabros, fractu
contumaces: fo-
lia instar Gly-
cyrrhizæ dispo-
nuntur. coniugationib' qua-
tuor, quinque,
aut sex, vno im-

Delect.
radix
Sapor
Rami

pari alam claudente, quod tamen non est perpetuè, sunt ea verò, si singula seorsum contempleris. Pisi silvestris foliis similia, superne ex viridi glauca & glabra, inferne ex viridi flauescencia, ac hirsuta, sapore eo, quem radici inesse dicebamus: ex foliorum postè alis pediculus circiter palmaris enascitur, qui leguminaceos crebros flores ex flauo pallentes sustinet: siliqua non minùs floribus frequentes, incuruæ, dorso sulcata, vnde si neruum auferas, ex duabus compositæ videntur, quarum singulæ suis membranis dissepiantur, semen claudentes Fœnugræci, minus, lucidum, cui sinus insculptus.

Color
Sapor foli-
rum
Pediculus
Flores
Siliqua
Semen

Fœnugræcum silvestre Tragus nominat, Lotumque sylvestrem, à Diosc. descriptam, quam & Trifolium minus, & Lybicam vocet, perpetuam esse iudicat.

Synonyma

Ineptit simili modo Lonicerus, qui Lotum trifoliam, aut Lotum campestre appellat. Ger. Steinwiden/ aut wild fœnugrec/ & wild boden forn.

Dodonæo est Fœnugræcum silu. Tragi, & Recentiorum, & hæc in Hist. frum. In fol. autem Fœnugræcum silu. 1. Belg. Wilde Senigried/ Germ. Wildbodens forn.

Lobel. & Penz Adu. & Ic. Pl. Glauz vulgaris, Obs. insuper Fœnugræcum silu. Tragi Angl. Sca Trifoly.

Gesn. Glycyrrizam silu. eam herbam putat quam Dod. Iconum suarum lib. 2. p. 36. pro Hedyaro pinxit. Quod an verum sit videndum. in hist. gall. id non facit.

Glauz vulg.
garr.
Glycyrr. silu.

Cordo, cui Polygalon dicitur, gesn. addit figuram ex Tragi lib. 2. cap. 5. vbi etiam annotatum, Polygalon, Cordi quidam non rectè Hedyarum

dysarum, neque melids alii Fœnugracum silu. nominant. Glycyrrhiza silvestris.

Clusius, à quo Glauz vulgaris, & Glycyrrhiza silv. Gesneri dicitur, scribebat olim apud Aco-
stam, Herbam mimosam multis notis convenire
cum Polygalo Cordi, cuius folia noctu interdum
contrahantur, ac spinis careat caulis, nisi pro spi-
nis sumere libeat, tenues illas & mucronatas ap-
pendices sedi foliorum alatorum inhaerentes.
Hanc tamen opinionem lib. Exotic. Clus. omisit.
Vocatur Hungaricè Denz leuleu/ edda siu, h.e.
Numularis dulcis herba.

Locus
Tempus.

Habeo à me satum Montbelg. in horto Ill. E.
C. Fœnugracum silu. Tragi, folio Glycyrrhizæ.
Multis hoc odiosum est, ramis nimirum se nimium
spargentibus. Geneuz proveniens observavi pro-
pe collē la Bassie mense Martio, & florens Junio.
Lugduni abundat, ubi Dalechampius Glycyrr-
hizam silu. vocabat, quod nomen non displicet,
dulcis enim est herba. Basileæ vidi extra portam
Lapidem inter spinas. Item eundo Bernam in-
ter Morat & Morges mense Julio prægnans semi-
ne. Inter Basileam & Leirach cum suis siliquis
instar cornu effigiatis, multis simul mensis Au-
gusti principio. Item iuxta Castellum Bessordien-
se semine maturo Augusto. Invenitur à Clusio in
silvis, pratium marginibus, umbrosis, atque
etiam in pratis apertis.

FœNUGRÆCO SILVESTRI

Tragi in quibusdam accedens
planta.

Descriptio
Caulis,
Folia.

Figura



Palmari est
altitudine,
caulibus dona-
ta teretibus,
hirsutis, striatis,
crassiusculis: fo-
lia Tribuli ter-
restris paria,
perquam hirsu-
ta, conjugatum
costæ, duum
vinciarum, ex
caulis geniculis
ortæ, adhaerenti
indidemque
flores copiosi
dimidiatū ver-
ticillum efficien-
tes, parvi, palli-
duli, quorum
vnicuique suc-
cedit siliqua hie-

futa, in acumen desinens, in duas partes fendi sa-
cili, quarum unaquæque suis vndique membra-
nis conuestita, semen continet copiosum. Fœnu-
græci satius, minus: radix duum vinciarum, sim-
plex, gracilis.

Hæc planta in multis accedit Stellæ legumi-
nosæ, de qua postea.

Circa Monspelium ad Episcopi Monsp. Ca-
stellum, lapide circiter vno ab urbe distans, in
loco arido, vix vnam, aut alteram observavit, at-
que collegit Gener. I. H. Cherlerus.

HERBA MIMOSA.

CAP. XXVII.

Inter ea, quæ anno 1809. Gener. Cherlerus ex
Angliæ reportabat, erat *Herba mimosa*, de qua

Tom. II.

hæcille. Herba, semen, & ramulus Herbe mimo-
sæ, per D. Cargillum missæ, cui tradiderat D. Ga-
retus, qui acceperat à Comite Comberlandio,

Icon Ac. flæ.



qui collegerat
in insula, quæ
cepit in Ame-
rica, quæ vo-
catur S. Ioan.
de Poste Ric-
co. Sunt au-
tem eius ra-
muli tenues
in partes divi-
si, in quibus
creberrimæ &
tenuissimæ,
veluti spinule,
non tamen
pungentes, ad
Multarum
accedunt: ipsi
verò ramuli
sunt conglom-
merati, abun-
dantes se mi-
nibus, quæ ad-
hæreere videntur
illis veluti

Locus

Deser.

ramulus

Spina

spinolis, ea aliquid cum Lente simile habent, ver-
um minora, & minus orbiculata, in acumen de-
sinentia, compressa nonnihil, & in medio parum-
per tumescunt, dentibus atritu facilia. Con-
stant membrana tenui, sulcata, & minimo nucleo
internè albo: saporem nullum animadvertimus.

Iconem Acostræ dudum sculpendam curaveram-
us, anno sc. 1506. sed quia veriorem Clusii, quæ
cum nostro ramulo, semine, & herba congruit,
agnoscimus: eam parandam censuimus. Dicitur
autem Acostræ in lib. Arom. Italicè edito, *Herba*
Mulle, *Herba Delicaria*, & in versione Clusii *Herba*
mimosa, ubi sequentia de ea leguntur. Invenitur
in quibusdam [Asiæ] hortis, planta quinque pal-
morum longitudinis, vicinis arbutis, aut parie-
tibus incumbens, terui caule, eleganti viriditate
prædita, nec admodum rotundo, per intervalla
exiguæ, & pungentibus spinis, foliis superiori-
bus haud abstimilibus, Filicis feminae foliis mi-
noribus. Gaudet humidis & petrosis: manu-
que admodum senescit & marcescit, remota verò
pristinam viriditatem recipit, sed non celeriter
ideoque *Herb. visa*, & *Mimosa* dicitur. Na-
turam habet plurimum ab arbore tristi differen-
tem: nam singulis noctibus Sole occidente se-
nescit & siccat quodammodo, sic ut conta-
buille videatur: oriente verò Sole vigorem de-
nud recipit: quantoque Sol magis seruet, eo ma-
gis viret, totoque die folia ad Solem convertit.
Odore & sapore est Glycyrrhizæ: vulgoque ab
indigenis folia manduntur aduersus tussim, ad
pectus repurgandum, & vocem clariorem effi-
ciendam: teneum etiam doloribus utilis esse cen-
setur, & recentia vulnera glutinare.

Hic Clusius (qui olim apud Acostram hanc mul-
tis notis cum Fœnugræco silu. Tragi convenire
dixit, & nunc in Exot. hanc suam opinionem o-
mittit) addit: Multarum (præsertim in leguminu
genere) folia, noctu se contrahere, & compri-
mere solent. Herba porrò Mimosa appellatio-
ne ad me mittebatur sicca planta à Lac. o. v. re-
extremo Octobri, anni 1599. quam ab Ill. Comi-
te de Comberland ex Insula D. Ioannis à portu
diuine nuncupata, reduce, horti cum terra impo-

Iconem

Herba Mula
le
Herb. Delicaria
cata.
Locus
Deser.
Acosta.
Caulis.

Locus

Mimosa
quæ
catur.
Naturæ.

Odor.
sapor.
Vires.
Tusis.
Rorari de
lari.

Vulnera.
Pannicula.
cum silis.

HISTORIAE PLANTARVM.

stium recepiſſe ſcribebat, conſeruare tamen non potuiſſe. Huius verd iconem, quā commodè fieri potuit, ex illa ſicca exprimi curabam, vt eius hſtoriæ ex ſicca etiam planta concinnata, addi poſſet.



Conſtabat autem ea planta, quæ proſus ſicca, & foliorū expers, ſingulari radice, non craſſa quidem illā, ſed dura & lignoſa, rariſque fibris prædita, à quā terni, aut quaterni cauliculi exhibant breues, qui ſtatim in aliquot tenues virgas, & humi procumbentes in ambitu ſpangebant, ad ſingulos nodos, fre-

quentes, lōgas, tenuesque fibras agentes, inſtar ramorum Peridymeni vulgaris, qui per terram diffunduntur: erant verd cubitalis longitudinis illæ virgæ, interdum ampliores, teretes, lentæ, quibuſdam ſpinulis latiſculā baſi eas inſidentibus præditæ, quemadmodum in Rubi ramis videre licet, minoribus tamen, rarioribus, minusque firmis: ex rurfus in alios graciliores ramos diuidebantur, frequentioribus ſpinulis obſitos, quorum nodis inter binas appendiculas alternis exoriebatur teneriſſimi ramuli ſuis foliolis obſiti, quæ numeroſa ſerie quādam, & pari vtrinq; numero, in ala nata erant, nullo ſingulari alam ſiniente, tenella admodum, & virentia, non diſſimilia Acaciæ foliolis, quæ (dū primū prodibant, tenui, incanaque lanugine pubeſcebant, vt ex ramo ſuis paruulis ramulis, & foliolis conſpecto, quæ addiderat, deprehendere poteram, quique fibras aliquot adnatas etiam retinebat. Adiunxerat & bina capitella, quæ, in ea planta nata, ab Illuſtri ſupra dicto Comite accepiſſe ſcribebat, cum aliquot ramis ſua folia adhuc retinentibus. Conſtabant ea capitella à multis, tenuibus, anguſtiſque & ſpinolis veluti foliolis, inter quæ latebant ſemina orbiculata, plana, nigra, in medio nonnihil tumentia. Flores à me conſpecti non fuerunt, & haud ſcio, an allati fuerint. Verum porro huius plantæ virentis, & adhuc in terra hærentis, folia, manu admotā, marceſcant, vt ſcribit Acoſta, cuiusque rei cauſā nomen fuerit inditum, ii reſerre poſſent, qui plantam virentem & creſcentem viderunt, atque ærutam capſæ impoſuerunt.

ASTRAGALVS. VETERIBVS.

C A P. XXVI.

Aſtragalus [*ἀſτράγλος*] inquit Dioſc. eſt paruus à terra frutex [*θρύſκος*] foliis & ramulis ſimilis [*ῥαβδίου*] Ciceri: flores ſunt purpurei, parui: radix ſubell rotunda, velut magnus

Raphanus [*ῥαβδίου*] I. c. b. & Pena Adu. Colum. [*ῥαβδίου*] propagines habens ſolidas, nigras, duras, velut cornua inter ſe implicatas, gultu adſtringentes.

Variat nonnihil à Dioſc. lectione Plinius, breuiter ita ſcribens: Aſtragalus folia habet longa, incifuris multis obliquis [Columnæ incifuris multis ſuperfluum videtur, & legendum obliqua:] circa radicem caules tres, aut quatuor foliorum plenos, ſtorem Hyacinthi, radices villoſas, implicatas, rubras, præduras.

Gal. lib. 1. c. 1. ſecund. loc. medicamentum ad calueſcentes habet, quod recipit Iridis Aſtragalitidis, ſive, vt alii, Illyricæ ſextantem. In quem locum ego (inquit Corn.) in com. med. annotauit, videri mihi Iridem Aſtragalitidem eandem elle cū Aſtragalo ſimpliciter appellato, ed quā huius radicem ſoliditas, & vires, Iridis Illyricæ ſoliditati, ac viribus reſpondeant, ad vetera vlcera explenda, ac repurganda. In ea ſententia adhuc ſum & habet Iridem Aſtragalitidem etiam Aëtius libro tert. cap. tert. Poſſe itaque Aſtragalus, Iris appellari, & additione Aſtragalitidis declarari. Aſtragali appellatio talum ſignificat, quod radicis figurā, & ſoliditate talum reſert. Noſtris putatur ea eſſe, quam Erdmōren vocant. Sed ſordi erroris inſinulare licet Cornarium, qui, vt aliquid noui, & minimè vulgaris in lucem ederet, ſibi perſuaſerit, ne dicam leuibus idearum ſonantibus ſinixerit, Aſtragalum, & Iridem Aſtragaloidem, eandem eſſe plantas. An præterea per Erdmōren intelligat Chamæbalanum quorundam, conſiderandum. ſi eam intelligit, radix non eſt ſimilis magno Raphano, vt in Dioſc. legit.

Conuenientius adhuc nomen, & Etymon, quā Cornarius, Columna tradit. Seminum, inſit, forma *ἀſτράγλου*, plantæ huic nomen indidit Aſtragali: *ἀſτράγλος* quidem talum, & talorū luſum ſignificat, quorum formam & vltim huius plantæ ſemina reſerunt: tereti formā quidem ſunt in ſuperna, infernaque parte plana, vel acetabulorum more concava: poſſet etiam ita appellari à tuberoſa, carnolaue forma radicis compreſſa, & melius à multitudine fibrarum nodolarum ad ſimilitudinē flagelli, vnde *ἀſτράγλος* à Pollice dicitur. Dioſc. plantæ habitum ſimilem Ciceri fecit, non folia Ciceri ſimilia: ſtorem Hyacinthi, colorem intellige.

Cæterum Aſtragalum volunt aliqui, vt Tur- nerus, quem antè, hoc libro 17. tradidimus, titulo Chamæbalani leguminoſæ, hanc fortè etiam intelligit per Erdmōren antè dictam Cornarius. Necdum conſtat, quæ planta ſit Aſtragalus Matthioli, niſi ſit Hederaſum clypeatum per pictorem accommodatum deſcriptioni Dioſcoridis. Adhuc Aſtragalitidē Iridem Galeni & Aëtii non exiſt manius eſſe eandē cum Aſtragalo, & Erdmōren, vt putauit Cornarius.

Aſtragalus maior dicitur à Fuchſio. Aſtragaloides autem, & Aſtragalus ſilu. Thaliō & aliis. Non deſunt præterea, qui Aſtragaloidem reſt- caulem, hirsutam vocitant. Alii verd Aſtragaloides Cicero Ponz, Onobrychin quorundam purpureis flore. Alii Aſtragalum Monſpelicum. Quidam Aſtragalum quendam montanum Aſtragalum montano candidiorem. Nonnulli Aſtragalum Syriacum appellant. An Aſtragalus fortè lanuginofus Boeticus. Aſtragalus Dioſcoridis quibuſdam. Habetur & Aſtragalus ſilueſtris vernus à quibuſdam, & cælega nemoſis verna, de qua paullo poſt.

Creditur tandem Aſtragalus Columnæ, cælega nemoſis

Locus.

Memorensi valde similia, si non idem.

Nascitur (teste Diosc.) locis vento expositis, vmbrosis, & niuosis. Multa in Memphide Arcadix. Ait contra [autore Plinio] legitur, in Phœneo Arcadix in petrosis, apricis, & idem niuosis. Ita etiam Paulus habet Galenum secutus. Quum itaque hi omnes in quibus legant, inquit Corn. etiam in Dioscoride rectam lectionem esse, in eam apparet: & non in uluord, velut quidam exemplaria habent: maxime cum nulla sit Arcadie Memphis.

Colligitur
comp.
Vires &
usus.

Colligitur exite Autumnus, quum folia amiserit, siccat in umbra.

Radix, ut Diosc. tradit, in vino pota aluum fluidam sistit, & vrinam mouet. Facit & ad vlcera vetera, arida inspersa. Sanguinem quoque cohibet. Tunditur autem difficulter ob suam soliditatem. His addit Plinius: Vis ei ad spissanda corpora. Vrinam mouet reperculso liquore, sicut pleraque quæ aluum sistunt. Sanat & dysentericos in vino rubro tusa. Eadem gingiuarum supurationi vtilissima est sota. Galenus fruticem hunc paruum, radices habere adstringentes asserit, proindeque ex iis esse, quæ non ingenitosè siccant.

ASTRAGALVS ROMANVS, SIVE Hedysarum clypeatum siliqua aspera.

Ramis est cubitalibus, bicubitalibus, & tricubitalibus concavis, procumbentibus, glabris, crassiusculis, multis ex radice statim ortis: per quos alternatim serè nascuntur folia palmata, & serè dodrantalia, alia instar hærentia, quinque, aut sex coniugationibus, extremoque folio impari, constantia. folia singularia, Glycythiza folius quodammodo similia, paullo breuiora, latioraque, & glabra, exceptis marginibus, breuibus pilis ornatis, sapore nullo manifesto, nisi tantillum adstringente: ex alarum sinu prodeunt singuli singulares, qui in spicam digestos ferunt flores, amœnos, Genistæ, sed rubentes: è quibus siliquæ, compressæ, asperæ, ternis, aut quaternis, aut quinis seminibus orbiculatis, clypeoli effigie locatis, complures videntur.

Icones factæ sunt binæ. Prior demonstrat folia præcipue, & flores: altera verò siliquam, & semen. Illa rursus facta est ad plantam siccam delatam à cœtero meo Cherlero nomine Astragali Romani quorundam, nec autem ad Iconem Plantini, cum nostra siliqua, & semine.

Falluntur (inquit Dod.) qui Onobrychin alteram ad Securidacæ genus referre student. Falluntur & ii

Onobrychin
Securidacæ
genus.

Alia icon.



qui Helenium esse Aegyptium Dioscoridis vocant, quod esse nunquam potest, cum odorata non sit.

Hedysarum alterum clypeatum, & Helenium Aegyptium quorundam à Lobelio Obs. dicitur. Hedysarum Icon. Plantini. Pona in Baldo vocat Hedysarum alterum clypeatum. Camen hort. cognominat Securidacæ clypeatæ à Lobelio,

Hedysarum
clypeatum.

ac Dod. descriptam, Onobrychin à Dod. Nec deesse scribit, qui velint Helenium esse Aegyptium, quod non conueniat, siquidem radix sit rubra. Hedysarum alterum clypeatum Lobelii, quod in hortis Belgicis alatur, hist. Lugdunensi cognominatur. Helenium Aegyptium, eiusque speciem quidam dixerunt, alii vero appositè Hedysarum censuere.

In hortis Belgii Dodonæo conspici interdum contigit. Pona verò in horto montis Baldi. Môtbelgardi in horto E. C. satum aliquoties mihi prouenit, & primo quidem anno flores protulit Septembri, & Octobri, qui non maturuerunt. Argentiniæ tamen apud Fridericum Meierum Septembri maturum obseruavi, qui mihi indicauit à se obseruatam hanc plantam in pratibus Senensium copiosè prouenientem, quam equis pro pabulo exhibeant. Perit Hæc, ni reponatur. Hanc attulit Gener Cherlerus collectam in via Romana Viterbam versus. Florentiæ item in horto magni Ducis Hæturæ.

Locus &
Tempus.

Vires.

ASTRAGALVS MAT- thioli.

Somnio hercè vexabatur Matthioli, cum Astragalum quendam in agro Tridenino, in vallis Ananientis montibus sibi prouenientem olim imaginaretur, siquidem in post. com. silius Astragali figuram omisit quasi fictitiam. Nos enim suspicamur illi quondam aliquam plantam nomine Astragali demonstratam, quam postea per pictorem Dioscoridis descriptioni aptari (pictoribus enim omnia licet, ut hinc apud omnes in aliis plantis) Ea verò planta fuit fortè Hedysarum clypeatum, quibusdam dictum Astragalum, ut antè indicatum. Retractauit hinc mentis & Hist. Lugd. in ultimis suis editionibus sententiam suam de Astragalo Matthioli. Siquidem consilium siccæ botanici, aut vinolenti, nec cogitatum sapientis, sed optatum quilibet audientis certè percipiebatur. Quamuis autem Astragali figuram apud Matth. C. Bauh. ex secunda commentariorum editione proposuerit, attamen ignorare se fateatur qualis sit planta, etsi non desint, qui eiusdem Pseudo-Apium esse censeant.

Matth. no.

C. Bauh.

ASRAGALVS MAIOR, Fuchſio.

Descriptio.

Astragalus
maior.
Radix.
Caulis.



Quam mihi olim D. Fuchſius cum apud eū Tubingę esse Astragalum maiorem designauit, radice est satis longa, & crassa, dulci: caulibus rectis, cubitalibus, striatis, angulosis: foliola Viciarū modo disposita, nonem, vel undecim: interdum vnguib. longiora, aliis multo

Flores.

Siliqua.

Ervum:
Orob.
Descript.
Classi.

Flores.

tando oblonga, ad costam vnā adnexa, suberulea, quæ exsiccata nigrescunt: flores ex pediculis longis, satis magni purpurei, ex eodem pediculo plures, formā Viciarum: quibus succedunt siliquæ longæ, teretes, admodum affines plantæ, quam paullo post describam, quibus multa inter se similia, quædam diuersa.

Commemorat hanc Cluſius his verbis: Ervum siue Orobus rei herbariæ studiosis, Pannonicus purpurascens secundus, folia habet sēna, octona, interdum decem vni costæ hærentia, Lenticulæ folijs haudquaquam maiora, tenella, viridique, gustu amicante, calidissimo: flores purpurascens colore, qui vetustate in cæruleum commutatur: radix in diuersa tendens. Icon apud Cluſ. in hist. post. quemadmodum etiam apud Lobelium, optimè exprimit plantam, quam nos descripsimus: in Pannon. errore typographi pro Orobo Pannonico secundo pag. 738. male ponitur icon Trasi.

Astragaloides.

An Lob. Obs. sicut & Ic. Pl. Astragaloides altera Herbariorum. Huius figuram habere videatur Lonc. sub nomine Feldmeisen: quamuis non sit ea, de qua in contextu loquitur. C. Bauh. frater, qui Patavio misit, ei hæc nomina adscripsit, Glycyrrhiza Gæſneri, Aphace Cortusio: vultū ubi Gæſn. ita vocat ignorat. Astragaloides simpliciter à Dod. scribitur, ei que flores ex cæruleo purpurei, minores quàm Vicæ conferuntur, siliquæ verò teretes, oblongæ, nigricantes, in quibus semen Vicæ minus, non rotundum, ac globosum. Nonnulli, inquit is, Ervum silu. vocant.

Locum & tempus.

Inueni Genævæ mense Iunio in colle la Bastie florentem: item mense Maio. Argentinz vidi in horto D. Frid. Meieri cum siliquis Iulio. In Belgicis hortis aliquando videre meminit Cluſius, & Aphace nomine à rei herbariæ studiosis appellari. Sed multo tempore. Dod. teste, durat, Hiemis, frigorisque patiens. Ad hortos Belgii aliunde allatum, peregrinum est legumen. Iunio ac etiam serius flores, siliquæ interea perficiuntur.

ASTRAGALOIDES, SIVE ASTRAGALVS siluaticus, Astragalo magno Fuchſii, vel Chamzbalano leguminosæ affinis planta.



Chamzbalano similem voco, cui ex radicibus longis, quasi repentibus, varique implicatis, partim tenuibus, partim tuberosis, Chamzbalani Dodon. perquam similibus, nisi è tuberosis plures capillares fibræ prodirent, externè nigris, internè albis, sapore subdulcibus, caules exsurgunt multi, pedales, angulosi, folia aliquate-

Descriptio.

Radix.

Caulis.

Folia.

Flores.

Siliqua.

Semen.

Astragaloides.

An montanum.

Locum & Tempus.

nus Chamzbalano similia, sine capreolis, glauca, & serè nigricantia, oblonga, obtusa, nervosa, ex breuibus pediculis, quaterna vel sēna, præter foliola, quæ ad pediculorum exertum sunt: flores Pisorum rubentes, quibus succedunt siliquæ satis longæ, teretes, ex pediculo non admodum longo, in quibus semina mediocriter magna, lutea, sapore serè Pisorum, quæ se contingunt vtrinque compressa.

Ab Astragalo maiore Fuchſii differt, cui folia ex vno pediculo plura, & breuiora: differt etiam caulibus: qui breuiores, & radicibus.

Tbalio in Harc. Astragalus siluaticus, apud quem Camerarius scribit, dici vulgò Christianæ wurzel; alius Cicer montanum nuncupari, describit à Cordo, sed à nullo, quod sciat, depingi.

An Ruell. Astragalus, qui à Diosc. describitur, frequensque est apud suos. Rura, inquit, nostra montanum, vel rusticum Cicer nominant: Cicerulam esse diceret. Vulgus nonnusquam siluestres Cerras [cicerulas] vocat. Astragalum itaque Ruellius agnoscere uisus est, vel Cordo teste: cui cum ratione est adhibenda fides, cernitur Bnöllen Braus. Idem in hist. describit Astragali nomine quo in loco Gæſnerus annotauit Christian wurzell & Bnöllen wurzel ab aliquibus Cicer montanum appellari.

Mense florentem Aprilis, prouenientem verò cum siliquis obseruavi mense Octobri in monte Rosberg prope Masmunster & locis vicinis, in siluis & dumetis. Item circa fontem Admirabilem in ducatu Wirz. inter repres.

ASTRAGALVS RECTICAVLIS hirsuta.

A Nonymum quendam rannum inter siccas meas adseruo, rectum, cubitalem (altiorē fuisse sicca insinuat) rigidum ac firmum, totum pilis candicantibus ac lanuginosis oblitum, crebro foliorum vestitu præditum. Ea costæ hærent quindecim communiter, ordine & polita ut in Galega, minora, angustiora, tota villosa, in ac-

Descriptio.

Folia.

magn.



men desinen-
tia, sapore ama-
ro, flores longo
pediculo insi-
dent. Trifolii
pratensis, hian-
tes, pallidi, in
glomerem con-
gesti, ex villosis
calyculis pro-
minentes. Hæc
vbi locorum
naustus sum, nō
recordor. Ele-
gans tamē tur-
raritas, cum va-
rietate, figuram
merebatur, &
nomen ali-
quod.

POLYGALON VETERI-
BUS.

CAP. XXVIII.

Polygalon Diolecoridi frutex [πολύγαλον διολεκορίδι] est parvus, Palmi altitudine: folia habens Lenus foliorum specie: gustu subacerba [moderate austera Galenus: Plinius autem utramque speciem generis appellatione comprehendens, gustu adstricto dixit. Habet enim, inquit Corn. τὸ κόρυς species, τὸ δυσήγει, καὶ τὸ σπυγρόν.] Sed herbarum periti [pergit idem Corn.] hodie & de hac ambigunt. Quidam Pimpinellæ speciem esse volunt, quam Heine Bibenel dicunt. Alii eam esse volunt, quam Erubrum, vocant. Sed quum hæc trium generum sit, iuxta triplicem florem, Polygalon esse volunt eam, quæ album florem habet. Reliqua duo genera, & purpureum florem habens, & od. caeruleum ad Glaucæ, de qua suo loco agemus, referunt. Florem Polygalii neque in Diole. neque in Plinio Corn. reperitur, ideoque nihil pronunciat. Contendunt præterea nonnulli esse Gesneri Polygalon, alii verò Polygalon minus saxatile, quidam porro Polygalon affine Caput gallinaceum.

Folia pota lac gignere, creduntur, testibus Diole. Plinio, & Galeno. Quare in ipsis calidum & humidum prædominantur, talia enim esse oportet ea, quæ lac gignunt.

POLYGALON GESNERI.

Miltarum notarum argumento Polygalon Mindigitabat Gesnerus herbam, & radice medicatè crassa, longa, cortice obiecta nigro, intus albâ, ramis præsertim multos, palmares, vel etiam cubitales, rubentes: & quibus orti pediculi folia coniugata disposita sustinet, Lenus, inferius magis albicans, & pilosa, superius viridat magis: summus ramus spica insidet florum Vicæ, vel Aphaces aut Lenus, sed coloris purpurei est calyce piloso: sequuntur seminum conceptacula subrotunda, modicè compressa, spinulis asperata, & per ambitum gibba, cristam serratam membranam erigena.



Label. & Penna Aduellac. Obs. qui Caput gallinaceum Belgarum vocant, dicunt: An Onobrychis Diolecoridis? Polygalum vera Dalechampi. Onobrychis Dodonæi. Dodonzo autem gallico, Onobrychis quædam, & Vicia species secunda. Item in fol. & de frum. Onobrychis Diole. Plin. & Galeni, Gesnero de hort. Glaucæ, vel

Synonyma
Caput gall.
Belgarum.
An Onobry-
chis
Polygalum
vera Dale-
champi.
Onobrychis
Dodonæi.
Polygalum
Reticum.

Onobrychis Dodonæi. Et in append. Polygalum Reticum. Hist. Lugd. Polygalum multotum, quibusdam Onobrychis. Tab. ic. & Hist. Onobrychis, Baenenkopf / wildthöffenfraut. Clus. Onobrychis Dodonæi, quæ Brabantis Panefammefen, id est, Crusta gallinacea cognominatur. Pona in Baldo nominat Polygalum Diole. Dalechamptio, Lobelium imitatus, Gesnerus tamen fuit primus auctor huius appellationis, quicquid scribat Lobelius.

Polygalon Gesneri diligens simplicium indagator Leonhardus Rauvvolfius prope Areletam in Provincia mense Maio collegit. Vidimus nos hanc florentem mense Aprili, in monte Appennino. Genevæ abundat in pratis iuxta Aras & Nosodochium. Polygalon in peregrinatione Rhætica Curie repertum flore albo, ut ceterat Gesnerus non recordor autem an aliis notis à præcedenti differat. Montbelgardi provenit in horto ex semine in Briscoia collecto. Clus. sicut & Pona in Baldo gramineis locis, siccioribusque pratis nasci perhibent. Sed & plerisque superioris Germaniæ locis exit, inquit Dodonæus. In Bohemiæ agris secus scrobes, per quas pluvia delabitur aqua, Onobrychis frequens est, apud Brabantos & Flandros ab herbarum studiosis in hortis subinde feritur. Augusto cum flore & fructu reperitur.

Curia Rhætorum [sic enim Pontifella inibi narrabat] plurimi sunt prata, in quibus hæc proveniret, multum enim ex eius esu lactis vaccis & cæteris animalibus copiam contingere pro indubitate creditur.

POLYGALUM MINUS
saxatile.

Tota quanta est, vix palmum superat. Radix candida est, longiuscula, modicè pro plantulæ modulo crassa, divisa in capita, paucis fibris donata. Ex qua foliola statim emergunt costæ hærentia, repanda, capitulis gallinacei, sed obtusiora, latioraque, pilis candidis obsita. Coliculi graciles sunt, consimilibus foliis vestiti, supernè divisi: quorum extremis flosculi insident luteoli, aut palliduli hiantes, exigui, pauci, Astragalorum politu, nec in spicam abeuntes, ut in Polygalon Gesneri, capitula sequuntur exigua, rotunda, aliquot apiculis supernè donata.

Crista gall.
huacea.

Locum
tempus.

Vicia.

Descriptio
Radix.

Folia.

Coliculi.

Flosculi.

HISTORIAE PLANTARVM

Locus &
Tempus.



POLYGALO GESNERI AFFINE
Caput gallinaceum.



Hanc plantā attulit Gern. Cherlerus, collectam circa arcem Episcopi Montpelientis in locis incultis, asperis & saxosis, Iunio mense.

radice mox germinant, alia per caules, trium pl. minus vnciarum longitudine, foliolis conjugatim dispositis constantia, duplō minribus, quam Polygali Gesneri, acuminatis, vtrinque hirsutis, & argenteo splendore subinde micantibus: foliorum per ramos pediculi longiusculi, squamulas habent appositas, rubentes.

In sabuleis & campestribus ad semitas prope montem Lupi Montpelienſiu meruit Gern. Cherlerus. Existimo me eandem vidisse anno 1594. apud Fratrem C. Baubinum.

ONOBRYCHIS IN GENERE

CAP. XXIX.

Onobrychidi Diosc. filia Lenti similia tribuit, attamen paulō longiora. caulem verō palmi altitudine: florem puniceum rubentem Plin. 17. 4. dicem parvam [exiguam & gracilem Plin.]

Verū non satis constat inquit Ryff. & Corn. quæ herba sit. Quidam enim Herbarii Rutz silvestris speciebus annumerant. Corn. quidem Onobrychidem & Onopordon, vnaſm herbam esse putat altero nomine à crepitu, altero à ruditu alini ducto. Et fieri potest vt vtrumque accidat alino, ex herba est, vt & pedat, & rudiat. Cur autem in hanc abierit sententiam, Plinius ipsum mouit de vtriusque viribus non multū diuerſa tradens. Onobrychidis igitur nomen plurimus plantis attributum est, in primis Polygalo Gesneri, Astragalo Montpeliano, Hedyſato clypeato, & Meliloto 5. Tragi. Est & Clusio planta dicta Onobrychis flore purpureo, subceruleo alia, tertia pallido, montana quarta, ac demum quinta peregrina. Galegam porrō voluit esse quidam Onobrychin. Hanc Cæſalpinus similem Capiagini [Galega] scribit, flore scilicet rubente, Coralli modo, siliquis nigris, longis. Simili modo & alteram, latioribus foliis, flore purpureo. Visa tandem est aliquibus Onobrychis Polygala Tragi, & Onobrychis 4. lutea Dalech. Vltimo sunt, qui Auiiculariam Sylui Onobrychidem vocent.

Nascitur in humidis, Diosc. autore [circa fontes Plin.] & incultis locis.

Ceterū vim habet inquit Diosc. herba tria imposita, tubercula diſfundendi, cum vino verō pota, vniū stillicidium sanat. Cum oleo ultra, indoremouet. Sed hac Plinius: Siccata in ſario modum, & insperſa vino albo, strangurias finit. Alium ſiſtit. Succus eius perunctis cum oleo sudores mouet. Et hæc lib. 24. c. 16. Sed rursus lib. 27. cap. 12. de Onopordi [quod idem Corn. cum Onobrychide facit] viribus non multū diuerſa tradit. Onopordon, inquit, si comederint alino, crepitu reddere dicuntur. Trahit vrinas, & menses. Alium ſiſtit. Suppurationes, & collectiones diſcutit. Hoc autem poſtremum etiam de Onobrychi Diosc. in ſibi adſcriptis dicit. Galego Onobrychis rarefaciendi, ac diſcutiendi vim habet, proindeque ſolia eius, virentis etiamnum, illa ad morem cataplaſmatis, phymata digerunt: arte

facta verō, si cum vino bibantur, ſtranguant. Quin etiam ſudores elicit cum oleo inuncta.

Radix, Caput, Flos, Siliqua, Caulis, Folia, Semen, Fructus, Radix, Caput, Flos, Siliqua, Caulis, Folia, Semen, Fructus. dodrantes, tenues, subhirsuti, ad medium vique foliosi, cetera nudi, spicam gerunt vnus, duarum, aut trium ſerē vnciarum, floribus congestam purpureis Polygali Gesneri, quæ tamen hic in latum diſfunditur per extrema, non autem in metæ formam ſaſſigiat: floribus etiam adhuc non omnino delapſis ſuccreſcunt ſiliquæ, Atracis ſiliquarum quodammodo formā, vnico, aut duobus peltatis orbiculis conſtātes, quodam veluti iſthmo loculos diſterminante, quod si vnicum est conceptaculum, breuem mucronem proſert (id quod etiam in extremo, vbi plura ſunt, obſeruari licet) margine alias æquabili, nec criſtato, vt in Polygalo Gesneri, umbone protuberante propter contentum ſemen, Cracca minori par, nigricans, rotūdumque, niſi quippiam, vncinuli inſtat, inæqualitatem faceret: ſinguli porrō orbiculi præter tunicam ſemen integram, extrinſecus reticulatum habent obductum plexum, circa oras hæreſcentem, alias liberum, ſpinulis mitibus aſperum, radius æſtis, in margines exporrecis: ſolia quædam à

ONOBRICHIS QVIBVSDAM
purpureo flore.

Alis multis concava cubitalem superat longitudinem, ramis teretibus, hirsutis, medulla fungosa factis: folia Lentis, longiora paulo, hirsuta densis, aut duodenis pinnatim uniconstis adnexis conjugationibus, impari vno numeru claudente: flores purpureo-violacei, Trifolii

formam, in spicam sextantalem comosam dispositi, pediculo insident Spithamam longo, hirsuto.

Hanc sic describit Clusius: Cubitales plarumque habet caules, multos [si verusta sit planta] rotundos, duros, humi procumbentes, in quibus frequentia folia. Lenti similia, angusta, hirsuta, seu lanugine quadam obducta, quindena subinde, & totidem alia ex aduerso vni costa haerentia, vno impari extrema alam occupante, gustu amaro, & ingrato: ex alarum cauis oriuntur ramuli similibus foliis septi, ex quibus dodrantes exeunt pediculi, striati, ferentes multos flores, Trifolii florum xmulos, oblongiusculos, eleganti purpura nitentes, inodoros, confertos, & velut spicam trium interdum vnciarum longitudinem xquantem efficientes, nonnunquam etiam longiorem, praesertim quando in semen abeunt, quod bifidis, breuib, turgidiusculisque vasculis continetur, exile, nigrum, durum, sapore ingrato, vt alia legumina: Radix illi magna, longa, dura, in obliquas nonnullas fibras sese spargens, & subinde ad cauliculorum exortus, recentes fibras agens, vitax, & perennis.

Onobrichis prima, flore purpureo Clusio. Onobrichis Clusii prima Tabernam. Onobrichis Pannonica prima Clusii, seu, vt ego dicerem, [ait Pona in Bald.] Cicer Astragaloides.

Mense Iulio Argentun in horto Frid. Meieri florentem obseruavi, sicut & in Pfortzeim in horto Pharmacopaei D. Griesmingeri. Habui & siccam a D. Agerio colorem referuantem. Frequentem inueniebat Clusius ad Danubii ripas supra Posonium apud Petronellam oppidum [quod nonnulli, ex loci situ, ruderibusque antiquis Carnuntum Veterum esse coniciunt, a Plinio numeratum inter Pannoniae vrbes, quodque se modò subditum agnoscit generoso Domino & libero Baroni ad Vnuerzap] ad viarum margines. & frequentissime toto illo itinere ad Badenses thermas tendente, multisque aliis circa urbem Viennam Austriae locis, tam citra, quam ultra Danubium.

ONOBRICHIS QVIBVSDAM. SVB-
caeruleo flore.

Multos ex eadem radice prodebat altera virgineos cauliculos, pedales, nunquam non etiam longiores, humi folios, crebre nodis distinctos, & in his alata folia, hoc est tredecim, quindecim, septem, & decem, aut plurius & oblongis foliis vni costae in hae. entibus constantia, extremo

semper imparem numerum faciente: prodeunt deinde ex alis tenues pediculi, seu virgulae, stesculi, in spicam confertos, ferentes, Pisi, aut Vicie florum formam, sed longe minores, colore dilute caeruleo, vel ex caeruleo purpurascente: his succedebant exiles filiquae quasi duplicatae, continentes pusillum semen, renis formam, nigrum: radix minimi digiti crassitudinem ferme aequabat, dura, lignosa, contorta, oblique se spargens, & alte sub terra se condens. ramisque fibris donata, quae summam parte in aliquot capita extuberabat, & quibus singulis annis novos cauliculos fundebat.

Onobrichis subcaerulea flore, siue Onobrichis secunda Clusio, qualiter & Tabernae vocatur.

Rara est, nam paucas duntaxat plantas inueniebat Clusius publicam via secundum orbitas, inter Schwetzer & Götzstorf infra Viennam Iunio florentes; & non procul a Znaim Moraviae oppido, dum Pragam, & inde per Germaniam proficisceretur. Etiam in hortum translata florebat toto Iulio, & subinde semen perferrebat.

ONOBRICHIS QVIBVSDAM
flore pallido, vel
Polygalon.

Sesquicubitalibus assurgit tertia ramis, rectis, stemis, duris, viridibus, in quibus folia Lentis, siue Vicie siluestris, longa, angusta, duodena, aut quindena, & totidem ex aduerso, eidem costae haerentia, vno etiam, quod extremae costae insidet, impari, lanugine obsita, gustu ingrato & amaro, deinde nonnihil acri: ramuli extremo caule ex alarum sinu prodeuntes, palmares, striati, in dodrantes spicas, stesculorum Trifolii florum xmulantium, oblongiusculorum, pallidorum desinunt, quibus impressi nigricantes quidam radii: his succedunt filiquae, prioris filiquis similes, mucronatae, duobus vasculis constantes, in quibus semen Foenograeco penè simile, sed minus & nigrum: radix crassa, dura, lignosa, longa, aliquot



fibris dantur,
candicans. per-
ennis.

Onobrichis
pallido flore,
vel, ut Tab. O-
nobrichis Clu-
sii tertia. Sunt
autē mihi stir-
pis reliquæ cū
hac. Celseni,
propria manu,
inscriptione:
Polygala lu-
tea v. eo quod
lac pecori au-
get, folia ei quæ
Ruta caprarum
Italorum teret.
Huic Polyga-
li siliquas ap-
pini figuræ
Clusii.

Locus.

Valderara & hinc est, duobus duntaxat locis
Clusio conspecta, ad Hamburgum videlicet vr-
bem, duobus supra Potomum (vulgo Preesburg)
militibus, & ad oppidum Fischmuntz ad Fil-
cham flumen sitam, paullo supra quam in Danu-
bium se exonerat, publicā viā, vade singulares
plantas singulis locis duntaxat eruebat floren-
tes Maio mense.

Tempus.

ASTRAGALVS MONSPESSV- lanus.

Descriptio.

Radix.



Astragalū
vocat
Monspessuli
plantam Secu-
ridacæ minori
similem, diuer-
sam tamē quæ
radice est durā
lignosā, crassi-
tudine digita-
li, & crassiore,
longitudine
cubitali, dute,
intus albā, en-
tus cortex cras-
sus, subfusus,
quæ antequam
ē terra erump-
pat diuiditur
in aliquot por-
tiones, suo ca-
pita, tres, qua-

Coliculi.
Folia.

Flora.

Silique.

tuotue digitos longa, ut nisi quis profundē su-
diat, multas esse plantas existimet: ex quibus
prodeunt coliculi, simplices, concavi, rubentes,
vix palmares, foliolis vestiti brevibus, in mucro-
nem exacutis, pilosis, smarescentibus, crebris,
sic ut ad costam vnā adnexa foliola viginti &
vnā supputantur: in vngularum extremitate
fiores multi, non multum floribus Polygali cel-
seni dissimiles, purpurei, interdum albi, non in
spicem digesti, sed conglomeratis. Tota folio-
rum similes, sed maiores: quibus succedunt sili-
quæ, duræ vncias longæ, incuruæ, rubentes, tere-
tes: Differt à Securidaca minore, foliis primò
quæ mucronata, non obtusa: radice dein crassā

numerosā: floribus denique, qui in Securidaca
& minore, & alterius coloris.

In monte nostra, radicis maxima pars est, ner-
uus cortice detectus, qui euellendo in terra re-
mar sit.

An Rauuolffius hacde planta scribit, cū in
Itinerario suo de pulchra specie Astragali, cir-
ca Hilepum cum paruis foliis Hedy sar proue-
nienti tractat?

An Hist. Lugd. in append. Astragalus foliis
paruis Hedy sar, siue Securidacæ, aut quomodo
quidam pronuntiant Securidacæ?

An Anguillæ Astragalus, quem Diosc. dicit
in Arcadia Memphi prouenire? Verū nulla
Memphis reperitur in Arcadia, sed in Egypto.
Astragalus hodierna Græcia solus est ordine dis-
positus, ut in Cicere, sed minus serratus. Rami hu-
mi sparsi sunt: flores eleganter ex cæruleo &
purpureo mixti. Radicem talo porcino admo-
dum similem idæis facie externā, fibris alioqui
pluteulis stipatam, duramque. In montibus Eu-
ganeis similis prouenit planta, quam semper
hanc ipsam esse sibi persuasit. Sed hanc nostram
eandem esse cum Anguillæ Astragalo nolimus
adstruere.

Mirum, quod Clusius, qui in Hisp. Astragalum
Monspeliensem cum siliquis inflexis, & duplici
serie semen continentibus, subfolum & rotun-
diusculum agnouit, in sua postrema Hist. pro eo
Securidacæ minoris seponem posuerit: discrimen
poterat ex tenui radice, in iconem quam exhibet
colligere. In Astragalo enim radix crassa.

Eodem errore lapsi sunt Lob. & Pena, qui non
animadvertunt Securidacæ minorem diuer-
sam esse ab Astragalo Monspeliensem. Ita si qui-
dem legitur in Advers. Securidacæ minor, Astra-
galus Monspeliensis. Legumen floribus pur-
pureis, semen subrotundum, subfolum est simi-
lius Galegæ, vel Araci, quàm Securidacæ.

Idcirco præceptores nostri Monspelienses huius
speciem esse inficiabantur. Astragalo propiorem
astruebant, quod nos etiam retere odam duxisse-
mus, nisi Raphani radix, & adstrictorix, ceteræ-
que facultates decessent. Quare nulla stirps, quæ
explenda descriptioni satis sit, vsipiam sese dat.
Non ea quam in collibus Lugdunensibus prope
Trenn. & in horto Patavino. Radix certè dissua-
det: nam Senensi licuit pictoris operā nobis illu-
dere, idēd nunc illum illius picture postremo pu-
duit. Et Obs. Astragaloides Herbariorum. Astra-
galus forte Matthioli, vel iam demum Polygala
eiusdem circa vibeculam Trenn. Lugdunensis

Gallia cum Valerando Dourez, & nonnullis aliis
peritis herbarum exploratoribus diximus. Cau-
liculos spithameos, & pedales erigit. Folia Cice-
ris, aut Galegæ, sed minora: flosculi ex pallido pu-
nicant, aspectu iucundi. Radix crassitie digitum
æquat. Item Ic. pl. Astragalus fortè Matthioli, vel
iam demum Polygala eius. Merito igitur præ-
ceptores Monspelienses Securidacæ minorem
negabant, quæ multum, ut iam ostensum, ab hac
differt, quod non animaduertit Lobelius, qui pro
Astragalo Securidacæ minoris Dodonæi figuram
ponit, ac Astragalum Monspeliensem dicitur.

Semen huius Astragali, teste Clusio, rotundiuseu-
lum, Securidacæ verò minoris simile est Securi-
dacæ & quadratum. Figura quoque mala, nec pla-
cet, quod separet Lugdunensem Monspessula-
no, nec etiam, quod suspicetur Matthioli Poly-
galam, à qua non parum abest. Nec tandem
astimarim cum Astragalo Matthioli conue-
nere.

Polygala. Securidaca recurva siliqua (inquit Cam. in Hist. germ. Matth.) reuocant in memoriam partem herbam à Gesnero depictam, & Polygalam dictam: fortè est Polygala auctoris depicta in suis lat.com. quamuis ex figura eius nihil certi concludi possit. Idem in Epit. Polygalam vocat. Sed audiat Camerarius de his certiora scientem. Figura ex Gesnero posita, facta est ad plantam Montspelianam olim à me ei missam, quæ adhuc penes me est nomine Astragali Montspeliensis: nunquam aminaduerti Gesnerum fecisse Polygalam, antequam autem ille curauit pingendam plantam, de qua hoc in loco agimus, habebat Polygalam foliis nonnihil similem & floribus, sed siliquis longè diuersam. Verùm, quum teste Camer. ex figura Matthioli non possit concludi, quæ eius Polygala fuerit, quis approbabit eum in Epit. pro Matth. Polygala exhibere plantam de qua verba facimus, non parum tamen ab ea differentem.

Matth. & Camer. la. Montsp. Polygalon Matthioli, quod Hist. Lugd. placet, siue Astragaloides Lobelii, aut Anthyllis clauiculata, radicem edit nigram, lignosam, fibratam, dimidium pedem longam, supernè in multa veluti caulium principia diuisam, crassiuscula, laminulis corticosa, ex quibus folia multa exeunt, humi strata, longa, ex foliolis composita, Lente similibus, vtrinque ordine ex aduerso digestis. Flores in cacumine nudarum virgularum emicant, oblongi, lutei: deinde siliquæ Lenti similes, nigre, ex quarum vertice tenuis villus exoritur, capreolo clauiculæque similis. Suspico Anthyllidem Dalechampii non diuersam à nostro Astragalo, quamuis quædam videantur mindis conuenire, nempe color floris, qui fortè visus in planta sicca, cum multi flores exsiccati, lutei videantur. Capreoli, qui traduntur & depinguntur sunt fortè in Astragalo, vbi flos excidit, & tunc siliquæ mindis curuæ: de hisce tamen indicent Lectores.

T. d. m. m. Camer. An Casalp. Astragalos humi strata, similis Helenio Egyptio [de quo antè inter Vicias] foliis numerosioribus, tenuioribusque: floribus similiter sanguineis racematim in summis ramulis, siliquis autem corniculis similibus, rubentibus: radice crassa, æ lignosa, supernè in multos ramos inuicem diuisa, vnde germina erumpant?

Figura à Compilatore Tab. [titulo Polygalæ Matthioli 4. creutzblum posita,] multa habet similia cum Astragaloide herbariorum Lobelii, variata tamen est, & fortè confusa, vt dictum, cum Polygala Matthioli, & altera, quæ vulgaris dicitur, siue Tragi.

Cam. & Lob. Cæterum, quam Polygalam censuit Matth. [inquit C. Bauh. apud eundem] eandem Lugd. & Tab. sub ipsius nomine posuere. Verùm Castori Astragalus dicitur, Lob. Astragaloides herbariorum. Secundò, Astragalus Alpinus à Cam. in locum Polygalæ Matth. substituitur. Astragali Montspeliensis nomine à Clusio proponi videtur, & in Hist. Lugd. Astragalus purpureus vocatur. Dispicet nobis icon Tab. falsa, à Fratre pro Polygala Matthioli posita, à qua multum differt. Lobelii Astragaloides mihi idem videtur cum Astragalo Alpino proposito à Fratre. Astragalus insuper ei dictus Alpinus, quem secundo loco, suo Matth. appingit, est ex meis plantis siccis, vt antè dictum. Astragalum autem purpureum Hist. Lugd. alium puto.

Tempus. Crescit secus vias in iunere Narbonam versus, prope Gigis vno à Mospelio miliar: quo loco florentem vidi mense Aprili. Visus mihi Bononia Tom. II.

quoque in monte: item inter Cascul & montem Gibbi, vnde accersitur Petroleum. Gener Cherlerus attulit flore albo collectam Nemaui.

ASTRAGALVS QVIDAM MONTANVS, vel Onobrichis alij



Folia **M** Vltæ folia promit ab eadem radice, Lenticulæ, aut Tragacathæ foliis proxima, vni similiter conste inharcentia, molliora tamē, viridia quidem illa, sed lanugine quadam radicante pubescentia, lento primùm gustu, deinde nonnullam amaritudinem relinquentes, postremo linguam vellit: nascuntur inter foliorum

Fl. *Stem.* *Radic.* *Onobrichis* alas canticuli, serè dodrantales, supini, exiles, quadam lanugine obdusi, aliquot flosculis ornati, Viciæ silv. aut Lenticulæ florum magnitudine, colore ex caeruleo purpurascens: quos excipiunt siliquæ pusillæ, geminis cellulis constantes, semine (quod cum adhuc maturum non esset, probè non potui obseruare) plenæ: multas ex eadem radice, quæ longa, crassiusculaque est, & obliquas fibras agit, propagines, & ramulos dodrantales, humi tufo, in latera emittentes.

Astragalum hunc quorundam montanum, Clusius Onobrichidem quartam numerat, quam si quis non inter Onobrichides, sed inter Astragalos referre malit, Astragalus est ipsi Alpinus: Onobrichis est Tab. Clusii 4.

Locus & Tempus. Crescit in summo Eneberg iugo, atque in Etseri summis scopulis, quibus duobus locis florentem, & siliquas iam formantem Augusto Clusius eruebat.

ASTRAGALVS MONSPELIANO CANDIDIOR, & Onobrichis quorundam.



Dist. *Folia* **A** Stragalus hic multa cum Monspeulano habet communia, quo tamē differt: folia multo candidiora, interdum longiora & maiora: piluli longiores: caules non multum maiores: quibus insident flores multi putpurei, si benememini multo plures, quam in Astragalo Mosp.

Fl.

HISTORIAE PLANTARVM.

peffulano, conglomerati, densâ pilorum lanugine hirsuti.

Def. Cl.

Folia.

Cauliculi.
Flosculi.

Radix.

Astragalus
purpureus.
Locus.

Similis, si non hæc ipsa planta videtur ita describi à Clusio: Hispani aliam [supple plantam] proponebant, Astragali facultatibus quidem respondentem: sed formâ radicis minimè. Nam tamethi folia Ciceris, aut Lentis, pusilla habeat tota canentia: cauliculos breues, duos, & in his flosculos Pisi formâ, pusillos, congestos, & purpureos, summis pediculis inhzentes: radix tamen magna ex parte singularis, & nihil commune cum Astragalo habens, omnino repugnat.

Hist. Lugd. Astragalum purpureum Herbariorum quorundam esse tradit, qui in lura montium saxosis collibus proueniat, radice grandi: foliis Ciceris siluestribus, villosis, gustu adstringentibus: flore ex albo purpurascens. An Lob. & Penz Adu. Astragali perlimilis pusilla planta palmaris, quam, dum in collibus quibudâ callo-Prouincie essent, sublegerunt, elegantia nequâ spectatu indigna: radicibus namque proripit lignosis, implexis, corticosis, denso exortu numerosos producentibus cauliculos, fruticantes, duos, sed breues, vix binas, aut ternas uncias excedentes, & foliola emittentes pusilla Lentis, Astragali, aut potius Tragacanthæ, quam tota refert rigidiuscula incana hirsutia: flosculis luteolis, aut albidis, Ornithopodii, gustu præfeco & æquè duro. Onobrichis quorundam. Sed Plac. Onobrichin etiam esse censebat, discrepat tamen historia. Lusitani Herua de S. Lorenzo nuncupabant.

Tempus
Locus

visus.

Genex collegi in monte Saleue florentem mense Iuno. Crescit etiam vt Clus. testatus est, in vinetorum, & agrorum marginibus secus vias per Lusitaniam & hispaniam, floret Aprili.

Siccata huius in cibano puluerem vulneribus & viceribus vtiliter inspergi assuerare quosdam legitur apud eundem Clusium.

ASTRAGALVS SYRIACVS.



Astragalus Syriacus à Lob. Obs. ita vocatus & descriptus, perelegans est, & rarior leguminosa planta, Astragali generica certe habenda: quippe saliorum & cauliculorum similitudine, & implexu radicem protrepantium Astragalon refert. Sed sturnum denso exortu congestorum decore, effugio,

elegantia, magnitudine & rubore ornatur, amoenissimo.

Hanc exhibent Ic. Pl. eodem nomine, quem admodum & Hist. Lugd. quæ & descriptionem Obs. proponit. Astragalum Syriacum, Syriacum Citeri Tabern. vocat.

Astragalus
Syriacus.

An Clus. Pannon. Onobrichis peregrina, rariâ planta, quam Londini vidit in Io. Richi phar-

macopari regii horto, cuius folia mollia, incana lanugine pubescentia, vt Tragacanthæ legitimæ folia, & eodem modo costæ inhzentia, quindena & plura, interdum etiam vicena quina, vno extremam costam occupante: cauliculi tamen in hac oblongiores sunt, fusco cortice testati, lenti, fractu continuaces, humi fusi, & plerumque nudi, qui extrema parte frequentes ramulos luis alatis foliis onustos proferunt, & in vnciali, villosoque pediculo multos flosculos in caput, & globum congestos, Tragacanthæ floribus proximis, candicantes, deinde membranaceas siliquas, Erui siliquulis minores, & Dorycnii vulgariter nuncupati, siue Hispanici, valvulis pares, singularia semina Fænogæco similia continentes. Si quis verò hanc etiam non inter Onobrichides, sed inter Astragali congeneres plantas, cum quibus magnam similitudinem habere videtur, referre malit, Astragalus peregrinus esto.

Alepo Syriæ suam plantam Lob. primum habuit, postea in viceis pensilibus D. Brancionis Melchliniz Italo semine enatam scit. Clusii florebat Iulio & Augusti initio, quæ flores & semen, semine Londino misso: protulit.

Locus

Tempus

ASTRAGALVS FORTE LANUGINOSUS, Boticus.

CAP. XXX.



Cvbitales, Caut am- phlores sunt huic Astragalo caules, minimè serâ digiti crassitudinem æquantes, pentagoni, lue angulosi, duri, subrubentes, & lanuginosi: folia lanuginosa, & incana, in longa costa ex aduerso semper inter se opposita, veluti in Vicia & Ciceris foliis, gustu primum adstringente, de-

Caulis

Folia

Floris

Fructus

inde seruido, flores copiosi, Lupini, aut Fabæ vulgaris florum æmuli, secundum oblongos ramulos, seu virgas ex alarum situ prodeuntes nascuntur, serie quadam digesti, albidis omnino, sed antè quàm aperiantur, & explicentur, ex luteo foris nigricantes: fructum ferre dicitur (nam florentem duntaxat obseruabam, ait Clus.) in lobis, qui gustatus, fauces, os, & linguam inflammatione torqueat: radix pro stirpis magnitudine amplissima, brachialis nonnunquam crassitudinis, palmaris verò longitudinis, deinde in binos, aut tres ramos diuisa, foris nigra, rugosa, intus candida, dura & lignosa, ingrati saporis, quæ a ressecta, cornu duritie superat. Ceterum Astragali nomine, licet multæ plantæ hodie insigniantur, nulla tamen meo iudicio, ad Dioscoridis descriptionem propius accedere videtur, quàm hæc quam Lusitani Alfabea vocant, Botici autem

Garavancilla

Cicer exile. Geranacillos, hoc est, Cicer exile. Si facultates
etiam, quas ex eius temperamento contrarias
deprehendere licet, non refragarentur, legitimum
Astragalum esse confirmarem, cum cuius historia
plurimis notis convenit. Videtur porro ea esse,
quam Amatus, Apocynon facit, & Lusitanis *A-*
tramocis decan, id est, Lupinos caninos vocari ait.

Locus. Primum hanc plantam collibus quibusdam supra Vlyssipponem, quos Tagus fluvius alluit, inter vepres observabam, atque mense Decembris erucbam anno 1564. deinde sub exitum Ianuarii insequentis, siluosis locis non procul Hispali, dum Gades proficiscerer, florentem inueniebam. Phaseoli novum genus in epistolis Hononii Belli respondet Bortico Astragalo. Nobis autem hanc opinionem non placere, indicabimus sub sequenti Ponæ Phaseoli genere novo.

Astragalus L. *Obs.* & *l.* *Pl.* *Astragalus Lusitanicus*
Clusii cognominatur, ut & *Tabernæ*, qui insu-
per *Flein* *Spanische* *cicern* vocat, & *Alphab-*
etam. *Astragalus* fortè *Clusii* *Hist. Lugd.*

PHASEOLI NOVVM GENVS
foliis Lentisci.

С а р. XXXI.

Nona prorsus & elegantissima etiam hæc est
 planta (inquit Honor. Bellus in epist. ad
 Clul. ex Cretæ Cydonia) quæ apud me nondum
 nomen inuenit, sed interim ob similitudinem
 quandam seminis, quam cum Phascolis habet.
 Phascoli nouum genus vocare mihi liceat. Ad
 sesquicubitalem assurgit altitudinem, modò sim-
 plici caule, modò pluribus stolonibus ab vna ra-
 dice prodeuntibus, digiti minimi crassitudine: sili-
 illi pinnata, h. e. longo pediculo utrinque hæren-
 tia, semper contrariis petiolis, Lentisci æmula, sed
 mucrone obtuso, vt Securidacæ folia: à foliorum
 cauis, siliquas scet rotundas, pollicari crassitudine,
 tumentes, & multo aëre plenas, colore rubras, in
 quibus continentur sex, aut octo semina ad lute-
 um tendentia, compressa, Phascoli figura: quos
 flores proferat, compertum mihi non est: nam
 eam spontè nascentem in Spagia insula aduersus
 Matonem Peloponensi sita, sequentissimam in-
 ueni anno 1592. dum Venetias petebam, mense
 Aprili, quo tempore siliquæ ad maturitatem non-
 dum peruenerant: à nautis grana cruda libentis-
 simè edebantur, græcèque *Lupinos siluestres* vo-
 cabant, licet nihil cum Lupinis commune habe-
 ant: huius plantæ semina his diebus ex eadem
 insula ab amico accepi, quem, vt colligeret, roga-
 veram: nam insula habitatoribus caret, & non
 nisi aduersis ventis à triremibus petitur, & à pi-
 ratas: eam ob causam semina citius habere non
 potui.

Sed ad hæc Honorii Belli scripta, Clusius sequentia tradit: Valde respondet hæc planta [nam ea etiam semine misso mihi nata, anno 1597.] Botânico Astragalo, quem inter Hispanicæ plantas descripsi, ac quantum quidem ex eius facie conicere licet, superiorem Hiemem in horto pertulit, & nouo Vere denud germinauit, nullum tamen floris specimen adhuc dedit: nescio an proximo anno (si per Hiemem conseruare potero, perenni enim est radice) dabit. Ego quidem haud possum mihi persuadere Phaseolum exoticum Belli eundem cum Clusii Astragalo: descripuo- nes namque & vires nimium dissident.

Phas. peregrinos, vt fortè eiusdem generis, Co
Tom. II

ral arbor posset commodè sequi, si non iam collocata esset antè inter arbores siliquosas, quò etiam possent referri Fabæ aliz & Phasioli Americani.

ASTRAGALVS DIOſCORIDIS
quibusdam.



A Stragalo Dioscori-
dis apprimè si-
milis plantu-
la (inquit Rau-
vvolf) humilis:
radice longâ,
purpureâ, ad
Raphani cras-
sitiem, longitu-
dinemque ac-
cedente, ma-
iusculis fibris
donatâ, quæ
vel ipsâ radice
citius nigres-
cunt atque in-
durantur: Ha-
rum aliz deor-
sum vergunt,
sursum aliz,
curvitate cor-

nata, sapore dulci cum modica siccitate. *Coliculus*
erigit aliquot, vix digitatos, radici concolores, *Folia*
terrani versus reflexos, quibus adhaerent no-
uem, aut decem foliola Lentis, aut Orobi, Inter *Flores*
quæ flores emergunt violacei: quos sequuntur
vericuli tumidi, quorum aliqui Coluteæ ferè æ-
quales.

GLAVX HISPANICA.
CAP. XXXII.



Ternis, aut
quaternis
à radice assur- *Cauliculis.*
git *cauliculis*,
dodrantem al-
tis, gracilibus,
incanâ lanugi-
ne pubescenti-
bus: *foliis* serie *Folia:*
quadam secun-
dum costæ lon-
gitudinem v-
trinque dige-
stis, siue ala fo-
liorum illos
vestiente, O-
nobrichidis,
aut Astragal?
prioris [Ono-
brichidis qui-
busdam flore
purpureo] in
superne virenti.
Ff 2

Flor.

Rutia.

Glauc.

bus, infernè canâ lanugine obfita, gustu nonnihil amaro: flor. extremo cauliculorum fastigio innascitur confertus, capituli, spicarue breuioris & obtuse instar, Glycyrrhizæ vulgaris florum formâ, & colore perquam similis: radix candicans est, & exilis, quæ, an viuax sit, asserere nequeo.

Græcis *glauz*, perinde atque Latinis appellatur hæc planta: quæ appellatio, si quibusdam minus probabitur, permittant quæso Glaucem Hispanicam à Clusio (cuius & descriptio proponitur) tantisper nuncupari, donec magis aptum nomen inuenerit. Nullâ adhuc inter eas (ait idem in Hisp.) quæ Glaucis nomine à recentioribus describuntur, magis ad amissum Diosc. descriptioni respondentem inueni. Ceterum Glaucem Diosc. Clusii, Lobelius Obl. ne sibi quidem inspectione notam fatetur. Glauc Clusii Schiele Fraus / Tabernæ. Antillis altera Lenti similis Dod.

Glauc Hisp.
panica aut
dila.
Locus.

tempus.

Cur autem Glauc Hispanica dicatur, ratio redditur, quia nusquam alibi, quàm ad ripas fluminis Thormis Salmaticam alluentis, pauidè infra eam urbem à Clusio obseruabatur, nomine vulgari carens, mense Iunio: verùm is locus procul à mari distat iuxta quod Dioscorides glaucem nasci tradit.

ONOBRYCHIS CÆSALP. FLORE
rubente, Corallii modo, similis Gale-
gæ: Et alia flore purpureo la-
tioribus foliis.


Locus.
Flor.
Sæpè.

Onobrychis similis Capragini, breuior, in montibus riguis nascitur: flore rubente, Corallii modo: siliquas nigras fert, longas, vt Vicia. Altera latioribus foliis constat, rarioribusque, flore purpureo: siliquis similibus. Dioscorides folia ei tribuit Lentis, longiora paulò *æulem* dodrantalem: *florem* puniceum: radicem parua: in vliginosis & incultis. Plinius circa fontes eodem modo describit.

GALEGA.

CAP. XXXIII.

Hinc inde per terram spargit tenues radices albas: caules verò tollit bicubitales & altiores, striatos, inanes, ramis complutibus brachiatis: folia Viciz, pinnata, impari alam claudente, longiora, spinulam mollem ex extremitate proferentia, sapore leguminaceo: flores peculiaribus insident



Flor.

surculis, ex foliorum alis exortis, Viciz florida, subam longam efficiens, colore albo, vel ex al-

violaceo: siliqua teretes, tenues, oblongæ, in siliqua quibus semen.

Corn. non satis constare dicit, quænam hæc sit Onobrychis, & Ruta silv. speciebus Herbariorum quosdam annumerare scribit.

Dod. gall. Fænugræcum à quibusdam siluestre dictum, aliis verò Glaucem aut Polygalam vocatam, nullam cum Galega similitudinem habere scribit. Sed hanc Italos Galegæm, & Rutam caprariam, nonnullos etiam corruptè Gralegam nominare assentit.

Hier. Fracastorio *Herba galica* vocatur. Hericis *Lauanese*.

Gesnerius ait dici in Italia *Castanea Lauana*, *Thorina*, vel *Taurina*, *Martanica*, *Sarracena*, *Capragina*. *Herbanesa*. Fænugræcum siluestre, & teste Brassauolo, *Gargæ*.

Quidam Onobrychim Veteribus nuncupatam esse indicant, alii Glaucem, nonnulli Polemonium esse volunt, ali Polygalon, sed non tam Matth. quàm Dioscoridis singularum descriptiones repugnant. Gesnero qui cum Lob. Obl. Galegam vocat, (quasi Gallicæ) appellatur Ruta Capraria Italicorum: nam & *Regallicum*, & *Galenii herba* quibusdam dicitur, vel Galega, aliis Taurina, & Martanica, ab aliis herba Necla, vel Fænugræcum silv.

Cardanus eius meminit, sicut & Monachi in Mesqui in Italia [autore Manardo] à quibusdam Gyrcam vocari scribunt. Brassauola Gargam, & fortè eadem fuerit, quam Marc. Empir. Cicharbam vocat, miscens aliis quibusdam medicamentis ad caput pruriginosum & vlcerosum. Martanica verò an fortè à Marte dicitur? Nunc teste Agricola Rutam agrestem, vel Caprariam, nonnulli Polemoniam Dioscoridis vocant, cuius sententiæ est Leoniceus & Manardus. Alii tamen hanc herbam Sarracenicam censuerunt appellandam. Sed ridiculum est. Rutam caprariam, seu Galegam, quam nonnulli Onobrychim credunt, pro Polemonia ostendere. Et cum videant illi boni viri hanc nusquam in montibus, asperisque inueniri, vt de Polemonia docet Dioscorides, sed pinguibus locis atque humidis: inquit hanc mirum non esse, quandoquidem plantæ variis locis nasci consueverunt, quod & nos admitteremus cum Maranthæ si vel vnam ex aliis notis coherere videremus.

Non facile adducor [ait Matth.] vt credam, quæmadmodum censet Brassauolus, eam esse Polemoniam, quam nostrum Hetruriz vulgus appellat *Lauanese*: alii verò Galegam, alii Rutam Caprariam nominant, & Ruellius Herbam Glaucem, quidam verò *Lauanensi*, quod propè riuos aquarum nascatur, vbi manus lauantes Rustici, hac planta saponis vice sibi sordium lutum abstergunt: sed Glaucis faciem nō repræsentat: Ruellius hallucinatus.

Caprago [autore Cæsalp.] vulgò appellatur, alibi Galega, in Hetruria *Auane*: flores habet cæruleos, vel purpureos: siliquas nigras, Viciz breuiiores. Ruta Capraria, & Galega Italicorum, quorundam Lauanese. Hist. Lugd. Fænugræcum silv. Griffranth / Fleckenfraut / Tabern. Galega vulgaris, quam nonnulli Rutam Caprariam, Fracastor. Onobrychin, Clusii in Pannon. Galega Pannæ & Camer. cui & Ruta capraria.

In vliginosis locis, scrobium aggeribus, in montibus, & denique passim prouenit, teste Matthiolo. Cæsalp. frequentem asserit in aruis frugiferis florere æstate, perfici Autumno. In Pannonia omniū abundantissimam vidit inter Mu-

Onobrychis
Ruta silv.
Fænugræcum
Glauc.
Polygala
Ruta capraria
Gralegæ
Herba galica

Polemonia.

Regallicum
Galenii herba
Taurina
Herba Necla

Gargæ
Gargæ
Cicharbæ

Polemonia.

Herba Sarracenicæ
Polemonia
non est.

Lauanensi.

Caprago.

Locus & tempus.

nam & Draconem flumina, paullo supra eorum confluentes. Ceterum per me lata in horto E.C. Monbelgardi primo anno caules protulit, & per Hiemem multis duravit annis. Semen maturum obseruavi Septembri. Spontaneam reperi in Italia inter Patavium, & Vincentiam, & inter hanc, & Villanouam, & circa fossas vrbis Patavinae, in montibus Euganeis Februario germina prorudentem, inter Veronam & Castellam, inter Ferrariam & Bononiam: Genuae habebam in horto Ianuario virentem: vidi in hortis, Tiguri D. Gesneri, Tubingae D. Fuchsi, Bernae in pluribus, Basileae D. Felici Plater, & Fratri C. Bauhini.

Succus herbae Foenugraeci silu. datus à Bayro, in cochleari, liberabat pueros ab Epilepsia, expellebat vermes, quod postremum etiam ipsa bullita in patella herba cum oleo & semine Lini super umbilicum ligata praestabat. Hanc magnifaciunt (pergit Mich.) nonnulli suis experimentis non in modo aduersus pestilentiam, & lethalia medicamenta: verum etiam contra ferarum omnium quae dentibus, aut aculeo venenum emittunt, tum morsus, tum ictus in quem usum herbam eius succum hidendum praebent, ac etiam emplastri modo vulneris partibus imponunt. Laudant aliqui succum, sesquialtera pondere, haustum pueris comitiali morbo vexatis. Succo & semine Camer. vermes quoque necat. Decoctum in aceto paratum cum Theriaca, & Tormetilla ac Cardobenedicto, teste Ingrassia plurimum valet in peste, & febribus malignis cum petechiis. Quorum omnium quoque testis est Dodonaeus qui contra venena assumpta eandem laudat. Casalpino tandem autore, Galega succo timentes ob venenum boues sanant, infuso in os. Quidam aquam distillatam in peste exhibent.

GALEGA MONTANA DALE- champii.



Cvitalis planta est Galega Dalechampii, montana dicta, caule striato, ex quo per ex intervallo orti pediculi, longitudinis mediocri quinas, senalve annexo denso agmine sustinent foliorum coniugationes, quae Galegae vulgo notae folius, quam simillima: flores in peculiari

appendice spicam emulantur, colore praedito luteo pallidente, figura florum Genistae quoque: radix tubest multiplex, tuberosa, & longissimis fibris donata: siliquae, quas mihi obseruare non licuit, testatur Dalechampius esse nigras, seminibus plenas Lenticulae similibus.

Galega montana Dalechampii Hist. Lugd. & Ponz in Baldo.

Inuenimus nos in monte excelsio & nigro, Tom. II.

qui Thucidi dicunt, quare essemus Genuae. Nascitur haec in asperis (ita legitur in Lugd.) montibus, non in eorum quidem salubris, aut praecipitiis, sed in ipsis culminibus, si qua vda planities illis occurrat.

Efficacem [apud Lugd. Hist.] esse aiunt contra venena, lumbricos, morbum caducum & pestem, non minus, quam Galegam alteram. Sed vereor ne haec imaginariè scribantur, & non per experientiam: quam ob causam nulli consuluerim temere ea utendum. Dolemus nos, quum viridem haberemus non diligenter à nobis descriptam, ac saporem annotatum, quem debuerat obseruasse, qui vires adscripsit. An maduerant alii.

Vires & vias.

GALEGA NEMORENSIS verba.



Vires minus Galega siluatica, pedem altos habet caules, cum incipit fl. rere, foliaque satis angusta, & mollia, postea maiores, angulosos, ex radicibus multiplicibus, fibrosis, nigris, perennibus, numerosos surgentes: in quibus folia ex duabus, tribusve coniugationibus composita, quorum sin-

Tempus Cautel.

Folia.

Florae.

Siliquae.

Semina.

Orobanchae.

Astragalus aphaca. Hist. Lugd. non. Phasolus siluaticus.

gularia Parietariae foliis paria, vnciam, aut fescunciam lata, vncias circiter tres longa, in longum mucronem desinentia, tribus secundum longitudinem decurrentibus costis, bina quoque foliola caulem, foliorumque pediculos amplectuntur veluti pinnae: flores in longo pedicelo veluti spicam, sex, vel septem, aut octo, quales legumibus, purpurei primum, postmodum caerulei, quos siliquae excipiunt. vncias duas longae, nigrae, in quibus semina rotunda, exigua, interdum vero oblongiuscula, amaricantia. Radix quotannis iterum pullulat.

Camer. inter figuras in sine horti, Orobanchae siluaticus vernus, sicut & Thalictrum in Hae. qui praeterea vocat, Orobancham Cyssophyllum. Georg. Amilii Theologiae doctor, contendebat Astragalum speciem esse, vocabatque Astragalum siluaticum vernum. Laurent. Hier. Aphacem speciem ex aliorum sententia faciebat, Aphacem siluaticam nominans.

Hist. Lugd. [cuius figura non placet] Phasolus siluaticus, & Phasoli tertium genus dicitur, quod Dalech. in siluis comperit.

Galenum aiunt Lob. & Pena Ad. Phaselum à Dolichone discernere, Pliniumque videri eum inuisse, & Maronem per Phaselum. Ea verò, quae dixerint, de Phasolo potius accipienda, quam de Phasolo. Idem videri Columellam intelligere. Sibi verò videtur Phasolum esse, quod da n

ff. 3

huius operis extremo. Phaselum à Phasiolo diuersum. Plinio, Maroni, Columella, Dioscoridi

Clusii Pan. est Orobus Pannonicus, purpureus, primus. Idem in fol. ait: Erui, siue Orobi nomen apud rei herbariae studiosos obtinuit Orobus Pannonicus. Folia ei sena, octona, aut plura, vni costae adnata: semen intermedium, rotundum & exiguum, nonnunquam verò oblongiusculum. varium: radix per intervalla extuberans. Tota planta calidiuscula est.

Pona in Baldo, Orobum i. pann. Clusii vocat.

Schvv. in cat. Sil. Orobum silu. vernum. A-rachum lausolium Dod. wald cruen waldm-
Locus & tempus

Inueni Genes in colle la Bassie sub arboribus florentem mense Aprili & Maio. Item Montbelgardi inter arbuta. Obseruati & Bononiæ, ubi Orobum vocat. Copiosè nascitur, autore Clusio, in montana illa silua Leitenberg supra Manderstorf similiter supra Medeling & omnibus montanis illis siluis quadam serie productis à Danubio ad Alpes: variis item Pannoniae locis. Floret Aprili, atque etiam Maio: semen autem profert Iunio.

Semen amaricat (inquit Schvv.) & calidiusculum est, & absterforia facultatis.

GALEGÆ NEMORENSI VERNÆ valde similis, si non eadem.

Radix.



Radix colore fortis est fusco, intus pallido, multas nodosas fibras, duras, longas, implicatas habens, in quorum medio, finibus, & extremo inueniuntur veluti bulbi conerescences, quibus radix se propagat: Inueniuntur etiam aliquando [Mai mensis sine inueni, inquit Colum.] quædam carnosa, crassa, purpurascens,

succosa, dura, leuia, vt *ὀψιζαλας*, dici possent, nec aliud quicquam representare videntur: quæ tamen se non explicant, sed ita abundant superflud. Caules tres, quatuorue emittit tenues, quadratos, Ciceri similes, parum à terra se attollentes: inque ipsam inclinatos, ex quibus per intervalla, vt in Cicere, posita sunt folia, pedicellis herentia, primò bina, dein quaterna, bina ex opposito, postea quina, postremò terna ex opposito intercurrentia, formà ad Rusci folia accedentia, maiora verò, duplo longiora, teneriora, & leuia, ad nouella Hederæ folia accedentia: pedicelli autem, quibus insunt, in imo ubi cauli hærere, singuli aurículas habet, vt in Cicere & similibus leguminosis visitur: aurículas bina illa folia in pedicello, & caulis geniculo hærere intelligi-

go: in summo verò veluti aculeum, sed mollior. Inter foliorum verò petiolorum & caulem, viticulae exeunt dodrantem longæ, in terram nutantes, ex quorum medio ad summum vsque viginti ferè insunt flores, primùm coaceruati, deinde Vicie modo dispositi, formâ & colore eidem similes: sunt enim purpurei exteri, in medio cærulei, interius verò lutei, colore vario ornati. quibus hiantibus, ex illorum vasculis exeunt siliquæ tenues, quatuor digitos longæ, primùm virides, liccatæ verò rufescentes, vt etiam semen, in terram deuteræ, seminibus refertæ, formâ, vt dixi, *ἀγχαλιδίον*. Radix dura est, difficilè que tundi, vel rumpi potest etiam liccata: sapore adstringente, gustu verò saturo, odore terreo, veluti fungi.

Ceterum Columna plantam hanc à se longis, vt vides verborum ambagibus depictam *ΑΨΑΓΑΛΟΝ* (Astragalum) Diosc. Plin. & Galeni (vt quæ eorum delineationi respondere videatur) proclamare non veretur. An verò eius Astragalus idem sit cum Galega vernâ valde dubito: maior namque numerus florum quàm vnquam obseruatur: in solis præterea non depinguntur, nec describuntur nerui, ad plantaginem accedentes; adde, Clusium quoque diuersum facere.

Astragalus secundus à Clusio siue Alpinus inscribitur, cuius iudicio nulla planta ad Dioscoridis descriptionem propius accedere videtur quàm quam in Cantabris, Heluetiorum alpibus, atque etiam Pannonicis obseruabat, ramulis aliquot ex vna radice prodeuntibus, gracilibus, interdum surrectis, vt plurimum autem procumbentibus, foliis Ciceris foliorum instar, in alio ordine dispositis, sed rarioribus & longioribus, nec in ambitu serratis, sed valde accedentibus, ad Orobi primi (Galegæ nemorensis vernæ) folia: flore Vicie, aut Ciceris flori simili, ex cæruleo purpurascens, cui succedunt lobi Arachi sitiquis ferè pares, in quibus semen continetur: radix est tuberosa, nigra, dura, cui propagines adnascuntur sarmentosis radiculis in hærentes, illi similes, sed minores. Sed miror Clusium non posuisse huius Astragali descriptionem capite de Orobo pannonico [Galegæ vernæ purpureæ nemorensis] cum quo tanta similitudo: quæ opteoro similitudo Astragalo Columnæ cum Cicere, verè ne Clusius minùs benè interpretatus sit, suum Astragalum Alpinum, siue Hist. Hisp. secundum, quem eum esse existimat, quem Fab. Colum. hoc in loco, præ legitimo Dioscoridis Astragalo, exhibet: multum differentem à Chamæbalano, seu Glan-dibus terrestribus.

In montibus (inquit Column.) vallibus, locis vmbrosis, & Sole illustratis ventosis oritur, hic vbique. Floret Maio, & Iunio mense perficitur. Nascitur, ait Clus. in montibus, quos dixi, vento perflatis, & aperuis.

GALEGÆ NEMORENSI VERNÆ SIMILIS FLO- re albo.

Pro Orobo Pannonico Clusii albo 2. colle-
Ro in montibus Tyrolensibus plantam dedit nobis D. Nicolaus Agerius, cuius silia similis Galegæ vernæ, in quibus discrimen manifestum, quod non trineruia secundum pediculorum principium, nullæ pinnae: fere mihi videntur minores: id notandum in ea planta, quæ vnica fuit, caulem in suprema parte diuisum fuisse, in foliorum

GALEGA N. MORENSI VERNÆ SIM-
lis multiflora, flore purpureo, & albo.

foliorum, & in alium longum pediculum, in cuius suprema parte erant plures flores, iuxta diuersionem verò siliqua, provenire incipientes.

Clusius autem suum Orobum ita describit: Aliquot ab una radice prodeunt caules cubitales, striati, recti, folia alternatim proferentes pennata, quaternis foliis sa-

tis amplis, & mucronatis constantia [quibus adnascitur aliquando in extrema ala quintum] viridibus, per quæ aliquot venæ transversim à medio nervo excurrunt, subacidi quidem initio gustus, sed postea amariuli: flores ex alarum sinu brev petiolo insidentes prodeunt quini, aut seni, antrorsum spectantes, Vicæ floribus non dissimiles, albo colore præditi, qui in binis foliolis sursum reflexis pallefcit, odoris expertes: lobi, quales in primo genere [Galega nemorensis verna] ferè, in quibus semen fuscum, maius: radix minimè viuax est, sed prolato fructu perire solet, ut plerisque Leguminum generibus accidit.

Eruum, siue Orobum Pannonicum 4. album ad Phasioli silu. aut Vicæ genus commodè referri posse, existimat Clusius.

Arachus { inquit Dod. } latifolius cauliculos fert, qui non attolluntur, sed humum versus inclinantur: foliis luxuriat, quæ ad vnum pediculum ferè quinque, rarè tria, lata, & in rotunditate oblonga: congesti flores, colore aut candidi, aut dilutè purpurei: in siliquis semen, Vicæ minus. Plerique Eruum Venetum appellant, non tamen Eruum, aut Erui species, sed siluestre legumen, quòd haud aliò, quàm ad Arachi, perich, genera, referendum videtur. At eadem Icon Dodonæo cum icon Orobi Pannonici 4. aut albi 2. Clusii. Fortè Dodon. sua descriptione comprehendit etiam Clusii Orobum Venetum, flore purpureo.

Raram hanc plantam in Austria primùm inueniebat Clusius, nec nisi in Alpibus illius Provincie nascentem, unde delata, & in hortum translata, altero anno flores ipsi protulit Aprilii, & Maio, deinde semen. Anno 1579. observabat Maio florentem maximà copiam, in eà Pannoniæ parte, quæ inter Drauum & Savaum est flumina in Danubium illabentia, quæque ob eam causam Interamnia Pannonia nuncupatur, in monte quodam siluoso Greben arci vicino. In collibus (ut Dod. perhibet) herbosis apud Bohemos subinde reperitur: in hortis Belgii facillè proficit. Floret Vere, ætate siliquæ cum semine perfructur.



Insignis Botanici & Med. Argent. D. Agrius obtulit nobis nomine Orobi latifolii, coloris albicantis plantam, collectam in horto Bononiensi, cui magna similitudo cum Galega verna: folia constant duabus, vel tribus conjugationibus, quæ paulò breviora videntur, nec trinerua, ad principium pediculi longi, in eorum summitate flores plurimi (multò enim plures quàm in illa) minores, in utramque partem conuersi, non in vnam tantum, ut in prædicta.

Hanc si fallor, Clusius his delineat: Multos ex eadem radice fundit ramos, pedales angulosos, & ad singulas foliorum alas, modò in hanc, nunc in alteram partem inflexos, humique ut plurimum diffusos, folia in singulis alis quaternis, aut senis, vni costæ inhaerentia, bina semper ex aduerso sita, nullo extremo imparem numerum faciente, Orobi Pannonici primi [Galega nemorensis verna] foliis parè similia, sed dilutè virentia: flores oblongis virgulis ex alarum cauis prodeuntibus innascuntur, numerosi, in comam flexi, pusilli, quatuor foliolis, ut reliquorum leguminum flores constantes, hoc est, superiore latiore, sursumque reflexo & expanso, binis minoribus ad latera, quarto inferiore cauo, & quodammodo carinato, coloris purpurei: oblongi, lobi, mucronati, Vicæ lorum parè æmuli, rotundiores, & magis teretes, maturitate rufescentes, semen continent orobaceum oblongiusculum, albicantis coloris: radix dura, lignosa, multis fibris in diuersa tendentibus donata, viuax est, & singulis annis frequentiores caules profert.

Orobus Venetus primus purpureo flore, & alter siue secundus, qui foliorum duntaxat & ramorum, colore differt, qui ex viridi pallefcit, & floribus, qui prorsus sunt albi, Clus. Orobus Venetus primus, & alter Clusii seu purpureus, & albo flore, Pontæ in Bald.

Cum in Belgica, tum Viennæ natæ è semine Venetiis missio nomine Orobi. Florent Maio.

SECVRIDACA FLORE LVTEO, SILI-
qua lata oblonga.

CAP. XXXIV.

EX radice statim multos emittit caules, cubito longiores, ramosos, procumbentes, folia leuia, lentis maioris, sensim latescuntia, sex, octo conjugationibus, ad costam annu-



Flor.

Siliqua

Semen

Hedyarum
Pelecium
Diosc. Diosc.Pelecium
Plinius
Diosc. PliniusSecuridaca
Scaliger
Plinius
Diosc.

Lentem

Dioscorides
Hedy-
sari genus
Neoterici
quibusdam
dos.
Hedyarum
genus
Plinius
Matth. nos.

xis, vno in
summa alim-
pantatem fa-
ciente: indi-
demque adeo
vnde foliorum
pediculus, ap-
pendix specu-
liaris, in satigio
umbellatum fl-
res sustinet Me-
lliotti nobilis
Tragi, luteos:
quibus succed-
unt siliquae pal-
mo longiores,
nonnihil sulca-
tae, rostro re-
curuo, cōpres-
sa, valde breui
pediculo hærē-
tes, duobus hinc

& hinc aggeribus veluti fossam intercipientes,
geminum conceptaculum, ruforum, quadrangu-
lorum membranis distinctorum.

Semen [ait Celsus] est apud nos peregrinum,
omnium amarissimum, ut si vel minimum eius
deguſtetur, ingens amaritudo sentiat, depres-
sum est, quadrangulā figurā, ancipitem securim
prae se ferens, colore rubro: extrat & pallidum:
flores fert luteos, in longo pediculo plures, in
orbem dispositos: siliquas digitales, depresso &
aduncas.

Dioscorides Hedyarum & Pelecium vocat,
fruticem minutis foliis, Ciceri similibus: siliquis
vero cornicula referentibus, in quibus semen
solum, quod ancipitem securim amuletur [vnde
& nomen acceperit,] gustu amarum.

Idem ferè Plinius habet. Pelecium in segeti-
bus diximus nasci, fruticosam cauliculis, foliis Ci-
ceris. Semen in siliquis fert corniculorum modo
aduncis, ternis, quaternisve, quale Cith nouimus,
amarum, stomacho vtile. Est herba [tradit sibi]
quae Lentem enecat, & hoc quidem complexu
suo: vocaturque Securidaca, quam Graeci à simili-
tudine Pelecium nominant.

Apud Theophrastum Gaza Securina vocat,
& in Aphacia nasci scribit: quo in loco Scaliger
in Phacia legendum praecipit. Sed perperam &
Plinius loco proxime citato, & Scaliger apud
Theophrastum quare (lentem) pro aphis (Vicia
genere) legerunt. Is enim ipse, ut & Dioscor. in
segetibus nasci scribunt. Theophr. etiam Securi-
dacam in Aphacia gigni, & Aphaciam à Securida-
ca strangulati prodidit. Adde Theophrastum et-
iam hac in re Plinio refragari, qui Aracum rem
duram & scabram in Lente nasci tradidit, non
Securidacam. Nec contrariatur, quod Galenus
Lentem in Securidacam degenerare testatus fue-
rit. Aliud enim est, degenerare in aliud, & inter
ea nasci.

Dioscorides igitur, Plinius & Galenus vnius
tantum Hedyari, Pelecii, siue Securidacae me-
minerunt. Matthiolus autem cum Neotericis ali-
quibus duorum secere mentionem, maioris scilicet
& minoris. De maiori ita Matthiolus: Hedy-
sari Diosc. Galeno & Theoph. Plinius deceptus
Securidacā Lentem complexu strangulati scri-
psit; & quare pro aphis legit & vertit. Hæc Mat-
thiolus, qui non descripsit suam figuram fallam.
Olim in icone valde politè erant siliquae, singu-
lares ex breui pediculo, quas in post. comp. reti-

net, quibus insuper adaptavit flores discorde pur-
pureos, non tamen annotavit, ubi terrarum eius-
modi colorem obseruauerit. Ego quidem semper
luteos offendebam, & decerpebam. Et quamuis
Dod. olim Matthioli Securidacam dicebat non
multum ad Dioscoridis descriptionem accedere:
postea tamen in re herbaria doctior f. Quis suam
mutauit sententiam, Hedyarumque primum
appellauit.

Ceterum Pelecium, Securidacam, & Hedy-
sarium Gesneri hort. dicens, qualiter & Celsus
appellat. Plinius, inquit is, eā Lentem
strangulati. Galenus verò Lentem in Securi-
dacam degenerare, testatur. Verum me iudice,
non est possibile eam diuersam plantam, quam
Celsus describit, quæ eadem cum nostra Securi-
daca, posse in Lentem degenerare: scribit enim
Theophr. de caus. pl. Mutationes euenire putan-
dum, ut aliquid similitudinis faciant, non ut om-
nino speciem expriment alienam: igitur aut non
est Securidaca Galeni, aut Galenus errauit.

Hanc tribus in locis triplicibus insigniuit no-
minibus Hist. Lugd. liberalissime quidem abque
duce. Et primum quidem, inquit appellari Latini
Securidacam, vel ut Turnerus, legendum
centest Securidacam. Hedyarum manus siue Se-
curidacam Matth. Item Hedyarum Dodon. Et
rursus, Hedyarum Dod. Hic vides auream
esse libertatem. Aurea est: sed non quæ propter
Rempublicam herbariam, aut potius inaristam
explendi gratiā suscepta fuerit: tres siquidem v-
nius plantæ figuras Historia proponit, quatum
prior ex Matthioli falsa quod annotare debebat
seuerus ille Censor Hist. Lugd. C. Bauh.

Hedyarum, siue Securidaca maior, autoribus
Lob. & Pena Adu. Ancipitis Securiculæ amulo
semini ferui accepta matris, siue Securidaca
vox, quam etiam aphis, ob suauoleptism vo-
carunt. In Obs. & Icon. Pl. eadem nomina legimus.
Figuram porro in Obs. & Icon. quod concernit
pulchre repræsentat Securidacam, de qua hie
gimus, non item descriptio, in qua inter alia flo-
res describuntur purpurei, quales nunquam vi-
dere contigit.

Nullius insuper semen aptius Veterum locu-
rim, Clusii iudicio, refert, quam eius, quæ ab om-
nibus Hedyarum (aphis, matris) legitimum
centestur, & Securidaca vera.

Hæc à Cam. Securidaca maior nominatur, &
a Cam. à Graecis, forte per antiphrasim, cum se-
men sit amarissimum. A C. Bauh. apud Matth. Se-
curidaca siliquā oblongā. Hedyarum Matthioli, Ital. Hedyarum, & Securidaca, Cam.
Lob. & Pena Securidaca maior. German. gro-
ßschäfen.

In Germania (id annotante Dodon.) locusta
provenit, floret in hortis Maio & Iunio mensi-
bus. Sed in Hispania aliquot locis inter segetes
spontè nascentem Clusius obseruauit, vulgari-
ssimam porro hanc esse scribit per vniuersam
Pannoniam, Austriam, Stiriam, Moraviam at-
que Bohemiam, cum in pratis, tum in agris, & se-
cundum vias. Flores Iunio, interdum totis
etiam Aestate: semen maturum esse Iulio, & Au-
gusto. Variare etiam interdum floris colore, qui
vel totus candidus sit, vel exalbescat, vel inter-
fusus purpureascat. Notant item Adu. cam in arvis
& segetibus, quas rapidi torrentes ex Alpibus
Taurinis præcipiti alluione, plerumque va-
stant, & ad Ceuacum via, satis multam orni legu-
minisque modo serpere & fertilitate restitili, se-
se reparare. Securidacam flore luteo, siliquā li-
tā ha-

et habebam in horto. Vidi Basileæ in horto D. Foel. Plateri florentem adhuc & siliquas ferentem Septembri, Montbelgardi verò etiam Augusto.

Virt. & Vitis.

Stomacho in potu utile Hedysarum [autore Diosc.] Additur & in Antidot. Cum melle verò subditum ante coitum spem partus adimere creditur. Hedysari quoque meminit Galenus simpl. med. 6. sic inquit: Hedysarum, aut Pelecinus. Huius fruticis semen colore rufum est, utrinque anceps, tum gratum est stomacho, & viscerum obstructions expurgat. Idem præstant totius fruticis ramuli.

SECURIDACA ALTERA, sive minor.



Lignosa, simpliciter radice, & candida nititur, ex qua emergunt caules, striati, cubitales, aliquando vix duas uncias longi, folia pinnata Securidacæ maioris, minoræ per extremam oram latelescentia, sæpè & filis, flores singulares, pediculi fastigio ordine ascendentes insident ex luteo pallidi, quibus succedentes siliqua, ut minores quàm Securidaca prioris, ita multò magis incurvæ, parum abest quin vtriusque finis coitu circulum efficiat, torosiores, quàm Securidacæ iam dictæ, & propemodum rotundæ: in quibus geminus granorum crassorum, quadrangulorum, ruforum versus, intergerinâ membranâ dissepitus.

Securidaca minor, Astragalus Monspel. Præceptores nostri [aiunt Lob. & Pena Adv.] Securidacæ speciem inficiabantur. Senensi licuit pictoris operâ nobis illudere. Addunt iidem in Obs. Hedysarum alterum Dod. Huius altera differentia in vireto Morgani, Hiemis, cæli, & Soli nostri patientissima. Item Ic. Pl. Tom. 2. p. 27. Iconem habet Hedysari alterius Dodonæi. Verùm, quod monuimus, Securidaca minor Matth. aut Dod. diuersa est ab Astragalo Monspelien-sium.

Apud Dod. gall. titulo, *Securidaca Latini*, quibusdam Pelecinon, Græcis ἡδύσαρ, effigies mala: in Hist. autem lat. titulo Hedysari alteri, bona. Ait Gesn. Pelecinus falsus Goldenbergio, pingitur à Dod. Tom. 2. sponteque apud nos nascitur. At vellemus eum annotasse vbinam terram in Germania observavit, si intelligit eundem nobiscum Pelecinum. Nos nunquam observauimus.

Hedysarum, siue Securidacam minorem appellat Matth. & Cam. hort. & Epit. Matth. Astragalum Monspelianum, Clusius. Verùm diximus cap. de Astragalo Monsp. non bene pro eo à Clusio poni Securidacæ minoris iconem.

C. Bauh. apud Matth. Securidaca siliqua falcata.

Hist. Lugd. quæ duas icones vnius plantæ proponit, Hedysarum minus Matthioli, & Hedysarum alterum Dod. inseribit.

In hortis meis Genevæ & Montbelgardi mense Maio florebat, & siliquas proferebat, Hiememque perferebat.

Locus & tempus

SOLEA EQVINA.

CAP. XXXV.

Solea equinæ dictæ herbule radix alba, paucis donata fibris lignescit, Matth. gracilis, quatuor digitorum longitudine: à qua statim plures proferuntur caules, palmares, aut dodrantales, angulosi, striati Matth. unde folia exeunt Securidacæ minoris pinnatim digesta, & per extremam oram latelescentia, leuiterque in corculi morem fissâ: hinc, ex sinu videlicet foliorum, flosculi exeunt lutei, singulares, quos siliqua etiam excipiunt singulares, nullo pediculo, tres



circiter uncias longæ, culmum latæ, nonnihil incurvæ, compressæ, artifice naturæ rarum spectaculum. dorsum his còtinuum, opposita pars simbratis sinibus laciniosa, vel. ut Matthioli ait, siliquæ oblongæ, pressæ alterâ parte, incurvæ, incisuris diuisæ, & foraminum totundorum speciem referentibus: provenientes

trinque foraminum orificio. Semen lunatum, bicornè pro contenti seminis figura, numeroque, totidem equinæ soleæ simulacra repræsentat.

Sierra canallo, Lunaria Alchymistis, si denominanda mihi esset (inquit Matth.) pro arbitrio, vocarem Securidacam minorem. Italis *Sferra canallo* sic appellatur, quod equis calceos ferreos calcata extrahat. Chymistis Lunaria minor, quibusdam Securidaca etiam nuncupatur. Hanc ego plantam Securidacam montanam appello, cum non parum videatur habere cum minori Securidaca cognationem, tum facie, tum viribus: *Hædennus Matth.* Ego autem malim dicere, vocari *Sferra canallo*, à figura Soleæ, siue ferri equini quàm à vano, ut quidem existimo, rumore, qui tribuitur etiam alteri plantæ, ipso Matth. teste.

Cæterò, Ferrum equinum, *Ferro de canallo*, Itali vulgè nominant, ut notat Gesn. hort. & Dod. de frum. cui tota insuper amara est, & Hedysaro naturâ assimilis.

Lob. & Pena Adu. *Ferro canallo*. Ferrum equinum. Soleam equorum resurgentem fabulati sunt. Quidam nomen Lunariæ affinxerunt. Hæc illi, qui describunt.

Cam. in Epit. Matth. posuit iconem *Sferra Ca-*

Caules.

Flosculi, siliqua

Semen.

Lunaria. Alchymistarum. Sferra canallo.

Lunaria minor. Matth. restituit.

Ferrum equinum.

Solea equorum.

ualli, quæ partim conuenit, quod siliquas attinet, cum Ferro equino: partim autem videtur esse alterius plantæ, quam consueui nominare, Solex, vel Ferro equino similem, de qua mox.

Medica

Hedysarum, siue Ferrum equinum Tab. Medicæ species Cast. Dur. Sed ad Securidacæ [ait Cæsalp.] reduci posset & ea, quam vulgò vocant *Sferra cauallo*, alii Lunariam, oritur in montibus, in totum minor Securidacæ.

C. Bauh.

C. Bauh. apud Matth. iconem *Sferra cauallo* ponit, quæ non respondet nec descriptioni, nec iconi Matthioli: scribit enim Matth. folia cordis faciem referre: quæ non referunt folia iconis iam dictæ: idem accidit Camerario. In nostra iconone radix pro portione plantæ crassior picta, & flosculi omitti.

Locus

Soleam equinam vidi Patau in horto D. Cortusi: spontaneam reperi inter Nemaum & Valentiam redeundo Montpelio florentem & siliquas habentem mense Maio. Prouenit Montbelgardi in horto E. C. semine per hortulanum Magni Ducis Hetruræ Florentiæ mihi misso.

Tempus

Nullum, quod Matth. sciat, habet in Medicina usum, quamuis non desint herbarii, qui eam in potionibus vulnerum addunt. Chymistæ hac tantum ex argento viuo argentum purum fieri fabulantur.

Chymistæ sum error

ORNITHOPODIO AFFINIS, VEL POTIUS SOLEX, VEL FERRO EQUINO, HERBÆ.

Radix

Longissima radice, nigricante, lignosa, subdulci, licet sit ubi & pluribus nitatur radicibus: viticulas producens multas, palmo longiores, interdum

Folia



nodrantes, & cubitales, ramulos, tenues, subrubentes, in quibus folia Lentis pinnata, paulò quam Ornithopodii maiora, non continuè vsque serie, costæ ad caulem vsque adhaerentis, ut in Ornithopodio Dodonæi iam dicto, cum costæ, quæ cauli adnascitur, sit aliquotq; foliis vidua, ut in Ferro equino,

Floris

subamara: flores octo aut nouem in ramulorum extremis, corona instar radiatum penduli, colore & effigie Meliloti, quam nobilem vocant, quibus succedunt siliquæ, crebris internodiis interceptæ, aduncæ, in acutum desinentes, siliquis Ferri equini similes (in quo ab Ornithopodio dicto dirimitur, cuius siliquæ Scorpii caudam æmulantur, teretes) minores tamen, minùsque incuruæ, nec ita latæ, in quibus semina incurua, oblonga, rubra.

Siliquæ

Semina

Hedysarum

Hedysarum minus Geel Steintwicken Tabern.

An Ornithopodium

An Gesnerus hanc intellexit de hort. pro Ornithopodio Dodonæi, ait enim Ferro equino

cognatam videri herbam, Dodonæi Ornithopodium.

An eidem de coll. stirp. Meliloti filu. species humilis, binis è regione foliolis, cuius lutei flores, suauem quandam & ferè lactis odorem referunt: in prato infra turrim in hard/floret Maio, & Iunio. Siliquas curuas, & vnguium speciei profert Iunio adulto, vel in fine Iunii.

Confundit meo iudicio Cam. apud Matth. in Epit. præsentem hanc nostram plantam cum *Sferra cauallo*: duas siquidem hoc titulo plantas depingit, Soleam scilicet equinam, & huic affinem.

Montpelii prouenit prope patibulum, florens Aprilis & Maio. Basileæ vidi cum flore Iunio. Genevæ passim viret Februarii principio, florètque Maio. Montbelgardi frequens est. Gener Cherlerus collegit circa Wasserfall.

LUNARIA RADIATA, ROBINI.

Misit ad nos Lntetiæ Regis Magnis Botanicus Robinus,



Gallorum in si-
amicus noster
Lunariæ radiatæ
siliquas plu-
culas, formâ &
exotica eleganti-
pulcherri-
mas. Vnciam
longitudine
vix superant,
colore sunt ex
ruffo subcine-
reo, vtrinque
dentatæ, nervo
per medium
currente di-
stinctæ: in qui-
bus gemino
versu semina
continentur
exigua, com-
pressa, Lentis
colore, ac ro-
tunditate, ve-
rùm multis nu-

meris minora, leuiterque sinuata, sapore, quantum ex sicco deprehendere licuit, minime notabili, aliquo tamen modo ad leguminosum accedente.

Seimen commissimus terræ Montbelgardi in horto Ill. E. C. Wirt. quem colimus. Mense verò Aprilis prouenit & floruit Iulio, siliquasque produxit. Radix longa cum aliquot fibris, cauliculos plures profert angulosos: in ramulos subdividuntur folia dodrantalia: Viciarum, ac Securidacæ minoris modo disposita, in quibus foliola multa, sibi inuicem apposita, nonnihil cordata ultra 29. supputauimus: desinunt in vnicum foliolum sine capitulo, ut Securidacæ dicta, cui valde similis: inter superiora folia exoritur pediculus longus, in cuius extremitate flosculi hiantes, quales ferè in dicta, vel in Vicia, quæ Cracca minor dicitur, rubellæ, plures simul: sequuntur siliquæ, quales descriptæ, recuruæ, septem supra vnum pediculum supputauimus: folia sapore sunt subdulci.

Securidacæ peregrina, quam Clusio misit Iac. Antonius Cortusus, significans missam à Cl. V. Honorio Bello, qui eam nascentem obseruabat in sco-

Securidacæ peregrina

Scelopendra leguminoſa
in ſcopulis apud Sebemicam Illyria urbem. Ipſe Cortuſus aſcripſerat *Scelopendra leguminoſa*, vel Hedysarum peregrinum, quod poſtremum nomen aptius illi convenire videtur. Hæc Cluſius, qui nondum in lucem ediderat ſuam iconem cum noſtram parandam curaffeſſemus.

MELILOTI MAIORIS QUARTA ſpecies Trago.

CAP. XXXVI.

Quarta Melilotus Tragi licet ſoliis, tenuiſſimis ſimilique virgis & adnaſcentiis, nec non longa radice, floreſque luteo & multiplici tertiz (Medicæ ſilu. flore luteo) reſpondeat: tamen flores huius maiores, & magis crocei apparent, quo nomine à ſuperiori [tertia] diſſerre videtur. Eſt & aliud diſcerniculum, & certius quidem, quo invicem quarta hæc à tertia Meliloti ſpecies diſcerni queat, nimirum forma ſiliquarum, quas hæc Melilotus gignit, ex vno flore plerumque ternas dentatæ aut quaternas, digitum longas, vnguibz auicularum ſimiles, terete ſeminio Orobo haud diſſimili reſertas. Germ. Vogelwiſſen dicta, fortè Serapionis Melilotus, nam deſcriptio ſatis quadrat.

Quemadmodum autem & Dodonæus, qui Trifolium corniculatum vocat, & Frater, cui & Trifolium 54. dicitur, nullam huic plantæ lucem afferunt: ita nec ego, qui adhuc diuinare non poſſum, an ſit mihi nota. Si Tragus locum, ubi proueniat, annotaſſet, ibi poſſet perquiri.

MELILOTVS QUINTA Tragi.

Viuaci radice reptat multis adnatis variè ſe propagans: ſibris aliquot donata, craſſiue radicem Conuoluuli maioris, lignoſa candidaque matrice ſarcta, ſapore amariſſimo: hinc emergunt longiſſimi caules, craſſitudine cum radice pari, ſtriati, intus concaui, ramoſi: ſolia pinnata, Securidacæ pinguicula, atro-virentia, octo aut duodecim ſoliorum coniugationibus conſtantia, impari vno extremam alam claudente: ex ſoliorum alis pediculi producuntur palmares, & breviores, anguloſi, quibus pendula impolite ſunt coronæ ſorum Securidacæ, quorum ſolum ſupremum purpureo ſurſum explicatur, lateralia bina in album languſcunt, carina penitus albet, ſub roſtro atro-purpureo ſtamina occultans argentea: ſiſ inter ſolios totus albet, ſolo carinæ roſtro purpureo: ſiliqua ſuccreſcunt vncias duas, aut tres longæ, anguloſæ, tenues, crebris notis articulatz, ſemine longo, mediocriter amaro.

Tragus Hiſt. Ger. die fünffte ſtein-wiſſen/pulchra Lotus campeſtris. Idem in lat. Meliloti maioris quinta ſpecies.

Fr. C. Bauh. attulit Patanio nomine Aphacæ maioris Cortuſi. An Cæſalp. Alterum genus. Securidacæ, quod in ſiluis grandioribus oritur: ramis tenuioribus, ſiliquis inſtar Meliloti vulgaris, & ſemine intus habet oblonga, ſubalbida: ſiſculos ſimili modo, in orbem diſpoſitos, albos aut ſubrubentes.

An Hiſt. Lugd. In pratis & terratum aggeribus gignitur Loto Enneaphyllo non diſſimilis: ſoliis eodem ordine collocatis, ſed non perpetuo no-

uenis: flore ſimili, ſed purpureo: ſemine ſiſdem corniculis incluſo.

Hedysarum Scorpinron, aliis Onobrichis, Cam. hort. Vogelwiſſen / Melilotus tertiz, & Serapionis Trago, Lonic. qui fallitur, non enim Trago tertiz eſt, ſed quinta. Ornithopodium quoddam maius, Dod. Hedysarum purpureum, Pürperbraun Pelſchen/Tab.

Montbelgard: pluribus in locis, à me etiam plantata in horto ſoreſt Junio, & Julio, ſuo reſpectu moleſta. Baſileæ etiam & Stutgardiæ copioſè obſeruauit. Obſeruauit & Cluſ. maximè viuacem vulgatiſſimam, per vniuerſam Pannoniam, Auſtriam, Stiriam, Morauiam, atque Bohemiam, cum in pratis, tum in agris, & ſecundum vias, Florentem Junio, & interdum tota etiam æſtate: ſemen maturum Julio, & Auguſto. Pennæ ſuam creſcere aiebat agro Geneuenſi non procul à Ponte tremulo, inter dumeta.

POLYGALO GESNERI SIMILIS planta.

Palmam alta, ætatis donata ſibris Polygali Geſneriani, multò tamen minoribus, hiſtutis, ad Aſtragali Monſpeliani ſolia accedentibus, ſiue magnitudinem, ſiue etiam figuram reſpicias, niſi obtuſiora eſſent, paulòque longiora: flores extremo ſaltigio caulium hærent, multi pro plantulæ modo, roſtello adhuc rubro apparente caduci enim erant, poſitu ſerè ſorum, quintæ ſpecies Meliloti maioris Tragi.

Hanc in peregrinatione mea Rhætica cum D. Geſnero in Rhætorum monte Albula reperi, ſorentem Junio.

SCORPIOIDES LEGV. minora.



Radicem. habet Scorpioides leguminoſa longam, tenuem, ſimplicem, in capita aliquot ſubinde diuiſam: ex quibus non tantùm prodeunt cotyledones palmares, & ſeſquipalmares, hiſtutæ, verum etiam ſolia, quæ Ornithopodii ſolibus æqualia, exigua, hiſtuta, acuminata, & nonnihil incana, pinnatim diſſecta in coniugationes decem, aut plures ad coſtam adneſcuntur: quanquam & ex ipſis caulibus conſimilia quoque ſolia oriuntur: flores extremis ramulorum hærent coaceruati, Ornithopodii floribus haud abſimiles: quibus ſuper veniunt intortæ ſiliquæ ſenſim attenuatz, modicè compreſſæ, ſtriatz.

Lob. & Pena Ada. & L. Pl. Tom. 2. Scorpioides leguminoſa.

SCORPIOIDES LEGVMINOSA
altera.

Viridit.

Folia.

Stipula.

Siliqua.

Locus.

Notabili hæc tum à Scorpioide leguminosa Herbariorum, tum ab Ornithopodio differentia discrepat. Viriculos hæc quidem, vt istæ emitut, laues, cauos, dodrantes, aut maiores, in ramulos diuisos: Sed foliola ordine vtrinque ad costam aggesta, pauciora, angustiora, ramulique disposita, & quoad figuram ferri equini folioliis simillima, quippe quæ cordata, serè notabili neruo donata sunt. Pedicellorum extremis stoculis hærent singulis gemelli, flauis, cum Ornithopodii stoculis tam figurâ, quàm magnitudine apprimè conuenientes. Quibus gemella succedunt cornicula multiplici discrimine quoque à dictæ Scorpioidis siliquis variata. Teretia quippe sunt, ac recurua, minimè tamen compressa, sicut illa, ac proinde multò angustiora, gracilioraque, glabra: nullis interim nec stris, nec lanugine donata, obscuris tamen quibusdam articulis distincta: quæ semen continent exiguum.

Hanc primò nobis exhibuit D. Agerius diligentissimus Botanicus, in agro Neapolitano lectam prope Fundi iuxta vias inter Scillas, ex qua & descriptionem, & figuram damus.

STELLA LEGVMINOSA.

CAP. XXXVL

Arturo Cortusi.

Folia.

Stoculi.
Semen.



Stella leguminosa, Arturo Cortusi, cui debetur rarissima hæc planta, foliis exit leguminosæ Scorpioidis, stoculis Lamplanæ. Semen exile, pullum, in corniculis tantillum salcatis, vno pediculo aptatis, & radium congestis, stellam exprimentibus, gustu leguminoso, & glutinoso.

Quædam.

Num eadem sit cum Stella illa decantatissima herba, Hibernis celebrata, humi depasta, fides esto [inquit Lob. Obs.] penes illos qui viderunt, & referunt. Cæterum Stellam leguminosam, siue Arturo Cortusi depictam quoque exhibent Ic. Pl.

Stellam leguminosam Lobelii vocat Hist. Lugd.

Chariss. Frater C. Bauh. ostendit mihi anno 1607. plantulam plurimum accedentem Stellæ leguminosæ, si non eandem, folia Lentis candidantis accedunt Astragalo candidiori. Multum etiam similis plantulæ Mospeliensi, cui titulum fecimus, Fœnugræco silv. Tragi in quibusdam accedens plantula.

ORNITHOPODIUM FLORE
flauescente.



Ornithopodium Dodonæo dictum radice pusilla. Radice. Coliculus promit. Coliculus. plures, dodrantes, tenues, & in ramos ditissimos: folia pinata per costam totam ad eam usque cum ramis aut caulibus connexum disponuntur, dimidio minorâ quàm Lentisculæ: flores leguminacei, flauescetes, plures in vniuersi furculi fastigio.

simul iuncti pediculis perquam breuibz: siliqua perinde copiosæ, pedem auiculæ digitatum exprimentes, teretes, quarum singulæ Scorpii caudam referunt, nodis quinque, aut septem distinctæ: semina Dod. sena, septenauæ, minuta, rotunda, Napi, aut Rapi similia continentes.

In figura ex Fuchianis hæc apposita maximè displicent siliquæ. Et quamvis similitudinem aliquam habeat in foliis, melius tamen placet Dalechampi figura, posita pro Ornithopodio tuberoso.

Vocari potest, inquit Dodonæus, Ornithopodium, Brabantis Vogeloot / Gallis Pied d'oïseau, Lat. *Auis per*, licet nullum nomen, quo appellari possit, habeat, nisi sit Polygala [μαύγαλα] Dioscoridis, vt nonnulli existimant. Ex Arachidum quoque est numero. Verum Gesnero Ferro equino Italorum cognata videtur. Sed vereor, ne Gesn. describat, & intelligat aliam plantam, quàm Dodonæus: quia Ornithopodii Dodonæi siliquæ & foliorum dispositio non ita respondet Ferro equino, vt plantæ quam descripsimus: siliquæ enim huius, caudam Scorpionis imitantur, quatuor, aut quinque sunt articuli, non incurui: qui non exprimuntur in mala nostra figura.

Ornithopodii autem, siue Pedis auis elegans varietas oritur, vt annotant Lob. & Pena Adumarginosæ herbis Grinviçii Regiæ, ad Tamesim flumen, non procul Londino: vix tota binos, aut ternos superat pollices: ramulis in terram sparsis, exilioribus, & crebrioribus, vniuersis ordine positis, quàm superior, [Polygalon Gesneri] quæ non aliis ab ista natalibus gaudet. Idem in Obs. Ornithopodium vocant Polygalam Diosc. Dodonæo, quæ in re Dod. detrahunt, cum id non assermet, sed dubiè ex aliorum estimatione proponat. Ic. tandem Pl. dicitur Tom. 2. Ornithopodium perpusillum. Hist. verò Lugd. Ornithopodium Dodonæi. Item: Pusillum Ornithopodium Penz.

Data nobis est hæc planta, à D. Petro Turnero inter stirpes Andicænas. Nascitur [inquit Dod.] in arvis, segete potissimum demersæ reperitur & locis incultis, veluti in collibus, prætisque ficis & apricis, ac secus vias, arvis verò nata minithopodium penz potest anterior.

ORNI

ORNITHOPODIUM TUBEROSVM Dalechampii.

Radix. Radice donatur multiplici huc illuc fusâ, tenuibus fibris capillatâ, crebris tuberculis nodosâ, duris, rotundis: cauliculis multis, humi

Coniculis. ferè sparsis, aut paululùm extantibus: foliis Viciz, minori-, bus, in singulis ramulis ex aduersodispositis numero imparibus: flore in summis ramulis ex albo rubescente: siliquis exilibus, curuis, ferè ternis, velut articulis quibusdam distinctis: minuto semine.

Folia. Nascitur in aridis & sabulosis.

Flos. Herniarium quidam vocant, quia omenti & intestini prolapsui mirè auxilietur sumpta & admota. Item experimentis constat totius plantæ decoctum ac puluerem, renum calculos frangere & eiecere.

Siliqua. Anthyllis prima quibusdam, flore luteo, foliis lente minoribus.

Locus. Quidam (Lunaria) gracili solo nascitur, tenuibus ramulis, dodrantalibus, sparsis: foliolis candidantibus, lente minoribus: strobilulis luteis, aduncis, ut vulgare Melilotum: quidam Anthyllidem primam putant: at sapor non inest falsus. Celsalp. l. 6. c. 33.

POLYGALON CORTVSI.

Radix. Ita mihi olim denominabat Patanii Nobilis Cortusius, plantam, cui crassa, lignescens, dodrante longior, nunc simplices, nunc multifide, intus albæ: quæ statim plures emittit virgulas lignosas, dodrantes, aut breviores, humi stratas, quibus coniugim haren-

Virgula. folia, ut plerumque novena, similia Ornithopodio quorundam, nisi essent breviora, & rotundiora, solidiora,

Tom. II

spissiora, & magis alba, saporis adstringentis, nervo vno secundum longitudinem prædita: flores ramulorum nudorum extremo insident lutei, ut Ornithopodii iam dicti, vel Polygalæ Valentini primæ Clusii: semina item consimiliter in siliquis longis, crebris internodiis interceptis.

Polygalâ, cuius imaginem in Ital. & magnis figuris appinximus, misit ad me [inquit Matth.] Veronâ Calzolarius. Quæ an legitima sit, pro certo decernere non ausingi, quod tam paucæ eius tradantur notæ, facile tamen adducor, ad credendum legitimam esse, & præsertim cum ipse Calzol. scribat multiplici sibi experimento constare, huius plantæ vsum lac in mulieribus copiosum efficere. Cam. in Histor. Gern. relicta Matthioli figurâ non vndique spernendâ, ponit aliam ex Gesnero à Polygalâ Matth. differentem. Matthiolus autem non descripsit Polygalam suam, contentus pro suo more solâ figurâ. Qui porro patrociniū eius suscepit, non bene patrociniatur illi, sed figuram ex Tabern. apponit malam. Polygalâ Matth. & Crengblum, nonnihil differt [inquit Tabern.] à cæteris, floribus planè similibus, folia etiam convenirent, nisi breviora essent paulò & latiora. At Compiler corruptit figuram Matth. vel Astragalum Lobelii, posteaque ex figura sua falsam descriptionem concinnat, nec bene Crengblum dicit: ea enim amara est planta, Matthioli autem non amara, sed adstringens: flos etiam ducisus, nempe luteus. Quæ obsecro convenientia, aut similitudo foliorum? consideratis etiam Tabern. figuris, vni folia Lini, alteri folia leguminum, cum multis foliolis

ex vno pediculo. Lobelium Adu. quo argumento Senensis Polygalam legitimam vindicet, piget referre: vocatur autem ab ipso in Obs. Astragaloides herbariorum, Astragalus Matthioli, vel iam demum Polygalâ eiusdem. Verùm Lob. non novit Polygalam Matthioli, quæ multum differt ab Astragaloides et dicta, cui flores tribuit ex pallido puniceos. Astragali quoque figura apud Matth. partim ficta, partim etiam aliena, de qua suo loco

An Histor. Lugd. Lotus enneaphyllos Dalechampii, radice firmatus brevis, subnigra, valde fibratâ: cauliculos edens multos, per terram sparsos, vel supra terram paululùm extantes: folia Loti, in singulis pediculis novena: quæ ex causâ Enneaphyllum cognominantur: flores luteos in terra congestos: semen parvum in corniculis longis & gracilibus: ac qui pratis & terrarum aggeribus gignitur. Descriptio sanè hæc Dalech. cum nostra planta convenit, si radicem demas, fortè Dalechampiono non fuit delata integrâ planta.

Genevæ in horto nostro tota Hyeme virebat, florebatque Maio. Hanc olim inueneram primò in Rhætiæ monte Nambre: Postea verò è montibus quibusdam Episc. Basil. transtulit Montbelgardum in hortum Ill. E. C. V. Virr.

POLYGALA QVIBVSDAM.

CAP. XXXVIII.

Descriptio. Polygalâ nostra Lenticulæ foliis & facie crassioribus, pusilla, & tenera planta, in Gallo-Provinciæ pascuis montosis prouentu multo ferriur, strobiluli sunt lutei, minores Cytisi, aut Araci, siliqua & semine minutis, quæ laetis pugent prouentum, gregi & armentis, Lob. Polygalâ nostra

Q.

Lob. & Pena Adu. & Polygala Dioscoridis, Obs. Polygalæ nullum scio (ait Anguill.) vulgare nomen: planta est similis Lenti: sed crassior: ei flos luteus, cum tenui-siliqua. Seminatur in Provincia & datur animalibus: provenit etiam in Italia in montibus Bononiensibus, & in Samnibus, siue abruzzis. Lobelius similem ponit cum Anguill. descriptionem, qui ambo sese risui exponunt, cum neuter vulgare nomen addat: nam si feritur, ut aiunt, multo proventu, non potest esse innominata. Hanc potè eandem suspicari cum Polygala lutea [vi frater C. Bauh. facit] non possum: quia Polygala lutea à vulgari colore solo distat, quod animadverterim, cui folia non respondent Lenti, nec vires conveniunt ei attributæ à Diosc. Aliquando suspicatus sum Anguill. Polygalam, eandem cum Cortusi, & Matthioli Polygala, verum cultura, de qua scribunt, mihi adhuc incompecta, dubium mouet.

GLAUCE VETERVM.

CAP. XXXIX.

Diosc. descri.

Diosc. Plin.

Plin. Mus.

Locus.

Vires & usus. Lac.

Glaux (Γλαυξ) inquit Diosc. Cytiso [cod. Bal. κρυφ.] aut Lenti, similia habet folia, quorum infernæ partes albidiores, supernæ virides sunt; ramulos per terram producit [κλαυξ ἢ ἀνὰ γῆν. Marc. δὲ γῆν legendum censet quinque, aut sex, tenues, palmi altitudine à radice: flores Leucoio similes, sed minores, purpureos. Hæc ita tradit Plinius. Glaux antiquitus Eugalaetion vocabatur, Cytiso & Lenticulæ folus similis, auersa candidiora: rami in terram serpunt quini, senive, admodum tenues à radice: flosculi purpurei exeunt. Plinium Glaucium cum Glauce confunderet scribit Cornarius: dicitque Glaucem herbam Officinis & Herbariis, esse hodie ignotam. Dioscoride & Plinio autoribus inuenitur iuxta mare.

Hæc cocta cum farina hordeacea, & sale, & oleo, atque sic absorpta, lac in mammis extinguitur nutritibus reuocat, Diosc. Acuius lectione recessit Plinius, scribens: Coquitur in sorbitione Similaginis, ad excitandum vbertatem lactis: eamque qui hauserint, balneis vi conuenit.

GLAUX LEGVMINOSA
Herbariorum.Descriptio
Caulis. Radix. Folia.

Flos.

Glaux.

Locus.

Caulis assurgit rotundo, pedali radice, exili, singulari, nitente, à qua statim folia erumpunt Ocymoidis, aut Halimi, albida, glauca, oblonga: à medio autem caule aliquàmula exeunt minora, minutim, Lentis modo, aut Viciæ diuisa. In summo caule pallido, conspicui flauent, aut puniceant flores, congesti in glomerulum, ex calyculis multis conflatum, ob idenubus squamosis folliculis, acerosisque velut glumis, ubi semen. Tota planta lato aspectu.

Glaux, vel Glaux quædam leguminosa Herbariorum floribus purpureis, Lob. & Pena Adu. Ast dicant, qui sunt Herbarii illi, qui memineruntque obsecro similitudo Ocymi, aut Halimi, Lentis, aut Viciæ.

Iuxta agrorum, viarumque margines obuiam sese dat in Francia, Anglia, & Belgio, iuxta autores.

TRIBVLVS TERRESTRIS.

CAP. XL.



Prolixam latis agit radicem, fibris capillaribus donatam: coliculos emittit plures, palmates, aut etiam dodrantales, ramis multis diuifos, albicantes, per quos folia pinnata Lenticulæ, incana, pilosa: flores pediculis infident, è sinu foliorum ortis, lutei, parui, quibus succedunt muricata capitula, spinis maiusculis ha-

rentia, ad Spinachiorum accedentia, semen continentia.

Tribulo (Theoph. tradente) peculiare est, quod integumentum fructus aculeatum gignit, Tribuli ge. nera Theophrasti. Duo eius genera. Vnum, folium Ciceris [Theoph. δὲ γῆν] habet: Alterum spinosus est folus. Humi iacent ambo, & quaquauerfum ferè disperguntur. Serius germinat, qui folia spinosa habet, & circa villarum septa prouenit. Semen præcocius [Tribuli] Selsamo [Theoph. δὲ γῆν] simile, Serotini verò rotundum, nigricans, siliqua clausum. Cæterum Tribulus spinosa planta est, ac arnicaulis, qui iuxta folium aculeatum, altero quoque folio conditur. Hic potè vel semine aculeigero constat: habet enim in semine aculeum: Qua de causa id quoque proprium ei (ut sic loquar) præ omnibus licet vtiq; adnotare. Ad hæc folium iuxta aculeum gerit.

Tribulo terrestris inquit Diosc. [Theoph. δὲ γῆν] solis quidem est Portulacæ [Theoph. δὲ γῆν] Lob. putat legendam Araci] similibus, at tenuioribus: viticulis verò [Theoph. δὲ γῆν] Vetus Cod. Lacus. & Oris. pet terram sparsæ, in quibus spinæ sunt rigidæ, prædura: iuxta omnes & rudera nascitur. Græca verò Diosc. verba sic habent: τὸ ἀντικατὰ τὴν γῆν, quæ sic reddidit Ruellius: Viticulis in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, quæ Ruellius versio non ita aridet, ut Cornarii, qui legit: & fermen- ta per terram sparsa: & in ipsis sunt spinæ acerbæ: siquidem illud, τὸ ἀντικατὰ τὴν γῆν, non videtur referri ad eam, sed ad spinas.

Tribulo proprietates [ait Plinius] quod & fructum spinosum habet, & secundum spinam folium. Eius genera duo. Vni Cicerulæ [Theoph. δὲ γῆν] folia. Alteri, aculeatis. Hic & serius floret, magisque septa obsidet villarum: Semen ei rotundius, nigrum, in siliqua: alteri arenaceum: [alii Acanaceum legunt vulgata exempl. Theoph. δὲ γῆν, Hist. Lugd.] Lolium & Tribulum, & Carduum, Lappamque non minus quam Rubum, inter frugum morbos potius, quam inter ipsius terræ pestes numerauerim. Et hæc de Plinii sententia.

Sed

Sed Tribulum frugibus infestum esse, vel ex Virgilio manifestum est, nam ita canit:

*Lappaque, Tribulique, interque micentia culta
Infelix Lolium, & steriles dominantur Avena.*

Tribulus Theophrasti, Veneti vocatur *Basap*, inquit Anguillara, Tribulus terrestris (autque Bellon.) vulgò in Creta vocatur *Aeriuolo*. Tribulus sacrarum literarum, in Gallia non prouenit.

Esse [ait Clus.] Dioscoridis *τριβυλον χερσαιον*, Tribulum terrestrum affirmare non velim: sed optimè quadrare videtur. Alteri ex terrestribus Theophrasti descripto, *αερνιον* videlicet, tamen hic non sit valde præcox, locis saltem ubi obseruabam. Hisp. *Abrojos* appellabant: folia sunt subatri gustu, cum quadam adstrictione: fructus quinque-partitus diuisus (quatuor spinis singulæ diuisuræ constant) in quo totidem semina: radix interdum minimi digiti crassitudinem æquat.

C. Bauh. in Matth. Tribulus terrestris folio Ciceris, Theoph.

Soliti erant (vt Adu. annotant) proicere hosti murices infestis aculeis armatos: quos quia prætererentur, *τριβυλον* nominabant: vnde huic siliquæ plantæque muricæ Tribuli nomen. Senensi duo Tribuli. Alter, quem Pisis à Cytindro missum scribit. Alter, Dioscor. foliis Portulacæ quem in Veneto littore vidit. At quidam peti- tus locorum illo- rum & herbarum Italus nobis dicebat Senensem illum prædictum Commentatorē nunquam nisi aridum, aut pictum vidisse vulgatissimum Tribulum, eoque describere nesciuisse: deinde Portulacæ marinæ illic frequentem pro Tribulo Portulacæ foliis accepisse.

Τριβυλον χερσαιον, Tribulus terrestris dicitur [inquit Hist. Lugd.] quod siliqua, plantaque muricata sit, It. Tribulo terrestris, Arab. simpliciter Tribulus *Hasab*, siue *Haserk*, Hisp. *Abrojos*, & *Abrothos*.

Terrestris autem Tribulus [*τριβυλον χερσαιον*] dicitur [teste Dod.] ad differentiam alterius in aqua nascentis. Est autem duplex *φυλλακάρδος* (spinoso-folio) & *αερνιον* [præcoxus.] Cum *αερνιον* autem Theoph. hic magis convenit, quem & terrestris Theoph. Tribulum, non omnino abs re, quis nuncupauerit. Dioscorides enim, qui vnius terrestris tantum meminit, hunc omisit. Suum siquidem Tribulum, non Ciceri, sed Portulacæ, similia tradit habere folia, ac tenuiora, & *αερνιον*, siue tenuiores, tenerosque ramulos, per terram stratos, in quibus spinæ acerbæ & duræ. Qui certe Tribulus *φυλλακάρδος* magis similis est, quam *αερνιον*, siue præcoquo.

Ceterum, Tribulus terrestris Veterum & Recentiorum, Calcitrapa à quibusdam esse censetur.

Ad arnorum semitas, in quibus Melopepones salmanticæ feruntur, frequentissimè prouenientem reperiebat Clusius, hortulanis valde molestum, & exosum, quoniam fructus eius [qui per maturitatem facile de planta decedit] firmis aculeis pedes illorum nudi grauitè offunduntur. Florebat isthic Iulio, semen verò Augusto & Septembri maturum. Meminit etiam olim Monspeliano agro obseruare, sub ipsis ferè vrbis moribus inter oliueta, vt & Lobel. qui dicit: Videas pratenses, puluerulentas, & fabulosas plantitas maritimas Adriatici, Thyrræni, & Gallici Mediterranei maris isto Tribulo itineranti infestas & propemodum imperu- as. In Lio Venetæ postremum insule fabuletis, cuius Pharmacopæorum

Tom. II.

notissimum dicebat Italus, eoque minimè Pisi accensendum. Hunc vidimus nos, flores & semina ferentem hiesse Augusto, in fossis circa Monspelium prope muros exedificatos à Papa Urbano. Montbelgardi prouenit in horto Ill. C. Vvitt.

Adstringit & refrigerat: estque omnis inflammationis cataplasma. Cum melle verò seruida oris vlcera, & tonsillas, & putredines in ore sanat, & gniguias. Exprimitur & succus ex eo ad oculana medita- menta. Fructus ipsius viridis potus, calculosis prodest. Drachmæ quidem pondere potus, & impositus commor- sis à vipera particulatim opitulatur. Commodus est etiam ad lethalia medicamenta, cum vino potus. Decoctum respersum pulices necat. Ceterum, qui ad Strymonem fluuium habitant Thraces, viridem quidem herbam equis in pabulum dant, fructum verò, qui dulcis est, & probè nutrit, in panes effingunt, ipsoque pro pane vtuntur. Hæc ita Plinius tradit. Succus ex hoc colligitur ad oculorum medicinas. Est enim refrigerantis naturæ, & idè utilis contra inflammationes, collectionesque. Vlcers per se erumpentia, & præcipuè in ore, cum melle sanat. Item tonsillas. Potus calculos frangit. Thraces, qui ad Strymona habitant, foliis Tribuli equos ligant. Ipsi nudo viuunt, panem facientes prædulcem, & qui contrahit ventrem. Radix castè pureque collecta, discutit strumas. Semen adalligatum, varicum dolores sedat. Tritum verò, in aqua sparsum pulices necat. Galenò teste: Dominatur in hoc terreum frigidum, quod adstringens etiam alibi ostenditur. Et propterea ad inflammationes, dum adhuc generantur, & omnino ad omnes inflammationes commodat. Fructus, qui tenuium partium est, calculos in renibus atterit potus. Et quam Galenus Dioscoridem sequutus terream & frigidam qualitatem huic tribuat Tribulo, Saluatienses tamen eius decoctum, ad pituitam, crassosque humores incidendos, & euacuandos felici successu clysteribus iniici prodebant, teste Clusio. Nullius hodie commodi, nisi Alinis quibus pabulum est, Lob.

Vires & visus.
Inflammationes
Oris vlcera
Siccitas

Panem
fructum
Oculi.

Radix
ma

DE LOTO IN genere.

CAP. XXXXL

IN genere de Loto verba facturi, hanc duplicem agnoscimus. Est enim & *Lotus arbor*, de qua Historiæ libro 2. diximus: & *Lotus herba*, de qua nunc agemus. Quæ autem Theoph. in pluribus formis est, & ferè cen æquiuocis: Huius enim species plurimæ sunt, differentes & foliis, & caulibus & floribus, & fructibus.


Lotus [inquit Diosc.] quam aliqui Trifolium vocant, folia habet terna, Loto arbori similia. Censendum autem est, Matthiolo teste, Dioscoridem Trifolii huiusce folia, Loti arboris comparasse foliis, non quod terna folia Loto, perinde ac Trifolio, ex vno pediculo exeant, sed quod vnumquodque per se Trifolii Alphatidis folium, Loti arboris folium referat. Ceterum in caule tantum [autore Theoph.] foliata Lotus.

Lotum porro satiuam, & silu. ac Egyptiam, Arabes indifferenter vocant *Hamdashocha*, *Garcha* & *Thusa*.

Lotus arbor

Lotus herba
æquiuocum
est

8



Trifol. filiquosum

Lotus pentaphyl-
lus. Czfalp.
Melilotus vul-
gè appellatus,
cuius flores
officinæ pro
Melilotis. An-
tiquorum sub-
stituunt, quâ-
vis autem iis,
præter colorem
croceum nulla
qualitas legiti-
mi Meliloti in-
sit. Tabern.
Trifolium fili-
quosum. Bonnus.
flein schwe-
tenflee.

Trag. An
Hist. germ.
Edeler sicilicet

flee. Dâß sibentgeschlecht potest esse Serapio-
nis Melilotus, non tamen malè conuenit cum
Hedysaro Diosc. quod Pelecinum vocat, & quo-
rundam Securigadacum. Nostri Herbam flauam, &
Herbam leporinam vocant: quidam etiam
Unser frauen schüchlin esse volunt. Hanc idem
in Hist. lat. nati tradit in agrorum limitibus &
secus itinera, hoc quidem titulo: Aliud quoddam
Meliloti genus, Melilotus nobilis, Meliloti septimum
genus. An insuper eisdem Hist. germ. Lagopus,
basenfuß / quem Diosc. non describit, nec etiam
Gal. Egineia, & Plin. ex denominatione tamen,
ut etiam ostendit Apuleius, apparet herbam simi-
lem pedi leporis, nullam igitur nouit plantam
præter flores quosdam, è genere Trifolii, & Loti,
quæ planta eisdem Gen. vocetur basenfußlin:
existimat autem verum à antiquorum, di-
ctum Dioscoridi Leporis Cyminum, & Lepori-
num pedem: Basenflee. Hanc suspicamus nos
Lotum urbanam Matthioli.

Lotum pentaphyllum Gesn. dixerit herbam,
quâ imperiti quidam pro Melilotis hætenus
abusi sunt: in odorem proflus, Gâle Tubenfrö-
pflee, cuius species duæ sunt. Matthiolum Lotum
urbanam nominare non probauerit, sed Lotum
Fuchsi putarit.

Meliloti alterum genus. Fuchf. Melilotum ger-
manicam vocauit, quod in Germania pro vera
Melilotis sit usurpanda ob additionem. Hanc
suam autem opinionem stabilire nititur antiquo
manuscripto Herbario, qui hanc pro Melilotis
pingat. An de hac Ruell. sciens in pratis herbam,
quam officinæ Andachocum & Coronam vocant
regiam. Sed an Lotus sit urbana non audeat asse-
rere, quod à Diosc. non describatur. Sunt tamen
inquit, qui verum Melilotum defendant.

Nulla certe hætenus Matthiolo sese obtulit
planta, cui Lotus urbana meritis subscribi possit:
hæc est, inquit is, vera ac legitima Lotus flaua.
Sunt tamen alii, qui existimant, eam plantam Lo-
tum esse urbanam, quam vulgares herbarii, &
officinæ Melilotum falsè appellant, ut potè quæ
solus constet Trifolii effigie, nascaturque non in
pratistantiis, sed etiam in viridariis & hortis.
Verum horum sententiam cur planè probem,
aut refellam, nihil equidem habeo, cum iis
potius opinione duci, quam rationibus, aut au-
toritatibus niti videantur. Inclinat tamen ani-
mus ad credendum, quod ita, ut illi sentur, facile
esse possit. quandoquidem vulgaris Melilotus &

in hortis provenit, & folia Trifolio proxima pro-
fert: quin & omnibus notissima est herba, que-
madmodum Lotum urbanam olim fuisse, aperte
innuit Diosc. qui eam ut triviale non Hepinxit.
His illud accedit, quod in hunc usque diem pro-
prium ferè seruauerit nomen, eo tantum aucto-
re Loto in Melilotum: unde postea facile fa-
ctum esse potest, ut eadem legumina Meliloti lo-
cum occupauerit. hæc ille: Qui sub titulo Loti
urbanæ ponit iconem Loti nostræ corniculatæ
glabræ, quam Melilotum quoque officinarum
nominare videtur. Verum hanc suo more non
describit. Eliget retineat in post. com. cum mag-
fig. maiorem verborum prædictorum partem,
omissa tamen in his iconibus & in Epit. aliam re-
ponit, Trifolij scilicet odorati, sub eodem Loti
urbanæ titulo.

An Amato Lotus filu. Trifolium filu. Offic. Meli-
lotum: Hist. Latic. Melgar: & Ital. Gal. Melilot.
Germ. Guldensflee oder Steinflee

An Brunl. Tom. 1. Rhaph. 14. Trifolium 7. flore
luteo, Latinis Leporaria vocatum?

Lotum filu. non tamèn Dioscoridis Dod. gall. vo-
cat. germ. Wildenflee, Steinflee / Edelsteinflee
Dogels wicken / Unser frauen schüchlin. Gall.
Trefle sauage: autne Belg. Steendäueren / &
Geelsteendäueren wilde cläueren, & quibusdam
Dogels Däsen. Quidam, at ipse, Meliloti spe-
ciem putant, idèd vocatur latine Melilotus filu.
aut Melilotus germanica.

Trifolium corniculatum primum, similitudinem
maximam habet (eodem teste in fol. & de frum.)
cum Serapionis, & Isaac Melilotis, quam alschle
sue Melich vocant.

Lonic. Melilotus germanica, & Herba flava, Loti
filu. 9. species.

An Lob. & Penz Adu. Melilotus coronata? Non
de nihilo erat, quod quidam persuasi fuerunt,
illam Lotum, quæ siccioribus pratis & viarum
marginibus latatur, Sertulam esse campanam,
aut saltem pro Melilotis esse vtendam. Plebi gal-
licæ Corona regia dicitur, indidemque Romanis
Sertula forte dicta. Ea Pharmacopœi, Galli præ-
ferunt, plurimum vtuntur æquè tunc atque Meli-
loto. Nusquam non Angliæ, Galliæ, Belgæ, fre-
quentissima filiqua Loti siluestris. Item Obs.
Melilotus coronata, Trifolium corniculatum D. d. Me-
lilotus germanica Fuchsi.

An de eadem loquitur pag. 500. Melilotus Adu:
Sertula campana & corona Regis. Angl. Melilotus
It. Melilot, & Trifoglio canallino. Hist. Lugd. Lotus
sativa Matth. Hort. Camer. Melilotus nostra germ.
Hort. Lus. Trifolium filiquosum, Melilotus nobilis
Tragi.

In pratis provenire solet, ac etiam collibus sic-
cis. Genus duas species obseruauit: Hirsutam
florentem Maio & Iunio cum siliquis, quam ma-
rem voco. Glabram alteram, aut saltem pilos ha-
bentem paucos, florentem Septembri secus vias
Montbelgardi & Basileæ, quam feminam nomi-
no. D. Agerius attulit ex Italia, cuius radici ad-
hæsit Orobanche patua.

LOTI CORNICULATA MAIOR species.

Est altior multò quàm vulgaris, caulibus enim
E cubitum, ac etiam sesqui cubitum altiori-
bus assurgit: foliis per ramos tribus ex vno pedi-
culo, yncialibus circiter, duobus indè pediculis ex

An Lotus
filu.Autrofolio
fl. luteo.
Lotus filu.
D. d. m. d.
linguar.Melilotus
speciosus.Trifol. cor-
niculatumMelilotus
germ.Lotus
tempus.

Mar.

Femina

Descriptio
Caulis.
Folia.

Flor.

Siliqua.

Locus.
T. Bauh.
v.In Meliloti
specie.Locus.
Locus.Descriptio.
Radix.

Folium.



peribus cau-
lem cūplexis:
flores pecu-
liaribus surculis
& in summo
caule in orbē
congesti, ma-
iores, lutei, fo-
liis quibusdam
coronae subie-
ctis: sequuntur
siliqua nuppe-
rolo, vnciales,
& seiscuncial-
es.


Est C. Bauhi-
no Trifolium si-
ue corniculata-
rum mains &
hirsutum: Locus
pentaphyllus
maior, modus

hirsuta Gelsnero. Meliloti vulgaris alia species fu-
it subhirsuta Celsalpino. Nobis autem non satis-
facit C. Bauh. differt enim Celsalpini Melilotus
altera, à Loto pentaphyllo. Ea siquidem Celsal-
pino breuior est Loto corniculata, & siliqua in-
curua sunt, quae non conueniunt Loto maiori
corniculatae, de qua hic agimus: praeterea Meli-
loti vulgaris alia species Celsalp. in veteribus &
difficili nascitur: nostra autem inter vepres, & spi-
nas, in sepibus.

Trago solet vocatur Meliloti quarta species.
Ser. Viert. Blee / Vogelweiden / quae Serapio-
nis Melilotus esse possit. Ego tamen non ausim
asserere Tragum intelligere Loto corniculatae
maiores speciem, quamvis id suspicer, & eam
Lonicerus quoque sua figura demonstrat. Est
Trifolium corniculatum Dodonaeo tertium, de quo
Tragus. Gelsnero Locus altera maior hirsuta & cre-
ta, gustu adstringenti.

In Dumetis & sepibus provenire, solet inter
Montbelgardum, & Spurbach.

LOTUS CORNICULATA SILIQVIS singularibus, vel binis, tenuis.



caulis exit singularis tenuis, vncialis & longior:
in cuius cacumine, flos luteus, hians, ex cū-

Semper mul-
titudine radice-
rum haret:
caules emittens
rectos, nume-
rosos, pedales,
ramulos, sub-
rubentes: lon-
gis albican-
tibus pilis obsi-
tos: ad quo-
rum nodos ter-
na folia Melilo-
ti nobilis, o-
blongiora, acu-
tiora, binique,
nihilominus,
cauli ad pedi-
culi exortum
enata: ex folio-
rum sinu pedi-

cibus hirsutis: siliqua plerumque singularis [ra-
rissime binæ] vnciam longa, teres, semine copio-
sissimo, ad vicinarium serè numerum, tenui,
Portulacae pari, iusto, rotundo, sapore legu-
minoso repleta.

Hanc attulit Gener Cherlerus ex Gallia Nar-
bonensi.

DE MELILOTO VETERVM

in genere.
CAP. XLIV.

Sertula campana, teste Theophrasto, viridis
Squidem nihil: aut siccata plenius olet, & plus
temporis odorata durat.

Melilotus [M. hirsutus] optimus est Atticus, & qui
in Cyzico, & Chalcedone provenit, quique Cro-
co similissimus [ser. L. 2. c. 9.], Crocum referens. Corni-
& odoratus est. Nascitur & in Campania circa
Nolam, in luteo languescens colore & vergens
[ser. L. 2. c. 9.] & infirmo odore. Sed vocem undique me-
lino colore reddidit Cornarius. Nihil enim aliud
(inquit) vult ea vox, quam coloris similitudinem
in Meliloto, ad Melum Cotoneum.

Ceterum Meliloton Sertulam Campanam Ca-
to dixit: Celsus Sertulam Campanam.

Ita & Plinius L. 2. c. 9. qui appellationis etiam
rationem reddit, quod sit in Campania Italiae
laudatissima. Graecis in Sunio: mox Chalcedica &
Cretica, ubique vero asperis & silvestribus
nata. Coronas ex hac antiquitus fabricatas, indi-
cio est nomen Sertulae, quod occupavit. Odo-
r eius Croco vicinus est, & flos. Ipsa cana placet,
maxime foliis brevissimis & pinguis. Eius-
dem libri c. 11. Melilotos ubique nascitur, lau-
datissima in Attica, ubique vero recens, nec
candicans, & Croco quam simillima, quanquam
in Italia odoratiores & candida.

Sertulam ergo Romani veteres dixerunt, quod
flos eius coronamentis datus sit, & quia ex ea
antiquis coronae & sortis fabricatae sunt: Coronam
autem regiam, quoniam luteis floribus superne
coronatur.

Duorum porro generum Melilotum Anice-
na facit, unam videlicet lutei floris, alteram can-
didi. Anice-na autem Meliloton eandem cum
Dioscoridis Meliloto esse de viribus ac facultati-
bus amborum testimonium in fine adducendum
ostendet.

De Meliloto hanc Serapio. Alkilelmelich [Al-
chilelmelich, corona regia, Ysaac Eben amram]
est herba, quae habet folia rotunda, viridia, & ra-
muli eius sunt tubiles multum, & folia rara, &
fructus habent vaginas, subtiles, rotundas, sicut
virga puerorum parvulorum, & sunt in eis gra-
na pauca, glauci coloris, rotunda, minora granis
Sinapi. Et quod de ipsa administratur, sunt illae
vaginae, cum eo, quod est in eis ex granis.

Hodie vero non omnes Auctores eundem ha-
bent Melilotum. Quidam enim, teste Cordo,
humili stratum Trifolii speciem, quae luteos habet
flores, pro Meliloto accipiunt, sed male. Neque
recens enim, neque sicca aliquam odoris boni-
tatem habet: Melilotus vero fragrantissimum
habere debet, praesertim eius succus. Propterea
hunc Diosc. cum Sampsocho inter alias odoratas
herbas describit. It tamen melius faciunt, qui
Sertulae appellatam Loto siue Trifolii speciem,
pro Meliloto accipiunt. Odorata enim est val-
de, praesertim quae luteos habet flores: hi siccati
melius etiam olent. Dicitur hanc à nobis Trifo-
lium

Trifolium
odoratum
ne Melilo-
tum vulg.

linum odoratum, siue Melilotus vulgaris.

Tragus etiam Melilotum 7. seu nobilem, siue Meliloti exiguae speciem alteram, quae quidem ab aliis Melilotis Serapionis accenseri, ipsius tamen iudicio non male ad Hedysarum, alias Secundacam, & Pelecium fruticem dictum, referti posset, pro Meliloto recipit.

Imperito-
rum Lappae.

Gesnerius ait Loto pentaphyllo imperitos pro Meliloto abusus.

Fuchsius, Meliloti alterum genus, quod Melilotum germanicum vocat, pro vera Meliloto, ob adstrictionem, usurpandum censet.

Matthiolus Lotum urbanam, quam & Melilotum officinarum falsam affirmat, nominare videtur. Pro vera Meliloto, Melilotum vulgi, cuius flores officinae pro Meliloto Antiquorum substituant, quamvis praeter colorem croceum, alia nulla qualitas legumi Meliloti insit, agnoscit. De his singulis agemus sub Loto corniculata glabra & hirsuta, minore.

Dicit quoque Gesn. Melilotum veram Tiguri in aruis, alibique locis arenosis praecipue flore luteo, & alteram speciem albo nasci, eamque vulgus Trifolium aureum appellare. De hac agimus sub Trifolio odorato, siue Meliloto vulgari.

C. Bauhinus Meliloti vulgaris speciem aliam Calsalpini habet, quam nos Lotum corniculatam maiorem facimus.

Melilotum porro Aegyptiis dictam Alchimelech, Melilotum verum potius, quam Lotum urbanam, aut Sertulam campanam dici putat Alpinus. A nobis Melilotus Aegyptia inscribitur.

Melilotum veram, eam esse plantam tradit Matth. cuius flores Germani colligant, ac pro Meliloto passim utantur, quemadmodum & Bohemi, consultius fortasse, quam Itali. Vocatur haec Melilotus falsa dicta, a nobis Trifolium odoratum, seu Melilotus vulgaris odorata flore luteo.

An Medica
sit. fure.

Melilotum adhuc alium vulgo appellatum, siliquis ferentem inceduas, multi legitimam Melilotum putant: sed haec, inquit Calsalpinus, forte ad Melilotum Serapionis reduci potest. An hic Medica nostra silu. surrecta?

Med. fragr.

Theophrastus Loti nomen æquiuocum esse ait, cum eius genera plura sint, inter quæ & illud recensetur, quod Melilotum vocatur, sic enim Calsalpinus legendum censet, non Melias sitos, quod Gaza Mel frugum vertit.

De Meliloto Græcorum non inter Trifolia, auctore Calsalpino, querendum est. Serapio tamen inter Arabes Melilotum intelligere videtur Loti genus, quod Trifolium Balsaminum appellatur, inquit enim Herbam esse foliis rotundis, &c. Putauit autem id à Diosc. Melilotum vocari, colore croci, odoratum. Hanc tradimus esse Lotum odoratam, annuam, flore cæruleo.

Herbz S. Matiz optimè conueniunt, quæ de Meliloto traduntur, tum apud Dioscorid. tum Plinium, & Auicennam. Et hæc nobis est Mentha Saracenica, siue Costus hortensis, de quo H. n. lib. 15.

Nomina
linguarum

Melilotus Græcis, Latinis melilotus, Sertula & Sertula campana, aliis Corona regis, Germ. Steins Hee, Belg. Malloet, Gall. melila, Ital. meliloto & Trifolio Canalepo, Hisp. Corona de rey, Angl. Melilote.

Locus

Hodie probatissima, leguminaque Melilotus, si Hist. Lugd. fides habenda, non modò in multis Campaniæ locis, sed etiam in Gargano Apuliz monte prouenit.

Tom. II.

Melilotus, auctore Dioscoride, vim habet adstringendi, inflammationemque omnem emolliendi, praesertim oculorum, vuluæ, sedis ac testium, si ex passo decocta imponatur; adducto interdum oui luteo affato, aut Foenugræci facinâ, Lini semine, aut Tritici polline, aut denique capitulis Papaueris, Insyrbæ. Sanat & recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite cum terra Chia, & vino, aut galla inuncta. Stomachi dolorem in vino decocta, itemque cruda cum aliquo ex antè dictis leuat. Dolores etiam aurium cum passo mitigat succus ex ipsa cruda expressus & instillatus. Denique capitis dolorem ex aceto & rosaceo irrigatus lenit. Melilotus, si Plinius vera dicit, oculis medetur cum lacte, aut cum Lini semine. Maxillarum quoque dolores leniuntur, & capitis tum rosaceo: item aurium è passo, quæque in manibus intumescunt, vel erumpunt. Stomachi dolores in vino decocta, vel cruda, tria que. Idem effectus & ad vuluas. Testes vero, & sedem prociuum, quæque ibi sunt vitia, recens ex aqua decocta, vel ex passo. Adiecto rosaceo vlinetur ad carcinomata. Deseruescit in vino dolci. Peculiariter & contra Melicerid. efficac. Sed adinuertendum vulgatos codices falsè habere lacte, pro luteo oui: disertè enim in Diosc. *αὐτὸν χρῆσθαι*, legitur. Coptiosior autem, vt Galenus ait, in Meliloto est substantia calida, quam frigida (primi videlicet ordinis calida & sicca, Dod.) habet etiam quiddam adstringens, sed & discutit, & maturat. Vtraque tandem Auicennæ Melilotus odorata est, & nonnullæ amaritudinis particeps, ac simul digerendi facultatem cum nonnulla adstrictione habens. Quoddam porro in Meliloto, vltim sibi vendicent siliquæ, & semina, quæ in eis continentur, ex autoritate Isaac Eben amram apud Serapionem iam constat. Ex quibus facile est conicere, inquit Matth. non esse mirum, si emplastrum, quod de Meliloto Officinis dicitur, sapè Medicos fallat, cum in id legitimi Meliloti seminis farina nunquam recipiatur. Quod autem Diosc. Melilotum tradit adstringentem & malacicam vim habere, sciendum est, ait Dod. eam non habere propriam, sed quatenus in inflammationibus, aut alijs collectos humores discutit ac digerit: nam estenus, quod durum est ac tensum, emollit, quæ propriè non emollitio, sed digestio, & per halitum discussio est, cuiusmodi facultatem *διασπορῆς* Græci nominant.

Vires &
vlus
Inflamm.

Melicerida:
Vlcera cap-
itis Stomachi
dolor. Am-
rum d'or

Plin. corrig.

Temper.

Sus sili-
quæ
seminum

Emplastrum

Diosc. expli-
catur
malacica
vim

MELILOTUS AEGYPTIA ALCHIMELECH vocata.

Supra terram expansa planta est, parua modice repens, serè nihil aut parum in altum se attollens: foliis trifolii siliquosi, minoribus tamen, floribusque paruis, multis, longis, racemi modo ordinatis, croceis, odoratis, à quibus promanant siliquæ paruz, obliquæ: semen continentes minutum, rotundum, subnigrum, declinans ad tubrum, odoris non omnino expers, sapore stipitico, cum aliquo amarore.

Descriptio.

Folia.
Flores.

Siliqua.
Semen.

Melilotum autem, Aegyptiis dictam Alchimelech, Melilotum verum potius puto (inquit Alpin.) quam eam plantam, quæ Lotus urbana, aut Sertula campana dicitur.

Synon.

Huius plantæ semina tantum apud Aegyptios in vsu sunt. Quæ putant si quoad calorem & frigiditatem esse temperata, sed siccare, resolueret, ac suppuritate roborare, ex quo ad hepatis tumo-

Vires &
vlus
Téperam.
Hepatis tu-
mor.

Gg 4



Menstris

Pteris frons
galeaMenstris
Pteris frons
galea

res ipsorum v-
sus apud illos
est frequen-
tissimus: quoniam
sine aliqua re-
laxatione di-
gunt & resolu-
unt. Ad omnes
quoque dolo-
res, quacun-
que corporis
partes occu-
pantes somen-
tis ex ipsorum
decocto vtun-
tur, maxime ad
pleuritidem, pe-
ripneumoniam,
& ad hepatis,
coli, & ventri-
culi dolorem:
quibus dolore

veratis, ipsorum decoctum ad libram bis in die
calidum bibunt. Mulieres quoque vteri stran-
gulationibus, flaubus, ac doloribus eo subue-
niunt, præsertimque ex eo etiam infestationibus
paratis, quæ etiam Fœnugræci, Lanique semini-
bus, paratis, & Camomeli floribus, efficacius ad-
ilhus, & aliarum partium duros tumores admi-
nistrantur, atque ad euocandos menses reten-
tos. Ad robbendum ventriculum: & aperiendas
obstructiones venarum decocto summe profi-
cure vtuntur.

LOTUS SILIQUOSA FLORE FVSCO tetragonolobus.

Descriptio

Radix

Caulis

Folia



Floris

Siliqua

Semen

Culpa con-
trouersiam
longè pulcher-
rima est hæc
Lotus, simplice
radicula, pau-
cisque fibris
donata, nitens:
ex cuius capite
complures o-
runtur caules
cubito longio-
res, interdum
suppares, tere-
tes, hirsuti in a-
liquot illis di-
uisi, procum-
bentes serè.
folia ex certis
interuallis ter-
na iuncta, reli-
quis duobus
semper caulem

amplectentibus, ut in Loto siliquosa interea Mon-
speliensium, vel Loto corniculata, sed longè ma-
iora, hirsuta: flores ex foliorum alis, Pili qui-
dem formæ, maiores, holoserici coccineum,
vulgè dictum satyrium, prouocantes: siliqua sel-
quiancia circiter longæ, angulosæ, crassiuscu-
læ, quatuor membranis, seu ligittum alis ap-
positis donatæ: in quibus continentur semina
magna rotunda, substatia, quæ dentibus testantur,
sapore Pisi.

Lotus pulcherima tetragonolobus, flore ru-

berimo. Pisi rubrum quorundam Camer. hort. & Leonum. Lotus siliqueus rubro flore, Pisi rubrum Oellingeti: Semen eius missum Lupini nomine, licet eius planta Lupino prorsus sit dis-
similis: tetragonolobus non nullorum, & tetra-
eque non minus, apud tamem, nigræ non
nigræ non forsitan appellare liceret. Aliquoties
ex Italia missum semen Sandalide appellatione,
Clusio. Anabididem inquit Anguill. vocant in
Candia edidit. An autem Anguillara hanc in-
telligat asserere non ausim, quia non describit.
C. Bauh. Trifolium 66. siue siliquosum rubrum.

Ante plurimos annos cum ex semine à me fa-
cto planta in horto E. C. Montb. proueniret, Lo-
tus siliquosa, flore fusco denominata descrip-
tione fuit, nec ante à me visa, nec à quoquam de-
scripta. Floret Iulio, semina matura Augusto. An-
nua planta est. Semina eius missa E. C. ab hortu-
lano Ducis Florentiæ anno 1594 cum inscriptio-
ne Semina Sandalide Candia.

Anabidide

Trifolium
siliquosum
rubrumSandalide
Candia

LOTUS SILIQUOSA ALIQVOMODO SI- milis, Coronopus ex Cod. Casl.



Herba
Stella, si
fides iconi ha-
benda, quæ in
codicè Cæsa-
reo reperitur, Descriptio
longè differens
planta est à
Coronopo.

Depingitur e-
nim in hoc Co-
ronopus, re-
nuibus ac viti-
culosis cauli-
calis, ex recur-
tis cornuorum
pedum digitos
referentibus
siliquis, ut ipsa
figura ostendit.
Cæsareani
autem veteris Locum

manuscripti codicis fidem, nobis inquit Dod.]
asseruit Bern. Paludanus, qui huiusmodi Co-
ronopum, qualem icon exprimit, à se visum ac
reperitum haud longè à Tripoli, & ad radices
montis Libani nobis coram narrauit.

Sed inter nothas Coronopæ voces hæc ascribun-
tur. Auzier [Harenaria] & Auzier [sanguinaria]
C. Bauh. Trifolium 57. facit, & Coronopum ex
codicè Cæsareo Dodonzi vocat.

Synon.

LOTUS ORNITHOPODI siliquis.

Vnica ex radice, albâ, duriusculâ, paucis
fibris donatâ, coliculi exeunt aliquot, te-
retes, in aliquot ramulos ex sciscunciali inter-
uallo diuisi: ex quorum geniculis folia hærent
quina, quorum inferiora duo superioribus tri-
bus magnitudine cedunt, nullo sapore manife-
sto prædita. Extrema siliquis occupant lutei,
quales in Loto corniculata glabra, nigris lineis
striati. Quibus succedunt siliqua, ex vno geni-
culo duæ, tres, ac plures, sciscunciam, aut ad
supremum vncias duas longæ, falcata, compres-

Descriptio
Radix
Caulis

Folia

Floris

Siliqua

Facile tamen discernitur, caules habet rectos, robustos, bicubitales, ramosos, minus teretes, quam iam dicti Trifolii, imò nonnihil angulosos, glabros penitus, aut parum hirsutos: folia quina, bina minora, cauli apposita ad pediculorum exortum, reliqua tria extremo harent pediculo, maiora, quibus folia Trifolii illius albi magnitudine cedunt & rotunditate, superant verò lanugine: flores confertim conglomerati priuatis surculis ex foliorum sinu ortis, corollæ instar penduli, albicantes, inferioris folii rostellum atro-purpureo: siliqua in orbem radiatæ, numerosissimæ, tenues, 24. interdum, omnium pediculis mediocriter breuibus, in surculi caput coeuntibus, vni- cæ breuioribus, teretes, glabræ, fuscæ, seminibus resectæ nigricantibus, paucioribus æquantibus.

Lotus silv.
Diosc.

Lob. & Penz Adv. Lotus silv. Diosc. cuius caules numerosi, bicubitales, à radice lignosâ, fibrosâ: folia terna, mollia, rotunda, fusco virore, lœuia: flores lutei: vaginulæ numerosæ, teretes, rubentes, nitidæ, intus semine sinapi par- ticulario colore. Sapor, qui leguminum quo- rundam & medicatus. Item Obs. Lotus silv. Adv. Hisp. Trebol. Sainage.

Lotus Liby.

Hist. Lotus Lugd. p. 509. Libyca Dalech. siue Lotus silv. flore ex albo subrubente, qui cum Loto Diosc. maximè congruere videtur, ita scri- bentis: Silv. Lotus, quam aliqui Lybicam ap- pellant, plurima quidem in Lybia gignitur (sic enim ex greco legendum: *ἡ λωτὶς ἐν λυβίᾳ*, non ut vertit Ruell. Lotus silv. quam Trifolium minus ap- pellant, absurdè, quoniam planta cubitalis & sæpe maior, ac ob id Trifolia omnia magnitudine su- perans, Trifolium minus rectè dici posset?) caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multifoliis, Loti Trifolii pratensis similibus (non ut Ruell. inter- pretatur, foliis Trifolii pratensis.)

Trifolium
silv.

Oxytrichum
Lotus silv.
Egyp.

Monspeli (inquit Clus.) Trifolii genus repe- ritur, cubitale aut amplius, & quodammodò fruticans ad lœuam pontis luuenalis, quæ ad Gra- montiam siluam iter est, ad Ledi fluminis ripam quod nonnulli *Oxytrichum* Scribonii nuncu- pabant, aliqui *Lotum silv.* nec desuerunt, qui in- ter Cyusi genera ceterent. Similem porò, si non eandem, apud Granatenfes obseruabam, cu- bitali altitudine, & multis ramis præditam, per quos secundum nodos, & ramulorum diuica- tiones sparsa erant terna semper folia, vni petio- lo inhaerentia: flores summis ramis nascebantur, pusilli, candicantes, in globum quodammodo congesti: quibus succedebant cornicula, siue lobi, semen exile, rotundum, nonnunquam oblongiusculum, continentes. Eius autem plan- tæ duplex erat genus: vnum, candidioribus ra- mis, & albâ radice: alterum, caule & ramis ex al- bo purpurascens, similiter & radice, quæ ta- men in quibusdam plantis magis rubere vide- bantur: Granatenfis quidam Medicus Lago- pum esse volebat, refragantibus tamen notis. Ioannes Placa Professor in Academia Valentina [in quo regno frequentem obseruabam] *Peremp- sanam* Arabum vocabat, eamque duplicem facie- bat: primam, humidis nascentem, Granatenfi si- milem: alteram, montanam lanuginosamque. Granatenfes Mauritani *Enziar* suâ linguâ ap- pellabant, & ex viriusque radice, quæ satis crassa, & magnâ adstrictiōnis particeps est, præsertim autem ex rubescens, serapium cor. faciebant ad dysenteriam vile. Huius semen ex Italia missum *Loti fruticosi* nomine, & natæ ex eo plantæ. Et hæc Clusius.

Peremp-
sa Arabum

Enziar.


Loti fruti-
cosi

Nobilitate & doctrinâ insignis Medicus Iac. Vterhosius. misit Monspelio nomine Trifolii Scribonii. C. Bauh. phyt. Trifolium 46. siue rectum Monspeliensium flore rotundo.

Monspeli prope aquæ. Semen missum Flo- rentiæ per D. Iosephum Casabonum nomine Trifolii fruticosi Candide, satum Montheigardi id horto Ill. C. W. prouenit: erat semen mini- mum nigrum in parua & tenui siliqua: nos re- seruamus in olla Hieme reponenda. Ad ripam (ait Hist. Lugd.) Ledi amnis haud procul Mon- pelio in stagnum maximum defluens vlitur. In Angliæ vdis.

TRIFOLIUM ALBUM, RECTUM

hirsutum valdè.



M^{ultis} hoc Tri- folium ex ea- dem radice stolonibus, re- ctis, cubitali- bus, & bicubi- talibus fruti- cat, gracilibus, lignosis, tere- tibus, hirsutis, & ramosis: fo- lia canâ lanu- gine pubes- cunt, terna, quadam sub- rotunda, po- tissimum prio- ra & parua, cum, paruis duabus appen- dicibus: supe-

riora in obtusorem mucronem delinunt, & ex his quadam maiora, ad quæ appendices, etiam magnæ, ita ut sint quina folia, sapore insigniter citra morsum vllum, aliâ uero asitâ qualitatem adstringente: flores extremis ramulis emicant plures iuncti, positi patulo: singularium forma, quæ Trifolio Asphaltio, sed color candidus, ex calyce valde hirsuto & viroso: iuxta calyces & flores foliola longa, breues, crassiusculæ superue- niunt siliquæ, coloris spadicei, forma stercoris magni muris caudati: semen in his hauescens.

Lotus siluest. quam copiosam in Lybia gigni tradidit Dioscor. an nascatur in Italia non auiam [inquit Mauch.] affirmare. Equidem herbam quandam sepius vidi ac legi in incultis & pratis nascentem foliis Trifolio æmulis, bicubitali cau- le, quàm plurimis adnatis, luteis floribus, è qui- bus cornicula prodeunt semine plena, Fœnugræ- ci, modo, odore non ingrato. Sed an hæc sit ve- ra Lotus silv. nondum compertum. Ceterum turpi erroris notâ inurendus est Matthioli, ut qui figuram absque descriptione proponit, ha- bet is quidem descriptionem, sed ex Diosc. repe- titam, addito luteo florum colore, quam inpos- sit. com. simul cum figura demit, & substituit Lotum satiuam pro syluestri. Eius patronus o- missâ priore figurâ Lotum etiam satiuam sup- posuit non factâ mentione prioris iconis. Figu- ra igitur, quam olim exhibuit pro Loto Libyca in multis conuenit cum nostro Trifolio, albo, re- cto, hirsuto. Alia species est Medica, siue Trifo- lii peregrini Dodonæo gall. quam aliqui Glaucem

Defec. Com-
les.

Folia.

Sapor.

Flora.

Siliquæ.
Lotus silv.
Libya

Notatur
Mauch.

O. Bauh.

itali

Anthyllis.
Polygala

Oxytriphyl-
lum. Trifo-
lium candi-
dum. Cytis-

Lot. var.

Per lepori-
mus.
Dorycnium

Lotus fil-
iquosa

Trifolium
filiquosum
C. Bauh.
per.

Locus

Locus

Tragos in-
terfrager

Tragos
Scorpius

Tragos
Scorpius

Scorpius
Theophr.
Stipa

[talio Gese. hort. in append.] existimant, alii Anthyllidem, Polygalam alii. Verum Dodonæi iudicio maiorem videtur habere similitudinem cum Oxytriphyllo, à Scribonio descripto. Idem in hist. frum. & in sol. Trifolium candidum vocat: quod studioforum plerique Glaucem, alii Cytisum faciant, nonnulli herbarii Oxytriphylon. At Scribonii Oxytriphylon à Trifolio bituminoso non differt. Cytisus sicut est. Cum Glaucem autem similitudinis quoque nihil, aut exiguum habet.

Lot. & Penz Oxytriphylum alterum Scribonii, & herbariorum, quorum Icon displicet: siliquæ enim longiusculæ, quales solent esse in Trifolio recto Monspelianno.

Trifolium autem, de quo hic agimus, Valer. Dourez Oxytriphylon Scribonii Lægi vocabat, vti comperimus eius manu adscriptum. Missum etiam Monspelio per Nobiliss. virum D. Jac. Vtenhouium Medicum, cum hac inscriptione. Trifolium candidum Dodonæo. Inter meas plantas Monspessulanæ inuenio me adscripsisse, *Pes leporinus, Glaux quibusdam.* Dedit plantam siccam D. Rentzius, hoc titulo: *Elycnium Casabona Florentia & in horto Bembi.*

Frater attulit nomine Loti siliquosæ collectæ in via Monspelio versus Frontignanum, ei in Phytopinace dicitur Trifolium 62. sine siliquosum villosum. Cur autem hoc Trifolium ei dicatur 62. non videmus, potius erat dicendum 47.

Locus filu. Matth. appellatur ab Hist. Lugd. An Cæsalp. Glaux, quæ in asperis nascitur, præcipue maritimis?

Gencuz nobis in horto prouenit. Abundat teste Lobelio & Pena Monspeli iuxta Gramontiam filuam. D. Agerius attulit ex Italia cum Orobanche adhærente radici.

TRAGOS DVPLEX CÆSALPINO.

Post Trifolia, Medicam, Lotum corniculatam, Glaucem, Polygalamque, Cæsalp. Tragum ponit, eamque duplicem tradit, ita scribens: Tragos in maritimis nascitur: ramulis multis ab eadem radice procumbentibus in terram, lignosis, tenuibus, dodrantalibus: foliis pusillis, nigricantibus: in cacumine flosculos candicantes fert: & fructus Glauci similes, sapore vehementer ascripto. Alterum genus in totum grandius, bicubitali altitudine: folius Glaucis, latioribus, vtiq; sapor acerbis, tum foliis, tum fructui, qui velut grana Tritici asseruata, & in aculeum, infissum tamen, definit. Dioscorides hoc nomine vnam numerat: inter fruges alteram, quæ & Scorpius vocatur, in maritimis nascens, pusillus frutex in terram procumbens, oblongus, non magnus, dodrantalis, aut maior: folia autem non habet: in ramis veluti acinos pusillos, rufos, magnitudine Tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente, numerosos. Plinius inquit, Herba Tragos, quam aliqui Scorpion vocant, semipede alta, fruticosa, sine foliis: pusillis racemis, rubentibus: grano Tritici, acuto cacumine, & ipsa in maritimis nascens: alibi eandem Tragion, & Scorpionem vocat, veprem sine foliis, racemis rubentibus ad medicinæ usum. Sed quod sine foliis traditur, repugnat prædictæ plantæ: At suspicor hanc conditionem adiectam esse propter æquiuocationem: cum Scorpio Theophrasti, quam Theodorus N. pam vertit, cui nulla folia, nisi spinæ pro foliis habeantur, vt in Asparago, quod Plinius significauit cum de Tra-

gio [Trago] dixit, veprem esse sine foliis, non enim Tragos spina est, sed hoc Nepz Theophrasti conuenit. Hæc Cæsalpinus, qui quas plantas tradat pro Trago perquirant Lectores. Quam dicit flosculos & fructus ferre similes Glauci, Trifolium album, rectum, hirsutum valde, iudico, Dodonæo Trifolium candidum dictum, de quo præcedenti capite locuti sumus.

Considerandum an primus sit fortè, quod Monspelienses Dorycnium vocant. Nostrium Trifolium rectum Monspessulanum dicerem Tragum secundum Cæsalpini, si responderet fructus, siue seminis descriptio: planta alioqui multam habet affinitatem cum eius Glaucem. Neuter porro Tragus cum Trago Diosc. conuenit, & Plinii, qui bene representatur Hist. n. lib. 2. per vnam marinam, vbi Tragi æquiuocauerunt.

ABSVS FOLIIS TRIFOLII.

CAP. XLV.



Est herba palmarum magnitudine, vel aliquantè maior, foliis trifoliis, sed rotundioribus, quaternis singulæ alæ appensis. Flores patuos, albos, & semina Piri seminibus proxima ferens, quam Prospero Alpino de plantis Egypti, cap. 31. teste, incolæ sermone vernaculo Absus vocant.

Cæsalp. cap. 2. lib. 2.

An Dorycnium

Cæsalp. rati. prob.

Flores

Locus

TRIFOLIUM HALICACABVM, SIVE velicarium.

CAP. XLVI.

Caules fundit cubito longiores, villosi lanugine obductos, in ramos alternatim ortos, diuitos: folia terna, non raro quaterna, sena, aut septena, hirsuta, ita certè vt extremum folium longè reliqua magnitudine excedat, Oleæ folio maius: ex alarum ortu proueniunt pediculi, quorum cacumini insident flosculi lutei, parui: quibus succedunt insignis magnitudinis turgida vesica, sulca, lanuginosa, semina claudentes duo, teste Dod.

Diosc. Cardo

Folia



Arachis similia. Cicer. filu. al.

Cicer. filu.

Arachis

Dodonæo. terum, Dodonæo missum ab Alphonso Paucio, Acad. Ferrar. Professore. Sed non placet pro hoc apud Dod. poni iconem Ciceris filii trifolii, ni forte error Typographi, qui posuerit alterum pro tertio.

Dorycnium. Inuenitur [inquit Anguill.] planta admodum similis Dorycnio: verum quum nesciam an sit somnifera, non possum illud certo statuere.

Trifol. Halicacabum. Camer. Trifolium Halicacabum, seu Trifolium vulgò dici ait, aliis verò Cicer. filii. quibusdam etiam, ac satis ineptè Dorycnium. Folia plerumque quaterna, vel quina gerere, vt Loto annumerandum videatur.

Locus. C. Bauh. phyt. Trifolium ss. siue Halicacabum. Scribit Clus. Trifolii quoddam genus, satis amplis foliis pro plantæ exiguitate, à magnis & membranaceis vesiculis, quibus semen suo pericarpio continetur, appellari.

Locus & tempus. Montbelgardi prouenit mihi in horto Ill. Ex. C. V. Vitt. ex semine Francofurto allato, quod adhuc Octobri floruit, & semina protulit.

cilè animaduertent, quibus nota erit planta, cuius picturam exhibet Dod. Quznam obsecro similitudo cum Lente, qualem in Anthyllide requirit Dioscorides.

Gal. de hort. *Vulneraria Consolida*, aut sideris. *Vulneraria* *Sideris* *cognomine rustica*: quidam Germani inquit simpliciter wündkraut in Bernensium agro Gachheil nominant.

Lob. Obs. Anthyllis leguminosa Belgarum, Anthyllis prior Dod. *Glaux quorundam*. Ic. Pl. Anthyllis leguminosa Belgarum.

Hist. Lugd. *Lotus latifolia Dalech.* cui flores priusquam aperiantur subrubentes, cum reclusi sunt lutei. Semen paruum in breuib. siliquis. Anthyllis quorundam maior. Item alibi Anthyllis prior Dod. Si Rapsodus aliquid peritiei habuisset stirpiem, non posuisset figuras & historias vnius plantæ in diuersis locis.

Tab. Lagopodium flore albo weisser Barzenflee. Et rursus, *Lagopodium flore luteo*, Geeler *Bas Tab. repr. sentlee*. Sed Compiler Tab. non demonstrat ubi obseruauerit flore albo, nec etiam describit vt oportebat.

Clus. anthyllis leguminosa flore luteo Lobelii, cuius genus purpurascens flore Ferraria accipere meminit.

Ponz in Baldo *Glaux Guilandini & Belgis Anthyllis leguminosa*.

Vulneraria rusticam, siue *Panaces Chironium* lzue denominatum Gelnero, & vulneribus admotum commendatum, vidi Geneuz, Lugduni, & passim in Germania florens mense Maio: Montpelii vidi flore purpureo mense Martio delatam ex montibus circa Gangen. Gener Chelrus attulit ex montibus supra Apenninum in pratensibus quibusdam Iunio collectam, flore [vt ait] sanguineo, vel rubro, & ex Gotthardo flore exquisitè albo. In aridis quidem [vt refert Hist. Lugd.] inacris, & sabulosis prouenit, & agrorum marginibus, Lob. teste, Lutetiani agri, Narbonensis, Germaniæ & Angliæ. Brabantis hortensis est. Dod.

VVLNERARIA RUSTICA.

CAP. XLVII.


Descriptio

Caulis

Folia

Super

Thyrs



Radix longa, recta, lignosa, sapore leguminoso: caules dodrantes, teretes tenues, hirsuti, nonnihil rubentes: folia pinnata, Galega, pinguicula, infernè hirsuta, modicèque canescentia, supernè ex luteo vire-scentia, sapore subdulci & subacri, atque in extremis ramis floribus subiecta sunt, lata

sunt, digitata, oblonga, membranacea: flores in ramulorum fastigio glomerati, luteoli, odore nullo eccellente: quorum singuli ex vesicula lanugine argentea, villosa emicant, parui, folio supremo reflexo, sub quo lateralia duo parua, quantum minimum rostratum stamina lutea continen-tem amplectuntur.

Synon. & Nomina. Dod. dicitur gall. Anthyllis prior, Anthyllis magna, wündkraut Diosc. Anthyllion, anthyllion & anthyllion Plinii. Glauciola quorundam, à nomine Glaucæ, quia Glancem existimant, quamuis non sit vera Glaux. Eidem in sol. Anthyllis Lenti similis, ab Auic. Zahara vocata: qui sic describit: Herba humilis: cauliculi dodrantes: folia Lentis modo, ex pluribus formata, vtraque verò mollia, tenui lanugine incanescentia: flosculi in cauliculorum fastigiis lutei, complures, veluti in umbella coniuncti, post quos siliquæ parue, in quibus semen exiguum, radix tenuis, duriuscula. Hæc ille, cuius icones propositæ respondent nostræ vulnerariæ rusticæ, verum discrepat eius descriptio, & multò magis gallica. Nec conuenit ea planta cum Anthyllide Diosc. quod fa-

Glaux non vera Zahara Auic.

Dod. error

Anthyllis Diosc. non est

TRIFOLIUM IN GENERE.

CAP. XLVIII.

Trifolium, Triaphyllon Græcè, siue Triaphyllon plura complectitur genera, [aiunt Monachi in Mef.] & species & differentias.

Multa sanè [teste Brunfelsio.] Trifolia sunt genera, quorum septem in recepto sunt usu. Tametsi porro plura passim in pratis ac viridariis Trifolia inueniantur genera, omnibus planè nota, non tamen de his, vt placet Matthiolo, tradidit Diosc. cap. de Trifolio, sed de eo tantum genere, quod à bituminis odore Asphaltitis dicitur, de quo etiam scribit Gal.

Innumerabiles authore Trago Trifoliorum inueniuntur species. C. Bauhinus verò septuaginta sibi notas tradit.

Trifolium tandem, tradente Brunfelsio, pratense olus est, & futuræ tempestatis prænuncium. Notum est etiam, quando album Trifolium abundè floruerit, sequenti anno, futuras esse aquarum inundationes. Sophocles venenolum esse putat, nam in eo serpentem inuenies nunquam. Fracast. de cont. Trifolium omne ad contagiones valere scribit.

Nos etiam complures plantas Trifolii nominando.

Trifolium
Herba
aquosa
Foenugra-
cum
Trifol. Af-
phalites.

Lotus (sci-
na odorata.
annua, flore
caeruleo.
Lotus filu.
ex codice
Celsi.
Trifolium
odoratum
sive Melilo-
tus vulg.
odorata
Melilotus
magnos-
mum totum
dorsum.
Trifol. Ital.
sive Melilo-
tus Ital. cor-
niculis in-
curvis
Securidaca
Trifolium
pratense
Trifolium
maius.
purpureum
Trifolium
alt.
Trifol. alpi-
num Rheu-
cum Astra-
galoides

Medica
maior
flor. flore
purp.

Medica ma-
ior
Medica
scutell
Medica
echinata
glabra cum
sive sive
Medica
gnadaria
Medica

ne donatas numeravimus; novimus. Ast sanè inter se longè distantes, si vel radices solum, caules, folia, flores, & fructus, saporem etiam eorundem & gustum, locum item & tempus, vires denique, temperamentum, & usus, trutinà non vulgari pensiculis. Numeravimus autem sequentes. Fœnugræcum, Fœnugræcum filu. Dalechampi. Loti genus edule, inq. Hon. Bello dictum. Trifolium Aphalites, siue Bituminosum à Diosc. traditum. Et aliud huic planè simile, sed inodorum, siue non foetidum. Trifolium item Americanum. Pro Trifolio insuper bituminoso & Oxytriphyllo quidam exhibent Lotum sativum nobis existimatam: Trifolium odoratum Fuchsi. Corn. Lonicero. C. Bauh. Trifol. Caballinum Gesl. Balsaminum Celsipino. Novimus & Trifolium 48. C. Bauh. de quo nos sub Loto filu. ex codice Celsi. Trifolium odoratum Matth. quod est Equinum Dodonæo, Versinum Trago, Aureum Gesnero, nobis Trifolium odoratum, siue Melilotus vulg. odorata, flore luteo & albo. Trifolio huic præcedenti, siue Melilotus vulg. odorata affinem folio angustiore. Trifolium Italicum folliculis rotundis C. Bauhino, quod nos appellamus Melilotum magno semine, rotundo, rugoso. Trifolium Italicum siue odoratum Italorum Gesneri, à nobis Trifolium Italicum inscriptum, siue Melilotus Italica corniculis incurvis. Est & Triphyllon Securidacæ genus. Adhæc Trifolium pratense, cum quo Amatus confundit bituminosum siue Aphalites. Et aliud maius purpureum, brevius & longius spica. Maius purpureum Clusii, siue maius secundum. Acre & maculatum, quod an ad præcedentia, vel sequentia, referri possit, nondum nobis certè constat. Alpinum Rheticum Astragaloides Monanum aliud, minus, Thalia purpureum, varians flore rubro, & albo. Stellatum purpureum Monspessulanum. Angustifolium spicatum, glomerulis Personæ Cbleri. Paruum rectum, flore glomerato cum vngiculis. Capitulo glomerato, rigido. Pratense album, siue mas. Maius albo flore incanum Clusii. Pratense, flore albo, minus, & semina glabrum. Paruum album Monspessulanum, pilosum cum paucis floribus. Albo incarnatum spicatum, siue Lagopus maximus. Idem flore albo. Angustifolium Hispanicum, siue Lagopus angustifolius, flore dilute rubente. Trifolium quibusdam quod vulgè. Lagopus dicitur, nobis verò Lagopus trifolius quorundam. Trifolium caule nudo glomerulis glabris & membranaceis, & Lignosum cum glomerulis. Cum glomerulis ex caulium geniculis. Cum glomerulis tomentosis secundum caules. Folliculaceum, siue Vesicarium minus, purpureum. Paruum quoddam, siue Lotus pratensis purpurea, Dalechampi. Pratense luteum mas, flore minore, semine multo. Saxatile hirsutissimum, siue argenteum. Pellatum Creticum. Trifolii genus procerum Gesnero est Medica vera, à nobis dicta Medica maior, erectior, floribus purpureis. Novimus & Trifolium, quod cognominatur Medica filu. flore luteo, & ruffo. Trifolium cochleatum marinum, aliis Medicam marinam vocatam. Medicam scutellatam, Dodonæi Trifolium cochleatum primum. Trifolium 19. siue scutellatum C. Bauhino; quæ nobis Medica orbiculata. Cochleatum 2. Dodonæi, nobis autem Medica echinata glabra, cum & sine maculis nigris. Trifolium 20. siue cochleatum C. Bauhini, nobis Medica magna turbinata. Echinate magnum hirsutum,

Tom II.

siue Medicam echinatam magnam, hirsutam. Cochleatum fructu duro spinoso. C. Bauhini, siue Medicam nostram hirsutam echinis rigidioribus. Tortuosum quibusdam dictum, siue Medicam minorem Gesneri: an nostram Medicam echinatam hirsutam. Echinate aruense secundum C. Bauhini, quod nobis Medica echinata minima. Coronatum, siue Medicam coronatam parvam Cherleri. Trifolium siliqua falcata C. Bauh. siue Medicam nostram lunatam. Trifolium 29 Trifolium siliqua falcata simile C. Bauh. siue Auriculam muris & leporis Cam. Trifolium halicacabum, seu vesicarium. Corniculatum glabrum & minus C. Bauh. vel Lotum corniculatum nostram glabrum, feminam: & hirsutam, marem. Corniculatum maius & hirsutum C. Bauhini, quod Loti corniculati maior species à nobis appellatur. Lotum corniculatum siliquis singularibus, vel binis, tenuibus Cherleri. Siliquosum luteum C. Bauh. quod Lotum siliquosum luteum Monspessulanum vocamus. Siliquosum rubrum eiusdem dictum à nobis Lotus Siliquosa flore fusco tetragonolobus. Trifolium 57. C. Bauh. quod nominamus Lotum siliquosum aliquomodo similem Coronopum ex codice Celsi. Trifolium siliquis Ornithopodii C. Bauh. de quo agimus titulo, Lotus Ornithopodii siliquis. Trifolium argentatum floribus luteis. Trifolium rectum Monspessulanum flore rotundo C. Bauh. hoc nobis Trifolium rectum Monspessulanum. Trifolium asperum Narbonense luteum C. Bauhini. Candidum Dodonæi, quod nos album, rectum hirsutum valde dicimus. Acetosum, siue acidum flore albo & purpurascens, quod Oxys appellatur. Acetosum flore luteo, à nobis Oxys lutea nuncupatum. Trifolii maioris & scetidi nomine, semen Anonidis non spinosum, purpureo flore, Clusio missum. Aculeatum Creticum. Hepaticum, siue Trinitatis herbam flore caeruleo, multis aureum dictum. Hepaticum flore albo. Hepaticum flore rubro. Hepaticum flore pleno. Trifolium palustre. Fragaria certè, si Tragum sequimur, nuncupamus. Porro Fœnugræcum filu. nobis nominatum, Lotum filu. iudicamus Diosc. quam & Trifolium minus nuncupat Tragus. Sed inter Trifolia etiam recensetur, Melilotus 5. Tragi. Ceruinum aquaticum Gesneri. Adulterinum. Bassi Bartlee Aretii & Iosephi Simleri de albis. Nuncupatur & Trifolium apud Diosc. de Maiorana quoque dicitur, quemadmodum & de Medio. De Orchide [albo, calcari longo] & Staphide agria Monachis in Mel. & de Satyrione Fuchsi de comp. med. Tulipa demum quibusdam, Camer. her. teste, Triphyllum Satirium vocatur. Trifolia tandem arbores & frutices traduntur Hist. n. g. tom. I.

FOENUGRÆCVM

CAP. XLIX.

IN Trifoliorum classem cooptandum merito Fœnugræcum, vel ob folia quæ terna, maiuscula, crenata, modò oblonga, modò latiora quàm longiora, supernè virentia, infernè glauca: tota planta [inquit Celsi] semicubitum non excedit, estque ramosa. Flores ex foliorum sinu exeunt Lupinorum floribus pares, subcandidi: siliqua siliquæ palmates & sesquipalmates, brevissimis pediculis hærent falcata, mucrone tenui, longo, inani

echinatus
magna
fusa
Medica
nata
Auricula
muris
separat
C.

Lotus
corniculatus
glabra
femina
et hirsuta
mas
Loti cor-
niculata
maior spe-
cies

Lotus fili-
quosa flore
fusco tetra-
gonolobus.
Coronopus.
ex cod. Celsi.
Lotus Orni-
thopodii fili-
quosa

Trifol. rectum
Monspess.
Trifol. al-
bum, rectum
hirsutum
valde

Oxys
Anonis
Fragaria.
Fœnugr.
filu. Trago
Maiorana.
Medicum
Orchis
albus, calcari
longo
Tulipa
Arbores

frutices

Deser.

Folia.

phor.

siliqua

Hh

Semen

semen flavescent, odoratum, inaequale, inferiore earum parte continetur ferè quadratum, Cæsalpin. teste, odore quodam, cum decoquitur medicato, succumque reddens glutinosum, seminis Lini modo: radix lignosa, singularis.

Nomen
Telin

Telin, & inter Diosc. reiectancas appellationes τήλης καυτός [fortè καυτός vt Plin.] aliis βέκκας, αἰγώκας aliis, aliis καυτός, aliis λωτός, Romanis Fœnugræcum, Aegyptiis autem ιούης dicitur. Sed maior pars Græcarum appellationum à siliquarum est similitudine sumpta: hæc siquidem corniculis similes sunt. Coraitis quidem simpliciter à cornu dicitur. κέρας enim cornu significat. Sic Aigoceros à caprino cornu quemadmodum à bubulino Buceros, quod nomen Theoph. huic plantæ indidit. Fœnugræcum porro, quod Diosc. Telin vocat, Plinius Siliciam dicit. Columella absque alio attributo Siliquam, Varro Siliculam.

Silicia, Sili-
cula, Silicula

Cæterum Loto silu. semen simile Fœnugræco [τήλης] Diosc. adscribit, sed multò minus: folia verò circa ramos Loto similia, trifolia, sed minora, & maius dorsum habentia.

Epiceram

Scribit Hermol. in Diosc. Epiceras ab Hipp. vocari, quoniam semen habeat simile corniculis. Inuenio (inquit porro) & Carpum in nostris, & Græcis Autoribus vocatum. Item Carphon, quasi flosculum, Diosc. quoque dixit Botton vocatum: quidam Lobon (siliquam legendum), non Loton credunt, Ego & Lotum dici posse video. Plinius Anonim similem Fœnugræco, Diosc. Loton scænasiz, aut Rutæ faciunt, vt æstimare liceat, Lotum scænasiam cum Fœnugræco eandem videri, aut persimilem.

Carpum
Carpum
Botton

Loto

Loto scæna-
sia

Sed quid de hac re Corn. Quod Plinius inquit, Fœnugræcum Carphos vocari dicit, videtur etiam Diosc. agnoscere, si καυτός [festuca] & non καυτός legatur. Buceras autem & Aigoceras appellationes sunt Hippocraticæ, velut Galenus in glossis testatur, & lib. 1. de alim. vbi quomodo in cibum veniat, exponit, Non modò Telin, inquit, sed etiam Buceras, aliqui verò Aigoceras, nominant hoc semen, Nostri hodie cibum Fœnugræci ignorant, sed medicum vsum retinent officinæ, maximè Chirurgorum, qui partim Latina voce corruptâ appellant, partim ad Græcæ vocis similitudinem Bockshorn nominant. Vulgus tamen Sibengereit vocat, quomodo alii Lotum sativam appellant.

Dodon. Tragus, Lonic. & Cordus, singularis præter hætenus recensita nihil afferunt, quemadmodum etiam Anguillara, cui Fœnugræcum sativum dicitur: Gesn. & Cæsalp. Est siquidem hodie aded notum Trifolium Fœnugræcum, attestantibus id Lob. & Penâ Adv. vt qui Lotos norit, neminem latere possit, quodduntaxat differre videtur siliquâ, quâ maiore est, magisque adunca, & acutioni stylo. Item Obs. & Ic. Pl. Fœnugræcum.

Synonyma
linguæ

βέκκας, Theoph. Epiceras, Hipp. τήλης, καυτός αἰγώκας, λωτός, & καυτός, seu καυτός, Dioscoridi. Plinio Silicia. Columellæ Siliqua, Varroni Silicula. Olba Arabibus, & Helba. & helbe, seu hebbe, & Astulba. Germanis Bockshorn/ zigenhorn/ Sibengereit, aut fâhorn. Belgis, Fenigreeck: Anglis, fenegrock. Italis, Fiengreco, Gallis, Fœnugrec, & Senegro. Hisp. Alfornas & alhouas, Hung. Fœnugræcum.

Satio

Locus

Silicia, teste Plinio, scarificatione seritur, non altiore quatuor digitorum sulco, quantoque peius tractatur, tantò provenit melius. Rarum dictu, esse aliquid, cui profit negligentia. Satum

Montbelgardi Fœnugræcum in horto E. C. facile provenit. Genevæ, & non longè à Montpelio, vbi copiosè à multis seritur, vidi florens Nouembri, & ex semine deciduo vires totà hyeme ad mensem Ianuarium, quo mense quoque florebat Lugduni in horto Pharmacopæi Verdau. Florens præterea obseruavi Aprilis principio, & cum siliquis Maio.

Tempus.

Siliquis, vel Fœnugræco, vt refert Benzo, abundat regio Peruana, ita vt vinum etiam inde conficiant, quod bibunt.

Vinum

Farina Fœnugræci molliendi & diffundendi vim habet. Trita verò cum aqua mulsa cocta imposita, ad internas & externas facit inflammationes, Cum nitro verò & aceto trita imposita, splenem minuit. Decoctum ad infessus commodum est, in muliebribus affectionibus, quæ ex inflammatione, aut præclusionem vteri consistunt. Expressus ab ipso in aqua cocto succus, capillos & fursures, & achoras, manantia capitulis vlcera repurgat. Cum anserino adipe pelli vice apponitur, molliens ac dilatans locos circa vterum, Viride Fœnugræcum cum aceto, debilibus & exulceratis locis commodum est. Decoctum verò ipsius ad egerendum inanes alui contentiones, & ad graueolentes egestionem dysentericas prodest. Quod autem fix ex ipso oleum, id cum Myrtæ capillos repurgat, & cicatrices in pudendis exterit. Diosc.

Vires & v-
susInflamma-
tionesAffectus mul-
iebres,
CaputViride Fœ-
nugræcum
DecoctumDysenteria
Oleum

Vis eius [inquit Plin.] siccare, molliere, dissolvere. Succus decocti scæmarum malis pluribus subuenit, siue duritia. siue tun or, siue contractio sit vuluæ, solum & in fuso prodest. Fursures in facie extenuat. Spleni addito nitro decoctum & impositum medetur. Item ex aceto. Sic & iecini decoctum. Diosc. difficile parientibus [instante partus tempore Dalech.] semen eius dedit acetabuli mensurâ, tritum in nouem cyathis sapæ, vt cum tertias partes bibissent, calidè lauarentur: & in balneo sudantibus dimidium ex relicto iterum dedit, mox à balneo reliquum, pro summo auxilio. Farinam Fœnugræci cum

Vulua

Parientibus

Hordeo, aut Lini semine decoctam aqua mulsa contra vuluæ cruciatus subiecit. Item imposuit imo ventri. Lepras, lentigines, Sulphuris pari

Farina

Lepra

portione mistâ farina curauit, Nitro ante præparatâ cute, sæpius die illinens, perungique præcipiens. Theodorus Fœnugræco miscuit quartam partem purgati Nasturtii acerrimo aceto ad lepras. Damiom Fœnugræci semen acetabuli dimidia mensura cum sapæ & aquæ nouem cyathis ad menses ciendos dedit potu. Nec dubitatur, quin decoctum eius vtilissimum sit vuluis, interaneisque exulceratis, sicuti semen articulis atque præcordiis. Si verò cum Malua decoquatur, postea addito mulso, potus inde ante extera vuluis, interaneisque laudatur. Quippe cum vapor quoque decocti plurimum proficit. Alarumque etiam graueolentiam decoctum Fœnugræci semen emendat. Farina porriginem capitis, fursuresque cum vino & nitro celeriter tollit. In hydromelite autem decocta addita axungia genitalibus [tumentibus, inflammatis Dalech.] medetur: item pano, parotidi, podagra, chiragra: articulis, carnibusque, quæ recedunt ab ossibus, aceto verò subacta luxatis. Illinitur & lieni, decocta in aceto, & melle tantum. Carcinomata, subacta ex vino, purgat: mox addito melle persanat. Sumitur & sorbitio è farina ad pectus exulceratum, longamque tussim. Diu decoquitur donec amaritudo desinat: postea mel additur. Est ex calefacientibus manifestè (Galeno alim.

Menses

Vulua

Alarum
GraueolentiaArticuli
dolori.

Carcinoma

Tussis

Temperam
autore

autore) eundem usum ad cibum exhibens hominibus, quem Lupini: praeferunt enim ipsam ex gero, ventris subducendi gratia. Et ad hoc multo magis idoneum est, quam Lupini, ut quod ex propria substantia nihil habeat, quod difficulter egrediatur. Editur etiam cum aceto & gero, velut Lupini. Et cum vino, & gero, & oleo, plerique Foenugracum edunt, ut Lupinos. Quidam etiam cum pane edunt, & satis hoc ipsi obsonii est, minus quidem ventrem subducens, sed neque caput tentans, quemadmodum id quod cum gero editur aliquorum capita tentat, neque stomachum subvertens: quod in quibusdam efficere Foenugracum solet. Succus ipsius cum melle sumptus, ad omnes praeuos humores, qui in intestinis habentur, subducendos, est accommodus: suo quidem lentore leniens, calore autem dolorem mitigans. Quod autem absterforia facultatis sit particeps, intestina etiam ad excretionem instigat, sed parcius ei mel est admiscendum, ne mordacitas exuperet. In diuturnis vero thoracis citra febrem affectibus, pingues cum eo palmulas elixare oportet, ubi autem succum ipsum expressum copioso melli miscueris, ac rursus super carbones ad medietatem crassitiam coxeris, tum de mum longe ante cibum uti. At lib. 3. simpl. Foenugracum, inquit, calidum est ex secundo ordine, siccum ex primo. Et propterea feruentes inflammationes exacerbat: minus autem calidas, & in scirrhum induratas discutit curat. Sed hanc Galenus,

Ceterum seminis decoctum maceratis in eo hincetis, & fronti adhibitis, oculorum fluxiones auertit, & non solum capillorum pediculos (Nilsen) extirpat, si caput hoc abluas, sed etiam efficit ut pulchiores, & longiores evadant. Semen clysteribus adicit Tragus, quibus aduersum tormina ab exulceratione orta vsurpat.

Germine, teste Prospero de Pl. Aegypti cap. 42. mox est seminibus erumpentia, ex ipsiusque statim profluentia plebei comedunt, praefertimque mulieres pingueheri cupientes: per urbem multas massas terrae plenas seminum recenter productis germinibus vendendas uferunt.


Sciendum porro vnguentum ex Foenugraco quod nunc est, & non à Telo insula, nomen habet, à Diosc. preparari, quod recipit Foenugraci lib. 5. olei lb. nouem: Calami lb. j. Cyperi lb. ij. quae simul ad dies 7. in oleo macerantur, ita ut ter quotidie commoueantur. Deinde excolantur, & reconduantur. Alii pro Calamo Cardamomum: pro Cypero, Balsami lignum simul macerant. Quidam oleum antea his spissant, & postea Foenugracum in ipso macerantes excolant. Haecenus Diosc. Plinius autem alter hoc vnguentum, at corruptissimè, preparari prodidit, qui dicit: Telinum sit ex oleo recenti, Cypero, Calamo, Foenugraco: consentiens quidem haecenus cum Dioscoride: sed quod addit: Meliloti, melle, & melino, Maro, Amaraco: Corn. ad Telinum pertinere non putat: & quaedam exemplaria pro melle & melino, habere mello, nulla certa significatione: & melinum recipi in Telinum, satis absurdum esse. Hodie bene parari posse, sed non haberi. Ceterum vim ei tribuit Diosc. molliendi abscessus, & maturandi, ac concoquendi. Maxime autem conuenire ad omnes circa vterum duritias. Infundi etiam aegre patientibus, quum excretis antea humoribus loci obandi fuerint reddit: itemque ad sedis inflammationes. Vtiliter etiam infundi, frustra ad egerendum nutribus. Fursures quoque & aschoras

Tom II.

detergere. Et ad ambusta & perisiones cum cera. Maculas etiam Solares deterere, & medicamentis ad faciei nitorem inducendum paratis miscui. Eligendum esse recens, & quod Foenugraci odorem non admodum referat, & manus purget, & in sapore dulcedinem cum amaritudine repraesentet. Tale enim esse opimum,

FOENUGRACVM SILVESTRE

Dalechampii.



Minus est satiuo, caule tamen dodrantali interdum: folia genit ternaria, & inter flores, hae flores per totum caule: corniculatas siliquas multas breuiore, sescuoiales, recuruo, vacuoque & renu muctrone donatas, quum in satiuo tamen latiores, semen quidem continentes minus


radicem longam, lignosam, furculosam.

An de hac Anguill. ait: Foenugracum silv? quo in multis locis vntur pro Meliloti: Hist. Lugd. Foenugracum silv. Dalechampii.

Gener Cherlerus attulit Monspelio collectum in via Frontigniana versus Balleruch, florens Maio & Iunio, Iulio siliquas ferens.

TRIFOLIUM, SIVE LOTVS HIE-
razane, edulis, siliquosa.

CAP. I.



Lotus, aut Loti genus est edule, si non. Bella credimus, in foro enim eius siliquae, antequam durefcerent, reincipiant, venales reperuntur, à pueris & feminis libentissimè eduntur, succosae sunt & dulces, Pisi recentis gustu: multos, tenues caules à radice profert, folia trifolia, angusta, crassiuscula, aliquantulum

muctronata, terna semper sibi coniuncta: flores luteos Pisi, quibus succedunt siliquae rotundae.


Hb.

HISTORIÆ PLANTARVM

falcate, ac pro ratione plantæ, magna inter se-
getes inuenitur, & in marginibus agorum fre-
quentissimè, herbaque omnibus nota est. Huius
semen Astragalo Monspeliensium non multum
ablimile Cluio videbatur, quod cum aliis ab
honorio acceptis terræ commiserat, sed non na-
tum erat & illi, & mihi; habebam enim ego à
chariss. Fratre C. Bauhino, quod ab eodem ho-
norio nomine Hierazani in Creta acceperat.
Continebatur autem in siliquis corniculatis, vn-
cialibus, semicirculi instar incuruis, geminis, cõ-
cauà parte canaliculatis, pedicello paruo in fo-
liatum exitum, corniculorum extremum capien-
te, dependentibus, denso sarctu, paruum, leuiter
compressum, quale serè Fœnugræci, sed minus,
sapore dulci. Color tum siliquæ, tum seminis ex
ruffo obsoletus.

Hierazani, seu Hierazani Cretica, Belli. Locus
Cretica, Cap. Bauh.

TRIFOLIUM ASPHALTITES sive bituminosum odoratum, & non odoratum.



IN fruticem
excreuit Tri-
folium bitumi-
nosum, cubita-
lem & sesqui-
cubitalem, vir-
gultis rigidis,
incanis, ac etiã
nigricantibus,
striatis: folia
terna, per pri-
mam adolescen-
tiam rotunda,
mox oblonga-
tur, in acumi-
natum mucro-
nem desinen-
tia, incana iti-
dem & hirsuta,
odore bitumi-
nis fastidioso,
tactu glutino-

so: flores non planè glomerati congesti, sed
oblongiori capitulo dispositi, colore purpuro-
violaceo, quorum singuli vnum folium latius
surrigunt, duo lateralia replicant: quorum com-
plexu quartum comprehenditur apiculus luteus
continens: ex calycibus oblongis, striatis, villo-
sis: semen nigrum, asperum, hirsutum, in cuspi-
dem desinens foliaceum, eiusdem cum reliqua
planta odore, Casalp. sapore medicato. Conge-
net huic, totoque adèd vultu idem iamdiu colo-
re, excepto eo, quod folia quidem odore omni pe-
nitius destituta sunt: flores verò suauiter, licet
obscure, redolent.

monachi in Mes. Trifolium Asphaltitum, si-
ue acutum, aut odoratum, præfens Trifolium
appellant. Matth. autem Trifolium Asphaltite,
& rursus lib. 4. c. 109. Lotum Egyptianum, quam, vt
& reliquas Loti species, Serapio Handachochã
indifferenter nominat, & à cuius semine Oleum
exprimitur, Mauritanis ad articulorum dolores
expetitum. Neque enim fieri ex vulgaris Trifolii
semine, vt quidam aberrantes existimant, sed
ex omnium Lotorum semine, & ex eo tantum
Trifolio, quod Asphaltites Græci vocant. Idem

hist. Germ. Trifolium Asphaltites, hartlee vo-
cat.

Cast. Dnr. Trifolium bituminosum. Bellon.
Obs. Trifol. cognominatum Menianthes.

Dodonæus Trifolii huius meminit his verbis:
Trifolium, & vt Dioscor. scribit ὀξυτρίφυλλον Græci
nominant, plerique Μενιάνθης: alii Ἀσφαλτίτης:
nonnulli Νίκανδρος: Nicander etiam Νίκανδρος: Ro-
mani Trifolium acutum, aut odoratum: nostra
ætas Trifolium bituminosum. Auicenna Trifi-
lon est, non autem, vt quidam existimant, Han-
dachocha. Sub Handachochã siquidem nomine
Auicenna Dioscoridi Lotos dictas comprehen-
dit. Describit Trifolium istud etiam Scribonius
Largus cap. 163. Mirum hinc quod olim legebantur
apud Diosc. ὀξυτρίφυλλον, nec mentionem faciebant
villam Oxytriphylly Scribonii.

Lonic. describit & depingit, primo anno pro-
uenientem plantam dicens: Lotus, quem Diosc.
describit, simpliciterque Lotum nominat, ex a-
liis præcipuus est, diciturque Græcis Trifyl-
lon, Lat. Trifolium, Dioscor. etiam Asphaltion
[hartlee] ab odore, & Oxytriphylon, ac Me-
nyanthes. Hæc ille, qui describendo Diosc. secus-
tus, ait habere folia similia Loto arbori.

Gesn. de hort. Trifolium quoque simpliciter
vocari scribit, & Asphaltites [bituminosum] quod
cum ad altum sit, Oxytriphylon etiam dici me-
reatur: quamuis hoc aliqui Veterum [vt Plin.]
specie distinguant à duabus aliis eiusdem generis
speciebus.

Trifolium Asphaltion Turn. Angl. vocant tra-
dit Diosc. trifoly Clauen.

Lob. & Pena Adu. describunt ac dicunt. Aspha-
litem seu Menianthes Diosc. Idem Obs. Trifo-
lium Asphalticum siue bituminosum, & Trifo-
lium odoratum Plinii, quod synonymum in le-
Plomiserunt.

Camer. hort. Trifol. bituminosum. Gal. lib. de
Ther. ad Pison. de hoc Trifolio Asphaltite, siue
Hyacinthino. Math. in epist. Galenum negli-
gentiæ arguit in legendo Diosc. lib. 3. cap. 106. Ex
Sophocle tamen & Simo Medico Plinius idem
prodidit, & Aboali cap. 697. cum errore floris, id
quod Scaliger animaduertens exoter. exere. 133.
dist. 10. inquit, hoc non casu, sed sapientis cuius-
dam cogitatu productum ad experimentum
fuisse. Sed Iul. Alexandr. respondet, librum il-
lum illum haudquaquam à Galeno fuisse edi-
tum, & ob id non esse opus aliquo defensionis
genere. At de his inferius agemus.

Hist. Lugd. vnius plantæ duas figuras exhibet:
sub titulo Trifolii Asphaltitis, vnam quidem ro-
tundis foliis, alteram verò longioribus.

Tab. communia nomina retinet. Asphaltium
Trifolium, inquit Marantha, quod in Campania
insignem bituminis odorem habet: in Hetruria
transplantatum, nullum prorsus spirat: quod in
causa fuit, vt ibi pro Asphaltite non haberetur.

Textor de peste vulgò Trifolium foetidum no-
minat.

Trifolium bituminosum Casalp. Dictamnus
ab incolis Iluz propter vires aduersus venena
celebratas nuncupari scribit, & à Dioscoride E-
nicion, quod nos hætenus apud Diosc. non le-
gimus.

Casparus Bauhinus Trifolium Bituminosum
ὀξυτρίφυλλον Μενιάνθης & ἀσφαλτίτης nuncupat: ac apud
Matthiolum hæc scribit: folia, quæ ante caules
prodeunt, rotunda sunt, vt figuræ Matth. mino-
res ostendunt, cum verò caulescit, & adulta est,
acumi-

Locus
Semen.

Siliqua

Sapor semi-
nis.

Descri.

Folia

Odor
Tactus
Florus.

Semen

Huius Tri-
folii Vari-
etas

Trifol. A-
spalticum
acutum
Trifol. A-
spaltites
Lotus Agy-
ptius. Han-
dachocha.
Oleum

Trifolium
Asphaltites

Trifol. bitu-
minosum
Trifol. Me-
nianthes
Oxytriphyl-
lon. Menian-
thes. Aspha-
lites.

Trifolium
bituminosum
sive Trifi-

Lonic.
Oxytriphylon
Asphaltites

Folia Loto
arbori.
Trifolium
simpliciter.
Oxytriphyl-
lon

Asphaltites
Menianthes

Galenus
arguit

Gal. ad Casp.

Hist. Lugd.

Trifolium
bituminosum
Menianthes

Trifolium
foetidum

Dictamnus
Enicion

acumi-

acuminata redduntur, quare neutiquam binæ figura retinendæ, ut fecit Herbarii Lugd. author, alterum rotundis, alterum longioribus foliis nominans, idcirco vnâ figurâ exprimere volumus. Et rursus in animad. in Hist. Lugd. ait: prior figura prius prodeunda folia exprimit, altera verò cum & rotunda & longa exprimat, seruanda erat, reiecta priore. Nos huic animaduersioni ita respondemus: Si Matthioli prior icon falsa erat, poterat reici, vel reineri, monendo falsam eam esse: verum cum non sit falsa, sed bene exprimat nuper natam plantulam, & iam dudum sculpta esset, cur Typograpus Rouillius nactus perfectiorem & plures partes exprimentem, non curasset etiam sculpendam, & vtramque proponendam? Ea etiam quam exhibet C. Bauh. imperfecta est, non enim exprimit prima exeuntia folia, nec posset per eius iconem nouam nouella plantula agnosci, cum ille voluerit vnâ figurâ, vtraque exprimere folia, ecurr non fecit, & ita minus mancarn habuisset iconem

In agro Lucensi, circa Lunam & Carram di Massâ, & vniuersam Hetruriam notissimum. Hyemis frigora apud nos, inquit Camer.) fert. Semen ex Italia allatum, terræque mandatum plantam profert foliorum odore bituminoso, Italice nihil vel parum inferiorem. Semen itidem sapore Italicum refert. Sin autem, semen in Germania educatę plantę rursus feritur, statim sapore & odore producta planta deficit. Et vel hinc patet verissimum illud esse, quod Porta prodidit, e variis nimirum terræ qualitatibus in qualis varia herbarum genera exoriri, natali solo, cœloque familiaria. Sic tophacea terra Asphaltites Trifolium producit, vnde mons Neapoli imminens tophaceus, à Galeno Trifolinus dictus est, ex huius Trifolii copia. Nascitur, Hippocrates non Cous, sed Hippiautos apud Dodon. ait, locis fragosis, ut Ruellii conuersio habet. In Belgio ac Germania, nusquam suâ sponte, sed in hortis tantummodò satum prouenit, vbi Iulio & Augusto demum mense floret. In maritimis, Cæsalp. teste, nascitur gracili solo, copiosum in Ilia. Ego verò florentem obseruavi mensibus Octobri, Aprili, Maio, & Iunio Monspelii circa Castellneuf. In horto præceptoris Fuchii Tubingæ, & Tiguri apud Gesnerum. Patani virentem Decembri. Basileæ in horto D.D. Fœl. Plateri, & Theod. Zvingeri florentem mense Iunio, & Septembri cum semine maturo, ob loci fortassis humiditatem: ibi non fert Hyemem, nisi reponatur, nec primo anno caules producit: floret Augusto. In Creta nihil vulgatus.

Semen & folia, authore Dioscor. in aqua pota, pleuritidi, vrinæ difficultati, morbo comitiali, in principio aquæ intercutem, his, quæ vtero strangulantur, auxiliantur. Ducunt etiam menses. Exhiberi verò debent seminis vnc. iii. foliorum vnc. iii. Opitulatur etiam commorsis à bestiis venenatis folia trita: cum aceto mulso pota. Quidam narrant totum decoctum fructibus & radicibus, & foliorum, si commorsis à serpentibus affundatur, dolores eximere: Verum si ea aqua, quæ quis curatus fuerit, alii, qui vlcus habeat, affundatur, ipsum eadem pati, quæ illi, qui commorsus fuere. Quidam etiam in tertiana febre, folia, aut semina tria cum vino bibenda exhibent: in quartana quatuor, velut quæ circuitus febriles exoluant. Ammisceatur etiam antidotis Trifolii radix. At Veteres alii, quod Dod. testatur, non radicem modò, sed & semen ipsis admiscuerunt ut ex plurimis compositionibus. lib. 2. de Anid.

Tom. II.

apud Gal. videre est: Theriacis, videlicet Albi Galli, Zenonis Laodiceæ, Claudii Apollonii, Eudemii, Heraclidis, Dorothei, & Heræ.

Trifolium Plinius scit credi præualere contra serpentium ictus & scorpionum, ex vino aut posca, seminis granis viginti potis: vel solus & tota herbâ decoctâ: serpentelque nunquam in Trifolio aspici. Præterea celebratis autoribus, contra omnia venena pro antidoto sufficere 25. grana eius, quod Menyanthes appellatur, tradi. Multa alia præterea in remediis eius scribi. Sed ipsum contra sententias eorum grauissimi viri autoritas mouet. Sophocles enim Poëta venenatum id dicit. Simus quoque à Medicis, decocti, aut contriti succum, infusum corpori, eadem viedines facere, quasi percussis à serpente tradit. Ergo non aliter vtendum eo censuerit, quàm contra venena. Fortassis enim & his venenis inter se contraria erit natura, sicut multis aliis. Item animaduertit semen eius, cuius minima sint folia, vtile esse ad custodiendam mulierum cutis gratiam, in facie ilitum. Ita Plinius. Et hanc sententiam Simi Medici à Plinio adductam [inquit Corn.] habet etiam Galeus in lib. de Ther. ad Pison. Trifolium, inquit, herba quæ Hyacintho similis est, quum Veris tempore prægnans sit, & semen agrestis Cnico simile habet, si quis tunc ipsam valde decoquat: Deinde mortuum phalangii, aut etiam viperæ, eâ aquâ perfundat, sanat ipsum, & statim doloris exortem efficit. Si verò quis in alio non commorso, sanum locum eodem somento perfundat, eundem sensum, & eodem dolores, omnes commorso similes inducet, ut hic effectus reuera admiratione dignus sit, eandem herbam & mortuum sanare, & sanum locum bestiarum venenatarum modo malè afficere. hac Galeus. Nec alia est Diosc. sententia. Non enim de eadem numero aqua, Dioscoridis verba accipienda sunt: nam hæc res nihil miri exhiberet: sed de ea, quæ eadem specie est, quæ contrariam vim in commorsis, quos lædit: non sine admiratione ostendit. Impudenter itaque Galenus damnatur, velut qui Diosc. sententiam non intellexerit, ab his, qui ipsi parum intelligentium stupiditatem hac parte declarant. Gratiam autem habeo pro Galeni patrociniis aliis, qui librum illum inter spurios referre mallent, quàm pati, ut Galenus hic cecidisse dicatur. Sive autem genuinus, siue spurius Galeni liber sit, non propterea à viro docto, qualis Matth. videri ambit, tam frivole stupiditatis, aut ignorantie stigmate notandus, sed potius fideliter, quod equidem verè ingeniosum virum decet, excusandus fuit, ut qui non simpliciter locum sanum dixerit, sed duntaxat à dicto morfu liberum, quod Galenus his verbis innuit: Sanum locum in non commorso. Nec locus simpliciter sanus medicamentum tale quod requirit.

Hippocrates [ait Dodon.] Trifolium non solum menses prouocare, sed & fetus cum sumptum, tum appositum expellere tradit: Mulier, inquit, si ex partu non fuerit purgata, Trifolium in vino albo bibendum dato, hoc etiam menses educit & fetus. Et alio loco: Idem etiam (de Trifolio scribens) appositum menses erumpere facit, & fetus eiicit. Cæterum Trifolio, quod Asphaltion Galeno dicitur vis calida & sicca, uti bitumini, vtrumque tertio ordine, proinde potum laterum dolores ab obstructione iuuat, & vnam, mensesque prouocat.

Hh 3

C. Bauh.
167.

Locum

Tempus

Vires &
usus.
Pleuritis
Aqua inter-
cutem
Vires
Dosis folio-
rum & se-
minis
Decoctum
Serpentium
morsus

Tertiana
Quartana

Serpentium
ictus

Dosis

Vires

Vires eius
sanum com-
tra venena

Plinio sub-
scribit Galen.
167.

Nec differen-
tiant à Diosc.
scorido

Galenus de
sensu contra
Matth.

Matth. re-
probat

Matth.

Fetus

TRIFOLIUM AMERICANVM.

Descriptio.

Caulis

Folia



Floris.

Fructus.

Trifolio bituminoso simile quoddam reperitur, quod caules fert à radice cōplures, rotundos, ramosos, in latus declinantes: folia in singulis pediculis terna, colore in virore subnigra, figurā rotundiuscula, primis & à radicibus exeuntibus bituminosi Trifolii, formā, colore, & odore quoque qua-

dantenus similia, latiora tamen & per ambitus magis crenata, flores in summo ramulorum exeunt, exigui, subcandidi, spicatum digesti, fructus inde rotundi, aliquantulum plani, Aphaces (Vicia latā siliquā, flore luteo) à nobis (inquit Dod.) descriptæ semini ferè similes. Radix in plures diuiditur.

Ceterum Trifolii bituminosi speciem odor grauis, & eius odori haud multum dissimilis, Dodonzo ostendere videtur.

C. Bauh. phyt. Trifolium n. siue Americanum. Tab. Trifolium Americanum Indianischer fleck. Ita & Lob. Obs. & Ic. Pl. & Cam hort. Hist Lugd. & Dodonzo Trifolium ex America in Belgium illatum est, ubi Iulio & Augusto floret. Cæsalp. Trifolii quoddam genus latifolium ex America allatum, odore ingrato.

Nos Trifolium Americanum primò vidimus Basileæ in horto D. D. Fœlic. Plateri. Eius semen Stutgardia accepimus, ferendum Montbelgardi in horto Ill. C. V. virti


ARBOR TRIFOLIA INDICA.

CAP. LI.

Descriptio.

Folia

Folia



Haud curans adminicula, per se rectā surgit, caule, vel si maui, truncato, quadrato, breuissimis pilis hirsuto: foliis ornata quorū priora exciderant, patre inferiore quoque hirsutis, ternis, angustis, Trifolii bituminosi, ex longo pediculo, saporem manifestum

non animaduerti:

Sata in horto Ill. Principis, palmā non multum altior erat Iunij principio. Locus

LOTUS SATIVA, ODORATA, annua, flore cæruleo.

CAP. LII.

Planta est cubitalis, & sesquicubitalis, caule recto, gracili, striato, nonnihil angulato, multis alis concauo, iuani: folia Meliloti vulgaris, ternaiuncta, pinguiuscula, per ambitū crenata, longiora quā latiora, sapore acriusculo: floribus verò glomeratis, pallidè cæruleis, Trifolii pratensis vulgaris æmulis, minoribus, præcipue ex pertineti odoris suauitate quæ sita est gratia: quos echinata excipiunt oblonga capitula, semine miliaceo fuluo referta: radix gracilis, simplex, alba, panicis aucta fibris, rectā ferè demittitur.

Lotus sativa Cordi, Camer. hort. & ad Hist. Matth. Lotus odorata, aut sativa peritis stipitum. Synonyma & nomina.

Matth. in com. in Diosc. cum magnis iconibus tam lat. quā italicis, & Hist. germ. Lotus silv. siue Lybica, an nascatur in Italia, non audeat affirmare, quod non meminerit, à se ibi eam vspiam vitam, Verum in Bohemia copiosam admodum prouenire, floribus in capitulis cæruleis, vocari germ. wilder Steinklee / & Sibengerzeit. Et in Epit. ab Arabibus mandachocham nominari. Et hæc Matth. Vbi verò Lotus hæc Matth. spontanea, vel silv. de qua hoc capite agimus, comperiatur nobis nondum constat, nec scimus cur non potius dicatur sativa, quā vulgaris Officinarum Melilotus, siue Trifolium odoratum vulgare. Olim Matth. dicebat se sapius vidisse herbam quandam floribus luteis, de qua dubitabat, an Dioscoridis esset. Iconem etiam proponebat: nunc illam plantam reiicit, & silentio planè præterit, quasi nunquam vidisset, vel falsa commentus esset: hic silent, silent etiam eius glossatores & patroni.

Castori Lotus silv. sed malè nostro iudicio. Diosc. & nonnullorum nuncupatur, Latin. Lotus urbana, & Lotus sativa, quibusdam Trifolium, nunc & Trifolium odoratum, Gall. Trefle odoriférant, Germ. Sibengerzeit / Belg. Seinen ghetide cruyt. Fuch. his addit, Officinis simpliciter Trifolium dici. Tragus hoc depingit & describit, dicens.

Scribon. Larg. [Oxytriphylly nomine] plantam hanc depingit. Germ. Sibengerzeit appellat, propterea quod singulis diebus septies odorem habeat & toties etiam amittat, quamdiu in horto creuerit. Decerpta autem & exsiccata odorem suum perpetuò retinet, qui certè pluuiosa temporis constitutione, & tempestate imminente multò vehementior est, sic sanè ut totas ædes odore suo compleat, quo nomine tempestatum nuncia, German. verò wetterfracht haud iniuriā dici posset.

Sunt porrò qui præter omnem rationem huic nostro Trifolio peregrino, Nardi nomen tribuant. Ast Latine aliter appellari non potest, quā Trifolium acutum & odoratum. Spigiger rind wolrichender fleck. quo de Diosc. lib. 3. cap. 114. Cognominatur à Nicandro in Theriacis Menianthes & Triperalon, à Dioscor. verò Cnicion, Asphaltion, Oxytriphylon. Columella denique lib. 6. cap. 16. Trifolium Symoniamum. Quoties

Nardi.
Trifol. acutum.

Menianthes Triperalon. Cnicion. Trifol. Symoniamum.

Quoties in Galeno; Plinio, Rhase, & Nicolao, Trifolii mentio habetur, toties Trifolium odoratum hoc intelligendum, quemadmodum Manlius rectè docet.

De odorato Latifolio scripsere & Arabes, Serapio cap. 9. & Aulc. lib. 3. cap. 343. apud quos hæc illius nomina leguntur: *Handachochæ*, *Lyrhos*, *Garch*, & *Thuff*. Quod si scripta horum examinauerimus, deprehendemus Trifolium odoratum, domesticam illis esse *Handachocham*, pratense verò siluestrem. Et hæc *Tragus*, cui si verum Trifolium bituminosum cognitum fuisset, hanc plantam nunquam existimasset *Asphaltion* Dioscor. Plinii, Galeni, & aliorum, ut Scribonii. Lectores igitur admoniti sint, ne silant viribus à Trago huic plantæ tributis, quum sint Trifolii bituminosi: *Oxytriphyllo* quoque nomen non malè conuenit Trifolio bituminoso.

Hist. Lugd. pag. 506. Trifolium odoratum alterum, siue satiuum. Et pag. 508. Lotus silu. altera Matthioli. Sed & nimium rudis in re botanica, confarcinator Hist. Lugd. si vel leuem plantarum cognitionem habuisset, non duas vnius Trifolii figuras pro diuersis exhibuisset.

Plinius Loti satiuæ foliis, Corn. teste, ascripsit, quæ Dioscor. expresso succo attribuit. Officinæ Trifolium odoratum vocant, wolriechenden Hec, alii sibengerzeyt appellant, quod septies in die odorem mittat.

Confusè sanè Lonic. hæc describit, qui modò Trifolium odoratum, & Lotum satiuam: modò Trifolium acutum, Plinii *Asphaltion*, Arabum *Andachocham*, Officinatum simpliciter Trifolium cognominat.

Gesn. de hort. quam olim malè Lotum silu. esse putabat, nunc Lotum satiuam, Herbam casealem *Zigerfraut*, *Stündfraut* appellat. Item Trifolium caballinum in Italia plerisque vulgò vocatum. Aliis etiam *Triphyllon*, *Trifolium*, & *Trifolium minus*, *Sibengerzeyt* interpretatur, sed falsò.

Robert. Const. apud Amat. in Diosc. *Cytisus*, Trifolium odoratum esse non potest (ut vult Amat.) quia Trifolium odoratum Herbariis, ut *Lonicero*, nihil aliud est, quàm *Asphaltion* Plinii, & trifolium Dioscoridis, quod singulis annis emoritur. Ecce stirpium peritus (si diis placet) non obseruauit aliam etiam plantam dici trifolium odoratum, qualis est Matthioli & Amati trifolium caballinum, quod multum à Loniceri trifolio odorato differt, nempe, quod nostra Lotus satiuæ est: malè etiam, ut antè dictum, vocat *Asphaltum* Plinii, & trifolium Dioscoridis.

Quam rectè porro Anguill. Lotum hunc, in Flandria, & Hispania *Balsamum* dictum, siluestrem vocet, intelliget is, qui titulum huius capituli vel obiter inspexerit.

Mich. Neand. in *Physicis*, trifolium *ὀξυτρίφυλλον*, aut *ἀσπάλιον* vocat, at confundit trifolia, nec bituminosum bene olet, quod asserit.

Loti alterum genus peregrinum apud nos. Italos [inquit *Casalp.*] trifolium balsaminum vocant, ob odoris vehementiam, qui spirat è femine, flore non in spica, sed in rotundis capitulis cæruleo. Serapio hoc intelligere videtur per *Melilotum*, inquit enim, Herbam esse foliis rotundis, &c. putauit antè à Diosc. ita vocari colore *Croci*, odoratum. Lob. & Penz. Hortorum odora Lotus. est verior Diosc. Germ. *Sibengerzeyt*. Belg. *Seüengetyden clauer of fruyt*. Cum arbores, frutices, & alia, specie, fa-

Tom I.

cie, fructu, & floribus differentes plantæ Loti dicantur, quapiam bonitatis commendatione, potius quàm inter se conuenientia, videtur hæc nomenclatio huic trifolio attributa, quasi quòd cæteris trifoliis excelleret, inque paradisis & latioribus locis oriretur, dictum foret trifolium *λότος*, siue volupe, & voluptas, à verbo *λάω*, ut sit adlusum ad *λατράζουε* *Villicos*, & Epithetum apud Homerum, qui vocat roscidum Lotum, *Deorum* lubescentiam. Proinde coniectura plena fert, veram urbanam illam, verè dici Lotum, quæ domi hodie colitur, decerpiturque. Et Obl. Hortorum odora Lotus, Perperam Trifolium *Asphaltum* Diosc. Fuchsi. Lotus satiuæ, siue trifolium odoratum alterum Dodon. Lotus silu. Anguill. & Matth. An Mel Frugum Theophrasti? Angl. *Gardenclauer*. Hisp. *Trebol Real*.

C. Bauh. phyt. trifolium 45. siue odoratum, vel Lotus hortensis. Quibusdam *μυλὴ σίτου* Theophr. 7. hist. 14. Mel frugum Gaza vertit.

Ponz in Bald. Lotus siluestr. Anguillara & Matth.

In hortis tantum habui, ut *Geæuz* ex semine deciduo, florentem Maio & Octobri, virentem Ianuario. Sicuti Lugduni quoque *Basilea*, & *Montbelgardi* quotannis se renouabat. Dodon. authore floret Iunio, Iulio ac Augusto in hortis cum in superiore, tum in inferiore Germania, in Italia, Gallia, ac aliis regionibus feritur, nec spontè prouenit quod Anguillara testatur. Et licet in Baldo reperiatur, tamen & ibi primum lata fuit.

Extractus, ait Diosc. succus addito melle oculorum argemas, nubeculas, *λιπώματα* [albugines vocant] & quæ pupillas oculorum obscurant, expurgat. Vim autem mediocriter conuoluentem, & resiccandi possidere Galait, & in caliditatis, frigiditatisque coniugatione mediam quodammodo, ac temperatam esse. Quæ certè facultates, id attestante Dodonæo, in hoc odorato trifolio conspicuæ sunt. Nostri, pergit Dodon. oleum in quo folia, floresque odorati huius trifolii macerata, recentia vulnera glutinare tradunt, & ad puerorum enterocelas, bubonocelasque plurimum commendant. Interponitur & arida herba vestimentis, quæ ne à tineis rodantur, defendere putatur. Dodonæus (nescio inquit Cam.) quibus rationibus adductus, existimat haberi posse pro *Oxytriphyllo* Scribonii, ad venena & morbos pestilentes commendato.

Frequentissimè feritur apud Helueticos propter quoddam casei secundarii genus, *Claronensem* vocant, quod hac potissimum herba condire solent. Vide Gesn. de operib. la&c. Eius olei vsus est ad corroborandos æruos. Et hæc sua Camer. ex Gesnero desumpsit, qui malè horti sui Medici Dodonæum citat, cum *Tragus* eadem scripserit, nec vnquam Dod. horum meminerit. Trifolium hoc in vino decoctum, ut vult Matth. Ger. melle aut saccharo præparatum, & epotum emollit ac dissoluit omnis generis apostemata, lenitque dolores. Conducit etiam vtero indurato. Cum vino dulci verò, farina seminum *Lini*, seu *Fœnugræci*, capitulisque *Papaueris* sunt somnitationes, & cataplasmata, vteri, intestini recti, pudendorum tumoribus calidis aptissima. His adiciunt quidam oui luteum, aut oleum commune. Cum gallis autem & creta incoctum, & illitum manantia capitis vlcera sanare traditur. Cum vino coctum & stomacho applicatum dolores sedat. Aceto tandem, & oleo rosaceo permixtum, & admotum, mitigat dolorem capitis

Hb 4

Volupe. Pl. Luptum

Rosida &c. Deorum. Inuoluentium. Trifolium. Asphaltum. non est. Fuchsi. nescio. An melifrugum.

Locus Tempus

Vires &c. Oculorum. Vires

Temperat

Oleum

Vulnera

Dod. repræsentat

Casalp.

Merui Camer. nescio

Apostemata

Tumores pudendorum

Vlcera capitis

Cancer
Fuchsi lap-
sus.

Macula fa-
cies

Aqua decoctum, & oleo rosaceo ammixtum can-
cro medetur. Succus florum expressus, obscuri-
tati visus succurrit. Calidè in aures instillatus,
dolores sistit. Perperam adhuc Fuchsius, Hist.
Lugd. hoc notante, trifolii Asphaltitis vires o-
mnes à Diosc. assignatas, huic trifolio attribuit.
In Belgio, concludit Anguill. & Hispania mulie-
res ex eo oleum parant, quod maculas faciei ab-
stergit, & vtile estatrici & calculosis.

TRIFOLIUM ODORATUM SIVE MELI-

LOTUS VULGARIS FLORE LUTEO.

Folia:

Flores:



Semen
radix.

Melilotus
maior.

Trifolium
vrsinum.
Gratiola
plena.

Lotus sil.

Melilotus
maior.

Hominis p-
ceritatem
assequitur,
multis alis ru-
bescens, trifolio bitu-
minoso nō dis-
similibus: folia
trifolia praten-
sis, vel potius
Loti latius,
crenata: floscu-
li in spica di-
gesti, foliorum
numero & si-
tu, ut in Geni-
sta floribus,
sed valde exi-
gui, odore sua-
ui, mellito, co-
lore plurimum
luteo, rarius al-

bo: succrescunt veluti vascula parua, nigra, ma-
gnitudinis Lentis, ex breuib. pediculis, conti-
nentia semen luteum, paruum, veluti cornu con-
tortum: radix crassa profunda, plurimumque cauli-
bus productis, pereuns.

Figuram huius Meliloti malè posuit Brunfels.
meo quidem iudicio, nomine Fragaria. Vulgaris
& maior Melilotus, autor Tragus, ad Melilotum
Dioscoridis lib. 3. cap. 41. refert, quam ille Zoode-
tem, & Orthanon cognominat. Marcellus &
Manardus Sertulam campanam vocant, Cato
Sertam campanicam, Auerhoes Alchelilamelech
hoc est, Coronam regiam appellat. Quibusdam
Trifolium vrsinum, germanicè Berenflee di-
citur.

Ceterum, huius Meliloti duplex est genus:
Vnum, quod florem spicatum profert lutei colo-
ris, & alterum, flore quidem etiam comans spi-
ceo, sed candidi coloris, quod in Hist. germ. Groß
gmein Steinflee mit weissen blümlin, Melilo-
tum maiorem candido flore nuncupauimus.

Corn. Lotum silu. vocat, de qua Plin. ut etiam
de Libyco nihil habeat, quamque officina ex
Meliloti generibus faciant, ac Groß Steinflee
& Gilden Steinflee vocent. Et sanè, inquit,
Meliloti appellatio, Lotum refert. Et quia nul-
lam prae se fert gustu adstrictionem, inter Meli-
lotos Fuchsi quidem iudicio, rectè connumerari
non potest, idè Saxifragiam lutea, Steimbach
appellauit, dicens: perperam eum officina non-
nulla pro Meliloto usurpant.

An Monach. in Mel. dist. n. cens. 318. Trifolium
maximè odoratum, quod vulgè Romæ Tribu-
lum (quasi Trifolium) appellatur, quodque largè
mulieribus, & aliis venditur. Ad hanc dubitatio-
nem quid Matthiolus? Trifolium, inquit, odora-

tum, Romani & Hetrusci vulgè vocant Tribulo.
Hoc equi avidissimè in pabulum suum sequun-
tur: vnde factum est, ut quidam Trifolium equi-
num appellauerint. Florem edit album, atque
etiam alicubi luteum. Item in com. cum magnis
fig. & in Ital. Lotus vibana: quam eam Trifolii
odoratam plantam esse censeo, quam antea Cy-
tisum faciebamus, quamque Romæ vulgè Tribulo
dicunt, & alibi in Italia Trifoglio canellino, ob cau-
sam dubio procul ianiam dictam. Germani hu-
iusce flores colligunt ac pro Meliloto passim v-
tuntur, quemadmodum & Bohemi, consultius
fortasse, quàm Itali. Huius Trifolii odorati ne-
que Dioscorides, neque Gal. quod sciam, quic-
quam meminerunt. Non desunt, qui id velint
esse plantam, Theophr. Mel frugum appellatam,
quam ipse recenset inter Loti genera. Et hist.
germ. nominatur Lotus vibana, sicut & in Epi-
tome etiam cum addit. Camerarii, & Melilotus
falsò dicta. Hæc ille. Qui pro Loto quondam vi-
bana, Lotum corniculatam exhibebat, mutans
nunc sententiam, nec causam indicans.

Ad eundem modum, Senensem fortè secu-
tus Cast Dur. Lotum satiuam vocat, quod mini-
mè congruit.

Amat. profectò ad aliorum errores obseruan-
dos mediocriter oculus, ad suos ipsius talpis
cæcior: sic enim clamat. Qui herbam Mauram,
flauram, vel plantam Leonis dictam, Trifolium
esse putarunt, omnino hallucinati sunt, quum
herba Maura illa dicta, Trifolium odoratum,
Dioscoridis Cytisus sit. In dignoscenda siqui-
dem Cytiso herba multi decepti sunt, ignoran-
tes, quid vera Cytisus ea sit herba, quam vulgus
Trifolium odoratum, Itali Trifolium caballinum
nominant. Ex quibus palam fit Amatum ipsum
in dignoscenda vera Cytiso, talpis cæciorem es-
se: Trifolium namque hoc odoratum Cytisus
Dioscoridis non est, quod ex lectione historiarum
vtriusque manifestum euadit. Adhuc icon huius
plantæ apud Amatum est li. 4. c. 112. sub titulo Lo-
ti silvestris.

Dodonæus Syluam plenam speciebus huius
Meliloti profert: dicitque vocari à quibusdam
Trifolium odoratum: Tr. caballinum: Tr. vrsinum:
Melilotum germanicum: Melilotum officinarum: Cy-
tisum Veterum: Melilotum Auicennæ: Melilotum Ve-
terum: Sertulam campanam, & Coronam regiam.

Malè Lonic. meo iudicio hanc plantam bis
pingit lib. 5. ac primùm quidem cap. 93. nomine
Meliloti Dioscoridis, herbæ regiz, ac Meliloti lu-
teæ. Et rursum c. 94. sub Meliloto alba.

Gesn. de hort. Melilotus vera flore luteo, &
albo: vulgi Trifolium aureum.

Lob. & Penz Adu. Melilotus germanica &
gallica. Obs. Melilotus germanica, quo nomine
& in Ic. Pl. Tom. 2. p. 43. appellatur, Melilotus
lutea, & alba Auicennæ, Trifolium odoratum
Dodonæi.

Lotus silu. Cæsalp. quæ vulgè Trifoli, & cor-
rupto vocabulo Tripuli vocatur.

Cam. hort. & ad Hist. germ. Matth. Trifolium
caballinum dicitur, quod Bononienses loco verè
Meliloti usurpent: & Melilotus vulgaris, quæ po-
tius Lotus sit.

Hist. Lugd. duas icones vnius plantæ ponit.
Primam, p. 507. cui titulus, Lotus satiuæ altera
Matthioli. Melilotus officinarum: Hæc opinio de
Loto nititur duntaxat opinione, non rationi-
bus. Et alteram, p. 511. quæ inscribitur Melilotus
vulgaris, siue Trifolium odoratum Dodonæi.

Thalys Hæc. Trifolium odoratum L. Dod. seu

Tribulo.

Cytisum.

Dioscoridis.

Galeni.

ignotum.

Mel frugum.

Matth. Boer.

Diosc. Cytis.

suu.

Dodonæi.

species.

huius Meli-

loti.

Lonicæ.

Melilotus.

Diosc.

Herba re-

gia.

Trifoli.

Lonicæ.

Hist. Lugd.

duplex or-

ror.

Melilotus vulg. flore tam citrino, quam candido.

Locu. & Tempus. Tab. ic. p. 107. & Hist. p. 206. Lotus silu. flore albo. miffus: oder wilder Steinflee. Item Lotus silu. 2. precedenti in omnibus similis, exceptis radicibus magis fibrosis, & spinis caulium. Et rursus l. p. 110. & Hist. p. 211. Melilotus vera, Lotus urbana, Melilotus urbana, nobilis coronata. Sertula regia. Sertula campana, quibusdam Melilotus saxifraga, & lutea. Arab. *Alahile lemelib.* Ital. *Meliloto.* germ. *honigflee/ gemein* oder *groß Steinflee / Schüchlein* & *Unser leiben frauen schenklein*. Passim prouenit, tota Aestate fere flores, flore albo & luteo. Compiler Tab. cui tanquam imperito indulgendum, proponit tres icones vnius plantæ, & nomina tum latina, tum germanica inter se confundit, nec ullam descriptionem exactam exhibet, ac falsè vnam ex suis Melilotis dicit spinosam.

Locu. & Tempus. Iconem duplicem Theod. Dorst. habet, sed Meliloto non convenientem

Cesarij in prelo. Gesn. de coll. stirp. Trifolium odoratum, quodd Math. Cyrtum facit, omnino est Lotus. At licet hæc dicat Gesn. ego tamen hanc pro cyrtis apud Matthiolum non inuenio.

C. Bauh. apud Matt. & in phyt. Trifolium 43. siue odoratum, seu Melilotus offic. flore luteo, & albo.

In fluuijs, & fluminū ripis prouenit, Cæsal. Ego obseruavi montipeli. Basileæ etiam florentem Octobri inter horarum Xenodochii & propugnaculam. Copiosè quoque mense Iunio & Iulio ad ripam fluuii Birsæ. Genevæ passim Iunio mense. Adhuc prope Aspach, vnde in hortum M. E. C. transiit flore, albo: flores Augusto. Eadem copiosè prouenit inter Sulz & Bollwiller. Genevæ abundat iuxta Arve fluuium.

Ufus. Romæ mulieres Trifolium hoc distillant, pro suffumigijs, & alijs varijs odoramentorum lasciuijs faciendis, Monachis in Mel. autoribus. Scit Matth. eius succo oculorum nubeculas deleri. Vsurpatur tota planta vnguentarijs, quodd odoratum aquam ex ea faciant, in qua chirothecas macerant, ac lauant. Vtuntur [inquit Dodon.] hoc vniuersæ Germaniæ officinæ in omnibus medicamentis, ac compositionibus, pro Veterum vera Melilotp. Odorata siquidem est, & nonnulla amaritudinis particeps, ac simul digerendi facultatem cum nonnulla adstrictione habet. Hinc igitur emplastris & cataplasmatibus digerentibus, ac resoluentibus, nec non concoquentibus, tum & acopis omnibus vtiliter admiscetur. Ex huius tandem floribus [teste Cæsalp.] per destillationem extrahitur aqua, quæ per se quidem nequam grata est, at alijs odoratis ammixta, valde gratum & perseverantem odorem spirat.

MELILOTO VULGARI NOSTRATI

affinis, folio minore & angustiore.

Locu. & Tempus. Angulosos & prolixos caules profert, minores quàm vulgaris Meliloti, diuisione parifolia inidem tergemina, odorata, sed non parum tum longiora tum angustiora, quàm nostratis vulgaris, per ambitum crenata: floris lutei consimiles spicati, sed singuli minores: pericarpia circularibus lineis rugosa, singula vnicum



semen continet. Aded coactæ breuitatis reperitur interdum, vt palmarum non superet, radice proluxa, & simplici, cuius picturam exhibemus.

Vbi collegerit, aut vnde attulerit Gerner Cherlerus p. m. non occurrat.

MELILOTVS MAGNO SEMINE

rotundo, rugoso.



DVorum altitudinem assequitur, radice simplici, recta, lignosa, alba, gracili: caulis angulosus, purpurascens, rigidus, lauis, arcto tubulo peruius, plurimis ramis brachiatus: folia trigemina, pediculis rubescens, appenduntur, supremo margine rotundata, leuiterque

crenata, nonnunquam & integra: strobili melini, vulgaris Meliloti, veluti in spicam digesti, suauolentes: pericarpia Pisi magnitudinis, rugosa, semen modò vnum, modò duo continere.

Camer. inter icones Melilotum hanc depingit, vocatque Italicam. Cui inscriptioni in horto addit, vocari & Melilotum veram, in Maris autem incolis hodie *Malatro*, in Romano agro *Coronellam*, ad imitationem Antiquorum, qui Romæ Sertulam campanam nominabant. An Anguill. Illyricorum *Diselina*: C. Bauh. Trifolium 54. siue Italicum, folliculis rotundis, quod Northul. à D. Io. Ostvaldo *Loi vesicariæ* nomine habet.

Sata in horto E. C. floret Iulio, semina profert matura Augusto & Septembri, quo mense apparuerunt plantæ nouellæ ex semine decido. Semen huius misit Tossanus Carolus pro Melilotis Hispanica.

Melilot. 13
radica.
Melilotus
Gera.
Malatro.
Coronella.
Diselina.
Trifol. 114.
licum.
Lotus Gess.
caris.

Locu. & Tempus.

TRIFOLIUM ITALICUM, SIVE

Mehlotus Italica corniculis

INCENSIS.

Descriptio

Folia

Flores

Siliqua

Tragus

Mehlotus

nota

Trifol. Itali.

cum. Coro-

naregia

Cornici.

Mehlotus

Mehlotus

Tragus



Praeterea est Trifolium, trium, quatuorue cubitorum, & altius interdum, alis multis brachiatum, iisque crassis satis & firmis: folia terna ex brevibus pediculis, Mehloti germanice haud multum dissimilia, oblonga, serrata, glabra: & quorum sinu pediculi exeunt palmares, in cacumine comantibus onusti floribus Mehloti Syriacae, luteis, odore fragranti & perenni: quos siliqua sequuntur falcatae, viciales, compressae, striatae, gemino versu alato pendulae.

Fuchsiana nostra figura non placet, qualem habet Tragus & Dodon. qui etiam in postrema hist. eam retinet. Ne ergo lectores existiment, nos velle eos priuare fi-

gura Mehloti Syriacae, & nostra figura displiceat, altera icone proponimus ramum ex Lobelio, qui in tabella simpliciter cum magis recuruis siliquis est: Siliquam etiam ex nostra Syriaca separatim, & ramum cum flore eius, quae prouenit Basileae: in Syriaca, quod monuit Lobelius, siliqua videtur magis curua, falcataue. In Italica porro, quod ait idem Lobelius, esse minus falcatas propter degenerationem, asserere adhuc nequimus.

Corn. dicit, notam officinis Mehlotum herbam & Germanis dici welscherflee [Italicum Trifolium] quibusdam etiam Coronam regiam. Verum nescimus in quibus officinis fuerit Italicum Trifolium in usu eius tempore.

Fuchf. vocat Mehloti tertium genus, & Italicam Mehlotum, maioris, ut loquitur, discriminis causa, quam optimam & legitimam arbitrat, scribens ex Italia in Germaniam delatam, flore luteo, odorato, semine in siliqua lunata.

Quamuis autem Tragus iconem eandem habeat cum Fuchfio, nomine Mehloti maioris, cuius alia passim species extet, non tamen videtur de eadem planta scribere: siquidem Mehloti

huius aliam speciem, ne dicam passim, sed haec genus nullibi, extare animaduerti. Quam ob causam puto illum intelligere Medicæ speciem per suam descriptionem, de qua alio loco.

Gesner. appellat Trifolium odoratum in Italia sic dictum, & iudicat Lotum siluestrem, & non Mehlotum. Dodonzo Gall. olim vera Mehlotus, quæ usurparetur Roma, & in Italia adeoque Mehlotus Italica vocata sit, Germ. Italianisch oder aut Römisch Melior, Gall. oray Melior. Alibi tamen aduersus Fuchfium dicit cum vera Mehloti non per omnia communicare. Fuchfius, inquit is, Mehlotum Italicam [welschen steins fleck] nuncupat, & cum vera Mehloti conuenire existimat: cum qua tamen non per omnia conuenit. Siliquæ sunt recuruae, in quibus semina parua, ac forma Genistæ: radicibus firmioribus, longis, tenuibus & fibrosis: & varium & mutabile caput.

Mehlotus Syriaca, omnium, quas nouerunt Pena & Lob. huius familiae, optima & elegantissima, quæ est Syriaca Alepo ferri cepta. Paratissima, quasi soli satui oblita, non nihil corniculis minus sulcatis, lunatis, & ignauiore odore degenerat. Hanc Obs. describunt mehlotum Italicum & Patavinum. Trifolium corniculatum alep- rum Dod. Ic. Pl. Tom. 2. pag. 43. mehlotus Italicum & Patavinum. Et precedenti pag. 42. mehlotum Syriacum odoratum, mehlotum, ferulam campanam. & coronam regiam. Miramur nos Lobelium non meminisse Mehloti Italici, cuius mentionem facit Matth. & alii plures, quæ non primum anno 1562. ferri cepit ex Syria, & degenerauit in Italia, ut Lob. ait, sed longè antè exibat in Gargano monte, teste Matth. cuius recordatur Fuchfius, anno 1540. Licet porro Lob. lib. Ic. Pl. duas proponit icones, non propterea facimus duas diuersas plantas, quandoquidem ipsemet dicit Italicam & Patavinam ex Syriaca degenerare.

H. N. Lugd. mehlotus, siue Sertula campana nuncupatur.

Thal. Harc. Trifolium corniculatum alterum D. d. mehloti maioris tertia species Tragi. Figura quidem Tragi, non descriptio autem, Mehloti Italici correspondere videtur, quod Thal. non animaduertit.

Casp. Bauh. phyt. Trifolium 44. siue odoratum corniculis reflexis, mehlotus siue Sertula campana Matth. ic. p. 440. mehlotus Syriaca odorata Lob. part. 2. p. 42. Item Trifolium 52. siue corniculatum 1. mehlotus maior Tragi. mehlotus Italica & Patavina. Non sciungendum erat C. Bauhino Trifolium 52. sed dicendum potius 45. vel 44. Nam & Matthiolus de Italica differens, non separat Mehloti Tragi, quod iconem attinet.


Is autem in Diosc. vocat mehlotum legitimam, quædam Sertulam campanam, Arabum Albilel-melch, Hisp. Coronam de Rei, ubi figura deest, quam ponit in com. cum mag. fig. & Hist. Germ. welsch steinflee: Boh. Romanice cognominat. In Epit. verò cum Cam. glossis sigerfraut appellat, quod nomen non placet, cum alterius plantæ sit.

Vidi Monspelii & Basileæ in horto D. D. Iacobi Zvingeri. Portione nomine Mehloti veræ ex Syria Val. Dourez, pulchra & integræ me donauit Frater. Probatissima [quod Matthiola nemo negat] legitimaque Mehlotus non modo in Campaniæ pluribus locis, sed etiam Gargano Apuleiæ monte prouenit. Cuius semen in tenuibus corniculis inclusum nuper Venetia asseri cepit. Testantur hoc Adu. quæ dicunt: E Syria-

Syriaco Alepo ferri cepta fuit, & foliis superioribus, nec antea, annis 1562. & tertio, cuius etiam culci referti Venetiis, in Martinelli ad Angelum officina, prostant: exilior, odore Meliloti Germanica, vel Gallica, sed multo fragrantiore, ac in decennium perdurante. Sata Patavii, degenerat.

SECURIDACEÆ GENVS TRIPHYLLON.

CAP. LIII.



Pedales habet, graciles, sed robustos caules, foliis donatos ternis simul iunctis, per extrema latioribus, crenatis, quibus, veluti ad caulium articulos, medioeribus intervallis distantes, siliqua falcata verticillatim apponuntur, Meliloti Italicae siliquis pares, dena, aut duodena, caulem coronantes, semunciam longiores, graciles, striatae.

Dalechampsio dicebatur Securidacæ genus.

Describit hoc & depingit Hist. Lugd. titulo Hedyari minimi, cuius radix tenuis, brevis, candida, flos luteus, circa caulem copiosus: semen rufum, bipenni simile.


An Dodon. Hist. frum. & Lat. in fol. Fœnugracum silu. alterum, recentiori ætati Fœnugracum legitimo similis, flores perpusilli, siliquæ teretes, tenues, parvulae, oblongæ, tres, quatuorve simul, in quibus semen exiguum.

An Lob. Obs. p. 502. Et Ic. Pl. Tom. 2. p. 45. Fœnugracum silu. Herbariorum?

In agro Monspelienfi & nemore Gramuntio, præsit, Hist. Lugd. In Hispania plerisque incultis locis sponte exte Dod. accepit. Hortis hic in Belgio [ait Lob.] duntaxat quibusdam reperitur, ex Hispania delato semine.

LOTUS SYLV. EX CODICE

Cæsareo. CAP. LIIII.



Depingitur caule recto, foliis trifoliis, & è sinu horum, pediculis flores, deinde siliquas, proferentibus, quæ tenues sunt, & quàm Fœnugraci minores, ut imago ostendit.

Huiuscemodi autem silvestris Lotus hætenus incognita latet, & non nisi in vetusto Bibliothecæ Cæsareæ

codice reperitur, annotante Dodonæo.

Hist. Lugd. Lotus silu. ex codice Cæsareo, sicut & C. Bauhino, cui Trifolium 48. quoque dicitur.

TRIFOLIUM PRATENSE, ET LOTVS pratensis Veteribus, & in genere.

Licet de vulgarissima Loto, Trifolio pratensi, Veteres particulatim nihil prodiderint, nec Dioscorides de hoc caput proprium conscripserit, nihilo tamen minus hanc non penitus sicco pede transit, sed de hac l. 4. c. 107. egisse videtur, cum ait, silvestris Lotus quam Trifolium minus appellant plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali & sæpe maiore: alis multis: foliis trifolii pratensis, &c.

Oxytriphylon (inquit Scrib. Larg.) foliis, & specie, & numero similis communi Trifolio, nisi quod huius pleniora sunt, & frutex eius duorum pedum interdum, aut etiam amplior conspiciatur, & odorem grauem emittit, quorum nihil circa pratense Trifolium inuenitur.

Nostri (inquit Corn.) Herbarii Trifolium hæc vocant, & tria eius genera agnoscunt, quæ florum colore discriminant, purpureumque, ac album, & luteum appellant, quæ pratensia sunt.

Aliter sanè de Trifolio pratensi Tragus scribit, dicens: Hoc inter omnia Trifoliorum genera, quæ sanè multa sunt, non solum formâ, sed & vlu nouissimum vulgò habetur. Eius duo existunt genera, colore duntaxat florum, & magnitudine differentia: hoc enim album, illud purpureum fert florem, hoc maius, illud exiguum censetur.

Sed Trago contrariatur Fuchsius, dicendo, Tria apud nos passim in pratis prouenientia trifolia inueniuntur fastigia: quorum primum: à floribus purpureis, Trifolium pratense purpureum. Germ. Braun wesenflee, Gall. Trefle purpuree. Alterum idem à floribus suis candidis, Trifolium pratense candidum, Germ. weisse wesenflee, Gall. Trefle blanc, Et tertium luteum, Germ. Gel wesenflee, Gall. Trefle jaune appellauimus. Quod ad folia ipsa attinet, non admodum differunt: quoduis enim horum generum tribus constat foliis, quæ in primo sunt latiora & herbacea, in secundo autem longiora & angustiora, magisque pallescentia, candicante uero, in tertio sunt minora & rotunda, atque ad Fœnugraci folia accedentia. Sunt qui hoc genus Lagopum esse putant.

Cæterum [ait Matth.] Trifolium pratense in Italia trium est generum, foliorum & florum diuersitate differentium. Primum foliis exit subrotundis, & amplis: maculosis, longo pediculo nitentibus, obsequioso, flexilique: floribus in capitulis subpurpureis, aut albicantibus, in cauliculis summitatibus emicantibus. Nasceitur in pratis & herboso solo. Secundum cauliculis assurgit lentis, obsequiosisque, foliis in vnoquoque pediculo ternis, variâ tamen facie petinde ac bituminosum: namque quædam, quæ ad radicem sunt, Acetosi Trifolii modo, quod Oxy vocatur, trina ex vno pediculo emergunt, ac cordis faciem quadantenus imitantur, cætera uero longa sunt, & in cacumine acuminata, ut in Asphaltite: flores in capitulis sunt illi purpurei in flocci modum. Prouenit sponte in pratis, & viridariis, & herbosis locis. Tertium, ut primum, circinatis, sed breuioribus foliis. Distant & florum colore, quod in vno flores albicant, in alio

Trifolium

Trifolium commune

Trifolium pratense Cornar. differentia

Tragi differentia

Fuchsii differentia

Folia

Lagopus

Matth. differentia

ro rubescant, in tertio lutei spectentur. Pratenſe Trifolium tempeſtates prænuntiat. nam [vt Plin. eſt autor] inhortefcit, & folia contra tempeſtatem ſurgit.

Aduerſaria Trifolii pratenſis triplicem varietatem perhibent, aſt diuerſos colores non oſtendunt.

Cæſalp. porro Trifolium pratenſe vocat, quod in ſternalibus campis, & inter ſegetes ad pabulum iumentorum ſecatur, infirmis caulibus, aut ſtratis in terram, aut procumbentibus: cuius multæ differentiæ, magnitudinis, & paruitatis, tum foliorum, tum caulium, tum fructûs.

Turn. diff. vntia
Turn. duplex genus tantum agnouit, dicens: Eſt Trifolium quoddam vulgare in pratis naſcens, flore vel albo vel purpureo.

Eucharis arvens
Indiſtinctè Euchar. de Trifolio fleæ, Triphyllo fleiſchblüm, Triblat/ heymſchenfleæ / & wildenfleæ ſcribit, non demonſtrans quodnam intelligat, vires etiam confundit, ac pro Trifolio poſita icon, Oxios, ſive Trifolii acidi.

Trifolii in pratis naſcentis, inquit Amatus, tria genera paſſim videntur, alterum foliis rotundis, & magnis: alterum verò acutis: tertium foliis quoque rotundis, ſed minoribus, quæ omnia floribus lacteis, quandoque rubris, nonnunquam verò purpura ornantur. Harch. itidem Trifolium pratenſe à colore triplici triplex numerat, candidum, purpureum, & luteum.

Nomina linguarum
Græci τριφυλλιον in τῷς χορτοκατακλιμαζόμενοις, & non raro, ἀπὸ τοῦ τριφυλλίου nominant: Latini Trifolium pratenſe dicitur: Ger. dreyblat fleæ/ miſenfleæ / & fleiſchblümer, Belg. Claeyrn. Angl. herbe trefolie. Gall. Trefle, Triolet, & vetere eiſdem Gentis lingua, Viſumarm, vt tradit Marcell. Scriptor antiquus. Ital. Trifolio. Hiſp. Trenol. Hung. Lo here.

Locus & tempus.
Naſcitur in pratis, vnde etiam nomen naſtum, ac paluſtribus locis, præſertim iis, qui ſubinde, fluminali aqua rigantur. Floret Maio & Iunio, ac reliquæ deinde æſtatis maxima ſæpe numero parte.

Vires & vſus
Haud dubiè mediocriter concoquendi & exſiccandi vim poſſidet, vt non temerè quidam ex Recentioribus Herbariis tradant Trifolia pratenſia albo muliebri profluuiio mirificè conferre. Eidem etiam inflammationibus impoſita, eas concoquunt, & ad maturitatem perducunt, Fuchſius. Trifolio pratenſi nihil vtilius pecori veterinarie ſaginandæ. Id etiam inter palati irritamenta recenſent Lobel. & Pena. Reſtiferat, exſiccatur cum partium tenuitate: inflammationes cataplaſmate, ventris torſiones, colicæſq; dolores iniectione mulcet, ac exſiccandi & mediocri concoquendi vi menſtruis albis mederi proditur, Lobelius. Aſt conſiderandum an vires à Fuchſio & Lobelio attributz Trifoliis vulgaribus conueniant, ſaltem non conueniunt purpureſcenti, ſive rubenti maculato: folia enim guſtu acia, vt paulò poſt dicemus. Semen & flores ex aqua mulſa, aut vino decocti & ebibiti, vel clyſtere iniecti, inſteſtinorum roſiones ac dolores ſedant, & viſcidos, lentosque adhzrentes inſteſtinis humores educunt. Ex aqua verò decocti, & ex oleo admoti, duros emolliunt abſceſſus. Ex ipſa verò herba, cataplaſma vtiliter inflammationibus impoſitur. Volunt nonnulli Trifolium flore purpureum comestum aut ebibitum, menſes prohibere. Album verò prouocare. Paſcuntur herbam cum boues & iumenta, tum vtiliſſimè vituli, & agnelli. Flores apibus graui ſunt, de his enim vt de Thymo mellific-

Semen & flores. præſtina

Abſceſſus inflammatio

cant, Matthiolus. Sunt qui Trifolii pratenſis ſuccum, miris laudibus efferant ad oculorum nubeculas, albis quidem maculis in foliis notati, ad albas, nigris autem ad nigras, Hort. Luſ. Succus in vniuerſum ad cicatrices & vulnera commendatur. Eaſdem penè obtinet facultates, quas Fœnumgræcum, ſed non perinde vſitatum.

TRIFOLIA MACVLATA ET ACRIA.

CAP. LV.

QVandoquidem adhuc minùs nobis conſtat, quomodo Trifolium maculatum, & acre, à vulgari & ſequentibus ſit diſtinguendum, ideo caput particulare hoc eis tribuimus, donec diſcrimen meliùs innotefcat. Ex maculatis igitur, quæ ad certam claſſem referre ambigimus, primùm ſeſe offert Hæmorrhoidum, de quo Geſn. horti, quod circa Lugdunum videtur, ſpecies alia Trifolii pratenſis, maculis nigris. Poſt hoc eſt & altera ſpecies maior, in collibus & aruiſ Tiguri frequens, acri guſtu, vt abſceſſu tertio calida videri poſſit. Sed quod ſit Geſneri Trifolium acre, mihi non aded compertum eſt. Frater etiam quod intelligat, ne later. Refert ad Cluſianum poſt dicendum. Trifolium, vt diuinantur Aduerſaria, pratenſe purpureum & album præalunt, ſæpiùs guttatis & ſalcatis ſuperficie foliorum maculis. Meminit & Cæſalp. Trifolii maculati, albo flore, à dicendis alieni, de quo forſitan agimus titulo, de Trifolio albo, glabro, minore, ſermina.

Trifolium guttatis maculis (inquit Lob. Obſ.) Euphraſiæ ritu ocularibus decoctis & colligiſtis noſtra ætas feliciter commiſcet.

TRIFOLIUM PURPUREVM VULGARE.

CAP. LVI.



ECcui igno-
rum phaco
vulgare idem
Trifolium, cui
ex radice cran-
ſuſcula, adul-
tiori ſerè, digi-
tali, fibrata, vi-
ticulæ tenues,
ſtriatz, partim
humo repunt,
partim ſurgunt,
ſub-
hiſcunt: ſed de
trium foliorum,
nunc rotundorum,
aliàs ob-
longorum, in-
terdum ſpicu-
latis lineis al-
bis notato-
rum, nonnulli

quam obliquis candicantibus ſtriſ virgato-
tum, numero poſituque notius: Flores autem glome-
rati modò rubent, modò alben, odore non in-
ſuaui, guſtanti ſiccitatem offerentes: anno 1607.
menſe Iunio obſeruau Trifolium vulgare pur-
pureſcens in area paſſim arcis Montbelgard. in
horto & extra urbem habere maculata folia: ma-
culas autem eſſe albicantes, ſemicirculares, ad
cordis

cordis formam nonnihil accedentes, & folia aliquandiu masticata acris esse.

Drusell. cr.
710.

Brunfels. Herb. germ. Trifolium primum, Gemeinflex / Dryblat & Fleischblum à colore rubente instar carnis ad summum exsiccata. Et Tom. 3. Trifolium maius ubi perperam pro Trifolio purpureo vulgari, apposita icon. Melampyri.

Trifol. pratense.

Trifolium pratense Fuchsio & Trago. Trifolium simpliciter pratense Lobelio & Tab. quibus addit Thallus vulgare, & alterum flore rubro. Flore purpurascens Lonic. dicitur. Capitulis florum purpureis Gesnero. Purpureum, Lobel. & Penz. Adv. Castalp. Camer. Hort. Lus. C. Bauh. cui & Trifolium, in phyt. nominatur.

Trifol. Gal.

Trifol. pur.

Locus & Tempus.

Vires.

Pessim in pratis provenit. Vide paulo ante vires, titulo Trifolium pratense, & Lotus pratensis, Veteribus, & in genere.

TRIFOLIUM PURPUREUM maius, folio & spica longiore & beruore.

Disce. Cal.
711.



AD cubitū & sesquicubitum excrecit, caulis crassiusculis, valentibus, variegatus: in foliis subinde ludit, incedum semunciam vix excedunt, subrotunda, frequentius oblonga, acuminata, trium viciarum semunciali latitudine, concinne per ambitum crenata, admodum venosa, crispata, trigemina, pediculo hix in vaginam valde laxa pinnatam, trium viciarum, aut longiorem caulem complectente, desinente, flores rubentes in spicam palmarem & maiorem, satis crassam dispositus, ex calycibus in pinnas longas, tomentosas, dissectus.

Tragus, vocando Cytisum insigniter labitur. An Hort. Lus. Trifolium montanum purpureum?

Clusius in Pannon. describit & iconem exhibet cum spica brevi. In post. vero hist. cum spica longa. Describit & depingit Lonicetius ex Trago, quem citat, & Cytisum sily. Co-

Tom. II

lumellæ facit, à Dioscor. digersum: quamvis ipse non norit. Lobel. Obs. Lagopus altera, an Cytisus Tragi, & Trifolium magnum Cordi. Dodon. Lagopus maior alter. C. Bauh. phyt. Trifolium 32. hinc spicatum folio pinnato.

Cytisus
lumella
Lagopus
Lob.

Observatum à nobis florens Iunio prope Champi Genevæ, & Basileæ in horto D. D. Felicis Plateri. Invenitur, rure Clusio, non modò in Hamburgensi Pannoniæ monte, & illi vicino Prellenbergo, sed aliis etiam Pannoniæ, & Austriæ, Sarmatque montibus, alpestribusque pratis & silvis. Floret mente Maio & Iunio.

Locus & Tempus

TRIFOLIUM MAIUS CLUSII (secundum, non album, sed rubrum.

Trifolio maiori albo non valde dissimile est alterum genus, vel amplitudine, vel forma folia tamen paulò angustiora, & crassiora strobilorum, qui confestim nascuntur, spica, eaque summo caulis fastigio inhaerens, sine illo petioli vestigio, & quasi inter folia latens, cui plerumque adnascitur alia brevior, rarissime terna: strobili vero differunt colore, qui non albus est, sed ruber, & odore, cuius sunt expertes: radix, prioris radici serè par.

Descriptio
Ficus.

Clus. in Pann. & in fol. Trifolium maius 2. hinc maius purpureo flore. C. Bauh. Trifolium seu montanum purpureum maius. Trifolium altera species & maius in collibus, Gesn. hort. Et, maius secundum Clusium sine iconem: variat, folio acuto non crenato, & obtuso crenato.

Trifolium
712.

In Hamburgensi monte & aliis Pannoniæ & Austriæ montibus, Alpestribusque pratis, præsertim siccioribus Viennæ vicinis, tum pariter in Moraviæ & Bohemiæ silvis copiosè invenitur.

Locus

TRIFOLIUM MAIUS TERTIUM purpureum Clusio.

Maiore multò excrecit altitudine, quæ plerumque cubitalis est: caules etiam habes crassiores, nodosos: folia ex singulis geniculis alternatim prodeuntia, longa, stridatque, dorso magis eminentè & elato, laxà quadam veluti vaginà in binas appendices desinente, caulem amplectente, deinde terna numero ex eodem petiolo nascentia, superioribus duplò longiora, illis tamen non minùs dura, & per oras denticulata, gusta nonnihil adstringente: huic spica oblongior, & maior, elegantissima rubrorum strobilorum è caliculis hirsutis emergentium festiva composita: radicem habet superiorum radici similem, vivacem & singulis annis plures caules proferentem.

Descriptio

Clus. Pannon. Trifolium maius 3. seu maximum flore purpureo. Tragus Grossen Geystlee / & Cytisum appellavit. Lobelius alterum Lagopus nuncupasse videtur. Hæc is, qui in rariorum Hist. post. non amplius Tragi Cytisum facit, nec mutati consilii rationem assignat.

Calceolus

TRIFOLIUM MONTANUM minus Thallio, purpureum.

Rarioribus constat cauleculis, & foliis acutè mucronatis, & capitulis etiam, estque flore quandoque purpureo, quandoque candido.

Descriptio

Trifolium
monspeliense

Thal. *Trifolium albidum montanum*, etiam satis vulgare, foliis oblongioribus, acutè mucronatis, minus. C. Bauh. phyt. *Trifolium nigrum*, semper-purpureum minus: variat flore albo, & rubro.

TRIFOLIUM ALPINUM RHETICUM
Astragaloides.

Descriptio



Non ita
obuium
alibi, quàm
summis mon-
tium iugis hoc
Trifolium, cui
radix crassa,
longa, in plura
capita aliquan-
do diuisa, ter-
ram vertus co-
mota, substan-
tia albà, dulci:
ex qua pediculi
germinant lō-
giusculi, imò
parte vaginam
inutati, folia
tria, oblonga,
vncialia, an-
gusta, acumi-

nata, glabra, obliquis venulis intertexta: inter
hæc surgunt coliculi nudi, eñodes, vix foliorum
cacumen attingentes, quorum fastigio insident
glomerati flores, magni, rari, purpurei, semen
Cræcæ minoris, compressum in siliquis semun-
cialibus, foliaceâ vaginâ textis.

Flor. semper

Trifol. alp.

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 42. siue *alpinum* mini-
mum flore luteo. Io. Ponz in Baldo, *Trifolium an-
gustifolium alpinum*, radice sapore subamaro. Planta
admodum rara & perennis, florum colore pur-
pureo, admodum venusto.

Locus &
tempus

In Rhetia in monte propè Burium inueni,
florens mane lunio.

TRIFOLIUM STELLATUM PURPV.
tenum Monspeli.

Descriptio



Bipalmæres,
non planè
luteos, et-
iam in terram
prociduos sū-
dit ex gracili
lignosâ radice
caules, totos
densâ lanugi-
ne obritos.
folia terna lō-
gis nixa pedi-
culis, cordata,
tantillam per
oras superio-
res crenata,
penitus hirsu-
ta: florum glo-
meres diuisi,
coloris pur-
purei, per-

quàm villosis constant calycibus, quorum pinne

diductæ radiatam stellam representant. Multa
habet communia cum *Trifolio* ex albo incarna-
to, cui folia non cordata.

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 35. siue *stellatum*, quod *Trifolium*
multum similitudinis habet cum *Logopo maximo* La-
belli, at diuersum est.

Prout in Monspeliâ circa patibulum, vbi flo-
rens legimus mente Aprilis. Montbelgardi in hor-
to E.C. ex semine de caduo pullulauit.

Locus &
tempus

TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM

spicatum.



Commu-
ne quæ
habet cum Cy-
tiso Tragi: ra-
dix vicia, te-
nis, longius-
cula, lignosa:
caules ex ex-
plures, satis
fieri, palma-
res, aut peda-
les, simplices,
in quibus folia
tertia, grami-
nea, hirsuta,
pediculo nixa
vnciali, caulem
longâ, striatâ
vaginâ obvol-
uente: spica
duarum circiter
vnciarum

Descriptio

longitudinis, aut maior, ex floribus purpureis
congestis, in calycibus lanuginosis, pinnas quin-
que protendentibus.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 121. siue *Alopecurus*, minus.
Item *Trifolium* 39. siue *spicatum angustifolium*.
Lob. & Ponz *Lagopus altera angustifolia*. Hist.
Lugd. p. 431. *Alopecurus graminea* Valeth. Et p.
441. *Lagopus altera angustifolia*.

Abundans inueni inter Monspeliâ & Lug-
dunum, florens mense lunio.

Gramen si-
ue *Alopecu-
rus* minus.
Trifol. spicatum an-
gustifolium.
Lagopus.
Alopecurus.
Locus &
Tempus.

TRIFOLIUM ALBO-INCARNATUM
spicatum, siue *Lagopus maximus*:



Satis proli-
xâ radiis
donatum est,
gracili, fibrosa,
caules plures
dodraniales, &
cubicales, hirsu-
ti, simplices:
folia ex piloso
pediculo, vagi-
nâ suâ breui,
hirsutâ, caulem
complexo, ter-
ta, subrotun-
da, latiora,
quàm longio-
ra, crenata,
non cordata,
spica duarum
aut trium vnciarum
floribus
constat albis,
dulcâ

Descriptio


dilatâ purpurâ remistæ, ex calycibus admodum villosis, in pinnas quinque desinentibus. Semen minusculum, subrotundum, lucidum, pallidum, accedens ad Meliloti vulgaris: saporis Pistorum.

Lagopus Trifolium. Lob. & Penz. Adu. Obl. & Ic. Plant. *Lagopus maximus folio & facie Trifolii pratensis.* C. Bauh. phyt. Trifolium 36. siue spicatum flore subrotundo. Dod. in fol. *Lagopus maior folio Trifolii.* Hist. Lugd. *Lagopus maxima.*

Locus & tempus. Genus observari in prat. is prope fluvium Aræ florens Maio: vt & alibi: Annua est planta, ex semine deciduo, siquidem maturo Iulio & Augusto, se conseruat.

TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM HISPANICUM, siue *Lagopus angustifolius* flore dilutè rubente.

Descriptio



Caulis

Lagopi maioris genus, semine ex Hispaniis accepto natum, cuius iconem ad Clusium mittebat Iacobus Plateau: id vnicum fert caulem gracilem, & satis firmum, nodis quibusdam distinctum, & in aliquot ramos diuisum, nascentibus ad singulos nodos, pediculis, satis laxâ sede caulem & ramos ample-

Folia

ctentibus, quorum extremis terna insident folia, vt in trifolio albo incarnato, non orbiculata tamen, sed longiuscula, & angusta, carinata, siue dorso elatiore, canescentia inital foliorum vulgaris Lagopi: summi rami desinunt in longas caliculorum spicas, è quibus emergunt *flosculi* vulgaris floribus similes, & ferè concolores, hoc est, dilutè rubentes.

Flosculi

Locus

Lagopus angustifolium Hispanicum Clus. obseruare meminit Salmanticensi agro, dum in eâ vrbe vivebat, ad vinetorum aggeres.

LAGOPVS TRIFOLIVS QVORVMDAM.

CAP. LVII.

Descriptio


Nomen ex argumento spicæ indeptus est, quæ molli villo, cineraceo, purpurascen- te, leporinos pedes imitatur, *flosculis* albidis & minutis, Scorpionidis, tantillum prominulis, quos *semen* excipit exile, sulcum: coliculi pal- mum, aut sesquipalmum alti: vel etiam spirham- zi, ramosi, toti canâ lanugine pubent, in quibus hirsuta Trifolii folia, vnciam circiter longa, culmum lata, sapore subadstringente, strenuè siccante: *radicula* subest exilis, lignosa, tortuosa, candida, fibrata.

Trifolium folium.

Lagopus

Nostri [in sic Corn. Iad Græcæ vocis imitationem] *hasenpfölin* vocant. Aliqui *Bazentlee* [selium Trifolium:] Nam huius genus quod- dam esse videtur. Apud Hipp. Galenus *Lagopyron* exponit, quæ appellatio, Triticum leporis significare videtur. Trago, & *ultima melilo-* Tom. II.

rus, alba, & Lotus campestris dicitur. Lonic. de- pingit & vocat *pedem leporinum* & trifolium hu- mile *Lagopus*



[teste Dodon. gall.] à quibus- dam dicitur *Le- poris minimum*, *pes leporis* & tri- folium humile. Addit idem in Hist. suum. & in fol. vocari à rō- nullis *lagopy- rō*. Hippocrati- tis. At *Lagopy- ros* non Trito- lia, sed Tritico simili. Lob. & Penz. Adu. *Lagopus genuinus Antiquorum*, *Lagopyrus Hippocrati.* Item Obl. & Ic. plan. *Lagopus Pes le-*

Lagopus can- pifolius.
Lagopus.
Trifolium humile.

Leporis mi- nimum.

Error quo- randam

Lagopyrus Hippocrati.

Lagopus genuinus Antiquorum.

Trinitas.
Matth. se- pich.

Amatur not.

Hist. Lag not.

Lagopodiu

poris. *Lagopus* [inquit Læcynia] Trifolius annu- merata planta, Herbariis *Trinitas* dicitur. Dubi- tat Matthiolus an Germanorum vulgè *Lagopus* legitima sit: Sed quæ tanti dubii necessitas? cur affirmare non audeat? Apud Amatum pro *Lago- po* quidem pingitur, verum alia herba, nempe *Trinitatis*, ab eo describitur. Brunfels. nihil sin- gularis adhibet, sed vulgata retinet nomina. Hist. Lugd. *Lagopus vulgaris Matthioli.* Item *Lagopus vulgaris Fuchsi.* Sed cur frustra Lugd. con- tra *Philosophum* entia multiplicat? Cur duas fi- guras vnius plantæ ponit? Infinitas hac ratione ne dicam Botanicus, sed quivis conforis discipu- lus icones appingere posset. Tabern. *Lagopo- dium* vocat.

C. Bauh. phyt. Trifolium 38. siue spicatum humile, seu *Lagopus.*

Lagopus Germ. *hasenfueß*, *hasentlee* pfoelin, *fazle*, & *fazentlee*. Belg. *hasen Poostens*. Gall. *pie de lieure*, Castil. *pie de liebre*. Portug. *pe de lebre*. Ital. *pie de lepre*. Hisp. *pie de lebre*. Angl. *hares foote*. Boh. *Zagecinoha*.

Nomina linguarum

Locus & tempus

Genus viget mense Iunio & Iulio cum flo- re, Basileæ adhuc Octobri in aruis, Montbel- gardi quoque, ac spontè in horto E. C. Augusto. Non parum huic est adstrictio: siccitatis ve- rò tantum vt mirum seminis profluvio laboran- tibus præstet præsidium Lobel. Alium sistit si cum vino bibatur, aut in febre ex aqua: ad alliga- tur & ad inguinis inflammationem Diosc. Replet causa. Sunt, inquit Matth. è Germanis, qui ea v- tuntur ad detergendam sitim in dysenteria.

Vires & vili

Dysenteria

TRIFOLIUM GLOMERVLIS PER- sonatæ Cherleri.

In humum reclinat palmares caules quos à re- ptante radice emittit, plures, hirsutos, floribus vestitos ternis iunctis, per extremum la- tioribus, pilosis: vniuscuiusque coliculi fastigio capitulum hæret vnicum, minusculum, in Personatæ modum glomeratum, & aristis lon- gis, sed lanugine quadam albicante intertextis, horrens, *flosculis* inter aristas apparentibus par- uis, purpureis, basin autem amplectuntur terna folia, magna, squammatim incumbentiâ subeuntiaque, lata, albicantia, per margines pur- purascantia, similibusque *Arctii* virgata, nesci-

Descriptio

TRIFOLIUM GLOMERULIS TOMEN-
tosis per caulum longitudinem.

Descriptio



Angulosi & glabri caules: folia terna, sancta, parva, ex oblongo, rotunda, glabra, crenata, pediculo donata, serè vnciali, cuius exortu adnata gemina pinna minuscula, ex lato mucronata, caulem complexu suo comprehendit, indidemque strobili minuti, palliduli, glomerati oriuntur, quos se-

quantur glomeruli folliculorum tomentosorum, candicantium, conclusorumque, in quorum singulis semen vnum pusillum, rufescens, nitidum, apophylli veluti donatum, quemadmodum in Foenograci semine animaduertimus.

Locus

Tempus

Ex equalidis Gallo-provincie quibusdam locis collegit Gener Cherlerus mense Iulio.

TRIFOLIUM FOLLICVLACEVM, SIVE
Vesicarium minus purpureum.

Descriptio



Humi fusos producit ex tenui, simplicique radice caules dodecanthes, foliis ornatos ternis, paruis, per extremum obtusis, circumcirca crenatis, pediculo longo appensis: e quorum sinu exit pediculus vncial longior, flores sustinens in orbem glomeratos, paruos, rubentes, quos membranei ex-

ciunt utriculi, satis laxi, bicorni fastigio dehiscetes. Hæc pulchella planta se per tetram spargit, degustata nullum habet manifestum saporem.

De hoc Clus. in Hisp. & hist. post. agit, vocans *Trifolium pratense Salmaticum*, Hispanorum *Trebol de prados*, & simpliciter etiam *Trebol*, quod ipsi & cetera Trifolii genera sic appellant. Ceterum folia huic tribuit in ambitu quoque serrata. Quæ occasio, quod figura Clusi minus placeat, quod talia in eius pictura non exprimantur, nec folliculi, in quibus semen exile, subrotundum, contineri scribit, benè appareant. C. Bauh. phyt. Trifolium 6. siue pratense folliculatum. Lob. Obs. & Ic. Pl. picturam, Clusi descriptioni, et & nostra, Tom. II.

minis commodam habet. Clusi, namque sine crenis proponit: vocat autem *Trifolium pratense Salmaticum*. Tab. *Trifolium hispanicum*.

Ex semine è Belgio misso Genevæ mihi provenit: floret mense Aprili, estque semen maturum Iulio. Clusio autem tota ætate floret.

TRIFOLIUM CAULE NVDO GLOMERULIS glabris: Et aliud parvum cum glomerulis, lignosum.



Ex radice crassiuscula caules exsertit simplices, nudi, glabri, pedales: in glomerum florum purpureorum fastigiat, subrectis foliis, exilibus, viridantibus: sequuntur utriculi folliculorum numero respondentibus, laxiusculi, squallidi, veluti nervulis intertexti, albi, è quorum officio adhuc

folliculorum prominent reliqui: folia tergemina, glabra, subrotunda, serè vncialia, pediculo hærent palmati & sesquipalmati, è radice.

In vis quibusdam hæud ita frequentem, quæ Locus Nemauto ad Gari pontem pergitur, observavit Tempus atque decerpit Gener Cherlerus Iunii initio floens adhuc, sed & vel tunc glomeratum.

TRIFOLIUM PARVVM QVODDAM, SIVE
Lotus pratensis purpurea. Dalech.

Descriptio



Lotus pratensis purpurea [inquit Hill Lugd.] radicem gignit gracilem, candicantem, parvam capillatam: cauliculis multos, serè pedales, hirculosos: folia Loti nunc terna, nunc quaterna, exigua: flores in ramulorum vertice copiosos, purpureos.

In pratis & humidis locis nascitur.

TRIFOLIUM PRATENSE ALBUM
à Fuchio depictum, siue mas.

CAP. LIIIX.

Folia huic hirsuta, oblonga, venosa, crenata, terna ex longo pediculo appensa, per caules cubitales, simplices, plures ex radice crassiuscula, inque plura capita interdum divisa: exortu flores glomerati, albi, Trifolii pratensis, purpurei, alio-

qui similes. Genesv variisque aliis in locis obseruati florentem Augusto, Septembri & Octobri.

TRIFOLIIS AFFINE, QVADRIFO-
lium. Phzum Lobeli.

CAP. LIX.

Descriptio.

Quadrifol.
hortense.
Lotus qua-
drifol. Tab.
motarur.



Lobel. Obs. Quadrifolium phzum & l. Pl. Tom. 2. p. 33. Quadrifolium phzum sicut hortense. C. Bauh. phyt. Quadrifolium hortense album. Tab. Lotus quadrifolius Diebletterichs ter Streinlee. Alii nunc dicunt Quadrifolium, quum in figura Lobelli etiam sint quina.

TRIFOLIUM MAIUS ALBO FLORE
intantum Clusii.

Descriptio.



Ternis, aut quaternis interdum assurgit virgis aut colunt pediculis, firmis, rectis, teretibus, circa quos nascuntur rara folia, oblonga, angusta, dura, neruola, catinata, & dorso elauiore, terna seper ab vno exortu procedunt vbi in reliquis Trifolii generibus, incana, in ambitu veluti dentata, ab radice frequen-

flora & maiora: flores extremis ramulis, in quos cauliculi separantur, inhzrent parui, frequentes, conferti, & spicam quodammodo formantes, albo colore, & nonnullo odore pradi: radix vixat minimi digiti crassitudinem aequans, fusco & dolo cortice tecta, longa, aliquot fibris donata.

Trifol. al-
bum.

Locus &
tempus.

Clusio cuius descriptionem propoluimus, Trifolium maius primum, seu maius albo flore. C. Bauh. phyt. Trifolium 10. siue montanum album.

In pratis siccioribus Metropoli Austriz Vienne vicinis, tum in Moravia & Bohemia floret Maio & Iunio.

TRIFOLIUM PRATENSE FLORE
albo minus, & sermna, glabrum.

CAP. LX.



Contra-
Cuius est habitus quam mas, & latis breuioribus, infirmis, per terram sparsis per quos folia terna, parua, rotunda, glabra, reuusa: flores glomerati, minores, ex longioribus appelli pediculis, coloris albi. Hoc ni salior, Montebelgardii quadrifolium, & quinque folia reperitur. Ex hoc genere sus-

Descriptio.

picor paruum, maculatis foliis, flore albo, reperitur ad fontem admirabilem in Ducatu Wirtembergico: Maculatum etiam est luto circa Montebelgardum. Passim ac sponte prouenientem variis in locis obseruati.

Locus &
tempus.

TRIFOLIUM PARVUM, ALBUM
MONSPESVENSE PILOSUM CVR.

paruis floribus.

Trifolium nostratense pratense albo respondet, sed multo minus est, foliis pilosis, floribus albis, duobus plerumque aut tribus simul rancis: punila est admodum planta.

Montiselli hoc legimus florens mense Aprili. TRIFOLIUM PRATENSE LVTEVM mas, flore minore, semine multo.

CAP. LXI.



Adpeda-
lem altitudinem & cubitalem ex-
cielat hoc Trifolium, can-
libus tamen non pendit
surrectis, quos a radice alba, minimi digiti crassitudine, fibrosa, sapore leguminoso Pisorum aut Fabarum, enulsi difficulti, promit plures, hirsutos: folia hirsuta

Descriptio.

Trifolii purpurei & albi: flores, parui, lutei, ex multis flosculis minimis, formati (si parua licet componere magnis) Genista alicuius, aut Coluteae, congesti, globulum exprimentes, quibus succedunt semina multa, Meliloti officinarum quodammodo similia.

Melilotus

Melilotus minor, Serotina campanica, & *flavescens* Brunfels. *melilotus exigua*, Trago: *medica* Dodonzo: *Trifolium arvense*, Tabern. *Trifolium luteum*, Gesnero: *Saxifraga lutea*, Fuchsio. Meminit tantum Trifolii lutei Matthiolus, nec distinguit nisi colore à cæteris. C. Bauh. in renouato addit iconem.

Nomina
linguarum

Cæterum, nomina linguarum usitata, sunt Gall. *Trefle perizantia*, Germ. *Gelbflee* / *Gelb wiesenlee* & *flavescens* / Belgicè *Eleynsceen* / Clauern & *Eleyn geel* / Clauern.

Locus &
Tempus

Genex florens videt Maio, ubi viribat Hymne: Basileæ Octobri: Lugduni, & Montbelgar- di etiam spontaneum.

TRIFOLIUM PRATENSE LUTEUM, semina, flore pulchriore, siue Lupulino.



Cum Trifolio pratensi luteo mari multa habet communia, radicem exilem, dexam, colligulas graciles, bisturtos, folia trigemina, neruola, florem luteum, sed magnitudine & singularem flosculorum formam differentem, duplò enim & triplo maiores hinc sunt glomeruli. Lupulorum capitula imitati,

minores, contratioque situ squamarum, quarum unaquæque cristata supremum constituit flosculorum folium, reliqua tria sinu suo occultans. Huius porro Trifolii pratensis videntur duæ species: minor passim proueniens: altera magna & robusta ad cubiti altitudinem *capitata*, cum pulchris magnis floribus, in qua *semina* perna forte animaduerti. Pulcherrimum hoc Trifolium pratense luteum, magnum & robustum, *seminam* voco.

An Lepor-
na
Lupulus
filuarius.
Trifol. pra-
sente luteo.

An forte Brunfels. *Leporina*? *Thalium trifolium luteum* alterum *lupulinum*, & vulgò *lupulum filuare* appellat. Casp. Bauh. phyt. *trifolium 4* siue *pratense luteum*, capitulo *Lupuli*. Hort. Lus. *trifolium arvense luteum*, *lupulinum*. Geelb wiesenlee / wiser frawen hopffe. An Tragi, *Meliloti* genus 8. & penult. Lonic. *Tragum* imitatus huius meminit, ac vocat *Lagopum*, *pedem leporinum*, & *trifolium humile*.

Lagopus.
Pro lepor-
Trifolium
humile.
Locus &
tempus

Speciem maiorem inueni in margine agrorum montis Rolsberg prope Masmunster, florentem Octobri, Minorem alioqui frequentem Montbelgardi, Montpelit & Genex. Frater C. Bauh. collegit Basileæ in pratis.

TRIFOLIUM SAXATILE HIRSVTISSIMUM, siue argenteum.

Descriptio

Sub hoc nomine apud Fratrem obseruauimus plantulam, cuius radix dura, lignola, cortice Tom. II.

vestita rufo, cuius figura reptionis suspensionem insinuat: superna illa parte in maiusculos diuaticatur trunculos, plures cauliculos ex radice multiplices erigentes, sed palmam breuioribus, quos folia Trifoliorum ritu digesta vestiunt argentea, mollicella, albicantia, breuissimis nixa pediculis. Ex quorum sinu glomerulum mollissimum, pilosorum, flavescentium stipatu congestum prominet, quod ex flosculis faulcentibus compositum arbitramur.

C. Bauh. phyt. *Trifolium 41* seu saxatile hirsutissimum, quod in ueluticis iugis & caulis summis legit.

Trifolium
saxatile
hirsutis-
simum.

TRIFOLIUM PELTATUM CRETICUM. CAP. LXII.

Quod apud Fratrem obseruatum cum inscrip-
tione Trifolii odorati Cretici, & apud D.

Descriptio
Trifolii de-
rati Cret-
icium.



D. lac. Zvving-
gerum, cui as-
criptum erat
Masaria, Radicula est tenui,
longiuscula, fi-
bris donata,
quæ cauliculos
ex se promit
duas, tréve
uncias altos,
glabros, folia
exigua, quæ
longiusculis
insident pedi-
cellis. Flosculi
quini plus mi-
nus cauliculo
summo incu-
bunt congesti,
pallide luteoli:
quos siliqua
excipit com-

Masaria

pressa, latiuscula, simile semen sed exiguum, ac vix vnum aut alterum complectentes. Hæc, referente Fratre ex testimonio Honorii dum teneræ sunt, recentisque, dulcissima, estque apta sunt: at ubi induruerint, amarissima.

C. Bauh. phyt. *Trifolium 27* siue *peltatum Creticum*. Item apud Matth. *Trifolium 8* siue *Peltatum Creticum*.

MEDICA IN GENERE.

CAP. LXIII.

EX Trifoliorum, & eorum quidem, quorum *semina* cochlearum modo intorquentur, genere & Medica est. Hæc natales suos ipso nomine fateretur, locumque vnde venerit, vocabulum indicat. Externa olim Græciæ [inquit Plin.] à Medis est aduecta per bella Persarum, quæ Darius attulit. Hinc Gentile nomen obtinuit. Similis est Trifolio, caule, foliisque geniculata, quicquid in caule assurgit, in folio contrahitur. Hæc paulo aliter Diosc. tradidit. *Medica* recens nascens similis est Trifolio in pratis nascenti. Verum in progressu folia contrahuntur, & caules Trifolio similes producit, in quibus accrescit semen, Lentis magnitudine, siliquulæ modo intortum.

Medica

Plin. l. 19

Diosc. l. 81

Alfafa. Al-

falso. &

Alfalfa. Al-

fajafat.

Medica ab Hispanis vocatur *Eruaye*, *Alfafa*, *Alfalso*, & *Alfalfa*, voce fortè diducta ab *Alfajafat*.

HISTORIAE PLANTARVM.

Ca. 21. quam Auicenna simul cum nomine *Cos* & *Al-*
scis. *ris* lib. 1. exprimit: licet lib. 3. capite de tremore,
Andacocca. ubi oleum de Andacocca multum laudat, videat-
tur eandem per Andacoccam intellexisse. Gallis
Nomine *Saintsain*, & *Foin de Bourgogne*, & *grand Treffle*,
linguarum *Picardis Foignasse*, *Germanis Diebelen*, oder *bürgün-*
Aequiuoca *disch* *heuw*, *haisfiter*. Sub Medica nomine, quæ
nobis verior videtur, & ut existimamus, per
Hermol. Marcellum, Gesnerum, Matth. Ama-
tum, Bacchan. Dodon. Clus. & Cæs. alpinum rece-
pta est. & à nobis Medica maior erectior florib.
purpureis dicitur. hæc occurrunt æquiuoca. Me-
dica filu. lutea & ruffa. trifolium cochilgatum
marinum, aliis Medica marina. Medica scutella-
ta. Medica orbiculata. Medica echinata glabra
cum maculis nigricantibus, & sine iis. Medica
magna turbinata, Echinata magna, hirsuta, hir-
suta echinis rigidioribus, Echinata hirsuta, E-
chinata minima, Coronata parua Cherleri,
Lunata, Lunata similis siliqua, de qua sub Au-
ricula mutis Camerarii. Medica nomen quo-
que, quamvis perperam, & apud imperitos so-
lum cognitionis herbarum, teste Dodonæo ob-
tinuit trifolium pratense purpureum. Olim tri-
folium candidum, dicebatur Medica tertia Do-
donæo; quæ opinio in postremis reicitur. Nos
de hoc agimus sub titulo, trifolium pratense al-
bum. trifolium quoque luteum, Trago dicitur
Medica Dioscoridis, & apud Dod. Medica spe-
cies. Porro Medica Tragi non est Saxifraga lutea
Fuchii, ut vult Rob. Const. apud Amatum. Est
hæc nobis Melilotus vulgaris. Quæ verò sit Me-
dica Cornario, quam dicit à vulgo Medicorum
vocari Burrum pastoris, & à vulgo Germanorum
deschenstra, inquirendum.

Saxifraga
lutea.
R. Const.
ov.

Error quo- Apud Euch. Roels. Lonicærum & Ryffum
Andam. ineptè ponitur icon Laburni pro Medica. Cytis-
Laburnum. sum Matthioli à Cortuso missam, non Cytisum,
Cytisum sed Medica speciem esse [inquit Hist. Lugd.] au-
sumant periti herbarii: hæc vocatur à nobis Cy-
titus candidus siliqua incurua. Ad hæc Medica
speciem esse putant Ferrum equinum dictum
Gesnero, quod nos Soleam equi interpretamur.
Medica etiam de Helenio dicitur in ascript. Dio-
scor. de eo hist. n. g. l. 25. de Medio quoque Medi-
ca traditur in spur. Diosc. de eo hist. n. lib. 20.

Duratio

Tanta dos eius [inquit Plin.] ut vno sæ-
culi amplius quam tricenis annis duret. Plinio con-
trarius esse videtur Palladius, qui semel satam
decem solum annis permanere scribit. Cæterum
Medicam diu durare, vel Plutarchi testimonio
comprobatur, simulundinem ex hac in libello
contra Epicurum desumentis egregiam. Sicuti,
inquit, herba Medica semen multis flexibus,
& per obliquum terræ innascens, ob asperitatem
multo tempore perdurat, ita dolor vinctus &
radices disseminans: carniq; implicatus adhæ-
ret non diem modò, aut noctem, sed annos &
aliquot lustra, ægrè aliis doloribus tanquam cla-
uis violentioribus expulsus discedit.

Locus, in quo Medicam proximo Vere fa-
toruses, autore Columella & Palladio circa Ca-
lendas Octobris prosciendendus est, & is tota
Hyeme putrescere permittendus. Mense autem
Februario, iterandus est, & purgatis lapidibus
diligenter occandus. Et tandem circa Martias
Calendas, subactò sicut in hortis solo, forman-
da sunt areæ pedibus 10. latæ, & 50. longæ, ita
ut eis per semitas aqua ministretur, & facili pos-
sint ex utraque parte tuncari. Tunc iniecto an-
tiquo stercore in Aprilem mensem (hoc enim
tempore Medica letenda est) reseruentur, para-

Tempus se-
cutum

te. Singuli cyathi seminis occupant locum
tem pedibus quinque, longum pedibus de-
cem. Sed mox ligneis rastellis obruantur iacta
semina, quia Sole citius comburuntur. Post satio-
nem ferro locum tangi non licet, sed rastellis li-
gneis frequenter herba mundetur, ne tencram
Medicam premat. Prima mensis eius tardius fiat,
ut aliquantum semen excutiat. Cæteræ verò mes-
ses quam volueris citò peragantur. Vbi secueris,
septuaginta. Post paucos dies, cum fructus ex-
perit, omnes alias herbas runcato, ita & series
per annum metis, & annis decem pote ri-
nere continuis.

De Medica, inquit Varro, in primis obserues, Locum
ut ne in terram nimis aridam, aut variam, sed
temperatam semen demittas. In iugerum vnum,
si est naturæ temperata terra, scribunt opus esse
Medicæ sesquimodum: id fertur ita, ut semen
iactatur, cum frumentum fertur. Medica porro,
ut Theophr. tradit, saporis diminuta, consaque
melior, lapidiorque euadit. Sed nec huic sterco-
ratio prodest, quin potius stercoreis & vitiis cau-
sa perit, ut quidam dixerunt.

Vfus.

Medica nutriti boves lactantes, ut plus con-
tineant lactis, iubei Sotion in Geoponicis, utam-
que Varro, Columella & Palladius. Aristoteles
contra hist. animalium inquit: Pabuli genus a-
liud copiam lactis extinguit, ut Medica herba, &
præcipue ruminantibus: aliud augeat, ut Cytisus
& Erum. Qui in Hispania rem obseruauerunt
[ut notat Camer. horti] ubi quotidianus eius
usus est, reterunt nullo cibo tam viridi quam ar-
ida prius magisque lxtari, saginari, & pinguescere
iumenta, pecusque omne: parcus tamen dari,
quoniam inflet, & multum sanguinem creet,
quem deducere postea necesse sit, annotante
Virgilio Marcello. Medica, inquit etiam
Varro, obicitur modicè, ne parum, aut nimium
saturentur, utrumque enim ad corpus alendum
inimicum. Fieri itaque potest, ut lactis abundan-
tius conducat, modò non ad satietatem usque
præbeatur, id quod etiam Plinius vetat, alioquin
nihil mirum Aristotelem vera scribere, & vniuer-
so in sanguinem, adipem, & carnes, alimento re-
ducto, non superesse, quod in lac conuergi de-
bebat. Agrum stercofat, ac adeò est suauis ac
nutriens, ut pecus arcere necesse sit, ne vel dis-
rumpatur, aut sanguinem detrahare oporteat.
Animalium vitis plerisque medetur. Ad maciem
mularum, ut Columella prodidit, nulla res tan-
tum, quantum Medica prodest. Semen, ut tra-
dit Diosc. siccatum iucundi saporis gratia condi-
taneo sali admiscetur. Viride, quibus refrigeratione
opus est, illi suffragatur. Herba tota pro
gramine vniuntur ei, qui pecora alunt.

Lactans
boves.

Lactans
boves.

Aristoteles
contra Sotionem
et alios

Virg.

Marcellus
Virg.

Semen

MEDICA MAIOR, ERECTIOR, FLO- ribus purpurascens.

Valde quam luxuriat obsequioso foenore Desca-
cultorem fouens, caulibus, ut numerosis,
ita prolaxis: folia terna oblonga, per extre-
mam oram, quæ obtusa est, crenata: flores co-
piofi velut in spicam digesti, purpurascens: si-
liqua cornu caprini instar contorta, in quibus
semen minutum & candidum: radix tubè lon-
gè, tenuis, & lignosa.

Hanc tradit Hermol. dicens: Imperit vulgi
Melica vocari cepit. Semen eius sub dente Pha-
seoli recentis saporem præsentat. Propter altitu-
dinem radicum huius reliquæ herbae intescunt,
sine ipsius damno.

Ex Hispania [inquit Marcell. Virg.] integros
herbæ

herbz; quam inibi Medicam censent, cum suo semine caules afferri nobis curauimus. Siliquam non licuit videre &c. miramur autem nos et allatos caules cum suo semine, & siliquas non eam adfuisse.

Fenugreek
Burgundian
Medica vera
Medicam appellat Ruell. ex aliorum sententia Fenugreek Burgundianse, quod rura Fenugreek dicant. Ait etiam Marcellum magis eius cognitionem oblitterasse. Gesnero Medica vera, Clusio farina & legitima. Anguill. Medica species. Medice quoque meminerunt Matth. Lacuna, Amat. Bacch. Lob. Pande & Casalp. Camer. hort. Lul. & alii.

Hist. Lugd.
exhib.
historia Lugd. Confarinator imperitus stirpium omnia confundit: descriptio quidem competit Medicæ, de qua agimus hoc capite. An item Dodonzi icon, dubitamus. Quia Dodonzi & historia, & figura dubia: hic præterea nullum certum ponit discrimen inter Medicas, sed suo more commiscet. C. Bauh. phyt. Trifolium 30. siue siliqua cornuta. Medica Dod. gall.

C. Bauh.
Locus
Tempus
hæc quondam, hermol. Marcell. Virgil. Aug. Gallo, & aliis testibus, plena erat Venetia, sed



pandem per Gothos perit, reſeruata autem in hispania, inde denud in agrum Neapolitanum, quasi postliminio introducta fuit. Cæterum, Tiguri primò apud D. Gesnerum, cui, ut ipse perhibet, ex semine peregrino prouenit, deinde Basileæ in hortis quibudam florentem mense Iunio & Iulio, vidimus. Genere agros eâ conſi-

tos obseruauimus, quos aliquoties in anno reſecabant ad impinguandos equos. Circa Burmiæ in Rhetia spontè prouenire reperi. Montbelgardi in horto meo & Illustrissimi Principis è semine mihi prouenit, ac multis durauit annis.

Vitis
De huius viribus & usu iam supra in genere pertractauimus.


MEDICA SILVESTRIS. CAP. LXIV.

Descriptio
Tabern.
C. Bauh.
Medicæ silvestris genus est, radice crassiuscula lignosa, sapore subdulci, virgulta emittebat cubitum longa, vel etiam longiora, teretia, striata, glabra, in multos, lentos furculos subdinata: folia de more terna, angusta, oblonga, supremo margine veluti corrola: flosculi furculorum fastigiis conferti, globuli serè modo insident, crocei, quibus delapsis siliqua suboritur contorta, compressa.

Tabern.
Lens maior repens, Groß friedende linsen. Icon Tabernæ quidem placet, aut non nomina, quæ huic in eum dubio procul finem adscripsit, ut nominate placeret, non aliis, sed sibi ipsi.

C. Bauh.
C. Bauh. phyt. Trifolium 31. seu frutescens, luteum

Ait nos in hac herba nihil fruticosi obseruauimus, existimantes hanc plantam comprehensam esse sub Trifolio 30. siliqua cornuta, flore luteo.




In sepibus Locus & segetibus tempus præpe Monspe-lum & Lunel, mense Maio & Iunio reperitur cum flore luteo, variisque aliis in locis tum à nobis tum ab aliis re-perita fuit.

Vitis
Calida est in secundo gradu, subacris, sapore scilicet nitroso,

tehuumque partium Gesn.

TRIFOLIUM COCHLEATUM MARI- num, siue Medica marina. CAP. LXV.



Descriptio
Quantum quantum est, totum villosa, incanaque lanugine obductum est: caules pedales, ac etiam cubitales, ramis frequentibus brachiati: per quos folia ex brevibus pediculis terna, parua, obtusa, frequentia, sapore nullo manifesto, flores multi simul congesti, lutei, Trifolii lutei serè similes: sili-

qua orbiculares, in se contorta, radix crassa, cubito longior, tenera, gustu quodam ingrato, saluginoso, & amaricante. Gesn. hort. Trifolium marinum.

C. Bauh. phyt. Trifolium 24. siue Cochleatum marinum. Guilandinus Trifolium album, & Cicer sacerdotale vocabat: alii Cytisum marinum. Lob. & Pena Adu. & Ic. Pl. T. 6. p. 38. vti etiam Tabern. cum Camer. hort. & icon. Medicam marinam: Eius autem figura facta est ad plantam siccam, à me [L. Bauh.] Gesnero missam, & anno 1561. collectam, quæ adhuc diligenter inter siccas meas coaceruatur: Quamvis nec Gesneri, nec nostri hic meminerit, sicut in pluribus aliis.

Dalechampsius hanc depinxit, vocans Anthyllidem priorem descriptam à Dodonæo, cuius opinionem assentiri non possum, nisi dicam non diligenter ab ipso neque descriptam, neque depictam.

Clusius, à quo parua aliquando absuit, quig

Trifol. marinum.
Cochleat. G.
Album sacerdotale.
Cytisus marinum.
Medica marina.

C. Bauh. nov.

Dalechampsius.
Anthyllid.

Siliques cochleatas, parum compressas, mucibus per margines horridas.

Synonyma C. Bauh. phyt. Trifolium 22. siue cochleatum maculatum. Medica Arabica Camer. Et sequenter, Trifolium 21. siue cochleatum fructu nigro hispido. Trifol. cochleatum alterum Dod. Medica folliculo spinoso Lobelio. *Hacille.* Nos tamen, Medicam Camer. Arabicam diuersam à Lobelii Medica spinoso folio, & Dodonzi Trifolio cochleato altero, asserere non ausimus. Numidum sunt breues Dodon. & Lobelius.

Ceterum, Trifolium cochleatum alterum (inquit Dodon.) gallice *l'herbe aux Limacins* vocatur, quod plerique Recantiorum Medicam indicent, quamvis cum descriptione Medicæ non conueniat. Est enim Medica Arabica (scilicet Camer. hort.) foliis cruentis maculâ insignitis. Lobel obl. & Jacq. Pl. Tom. 2. p. 37. sub Medica folio spinoso, figuram Trifolii cochleati alterius Dodonzi habet. Medicam porro Arabicâ Hort. Lusgerm. Arabico. Schneid. flect vocat. Meminit huius, ni fallor, Casalp. sub Trifolio pratensi in genere.

Locus & tempus Genoux mihi in horto mense Maio vigebat: Argentinz D. Melchiori Sebizio cum floribus & siliquis hispidis, foliis glabris non maculatis, Iulio.

MEDICA MAGNA TURBINATA

Descriptio.



Cubitales & sesquicubitales caules erigunt, hirsutos, multis ramis fissis, foliis tergeminis, hirsutis. Trifolium pratensis purpurei paribus, aliis veluti triquetris, per oras incisissimis, quorum pediculi longiusculi, pinnis caulem ambiunt: flores parui, lutei, pediculo hærent vnciali, & sesquicubitali, quos sequuntur fr-

us turbinati, sex aut plerum circumuolutionum, arcu committarum, duri: vnaquæque spirâ gemino denucellorum ordine calata est, medium secante zonula perpetua: semen compressum, renis instar ligatum, Fœnugræci semini par, aut etiam paullo longius. Annua est planta.

Lob. & Penz Adv. Medica, cui siliqua compressa figura, cuius portio quidem aliqua, sub titulo Medice, tres seminis varietates ostendunt, exprimitur, est non placet icon. Hæc etiam à Plandino Tom. 2. p. 37. proponitur.

C. Bauh. phyt. Trifolium 20. siue cochleatum fructu compresso oblongo. H. Lugdunensis, inquit, vna figurâ tres exprimit differentias, vt & Lobelius. Si frater triplicem hanc differentiam ostenderet, ipsi fidem haberemus, nos duplicem duntaxat obseruamus, scutellam sc. & turbinatam.

Locus & Tempus Montbelgardi in horto E. C. ex semine per D. Christophorum Schvvarz Sturgardiâ missio, & Aprilis terræ mandato floruit Iulio.

MEDICA ECHINATA MAGNA

hirsuta.



Folia huic subrotunda, postmodum nonnihil acuminata, & serrata, terna vni pediculo innixa: caules ad duos, tresve cubitos per terram sparguntur: flores multi, coarctati ex longo pediculo, lutei: siliquis simul aliquot coherent, spiris duabus, aut tribus, vel etiam quinque, terminatis, breuissimis veluti spinis obtusis, exasperatis.

Genoux in horto mihi provenit. Echinus, qui particulatim in tabella hæc est pictus, sequentis Medicæ est.

MEDICA HIRSVTA ECHINIS RE-

gidioribus.



Per terram se expandit cubitalibus & longioribus caulibus. Folia parua hirsuta, & per extremam oram latis: siliques lutei: echini cochleati, pauci, & sæpe singulares, longis usque deque vergentibus rigidiusculis spinis horrent, non admodum densis: conuolutiones sunt tres, aut

quatuor.

In figura nostra empiria spinæ nimis breues & crebræ, idcirco in tabella præcedenti, melius erant exprimendæ.

An Lob. & Penz Adv. Medica siliquis spinosis. C. Bauh. phyt. Trifolium 21. siue cochleatum, fructu duro, spinoso. Medica siliqua spinosa Adv. quam Lob. & Penz. Tom. 2. p. 37. sub Medica pingit. An autem Lob. (vt equidem C. Bauh. vult) intelligat eandem Medicam nobiscum, asserere non ausimus, quia paucis tantum verbis spinosæ meminit. In iconum quoque tabella, in qua Lob. tres Medicas dicit se tradere, nullam video spinosam. Fratrem eandem nobiscum intelligere existimo. Ponit in Baldo Medica spinoso folliculo. Cast. Durantes pro Medica pingit cochleatam spinosam. An Camer. hort. Medica annua, semine minuto, hirsuta?

Mense Septembri ad mare reperi Montpelii.

Locus & Tempus

MEDICA ECHINATA HIRSYTA.

Descriptio



Cassius. Cereola est & prolixa, sed singularis radix, alba: caules multi, tenues, per terram sparguntur, dodrantales, & cubitales, striati, hirsuti: folia ternaria, sobrotunda, ad Trifolium pratense hircum accedentia, nullo notabili sapore praedita, pilosa, albescencia, maxime parte inferiore.

Stipes parui, lutei, simul aliquot congesti, eodemque modo simul obacervata ex eodem pediculo longiusculo, capitula. Pilo non maiora, contortis helicibus constantia, globosa, quatuor aut quinque, atque etiam plura, mollibus spinulis echinata.


An Trifol. tortuosum? Tribulus Trifol. echinatus. An Lotus? Locus & tempus.

Hist. Lugd. Tribulus terrestris minor repens Dalechampi. C. Bauh. phyt. Trifolium 26. siue echinatum arvense maxime. An Lob. Obs. Lotus Italica altera?

Floret & semina fert mense Aprili & Maio. Passim provenit maxime inter segetes prope patibulum Montispellii. Frater C. Bauhinus invenit prope Perou in luto maris. Hanc eandem hircum Genecuz in horto.

MEDICA ECHINATA, MINIMA.

Descriptio



Hec est caulis circiter pedibus, vel minoribus, tenuibus, quos ornant folia ternaria. Medica echinata foliis similia penitens, parva, hirsuta: stipes pusilli, lutei, multi simul congesti: sequuntur eundem pediculi fastigio hererres quamproxime, glomerati echinuli muricati, tres,

aut quatuor, vel quinque iuncti, Orobiganon non maiores: radices tenues.

Tribulus Trifolium Medica

Hist. Lugd. Tribulus minor rectus Dalech. C. Bauh. phyt. Trifolium 26. siue echinatum arvense secundum. Cam. hort. Medica pusilla capsulis echinatis. An Ponz. In Baldo, Tribulus filu. Dalech.

Locus

In pratis provenit Genecuz ad Nofodochium. In arenosis & sabulosis locis Dalech. legit. Ex ne-

more prope Liphiam, d. et Rosenthal vocato, C. mer. attulit.

MEDICA CORONATA CHERLERI,

parva.



Pedibus. Descriptio. donata est caulis, tenuibus, sobrotulibus: & quibus alternatim ex longis intervalis singuli exeunt singulares, viciales & longiores, qui extremo mucrone ternos, quaternosque gestant echinulos. Tribulus terrestris trifolius Hist. Lugd. Verum singuli viciales ferè, aut sesqui-altera

circumvolutione constant, utrinque denticulata, gemellam coronam imitata, echinos sustinenti: surculo ad exortum brevi pediculo haerent tergemina folia, hirsuta, aliquando subtrubra, ferè cordata, in ambitu crenata, tam exigua, ut simul omnia dimidiatus vaguis digiti modum facile possit tegere.


In saxosis, aridis, & squalidis Galliae Narbonensis, maxime verò in collibus inter Nemausum & Viterum observavit & legit Cherlerus: ciliques videri rarissimis plantulis.

Locus

Locus

MEDICA LUNATA.

Descriptio. Silique.



Lata. Compresssa, pollicis vique maior, siliqua, ad Auriculam muris Camerani recedens, sed speciosior & maior, striata, in circumvolutione singula. spinula, Costam galti non male exprimit.

Lunaria radiata. Medica sil. Lata. Trifol. quod sil. Hist. Lugd. repm.

Trifolium 28. siue siliqua falcata: Conlarcinator Hist. Lugd. non distinguit Medicam silu. alteram lunatam seu falcatam, & ceteris Medicis. Ceterum pulchrum semes misit Clariss. D. Costusus nomine Medicae Alaphalaga. An porro, C. C. Trifolii quoddam genus, cuius siliqua valde lata, de quo sub Trifolio pratensi in genere. An C. C. Dur. in siue Medica lunata.

Alaphalaga

AVRI.

AVRICULA MVRIS CAMERARII.

Descriptio



Inquilina nobis planta est, quam Auricula muris nomine proposuit Camerarius, radice nixam parua, colore buxo, sapore dulci, ex qua caules pedales circiter, numerosi, supini, in terram reclinantes, teretes, hirsuti: folia alternatim & caulibus exeunt, medio criter crassa, rigidiuscula, ta-

men aspera, & pilosa, pinnata, eo quidem ordine, ut extremum impar sextuplo fere coniugatum dispositus in alam foliis maior sit, principio angustiore, medio ampliore, denique in mucronem desinens: sapor utriusque aliquantulum feruidus: flores, cuiusmodi leguminibus, parui, crocei, hirsuti, viridantibusque foliis ambiti: siliqua late, compressa, similes Medicae lunatae, sed paulo imminores, in se conuolutae, hirsutae. Semen claudunt figuram renis, altera parte gibbosum, altera siccum inflexum, canum.

C. Bauh. phyt. Trifolium 29. Trifolio siliqua salentia simile. Camer. hort. Auricula muris, à semine, & Auricula leporis, à foliorum figura appellata.


Anno 1597. mense Augusto floruit in horto Monbelgardienfi E. C. ex semine partim missio per D. Hoenstetter Medicum, partim in horto D. D. Martini Chemicum Basileae, maturo, mense Septembri. Annua est planta. Ceterum, ubi sponte nascatur, ignorat Camer. nisi forte in Creta, unde semper Epithymo immixtum desertur.

Saporem non nihil feruidum habet, siquidem Cameratio credendum, ac etiam commendata, saluam prolicet. Liquor stillatius dulcis est primo gustu, postea vero non nihil linguam vellicat, forte putridis viceribus, si quis periculum faciat, non incommodus.

OXIS, SIVE TRIFOLIUM ACIDUM,
flore albo & purpurascence.
CAP. LXVI.

Si Trifolius annumeranda planta, quae à vulgaribus Herbariis Panis cuculi vocatur, vel quidam Cuculus aut eam vescatur, vel quia hac erumpente Cuculus vocem suam edere incipiat, in officinis autem Trifolium acetosum ab acido sapore, ac à Plinio Oxys eadem ob causam. Ex crassiuscula, squammatà, alba, vel ex albo rubente radice longae & crebrae pendent fibræ albicantes, indidemque emergunt pediculi infirmi, tenues, rotundi, palmares & longiores, terna gerentes folia, latis magna, latiora quam longiora, cordata, hirsuta, ex viridi flauentia, saepe reflexa, ut capitulum ad pediculum cont-

Tom. II.



rus tubinam reddat formam, sapore acido: inter haec alia surgunt pediculi, florem singuli sustinentes, vnicum, magnum, albicantem, striatum, tenebrum, folliculus pentagonus, quo attracto semen exilit rufum, nucleo Persici simile, striatum.

Bruntell. Trifol. acetosum.
Tom. 4. cum Matthiol. Cast. Dur. Histor.

Lugd. & Thal. Trifolium acetosum, & herb. ger. Trifolium 5. Oxys, autore Dodoneo, Alimonia vulgi Alexandro Benedicto. Lob. & Penz. Adu. pusilla videtur Lotus.

Oxys autem Plinii nunquam ad Lotos pertinere, doctè Gesn. existimant. Patet igitur vel hic Lobelium memoriam lapsum.

Anguill. non vult affirmare Oxys esse speciem Trifolii acidi. Cordus, qui describit, dicit Oxys Alleluam vocari. Ruell. Oxys Plinii, vulgo panis cuculi dicitur, & Herbarium Trifolium 4. quod acidum nominant. Clus. Hist. Oxys vulgaris.

Trago li non restagandum, fieri potest, ut sit Oxys seu Oxytriphylon apud Dioscoridem. Posset etiam dici siluestris Acetosa, seu Oxalis wild saur ampffer] Sunt qui Luyulam & Bachael nuncupent. Vide Meluein, Matth. Syluaticum, Leonh. Gilbertum, & Jac. Manthum super yng. Marciaton. Oxytriphylly quoque nomen apud Dioscor. videtur eidem Hist. Germ. superfluum & pertinere ad Gaidoflee, Trifolium acidum. Hæc ille, cui si notum fuisset verum Trifolium bituminosum, ei reliquisset nomen Oxytriphylly, quod non malè conuenit.

Ad stipulatur nobis Cornarius, dicens: Oxytriphylon cum Oxys nihil commune habet. Oxym Plinii crediderim esse Trifolium acetosum dictum. Hinc malè videtur Celsipino Plinius per Trifolium alterum, acuto folio Oxytriphylon, intelligere Trifolium acidum, quod alibi Oxym vocat.

Nec desunt Monachorum testimonio, qui per Triphylon intelligi putent Trifolium acetosum, Alleluia nuncupatum. Fracast. Luyula, forte Oxys Plinii.

Trifolium autem acetosum differt sexu. Feminina [inquit Camer. Epi t. Matth.] flore albo, venis purpurascens distingo. Mas totus purpureus, rarus inuentus.

Tab. Oxys & Trifolium acetosum floribus la-

C. Bauh. phyt. Trifolium 13. siue acetosum vulgare. Variat flore lacteo, purpurascens & luteo. Hæc Frater, qui quo Autore dicat vulgare Trifolium acetosum flore esse luteo, me lateat. Ego nunquam me audire aut meminisse, aut quemquam scribere obseruari. Paulò pòst quidem scribam de luteo, sed differente à vulgari.

Fuch. Roess. pro Alleluia, Panis cuculi, seu Trifolio cuculi, iconem Trifolii albi exhibet. V.

K b

Trifolia siliqua salentia simile. Auricula muris. Auricula leporis. Lotus & semper

Vires & vus.

Pura

Panis cuculi dicitur

Trifol acetosum vulgare

Descriptio

re autem Oxyos icon est pro Epithymo male posita, male quoque Trifolii titulo ubi potius ponenda est dicta icon Trifolii albi.

Ceterum Oxin Plinius, siue Trifolium acidum, quidam existimant Oxytriphylon Dioscoridis, non sine insigni errore. Oxytriphylon enim & Oxytriphylum, de Trifolio bituminoso Veteribus dicitur. Nec minus bene Lotus sativum quidam putant Trifolium Asphaltites & Oxytriphylum. Nobis hæc est Lotus sativa, odorata, annua, flore cæruleo. Male quoque quibusdam Scribonii Oxytriphylon: dicitur nobis Trifolium rectum Monspeliarum. Pessime tandem a nonnullis pro Oxytriphyllo altero Scribonii habetur, de quo nos sub Trifolio albo, recto, hirtuto valde.

Oxytriphylon, Oxys, Oxys Pliniana, Acerosella, Oxalis minima, Trifolium aceris, acidum, panis cuculi, & Alleluia. Gall. Pain de corn. Germ. Sau: Buch: Gauch: & Guchgauchlee & Gaseflee. It. Hasen. Ros: & Büschampffer. Bûch: Gauch & Guchgauchbrot, Guckenlauch / & Gauchlin. Belg. Cockoutsbrot. Angl. Wood saur. Hung. Alleluia fiv.

Linguarum Nomina.


Locus & Tempus.

Vires & virtus. Externæ & Internæ. Temperamentum. Ventricle ardoris. Aqua. Refrig. acuta. Sucus. Erysipelas. Eucrasia. Galidissima. Affectus cordis. Venæ crassæ. Porta. Erysip.

Conferre. Efflu.

Oxyn flore albo observavi Genevæ semine maturo Iunio. Patavii cum siliquis Decembri. Bononiæ al burgo di S. Catharina. Basileæ copiose Augusto circa Dornach in montibus. Frater autem C. Bauh. in monte Moutets. Ceterum opacis plurimum provenit locis prope sepes & itinera. Iac. Gargillus invenit flore purpurante prope Vlemhaüs quæ est ultra parvam Basileam in Marchionatu: nos autem inter Bessfordiam & Raupach in dumetis florens Martio. Montbelgardis passim florens Aprilis, virens Augusto.

De eius viribus hæc Plinius. Oxys datur ad stomachum dissolutum. Edunt & qui enterocelen habent. Observasse autem sese scribit Fuchsius, atque aded multorum experientia cognitum, quod eius herbarum copiosi flores crebras illius anni pluvias, & aquarum inundationes ceteris portendunt: pauci contra, siccitatem. Tota planta, auctore Matthiolo, refrigerat Oxalidis modo. Quare devorata, sium & ventriculi ardores extinguit. Iecur refrigerat & cor roborat. Stillata huius aqua datur vtiliter potanda acuta febre laborantibus, sed multo magis præstat succus ex saccharo potus. Illinitur idem per se erysipelatis & inflammatis locis: osque eo colluitur, cum lingua, palatum, faucibusque calida fluxione laborant. Placet autem Triphyllon Alleluia dictum ad affectus cordis, vel ventriculi potius & oris eius, commendari. Propter temperamentum quod ex sapore proditur, non autem propter cordis figuram, ut Porta vult. Siquidem multa sunt, quæ talem figuram habent, nec cardiaca comprobantur. Displicet quoque quod laudet propter rectas, longas, & rigidas vaginulas ad serpentum morsus. Quis enim consulat, ut applicetur planta adstringens & refrigerans morsui serpentum? non invenio Plinium aliquid tale de Trifolio atido scripsisse. Suspicio Portam confundere cum modo dicto Trifolio, Trifolium Asphaltites. Præ ceteris demum, teste Io. Bokelio, ad pestem laudatur conferua. Trifolii acetosi verno tempore cum Saccharo præparata sumpta manet ad Castaneæ quantitatem.



Sperdo. Spem terram spargit coliculas palmares, aut sesquipalmates graciles: folia tenuissimis nixa pediculis terna coherere mirora quam Oxyos vulgaris, maque per extremum filia, corculum [ut vulgo pingi solet] expressis effigiantia hirsutiora, ex brevis pediculis a coliculo prodeuntibus

dependentia: gustus acidi: floris forma stellata eadem, sed color luteus: quem cornicula, siue siliqua sese vinciales sequuntur, sursum spectantes, crassiuscula foliosa ex quinque loculis constituta, quæ ubi ad maturitatem pervenire leuissimo attritu semina plurima, parua, rufa, vel flava C. Bauh. aspera exiliunt e lateribus oculis quamprimùm coniuventibus, ut ne appareat siliquas dissiluisse. Radix longiuscula, gracilis, fibrata.


Huius Trifolii his meminerunt nominibus (Oxys, siue Trifolium acerisum flore luteo.) Clusius Dodon. Cam. Tab. & Lob. qui præterea Obs. Oxyn luteam corniculatam repentinam, & Oxyn luteam Clusii, cum Hist. Lugd. inscribit. C. Bauh. phy. Trifolium 12. siue acetosum corniculatum luteum, qui ante vulgare luteum quoque dixit, quasi ab hoc diuersum, ita ut duo genera faciat. Ponit is iconem in renouato Matth. ubi vocat Trifolium acetosum flore luteo Castori.

Vmbrosis quibusdam circa Hispalim locis nascitur. Apud Belgas, atque aded in omni solo facta provenit, quin & semel facta, postquam florere cepit tota deindeestate flores producit, & semen fert: plantæ tamen omnes, ut Clus. dicit, Hiemis inclementia pereunt, sed & semine deciduo renatescunt rigida Hiems subsequatur, plerumque corrumpuntur, prorsusque genus interit, frigidioribus præsertim regionibus. Hæc Clus. Ego quidem cum Monspeli essem vidi flore luteo mense Iunio, & postea Octobri florentem circa Gangem. Neidelbergæ copiosè in hortu D. Spregeri, & Basileæ D. Zvingeri, vnde in hortum Montbelgardensem transtuli, in quo se quotannis semine propagavit.

TRIFOLIUM ACULEATUM CRETICUM

Arum est hoc Trifolium Cretæ munus, cui cania in ramos alternatim oriundos, creberrimos, angulosos, denud in minores ramulos diuaticatos, humique fusos, striatosque diuiditur, ubique verò quæ rami, surculique diuiduntur, duo exeunt pedicelli breues, oppositi, singuli folia terna, parua, oblonga, in acumen spinosum desinentia, glabraque sustinentes: inde, que diu-

que diuicationibus subsunt adunci, rigiduli,



mordaces deorsum spectantes aculei: superius vero ex ipso ramorum costis pediculus exit brevis, cui ex calyce viridante emicans insidet flos amoenus, magnus, purpureo-violaceus, Lysimachiae speciosae similis, è quinque foliis compositus, medium obsidentibus lacinibus luteis: *foliis*

quatuor, aut quinque, costis canaliculatis, latusculis, ad mucronem turbinatum coeuntibus constant, semine in singulis contento lato, ruflo.

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 33. siue spinosum Creticum caeruleum, quod in horto Montbelgardensi apud Fratrem Io. Bauhinum legimus: accipimus etiam à Laurentio Rolenavv nomine Trifolii spinosi, semper virentis ex Candia, Cythi flore. Clus. in post. Hist. vocat *Trifolium spinosum Creticum*, Honorio Bello, Orbitochorto, habitatque an Tribulus terrestris Diosc. *οπίσθιον* sit, aut saltem genus aliquod. Sed notæ Dioscoridis, nobis quidem iudicibus, videntur melius respondere iam recepto Tribulo terrestris: siquidem Trifolio Cretico non sunt folia *αδράχνης*, qualia requirit Dioscorides.

Calabona praefectus horti Ill. Ducis Florentiae ex horto eius Pisano misit Stutgardiam semen cum hac inscriptione: *Orbitochorto*, Trifolium aculeatum, flore Cythi, rarissima planta Candiae. Sata Montbelgardis in horto Ill. Princ. mense Aprilis, prouenit ex semine mihi misso Lutetia à Robino, floruit principio Iulii. Nata quoque erat Moguntiae in Reuerendissimae eius Celsitudinis horto, semine ex Italia quidem misso, sed ex Creta accepto.

TRIFOLIUM PALUSTRE.

Descriptio:

Eniculata radix, longa, alba, prorsum incedit fibris subinde demissis, firmata, pediculis inferius latiores vaginæ instar, dodrantes, tria habent annexa folia, magna, sabaceis formâ & magnitudine respondentia, laeua, inter hæc cauliculus surgit cubitalis, laevis, gracilis, virens, thyrsam gerens florum, ex albo purpureo, qui Dalech. priusquam dehiscant candidi, nonnunquam subrubentes ac rotundi: cum reclusi in quina folia dimisi, oblonga, tenuissimis & candidis filis, veluti lanugine, siue pube quadam elegantissimè crispata, folliculi inde parui, rotundi, siue rotunda capitula aut vaseola, in quibus semen Helianthemi simile, ex fusco flauescens: amari gustus.

C. Bauh. phyt. *trifolium* 16. siue palustre. *Isopyron* Diosc. quorundam, aliis *Menianthes palustre* Theoph. 4. Hist. 11. *Menisiflorum* Gaza vertit. Thabo Hærc. *Trifolium palustre*, seu *castoris*, *Isopyron* Tom. II.

Trifolium palustre

Dodon. *Limonium verum Cordi*, oder *vassewischen-mangols*, quoddam nempe irriguis pratis & consimilibus locis gaudeat, à quibus Limonio suum apud Græcos nomen antiquitus obtigit.

Tragus idem Limonii pratensis nomine describit, sed apparet ipsum incidisse in locum, ubi stirps hæc florifera quidem fuerit, sed floribus eius absque fructu intercedentibus, unde ipse existimauit, nullum herbarum huius fructum protulisse.

Compiler Tabern. duas exhibet figuras, nec ostendit qua in re differant præter magnitudinem. Hort. Lus. *Trifolium palustre fibrinum castris*, Biberflees/längenflees. Dodon. Gall. *Isopyron* vocatum est à quibusdam, teste Dioscoride, *phasolon*. Item in sol. *Faselm hircinus*, aut *Bona hirsuta*, Belg. *Boixboonen*/ Hærc. in Enchir. quoque *Limonium* vocat, verum confundit cum eo *Pyrolam*.

Lonic. *Limonium, limonium pratense*, & *Beta siuestris*. Hæc ille, qui nomina solum absque descriptione ponit, ideoque confusè nimis capite de *Pyrola* duas figuras ponit.


Lob. & Pena [qui in Adu. quæruunt, *Trifolium paludosum*, siue potius *Isopyron*, quàm *Melanthii* species] scribunt, cur huic Trifolio, a quatuor vocato, quod potius *Isopyron*, Matthioli *Melanthium* quoddam prætulit, vix coniectari licere.

Cæterum, Gesnerus eorum opinionem non probat, qui plantam hanc *Limonium*, aut *Dioscoridis Isopyron* esse affirmant. *Isopyron* siquidem Diosc. Anisi folio constet. Lotus [inquit is, forsitan est palustris VVoiselli.

Hist. Lugd. *Menianthes palustre* Theophrasti: *Isopyron* Dodonæi, cuius sententiæ, tum Dioscoridis, tum Plinii autoritas, maxime refragatur. Hist. Lugd. duas proponit icones. Priori titulus est modò dictus. Altera verò, *Menianthes palustre* Dalechampii inscribitur.

Nascitur viginosis ac palustribus locis, sterili ac macro solo, aquarum tamen affluxu semper madefcente, extra aquam citissimè flaccescens. Primò vidi Tiguri florens Maio, postea Genevæ semine maturo Iulio.

TRIFOLIUM HEPATICVM, SIVE TRINITATIS herba, flore caeruleo.



Hic plantæ *Dalech.* *folia* sunt ex longis pediculis triquetra, autersa parte Matth. *Cyclamini* modo subpurascentia, superiore verò albis quibusdam maculis resperla: *caulis* ex radice tenuis, *stemon* in cacumine sustinens stellatum, caeruleum: *semen* coarctum non diuersum, oblongum: *radices* tenues, plurimæ subrubentes.

Græcis & Mauritanis [in Hist. Legd.] inco- K k

Hepatica
Etymon
Herba Tri-
nitatis
de
Parrotia

gnita videtur fuisse, hanc quæ hodie ab Herbatistis. *hepatica*, dubio procul quoddam *Hepaticos* iunet, & *herba Trinitatis*, à foliorum figura nominata est. Huius flores colore variant, alias cœrulei, alias purpurei, & quandoque niuei. Nonnunquam etiam folia [florum] maiora, maculis, notulisve variegata spectantur.

Dodon. gall. *hepatica*, Et Lat. *trifolium aureum*. Baptista Sardus, inquit, *Trinitatem*, & *Trinitatis herbam*, [ut & Itali apud Gesn.] nominat. Sunt qui *Balaris* esse suspicantur, quam *Trifolium* herbam esse Hesych. scribit: Sed *Balaris* descriptione non exstante, nihil de finiri potest. Cæterum *Trinitas* à Cordo *Epimedium* redditur. Iis autem (inquit Trag.) qui hanc herbam *Lichen* esse statuunt, assentiri non possum. Omnes empirici eam *Hepaticam* esse statuunt. Germanis *Edel leberfräut*, *hepatica nobilis*, Hieron. Braunsch. *Guldenflee*, *trifolium aureum* vocatur. Ego quoque [sic & Lonic. Matth. germ. & Cast. Dur. p. 464. appellant. hic præterea pagina sequenti 465. *Trinitatem* nominat, atque ita duas figuras & descriptiones vnius herbæ ponit,] vocabo *trifolium aureum* seu *magnum*.

Hepaticum
Trifol.
Trinitas
Herbar.
Hepatica
terrestris

Lob. & Penz. Adu. *hepaticum trifolium*, siue *trinitatis*: Obf. quoque *Hepaticum Trifolium hepatica* & *Trinitas* herbariorum. *Epimedium Tragi* Cordo. Gesn. *Hepatica terrestris*, & aurea flore cœruleo & rubro Tabern.

Camerarius, cui in horto, *Trifolium Hepaticum* flore cœruleo dicitur, scribit apud Matth. *Trinitatem* inueniri flore rubente, & interdum albo [maculosoque Cæsalp.] Tardius autem eas florere, quam cœruleam. Hoc ita confirmat Clus. Planta quam nonnulli *Trifolium nobile* [Edlen fleck vel aureum, & *Hepaticam trifoliam*, appellant, flore, vel est cœruleo, & præcocior: vel ad cœruleum tendente, & serius florens.

Hepatica
trifolia

Brunfels.
gaxatius

C. Baub. phyt. *trifolium* 14. siue *Hepaticum*.

Lagopus
Pes leporis

Pingit Brunfels. lob *Hepatica* [byrriflee] titulo, vocatque ex Hieronymi Herbario, *hepaticam tertiam*, & *Trifolium aureum*. Brunfelsium reprehendit Amatus dicens. *Lagopus*, herbam illam, quam *Trinitatis* appellant, esse, credendum est: Hæc herba *Trinitatis*, *Pes leporis* dicitur, & à Brunfelsio inter *Hepaticas* reponitur, quæ in re nulla præstanda fides. Sed miror Amatum *Trinitati* tribuere cubitalem cauleculum, ac dicere alia in descriptione, quæ non multum conuenire videntur: hæc etiam non nascitur in legibus, quod Diosc. tradit de *Lagopo*. Brunfels. quoque non ex se, aut ex authoritate Hieronimi, bene vocat *Hepaticam*. Robert Const. apud Amatum, Alteram herbam *Trinitatis*, *ped d'Alexandrie* ou *d'Alouette* vocat, quæ *Lagopus* Lusitano, Matthiolo abique nomine cap. de *Trifolio*. An autem Robert. congruè tribuat ei nomina gallica, mihi nondum constat.

Rob. Const.

Trinitatem vulgò dictam flore cœruleo Brunfels. inter *Hepaticas* numerat, licet non inueniam (ait Matth.) inter Græcos antiquos, aut Arabes, qui eius meminerint.

Tora.
Taur.

Cæsalpinus *Triada* seu *Trinitatem* ab Hermolaio, & aliis quibusdam *Toram* & *Tauram* appellari scribit. Nos id apud Hermolaum nondum legimus. De *Tora* agitur lib. 34. vbi quoque de *Anthora*, quam à nonnullis *Hepaticam auream*, & *Trinitatis* herbam nuncupari Thalius in Hæc. tradit. Alia potèd est herba *Trinitatis* nomine donata, vocaturque *Viola tricolor* à quibusdam etiam *Iacca*, de qua suo loco

Viola tricolor

Nomina
linguæ

Hepatica, *Hepatica nobilis*, *aurea*, *trifolia*, *Trini-*

tas, *Trinitatis* herba. *Trifolium Hepaticum*, nobile, *aureum*. Germ. *Leberfräut* / *Edel*: Dünd *Gulden* *Leberfräut*. *Edel*: Dünd *golden fleck*. Belg. *Edel*: Dünd *Gulden* *lebercrust*. Gall. *hepatique*. Boech. *yarruif* *troglystif*.

Offendi *Trinitatem* varium in locis. Cæterum loca quærit vlginosa & opaca, hinc in frutetis frequens.

Probatum maxime à recentioribus Medicis ad vulnera glutinanda, tam foris illa, quam intus: item ad enterocelas, in quem ystum pulcrem dimidii cochlearis mensura ex vino austero propinant. Tota planta decoquitur in vino eodem ad colomellæ, fauciumque inflammationes. Refrigerat enim, siccatur & roborat. Quare aduersus intemperies calidas, & inflammationes hepatis, & febrium calores periculis.

Locus & tempus

Vires & visus
Vulnera
Enterocela
Fauces.
Temperamentum,
Inflammationes.

TRIFOLIUM HEPATICUM FLORE albo.

Quoniam autem in *Trifoliorum* historia versatur [inquit Clus.] obiter etiam meminisse hoc loco libuit *Hepaticæ Trifoliæ* flore albo, quæ Belgici horti alunt munere Alphonsi Pancei Ferratiensis Medici, qui eam nobis *Mechliniam* misit. Hanc etiam non solum Viennensi agro sed omnibus in siluis Pannoniæ & Austriæ interioris spontè nascentem obseruabam. Nam Viennensis saltus omnes *hepaticas*, præter eam, quæ pleno est flore, alit. Nos in montanis Sabaudiz Syluis etiam vidimus.

Locus

TRIFOLIUM HEPATICUM SIVE Trinitatis herba flore rubro.



Hepatica *Trifolia* rubro flore alunt Belgici horti, munere Alphonsi Pancei, qui *Mechliniam* misit: Viennensis ager alit eam, quæ incarnato siue rubello est flore: apud Nisam Silesiæ, & Jenam Thuringiæ etiam spontè nasci Clusius ab amicis intelligebat.

Descriptio


TRIFOLIUM HEPATICUM FLORE pleno.

Urpuro cæruleis multiplicibus floribus stipatam elegantem peregrinam, præclaro D. Io. Brancioni, doctissimo p. m. Alfonso Pancei Ducis Ferrar. Medici m. t. cæteroque folia, radix, cum superioribus huiusmodi similia.

Lob. Obf. & Ic. Pl. Tora. p. 35. *Hepatica trifolia* polyanthos. Clus. Pannon. *Trifolium nobile* polyanthos cæruleo flore, quod Panceus *Mechliniam* misit. Item in fol. ait: Post meum Viennæ discessum, inuenta est apud arcem Sternberg Loc. Mag.

Descriptio

Hepatica
trifolia polyanthos
Trifolium nobile
polyanthos
Loc. Mag.



*Hepatica
aurea multi-
flora.
Trinitas
florans*

Mag. Dn. de
Heusenstain
in silvis illis,
quæ ab illa ar-
ce ad nixentem
montem ex-
tenduntur,
etiam illa He-
patica trifolia,
quæ flore ce-
ruleo est, &
pleno. Taber.
*Hepatica aurea
multiflora*
gessit gulden
Leberfrant.
Camer. ad
Hist. Matib.
*Trinitas flore
pleno.*

EPIMEDIUM QVORVNDAM. CAP. LXVIII.



Epimedium

Pro Epi-
medio o-
stenditur ho-
die planta,
pulchra sane
& nostris oris
rata: radix o-
bliqua agitur,
nec alte de-
mersa: gracilis
sax, sed lon-
ga, lignosa:
hinc surgunt
pediculi do-
drantales, at-
que etiam tu-
bito altiores,
centes, polli-
giduli, in ter-
nos furculos di-
uisi, quorum
singuli sursum

internos alios dividuntur, ita ut vnicuique so-
lum habeat usum Hederaceum, ex rotundo oblo-
gum, rigidulum, acuminatum, nervosum, aversa
parte glaucum, superius ex viridi pallescens, iux-
ta pediculum pinnis duabus subrotundis, qua-
rum altera altera longior, donatum, circumcirca
imbriculis crenatum & pedicularis qui-
dam ramus paulo infra primam ramorum di-
visionem palmaris aut dodrantalis in ramulos di-
uisus, quorum unusquisque plures gerit flores,
privatis petiolis hirsutis nixos, quatuor foliis
purpurantibus constantes, quorum medium oc-
cupant apices lutei.

Epimedium nominat Anguillata; diciturque
Dioscoridem in eo lapsam, quod putet carere
flore & semine. Aduers. Lob. & Penz Epime-
dium quoque tradunt, suspicanturque Epime-
dium hoc esse Epipetrum, ut Plinius legisse vi-
deatur Theophrasto memoratum, non autem ut
vulgo legunt Epimetrum. Epimedium (inquit
Dod.) appellatur: sed legitimum affirmari ne-
quit. Diosc. enim florem & semen ei esse negat:
Plinius etiam nunquam florere refert. Hist.
Lugd. Tabern. & Camer. Epimedium. In mon-

ibus Liguriæ planta proveniens dicitur Cas-
pino.

Observavi Patavii in horto Iesuitarum, D. Locut
Cortum & Trucelani, Ferrariæ in monasterio
Dominici à l'angeli, in montibus Euganeis inter
balneum Aponense & Arqua, ubi Gener Cher-
lerus etiam observavit copiose florens Martio
& Aprili: Stutgardia florens Maio, in horto
Ill. E. C.

ANONIS, SIVE RESTA BOVIS, vulgaris, purpurea & alba, spinosa. CAP. LXIX.



Longè late-
que radice
spargit albas
fructu perqu-
conumaces,
ramis vero li-
gnosis, simpli-
cibus & fre-
quentibus fru-
ticat, cubitum
vnum, aut alte-
rum longis, te-
nibus, totun-
dis, hirsutis, tu-
bescens, lentis,
spinis
longis & rigi-
dis armatis, in-
terdum vero
nullis, pinnis
quam decidant
folia: folia spi-

nis ferè proximo ortu, inondita, sublonga, Ci-
ceris singularibus foliis simillima, nigricantia,
hirsuta, in ambitu crenata, sapore leguminoso
tactu glutinosa, odorataque: teste Casalpino
flore Coluteæ, sed colore purpurascens, albo,
vel carneo: siliqua parva rotunda semen con-
tineat, Vicia formæ & sapore.

Optandum esset, ut omnes Antiquorum descrip-
tiones, qui de Medica materia, aut de plantis ali-
quando egerunt, tales essent. Felicissime si qui-
dè unus omnium. Theophrastus autem hanc
hanc expressit, scribens: Ononis in ramis aculea-
ta est annuam fert frondem, Ruteæ folio similem
quam toto caule profert, sicut quæ tota veluti co-
ronæ formam per intervalla disposita florem mi-
nutulum, & in siliqua non vndique leptum edit.
Nascitur pingui & glutinoso solo, præsertimque
in segetibus, atque cultis: quam ob rem aratori-
bus inimica. Nec facile perit, cum semel alto &
pingui solo hærent. Descendit enim quamprimum,
& quotannis regetminat per latera se spar-
gens: iterumque in interiora terræ nitens de-
scendit, sequenti anno copiosius nascitura. E-
ructenda tota extirpandaque penitus est: Quod,
cum terra imbribus maduerit, egisse oportet. Fa-
cilè enim tunc tota perit. Si quid enim ex ea reli-
tum fuerit, ex eo iterum renouatur. Estate ger-
minare incipit: Autumno autem incrementi sui
finem habet.

Anonis (inquit Diosc.) quam aliqui Ononida
[Ononis] vocant, ramis habet dodrantales &
maiores, fruticosos, multis geniculis præditos, &
qui alas multas habent: capita rotunda folia par-
va, tenuia, velut Lentis, ad Ruteæ, aut Loti præ-
tensis folia accedentia, subhirsuta, odorata, non
inucundi odoris. Mitia conditur antè quàm spi-
nas producat, estque cibo gratissima. habent ra-

*Ononis
siliqua*

In vitream acetam conficiuntur, ex qua in calentis aqua balneo collocata efficitur aqua, quae potest sensibilibus pondere, non solum renes a calculis liberat, & urinam promouet, sed etiam vesicam, & eius ceruicem a glutinis excrementis obfessam expedit. Ceterum, quod Veteres hanc herbam, antequam spinosa fieret, mutua condierint, factum est, quia in cibo sumpta scidum oris halitum emendare tradebatur.

Anonis spinosa lutea.

Lotus


A Nonidem spinosam luteo flore habeo col-
lectam Lutetiae, quae minor vulgari purpu-
rea & alba.

*Anonis flore
aureo.*

Match. in Dioscor. & post. comm. Ital. Anonis
flore aureo.

**ANONIS LUTEA NON SPINOSA, DA-
lechampio Natrix.**

Descriptio.



A Nonis
vulgari
similis est, vir-
gultu cubitali-
bus, in frequen-
tes ramos fil-
lis. spinarum
expertibus, so-
lit. terna co-
herent, oblon-
ga, hirsuta, per
extremum cre-
nata, viscosa,
odorata, sapo-
re nullo, eui-
dente: flores
longis, nitun-
tur pediculis,
Anonidis spi-
nosae purpu-
rea maioribus,
lutei, confertis

siliquis viciales, ac rotas, hirsutae, semen continent
colore pullo, inquit Camer. Herba tota est hir-
suta, & pinguis, odorata, sed hirsutium quiddam
olet.

Camer. in Epit. Match. figuram ex siccis meis
plantis Di. Gelsi. missis sub his nominibus ponit.
Ononis lutea, montana. Natrix alius. An Bellon.
de plin. Creta prouenientibus, Veta Melioris
odorata, crescens in collibus herbosis, similis se-
re Ononidi: Lob. & Pena Adu. vocant Natricem
Plin. Herbariorum, & describunt distinguentes
ab Ononide lutea. Huius forsalsi meminit Mar-
tius cum ait: Anonis interdum constat flore au-
reo, sed quibusdam in locis aculeis vacat.

De hac ita Crisalp. Diosc. Cicero. silu. tradit, odo-
re graui. Hoc genus videtur significasse Theoph.
cum dixit inter ceteras differentias, quoddam o-
dore differre: & Auius Orobitum hoc idem ap-
pellasse videtur; specie Ononis [vnde quidem
Onobium lanem appellant] flosculos fert & sili-
quas exiliiores Cicere, & semina in his parua &
rotunda, sub flaua: tota planta constat odore val-
de medicato, Theriacam imitante, vnde vulgo
Theriacaria herba vocatur, laudata ad vermes, e-
necandos. Quod Crisalp. flosculos dicit Cicere
exiliotes, non conuenit cum nostra Anonide,
cui idem floris colorem non tradat, nos latet. O-
nonim luteam non spinosam. inquit Hist. or.
Lugd. sunt qui Meliorum maiorem, Melio-
rum silu. pinguem, & Natricem Plin. cognomi-
nent. Et hoc quod non solum radix coctis, sed &

herba tota virus hirci: aut, ut aliqui exponunt,
bituminosum & grauem fetorem edoleat. Ca-
terum hac in Piceno (ait Plin.) a feminis abi-
gunt, quos mira persuasione Fatuos (Fatuos
hu) vocant: ego species limphantium hoc mo-
do animorum esse crediderim, qui tali medica-
mento iuuentur.

Dodon. Anonis flosculo luteo. Clusius Anoni-
dis nostrae hirci ferè meminit: Anonis minor,
non spinosa, siue secunda, flore luteo [praesertim
si in hortis colatur] purpurex aded similis,
ut ab ipsa antequam flores explicentur nisi dili-
genter inter se conferantur, vix discerni queat:
paulo tamen pinguior deprehenditur, nec adeo
grauiter odorata: praeterea ubi sponte nascitur
candidior est reus item flores, qui lutei sunt, bre-
uiori spica nascuntur.

Scribit Ponain Baldoperperam Anoni luteo
multos pharmacopoeos pro vera Mellifera vi.

Anonim luteam non spinosam Montpellii lo-
cis arenosis collegimus, & quidem florentem
Augusto & Septembri, April & Iunio. Hanc a-
lias vidi Esslingz in horto Volmarii pharmaco-
poeiz. Geneuz copiosam iuxta Arhe vltra flu-
uium circa superiores partes florentem Iulio.
Frat. C. Balth. misit cum hac inscriptione: Na-
trix Montpelluli, prope Buctoneti campus refer-
tur: Item in Castelnau, quibusdam Melioris vi-
dualis: Floret Iunio, Equentem obseruauit
Cld. in Gallia Narbonensi, tū in Hispania &
Lusitania florentem Iunio, & Iulio. In aridis,
glareosis & sabulosis gigni tradit H. St. Lugd.

Eadem teste aduersus omnia venena prodesse
& admodum & sumptam experientia comper-
tum est.

**ANONIS NON SPINOSA PUR-
pureo flore.**



A Lunt Si-
lvestra
prata Anoni-
dis quoddam
genus vulga-
ri diuersum,
quod ab aliis
minimè ob-
seruatum Clus.
in Pannon. ex-
istimat. Mul-
tos hoc an-
nuatim ex ra-
dice dura, li-
gnosa & pe-
renni fertur
cubita-
les, rotundos,
lentos & vi-
uineos, fir-
mos tamen &
admodum ra-

mosos, mollique lanugine obductos: multa folia
alternatim caulem lata basi amplectentia, inter-
dum singularia, plerumque autem terna, ex eo-
dem pediculo prodeuntia, molliora & ampliora,
quam vulgaris: summa virga & rami delinunt
in oblongam spicam florum vulgari quidem si-
milium, sed colore magis sanguineo, siliquis de-
inde per similes vulgari, quemadmodum & semen
fert. Tota planta lento quodam humore grauitate
& hircinum olente obsita est, Fraxinellae ferè
odore, & nullo aculeorum vallo munita.


Vocatur autem hac a Clusio tam in Pann-

HISTORIAE PLANTARVM

quàm post. Hist. Anonis non spinosa, suæ mitior
prima, flore purpureo, cuius semen è Silesia ei
millum. Trifolii maioris & sætidi nomina. Dedit
nobis D. Agrius Ononidem purpuream sine
spinis, collectam in Sclauonia, ea nostrati spinosæ
alioqui similis, nec respondens iconi Clusii.

TRIFOLIIS AFFINIS ANONIS pusilla glabra fruticans Cherleri.

Descriptio Lignosa, palmatibus & breuioribus fruticat
surgens, subrubentibus, tenuibus, glabris,
quos folia stipant crebra, tergemina, glabra, viri-
dantia, circumcirca crenata, oblonga. Medice no-
stratis folijs quadantenus similia: ex quorum si-
nu prodeunt, per totos ramos flores mascululi



conforma-
tione legu-
minosorum,
lutei, calyce
in quinque
segmenta flo-
re longiora,
acuta, ex ru-
bro nigrican-
tia, diuiso:
succedunt si-
liquæ turgi-
dæ, nigrican-
tes, glabræ.
Cræcæ mini-
mæ minores,
seminibus qua-
tuor, aut
quinque si-
nuata copu-
santes.

In figura
nostra folia

sunt eiusdem ferè magnitudinis cum ipsius nati-
uz folijs.

Circa Monspelum in rupetis & squalidis col-
legit, & ad nos attulit Gener Cherlerus. Floruit
autem Maio, & paulò post siliquas tulit, alijs su-
bunde atque alijs prolificatibus stoculis.

TRIFOLIIS AFFINIS ANONIS minima hirsuta Cherleri.

Descriptio



Pari cum
lutea mi-
nima glabra
surgit altitudi-
ne, lignosa,
duraque & al-
bicante, dimi-
sa radice, in
multos ramu-
los hirsutos,
rubentes, vel
incanos fissâ;
folia terna, an-
gustiora, lon-
giora, per ex-
tremum dun-
taxat crenata,
alioqui caloz
igata, hirsu-
ta: calyx per
ramos crebri,
magni, pilosi

adnodum, in quinque longas aristas delincentes,
pediculo contorto, deorsum tectam spectantes,
in collis suis florem complexi paruum, cetera al-


bidum, costello ferrugineo. Tota est tactu vis-
cida.

In rupetis Monspeliciis & Nemausis verna-
que obuiam animaduertit & collegit Cherle-
rus.

FRAGARIA FERENS FRAGA RVBRA & alba.

Cap. LXX.

AD Trifolia accedit vel foliorum numero Fra-
garia, fere enim in singulis pediculis terna,
sed Rubo minorâ, venosâ, hirsutâ, per ambitum
serrata, superius viridia, inferius autem albican-
tia, caliculis palmi altitudine, ramulosum & fir-



lutum, flores
Ranunculo
minores, in
quina folia te-
trâ, candidos,
fructum globo-
sum, in qua-
lem, per mune-
ritatem rubrâ,
odoratam,
linguinos
dulci, vinoso,
gratissimoque
sucro pre-
gnantem, se-
minibus multis
& exiguis, a-
bundantem
radicemubro-
sam, capilla-
rem, oblon-
gam, subru-
sam, peren-

nem, gustuque adstringentem.

Maxima sui vel incensæ vel negligentiæ nota
Brunell. Tom. 3. Rhaps. 14. pro Fragaria Mellio-
rum vulgarem exhibet. Ita ut merito à quolibet
in dubium vocari possit, an Fragariam vulgarem
simam herbam aliquando videtur.

Præter fraga rubra & alba, Camer. te. te. repe-
ritur aliud genus, inter hæc coloris mediæ, seu
flauescens, maius multo & rotundius, quod vul-
gò Brösling dicunt, tardiusque maturescit. Po-
teat vocari fraga serotina.

Tabern. Trifolium fragiferum.

Herba quæ fraga ferit, æt. Hist. Lugd. Fragaria
ab uerbis nominatur, quæ quomodo
Græcis appellata sit, nondum constat. Fragariam
autem ex quinque foliorum genere esse quidam
arbitrantur, quod falsum. Sunt etiam, qui Ru-
bum Idæum non spinosum esse putant, quorum
sententiam non improbat. Cronenburg. &
Fuchsius, quibus non subscribunt Lob. & Dale-
champius.

Apuleius Græcis *strawberry* appellari scripsit,
quod si verum est, longè alia est à Comaræ, quæ
ex Diosc. Galeno & alijs describitur. Fuchsius ta-
men vidit codicem manu scriptum, in quo hæc
verba: *Comaræ Græci Romani Fragum*. Quicquid
lit, ex numero Mororum esse constat. Græci Co-
maron appellant, ob fructus arboris eiusdem
nominis. *Fragaria* à verbo *frago*, quod odorem
reddo significat, nominata est.

C. Bauh. phyz. Fragaria vulgaris. 1. fructu al-
bo. 3. hispida folijs. 4. bis fructum ferens.

Fragaria, ut Cæsalp. notat, fructus differentiz
paucæ, in figura, & magnitudine: nam quædam
rotunda sunt, ut Arbuti fructus, quædam ob-
longæ.

longa. Quoddam genus in Alpibus Bargeis vi-
sum est bis in anno fructificare, Vere sc. & Au-
tumno: eius fructus modicè compressus & stria-
tus est, sapore Rubi Idari. Plinius Fraga tantum
meminit in Italia. Non autem idem est, quod a-
pud Serapionem Fragre, de quo H. n. lib. 15. post
Piper. Apud Theoph. Chamaebatus [Humiru-
bus] vocatur, male. Diosc. inter genera Penta-
phylli intelligit, inquit Celsus. quam opinionem
postea refutabimus.

Ceterum, Fragariz meminerunt Fuchs. Lob.
& Pena Adu. Obs. & Ic. Pl. Tragus & Gesnerus.
Qui duo præter rubrum & album, singulare ge-
nus prædant, quod herbeer appellant. Cronem-
burg. cum Cordo, cui Gesn. ex Trago figuram ad-
dit, Fragulam vocant.

Ceterum, legisti, si nō neglexisti, Fragariam fer-
re in singulis pediculis terna folia, nec plura, licet
asserat Brassauolus in Vetonensi agro nasci Fra-
gariz, cui quinque pediculo insint folia, quæ
quæ fraga gignat, in cibis gratissima.

Te quæ morituris. Had. lun. herba appellatur,
Fragaria vulgo, & Fragula, germ. Erdbeerfrucht
Gallis Fraiser, Ital. Fragaria & Fragole. Ipsi fru-
ctus Virg. ac Ouidio fraga, Servio Mora terrestris,
Germ. Erdbeer Belg. Erdbeszen Gall. Fraises,
Gallo-Belg. des Chaperans, Ital. Fraga-Hisp. Miezga-
do, Magneta, Angl. Strawberry, Bohem. asody,
Hung. Epöry.

Pasim in montibus, non raro in conuallibus,
in silvis, ac aliis similiter aliquantulum vmbrosis
Fraga gignuntur: proficiunt & in hortis. Viret
toto anno herba: Vere latius fibris suis expatia-
tur, ac deinde floret: Iunio, prius ac tardius fru-
ctus maturi fiunt.

Coqui, autore Trago, ex Fragis pulcriculas uti-
lissimas conficiunt, quæ ob refrigeratorem vim
inflammatione laborantibus rociis quàm sanis
exhibentur. Aqua è fragis destillata præstantis-
simo est remedio internis quibusvis icoris &
pulmonis, aliisque totius corporis inflammatio-
nibus, siquæ reslinguendæ: ad eadem Fraga ipsa
faciunt. Leprosi, quibus nimium calet sanguis,
faciesque plurimum rubet, aquâ fragorum distil-
lata longo tempore vitam ac valetudinem tueri
possunt, si bis aut ter quotidie illam bibant men-
tura trium ligularum. Aqua fragorum destillata,
pari ratione bibita, cor confortat, vitia thoracis
expurgat, morbum arquatum discutit, sanguinè
purgat, & emendat. Herba Fragariz tula succus
malignis & calidioribus vulneribus apprimè
conducit: nam glutinat ea, & ad sanationem per-
ducit. Aqua fragorum viceribus oris & anginae
auxiliatur gargarisato. Eadem faciei ruborem &
maculas tollit, colluto. Vlcera tibiæ hac aquâ
ablui & purgari debent, linteolisque in ea ma-
defactis semper illis imponi: nonnulli ad oculos
collyria ex Fragis conficiunt, nam sal illis admi-
scunt, posteaque destillant: alii Fraga cum sale,
aneo vase, recondunt, ac per ostium cellæ vi-
nariæ committunt, quoad in viridem aquam mu-
tantur: eâ postea ad oculorum suffusionem utun-
tur. Succus igitur fragorum expressus ad multa
vicia, visui imprimis, ut Camer. notat, & retentæ
vrinæ, Longo tempore asservatur, viresque ve-
tustate acquirit. Decoctum ex herba & radice
diutius vsurpatum cum passulis iëtericis prodest.
Stillatitia aqua manentem sanguinem sistit.

Serapio (inquit Fuchs.) Fragariam calidam &
siccam in secundo ordine tradit. Alii frigidam &
humidam in primo: Nonnulli [qui tamen pror-

sus meo iudicio hallucinari videntur] in tertio
ordine scribunt. Ego folia ipsa gustu modicè esse
amara, & adstringere deprehendi, ut siccam esse
hac ratione, & minimè humidam oporteat. Folia,
flores, fructus, & radix adstringunt. Differunt
tamen inter se, quod folia potissimum recens na-
ta, plurimum in se habeant aqueæ substantiæ,
parum verò adstringant: ad eò ut verisimile sit de
his locutos esse, qui frigidam & humidam in pri-
mo ordine Fragariam statuerunt. Est enim eo-
rum temperies ex terrenâ essentiâ, & aqueâ ter-
pidâ. Fructus immaturus frigidâ terreâ substan-
tiâ præditus est, ut frigidus & siccus hoc nomine
dici mereatur. Maturus autem non parum siccæ
temperati calidi, qui dulcis est, modicamque ad-
strictionem habet, ita ut calidus & siccus dicen-
dus veniat. De fructu itaque intelligendi erunt,
qui Fragariam calidam & siccam esse affirmant.


Expetuntur tandem in cibis Fraga (inquit
Celsus.) quorum gratia & coluntur in hortis. Re-
frigerant & humectant, pichrocolis conueniunt,
& huculosi, sed copiosiore cibo caput tentant,
& inebriant: eorum succus incipientibus infla-
mationibus commodus, præcipuè gutturis: vetu-
state vires acquirit efficaces ad oculorum suffu-
siones & ad faciei vlcera: Aqua distillata prouo-
cat menstrua. Herba adstringenti sapore constat
& subamaro, ad calculum utilissima, & lienosis,
hepaticisque. Ad calculum fraga matura in phia-
lam aquâ ardente optima plenam conuicito, post
horas 40. circiter, colato, & rursus noua in ean-
dem aquam ardentem inuicito, ac sic relinquito
optimè recta & munita ne quid expiret. Prima
autem fraga quæ post colaturam supersunt, per
lintheum validè exprimere poteris, & expressum
eum liquorem seorsim seruare. Cum uti voles,
ter aut quater in mense cochlearium plenum
sumes manè & addes puluerem de Saccharo
cando. Gratum, probatū, efficacissimumque hoc
remedium est, quod vitra 20. annos calculo con-
fictati, præ cæteris omnibus, quæ innumera
eis diuersi medici præscripiere, Gesnero com-
mendarunt.

In cibis ex-
petuntur.
Temperati
moderati

Inebriant
Succus
Guttur.
Oculis, fa-
cies.

Menstrua
Herba Cal-
culis.

FRAGARIA NON FRAGIFERA, VEL non Vesca.



Fragaria ste-
rilis, vel po-
tius non vesca,
radice nititur li-
gnosâ, satis
crassâ, cortice
ruffo, adstringe-
te obductâ,
multis hinc in-
dè enatis fibris
capillatâ, sarmentis
suis per ter-
ram serpentibus
tenuissimarum
fibrarum
productione
denuò radices
agens: folia hu-
mifusa, tripar-
tita, in ambitu
ferrata, molli
lanugine supra
subtusque canescentia, ex hirsutis pediculis duas
yncias longis, ad exortum gemina, vtrinque

Fragaria
off.
Chamae-
ba.

Fragula

Nomina
linguorum

Locus

Tempus

Vires & v-
ta

Herba
quæ
lucet.
Pulchra
Aqua

Frag

Herba
Tempus

Coliculus mucronata membranula eleganter alatis: coliculus teres, hirsutus, vno aut altero folio tripartito stipatus, sextantis, flosculum sustinet pulchellum, candidum, inodorum, quinque foliis constantem, ex calyculo decem mucronatis, hirsutis folliculis donato: in medio *flaminula* plurima: *semina* ex capitulis, Pentaphylli aliquantum similibus.

Fragaria Lob. Obl. *fragaria filuestris* minimè *vesca*, siue *sterilis*. Geln. hort. *Fragaria species sterilis*. C. Bauh. phyt. *Fragaria sterilis*.

Locus & tempus Fragaria sine fructibus *vescis*: Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret Martio & Aprili.

PENTAPHYLLON SIVE QVINQVEFOLIUM Veteribus

CAP. LXXXI.

Non scandit quidem Pentaphyllum, nec cen-
Frangaria, trifolium est, sed huius instar fer-
pit, ac similia folia, nec fructum valde dissimilem, aded vt nonnunquam à quib. dat confundantur, profert. Quæ ratio est, quod hunc ei demus locum.

Discoridis
lecti & valde
glaberrimi

Quinquefolium (itaque describente Dioscor.) ramos fert, samentitios, tenues palmi altitudine, in quibus est fructus *φ' δ' ε' ι' κ' λ' ο' ς* Folia habet Mentæ *ἀνδρομή*, similia quinque in singulis pediculis, rariùs plura, per ambitum terræ modo fissis: florem cum pallore rubentem, auri specie *χρυσάκων, χρυσάνθου* Radicem subrubram, & longam, Veratro nigro (*ἐμβέριον μέλαν*) crassior.

Theophr.
de Pentaphyllo

Πενταφύλλον, aut *πενταπύτε* (vtrouque enim, inquit Theophrastus, appellatur nomine) radix cum effoditur, rubra, siccata verò, nigra & quadrangula (*πεντάγων*) existit, habet folium Vitis (*ἰσάριον*) parum quidem, at colore simile: crescit & perit cum Vite (*τὴν ἀμπέλην*) Folia omnia quinque, vnde & nomen: caules verò super terram (*ἐπὶ γῆς*, quam particulam Theod. omisit) tenues mittit, ac internodiis (*κνήμας*) crebris constat.

Quinquefolium
Plinius
Chamae-
rium
Chamae-
rium

His similia Plinius tradidit: Quinquefolium nulli ignotum est, quod etiam frago gignendo commendatur. Græci vocant Pentapeles. siue Eamzelon (vel vt alii Chamæzelum, Hist. Lugdun.) siue Pentaphyllum. Quum effoditur rubram radicem habet, hæc inarescens nigrescit, & angulosa. Theoph. legit *πεντάγων* quadrangula sit. Nomen à numero foliorum habet. Ex ipsa herba incipit & desinit cū Vite. Hæc quidem ex Theophrasto mutuata esse constat (licet mentio eius non fiat) præter illud, quod gignendo fraga etiam commendari scribit. Nec hoc obscurum est, & ambiguum, vt Hermolaus, Cornar. Matthia post. com. Ital. & Hist. Lugd. somniant.

Theophr.
de Pentaphyllo

& ante hos Leoniceus, qui errasse in hoc Plinium maximè credidit, quod Quinquefolium etiam fraga ferre dixerit Pentaphyllum, atque Herbam fraga ferentem pro eadem accepisse, ac Pentaphylli notas, simul ac vires, eidem herbæ, præter Pentaphylli nomen, adscripsisse censuit. Nam quæ herba etiam fraga gignendo commendatur, & nulli ignota est, inquit, non quinis, sed trinis duntaxat constat foliis. Existimasset quidem in se tam nota, esse codicis potius, quàm Plinii errorem, ac pro Pentaphyllo, Trifolium legi oportere, nisi alia nomina subiungeret, quæ sunt Pentaphylli propria. hæc ille. Verum triplici in errore versari Leoniceum, sequentibus rationibus Collinucius perspicuum

Leonice
triplici
error

fecit. Primum quidem, quod Quinquefolium illam esse arbitrat, quæ in hortis, & agrorum limitibus, tum seminis, viisque passim conspicitur, quæ quidem vulgò, & Quinquefolium, & Pes coruinus dicitur. Hanc enim Quinquefolium esse, de qua hic loquimur, affirmasse illum plurisque constat: cum de nostra hac defensione, deque sua accusatione sermo fortè incidisset, auulsumque terræ ramusculum (nam & in hortis res agebatur) ostendisse, dixisseque illam Quinquefolium esse, in qua Plinius tam euidenter errauerit. Deinde, quod per imperitiam, herbam fraga ferre nullam posse credidit, nisi eam, quæ trina folia habet, quamque melius Trifolium dici adseuerat, & quam docti, vulgusque, Fragariam noscunt pariter & appellant. Tertio, quod folium quid sit, quove modo accipi oporteat, in saluberrimæ herbæ descriptione, parum intellexisse visus est, quas rationes postquam variis fulciuit aliis, concludit tandè verum esse autorem Plinium, & calumniatorem Leoniceum.

De ratione nominis Pentaphylli annotat Marcellus. Non Pentaphyllum (*πενταφύλλον*) tantum vocari suâ ætate Theophrastus dixit, verum [*πενταπύτε*] etiam, factò ab aliquibus nomine à pennis auim, vt credidit Gæz: vt autem nos opinamur, quia in quinque folia se pandit & extendit. Fecit eadem etiam foliorum formâ, vt *pentatomon* (*πεντάτομον*) in quinque partes diuisum (diceretur. Sic à Dioscor. inter nomina, *pentadactylon* [*πενταδάκτυλον*] quod vt in hominis manu quinque sunt digiti, sic in ea planta totidem foliorum diuisiones. *pseudofelinum* [*ψευδοφελίνιον*] quoque dictum, quod Apium mentiat, siue illi in foliorum sectionibus quadantenus simile. *Calipetalon* [*καλλιπέταλον*] à foliorum pulchritudine, (*ἐυαπείταλον*) à foliorum duritie, vt & *ἐυαλάκων*. Quemadmodum & in his [*ἀνταλτες* & *ἀλφάκων* & *πεντάκων*] latere ex figura, aut viti- bus eius aliquam rationem verisimile est. Vocatur & *δυναπίνης*, Manus Martis. his addit Hermol. Pentaphyllum & Pentapteron in Theophr. Quinquefolium & Quinquenervium Theodorum conuertisse. Etiam hanc Hermubor autem (Mercurii herbam) vocari tradidisse. Egyptios etiam *Diffyphi* cognomine, *Dacos Dracila*, Italos *psyllerum*, *Solarum* & *Thebeum*, quanquam corrupte, putet nomina. Nam & *Therumbros* & *Theonestran* quoque dictam idem Hermol. inuenit.

Sexta-decima herba (inquit Albert. Magnus de virt. herb. à Chaldeis *Carrulin*, à Græcis *Quinquefolium*, à Latinis *Serpentina* vocatur, & secundum Alexand. Imper. herba *Mercurii* dicitur, à quibusdam *pentadactylon*, *pentaphyllum*, à quibusdam *Calipendula*. Nec sibi pugnat Theophrastus, & Dioscorides, licet is de radice & folio agens, addiderit, Quinquæ huius radicem effossam, siccatamque nigrescere. Nam hoc à Diosc. ided dictum non est, quoniam satis forte sibi credidit, si qualis ea esset cum foderetur, dixisset. Adiecit etiam vitigineum Quinquæfolii folium esse, non quantitate, sed colore & formâ, quodque naturam Vitis sequeretur. Sed illud videndum etiam, quomodo hic Mentha, ille Vitis folio Quinquæfolium esse dicat, quæ malè inuicem comparari posse videntur: quemadmodum & floris color in pallido albus, simul & auri auro colore dici. Hoc tamen non aded difficile vultud. Videmus enim aliquando in pallore hominis, vtrumque colorem illum.

Nascitur, auctore Diosc. in aquosis locis, & Leonice iuxta canales aë aquæ ductus.

Vitis & T. Est autem multi usus, eodem tradente. Potest enim radice decoctum, ad tertias deductum, si ore contineatur, dentium dolores sedare. Putredines etiam in ore, si colluatur, sistit. Et atteritis asperitates, si gargarizetur, eximit. Alio quoque fluenti, & dysenteriae opitulatur. Arthriticis item, ac ischiadicis, si bibatur. Eadem eadem in aceto trita, imposita herpetas cohibet: strumas discutit: duritias, tumores, arteriarum dilatationes, aneurysmata appellata, abscessus, ignes faciosos, pterygia in digitis, condylomata, & scabies sanat. At succus radicis tener, ad hepatis & pulmonis affectiones facit, & ad lethalia medicamenta. Folia bibuntur cum aqua multa, aut vino diluto, & modico pipere, ad febres per circuitum repentes, in quartana quidem quatuor ramulorum folia, in tertiana vero trium, in quotidiana unus (iv, vnum). Auxiliatur etiam comitialibus pota ad 30. dies. Sanat item breui morbum regium foliorum succus ad aliquot dies triu cyathorum mensura potus. Vulnera quoque & fistulas, folia cum sale & melle imposita sanant. Opitulatur Quinquefolium etiam hernia intestinalium: & haemorrhoidas sistit potum & impositum. Secatur & ad lustrationes ac purificationes adhibetur & purgandis donibus, Plin. Qui reliquum usum medicum sparsim pro occasione exponit, plane prout Diosc. habet, omnia tradens. Galenus Pentaphylli radicem fortiter siccare dicit, sed minime acrem esse. Et idem etiam multi usus esse, quemadmodum & alia omnia, quae tenuium partium sunt, & siccant citra mordacitatem. Est enim & hae radix, siccandi vi praedita ex tertio ordine, manifestam caliditate minime parcipans. Idem & loc. c. 9. Quinquefolium tradit ab aliquibus Eupatorium vocari, cuiusque radicem in vino coctam dentium dolores levare: hoc autem etiam Diosc. tradit. Hae herba, si Alberto magno supersticioso silu credis cum folio Trifolij inhumata, generat serpentes tubeos & virides, de quibus si fiat pulvis, & ponatur in lampade ardente, videbitur ibi copia serpentum. Et secundum Alexand. Imper. radix sanat plagas & duritiem, trita & emplastrata. Amplius scrophulas diluit velociter, si succus eius bibatur cum aqua. Sanat etiam passiones pectoris seu dolores, si succus eius bibatur. Soluit etiam dentium dolores, si succus ore teneatur, aciones oris curat passiones. Et si quis secum deferat, opem dat & auxilium. Amplius si quis vult a rege, vel a principe petere aliquid, copiam dat eloquentiae, si secum eam habeat, & obtinebit quod voluerit, videlicet etiam in lithiasi & disuria succus eius habendus.

**PENTAPHYLLVM SIVE QVINQVE-
folium vulgare repens.**

Descriptio. Non secus ac Fragaria, flagellis suis cubitalibus & bicubitalibus, tereubus, hirsutis, rubentibus serpsit: folia minora Fragariae, quinque-partita, magna, hirsuta, singulis segmentis, in ambitu altis incisuris serratis, pediculis quadrantalibus & maioribus, gustu viscido: flores Potentillae; lactei, quinque foliis constant latiusculis, apicibus in medio croceis, quinque foliis virentibus in pediculis singularibus, palmo longiori fastigio insidentes: capitula superueniunt exigua, minutis seminibus repleta, quae cum pericarpio spoliatur, acetabulo florem tegente proteguntur. Radix longa, crassitudine interdum di-



[Pentaphyllum minus flore subluteo, interdum albo] eius enim titulus est p. 689. Pentaphyllum. Quinquefolium vulgare: ubi icon non conveniens, & transposita: est namque Pentaphylli recti maioris.

Ex quatuor Pentaphylli generibus, quae in Italia vidi, inquit Matth. primum a Diosc. historia nihil prorsus dissentit. Radix huic subrubens, licet id noget Brassauolus, quod alius, ut mihi eam effodiendi, verum esse deprehenditur. Sed con-tingere potuit [ait Apoll.] hanc totam Ferrariam deficere, viginolo forte loco: vocatur Quinquefoli prima species & maxima. Hinc autem mirari subit, pergi; Matth. Manardum Ferrariensem viri alioque doctrina insignem: quippe qui tam facile sibi persuaserit, id legitimum esse Quinquefolium, quod Graeci Heptaphyllum, officinae vero, herbariorumque vulgus, Tormentillam dicunt. Siquidem haec septem ex vno tantum cauliculo profert folia. Pentaphyllum vero quinque, unde & illi nomen. Hoc radices Elleboro similes habet, crassiores tamen, oblongas: illa vero admodum breves, strumosas, simulque in vnum compactas globum. Signatur haec plerumque in incultis, si-uculosisque locis, in altis praesertim montibus: illud vero in campestribus, & prope aqua ductus, & in riguis. Quae sane omnia aperte declarant, hac in re Manardum caecum fuisse. Ceterum, nunquam admiratus sum Plinium in hoc (in quo tamen a Leoniceo, ut arbitror, immerito reprehenditur) quod lib. 25. cap. 9. tradiderit reperiri Quinquefolium, quoddam Fraga gignendo commendetur: Quandoquidem Quinquefoli genus est, quod a quibusdam Diapensia vocatur, in cuius summis cauliculis capitula spectantur fragis non dissimilia. Haec ille, qui asserit, Plinium non huic Quinquefolio, sed Saniculi Fuchsi, quam Diapensiam nominat, fraga attribuisse. Cum tamen Quinquefolium vulgare parua veluti Fraga potius, quam Sanicula, aut Diapensia habeat. Idem in post. comm. Ital. eadem dicit, aut Leoniceum non reprehendit, imo potius eum sequitur, ac cum Leoniceo ait se mirari satis non posse, Plinium dixisse, Pentaphyllum notum ex eo, quoddam fraga ferat: ipsum Quinquefolium contrarium demonstrare. Trago Pentaphyllum tertium, minus & vulgare, quod officinae hodie verum Pentaphyllum dicant esse. Et licet hanc ipsam plantam Tormentillam esse aequat potius, quam Pentaphyllum Diosc. &

gitali, colore rubro, sapore adstringente & exsiccante, exsiccata quadrata citat. **Synonyma.** Camer. Quinquefolium. hort. Pentaphyllum. re-pens & vulgare. Fuchsi. Quinquefolium minus luteum. Lob. & Per. Obs. Quinquefolium sive Pentaphyllum vulgare. Ic. Pl. p. 690. Icon transposita. falso titulo

Quinquefolium
genus
Diapensia
Matth. non
tamen.

Pentaphyllum
minus
vulgare.

Non est
Tormentilla
contra Traditum.

aliquot pilis, vix ac ne vix quidem conspicuis in quibusdam partibus obsita. *Coliculi* aliquot palmates, summotenus diuisi *flosculi* lustrinent pulchre luteos (quantum quidem ex sicca iudicare licet) foliis latiusculis constantes, in quorum medio *stamina* saturatiora ac serè crocea. Eadem, certè aut non multum differens videtur, quam describit *Clus.* sub nomine *Quinquefolii* tertii his verbis: Ex radice fibrosa & nigricante, ramos promit humi se spargentes, & subinde oblongas alias fibras agentes: qui summo capite, multa folia proferunt. *Pentaphyllo* vulgariori serè similia, in quinque profundas fissuras diuisa [quarum singulae instar vulgaris *Quinquefolii* per oras serratae sunt] molliora tamen, aliquantulum incana & splendentia, adstringentis gustus: ex horum medio cauliculi exeunt palmates, multifidi, qui pro stirpis exilitate satis magnis floribus praediti sunt, eleganti & plane aureo colore, multis intus croceis staminibus: semen aliorum *Pentaphyllorum* more, in Fragi rudimentum congestum, fuscum, exile.

Synon. *Clus.* Pannon. & *Hist.* in fol. *Pentaphyllon* aureo flore, siue *Quinquefolium* tertium, cui nomen *Pentaphylli alpini* aureo flore indidit. *C. Bauh. phyt.* *Quinquefolium* 6. siue minus, repens, luteum, alpinum. *Schvv. cat. Sil.* *Quinquefolium* alpinum splendens.

Locus.

Tempus.

Datum nobis hoc *Pentaphyllon* ab Agerio in Stiria collectum. Dono etiam accepimus à *D. Jac. Zvingero.* Crescit [inquit *Clus.*] in summis Austriacarum Alpium iugis, quae tamen herbosa sunt, & sub Iunii finem floret, in hortis autem Maio.

PENTAPHYLLUM MINUS MOLLE lanugine pubescens, flore luteo.

Descriptio.



Multa ex una radice capita ramosa, humi fusa, aliquot foliis *Pentaphylli* vulgaris & elatioris formae similibus praedita, hoc est, quae quinque foliolis in ambitu serratis, mollique lanugine pubescentibus constant, sed non, ut illa [praecedens] incanis, gustu initio exsiccante, deinde nonnihil linguam

vellicante: ex iis capitibus prodeunt dodrantes interdum *cauliculi*, similibus sed minoribus, foliis ornati, gestantes in summo multos flores luteos, elegantissimos, quinque foliis, ut superiorum, constantes, medium florem occupantibus multis luteis staminibus: semen in caput, & veluti Fragi rudimentum congestum, fuscum: radix longa, dura, satis crassa, foris nigricans, & tenuibus fibris donata est: sed & rami illi humi fusi plerumque fibras agunt, & vicina loca occupant.

Clus. Pannon. & in fol. *Pentaphyllon* 4. siue repens minus, flore luteo. Prima species. Cuius

Tom. II.

figura in Pann. transposita est sub alio titulo, nempe *Quinquefolii* quarti secunda specie. *Cammer. hort.* *Pentaphyllum* Bauvaricum, in campis asperis, circa Monacum frequens. Pannonico 4. *Clusi* non ab simile. *C. Bauh. phyt.* *Quinquefolium* 4. siue minus repens, luteum primum.

Nihil illo vulgatius secundum vias, locis siccis & nudis Pannoniae, Austriae inferioris, Moraviae, & Bohemiae. Florere incipit ineunte propemodum Vere.

Icon in Pann. non. transposita.

Locus Tempus.

PENTAPHYLLON PARVUM HIR- sutum.



Radice densa, longâ, nigra: foliis parvis hirsutis, ex pediculis diuturnum viciatum longis: cauliculis multis, humilissimis, quatuor vel quinque viciatum: floribus luteis.

Descriptio.

Clusius suum sic describit: Cui praecedenti nascitur, atque etiam floret, minus tamen frequens, humilissimè fuscum, cuius cauliculi

Def. Clusii.

non virent, sed purpurascunt, & graciliores sunt, folia angustiora, magis villosa, & illorum ora altius serrata: flores etiam magis aurei: in ceteris conveniunt.

Clus. Pannon. & in fol. *Quinquefolii* quarti siue *Pentaphylli* repentis minoris aureo flore, 2. species. Cuius figura quidem bene competit huic nostro *Pentaphyllo*: sed in Pannon. transposita est sub titulo *Quinquefolii* 4. prima species.

Synon.

Icon transposita.

Trago *Pentaphylli*, siue *Quinquefolii* minimi genus, sub initio Aprilis florens, sine caule, foliis per terram sparsis, flore luteo, instar *Anserinae*. Tragi quidem descriptio convenit non autem figura. *C. Bauh. phyt.* *Quinquefolium* 5. siue minus repens luteum secundum. An *Thal. Hare.* *Pentaphyllum* minus, suffrutescens, quod radice constat lignosa, multifida, densa foliorum agmine, brevioribus caulibus digitati longitudo, minoribus foliis, locis aridioribus. An *Gesner. de coll.* *Pentaphyllum* minus, quod locis apricis & siccis nascitur, praecipue collibus, floret Martio, alias etiam Septembri. *Schvv.* *Quinquefolium* vernum minus *Tabernaem.* In collibus siccis & secus vias. Aprilis occurrit in Silesia. *Dod. gall.* *Pentaphyllum* luteum minus. *Quinquefolii* tertia species *Apollini rad. 1.*

Trag. nra. int.

Quinquefolium verno Tabernaem. num.

Passim provenit, ut versus *la Crotte Mont-belgardi*: *Bessfordia* versus *Castellum* vidi florens Septembri, & copiose en plein Palais, florens adhuc Novembri.

Locus.

Tempus.

PENTAPHYLLUM MINUS FOLIO subtus albicante.

Radix lignosa minimi serè digiti crassitudine, quae in fibras tenuiores abiens, longè latè-

Descriptio.

K x 9

six floribus magnitudine non inferiores, quod eodem nomine, quo Lob. suam vocavit, insigniri possit, Pentaphyllum minimum & petrzum. Cùm tamen Lobeliu diuersum sit à Clusii, quia flores muscoli.

An Gesn. hort. app. Quinquesolii albis floribus species quædam in locis montium nascens: C. Bauh. phyt. Quinquesolum 2. siue album minus.

Locus

Tempus

Nostrium à prædicto D. Becchio collectum in Baldo. Suum eruebat Clus. inter saxa & scopulos, summis Austriacarum & Suiarum Alpium iugis. Floret sub finem Iulii, interdum etiam Iulio & Augusto, prout iuga illa maturis, aut serius à niuib. sunt libera.

PENTAPHYLLVM, SIVE POTIVS HEPTAPHYLLVM ARGENTEVM, flore muscolo.

Descriptio



Radicem habet crassam, longiusculam, fibratamque, ex rubro nigricantem, nunc singularem, nunc in multa capita diuisam: pediculi palmates circiter, argentea lanugine obducti, folia sustinent, in quinque, aut septem segmenta, ut plurimum, diuisa, per extremum serrata, subtus argenteo nitore splendentia, mollique villosa, superius atro-virentia, glabra: caules dodrantales & maiores, tenues, paucis foliis vestiti, ramosi, muscosos, confertos gerunt flosculos, Alchimilla modo, singulos quaternis foliolis virentes, foris incanis, hirsutisque. Adstrictionem aliquam percipimus in foliis.

teo nitore splendentia, mollique villosa, superius atro-virentia, glabra: caules dodrantales & maiores, tenues, paucis foliis vestiti, ramosi, muscosos, confertos gerunt flosculos, Alchimilla modo, singulos quaternis foliolis virentes, foris incanis, hirsutisque. Adstrictionem aliquam percipimus in foliis.

Pentaphyll. petrzum

Tormetilla

Argentaria petraea.
Herba stellata species.
Pentaphyll. petrzum

Heptaphyll.

montanum
Argentaria montana

Tormetilla alba:

Leontopodium.

Stellaria argentea.

Argentaria petraea.

Alchimilla minor.

Argentaria

Heptaphyll.

Lob. & Penz. Adu. [vt & Ic. Pl.] Alpinum petrosum & minimum Pentaphyllum cognominatur, quod quidam Tormetillæ annuerant, cui multum sanè simile est: flosculi candidi interdum & purpurascens. Gesn. hort. Argentaria petraea, quæ videtur species Herbe stellæ à quibusdam dictæ, ob radiatam foliorum speciem. Bergsinnato, Steinsinnato. An eadem de coll. Pentaphyllum petrzum, in saxis iuxta aditum fodinæ ferrariæ in monte supra Serranum, ubi plantæ erant paucissimæ, florebantque Augusto: Gesn. cùm apud eum essem vocabat heptaphyllum montanum, & Argentinam montanam. Ille lib. de Lunariis in descriptione Montis fracti ait, Argentariam, speciem Herbe stellæ, siue pedis leonis. Tormetillam albam vocabat Dalech. Bened. Aretio Heptaphyllum montanum, Schaff. Suppen. C. Bauh. phyt. Quinquesolum 12. siue heptaphyllum alpinum sericeum, & quorundam Leontopodium Dioscoridis. Camer. in Epit. Matth. Stellaria argentea, vel Argentaria petraea, vel Alchimilla minor, & heptaphyllum montanum. Item horti, Argentaria heptaphyllos

montana. Taber. icon. Pentaphyllum petrzum minus. Item pag. sequenti 124. Quinquesolum alpinum, heptaphyllum Clusii. Clus. Hisp. heptaphyllum flosculis candidis [virentibus.] Tormetilla candida Hist. Lugd.

Locus.

Lobelio occurrit in cellionibus montium iugis, gelidisque cauitibus, quales sunt Sabaudia, in Austensi valle, & Norbonæ ad Calcaris, hortique DEI, ardua, & in verticibus editissimis Mindenii. Gesnero in saxis, vel locis saxosis montium helueticorum. Clusio in Pyrenæis iugis apud Cantabros, florens Maio, in Alpibus Allobrogum serius. Nobis in montibus Genouæ propinquis, Montpelit in cacumine montis Esperem mense Octobri.

PENTAPHYLLVM INDICVM.

Descriptio.



In sportulis [autore Clus. Exot.] D. Nicolai Colii Medici, anno 1601. ex Orientali India adferebatur Amstelredamum. Pentaphylli Indici planta, cum duabus aliis eiusdem generis, formâ quidem prorsus similibus, magnitudine verò nonnihil differentibus. Singulæ porro plantæ bina duntaxat habebant folia, eaque tenella,


petraci tamen sapore prædita, ex tuberosâ radice prodeuntia, gracili, septem, aut octo nihilominus uncias longo pediculo subnixa, in quinque profundas, & ad pediculum usque ferè perungentes lacinias diuisa, neruo singulas lacinias à pediculo ad summum mucronem secundum longitudinem secante, & venis quibusdam ab eo neruo in latera excurrentibus prædita. Caudicem & flores proferret, mihi incomperum, ait Clus. sed radix, quæ, ut dicebam, tuberosa instar radicis Tormetillæ, & solida, parte externâ aliquantulum fusca, internâ verò alba, & cum quadam acrimoniæ particibus, duorum aliorum foliorum, quæ abrupta, vestigia adhuc retinebat, plenaque, & aliquot fibris donata erat.

PENTAPHYLLI EFFIGIES, LEVCAS quibusdam.

CAP. LXXIII.

LEucaem putaram ex plantis habeo Valer. Dourez. radix crassa, nigra, squammata, in capita diuisa: tota alioqui planta, quæ vncialis, aut sesuncialis, cinericeo tomento obducta: folia plerumque terna, Fragariæ modo, minora, magis villosa, candidioraque, serrata.


Lob. & Pena Adu. testibus, non penitus nihil



TORMENTILLA.

CAPUT LXXIV.

Descriptio



Vitruvia

hil sentiant, Valerandus & alii, qui plantam hanc incanā Pentaphylli effigie, intuiti, Leucadem censent. Tabern. ic. Argentina Melpolliaca, melsch Silberfräut.

Admodum inuentu rara, nec nobis le- & a, nisi prope Allobrogum deuexa, planitie in arida, glareosa.

quiesolum crebris internodiis constat, ut ne hy- lus quidem hinc deficiat, nisi & duo folia exci- pias, quæ & centè ob eorum exiguitatem in numero foliorum recensenda, non videantur. Quæ postrema apud Theophrastum reperi- tur, nunquam vel somniauerimus. Caterùm, quum hæc absolutè pronuntiet Apollo, ei hæc errandi, aut veris Matthiolum suggillandi, ansam faciliè iniuria, inuidiaque suppeditat.

Germani] inquit Trag. lib. i. cap. 171.) hanc plantam Tormentillā à Latīnā voce deriuato no- mine nuncupant, alii Birkwürz, à Betula, quòd in iis siluis, quæ magnā copia Betulas pro- ducunt, & hæc luxuriat, nonnulli Blütwurzel/ aut Rõtheil wurzel [sanguinariam aut rubram radicem] vocant, eò quòd Dysenterias, & vitia intestinorum curet. Dicitur & Bistorta [Cæsalp.] à nodis nimirum radicis quibus intorquetur, ut ea, quæ priuatim Bistorta dicitur (nam est procul dubio prima Pandectarii Bistortæ species) & à plerisque Ferula. Ego autem puto nomine Pen- taphylli insigniendam. Idem cap. sequenti ait Tormentillam nobilissimū Pentaphyllon Theo- phrasti & Dioscorid. esse statuo. Quod verò ita sentio, Theophrasti me mouet descriptio. Tan- dem lib. 2. c. 37. Mitos (inquit cur Alex. Bened. Sparganion nominet. hæc ille. Quod autem Tormentilla Theophrasti Quinquiesolum non sit, solā Theophrasti autoritate refellitur, ut iam sub Pentaphyllo vulgari docuimus. Malè igitur sentiunt Tragus, Gesn. Michael Humel- bergius, Valeriola, & alii, qui Tormentillam. Pentaphyllon esse existimant: hæc enim septem- na folia habet, raro pauciora, præter id, quod teste Maranthā, aliæ notæ non respondent.

Quærentibus porro Lob. & Penz in Adu. & Obs. an Tormentilla, vel Heptaphyllon. Chry- sogonum Dioscoridis sit: scitè, nostro iudicio Dodon. negatiuè respondet, dicens. Tormen- tila fruticis modo haudquaquam, ut Dioscoridis Chryzogonum attollitur, nec flos eius similis est Coronarii Verbasci floribus, ut Chryfogoni: ergo Tormentilla Chryzogonum non est.

Nominatur verò Tormentilla (ut Lob. & Pe- na notant) quia tormentum cruciatumve den- tium exuillimum placat, atque venenatarum quarundam rerum compescit furorem crucian- tem. Meminit & Hermol. Tormentillæ, quod- dam esse scribens, qui ad Saxifragam referant.

Græcè *ἑπτάφυλλον*, Septisolum, Latīnè vulgò Tormentilla nominatur. Germ. Birkwürz, Rorheilwürz & Tormentil / Gall. Ang. & Belg. Tormentille, Ital. & Hispan. & Hungar. Tormentilla, Boh. Vatrzyr.

Obseruauit passim Basilæ, Monspelii, & Ge- neuz in pratis, ubi folia protumpebant Martia, florebat Maio, Iunio, & Iulio ibidem audiui Rhizotomum vocantem Mamor. Nemoribus (ita tradente Hist. Lugd.) opacis, montosis etiam, siccis maculentisque locis gaudet. Serò & Asta- te floret.

Tormentilla omnibus vulnerariis potioni- bus, emplastris, & vnguentis adiungi potest nam vetera & putrida sanat vulnera & absces- sus, vino, vel aqua decocta, collutione & in- spersa. Est & in omnibus medicamentis, quæ ad- uersus venena & pestem componuntur, adhi- benda. Est porro radix potenter resiccans, & ex eorum quæ tertii sunt ordinis, numero, & par- tium tenuium: caliditatis quàm minimum tenet, adstringentis facultatis particeps. Herba autem & radix simul tusa ac imposita sanant

caulem ambientia, Pentaphylli, hirsuta, sed dini- sura septemfolia: flores parui, lutei, Quinqueso- lii. In huius coliculo observatur aliquando ad- natum tuberosum quoddam excrementum, con- cretione Pomorum quercinorum, in cuius an- tris stabulantur vermiculi, seu teredines.

Tormentilla verò (quemadmodum Apoll. pro- didit) à septenis foliorum diuisuris. heptaphyl- lon [vel ut Hermol. Septisolum] quoque vo- catur. Eadem in Quinquesoli (specie reponitur, ob folia quippe duo iuniora, quæ tam exigua sunt, ut in foliorum numero à quibusdam repo- nenda non videantur. Et hinc fortè factum, ut Brassauolus hanc Plinii Pentaphyllon suspicatus sit, ut & Manardus, quem propterea excutuisse Matthiolum dixit. hæc ille, qui Matthiolum re- pschendit eo loco, cum tamen ipse in dolis, ac versutis, & non Matthiolum, quem suo nomi- ne metitur, magis quàm in comitate confidit, inquit enim Tormentillam Quinquesoli, hæc Quinquesoli Theophrasti tam aperte respon- dere, ut nulli magis: Nempe hunc in modum eum inter cetera distare 9. de mult. pl. c. 14. Quin-

Tom. II.

Tormentilla

Kirk-
Sturtz.
Locus

Sanguina-
ria radia.

Bistorta.

Pentaphyll.
Throph.

Sparganion
Tragi error

Gesneri.
Humelb.
Valeriola
Gra. lapsus

An Chrys-
ogonum

Tormentil-
la radic.

Saxifragia

Nomina
linguarum

Locus
Temper.

Vinc. & v-
bus

Vulgaris
Abies

Veneris
Pessu

Teperam

Hepher
K. k.

49

Tumores.
Ulcera.
Scabiei.

Dysenteria.

Scurra.

Pessis.
Emplastrum.
Aqua.

Ulcus.

Menstr.

Pulsio.

Pessis.

Dysis.

Dysenteria.

Phlegma.

Placenta.

Fluxiones.

Cholera.

Infidum.

Vomitus.

duritias & tumores, & collectiones iuxta aures subnatas, coxendicium dolores sedant, cuius fluenti scabiei medentur, nec non & mariscis, aliisque id genus affectionibus, maxime vero hoc efficiunt, cum ex aceto imponuntur. Nec inuenias aliam radicem, quæ dysenteris & lienteris, aliisque quibuscunque alui fluxionibus coercendis apta sit. nunc ad has affectiones ex ea pastilli, pulueres, electuaria, potiones, & sacculi conficiuntur. Opiliones etiam hac radice xgrotantibus ouibus subueniunt. Succus radicis & herbe recentis expressus manè & vesperti temporibus illitus, vertigini medetur. Idem potus veneno omni in cibo, siue potu hausto resistit, sicut & pessis, nam per sudorem venenum expellit. Potest etiam manipulus herbe & radicis vino decoqui, ac decoctum ad eadem calidum bibi. Vtiliter etiam emplastra & vnguenta succo Tormentillæ conficiuntur. Radix cum herba vino per noctem, inque balneo Mariæ distillata, ad omne venenum vtiliter quoque propinatur. Eadem aqua cum Tutia præparata, vel Succino albo, oculis instillata, distillationibus illorum medetur. Aqua & succus secreta mulierum medicina est, ad sistendos menses. Sicca radix in puluerem redacta, singulis vicibus aduersus pestem, omneque aliud venenum drachmæ pondere siue in potu exhibetur. Eadem ex vino rubro pota dysentericis succurrit. Verum obseruandum est, si febris Dysentericæ coniuncta sit, ut puluerem illum ex aqua, in qua candens chalybs extinguitur fuerit, aut ex aqua Tormentillæ distillata, drachmæ pondere exhibeas, idque bis per diem. Sunt qui radicem cum albo ovi admixta dimidia nuce Myristicæ & tantundem salinis Aucinæ, subigat, ac in ferreo cochleari super carbones lentè decoquat, subinde vertentes placentulam illam. Fluxiones in infidè coluberi aunt, si quis quotidie vnam talim placentulam deuorauerit. Alia proinde ratio has placentulas, & quas, quibus cholera, fastidia & vomitus excitat, profuerit hæc est. Accipe puluerem radicis Tormentillæ, & cum albo ovi subige, deinde verò super latrem candentem decoque & reconde. Quod si quis prædicto morbo laborauerit, ei huius placentule partem drachmæ pondere contusam, ex aqua Balsaminæ propina.

POTENTILLA SIVE ARGENTINA.

CAP. LXXV.

Descriptio.



EX radice palmari & longiore, tenui, subadstringente, folia promit Agrimonie, pinnata (intercedentibus paruis foliolis) quorum singularis in ambitu serrata, superne glabra, inferne candicante hirsutie vestita, Celsi. foliorum sectionibus tenuioribus maximè Quinquifolii refoctenus, sic-

cior & adstringentior sapore, quàm radix: candelas nudos spargit, qui more Fragane radicant in summo difixi in terram, ac folia gerunt: alios cauliculos inter folia attollit simplices: quibus flores insident grandiusculi, Pentaphylli, quinque foliis constantes, lutei: fructus sumidis, grandiusculus.

Quo nomine Greci & Latini hanc herbam appellant, à nullo, quod Fuchs. sciat, adhuc proditum est. Recentiores quidem Potentillam, ab eximius vinibus, quibus pollet, vocant: nonnulli Agrimoniam siluestrem, ob formæ affinitatem, quam cum utroque habet, nuncupant. Dicitur & Argentina, siue Argentilla, ab argenteo foliorum splendore: Germani verò Genseric (Anserinam) quod hæc anseres in cibo delectentur, appellant.

Posset inquit Tragus, Anserina hæc, quod ad formam attinet, non ineptè Eupatorium dici. Posset & Gross garb (Millefolium maius) appellari. Nam singula eius folia instar pinnarum auium pulli, sed maioribus ineuris dissecta apparent, quoad reliqua Millefolio non dissimilia. Millefolium itaque maius Latinis dicitur, nam & hoc nomine à Diosc. insignitur, tametsi quædam nomina, quæ eo capite commemorantur, ad alterum Millefolium pertineant, quod Stratiotes vocatur. Ea sunt Stratiotes, Achillion, Supercilium Veneris. Hæc ille, qui describit, & bonam figuram exhibet, verum nomina commiscet: est enim neque Eupatorium, neque Millefolium.

Quidam (ut erat Hist. Lugd.) Stephanomelidem Plinii esse conieciunt vtilem ex aqua sanguis: fuerit per nates, sic dictam, quod coronis elus eius flos innectatur.

Ceterum (teste Lob. & Peræ, qui in Adu. Obs. & l. Pl. Argentinam vocant) tantopere est hæc finis Agrimonie, ut non raro muliculas Agrimoniam se collegisse ratas fallat: discernitur autem res tota vniculorum.

Gelsero hort. dicitur Argemone altera: & in cat. pl. Thalestrum Herbarior. lux ætatis. Quod tamen Argentina non est (attestante Cordo in Diosc.) hæc hoc opinentur Ruellius & Anguill. Per nulla 2. optimè à Fuchs & Matth. depicta.

Hæc lun. nominatur Argemone, Inguinaria Plinii, Agrimonia siluestri, inferna, Argentina, Potentilla, & quorundam & German. Genseric, Gensing. Belg. Siluerchuyt/Bluet noilandis, Gall. Argentine, Bec d'oye. Ital. Argentina. Hung. Lud pasur, Anserum gramen. Boh. Strubruk aut Husy Maydio.

Obseruam passim florentem Maio, Iunio, ac Julio. Frequentem scribit Celsus in Germania, circa semitas & loca aquosa, potissimum iuxta flumina, quorum nulla amantior, frequentiorque alumna. Amat viginosa. Astate, dum floret, legi debet.

Quum folia eius & radix (inquit Fuchs.) adstringant, temperamento à Pentaphyllo (Millefolio Trag. legit) nihil differre videtur. Quare hæc, potissimum autem radix, ex tertio ordine desiccatoria est, minimumque euidentis caliditatis habet. Errat itaque mirum in modum, qui hanc humidam esse statuunt, nullà alià moti ratione, quàm quod in humidis locis proueniat: quasi verò Nasturtium aquaticum, hand obstante quod in aquosis nascitur, non etiam in tertio locet ordine. Debuisset certe illos ab hac sententia deterrete non lenis illa adstrictio, quæ certissimus est siccitatis index: adstringentia enim Göl. lib. 4. simpl. 6. teste, terrena sunt de crassa corporis consistentia.

Potentilla

Ulc.

Agrimonia

filu. & Ta-

naculum

507

Argentina

Argentilla

Gende. Anse-

rina Gende.

Eupato-

rium Mille-

folium ma-

ius.

Tragus

proh.

Stephanom-

elides

Agrimonia

affinis

Argentina

Thalestrum

Gens. &

Ruell. not.

Nomina

Linguerum

Inguinaria

Plinii

Locus &

Tempus.

Tempera-

mentum

Error qui

rondam


Adstri-

Adstringens igitur & exsiccatória vi pollet. Quare Recentiores fluxionibus & puncturis oculorum prodesse, recentia vulnera glutinare, & exedentia sanare, mulierum menstrua compescere, artus & membra confirmare, rectè tradunt: nam id ipsum polle adstrictio, quæ in hac herba haud modica est, abundè docet. Et cum habeat. Quinquefolij temperamentum, eius etiam facultates obtineat necesse est. Dentium itaque dolorem finit, exedentia oris ulcera sanat. Dysentericis & alui profluviis, coxendicis articulorumque doloribus subuenit. Sanguinis eruptiones sistit, aliæque, quæ à Diosc. Quinquefolio attribuuntur, potest. Quod verò adiciunt, hanc etiam lumbricos exterminare posse, id minùs rectè faciunt. Ea siquidem facultas, non hinc, sed illi inest herbae, quæ verè Tagetes dicitur. Proinde non sine magno errore, Potentillam cum eo confundunt. Anserina cum aqua & sale decocta, ac iis exhibita, qui ex alto deciderunt, auxiliatur, ut quibusdam apud Trigum videtur, sanguinem concretum dissolvendo. Verùm hoc illi nequaquam probatur. Herba vino decocta & pota torminibus, & dorsi dolore laborantibus subuenit, mulieribus, quæ albis profluviis vexantur, conducit, nam adstringit haud secus atque Pimpinella Italica. Aqua Anserinae destillata rubentibus oculis utilis est, si linteolis in ea mactatis imponatur. Hac ratione maculas quasvis extergere, fluxiones & dolores sedare dicitur. Experimento egregio didicit Ioan. Agricola Potentillæ succum unâ cum pulvere Colchici vulgaris mariscis ani mederi. Viribus eximii pollet (aiunt Adv.) ad frangendum calculum, interiora vulnera & ulcera maligna, & dysenterias, viscera roborando, similiter Agrimonie: cuius potiùs, quàm Tagetes. temperamento exsiccat, siue calore moderato est, sed astrictione superat: multum sanguinem grumofum potu dissolvit. Hanc indicat pelui, frigida aqua semipleuræ, & operculo oclusæ, destillare, siue vapores in concavum operculi subuehere. quod sublimare vocant, ferunt. Huius stillatitiam ad lentiginis, pannos & maculas, fuscumque colorem Sole contractum delendum, Angliæ mulierculæ adhibent. His addit Hist. Lugd. Datur utiliter potui sanguinem rejicientibus. Herba sicca farina ex sua ipsius stillatitiâ aquâ pota, albas vteri fluxiones sistit, sed valentiùs addito Corallo & Eboris ramentis. Sunt qui ad enterocelas præferunt, tum in cibis, tum in potionibus. Etenim vlcera sanat præsertim pudendorum, & quæ oris partes erodunt, firmat commotos dentes, & laxas gingivas, si in aceto decoquatur, & os sæpè colluatur. Dentium dolores inulcet, prolapsam columellam restituit, addito Aluminis momento. Barth. Currichter in sect. præct. lib. 1. cap. 2. ad dolorem capitis à sanguine & bile, Anserinam ex aceto ros. & sale, primò pedibus apponit, & si non cessat, succum cum aqua rosacea temporibus applicat.

PES LEONIS SIVE ALCHIMILLA.

CAP. LXXVI.

Descriptio **E**X radice minimi digiti, aut pollicari crassitudine, plurimis fibris donata, strenuè adstringente & desiccante: caules surgunt aliquot tenues, teretes, hirsuti, ramosi, draconales & cubitales, quibus insident flosculi



hirsutis, alia cauli, pediculo aut breui, aut stillo adhzrent, interceptaque folij continuitate, reliquo pediculus ambiunt, ut ab eo perforentur: ceterum solum ad Maluam accedit, ex luteo virescens, infra hirsutum; in octo, aut novem angulos obtusos, seu plicas divisum, in singulos angulos singulis nervis à pediculo prodeuntibus, concinnè in ambitu crenatos.

Hæc vulgò Herbariis, Pes Leonis (Leontopodium) & planta leonis, à folijs instar leonini pedis latis, & rotundis nominatur: minimè verò est Dioscondis Leontopodium, id quod Brunfels. Euch. & Cornarius volunt. Notum est (inquit Corn.) Leontopetalon officinis & herbariis, & ab ipsis corruptè *Para leoni* (Leontop) appellatur. Sed erronea admodum est hæc opinio. Quandoquidem Alchimillæ descriptio cum Dioscondis Leontopodij delineatione [teste Dorst.] minimè convenit. De Leontopodio scribitur Hist. n. g. l. 31. ubi & eius æquiuocationes assignamus.

Euch. præterea vocando Alchimillam, Artinellam, Leucopedion, Plantam siue Pedem leonis, Leontopetalon diversarum plantarum nomina confundit.

Brunfels ait eos non perpetuè agere, qui Dentem leonis, Leontopodion & Leontopetalon Dioscor. nominant, quamvis descriptio non quadret. Sic vult sic iubet Brunfels. cui pro ratione novitas placet. Qui tamen non dentem sed pedem legisse debebat. Horum autem opinionem de Leontopodio & Leontopetalo, nobiscum rejiciunt: Fuchs. Matth. & Dodonæus.

Nec audiendus (monente Matthiolo) Brunfels. in suo Onomast. Dodon. Lob. & Pena Adu. & Hist. Lugd. qui Scellariam vulgò vocatam Leontopodium esse scribunt, id quod ex amborum plantarum descriptione constat.

Quod verò Hier. Bunsch. Sinaw, græcè Alchimillam, Artinellam, & Leucopedion vocari scribit, apud quem Græcum inuenierit ista nomina non reperio.

Dicitur autem Alchimilla, quod Alchymistarum præconis celebrata sit, & *Alchimilla* seu *Alchim* siue *Alchim* Cordo à German. Chirurgis Sanicula maior, quod sit illi, tum facie, tum viribus admodum affinis.

Pes leoni, siue *Alchimilla*, German. *Sinaw* / *lewen süß* / oder *lewen rapen* / *Gross Sanicel*. Belg. *Sinawe* / *onser fraven mantel* / Gall. *Pied ou Tape de Lion*, Ital. *Pie de Leone*, Angl. *Ladies mantel*.

heibidi, umbellatim congesti, quorum singuli, octonis constanter foliolis, majoribus quatuor, totidemque minoribus, alternatim posit, in quorum medio apiculi lutei: semen minutè luteum: Papanetino simile: folia, alia statim à radice exortuntur, longis, sesquipalmari- bus, pediculis

Nomina
linguarum

Agriemonia similitudinem habent.

Herba benedicta.
Brunfels. quam Tom. 3. Rhaps. 2. Caryophyllatam vocat, eandem in 4. herbam Benedictam nominat.

Syluaticum nunc.
Reprehendit Matth. Syluaticum quod parum rectè tradiderit, dicendo, Lagopum eam esse herbam, quam Herbariorum vulgus Caryophyllatam appellet.

Genus Plin.
De hac Veteres, quod Matth. sciat, nihil memoriz prodiderunt. Nisi fortasse fuerit Geum, cui Plin. lib. 26. cap. 7. radículas assignat ternas, nigras, bene olentes. Vtrum autem sit Geum Plinii vulgaris hæc Caryophyllata Lob. & Pena Adu. quoque dubitant.

Herba filio.
Sic & Trag. de hoc dissidio nihil iudicat, sed Nardum siluestrem vocat, quam quidam Sanamundam nominant.

Sanamunda.
Eadem repetit Dodon. gall. & Gesn. Qui præterea Auantiæ, & Oculum leporis, atque Geum, Caryophyllatam vocari tradit, id quod ante cum Antonio Musæ Brassauolo quoque placuerit.

Apocyn. Oculi leporis.
Caryophyllatam vulgi Cæsalp. nuncupat, cui apud Plinium inter Argemonias numerari videtur, cum ait, radix Thus redolet.

Hist. Lugd. Caryophyllata Matthioli, & Caryophyllata vulgaris, qualiter & Clusio dicitur.

Eupatoriæ species non est.
Taber. icon. & Hist. Caryophyllata, & Herba Benedicta, quam quidam Lagopum, alii Eupatorii speciem volunt, sed errant, inquit, Plinius vocat Geum, & Scalig. Geriam. Item Caryophyllata 4. filuatica, flore luteo. De hac quarta plura vide sub nostra aquatica, dubius edim sum, quod referri debeat.

Genus.
Camer. Epit. Caryophyllata. Item horti Caryophyllata vulgaris: Et rursus: montana similis vulgari, elegantior tamen & maioribus floribus prædita.

C. Banh. phyt. Caryophyllata 1. siue vulgaris. Caryophyllata 2. siue vulgaris maiore flore, fortè Fuchf. siluestris.

Gloria filia.
Gerardo, Caryophyllata; Vallonum Gloria filia.

Baccharis.
Baccharis, [vt vult Corn.] officinis ignota est, sed Herbariorum vulgus Herbam Benedicti, siue Benedictam vocat, aliqui etiam Chirothecam nostræ domine, vnser framen hendschuch, appellant. Verùm Benedicta non videtur nobis respondere cum Bacchari Dioscor. nec nomen Chirothecarum placet, quodd fortè Digitalis sit, Hanc autem non esse Diosc. Baccharem, vt nonnulli suspicantur, descriptio plantæ, quæ non conuenit, vt Monachi in Mes. testantur, comprobant.

Corn. duplex lagopus.
Sed vt liberè dicamus, quod sentimus: Minime, cum Fuchfio, Caryophyllatam, Dioscoridis Lagopum credimus, dicimusque eorum sententiam, qui Geum Plinio dictam velint, periculo vacare, quodd eadem facultas vtrisque radicibus insit.

Fuchf. diff. verna.
Cæterum, Fuchfius Caryophyllatæ, seu Herbz Benedictæ siue Sanamundæ vulgè appellatæ duo genera animaduertit, hortensem, flore minore, & siluestrem flore maiore, magis ad croci colorem accedente. Nos Fuchfii duas figuras apponimus, quia sculptæ iam erant, quamuis nullam differentiam dent ostrent, nec discrimen à Fuchfio positum in iis observare possumus.

Fuchf. met. Icones.
Caryophyllatæ figura malè apud Euchar. Carduo benedicto appingitur.

Euchar. Caryophyll. pyrum.
Caryophyllata qualiter Græcis & Antiquis

Latinis nominata sit, nondum compertum. Est autem ab odoris suauitate, quam radices de se præbent, nominata. Vulgus herbam Benedictam, à diuina sua efficacia, & Sanam mundam appellat.

Germani Benedikten wurtz, Belgi & Brabantii Caryophyllatæ, Gall. l'herbe beniste, Resise, ou gallier, Angl. Adens, Boh. Benedyft, Hung. Vadzef tin,

Vidi spontè prouenientem non longè à Monspelio, Basileæ mensè Octobri inter propugnaculum & portam cineticæm, intra urbem ad muros & propè portam lapideam, & abbi florentem Maio & Iunio, cum flore & semine Augusto, Patavii virentem in quodam horto Decembri, & in horto D. Musali Ianuario, Florentiz in horto D. Nicolai Ferrariensis, Lugduni passim; Genevæ virentem mensis Februarii principio, & cum flore Maio. Cæterum, Matth. teste, gignitur in montibus, & in viis iuxta septa, quodd mirum in modum sepius opacis gaudeat. Vulgaris in Germania, inquit Tabern. in terra firma, & humida, vmbroso loco, in hortis prope muros, in sepiis & dumetis: transfertur in hortos propter summam utilitatem.

Geum Plinii medetur non modò pectoris doloribus, & lateris, sed & cruditates discutit, cundo sapore. Recentiores & peruenustus etiam herbarius, annotante Fuchfio, calidam & siccam esse in tertio ordine statuunt. Folia sanè in gustu non mediocrem adstringentem ostendunt, vt & eadem radix. Eadem luto & sordibus eluta siccat, & imbre acui respersa, aras & vestes iucundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosque coli dolores. Manuscriptus Herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Tomentum item ex vino decoctionis eius mentes cedere. Contra venena tritam cum vino sumptam valere. Concoctionem præterea roborare, dolorem ventriculi, & intestinorum à frigidityte aut floribus ortum decoctam in vino sanare ait. Mirificè etiam ad interna vulnera huius herbæ decoctum confert. Externa verò ex eà collui debent. Acetariis etiam folio expetita herba. Eadem Tragus sic tradit.

Vitis & loribus, & lateris, sed & cruditates discutit, cundo sapore. Recentiores & peruenustus etiam herbarius, annotante Fuchfio, calidam & siccam esse in tertio ordine statuunt. Folia sanè in gustu non mediocrem adstringentem ostendunt, vt & eadem radix. Eadem luto & sordibus eluta siccat, & imbre acui respersa, aras & vestes iucundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosque coli dolores. Manuscriptus Herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Tomentum item ex vino decoctionis eius mentes cedere. Contra venena tritam cum vino sumptam valere. Concoctionem præterea roborare, dolorem ventriculi, & intestinorum à frigidityte aut floribus ortum decoctam in vino sanare ait. Mirificè etiam ad interna vulnera huius herbæ decoctum confert. Externa verò ex eà collui debent. Acetariis etiam folio expetita herba. Eadem Tragus sic tradit.

Vitis huius radicis vulgaris est, vt vere in vinum imponatur, quodd optimo ac iucundissimo & odore & sapore commendat. Hoc vino cor exhilarari & obstructions iecoris aperiri, nec non frigidityte & crassis humoribus affectum stomachum iuuari multi testantur. Radix Benedictæ vino decocta ac calida pota, dolorem ventriculi, & intestinorum à frigidityte, aut flatibus ortum, sedat. Vinum in quo radix Benedictæ decocta fuerit, purgat & mundat omnia vulnera, cuiusmodi sunt fistulæ & carcinomata: idem sordas maculas exterit, si illo facies aliquando singulis diebus abluatur, maximè verò in primis diebus puerperis. Caryophyllata, inquit Matth. non est viribus inefficax, argumento quodd eius radices manifestum Caryophylli sporent odorem: Eà Redentiores vtuntur potè ad thoracis interna vulnera. Quin & eius succum admistâ æruginè, cuniculosis, contumacibusque vlcibus, vtiliter iniiciunt. Eadem olfactu spiritus recreat, & frigidum roborat cerebrum. Epota prodest coxæ, dysentericis, scæminatæ profluvii, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quàm foris illita enterocelis auxilio est. Temperamentum ei exalefaciens, & exsicicans, vt ma-

vt manifesto sunt indicio eius radices : quippe
 quæ gustu odoratz, adstringentesque deprehen-
 dantur. Quibus qualitatibus non modò attenue-
 re, discutere & adstringere valent, sed etiam ro-
 borare. Menles, vt attestatur Lobel. & sanguinis
 grumos propellit, obstructions reserat, vene-
 nis aduersatur. Radix huius, vt tradit Tabern.
 in cibo, & potu, & medicamentis quocunque
 modo sumpta, cerebro succurrit, spiritus, vitales
 recreat, omnibusque oculorum vitis subuenit.
 Radix masticata oris scortorem emendat. Eadem
 ieiunè commanducata, corroborat, & ab omni
 contagio præferuat. Ex herbâ & radice, in bal-
 neo Mariæ destillatur aqua ad eisdem vîus ido-
 nea. Similiter & vinum ex radice paratur, & Con-
 serua. Radix colligenda Martio.

Auantia montana flore luteo, caule vînam alto.
 C. Bauh. phyt. Caryophyllata 6. siue Alpina lutea,
 cuius flos licet communiter luteus sit, inuenitur
 tamen & purpureus & albus. Gerard. Caryo-
 phyllata montana.

Planta hæc, quam Gesnero in peregrinatione
 Rhetica Caryophyllatam alpinam nominauit, re-
 perta in monte Braulio, florens Iunio, vt & alibi.
 In summis etiam [autore Clus.] duntaxat iugis
 montium Pannonicorum, nec in omnibus ta-
 men, sed inter gramina, vel sub fruticibus nasci-
 tur. Iunio floret, Augusto semen maturum est.
 Reperitur [teste Matth.] in Bohemæ montibus,
 & quibus Albis fluius, oritur.

Iisdem cum altera pollet viribus, sed præstan-
 tioribus. Radix non solum excalescit, & siccatur,
 sed etiam cohibet ac roborat.

GARYOPHYLLATA MONTANA flore magno, luteo.

Descriptio



Folia Ca-
 ryophyl-
 latæ montanæ
 & palustris
 vulgationis,
 respondent,
 sed multò mi-
 nora, vncialia,
 multa per ter-
 ram sparsa, vil-
 losa, nonnihil
 laciniata, per
 extremum ro-
 tunda, serrata:
 inter hæc sur-
 git culiculus,
 sex circiter
 vncias altus,
 foliis paruis,
 & in profun-
 das oblongas
 lacinias fissis,

cuius summo flori insidet magnus croceus, conco-
 lorum staminum congerie medium occupante,
 ex calyce hirsuto in lacinias mucronatas, alterna-
 tim maiores minoresque exso: radix satis crassa,
 nigra, fibrata, valdè odorata.


Gesn. hort. Geum tertium alpinum Matth. in
 Diosc. cum mag. fig. Gariophyllata montana, cui
 flos aureus, radix odore Caryophyllorum, & gu-
 stu adstringente. Lob. Obsv. vt & Ic. Pl. Caryo-
 phyllata maior rotundifolia, & Garyophyllata
 montana Matth. qualiter etiam Hist. Lugd. inscri-
 bit, dicitur: Quandam, inquit, Caryophyllatæ ra-
 ram & perelegantem speciem, Italo semine or-
 tam, nihil dissimilem à Septentrionali rotundi-
 folia impertiuit Coldenbergius, nisi folio qua-
 druplo maiore, & radice crassiore digitum æquã-
 te, minusque fibrosa foret. Si Lob. eandem cum
 Matthiolo [cuius figuram exhibet] intelligit præ-
 cedenti descriptione, miror cum non meminisse
 coloris.

An Anguil. Garyophyllata alpina. Clus. Pan-
 non. & in fol. Caryophyllata montana 2. Caryo-
 phyllata alpina aureo flore, à Matth. Caryophyl-
 latæ montanæ nomine descripta: pictura tamen
 non valdè felicitè expressa. Camer. in Epit.
 Matth. Caryophyllata montana, Ital. Garofanata
 saluatica. Item hort. Caryophyllata alpina altera,
 à Pennæ floribus albis reperta, in monte Lupo
 Gallicæ. Tab. ic. & hist. Caryophyllata montana
 Berg Benedictæ nunt: / Berg Nâglinfraus:

Tom. II

GARYOPHYLLATA AQUATICA flore rubro striato.

Descriptio



Radice fi-
 brosa mi-
 nora, extrin-
 secus rubente
 nonnihil, intus
 alba, sapore
 adstringente,
 & subdulci, tã-
 dem caules
 profert multos
 interdum pau-
 cos, aliquando
 cubitales, sar-
 cotos, hirsutos,
 nonnihil ru-
 bentes: ramu-
 lorum summis
 subinde etiam
 prinatis pedi-
 culis, breui-
 bus, hirsutis,
 rubentibus,

nonnihil nutantibus floris insident, patuli, Alpi-
 næ floribus serè æquales, striati, non multum elat-
 ti, & supra calycem parum admodum se profe-
 rentes, extrâ purpurei intensius, intus dilutius,
 odore grato, ex foliis quinis, à tenui principio
 sensim in latum se diffundentibus, intra quorum
 septa apices multi, crocei, echinatum capitulum
 obuallant: insidet autem flos quasi calathio patulo
 rubente hirsuto, in quinque lacinias hirsutas, to-
 tidemque ligulas in lacinarum spatia distributas
 diuiso: folia Caryophyllatæ vulgaris foliorum
 formâ, sed longè maiora, alia à radice statim orta;
 alia in caulibus, pediculo sextantali, sapore cum
 radice compati.

Camer. in Epit. Matth. vbi noua figura, Caryo-
 phyllata aquatica. Item hort. Caryophyllata pa-
 lustris.

Hist. Lugd. Caryophyllata montana Dalech.
 radice inodorâ, satique gustus: foliis Caryo-
 phyllatæ similibus: flore luteo, lineis pluribus
 distincto. Aquosis locis gaudet. Quæ Dale-
 champii Caryophyllata, si non eadem cum no-
 stra, saltem erit illi valdè similis. C. Bauh. phyt.
 Caryophyllata 3. siue aquatica, nutante flore. I-
 tem Caryophyll. 4. siue aquatica 2. Et rursus, Ca-
 ryophyll. 5. siue montana Dalechampii. Adhæc
 Caryophyll. 7. siue alpina minor. Et tandem a-
 pud Matth. Caryophyllata aquatica.

Cam. in suo Matth. Caryophyllata 3. vel Geum
 aquaticum Gesnen Clusio, floribus pallidis, sub-

K x 99

Caryophyll.
montana.Geum aqua-
ticum.

purpureis, aliquando multiplicibus, magis in-
bentibus, aliquando sanguineis.

Clus. Pann. & in fol. Caryophyllata 1. siue al-
pina nutante flore, radice impensè adstringen-
te, odore inincundo: floribus quinque ut plu-
rimùm foliolis, nonnunquam senis, aut septen-
nis, suauiter rubentibus, constantibus. Item Ca-
ryophyllata 3. siue Geum aquaticum Gesneri:
cuius iconem suis coloribus depictam ipsi com-
municauit Pennæus, quam ex Gesneri depicto
herbario se desumpsisse fatetur. Flores huic sunt
sanguinei coloris, duum generum: nam alter
flos multiplici foliorum texturâ & serie constat,
alter simplici, vtriusque medium, quemadmo-
dum in aliis Caryophyllatis, occupante villosâ
congerie. Iconi suis adscriptum Geum aquati-
cum flore simplici & multiplici. Tabern. hist.

Herba fo-
medica filia

Caryophyllata 4. siue siluatica, Herba benedi-
cta filu. wild Benedicte wûrg & wild Garafel/
radice simili vulgari crassiore, minus fibrosa, o-
dore multò minore: foliis paruis similibus He-
deta terrestri, pilosioribus: caule cubitali, ro-
tundo: floribus pulchris plurius, rard pluribus,
quàm tribus in vno caule, sequitur floccus al-
bus. Prouenit copiosè in S. Petri silua inter S.
Remig. & Lâuserbürg, abundanter reperitur in
Brabantia prope Mechliniam in silua, non lon-
gè à domo aquatica Bûrgenstein. Radix habet
exsiccantem & adstringentem lapozem. Gesn.
hort. Geum 2. siuale, Caryophyllata & Benedi-
cta species. Trago Benedicte filu. Lob. & Penz
Adu. Septentrionalium rotundifolia papposo
flore Garyophyllata: radice non perinde Ga-
ryophyllum aut Nardum halante, ut vulgari:
flore speciosiore, & coliculo pallidiusculo. Quæ
descriptio non in omnibus placet, colorem e-
nim non tradit. Figura quæ alioqui satis bona,
exhibetur eodem etiam titulo, Icon. Pl. p. 694.

Geum riuale
Benedicta
filu.
Garyophyll
rotundifolia

Lob. m.

Locus
Tempus.

Florentem in horto mense Aprili & Maio, ex
montibus allatam Geneuz habui, semen decidit
mense Iunio. Crescit auctore Clus. mediâ ferè

Montium regione lacis vdiæ & rigis, sub arbo-
ribus. Floret isthic Iunio: in hortos translati
Maio, aliquando etiam maturius. In Brabantia
siluosis conterminis Mechliniæ, & in North-
mannia frequens, in Anglia verò plurima, teste
Lobelio.

GARYOPHYLLATA PENTAPHYLLATA

IN Rheticiis Alpibus non procul Clauenna, hanc
primum nacti, putauimus [arant Lob. & Penz]
na Adu. Jesse Tormentillæ, aut Pentaphylli spe-
ciem: verùm radix Geranii fibrosior, forisque
rubiginosa, paruum quid suauiter redolens, Ga-
ryophyllatam testatur. Quinetiam erigit caules
pedales, cui hærent folia quinque partita, amb-
tu serrata, Pentaphylli aut Tormentillæ, flore
luteolo pallentève, staminibus lanuginosis, cro-
ceis, papposis, minoribus Garyophyllato.

Lob. & Penz

Lob. & Penz Adu. & Ic. Pl. Alpina Pentaphyl-
la Garyophyllata. Cæterum, Lobelina prædi-
cto titulo duas diuersas proponit figuras: Præ-
quidem in Adu. pingitur, sine pilis, & tantum
cum foliis quinque: Posterior verò tota pilosa
& septifolia, quæ sanè effigies non male conue-
nire videtur cum Ranunculo nostro montano
albo, hirsuto.

Lob. & Penz

Tabern. Ic. & hist. Caryophyllata 3. siue alpina,
quinquefolia. Sed & Tabernæ figura longè
Lobelii diuersa, est enim tota glabra, licet ipsa
hirsutam esse scribat. Nos igitur propter figu-
rarum varietatem Lobelii & Tabernæ, non
proponimus. Casp. Bauh. phyt. Caryophyllata
8. siue Quinquefolia maior. Item Caryophyllata
9. siue alpina, quinquefolia minor, quæ foliis in-
quadruplò angustioribus quàm prior, totaque
minor & tenerior, in monte Fracto præce-
niens, cui Cast. Durant pag. 197. Caryophyllatam
montanam non absimilem pingat. Gerard. bot.
Angl. Caryophyllata montana alpina pentaphyl-
la.


Tabern.

Casp. Bauh.

FINIS LIBRI DECIMI SEPTIMI

HISTORIA





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER DECIMVS OCTAVVS.


FRUMENTACEA, GRAMINEA, HARVNDINEA, IVNCEA.

Perducta ad Colophonem Arborum, Fruticum, & Suffruticum historia, tempus est ut ad Herbarum historiam accedamus. Maximum hinc opus natura, Frumenta ordiemur, & cibos suos homini enarrabimus, saterique cogemus, ignota esse pleraque, per qua vivat. Fruges, inquam, Cereales, in cibos potius, quam in medicinam cedentes, non à Cerere, uti Poeta nugantur, reperta & exculta, sed ab ipso totius universi Creatore in ipso Mundi exordio productas: subinde gignente eas, & usibus assarum subministrante Tellure, lato præcipuis orbis regionibus proveniunt. Post Frumenta, & inter ea, & de Graminibus & si cogit Botanicus ordo. Quippe etiam Frumenta non sint, sunt tamen pecudi, quod frumentum homini. Adde quod plura eorum sunt Frumentacea. Sed & forma similitudo, & quod illorum quadam in hac abeant, inter illa de se dici postulant. Ex quid propius ad Gramina accedit, quam lunci & harundines. Ut & hinc venia sit hac illis adiacentibus, & equi stydiotum, ac Historia nostra compendio consulentibus.

TRITICVM VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. I.

Triticum genera Theophrasti plura. Ex locis, coloribus.



Radidimus priori libro, quæ de Leguminibus dicenda videbantur, nunc ad Frumentacea, quæ, teste Plinio, non eadem ubique, neque ubi eadem sunt, iisdem nominibus occurrunt, devenimus. Sunt autem ea,

quæcunque geniculato culmo, & arundinaceis constant foliis, semênque panificio, & pulitibus aptum in spiciis aut iubis producant. Horum quidem omnium quamplurimis terris commune, & nobilissimum est Triticum.

Ex viribus.

Huius (ut auctor est Theophr.) genera plura notantur, cognomina ex locis sortita, ut *Africanum, Ponticum, Thracicum, Assyrium, Aegyptium, Siculum*: quæ & colore & magnitudine, & specie, & proprietate inter se differunt. Quædam vel aliunde cognomina sortiuntur pro suis viribus, tum aliis, tum vel maximè, quæ ad cibum pertineant, ut *Canchrydias, Silengis Alexandrinus*. Nec verè abrefuerit, si illa quoque pro differentiis capies: & aliud præcox, aliud serum: & aliud aut amplum multumque reddens, aliud ieiunum quoddam parumque serens: & aliud spicam grandiore effundens, aliud parvam: & aliud diu in folliculo manens, aliud aptum brevi absolui, ut

Ex crescentia modo.

Africanum: & aliud culmo tenui constans, aliud *diversi* crasso: quod etiam ipsum *Africo* datum est. Cras. *habens*. so tamen & *Canchrydias* dictum consistit. Item aliud tunicis paucis, aliud multis vestitur, ut *Thractum*: & aliud *vnicalamum*, aliud *multica-* *Ex viribus*. lamum, & magis minusque. Adde etiam si quid aliud his, aut prædictis ratione virtutum proximum sit: eiusmodi namque differentiarum naturaliores profectò apparent, quibus trimestrium annumerari genus par est, & bimestrium, & si quid intra pauciores dies valeat consummari. Et in *Eubœa* genus quoddam intra quadraginta dies *cras-* sari, perficique posse affirmant, idemque firmum esse, ac ponderosum, nec modo trimestris leve: quamobrem famulis id præberi inquit, etenim nec multum in hoc fututis esse volunt. Igitur genus id celestimum quidem ad consummationem, sed inuenta rarissimum est. Et bimestria verò quædam habentur, quæ ex *Sicilia*, & in *Achaia* aduecta sunt: sed hæc paucum reddunt, parumque secunda habentur: quanquam cibo facilia, & iucunda sunt. Nascuntur & alia quædam genera in *Eubœa* & præcipue apud *Caristum*. Trimestria verò per multa, & ubique habentur: leuia hæc & parum secunda, & vnicalama sunt, atque in totum infirma.

Tom. II.

LI

Deleat.

Mira
gratudo.An
re
gratudo
genera
distenda.Celi
quali
tat, diuer
sitatem ge
nerat.

Plinius.

Genera
prima
dus.
Hyberna.
Aestiva.Sementia
Dal. quid.Triticum
Italicum.Baceticum
Sicilicum.
Africanum.
Thracium.
Syrinum.
Aegyptium.

Leuissimum igitur Triticum, quoad simplici ratione agere licet, Ponticum est: ponderosius ex his quae in Graeciam aduehi solent Siculum datur, sed eo ponderosius, quod Boeotia fert: quod inde asserunt, quod athletae, qui Boeotiae ternos semilextarios vix possint consumere, cum Athenis fuerint, facile quina consumunt: leue satis, & quod in Laconico agro conficitur. Horum igitur causa in terris, coeloque intelligi debet. Nam & Asia ultra Bactra quodam in loco, adeo grande frumentum fieri tradunt, ut nucleis Oliuae sua equiparent magnitudine grana singula. In Pithagoras autem dictis adeo firmum nasci affirmant, ut si quis plus comederis, disrumpatur necesse sit: & Macedonum ita plerisque interisse aiunt. Absurdum sane, & leuitati trimestrium absolum, quod in Pontico euenit: Verum enim durum admodum est: hybernium autem molle est: leuitate enim molle plurimum differt.

Reliquum est, ut propriae naturae causa detur, quam in pluribus differentias recipere magnas, cum in exortu, consummationeque, tum in propriis speciebus videmus, seu magnitudinis atque paruitatis & figurae. Adde copiam paleae, & incommoditatem ratione usus cibari hominum. Forsitan & genera regiones efficiunt, vel omnia, vel certe aliqua: assimilant enim sibi ipsis quodam modo, & aut differentiam aliquam generis pariunt, aut etiam minus vtile reddunt, ut Triticum Thracio euenit. Fit enim multis cum tunicis, seroque prouenit: quod utrumque vis sane frigoris facit. Quae de causa ceteris quoque agris, Thracium istud satum maturae, sero erumpit, ac augescit: & quod maturae apud alios seritur, sero apud alios exit. Consuetudo enim velut natura effecta est. Nam & quod in Asiatico agro Aepilyngangis vocato habet vim disrumpendi, quodque magnitudinis nuclei est, agri proprietate, naturaeque vires eiusmodi fortuitur: nec aliud translata seruari incommutabilia possunt. Nec minus locum habet in ceteris, si quis cum agro, coeli quoque adiciat qualitatem. Hinc enim fructuum diuersitates exstant, imo hinc sterilitates sequuntur, cum planta in alieno agro nequeat hospitari. Haec Theophrastus, quorum multa transcripsi videtur Plinius.

Frumenti ipsius, inquit, totidem duo ut frugum) prima sunt genera, per tempora satis diuisa. Hyberna, quae circa Vergiliarum occasum [No-uembrem] lata, terra per Hyemem nutriuntur, ut Triticum, Far, Hordeum. Aestiva quae Aestate [Maio] ante Vergiliarum exortum seruntur, ut Milium, Italiae duntaxat ritu. Alioquin in Graecia & Asia omnia Vergiliarum occasu seruntur. Quaedam autem utroque tempore in Italia. Ex his quaedam & tertio, Veris scilicet. Aliqui Verna, Milium &c. appellant. Sementia, autem Triticum &c. Et in Tritici genere pars aliqua pabuli est quadrupedum causa sati, ut Farrago. Sementia autem interpretatur Dalechamp. quae primo & postremo sementis tempore, nempe circa Vergiliarum occasum, quod Aestiu [sementem] ut ait Theophrastus, antonomastice Graecia vocauit, terre mandantur. Tritici, (pergit Plinius) genera plura, quae fecere Gentis. Italico nullum equidem comparauerim candore ac pondere, quo maxime discernitur: montanis modò comparatur Italiae agri externi, in quo principatum tenuit Boeotia, deinde Sicilia, mox Africa. Tertium pondus erat Thracio Syriacae, [deinde &] deinde Aegyptio, athletarum cum decreto, quorum capacitas iumentis similes, quem diximus ordinem fecerat. Graecia &

Ponticum laudauit, quod in Italiam non pertinet. Ex omni eadem genere grani praeuult [Carchyriam, Selengyn, & Alexandrium Theodracon, & Istelephant, & Selinusium CH.] Dracontiam, Strangiam & Selenusium, argumento crassissimi calami: ita pingui solo haec genera assignabat. Leuissimum & maxime inane, seu tenuissimum calami in humidis feri iubebat, quoniam multo egeret alimento. Haec fuisse sententia Alexandro Magno regnante, cum clarissima sit Graecia, atque in toto terrarum Orbe potentissima, ita tamen ut ante mortem eius annis fere 145. Sophocles Poeta in fabula Triptolemo frumentum Italicum ante cuncta laudauerit, ad verbum translata sententia.

Et fortunatam Italiam frumento [candido] candido.

Quae haec peculiaris hodieque Italico est. Quo magis admiror, posteros Graecorum nullam mentionem huius fecisse frumenti. Nunc ex his generibus quae Romam inuehantur, leuissimum est Gallicum, atque e Chersonelo aduectum: quippe non excedunt in modum vicienas libras [sic] quae granum ipsum pondere Turni. [sic] si quis granum ipsum ponderet. Adicit Sardana selibras, Alexandrinum & trientes: hoc & Siculi pondus. Boeotia cum totam libram addit. Africanum & dodrantes. In transpadana Italia scio vicienas quinas libras farris modios pendere: circa Clusium & (Senas Dal.) senas. Lex certa naturae, ut in quocunque genere pani militari tertia portio ad grani pondus accedat: sicut optimum frumentum esse, quod in subacta congiunt aqua capiat. Quibusdam generibus per se pondus, sicut Balearico: [quod modio Vet.] modo triuci panis pondo xxx (xxxv Dal.) reddit. Quibusdam in binis mistis, ut Cyprio & Alexandrino, xx. propè libras non excedentibus. Cyprium luscum est, panemque nigrum facit: itaque miscetur Alexandrinum candidum, redduntque xxv. pondo. Thebaicum libras adicit. Marina aqua subigi, quod plerique maritimis in locis faciunt occasione lucrandi salis, inutilissimum. Non alia de causa opportuniora morbis corpora existunt. Galliae & Hispaniae frumento in potum resoluta, quibus diximus generibus, spumata concreta pro fermento vtuntur. Quae de causa leuior illis, quam ceteris, panis est. Differentia est & calami. Crassior quippe melioris est generis. Plurimis tunicis Thracium tunicum vestitur, ob nimia frigora illi plagae exquisitum. Eadem causa & trimestria [et trimestre Dal.] inuenit, detinentibus terras niuib, quod tertio fere à satum mense & in reliquo orbe metitur. Totus hoc Alpibus notum, & hyemalibus prouinciis nullum hoc frumento laetius. Vnicalamum praeterea, nec usquam capax: feritque non nisi tenui terra. Est & bimestre circa Thracium finum quod quadragesimo die, quam satum est, maturarescit: mirumque, nulli frumento plus esse ponderis, & furfuribus carere. Vtitur eo & Sicilia & Achaia, montosis (montuosis CH.) utraque partibus Euboeae quoque circa Carystum. In tantum fallitur Columella, qui ne trimestris quidem proprium genus existimauerit esse, cum sit antiquissimum. Graeci trimenon vocabant. Tradunt in Balearis grana tanta magnitudinis feri, ut singula spicas nostras aequent.

Quod verò dixit Plinius: Est & bimestre &c. Theophrastus aliter habet. Scribit enim esse Tritici genus trimestre celerius matutescens, ut in Euboea quod intra quadraginta dies perficitur. Esse & trimestria, quae ex Sicilia in Achaia transportantur.

Plinius
Theophrastus

portantur. Est & eiusmodi in Euboea, maximè in Cerysto. Præterea à Theophr. dissidet, cum ait, Tradunt in Bactris grana tantà magnitudine fieri, ut singula spicas nostras æquent, cum Theophr. scribat, In Asia trans Bactra adeò grande gigni frumentum, ut nucleo Oluz par sit magnitu-

Nunc, eodem Plinio autore, frumenti genera, non eadem ubique (ut diximus) neque ubi eadem sunt, iisdem nominibus. Vulgariissima Far (Triticum muticà spicà secundum pentiotes) quod adorem Veteres appellauere, Siligo, Triticum. Hæc plurimis terris communia. Arinca Galliarum propria, copiosa & Italiz est. Aegypto autem ac Syria, Ciliciæque & Asiæ, ac Græciæ peculiare Zea, Olyra, Tiphe, Aegyptus Similaginem conficit à tritico suo, nequaquam Italica parem. Qui Zea vitatur, non habent Far. Ex omni genere durissimum Far, & contra hyemes firmissimum. Patitur frigidissimos locos, & minus subactos vel æstuosos, siccioresque. Primus antiquis Latio cibus, magis argumento in adorem domus, sicuti diximus. Pulce autem, non pane, viabile longo tempore Romanos manifestum, quoniam inde & pulmentaria hodiè dicuntur. Et Ennius antiquissimus vates obsidionis famem exprimens, ostam eripuisse plorantibus libens patres commemorat. Et hodie sacra prisca atque natalium pulce stilla (pulce stilla M. stilla ch.) conficiuntur: videnturque tam pulce ignota Græciæ fuisse, quam Italiz polenta. Tritici semine audius nullum est; nec quod plus alimenti trahit. Siliginem propriè dixerim Tritici delicias: candor est, & sine virtute, & sine pondere, conueniens humidis tractibus, quales Italiz sunt & Galliz comæ. Sed & trans Alpes in Allobrogum tantum Meninorumque agro pertinet, in cæteris ibi partibus biennio in triticum transit. Remedium ut grauissima quæque grana eius serantur.

Dioscorides duo duntaxat Tritici genera proponit: alterum recens, perfectè maturum, & colore luteo: alterum *requisitum*, id est Trimestre, quod ab aliquibus *entium* appellari dixit: hac voce etiam Trimestre significante. *Tritum* enim significat *τὸ τῆς τῆς τῆς*, id est, hoc ipso anno, quod Dores *τῆς τῆς τῆς* dicunt, unde *entium* *τῆς τῆς τῆς* est, ut exponit Galenus, *τῆς τῆς τῆς τῆς τῆς τῆς*, hoc est Triticum huius presentis anni, nempe vere satum.

Prima & vtilissima, inquit Columella, sunt hominibus frumenta Triticum, & semen adorem. Tritici genera complura, ait Columella, cognouimus. Verum ex his maximis ferendum est, quod Robus dicitur, quoniam & pondere, & nitore præstet. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua pondere deficitur. Tertium erit *trimestre*, cuius usus agricolis gratissimus. Nam ubi propter aquas aliamve causam matura satio est omissa, præsidium ab hoc petitur. Id genus est siliginis. Reliquæ tritici species, nisi si quos multiplex varietas frugum, & inanis delectat gloria, superuacua sunt. Adorj autem plerumque vidimus in usu genera quatuor, Far, quod appellatur *Clusinum* candoris nitidi. Far, quod vocatur *Venniculum* rutilum, atque alterum candidum, sed utrumque maioris ponderis, quam clusinum. Semen trimestre, quod dicitur *Halicastrum*, idque pondere, & bonitate est præcipuum.

Spica, autore Varrone, quæ mutica non est, in tritico & ordeo tria habet continendia. *Granum*,

glumam, *aristam*, & etiam primitus spica cum ori-
tur *Vaginam*. *Granum* dictum, quod est intumum
solidum. *Gluma*, qui est folliculus eius. *Arista*, quæ
ut acus tenuis longa eminet è gluma. Proinde ut
grani theca sit gluma, & apex arista. Arista &
Granum omnibus fere notum, gluma paucis. Ita-
que id apud Ennium solum scriptum scio esse
in Eumeri libris versis, videtur vocabulum e-
cymon habere à glubendo, quod eo folliculo de-
glubitur granum. Itaque eodem vocabulo ap-
pellant fici eius, quam edimus, folliculum. Ari-
sta dicta, quod areleat prima; granum à gerendo,
id enim sentur, ut spica gerat frumentum, non
ut glumam, aut aristam gerat, ut Vitis feritur, non
ut pampinum ferat, sed uiam. Spica autem quam
cultici, ut acceperunt antiquitus, vocant *spicam*, *spica*
& à *spe* videtur nominata. Eam enim quod spe-
rant fore ferunt. *Spica mutica* dicitur, quæ non
habet aristam. Arista enim quasi cornua sunt
spicarum quæ primitus cum oriuntur, neque pla-
nè apparent, in qua sublatent herba, ea vocatur
vagina, uti qua latet conditus *gladius*. Illud au-
tem summa in spica iam matura, quod est minus
quam granum, vocatur *Fris*, quod in infima spi-
ca ad culmum stramenti summum, item minus
quàm granum est, appellatur *Vitruvium*.

Hermolaus partem ex aliis, partem ex sua ob-
seruatione hæc habet. Triticum & sativum & sil-
uestre, cultu annorum trium mitescit. Degene-
rare Triticum in Hordeum, ex eodemque nasci
pede utrumque fabulosum existimatur à Theo-
phrast. Triticum multis integitur tunicis: ei
culmus altior quam Hordeo: spica quoque re-
motior à folio, palea suauior, mollior, succosior
spicæ verò inconditæ explanatæque. Culmus
spicam sustinet, quæ & *spica* & *spicula* à Cicerone
dicitur in Arato: spica, granum & Arista, quæ
ut acus eminet è folliculo siue gluma. Sunt por-
rò Ariste partes in spica primæ, quæ à Græcis *an-
therices* dicuntur, & *atheres*. *Stipula* sunt folia
culmum ambientia: est autem *culmus*, idem quod
& calamus. Quod minus est, quam granum, vo-
catur *Fris*: quod verò ad culmi cacumina in firma
spica geritur, minus item quam granum, *Vitruvium*
appellatur. In Tritico marcescente gurguliones
gigni, ut etiam Cantharidem constat. Tritici
multa discrimina: Sitanium vocatur, genus id Si-
liginis trimestre, frumentago dictum Theodoro,
differens crassitudine furculorum. In nomine
sunt *Assyrium*, *Aegyptium*, *Ponticum*, *Thracium*, *Sicu-
lum*, *Africum* quod faciliè absoluitur folliculo:
Thracium verò multas habet tunicas. Habetur
& cachrys, siue canchrys, culmo crasso, quod et-
iam Africo tribuitur. Ponticum leuissimum, Sicu-
lum ponderosum, ponderosius *Bæotium*. Ponti-
cum & Aegyptium sine Lolio nascuntur, item Si-
culum, præcipuè Agrigentinum. Cum Siculo
melampyron nasci perhibent alii, sed innocuum
neque Lolii modo graue, cuspide tentans. No-
minatim & Alexandrinum, oblongo semine,
quod fortasse idem cum Aegypto, & Calymno.
Dracontias & Selenusium, & Selengias crasso
cuncta calamo. Iam aliud trimestre, aliud bime-
stre. Sitanium idem esse video cum trimestri, si-
tium Doricè vocatum, & Atticè titinon, quasi
purum. In truculento Plauti Etanio pro Setanio
legitur mendosè. Euboicum intra diem quadra-
gelimum à satu metitur, firmitate ac pondere
præcipuum, non ut trimestri leuitas, ob id cibario
pani vtile: nam & furfuris parum habet, inueni-
ti rarum. Bimestria in Achaiam è Sicilia primùm
venire, parum secunda, sed cibo facilia & su-

cunda. Olynthi & in Eubœa apud Cerinthum
genus effoditur terræ, quâ triticum oblinentes,
diuid servant. Trimestria vbiq; sunt, verum
inutilia, & infirma singulari calamo. In Asia
quodam loco trans Bactra frumentum nucleis
Oliuæ par nasci referunt. In Pissotis tam firmum,
vt multos Macedonum largiore vsos ex saties
peremerit. Omni frumento nocent imbres in
flore. Item iam planè crassato, triticum plus
quàm hordeum vligine commeat in Lolium. Ca-
matias in Thessalia Tritici genus est, quod admis-
so pecore nihil patitur, etiam bis derosum. Præ-
ter lapinum nihil æque in spica durat quàm Tri-
ticum.

*Camatias
triticus ge-
nus*

Ruellius

Ruellius qui suam historiam ex Theophrasto
& Varrone, Columella & Plinio, Galeno & Her-
mollao congeffit, ait speciatim vnum apud Gallos
tritissimum esse genus, macrum, triste, Hordei
similitudine, cuius granum folliculo non facile
deglubatur, nullis tamen aristis vallatum, quod
Vere non seratur. Sermone vernaculo, *Succur-
sus gentium*, siue *Scurge* dici, cuius agricolis vsus
propè nimis cum annonæ pramat penuria. Di-
cit adhuc, Trimestre, quod Græci Trimenon, vel
Sitaniū, vocent, totis Alpibus notum esse, &
hyemalibus pronunciis, nullum hoc letius. Vni-
calamum præterea Gallos *Martia* vocare, quod
Martio scilicet tertio hinc mense maturescat.

Martia

Cordi

Cordi verba haudquaquam negligenda duci-
mus, præsertim quod videantur ad dicta Veterū
intelligenda non nihil facere. Ea autem sunt hæc:

*Robus Sil-
go.*

Sunt Tritici species, *Robus* & *Siligo*. *Robus* voca-
tur densius, solidius, & ponderosius. *Siligo* ra-
rius, & tenuius pondere: sed candidius Triticum.

*Semestre,
Trimestre
Hyemate.
Æstiuum.*

Est & alia Tritici distinctio: *Semestre* & *Trimestre*:
illud ante hyemem, hoc verò initio Veris serit-
ur, quare alterum *Winterweize*, id est hyemale
Triticum: alterum *Sommerweize*, id est Æstiu-
um Triticum, Germani vocant. An verò idem
sit Robus cum semestri, neque negare, neque af-
firmare ausimus. Credimus tamen, haud sine
causa, non differre Robum à semestri, nam à Se-
mestri non distinguunt id Anthores, neque Co-
lumella cum species Tritici recenset, Semestris
meminit, sed Robi, quasi idem cum eo crediderit
& ipse. Quemadmodum quoque Robus Siligini
præfertur pondere & magnitudine, ita etiam Se-
mestre Trimestri, quod & Sitaniū dicitur, & Si-
liginis species existit.

Siligo.

*Triticum
Germania
triplex,
Vidgo.*

Tragus triplex Germaniæ Tritici genus descri-
bit, quorum primum *hybernū* censet, alterum æ-
stiuū dicit, tertium *non vulgare*, nec vbiq; no-
tum scribit, de quibus separatim tractabimus.
Constat, inquit, Triticum omnium frugum ferti-
lissimum esse, siquidem culturā suā minimè desti-
tuatur. Legimus enim, vno ex grano Tritici tri-
ginta aut quadraginta quandoque spicatos cul-
mos exiuisse. Sed hanc fertilitatem terræ bonita-
ti & culturæ diligenti ego adscripserim. Huc ni-
mirum respexit Seruator noster Iesus Christus,
cū in parabola ad populum, sementem quæ in
bonam terram cecidisset, aliam, quidem tenui-
plum, aliam verò sexageuplum, aliam denique
trigecuplum fecisse fructum dicit. De Thracio
Tritico Plinius peculiariter meminit, quod illud à
satione quadragesimo die maturetur. Sed hæc Pla-
nius ipse non vidit, ac potius legit in Veterum
scriptis, tum aliorum, tum præsertim Theophras-
ti, quilibet. 9. Hist. plant. cap. 3. in Mela sata intra
triginta, aut quadraginta dies meti scribit, rursus
verò in Chalcia Rhodiorum Insula locum quen-
dam esse aded præcoquem & fertilem: vt hor-

*Vernaculus
terra boni
satis cul-
tura ad-
scribenda*

Plinius

deum satiuum in eo, cū in aliis sereretur locis,
meteretur, &c. Hæc verò quæ tam à Plinio,
quàm Theophrasto, prædicantur, credere, quàm
experiri malimus. Nostrum certè Triticum hy-
bernū, nouem mensibus in agris moratur, quod
non solum omnes norunt agricolæ, sed & Plinius
& Varro testati sunt. Aegyptii septimo à satione
mense fruges suas horreis committunt, vnde fru-
menta illorum iurè Septimestria dici possent, at-
qui talis fertilitas nostro solo negata est. Idem de
Sitaniū quod nostri *Amelhorn* nuncupant tu-
dicium est. Hoc quia tertio postquam satum fue-
rat mense, horreis apud alias Nationes recondi-
fertur Trimestre Dioscoridi nominatur. Apud
nos quinto demum mense maturatur, vt omnes
norunt. Tanto intervallo fruges alio atque alio
solo procreant inter se distant, vt vel hinc appa-
reat, suum cuique frumento tempus in singulis
regionibus deputatum, frugisque pro diuersitate
terræ alio atque alio gaudere cælo.

Fuchsius quoque tria summa genera Tritici
eos obseruare dicit, qui frumentariæ rei periti
sint. *Primum* quod Robus, Germanis simplici-
ter *Weizen* nominetur. *Secundum* quod Trime-
stre & nonnullis Sitaniū, Germanis *Amelhorn*
dicatur, haud dubiè non aliâ ratione, nisi quod ex
hoc genere Tritici amyllum optimum conficiatur,
Tertium, quod non vndiquaque notum. Atque
alterum non differre à primo, nisi quod spicam
multis aristis vallatam, & in duos versus disposi-
tam obtineat. Sed consideratione dignum, an
Triticum Setaniū à primo differat tantum aris-
tis: Montbelgardi enim obseruo in agris nostris
vulgare triticum spica mutica & aristis vallatum:
si intelligit idem Triticum cum *Amelhorn* Hist.
Tragi, quod suspicor, is plurimum fallitur, hoc e-
nim est ex genere *Zæ*. Manus non separatur, ni-
si per Molendinum, de quo sub titulo *Zæ* Ver-
naz.

*Pachy-
saria
Robus.
Trimestre*

*Fuch. re-
dact.*

Dodonæus triplex quoque Tritici genus tradit,
Robum Columellæ, *Siliginem* Plinii, & *Setaniū*,
quod Trimestre vocant.

*Pachy-
saria
triplex Di-
dona.*

Triticum aliter ex Dalechampii sententia, qui
sua Veteribus accommodare studet, Hist. Lugdu-
nensis diuidit, vt eius duo summa sint genera vsu
frequentiora. Vnum *candidum*, vulgè *Gallis Blé
blanc* nuncupatum: alterum *rufum*, Veterum *noirs*,
quasi *noir*, vulgè *Blé rouge*, Columellæ Robus à
flauo colore quem Rubrum primâ syllabâ pro-
ductâ, & Rubrum Veteres appellauit, Græci
ῥυβρόν, vnde Seruio Nitedula, rufus agrestis robeus,
& in illud Vergilii, *Sanguineis fronte moris*, &c.
Robeus color Diis attributus, & in Veteri inscrip-
tione, vt Prætor cui hæc regio sorti obuenerit,
litaturum se sciat, aliūne quis magistratus, Volca-
nalibus x. Cal. Septemb. omnibus annis, vitulo
robo, & verre. Rursus Tritici candidi rufique
duæ sunt Gallis notæ species. *Præcipuus* spica aris-
tis habet, altera cuius spica mutica est, id est aris-
tis caret, auctore Varrone. Priorem nulla pe-
culiari appellatione Galli designarunt: posterio-
rem *Blé mouet* vocant, quasi Triticum muticam.
Quod autem spica aristis vallata sit, vel iisdem
careat, quidam frugis & naturæ proprietati, qui-
dam agri conditioni macri, pinguis, tenuis, crassi,
stercorati, minimè laticati tribuunt. Triticum
enim candidum aiunt in pingui, crasso & sterco-
rato agro spicam muticam ferre, in magro, tenui,
& non laticato aristis horridam. Adiciunt qui-
dam cæli statum quo seges adolescit: humidior
etenim spicam aristis carere, sicciore aristis muni-
ri. Addunt alii & ventorum status, quoniam si ve-
hementio-

*H. Lugd.
sua Veteri-
bus accom-
modat.
Blé blanc.
Blé rouge.*

*Robus
color*

Blé mouet

hementiores intrant, aristas decutiunt: si leniores spirauerint, aristas spicarum collisu non frangunt. Sunt & qui segetis densitatem raritatemque nonnihil ad id valere putant. Nam densiore segete, spicas muticas, rariore, cum aristis prodice. Ex candido Triticum panem lautiores, quam ex rufo pistorum fieri asserunt, sed leuiorem, & qui minus alat: atque in hoc genere muticum aristato præferunt, etiam si mutici granum gracilius sit, & minus: plus enim farina à mutico reddi, & furfuris parum: farina verò minus ab aristato, & furfuris plurimum. Præterea mutici farinam candidissimam esse, ac niueam, aristati nigriorem, ac sordidiorum. Candidum Triticum, Latinorum Siliginem stugem esse, Veterum scriptorum testimoniis confirmari potest, qui Siliginem Triticum genus faciunt, & ut Triticum nostrum candidum, candore ac leuitate ceteris generibus præstare literis prodiderunt.

Siligo.

Cornarius
genera
triticum.

Duo Triticum genera celebrant Cornarius. Et prius quidem (quod Columella Robum) tum simpliciter weizen (Triticum) tum winterweizen (Triticum hyemale) postea (quod Columella Trimestre, *trimestre* Diosc. Trimenon Plinius dicat, Aestiuale) Sommerweizen vocat, sicut etiam reliqua frumenti genera iuxta seminationis rationem, winter & Sommergetreide (Hyemalia, & Aestiuaria frumenta, appellat. Potest, inquit, Setarium (Trimestre) Triticum barnum dici, quum vere seminatum,estate metatur: Columella Robum probat, quo Autore, nullum (sicut multi credunt) natura trimestre semen datur. Quod quidem Columellæ dictum reprehendit Plinius. Sed non videtur satis considerasse id, quod Columella subiungit, Sed sunt nihilominus quædam alia potiora, quæ sustinent veris tepores &c. Tercium Triticum genus ignotum & neglectum arbitratur, eò quod Columella dixeris, species eius in pane præcipue, pondere defici. Et repetierit cap. 9.

Trimestre
semen
natura
datur.Triticum
natura
fertilis.

Nec nos tanquam oprabilis fallat Siligo.

Triticum nihil est fertilius: hoc ei natura tribuit, quoniam eo maxime alat hominem: utpote cum è medio, si sit aptum solum, quale in Byzacio Asiae campo, centeni, quinquageni modii reddantur. Misit ex eo loco Diuus Augustus Procuratorem ex vno grano (vix credibile dictu) quadraginta paucis modis germina, extantque de ea re epistolæ. Misit & Neroni similiter cccxlii stropulas ex vno grano. Cum centesimo quidem & Leontini Siciliæ campi fundunt, alique, & tota Boetica & impetrinis Aegyptus. Fertilissima Triticum genera, ramosum, aut quod centigranum vocant. Ceterum, ob summam Triticum in Asia fertilitatem, Imperatores Romani, attestante Virgilio, qui ei Prouinciæ præfuerant, aut in ea res gesserant, Africam signabant capite obuoluto pelle elephantis capiti detracta cum promulsce, adiecta spica & subdito aratro cum cultro. Sed & ea soli fertilitas Siculos ad omne deliciarum genus sic effudit, ut omnibus voluptatum generibus præter modum addicti forent ac dissoluti. Hinc Platoni Siculæ mentis, ut & Italici, & Thesaliæ, lauiustimæ ac maxime opiparæ, quemadmodum & Asiæ. Macrobius. 7. Saturnal. Modum eum seruat, qui sui potens est, & in mensa Sicula, vel Asiatica. Brod. c. 34. lib. 5.

Nomina
in guaris

Græcis *trige* vocatur, quasi *trige*, pto *trige*, à *tr* & *trige*, secundum Etymologicum. Hebræis *Chittab*, vel *Chintab*, Columellæ Robus, si Trago credimus. Arab. *Henta*, *henta*, *hanta*. Germ. *weyzen* / Alsatis, Born. Belg. *Jerwe*. Angli. *weat*.

Tom. II.

Ital. *fourmento* & *Grano*. Hisp. *Trigo*, Gallis generis vocabulum speciei tribuentibus, *Froument*, voce ex frumento Latino deflecta. Sed frumentum apud Latinos Triticum latius patet. Hinc plerique etiam *far* frumentum appellant. Hung. dicitur *Buza*, Boh. *psenice*. Significat verò Triticum generaliter omne frumentum quod ex spicis tritum, ac trituratione repurgatum est: in quo significato, ait Dodenzus, Iurisconsultus nonnunquam hac voce utitur, ut si de verb. obligat. propriè tamen idem cum eo est, quod Græcis *trige* est.

Locus, et
pus, satio,
cultura, &
id genus
alia.

Solo pluuio atque frigido semina conueniunt ad Triticum sicut & ceterorum frumentorum fructificationem, quod aperta & rara substantia sunt: soluta enim hæc sunt. Verum (ut simplicius agam inquit Theophr. de caus. plant. lib. 3. cap. 26.) Solum pingue Triticum accommodatius est, largius enim callosiusque alimentum exposcit. Triticum trimestre solo tenui melius fit. Alimentum enim subministrari modicum eo potest, hoc est leue leui. Africum & Dracontias appellatum, & Strangias, & Selenusium, latum exigunt agrum. Hæc enim vberius succos hauriunt. Argumento calamus est, quem crassum gerunt. Ad summam, quodcunque huiusmodi sit, solo frugali aptè committitur. At si aliquod genus tunicis multis contegitur, ceu Thracium, hoc solo hyberno conuenientius dabitur, frigus enim huic nihil efficere potest. Rarum, solutumque, ceu Canchrydias vocatum, agro pluuio ferendum profectò est, quippe cum alimenti copiam id quoque desideret: quamobrem & culmo crasso exurgit. Et in ceteris verò semper ad alimentum referenda ratio est: nunquam tamen ratione aeris prætermissa, etenim solum apricum & ad summam serenum, infirmioribus commodius est: contrarium validioribus, lutosum siccis & parum alimento contentis. Sic Triticum solo pluuio vberius quàm hordeum geritur, & omnino contra imbres validius est: fert idem etiam solo non stercoreato copiosius. Ratio, quod suo naturali colore plenius concoquere possit, & si num non æquæ requirat, quoniam in se habeat quod ex humo acquiratur. Ad summam, Triticum robustius est, & maturius feritur, & locis frigidis magis committitur. Robur autem facere, caloris planè interest naturalis. Quin & quod tunicis inuolutum pluribus sit, sit ut tutius maneat: quapropter solum, quod longo intervallo temporis cohitur, Triticum magis quàm hordeum fert, Triticum enim alimentum eius soli validius magis vincere potest. Omnino [ut simplici ratione dicam] publicæ ac summæ differentie illæ sunt, ægri natura, seminum firmitas, infirmitasque, atque aeris habitus: qua de causa hæc considerari ubique necessarium. Frigora subsecuta omnibus in locis utilia sunt: sic enim sata plenius radicantur, canchrificanturque ita, ut intente vere laudat quaquam modica magnitudine careant, sed præcipue in bonis. Austrinum enim atque omnino ferentem tempus celeriter edit, æruginemque fortificat. Quæ dense fuerint seminata, spicam prius effundunt, quàm quæ rarerent, quod altera largius radicentur, & multiplicius deorsum scindantur, quia locus superfluit, altera protinus sursum excurrant. Triticum atque reliquis, quæ spicæ pusillæ, infirmæque sunt, anceps satio datur. Sunt enim in singulis generibus alia præcocia, alia setotina. Quamobrem alia properant, alia differunt. Triticum enim quod hyeme feritur, quia numerosa radice sit, virisque suas ad se rapit.

L. I.

dicandum primum intendat, multitudinem culmi educit, est enim multicalamum: trimeſtre contra paucis radicibus, paucisque culmis conſiſtit, qua de cauſa ſurſum continuò nititur, atque celeriter conſummat: quod enim minus eſt, perfici facilis poteſt. Hinc etiam alterum large fruſcat, alterum parce: & alterum facile, alterum graue eſt. [vt antè iam diximus] cum plus alimentu, & turbulentius trahat. Excruſus quoque ratione properè agitur, cum in condendis radicibus haud multum teratur temporis, vt pote paucis. Qualitas quoque temporis plurimum ſauet, nam & radicolum illud, ſi eo tempore obſeratur, velocius enaſcetur, & in culmos ſpargetur pauciores, & ſpicam paruam, atque paucis fertilem geret: & trimeſtre, ſi maturè ſeratur, frigus tolerare non poterit ſua cauſa imbecillitatis. Sed mirum, atque diuerſum eueniet, ſi quod tempore breuiori conſicitur, graue, ſaſtigioſumque ſit: vt Aenienſes de eo referunt, cuius cura æquinoctio delegata eſt.

Tritici in ſingulis m- geribus quantum ſerendum.

Catonis apud Plinium ſententia eſt, in agro ſiccò & non herboſo, nec ymbroſo Triticum ſeri. Non tranſferendum eſt ex frigidis locis ſemen in calida, neque ex præcocibus in ſerotina: idque in contrarium præcepere quidam falſa diligentia. Serere in iugera temperati ſoli iuſtum eſt Tritici aut Siliginis modios quinque. Farris aut Seminis (quod frumenti genus Plinius ita appellat) decè. Eſt & alia diſtinctio. In denſo, aut cretoſo, aut v- liginolo ſolo, Tritici aut Siliginis modios ſex: in ſoluta terra nuda, & ſicca, & lata, quatuor. Ma- cies enim ſoli maior, niſi rariſſimum culmum habeat, ſpicam minutam facit & inanem. Pinguia arua ex vna ſeminis radice fruticem numeroſum fundunt, & ſamque ſegetem è raro ſemine emittunt. Ergo inter quatuor & ſex modios pro natura ſoli, alii quinque non minus ſeri, plures præcipiunt: item in conſito, aut cliuoſo, vt in macro. Huc pertinet oraculum illud magnoperè cuſtodiendū, ſegetem ne defruges. Adiecit iis Accius in Praxi- dico, vt ſeretur, cum Luna eſſet in Aricte, Ge- minis, Leone, Libra, Aquario. Zoroaſtres Sole xii. partes Scorpionis tranſgreſſo, cum eſſet in Tauro, Sequitur huc delata & maximè indi- gens cura de tempore fruges ſerendi quaſtio, ma- gnaque ex parte ratione ſiderum cōnexa. Quam- obrem ſententias omnium, in primis ad in perti- nentes, exponemus. Heſiodus, qui princeps om- nium de agricultura præcepit, vnum tempus ſe- tendi tradidit à Vergiliarum occaſu. Scribebat e- nim in Boeotia Helladis, vbi ita ſeri diximus. In- ter diligentiffimos conuenit, vt in alicui quadru- pedumque genitura, eſſe quodam ad conceptū impetus & terræ. Hos Græci ita definiunt, cum ſit calida & humida. Virgilius Triticum & far à Vergiliarum occaſu ſeri iubet: Quo ſit, vt horum ſiderum aliorumque exortus & occaſus digerendi ſint in ſuos dies. Sunt qui & ante Vergiliarum occaſum ſeri iubeant, duntaxat in arida terra, ca- lidiſque prouinciis. Cuſtodi enim ſemen corrū- pente humore, & à proximo imbre vno die erū- pere. Alii ſtatim ab occaſu Vergiliarum ſequi im- bres, à ſeptimo ſerè die. Aliqui in frigidis ab æ- quinoctio Autumni in calidis ſerids, ne ante hye- mem luxurient. Inter omnes autem conuenit cir- ca brumam ſerendum non eſſe magno argumen- to: quoniam hyberna ſemina, cum ante brumam nata ſint [ſata ſunt M.] ſeptimo die erumpant: ſi poſt brumam, vix xl. Sunt qui properent, atque ita pronuncient, *ſeſtinatam ſementem ſape decipere, ſeratinam ſemper. E contrario alii, vel quæ poſius ſe-*

rendum, quàm malè in Autumno. Atque vbi ſerit necesse, inter Fauonium [Spirare incipit circa 7. aut 8. Februarii. Lugdunenſes vocant, *Le nouer ſneiller*, quod arborum ſolia eliciat.] & vernum æ- quinoctium. Quidam omiſſa cœleſti cura, vt inu- tili, temporibus definiunt. In Græcia & Aſia frumenta omnia Vergiliarum occaſu ſeruntur. Quædam autem vtroque tempore in Italia. Ex his quædam & tertio, Veniſcilicet: Varro qualiter nouenis diebus fruges abſolui tradit, & menſe nono meti. Frumenta cum deſlorere, craſſeſcunt, maturanturque. In Aegypto ſeptimo à ſatu men- ſe frumenta metuntur.

Triticum erumpit die plurimum ſeptimo, craſ- ſeſcit autem, inquit Theophraſt. maturaturque in- tra quadrageſimum, quum tardiffimè octauo ab ſatu menſe plurimè parte metatur, Aegyptiis, vt aiunt, ſeptimo. Varro quindecim diebus in va- ginis eſſe dicit, quindecim florere, & quindecim areſcere. Triticum pergit Plinius, quo ſerids meritur, copioſius inuenitur: quo celerius verò, hoc ſpecioſius ac robuſtius. Lex aptiſſima, ante- quam granum indureſcat, & cum iam traxerit co- lorè. Oraculum verò biduo celerius meſſe ſacere potiùs, quàm biduo ſerids. Siliginis & Tritici etià ratio in area horreoque. Far quia diſſiculter ex- cutitur, conuenit cum palea ſua condi: & ſtipula tantum, & artiſtis liberatur.

Sed de mutatione Tritici in formam alienige- nam, in Lolium, & vice verſa, & ex ſemine in A- uenam, mirandum ſanè eſt. Aqua Tritico flo- renti obeſt. Vermem maximè etiam ſentit in ra- dice, ea nimirum humefacta. Euenit verò vt Tri- ticum beſtiolas ita gignat, quia dulcius eſt: qua de cauſa palea quoque huius ſuauior. Vermis ge- neratus in eo, vbi alimentum aſſumpſit, quod in culmo eſt, ſpicam aggreditur, & vel totam erodit, vel alteram partem.

Ærugo, quamuis frumentorum commune vitium ſit, tamen magis infeſtat Triticum, quod tunicis integitur pluribus, & ſolum ſpicæ gerit proxi- mius, vnde frugem ſuam effundit: reſidet enim in eo humor putrefactus, qui æruginem creat. Ad- de quod ſpicam gerat erectam, denſioremque. hinc enim humor minus poteſt deſſuere: qua de cauſa ſpicam aliquantulum inclinari melius eſt.

Triticum perit ex nimio ſtercore, ſi non im- bres ſecuti ſunt. Quocirca ſolo pluuio, crebra & largior ſtercoratio commodior eſt. Siticulolis at- que gracilibus modica prodeſt. Hyeme ſicca & ſuda, Vere pluuioſo & humido ſecundam ſe- getem eſſe monſtrat hoc carmen veteris Poetæ a- pud Feſtum.

Hybernopulnere, Verno luſo, grandia farræ Ca- mille meret.

Exprefſit & Virgilius hanc ſententiam his ver- ſibus,

*—byberno latiffima pulnere farræ,
Latus ager, nullo tantum ſe Maſſa cultu
laſcat, & ipſa ſuas mirantur Gargara meſſes.*

Triticum non penitus exſiccari patitur, quod ad reddendam ſarinam melius minus arefactum pu- tatur. Qua de cauſa in acervos componi aſſolet: videtur enim in acervo craſſeſcere potiùs, quàm attenuari. Triticum puluerulentum putreſcit ce- lerius: & quod in domiciliis opere tectorio leui- gatis conditum: quoniam id caloris plus ſentiat. Pulvis enim calidus eſt, vt pote ſiccus, vt illimen- tum calcis calorem ſulceptum vtique ſeruat. Nam & cum vniuerſum, altumque acervatum eſt, pu- tret: ſic enim plus caloris exoritur. Triticum magis Hordeo & leguminibus doget, quia calidius eſt

Tempus

Tritici modus ſerendi.

Ærugo.

Calura.

Farina ſe- getis indicium

Triticum quando ſerendum

Triticum ubi ſerendum

Doget.

est, & tunicis pluribus tegitur. Triticum in spica nondum mellum durare maximè potest. Conne-
xa est ratio, ut nobis, autor est Plinius, frumenti
seruandi. Horrea operosa tripedali crassitudine,
pariete lateritio, exedificari iubent aliqui. Præ-
terea superne impleri, nec afflatus admittere, aut
fenestras habere vllas. Alii ab exortu tantum æ-
stiuo, aut Septentrione, eaque sine calce construi,
quoniam sic frumento inimicissima. Alibi contra
suspendunt granaria lignea columnis, & perflari
vndique malunt, atque etiam à fundo. Alii omni-
no pendente tabulato extenuari granum arbi-
trantur: & si tegulis subiaceat conferuiscere. Mul-
ti ventilari quoque vetant. Curculionem enim
non descendere infra quatuor digitos, nec am-
plius periclitari. Columella & Fauonium ven-
tum conferre frumento præcipit: quod miror e-
quidem, siccissimum alioqui [sicissimum Vet. sic-
cissimum locum querenti Dal.] Sunt qui subeta-
rana in limine horrei pede è longioribus suspen-
sa, inuehere iubeant. Nobis referre plurimum
tempestiuitas condendi videbitur. Nam si parum
tostum atque robustum collectum sit, aut cali-
dum conditum: inimica innasce necesse est. Diu-
tinitatis causæ plures. Aut in ipsius grani co-
ritio, cum est numerosius, aut succi pinguedine,
qui pro humore sufficit tantum, aut amaritudine.
In tritico maximè crescunt animalia, quoniam
spissitate sua concalescit, & fursure crasso vestitur.
Quidam ipsum Triticum diuturnitatis gratia a-
spargunt amurca, in ille modios quadrantal. Alii
Chalcidica, aut Carica Creta, aut etiam Ablin-
thio. Eadem Olynthi, ac Cerinthe Eubœæ terra,
quæ corrumpi non sinat. Nec ferè condita in spi-
ca læduntur. Vtilissimè tamen seruantur, in scro-
bis, quos siros vocant, ut in Cappadocia, & in
Thracia. In Hispania & Africa, ante omnia ut sic-
co solo fiant curant: mox ut palea substernatur.
Præterea cum spica sua conduntur [condantur
Dal.] ita frumenta, si nullus spiritus penetret, cer-
tum est nihil maleficum nasci. Varro autor est,
sic conditum Triticum durare annis quinquagin-
ta.

Ratio rei
seruandi
frumentum
in multis
annis.

Horreum locumve Tritico destinatus, aqua salsa
ante omnia conspergitur, scopisque optimè ex-
terius siccator, sic enim Tritici conseruationi ma-
gis erit idoneus, Orobri repositum Ianuario a-
gitetur nouilunio: Idem fiat mense Martio ter-
tribus postremis septimanis. Aprili quoque, sed
semel tantum in nouilunio. Toto Maio intactum
relinquatur. Sequentibus verò mensibus reli-
quis singulis semel tantum, idque sicut antea in
Nouilunio & Sole feruente ventiletur. Quod si
fortè vermiculi & gurguliones generentur, asper-
so tale, betulaque scoparum furculis siccis im-
positis arcebis: sic frumentum ab horreorum stipa-
toribus atque æconomis celebris Monasterii
Massouienfis in Sunchouia frumenti feracissima
in plureis annos conseruari solet. Cdm versare-
mur in Ducatu VVirtembergensi in pago Wolffe-
schlügen Nürtingensis præfecturæ hoc literis
mandatum inuenimus. Anno 1599. Maii mensis
25. die, tam srua, violentaque tempestas coorta
est cum horribili procella ventorumque turbine,
& tremenda nubis fecundissimæ ruptura, nim-
borumque effusione, tantaque grandine, ut cul-
mos frumentaceos in aruis ferè omnes grandine
comminuere: ritumque strauerit. Interea tamen
clementissimus Deus suam illà paternam benedi-
ctione rursum dexter affuit, ut frumentacei culmi ab
ima usque radice, maiori quàm prius, cum ari-
sterum copia, nullaque interueniente satione, de

Tom. II.

novo progerminauerint, tantoque vberior suc-
cessit frugum prouentus, quando maior calami-
tas agros prius attingerat, agros enim nouales,
requiescentis planè præ se ferro videbantur. Hanc
igitur tempestatem tanta messis subsequuta fuit,
ut post nouenas septimanas tam diræ grandini
succedentes, optimas fruges in horrea coegerint,
idque non illic solum, sed aliis passim in locis
pluribus illius tractus aruis contigisse certum est.

Optima porro è Tritici generibus ad secundæ
valetudinis usum habentur, inquit Dioscorides,
quæ recentia & perfectè adulta colorem luteum
referunt: hæc sequuntur trimestria, quæ non-
nullis Sitania nominantur. Itaque cruda illa in
cibo sumpta teretes lumbricos gignunt: com-
manducata verò & imposita cominorosis à rabioso
cane auxiliantur. Confectus eorum similagine
panis plenius alit, quàm cibarius: qui verò sic è
trimestrium farina, leuius alimentum præstat, fa-
cileque in membra digeritur. Farina eorum cum
Hyoscyami succo cataplasmaris instar imponitur
aduersus neruorum fluxiones & intestinorum
inflationes: lentigines autem ex aceto melleo
tollit. Furfures in aceto decocti [vulg. exen-
plemittunt] & calentes adhibiti lepras re-
mouent, suntque contra omnem incipientem
inflammationem vtile & accommodatum cat-
aplasma. Cocti verò cum Ruta decocto luxuriosas
turgentisve mammæ [απαρρῆας Vet. codex
teste Lacuna habet] compescunt, & morbis à vipera,
tormentosisque conueniunt. Fa-
rinaceum fermentum, calcificandi extrahendique
vi præditum, priuatim callos in plantis pedum
extenuat, & tum alia tubercula, tum etiam fu-
runculos ex sale maturat atque aperit. Porro è
Sitania Tritico farina, contra venenatorum ictus
ex aceto aut vino commodè imponitur. In glu-
tini verò modum decocta si delingatur sangui-
nem reicientibus [αἱμακτορῶς Vet. αἱμακτορῶν] o-
pistulatur. Contra tussim & exasperatam arteriam
cum Menthæ & Butyro decocta efficax est. Ipsius
autem Tritici pollen si ex aqua mulla aut hydre-
leo decoquatur, omnem discutit inflammatio-
nem. Sed & panis tum crudus, tum etiam coctus
ex aqua mulla impositus, inflammationem om-
nem demulcet: quippe qui plurimum nemolliat &
quadantenus refrigeret, maximè verò si herbis,
succisve quibusdam ad id accommodatis ammi-
sceatur. Vetus autem panis & aridus tum per se,
tum quibusdam admixtus, alui profluvia sistit.
Recens verò muria maceratus & impositus, li-
chenas inueteratos sanat. At gluten [κίμα Vet.
&c.] hæc verba ad capitis usque calcem non le-
guntur in altero codice manuscripto. Goup.] quod
è Similagine aut polline [σῖμις, vulg. σῖμις] con-
fiscitur ad glutinandos libros, sanguinem reit-
cientibus prodest, si liquidius ac tepidum co-
chlearis mensura sorbendum exhibeatur. Cæte-
rùm, quæ in molendo crassior sit ex Zea & Triti-
co farina, ex qua puls sit, Crimnon [κρίνον] ap-
pellatur. Abundè autem nutrit & facile confis-
citur. Quæ verò ex Zea maximè prius tosta sit,
aluum magis adstringit.

Amylum autem appellatum ab eo est, quod si-
ne mola fiat. Optimum quod è trimestri paratur
Tritico, natione Creticum aut Aegyptiacum.
Confiscitur verò ex Tritico eiusmodi puro quin-
quies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aqua per-
fuso: atque vbi emollitum fuerit, sensim aquam
citra agitationem effundi oportet, ut ne simul
vtilior succus excludatur. At vbi mollissimum e-
ualle constitit, diffusà aqua pedibus calcari

Vitis.

Nona.

Mercurius ca-
vus rabidi.
Panis.

Farina.
Neruorum
fluxiones.
Lentigines.

Furfures.
Lepra.

Mamma
turgentis.

Furunculi.

Hæmoptoe.
Tussis.

Pollen.
Inflammationes.

Profluvia
alui.
Lichenæ.

Crimnon.

Amylum.

oportet: deindeque infusâ altâ teri. Tandem in-
hatantes fures in cerniculo tollendi: reliquum
verò colo trahendum, moxque ut excolatum
fuerit, super tegulis nouis ardentissimo sub Sole
siccatî densarique oportet. Namque si paulisper
vltum manserit, aceleat. Porro contra oculorum
fluxiones, caua vlcera, & pustulas efficax est. San-
guinis etiamnum reiectiones potu cohibet, & ex-
asperitas fauces lenit: lactu quoque & obsoniis
admisceatur. Paratur & Amylum ex Zea macera-
ta elotâque ad vnum aut alterum diem, & massâ
triticeâ in modum manibus subacta, tandemque
feruentissimo in Sole, ut dictum est, exiccata. Sed
huiusmodi Amylum ad vltimâ medicum ineptum
est: ad reliqua verò idoneum.

*Siliginis
grana.*

*Triticea
farina usus*

*Tritici pa-
lea.*

Amylon.

Genas dura

Sitonia.

*Paronychia
Callus pe-
dum*

De Tritici, cuiusque farinae, iemque panis & pa-
lez atque Amyli [iuxta veteris codicis quidem
lectionem] vltu passim hæc Plinius lib. 22. cap. 25.
Siliginis grana combusta & trita in vino ammi-
neo, oculis illita epiphoras sedant: tritici verò fer-
ro [eâ industriâ conficitur oleum è Tritico à me-
dicamentis] combustis, quæ frigus viderit,
præstantaneo sunt remedio. Farina Tritici ex ace-
to cocta nervorum contractionibus, cum rosaceo
verò [sola verò Dalechamp.] & fico sicca myxif-
que decoctis fures tollit: gargarizatione pro-
sunt. Sextus Pompeius Prætorii viri pater, Hi-
spaniæ ceterioris princeps, cum horreis suis venti-
landis præsideret, conceptus dolore Podagræ,
mersit in Triticum sese super genua: leuatusque
siccaus pedibus mirabilem in modum, hoc po-
stè remedio vsus est. Vistanta est, ut cadus ple-
nos siccat, (Aceruis Tritici defossos & sepultos:
quâ alluda rusticos Triticum furari solitos Gal.
scribit cap. 14. de Nat. fac.) Paleam quoque Tri-
tici calidam imponi ramicum incommodis expe-
ti iubent, quæque decoctæ sunt aqua foueri. Zea,
ex qua aliam fieri diximus, efficacior etiam hor-
deacea videtur, trimestris mollior. Ex vino rubro
ad Scorpionum ictus tepida, & sanguinem ex-
creantibus: item arteriæ. Tussi cum caprino se-
uo aut butyro. Amylon hebetat oculos, & gula
inutile, contra quàm creditur. Item sistit aluum,
epiphoris oculorum inhibet, & hucera sanat: ite
pustulas & fluxiones sanguinis. Genas duras e-
moluit. Datur cum Opio, his qui sanguinem re-
iecerint. In vesica verò dolore semuncia Amyli
cum ouo & passu tribus ouis suffusa facta, à bal-
neo. Panis [panis facultates attingit Dioscor. lib.
2. cap. 10.] hic sole, quo viuunt, innumeras penè
continet medicinas. Ex aqua & oleo aut rosa-
ceo mollit collectiones: ex aqua mulsâ duritias
valdè mitigat. Datur & ex vino ad discutienda
quæ præstringi opus sit, & si magis etiamnum,
ex aceto, aduersus acutas pituitæ fluxiones, quas
Graeci rheumatismos vocant, item ad percussa, lu-
xata. Ad omnia autem hæc fermentatus (non
quidem fermentatum (*Zeiridus*) autopyron dici
vult Plinius, sed *ambrosia*, id est confectum è fa-
rina minimè castrata, simul & fermentatum ad ea
remedia commendat) qui vocatur autopyros, vti-
lior. Illinitur & paronychiis, & callo pedum in
aceto. Vetus aut nauticus panis (Ammianus Mar-
cell. ad vsus diuturnitatem excoctum vocat buc-
cellatum. Brod. cap. 11. 4. *ταυτην οὖν* Lucianus) ru-
sus atque iterum coctus, sistit aluum. Vocis stu-
diosos [aut *οὐδὲν*, aut eos qui claram vocem
custodire volunt, ne aspera & rauca fiat: aut *οὐ-
νοῦ*, qui canoram, suauem, plenam, lenem
vocem suis modulationibus adhibere maximè ni-
tuntur & student:] & contra distillationes, siccum
esse primo cibo, vtilissimum est. Sitanius

(hoc est è trimestri) incussa in facie, aut
desquamata cum melle aptissime curat. Candi-
dus ægris, aqua calida frigidaue madefactus, lenis-
simum cibum [intritam panis vocat Celsus lib. 1.]
præbet. Oculorum tumori ex vino imponitur. Sic
& pustulis capitis aut adiecta arida myrto. Tre-
mulis panem ex aqua esse ieiunis statim à balneis
demonstrat. Quin & gravitatem odorum in cu-
biculis vltus emendat, & vini, in saccos additus.
Pistura verò non omnibus facilis: quippe & He-
truria spicam sarris tolli pisente pilo præ-
ferrato, fistula serrata, & stellata intus denticulata,
ut nisi intenti pilis, concidantur grana, ferroque
frangantur. Maior pars Italiz ruidio vltur pilo,
rotis etiam quas aqua verset obiter, & molat. De
ipsa ratione pilædi [pinlendi] Magonis propone-
tur sententia. Triticum ante perfundi aqua mul-
ta iubet, postea eualli [vel ut alii legunt euallari,
vallo suo eici, ac excludi, deglubi, gluma corti-
cæque suo [polari] deinde Sole siccatum pilo re-
peti.

Lib. 18. cap. 7. explicat sententias Dioscoridis de
Amylo, his verbis: Amylum fit ex omni Tritico
ac Siligine, sed optimum è trimestri. Inuentio
eius Chio insule debetur: & hodie laudatissimum,
inde est appellatum ab eo quod sine mola fiat.
Proximum è trimestri quodam minimè pondere-
so tritico. Madescit dulci aquâ lignis vasis, ita
ut integatur [inungatur CH.] quinquies in die
mutata. Melius si & noctu, ita ut misceatur pa-
riter emollitum, prius quàm aceat. Linteo aut
sportis siccatum tegulæ infunditur illitz fermen-
to, atque ita in Sole densatur. Post quum maxi-
mè laudatur Creticum, mox Aegyptium. Proba-
tur autem lenitate ac lauore, atque ut recens sit,
iam & Catoni dictum.

Palearum quibus plures Gentium pro sœno v-
tuntur eodem Plinio lib. 18. cap. 30. teste, pessima
ex Tritico præterquam iumentis opere laboran-
tibus, Culmum saxosis locis, cum inaruit, baculo
frangunt substratu animalium. Si Palea defecit, &
culmus teritur. Ratio hæc, maturius defectus, mo-
riâ diu respectus, dehinc siccatus in manipulos co-
uoluitur, atque ita pro sœno bubus datur. Sunt
qui accendant in aruo & stipulas magno Virgili
præconio:

[*Sape etiam steriles incendere profuit agros
Atque lenem stipulam crepitantibus utere flammis.*]

Summa autem eius ratio, ut herbarum semen
exurant.

Galenus auctor est Triticum ut medicamen-
tum foris impositum primi esse ordinis excalsa-
cienium, tamen nec resiccare, (Plin. Sexti Pomp.
historiâ Triticum siccare ostendit.) nec humecta-
re manifestè posse: habere verò etiam quiddam
lentoris, obstruentisque naturæ. Porro, quod ex
eo conficitur Amylum, eo tum frigidius esse, tum
siccus. Quod verò ex pane fit cataplasma, vim
habere magis digerentem, quàm quod ex Tri-
co: nimirum cum & Sale & fermentum panis
adiuncta habeat, quippe cum fermentum
vim habeat attrahendi digerendique ea quæ
in alto residet. Glutinò tandem, quod ex Simi-
lagine & polline Tritici fit, idem Galenus meatus
obducendi ac concoquendi vim attribuit, qui-
bus tanque partibus impositum fuerit. Ast con-
siderandum an Amylum siccus sit Tritico, & an
non potius humidus: quandoquidem cortex &
furfur ab eo separatim, quod videtur siccus fari-
na. Præterea perpendendum an Amylo ex ma-
ceratione in aqua non imprimatur humiditas. Ve-
rùm Solis calore ea impressa & acquisita humidi-
tas,

*Oculorum
tumori.*

*Amylon
ex omni
Tritico.*

*Culmum
palea sub-
stratur.*

*Galenus
Tempera-
mentum.*

Amylon

*Cataplas-
ma.
Glutina.*

Galenus.

tas, fortèque etiam naturalis resoluitur, & eà ratione ficius redditur. De quinque autem panis ex Tritico generibus, Galenus purissimum dicit esse *Silignitena*, id est, siligneum. Et hoc est quod etiam Plinius dicit, E Siligine lautissimus panis, pistrinarumque opéra laudatissima. Deinde *Semidaliten*, id est, sililagineum, ex Sililagine Tritici farina. Et mox distinguit vocabula, *semidalim* quidem Græcam vocem esse asserens, Siliginem verò non item. Nimirum hanc Græcos à Latinis accepisse, sicut *Semidalim* à Græcis acceptam Latini in *Sililaginem* converterunt. Maxime igitur, inquit, nutrit Siligneus. Deinde *Sililagineus*. Tertius est medius, *Syncomistos* & *Autopyrus* appellatus, cui nihil furfurum decessit, sed ex toto Tritico constat. Quartus est sordidus, magna ex parte è fursure constans. Et postremus omnium fursuraceus totus.

Farina crassior ex Zea & Tritico Germanis nota est, inquit Cornarius, & ex ea pulcem faciunt modò crassiorem, modò tenuiorem, ut sorberi possit. Vnde Galenus dixit *καλὴν ὃ τὸ ἔσπετον ἔστιν, καλὴν*. Vocant autem nostri *Griesmel*, eò quod arenæ speciem referat. Idem Galenus crassum Triticeæ, & ex Zea farinæ partem, Crimnon esse dixit, & magis quàm polentam nutrit, sed pgrius concoqui. Vnde videri possit in Dioscoride legendum esse non *ἀγρίον*, quod facile conficitur reddidi, sed *ἀγρίον* ut accipiamus quæ non concoquitur. Sed graue hoc malum esset, & priuatiua particula non responderet ei quæ difficultatem significat. Itaque recta est *ἀγρίον* vocis lectio: & Galeno *ἀγρίον* vox comparatione ad Polentam dicta est. Apud Hippocratem sæpe habetur, *τὸ ἀπὸ τῆς ἀγρίου ὕλης*, & aliquando simpliciter *τὸ ἀπὸ τῆς ἀγρίου*, ut etiam farinæ crassæ accipiendus videtur. A veteris codicis de Amylo lectione Pliniana, vulgata sic euariet, *Datur cum ouis qui sanguinem reuerunt*: Sed Opium, ut quod concoquat, & dolorem eximat, aptius videtur legendum. Deinde tribus ouis, mensura passû significatur, quod accipiendum est, quantum trium ouorum euaria testæ capiunt, ut hoc cum ouo & Amyli semuncia seruatum, à balneo sumatur. Potest tamen fieri ut cyathis vox decurtatè scripta cyphenit, & ita pro vera lectione, passû cy. tribus, falsa supposita sit, passû tribus. Amylum nostri partim corrupta Græca voce Amydum vocant: partim *Brassmel* & *Stercke*, quod in forminarum vsu peplis inductum, ea & inalbet, & firmet.

Cur Triticum homini in cibo facilius sit, quàm ceteris animalibus quanquam validioribus, quorum multa eo satiata intereunt, docet Theophr. de caus. plant. cap. 10. lib. 4. quæ hæc transcribere nimis longum est, & præter institutum. De Tritici præparatione ad conficiendum vinum, itemque Aquam vitæ, consules alios. Nos in Alsatia sæpius bibimus vinum, quod solent cum Tritico parare, ac *weigenwein* vocant: Mustum autem iniecto paucò tritico decoquunt aliquandiu, inde remanens vinum dulce & generosum ad maluatium accedens, quod præstantius aiunt secundo anno.

TRITICVM VVLGARE, GLVMAS TYRANDO DEPONENS.

Vulgare Triticum culmos habet proceros, trium cubitorum altiores, ex radice c. apil-

lata ortos, foliis gramineis donatos: spicam verò in summo culmo palmarem circiter, muticam aut



brevibus admodum aristarum rudimentis donatam, ac etiam longis, in qua grana, flauescencia, turgidula, oblonga, sulcata, superiore parte hirsuta, triplici glumarum, quas tribulorum verberare deponit, vallo clausa, ita ut gibbus duabus, sulcus vna muniatur.

[Considerandum an Tritici alterum genus, *Seranium*

Fuchsis dictum, à primo Robo sc. [ita vulgare vocat] non differat, nisi spicâ multis aristis vallata, & in duos versus dispositâ. Ego, ut antè monui, observavi Montbelgardi in agris vulgare Triticum spica mutica & aristis vallatum: si intelligit idem Triticum cum *Amelforn* Hier. Tragi, plurimum fallitur. Hoc enim est ex genere Zeæ vernæ.

Triticum Brunfels. in 4. Gesn. hort. & de coll. Cord. in hist. Dod. [qui Triticum dicit spicam vltimum muticam habere, interdum tamen aristis cinctam] & Tab. siue Robus, Colum. & Dod. Gall. Tritici primum genus Trago, Fuchsi. & Lon. Triticum spicâ muticâ Hist. Lugd. & Ger. Triticum aristis carens Cæf. Triticum i. siue hybernum aristis carens C. Bauh. pin. cui videtur Siligo Veterum, quam Plinius Tritici delicias vocavit. Siligo spicâ muticâ Lob. Obs. pag. 14. Icon. plant. p. 24.

Prouenit in omnibus serè habitati ac culti Orbis regionibus, à quibus & complura eius notantur genera, cognomina ab ipsis natalibus sortita, quæ colore, magnitudine, specie & proprietate inter se differunt: testis Theophrastus. Latum autem pingueque solum Triticum postulat, idque magis apricum & siccum, quàm riguum. In sicco enim, ut Columella refert, melius coalescit: in humido vero ac vliginoso degenerat, & post tertiam sationem in Siliginem, hoc est, leuius & candidius Triticum conuertitur: quæ tamen & rursus in Robum, id est, præstantius Triticum biennio transit, si in conueniens solum translata, grauiissima eius grana ferantur: auctor Plinius. Scribitur frequentius Autumno: interdum Vere, Autumno satum per hyemem in herba est, & pluribus culmis attollitur, & frequentioribus radicibus firmatur. Æstiuus mensibus vtrumque ad maturitatem peruenit, Dodonæo referente.

Fuchsis passim prouenit Triticum primi & secundi generis: floret Iunio mense: in Iulio autem metitur.

TRITICVM CVM MVLTIPlici SPICA GLVMAS FACILE DEPONENS.

Radicem fibrosam, culmum geniculatum, foliaque cum vulgaris vltus Tritico habet com-

Descriptio



Blé qui truche.

rusticis *Blé qui truche* appellatum, ob spicâ sc. eius in alias fissam, plurêque minores adnatas veluti ramos spargentem: *trucher* enim in ramos diuidi Lugdunenses Colonidicunt: Triticum ramosum, Centigranum vocatum & Triticum ferulissimum Plinio.

Synonyma Casp. Bauhin. pin. Triticum 4. siue spicâ multiplici: Triticum ramosum Plinii, spica ramosa Cxtalp. Triticum 5. species, & *Grandel graspo*, i. e. frumentum racemosum Angullaræ: Triticum multiplici spica Lob. Ic. p. 16. & Germ. *Blé qui truche* H. Lugd. Triticum typhymum multiplici spicâ Tabern. Triticum racemosum Portæ: spicis modò paucioribus modò pluribus, ita vt Matt. 24. spicas viderit.

C. Bauh. Considerandum quantum differat ab hoc Triticum Casp. Bauhin. pin. tertium, siue rufum hexastychon, Triticum rufi genus aliud H. Lugd. An color facit differentiam à nostro coloris albisimi.

Locus & Tempus. Triticum pulchrum genus hoc, spicâ multiplici, quod primum Heidelbergæ vidi, mihi datum ab insigni Pharmacopæo Sprengero nomine Siliginis, satum feliciter prouenit Montbelgardi in Horto Ill. E. C. cui valde infestæ sunt aues.

TRITICVM RVFVM, GRANO MAXIMO, Far siue Adorceum Veterum putatum.

Descriptio Triticum rufi præter Aristatum & Muticum H. Lugdunensi multa alia sunt genera, pro diuersa locorum natura, sitûque. Haud procul Lugduno in pagis monti alto, siue Aureo propinquis, Triticum genus colitur, quod incolæ vocant *Blé rufne*, & *gras blé*. Spicam fert muticam, granum maximum, sed ad conficiendum panem minus utile. Ex eo decorticato puls fit cum lacte, in cibo rusticis grauisima: quamobrem illud ad eas delicias non legitur colunt. Sunt qui Far, siue Adorceum Veterum esse putant, ex cuius pulte Romanos diu vixisse Plinius literis antè prodidit.

Casp. Bauhin. pin. Triticum 2. siue rufum grano maximo.

TRITICVM RVFVM HEXASTYCHON.

Descriptio Aliud Triticum rufi genus est *hexastichon*, Galli vocant, *Froment à six quarres*. Quidam, vt circa pagum Ericum in Allobrogibus, *Blé riguet*, quod

munia ad spicæ facillimum discrimen, quo in hoc præter quatuor illos versus aristatos, qui in summa spica solitarii, circa medium complures vndique sibi adiungunt, multiplicique congectione in ventre crescunt: granum etiam multò candidius & delicatius. H. Lugd. p. 176. Triticum rufi genus, Lugdunensibus

si rigidum Triticum, quodd rigidissimâ firmissimâque spica sit, sex ordinibus distincta, cum in aliis quatuor tantum reperiantur.


Triticum rufi genus hoc aliud H. Lugdunensibus sine icon. p. 176. vocat in pin. C. Bauh. Triticum 4. siue rufum hexastichon.

TRITICVM DICTVM FAR CLVSINVM Dalechampio.

Descriptio Far Clusinum Dalechampio, aduectum ex Italia, & in agro pingui satum creuit ad hominis altitudinem, vel etiam procerius: caule sex geniculis distincto: foliis totidem: radice quinque vel sex, fibrosis: spicâ palmum longa, prælongis aristis horticola, folliculis amplis, dentis, multiplicibus, granum ambientibus longum, exile, profundius lacunatum, aridum, quod vix exculpitur ac euoluitur.

Sed & Far pro omni Frumenti genere à Veteribus usurpatum fuit. Hinc Far triticeum pro Triticum, & Far hordeaceum pro Hordeo, & Far adorceum, pro Farre apud Columellam lib. 8. cap. 5. legitur. Videtur & Plinius lib. 18. cap. 7. Far, pro Faris farina, siue pulte, siue grano decorticato, accepisse, ubi Populû Romanum farre tantum è Frumento trecentis annis usum fuisse, è Verrio tradidit. Porro decorticati Faris grani crassioris farina, ex qua pulres fiunt, Græcis *xeium* dicitur. Lat. *Simila*, Gall. *Fromente*, quibusdam Italico nomine usurpato *Semoule*, quasi Simila. Dioscorides tamen ex Zea quoque, sicut ex Triticum crimon fieri testatur, atque etiam ex Olyra.

TRITICVM CINERICEVM MAXIMIS austis donatum, triturando glumas deponens.



Descriptio Speciosum & splendensque magnitudinis est calamis proceris, geniculatis, foliosis, aristis maximâ, ferè sesquipalmari, duobus granorum ordinibus compactâ, glumis hirsutis, cinericeis (vnde nomen) in longissimas asperasque aristas desinentibus, quibus tribuli verberare in area facile excutuntur semina.

Synonyma Triticum tertium siue aristas longiores & asperiores proferens: Triticum pauciculatum: Germanis *Weizen* solbensibus Triticum italicum, h. e. *Welscherweizen*: Triticum genus Typha fortè cognominandum: Triticum, quod apri syluestres rari degustant.

Fuchs. Triticum tertium genus. Hoc in hist. non vndiquaque notum ait, geniculâque habere quaternâ, alias præcedenti i. e. secundo trimestri, siue Setario, de quo sub Triticum vulgari. J per omnia propemodum simile esse: in Asia & agro Tubingensi signi.

Dodon.

Dodon. Gall. inscribit Typhum cerealem, Gall. *Mereil*, Belg. *Booufche terre*. Figuram autem habet forte ex Trago: an bonam iudicent alii. In Frugum Hist. & Lat. in sol. sub Tritici typhini titulo pingit, ac ait: Repentur frumenti quoddam genus, grano & culmis Triticum referens, quod culmos quidem habet breuiiores ac tenuiores, spicam vero aridis longis & duris Hordei similitudine munitum, granum autem durum, densum, colore fulvum, Tritico minus, quodque facile è glutinis suis exterritur.

Nascitur in quibusdam Hispaniæ, ac Insularum Fortunatarum agris: Phalaridis enim semini, quod illinc aduehitur, permixtum reperitur: unde collectum, æque in hortis satum, ea, quæ descriptum est, formam prodiit. Suspiciari quis posset, semen hoc Typham esse, cuius Theophrastus & Galenus meminerunt. Sed cum Typha granum, multiplex folliculo inclusum, difficulter deglutitur, huius autem facile, Typha proprie esse non potest: licet tamen ex Typha natum, & degeneratum esse possit, nam quod ad reliquas notas attinet, ei simillimum est. Inter ea enim quæ triticum & Zea similia, leuissimum est, tenui ac simplici culmo assurgit, ut de Typha Theophrastus scribit. Semen eius paruum quoque est, & exile, densum item & coactum, æque colore quam Triticum magis rufum, ut Galenus de Typha scriptum prodidit. Iam & spica aristas habet longas ac duras, quales Typha esse ex Veterum plerisque locis manifestum est. Quæ omnia tam magnam huius frugis cum Typha similitudinem ostendunt, ut plane non aliud, quam ex Typha Triticum, ac Typhinum quoddam Triticum esse videatur. Nam & Typha, auctore Theophrasto, in Triticum transit, si pista ac purgata, seratur. Rationi autem consentaneum videtur Triticum ex Typha natum similitudinis plurimum cum ea retinere, non secus ac Triticum ex Zea genitum, quod culmo spicæque Zeam refert. Huic non admodum dissimile videtur, quod Hieron. Tragus *Welsche weizen*, hoc est, Triticum Italicum aut Romanum cognominat: nam & huius spica aristas habet longas & asperas, est tamen culmis, spicis, atque granis maius, spicas etenim habet pleniores, rotundioresque quam Triticum, semen vero pulcherrimum atque Tritico simile, ut Tragus refert. Scitur frequentius in Afsatia, raris in aliis Germaniæ regionibus, idque locis potissimum montosis, præsertim ubi apri fruges depascuntur, nam ab hoc vno ferè abstinent, quod durioribus eius aristis offendantur.

Quandoquidem autem Dodonæus, cuius verba hactenus recitauimus suam priorem cortigit sententiam, nec authenticum tradit discrimen inter Typham cerealem, typhinumque Triticum, idè utriusque descriptionem hoc capite comprehendimus, sicuti & Lobelii Obs. p. 14. & Icon. pl. 16. Triticum aristis circumuallatum, quia tantum proponit figuram Dodonæi Latini: necdum separatam cum Casp. Bauhin Phyt. à Tritico tertio Tragi, donec demonstret harum plantarum differentiam. Sed ipsemet in postremis [pin. scil.] vnam eandemque esse concludit. Triticum 9. siue Typhinum simplici folliculo, inquit, est Tritici tertium genus Trago, Fusch. & Lon. Triticum Matthiolo, Lac. Cast. & H. Lugd. p. 377. Typha cerealis Dodon. Gall. Typha Dodonæi, & Typha Fuschii, Hist. Lugd. p. 392. Triticum aristis circumuallatum Lobel. & Ger. Triticum aristis munitum Cæsalpino. Ceterum plura obscure dixisse hoc in loco videtur nobis C. Bauhinus. Imprimis au-

tem Triticum Matth. Lac. Cast. & Hist. Lugdunensis p. 377. exhibuit, ad vulgare referendum ducimus, idèque ab hoc separandum. Deinceps mirari subit, quod Triticum aristis circumuallatum Lobelii, [quod hic Triticum typhinum Dodonæi esse perhibet] ad Triticum suum 9. iam memoratum referat, itèmq; rursus ad decimum, quod typhinum simplici folliculo Hispanicum cognominat, & Triticum typhinum Dod. & Hist. Lugdunensis, quæ Dodonæi figuram cum historia habet, nostro iudicio ad hoc caput pertinentem. In eo præterea hallucinari videtur, quod Tragus Frumenti genus, spicæ cæruleæ H. Lugd. p. 377. à Tritico suo nono diuersum dicat, & Triticum 4. faciat, siue Triticum aristis longioribus spicæ cæruleæ. Triticum *Lota* vocatum alterum Lob. Icon. Triticum nigrum peregrinum 2. Tabern. Triticum luidum Gerardi. Ceterum, Tragus frumenti genus spicæ cæruleæ H. Lugdunensis, in Sebusianis, vulgò *Sagey* (Allobrogum Sabaudianorum gens est, nunc Oeno ac Rhodano fluminibus clausa, olim longius patens) Tragus frequenter est: incolæ seruatim præci nominis vestigium *Blé Turgnet* vocant. In montosis aridis, & ventosis locis nascitur, & absque noxa nebulas, pruinas, gelicidia, aliisque cæli iniurias in montosis locis frequentes tolerat, ventisque agitatus firmissimè granum retinet. Spica cum maturuit, aristis densis horret, & cæruleo colore tincta, contra quam in aliis frugum generibus, quarum spica flauescunt. Haud multum alimenti præbet. Est apud varias Gentes multiplex varietas frugum, quarum numerum, nominumque ancipitem significationem persequi difficillimum foret. Et hæc H. Lugdunensis, de Trago Frumento, cuius figura pro Tritico cineritio melius placeat quam vel icon Typha Dodonæi, vel effigies Typha Fuschii, p. 392. frustra repetit. Reprehendit autem Hist. Lugd. cap. de Typha Dodonæum his verbis: *Typha*, Lat. etiam *Typha* & *Typha* dicitur, à Ruellio, Typha cerealis cognominatur: quoniam planta alia inter arundines locis humidis provenit, quæ Typha nominatur. Theophrastus inter ea quæ Tritico & Hordeo similia sunt numerat Typham, subiungitque esse omnium leuissimam, simplici culmo assurgere, solo tenui contentam. Mnesitheus Typhas tertio loco post Triticum & Hordeum numerat, item & Diocles. Sed Mnesitheus Olyram & Typham eandem rem esse putat, quem ob id reprehendit Galenus lib. 1. Alim. ubi eius de Typhinis panibus & Typha, oratio scripta habetur. Typha autem Galeni quamnam nostrarum frugum speciem refert, ignorant plerique docti Herbarii. Dodonæus Typham appellat eam frugem quam Gallis *Mereil* vocari putat, Germanis *welsche weizen* & *Robstscheterwe*, id est, Triticum Italicum, aut Romanum. Fuschius eam pro tertio Tritici genere depinxit. Sed fallitur Dodon. Neque enim Gallorum *Mereil*, non ubique noti, seu peregrini Tritici species est, sed partim ex Tritico, partim ex Secali miscellanea seget, quam Lugdunenses vocant *de la Mesle*. Calamo, geniculis, spicæ aristis vallatæ Olyram Typha refert, nisi quod spicas habet longiores & asperiores, rotundioresque & in vnum magis coactas. Semen folliculo unico includitur, grano Tritici simile. Fruges hæc cortice & acerbis purgata Zea modo in Triticum redit, quod & de Typha Plinius scripsit. Hæc autem Hist. Lugd. quæ Tritici cineritii quatuor imagines proponit.

Quid tandem C. Bauh. per Triticum 8. siue Ty-

Tragus
frumenti

H. Lugd.
fructus 4.

Dodon. Lugd.

Loz.

Triticum
Romanum

Dodon.

S. Bauh.

Synonymum

C. Bauhin
Typha 6.
Ty.

Trit. 8.

phorum multiplici folliculo, Typham inter frumentacea Theophrasti, Thypham Galeni, Typhen Plinii intelligat, & an huc referri possit, aliis deducendum relinquitur.

TRITICVM SPECIOSVM GRANO longo.

Descriptio Speciosissimum Tritici hoc genus, hactenus nobis nondum observatum ex horto Stuchardino accepimus, quod satum in horto Montbelgardensi in spicam exiit spica Tritici vulgati longè maiorem, sex aut septem vnciarum altitudo drantibus, pedibus plùs minùs. Glumæ vnciales ferè, granum oblongum & vncie trionte & quam vulgati duplo ferè longius continet, è glumis facillè separabiles, in quo cum vulgato & cinereo convenit.

De hoc, ni fallat inscriptionis vicinitas, apud H. Lugdunensem hæc scribuntur. Circa Matiscornem in humidissimis Sebusianorum tractibus deterrimum & strigosissimū Tritici genus provenit, granò longo, exili, subatro, inultis glumis vestito. Rustici vocant *Long gran*, id est, longum granum, famèque vel egeitate compulsi panem ex eo conficiunt. Alii iuvibus & gallinis edendum obiciunt. Ad Bizam Thraciam fruges hæc videntur accedere.

Caip. Bauhin. pin. Triticum 5. siue semine oblongo, cui congener dicit Frumentum *Sourgen* Ruellii.

TRITICVM SYLVESTRE, AGRIOSTARI Cretensibus.

Locus Agriostari quod Triticum sylvestre significat, autore Hen. Bello, frequenter in Creta inuenitur, negligiturque. Herba est Tritico similis, folia & caules tritici ferens, spicæque aliquantulum asperas, nigriores, & aristas breviores, eius grana minora sunt Tritico sativo, & altera parte obtusa, ita ut fecalis grana potius quam Tritici æmulentur. Hæc senuna nulla alia causa tibi mitto, nisi ut tibi compertum sit, non in sola Sicilia Triticum oriri sylvestre, quemadmodum Poëte tradiderunt: & quod non absque ratione Cretenses Triticum primò à Cerere in Creta inuentum fuisse sibi persuaferint, quemadmodum Diodorus Siculus in suæ Bibliothecæ l. 6. scriptum reliquit.

Classificatio Felicissimè & abundanter Clusio nata erat hæc planta, sed antè quàm caules proferre inciperet, ab eo cui repurgandi horti curam dederat, pro inusitata herba euulsa & abiecta fuit, licet serie quadam & ad normam, quemadmodum fata erat, nata.

ZEAM IN GENERE, EX VETERIBVS & Neotericis.

C. A. 2. II.

Descriptio Zeam Dioscor. duplicem facit. Alteram enim simplicem: alteram Dicoccon [Dikokkon] appellat: quoddam in duobus putaminibus siue folliculis grana bina coniuncta [coniunctum semen, Corn.] ferat. Hordeo autem potentiùs nutrit, ut idem tradit, & ori grata (i. e. Corn. tamen *ἀσπαστος*, h. e. stomacho commodam, ex Galeno legendum asserit) est: sed panificia ex ea co-

lecta, minùs quàm ex Tritico, nutriunt.

Est verò Spelta Dioscoridis quidem dicoccon, si Dodonæo non refragandum, quæ Theophrasto & Galeno Zea. Hic autem Zeam vniuersa sua facultate, in medio quodammodo Tritici & Hordei esse, in lib. simpl. med. scribit. Quare ex illis cognosci posse iudicauit Cornarius magis alere panes ex Zea factos, quàm hordeaceos: & minùs quàm triticeos, & insuper stomacho commodam esse. Nam in Græcis non vocem *ἐσπαστος*, h. e. ori gratam, legendum esse præcipit, sed *ἀσπαστος*, i. e. stomacho commodam: Et hanc esse Galeni l. 1. de aliment. lectionem ait.

Potè, antiquissimæ ac prisce Latinorum, teste Dodonæo, Zeam siue Speltam, Far nuncupauere, ut locupletissimus testis est Dionysius Halicarnassæus. Nominabant [inquit] prisce Romani sacras nuptias, vocabulo suo *πασπαστος*, quia coniuges velcerentur eodem Farre, quod nos Græci *ζῆα* dicimus: idem affirmat Alcibiades apud Galenum, 2^o lib. 9. ita scribens: *ἐσπαστος ὁ ζῆα*, id est Farris, quod *ζῆα* appellant. Appellatur verò Faristud Latinis quoque *Ador*, *Adoreum*, & semen *Adoreum*, ac à Posterioribus propter frugis præstantiam, peculiari nomine *Semen*. Hoc populum Romanum tantum, è frumento 300. annis usum, Verrius tradit. Genera huius Columella quatuor scribit: *Far Clusinum* candoris nitidi: *Far* quod vocatur *Venniculum* rutilum, atque alterum candidum, sed utrumque maioris ponderis, quàm Clusinum: Semen trimestre, quod dicitur *Halicastrum*, idque pondere & bonitate præcipuum. Ex his cum Halicaastro conuenire Spelta posset, si trimestris esset, ac Vere fereretur, verum cum Autumno feratur, Vennicululo albo magis similis esse videtur. Nam veluti Vennicululum, sic & Spelta, pondere præstat accedida est. Et hæc Dodonæus.

Ceterum qui Zea vtuntur (Plinii verba sunt l. 18. cap. 8.) non habent far. Est autem hæc Italix, in Campania maximè, semenque appellatur. Hoc habet nomen res præclara, ut mox docebitur: propter quam Humerus *ζῆα* dixit: non ut aliqui arbitrantur, quoniam vitam donaret. Amylum quoque ex ea fit, priore crassius. Itè cap. 10. apud Græcos esse Zeam scribit, tradique eam, cum sit degener, redire ad Frumentum, si pista feratur, nec protinus, sed tertio anno. Cap. 11. Zeam in Africa degenerare refert. Ait & alibi Zeæ granum pulchrius esse, quàm Tritici. Libro 22. cap. 25. Zeæ medicinas persequitur, de quibus alibi dictum.

Apud Galenum Mnesitheus panem ex Zea neminem affatum comelle citra sanitatis dispendium posse tradit. Quod si quis, ait, si panem non assueuerit, etiam si minimum sumperit, ægrotabit. Est enim gravis, & concoctu difficilis. Qui verò regionem incolunt vehementer frigidam eo semine coguntur nutrir, ipsūque ferere, quod frigus perstrenuè resistat. Hæc Zea de qua ex Dioscoride & Plinio diximus, conuenire non possunt, neque Zea Theophrasti, qui eandem quam Dioscorides Zeam intellexisse videtur: sic enim scribit. Inter ea quæ Tritico hordeoque sunt similia, ut Zea, Olyra, Typha, Avena, & Aegylops, Zea est firmissima, copiosissimèque fructificat, multiplicem altamque radicem effundit, calamo multiplici crassoque assurgens. Fructus autem est leuissimus, & cunctis animalibus admodum iucundus. Deinde subiungit. Sunt autem hæc duo, Zea scilicet, & Typha. Tritico similissima. Herodotus verò *ζῆα* Zeæ meminisse videtur,

videtur, cum scribit: *triticum hordeoque* plerique videntur. Apud Aegyptios autem his in victu uti summum dedecus putatur. Utuntur autem Olyris, quas alii Zeias cum *z* nominant.

Zeam Germanis notam esse, & quidem simplicem, *μολόκος*, *tinefel* appellari, *σίκακος* vero speltam vocari, testatur Cornarius. *Zea* igitur,

et *z* Græcorum, Latinorum *Zea*, quibusdam annotante C. Bauhino, idem cum *Olyra* est: sed horum sententiam haud dum probandam censens: sicuti neque tragi qui *Far Clusinum Columellæ* credidit. Lobelio in *Aduers.* videtur *ryphæ* cerealis. Ast ab aliis melius *Frumenti* peculiaris species, quæ Latinorum semen est, statuitur. Semen autem Latini à substantia frugis appellarunt. Eius hodie differentie plures habentur. *Zeam*, *Speltam* vulgò vocari scribit Dodonæus: Germanis *Spelz*, nonnullis vero *Tinefel*, & *Tindelforn*, Belg. *Spelre*. Gall. *Espeautre*: Italorum plerisque *Pirra sarrà* Hetruscis *Biada*. In subribus *Alga*, quasi *Alica*. Hebræis, *Kuntha*.

DE CHONDRO ET HALICA SIVE ALICA.

CAP. III.

Chondrus & *z* ex factitiarum rerum numero sunt, teste Cornario & Dodonæo. Fit autem utraque ex *Zea*, & Chondrus quidem ex *Zea* Dicocco, Dioscoride auctore. Theophrastus & ex *Hordeo sylvestri* bonum fieri Chondrum tradit.

Galenus Chondrum ex *Tritici* genere esse ait, quod nihil aliud sonat, quam ex *Triticeo* genere ipsum confici, non quòd *Tritici* aut alterius frumenti aliquod genus sit, veluti nonnulli perpetim sibi persuaserunt. Non enim frumenti aliquod genus, sed res planè, ut diximus, factitia.

Galenus & aliorum Græcorum Medicorum interpretès *χόνδρον*, Latine *Halicam* siue *Alicam* interpretantur, Chondrum omnino idem cum *Halica* esse putantes, quæ in re, non parum à veritate recesserunt. Chondrus siquidem & *Halica* differunt, veluti absurdè vnus pro multis, Paulus Aegineta non vno ostendit loco: aut videlicet de vtriusque seorsim agens, & suas cuique vires ac facultates tribuens, ut lib. 1. cap. 78. aut vnam alterius loco substituens, veluti cap. 19. 39. & 62. lib. 3. Differunt autem hæc inter se, non quidem toto genere, sed quodammodo, veluti genus & species, aut potius ut vnus generis duæ species. Non *Halica* siue *Alica*, Latinis ac Plinio generalius est nomen, Græcorum *χόνδρον*, tum *ἀλικά* ipsis peculiariter nominatam, sub se continens. Est enim vna *Halica* ex *Zea*, quæ semen appellatur, propria quidem ac genuina, quæ à Plinio lib. 12. res Romana esse fertur, Magni Pompeii tempore nondum in vsu. Hæc à Paulo Aegineta Græcè *αλικά* dicitur, & à *χόνδρον* ipso præparationis modo differt, non enim gypso & arena veluti hic repurgatur, sed cæta candorem perfectionemque suam assequitur. Est verò & altera *Halica*, ex *Zea* in Africa degenerante, cognomento adulterina, Græcorum *Chondro* simillima: gypso siquidem & arena, veluti Chondrus perficitur: licet tamen *Halica* quidem ex degenerante, Chondrus verò ex *Dicocco* *Zea*, fiat. Nam præparandi ratio apud ytrasque nationes consimilis, eandem esse rem prorsus ostendit, quemadmodum & ea dissimilis

res diuersas. Non enim tam species frumenti, quàm præparandi conficiendique ritus ac modus considerandus. Frumenti enim aliqua diuersitas, speciem rei factitiæ non videtur mutare, modò in præparandi ratione nihil varietur. Siquidem ex *Zea* & *Hordeo* *Far*: ex *Zea* & *Hordeo* sylvestri Chondrus: ex *Hordeo* & *Tritico* *prisanæ* confici possunt.

Qua autem ratione Chondrus conficiatur ac præparetur, in libris de Agricultura, siue *χόνδρον* præparandi, Constantino Imp. dicatis à Cassio Dionysio Vticensi, docetur his verbis: *Zea* tunditur & in serpentem aquam iniicitur, ac premitur, deinde gypsum album rufum cribratum, & arenæ albiſſimæ ac subtiliſſimæ ad gypsum pars quarta paulatim admiscetur, donec *Zea* probè repurgetur. Præparetur autem in canicularibus diebus, na acescat. Postquàm verò rursus totus perpurgatus fuerit, per cribrum densius excutatur.

Optimus est Chondrus, qui primùm excussus est: secundum locum habet, qui succedit: deterior autem tertius est.

Halica verò præparationem Plinius lib. 18. cap. 11. tradit. *Halica* sit, inquit, ex *Zea*, quam semen appellauimus: tunditur granum eius in pala lignea, nam lapidis durtiâ conteritur. Nobilius, ut notum est, pilo victorum pœnali opera, primoni inest pyxis ferrea, excussis inde tunicis, iterum usdem armamentis nudata conceditur medulla, ita fiunt *Halica* tria genera, minimum, ac secundarium, grandissimum verò *aphrema* [αφρέμα] appellant: nondum habent candorem suum, quo præcellunt, iam tamen Alexandriæ præferuntur. Postea mirum dictu, admiscetur creta, quæ transit in corpus, colorémque & teneritatem adfert.

Deinde paulò infra: *Halica* adulterina sit maxime quidem ex *Zea*, quæ in Africa degenerat. Pinfunt cum arena, & sic quoque difficulter conterunt vtriculos, sitque diuidi modii mensura, posteaque gypsi quarta pars inspergitur, atque vtriusque farinae cribro subcernunt. Quæ in eo remansit, excepticia appellatur, & grandissima est: rursus quæ transit, ardore cernitur, & secundaria vocatur: item cribraria, quæ simili modo in tertio remansit, cribro angustissimo, & arenas tantum transmittente. Alia ratio vbique adulterandi. Ex *Tritico* candidissima atque grandissima eligunt grana, & semicocta in ollis, postea arefaciunt Sole ad initium, rursusque leuiter aspersa molis frangunt. Ex *Zea* pulchrius quàm ex *Tritico* fit granum, quamuis id *Alicæ* vitium sit, candorem autem ei pro creta, lactis incocti mixtura confert. Cæterum de ipsius vtilitate lib. 12. cap. 25. ita ait. *Alica* res Romana est, & non pridem excogitata, alioqui non *prisanæ* potius laudes scripsissent Græci. Nondum arbitror Pompei Magni ætate in vsu fuisse, & ideo vix quicquam de ea scriptum ab Asclepiadis schola. Esse quidem eximie utilem nemo dubitat, siue eluta detur ex aqua multa, siue in sorbitiones decocta, siue in pultem. Et paulò post. *Prisanæ*, quæ ex hordeo fit, laudes vno volumine condidit Hippocrates, quæ nunc omnes in *Alicam* transeunt. Nec dissonant ab his, quæ Galenus de aliment. prodit. Ex genere *Tritici* inquit, est *Alica*, quæ multum alit, & viscosum succum habet, siue in aqua sola cocta, accipitur ex vino mulso, aut vino dulci, aut etiam adstringente: proprium est enim vnumquodque vsus tempus: siue cum oleo & sale condita. Iniicitur etiam aliquando acetum ad ipsam, & dicunt Medici ita præparatam, *chondroprisanæ* factam esse conditu-

Min

HISTORIAE PLANTARVM.

Quidam verò ex Alicæ Pusana (χώρα) ægrum nutritum esse dicunt. Aliqui verò Veterum, velut Diocles & Philotimus, pusanam triticam (σπινθάρη τριτική) ita præparatam Alicam [Chondrum hoc modo apparatus] appellant. Et vno quidem horum modorum, eo videlicet qui prior est, Alicam etiam coqui ac edi apud Roman. solitam Martialis in xenis hoc dist. ostendit.

Nos Alicam, mulsam poterit tibi mittere dines, Si tibi volueris mittere dines, eme.

*Alimentum
optimum.
Tempera-
mentum.*

At idem Galen. s. simp. phar. Alica, inquit, est etiam alimentum optimum, quemadmodum etiam Triticum, sed non est huius loci de alimento distinguere. Verum ut medicamentum meatu obducendi vim habet. In temperamento verò similis est Tritico, plus viscosi quàm illud habens, quo etiam magis quàm illud alit. Et est velut materia quædam idonea ad suscipiendum acetum, & aquam marinam, & murtiam, & alia huiusmodi quæ vehementer siccant. Quapropter quidam ex his quæ multum siccant, ipsam esse putauerunt. Est autem ex his quæ magis concoquere possunt, quemadmodum & Triticum, quæ minimè siccant. Verum ob siccantium pharmecorum mixturam, id quod ex ipsis compositum est siccandi vi præditum, multos medicos fallit, ut ad ipsam Alicam referant siccandi causam, omittis his quæ sunt amixta. Et hactenus quidem Cassi, Plinii & Galeni verba, ex quibus manifestum est, Alicam à Chondro differre, & Chondrum cum secunda Plinii Halica convenire, utramque item rem factitiam esse, & non peculiaris frumentorum genera, Dodonæo attestante. Sed ex iis quoque clarum fit, monente Cornario, etiam ex Tritico Alicam fieri: & tum res eiusmodi factitias, nomina inter se commutare, tum pro ipsis naturalibus nomina factitiorum usurpari & vicissim.

*Alica Ery-
mon.*

Videtur porro Alica Latinis ab alendo appellata esse, sicut Græcis χώρα, ob excellentiam, id est, granum dicitur. Utuntur tamen etiam Græci medici iuniores Latina voce αλιζ, pro Alicæ. Et aliquando χώρα αλιζ coniunctum dicunt.

*Chondrus
Vires ex
Dioscoride.
Alica.*

Cæterum χώρα auctore Dioscoride, potèntius quàm Oryza & alit & alium cohibet, sed stomacho longè vtilior. Decoctus in aceto illitusque, lepras tollit, & vngues scabros pellit, ac incipientibus agilopis medetur. Eius decoctum dysentericis dolore vexatis in fufum idoneum est. Chondrus, uti Paulus lib. 1. tradit, egregiè nutrit, & glutinosos parit humores: verum puls ex eo confecta nocet, quoniam quamprimum crassescens incocta permanet. Probatum magis χώρα ipsius ex integro Chondro bene decocto, expressus Pusanz similis: αλιζ in cæteris Chondro quidem respondet, sed alium magis adstringit.

DE ATHERA, ET ΚΟΛΛΑ SIVE GLVTINE.

CAP. IV.

*Athera
quædam*

Athera sorbitio est, inquit Dioscorides, ατρίνη, i. e. veluti pulicula liquida infatibus conueniens: comoda etiam ad cataplasmata. Fit autem ex Zea tenuissimè molita. Apud Belgas verò non ex Zea tantum, sed ex quavis etiam priore farina coquitur: velut, Secalis, Hordei, frequentissimè autem Tritici, cum tenui ceruisia vel alio liquore permixta, Plinius etiam ex Olyra facit. Est autem edulium, quod citò concoquitur, facileque nutrit, infantibus idcirco & senibus conueniens: interiora tamen viscera non-

nihil obstruens. Datur capite dolentibus, extenuissima Secalis, vel Hordei farina: dolorem enim sopit, & somnum clementer conciliat.

Athera crassius & solidius est gluten, Græcis ατρίνη, ex Similagine & farina Tritici, quo charæ glutinantur. Quod propter eam, quam habet obstruendi vim, sanguinis excreationibus prodest.

In vtriusque medio manet, siue puls, est solidior quidem ac spissior Athera: liquidior verò Glutine, & minùs Glutine, plus autem quàm Athera viscera obstruens. Atheræ, aut potius pulsæ genus est, edulium, quod Galenus ex multa Tritici farina lacti permixta fieri scribit, quo hac ætate Belgium, ac vniuersa inferior Germania frequentissimè vititur. Cibus boni succi & multi alimenti, sed eos qui ipso assidue vituntur offendit. Nam in hepate obstructions parit, & calculos renibus gignit autore Galeno.

ZEA SIVE SPELTA.



Culmo solidior respondet, spica palmaris aut scilicet palmaris, aliquando mutica, interdum aristis circumuallata, longioribus brevioribusve, gemis granorum versis, vel ita dispositis granis, ut alternatim vnius principio medium alterius respondet, glutinis pertinaciter hærentibus, nec tribuli istius semina relinquuntibus, quo nomine à Tritico vul-

gari distinguas licet, alioquin glutinis & murtis exuta grana vix internoscas.

Dodon. gall. Zeam hanc pingit sine aristis. H. Sponz. Lugdunen. contra p. 385. Zeam duplicem exhibet, modò non. Casp. Bauhin. pin. Zea 1. siue dicoccos vel maior: Zea 2. siue minor. Dioscor. Zea Theophrast. & Galeno. Zea, Brunf. Corda in Dioscor. Lon. Ger. Spelta prima Trago. de scr. Secunda, Eid. ico. Zea dicoccos, Matth. Gesn. apud Cordum. Zea altera Matth. Lac. Cast. Zea primè genus Fuchf. Turn. Zea, Romanis veteribus semen, nunc Spelta Dod. gall. Zea vulgò Spelta, Far antiquiss. Ador posterioribus, & Semen Adoreum, Dod. Typha Ang. Far primum Cæl. Zea maior seu dicoccos Lugd. pag. 385. Zea ador, Tab.

An Lob. in Ic. plant. p. 27. Robus, siue Triticum Insulanis Gallo-Belgis Loca vocatum. Ibi siquidem nulla alia figura pro Zea. Scio fratrem Casp. Bauhinum à Zea diuersam statuisse, & in pin. Triticum 7. facere, cognominatè quæ Triticum aristis longioribus spica alba, Triticum typhinum Ger. quartum Tabern.

In multis Italiæ, Galliæ & Germaniæ locis provenit. Nascitur qualicumque solo, etiam humidiore, quoniam folliculum, ut ait Columella, quo continetur, firmum ac durabilem, aduersus longioris

*Locus &
tempus.*

gloris temporis humorem, habet. Læto tamen
pinguique solo melius proficit. Seritur ut Triticum
Septembri vel Octobri mense: Iunio floret,
Iulio autem maturitatem consequitur, demeti-
turque.

ZEA VERNA, JUNNER.

Descriptio

Triticum quod vulgus VVirtembergicum
Junner vocat firmos habet calamos, tres cu-
bitos, altos, quatuor, quinque aut sex geniculis

donatos: folia
plusquam se-
munciam lata:
spica verò
duorum est
versuum, sibi
mutuò equali-
ter responden-
tium, aristata,
in singulis au-
tem versibus
ordines duo
seminum ma-
iusculorum,
quæ glumæ in-
volvunt vali-
dæ, aliàs albi-
cantes, aliàs
quali ferrugi-
ne infectæ vel
rubentes, binæ
quidem vndi-
que, extrema

verò, externa tantum parte.

C. Bauh.

C. Bauh. phyt. Triticum 2. æstivum siue
Dioscoridis, Triticum genus alterum Tragi,
Triticum trimestre Cordi, Olyra Dodonzi gall.
Item Triticum 3. siue amyleum, Spelta secunda
Tragi. Et rursus Zea 2. siue dicoccos Dioscoridis,
Spelta 1. quoad descriptionem: 2. quoad iconem
Tragi. Ego Dodonzum se corrigentem sequor,
hec Dioscoridis Triticum existimo: nec hoc Cor-
dus trimestre vocare videtur, iam nec Amyleum
Triticum, à Tritico altero Tragi separandum:
quin nec Spelta secunda Tragi eadem est cum A-
myleo Tritico, quod eadem cum Zea altera. Eid-
pin. Zea tertia, siue amylea, vel zeopyrum Amy-
leum: an Far halicastrum trimestre cognomina-
tum, Col. Triticum secundum Trag. Fuchl. Lon. O-
lyra, Dod. gall. Lugd. Triticum trimestre Cord. A-
mylzum frumentum & Far halicastrum, Dodon.
Frumentum vel Triticum Amylzum, Tab. Triticum
amylzum, Ger.

Fuchl. Lon.

Si Fuchsius per Triticum secundum genus, Sita-
nium scil. de quo cap. de Tritico, hanc Vernam
zeam intelligit, malè, meo iudicio, eam haud dif-
ferre ait à Tritico, nisi quodd spicam multis ati-
stis vallatam, &c. obtineat.

Olyra.

Dod.

Fuchl.

Lon.

Dod.

Fuchl.

Lon.

Dod.

Fuchl.

Lon.

Dod.

Fuchl.

Lon.

Dod.

Fuchl.

Lon.

Dod.

Fuchl.

Lon.

Dod.

Fuchl.

Lon.

Dod.

Fuchl.

Lon.

Dodon. gall. Olyram Plinii esse statuit, negat-
que Siliginem. Latinus zea generibus accedere
haud perperam dixit Amyleum Germanis dictum
frumentum, Amelforn, æstivum, siue trimestre
genus. Addit Tragum & Fuchsum trimestre Tri-
ticum esse existimasse: sed cum granum habeat
glumis conditum, ex Tritici generibus esse non
posse: inter Farra autem citius reponendum
fore, inter quæ Halicastrum fortè sit futurum,
quodd, teste Columella, vere seratur.

Io. Marhardus Med. Halæ Sucuorum vocabat

in Ind. suarum plant. mihi missarum; Typham, Fru-
menti genus, Junner.

An Lob. ic. plant. p. 27. Triticum, Zea vocatum
alterum, & Triticum lucidum Gallo-Belgarum:
Non me latet quidem aliam esse opinionem Fra-
tris, eumque separate à tritico altero Tragi, ac
facere triticum 4. in pin. siue Tragum frumenti
genus spica cærulea Hist. Lugdunensis, quod ad
triticum cinericeum retulimus.

Anno 1596. mense Augusto observavi inter
urbem Rotemburgum & Nideravv fontem aci-
dum tritici genus hoc, quod mihi denominarunt
welsche forn, an bene, nondum mihi constat. In-
veni eodem mense etiam inter Kircken urbem &
Bol: serunt verno tempore, circa festum Diui
Georgii, tardè metant, scilicet primum Septem-
bri.

Locus &
Tempus

ZEA MONOCOCCOS, BRI-

ZA QVIBVS DAM.



Culmis sur-
git gracili-
bus & sesqui-
cubitalibus, læ-
to solo maiori-
bus, foliis an-
gustis: spica
summo culmo
sedet strigosa,
sed pulchra;
trium quatuor-
ve unciarum
longitudine, se-
munciam lata,
compressa, du-
plici contextu
versu granorū,
quos glumæ
simplices arcuè
obtegunt, in a-
ristas asperas
desinentes Ra-

Descriptio

dix fibrosa: Icon nostra planè displicet: iam scul-
ptam emimus.

Dod. Gall. inscribit Brizam, vocans eam Germ.
Blicfen/ S. Peters forn / Frumentum Sancti Pe-
tri, & in forn, Monococcon: suspicatur autem
Gallicè, Blé locar ou Froment locar, id est, Fru-
mentum locale Ruellio dici, Farris que speciem
esse, non verò zea, ut quidam putarint. Lat. de
Frum. & in fol. sub titulo Frumenti monococci
huius figuram exhibet [hanc & Lobel. habet in
Obs. pag. 10. ic. plant. p. 31. Brizz, Monococci re-
centiorum & Dodonzi inscriptione.] ac addit

Tinesel, ac Dinfelforn à quibusdam etiam ap-
pellari. Suspiciaturque Frumentum ru-
brum siue locale Ruellii, Froment rouge, &
Froment locar esse zeam monococcon. At hic
apertissimè falli Dodonzum docet Dalecham-
pius in hunc modum: Blé locar Gallis, triticum
est, quasi Loculare sic dictum, quodd mul-
tis tunicis tanquam oculis involuatur. Id barbati
Frumenti genus Farris speciem Ruellius esse vult
In concavis inquit, tractibus Galli serunt: & qui
facile sentiunt rubiginem: nam, ut credunt, nec
pruinæ, nec æruginem extimescit. In perflatis
& excelsis quamvis bene conualecat, sationem
tamen ibi damnavit. Farris speciem esse negat
Dodonzus in stirpium Historia, quodd Farris spi-
cas muticas esse putet. In frumenti Historia simi-
litudinem quandam fortasse habere ait, cum Fara

Briza
Dod. Gall.
Frum S.
Petr. Mo-
nococcos.
Frum. locar.
Farr. rub.
Zea.

Dod. lapp.

re venticulo rutilo. Idem Zea genus esse negat in Historia stirpium. At in Frumentorum Historia scribit non temerè Scriptores nostri temporis ad Zeam referre, neque perperà *Zeam*, id est, simplicem Zeam Dioscoridis existimare. Ruellius *Brizam* quoque non longè dissidere credit ab ea fruge quæ Gallis *Secale* vocatur, ex quo panis fit ater quidem, sed recens non insuavis, ab eaque *Bizi* panis in vulgus nostrum manasse putatur extrita litera: *Bizum* enim panem nigrum vocamus.

Synonyma Calp. Bauhin. phyt. & pin. Zea l. Briza dicta, vel Monococcus germanica: *Zea éxan*, quod simplicis grani sit, Diosc. Spelta prima, Trag. ico. secunda Eid. descript. Zea Ang. Zea simplex, Matth. Lac. Cord. in Dioscor. Zea alterum genus, Fuch. Frumentum loculare, Ruell. Siligo, & Zea alterum genus, Tur. Briza, Dod. gal. Adu. Lugd. Monococcus Lob. Ger. Monoccon, frumentum barbatum, Far venticulum rubrum, Col. Zea Mnesitheii fortè, Dod. Spelta vulgò, Czf. Zea species prima, Cast. Zea monococcus, Tab. minor & monococcus Lugd. Si, ut frater antè scripsit, Triticum amyleum est spelta secunda Tragi, quomodo erit Zea simplex, siue *éxan* Dioscoridis? Trago enim Amyleum Triticum, est spelta secunda, dux sunt plantæ diversæ.

Locus & Tempus Nasctur asperis & montosis plerisq; Germaniæ locis. Autumno cum reliquis frugibus seritur, seriis tamen ac subinde Septembri demum mense maturefcit.

Ex Monococco panis confectus, ater est & hominibus ingratus.

OLYRA AC TYPHA.

CAP. V.

Olyra
Diosc.

Olyram Zea genus facit Dioscorides, sed aliquantò minùs quàm illam nutrire, & ex ipsa panes, crassiorèmq; farinam, eodem modo fieri refert.

Arinca
Galliarum
Plin.

Plinius Arincam Galliarum propriam, & Italia copiosam esse dicit. Et rursus, Ex Arinca dulcissimus panis, ipsa spissior quàm Far, & maior spica, eadem & ponderosior. Rarè modius grani non 16. libras implet. Exteritur in Græcia difficulter: ob id iumentis dari ab Homero dicta. Hæc enim est quàm vocat Olyram. Arincam itaque eandem cum Olyra Plinius facit. Nec reperitur apud ipsum id quod quidam scribunt, Olyra Græcis, Latinis Plinio autore, Siligo. Quare isti Olyram cum Veterum Siligine confundunt. Quæ autem fuerit Siligo, & quòd ea hodie ignota sit, concludit Cornar. Hodie tamen Siliginem putari, & appellari eam quæ Olyra est fatetur, sed nullo Veterum autore. Olyram itaque esse affirmat eam, quæ vulgò hodie Siligo appellatur, quàm Germani *Rodfen* vocant, & quibusdā locis fortè per excellentiam, hoc quidem nexus argumento, quòd ex hac magna ex parte per omnem Germaniam vulgares panes fiant, ut & ex typha, quàm deteriore aliquantò, Olyra speciem statuit. Sed quæ sit in his differentia, ex Galeni verbis, quæ inferius adscribenda, cognoscendum.

Mnesitheii
opinio re-
probata.

De Olyra ac Typha ex Theophrasti & Galeni præcipuè sententia, hunc ferè in modum disseruit Dodonæus. Olyram ac Typham Mnesitheus idè frumentum, utroque nomine appellatum existimavit, sed eius opinionem Galenus reprobat, Diocli ac Theophrasto accedens: qui Olyram à Typha distinguunt. Theophrastus Olyram ac

Typham inter ea quæ maturè feruntur; ac Triticum similia sunt, enumerat: & Olyram quidem ait, Zea ac Bromo molliorem ac infirmiorè, Typham verò omnium leuissimam: nam simplici culmo assurgit, & solo tenui contenta est: nec, uti Zea, pingue latumque desiderat. Vtramque præterea scribit multiplici folliculo includi ac Typham uti Zeam in Triticum mutari solere, si pista seratur, idque non protinus, sed tertio anno. Plinius Olyram Latinis Arincam dici affirmat. Recentiores Typham, cognominant cerealem, ad differentiam nempe alterius Typhæ, quæ in paludibus enascitur, de qua suo loco. Typha semen, Galenus ait, corticem extrinsecus veluti Olyra ac Hordeum habet. Quod verò ad colorem naturalem attinet, in Hordeis quidem ac Olyris est albus, in Triticis verò subflavus: Typhæ autem vel Triticis sunt flaviores. Quin & harum corpus coactum est, ac densum, quòd fortassis ad seminis paruitatem nonnihil adfert momenti. Est enim id Triticum longè exilius, quam non desint, qui ipsum quoque in Triticum numero ponant: velintque id semen esse, cuius Homerus meminit, cum Hectorem equos suos alloquentem facit his verbis:

Τὴν δὲ σπέρμενιν μάλιστα ποτὶ δόμον:

Hoc est, Triticum enim vobis primum prædulce ferebam. Aiunt enim Typham paruum Triticum esse, eamque equos sine noxa mandere, verum autem Triticum non absque noxa. Nec absurdè certè Typham quis exile Triticum vocauerit, cum ei, & colore, & densitate, & caliditate sit absimilis. Vtrumque autem semen (inquit Galenus, qui Mnesitheum miratur, quòd quomodo Olyra à Typhis differant, ignoret.) Olyra videlicet ac Typha in Asia est frequens, & potissimum in regione, quæ est supra Pergamum, adèd ut rustici ipsi panibus ex iis factis semper utantur, propterea quòd Triticum omne in oppida comportent. Olyrini sanè, si modò ex bona Olyra fiant, post Triticæ saltem sunt præstantissimi, secundi autè ab his sunt Typhini. Quod si Olyrini ex vitioso semine sunt facti, Typhini non erunt eis inferiores. Calidi verò panes ex laudatissima Typha facti Olyrinis longè sunt præstantiores: asseruati verò deteriores seipsis euadunt. Cum enim massa eorum sit tenax ac ductilis, densatur maiorem in modum: & maximè cum negligenter parati fuerint, adèd ut qui panem huiusmodi, post vnum aut duos dies, ac multò magis sequentes aliquot, comederit, putaturus sit lutum venticulo suo inesse. At calidus adhuc cum est, ab ipsis etià vrbis expetitur, ipsumque cum casco quodam mandunt, quem vernaculo nomine *ἑψέματε* appellant. Porro hunc quoque tenerum esse oportet, & ipsum panem calorem clibani adhuc retinere. Qui certè hunc in modum est paratus, non rusticis modò, sed vrbis quoque hominibus in deliciis habetur. Qui verò trium, quatuorve dierum est vel ipsis rusticis manditur insuavis: præterea concoctu est difficilior, ac tardius per aluum subducitur, quæ calido minimè accidunt: qui tamen ab Hordeaceo, quòd ad deiectionè attinet, multum relinquitur: non tamen in eo adèd, ut Miliaceus, est vituperandus. Quin etiam corpus admodum, dum calidus est, nutrit, ut penè Triticæ syncomisto par sit. Congeritur autem in panes Typhæ semen repurgatum, omnique vsui accommodatur: nam & ex aqua manditur, haud aliter ac vocatum à rusticis *ἀπὸ τῆς ὕδατος*, hepsemate, quòd alii *ἑψέματε* nominant, iniectis nonnunquam etiam cum sale editur.

Ceterum

Typha
redu
comm.

Triticum
prædulce
Hom.

Triticum
caule
Mnesitheii
modum.

Locus

Panes ex
Typha
et deo
asfer-
nandi.

Inter tri-
tici &
Hordei
medicam
ut a.
Ceterum Olyram mediam inter tritici & Hordei naturam possidere, authorem habemus Galenum 8. simpl. med. tam ut nutrimentum, quam ut medicamentum.

Galenus porro differentiam inter Olyram & typham etiam Germanos obiteruasse, ideoque eos, optimam ex Olyra panes Schoenroffen appellasse, prodidit Cornarius.

Ex de Olyra, atque ei simili typha haecenus: nunc eius factitia sequuntur, quae apud Veteres in usu esse solebant, & sunt inter alia, Far & Tragus.

DE FARRE FACTITIO EX VETERIBVS

CAP. VI.

Far, fru-
mentum
naturale.

DE Farre factitio dicturi, Dodonzi historiam ad vnguem obseuabimus. Far, inquit, aliàs naturale frumentum, quod Graecis, ut ostendimus, ζεία & ζεία appellatur, aliàs res factitia artificum & non naturae opus: de illo superioribus capitulis, de factitio vero modo.

Far, facti-
ta res.

Simile autem istud apud Veteres illos Romanos, quos pulce Farracea, non pape, longo tempore vixisse Plinius scribit, ex Farre frumento factam, nomen ipsum & frugi & rei factitiae commune, indicat. Quod inde translatus est, ad cuiusvis frumenti granum, ab utriculis quibus conditur, eo modo, quo Archigenes Far confici tradit, repurgatum, atque in partes contractum. Nam & Far Hordei, Palladius vino conspersum, Phasianorum pullis primis diebus dari praecipit: & Plinius in Aegypto ex Olyra Far confici scriptum reliquit. Modum autem conficiendi Faris, Archigenes apud Aetium Serm. 19. ostendit: ζείον, id est, frumentum, ait, modico tempore aqua madefacto, inde iue extractum ac in pilam coniectum, veluti Pulaniam à cortice repurgato: ubi vero corticem exuerit tollito atque in Sole siccato: deinde manibus trientem, donec penitus à cortice fuerit mundatum, crassissimè molito, ita ut granum vnum in quatuor aut quinque partes redigatur, & sic cum asservato. Porro factitium istud Far, praeterea ex zea siue Farre frumento, plerique nostrae aetatis idem cum Chondro aut Alica esse existimant, similitudine quadam eorum induci: Chondro etenim si nile est, non tamen idcirco idem, veluti ipse Archigenes ostendit, quando Far Chondri modo coqui scribit. Differentiam horum praeparationis modus efficit. Chondrus siquidem gypso arena addita (ut paulò post dicitur) purgatur: Far absque his cum aqua sola. Differt verò etiam ab Halica, Far etenim antiquum, quo Romanorum vetustissimi vixerunt, Halica verò, ut Plinius ait, res noua aetate Magni Pompeii nondum cognita, cui non solum aqua, sed & creta candorem teneritudinemque confert. Differentiam praeterea horum etiam ostendit Trallianus lib. 8. cap. 3. utrisque, ut diuersis utens, & eorum inter se comparationem faciens. Quod autem Germani ac finitimi Frisii, Hollandi, Batavique ex Hordeo & Avena conficiunt, Farri simillimum est, ac eius quoddam genus: Germani Grispert, Hollandi Gort appellant, & ex Hordeo quidem gersene grupen/gersene gort/ex Avena vero habere grupen/habere gort.

Farri conf-
ficiendi
modus.

Farri à
Chondro
et Halica
differentia.

Nomina
Linguarum

Facultate
Chondri.

Ceterum Far quod ex zea factum est, facultate Chondro aut Halica quodammodo simile est, nutrit ea de causa valenter, sed tardius descendit, &

Tom. II.

gruisque concoquitur. Vfus tempore, ut Archigenes tradit, Chondri modo coquitur, & à sanis in cibo sumitur. Pro aegris verò variè apparatus, & epithematis quoque admiscetur. Ex hordeo autem vel Avena Far leuius est, minusque alimenti adfert. Est & Far apud Aetium cognomento Clusinum, non naturale aliquod Far, verum puls quaedam Farracea, de qua Martialis Epigrammaton lib. 13.

Imbue plebeias Clusinis pultribus ollas;
Ut satur in vacuis, dulcia musta bibas.

DE TRAGO.

CAP. VII.

Tragus, ut Dioscorides ait, Chondri similitudinem ac figuram gerit, res quoque factitia. Fieri eum, Galenus in lib. de aliment. facult. ex nobilissima Olyra ait, cum, ut decet, fuerit excoctata: in Comment. verò lib. primi, de ratione vitus in morbis acutis & ζείον, hoc est, ex zea; quarum vique Olyra species est. Cassius Dionysius Tragum ex frumento conficit Alexandrino. Plinius lib. 18. ex tritici semine Pulaniam modo, in Campania duntaxat & Aegypto fieri tradit. In Aegypto autem, cuius celeberrima ciuitas Alexandria, Olyra facilis ferturque: eiusdem lib. cap. 10.

Tragus
quid.

Ex his igitur patet omnia Frumentorum genera, ad Pulaniam modum decorticari ac praeparari solita, & illius, & suam, & eius frumenti, ex quo parantur, appellationem habere: Alicam item & Chondrum, & Tragum similiter inter se confundi: quoniam iuxta Galeni verba, Tragus etiam ex zea fiat, ex qua Dioscorides Chondrum & Alicam facit: & non solum res factitiae nomina inter se communia habent, sed etiam cum suis nativis contunduntur, teste Cornario. Quod igitur Dioscorides dicit tragus figuram Alicae similem esse, sed multò minus quam zeam nutrire, Cornarius ita accipiendum statuit, ut tragus aequè ut Alica ex zea, eadem etiam figuram fiat, sed quia paleas non probè ab ea depurgentur, ideo minus aliat. Ceterum, videtur ipsi quod ζείον apud Hippocratem lib. 1. de Dieta à Trago diuersa non sit. Proinde in sua translatione hunc locum sic reddidit. Trygis, id est, tragus siue Olyra, leuior est tritico, & quae ex ipsa sunt, similiter ut ea quae ex tritico parantur, & magis per aluum secidunt.

Confusio
inter Ali-
cam, Chon-
drum &
Tragum.

Trygi à
quid Hipp.

A Chondro autem, & Alica, & materia, sed potissimum ipsa praeparatione differt: Chondrum siquidem, gypsum & arena perficiunt. Halicam creta emundat, Tragus solà aqua maceratus excorticatur.

A Chondro
et Alica
differentia.

Eius conficiendi modum Cassius tertio de agricul. lib. sic docet. Frumentum Alexandrinum appellatum, maceratur decorticaturque, & in Sole calido siccatur, deinde idem rursus fit, donec ei pellicula & quicquid fibrosum est in frumento delabatur. Appellatur autem tragus iste, subinde cognomento frumentaceus, ad discrimen eiusdem nominis, & animalis, & herbae non quoddam naturale aliquod frumenti genus sit. Nam ut Veterum Autorum testimonio abundè constat, res factitia est.

Conficiendi
modus.

Trago autem Galeno auctore, plerique vtuntur, primum eum in aqua decoquentes, deinde ea effusa, aut yinum dulce, aut mulsum insup-

Mm

dentes, superiniiciunt & nuces pineas aqua prae-
maceratas, donec plurimum intumuerint: multo
tamen minus quam Zea, Dioscorides ait, nu-
trit, eo quod multum palearum habeat. Quare
etiam agre conficitur & aluum mollit.

SECALE

CAP. VIII.

Descriptio



Secale vul-
gare frum-
tum. culmos
tollit altissi-
mos, cōlique-
rigidos, non
sine foliis, quae
prima germi-
natione rubef-
cunt, spica se-
re quadrata,
fusca, aristis
concoloribus
horrida, grana
Triticeis lon-
giora, strigoso-
ra, & intenuis
flauescētia aut
fusca, gluma
exterior ex qua
arista produci-
tur, altera par-

te denticellis rigidiusculis armata est, interior te-
nuior, candidior, lauis. Vstilagini obnoxium est,
rarā formā, fescunciā aut vncias duas longā, tri-
quetra, colore foris ex spadiceo nigricante, intus
cinericeo, modò incuruā, duritie ferē cornea, sa-
pore subdulci insuani.

Olyra Varr. Cordus in Diosc. ait quod si frumentum hoc,
non fuerit Olyra apud Veteres, se ignorare quid
sit.

Farrago. Dodon. gall. refert quibusdam Farraginem di-
ci, non tamen veram esse, ut quae nil aliud quam
Hordeum sit, concludit. Duplicem autem statuit,
maiorē & minorem. In Hist. Frum. & Lat. in fol.
meminit Autumnalis & Aestiuā, ac inter alia Bri-
zam esse putat, cū tamen pro Briza olim longē
aliā habuerit plantam. Verba eius hae sunt:
Plinio Secale est, de quo lib. 18. cap. 16. sic scribit
Rarum dictū, esse aliquid cui pro fit negligentia,
id autem quod Secale & Farrago dicitur, occari
tantūm desiderat. Secale Taurini sub Alpibus A-
siam vocant, deterrimum (sed veridicū aterrimum)
& tantūm ad arcendam famem vtile, fecunda, sed
gracili stipula, nigritia triste, sed pondere prae-
cipuum, & tamen sic quoque ingratiſſimum ventri
est: nascitur qualicunque solo cum centesimo
grano, ipsumque pro latamine est.

Quae Plinij verba frumentum Roſe ac rog-
ge dictum, cum Secali conuenire satis common-
strant. Dicitur autem id, ut Plinius tradit, etiam
Farrago, verūm non secus, quā Far, Hordeum,
Arena, Triticumve, subinde Farragines nominan-
tur, quando videlicet iumentorum, pecūumque
pabulo cedunt.

Farrago siquidem, quam Graeci *ῥαδὴν* appel-
lant, generale nomen est, ad omnem viridem se-
getum herbam, quae pabuli causa seratur. Seritur
ea, excrementis Farris praedensa, admixta ali-
quando & vicia: eadem in Africa fit, ex Hordeo:
Plinius. Atque inde Farrago quod Far sit ferro

caelum, aut quod primum in faracea segete seu
coppum, Varrone auctore dicitur.

Ex Hordeo Farraginem facere docet Columel-
la: Farraginem ait, in restibili stercoreatissimo lo-
co, & altero sulco serere conuenit. Ea sit optima
cū Chanterini Hordei decem modis ingerunt
obseritur, circa æquinoctium Autumnale, sed im-
pendentibus pluuiis, ut confita rigataque imbri-
bus, celeriter prodeat, & confirmetur ante hye-
mis violentiam. Nam frigoribus cū alta pabula
defecerint, ea bubus ceterisque pecudibus, opti-
mē defecta praebetur: & si depascere sapius vo-
les, usque in mensem Majum sufficit. Quod si e-
tiam semen ex ea voles percipere, a Calendis Mar-
tiis pecora depellenda, & ab omni noxa defen-
denda est, ut sit idonea frugibus. Similis ratio A-
lienae, quae Autumno sata, partim creditur in for-
num, vel pabulum, dum adhuc viret: partim semi-
ni custoditur, iam & ex Tritico Farraginem feri
Plinius quoque testatur. Et in Tritici, inquit, ge-
nere, pars aliqua pabuli est, quadrupedum causa
sati: ut Farrago. Absyrus etiam *ῥαδὴν*, id
est, Triticeam Farraginem, equulis maximē pro-
bat: ea si non adsit, *ῥαδὴν*, quam Eumelus ius re-
fert, post trimatum dari solitam. Hoc modo & Se-
cale Farraginis genus est, quando videlicet pecu-
dum iumentorumque per hyemem pabulum
efficitur. Recentiores Roggam Siliginem ferē
interpretantur: quā in re quantum hallucinen-
tur satis apertum est. Nam Siligo candidius ac le-
uius Triticum est, ac tritici, ut inquit Plinius, deli-
tiae, ex qua lauiſſimus panis & pistrinarum opera
laudatissima fiunt, at Secale nigrum est, & ex eo
panis ater, pauperum non lauiorum, mensis ac
cibus dicatur.

In non dissimilem errorem lapsi videntur, qui
Roſe cum Olyra conuenire autumant. Olyra
siquidem candida est, ac vtriculis multis continen-
tur: Secale verò praeter quod nigrum est, glumis
nullis implicatur. Ruellij conjectura plus ve-
risimilitudinis habet, qui Secale a Briza non lon-
gē diffidere credi scribit, atque inde putari no-
men *Bizi panis* in Gallia vulgus manasse. Panis
siquidem ex Secali sit grauis, firmus, concoctus
non facilis, qualem ex Briza fieri Galenus tradit,
& hunc migrum ex Secali panem, extrita litera *r-
pain bizi* Galli nuncupant, sic ut ab inuicem non
diffidere existimari possint, nisi Secalis granum
nudum foret, Briza verò glumis implicitum, quod
hæc inter se differre manifestè ostendit.

Quod verò Briza semen glumis implicetur, ex
his videtur colligendum: tum videlicet, quod
eam Typhae persimilem Galenus scribat, quae
multiplici folliculo conditur: tum etiam quod
membranosa substantiam panis ex ea factus ha-
beat, ex ipsorum nempe folliculorum admixtio-
ne, contra planè quā Secalinus, qui Triticeo
syncomisto membranas ac fursures vel pauciores
vel non plures habere comperitur.

Secale autem ut medicamentum, Tritico in ca-
lesfaciendo ac digerendo potentius est. Panis ex
hoc aut fermentum, promptius ac citius absces-
sus maturant & rumpunt, quā ex Tritico facta.
Farina confusanea, diuturniores capitis dolores
lenit, in lenteo capiti circumligata.

Porro Secale proximum inter frumenta a Tri-
tico Triticeisque seminibus locum habet. Panis
ex eo factus, lentoris atque obstruentis naturae
non nihil obtinet, difficulter concoquitur, ac ven-
triculo grauis est, praesertim si fursurum expertus
fuerit. Nam confusaneus, qui simul omnia recipit
ac ex tota farina concinnatus est, si probè coctus
beno-

Farrago
Tritici.Secale qui
modo Far-
raginis ge-
nus.
Recentior
lappus.Briza olim
quorundam
Olyram
Secale con-
fundunt.De Briza
Ruellij.Briza &
Roſe.

Panis.

Bemq; fermentatus fuerit, minus lentus est, non
modum agrè conficitur, citòque descendit:
non dum tamen Tritico syncornisto par, quo
gravior & concoctu difficilior etiamnum est. Ali-
mentum autem corpori solidum, ac firmum præ-
stat, nec mali succi, si ex bono frumento coctus
fuerit, ex malo autem frumento & corrupto
paratus, prauos & corruptos succos ingene-
rat, & diuturniores morbos procreat, veluti
morbum, Germanis Scorbutus aut Scorbutus,
dictum. Admiscetur huic non rarè Triticum, ut
leniorem gratioremque panem efficiat, qui Se-
calino puro minus gravis ac lentus est, & teneri-
tudinem suam Triticeo diutius retinet.

Synonyma Lobelius in Adu. Secale distinguit in Vernum,
& autumnale. Tragus in hybernium & ætium:
asserit autem esse Olyram Theophrasti & Dio-
skoridis. Siliginem Veterum ac Secalen, nec non
Triticum secundum Columellam. Fuchsius contrà,
eos magno in errore versari scribit, qui hoc fru-
menti genus Siliginem esse existimant.

Secale C. Bauhinus, duplex ait, stationis tempo-
re & magnitudine destinatum. Secale quidem
Hybernium vel maius [quod primum in phyt. se-
cundum autem in pin. ait] dicitur Siligo, Brunf.
Lon. Veterum & Secale Trag. Secale Matth. Dod.
Gall. [quibusdam Farrago, non tamen est vera
Farrago, quæ nil aliud est quàm Hordeum] Fuchf.
Lob. Tab. G. Secale & Farrago Plinii, Dod. Tiph-
cerealis & Tiphæ Theophrasti, Portæ. Vernum
vel minus [quod 2. Phyt. 1. pin.] est Siligo æstiva,
Trag. Secale alterum, Lugd. Rogga siue secale æ-
stivum, Dod.

**Nomina
hæc.**

Germani Roeken, & Roekenforn: Belgæ Rog-
ge vocant: Galli Seigle & Segle: Itali Segala:
Hispani Centens & Sentena.

**Locus &
tempus.**

Nascitur cùm in Germania ac apud alias Natio-
nes plurimas, præsertim Septentrioni subiectas,
tùm in Belgio omnibus ferè agris tam sterilibus
quàm lætis, veluti in Brabantia campania, quæ
hoc frumentum, licet arida ac sterilis, feliciter
progignit. Qualicumque enim solo prouenit,
quantumvis rigenti, gracili, aut arido, fecundio-
re tamen ac latiore melius præstantiusque. Seritur
Autumno, quod & lætius, item & Vere: Ac-
stivum, altero gracilius, paucioribus culmis, spica
breuiore ac tenuiore, granoque leuiore. In Pas-
sauani Principis & Abb. Murbac. ditionib. obser-
uauit spicam Secalis inusitata magnitudinis, vet-
ustum multorum, granorumque supra sortem vul-
garem copiosorum, & glumis spontè dehiscen-
tibus, vel citra triturationem, excidentium.

SECALE LATIFOLIA C. BAVHINI.

Descriptio

Culmis Secali primo siue latifolio [ut in pin.
vocat] in prodromo descripto, exurgit can-
dicantibus, rotundis, striatis, quibus spica pal-
mum longa, crassa, aristis longissimis, & ut in vul-
gari tenuissimis denticulis exasperatis armata, in-
cludet: folia habet cubitum longa, vnciam lata, &
per marginem leuiter exasperata, grana non vidi-
mus, spicam & folia ex horto Nobiliss. Contarenti,
Senatoris Veneti, habemus.

SECALE LUXURIANS C. BAVHINI

QVID?

**Quæ-
stio.**

Secale 4 siue luxurians [ut in pin. ait] est Cla-
ui-Siliginis Lon. Secalis mater, Thall. tit. de gra-
Tom. II.

mine. An Plin. lib. 18. cap. 17. de hoc intelligendus,
dum scribit: Inter vitia legetum & luxuria est,
cùm onerata fertilitate procumbunt: alii volunt
Plinium intelligere id, quod Theophr. 2. hist. quæ-
stionibus, insanam foliorum luxuriam, vocavit.

Cæterum de Secalis matre hæc dixisse videtur
Thal. Reperitur in Hærcinia Festuca tertiz seu
gramineæ nemoralis species media, radicibus ge-
niculatis, minoribus, densa capillaceorum cirro-
rum congerie præcinctis, foliis pluribus, angustis,
palmo longioribus, parum pilosis, culmis cubita-
libus & longioribus, interdum bicubitalibus,
crassioribus, minoribus verò iam memoratæ spe-
ciei, paulò tamen tenuioribus quàm festuca ne-
moralis maioris, propè radicem bina ternæve ge-
nicula habentibus, reliqua autem serie [qua vs-
que, in summum fastigium prorsus destituitur ge-
niculis] iubatam spicam continentibus, oblon-
gam, sed primæ speciei tenuiorem, rariorem, vtri-
culis tamen eiusdem paulò maioribus constan-
tem, nec ita splendentem, ut in illa. Spica ubi de-
floruerit, frumenti alicuius generis imitatur, ut po-
te Secalen, vel aliud simile. Frequens est in mon-
tibus aridioribus passim, ac secus vias. Videtur
verò hoc genus vitium esse Secalis. Ac, sicuti sæ-
pius in Secale nostra accidit, ut aristæ quædam,
postquam flores deciderunt, ac semina iam au-
gmenta suscipere incipiunt, vitium aliquod in
granis contrahant: fortè maior succi copia, quàm
ad grani instum alimentum opus est, attrahitur, ut
ita necesse sit, corticem adhuc tenerum rumpi, &
ita internam substantiam in maiorem molem au-
geri, ac à seruore Solis & ambiente in circumse-
rentia sua affici. Tunc enim videmus quædam se-
mina longius ex suis vtriculis seu glumis proten-
di, ac in mediocrem etiam crassitiem excrecere,
nigrumque colorem foris contrahere, intus can-
dida farina densioris materis constantia. In Thu-
ringia vulgò vocatur vitium hoc genus mater Seca-
lis, Roekenmutter. [Vtuntur etiam eo ad sisten-
dum sanguinem.] Eodem, inquam, modo vitii id
anno 75. in hac festuca Secalina obseruauit. Repe-
ri enim in montibus quibusdam Stolbergæ huius
plures spicas, non vnum eiusmodi vitiosum gra-
num oblongum, nigrum, continentes, sed plura,
eaque maxima ex parte in corniculi modum re-
curua. Verùm tempore florescentiæ ipsius anno
illo copiosæ erant pluuie & postea succedebat ca-
lor Solis feruidior. Potrè si quis singula velit ad
amissum examinare, facillimè differentia maioris
& minoris esset reperiri, solummodò discrimine
in spica vel longiore vel breuiore confuturo.

**Locus &
tempus.**

Descriptio

Secalis mater.

NACHANI GARCIE.

CAP. IX.

Nachani Garcie sementis nigra & minuta, sa-
pore secales, conficiendis panibus apta, et-
iam meminit is, teste Clusio, qui naufragium Na-
uis Sancti Benedicti nomine, quæ paulò supra
Promontorium Bonæ spei ad scopulos allisa est,
descripsit, aitque Sinapi similem esse, sed nigrio-
rem, cuius farina in panes orbiculares subacta
velociter tota illa Aethiopia ora maritima, præ-
sertim inter A. S. Christophori, & eum qui à S. Lu-
cia nomen accepit.

**Sinapi si-
militudo.**

Synonyma


C. Bauh. pin. Secale 5 siue Secali affinis peregrina,
Nachani Garcia, Secales peregrinum genus
n. Lugd.

VSTILAGO.

CAP. X.

Descriptio

Segetum siue frugum, praesertim spicatarum, maximè Auenæ & Secales, Dodonæo Auenæ



& Tritici vitium est. Vstilago [*epurum*, Rubigo vertit Gaza apud Theoph. 8. hist. cap. 10.] ubi in spicam abit culmus apparet solita, si pluvia madens incerti Solis sentiat feruidiores radios: culmo, foliove neutiquam degenerante, sed granis in fuscū fuliginosum puluisculum commutatis, qui vel solus

vel salius, liquorēve subactus, eiusmodi colore cutum inicit. C. Bauh. pin. triplicem Vstilaginem nominat. 1. Vstilago secales. Vstilago, Trag. Dod. [cui Auenæ ac Tritici propriè morbus] Lon.

Synonyma


Lob. Lugd. [cui praesertim Auenæ pestis est.] Vstilago secalina, Tab. 11. Vstilago hordei, Vstilago polystichi, & Vstilago hordei dystichi, Lob. icon. Vstilago hordeacea, Tab. 111. Vstilago Auenæ: & Lob. icō. Vstilago Auenacea, Tab.

De Vstilagine, quam Germani vulgò Brande vocat: hæc Theophrastus loco citato,

prodit. Rubigines frumentacea magis, quàm Leguminosa: & inter frumentacea hordeum magis, quàm Triticum sentit, & inter hordea aliud plūs, aliud minūs, sed præcipuè dixerim achilleis. Nec segetum sirus, naturæque parum refert: tractus enim excelsi, perflatique, rubiginem nullam, aut minimam sentiunt. Concaui & flatibus nullis expositi contra frequentissimam habent: gignitur hæc plenilunio. Libro autem causar. 3. cap. 27. sub æruginis [ut Gaza interpretatur] nomenclatione de eadem sic tribit: Semina quoque ad fertilitatem idonea, & vitia quæ accidunt solent, haud ignorare oportet. Locis enim cauis & à flatu silentibus segetes ærugine infestantur: aufugiunt hoc vitium quæ stant non erecto, sed paruo cacumine. Quamobrem spicam inclinari vtile est, ut imbres decidant, nec rores excipi possint.

Inclinantur magis quæ longæ sint: manent erectius latæ ac breues: quo fit, ut istæ ærugines sentiant. Iuuat & multò à foliis spicam distare, humor enim in foliis magis concipitur. Iraque si propinqua sit, tangitur statim: si remota, non æquè inhiat. Quamobrem hordeum achilleis votatum, æruginosum, tam nigrum quàm candidum est, spicam enim gerit erectam. Contrà genus, quod eteocritum vocamus, quia incurvatur, ab ærugine innoxium est. Segetes vento expositæ minūs ærugine infestantur, motus enim humorem discutit. Nam & cum post imbrem flatus secutus, & non deinde successerit, ærugo minūs constitit. Flatus enim humorem denicit, & Sol paululū immoratus nullam putredinem conficit, sed prius quàm quicquam emarcescat, humor totus assiccatur atque absumitur: ærugo autem quædam putredo est, nec putridum esse quicquam potest sine alieno calore. Triticum plenilunio potissimū ærugine capit: ratio in calore est, quo etiam noctu Luna putrefacere potest. Infirmita, fragiliora sunt omnia [ut simpliciter loquar] alba quàm nigra, tam in plantis, quàm in animalium genere. Igitur quod semina locis conuenienter eligi debeant, plerisque rationibus constat. Morbi autem [ut in summa dixerim] omnibus ob alimenti cæque temperiem eueniunt: videlicet cum plūs, minūsve alimenti præbetur, aut ær immodicè humidus, siccusve est, vel etiam cum non tempestiue humescit.

Cælestis frugum vinearumque malum, nullò minūs noxium rubigine dixit Plinius lib. 18. cap. 17. Frequentissimam autem hanc in roscido tractu, conuallibusque ac perflatum non habentibus: E diuerso carete eā ventosa & excelsa. Capite 28. hæc subdit. Plerique dixerunt rorem inustum Sole acri, frugibus rubiginis causam esse, & carbunculi vitibus. Quod ex parte falsum arbitror, omnemque vredinem frigore tantum constare Sole innoxio. Id manifestum fiet attendentibus. Nam primū omnium non hoc euenire, nisi noctibus & ante Solis ardorem, deprehenditur, totumque Lunari ratione constat: quoniam talis iniuria non fit nisi interlunio, plenæve Luna, hoc est prævalente: utroque enim habitu plena est, ut sapius diximus. Sed interlunio omne lumen, quod à Sole accepit, calo regit. Differentia utriusque habitus magna, sed manifesta. Namque interlunio æstate calidissima est, hyeme gelida. E diuerso in plenilunio æstate gelidas facit noctes, hyeme tepidas. Causa euidens, sed alia redditur à Fabiano, Græcisque autoribus. Aestate enim interlunio necesse est cum Sole nobis proximo circulo currat, igne eius cominus recepto candens: eademque interlunio absit hyeme, quando abscedit & Sol. Item plenilunio æstiuo procul abeat aduersa Soli: hyeme autem ad nos per æstiuum circulum accedat. Ergo per se roscida quoties alget, infitum quantum illo tempore cadentes pruinas congelat. Ante omnia autem duo genera esse cælestis iniuriæ meminisse debemus. Vnum quod tempestates vocamus, in quibus grandines, procellæ, cæteræque similia intelliguntur, quæ cum acciderint [vis maior in frugibus & terræ fructibus diuina Vlpiano dicitur. ff. de damno infecto. l. fluminum [vitium autem. Eidem calamitosa tempestas. ff. de loc. & cond. l. ex conducto, eod. titul. Causa exponit *τὸ θεῖον*. Porro calamitosam grandinem à dæmonibus immitti scribit Theophr. cap. 9. lib. 5. causis.] vis maior appellatur. Hæc ab horridis syderibus exeunt, ut sapius diximus, veluti Arcturo, Orione, Hoedis. Alia sunt



De Vstilagine, quam Germani vulgò Brande vocat: hæc Theophrastus loco citato,

Plenilunio gignitur.

Segetes vento expositæ minūs ærugine infestantur, motus enim humorem discutit.

Rubiginis causa, ut dicitur, est calor.

Causa iniuriæ, ut dicitur, est calor.

Hordeum, quæ silente celo serenisque noctibus
fructu, nullo sentiente, nisi cum facta sunt. Publica
hæc & magnæ differentie à prioribus, aliis rubigi-
nem, aliis vredinem, aliis [Caniculam legit Tur-
nebus cap. 23. lib. 24. Adversus. eamque interpreta-
tur syderationem & carbunculacionem, quæ facta
assantur, & ad sterilitatem castrantur, cum cani-
culas sana menses coquat, æstuososque impetu
suo omnia torreat.] carbunculum appellantibus,
omnibus vero sterilitatem. Ex hæc Plinius, de
quibus eandemque causis fusiis capite sequenti,
scilicet scripsit, quæ hic subdere nimis tardiosum for-
et foret.

Tempus

Cæterum nascitur Vtilago Aprilis & Maio men-
sis, cum cæli tempestas crebro inconstans, a-
liis imbuta, aliis serena, seruens fuerit, tunc e-
nim spica humore madida, & solis feruore cor-
rumpitur, ac quodam modo, ut aiunt, adurun-
tur.

HORDEVM VETERIBVS ET NEOTERI- CIS IN GENERE.

CAP. XL

Def. Hor-
deum 1.
Hordei à
Tritico
differentia
Theophr.

Dioscorides vnus duntaxat Hordei meminit:
Dat Theophrastus lib. 8. hist. cap. 4. plures e-
ius differentias & genera recenset. Hordeum, in-
quit, latiori folio quam Triticum conditur, nec
tenuis integitur, sed nudum consistit: hoc enim
omnium maximè caret tegumento. Quin etiam
caulus breuior hordeo, quam Tritico est, & spica
minùs discreta à foliis emicat. Palea quoque in-
ferior, quæ ex hordeo, quam quæ ex Tritico,
repote quæ minùs succi retineat, & durior sit. Ad
hæc Hordeum à Tritico differt, quod hordeum in
terris spicatur, triticum nullo versu conditum
est, sed æquale vndique constat. Genus totum ad
genera tales ingerit differentias. Rursus eorum v-
trumque in plura genera ipsis etiam fructibus, &
spicis & reliquis formis atque etiam viribus affe-
ctionibusque discreta, diuidi sanè potest. Est e-
nim in hordei genere aliud binis versibus, aliud
ternis, quaternis, cumque plurimum senis, est e-
nim vel huiusmodi quoddam genus. Quod verò
pluribus construitur versibus, hoc semper ferè
spissius, positiusque arctius constat: Magnam &
Indicem differentiam facit, quandoquidem ramis
natum sit brachiani, ut proposui. Et spicæ verò a-
liis grandiores, ratioreque constant: aliis mino-
res, frequentioresque, & aliis distantiores à foliis,
aliis proximiores, ut achilleis cognomine. Et hor-
deorum ipsorum aliud rotundius, minùsque: a-
liud oblongius, maiùsque, atque in spica rarius.
Item aliud candidum, aliud accedens ad purpu-
ram, quod & farinam reddere copiosius creditur:
& contra hyemem, & flatum, & in totum contra
cæli mutationes candido validius esse videtur.
Theophrastus Hordeum autem ad purpu-
ram accedens, in India Occidentali, semine ex
Hispania delato, fecundius & vberius nascitur, ut
habetur in Hist. Ind. Occid. parte 9. cap. 31.

Hordei dif-
ferentia

Hordeum
hexastichum,
hoc canthi-
num.

Columella lib. 2. cap. 9. Hordei duo genera tra-
dit. Est, inquit, hordeum, quod rustici hexasti-
cum, quidam etiam Cantherinum appellant, quo-
niam & alia animalia, quæ ruri sunt, melius quam
Triticum, & hominem salubrius, quam malum
triticum pascit. Nec aliud in egenis rebus magis
inopiam defendit. Seritur soluta siccaque terra, &
vel prænalida, vel exili, quia constat arua segeti-
bus eius marcescere, propter quod pinguius

agro, cuius nimis viribus necesse non possit, aut
macro, cui nihil aliud committitur. Altero sulco
seminari debet post æquinoctium media ferè se-
menti, sexto solo, si gracili maturitas. Iugerum
quinque modii occupabunt. Idque ubi paulum
maturuerit, festinantius quam vllam aliud fru-
mentum demetendum erit. Nam & fragili culmo,
& nullà vestitum palea gratum eius celeriter de-
cidit, iisdemque de caulibus facilius teritur; quam
cætera. Sed cum eius messem fastuleris, optimum
est noualia pati anno cessare, si minus stercore
saturare, & omne virus, quod adhuc inest terræ,
propellare: alterum quoque genus ordei est,
quod alii distichum, galathicum nonnulli vocant,
ponderis & candoris eximii, adeo ut tritico mi-
nus egregia cibaria familie præbeat. Seritur
quam pinguius, sed frigidis locis circa Mar-
tium mentem. Melius tamen respondet, si ele-
mentia hyemis permittit, cum seminatur circa I-
dus Ianuarias. Iugerum sex modios postulat.

Gratum
decidit.

Hordei alio-
rum Galati-
cium.

Sationis
tempus
Palladio.

Palladius Ordeum galathicum, quod graue &
candidum ait, serendum præcipit locis frigidis cir-
ca Martias Calendas. Cantherinum verò Octobris
macrâ & sicca terrâ, vel multum pingui.

Frum. hy-
bernium
Plinio.

Plinius lib. 18. cap. 7. Hordeum inter frugum
genera recensens, frumentum constituit hyber-
num, ut quod circa Vergiliarum occasum (No-
uembri) satum terrâ per hyemem nutriatur. Mul-
tis radicatur fibris, sine ramis: erumpit à primo
satu die septimo. Ex eo autem alterum caput
grani in radicem exit, alterum in herbam, quæ &
prior floret. Radicem crassior pars grani fundit;
tenuior florem, fructus spicis continetur, muni-
turque vallo aristarum quadruplici: genicula hor-
deo sunt octona, nec ante dictum geniculorum
numerus conceptus est spicæ, qui ut spem sui fe-
cit, quatuor aut quinque tardissime diebus flore-

Hordei di-
plex.

re incipit, septemque tardissime deflorescit. Hor-
deum vtrumque [distichon & polystichon: vel
nudum quod *γυμνόν*, & gluma sua vestitum,
intelligit Dalech.] & quicquid in stipula est, in
cacumine vnum solum habet, & quidem sca-
brum, ut reliqua: cum defloruit, crassescit, matura-
turque cum plurimum diebus quadraginta: In
Aegypto sexto à satum mense metitur, in Ællade
septimo, in Peloponneso octauo. Hordeum maxi-
mè nudum: ei calamus humilior, quam Frumen-
to, arista verò mordacior. In arca extefitur. Lenis-
simum ex frugibus hordeum: primum & omni-
bus frumentis sentitur. Indis satuum & syluestre,

Lenissimū
ex frugibus

ex quo panis apud eos præcipuus. Spicæ quædam
[Distichi hordei.] binos ordines habent: quæ-
dam [polystichi. Cantherium Columella vocat,
Dal.] plures vsque ad tenos. Grano ipsi aliquot
differentie, longius, leniusque, aut breuius, aut
rotundius, candidius, nigrius, vel cui purpura est.

Differentia

Vltimo ad polentam, contra tempestates candi-
do maxima infirmitas. Hordeum frugum omnium
mollissimum est: feri non vult, nisi in sicca & solu-
ta terra, ac nisi laxa: ex omni frumento minime
calamitosum, quia tollitur antequam Triticum
occupet rubigo. Hordeum sarculo [Hordeum sac-
culo, legit Turnebus c. 14. lib. 1. Adversus. quod non
tibariis, ut Triticum, sed loculis feratur, & foris
vendatur. Alii legunt, seculo, quia *σάκος*, id
est, alendis pascendisque animalibus gratum. Co-
lumbella cap. 9. lib. 2. hordeum altero sulco semina-
ri tradit. Ex illo autore videtur hæc lineâ transcri-
pta. Sarculo, interpretor, terra leniusque mora, &
tantum suspensa, ut sit sarriendo.] feri dicunt,
propterea celerissime rodit, fertilissimumque: quod
in Hispania Carthagine Aprilis mense collectum

Atollissimū
mollissimum.

Ad inueni-
endam calamitosam.

Fertillissimū
mollissimum.

est, hoc feritur eodem mense in Celtiberia: eodemque anno bis nascitur. Rapiunt omne à prima statim maturitate festinantius quàm cetera. Fragili enim stipula & tenuissima paleastrum continetur. Hordeum festuca enecat (pergit c. 17.) quæ vocatur xgilops: Catonis sententia est, feri in nouali & in aruo, quod restibile possit fieri, & loco temperato. cap. 24. Virgilius inter Equinoctium Autumni & Brumam feri iubet. Serere in iugero temperati soli iustum est modios decem.

Hordeum abque semine, & cortice. Cardanus refert in Atholia Scotiz regione Hordeum abque semine produci: in Cappadocia verò sine cortice.

Hordeum salutare hominibus, mortale sub equo canibus. Aristoteles de mirab. author est circa Scytharum & Medorum dictam Thraciz regionem, locum esse viginti ferè stadiorum spacio, qui Hordeum producat, quo homines vescantur: equi verò & boues abstineant: imò sues etiam & canes excrementa hominum, qui mazam aut panem ex Hordeo illo comederint, auersentur, tanquam mortis periculo.

Genera duo Ruch. He. nasticum. Ruellius ex rusticorum obseruatione Hordei duo genera memorat, hexastichum, quod quoddam cantherinum appellare refert, quod folliculo castratum enascatur: Gallos, qui hoc ferunt, mundum vocare ait Hordeum, quod sponte granum glumâ concidat, cum in reliquo non nisi ægrè deglubatur.

Mundum. Alterum distichum statuit, quod Galathicum nonnullos nominare scribit, pondens & candoris eximij, aded ut Tritico mistum egregia cibaria familiarum præbeat. Alibi tamen Oryzam Hordeum galathicum ab aliquibus appellari tradit.

Distichum. Ad hoc genus reducendum putat trimestre quoddam Hordeum, quod gallicè *secourgeon* dici narrat, quod rebus ad egestatem adductis, cum annonæ premit penuria, plebem alat & à famis noxa vindicat.

Trimestre. Errare autem eos addit, qui secundum hoc genus Orizam esse interpretentur. Nominat & Eteocriton genus Hordei quod tutum à rubigine sit, quoniam incutuum nascatur.

Error aliorum. Ceterum, Hordeo plures senis spicatum versus Theophrastum secutus, falsò denegat. Cui porro spica folio perquam proxima est, amplitudinis & crassitudinis maioris, & ob id propensius obnoxium ærugini, hoc Achilleis à Theophrasto, & Achilleas ab Hippocrate cognominari contendit. Omnia autem eo capite confundit.

Ruch. hal. loricat. Corn. Tragus, Fuchsius & H. Lugd. Hordei duo genera assignant, quæ in hunc modum discernunt. Maius, polypticum dicitur, Germ. *grosgersten* / Gall. *Orge à plusieurs rans*, quia in multos versus spicatur. Sunt enim ex hoc genere, quæ spicâ tribus, interdum quatuor, nunc sex, nunc octo versibus distinctam proferunt.

Achilleas. Alterum Distichum, vulgare sc. & exiguum. Germ. *Hein Gersien* / Gall. nunc *Pomyle*, nunc simpliciter *Orge*, nunc *Orge à deux rans*, quod sc. in duos duntaxat versus spicetur. Hoc vere, illud ante Hiemem feritur.

Genera duo multis. Dodon. Latinus in Hordei genere, quod pluribus versibus spicatur, *polypteron* appellat. Quod sex versuum *hexapeton*: Cantherinum hoc Columellæ ait, Aliud duorum versuum, *diapeton*, Columellæ Galathicum, Germ. *futer gersten*. Quod magnum & plenum, spicamque gerit erectam, Hippocratis, ærugini obnoxium: quod verò incuratur, *epicypetron*, ab ærugine minus infestatur.

Meminit præter hæc, & hordei trimestris, Secourgeon gallicè dicti: item & hordei Gallicè mundi, grano nudo quod

Hordei mundi. *Hordei mundi.* Galen. de alim. facult.

Hordei mundi. *Hordei mundi.* Galen. de alim. facult.

Hordei mundi. *Hordei mundi.* Galen. de alim. facult.

esse suspicatur.

Vniuersæ Europæ, & multo vfu notissimum Hordeum, Lobelius in Adv. variare scribit ma. *Hordei mundi.* gnitudine, colore, spica, gluma, versu, satione, proventu, & vfu. Nam, ut ait, culmis procerioribus è grano pleniore, maiore, coloreque rubello prouenit. Sed insignior differentia est in glabritie, nuditateve grani. Siquidem oritur hordeum, aut follicello pertinaci adhæsu granum sepiente, aut leuiore gluma & exutu facili, cuiusmodi est illud genus quod nudum vocatur vulgò. Notissimum nostras quod à sementis occasione in Autumnale & Vernali diuiditur. quippe illud pinguiori vnaucto, vel restibili mandant, eoque corpulentius maiusque stipulâ & spicâ euadit. Vernali verò, ut minore perficitur spatio, sic minus granum minusque alens è graciliore turo stipula tum spica promit: proportionem quadam cum Siligine trimestri. Alimentis & medicatis cibis plurima commendatio: deglubitum maxima vi vernali fertur hodie è Germania superiore in Belgicâ, Angliamque Septentrionales plagas, omnino glumis nudatum, quod *mundatum* vocant, Reliquæ Galliz officinæ ligneo pistillo effusa seruida pauca, mortarioque inditum, hordeum leniter tundendo tunicis paleacis exunt, mundumque vocitant, ad psillanem, sorbitiunculas, aliaque puliculas, ægris non parum accommodas faciendas. Est illud mansu suauius, albidum, pellucidum, & transparens, minusque vtrumque quam triticum viscidum, minusque vel calidum, vel pingue. Eoque pleureticis & Hepaticis multò vtilius. Nam potionibus diurnis diuturnisque temetis, cuiusmodi Galliz quædam pars infector aut Germania, Ruscia, Flandria, Anglia, Hybernia, Moscouia, Nortuegia, & Suecia potat, ceteraque gentes ad Septentrionem, non exiunt: sed triduum integris granis maceratur ad *Staph.* confectionem. Ut in *Byera*, *Zytho*, *Curmi* & ceteris temetis latius dicturi sumus.

In Adversariorum altera parte Hordeum distinguit in distichon & polypticum. Hoc iterum diuidit in Autumnale & Vernali. Nominat præterea Hordeum spica mutica, Borealibus Britannis *Barly* simpliciter vocatum, quod nunquam vidit.

Cæsalp. de Hordei differentiis agens, nobis *Cæsalp. de Hordei differentiis.* admodum obscurus apparet. Hordeum, inquit, semen est in medio crassum, & rotundum, vtriusque extremis in acutum desinentibus, cortice potius quàm folliculo inclusum: adhæret enim semini, ut cum labore auellatur: ponuntur semina in spica nulla alia protegente membrana, idè nuda videntur ut Speltæ: & similiter in acutam desinunt, longam, & asperam, aliquando binis versibus, ut vnicum vtriusque semen ordine procedat: longissima spica, quod genus *Ordeum* vulgò appellant: in montibus & locis fugidis, satam, breuiori grano, ac rotundiori, candido, quo pro Farre vtuntur. Ad hoc genus referri videtur de quo abhi ait, qui Zea vtuntur non habent Far per Zeam intelligit, quæ in Campasia semen appellatur, ex qua fit alica. Alterum genus Hordei similem spicam fert paulò breuiorem, granis tenuibus, vtriusque alternatim ad latera inclinantibus, ut in Spelta, in montibus Lucensibus *Scandellam* vocant, ex qua panes faciunt reliquo Hordeo meliores: sed iumentis noxia est: nam aluum turbat. Galenus fortè hæc genera Hordei inter Olyras recensuit. Dioscorides Tragum inter fruges (nam & alia est Tragos inter herbas medicas Scorpis cognominata) Chondro simili-

Farina. ca & Africa genus, ex quo fiat, hordei, glabrum [*Hordeum* Græci. Dal.] appellat Turannius. Apud nos hordei farina & ad medendum vtuntur. Mirumque, in vfu iumentorum ignibus durato, ac postea molito, ossisque humana manu demissis in aluum, maiores vires, totisque corporis fieri.

Palea. Palea ex optimis: stramentum verò nullum comparatur. Meliorem etiam Polentam fieri tradunt, si non excocta maturitate tollatur. De ipsa ratione pisendi, Magonis proponitur sententia. Hordeum ante perfundi aqua multa iubet, postea eualli, deinde Sole siccatum pilo repeti. Huius sextarios viginti spargi duobus sextariis aquæ. Paleam calidam imponi ramicum incommodis experti iubent, quaque decocta est aqua foueri.

Farina & Jus & Vinum. Hordeaceus panis Erulia aut Cicerula olim fermentabatur. Farina ex Hordeo & cruda & decocta collectiones impetusque [humorum fluentium impressiones & incurfus] discutit, lenit & concoquit. Decoquitur aliàs in multa aqua, aut fco sicca. Ad iccinoris dolores eam cum posca concoqui opus est, aut cum vino. Cum verò inter coquendum discutiendumque cura est, tunc in aceto melius aut in face aceti, aut in coconeis pyrisue decoctis. Ad multipedarum [Scolopendrarum] morsus cum melle, ad serpentium in aceto, & contra suppurantia, ad extrahendas suppuraciones [Galenus lib. 2. ad Glau. cataplasmate ex hordeacea farina parato discuti posse tumores suppuratos pollicetur, si exiguum pus est, si cuti vicinum, si tenue] ex posca addita resina & galla. Ad concoctiones verò & hulcera vetera, cum resina. Ad duritias cum fimo columbarum, aut fco sicca, aut cinere. Ad neruorum inflammationes aut intestinorum, vel laterum, vel virilium dolores, cum papauere aut meliloto, & quoties ab ossibus caro recedit. Ad strumas cum pice & impubis pueri vrina. Cum oleo & fenogrecæ contra tumores præcordiorum, vel in febribus cum melle vel adipe vetusto. Suppuratis triticea farina multò lenior [ad concoquendum humore, & dolorem mitigandam aptior.] Neruis cum hyoscyami succo illinitur: ex aceto & melle lentigini.

Palea & Farina hordei distat. De Polentæ generibus in frugum loco satis diximus, locorum ratione [quoniam eo loco de Hordeo tractaretur, & eodem loco etiam conueniebat de iis quæ sunt ex hordeo sermonem haberi.] A farina hordei distat eò quoddam torretur, ob id stomacho vtilis. Aluum sistit, impetusque rubicundi tumoris. Et oculis illinitur, & capitis dolori cum menta [melle aut aliqua refrigerante herba. Item perionibus & serpentium plagis: item ambustis ex vino. Inhibet quoque pustulas. Farina in pollinem subacta, vim extrahendi humoris habet: idè & cruore suffusus in fascias usque sanguinem perducit, efficacius in sapa. Imponitur & pedum callo clauisque. Nam cum oleo vetere ac pice decocto polline, condylomata, & alia omnia sedis vitia quàm maximè calido mirabilem in modum curantur. Pulte corpus augetur. Farina, qua chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus datur tepida sorbenda efficaciter. Hordeum optimum quod candidissimum. Succus decocti in aqua celesti digeritur in panibus quæ recedunt ab ossibus, & eruptionibus pituitæ, muris araneis morfib. Idem asperso sale ac melle, candorem dentibus, & suauitatem oris facit. Eos qui pane hordeaceo vtuntur, morbo pedum tentari negant. Nouemque granis si surunculum quis circumducatur, singulariter, manu sinistra, & omnia in ignem

abiciat, confestim sanari aiunt

Hippocrates, multò plura de ptisana in libro de ratione victus in morbis acutis, qui liber de ptisana inscribitur, quàm ipse Plinius, à quo citatur, prodidit, his verbis. Rectè omnibus frumentaceis eduleis præfertur in morbis acutis. Lando sanè eos qui ipsam prætulerunt. Nam lentor ipsius lenis est, & continuus, & incundus, & lubricus: ea verò moderatè humida sitim adimit, & facile eluitur, si sortè & hoc opus sit: & neque adstrictionem habet, neque malam turbationem, neque in ventre intumescit. Intumuit enim in coctura, quàm maximè tumescere solet. Quoniam igitur ptisana in his morbis vtuntur, nulla die vasa vacua fieri permittant, vt ita dicam, sed vtantur & intermittant, si non ob id medicamentum, aut infusi per Clysterem vsum, intermittere oporteat. Et qui bis quidem in die cibum capere soliti sunt, eis bis danda est. Verùm si progressu facto, si fieri poterit etiam bis bis datur, si sanè opus habere visum fuerit. Ptisanam porro ex optimo Hordeo factam esse oportet, & quàm optimè coctam, & præsertim, si non solo succo vti velis. Nam vnà cum reliqua ptisana virtute, lubricus lentor facit vt Hordeum decoctum non lædat. Nusquam enim adhæret, neque secundum thoracis reclinat moram habet. Lubrica verò maximè est, promptissimè sitim eximit, facillimè concoquitur: & debilissima est optimè cocta, quibus omnibus opus est: *Hæc Hipp.*

Quoquo modo Hordeum paraueris inquit lib. 1. Alim. Galenus, nunquam corpus calefacit, sed variè pro modo preparationis humectat ac siccat, quandoquidem Polenta ex fixo Hordeo facta, siccare perspicuè cernitur, ptisana verò humectat præcipuè quum vt decet, parata fuerit hoc est, cum in coctione quamplurimum intumuerit, postea igne lento per multum otium in chylum siue cremorem fuerit redacta. Acetum ei tum admiscetur, cum planè intumuerit. Cum verò cocta exactè fuerit, sub edendi tempus saltem tenuem iniicere oportet. Oleum autem si intus statim inieceris, coctioni nihil nocueris. Aliud tamen nihil est miscendum, nisi velis anethum, aut porri quippiam, idque initio statim immiscere. Video autem ptisanam à coccis omnibus pessimè præparari: In mortario namque crudam ipsam tundentes, non ad ignem coquentes dissolunt. Sunt qui Amylum etiam iniiciunt, vt per coctionem in cremorem copiosum videatur esse redacta. Talis certè ptisana meritò maximè est est statuosa, & concoctu admodum difficilis. Quæ verò in ptisana rectè præparanda prætermittenda nunc adiciere oportet. Crudam ptisanam aliquandiu in aqua præmaceratam, deinde in mortarium iniectam, manibus terere conuenit, aliorum quidpiam manu tenentibus. Usque eò autem terenda, dum qui in superficie est cortex, sit abiectus: is enim quo vestitur, ceu tenui tunica, non totus inter pisendum abiicitur. Quæ propter & præmaceratur, & in mortario tunditur. Quod si non quicquid est accis deciderit, etiam ptisana magis quidem deterget, nullam autem aliam noxam accipit. Pessima est ptisanæ præparatio, cum vbi cocci crudam ipsam in mortario cum aqua contuderint, deinde parum coxerint, sapam iniiciunt. Quidam cum his mel quoque & cuminum iniiciunt, cinnum quemdam veniunt quàm ptisanam parantes. Verùm quæ rectè præparata est, utilitates quas memorat Hippocrates cum ægrotis præstabit. *Hæc Galenus de ptisana seculare tradidit.*

Ptisana

Prisana e. *Prisana* autem à verbo Græco *πρίσαν* nomen accepit, quod tondere & decorticare significat. Hoc primum quidem generale nomen est frugum omnium decorticatarum, tularumque, & cum diuersarum frugum generibus copulatum, alia atque alia prisana genera significat. At simpliciter, & sine adiectione posita, hordeum ex-corticatum, ob eius præstantiam tantum signifi-cas. Hæc autem, ut ex variis Galeni locis, quo-rum nonnullos ponemus, colligi potest, hoc mo-do fiebat: hordeum in aqua maceratum dum ex-tumescat, in Sole siccat: mox in pila ligneo pi-stillo tantisper tunditur, dum corticem exuat. Hoc in aqua lento igne coquitur, donec succu-lentum reddatur. Galenus, quod sciam, aquæ & hordei mensuram non exprimit. Orbasius vni parti hordei decem partes aquæ miscet. Paulus vni parti Prisanae quindecim partes aquæ.

Eius parandæ modum tradit Didymus in Geo-pori. Cassiani: hordeum maceratum tunditur, & in Sole siccat, sicque reponitur: inspergitur deinde quod ex ipsa est ter uis, quoniam eam conferunt. Ea humidior sumpta maximè nutrit. Vni parti hordei decem partes aquæ iniunguntur, & laesitatus ipsi inspergitur. Fit etiam ex Tritico Prisana eodem modo.

Prisana e. *Hodie* Medici Hippocratis, Galeni que Prisana non vtuntur, sed eius vice hordeum integrum suspensa mola decorticatum, quod *Hordeum mundum* vocant, tantisper in aqua decoquunt, dum pullos speciem referat: deinde tundunt, & tenui incarniculo percolant, saccharum addentes, & modò cum saccharo Amygdalarum dulcium cre-morem, aut seminis Melopeponum, aut seminis Papaueris, modò aquam ex rosas stillatitiam pro uanis scopis & varia morborum ratione. Nostro tempore, inquit Dodonæus, rarè aut nunquam horum quorum Galenus meminit, aceti scilicet, olei, Anethi, aut Porri, aliquid additur, sed sac-charum serè, & aqua de Rosis albis stillatiua ei ad-miscetur, & subinde Amygdala aliquot amara, ut palato gratior fiat: aut seminum Melonum vel Cucumeris nonnihil, præsertim quando impen-sus refrigerandum, aut somnus eà conciliandus est. Admiscetur ei & nonnunquam Amygdalo-rum dulcium *γλυκύ*, siue succus (Officinæ sac A-mygdalinum vocant) præsertim cum altum li-quidiorem cohibere utile est.

Prisana e. *Fit & hodie à Pharmacopæis* potio, quam Prisana *πρίσανα* vocant, Galli *Tisane*, cum nec Prisana sit, nec Prisana cremor, sed eius tantum tenuius decoctum, ipsius substantiæ parum, aut nihil retinens. Fit enim ex hordeo mundato, Gly-cyrrhiza, & uvis passis. Qua ratione parata potio utilis est iis qui inflammatione pulmonis, par-tiumque respirationi seruientium, vel renum, ve-sicæque exulceratione laborant.

Prisana e. *Potèrò, eodem Galeno auctore, hordeum non eandem cum Tritico facultatem habet.* Siquidem hoc palam calefacit, illud verò non modò non calefacit, sed quoquo modo ipso vtare, siue panes ex eo feceris, siue prisanam coxeris, siue polen-tam, vim quandam refrigerandi habere videtur. Dissidet præterea à Tritici natura succi specie, quem utrumque ipsorum gignere consuevit. Si-quidem Triticum crassum ac lentum, hordeum re-tiuum, & nonnihil detergentem succum in nobis creat. Panes omnes hordeacei Triticeis minus a-lunt, qui tamen ex præstantissimo hordeo confi-ciuntur, minus à Triticeis in eo superantur, qui verò ex laxo ac leni, panibus fursuraceis respon-dent. Panes quidem ex hordeo sic laxo ciuillime

Tom. M.

per alium subuenit, quod reliquis etiam manife-stum est, si cum Triticeis eos contuleris. Sunt au-tem non modò Triticeis, verum etiam Olyrinis, & multò adhuc magis Typhimis friabiliore, nihil in se lentoris, ut illi, habentes. Ex quo perspicuum est, exiguum corpori præbere alimentum, & po-tissimum si facti ex petiore hordeo fuerint. Idem rursum: hordeum primum est ordinis in refrigeran-do & exsiccando: habet etiam paululum abster-sionis.

Polentam verò (quam Græcè *ἀλόντιον* propriè vocat, quanquam *ἀλόντιον* etiam de omni dia præsertim rudiore farina improprie dicatur) ex re-centi hordeo mediocriter fixo laudatissimam fie-ni scripsit, cuius si copia non sit, & ex alio ipsam confici. Cum autem polenta omnis rectè facta boni sit odoris, tam esse suauè olentissimam, quæ ex optimo ac recenti hordeo, & quod aristam non admodum siccam habeat, est confecta. Com- pluribus autem per sanitatem morem esse eam sa-pa & vino dulci multoque commixtis, nonnun-quam etiam sola aqua conspersam, etate duabus, tribusue ante balneum huius bibere, dicerè que sentire se hoc potu sui liberari: si autem cum vino austero fuerit pota, ventrem desiccare. Po-lenta Gentes quasdam pro pane uti, idque rusti-cos in Cypro facere, tametsi frumenti plurimum merant, Veteres militibus Polentam præbuisse. Romanos tamen milites ipsius imbecillitatem damnantes, eà non amplius nunc uti. Exiguum e-nim corpori alimentum dari, priuatis quæ sem, & omni exercitatione abstinentibus, satis multum: iis autem qui quoquo modo exercentur, minus quàm satis est.

Ceterum, cum Polenta hordei fixi farina sit, ut ex Plinio & Galeno diximus, Aëtius non dissi-milem huiusmodi descripsit, sed *Culba* appellat, ait, quod nomen à nullo alio usurpatum fuisse me-mini: Ex eorum, inquit, quæ tumores cohibent numero, est & id quod Byne appellatur. Est au-tem hordeum madefactum quod germinet, vna cum enatis ligulis tostam, si tritum pro cataplas-mate imponatur. Hoc nomine Aëtius indicat hordeum ad Ceruissiam conficiendam præpara-tum, quod *Maltum* vulgò appellant, Germani

Ceruissia e. *Ceruissia* autem, ad cuius decoctionem illud conficitur, Germanis *Byre*, Gallis *Biere* dicta, pa-rum à Byne distat. Laudatissimum fit Maltum men-se Martio & Aprili. Qualitate sicca præditum est, maiore quàm in hordeo, frigida multò remissiore. Nam empyreuma quod illi ab assitione diutina-que coctione accedit, siccitatem eius auget, frigi-ditatem verò non solum minuit, sed & calidita-tem quandam ei imprimit.

Quare Galenus cum scribit hordeum, quo-quo modo quis eo vtatur, siue Prisanam coxerit, siue polentam fecerit, vim quandam refrigeran-tem retinere, id de Malto intelligere non potuit, quod partim ipsa germinatione, partim longiore tostione magis à natura sua recessit quàm polen-ta, quæ vel ex crudo nondumque maturo hor-deo, vel in aqua macerato tantum conficitur. Ab-sterget præterea multum hordeo vehementius, tum quia farinæ minus, glumarum plùs habeat, tum ob empyreuma, quod absterisionem coniun-ctam habet. Ventris torminibus, aliisque simili-bus ex frigida causa doloribus Maltum subuenit, tostum seruensque in sacculo appositum. Polenta multò plùs hordeo desiccatur, inquit Galenus, al-ium etiam cohibet auctore Dioscoride, & in-flammationes mitigat. Tamen in vulgari Diosco-

Nn

omelytis
falsò pro
hordeum

omelytis
quid?

ridis exemplaribus legimus, ὅτι ἡ ἀνὴρ ἀλευρῶν. Secid est, farina ex his aluum sistit, inflammationes mitigat, ut de farina hordei de qua multa prius dixerat, hæc etiam intelligantur. Sed exemplaria falsò ἀλευρῶν pro ἡριπύου habere contendit Cornarius, ut ex Plinio intelligere licet.

Galenus quoque scribit polentam multò magis quàm hordeum siccare. Sed quoniam ad τοῦ ἀλεῖν, id est, polentę discrimen, ὡς αὐτὸς, & composita voce ἀμύλου dicta esse videtur, quid ea sit etiam hic explicandum. Polenta igitur hordei tosti farina est: ὡς αὐτὸς Galeno, & reliquis medicis Græcis, cruda hordeacea farina est: ideòque Plinius, Polentam à farina hordei distare, quia torretur, ὡς αὐτὸς cruda hordeacea farina est nulla alia re admixta. Id ex eo perspicuum fit, quod ubique in eius usu res & liquores exprimuntur, quibus ea farina excipi, & cum quibus subigi, parari, & coqui debeat. Quare falsum est ἀμύλου semper significare crudam hordeaceam farinam aqua & oleo subactam, quod in ἐπιτομῇ libello Galeno falsò attributo legitur. Neque solùm cruda hordeacea farina per ἀμύλου significatur, sed etiam Triticea. Quapropter nonnunquam ei vocem addunt, quæ certam farinæ speciem indicat. Galenus γὰρ ἀμύλου ἢ ὡς αὐτὸς ἀλεῖν. In cataplasmate verò veteri hordeacea cruda farina. Quin & sola hæc vox ἀμύλου Hordeaceam crudam farinam significat, ut paulò post, ἢ τὴν ἀμύλου δὲ ἡριπύου γένεσιν. Aut cruda Hordeacea farina cum Oxynele appurata. Idem alibi ἢ τὴν ἀμύλου ἢ τὴν ἀμύλου ἢ τὴν ἀμύλου. Aut cruda Hordeacea farina, aut Triticea, in pallo cocta. Neque solùm ἀμύλου de cruda Hordeacea farina, aut Triticea usurpatur, sed vniuersè de omni cruda farina. Galenus γὰρ ἀμύλου ἢ τὴν ἀμύλου, τὴν δὲ ἀμύλου ἢ τὴν ἀμύλου, ἢ τὴν ἀμύλου, ἢ τὴν ἀμύλου. Quæ & omelytis ex cruda Hordeacea farina imbutenda, aut ex farina feminis lini aut scenigræci. Et hæc dē Hordeo, eius farina, pristinā & polenta ex veteribus dicta sunt.

Mazam demùm ex polenta humido aliquo permixta & subacta conficitur. Et aliqua quidem, cum sola aqua subigitur; alia verò, aut cum vino aut cum oleo, aut cum melle aut cum aliquot horum permixtis. Cum aqua autem eam subigi, præter quod ex libro Hippocratis de dieta secundo satis evidens sit, testis quoque est Xenophon sexto περὶ τῆς Κυρί, ubi hic concione conuocata, milites suos ad aquæ potione adhortatur, & à consuetis non admodum recessuros ostendit, ὅτι δὲ πρὸς, ἐν αὐτῇ, &c. id est, Etenim qui polenta videtur, Mazam aqua permixtam edit, & qui pane vitur, panem aqua subactum. Subigi verò Mazam, & cum vino, ex Hippocratis libro de internæ affect. apparet, ubi in hepatico morbo, cui suffocatio accedit, & similiter in coxendiculi dolore, eam quæ vino dulci subacta est non edendam consilium. Idem mazam oleo & melle quàm maximè subactam, in typho quodam eodem libro exhibendam præcipit. Helychius verò μάζαν interpretatur, polentam aqua & oleo permixtam.

Et à principio, Athenæus ait, popularem cibum ex Alphiis, Mazam Veteres vocarunt, ipsamque præparare μάττιν dicebant, postea verò necessarium victum, ob intemperantiam varietate distinguentes, studiòque paulatim immutantes, nomen ipsum Maza in ματτίαν commutarunt, ita appellantes omnem cibum magnificum; ματτίαν verò ipsos cibos præparare dixerunt. Atque inde fortasse, quæ ex Amygdalis & Sac-

charo placenta conficiuntur, in officiis Mase. Nihil enim. Panis, hoc dicitur, & quædam, copiam.

Porro Maza, ut Galenus ait, panibus Hordeaceis ægrius concoquitur, magisque ventriculum flatu implet, in quo etiam si diutius manserit, turbationem excitat. Citius autem subducitur, si commixta diutius fuerit ac subacta. Quod si mel quoque addatur, citius etiam ob id ventrem ad excretionem incitabit.

Zythum porro non simpliciter ex Hordeo præparatur, velut Diosc. ait, sed ex Hordeo torrefacto, ac eo modo præparato, quo Byssum præparat Aëtius docuit. Quapropter qui ζύθον ἀλεῖν πρὸς exponunt, dum ex polenta potum Zythium esse dicunt, propinquius rem designant, quàm qui scribunt, ζύθον ἢ τὸ ἀπὸ κριθῶν γινώσκον, quum neque vinum sit, sed potius quo vini loco quædam Gentes vtuntur: neque ex Hordeo simpliciter, sed torrefacto præparatur. Id demum crassossem in modum molitur, & certa mensura in aqua coquitur, donec omnis ex illo vis in aquam exoluatur, in qua rursus ad certum tempus & modum, flores Lupuli, quem Plin. lupum salictarium dixisse videtur, incoquantur, atque ita Cereuisia in amplum vas per colum transfusa refrigerari, & per se seruire sinitur, donec facibus ad fundum demissis clara euadat: quo facto vasis picatis excipitur, alicubi etiam resinatis: & postquam rursus per se deserbuit, bibitur. Quibusdam locis etiam triticum eodem modo paratum, ad hordeum certâ mensurâ addunt, & eodem modo coquunt. Et talis Cereuisia ex tritici caliditate minùs frigida putanda est, quàm quæ ex hordeo solo constat: quod nunquam secundum vllum præparationis modum calefacere, Galenus aliment. dicit, sed in Polenta siccare, in pristina verò humectare. Proinde in libello de conuiuiis veterum Græcorum, & hoc tempore Germanorum, omnia Cereuisiarum genera in comuni refrigerare dixi, inquit Cornarius, alia plùs, alia minùs, pro Hordei, ex cuius cum aqua parantur natura. Et addidi, hac de causa excogitatum esse, ut Triticum ad Hordeum in Cereuisiis parandis addatur, quod moderata Tritici caliditas, Hordei frigiditatem contemperet. Et ad eundem modum scripsi lib. de peste. Cereuisia etiam si omnis natura frigida sit plùs aut minùs, pro Tritici in aliquibus locis ad hordeum, ex quo cum aqua coquitur, admixtionem tamen & frigiditas, & multositas, & malitia ipsarum emendatur lupuli capitulorum ac florum in cocturam additione. Vnde contingit ut quantò minùs de lupulo habeant, tantò sint Cereuisiæ deteriores. Et hæc non tantum rationem & experientiam, sed etiam Galenum sequutus scripsi. Hic enim lib. 6. simpl. ph.armac. maximam in Zytho partem frigidam, & aquosam & acidam esse dicit, ut qui malos humores, & flatus gignat, velut ex putredine factus: quàmquam Hordeo ipso Zythum acriorem esse assermet, & in acrimonia aliquid calefaciens habere. Si cui tamen Cereuisiam calidam suspente natura esse, & in Hordeo qualitatem innatam permixtam esse, & Cereuisiam per accidens, non aliter ac vinum, refrigerare placet: huic ego suam sententiam iucundam esse sino, & ut eâ afficiamur tur indulgeo: Nec pro mea tuenda amplius quid afferam, quàm sicut Galenus scripsit, hordeum nunquam secundum vllum præparationis modum calefacere, sed in polenta siccare, in pristina verò humectare: Ita etiam in Cereuisia, quæ ex quadam polenta specie paratur, non ad caliditatem, sed ad siccitatem præparatum sit, & hæc tamen

Cereuisia?
omni, Ger-
manorum
frigida.

Fortem
qui calidus
dicitur.

tamen aquosa ipsius maxima parte dilui ac temperari: nisi nimium aded tostum fuerit hordeum, ut inde & sapore, & odore contracto, bibentes Cerevisiam conqueri cogat, quod ipsos siccet ac torreat, velut non raro audire contigit. Nemo vero auditus est, qui ex Cerevisie potu calefcere se conquestus esset. Et hæc de communi hodie parandæ Cerevisie modo intelligi volo: qui an quondam eiusmodi fuerit, metito ambigitur. Itaque sicut Galenus de aquæ hordei, id est *modi* potu, ab Hippocrate præscripto dicit, manifestum esse hunc sitim eximere, sed præstiterat, inquit, ab ipso dictum esse, quomodo parare hordeum oporteat, num simpliciter madesfacere, aut, veluti hi qui nunc zythum ex ipso faciunt, aut alio quodam modo: ita profecto præstiterat etiam ipsum Galenum parandæ Cerevisie modum descripsisse, ut certius de ipsius temperamento iudicare possemus, sed velut omnibus notum præterisset illud videtur. Et dum ex putredine factum dicit, illud intelligendum nobis exhibet, quod Aëtius de Byre prodidit, quod sit hordeum madesfactum, quod germen emisit, quod *cymas* etiam vulgus nostrum appellare solet, & deinde vna cum enatis ligulis: ita autem cymas siue germina vocat: tostum est. Ergo itaque nullam Cerevisiam calidam esse sentio, sed aliam minus alia frigidam, velut dixi. Acrimoniam tamen in ipsis ut vitium, aliquid caloris habere, & hordei tosturam præsertim nimiam siccitatem inducere: quæ tamen aquosa ipsius maxima velut dixi parte diluitur. Quin & frigiditas Cerevisie, multo ipsius potu corrigitur, ut etiam ex potandi velut exercitio, Cerevisia potores incallescant, non quod ab ipsa Cerevisie natura vllus calor ipsis accedat. Plin. lib. 22. in fin. ubi de frugum usu medico egisset, ex iisdem, inquit, sunt & potus zythum in Aegypto, Celia & Celia in Hispania, Cerevisia & plura genera in Gallia, aliisque provinciis, quorum omnium spuma cutem foeminatum in facie nutrit. Nam quod ad potum ipsum attinet, præsertim ad vini transire mentionem. Quibus verbis & Cerevisie potum in totum damnat, & natales illarum locos, & nomina in his diuersa indicat, quod ipsum etiam Diosc. facit, qui etiam *Cymus* appellatum, & ex hordeo paratum potum proponit, cuius usus vini loco sit. Et hic igitur potus non fuit alius quam insignis aliqua eius temporis Cerevisie species, quæ sicut etiam hodie multa, & caput, & nervos, & oculos læsit, & prauos humores genuit. Et tales potiones etiam ex Tritico fieri adhuc hodie in Hispania audimus, & in Anglia scimus, quæ magna ex parte è Tritico parantur, non multo lupulo adiecto, unde etiam albidiores sunt, quam quæ cum multo lupulo coctæ fuluiores euadunt. In inferiore porro Germania Cerevisiam non Byre vocant, ut in superiore & media, sed *Cont*: & simplici modo paratum, simpliciter *Cont* dicunt, duplicato vero, *dupel Cont*. Unde non malè mihi diuinasse videretur Erasmius Roterd. de lib. 1. Epigram. Græcorum sub titulo *de iudicio*, in epigrammate Palladæ, *Modus* pro duplici isto zytho patris suæ familiari accipiendum esse visum est: melius meo iudicio, quam qui pro vocibus *Modus* & *Modus*, corrigendum arbitrantur *Modus* & *Modus*, & de ziziphis fructibus accipiunt, quos iuubas Officinæ vocant.

Porro quid Diosc. de zytho dixit, *Modus* & *Modus* latius potius *Modus* & *Modus*: & nos reddidimus, sed & ebur zytho maceratum tractabile euadit: hoc Plinius non de chore, sed de animali ele-

Totu. II.

phante intellexisse putatur, dum lib. 8. cap. 7. sine aut. Capti elephanti celerrimè mitigantur, siue, ut vulgata exemplaria habent, mitigantur ordeis succo. Ego tamen ebur Cerevisia macerari ab his qui pectines, & dentiscalpia, atque alia instrumenta ex illo faciunt, cognoui. Nec de zytho aut Cerevisia dixit Plinius, sed de hordei succo, qui alio modo ex illo parari potest, ut non ad hunc Dioscor. locum respiciens id dixerit, quem de ebore, non de elephante animali dicere, credo his qui per experientiam testantur, & Plutarch., qui id confirmat in libello qui inscribitur, An malum sufficiat ad infelicitatem. Quod verò elephantia sin inducere zythum Dioscorid. dicit, id etiam in vino Syëte reperit.

Maltum a Recentioribus nuncupatum, Dodonæo teste, ex hordeo quoque fit. Nam ipsum hordei granum est, primum donec intumuerit aqua maceratum, quod deinde germen emisit, ac postremo cum ipsis germinibus siue enatis ligulis resiccatum est. Resiccatur autem frquentissime ignis calore, quem ad hoc constructus fornax per exigua spiritamenta admittit: raro verò absque ignis sublidio, id quod non nisi æstius mensibus vigente æstu, cum in tabulato eminentiore loco persicato, tenuiter spatium, sæpius per diem vertitur. Nostrum *Mour*, Germani *Malz*, Recentiores *Maltum* voce à Germanis mutuata appellant. Aëtius Græcus Medicus, hordeum hoc modo præparatum *Malz* nominat. Ad Bera siue Cerevisie decoctionem conficitur, & laudatissimum quidem Martii & Aprilis mensibus. Qualitatem habet siccam quidem hordei intensiorem, frigidam verò multo remissiorem, præsertim quod ignis calore tostum ac resiccatum est, nam *luridum*, quod illi ab assatione diutinaque tostione inheret, siccitatem eius intendit, ac frigidam non solidam remittit, sed & qualitatem quandam calidam ei imprimit. Quod verò æst uis caloribus resiccatum, minus quidem calet, tamen & ipsum hordeo calidius vel sola germinatione redditum, quæ absque leui quidam putrefactione, ob alienam humiditatem, non succedit. Putrefactione autem caliditatem multis accedente, satis notum.

Galenus lib. de aliment. facult. hordeum ait, quod quomodo quis eo utatur, siue pisanam coxerit, siue polentam fecerit, vim quandam refrigerantem retinere, verum id de Malto non videtur intelligendum, quod vel germinatione sola, deinde & tostione, si accellerit, magis à natura sua recessit, quam Polenta, quæ vel ex crudo nondumque maturo hordeo, vel in aqua macerato tantum, ut diximus conficitur. Abstergit præterea & *Maltum* hordeo potentius, minus lentoris habet, cum quia farinæ minus, Siliquarum verò plus habeat, quam crudum hordeum: tum ab inherente illi nonnullo calore, partim à leui illa corruptione, partim ab empyreumate, qui absterfionem coniunctam habet. Ventris torminibus aliisque similibus ex frigida causa doloribus *Maltum* subuenit, tostum seruensque in sacculo appositum. Cataplasma ex *Byre* farina tumoribus hydropicorum vtiliter, Aëtio teste, imponitur.

De Bera siue Cerevisia.

Bera ex Malto, & Lupuli salictarii floribus, modo, proportionèque certis, aquæ dulci permixtis, coquitur: & simplicissima quidem ac propriissima talis est. Proxima, quæ Triticum, Zeam, aliæve fruges, vna cum Malto hordeaceo admittit. Quæ verò præter fruges, herbas, semina, flores, aro-

N. 2.

mata, aut alia huiusmodi caput implentia, ac ebrietatem inducentia, à frugum natura aliena, permixta habent, compositæ quædam Bera, siue Ceruissæ sunt ac medicatæ, ab hordeacea, Triticeaue Bera & sapore & qualitate dissidentes.

Nominant autem huiusmodi ex frugibus potum cum Germani omnes, tum Britanni reliquæque Septentrioni subiacentes gentes, communi quidem ac patria voce, Bierc siue Bere. Latina autem passim Ceruissam. Veteres verò ex hordeo tum variis nominibus appellantur: & *zithum* quidem *zithum*, id est, Vinum hordeaceum, ex hordeo omnem compositum Græci. Eundem Aristoteles, Athenæo teste, *zithum* dixit: alii *zithum*: veluti Sophocles in Triptolemo, & Hecætrus in Europa periodo, ubi *Phonæ* *zithum* ait bibere, ex hordeo, *zithum* verò ex Milio & Conyza. Hellanisticus tamen non solum ex hordeo, sed & ex radicibus fieri *zithum* asserit: Bibunt, inquit, ex radicibus *zithum*, veluti Thraces, ex hordeo, Aegyptii hordeaceam potionem, *zithum* siue *zithum* Theophrastus ait, appellant. Idem testatur Plinius lib. 12. Ex frugibus, inquit, potus, *zithum* in Aegypto, Celia & Ceruissæ in Hispania, Ceruissæ & plura genera in Gallia, aliisque Prouinciis. Quoslibet, nominibus quidem aliis, sed ratione eadem confici tradit. Diodorus Siculus, *zithum* non in Aegypto solum, sed & in Galatia quoque fieri asseruit. Tanta est (inquit de Galatia scribens) ævis frigiditas, ut neque vinum ea regio, neque oleum, producat, quare coacti homines potum sibi ex hordeo componunt, quem appellant *zithum*. Dioscorides vinum hordeacei potus genus *zithum*, alterum *Curium* nominat.

Simcon Zerhi ex posterioris ætatis Græcis, huiusmodi potionem Arabico nomine *zithum* vocat, alii *zithum* siue *zithum*: Arabibus tamen, Phonicis non ex hordeo tantum potus est, sed etiam, veluti Rhæsis scriptum reliquit, ex pane *zithum*, hoc est, S. malgineo, Mensha, ac Apio compositus: ac, ut Hali Abbas testatur: quædam etiam Phonicas ex pigmentis, aut ex malorum punicorum succo conficitur. Hæc autem omnia sine similia sint genera, diuersis appellata nominibus, siue proprietate aliqua discrepantia, cum Bera siue Ceruissæ nostra in ea conuenire possunt, quod ex hordeo ac frugibus componantur, preparatio tamen modo, vel alia qualitate aliqua ab ea fortasse differant. Nam si *zithum*, ut Galenus ait lib. de facult. simpl. medicam. ex putredine proveniat, aut ex frugibus fiat aqua madefactis, donec resoluantur in liquorem vino similem, veluti Hermolaus Barbarus in Corollariis scribit: ac acere malique succi sit, tenes & nervos tentet, quæ à Dioscoride ac Galeno quoque ei attribuntur, cum Bera siue Ceruissæ nostra nequaquam conuenire potest. Nam Bera ex fruge non fit putrescente, multò minus ex ea in liquorem resoluta, sed ex hordeaceo Maltho, ut diximus, coquitur, ab omni putredine asseruato. Est & Bera per se suavis, dulcis, ac boni omnino succi. Quæ certè Beram à *zitho*, cum conficiendi modo, tum facultate dissidere ostendunt. Sin autem *zithum* non eo, quo Galenus, aut Hermolaus tradunt, conficitur modo, sed ex hordeo ac Tritico fiat leuiter tantum putrefactis, ac à natura sua commutatis, ut Theophrastus scribit, *zithum* & Bera similia sunt. Nam hordeum in Malthum transiens, leuiter quodammodo putrescit, & à natura sua recedit. Verum cum Galenus, Dioscorides, & qui deinceps eorum sententiam ac doctrinam insequuti sunt, minus rectè *zithi* facultates cognouisse videbuntur. Propter leuem hanc etenim putrefactionem siue mutationem, hordeum, aut ex eo potus, mali succi statim fieri non potest, non minus quàm Polenta, quæ ex non recente hordeo, sed ex maturo & sicco in aqua macerato conficitur. Siquidem & tunc leuiter quodammodo hordeum computrescit, humoremque alienum inhibet, veluti dum Maltum futurum est. Polentam tamen hanc ob causam, neque Galenus ipse, neque Veterum quisquam, mali succi fore asseruit, sed contra omnem boni odoris, suauolentemque esse, sicuti & Malthum itè confectum est. *Zythum* autem, siue *zithum*, ex hordeo & Tritico confici leuiter putrefactis, Theophrastus lib. de caus. sexto, ubi de saporibus agit, his verbis tradidit. Nonnullos verò, ait, naturam commutantes, & leuiter putrefaciens, in succos cogimus, ad bibendum idoneos, veluti qui vinum ex hordeo ac Tritico conficiunt, quod in Aegypto *zithum* appellant.

Ceterum ut ad temperiem Bera veniamus, pendet ea ex qualitatibus eorum, ex quibus componitur. At materies eius, ut diximus, sunt, aqua, Maltum hordeaceum, subinde Triticum aut zea, & Lupuli salictarii flores. Aqua quidem simplex cuiusmodi ad Bera decoctionem sumitur, frigida est & humida: Maltum enim exigua caliditate resiccatur & abstergit: Triticum ac zea temperatè calida siccatque sunt: Lupuli flores secundo ordine calefaciunt, resiccantque, caput tentant, vrinam mouent, abstergeri quoque, ac aperiri potentia præditi. Faciunt hi ad Bera cum saporem, tum diuturnitatem, fruges verò alimenti materiam subministrant.

Ex horum autem varia & inæquali mistura, diuersa Berarum genera, dissimilibus qualitatibus prædita, sunt. Tenuis quædam, potentes aliæ, rubicundæ, siue nigre hæc, candidæ illæ, amaræ pleræque, dulciores nonnullæ. Quæ frugum plurimum admiserunt, potentiores sunt: quæ minus tenuiores: minimum tenuissima. Ex hordeaceo Malto, diutius rostito, rubicundæ, & præsertim diuturnior decoctio accesserit: præcipua autem parte ex zea ac Tritico confectæ candidæ sunt, lenescentisque tenues & aquosum, vinum substantiæ tenuitate quodammodo referunt: amariore caputque citius tentantes, Lupuli flores copiosius incocti efficiunt, dulciores eorum parsimonia: fruges enim ex se dulcedinem conferunt. Inter has tenuissima, frigida quidem est & humida, superante in ea aquæ qualitate ac substantia, non tamen altius caliditatis experta. Potentiores taloris plus habent, cuius etiam vi atque potentia, in vasa conditæ non secus ac mustum fluctuant ac effervescunt, minus tamen quàm mediocre vinum calidæ, à quo non solum temperamenti caliditate, sed & tenuitate substantiæ superantur. Calefactio siquidem Bera clemens mihi est, Alimentum autem præstant illæ quidem exiguum, aut nullum, hæc verò copiosius, copiosissimum potentiores: omnes prohi succi, si ex bonis frugibus & bene decoctæ fuerint. Crassiores circa præcordia aliquantisper hærent, tardèque descendunt: candidæ, tenuiores & citius digeruntur: amaræ absterfione aluum leniunt: mediæ, medio se modo habent.

Compositæ Bera, quæ videlicet præter fruges ac Lupulum, & alias quasdam herbas, vel flores, semina, fructus, aromata, similiaue recipiunt, pro qualitate eorum quæ admiscuntur, varias qualitates ac facultates obtinent, subinde etiam nomina. Recens Bera quæ nondum subsedit, non secus ac mustum

Temperamentum
Cerevisia

Cerevisia
tenuis, &
albarum
in aqua
mista.

Composita
Cerevisia

mustum, vitæ complura gignit: inflationem parit, alium conturbat, calculum procreat, ac vineæ septennero stillicidium excitat: foris tamen admoda, nervosarum partium dolores sopit, si dulci calenteque ea foueantur: præstat ad hoc recentissima, & cui nondum Lupulus incoctus est, ac inter omnes potentior. Acida nervos & renes teneat, ventriculum conturbat, ac vitiosum in corpore succum gignit. *Acetum* quod ex Biera cōficitur, vini aceto minis acre, minisque potens est, nec partium adeo tenuium. *Hæftenus Dodo-*

De Biera siue Cereuisiæ diuersa compositione, Lobelius in Aduersariorum altera parte sequentibus verbis egit. Vniuersa Britannia ad hordei præparationem quam *Maurh* siue *Malt* vocant, solo ferè hordeo spicâ muila vitur, idque polysticho ad Cereuisias Britannicas suauissimas & optimas præfert, quæ quilibet Septentrionales bonitate longè superant. *Maurh* autem inibi paratur, hoc qui sequitur modo. Hordeum maceratur aqua biduo & tribus noctibus: deinde effusa aqua in horreum aceruatur loco ventis minis peruito, quoad germen perpusillōsque radicem cirros & pullulationes (quæ hyeme tardius, vere & æstate biduo aut triduo,) emisit. Mox prius quàm incalescat sulcatim dispersum, sesquipalmari densitate, ter quaterve die & nocte subuertitur aperto aëre: quod octo vel nouem dies continuos iterando perficitur. Tandem in tabulato pertuso, igne subdito vel aptato fornaci vimineo, texto calathò acuminato, & superstrato hordeo, igne lento è palea, cremis vel arido ligno admotò fornacis ostiolo, sesquipalmari intervallo ab imo interposito, exiccatur, quoad molis frangi queat, sicque extostum *Maurh* in fornacis capacitatem deicitur: quod ex quolibet hordei mensura ad quartam partem accrescit, & antiquum bonitate, in zytho componendo, nouum præcellit.

Biera siue Cereuisiæ, Nortmannis & Gallobelgis *Biere* & *Ceruise*, Anglo-Britannis, & Germanis, & Belgis *Bier* dictæ, compositio, recipit Malthi mollis leuiter contuiti modos Britannicos octo, cui superfunde aquæ fluuiialis limpidioris fermentis, in qua aliquot manipuli fursuris Triticeï incocti fuerint, quantum satis implendo dolio Aureliano aut Aquitanico & semisse. Exactè mixta, infusa calidè persistent tres horas: deinde foraminulo palea aut duplicato fundo apto subterfuant. Id quod transmissum est [Belgis & Anglo-Brit. Wort vocatum] recoquitur semihoram, sesquihoram, vel aliquot horas, ut melius conferuetur, adiectis vnc. 12. florum Lupuli salictaris: mox longo latòque lacu, vel depressis labris vix pedem altis, perfrigerantur. Et huius decocti frige facti libris octo vel decem fermenti siue fecis Biera vel Alæ potentioris libra aut sesquibra adduntur, exactè agitando, loco tepidiore permiscuntur, stragulis operiendo, sensimque reliquum liquorem, ut commodius fermentescant, affundendo. Quibus absolutis transcolantur: vasa adimplentur: demùmque fermentatione absoluta, exactissimè ocluduntur. Eidem Maltho nouam affundunt feruidam, transcolant, eoque Cereuisiam tenuem concinnant.

Variis è frugibus, Tritico, hordeo, zea, Avena fit Malthum, quod ratione conficiendi, Biera colores immutat. Triticeum & Polystichum, supra coctum & excoctum potissimum, rubicundam & subfuscā Cereuisiam efficit. Hordeo disticho, Avena, zea, tritico, commixtis quinis vel

senis libris farinæ fabaceæ, albida & limpida redditur. Malthi hordeacti partes duæ aut tres, Auenæ & Tritici ana pars vna, sumuntur: farinæ fabarum quantum Tritici quarta pars, aquæ quantum satis, pro tenuitate, & efficacia Biera futuræ.

Cereuisiæ, à Cerere dictæ, siue *Biera* Teutonice & Anglo-Britannice omnium suauissimæ & saluberrimæ, calidioribus regionibus utilissimæ & convenientissimæ, parandi ratio exactissima & largissima, Anglo-Britanno vernaculo, à C.D.I. Coys Plantarum peritissimo accepta: recipit Aquæ fluuiialis [densiores, pinguiore, stagnantes aut puteales aquæ ex terræ argillofæ venis manantes, limpidis putealibus scaturiginosisque ad pinguiore concinnandas Cereuisias longè vulgi opinione, præferuntur. Fontanas tamen ex scatebris emicantes, & fluuiales fluentes cum Lobelio eligeremus, sanitati tuendæ, aucta frugum dosi] Galones 40. feruescat, sine tamen ebullitione [In quibusdam regionibus ebulliunt aquam ante Malthi infusionem & macerationem, superaffusa Galoni mensurâ vnâ aut altera frigidæ, ne illic Malthum excoquatur aut supra modum conferuescat, excandescatve, crustulæque retortidas contrahat.] In parte eius tertia [Hæc obseruantur quoties Malthum retortescit. Convenientissima est alioqui feruidior aqua, Maltho minis arido, aut humidior.] infunde & macera [Experientia constat Malthum commodius iuuiti aquæ, quàm aquam Maltho affundere. Lobel.] modum vnum optimi Malthi, molis vt ut triti: sine conferuescere per horam integram in cupa aut nauis plûs: tempore hoc exacto, liquor Wort Britannicè & Belgicè vocatus, percoletur in vas commodum, foraminis cupæ fundi obice, vt mox dicetur, referato. Et inter colandum, feruescat alteram tertiam aquæ partem, modo supradicto, & percolato liquore horæ spatio, affundatur. Si autem maiorem Cereuisiæ quantitatem parare velis, eamque potentiorē, primam colaturam feruescat, [affusa Maltho percolato secunda feruida aqua] additis vncis quatuor florum Lupi salictarii, per totum tempus iteratæ infusionis secunda Malthi, hoc est, horæ aut sesquihoræ spatio. Colantur deinde per setaceum & in lacu refrigerantur. Wort non excedat pedis altitudinem in lacu; æstate potissimum, hyeme superare licet, quo refrigerato æstiuo tempore, [hyeme tepidulo] sume huius colati Wort sufficientem bonam quantitatem in vas conueniens, prædictæ pedalis aut sesquipedalis altitudinis exceptam, cui lib. 8. aut vnc. 8. optimæ spumæ, siue fermenti Cereuisiæ, Britannicè *Yeast*, Belgicè *Gyst*, & Gallicè *Gy*, diluti & permixti in alio vase siue vrceo, triplici aut quadruplici mensura prædictæ colaturæ Wort: fermentescere finito, donec ebullitione & effluentiâ vrceum superet, effundaturque in vas colati, Wort vocati, liquoris. Post Spumarum fermenti in vrceo permixti effusionem in prædictum colatum liquorem, in quo vrceus conditus est, ebullitione & fermentatione totum colamen spumis vndantibus operiens, affundè sensim, ne ebullitio interpellatur, reliquum colatum liquorem, & permisceantur. His peractis, sine iterum conferuescere, donec sublimè plûs satis efferantur spumæ [eleuantur siquidem pedali sæpe mensurâ] & potus saporem similem colati liquoris acquirat, nullo tamen modo acrem, quia Cereuisia citius acorem saperet. Vasis demum impletis & post sublimationem oclusis, conferuetur Cereuisia. Dolia vas in quo Malthum infunditur, capacitatis sit Dolii Aureliani, plûs minis, pro ratione quan-

Cereuisiæ
Teutonice

Acidum
ea.

Cereuisiæ
Sæpe comitatur

Malthi
preparatio

Cereuisiæ
compositio
tam obseruanda
peritissimo
Lobelio.

Rariis
horæ Malthi
thum.

titatis Bieræ futuræ, duplici fundo donatum, vtroque maiusculo foramine pertuso. Longior & validior fustis, stramine, aut tæno tortili circumvallatus foramina permeet, sed intum fundi foramen arctius, obicis uicem supplens, referans & claudens, ad liquamentum (wort vocatum) percolandum, & in alia vasa traiciendum. Superior autem fundus sit multis foraminibus peruius. Viminis cistis longioribus, cilicii loco, Malthi liquamen separat Belgæ. Si tenuem cupis Cereuisiam, (quæ vulgò ætliuo tempore delectamur) vtrumque primum & vltimum commisce colatum liquorem siue liquamentum: feruefac addita s. q. florum Lupi salictarii, ex arbitrio: & omnia perage, vt dictum prius. Tertiam & vltimam aquæ feruentis partem superfundito Maltho, ad omnium tenuissimam Cereuisiam: maceretur per duas horas: & eadem vt prius præstat.

Cereuisia
tenuis.

Cereuisia Martia vegetans, maxime uic alens: per diuturnam, in annum & diutius perdurans, recipit Malthi recentis molis triti modios 12. Auenæ Modium semissem, pilorum aut Fabarum & Tritici tritorum, ana tantumdem, Aquæ q. s. implendis tribus doliis Aquitanicis aut Burdegalensibus: duobus vegetante Cereuisia, & vno viribus tenuiore. Feruefac tertiam aquæ partem modo supradictæ: infundantur donec aquæ pars secunda tertia efferbuerit, & infusioni sit parata. Tum primo Malthi liquamento percolato, & in aliud vas & refrigeratorio lacu traiecto, exactè simul percoctis sine defecatione ex lib. 4. Lupi Salictarii: optimeque tandem per semihoram despumando percoctis, & in refrigeratorio lacu traiectis, iterum affundatur Maltho secundus liquor siue Liquamen wort vocatum, quoad tertia altera pars aquæ efferbuerit, quod horæ aut circiter spatium perficitur. Hac ratione æquè efficax erit illud secundum wort ac primum: Denique vltima aquæ tertia parte feruefacta, detracto liquore, affundatur Maltho tertiâ & vltima vice ad ignauioris Cereuisiæ præparationem. Martia efficacissima Cereuisia ante sex menses non est potionibus apta. Refrigerato primo liquamine wort/permisceatur lib. duabus Spumæ Cereuisiæ, & vnc. 1. pul. Caryophyllorum: Exactissimaque fiat fermentatio citato modo.

Cereuisia
Martia.

Primæ nobilitatis Anglorum Ala suavis & vinei saporis portio, recipit liquamenti Malthi vernaculè wort, libras ducentas, florum Lupi Salictarii M. 2. quod Malthi dulcè & insipidum saporem exuant. Percoctis & transmissis sensim commisceantur [vt supra monuimus] facis Bieræ vel Alæ libræ tres, & Graut Anglorum (Belgæ Maerhier vocant) libræ sex vel octo. Graut autem sit hoc qui sequitur modo: Farinæ Malthi lib. 6. vel octo: aquæ feruefactæ lib. 12. vel 13. quæ agitata & probè sexies die remixta temente camino, stragulis operto, & palea condito, nitido vase taundum macerantur, donec Serapii lentorem assequantur. Tunc igne, sedulo versando ne vrantur, ad pulvis solidioris crassitiem percoquantur. Reconditur etiam hodie, per ebullitionem siue fermentationem adhuc spumans in lapideis phyalis, oris angustioris, suberino operculo exactissime oclulis, & decussatim funiculo, ne exiliat, vt sæpe fit, arctissime ligatis. Sapore admodum vinoso, gratissimoque, palatum & nares feriente: Non desunt qui Cereuisiam, eadem lege & ratione vini instar asseruant.

Anglorum
Ala.

Ala Anglorum
vina præ-
fata præ-
fata præ-
fata præ-

Quantum ex priscis Plinio & Dioscoride coniecturam facimus de Zitho & Curatli portiones

Cereuisiæ nostris proximas, nec dubiè designate videntur: præsertim Alam, quæ vini vicem antiquitus supplebat Britannis: quorum ipse Dioscorides meminit, referens malum succum gignere & nervos tentare: quibus idem quod nobis, conuenisse potuit, potissimum plebi & Anglo-Britannicæ rusticæ turbæ, cui ad gulæ delectamenta potentior Alam è cauponariis expetenti, incocturabilis quæstus gratia, illa ex Maltho luxuriosæ aquæ vice macerato, imponitur, sic enim rogis compositam & grano potior ementitur: caput ferit, lateraque opilionibus, colonis & nauticis stultitiam conciliat. Nec desunt nonnulli inexplēbiles nummorum vasti homines qui Bieræ pro Lupuli floribus camini fuliginem substituant, aqua falsa malthum macerantes, eo plus sitiantur Bieræ, quod plus sint potæ. Harum portionum & consimilium assiduo usu incommoda Dioscoridi memorata percipiuntur, quæ non possunt sine hepatis & viscerum summo dispendio assumi, Cerebro & neruis inde affectis & sanguine exulto, sit tuberculum in facie & naso, vti elephanthicorum, eruptio, inde apud Anglo-Britannos in hunc vsque diem locus proterito elogio, *Asinus sibi faciem ex nasum rubrum, ruberum commendationis Ala.* Maxima igitur in Cereuisia varietas: pro ratione, quantitatis frugum, mixtionis, compositionis, varias qualitates sortita. Germanis & Belgis Gentiana, Baccæ Lauri Zeduaria, Gagghel/Helenium, Lavendula, Salvia, Hormini flores, Cuculus siue Cucubalus Indicus, [quem insanum seu furiosum Solanum faciunt] Chamæpyris, Coriandrum & consimilia unâ cum Lupulo incoquantur.

Limpidior, vegetior, benè defecata Bieræ, cuius quidem faciendæ rationem docuimus, vt calidioribus innotescat regionibus, & penuriâ vini, eius vicem supplere possit, suavis & salubris est potio, alimentum bonum præbet, modò probè & ex optimis frugibus paretur & percoquatur. Tenuis autem quæ grani minùs, plus aquæ recipit, humectando refrigerat, minulque alit. Ac inde malum succum gignit: renes, nervos & caput tentat: tormina, inflationes intestinorum, quemadmodum & recentior epota, stillicidium vrinæ, crassum succum, calculum renum & vesicæ parit. Luteriana crassa, dum recens pessima. Additur Lupulus Bieræ vel Alæ duplici ratione: cum ob saporem & conseruationem, tam quia crassum succum Zithon procreare literis prodatur, cuius erratum & noxam emendaret, aperiendo abstergeret, per vrinas crassa pituitosaque excrementa venarum, renum, vesicæ, citra magnam calfactionem educeret: docemur enim à Mesuro in Syroppo è succo Lupuli & Byzantino, aliisque Neotericonum compositionibus Lupulum, non secus ac Fumariam, sanguinem purgare & defecare, eiusque ebullitiones compescere: iccoris intemperiem calidam, internosque feruores, febresque biliosas & pituitosas arcere: Quem eundem effectum præstant turiones siue Asparagi vere erumpentes, cibo & acetariis. Floribus tamen, quia temperatè calidi, secus euenit, vti de coriandro monuimus Aduersariorum pagina 314. Quod caput feriant, è Cereuisia non reiciendi, neque illis causa rheumatismorum & articulorum defluxionum, vt nonnullis doctis Anglo-Britannis perplacet, attribuenda: sed potius ingluuici, crapulæ, mollitici, blanditiis, & gulæ oblectamentis quibus sunt dediti, ascribere debent: quia Ala ipsa potentior, sine

impud.

Maxima
in Cereuisia
varietas.

Limpidior.


Tenuis.

ois aut

est, cum Lapillo paulillo concinnata, non se-
cus ac vinum, abditissimas permeat cerebri
membranas, eademque infert incommoda. Lu-
puli Bores non nocent qualitate, sed quantitate,
quemadmodum vinum & optima quævis temeta.

HORDEVM DISTICHVM.

Descriptio



Breviore cul-
mo est Hor-
deum, quam vel
Triticum vel Se-
cale, foliis latis,
spica longis as-
perisque horret
aristis, quæ sin-
gulæ è lingulo-
rum granorum
capitibus exe-
runtur; grana
verò gluma te-
nui simplici clau-
duntur, quam
nulla tritura de-
ponunt, nisi
vel molarium
confrictu, aut
sacculi asperioris,
calida prius ma-
cerata, aut deni-

que pilâ. Cæterum quod hic distichon nomi-
namus, duos habet granorum versus, quibus ta-
men interiecta & aliorum rudimenta, sed quæ
nihil sint aliud quam inutiles glumæ.

Synonyma

Gesn. coll. & hort. *Hordeum*. Trago *Hordeum al-*
terum siue *exiguum*. Dod. gall. *Hordeum parvum*,
latin. *Hordeum distichum Galaticum* Columellæ.
Ruell. *Hordei alterum* genus: ad hoc reducen-
dum putat trimestre illud *Hordeum* Gallis *se-*
curgeum dictum: erroris autem eos accusat, qui
genus hoc *Orizam* asserunt.

Error quo-
rundam.

Lobel. in Aduers. *Hordeum*, (nonnullis visum
Siligo) *vernum*. Obs. p. 15. *hordeum minus* Vere se-
rendum, Hyemis impatientissimum. Eid. Adu.
altera parte, *hordeum distichum*, Gallobelgis *Pa-*
melle, Germ. *Flein gerst*, id est, minus hordeum,
siue Britannis Borealisibus *Common barley*: Mar-
tio, Aprili, & initio Maij duntaxat seritur, hye-
mis quippe & frigoris impatientissimum: vniuer-
sa sui parte gracilius, cubitum & sesquicubitum
taro superat.

C. Bauh. Phyt. & pin. *hordeum* 3. siue *distichon*:
quod spicâ binos ordines habeat. Plin. *hordeum*
distichon Galaticum Columellæ. *hordeum Cantheri-*
nium Ruellio. *hordeum minus* Trag. *hordeum di-*
stichum, Fuchf. Tur. Dod. in Diosc. Lob. Lugd.
cui & *astium* & *trimestre minus*. *hordeum* binis
versibus Matth. Cam. *hordei alterum* genus, Cæf.
Kerol. Germ. *Sommer gersten* / *futtergersten* /
Flein gersten. B. Zoomer gerst. Gall. *perle orge* &
orge mondé, *orge à deux rancs*. Ital. *orza*. H. Ceualla.
Angl. *Barly*.

Nomina
linguarum

HORDEVM POLYSTICHVM.

CAP. XIII.

Descriptio

Inconditi & multi sunt Polysticho seminum
versus, quorum si quis ordo, ad Hexastichum
cedunt.

Tom. II.

Trago germ. *hordeum alterum* siue *polysti-*
chum: Lat. *Hordeum* 1. siue maius, quatuor, sex
& octo versibus. Ruell. *hordeum binos*, ternos,
quaternosq; 5, item & quinos spicarum versus
continens. Lobel. Obs. p. 15. *hordeum polysti-*
chum, Autumnno serendum, Eid. p. 19. *Siligo Tra-*
gi, *Olyra Dioscoridis*: In Aduers. *Olyra*, *Siligo*
Tragi, seu *Far candidum*, *Olyra* quæ Zea He-
rodoto, *Triticum amyleum*, non *Siligo* vel *Se-*
tanium, ut nonnulli putarunt. Existimo Lobe-
lium nesciuisse quid scriberet, quia Tragus non
eandem constituit plantam *Siliginem* & *Far*
candidum, sed diuersas: nec etiam demon-
strat quam plantam intelligat. Dod. Gall. *hor-*
deum quatuor vel pluribus versibus. *Hordeum*
maius: Lat. *herd. polystichon*. Tabern. *Hor-*
deum polystichum hybernium. Hoc hordeum
bene repræsentatur etigie Lobelij in Icon. plant.
p. 28. exhibita, sub inscriptione *hordei*.

Lob. obs.

C. Bauh. pin. *hordeum* 1. [ita etiam phyt.] siue
polystichon hybernium. *Hordeum* Brunfels. Mat-
thiol. Lac. Ges. hort. Lobel. Dodon. Lon. Cast.
Cæf. Ger. *Hordeum maius* Tragi. *Hordeum*
polystichum. Fuchf. Tur. Dod. Gall. [cui &
hordeum cantherinum.] Lugd. Tab. *Hordeum*
primum Ang. *Hordeum secundum hyemale*,
Cord. in Dioscorid. *Polystichum* dicitur quia in
multos versus spicatur: est enim differentia in
spicarum forma, magnitudine & granorum nu-
mero: quoddam binos, quoddam ternos, qua-
ternos, quinos, cumque plurimum senos versus
habet: sic aliud rotundius & minus, aliud ob-
longius & maius, aliud candidius, aliud nig-
rius.

Kerol. *polystichon*, Germ. *Wintergersten* / *Groß-*
se gersten. Belg. *wintergersten* / *Gallis, grasse or-*
ge, orge à plusieurs rancs. Nomina
linguarum

HORDEVM HEXASTICHVM
PVLCHRVVM.

CAP. XIV.

Brevior sed thorosior Hexasticho spica, senis
granorum versibus constans, inter quos &
paleæ inutiles breui mollique arista donatæ in-
tereunt: at solidorum granorum gluma in va-
lentulam, asperam, longamque aristam facit.

An Cordo in Diosc. *hordeum* siue tunica, *hor-*
deum italicum & *Romanum*, *hord. hexastichum*:
si glabrum suum, de quo in Hist. tractat, intelli-
git, cur vocat Hexastichum quod non magis sine
tunica, quam distichum erat appellandum.

An hordei
siue tunica
Cordo:

Ruell. *hordeum hexastichum*, *Cantherinum*
quorundam. Trago, *hordeum* cum sex ordinibus.
Dod. Lat. *hordeum* sex versuum, *ἑξαστόν*, *Can-*
therinum Columellæ.

C. Bauh. pin. *hordeum* 2. (& phyt.) siue *poly-*
stichum vernum. *Hordeum* senis versibus, Matth.
Cam. *hordeum* Septentrioni notissimum *παλίσ-*
τον, Lobel. Obs. *hordeum polystichum vernum*
Lob. Icon. *hordeum polystichum æstium*, &
hordeum trimestre polystichum Tabern.


Synonyma

HORDEVM DICTVM GERMA-
NIS ORIZA.

CAP. XV.

Quamquam culmo, foliis, geniculis, cum
hordeo vulgari conveniat, ex spica
Distichum

Nn 4



tamen evidens
cuiuslibet discrimen, est enim
lato-compressa
duobus verli-
bus constans,
granorum hor-
deaceorum,
habitionum,
paleaceo corti-
ce, grano ad-
hærente clau-
sorum, quorum
singula in lon-
gam asperam-
que aristam de-
linunt: inter
geminos hosce
versus duo alij
vtrinque, id est,
quater gemini
intercedunt, pa-

leacei, nullum granum continentes, mollicellis
& breuibus aristis donati.

Columella
Far candi-
dum Tra-
go.
Trago
prob.

Trago
genus
Lod.

Santalo
Plin.
Aut Farri
Clusino
similes.

Frumenti
barbati ge-
nus.
Dod
re-
ding.

Synonyma

Locus &
Tempus.

Hordei genus hoc, *Germanicam Oryzam* Tra-
gus appellauit, iudicauitque nihil aliud esse,
quàm *Columellæ Far candidum*, *Tragum fru-*
mentaceum *Dioscoridis*. Habet autem lib. 2. cap.
21. figuram ineptam sub titulo candidi *Farris*.
Teutscher Reiss & Ane Korn / quod nomen, vt &
ipsa figura, non videtur ad dictum caput per-
tinere. Cap. 22. vocabat *Farris* genus & *Vennicu-*
lum album.

Dodonæo hist. *Frumentum* & *Lat. in fol. consen-*
taneum videtur ad *Zeam* referre *Oryzam Ger-*
manicam à *Trago* nuncupatam. *Tragum* autem,
Farris speciem & *Tragum cerealem* existimantem,
reprehendit, vt qui veritatem assecutus non sit.
Tragum namque rem factitiam asserit, ac subdit:
Olyra autem magis similis *Oryza hæc Germani-*
ca est, quæ à *Dioscoride Zea* generi adscribitur;
aut *Plinii Santalo*, *Farris Gallici* specie, nitidissi-
mi grani: illi *Brance*, ait *Plinius*, vocant: aut
certè *Farris Clusino*, quod fortè idem cum *Plinii*
Santalo est: vtrumque enim candidum, & *Clusi-*
num, à *Clusio* dici potuit: oppido *transpadanæ*
Italiæ, quæ aliàs *togata Gallia* nominatur. Si
quid repugnet, quominus hæc *Oryza*, vel *Clusi-*
num, vel *Olyra* sit, sola vtique erit *vernalis satio*.
Nam *Olyra* & *Clusinum Far*, ex hybernis semen-
tibus sunt. Aded certi, de plevisque *frumentaceis*,
definiti nihil potest: cum propter *Veterum* i-
psorum breuitatem, tum *frumentorum* appella-
tiones, aut diuersas, aut sæpenuerò, confusas
eandem rem aliis aliter subinde appellantis.
Ruellius Farris Gallici, siue *Frumenti Barbati* ge-
nus quoddam esse ait, cuius *gramen candidius*,
ac *spica minoribus aristis circumuallatur*, quàm
Locularis, quod, inquit, *Clusinum* putatur: illud
autem an simile sit, vel idem cum *Oryza Germa-*
nica, expendendum est. Hæc *Dodonæus*, qui præter
sententiam *Tragi*, *Oryzam Germanicam Zea*
speciem facit: quamobrem cum planta ei inco-
gnita fuerit, eius de nomenclaturis opinionem
probare non possum.

C. Bauh. pin. Zea 5. (3. phyt. vbi est Zea genus,
Oryza dicta) siue Zeocryton, seu *Oryza Germa-*
nica: vt & *Trago* (cui & *Tragum cereale* & *Far*
gallicum, & *frumenti barbati* genus *Ruellii* vide-
tur, *Olyra* *Aduers. Far*, *Teutscher Reiss*, *Cast. Ty-*
pha *Theophrasti*, *Tab.*

Semen habui primò *Stutgardia* nomine *Reiss-*


famen, quod *farum* in *horto Ill. E. C. M. Belgici*
di descriptam produxit. *Oryza Germanica*, quæ
ex æstiuarum, siue trimestrium numero est, dici-
tur apud *Mediomatrices* cum aliis trimestribus
feminibus lætissimis agris coli.

Tradunt *Oryzam Germanicam* in cibo vis-
patam aluum emollire, rursus *Oryzam illam* pe-
regrinam, aluum suppressere. *Vtilis autem ger-*
manica ad multa culinæ opera, laudaturque præ-
sertim ad pultes, ob albedinem: cibus admixta
ori grata est: cum lacte *oryzæ* modo decocta, pro-
bè alit, teste *Dodonæo*.

Vire

HORDEVM NVDVM, SIVE Gymnocrithon.

CAP. XVI.



Hybridam *Descriptio*
hæc Gym-
nocrithon, cu-
ius *spica Hor-*
deaceam imita-
tur, horrido a-
ristarum barbi-
tio: at verò gra-
na rufescentia,
vtrinque acuta
vna facie sulca-
ta aduersæ par-
tis mucrone
germen longius-
culum ostentā-
tia, gluma sim-
plici obuoluta,
leui etiam digi-
torum attritu,
facilius quàm
Triticea, exi-
liunt: si quis au-

tem versusum ordo obseruari possit, quaterni ii vi-
deri possunt: porro folium latum, multum, cala-
mos amplectitur.

Trago, qui tertiam *Speltæ* speciem asserit:
Chondro & *Far a-*
doreum *Columellæ*
esse videtur, eiusdemque *Venniculum rutilum*,
quod *Germ. Bern* vocat. *Dodonæus* contra *Farris*
speciem esse negat, nec cum *Chondro* aut *A-*
lica, vt pote rebus factitiis conuenire statuit. *Zeis*
autem annuenerat, *Zeopyrum* quoddam esse
pronunciat, grano nudo. Suspicio ego *Dodo-*
næo minùs fuisse cognitum hoc *Hordeum nu-*
dum, quæ de eo scribit desumpta sunt ex
Ruellio & *Trago*: placet tamen figura quæ *Cor-*
do in hist. cap. de hordeo glabro apposita est cum
hac annotatione, *Dodonæus*, à quo hanc imagi-
nem mutuati sumus, *Zeopyron* vocat, & ex *Gale-*
no Gymnocrithon, i. e. *Hordeum nudum*. Per-
pendendum autem an *Cordus* hoc etiam intel-
lexerit, per hordeum sine tunica. Si hoc intelli-
git, ceu antè quoque monuimus, non placet vo-
cari *Hexastichum*. *Cantherinum* putari dicendum
Ruellii, quod folliculo castratum nascatur. *Hor-*
deum nudum vocant *Galli*.

Calpar. Bauhin. pin. Zea 4. siue Zeopyrum
(sic etiam in *Phyt.*) seu *Tritico-speltum*, quod
naturam habeat *Tris Zeas* & *Tris Zeas* & *Tris*
vineæ *Galeno*: *Hordeum alterum Anguil.* *Zeop-*
pyron *Dod. H. Lugd. & Tabern.* *Zeopyrum* siue
Tritico-speltum, *Hordeum nudum vulgè voca-*
tum *Lob. in Adu. p. 8. Obs. p. 18. ic. plant. p. 10.* *Hor-*
deum glabrum *Cord. histor. hexastichon*, hodie
hor-

Chondro
& *Far a-*
doreum *Columella*
Trago
Zea Dodonæo
Car. nudo
tem.

An Hordeum
sine tunica
cordis.

hordeum sine cuspidis Cord. in Diosc. Hordeum
quodam Gesn. horr. Ger. mundum, Cat. hordeum
mutu. Cam.

Satum Vere in horto Ill. E. C. Montbelgardi, se-
men maturuit Julio, & paulo citius quam in O-
ryza Germ.

Seritur plerisque Germanix locis ad pistrina-
rum & culinarum opera, in quibus hordei usum
præbet.

HORDEVM MVRINVM.

CAP. XVII.

Hordei fibrosis radiculis & foliis donatum,
culinos erigit cubitales, multo tenuiores,
spicas quoque breuiiores, aristis mollioribus ar-
istatas, glumâ tenui, quæ nullum granentegit.

An de hoc Plinius lib. 22. cap. 25. Est herba
rhenica Græcis appellata, Latinis vero hor-
deum murinum. Hæc trita è vino pota præclare
taentes dicit. Ex quibus apparet annotante Da-
lechampio, hanc aut procul diuersam esse à
rhenice Dioscoridis, aut apud Plinium legen-
dum menses cohibet. rhenix enim Dioscoridis
in austero vino pota manantem vulu sangui-
nem sistit & alui profluuium.

Trago Germ. hordeum alterum, das ander
Brau. Verum hordei vitium? Lat. Lolium ter-
tium. Tabern. hordeum spurium (& Gerardo)
Aristida, Gerstenalech, Bastard gersten. Lob:
in adu. p. 7. Obf. p. 18. l. c. p. 30. hordeum sponta-
neum spurium, vulgo Soncken-Turn. & Cat. hor-
deum murinum: Dodon. Lat. hordeum aut Lenticum
murinum, vulgo Muffe Corn. Anguill. rhytus
plini, Aristida aliorum. H. Lugd. Gramen hor-
deaceum, uolens Plinij p. 417.

Geneuz (vbi, vt & alibi, nascimur prouenit) quibus-
dam Carcallen nominatum fuit.

Graminis Loliacei tertium genus Tragi, quod
hordei ipse vitium esse asserit, Thalins d. plex
facit: Manus bicubitali culmo in montibus, lon-
giorique spica: Minus culmo & spica breuiori-
bus, in collibus aridioribus, aliisque asperis lo-
cis, ac secus vias. Hinc C. Bauh. phyt. Gramen
hor. siue hordeaceum minus, Plinio n. d. a tra-
hendo dictum, eod quoddam astita à corpore educat:
ob id Aristida quidam vocant: Item, Gramen
no. siue hordeaceum maius. Eid. pin. Gramen
horda. siue montanum, vel maius: Item Gramen
horda. siue minus & vulgare.

HORDEVM VRENS NOVE HI-
SPANIA.

CAP. XVIII.

Narra Nic. Monardes ad se perlata esse cum
aliquot aliis plantis ex Hispania noua, se-
men huius plantæ, quæ Cenadilla, id est, hor-
deolum, istuc vocatur, à similitudine quam cum
hordeo nostrate habet, in spica & vaginulis, qui-
bus semen includitur, sed minus, & Lini semine
neptiquam maius, verum longè aliis facultati-
bus præditum.


Orzada nouæ Hispaniæ Monardi & Castori.
Cenadilla Monardis Clus. hordeolum Monar-
dis Hist. Lugd. p. 1907. hordeum siue causticum,
propter similitudinem huc relatum. Caip. Bauh.
pin.



stare posset. Etenim vermes in viceribus necat,
putridaque vlcera expurgat, puluis eius sentim
inpersus, maiore minoreve quantitate pro vlc-
cis magnitudine, adhibitis præservantibus que
in huiusmodi remediis usurpati solent. Haque
cum eius facultates infringere volumus, puluerem
stillatio liquore, rosarium aut plantaginis exci-
piunt, linumque aut ellychnium eo intinctum vl-
ceribus & gangrenis imponunt: deinde sacroica
medicamenta adhibentur pro petiti Chirurgi iu-
dicio. Eadem ratione usurpatur in animalium
malignis viceribus, quibus plerumque infestantur.

GRAMEN BVLBOSVM EX ALEPO.

CAP. XIX.



lis delincentibus.

C. Bauh. phyt. 12. Gramen bulbosum ex Alepo Synonyma
quod solum vidimus siccup inter plantas. Gra-
men siliage bulbosum ex Alepo, siccup apud Fra-
trem visum. Plin. Gramen nodosum à radicis for-
ma. 5. siue bulbosum ex Alepo.

Gramen bulbosum Alepi habui à Valeratio
Dorco nostro.

Aliis liqui- Viri
dem ab hor-
deo facultati-
bus præditum
est Etenim nū-
quam auditum
est aliquam a-
liam plantam
ad hoc vrente &
caustica vi præ-
ditam: ita vt vi-
bi cauterium
necessarium est
in gangrenis,
& impuris, pu-
tridisque vlc-
eribus, eosdem
præbeat effe-
ctus, quos non
modo subli-
matum, sed et-
iam ignis præ-

Ex olivari- Descriptio.
bus, multis
laceris, tunicis
vestitis, bulbis
pendent, fibræ
robustæ culmi
pedales etas-
susculi, foliis
inligens angu-
stis, palmari-
bus, scapo ge-
rit spica hor-
deo mutinosa-
mitem, palma-
ri minorem,
glumis densis,
longis, calamo
appressis, sur-
sum spectanti-
bus, in breuem
aristam singu-

AVENA ALBA ET NIGRA.

CAP. XX.

Descriptio



Haud ita facile & promptum ex radiculis fibrosis, culnis geniculatis, foliis gramineis, discrimen; ac in panicula euidētissimum, quo à reliquis frumentaceis sine negotio distinguas licet, quæ iube instar tremulis staminibus explicata, glumis geminis laxioribus hiantibusque, gemina grana oblonga, alba,

nigra, suis interstis glumis, corticibus duris haud difficulter edentibus, nisi molendino, inuoluta, quorum granum alterum habitus aristas habet laterales, grana suis durioribus glumis detecta villosa sunt.

Gaza no-
tatur.

Theophr. 8. hist. cap. 9. inter ea quæ Tritico & Hordeo similia ait, Auenam (Gaza). Ridiculè hic omnia à Gaza translata.) recenset: sed radice numerosiore constare asserit, & multis dispergi culmis, ac veluti siluestre quoddam & immitte semen multiplici tunica integri.

Dicitur.

Dioscorides Auenam (Spinus) rugi calamo, cum foliis Tritico assimilât, sed geniculis ab eo distinguit. In cachimine verò dependentes veluti parvulas locustas bipedes, gent, in quibus semen continetur.

Plin.

Plinius lib. 18. cap. 10. Bromon inter externa recenset, ab Oriente inuenta, Oxyza similia: alibi inter vitia segetis Auenæ græcæ non silvestris, quam sterilem Virgilius vocat. Avena græca, Bromos: Avena cui semen cadit, Aegilops. Dal.) Auenam rusticus vocat Frumentum vitium, & Hordeum in eam degenerare scribit, ut postea fufius dicetur. Cæterum, Auenæ semen maxime nudum tradit, in quo aduersari videtur Theophrasto, inquit Cæsalpinus, qui Bromon multiplici tunica tegi testatur, & alibi, inquit, Auenam maxime natura operuit, ubi græcè Crocos legitur, quam vocem Auenam vertit Theodorus, sed Bromos legendum est. Sed Plinius nudum vocauit: quoniam membrana in maturitate dehiscens maxime nudum ostendunt semen, proprio tamen cortice instructum, ut Hordeum & Spelta. Galenus frequentissimam in Asia ait, & potissimum in Mysia. Tertium autem genus Aegilops vocatur, manifestè quidem à Theophrasto Auenam vertit Theodorus; siluestre quoddam & immitte, quod magis in Hordeo nascitur, terram vehementer extenuat, & multiplici tunica calamo, tum radice constat, folio piloso: cultis melius erumpit: & solum frugale desiderat, & coli exposcit, sed deleri contumax: cum annis alternis nascatur: non enim simul prouenit ex omnibus seminibus, sed partim anno primo, partim se-

cundo: semen continuum, & hisidum cernitur, ut eius vna pars prius nascatur, altera posterius anno sequente. Dioscorides autem aliam videtur describere Aegilops nomine.

Cornario Bromos est Avena sativa, & non sponte proueniens, neque ex Hordeo degenerante producta. De bromo, inquit, Plinius ita scribit, ut & ipsum inter vitia segetis ponat, & cum Aegilope confundat, & tamen eadem quæ Dioscorides de ipso prodat. Germani Bromum Auenam albam; Aegilopa, Auenam nigram & barbatam appellant.

Plin. con-
fundit Bromum cum
Aegilope.

Idem alibi, Aegilops herba est, quæ Latine Avena silu. dicitur, & erratica, & barbata, & nigra atque sativa, ea sc. quæ inter frumentum ut pote eius vitium sua sponte prouenit, atque Hordeo in eam degenerante fit. Differt à Bromo, qui Avena frumentaria est, sativa, pura, & quam alba Germani vocant. Quum porro Diosc. l. 2. de Bromo egerit, falsò de eo in quibusdam græcis codicibus lib. 4. post Aegilopa repetitur, ideoque hic remouendus erit. Huc usque Cornarius. Et autem notam fuisse Auenam nigram vix dum credimus. Fama siquidem non est: sed æquè plena ac ipsa alba; eodem etiam modo colitur multis locis, nec deterior, interdum etiam melior, & grano maiore. Nobis præterea videtur cum temere nimis hoc loco Theophrastum erroris accusasse. Differt enim Aegilops Theophrasti ab Aegilope Dioscoridis, cui non conuenit Avena nigra. Sed à Cornarii sententia alienus quoque est Dodonæus, duas Bromos constituens, vnamque frumentaceam, alteram verò herbam faciens. Et differunt sanè etiam Dioscoridis descriptiones.

Cornari-
tas.

Tragus Auenam duplicem agnoscit, sativam sc. & siluestrem. Sed ita rem tractasse videtur, ut quædam ambæ sint, obscure admodum dixerit, nec facile extricari sit. Theophrastus, inquit cap. descriptum) tria frumenti siluestris genera recenset, Bromo scilicet, Auenam, Aegilopa, & Lolium. Dioscorides verò indifferenter hoc frumenti genus nunc Aegilopa, ut lib. 4. nunc Bromon nominat, videlicet lib. 2. ubi de Avena frumento peculiariter agit. Germani Habern vocant, nonnulli alii, videlicet impostores illi mendici, qui ut facilius homines decipiant, propriam linguam confinxerunt, quam vocamus Betlerwelsch, hoc est Mendicorum Staditorum Italicum, Spir ling ab acuto semine dixerunt. Serapioni Dausia dicitur, cap. 25. De siluestri inter vitia frugum, ita differit: Lolii primum genus in quibusdam aridioribus pratis, & collibus, nec non stramineis domorum tectis, prouenit culmo, stipula & spica, Auenæ haud multum ab simile, fructus exerts, quare lepide Plautus in Milite dixit.

Avena de
plex.I. de Tri-
cam.

Mirum est Lolio visitare se tam vili Tritico, qui senarius in proverbium tandem abiit, quo notantur lusciosi & excutientes, vide Erasmus in Chiliadibus. Hoc Lolii genus Plinius proculdubio intellexit, cum libro 18. cap. 17. scribit. Primum omnium frumenti vitium est Avena. Nam & nos Germani id vitii habern hoc est Auenam dicimus, sed non simpliciter, ad differentiam enim frumenti Auenæ appellamus Gauchhabern/ vel Neuschhabern, hoc est, Cuculi, vel Murium Auenam. Hæc Virgilio sterilis avena nuncupatur, Dioscoridi 2. m.

Magna est autem inter doctos controversia, quidnam sit Avena, quid Bromos, quid denique Aegilops, de quibus ingentia volumina conscribunt.

C. Bauh. pin. Avena, siue vulgaris ita quoque phyt.

XVIII

Avena, Graecis Ἀβύνη, forſan à βρύνη quod cibū
ſignificat, & ἀνός, & Διοſc. Ger. Babern/Boh.
Bauern. Gall. Avoine. Ital. Biava, Avena, l'ena. Hiſp.
Ava & Avena Anglis Veteſi Etco & Baber.

Дитя твоего, иди: а Амена сиблю.
Vire-Ecl.1.

Avena item est, culmus & stipula: Virgil.

Adhuc est Avena herba segetes necans: Virgil. E-
cl. 5. & Georg. 1.

Symmachus : Nec rubigo segetibus obfuit, nec Avena fruges necavit. Steriles tamen Avena aut secundum situm Italiae Virgilium dixisse vult Horatius Gramini, quod in Thracia fructuosa sitatur ad discretionem earum quae seruntur.

Terram paucis annis exhaustire Auenam, scri-
bit etiam Virg. Georg. 1.

Loca amat rigua. Vere facta, sub finem ætatis
 murefcit.

Nostri Cornarij, verba sunt] ex Bromo Avena
farinam crassiorem instar Crimmi faciunt, quam
cum aqua coctam addito butyro edunt aut sor-
bent. Et ex farina tenui pulcem parant. In Saxo-
nia, magna farina illa, crassior, & velut Crimmon
apparata, omnibus fere obsoniis aspergitur, vna
cum sale & simul coquitur. Prudens oconomus
& quorum recentium cupidus Io. Collerus, men-
se Ianuarii gallinis Avenam tostam exhibuit, ve-
citijs & frequentius oua parerent, quod experi-
mento comprobauit.


С А Р. XXI.



Descriptio

Avena nuda Lebel. in Aduersf. pag. 9. Icon. p. 32. Descriptio
Dodon. Tabern. Ger. & C. Bauh. qui tertiam facit.

С. А. Р. XXV



ribus, partim virescentibus, latioribus quam in
vulgari Avena, cui similia grana intus bina com-
muniter, rarius singularia, fuluo ac penè rufso co-
lore prædita, pilis hauescentibus ac pulchris, Byssi
instar, lucentibus, obsepta, quæ ferè Avena gra-
nis longiora sunt. Secus quas ariste exeunt ge-
mellæ, longæ, duarum aut trium vinciarum nu-
tantes atque incurvæ, uti crura *St. alexand.* seu

hora, & in summo capite suis inclusa folliculis [hæc omittit Cœn.] semina duo aut tria, rubra, & quibus ariste velut capilli exeunt. Sed quid impedit, inquit Marantha, Aegilopem quaternam vel etiam plura in summo capite habere semina: etiamsi Dioscorides dicarbina, ternæve illi incluse.

Hordeum enecat Festuca, ait Plinius, quæ vocatur Aegilops, quoddam poculorum aegilopas sanet, folio Tritici.

Pliniam Aegilopem Auenam græcam vocare, & Festucaginem à Gaza reddi, legimus apud Hermol. Coroll. 752. & Io. Agricola cui præterea Aegilops Diosc. est Avena sterilis Virgilij.

In Aegilope [inquit Leon. in Plinij errata apud Brunfels. romo 2.] nescio an magis accusandus sit Plinius, qui in rebus adeo vulgaris, quibus nomina Latina non decant, Græcis utendum censuerit: an potius quoniam de eisdem herbis græca appellatione monstratis illa affirmari, quæ sensus falsa esse deprehendit. Ex Theophrasti verbis, quorum magna ex parte sententiam Plinius, de vitis frugum agens, exprimere studuit, facile ostenditur Pliniani erroris in Aegilope, origo. Postquam enim Theophrastus fecerat de Orobanche mentionem, quæ amplexu suo Erum strangulat, subdit eandem esse Aegilopi, quam Auenam Gaza conuertit, interueniendi rationem, idem subiunxit Plinius, hordeum enecat Festuca quæ Aegilops vocatur. Cur autem Aegilopem potius quam Auenam eodem loco dixerit Plinius, eam rationem affero, quod cum Græci duo Auenæ genera facerent, Bromum sc. & Aegilopen, hoc verò discrimen nemo reddidisset in Italia, ob id Plin. lib. 13. cum Auenam inter vitia frumenti collocasset, paulo post de Festuca quæ vocatur Aegilops, edisserit: non quod nesciret Auenam id esse quoddam genus, ut nonnullos canillares inquit Brunfelsius, me scil. innuens &c. Plinium in meo libello non reprehendi quod nesciret Aegilopem esse quoddam Auenæ genus, sed ob id, quod eodem capite modo Græca, modo Latina voce in eodem Auenæ genere uti voluerit. Nam quod Plinius lib. 13. Auenam esse frumenti vitium & hordeum in eam degenerare, hoc idem Theophrastus lib. 6. de plantis & Galen. lib. 1. de alim. de Aegilope etiam testatur. Quod verò etiam paulo post Plinius ait de Aegilope hordeum necari, id ipsum Theophrastus lib. 5. de causis plant. licet alio modo quam Plinius Aegilopi tribuit. Alterum quoque fastigium Plinius, si non eodem capite: saltem libro, aliquando Bromon, aliquando Auenam nominavit &c. Cur Plinius Aegilopem circumligando se hordeum dixerit interuenire, non scirem reddere rationem cum nulla Auenæ species, quæ id faciat agnoscat, sicuti neque Lolii &c. Sed cur Plinius in his apertis erroribus tam operose defenditur abs te Brunfelsi ubi Plinius Aegilops naturam peruertit &c.

Pro Plinio aduersus Leoniceum stat Randolph. Coliniarius, sed an Plinium sufficienter defendat, Lectoribus liberum esto iudicium. Aegilopem, inquit, quæ sylu. Avena sit, quis unquam vidit vel iumenta vel homines vesci? Tum Avena Tritici & hordei vitium est: quod duodevigesimo volumine docet Plinius. Aegilops verò (ut eodem loco Plinius) hordei morbus est proprior non vitium, & hordeo innascitur, quod quinto quoque & vigesimo volumine refert (populo etiam teste) duo esse Auenæ genera. Frugiferum vnum: sterile autem &c. Dioscorides quoque de Tom. 11.

Avena, Aegilopeque seorsum tractans, diuersas illas esse indicauit. Non Bromi quidem duas species, 2. volumine cum referat, secundum à Romanis Auenam vocari: tum 4. volumine Aegilopen quoque à Romanis Auenam dici affirmat &c. Aegilops semina maiora (quam Auenæ) nigra &c. Si Dioscoridis & Plinii scriptis & rationibus, & rei ipsius euentibus, diuersa esse monstratur, [Aegilops & Avena] quis Leoniceum non errasse defendit, qui Plinii doctrinam taxare non sit veritas &c. Lectorum erit examinare an Plinium sufficienter defendat Randolphus.

Theophrastum non nusquam, ut lib. 5. caus. Aegilope pro inani Avena, & lib. 3. pro herba hordeum enecat, hic tamen corruptè Aegilopa legi: Plinium verò Festucam vocare, in eademque distinctione vagari nunc frugem, nunc herbam facientem, testatur Rob. Constant. in Lexico.

Aegilops herba est quæ Avena Latine dicitur, sed ea quæ sua sponte provenit, atque hordeo in eam degenerate fit. Virgil. steriles Auenas dixit. Differt Aegilops à Bromo, quod Bromos Avena frumentitia est, sativa, pura, & quam nostri albam vocant. Aegilops autem ex hordeo degenerate, & inter frumentum sua sponte provenit, utpote eius vitium, & alias etiam nascitur, & Avena sylvestris, & erraticæ, & barbata, & nigra, & farua à nostris appellatur. Confundit tamen Bromon cum Aegilope Theophrasti & ipsum in hoc sequitur Plin. Quam autem lib. 2. de Bromo egerit Diosc. lib. 4. post Aegilopa falsè suppositus in quibusdam Græcis Codicibus habetur, & à nobis remotus est, inquit Cornarius. Nobis autem non videtur ita temerè erroris accusandus hoc loco Theophrastus. Is enim nostro iudicio diuersam tradit Aegilopa à Dioscoride, ut facile est colligere ex eius verbis lib. 9. cap. 9.

Cæterum quoniam hodie sit stirps Aegilops, inter authores non conuenit. Est enim gramen quoddam Matthiolo, quod Aegilopem existimat. Est Festuca prior Aegilops species Dodonæ: nobis Aegilops quorundam artistis recuruis siue Avena pilosa. Habet Tragus Lolium secundum, Aegilopem Galeni, quod Gramen gros Montbelgardicum inscribitur. Aegilops Narbonensis & calidarum regionum Lobelij. Gramen quoddam tremulum à nobis describitur, quod est Aegilops vera Plinij, Trago. Gramen nodosum suspicatur author Hist. Lugdunensis Aegilopa Plinij. Hordeum murinum cognominat Aegilopa Schuuenck f. Triticum secale an Aegilops, Barchanelli. Aegilops dicitur de Avena tam alba quam nigra. Aegilops Bulbi genus Plinio lib. 19. cap. 1. Hoc cuiusmodi sit, nondum certe reperire licuit. Aegilops Dioscoridis Brunfelsio in sua Exagesi, est Consolida regalis, de qua lib. 25. Hist. n. Aegilopa Dioscoridis, quidam autumant Aquilegiam, descriptam lib. 30. Sed decipiuntur. Est porro Aegilops ex Quercuum genere, quæ Cetrus cognominatur. Hist. Lugd. pex Aegilopa intelligit fortè Tagum sepium.

Aizoid Græcæ, & Lat. Aegilops, Germ. Taube haber/wild vnnnd vnfruchtbarer haber, Gersienratten, & Theod. Gollio in Onom. Aüßerterete von der gersien/Unkraut in dem gersien. Galis, l'ne forte d'avoine n. nimee Aueron, cu Auenetron, Auoine sole: Auoine sterile, Auoine sauvage: adhuc Rusticis Gallis Aueron, quasi auehago vel auehala: in Gallia Celtica, Cequtele.

In Hordeo non nisi post annum à semine suo nascitur.

Herba cum farina imposita sanat Aegilopas, & duricias discutit: succus servatur ad eadem.

Phlo. 100.

Avena fr.

Bromus differt ab Aegilops.

Theophr. 6. Plin. 13. de Aegilops.

Diosc. 4. lib. 4.

Aegilops Gramen Aegilops forte Matthi.

Aegilops quorundam.

Gramen gros.

Aegilops Narbonensis.

Gramen tremulum.

Gramen nodosum.

Hordeum murinum.

Secale.

Avena.

Bulbi genus.

Cetrus.

Hist. Lugd. pex.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

Aegilops.

farinæ ammixtus, ac siccerus, authore Dioscori-
de. Plinio, Agilopas sanat herba eodem nomine,
semine contrito cum farina permixto, imposito-
que, vel succo: exprimitur hæc e caule, foliisque
pregnantibus, demptâ spica ut in trimestri, dige-
ritur in pastillos. Agilopi Galenus dissentienti
vim attribuit, id quod ex gustu cognosci scribit:
leniter enim quodammodo acris est, imò etiam
ex eo, quodd induratas inflammationes & agilo-
pas sanat.

GRAMEN SIVE AVENA STERILIS.

CAP. XXVI.

Descriptio **Q**uemadmodum spontanea pieraque satis
strigoliora, ita & lux spontis Avena, sati-
ua & culmi crassitie & altitudine cedit, catero-
qui ei satis similis, iuba glumis, mollicellis bre-
uium aristarum feris, verum semine aut nullo aut
crasso, strigolo.

Locus & tempus. In pratis citra admirabilem fontem in Duce-
catu Wirtembergico Augusto mense florens.

AGILOPS BROMOIDES IVBA
purpurascens.

CAP. XXVII

Descriptio **V**alidis sed fibrosis fundatur radicibus, stipu-
las emittens plures, bicubitales, valentulas,
longis internodiis distinctas: folia Avenaceis
longiora, ridicula, angusta, subhirsuta, porissi-
mum quæ a culmis abscedunt; vagina siquidem
culmum complexa glabra est, iuba purpurascens
diuisa. Inter glumias longæ, graciles, avenaceis
strigiosiores iuba emicant: quæ verò petioli glu-
mis committuntur flauescens villus circum-
nascitur.

Locus. In Gallia Narbonensi tam inter segetes, sed ra-
rò, quam ad squalidas aruorum margines colle-
git Gener Cherlerus.

LOLIUM QUINTUM TRAGO,

Hordei granis, aristis non admo-
dum multis.

CAP. XXVIII.

**Tragus no-
tatur.** **L**olii genus exiguis & oblongis Hordei gra-
nis, sed aristis non admodum multis, nec as-
peris armatum, Tragus Bromon Dioscoridis esse
iudicauit, ac præterea eorum sententiam impro-
bandam censuit, qui caput illud apud Dioscori-
dem ceu supposititium pronunciarunt atque da-
narunt. Adductus, ut ait, autoritate Theophras-
ti, tria Lolii genera describentis. Sed quamnam
consequentiæ necessitas? Theophrastus tria des-
cribit Lolii genera, ergo hoc quintum est Bro-
mos Dioscoridis.

C. Bauh. phyt. Gramen rad. siue Festuca sterilis
altera: Eid. pin. Gramen Festuca 8. siue Festuca ave-
nacea sterilis humilior. Bromos herba graminæ
generis Thalii.

PHOENIX VETERIBVS.

CAP. XXIX.

Phoenicis nomine hic non intelligimus arbo-
rem illam, de qua lib. 3. cap. de palma egimus

sed herbam, de qua Dioscorides, hæc scripsit.
Phoenicea herba [poine] quam aliqui Rhun, a-
lii Anchinops vocant, folia quidem hordei, ac
breuiora & angustiora: spicam verò Lolio simi-
lem, & ramos circa radicem senum digitorum, ac
septenas octonasue spicas. In aruis rectisque re-
ces illitis nascitur. Vinum hanc habet in austero vi-
no pota, ut alui profluuium, erumpentemque ab
utero sanguinem, vinarumque largiorem fluxum
iustat. Tradunt & nonnulli in puniceo vellere a-
muleti instar adalligatâ, sanguinem suppressere.

Est & herba Phoenicea appellata à Græcis, à
nostris ordeum murinum. Hæc trita ex vino po-
ta, præclare ciet menses. Ita Plinius lib. 22. cap. 25.
An verò eadem hæc sit, quæ Diosc. Phoenix, il-
lud maxime ambiguum facit, quod menses illam
ciet dicit: quum Diosc. Phoenix sanguinem si-
stat & alui ac vrinæ fluxum cohibeat. Galenus de
Phoenice herba siluit.

Paulus Phoenix, inquit, quam alii Rhun vo-
cant herba est Lolio similis. Vinum habet adstrin-
gentem. Potâ in vino austero omnia fluida sistit.

Phoenix ea esse videtur, quam Germani (inquit
Corn.) Taubenforn appellant. Sicut enim Agi-
lops vitium est Avenæ, & sterilis Avena dicitur,
& à nostris Taubenhabern: ita phoenix Ordei
vitium, & sterile Hordeum apparet. Et propre-
tea etiam ipsum Anchinops, aut potius Anchi-
lops à Dioscoride vocatur.

Guilandinus de Papyro affirmat falli Hermo-
laum, Ruellium Marcellum, & qui eos sequitur
Mathiolum (Ryffium adde, Lobelium Dodo-
nzum, & alios) quod omnes perhibeant Phœni-
cem, pusillam Dioscoridis herbulam, dièta Plinio
Phoeniceam, & Hordeum murinum, decepti no-
minum similitudine.

Cæterum, pro Phœnice herba, varix à variis
exhibentur plantæ. Est nobis Pœnix Lolio similis.
Phœnice Tragi suspicor Agilopem Matthioli.
Phœnix, Leo, Carduus ferox, quid?

PHOENIX LOLIO SIMILIS.

CAP. XXX.

Descriptio **V**T est eorum genus serè quæ segetis nomine
veniunt, ita & hoc vitium capillatam fibris
radiculam habet culmis coactionibus plurimum,
sesquicubitum nonnunquam altis, perquam te-
nibus rarisque geniculis donatum; folia Tri-
ceis angustiora, palmum aut sesquipalmum lon-
ga: spica, Loliacea ex acto virescens aut rubes-
cens, glumis alternatum ex culmi fastigio ortis,
subiecto foliolo, lumpero simili, non mordaci:
flosculi frumentacei albi.

Lolium 4. Trago des Vier Questengrass /
Lolium exiguum, Dinkel / Spelzen / Dort / qui-
busdam S. Petreeforn, & Wildungel / Rot
Wild habet / Geln. cgl. stirp. bid. in cat. Ein
Freutlein der Hersien gleich. Dingen belmer, &
Waldtrohor / Lobel. Taubenforn / Meusforn /
& Mäusgersten / Matth. germ. Belg. Moysse-
foren: Gall. luraye sauvage: It. Leglio saluapio:
Boh. Myssy faufol.

Phœnix Matth. Turn. Lacun. Dod. (cui & Lo-
lium murinum) Cast. Cord. Lon. Cas. Lugd. &
Lob. Obs. p. 21. lc. plant. p. 34. Hordeum mûri-
num, Guil. Lob. Tab. Graminis Loliacei 4. genus
Tragi, Tal. Lolium rubrum Ger. Gramen Loli-
aceum 3. siue angustiore folio & spica: sem. Diosc.
coridi, à feminis colore phœniceo, Herba phœ-
nicea

Hordeum Graecorum. *Hordeum mutundum* Romanorum Plinii, C. Bauh. pin.

Nascitur in aruis, secus vias, & in ædificiorum tectis: in Italia, & Gallia frequens, & ubique fere ubi reperitur etiam in Vbiotum & Eburonum finibus. *Eam proximè sequens leon non male representat.*

LOLIUM GRAMINEVM SPICATVM

CAPVT TENTANS.

CAP. XXXI.



Descriptio

Stipulas habet cubitū unū, duos, tresve altas, striatas, paucis nodis articulatas, foliis amictis gramineis, in spicam fere spithameam delincentes, figurā peculiari, in quodam alter-narim ex culmi lateribus grana terna aut quaterna, & quina, in paruas aristas desinentia, rubentia, triticeis strigiosiora,

glumis adherentibus clausa, pedicellis brevibus connexa, pusillæ spicæ forma, exeunt.

Figura Lobelii in Obs. p. 22. l. c. plant. p. 35. titulo Loli & Tritici temulentum melius placet, quam nostra, quæ iam facta erat.

C. Bauh. pin. *Gramen loliaceum*. sive spicæ latiore. Aps. Diosc. Arist. Theoph. Gal. Orib. Aegin. Aet. Zizanius Constant. Zizania Arabum. Lolium & Aet. Plinio. Lolium Ruell. Matth. Ges. car. Anna. Cordo in Diosc. Tur. Dod. Cxf. Cast. Lugd. Taber. Lolium & Triticum temulentum Advers. Lob. Lolium verum, Gesn. hort. Lolium album Ger. Frumentum sativum, Lon. Variat: communiter aristas habet, sed sine aristis quoque Bononiæ observatur. Eidem Gramen loliaceum latifolium spicæ angustiore, quod sic describitur: Gramen loliaceum latifolium spicæ angustiore: Ex radice alba, arundinacea, fibrosa, culmi aliquot bicubitales exurgunt, foliis paucis, latiusculis, oblongis cincti, quorum summo spica angusta, uncias quatuor vel quinque longa, Phoenici vel hordeo marino similis. Basileæ circa Cliben, longioribus & brevioribus foliis varians reperitur.

Lolium vnde dictū

Lolium autem esse *αἰσά* Graecorum, non est ambiguum, etiam si plinius diversis locis, tanquam de diversis agat. *Αἰσά* porro vocantur Graeci, teste Lobelio, ut coniectura fert *αἰσά* *αἰσά* *αἰσά*, quod est efferrī & attolli, vel sursum rapi: rapitur quippe in cerebrum Lolii vapida nocua aura, atque demencia affinem tenebricosam vertiginem, temulentiamque efficit. Quo quidem maleficio vel infumæ plebeculae notum, & inuisum plus satis est, praesertim Galloprovincia, Narbona, & passim in reliqua Gallia ubi *Yuraye*, quasi ebriosa vel inebrians vocatur. Quippe etiam in

Tom. II.

Normannia, Belgio & Anglia, non solum panis mixta farina, sed multo magis Cerealibus porionibus, *Ale* & *Byere* addita, & servata, torpore & remulento veterno cerebrum opprimit, & opacat, reliquaque membra torpida reddit. At fortis adnotum, eiusdem ex axungia depositum cataplasma, eadem pellit incommoda, doloresque diuturnos artuum & pericrani soluit.

Spica similior nulli quam Phoenici, ut scire Dioscorides monet: coque qui alterutram noceat, ambobus noceat. Granum in dura tunica: stipula, radix, & reliqua Tritici, vel Secalis sunt: coque ea in opinione, qui ex Theophrasto est Senensis, ut hæc Theophrasti pestis, ruscum in Triticum redire solita sit: ut verum dixit, ita ineptum & phisices imperitum se prodit, quum de Hippocrate Historiam, è Plinio exemplum sexus humani mutati, adducit. Quippe neque ad rem facit hic, sexus mutatio, & in plantis sexuum distinctio non vera, sed metaphorica & figurata doctis meritis censetur: igitur res vera, ratio improba. Nul-lus enim non novit hic defecisse Lolium à Tritico, nec in feminam abiisse, sed in vitium quodpiam, aut aliam segetis speciem; calidius enim & siccus est Lolium reliquo quolibet frumento, improbum alendo, praesertim homini, Tritico autem planè contrarium natura. Hoc enim homini salubre, veterinariae autem nex plerumque. At Lolium hisce, ut neque alitibus gallinis nocet nihil, illi tamen plurimum, quare specificæ differentie sunt, non maris aut feminae, ut blaterabat Commentator. Quin etiam Lonicerus Germanus Botanicus minimè bonus.

Commentator Senensis non.

Dicitur & *αἰσά* & Graecè: Arab. *Zizania* & *Seylem*: Germanis *tuvalch*, cum in Hordeo nascitur: in Secale verò *respe* *trabsendorn* & *treddorp*, Cordo. Vocatur & *fühweizen*, hoc est, Triticum vaccinum, & *Külch*, corrupta Lolii Latina voce. Belg. *Dolich*. Gall. *yuraye*, ou *yuraye*, & *lul-le*. Ital. *Loglio*. Hisp. *joio* & *rezania*.

Lonicerus qualis Botanici. Nomina linguarum

Nascitur in aruis cum Tritico ac Hordeo, se-minibus ipsorum corruptis, ac in deterius, ut Galenus ait, permutatis, & solo quidem praesertim vliginoso per cæli, mensibus potissimum hybernis, tempestatem humidam.

Lolium molitum vim habet emarginandi ac circumscribendi nomas, & putredines, & gangranas, si cum raphanis & sale imponatur. Impetigines feras, & lepras cum sulphure vino & aceto curat. Cum stercore verò columbino, & Lini semine coctum in vino, strumas dissolvit, & quæ ægrè maturantur, rumpit. Cum aqua multa coctum ac impositum, coxendicæ morbo laborantibus prodest, addita rosentia, aut myrrha, aut croco, aut thure. Idem sultum conceptus adiuvat, auctore Dioscoride. Plinius lib. 18. cap. 17 Lolium, inquit, non minùs quàm Rubum, inter frugum morbos potius quàm inter ipsius terræ pestes numeraverim. Et paulò post. Aetæ granum minimum est in cortice aculeato. Quam est in pane, celeritè vertigines facit. Aiuntque in Asia, & Graecia balneatores, quum velint turbam pellere, carbonibus id semen iniicere. Et lib. 23. cap. 25. Aetæna farina magis cæteris purgat vicera vetera, & gangranas. Cum Raphano & sale & aceto lichenas. Lepras cum sulphure vino. Et capitis dolores cum adipe asserino imposita fronti. Strumas & panes concoquit cum fimo columbino & Lini semine decocta in vino. Et ibidem inferius. Quin & ipse frugum pestes in aliquo sunt usu. Infelix dictum est à Virgilio Lolium: Hoc tamen molitum, & ex aceto coctum impositum;

Plinius de
Talis
Dioscor. de
Succo
Succo

q; sanar impetigines, celerius quā sapias mutari
est. Medetur & podagræ, aliisque doloribus cum
Oxymelite. Ratio hæc, Aceti sextario vno di-
luntur mellis vncie duæ. Iustum est ita tempe-
ratis sextariis tribus, decoctæ farinæ Lolii addere
vique ad crassitudinē, calidumque ipsum imponi
dolentibus membris. Eadem farina extrahit ossa
fracta. Atque hæc est veteris codicis lectio.
Et sane Plinius nequo integrè, neque distinctè
medicamenta à Diosc. præscripta expressit: quan-
quam etiam Dioscoridis lectio non satis probe
sit distincta. Cornarius ita distingui ac coniun-
gi debere censuit, velut huc reddidimus, maxime
ea quæ postrema habentur, ut Ischiadicis cum
aqua multa coctum, & addita polenta, aut myr-
rrha, aut thure impositum Lolium molitum pro-
desse velit: & deinde ipsum solum suffiri, & non
cum aliquo ex his quæ præcedunt, quæ conco-
quendæ coxendicæ affectionis gratia, comino-
dè in cataplasma Loliaceum ammiscentur: Ine-
ptè verò ad suffitus adhibentur. Desiccet ut
Galenus lib. 6. de simpl. medic. facult. & excoalefacit
efficaciter, ut propinquum sit acerbis, magis
quàm Iris: sed non est perinde ut illa subtilis es-
sentia, verum multum ab hac deficit. Secun-
dum hoc, ponat ipsum quispiam in principio ter-
tii ordinis excoalefacientium, secundi verò in fi-
ne exiccantium: *Lolium*, autem frugibus, ex quibus
Cereuisia coquitur, permixtum, ebrietatem citò
excitantem eam reddit: idem potest panis copio-
sius additum. Nocet verò & oculis, caliginem
ipsis adferens: quod & Ovidius Fastorum lib. 1.
scriptum reliquit:

Et careant Lolius oculos viriandibus agri.
Atque hinc natum videtur proverbium: ut cacu-
scentes Lolio videri dicuntur.

GRAMEN GROS MONTBELGARD.

CAP. XXXII.

Descriptio

Calamis est cubitalibus, nodosis, in quibus fo-
lia graminea, summâ stipulâ spicæ complu-
res in lubæ formam conspiciuntur, tenuibus, as-
peris pediculis appendicibus, vnciam
circiter longis, binis versibus
compositis, grani nouenis, aut
paucioribus, vix
vnumquam pluri-
bus, Secales pa-
ribus, formâ a-
liis, rubris, ca-
nalicularis, du-
ris, gluma bifori
hirtuta in bre-
uem aristam
(quæ postremâ
glumæ geminæ)
desinente con-
chilis; radices
multæ, capilla-
res.



Plinius de
Succo

Dodonæus
hanc plantam
sic describit: Altera Festuca, quæ propriè Seca-
lis virium est, culmis foliisque Secale refert, cul-
mos obtinet Tritico Hordeoue tenuiores, in quo-

rum summo veluti effusæ pendent subz, Auenæ
propemodum similitudine, sed breuiores, arctius-
que coniunctæ. Semina oblonga, sunt, longitu-
dine grani Secalini, sed angustiora, tenuiora, le-
uioraque multo, quæ membranulis siue utricu-
lis paruis continentur, e quibus càm in arca teri-
tur, concidunt.

Germani Dort & Lûsch vocant: Brabant
Drauid: Latine Festucam alteram non male
quis dixerit. Nam inter ea quæ frugum simili-
tudinem gerunt, illasque interim infestant, mi-
nimum ac leuissimum est granum: Festucis ea
de causa similitimum.

Gramen hoc, quod Tragus lib. 2. cap. 15. pro
Lolio germ. Dort dicto describit, nullo modo
existimo fieri ex mutatione Hordei & Tritici:
multo minus idem esse cum planta, quam pingit
pro Dort & Lolio. Hordeum, Triticum, & Dort
Tragi annuæ sunt plantæ, non repentes: ac præ-
terea spicis inter se multum dissident. In eo etiã
aberrasse videtur, quod Aegilopa Galeni, sed non
Dioscoridis, esse crediderit, sed potius Avena eius-
dem, & Zizaniæ Auicennæ.

Sed & Dodonæus (perhibente Gesn. hort.) Aegilopem
fecit Dort germanicè dictam, camque
lib. 2. imag. pro Lolio pinxit: circa finem verò
eiusdem libri, se emendans, Aegilopem nuncupa-
uit & pestem Secalis esse dixit. Refert idem
Gesner. Tragus hanc plantam tertio inter Lo-
lia loco describere, quæ in re non parum hallu-
cinatur: nam secundo, ni fallor, loco traditur.

C. Bauh. pin. dicitur Gramen Festucæ 1. siue Fe-
stuca graminea glumis hirsutis: Lolium 2. Trag.
at 1. iconè Aegilops & Festuca, Dod. gall. Gesner.
hort. Bromos, Lac. altera, Ger. Bromos sterilis
altera, Lob. Obs. p. 21. Ic. plant. p. 33. & Hist. Lug-
dunensis Lolium Lon. Festuca altera Dodonæus
Gramen murorum Dalech. Lugd. Festuca grami-
nea, Tal. Phœnicis altera species, Eid. Simpho-
nium, Bromos herba, Tabern. Variat spicis,
quæ aliquando quasi in fasciculum comprehen-
sæ, & Phœnix altera est Thalii: aliquando dis-
persis: sic aliquando glabris, aliquando hirsutis
& propriè Secales virium est.

Propriè Secalis virium est: cum aliis enim fru-
mentis, aut non rarissimè reperitur: succrescit,
veluti & alia huius generis, per imbres frequen-
tes: anni hyemisque constitutionem clementem
ac tepidam.

GRAMEN SPICA HIRSVTA, ad Gramen du Gros accedens.

Descriptio

Summus culmus spicâ insignis est duum trium-
sue vnciarum Triticeæ simili, magis diuulsa,
glumis multiplicibus, hirsutis, aristis mollicellis,
perbreuib; nec effatu dignis: folia per stipulam
lesqui cubitalem angusta, villosa, candicantia.
Radices crassæ, duræ, fibras crassiusculas habent
appendas, perennes.

Nemauti inter Triticum præcipuè obseruauit
& collegit Gener Cherlerus.

Locus

GRAMINI MVRALI DALECHAMPII simile, si non idem.

AD Gramen du Gros Montbelgardenisibus di-
ctum nonnihil accedit: à quo natalibus a-
liisque quibusdam notis differt: nascitur enim in
parietinis, culmis multis cubitalibus & altiori-
bus,

Descriptio



bus, foliis ad genicula non ita dissimilibus, sed hirsutis & fere canescentibus; tuba eundem habet cum gramine du gro positum, cuius partium textura itidem distichos, spicas breues imitata, aristis mollibus breuibus, glumae etiam molles, striatas, armaribus, tantillum hirsutas, squammatum incumbentes, strigosiores, & semine crassas. Radix capillaribus fibris contexta est. Nisi figuram paratam habuissimus, meliorem exhiberemus.

Figura Hordei murini Tabern. optime conuenit nostro Gramini, sed cetera nomina, ut phoenicis & Lolii non item, existimo praeter auctoris sententiam figuram plantae quam non intelligat appositam. Prater Casparus attulit ex Italia nomine Cynopis Theophrasti & Canariae.

Genevæ observavi & in valle Griesbachiana ad thermas acidas: Patavii provenit, nec non Ballex & Montbelgardi.

ÆGILOPS MATTHIOLO FORTE.

CAP. XXXIII.

Descriptio



Folia graminea, angusta, hirsuta: culmi plures, cubitales, geniculati, tenues, paniculam ferunt singuli multifariam diversam, cuius portiuncula squammatum & pluribus glumis compactiles spicam parvam mentiuntur, locustis Avenae non multum dissimiles, alias singulares, aristis donata mollibus, longis.

Lobel. sic describit: Bromos, siue Avena sterilis, ab Avenis vesca, usu quidem diverso, sed genere & figura non diversa: utriusque enim ut nomen sic facies, & natales eadem. Sed minore gracilioreque pedali stipula, apiculisque stamineis delicatioribus, minime mordacibus, comosa est: gic, semen ferme evanidum, in tunicis ferme vacuis.

C. Bauh. phyt. pag. 23. Gramen 104. siue Festuca sterilis.

Tom. II.

Trago forte Lolii i. genus est, quoddam rlinium lib. 18. cap. 17. per primum omnium frumenti vitium, Avenam intellexisse asserit: Virgilium vero per Avenam sterilem, & per rhaenicem Dioscoridem. Vocat germ. Gauchhabern & Mauchhabern, hoc est, Cuculi vel murium Avenam.

An Matth. in prior. Comm. Ægilops siue Festuca, Ananienis ruri vulgo Squala. Arabib. Dausir, Dalisir, Dufana, Dauser, siue Duffer: Ital. Ægilops. In post. comm. similem habet figuram sine descriptione pro Ægilope prima, olim vera existimata, ut ait, Italica nomina adimens. Videant ergo Lectores, qualiter se extrincent ex Matthioli scriptis.

Tabern. icon. p. 124. & Hist. p. 666. Ægilops i. Avena fatua. Versien/ Traldy Gauchhabern/ haber grae, alyad, Festuca, Festucago, gaze Bromos sterilis, Virgilio Avena sterilis i. Georg. Plinio Hordeum festuca lib. 8. cap. 7. Ital. Squala & Squala. Galli, Luron & anaron. Angl. Dranich & velle otes. Fland. & Brabantis. Dranich. Spica Hordeo similiores, nisi minores essent, nec ita asperae, sed molliores.

Dodon. gall. C. 10. ma, Bromus herba, & Avena herba. gall. Avenon aut Aveneron. Eid. Hist. frum. & in fol. Lat. Bromus herba Avenae & Ægilops similis est, habituque ipso sylvestris quaedam Avena, multiplicibus cum geniculatibus culmis, foliisque eam refert, licet utriusque tenerioribus: tuba rarior, aristae asperiores, longioresque habet: radice firmatur copiosa ac tenui. Nominant eam Graeci βρόμος, id est, Bromum herbam, ad differentiationem Avenae, quae Graecis quoque C. 10. ma aut C. 10. ma dicitur.

Lobel. in Adu. notat falso primam dici Ægilopen apud Matthiolum, & Bromon esse. In Obi. p. 20. figuram Dodonaei habet nomine Bromi, vocans p. 21. Festucaginem gaze Italorum Vena vana, id est, Avenam cassam, & Ora salutaris, & deum Ægilopen alteram, non primam Matthioli.

C. Bauh. pin. Gramen Festuca 7. siue Festuca aenacea sterilis clatior C. 10. ma Diosc. aliis C. 10. ma ad differentiationem Avenae. Festucago gaze. Lolii primum genus, Trag. def. Ægilops prima Matthioli. altera in comp. Ægilops Lac. vera gesin. hort. Bromos, & Avena herba. Dod. gall. Festuca & Avena orrea, Lon. Avena sterilis, Adu. Thal. Bromos sterilis Lob. icon. ger. Bromos herba. Dod. Lugd. Avena graeca C. 10. ma Ægilops i. & Avena fatua Tabern.

Herba natura sua in totum sylvestris, Aestate Maio mense secus vias in pratis, agrorum marginibus & segetibus reperitur.

GRAMEN TENVIFOLIUM HIRSVTUM BARBA ÆGILOPIS OLIM Matthiolo.

CAP. XXXIV.

Radices tenues albae, a quibus enatorum culmorum pars ima nodosa, satis profunde in terram depacta, festucis siccis comata, ut in Nardo Indica folia dodrantalia, angusta, hirsuta, potissimum quae calamos ambiunt, angustiora multo quam sint Ægilopis Matthioli: calami hirsuti, geniculis nigris distincti, tuba diuilla, ut in Ægilope glumis crassioribus ex pediculis robustioribus, rubentibus, cum aristis multo brevioribus.

An Ægilops Matthioli

Ægilops i. Avena fatua Tab.

Bromus herba. Dod. gall.

Matth. not. Bromus Lob.

Gramen Festuca C. Bauh.

Locus & tempus.

Descriptio

Bromus siue Avena sterilis Lob.

An Lolium i. Tragol

Go p.

An Dod.
Gramen
pratenfe 3
Gramen
Lob.


Locus

An Dodon. Lat. in fol. Gramen pratenfe, sine descriptione.

Lob. & Pena aduers. p. 2. Gramen minus (sic in 1c. p. 2.) istud quidem quod fundit montanus, incultus, & aridior ager, ut pabulo gratius & utilius velleri. sic multo delicatius, minus & semine efficacius est. Et succincta hac Lobelii descriptione nondum intelligo quam plantam intelligat suspicor. figuram demonstrare a nobis descriptam, non tamen assero. Tabern. icon. Gramen minus, & Hist. vbi Gramen 4. Grass. Figura Tabern. videtur facta ad imitationem figuræ Lobel. uti Dodon. Scio fratrem Gramen minus Lobelii & Tabern. ad aliam plantam referre. Genere prouenit, aliisque in locis obseruamus.

PANICVM VVLGARE, PVNICEVM,
& spica diuisa. CAP. XXXV.
Panicum vulgare.

Descriptio



Panicum punicum.



composita, in quibus semen Panici vulgaris copiosum, glutina etiam non alia, sed aristis, quæ inter grana plurimæ emicant purpurascensibus fo-

Plures ex radice fibrosa culmos erigit Panicum, geniculatos, fæctos, quibus adnata folia longa, latæque. Arundinaceis similia: fastigium verò culmi spicam fert clauæ instar, dodrantalem fere, breuissimis aristis asperam, numerosissimis, luteis, rotundis, nitidis, Milii minoribus, folliculis inuolutis, dense spicata: Panicum rubrum uti prouenit in horto, radices habet fibrosas, sed validas, subrubentes, canles verò duum aut trium cubitorum altitudine, loco fecundo, firmos, ex viridi rubescens, crebris geniculis interceptos, ramosos, & laues, præterquam sub spica, quæ sesquipedale longa est spiculis compositis dense congestis componitur in minoribus plantis, spica non apparet ita ex spicatis

lia arundinacea, frequentia, vaginis longis caulem involuunt, adeoque & inferior vagina superiore excipit, tactu aspera. Est mihi quoddam

Panicum spica diuisa.



Panicum spica insigniter diuisa, cuius figuram nouam exhibemus, sicutieriam Panici paniceæ, alias vti paratæ erant proponim pro vulgari.

Frumentis
herba sunt, verò
no tempore in
culmum geni-
culatum & con-
cauum fastigia-
tur Panicum,
quod pro indi-
uiso Constanti
legit, tantum
pro indiuiso ex-

ponitque sine diuisione, in commune, communiter. Quo genere loquendi usus est Caro cap. 137.] & paruis aubus expositum est. Indefensum quippe membranis continetur. Est verò à Paniculis dictum, cacumine languide nutante, paulatim extenuato culmo penè in surculum, prædedit aceruatur granis cum longissima pedali obba. Diocles Medicus mel frugum appellauit. Hæc Plin. lib. 22. cap. 25. Dioscorides refert Panicum alios Melinen appellare, & frumentaceis seminibus, Milio simile. Et hæc est fortè occasio, cur Tragus inscribat Milium agreste seu exiguum Flein oder wilder Hirß / quod alii Panicum, Germ. feuch & Heidefeuch appellant. Iudicauit porro & Typham, à paniculata iuba nominandâ.

Ruellium, Panicum in Italia Melicam vocari scribentem hallucinari refert Matthioli in prior. comm. vbi dicitur à Græcis appellari ut Arab. Dochm: Italis Pannico: Germ. Pfenich, Heidel-Pfenich pray, Fuchschwang, i. e. cauda vulpina: Hisp. Panico, & Paniso Gallis Panice. Meminit in post. comm. lat. oûra mag. fig. Panici pedali longitudine panicula: tradit & aliud, mammosas ferè paniculas gerens, & semen racematim proferens copiosiore prouentu: addit colore paniculas variare: nam quasdam candicare, alias rufescere, plures flauescere. In It. asserit Panici genus quoddam semine luteo, & aliud albo figuram ponit qualis nostra ad puniceum facta. Ceterum errandi occasionem præbuisse videtur Ruellio nominis Melicæ cum panico, siue paniceæ, cinitas, quæ fecit ut Panicum & Sorghum inter se confuderit, & Melicæ descriptionem cum Panici miscuerit, quodammodo dictum videtur quasi Melleum quidpiam: dicitur verò, forsan ab illis quod est inuoluo.

C. Bauh. pin. Panicum 1. siue Germanicum, siue Panicula nunc re: Paniculum Fulch. Tur. Dod. Cord. Gesn. horr. Lon. Lob. Obs. p. 24. 1c. p. 41. Carl. Cam. Tab. Ger. Variat paniculis albis, flauis & purpureis: semen album, luteum, rufescens: Dioscorides frumentaceis, Gal. leguminibus iungit. Eid. Panicum 2. siue Italicum, siue panicula maiore. Panicum Matullo, Hermolao, Ruellio, Matthiolo, cui & Domesticum: Anguil. Carl. Portæ. Panicum

Frumentis
herba sunt, verò
no tempore in
culmum geni-
culatum & con-
cauum fastigia-
tur Panicum,
quod pro indi-
uiso Constanti
legit, tantum
pro indiuiso ex-

Melico

Ruell. in
post. comm.

Ruell. in
post. comm.

Synonyma

sativum, Lugdunensi. *Panicum vulgare*, Clus. Hist. *Panicum aliud Indicum*, *panicula villosa*, Lob. ic. p. 41. *Panici Indici spica* Dodon. *Panicum Indicum*, Tab. cer.

Plinius lib. 18. cap. 7. recenset *Panicum* inter frumenta aestiva, ea sc. quæ restato ante Vergiliarum exortum seruntur. Cap. 26. Extremo ergo hoc tempore *Panici* satio est. Iustum est hoc soti maturato *Hordeo*, atque etiam in eodem aruo. Estque signum illius maturitatis, & horum sationis commune, lucentes vespere per arua Cicindellæ. Ita appellant rustici stellantes volatus, & ceci vocant verò lampyridas, incredibili benignitate naturæ. Cap. 17. *Panicum* in frigido & aquoso prius ferendum, postea in calido agro. Pestem a *Panico* sturnorum passerumve agmina, abigunt herba, cuius nomen ignotum est, in quatuor angulis segetis defossa: mirum dictum, ut omnino nulla avis intret. Cap. 10. *Panicum* agnus minime gaudet, cum in folia exit. Verant id inter vires arboreæque frugiferas feri, terram emacrarî hoc sato existimantes.

Panicum Dioscorides *Milio* simile dixit, eodemque modo in panes subigi: eosdem habere usus: minus tamen & nutrire & adstringere. *Panico* galliæ quedam præcipue Aquitania vitur, inquit Plinius lib. 18. cap. 18. Sed & circumpadana Italia, addita faba, sine qua nihil conficiunt. Ponticæ Gentes nullum *Panico* præferunt cibum. Item lib. 22. cap. 25. *Panicum* effectus habet quos *Milium*. In vino potum prodest dysentericis. Similiter his quæ vaporanda sunt, excelsæctum imponitur. Sistr alium in lacte caprino decoctum, & bis die haustum: sic prodest & ad tormina. Colum. *Panicum* pinsitum, & euolutum fursure, sed & *Milium* quoque, pulcre panis inopia, maxime cum lacte non fastidiendam præbet. Galeni sententiam ex i. de alim. ubi *Milium* minus alium cohibere dicit, quam *Panicum*, suo loco adscribemus. Ceterum ei contrariatur Dioscorides, quod & ego (inquit Corn.) ita se habere credo. Verum 6. simpl. phar. ita de *Panico* scribit, *Panicum* quod & *Meline* vocatur, ex leguminibus est simile *Milio*, & specie, & viribus parum alens, & siccandi vi prædictum. Sistr etiam ventris fluxiones, quemadmodum *Milium*. Si verò exteinctus impositum fuerit, siccet & frigefacit. Quo loco ex *Pharmacopœia* legitur, quod Diosc. dixit *Pharmacopœia* ad discrimina enim *Pharmacopœia* Galenus etiam *Pharmacopœia* vocat, alioqui enim *Pharmacopœia* appellari dixit illa cerealia semina, ex quibus panis non fit. At verò quod Plin. dicit, Dioscori *panicum* mel frugum appellasse, non aliud est quam expositio vocis *Pharmacopœia*, quæ melleum quid significatur.

Porro, licet apud Hist. Lugdunensem legatur nullum hodie *Panici* nec officinis, nec panificio esse usum, quodd, cum siccum admodum & macilentum sit semen, parum admodum præbeat alimentum, idcoque auiculis obiciatur. Clusius tamen perhibet magni per vniuersam germaniam, Vngariam, & Bohemiam *Panici* usus esse: etenim in alimentum cedere ac pulres ex eius semine deglutato fieri non ingrati saporis.

PANICVM COERVLEV SIVE INDICVM.

CAP. XXXVI.

Descriptio **S**orghii altitudinem assequitur *Panicum Indicum*, similiter ex fibrosa valida radice multos

Tom. II.

emittens culmos eoque medulla alba factos, foliis donatos ad singula genicula arundinaceis: iam verò cylindraceas spicas, non in summo tantum culmo gerit, ut nostrate *Panicum*, verum etiam è nodis & alis foliorum aliam spicarum sobolem parit, quæ ut longitudine cedunt nostrati, ita crassitie vincunt, pilosæ: In his semen stipatum denso *Panici* nostratis, subcæruleum, *Milio* par,



ab vna parte, quæ adhæret secundum longitudinem stria donatum, leue, gemellum ferè, ex pediculis vncia longioribus pilosis, glutinis lamellatum.

Clus. plantarum nostrarum ita describit: Est præter *Panicum* vulgare genus aliud ex Peruviana provincia primum in Europam illatum: habet autem id culmos longè

crassiores, firmiores, altiores vulgari *Panico*, & planè harundinaceos, ut quos humanam altitudinem attingere, interdum etiam superare plerumque viderim, crebris geniculis & veluti articulis præditos, & lanugine obsitos: folia harundinacea è singulis articulis prodeunt, longa, lata, dura. Melicæ foliis non valde dissimilia: inter quæ prodeunt è geniculis alii veluti breviores culmi, similibus foliis obsiti, desinentes in spicam digitalis longitudinis, nonnunquam breviorè, & dimtaxat pollicarem, densè compactam, & æqualis propemodum ubique crassitudinis: semina oblongiusculis gracilibusque petiolis innixa proferentem, & capillaceis veluti glutinis inclusa, quæ extrinsecus parte è glutinis prominente, crassiora, magis rotunda, & quasi orbiculata sunt, laevi, subcærulei coloris, qui in calidioribus regionibus magis satur est, raro tamen vel in germania, vel in Belgica (in illis enim provinciis sæpe terre mandavi eius semina ex Hispaniis accepta) ad plenam maturitatem proueniunt, radices eius fibrosæ sunt, validiores & maiores, quam in vulgari *Panico*.

C. Bauh. pin. p. 27. *Panicum* 3. siue *Indicum* spica Synonyma obtusa cærulea. *Panicum cæruleum Indicum*, Adu. Lob. icon. Cam. Tabern. *Panicum Indicum* Dod. cer. siue peregrinum, Lugd. *Panicum Americanum*, Clus. Hist. *Pannicula* est subcærulea, in calidioribus regionibus magis satuta. *Panici* nomine & *Phalaridis* Aethiopice accepimus huius plantæ semen.

Figura *Panici* Indici Dodon. de frum. & in sine Hist. Flor. ac in fol. Lat. satis commoda si semen pingeretur duplex ex vno pediculo: descriptio an quadret *Panico* harreo.

PANICI AMERICANI SESQUIPEDA-

LIS SPICA.

CAP. XXXVII.

Descriptio **H**uius *Panici* Americani spicam crassam valde firmam & bene compactam, non ubique

904


Imas, Galenus Phalaridis herbe & radicem & semen, & folia pota ad vesicæ dolores, opitulari, vel eius quæ tenuium partium quid & calidum habet, credi testatur. Alimento esse, & nonnullos panes pinfendos curare, estræque ad calculum fæcibusque vesicæ, perhiberi etiam Lobelius.

PHALARIS MAIOR SEMINE NIGRO
C. BAUH.

Phalaris 2. siue maior semine nigro : *Cyperus Melitensis incolis: granum in Melita frequens, Canariis insulis familiare, Massiliæ notum, nigrum, oblongum, à Milio simile, quo Canarios passeret præcipue nutriunt: ex grano aliquando à Dalechampro factum, referente C. Bauh. in pin.*

PANICVM SYLVESTRE DICTVM, ET
DENS CANIS. I.
CAP. XXXIX.

Descriptio



Gramen sylvestre quibusdam dictum, radices habet tenues frequentissimas, eoque nomine euulsu difficiles: culmi plures palmates, atque etiam dodrantales, geniculis paucis articulati, oblique articulantur, oblique eriguntur, aut per terram repandi reclinantur: denuoq; ætis radiculis attol-

luntur: singulis calamis, singula insident spicæ Panici, minores, asperæ, vertibus adhaerentes; per maturitatem rufescentes, breuibus pungentibus aristis obseptæ, inter quas semina parua Panico minora. Folia graminea, albicantia, hirsuta, aspera, partem culmi ceu vagina amplectentia.

Fuchsius, cuius icon hic assumpta displicet, vocabat Phalaridem Plinij hanc quam Geneux nominant *Panicete*, quasi vacuum Panicum. Ego tamen non puto Phalaridem Plinij ad hoc Panicum referendum. Sed crediderim potius cum l. 18. c. 17. intelligere per Herbam albam Panico similem, occupantem arua, pecori quoque mortiferam. An Ruell. lib. 2. cap. 118. Herba specie frumentum, folio Tritici &c. in aruis nascens. Frumentum ruri caudati frumenti nomine notum? An eid. lib. 3. cap. 82. Holostium, Denticulus canis Ruri, gramen molle Herbariorum nonnullorum?

Cordus in Diosc. Ruellium reprehendit, ut qui sibi non constet, quod Holostium à callis, Denticulum canis appellari scribit: Quod idem rursus alibi gramen, alibi Coronopum, Dentem canis esse dicat. Sed an Cordus citè mentem Ruellij perceperit, dubito, & an animaduertit, nomen Dentis canis à callis aliquot plantis similibus tribui, ut huic & duabus sequentibus.

An Rheginio in exerc. Alopecuros, Panicum agreste, non Frumentum caudatum, Lat. Cauda vulpina, Herba Tritico similis scholasticis? An eorh. Frumentum caudatum, aliis Alicopeuron aliorum?

An Casalp. Alopecuros vera si particulatim floreret, Panicastrella vulgò vocata, Panicum sylvestre fortè dicendum?

An Trago Lolium 7. quod Phalarim Dioscoridis esse putat? An Thal. Phalaris silu. maior, spicis asperis, lappaceis vestibus adhaerentibus.

Lonicerò pro Phalaride Dioscoridis describitur, sed non depingitur. Figura enim quam pro Phalaride exhibet, est alterius plantæ.

Marth. in co. nm. cnm mag. fig. habet descriptionem sub Panico sylvestri, quæ convenit huic nostro Denti canino primo paniculâ simplici, non item figura, quæ Panici est paniculâ sparsâ, aut diuisa.


Lob. in Ic. plant. pag. 13. tom. 2. est Panici effigie gramen simplici spica. Tabern. Ic. & Hist. gramen panicum 1. feuch groß. H. Lugd. p. 412. Panicum sylu. aliud Dalechampro, quæ fortasse fuerit Herba alba Plinij. Quidam tamen esse volunt eiusdem Scriptoris lib. 22. cap. 25. Miliariam herbam, quæ Milium necat, & trita, cornuque infusa podagras iumentorum sanare dicitur. Magis tamen placet eorum sententia Dalechampro, qui Albam herbam esse putant.

C. Bauh. phyt. Gramen 94. siue Panicum sylvestre, simplici spica, vel Milium sylvestre, Lolium 6. Tragi. Eid. pin. Gramen panicum tertium siue spica simplici: *quædam. Lolium sextum, Miliaria herba Plinij, Tragi. Panici effigie gramen simplici spica, Lob. icon. Panicastrella, Casp. Panicum sylvestre aliud. Dalech. Herba alba fortasse Plinij, Lugd. gramen panicum primum. Tab. Gramen cyperides spicatum, Ger. icon. Variat: aliquando enim spica oblonga; aliquando breui & rotunda.*

Inuisa Olitoribus herba, annua quidem: oritur æstate: semen maturat Augusto: perit Autumno. Passim obseruatur. Has ei vires adscribit Tabern.

GRAMINIS GENVS QVIBVSDAM GALLIS
Dens caninus 2. siue Panicum sylu.
paniculâ diuisa.

CAP. XL.



Calamos 2. Descriptio
radice fibris compluribus crassiusculis constante, quæ locis humidis emittit duos tresve cubitos altitudine equantes: Folia Arundinacea in acutum mucronem desinunt, iubam explicat palmarem & lequipalmarem subrubentem, aut è rubore nigricantem, è crebris spicis

Icon.
Phal. Plinij
Fuchj.

de Pan.
caudatum
Ruell.

Ruell. re-
trah.

Ded. not.

compositam . denso granulorum Paniceorum, glumis mucronatis . subhirsutis, runc muticis, nunc aristatis, idque interdum in eadem planta inclusorum, stipatu confertis, liberò tamen costæ dorso, vt in Gramine Mannæ.

An Cordo in Diosc. Oryza species, germanus Schnader nuncupata, Sesamum non absque errore putatum.

An Anguill. Milium secundum; Milium siluestre Galeni, cuius meminit liban. de antid. fortè Ischemon Plinii

An Trago. Lolii sextum genus, Miliaia Plinii. Matth. in com. cum mag. fig. titulo Panici silu. ponit figuram paniculâ sparsâ, quæ videtur exprimere plantam primùm prouenientem; & loco humidiori, carentem aristis: descriptio autem conuenit Panico silu. paniculâ simplici.

Multò aptius Ischemonis historia Plinii quadrare visum est Clusio Milii genus hoc silu. & supinum, vt vocat, quàm Panico siluestri.

Dodon. frum. & in fol. lat. (vbi Panicum palustre à nonnullis vocari ait) figuram minùs bonam ostendit. Ad Graminis autem genus, siluestre hoc & spurium degeneretque frumentum, cerealium seminum vitium, Gramen mannæ alterum, referendum ipsi visum fuit.

C. Bauh. phyt. Gramen 92. siue panicum siluestre sine aristis: panicum sylu. Matthioli, &c. Item, Gramen 93. siue panicum silu. cum aristis, per omnia priori respondens, nisi quod spica vtriculi in oblongâ aristam desinunt. Rursum, Gramen 94. siue panicum sylu. spica aspera: Lolium 7. Tragi: Panici effigie gramen aristis circumvallatum Lobel. cou. p. 1.

Panicum silu. de quo hic agimus spicâ singulari non obseruatum. Quare tres species non facio. In eadem enim planta interdum obseruo spicarum vtriculos desinentes in aristam, alios eadem destitutos, ita vt lusus naturæ hac in re negari non queat. Euenire autem cum dicimus ratione soli, atque ætatis. Huc porro Lolium 7. Tragi non refero. Siquidem spica longæ, asperæ atque lappaceæ, vestibis adherentes sunt, quas in hoc Panico spica diuisa non obseruo. Sed ipsamet in pin. (vbi non ampliùs tres, sed duas solam species facit) Lolium 7. Tragi, & Panici effigie Gramen aristis circumvallatum Lobeli separar.

Gramen Panicum 1. siue spica diuisa, inquit, est Panicum silu. Matthioli: Lob. in Adu. p. 15. Cast. Cam. H. Lugd. Tab. & Gerardi: Panicum Herbariorum siluestre Lobelii. Obs. p. 25. (vbi perperam Lolium Cordo) Ic. plant. p. 42. tom. 2. Gramen alterum mannæ Dod. & Hist. Lugd. Milium silu. & supinum, Clus. hist. Panicastrella species Cæsalp. An Milium silu. Ischemon, Anguill. spica subinde singularis, non rarò multiplex, eaque modò herbacei, modò atroxubentis coloris est. Item Gramen panicum 2. siue spica aristis longis armata, Panici effigie Gramen aristis circumvallatum Lobelii. Ic. Plant. p. 14. Gramen Panicum Ger. secundum Tabern.

Nos nondum separamus ab inuicem, ob iam adductam rationem. Illud duntaxat monendum censuimus, ex Lobelii figuris eam meliùs placere quæ exhibitæ est apud eum p. 14. quæ & à Matthiolo pingitur.

Locus

Passim prouenit nonnunquam palustribus locis delectans: hortis odiosa & molesta herba. Frequens est inquit Dodon. iuxta agrorum aggeres, in hortis & alibi: reperitur non modò in

Germania & Belgio, verùm & Italia, Gallia, & aliis Europæ prouinciis.

GRAMINIS GENVS DENS CANINVS
tertius, siue Gramen primum, vel
Galli crus.

CAP. XXXI.

Culmos ex radice fibrosa plures promit, tribus quatuorue articulis nodosos, subinde etiam ramosos, subrubentes: folia Triceis breuiora, latiora, hirsuta, culmos longiusculi uagina inuolunt. In singulis infidet culmis palmum aut sesquipalmum longa, quatuor, quinque pluribus setis comata, quarum alteri parti



secundum longitudinem è bifori gluma fuscâ purpurascens adnati, auersâ parte nuda sulcata, semen iisdem glumis conclusum panici graminis longius.

Ruellius lib. 1. cap. 62. Theophrasti, Plinii, Dioscoridis Coronopum ait, à Leonice no primò vulgari nomenclatura declarata, & cum censere dici Capriolam, Sanguinariam: O-

litores Gallos vocare Dentem canis: Hanc generibus Graminis Plinium assignasse nobis exprimentè eandem esse, quam Græci Coronopum & Romani Gramen vocarent aculeatum. Quod autem Leonice Capriola Coronopus Dioscoridis sit (cuius sententiæ quoque est Monardus) negat Matthioli in Diosc. lib. 2. cap. 123. Verùm eos aberrare non putat, qui dicunt Sanguinellam siue Capriolam esse aculeatum gramen Plinii Dactylon vocatum. Neque usquam se legisse ait, expressisse Plinium (ut Ruellius testari videtur) Gramen hoc aculeatum, esse Coronopum. Graminis huius semen, germanos Simeldam, hoc est, celestem Mannam, Selaos verò Cornicis pedem appellare. Et hinc factum esse, vt quali certo crediderint, quod Leoniceus ab iis fortè seductus, putaret hanc plantam Dioscoridis coronopum. Lib. 4. c. 28. vocat gramen aculeatum Plinii, Hetruscorum Sanguinellam & Capriolam. In post. cosm. cum mag. fig. distinguit lib. 4. gramen Mannæ à Sanguinella tantum ratione: ait enim gramen Mannæ multis in germaniæ locis ferri. Ceterum, nec in spontaneo, nec in cultu hoc gramine, crassam radicem, qualem Matth. pingit, obseruauit. Meliùs placet Camerarii figura in Epic. germ.

Aculeatum Plinii gramen esse negat Dodon. Lat. his verbis: Ad graminis genus referendum videtur & hoc Gramen Mannæ primum, syluestre, spurium, degeneretque frumentum, cerealium seminum vitium, quod pterisque Italia & Germaniæ,

Descriptio

Coronopum
Dactylon
Capriola
Sanguis

Coronopum
Dactylon
Capriola
Sanguis

Sanguis
Dactylon

Mannæ
Selaos

Gramen
aculeatum
Plinii

Matth. vni
reprobat

Frumentum
spurium

manae locis incultis sua sponte exit, reperitur & in Bohemia sylvestre. apud quos tamen & in agris seritur, veluti & in Gontienfi agro & Carinthia, ut Matthiolus refert, apud Belgas peregrinum, non nisi satum provenit. Germani Simeldan, id est, Caeli rorem appellant, Matthiolo ea de causa Manna-gramen, Mylij sylvestre ac spurium quoddam videtur genus. Creditur à Leoniceo ac Ruellio Capriola ac Sanguinaria dicta. Sunt qui velint Plinij gramen aculeatum esse, sed quia eius omnino brevis descriptio, affirmari nihil potest. Multum autem à veritate recedunt, qui Coronopum esse existimant. Coronopus siquidem, ut Dioscorides ait, per terram repit, & foliis est liliis: huius verò culmi erecti asperant, & folia harundinea nequaquam in partes sinduntur, quæ Mannæ gramen non esse Coronopum evidenter ostendunt.

Clusius in eo hallucinari reprehenditur, quod Ischamion Plinij (ita nostram hanc præsentem asperam in Hist. inscribit) quod Milij genus sylvestre & lupinum facit, in humidis nascens, foliis aspera lanugine obsitis, Panicum sylvestre Matthioli esse, sibi imaginatur.

Lobel. in Ad. p. 4. sub gramine hirsuto nemo-roso, huius inveniunt vocans in hac, gramen aliud Recentiorum, id est, Plinij. Sequenti pag. 4. vocat Ischamion vulgare, Crus Galli, Dactylon Plinij, & Aculeatum, Sanguinellam & Capriolam Italorum, Frustra autem hic quaerit an sit Scirpus Tragi. Matthiolum etiam, meo quidem iudicio, immerito reprehendit, quod vulgatum Sanguinariam cum gramine Mannæ eandem asseruerit, cum potius congeneres, quam eadem sint.

Necdum sane mihi constet, cur Tabern. gramen Mannæ, hoc est, Manna-gras / humeldan à suo Ischamio, sine gramine sanguinario primo separet. Vocat hoc ær. m. Blugras / quod intigne sit aduersus hæmorrhagiam sanguinis remedium. Illud in Hist. duplicat dicitur, scilicet, sativum & spontaneum. Veteres autem huius non meminisse decernit: dici verò Neotericis gramen Mannæ celestis, gramen esculentum, gramen cereale, Capriolam, & Herban Capriolam & Sanguinellam. Boh. Rosa, Vandalis & Sclauonibus pedem cornicis, h. e. Fraen fuß, vocatur tamen & hanenbein, hoc est, Crus Galli.

Geln. cat. Coronopus, Capriola vulgo dicta. Eid. hort. graminis species, Sanguinaria Avicennæ: Item, gramen album seu hirsutum, Manna celestis Matthioli.


Ceterum ad hoc caput sub vno & eodem titulo referimus C. Bauhini in phyt. Gramen 86. 87. & 91. quia nondum intelleximus, an reuera differentes sint plantæ, vel an culturâ tantum varient. Horum I. vocatur in pin. Gramen echinatum & aculeatum 3. siue album capitulis aculeatis Italicum. Gramen aculeatum Matth. Cast. & H. Lugd. pag. 45. II. inscribitur gramen dactyloides siue Ischamion 4. siue gramen dactylon folio latiore, Sanguinaria Comitis Neuenare, Tragi, Canaria Plinij, & galli crus Apulæ, Anguill. epist. 52. Coronopus Leoniceo, Ischamion Geln. cat. Clus. hist. & Tabern. Ischamion vulgare Lob. in Ad. pag. 4. Obs. pag. 12. icon. plant. p. 14. & ærardi, Ischamion Plinij, Clusij Hist. quoad iconem, gramen Ischamion Plinij, H. Lugd. siue Dactylon pag. 426. Variare hoc dicitur specie, plerumque quinis & senis, raro quaternis, rarissime ternis. III. appellatur gramen Dactyloides siue Ischamion 8. siue gramen Dactylon esculentum, gramen Manna Matth. & Castoris, gramin aculeatum, Sanguina-

ria, Capriola, Leon. Ruell. Ama. Frumentum German. Schwander, Orize species, Cord. in Dioscor. gramen album seu hirsutum, Geln. hort. Manna celestis Germani, Eidem gramen Manna esculentum, Lobel. in Ad. Obs. pag. 13. Leon. plant. pag. 14. & ær. gramen Manna primum, Dod. Tabern. gramen aculeatum 1. Plinij, Thal. graminis genus, quod in Germania seritur Cæsalp. gramen Manna prius Matth. & prius Dod. Hist. Lugdun. pag. 414.

Annua est planta etiam hortis valde odiosa, Locus & Dens caninus sylvest. tertius, qui Iulio apparere tempus. incipit. Ab hoc sativus, quem priuatim gramen Manna vocant, non nisi culturâ differre videtur.

Cacumina pueri naribus inferunt, extrahuntque ut sanguinem eliciant, & hinc ab effectu Herulsi vulgo Sanguinellam vocant: in Germania locis feri ac coli audio [inquit Matth.] non minor cura, quam cetera frugum & leguminum genera, siquidem eius semine frequenter vescuntur in cibis, quod in iure carniū pinguium decoctum non minorem cum palato inerat gratiam quam Oryza: cui ego facile præposuerim: in pila autem ipsum tundere oportet, ut à suo resiliat pyramine. Huius in acetariis hactenus nullus est usus, licet Gesner. in cat. hoc asserat: Nunc an tales & tantas vires obrineat, quantas perhibet Tabern. fides penes ipsum esto.

GRAMEN DIGITATVM HIRSVTVM.



PERENI radice & firma nititur, ex qua culmos emittit cubitales & bicubitales, tenues, in herbis geniculis nodulos, frequentius singulares, alias ramosos: foliis tres quatuorve uncias longa, angusta, & raris longis pilis hirsuta, subinde rubescentia, statim à radice partem, partim sed minima (exceptâ vaginâ) ex culmis oriuntur, panicula iuncta, quatuor aut quinque speciebus comata, graminum Mannæ similibus, minoribus purpurascens, mollidumque villosis, ex glumarum mucrone aristâ molli rufa prominente, strobilorum staminula saturatiore purpura tinguntur.

Est hoc Tabern. Ischamion secundum: C. Bauh. phyt. gramen 89 siue Dactylon 3. species villosa: Eid. pin. gramen dactyloides siue Ischamion 5. siue Dactylon angustifolium species villosa tribus 6. 7. & 8. idem.


Basileæ frequens ad pometium Albanum & alibi locis siccis & equalidis.

Synonyma

MILIVM.

CAP. XLII.

Descriptio



Synonyma
cum no-
minib.
logum.

Nomina
linguarū.
Meline
nere
Farina mi-
liacea.

Miliaria
avena.

Milium plu-
ribus cul-
mis crassiuscu-
lis bicubitali-
bus & tricubi-
talibus, breui-
bus internodiis
interceptis sur-
git: folia arun-
dinacea vncia
latura, hirsuta,
praesertim qua
parte densa la-
nugine obsita
sunt & euiden-
tius striata; in
summis stipu-
lis, juba expli-
catur ampla, ad
longa tenuia-
que stamina, i-
nervis glum-

mis comprehensa, grana lubrico leuore lucida,
parua, colore saepius fuluo, vel aureo, rarius albo,
aristula striata, radices crebrae, fibrosae, validae,
albicantes.

Graecis, ut Dioscoridi, Galeno (qui secund.
de antidot. Milii siluestris mentionem facit)
& aliis αἰχμή; & non ut Seraboni αἰ-
χμή; dicitur, à numerosissimis & minutis granis
Ficum, quae αἰχμή; vocantur: Hippocrati
iuxta Galeni glossam αἰχμή; & non αἰχμή;, ut
vult Hermolaus: Arab. *Jenars, Seguers, & Giansers*,
secundum verò Serapionem *Deshm*. Hebr. *Dichan*:
Latinis ut Plinio, Brunfels. Trago. Marth. Fusch.
Turn. Dod. Cordo in Diosc. Lac. Lon. Lob. Obsp. 24.
lc. p. 9. Gesn. coll. Cast. & Tabern. *Milium*, à
miliari summa sc. Festo. quasi millesimum
granum ferat. *Milium vulgare* Lob. in adu. &
Gesn. hort. *Milium commune* Anguillar. *Milium no-
gras* H. Lugd. p. 409. *Milium aegyptium* & *album* Cam.
Milium i. siue semine luteo, vel albo C. Bauh. pin.
Milium Dioscoridis, Theophr. & Plinii, Celsa-
pino.

Germ. *Birg*, & *Birg*: Belg. *Biro* & *Milie*
Gall. *Mil* & *Miller*: It. *Miglio*: Hup. *Milhe*, & *Miy*:
Angl. *Myle*: Boh. *Proso*.

Varro Milij nomen ineptè à Graeco deducit,
melinen id vocari dicens: nam Diosc. & Galenus
per Melinè Panicum intelligunt. Farinam milia-
ceam, seu tractum Milium sunt qui *serinum* vo-
cari putent, in Horatii versu illo.

Vilia vendentem tunicato serat a popello.

Sunt tamen & aliae scruti appellationes. Nostra
autem stat sententia scruti nomine vetera & corru-
pta ferramenta, pannos veteres, vestimenta quo-
quo modo deprauata, vasa dimidiata, supellecti-
lemque tandem quamlibet praefractam, signifi-
cari, id quod docet Lucilius apud Gellium, his
verbis: Quid ni? & scruta quidem ut vendat,
scrutarium laudat.

À Milio, *miliaria* aves dictas esse, quod ad
hanc frugem turmatim se conferant, eaque ves-
centes saginentur, placet Varroni. Porro quamvis
Cenchridi aui nomen videatur Milium indidisse,
eam tamen miliariam non esse certum est, cum
cenchridem, ut refert Plinius, accipitrum generis

Graeci faciant, quàm Latini *Tinniculum* à voce
& sono, vocant; Galli verò *Querrelle*, vulgo
bene cognitam, quod in altis urbium turribus
nidificet.

Plinius lib. III. cap. 17. docet quomodo Mi-
lium muniendum sit à vermibus & passeribus,
dum ait: Reliqua semina [Milij & Panici, in-
telligimus] Cupressi foliis tulis si misceantur, non
esse vermiculis obnoxia, nec si interlunio seran-
tur. Multj ad Milij remedia, rubetam noctu ar-
uo circumferri jubent, prius quàm sarriatur, de-
fodique in medio inclusam vase fictili: ita nec
passereim, nec vermem nocere, sed eruendam
prius quàm metatur, alioqui amarum fieri. Quin
& armo talpae contacta semina vberiora esse.
Democritus succo herbae, quae appellatur aizo-
on, in tegulis nascens, tabulisve, latine verò se-
dum aut digitellum, medicata feri iubet omnia
semina. Vulgo verò, si dulcedo noceat, & ver-
mes radicibus inhæreant, remedium est, amurca
pura: ac sine sale spargere, deinde sarrire. Si in
articulum seges ire coeperit, runcare, ne herbae
vincant. Pestem à Milio atque Panico sturnotum
passerumque agmina scio abigi herba, cuius no-
men ignotum est, in quatuor angulis segetis de-
fossa: mirum dictu, ut omnino nulla avis intret.
Mures abiguntur cinere mustelae, vel felis diluto,
& semine sparso, vel decoctum aqua. Sed re-
dolet virus animalium eorum etiam in pane. Ob
id felle habulo semina attingi viriliter putant. Ra-
bigo quidem, maxima segetum pestis, lauri ramis
in aruo defixis, transit in earum folia ex aruis. Lu-
xuria segetum castigatur dente pecoris in herba
duntaxat: & depastat quidem vel saepius, nullam
in spica iniuriam sentiunt. Reronsarum etiam se-
mel, omnino certum est, granum longius fieri, sed
inane cassumque, ac satum non nasci. Babylone
tamen bis secant, terribi depascunt: alioquin folia
tantum fierent. Sic quoque cum quinquagesimo
foenore messes reddit exilitas soli: verum di-
ligentioribus cum centesimo quinquagesimo.
Neque est cura difficilis, quàm diutissime aqua
rigandi, ut praepinguis & densa vbertas diluatur.
Linum autem non inuehant Tigridumque, sicut in
Egypto Nilus. Nec terra ipsa herbas gignit. V-
bertatis tamen tantae sunt, ut sequente anno spo-
de restibilis fiat seges, impressis vestigio semini-
bus: quae tanta soli differentia admonet terrae ge-
nera in fruges describere.

Milium porro leuicū, solutūque desiderat ^{Locum & tempus}
terram, nec in sabuloso solum sed & in arenoso
quoque provenit, modò vel humido solo, vel ri-
guo solo: nam siccum cretosumque reformidat,
ut ait Columella. Ante ver commodè feri non
potest: quoniam reporis maximè latatur. Vlti-
ma tamen parte mensis Martij comodissime
terre committitur. Plinius milium inter frumen-
ti quoque genera verna connumerat, & eo Cam-
paniam praecipue gaudere tradit. milium Theo-
phrastus refert siccitate sua diuturnum esse idem
plus annos centum durare, si quod ventus & aer
non perueniant, condatur, auctor est Varro.

MILIVM SEMINE NIGRO

SPADICIFLORE.

Semine Basileā misso facile mihi provenit in
Shorto E. C. Montbelgardi, in quo ex semine
deciduo quorannis renouatur. Non est hoc il-
lud milium nigrum olim Romanum allatum ex In-
dia cuius Plinius lib. 18. cap. 7. meminit.

Milium

Milium 1. siue *semine nigro* C. Bauh. pin. est *Milij nigri* species apud Oribasium, Ang. *Milium semine nigro* & *lactore rubra* Lob. Obl. *Milij* alterum *genus* e colore *nigro* *deserui*, Cels. *Milium* *in bā subinde coloru nigricanti*, Dod. *Milium nigrum* Taber. Cam. Ger.

Hoc quod in Argouia Bernatum frequenter scribitur, à vulgato differt foliis latioribus, caule non adeo alto, jubā sparsā & minore, semine aliquantū maiore & rotundiore, & ad pulces conficiendas altero longē vtiliore.

Milio (cuius adhuc apud Nigritas in Aphrica magnus est vsus) nonnunquam in pane viuunt, vigente frugum penuria, inquit Galenus, panis tamen ex eo exigui est alimentum, & refrigerans. Constat insuper præaridum, & instar arenæ friabilem esse: nihil enim in se habet pinguitudinis, & lentoris. Iure ergo aluum humidiorē exiccat. Agricola huius farina cocta, admisto adipe suillo, & oleo vescuntur. Panem etiam & pulcem ex *Milio* fieri testatur Plinius, cum scribit. *Milio* Campani præcipue gaudet, pulcrumque candidum ex eo facit. Fit & panis prædilectis. Sarmatarum quoque gentes hac maximè pulce aluntur: & cruda etiam farina equino lacte, vel sanguine & cruris venis admixto. Hæc puls etiam Germanis hodie in vsu est, cum lacte cocta butyro addito, & saccharo plerumque asperso. Alibi

Plinius. Panis, inquit, multifarie & e *Milio* fit, e *Panico* rariis. Sed nullum frumentum ponderosius est, aut quod coquendo magis crescat. 60. pondo panis e modio redeunt, modiusque pulvis ex tribus sextariis madidis. Panis ex *Milio* conficitur, inquit Columella, qui antequam refrigerat, sine fastidio absumi potest. Sed quamuis panis ex *Milio* nisi in magna reliqui frumenti penuria non fiat, ait Galenus, tamen is dum recens est, & scribit Matthiolus, & à pistore rectè paratus, ut Veronæ sit, & ita calidus, ut e furno excipitur, deuoratus, sua quadam suauitate placet, & multis experitur. Cum verò obduruit, planè ingratus est. Siluicola Tridentini sola pulce *Miliacea* qua vulgò *Polenta* vocant, aluntur, eam cum lacte edentes. Sed carbonarios opilionesque Tyrolenses quum percunctaretur Lobelius, num vera scripsisset Matthiolus, nimirum eos solo *Miliaceo* pane, vel *Polenta* lacte incocta vesci, cum ridebant. *Milium*, inquit Dioscorides, in panes coctum minus cæteris frugibus alit: sistit pulce sua aluum: vrinam cit. Torretur *Milium*, feruensque in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisque doloribus, si ægra pars foueatur, auxilio sit. *Milium* Galeno primo ordine refrigerat, exsiccat vero tertio exoluto, aut certe secundo intenso: habet etiam paululum tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura instar edulii comestum planè inter omnia frumentacea minimum confert nutrimenti, sed & ventrem siccatur. Porro foris impositum in sacculis, idoneum est fomentum iis quæ citra mortuum exsiccati postulant, & cataplasmatibus modo illitum exsiccare potest. At tamen admodum friabile est. Proinde difficile est eius in cataplasmatibus vsus. Idem alio in loco fomenta ex *Milio* in capitis dolore laudat, quod, ut ait Hippocrates, leue ac lene sit *Milium*. Sic enim ille scribit, fomentum siccum ex sale ac *Milio* torrefactis, ac laneo marsupio exceptis accommodatissimum. Etenim leue ac lene *Milium* est, quod Plinius leuissimum ac molliissimum esse dixit. *Milio* sistitur aluus, discutuntur tormina, in quem vsus torretur ante. Nervorum doloribus, & aliis feruens in sacco imponitur, neque a-

Tom. II.

liud vtilius, quoniam leuissimum molliissimumque est, & caloris capacissimum. Itaque talis vsus eius est ad omnia quibus calor profuturus est, farina eius cum pice liquida serpentium, & millepedæ plagis imponitur. Hæc Plinius. *Milium* igitur ad status repellendos fomentum est optimum, præsertim si cum sale commixtum fuerit. Quin & præstantius redditur additis chamæmeli floribus: *Milium* medicamenta, & carnes, si in eius acervo sepeliuntur, à carie & putredine diutius vindicat.

VVeck. in Antidor. spec. Syrupum ex *Milio* componit, quem Ambrosij cognominat, laudans eum in febribus, ut qui sudorem prouocet, & sitim extinguat. Recipit autem *Milij* excorticati quantitatē conuenientem, decoquit donec crepet: dein recipit vnc. v. vel circa, eius iusculi bullientis, & infundit vini albi odoriferi vnc. ij. & sic calidum dat patienti ac bene eum cooperit, & sic mirum in modum sudatum promittit. Sed mihi magis probatur sententia Montagnanæ consil. 193. de thermis, quia sit se expertum, *Milium* ex lacte insigniter sudorem compescere. Dioscorides enim aluum adstringere scribit, & Galenus ex eo panem frigidum esse. Mathias à Michou de Sarmatia Asiana refert Tartaros bibere Cereuisiam ex *Milio* confectam, vocareque

Buzum, Rutenos verò *Ebrahim*. Labet coronidis loco memorabilem historiam à *Milio* petitam subnectere quam Th. Zuingerus in methodo similitudinum, ita recenset. Tartarorum princeps Amorabecus ad Lazarum Sepuic Despotam missis Legatis, ad transitum in Vngariam petendum, mulum *Milio* onustum adiunxit, & coram Despota saccos exonerari voluit, ut innumerabiles Tartarorum copias esse significaret. Despota in tertium diem responso delato, Gallos interea, capos & gallinas fame excruciatas magno numero in effulsum *Milium* emisit. Qui cum paruo temporis spatio totum consumpsissent: ad Legatos conuersus, Renunciare ergo Regi vestro, inquit, quantumuis innumera *Milij* grana ei adsint, tamen neque nobis edaces gallos defuturos. Cui quidem voci omen adfuit. Tartari enim facta irruptione, à Seruis magna strage repressi fuere.

MILIVM LUCIDVM ARGENTEVm EX CAIRO.

CAP. XLIII.

Vulgati *Milio* magnitudine cedit, magisque rotundum, in acutum umbilicum terminatur, tenui argenteo valdeque lucido cortice, & à medulla leui tactu separabili, Medulla *Milij* vulgaris, alba, insipida ferè, denribus friabilis.

An hoc intelligit C. Bauh. in pin. per *Milium* 3. siue *Sabzum*: *Millo* frumentum in Guinea partum. *Milij* forma, sed dulcius, ex quo panem & vinum conficiunt in Regno Sabo: ad Clus. curas post.

Romà ab amico quodam acceptum attulit ce. Locu. ner H. Cherlerus nomine *Milij* ex Cairo.

SORGI. CAP. XLIV.

Sorgi peregrino nomine dictum multos ex fibrosis radicibus emittit culmos homine pro-

ceriores robustos, crassos, geniculatos, medulla alba fæctos, foliis separatos arundinaceis fastigia culmorum in tubum effunduntur palmarum aut



Panicum
Trag.

Milium
Indicum
Nomen
linguar.

Ruellap.
ar.

Melica
Murch.

Milium
Indicum
Plin.

Sorgi
Fuch.

Fuch.
91
Milium sa.

pedalē, ē multis flexuosis lentis loris contextam, quibus ē tenuibus pedicellis, appensa hærent copiosissima grana, lentibus aqualia, compressa, nonnihil oblonga, nunc alba, nunc fusca, & quandoque nigra.

Tragus sub Panicī inscriptione hanc stirpem delineauit, & a paniculis quibus semen inest, ita denominauit:

germ. Welsch hirtz, h.e. Milium Italicum, quod ex Italia in Germaniam aduectum sit, nominauit. Aliis tamen Sorg sament appellatur, h.e. Sorghi semen. Belg. Sorg sac: Gall. *blé barbe*, ou espece de Paniz, aut cum talis Sorghi vel Sorgi: Hetruscis *Sargina*: Insulrib. *Melega* & *Melegu*, teste Matthiolo, qui Ruellium, panicum in Italia Melicam appellari scribente, aperte hallucinari demonstrat. Sed Ruellio fortasse errandi occasio nem præbuit nominis Melicæ & *Melica* siue *Melica* vicinitas, quæ fecit ut Panicum cum Sorgo, & huius descriptionem cum illius descriptione confuderit. Frugis est genus tam forma, quam præcæritate arundinem referens, adeo ut campi, in quibus ad maturitatem usque adoleuerit, arundineta representare videantur. Eius tamen calamus, non, ut vulgariū arundinum, inanis est, sed sacchariferarum arundinum modo, alba fæctus medulla. Panicula, quas ad Cybelis pomorum magnitudinem summis proferunt culmis, quædam cum maturitatem senserint, in nigro-rufescent: quædam verò nigredinem in vniuersum contrahunt, granis compluribus onustæ. Deperitur granum à rusticis, moliturque in farinam, & inde in agrestem cogitur panem: etsi in Hetruria potius ad Columbarum, gallinarumque seratur saginam, quam ad hominum alimentum. Hoc Plinio lib. 18 ca. 7: Milium est Indicum, quod tamen non animaduertit Ruellius alioqui maximus Plinii sectator. Plinius enim sic habet. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam inuectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolefcit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis, lobas vocant, omnium frugum fertilissimum.

Fuchsius, qui peregrinum hoc genus Frumenti, Sorgi vocat, ait ignorari quo nomine Veteribus sit appellatum, nisi Faris genus sit, quod in Gallia rubrum & barbatum frumentum nuncupetur. Certe tamen nihil affirmat: nam Panicum etiam referre, quamuis magnitudo repugnet, admittit.

Dodon. gall. Panicī speciem quidem esse suspicatur: at Faris genus; contra Fuchsum, negat. Et hinc ait in Hist. Lat. Frumen. & in fol. Melica siue Sorghum, Lusitanis Milium Saburum ap-

pellatur; nonnulli tamen Panicum peregrinum, aut Indicum cognominant, id ipsum videlicet ex Panicī genere esse existimantes; quorum certe opinio probabilior est, quam eorum, qui illud inter Faris genera repduunt. Cum farre siquidem similitudinem nullam, cum Panico vero aliquam habere potest. Conuenire & cum eo Milio videtur, quod Neronis principatu ex India in Italiam inuectum est.

Videtur Cæsalpino Milium Indicum esse ex genere Calamagrostis, id est, Graminis arundinacei. Nos eorum sententiam probamus; qui Milium Indicum Plinii esse concludunt.

C. Bauh. pin. Milium 4. siue arundinaceum subrotundo semine. Sorgi = muna: um; Milium quod ex India in Italiam inuectum nigro colore, Plinio. Panicum Dioscoridis & Plinii, Trag. Milium Indicum Matth. Fusch. icon. (cui & Sarracenicum) Gesn. hort. Cord. Hist. Guiland. Lugd. Cast. def. Milium Indicum Plinii. Ang. Cam. Milium aliud, Amat. Panicum Indicum, Gesn. hort. & Cor. hist. Sorghi Fusch. Dod. gal. (cui Panicī species videtur,) Lon. Sorghi & Panicum Indicum Gesner. coll. Sorghum Gesn. hort. (cui & *Maisam Cardeni*) Tab. (cui & Panicum loculare) Ger. Sorgo melica Italicum Lob. Obs. p. 24. l. c. p. 1. Sorgo Insulribum, Bellonio. Melica siue Sorghum, Dod. Melica forte à Meline Sagina aliis à saginando, Calamagrostis Dioscoridis ex hoc genere videtur, Cæf. variat seminis colore, quod aliis rufum, aliis plenius nigricat: habetur & album & luteum, quod Sorghum fructu rubro & fructu albo, Eyst.

In horto Ill. E. C. sæpius prouenit, verum semen non maturuit. Solum amat pingue & humidum. Gignitur in Italia, Hispania, & aliis calidioribus regionibus. Ex æstiuis sementibus est: Autumno maturefcit.

Semen Panico sapore & temperamento simile est. Legitur à rusticis, molitur in farinam, cogiturque subinde in panes, sed friabiles, & parum alimenti subministrantes. Hetruria tamen potius ad columbarum gallinarumque saginam ferit, quam ad hominum alimentum. Ex huius Milij Indici culmorum medulla fit medicamentum ad strumas præstantissimum hoc modo. Ex decem culmorum huius internodiis extrahitur medulla, quæ cum spongia noua integra, rubentique comburitur. Hæc in puluerem teruntur additis piperis nigri granis duodecim. Huic pulueri admiscetur triticeæ farinæ vncia. Deinde omnia ouo recente excepta in placentam conformantur, quæ sub feruentibus cineribus coquitur. Et in sex partes diuiditur, quæ Luna decrescente alternis diebus strumoso dormitum ituro edenda præbentur, nullo addito potu. Idem altera & tertia Luna repetitur. Hoc medicamento multos curatos esse scripsit Matthiolus. Idem auctor est flores qui ex rubris huius Milij Indici paniculis excutuntur drachmæ pondere ex rubro vino haustos rubra feminarum profluua sistere, quemadmodum albos flores ex paniculis albis exceptos albos yteri fluores cohibere. Idem dari vtiliter dysentericis, & aliis fluxionibus alui affectis. Idem quoque præstare granorum putamen, cui vitello probe decocto exceptum, & à ieiunis deuoratum.

SORGI ALBUM, MILIUM Indicum, Dora. CAP XLV.

Sorghi iam dicto simile hoc Milium Indicum Describitur, foliis constans harundinaceis, præaltis & c.

De genicularis culmis, effusaque iuba, sed semen
eius multo, maius, rotundius, & candidum, in
glumis hirsutis contentum, differentiam manife-
stam constituit. Ab Arabibus, teste Bellonio, Ha-

Huius particula-
tionem in-
minisse Rha-
sem & Sera-
pionem, Ara-
bicóque anti-
quo nomine
Drom vocatis,
testem habemus Rauwolf-
ium studio-
rum nostrorum
socium, qui et-
iam Genera Sc-

Antuerpia transmissit Coldenbergius pro M.
bit A. americano & Milio Ethiopico: Florentia
Ducis Hortulanus pro Sorgho albo Candie.


Matthiolo in poet. comp. It. dicitur Miglio Indicum pro gemide, hoc est, Milium Indicum nobilius. Dodon. Lat. Melica candida. C. Bauh. pin. Milium 5. siue arundinaceum plang albi et femine. Sarga simile gram. Mare men Arabum, Bellonio. Dort, Rauwolfio. Milium Aethiopicum, Poter. An Milium album in Regno Congi, quod Mazzus de Congo, id est, semen Congianum vocant, Hist. Ind. Oriental. part. prim. l. 2. c. 1.

Sorghum hoc album in Cilicia ac Epyto feri, & illic à te repertum scribit Bellonius ubique panes ex ea coqui. Dodonæus priori Sorghi sapore & temperamento simile constituit.

LACHRYMA IOBI MVLTIS, SIVE MILIUM arundinaceum.

C A P. XLVI.

Description



L Achryma
Lobi culmis
donata est cu-
bitum vnum
aut alterum al-
tis, genicularis:
sola autem ha-
bet Tercici
Frumenti, cubi-
to subinde lon-
giora, vncias
duas lata: qui-
bus minora
sunt illa quæ in
ramis nascun-
tur, ex quorum
alio petioli emi-
cant, quibus
transadiguntur
singulis grana,
ut plurimam

singula, rarius bina, laevis pollicissimi, nigra,
ante maturitatem flavescentia, matura ex can-
dido rubescentia, duritie lapidea, Cicer æquan-
tia, superiore parte turbinata, vnde exit inanum
glumarum spica murica. Pro duabus nostris leco-
nibus (quas iam sculptras eminus) appositis, vel-
lemus unam esse solam melius depictam. Tragus

Fuchſium er-
raſſe ſcribit
Matthiſolus
quod in lib. de
comp. med. tra-
diderit plātam

hanc arundinaceam esse Lithospermum genus: càmque opinionem confutat in Apologi, quam aduersus Amatum, quem secutum ait Fuchium, scripsit. Genuinum, inquit, Dioscoridis Lithospermum eam memorat esse plantam, quæ globulos illos (lachrymas vocant) mittit, quibus vrantur funiculo traiectis ad numerandas preces. In quo manifestè peccat, quoniam Dioscoridi Lithospermum planta est foliis Oleæ longioribus, latioribusque, ac mollioribus humi accubantibus ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus caulicorum speciem exhibeant, foliis longis, interque paruum semen rotundum Prui parui (vt Oribasius & Serapio ex ipso Dioscoride transcribunt) magnitudine, nascaturque in asperis. Quæ omnia in planta lachrymas illas ferente desiderantur. Siquidem hæc folia profert harundinacea, quemadmodum & culmos per intervalla geniculosos, in quibus semen Orobo duplo grandius visitur, quæ quantum cum Lithospermi notis habeant similitudinis, ipse videat. Adde etiam quod Lithospermum in editis, & asperis locis per se spontè nascatur. Lachryma vero vocata non nisi sata proveniat, erectis omnino calamis non humi repentibus, vt scribit Plinius. *Hadenus Marshallus*, erroris accusans Fuchium, quod hanc plantam Lithospermi genus dixerit. Verum ipse potius reprehendendus est, vt qui falsam figuram pro Lithospermo maiore exhibuerit. Cerrum est quidem Lachrymam tibi, non convenire descriptioni plantæ à Dioscorido traditæ. Sed Fuchius non dicit esse ipsum Lithospermum, sed Lithospermi solum genus, licet Amatus eius fuerit opinionis, qui *Αδωκιν* Græcè vocavit, & Lat. Lithospermum, *Lachrymam*, *Lachrymam Marsæ*. Lachryma vulgò *Simientem*: Arab. *Cull*: Germ. *Marion trähen*: Clus. vocat *Gall*. *Larmes de nostre Dame*. Hisp. *Lagrymas de Moysen*.

Francia

Lithofane

703 26 178 2004-05

THE TRAGEDY

Pack 1770

Section 1000

Math.

Math. 101

darf.

Pp. 5

Getasus & Dodonaeus videntur credere esse *Lithospermi* speciem, si seminis duram substantiam respicias: alijs toto genere a *Dioscoridis Lithospermo* differre perhibent.

Lithospermi Plinii
Lob.
Lobelius tamen in *Adu. pro Lithospermo Pliniano* describit, notatque Plinium, quod verumque *Lithospermum* in vnam constaret descriptionem. Eius verba sunt haec: Plinij si quis exactius textum perpendat, & cum utroque comparet *Lithospermo*, facile animaduertet utrumque ab eodem designatum, sed (qui illi penè fatalis lapsus, ut de *Chrysanthemo* monuimus) in vnam descriptionem conflatum. Primum *Arundinaceum*, id est, *Iouis Triticum* indicat *Triticis*, aut *harundineis* similem, aut congenerem: herba quinquuncialis, folijs *Rutae* duplò maioribus, ramulis surculosis, crassitudine lunci, quae ex utriusque delineatione mixta sunt. Sed post addit lapillos magnitudine *Ciceris*, duritie lapidis, candore & rotunditate margaritarum, cauernulas habent quae pediculis haerent: quae postrema prorsum *Lachrymae lobae* quadrant, neutiquam *Dioscoridis Lithospermo*. Quod licuit illi quamplurimis in agro Romano locis videre: haud sanè tam stupenda mirabilitate, si vulgò cognitum *Milium Solis* intellexisset: eoque dicit, sibi non haerentem, sed vultu a visam plantam in Italia crescere, puta hortis. In *Creta* optima, nimirum natiuo solo, quia tantus decor veluti candicantibus margaritis: ceteraque mihi verba, neutiquam deformi & tristi *Lithospermo* congruant, sed *Lachrymae lobae* longè hilarior & incundior aspectu, quibus intus inest semen (ut idem dicit) & subius cauernulae, neutiquam communi. Mutat hic *rapodus Senensis*, & superius in *Fuchium* ineptit.

Synonyma
Casp. Bauh. pin. Lithospermum 1. siue *arundinaceum*, fortè *Diosc. & Plinij*. An *Coix Theophrasti*, 1. hist. 16. *Lachryma Christi*, *Trag. Gesn. hort. Lithospermum minus*, *Trag. Gesn. hort. cui & fruticosum*. *Arundo Lithospermos*, *Gesn. hort. Lithospermum primum*, *Lacun. Arundinaceum* *Lugd. Lachryma lobi*, *Adu. Clus. hisp. & Hist. Dod. Lob. Obs. p. 26. l. c. p. 44.* (ubi & *Lithospermum & Diospyros Plinii*) *Cam. Cast. Eyst. Lachryma vulgè*, *Cas. Eidem Lithospermum 2. siue minus*, *Matth. Lac. Cast. Lugd. quid?*

Locum
In hortis Italiae ac subinde etiam Belgii feritur, peregrinum siquidem est, aliunde illatum. Galloprouinciae & Narbonensia vireta praesertim Carnobiorum, nondum intestinis bellis offeruentibus euerfa, hanc plantam sedulo colere solita erant, seminis lapidei causae, ex hoc enim maturo, & in aqua feruenti intincto globulos precatorios, ut vocant, parant. In horto E. C. satum multoties prouenit, sed semen nunquam maturuit.

Vires.
Est etiamnum, si expertus haec scribit Lobelius, ad calculum renum, & vesicae saburram, polline & decocto praesidium vulgatum.

ORIZA VETERIBVS.

CAP. XLVII.

Theophrastus 4. Hist. cap. 5. Orizam potissimum in India feri perhibet, Zea similem, pistantque tanquam Alicam, concoctu perfacilem reddi, aspectu Lolii similem: stareque magna parte temporis in aqua: effundere non spicam, sed veluti jubam modo Milij atque Pani-

Dioscoridi Oriza frumentorum species est, in palustribus & riguis, quae mediocriter nutrit, & aluum sistit.

Indi apud Plinium lib. 15. cap. 7. ex Oriza oleum facere dicuntur. Idem lib. 18. cap. 7. ait, Italica maxime quidem Oriza. [Oriza quidem maxime ut Itali gaudent, subintelligit Indos Dalechampijs. Alius legit, Italia &c. *Casalp.*] gaudent, ex qua prisanam [Prisana Oryza ea est, quae in omnibus locis venalis prostat, & Ru dicitur.] conficiunt, quam reliqui mortales ex Hordeo. Oryza quidem folia carnosa, Porro similia, sed latiora: altitudo cubitalis, flos purpureus, radix gemmae rotunditatis.

Aristobulus apud Strabonem tradit Orizam in aquis clausis [conclusam Dodon.] stare, factis areolis quibusdam, eamque esse altitudine cubitorum quatuor. Multi fructus, multarumque spicarum esse: circiter verò Pleiados occasum, emundari ut speltam. Nasci etiam in Baetiano agro, & Babylonio, & Susio, & in inferiore Syria. Megillus scribit eam, ante pluias feri, consuetudine tamen & irrigatione indigere, & clausis aquis irrigari. Bosporus (Hermol. in Diodoro Bosporon corruptis exemplaribus inuenias) quem Onesicritus ait in veneratione esse, minor est Triticum, & inter amnes nascitur, torretur autem eam in area excutitur, sed iurant ne prius cum ex area moueant, quam igni concoxerint, idcirco ne semen exporteretur. Indi potum ex Oriza conficiunt, sicut ex Hordeo. Cibus magna ex parte Oriza forbilis est.

Galenus 8. simpl. med. Orizae adstrictorium quidpiam adscribit, quare mediocriter ventrem sistere ait: Et hinc 2. de alim. haec subdit: Semine Orizae omnes in sistenda aluo vtiuntur, ipsum eodem modo quo Alicam coquentes: difficilius tamen quam Alicam conficitur, & minus alit, & utique in edendi suauitate ab ea quam plurimum vincitur. Eadem est & Aeni & Aeginetiae de Orizae facultatibus sententia.

Aetnarius lib. 2. de spiritus animalis nutritione cap. 5. author est Orizam edulium esse modicè calidum ac siccum, & alibile, & meatus obducens: temporis autem intervallo sumptam, nihil sanè corpori molestiae afferre.

Samconis Serhi *Oriza* est prima distantia calida, sicca verò secunda: satis habet nutrimenti, sed difficilis est concoctionis. Alba ergo Oriza cum sit, modicè sistit aluum: rubra verò cum est, magis propter siccitatem adstringit cum lacte verò apparata, bonum habitum bonumque colorem affert, genitali semini adiicit.

Oriza nostra vulgaris, quae praecipue existimatur Theophrasti, Dioscoridis, Galeni, Aeni, Pauli, Aetnarii, & Samconis Serhi, alba & rubens traditur, quae quidem auctoritate nescimus, nisi ex Serhi, qui fortè per rubram intelligit, cui torrendo rubedo accidit.

Oryza verò rotunda radice Plinii diuersa à nostrate Lobelio, qualis considerandum, ex eius verbis, quae post adscribemus. Habetur quoque Dioscoridæ species, *Schneider, Cordo & Rysio* dicta, quae tradita est cap. de Gramine mannae.

Est & Oriza germanica Trago quae Hordei genus.


Per prisanam aliqui intelligunt Orizam, quae vulgò cortice nudata venalis habetur
C. Bauh.

Acquisita
Oriza
vulg.

Oriza rotunda
radice
dicitur, quae
Gramine
manna
Hordei
genus.

ORYZA

CAP. XLVIII.



luri crispantur. Inter Oryzam, quæ adfertur, sunt quædam grana cute flavescente recta, pulchre canaliculata.

Planta descripta Marcellis. Matth. sic describit herbam : Oryza folium profert arundinaceum, carnosum, potraceo haud absimile: culmum cubitalem & sæpe maiorem, geniculatum, Tritico crassiores, firmiores aque, in cuius fastigio iuba oritur, siue spica in ramulos diuisa, in quibus semen utrinque impari exortu prouenit, cortice sublaui, rectum, aspero, veluti striato, cui figura, quod gluma excussa candidam est.

Libel. descripta Marcellis. Lobel. in Adu. descriptioni Matthioli contrariatur: In arilla, inquit, flexuosa, sed rigidula spicam alterno situ insunt grana, sublaui folliculo, acutis seu angulosis striis in longitudine donata: quo cum sibi supernè hærentibus aristis mordacibus, exuta grana, candida, pellucida, dura & multo pulchriora gratiora, atque candidiora quouis præstantissimo Tritico siliagineo. Culni hordeacei sesquicubitales & cubitales, radix Tritici: at folia potius Milij aut Hordei quàm Porri (ni multum labat memoria) visa.

Hermol. descripta Marcellis. Hermol. qui testatur Oryzam Hordeum galaticum quosdam vocare, quia graue sit atque candidum, miscet quæ Theophrastus scripsit de Oriza cum Strabonis verbis.

Oryza generis Marcellis. Oryzam frumenti genus vulgus gallicum detracta priore litera *Rizum* appellare refert Ruellius, qui duo reperiri genera tradit, vnum grano candido, quo plurimum Gallia vescitur, decocto cineribus calidis, non nisi peruncto pingui iure. Alterum grano rubente, quod Plinius cubitali demonstrat altitudine, &c.

Oryza Marcellis. Marcellus quoniam Oryzam notam omnibus dixit, idè eam describere inutile & inanis iactantiz fore duxit. Nos Oryzam ipsi Marcello in mensam illatam per patinariam suppellestem, quàm in agro nascentem vuido notam potius fuisse dixerimus, non enim, ut tradit ipse, inutile fuisse illam descriptam ab eodem, cum non ita passim eius notitia in exteras regiones, & procul ab Italia disiunctas dimanarit, usque innotuerit, ut falsò eam omnibus notam esse ipsemet persuasum sibi habuit, quare ipsi planta ex solo

Tom. II.

natali vliginosa petita fuisset describenda, cum alij sint qui duo vel tria Oryza genera statuant, alij verò Hordeum cognomento galaticum esse velint.

Eandem olim Matthiol. verebatur censuram, quam Marcellus, cum dixit aded omnibus in cibis familiarem esse & frequentem, ut nulla prorsus explanatione in ea describenda sit opus. Sed eam tunc ceu ignotam plantam describere non potuit, quod satis apparet ex priorum comment. icone, quam in post. comm. innotuit: præterea ipsemet imperfectè eo modo quo diximus, plantam descripsit, quali prouenientem non obseruari.

Erronea est opinio Eucharj Roest. Oryzam, Far candidum statuentis. Sed & eorum sententiam minime probandam ducimus, qui Typhen Plinij esse dicunt. Alij Olyram & Oryzam eandem esse crediderunt, sed falsò quoque.

Ineptè Brunfelsius Oryza descriptionem pro sua venditat, cum sit Plinij, quem allegare debet.

Cum Oryza nostras ex India in alias terras transferatur, & multis Europæ locis feratur, cõtendit Cord. in Diosc. necesse sequi aliam quodamque Oryza speciem inueniri, quæ etiam in Europa spontè nascatur, quod sc. Diosc. simpliciter palustribus locis Orizam nasci dixerit, nec adiecerit peregrinæ alicuius nomen. Nos contra argumentum Cordi nullum exhibuimus, nec necessarium. De eius Oryza spontanea scribimus sub titulo Graminis manna & Dente canis.

Ryff. in Diosc. Oryza hgenium ponit, nunquam à se visa.

Dod. Lat. descriptionem Plinianam assumit radice gemmea rotunditatis, qualis tamen non apparet in icone Dodonæi, nec aliorum.

De Oriza Plinij hæc Lob. in Adu. Ut Semen ex India primum fuit allatum, sic & indidem nomen ascitum videtur: Matthiolus sequutus videtur eos, qui ex Plinio Orizam hodie ignotam, radice Gemmeæ rotunditatis, flore purpureo, foliis carnosissimis porri similibus, & latoribus, altitudine cubitali, cum nostrati vulgata Oriza in seicte confuderunt. Hæc ille, quem optatissimus descripsisse semina illa munere accepta. Si duo Oriza extant genera, Plinium ea non distinxisse clarum sit ex eius verbis, mentionem non facientibus duorum generum.

Orizam suo cortice spoliatam ad nos deferri putat Riolanus, quod in eius cortice venenatum quid sit. Scri procul ab urbibus quod eius flos malè oleat. Eam calidam esse & siccam, mediocrem habere vim adstringendi, idèoque in ciyleribus dysentericorum parum torrefactam à Medicis usurpari: crassum succum gignere, venasque obstruentem si quis frequenter vtatur: ex ea cum lacte cocta, jejuni tempore, parari Oryzatum. Sed mirari sibi videntur Riolanus habere, quod de cortice Oryza venenato scriptum reliquit, si Strabonis locum à nobis adductum consuluerit, longè aliter sentisset: præterea miror nos tenet, cur ob florem eius malè olentem procul ab urbibus ferendam eam iudicauerit, si namque Theophr. Dioscoridem & Strabonem adiunxerit, fuissetve ipsi in locis ubi colitur, meliorem longè veriorèque ei rei causam subesse deprehendisset, neque enim hætenus apud vllum Veterum Recetiorumque legisse nos meminimus quicquam vel de cortice venenato, vel etiam de flore olido.

Guiland. in theone rider præclaram illam O-

P p 3

Marcellus.

Eucharj.

Brunfels.

Argumentum Cordi nullum.

Figmentum Ryff.

Riolani.

Oryza Marcellus.

ryzam, priori à Matthiolo volumine expressam, eique Holci apud Plinium nomen adscribit, dicens eam seq. edit. Fallopio monente, in melius esse mutatam.

*Diversitas
nominum.*

Lacuna ait Orizam optimè cognitam esse in Hispania, præcipuè Valentia. Gualth. Rysium pingere similem Burlæ pastoris; Matthiolum similem Hordeo: silam si bene recordetur, non proferre spicam, sed paniculam veluti Milium. Quandoquidem autem ibi non proveniat, se perfectam figuram dare non posse.

*Item ridicula
Lacuna.*

Lonic. scribit provenire solo limoso, ad altitudinem vine, folia ei esse longa, florem rubrum unde patet per, in quibus inveniatur rubrum aut album Risum. Is ridiculam figuram proponit, qualem Risens, & similem descriptionem plantæ non visæ, & sibi planè incognitæ.

*Porta no-
tatur.*

Porta sibi imaginatur Hordeum distichum, siue Galaticum, Hordei genus alterum Columella & Palladii, Theophrastum & Dioscoridem Orizam vocare. Mirum autem eum non observare Hordeum Columellæ feri locis frigidis, non autem aquosis: quinimò non cõperimus Orizam locis frigidis provenire, sed calidis: parum ei notam plantam, Orizam fuisse, id etiam indicat, quod floris non meminerit.

Synonyma

Dicitur C. Bauh. pin. *Oriza*. siue *Italica*, ad differentiam Germanicæ, de qua inter Zeas. *Oriza*, Brunf. *Match.*, Ang. *Tur.* Cor. in *Diosc.* Lac. *Dod.* Lob. *Lon.* *Cass.* *Cast.* *Cam.* *Tab.* *Oriza peregrina* Trago. *Hordeum Galaticum Columella*, *Hermolaus*, *Ruell.* *Amat.* & *Tab.* cõsuet.

*Nomina
Linguar.*

Oriza Latinis, Græc. ὄριζα, Theophrast. ὄριζα Diosc. Germ. *Reiß*, Belg. *Kye*. Gall. *Riz* ou *Ris*. It. *Ris*. Hisp. *Ariz*. Arab. *Arz* seu *Arzi*. Angl. *Ric*. Boh. *Rayze*, in India Orientali, si diarium nauticum vera recenset, dicitur *Ten Tumbara*.

Locus.

Locus ex antiquis antè descriptis annectamus, quæ de his recentiores prodiderunt: Grapald. in Lex. scriptum reliquit apud Italos (Parmentes) nuper feri coeptam esse: [Seritur autem mense Martio] & aquis clausis irrigari. Itane feri coepit nuper Oryza, ut Grapaldus ait, in Italia? quandoquidem Plinii tempore Italia ea maximè gaudebat, & Horatii. Rei rusticæ authores Latini (quod quidem meminerim, inquit Bruyer. culturam Oryzæ minimè persecuti sunt, credo quod eam parum familiarem, nec hominibus admodum utilem existimarent. Etenim haud dubium est, eam ab externo orbe inuectam, Indiæque terræ populis cibum vulgarissimum & gratissimum esse. Hodie feritur quibusdam Italiæ locis. Quin & in Gallia nostra Lugdunensi tentare quidam eam excolere, frustra tamen: nam & parum latè provenit, & impensè maior, quàm ex eius provenitu utilitas sentiebatur. Vidi ipse plantas Lugdunensis Oryzæ: foliis carnosiss, Porro similibus, sed latioribus, altitudine cubitali, flore purpureo, radiceque gemmeæ rotunditatis. Sic enim Plinius Orizæ plantam depinxit. Si Bruyerinus vidit Orizam Lugduni, cur non describit, sed ponit Plinii suspectam descriptionem. Hac ætate in Fortunatis Insulis & Hispania provenit ut Dodon. testatur: unde in Belgium, pista ac Prisanæ modo repurgata, adfertur. Apud nos (Porta loquitur) in Salernitano agro, & alibi maximo provenitu, patenti uia planitie, quam tamen euripis, & illicibus, & fluviis ductis, quoties opus est rigamus, alioqui nullam, aut cassam segetem lagura. Notissimum illud Asiæ & Europæ, sed vnius duntaxat generis mihi [Lobelii verba sunt] visum in provincia Narbonensium & Hispania, sed

maximo provenitu in agri Mediolanensis depressis, & parenti planicie vdi agri, quem tamen euripis & illicibus à flumine è lacu *Major* vocato ductis, crebrius quoties opus viderint, rigat: alioqui nullam aut cassam segetem lagurum, ut mirum sit tam siccum & exectum granum, tam palustrem & humentem optare fundum, bonum alimentum & laetum suggerere, etiamque valetudini prodesse posse. Huius messis serotina est circa æquinodium autumnale, quippe maturefcit æstivis solibus multis: eoque Septentrionales, tamen humentes magis, respuit tractus, ut pote altissimos &c. Visa in Longobardicis & Hetruscis campis latissimis & viginosis, atque in Prouincia Gallia. Camerario referente in aquosis locis aliquoties Norimbergæ provenit. De huius cultura consule Augerum Gallum.

*Vitis &
Vina.*

Quæ Veteres prodiderunt de viribus vsuque Oryzæ, illa omnia reperient lectores, in antè adductis Antiquorum testimoniis. In cibis Oriza admodum est familiaris, concoctuque facilius euadit, & ori gratior, ubi ex lacte bubulo, aut amygdalarum cremore, aut carni pingui iure decocta fuerit. Datur utiliter in cibis dysentericis cæliacis, & diarrhoea affectis, præsertim ubi prius torrefacta in lacte, in quo igniti calculi fuerint extrincti, decoquatur. Sunt, qui Orizam quoque dicunt genitale augere semen, in bubulo lacte decoctam, additis saccharo & Cinnamomo. Oryzæ decoctum utiliter dysentericis infunditur, ac etiam potandum datur. Farina bellè quidem Cataplasmatis admiscetur repellentibus: mammarum incipientes inflammationes arcer cum Rosæ, & Anthemide decocta, & illita: Hactenus Matthiolus; Certum est (subdit Bruyer.) Orientis populos, Indiæque potissimum Oryzam in panes cogere: ex iisque nonnullos Triticum quidem serere, sed cibo abdicare, panificiaque ex eo facta: quippe sentiunt ingratißima ventri: & contumacißima coctioni, aded à teneris (ut inquit ille) assuescere multum est. Sunt apud Indos insulæ, quæ aliarum frugum expertes, Oryzam vberimè fundant: potus suos ex ea conficiunt saccharo aromateque vario cõditos, quibus facilius ocyusque tentari capita aiunt, quàm uini vel potentioris haustu. Theophr. Oryzon appellauit peregrinum, initid semen, ex Indiaque delatum, simile Zeæ, aspectu Lolii, magna parte temporis residens in aquis Milii modo ac Panicæ, effundens iubam &c. Hoc elegantiorum mensas subit variis paratum modis. Rura quoque nostra, nulla celebrant laeta conuiuia, quæ non ornentur Orizæ cibariis. Quibusdam prima mensa apponitur ex iure gallinaceo, aut iusculo alio pingui, Croco addito ad commendandum [ut reor] colorem, & conciliandam saporis gratiam. Quippe alioqui gustatu insuavis sentitur: alii ex lacte parant, aut ex succo amygdalarum dulcium, croco adiecto. Sed hæc parandi ratio præcipuè vsurpatur, quibus carnibus uesci cautum est, & secundis adhibetur mensis. Culinæ saccharum quandoque simul coquunt: quandoque verò paropsidibus impositam eo aspergunt. Vulgi peruasit animos opinio, obeliore fieri ea frequenter vescetes. Quæ obrem tum in aula, tum in præclaris vrbibus, scimus quasdam sceminas graciliores, nulliusque (ut sic dixerim) succi, Oryza cibo frequentius vti. Quod ita demum existimant ratum, si solam ex lacte, & largiori saccharo assumant. Sed id esse falsissimum clarissimis medicorum sententiis, constat. Quippe inter *ἀρτίσκηνα*, ab omnibus refertur, hoc est, ea quæ leuiter alunt, & *διάρρητα*, id est,

In cibis.

*Dysenteria
Auger se-
mon.*

*Porta ad
Orizæ.*

*In lacte
concoctum.*

*Obscurum
parum.*

est, quæ difficulter in ventrē conficiuntur. Plurimum & optimum alimentum fuit probè lacti incoctus saccharo & amygdalo nostratis Oryzæ pollen (inquit Lobel.) coque sanguinem & semen auget, quod non dubius animi ille Senensis efferebat in Mauritania vel Hispania egisset, ubi etiam ex Oryzæ macerato lacte frumento, destillant liquorem, limpidum primò, deinde oleosum habent, nec parum suauem, nec minùs exhilarantem spiritus & inebriantem, quàm ipsum (quo illi abstinent vel carent) vinum. Etiam eius pabulo mirè delectantur & dociles fiunt Aphri Elephantæ. Camer. in horto: Difficile nonnihil coquitur, & tota quidem adhuc magis, sed sic ventrem cohibet. In Hispania ex farina huius & gallinarum pectoribus elixis & incisis, cùmque lacte & saccharo lento igne coctis, & ligneo instrumento validè subactis suauissimum cibum, quem album vocant, parare solent, & quæ plurimi alimenti sed paulò crassioris. Solin. obnoxio Erysipelati (Hortensius) præscribit Oryzam, quæ inquit sanguinem increasat & minùs efficit fluxilem.

Vini ex Oryza meminit *Alianus*: Diarium nauticum, & potus ex Oryza & melle cocti, & Aquæ ardentis ex Oryza destillatæ: Acosta etiam Oryzæ acetæ. Ad immodicam, inquit, euacuationem Canarini Carambolas fructum vnum viridem edunt, vel Aceti Canarini haustum sumunt, (quod nihil aliud est quàm aqua decoctionis Oryzæ vno aut altero die referuata donec acefcat, Canarinis acetæ vires præbens, & medicum vsum præstat) & si profusum non cessat ægris caput frigida abluunt.

ORYZA INDIE ORIENTALI PECVLIARIS C. Bauh. quid?

CAP. XLIX.

Oryzam hanc secundam *Casp. Bauh. pin.* siue Oryzæ peculiare genus, Regina Patensis, Hollandis obtulit, ut habetur in *Ind. Orient. par. 8.* sed quid? Oryzam ex India originem traxisse, & per vniuersum ferè orbem disseminatam esse, in 6. part. *Ind. Orient. scribitur*. Hæc præcipua tantum India Orientalis locorum annona est, part. 3. *Ind. Orient. cap. 19.* Hinc Indis loco panis est, ex ea placentas parantibus, ex qua in China potum faciunt, quem in Peru *Azuam* vocant: in Laponia vinum, quod Iauenses *Aracle* nominant: & in Pegu, Aquam extrahunt, quæ cum aqua vitæ certat: part. 7. *Ind. Orient. cap. 36.* Distingunt in Oryzam optimam, quam *Girafal*, & in vilioiorem, quam *Chambafal* Indi vocant. *Lincol. part. 2. Ind. Orient. cap. 37. & par. 4. cap. 6.* In summa, Oryzæ vsus, vniuersis propè nationibus, non minùs quàm frumentum familiaris est: ut de China, Laponia, Philippinis, & maxima India Orientalis parte sileam, etiam per Africam & Ethiopiam vniuersam, Indiàmque Occidentalem, cibus vstratissimus est. Sic & Europæi, qui panes ex frumento habent, Oryza, obsonij vice, cum lacte aut aqua decocta vtuntur.

TRITICVM INDICVM.

CAP. L.

Descriptio

Nostro duntaxat Frumento assuetis oculis, Nari spectaculi est quod Turcicum indignant Triticum, culmo digitali, quinque aut sex Tom. II,

pedes alto, crebris articulis geniculato, rigido, medulla alba dulci farto: *folia* arundinacea, hirsuta, venosa, duas aut tres uncias lata, culmū fastigium in *spicæ* plures iubatas facessit, quarum singulæ seorsum consideratæ, Triticeis similes, muticæ sunt, ex quarum glumis *Flosculi* stamini emicant, colore granorum subscutorum colore varium prænunciantes, quæ in his tamen spicis nulla vnquam nascuntur, ut ad apparatus tantum, quasi *velut* n, comparatæ videri possint: namque ex culmorum geniculis & foliorum sinu, multiplices inuolucrorum membraneorum



stipatu obduti cylindri crassiores enascuntur octo aut decem versibus granorum constantes, quorum vnicuique mollis arista, dodrantē longa adnata, sic ut ex omnibus cincinnis & vagina caput exierens, metaxan, quæ cortinas nondum sensit, exprimat: cedentibus autem aristis grana quo diximus

ordine digesta, Pisis facie proxima, mira colorum varietate ludunt, tota alba, purpurea cærulea, lutea, & quocunque denique modo horum mistio excogitari potest, quæ contracta contritaque in farinam abeunt candidissimam: radix subest Milij.

An *Athen. dipnos. lib. 3. c. 15.* hoc Triticum Indicum intellexit, cum dixit:

*Nascitur Aomis Thebis simul apra farina:
Et Thaso, multisque locis: sed grana videntur
Vnarum.*

An *Anati Leri* in America sua, ubi scribit cap. 9. Mulieres Americanæ cum acuto ligno plantant duas species crassi Milij nempe albi & rubri vulgò in Gallia dicti *Bled Sarrazin*: sylvestr. hominibus, *Anati*, ex quo farinam parant quod existimo (licet in prima editione historiarum meæ aliter senserim) idem est cum *Mais*, Indianorum in Peru quod describit *Hist. gen. Indiarum lib. 1. cap. 215.* Calcondiles in Bello Turcico lib. 3. c. 14. scribit in quibusdam India Orientali Milium ad quindecim cubitos altitudinis. An *Eid. Milium præaltum Anati dictum?*

An *Theu. Amer. cap. 77.* Milium crassum, Pisi instar magnum (hoc est, ut in Gallia antaret. interpretatur *Mil gros comme pois blanc & noir*) diuersorum colorum: culmis Sacchari modo, tres aut quatuor spicas, quarum vna perpetuò maior altera, ferentibus? An *Nic. Nicol. Milij genus magnum, Malch Tripoli dictum.*

Dodon. Gall. vocat Milium Indicum Plinii, & cum Fuchl. Frumentum Turcicum. Item cum Lonic. (cui etiam Typha magna) Frumentum Asiaticum: Gall. Blé de Turquie, aut Blé Sarrazin. Belg. Torckshoren Dodon. Lat. aiter Asia inuectum credi, atque inde Turcicum frumentum nominari: non tamen ex Asia, aut Oriente sed ab Occi-

Frumentum Indicum.

dente; & ex Fortunatis aliisque Americae vicinis insulis, ac ex ipsius America nonnullis provinciis affertur, ibidemque *Maizum* siue *Maizum* nuncupari, praesertim quod candidi sit grani. Idem refert Cordum Triticum, Bactrianum faceret, sed ratione, aut occasione non probat.

Matthiæ postea com. It. ait male vocari Frumentum Indicum, esseque dicendum Indicum, quod allatum sit ex India Occidentali, & non ex Asia, aut Turcia, ut Fuchsius crediderit. In Epit. cum add. Canet. vocatur *Frumentum Indicum*, Indorum *Maiz* seu *Maiz*. It. *grano* siue *Formento Indiano*: Boem. *Ein ofen Syro*.

Matthiolum adarguit Lob. in Adv. dicens: Milium Indicum (ita in Obs. p. 24. l. c. p. 29.) Pliniam seu *Maiz* Occidentalem, Frumentum Turcicum, vulgò Flandris, *Turciscum*: Frugum maxima & perquam speciosa hinc nostro orbi inquilina, inde à Neronis principatu in Italiam inuectas, quæ nostra ætate magis oblectationi quam Panisefo lata & culta, Turcicumque frumentum, tum vulgo tum doctissimo Fuchsius nuncupata est. Quam tamen perbonum doctorem, cum alias non tenet, tum hic potissimum immerentem lapsus inculat Commentator Senensis: quod istud Milium perperam Triticum appellavit, utpote non ex Turcia allatum, sed ex Occidentalibus Indiis primò importatum. Atque cum huius delineationem, proceritatem & fecunditatem scite Plinius adumbret, cuius auctori nulli Europæorum nota fuit aut peruia Occidua India, perpetua illius tempore primum allatum fuisse commentatoris Chronographia statuit: quare rectius natelet, qui ex Asia Turcica maiore, Indiis finitima adduxerunt Turcicum vocarunt.

Frumentum Asiaticum.

Turcicum frumentum, quod Germani *Welsch Korn*, h. e. Italicum (ita enim omnia peregrina appellare solent) vocant, iure equidem Typham magnam dicendum putavit Tragus. Quia verò è scriptis Veterum nullum nominis huius testimonium adduci potest: idcirco Triticum magnum, & Asiaticum frumentum vocavit, germ. *Eurdisch Korn*.

Gesn. Coll. stip. appellavit frumentum Turcicum Fuchsi. De hortis tamen Panicum rectius cognomento peregrinum vocari opinatur. Idem rursus, Triticum Indicum, & Bactrianum nominat: In cat. pl. Milium Indicum in Italiam Neronis principatu conuectum: *αίχμη* i. e. *Turcisch Korn*, oder *Judisch Korn*: Milium Sarracenicum.

Triticum Bactrianum, Milium Indicum.

TRITICVM PERUVIANVM. album longum.


CAP. LI.

Descriptio

Minimè vulgaris notitia est in tanta tamque fecunda Tritici Peruviani varietate, species hæc ita secernenda, quod semen habeat vulgari duplo longius, compressum, & ea parte qua sinuatum nonnihil est, candidum.

Frumenti Indici: Epit. G. Bauh.

De Frumento Indico absolutiorem C. Bauhini in pinace tractationem hic subditam, legere ut non graueris, a nuce lector, rogatus esto. Et in Canaria frumenti varia genera habeantur: attamen potissimum apud Indos quadruplex est: *Primum* Milium Indicum: *secundum* Maiz, quod Triticum ipsorum est: *tertium*, quod *Manigete* indigant: *quartum* est Oryza, quæ in Regno Cogia-no *Maiz* & *di Manpuro*, id est, semen Lusitanicum,



at Malatenses *Bras* appellant: & tres posteriores species delineatæ in 6. parte historiz Indiz Orientalis figura: 4. proponuntur.

I. Frumentum Indicum, seu Milium hoc spicas habet oblongas, ex granulis colore semen Cannabis æmulantibus, compositas, formâ nonnihil oblongis, vtriculis siue folliculis arstis carentibus inclusis, instar Diplaci herbæ, quod trium mensium ipatio succrescit: dein absconditur, in terram mentis spatio deponitur, ut Solis calore probe exicceetur & percoquatur: tandem spicæ à culmis ressecantur, in fasciculos collectæ domum deportantur, stramine operiendis, vel muniendis ædificiis, destinato. Hoc Frumenti genus optimū est: quod fractum & comminutum, candidissimum apparet, ex quo facili labore panis pinsitur, cum admodum molle sit, & attritu itacum, massam conficiendis panibus aptam, præbeat. Et hoc Frumenti genus, semper habuerunt, etiam ante Lusitanorum aduentum: Hist. Ind. Orient. part. 6. cap. 30. An semen quod Congiani Lucum vocant, Cannabis grana, nisi quod paulò sit maius, referens, quod mola manuaris, subactum & pistum panem præbet candidum, Triticæ non inferiorem: Hist. Ind. orient. part. 1. lib. 2. cap. 1. An Arundinis genus granum ferens, nostro Secali aut Frumento simile, quod decoctum esui est aptum: Insulæ Virginæ Hist.

Frumentum Indicum.

II. Frumentum Indicum grano Auellanzæ magnitudine, folia habet angusta, & tenuia, sed in tantam altitudinem quemadmodum, tertium, non exurgit: ex ramis frumentum illud instar Nucum Auellanzarum dependet, quod aristas habet cum Tritico siue *Maiz* convenientes, colore rubicundo: grana cute tenella inuoluta, putaminibus includuntur, & peculiaribus quasi oculis ad modum granorum in Malo puniceo, ab invicem distincta: seminat in agris quemadmodum Frumentum verum, potissimum in Africa, & quidem in peculiari quodam loco, qui nomen etiam suum inde obtinuit: & Æthiopibus *Manigete*; Batavis, *grain* dicitur; part. 5. Ind. Orient. cap. 38.

III. Frumentum Indicum *Maiz* dictum. An Triticum Bactrianum Plinii lib. 18. cap. 7. Frumentum Arabicum quod *Maiz* nominant, in Hist. Ital. Triticum Indicum siue *Maiz*, quod Lusitanis apud Nigritas primò seminantur: in Hist. Ind. Orient. part. 5. cap. 31. *Pagasonur*, Virginæ indigenis. Auati fructus, ex quo Brasiliiani potum *Kaay* coquunt: Sead. part. 3. Amer. c. 17. Milium amplum, Triticum Sarracenicum, Barbaris *Anati*, quod idem cum Indorum *Maiz*, & Triticum Peruvianum Lero part. 1. Americ. capit. 8. Milium *Abram*, id est, Siligo Turcica in Balv. part. 3. Ind. Orient. capit. 40. Frumentum Asiaticum: part. 7. Ind. Occident. Milium Brasilianum part. 3. A.

Americ. Milium in florida, part. 6. Ind. Occid. Differentia notanda, cum duo genera, ad sex vel septem pedes, tertium ad decem in Virginia excresecat. Sic alterum crassius & rotundius, ut quod & Lucanis collitur: alterum subtilius & aridius, quod *Morachen* appellant. Granum hoc magni prouentus est (bis enim Martio & Iunio ferunt: part. 2. Ind. Occid.) eum in Peru ex vno grano 600. gignantur: at in Virginia mille & quinquaginta, & interdum bina millia reddat. Siquidem spica vel vna, vel binæ, ternæ, vel quaternæ, & singulæ spicæ quinquies, sexies & septies centena grana in Virginia contineant: apud Americanos, singuli culmi tribus quatuorve spicis ornati adolefcunt, quarum singulæ, grana centum & amplius pendunt. Sic grana alba, rubra, flaua, cærulea in Virginia sunt. Frugum omnium communissimum Indæ Occidentalis locis, in Peru, noua Hispania, Guatimala, Chile, & vniuersa terra firma, in Insulis vero non item: sic & in Indæ Orientalis aliquibus. Hoc Indi communiter cum primo commiscunt: & ex hoc solo panem *Arepas* nominant, & potum *Chicha* (potus subacidulus) in dictis: part. 9. Ind. Occid. addit.) Indis vocatum, ut fortissimum, quod in Peru *Sera* dicitur. An hæc herba quæ in Brasilia aliquando senes virilia contegunt, cuius folia dihorum digitorum latitudine, paulum incurua, in longitudinem excresecunt, veluti enclampus qui spicam Miliæ siue Tritici *Sarraceniæ* contegit: *Leio* in Brasilia, *sp.* Hætenus ex Hist. Indica: subiiciamus Recentiorum nomina. *Turcicum frumentum*, Trag. (cui & *Typha magna*) Fuch. *Frumentum Indicum*, Marth. Lon. *Milium Indicum* Pliniam, Ruell. Gesner. Ad. Lob. cui & *Mays Occidentali*. n. *M. Indicum*, Dodon. (cui & frumentum Asiaticum,) Turner. Lac. Gesn. cat. *Frumentum ostiana species* Turcica dicta, Ang. *Triticum Indicum* siue *Indicum*, Cord. Hist. Gesn. hort. *Frumentum Turcicum*, Dod. Gesn. hort. (cui & *Panicum peregrinum rectius*.) Tab. Ger. *Triticum Indicum* Fuchij & Marth. Lugd. *Mais*, Monardi. *Mais*, *Triticum Indicum* potius quam frumentum Turcicum dicendum, cum non ex Asia, sed ex India primum sit allatum, Cam. *Mais Indicum*, *Panicum Indicum*, Cæf. *Mais*, quod nulla specie cum Miliæ, quod Plinius ex India in Italiam importari scribit, conuenit, Ioseph. Acofta. Hist. Ind. lib. 4. cap. 16. Variat apud nos floris colore purpureo, rubeo, luteo, aliquando pro ratione fructus futuri: granorum in colore quatuor præcipue genera: habetur enim grana nivescentibus, nigricantibus, crocantibus & subalbicanibus.

Frumentum Ind. Mays dictum alterum. *Milium Indicum* magnum aliud, Lob. icon. *Milium Indicum*, Cæf. *Frumentum Indicum*, Tab. *Frumentum Asiaticum*, Ger. Hoc cum spicarum colore variet, ideo Tabern. spicas sedecim, Gerardus vero duodecim pingit, quæ colore sunt vel simplici vel mixto: simplici, albo, luteo, atro, violaceo, spadiceo, nigro: mixtis coloribus, albo, spadiceo, & cæruleo: cæruleo, albo, nigro, partimque punctis spadiceis mixto: albo, violaceo, luteo cum punctis spadiceis: rubro, nigro & spadiceo: luteo albo, aliquando cæruleo & violaceo, aliquando luteo & albo, violaceis & cæruleis punctis aspersis: rubro & spadiceo: atro & albo: cæruleo, luteo, albo, & punctis cæruleis aspersis: denique cæruleo, luteo, violaceo & albo.

V. Frumentum Indicum Mays dictum minus. Huius Tabern. meminit, quod prioris altitudinem tantum mediam attingat, cuius spicæ non ad culmorum latera, sed floribus succedant, colore albo, rubeo, spadiceo, luteo, atrox rubente, & ali quando mixto.

Cæterum, Germaniam propemodum Arabiam felicem *Tragus* appellat, posteaquam non solum domesticis abundet stirpibus, sed etiam peregrinis, inter quas *Triticum* hoc frumentum connumerat, quod terram probe stercoreatam & pinguem expetit, frigoris & pruinae impatientissimum: feritur Martio aut Aprilis mense, nec nisi sub finem Augusti & initio Septembris ad maturitatem peruenit: primo autem exortu, non multo aliter quam *Milium* erumpit.

Quidam hoc frumentum in Medicina posset, nondum satis constat. Quia autem dulcedinem & lentorem quendam grana gustu præ se ferunt, haud dubie idem cum *Tritico* habebit temperamentum. Cum porro idem cum *Tritico* habere videatur temperamentum, easdem etiam obtineat facultates necesse est. Grana itaque teruntur in candidissimam farinam, quæ in panificia subinde cogitur. Panis tamen ille lentoris quidam & obstruentis naturæ habet. Hinc est quod in Asia & Turcia illius nullum in cibo usum esse, nisi cum annonæ premit inopia, dicunt. Quidam ex farina pulres parant, adhibere lacte, quod & reliquis frugibus familiare est. Cæterum foliorum recentium succum refrigerandi facultatem obtinere tradunt, hinc ad erysipelata vtilem admodum esse conficiunt. In nutriendo, subdit Dodonæus, frumentum hoc, *Triticeis* omnibus, ipsoque non solum *Secali*, sed & *Hordeo* longe est inferior. Panis ex eo apparatus mediocriter quidem candidus est, absque fursuribus concinnatus, sed durus ac siccus, veluti biscotus, nihilque lentoris habens. Conceda eas ob causas difficilis, corporique nullum aut omnino exiguum alimentum præbens: tardè descendens, ac alium constringens, veluti ex *Milio*, aut *Panico* factus.

DE GRAMINE SIVE AGRESTI VETERUM SENTENTIA & NEOTERICORUM DUBIA.

CAP. LII.

Dicitur hæc herba à Theophrasto, quod omnium herbarum frequentissima sit. Hac tamen voce etiam quæcunque alia herba indicatur. Quare magis propria significatione ab aliis Graecis *ἀγρὸν*, *ἀγρὸν*, ab agris, quod in iis proueniat appellatum est. Gramen à Latinis à gradiendo, quod geniculatis ramulis mirifice serpat: vel à germinandi fecunditate, quod citò crebras multasque à se radices nouas spargat, agatque. Arab. ut Serapione cap. 119. *The* & *Negil*: Auic. & Rhase *Thil* & *Tithagra*, ab aliis *Vagen*, *Negen*, *Negien*, *Kel*, *Negil*, *Nagien*, *Phegen*, *Teil* & *Teid*: ken. Egyptiis *Ansi*: Afris, *Iedal* & *Ehal*. Germ. *Grass*. Belg. *Gras*: Gall. *Gramen* & *herbe*: Ital. *Gramigna*, *gramigna* & *gramine*: Hisp. *gramen*, *grama*, & *gramatena*, & olim *Apiaria*: Cretensibus, *Agrissi*, *Vallachis* *Corrida* & *Cutia*: Hung. *Pouye*: Boh. *Paye* aueb *Trawa*. Veteribus Graecis etiam *ἀγρὸν*, aut ut Apuleius legit, *ἀγρὸν*, *ἀγρὸν*, *ἀγρὸν*, & *ἀγρὸν*: hoc est, *Aigicon*, *Aigichum*, *Asyphylum*, *Allesolum*, *Vniola*, *Amazitis*, & *Hæmaticum*.

Frumentum Indicum Mays

In Germania qua loquor tempore se ferendum.

Vitis

Vitis in panis & panis fici.

Succus foliorum recentium.

Herba Theophr.

Agrissi Grass Gramen Lat.

Nomenclatura

V. J. Dioscorides quatuor Graminis genera facit, de quibus ait: Gramen [ἀγρόν] viticulas per terram repentes, quæ à suis articulis radices spargunt dulces, internodiis distinctas: folia acuminata, dura, lata, ocu arundinis parva, quibus boves & iumenta pascuntur. Huius rixa radix & imposita vulnera glutinat. Ipsius autem decoctum epotum, efficax est aduersus tormina, vrinae difficultatem ac vesicae vlcera, & calculos frangit. Arundinaceum gramen priore maius est omni ex parte. Iumenta porro in pabulo sumptum necat, maximeque quod in Babylonis regione secus vias nascitur. Quod verò in Parnasso monte gignitur gramen, densius fruticat, foliis hederaceis, flore candido & odorato, semine paruo, non inuili: radicibus quinque senisue, digitali crassitudine, candidis, mollibus, dulcibus, ac robustis, Quorum succus si in vino cum pari melle ac myrrhae dimidio, Piperisque ac thuris tertijs portionibus decoquatur, præstantissimum sicut ad oculos medicamentum. Id verò in area pixyde reconditur.

Arundinaceum Radicum autem decoctum eadem quæ herba ipsa præstat. At semen vehementius vrinam impellit, vomitionesque & alui profluvia sistit. Natum porro in Cilicia gramen, quod indigenæ Cinnam appellant, boves inflammatur (laginat) si eo virenti sepe pascantur.

Parnassi. Gramen ipsum inter herbas vulgarissimum, genicularis serpit internodiis, crebroque ab his, & ex cacumine nouas radices spargit. Folia eius in reliquo orbe in exilitatem fastigiantur: Parnasso tantum Hederacea specie, densius quam vquam fruticat, flore odorato, candidoque. Iumentis herba non alia gravior, siue viridis, siue in foeno siccata, quum detur aspersa aqua. Succum quoque eius in Parnasso excipi tradunt propter vberitatem. Dulcis hic est. In vicè eius in reliqua parte terrarum succedit decoctum, ad vulnera glutinanda: quod & ipsa herba rixa præstat, tuerique ab inflammationibus plagas. Decocto adijcitur vinum & mel, ab aliquibus & thuris, & piperis, myrrhaeque tertiae portiones. Rursusque coquitur in aereo vase, ad dentium dolores, & epiphoras. Radix decocta in vino, torminibus medetur, & vrinae difficultatibus, vlceribusque vesicae, & calculos frangit. Semen vehementius vrinam impellit; alui vomitionesque sistit. Ita verus codex Plinii lib. 24. cap. 9. Et sunt sane eadem quæ etiam Diosc. habet. Verum

Aculeatum 3. subiungit de aculeato gramine trium generum, quod Diosc. non habet. Et tandem addit, Camelos autem necare traditur in Babylonis regione, id quod iuxta vias nascitur. Hoc autem *καμύλον* Diosc. vocat.

Galen. Galeno graminis radix moderatè frigida est & sicca, habet modicum quid quod mordet & tenui partiu est. At herba in primo abscessu frigidat, sed moderata est in humiditate & siccitate. Semen autem reliqui graminis debile est. Eius verò quod in Parnasso nascitur siccandi vim habet, tenuium partium est, & subadstringens.

Capitulum 4. *Agrostis* denique capitulum in Galeni exemplaribus duplicatum legi auctor est nobis Iul. Alexandrinus. Quare surreptitium esse suspicatus est primum, vel certè superuacuum.

Agrostis 5. *Agrostis* (Lob. & Pen. Aduersaria auspicantur) quasi Agrestis diceretur planta nec satina aut ferenda. Græcis scitè nuncupata fuit: ut pore que ruri ybique spontè quouis anni cardine, coelo, solo & sidere luxuriat: eius namque perennis proventus, feracitatis restibilis, nec minus immensa utilitatis, quantum toto orbe extat terrarum, vi-

rore ornat ameno, & veluti gradatim sese propagando amicit decore, vnde Latinis Gramen deflexum puratur. Triticeo generi, vt cognata, & similis, sic perinde varia & nobilitate proxima. Quin differentiæ magis conspicua è radice, ipsa comâ, folio & flore sunt ducenda: quæ etiam cunctas partes & differentias (quia varias Tritici species emulantur, deque mutua inter se collatione facilius discernuntur & discuntur) apud fore diximus nominibus & notis quamque suis, vel minimas quasque prosequi, quas naturæ pecori quidem velendas, sed homini vni non modò vtendas, adeoque prius cognoscendas, peperisset. Nullum enim vel despiciatissimum illius operum, nostrâ, id est, mortalium Philosophantium, indignum cognitione & admiratione ducendum, summus Philosophus in libro De partibus animalium luenter docuit, eiusque alumnus Theophrastus in Plantarum historiis.

GRAMEN NODOSVM.

CAP. LIII.



CVLINOS ha- Descript.
bet duos
aut tres cubi-
tos altos, re-
nues, ad quoru
nodos folia o-
riuntur, culmū
ad alterum ferè
nodum inuol-
uentia, quæ in-
de dilatata ab-
scedunt, seculū
ciam ferè lata,
palmum longa,
glabra: panicu-
la bipalmatis,
glumis constar
aenaceis, ati-
sta parua mol-
licella donatis,
e quibus floscu-
lorum saturatè

purpurascentiu a tremula filamenta librantur, radices bulbis catenatis, tuberosis, creberrimis fibris longis capillatis, sapore parciū tubacido.

Dodonæus à crebris geniculis ac tuberosis radicem nobis *fnopgrass*, id est, nodosum gramen appellat. Addit autem apparere ex Marcelli verbis, nodosum hoc Gramen apud Veteres pro gramine propriè dicto habitum fuisse.

Hist. Lugd. duas huius plantæ habet figuras. Primam quidem, quæ nullo modo placet, sub hoc titulo: *Epix Myconi*: hoc lepores magnopere delectari, nocturneque eius radices effodere dicuntur. Quibusdam *76 Epix*, i. e. Gladioli species videtur esse, aliis Sisyriachium. Altera figura est sub inscriptione Graminis nodoli.

Lobel. in Hist. Belg. vocat *fnobelachich* ost *Chisterachichgras*. Tabern. *fnoder* oder *fnofen gras*.

C. Bauh. phyt. Gramen 97. siue nodosum aenacea panicula: Eid. pin. Gramen nodosum 1. siue aenacea panicula: an Agriops bulbigenus, Plin. lib. 29. cap. 5. Gramen vel aenae sylu. genus. Gesner. coll. Gramen bulb. siue nodosum, Adu. Lobel. Obs. pag. 71. It. p. 23. Lugd. cui & Gramen nodosum, sub alia figura. Gramen tuberosum, siue nodosum, Cam. Gra-

Diffinitio
completa
vnde se
recedit

Descript.

H. Lugd.
nomen descript.

Gladioli
species
Sisyriachium

Synonyma

men bulbosum Tabern. *Gramen caninum nodosum*, Ger. Agrosteos alterum genus. Patavij ubi sponte provenit, quidam vocabant Bromon: Volmarius misit Sturgardiz pro Gramine Dioscoridis.

Nascitur in segetibus, secus agrorum margines, & in collibus inter alia Gramina. In saltibus Thuringiz ubique se offert. Sed, auctore Lobelio, rarius aliquando istud, minusque plerisque Europæ regionibus usu cognitum: Lemano. a. & Lausannæ finitibus arvis & segetibus plurimum. Frequentissimum etiam Sabaudiz & Angliæ.

Saporis amari & acerbis sunt radices, quare valentius obstructions expedire & urinam ciere aiunt, quam vulgare. Herba, inquit Marcellus, quæ *gramen* dicitur, nodorum 27. ex vino ad medias decocta & expressa atque colata, potuiq; strangurioso ex viña cyathis vno mixta data, adeo potenter succurrit, ut ubi sine tormento urinam facere coepit, dari non oporteat: sed febricitantibus ex aqua sola dabitur. Ex quibus verbis apparet, nodosum istud *gramen*, apud Veteres pro *gramine* proprie dicto sive Agrosti habitum, & aduersus calculum & vesicæ morbos commendatum quoque fuisse. Recentioras nunc huius, modò illius indifferenter, pro *graminis* radicibus vitur.

GRAMEN HIRSVTVM REPENS, SPICA SIMPLICI, MOLLI.

Descriptio

Importuna luxuries est radicem albescentem; nudarum, geniculatarum, sapore subdulci, quibus in immensum se propagat: folia longa, hirsuta, mollia, vaginæ longissima culmum nodosum, tenuem, cubitalem, obvoluunt, panicula mollis, contractior, palmum circiter longa, ex viridi purpurascens.

Hoc *gramen* abundat in viribus Montbelgar-di: florens Iunio, & Iulio.

GRAMEN CANARIVM, LONGIVS, RADICATVM LATIORE panicula.

Descriptio



Huius *canini* *graminis* haud à vulgato *gramine* medicato dispar natura, quod eruitur ex amœnissimis glareosis sabulosisque ambulacris, vicinisque locis iuxta novum Medicum hortum Nobiliss. Baronis Edwardis Zouchæ: habitatoribus corruptioribusque dulcioribus radicibus, latioribus

sparsisque acerosis paniculis, cetera haud absimilia.

C. Bauh. pin. *Gramen caninum* 3. siue longius radicatum minus: *gramen canarium longius radicatum latiore panicula minus*. Lobel. Adu. parte altera.

GRAMEN CANARIVM LATIORE PANICVLA MINVS.

Latior item panicula glareosis, obsoleto & Linculto, agro hoc *Canarium* *gramen* minus quandoque occurrit, reptantibus, cirtaribus, geniculatis, prætenuibus radicibus, *graminis* *Canarij* vulgaris gustu non dissimilibus & efficacitate paribus: coloris ex fusco albidis: foliis vero sesquiuincialibus, iuxta radicem pluribus, parvis & angustis, in spithamis autem tenuibus cauliculis iuxta genicula tribus, raro pluribus.

C. Bauh. pin. *gramen caninum* 2. siue longius radicatum minus: *gramen Canarium longius radicatum latiore panicula minus*, Lob. Aduers. parte altera.

Descriptio

Synonyma

GRAMEN REPENS OFFICINARVM FORTI TRITICEÆ SPICÆ ALIQUATENUS SIMILE.

CAP. LIV.

Procerum est *gramen*, interdum tribus cubitis altius, foliis è longa vagina, glabris, interius tactu asperis. Spica summo culmo innidet duorum verticum, cum Triticea nonnihil commune habens, sed omnibus modis strigosior cum aristis brevibus subrubens, semine oblongo, fusco. Radices pro *graminum* ratione crassiusculæ, longè reptantes, sapore dulci, prædictæ sunt. Hoc *gramen* repens *Officinarium* non admodum malè representare videtur Eicon quæ post cap. 58. traderetur, sub titulo *Graminis repentis* cum panicula *Graminis Mannæ*.

Descriptio

Lobel. in Adu. dicitur *Gramen canarium Medicatum officinarum*, Germanis, *Gras*, Angl. *Quych gras*, Ital. *gramigna*, Gallic. *dent de chien*. In Obs. p. 11. *gramen caninum medicatum*: In Ic. p. 20. *gramen canarium*.

Synonyma

In descript. Aduers. nihil video quod repugnet nostrò *gramini*, nec etiam in figura: nisi quod spica non in totum respondet: nescio an negligentia pictoris, vel quòd planta sit diuersa, radix optime conuenit: illud tamen non placet quod scribunt Aduers. figuram esse apud Dodonæum, pag. 345. & Matthiolum pag. 999. Figura Lobelij similis esset Dodonæi figuræ, si iubam haberet & non spicam: descriptio etiam in eo differt quod Dodon. dicit suum *gramen* non spicam, sed iubam ferre. Lobelius autem in Aduers. ait spicam ferre: magna præterea differentia inter *gramen* Matthioli & Dodonæi ac Lobelij. Matthioli figura nec radice, nec spica similis: quinimò fallam existimò radicem, si vera fuisset, non mutasset in postremis commentariis.

Lab. refutator.

Nos subiungimus nostrò *Gramini* officinatū Dodonæi *gramen*, imitati Lobelium & fratrem C. Bauhinum: quāuis nostrā non habeat iubam sed spicam ut Lobelij, contra sententiam Dodonæi ut iam dictum. Lectorum igitur erit considerare

Gramen Dodonæi huc refertur.

HISTORIAE PLANTARVM.

an nostrum Gramen, Lobelii & Dodonæi idem sit, nec ne.

An Lolium
secundum
Trago.

An Tragus lib. 2. cap. 35. hoc gramen intelligit, eum ait: Inter omnes fruges in humidioribus agris, nec non cum annus fuerit pluuosus, Lolium infelix dominatur, quod sane nil aliud est, quam singulare vitium, & quasi abortus omnium frumentorum. Cum namque in satione, & quando in spicam sese attollit, pluuis continuis obruitur, fieri non potest quin vel semen protius suffocetur & putrilagine corrumpatur, aut in Lolium ac vitium quoddam degeneret. Est verò huiusmodi vitii vel Lolii fructus nihil aliud, quam palea inanis. Quodque iam dixi animaduerti potest in humidioribus hordeo confitis agris, in quibus frequenter Hordeum vel in Lolium transeat vel certe deorsum fertur tota seminis vis, id quod hinc accidere consuevit, quia Hordei caput alterum, & crassius quidem in radicem exis, alterum verò in culmum. Iam cum pluuosa fuerit anni constitutio, inferior grani pars nimio humore obtrita facilliter luxuriat; attracta ad se omni totius grani vis, ita, ut illa in radicem duntaxat se exerat, vicissim verò in totum spoliatur superior. Atque hoc pacto radix se longè lateque per terram diffundit, & non solum ex semine nullus fructus expectari potest, sed & agri ipsi peste ea adeo corrumpuntur, vitianturque, ut nisi industrius agricola subinde eiusmodi corruptelas agrorum sustulerit, culturaque diligenti emendauerit, hinc inde se se spargat, ac vndique culmis suis in altum emergat. Ac licet & culmum & spicam ostenter, nihil tamen fructus subsequitur, manetque nil nisi vacua, & inanis palea, quod sane haud immerito male habet agricolas, quare iure Virgilianus ille Mopsus hisce verbis conqueritur.

*Ipsa Palea agros, acque ipse reliquit Apello.
Grandia sepe quibus mandauimus herdea fletus.
Infelix Lolium, & steriles dominantur Aenea.*

Trago
notum

Haftenus Tragus. Lectores autem considerent annon Lolium 2. siue Quacken dictum, Agricolis molestum, non sit idem cum nostro gramine, & an Tragus in sua descriptione non confundat duas plantas: an verissimè perenne illud gramen odiosum agricolis possit generari ex annuis illis stirpibus, Tritico & Hordeo, plantis etiam valde differentibus suis spicis.

Matthioli
figura falsa.

Figura Graminis Matthioli in priorib. comm. quod primum Dioscoridis ait, & passim in Italia frequens, mihi videtur falsa, quod radicem attinet, quæ valde crassa pingitur: si tamen esset vera, non videretur eius gramen respondere descriptioni Diosc. qui ait *καρπία ἔχει, καὶ τὸν ἴσον αὐτῆς ἔχει τὸν κλάδον περιεμεινῆς*, quæ verba cum forte non obseruasset primum Matthiolus vel eius scriba: pictum gramen aliquod cum radice crassa: pœnituit tamen postea Matthiolus & mutauit radicem, & repentem appinxit, quod satis demonstrat priorem falsam, nisi etiam secunda sit falsa: miror igitur apud Matthiolus in postrema eius editione per Bassæum, sculptam de nouo figuram, per ipsum Matthiolus reiectam, & ut magis falsa redderetur, additam veluti iubam, quam quidam suspicantur esse Graminis xerampelini, uel, ut eos vocamus, Gramen cum spica molli rubente: præstitisset eius emendatam, vel corruptam postremam, curare sculptenam, aut, quod magis placuisset, cum annotatio

ne figuram Bassæi iam sculptam apponere. Camerarius ad Hist. Matthioli Germanicam omnino, diuersam posuit figuram Graminis, quod non videtur posse conuenire cum icona Graminis Matthioli, nec priore, nec secunda: de cæteris nescio: Matthioli postrema Graminis figura, quod radicem attinet, nostro gramine respondet, an idem intellexit ignoro.

Tabern. ic. & hist. Gramen caninum seu canarium 1. *Bundts gras*. Eidem histor. Gramen 5. Canaria Plinii, Herba cynagrostidis, Dens canis, & Gramen medicatum, quia multis locis utiliter in usu à Medicis pro Gramine usurpatur. Tabern. habet figuram Lobelii: si ei notam, cur hoc 5. non iungit primo, & secundum facit, ac discrimen certum ponit, quo possit distingui à primo.

C. Bauh. phyt. Gramen 1. siue *Officinarium*, *Canarium* Lobel. Gramen Dodonæo: Eid. pin. Gramen caninum. 1. siue *arvense*, siue Gramen Diosc. Gramen Ruell. Dod. Cord. in Diosc. Cast. Gramen Dioscoridis, Geln. hort. Gramen canarium medicatum, Adu. Lob. Gramen caninum, Tab. Ger. Gramen vulgare, Lugd. Graminis fortè Diosc. species maior. Thal. Caninum autem vocat ad imitationem Plinii, cui Canaria, quasi à canibus inuenta, quæ fastidium deducunt, vomitum cum pituita reicientes: hinc Cynagrostis aliis: & à foliorum primò prodeuntium forma, quibusdam Dens canis dicitur.

Passim spontè prouenit: floret Iulio & Augusto, in aruis & satis, non pratis, ut plurimum, trigibusque haud parum incommodum: eoque semine facturi raris Septembri, etiamque primo vere manibus runcandum præcipiunt Coloni.

Lobelio tota planta magis vesca creditur, dulcis & frumentacea vibusque Medicis receptissima, præsertim radix, quæ refert viscerum, farctus & renum, citra calefactionem, lumbricosque huius stillatitia interimit, nempe pabulo humorum putridorum frau datos.

GRAMEN CANINVM VINEALE Casp. Bauhini.

CAP. LV.

Radice est alba, tenui, repente, geniculis distincta, ex quibus fibra capillares in terram defiguntur: culmos habet tenues læues, geniculatos, in terram reclinatos: ex quorum geniculis singulis, folium, duas, tresue vncias plerumque longum, angustum, atroviens prodeit: culmorum summo panicula brevis, parumque expansa, ex paruis glumis composita, insidet. Apud nos in vinearum vis, solo aliquantulum duriore, circa æstatis initium reperitur, Gramen hoc caninum 2. in pin. siue vineale, primum in prod. descriptum.

GRAMEN CAMERARII repens.

Radice adipiscitur longam tuberosam, sed æqualem, articulis præcinctam & hinc inde reflexis, non tamen profundius radicatam, filamentis constātem pluribus. Suum protrudit hæc abynoque articulo culmum continuū se inno-

Matth. ap. casp.

Spanius

Locus & Tempus.

Vitis

Descriptio



& multiplicans. Folia longa, acuminata, dura, arundinis instar parua lata. Culmus duarum ferè spithamarum altus, admodum angustus, & tenuis more staminis, tribus, quatuorve nonnunquam articulis præditus, spicam superiori parte profert patulam, quæ paruum continet semen. Folia cum radicibus saporem habent

dulcem, cum adstrictione quadam & acredine.

Camer. ad Matth. Germ. & epit. ponit uiguram nomine graminis & Kechsgras.

Tabern. Hist. pag. 636. gramen primum Offic. seu gras aut Kechgras. pag. 644. gramen Diosc. germ. Rinde gras. Quæ antiquum est germanicum vocabulum adhuc in usu Saxonibus & Septentrionalibus Germanis, significans, Rinde, id est, Bouem. Potuisset Tabern. diligentius describere graminis suum, quandoquidem Dioscoridis primum facis, & iconem non dat. An sit idem cum eo, quod pingit Camerarius, considerandum.

GRAMEN PARVVM REPENS PURPV- REA SPICA.

CAP. LVI.

Descriptio Gramen canarium in cultis quærenti, occurrit passim copiose gramen istud, supinum, sparsis per terram culmis, radice sub terra huc illic vagante, vulgaris graminis canini in modum: spica purpurea splendent, diuulsa: folia graminis præteritis parui. Radices fibrosæ. nuncupatum hoc omnibus est gramen Lobel.

Lobel. in lc. plant. & Belg. hist. pag. 21. Gramen caninum supinum, Belg. Ligghende peyen-gras. Tab. 1c. gramen caninum supinum 2. Ligghende hande gras. Eid. hist. gramen 6.

C. Bauh. in Phyt. gramen 2. siue Caninum supinum, graminis primi Diosc. species minima, Thalyo. Quod verò Thalyus hanc ipsam non intelligat, declarat C. Bauh. in pin vocans, gramen caninum 7 siue supinum minus.

GRAMINIS PRIMI DIOSCORIDIS species minima Thali.

CAP. LVII.

Descriptio Sæpe nunquam attollit, sed geniculatis ramulis iuxta Dioscoridem serpit, ac ex internodiis suis, & ex ipso etiam cacumine creberrimè nouas radículas iuxta Plinium spargit, ac ex his nouarum plantularum exortus exhibet. Hæc passim in Flarcynia, & etiam Stollbergæ in pratis vliginosis ex musco terrestri, qui candidus vireplu-

Tom. 18

rimum est, nonnunquam etiam rubeus, non infrequenter prodit, radicibus tenuioribus, cirrosis, coliculos emittens recuruos, humi prostratos, tenues valde, teretes, geniculis frequentibus interceptos, ad quæ primum folia prodeunt palmatis longitudinis, stricta, deinde etiam inter hæc folia & ipsorum geniculos singulos densè prorumpit plurimorum, paruorum, oblongiusculorum ac strictissimorum foliorum cæspes, ad quorum inferius tuber, quo ex geniculis prorumpunt ipsa, noui cirri emergunt, qui denuò in musco comprehendentes, nouarum plantularum origines existunt.

C. Bauh. pin. gramen caninum 5. siue supinum paniculatum folio varians: graminis 1. Dioscor. species Thali.

Synon.

GRAMEN CANINVM SVPINVM PANI- culatum dulce C. Bauh.

Descriptio EX radice oblonga, capillata & nigra: folia paucis, lauia, viridia angusta, vnciarum trium vel quatuor longa, prodeunt: inter quæ calamus tenuis, internodiis distinctus, foliis paucis oblongis cinctus, parte inferiore supinus, mox palmatis longus, erigitur, & paniculam tenuem, albam, glumis exiguis donatam, sustinet: agris Londinensibus vdis gaudet, vnde D. Lobelius, graminis dulcis nomine misit. gramen hoc caninum 6. in pin. siue supinum paniculatum dulce.

Synon.

GRAMEN REPENS CVM PANICVLA Graminis Mannæ.

CAP. LVIII.

Descriptio Dum generum folia & culmos profert. Primum enim lentis, longisque ad cubitum vnum aut alterum coliculis solidis, crebro geniculatis: lauibis, caducis nascitur, qui ubi terram attigerint, statim per fibras & nodis dimissas, comprehendit, radicansque: atque ex istis geniculis folia mutuo amplexu stipata surgunt, brevia, angusta, hirsuta: deinceps aduultus culmos producit erectiores veluti superiorum ramos, pedales, tenuiores, foliis amictos longioribus, hirsutis, & rarioribus geniculis interceptos, quorum summitas, in spicas finditur, quatuor, quinque, sex, spicis graminis Mannæ similes, sed minores, concinniores, imbricatæ, non tamen circumcirca, perinde ut iam dicto gramine, cui pars spicæ interior nuda, hoc discrimine interim, quod ea pars graminis Mannæ sulcata sit, in hoc verò in costam elata, flosculos fert atrorubentes. Radice nititur geniculata, reptante, subdulci, alba.



les, sed minores, concinniores, imbricatæ, non tamen circumcirca, perinde ut iam dicto gramine, cui pars spicæ interior nuda, hoc discrimine interim, quod ea pars graminis Mannæ sulcata sit, in hoc verò in costam elata, flosculos fert atrorubentes. Radice nititur geniculata, reptante, subdulci, alba.

Q8

Ischemon
Plin.

Gram. aculeatum
Plin.

Gram. le-
gumini

Def. Cl.

Synop.

Locus.

Descriptio

Sunt qui Ischemon Plinio lib. 25. cap. 8. nuncupatum esse putent: quorum sententiam probare non possum, inquit Clusius in Hist. Quod si vero ad Pliniani Graminis vllum aliud genus referenda est hæc planta, aculeatum illud potius erit, cui, quod in acumine aculei sunt plurimum quini, Dactyli nomen inditum esse ait lib. 24. cap. ultimo. Nemo autem legitimi Graminis (ita vocat in Hist. post.) iconem exhibu, quod in magna Europa parte, præsertim per Hispanias & Gallias crescit, cuius antequam stirpium in Hispaniis obseruatarum historiam euulgarem ob illius tum elegantiam, tum vsum, cognitu dignum erat, illius descriptionem & iconem do. Pedalibus assurgit culmis, rotundis, purpurascens, genicularis: è quibus angusta promit folia, in acumen fastigiata, dura: ipsi culmi, siue calami, in quaternas aut quinas desinunt paniculas, mixti ex atro purpureoque coloris: radicibus firmatur longis, nodosis, geniculis interceptis, candidatibus, subdulcis cum quadam adstrictione saporis, quæ longè lateque serpentes, subinde plurimis locis germinant, nouosque culmos & folia proferunt.

Lobel. Obs. p. 12. Icon. Plant. p. 23. figuram Clusii habet, ac Gramen alterum inscribit. Anguill. epist. 12. & 14. Gramen tota Italia nomen. H. Lugd. Gramen vulgare Dalechampi. C. Bauh. phyt. Gramen 33. siue Gramen Dactylon secundum folio arundinaceo. Idem in pin. Gramen Dactyloides siue Ischemum. 2. siue Gramen Dactylon folio arundinaceo maius: aculeatum forte Plinii: Gramen Ang. Clus. & Cels. & dicitur. Hoc variare scribit, & Gallicum foliis nonnihil villosis; Germanicum vero foliis esse glabris, & cauliculis minus erectis tradit.

Hoc gramine nihil vulgariùs tota Hispania & Gallia in aruis, vinetis, atque etiam in maritimis, in quibus multò latius & vberius crescit: nam eius radices, interdum digiti crassitudinem æquantes erucere meminit Clusius.

In Horto E. C. cultum per plures annos mansit, tandem frigidioris soli impatiens perit.

GRAMEN CRVCIS SIVE Neiemelm salib.

C A P. LIX.




similes, perfectam crucem figurantes, quam æque

omnes vno modo formant: ex quo ipsum Aegyptii Neiemelm vocant, quasi dixerint, Gramen crucis: in quibus sunt semina minutissima, seminibus communis graminis similia.

Alpino descriptionis auctori dicitur Neiemelm-
salib Aegyptii, C. Bauh. phyt. Gramen 90. siue dacty-
lon Aegyptiacum: Eid. pin. Gramen dactyloides siue
Ischemum 1.

Maximum vsum semina apud omnes habent, ad eos scilicet, qui tum renum, tum vesicæ calculis laborant, atque ad frangendos lapides in vesica concretos. Quod genus morbi ibi est familiarissimum, & quasi endimium ex causis aliis narratis. Mulieres radices decoctum tum ad pueros variolis, atque morbillis correptos maxime sequuntur, tum ad se ipsas, ubi cupiunt interceptas menstruas purgationes rursum euocare. Sunt aliqui qui pro secreto auxilio habent decoctum, ex seminibus modicè contusis paratum, ad adiuvanda exanthemata in febribus pestilentibus quas periculas nostri appellant. Ad vñ quoque vulnerum & vicerum non paruum, apud eos, tota herba, præcipue radices habent vsum. Aiunt radicem frigidam atque siccam esse, & mullissimumque partium, quamobrem non desunt multi, qui ad mouendum sudorem eius decocto familiarissimè vtuntur.

GRAMEN SCOPARIVM. Ischemi Paniculis Gallicum.



Speciosius i-
stud, Ischemo
Gramini
cognatum, vi-
detur in Adu-
parte altera
Lobeli; & cu-
ius prælongis,
pratenuibus,
rigidisque cu-
bitalibus &
longioribus
radicum cirsis
cocinatur scop-
ula ille vul-
garissimæ ni-
tens comæ
conciliatrices,
frictionibus
capitis accom-
modatissimæ
& vltatissimæ.

Figura ei graminea, Ischemi vulgaris, gracilis culmus, rigidus, genicularis, cubitalis; in quaternas, quinas, vt plurimum senas, & plures elegantissimas lucidas spicatas caudicellas Ischemo Gramini similes, fastigiatus. Foliis item non dissimilibus, gustu Graminis, dulcioribus. Copiose prodeunt in Gallia, tabulosis vicinis Castris Insulani locis vocitati (vulgò Chasseau de l'Isle) prope Aureliam, collegit amicissimus vir Gebrgius le Sergeant, Pharmaceutices, & Rei herbarie callentissimus, quo gramine me donauit Londini, Anno 1662. quique quotannis Angliam nouis & rarissimis ditat Plantis.

C. Bauh. pin. Gramen dactyloides siue Ischemum
siue Gramen dactylum scoparium: Gr.
scop. Ischemi paniculis Gallicum.
Lobel. Adu. parte 2.

GRA-

GRAMEN SVPINVM ACVLEATVM

CAP. LX.

Descriptio



Breuis fribus radicatur: ramos verò terræ apprimat in orbem, multos, palmates & sesquipalmates, aliquando pedales, aliquos verò duntaxat vnciales, rigidulos: ad quorum genicula, vtriculi instar, folium striatum glumas numerosas conglomeratas, squamarum foliacearum complexu comprehensas claudis,

deinceps in mucronem rigidum & acutum, vncialem & breuiorem, recta in latus protensum definit, extremo verò cauli huius generis plura folia & vtriculi glumis grauidi, echinati aliquid ostentant.

Camer. ad Matth. hist. Gerin. & Epit. *gramen aculeatum*, Italis *gramigna spinosa*. Graecis *χρυσόχορδος*. H. Lugd. *gramen aculeatum* Matthioli.

Locus

Gener. Cherlerus attulit collectum ad vias Romanas, asperiores praefertim, siccioresque: Matthiol. verò in Epitome ait prouenire inter rudera, & in muris vetustate collapsis.

Vicia

Viresque easdem habere, quibus pollet primum graminis genus.

GRAMEN PRATENSE VVLGARE
spica ferè arundinacea.

CAP. LXI.

Descriptio



Capillari - totum occupat cespitem, glabris, viridibus, tenellis foliis amictas emittens stipulas, quarum summa comantes late diffusa paniculae mollicellae insigniunt, pilorum, aristarumque expertes, accedentes tamen. quodammodo ad arundinem. In hoc gramine insignis varietas ratione loci,

& potissimum in magnitudine spicarum.

De hoc Lobel. in Adu. Est quam quod notissimum *gramen pratense* dictum, vulgè notum, &

Tom. II.

Fenum quando aruit vocatum, exilioribus radicibus cirris seu pullis capillamentis & creberrimis cespitem summum tugens, humumque perreptans & tegens, densissimum & numerofo foliorum triiceorum stipatu: culmos pedem & cubitum altos surrigens, tenues, geniculatos, laues, lanosa, sparsa, & magis harundinem vallatoriam imitante, spica fastigiatum.

C. Bauh. phyt. *gramen* 7. siue *vulgare*: Eid. pin. *gramen pratense paniculatum* 2. siue maius, latiore folio: r. Theophrasti, *gramen vulgè agnitum*, Trag. icon. *graminis* genus Dalech. in Diosc. *gramen pratense maius vulgare*, Adu. *gramen pratense* *agritum* Lob. in Obi. pag. 9. & Hist. Lugd. *gramen pratense primum* Dod. *gramen* Lon. commune, Thal. *gramen alterum & vulgare*, Tabern. *gramen pratense*, Lob. in Ic. Ger. An per Chulem Garzias hoc *gramen* intellexerit? Clusius not. ad Garz.

Huius semine in horreis & spicis excusso & collecto vtuntur complures Medici ad obstructions viscerum, calculum, poru: admodumque ad discussionem pertinacium tumorum, & flatuum, tamen si Osticinis vti ignoto. Ast hoc non sine periculo, quia non facile separari potest, ab aliarum herbarum seminibus.

Vicia

GRAMEN PRATENSE PANICVLATVM
maius angustiore folio, C. Bauhini.

CAP. LXII.

Descriptio

Ex radice capillacea, rufescente, folia capillaria, quaedam breuia, quaedam palmum superantia, prodeunt: inter quæ culmi tenues, geniculati, cubitum superantes, vno alterove folio breui cincti, in quorum summo panicula leuiter expansa, vncias quatuor longa, quæ ratione loci, strigosior vel latior.

Gramen hoc *pratense paniculatum* 3. siue maius angustiore folio C. Bauhini pin. 10. in prod.

In pratis & dumetis ad ripam VVielæ fluminis Basileæ reperitur.

Huic simile ad ripam prædictam inuenitur potissimum radicem capillariam, v. ex caulium numero, paniculis, & in iis glumis longioribus varians.

Locus

varia panicula ex longioribus

GRAMEN AGRORVM LOB.

CAP. LXIII.

Descriptio



Aventi spicam diximus, quod spicam habeat laram, comosam, paniculam, & a ventis communiter in alterum agitatam latus. Foliis alioquin & radice magnitudine ferè æquale est tegetum graminis. Iuba ceterum Milicci graminis Iubæ haud absterilis est. Ita Lobelius. Quibus addit Tab. Ba.

Qq 1

dicem habet patnam, villosam: folia longa, angusta, nec acuminata: culmum, quam cetera harundinacea, magis tenuem.

Synonyma Lobel. in hist. Belg. p. 5. & Plant. It. p. 3. *Agrorum venti spica*, & *Gramen agrorum*, latiore, arundinacea, comola panicula T. p. 5.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 10. siue *segerum*, panicula arundinacea: Eid. pin. *Gramen paniculatum aruense* 4. siue *Gramen segerum*, panicula arundinacea. *Gramen fetaceum* & Tragi, Thal. *Gramen equinum*, forte Gesneri, Cam. *Agrorum venti spica*, Lobel. icon. *Gramen pratense* 2. Dod. *Gramen harundinaceum aruense*, Tab. *Gramen arundinaceum*, Ger. Variat panicula flauescens & spadicca. Don. *Gramen pratense* tertium duntaxat vocat nec describit: An idem cum aliis, an ipsi non cognitum? Sed non diuersum ab aliis esse constat ex iam adductis. Ipsi vero non visum patet; si namque vidisset, utique descripsisset, nec contentus solo nomine fuisset.

Locu.

Inter agrorum segetes reperiri Lob. notat & Tabernamontanus.

GRAMEN MILIACEVM LOB.

CAP. LXIV.

Agrorum venti spica simile est admodum, culmo & radice, sed panicula miliacea.

Synonyma

Tabern. icon. & hist. p. 639. *Gramen miliaceum*, hirsengrass. Item p. 642. *Gramen* 13. in aruis campistris sicis proueniens. Lob. in Ic. p. 1. & hist. Belg. p. 6. hirsgras / Saetgras, Miliaceum gramen: hic & Gerardo. Dodon. Lat. *Gramen pratense* 4. sine descriptione. Camer. *Gramen perenne miliaceum*, in siluis non procul ab vrbe nostra ad montem S. Mauritij. C. Bauh. Phyt. *Gramen* 21. siue panicula miliacea: Eid. pin. *Gramen miliaceum* 1. siue *Gramen siluaticum* panicula miliacea sparsa.

GRAMEN MONTANVM.

panicula miliacea sparsa, C. Bauh.

Descriptio.

EX radice fibrosa, rufescente, folia pauca, angusta, vncias quatuor vel quinque longa, vna cum culmo tenuissimo cubitali, vno alteroue folio vestito, exurgunt, in cuius summo panicula sparsa, ex locustis minutissimis composita: in monte Crenzacenfi prouenit: hoc Gramen miliaceum 2. siue Gramen montanum panicula miliacea sparsa, in pin: 50. in prod.

GRAMEN ARVNDINACEVM

panicula miliacea C. Bauhini.

Descriptio

EX radicibus fibrosis albis huic Gramini miliaceo 3. in pin. 51. in prod. siue arundinaceo panicula miliacea, vnus & alter culmus cubitalis exurgit, quem parte inferiore folia arundinacea vnciarum trium cingunt ad partem supernam duobus nodis distinctam, folia duo angustiora, longioraque vestiunt: in cuius summo panicula trium vnciarum, Milii paniculae similis: in agris Patavinis reperitur, & a Gramine miliaceo a Lobelio proposito, plane diuersum est.

GRAMEN CAPILLATVM.

Descriptio

Plures ex fibrosis radiculis tollit culmos cubitales, bicubitales & altiores, alias ex viridi in

luteum pallentes, alias rubentes, geniculis interceptos, foliis glabris, palmaribus, aut dodrantalibus donatos, culmum cacumen in iubam explicatur pedalem circiter, atque arundinaceam:



paniculae ex intervallis radiatum disponuntur, nunc flauescens, nunc viridiores, saepe rubentes, in tenuium pediculorum staminulis, theculis pusillis semine claudentes minutum, subulvum, acere molli capillari & obrutum fere eludente in extremo donatum.

Tabern. icon. **Synonyma**

& hist. p. 638. *Gramen segetale* siue aruense paniculatum, Akerstraus groß Kornstrausgras: Eid. p. 642. *Gramen* 9. Lob. Ic. p. 1. *Segetum Gramen panicula speciosa*: Eid. in hist. Belg. p. 5. Veldtgras oft forengras met schoone seer wygghespreyde arens worde: in Latin Segerum Gramen panicula speciosa, latiore: pulchrum est, panicula valde lata, nascitur in agris inter Hordeum & frumentum tam in Anglia, quam Belgio: radix fibrosa, ex qua culmus nascitur sesquicubitalis, non sine foliis Miliaceis, cui innascitur lata speciosa panicula, eo fere ordine quo scapus Plantaginis aquaticae.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 18. siue paniculatum segetum: Eid. pin. *Gramen paniculatum aruense* 3. siue *Gramen segetum altissimum* panicula sparsa: An Gramen caule geniculato Thalij?

Geneue & in Ducatu Wirtembergico ad fontem Admirabilem inter Auenam mense Augusto & Iulio florer. Montbelgardi etiam abundat in agris.

Locu. & tempus.

GRAMEN TENVIFOLIUM

magis sparsa panicula.

CAP. LXVI.

Observatum mihi Gramen culmis fere iisdem cum sequenti, ac geniculis aliquot, foliis tamen paulo latioribus ac panicula diuersa, quae magis sparsa, rubens: flosculi apicem modo, rubentes: radicibus terra firmiter haerentibus, in quibus capillares albae fibrae.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 34. siue foliolis iunceis primum. Eid. pin. *Gramen iuncifolium* siue foliolis iunceis oblongis, radice alba. H. Lugd. p. 425. *Gramen iunceum* Dalechampii.

Montbelgardi observauimus supra muros cum Iodem flore mense Iunio.

GRAMEN TENVIFOLIUM GLABRUM.

CAP. LXVIII.

Nymetofos effert culmos, satis tamen tenues, rubentibus geniculis aliquot distinctos, pa-

Descriptio

seculis singularibus Phœnicis seu Lolij rubri, sed crebrioribus, grandioribus, sparsis, inconditis, coloris herbacei: folia longa, tenuia, si vaginæ excipias, qua culmum inuoluunt, glabra, pedalia, & cubitalia, non rigida, fibræ capillares, nigricantes.

Casp. Bauh. pin. *GRAMEN IUNCUM* liliæ foliis iuncis breuius minus radice nigra. Hoc in prod. pro 14. sic describitur: ex radice capillata, nigra, folia iunceæ, rarius duas tresve uncias superantia, prodeunt: inter quæ culmus tenuissimus, pedalis, levis, cuius summo glumi minimi, quemadmodum in gramine exili duriore alter-natim dispositi sunt, ad monia verbis nostræ legimus.

GRAMEN TENVE DVRIUSCVLM

& pene iuncum.

CAP. LXVIII.

Descriptio



IN fine histor. nostræ balnei ad mirabilis descripsimus, quoddam gramen, quod vocauimus iuncum cinereum, in rupibus & muris hærens ita firmiter radicibus tenuibus capillaribus, nigricantibus, ut vix euellere possemus, coherentibus simul multis plantis, foliorum marcidorum vestigia demonstrant non annuam plantam: folia alioqui vegeta sunt, longitudinis quinque, vel sex unciarum, quædam etiam breuiora, conuolutionis ergo iunci instar teretia, nonnihil rigida, cinerei fere coloris, restantibus Octobris fine calamis, valde tenuibus dodrantalibus & pedalibus, cum vestigiis veluti parue spicæ: idem, ut verum fatear, mihi videtur graminis illud genus, quod Montbelgardi prouenit, aut valde simile, cui folia virentia, tenuia, compressa, viridia, glabra, culmi plurimi tenues, pedales vel cubitales lætes, in quibus vnum geniculum, præter illud quod ad radicem, & foliolum ex longa vaginula: suba vncialis, spicæ fere similis, virens vel nonnihil purpurascens, in qua quædam partes, ad phœnicem nonnihil accedunt, & in paruas aristas desinunt: in iis flosculi vel apices minimi albi: toti plantæ sapor subdulcis, in cæteris similis præcedenti, radice enim est nigra: & folia inferiora Autumno albescunt, cinereæve redduntur.

Lobel. in 1c. plant. pag. 7. & Hist. Lugd. p. 432. *gramen exile*: Lob. in Obs. pag. 9. *exile gramen durius*: Gerar. & Tab. icon. & Hist. *gramen minus duriusculum* flein hart gras: Eid. hist. *gramen* 19. C. Bauh. phyt. *gramen* 35. siue *foliolis iuncis* alterum: Eid. pin. *gramen iuncum* 3. siue *foliolis iuncis* breuius minus.

Primum nostrum gramen in monte Teckcia.


Tom. II.

no Ducatus Wirtembergici. copiosum erat mensis Octobris fine, destitutum pene omnibus spicis vel rubis: item in commillatis rupium & supra muros & rudera arcis. Alterum Montbelgardi florebat Iunio, obseruatum supra muros etiam, ac ni fallor, secus vias aridioribus locis. Lobelius ait suum gramen exile oriri sabuletis & squallido aridiorique agro Gallie, Anglie, Germanie, & Belgii.

GRAMEN EXILE DVRIUS NORTVE-

gicum aut Danicum, Scopario Gramini cognatum.

CAP. LXIX.



SAxorum Locus: Descriptio

Sinterueniis leui terræ sterilibus Petreæ Nortuegiæ, imisque marcidis, rimosis caudicibus sylvarum Daniæ hoc gramen (Lobel. in Aduers. altera parte) viget, densissimo sparsoque rigidorum iuncorum, sesquialterius altitudinis tenuissimorum foliorum stipatum: sesqui-

palmaribus, numerosis, cirratis, geniculatis stamineis calamulis, quorum summa folia lariuscula, vaginulæ instar, spicatas, vnciales, paniculas claudunt aut amplectuntur. Iubata concinnatæq; dodrantalis radix, Buxei pallida coloris, totique planta prolixior, uti graminis Scoparii, cuius cognata videtur.

C. Bauh. pin. *gramen iuncum* 5. siue *foliolis iuncis* radice iubata: *gramen exile durius* Nortvegicum aut Danicum Lobelij, Adu. parte altera.

GRAMEN NEMORALE AVENACEVM

alterum, ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum.

IN siluigeris Daniæ collibus & montibus (ex relatione Lob. Adu. part. 2. pag. 465.) perelegans, exilique gramen oriundum foliolis creberrimis, rigidis, cirratisque, vncialis & binarum vnciarum altitudinis radicibus. Pedales & sesquipedales, exiles, lucidi, & nitidi, aspectu iucundi culmi, ex fusco xerampelini, in quibus è longiusculis paniculis Auenacæ semina.

C. Bauh. pin. *gramen auenacum* 4. siue *capilla-* *ceum minoribus glumis*: *gramen Anglo-Britannicum auenacum*, Danico nemorale simile: Hoc nomine à D. Lobelio accepimus. *Gramen nemorale auenacum* alterum ex fusco xerampelini & lucidum Danicum, Eid. adu. part. 2. cuius etiam varietatem notat.

Qq 3

GRAMEN AVENACEVM

lanuginosum glumis rarioribus

C. Bauhini.

CAP. LXX.

Descript.

Gramen hoc avenaceum 6. Casp. Bauhini in pin. 72. in prod. ex radice fibrosa, folia iuncea oblonga, & culmi plures, iuncea, cubitum superantes, paucis foliis donati, exurgunt: in quorum summo glumi rariore, albi, lanuginosi, utriculum continentes, quibus semen nigrum, splendens, inclusum est: locis asperis circa Monspe-
lium provenit: diversum est à Gramine Clusi.

GRAMEN GLUMOSVM

Dalechampi.

CAP. LXXI.

Descript.

Gramen glumosum Dalechampi Lugdun. p. 429. siue Gramen avenaceum 7. siue lanuginosum C. Bauh. pin. radice foliisque multis graminum generibus non est dissimile: sed hac peculiari nota discrepat, quod spicas densissimis glutatum grandium ordinibus stipatas edat, quam ob causam glumosum nominatum est.

Locus

In agris latis nascitur.

GRAMEN RVBRVM MONSPEL.

Descriptio

Qantum quantum est, rubet, spicae, folia: atque haec quidem pilis minimis aciem oculi ferè fugientibus oblita sunt. Singuli calami multas gerunt spicas parvas oblongas, aristis longis, rubris, ut in Gramine Hordeaceo. A me Monspelii observatum fuit.

Locus.

GRAMEN ALIVD MONSPELIENSE.

Descriptio

Aliud Monspelii memini Gramen observari, quatuor aut quinque spicis in vno calamo donatum, sed crassum cum parvis aristis: folia pilosa sunt valde.

GRAMEN ALIVD GLABRVM
MONSPEL.

Descriptio

Spicas gerit multas in eodem calamo, admodum exiguas, molles, nec aristis villis obuallatas, dilutior rubore, quam Gramen rubrum Monspefulanum, à quo differt quoque, quod folia non sunt pilosa.

GRAMEN MINIMVM
Monspelienfe.

CAP. LXXII.

Descriptio

Dux radicum fibræ, culmi paucis geniculis distincti, palmares & sesquipalmares, foliis stipati prætenuis culmo altioribus: panicula in metam fastigiantur, singulares vnciam ferè æquantes, squammeis pusillis glumis contextæ.

Quod descripsi Gramen pro minimo provenit locis saxosis Monspelii: Gener. Charlerus ar-

tulis domine Graminis exilis ductionis, observatum prope Butlonetum iuxta Monspe-
lium, ut & alibi siccis & squalidis locis.

GRAMEN PANICVLA

multiplici, C. Bauhini.

CAP. LXXIII.

Gramen prætense paniculatum 7. siue Gramen panicula multiplici, ut autor in pin. vocat, siue Gramen 11. in prod. ex radice multis cirris villosis albicantibus composita, culmi plurimi, palmares, læves, geniculati & recurvi, foliis gramineis, oblongis, angustis, vestiti exurgunt, quibus panicula triuncialis angusta variè diuisa, per maturitatem rigida & spadicea, insidet. Monspefuli provenit; maius & minus reperitur, & Gramen minus duriusculum vocatur.

GRAMEN CVM PANICVLA
molli rubente.

CAP. LXXIV.



Constituta capillaribus radiculis sub cespite foliorum ima prodeunt, tuniceis involucris compacta, inter quæ bulbuli oblongi capitulum efformant, quæ à radicibus statim multa pronascuntur, quadrantalibus & trientalibus, perangustis, mollibus, glabris, in culmis pauciora.

minora, in singulis tamen geniculis singula. Culmus pedalis, minor interdum, subinde major, tenuis, paniculam gerit vnciam & sesquunciam, diuisam, ex viridi purpurascens, glumis crebris, exilibus, in breues, interdum tortiles, aristas, molles & quasi sericeas desinentibus.

Lobel. Aduers. Gramen minimum in sabuletis squallidis & vineis glareosis Norbonæ sepius visitur, omnium minimum: perpusillâ radice, capillacea, alba, calamulis etiam capillamentis similibus, eleganti purpura lucentibus, Gramini lischamo vocato non diuersis, sed spica mollicella, sericea, speciosa. Icon plant. p. 2. Gramen minimum xerampelinum. Norbonense etiamque Belgicum. Si Lobelius, quod suspicor, eandem plantam nobiscum intelligit, figura non placet, mihi videtur Dalechampi apud H. Lugdunensem p. 427. sub Graminis bulbosi Dalechampi titulo proposita.

C. Bauh. phyt. Gramen 14. siue paniculatum ævense, Aduers. minimum: Variat paniculâ quoad colorem, modò namque virescit, modò rubet: Quare Ta-

se Tabern. ic. pag. 206. & 207. duas proponit locos albi & rubri nomine. Sed non videtur nobis Gramen paniculatum Tabern. respondere figura aut descriptione minimo Lobelij, potius albus. Idem C. Bauh. in pin. gramen Matthioli esse tenet, de quo cap. de gramine officinarum scribit. Gramen, inquit, paniculatum arvense i. huc gramen arvense panicula crispata, est gramen Matthioli, & H. Lugd. p. 421. gramen minimum xerampelinum Lob. & H. Lugd. p. 421. & gramen bulbosum Dalechampi, eisdem H. Lugd. p. 427. Casp. Bauhinus hic separat Gramen paniculatum Tabern.

Locus & tempus.

Gramen panicula spica molli rubense observamus Monspeij in pratis: Genecuz supra muros: Basilez citra telonium ad margines agrorum: Montbelgardi mense Junio cum bulbulis supra muros.

GRAMEN PANNICVLATVM MINVS
album & rubrum.
CAP. LXXV.

Descriptio



Gramini paniculato, minori, albo, radix est exilis villosa, ex multis tenuibus fibris perplexata, admodum angusta, parva, acuta, laevia: cuncti paniculae, doctantem medium non excedentes, licet in pingui solo radicem egerit. Paniculae extensae, albae, nonnulli splendentes.

Rubrum qui-

dem iam dicto radicem, folia, culmum & paniculam quod atinet per omnia simile ferè, nisi quod in hoc culmi & paniculae rubescunt.

Synonyma

Tabern. ic. & hist. p. 639. & 40. gramen paniculatum minus album & rubrum, flein weis vnder Sträußgras. gramen 16. & 17. Qualia sint

haec gramina, nondum nobis perspectum.

Frater C. Bauh. in phyt. putat idem cum minimo Lobelij: verum nobis non videntur nec eius icones nec descriptiones (quae nos exhibemus) respondere, potius albi. C. Bauh. in pin. mutat sententiam vocatque gramen pratense paniculatum & huc minus gramen paniculatum minus Tabern. gra-



C. Bauh.

men minimum album & rubrum Gerardi: variareque perhibet panicula & culmis purpureis & albis.

Provenit passim (album ut legimus apud Tabern. in hortis & vineis: Rubrum autem raro conspicitur, quod haud omni terrarum loco cre- scit. Observavimus nos (inquit Tabern.) primum in Burgundia non procul à Bitantio in vineis, & apud montem Argae, sicut etiam in superiori Alsatia inter Rönigsberg & civitatem imperialem Obernchen in solo arido cum aliis graminibus: Alit alias nullibi in Germania offendimus.

Locus

GRAMEN MINIMUM

CAP. LXXVI.

Capillorum instar tenues radice caespitem

inordicus obsident: cuncti numerosi, plus minus viciales, c- nodes, molles, tenuissimi in spicam delinunt alternis glumis graminis pra- tentis obliam: folia stipulas à radice aliquot- que comitan- tur, tenella, per- pusilla.



Gener Cherle- rus attulit ex Gallia Narbo- nensi, & specia- tim se collegisse au propè fon- tem illum ma- gnum Templi Dianz propè Nemausium;

Locus

nec alibi uspiam observasse.

GRAMEN MINIMUM DALECHAMPII.

CAP. LXXVII.

Descriptio

Est veluti Egleba am- pliuscula, ro- tunda, radiculis plurimis brevi- bus, candidis: fo- lio digito non longioribus, te- retibus, spica valde gracili, parva: flosculis rubris, Februa- rio statim ad primam aëris temperiem ex- orientibus, sa- pore initio dul- ci, deinde ama- ro. Nasceitur in arvis.



Hist. Lugd. p.

424. gramen mi-

num Dalech. C. Bauh. phyt. gramen 16. & gra- men minimum instar glebae ampliuscula. Eid. pin. gra-

Qq 4

Gramen tremulum 6. siue minimum paniculis elegantissimis.

GRAMEN ANTHOXANTHON.
Spicatum.

CAP. LXXVIII.

Descriptio



Foliis & radiculis capillatibus proximè ad Gramen pratense accedit: verùm folia glabra; Culmi dodrantes: aliquando cubito altiores, tenues, frequentiusculè geniculati, spicam gerunt singuli vnicam vnius duarumve vnciarum, ex viridi flavescentem, in metæ figuram, cuius glumæ singulares,

molles, oblongæ, compressæ, acuminatæ, muticæ, interdum totæ flauent, interdum bicolores, flauæ & viridantes, per cōfinia decurrente ceu nervulo

Synonyma H. Lugdun. p. 426. *Gramen Anthoxanthon Dalechampi*. C. Bauh. pin. *Gramen spicatum pratense* 3. siue spica flavescente.

Locus. Obseruati Genevæ & in valle Griesbachiana ad fontes acidos florens Maio, itemque circa S Hippolitum Burgundiæ.

GRAMEN VERSICOLOR.

CAP. LXXIX.

Descriptio



Reptantibus graminibus accedendum, radices duras geniculatas longè latèq; spargit, fibris profundè demissis, satis crassis, vix euelli potest è rupum rimis; culmi foliis crebris vestiti, dodrantes, spicam singuli gestant graminis anthoxanthi paulò breuiorem, modò purpuream, quæ colore ad obiectum lucis variante placet, paruum semen longiutculum ad semen graminis Mannæ accedens, rufescens externè, internè albescens, in-

lore ad obiectum lucis variante placet, paruum semen longiutculum ad semen graminis Mannæ accedens, rufescens externè, internè albescens, in-

uolutum paruis glumis.

C. Bauh. pin. *Gramen auenacum* 8. siue glumis *Synonyma* variis: 73. in prod. sic descriptum: ex radice crassa, membrana alba rugosa intacta, caules bini, terniue, pedales, fragiles, laues exurgunt, quorum summo spicæ similis panicula vntialis, ex glumis variis coloris insidet: folia plura ad radicem angusta, palmaria, saturatè virentia: locis montosis circa Montbelgardum prouenit, vnde à Fratrep. m. accepimus.

Genevæ obseruati in colle la Bassie, circa S. Hippolitum Burgundiæ, semine maturo Maii principio, transtuli Montbelgardum in hortum, solet inter rupes prouenire loco soli exposito.

GRAMEN PANICVLA AVREA.

Tenuem surrigit dodrante maiorem culmum, per cuius fastigium conscendunt quinque aut sex auricolores paniculae splendidae, semunciales, graciles, teretes, acerolis glumis contextæ: folia perangusta, vix culmo cedunt longitudine.

H. Lugd. p. 430. *Gramen aureum Dalechampi*. C. Bauh. phyt. *Gramen* 20. & *Gramen panicula pendula aurea*. Eid. pin. *Gramen paniculatum aruense* 2. siue panicula pendula aurea.

Habui Argentina à D. Vldarico Chelio, medico: hoc, vt testatur H. Lugd. in siccioribus & squalidis locis prouenit.

GRAMEN LANATVM

Dalechampi.

CAP. LXXX.



Torvm mollicellum est, tomentoque obsita non rârùm folia longiuscula, sed & calami, eorumque geniculæ paniculæ mediocriter dimissæ, spicam inueniuntur, seiscuncialè, sæpe palmarem & longiorè, colore iam purpureascente, iam cinereo, aliàs coloris ex his mixti, vix villis donatæ pilis, molles ta-

men non minus ac folia, glumis laxioribus, breuius, aristarum expertibus, plurimùm striâ vnicâ obscuriore donatis, horum apiculis luteis.

H. Lugd. p. 425. *Gramen lanatum Dalech.* sic dictum quod manibus contectantium blandiatur: C. Bauh. Phyt. *Gramen* 17. siue paniculatum molle: Eid. pin. *Gramen pratense paniculatum* 1. siue molle: *Gramen paniculatum molle* Lob. Adu. parte 2.

Genevæ, Basileæ, vt & in callia Narbonensi prouenit: loca. amat montium, editorum & asperorum.

periorum, vda & rigua prata.

GRAMEN SORGHII EFFIGIE LOBELII,

Descriptio

AD sesquipedalem surgit altitudinem, foliis parvis, latis. Radix fibrosa: semen & spicz Sorgho similes. Nasceitur in aruis.

Loca.

Synon.

Tabern.

Icon.

Lobel. in Ic. p. 5. itēque hist. Belg. *Gramen Sorghi effigie*: Dodon. Lat. *Gramen pratense* 5. sine descriptione. Tabern. (apud quem in Icon. & Hist. p. 639. Icon à Lobelio proposita, est pro arbitrio immutata: nec enim vllam videretur habere cum Sorgho sua spica similitudinem) *gramen Sorghinum*: Eid. hist. *gramen* 12. siue *Sorghgras*.

C. Bauh. phyt. p. 8. *gramen* 27. siue *Sorghii effigie*: Eid. pin. *gramen sorghinum* 1. siue *gramen Sorghi panicula erectum: gramen sorghinum*, Gerardi.

GRAMEN HARVNDINACEVM SORGHII paniculā sparsā Cesp. Bauhino.

CAPVT LXXXI.

Synonyma

Descriptio

GRamen hoc Sorghinum i. in pin. 52. in prod. C. Bauhino, culmis est cavis magna ex parte reclinatis, ita vt capillaribus radicibus terrea attingitur, qui folia (quae longiora & angustiora quam in priore) veluti per tubum transeunt, & in summo paniculam ferē palinatem sparsam, parvis vericulis donatam, sustinent. Locus natalis memoria excidit.

GRAMEN ASPERVVM.

CAP. LXXXII.

Descriptio



GRamen asperum culmo est bicubitali & altiore, geniculato, alpe-ro, potissimum sub nodis & in fastigio: folia longa vagina culnum inuoluunt in aequum pungentemque mucronem desinentia, à quo deorsum si digitis stringas, aspera sentiuntur: panicula itidem aspera, tīgida, & crassa, albicans vel rubens, saepe minus sparsa: aliās etiam magis cum parvis paniculis ex pediculis longis asperis, antorsum duntaxat vergit, ex latiusculis ceu muscariis composita, flosculos luteos vibrantibus.

Synonyma

Hist. Lugd. p. 427. *gramen spicatum* Dalechampi: C. Bauh. phyt. *gramen* 11. siue *gramen folio aspero*, nonnunquam articulato: Eid. pin. *gramen spicatum pratense* 5. siue *gramen spicatum folio aspero*: *gramen varians folio nonnunquam ar-*

ticulato, & floribus, qui Basileae passim mense Iunio pallide lutei: in pratis verò montium frigidorum subrubei sunt.

GRAMEN PARVVM ECHINATVM.

CAP. LXXXIII.



Descriptio

Longis albis canibus fibris radicans, culmis plusculis donatum palmaribus, pauld longioribus, duris, rubentibus, crebro nodorum interceptu distinctis, quos folia ferē totos obuoluunt, vix vnciam ab iis recedentia, hirsutis per margines pilis donata, alioqui glabra: spica vnciales & longiores, interdum eam longitudinem minimē attingunt, denso glumatum pulchris denticulis muricatarum stipatu contextae, semine echinuli medirullio continentium, pusillum, oblongum, rufum.

A C. Bauh. in prod. pro *gramine* 3. siue *canino maritimo aspero* sic describitur: radicem habet ex multis fibris oblongis, albis, capillaribus compositam, ex qua ramuli plures dodrantes, in terram primum reflexi, prodeunt, calamis rotundis rufescentibus donati, quos folia quasi in fasciculo iuncta, breuia, dura, veluti in aculeum fastigiata, in circuitu leuiter hirsuta, terrea instat minutissime exasperata, cingunt: spica folliculo primum inclusa, angusta, ceu ex lappulis elegantissimis, exiguis, asperis & echinatis composita. In littore Veneto, maritimis quoque circa Anconam, & Montepessuli repetitur mense Septembri. Lobelius Aduersariorum parte altera in catalogo graminum, *gramen caninum medicatum marinum spica echinata* C. Bauhini (sed sine descriptione) vocat, quia hoc nomine in Phyt. nostro ante annos viginti quatuor breuissime descripsimus. Huius ille, qui pilos foliorum in sua iconē exprimit. In phyt. vocat *gramen* 4. siue *caninum marinum spica echinata*: in pin. *gramen caninum* 10.

GRAMEN CANINVM MARITIMVM spicatum C. Bauhini.

CAPVT LXXXIV.

Hvic *gramini canino* 1. (vt vocat in pin.) siue (vt in prod.) *gramini* 4. ex radicibus tenuibus, lignosis, leuissime capillatis, viticelli plures repentes, rotundi, lxxes, pedales, cubito etiam longiores, frequenter geniculati, vnde ramuli plures, foliolis arundinaceis breuibz & angustis cincti, prodeunt, quorum superioribus spica

Descriptio

triuncialis, ex cinereo nigricans insidet.
Ad littus maris, non longè Monspelio Domi-
nus Saltzmannus legit & communicauit.

GRAMEN MYRORVM RADICE RE-
pente, C. Bauhini.
CAPVT LXXXV.

Descriptio. Gramini huic canino 11. C. Bauh. in pin. 50. in
prod. ex radice nigricante repente & capilla-
cea. culmi plures, pedales, incurui, tenues, geni-
culati, foliis paucis, breuibus & angustis cincti,
prodeunt: quorum summitati panicula albicans,
sesquialteralis, ex minimis glumis contexta, insi-
det. Hoc in muris fossarum interiorum vrbs no-
stræ prouenit.

GRAMEN PERPVSVLLVM
capitulo rotundo, spinoso Cherleri.
CAP. LXXXVI.

Descriptio.




Paucis fibril-
lis radicator
summo cespice
herentibus, folia
aliquot vncialia
& breuiora, ri-
gidula, pro plan-
tulæ modulo la-
tiuscula: Culmus
vnciam vnam
aut alteram al-
tus, durus, rigi-
dus, striatus, non
sine foliis, quo-
rum vnicuique
capitulum insi-
det glomeratum,
exalbidum, stellis
denticularis ad-
modum rigidis
pungentibusque
muricatum.

Locus.

Nemus ad molendinas in saxorum & rupe-
torum caueinis collegit Gener Cherlerus, nec
maius vllibi reperit, quam pictura exhibet, quæ
ipsammet plantulæ magnitudinem repræsentat.

GRAMEN CAPITVLO LVCIDO
globoso Tabernæmontani.
CAP. LXXXVII.

Descriptio.



Clomero-
gram. radice est te-
nuis fibrosa, fo-
lia Graminis
vulgaris simi-
lia: Culmi sur-
rigit læues, re-
nellos, spicha-
mam longos.
In quorū sum-
mitate insidet
spica pellucidæ
glomerosæ, fl.
fuis albidis
dense stipatæ,
quos dehiscen-
tes minutu-
lum excipit se-
men, Tabern.
Tabern. lc.

& hist. p. 639. *Gramen lucidum* Germ. *Föbleins*
gras. Eid. Hist. *Gramen* 15. C. Bauh. Phyt. *Gramen*
42. & *Gramen capitulo glomoso*: Eid. pin. *Gramen*
nemorosum hirsutum 4. siue capitulo globoso. Com-
breum Plinii, Ang. *Herba Luciola* vulgo, Cæf.
Gramen lucidum Tab. *Gramen palustre echinarum*
Ger. icon.

Locus prouenit incultis collibusque asperis & siccis. Tabern. **Locus.**


GRAMEN HIRSVTVM
angustifolium maius C. Bauh.
CAP. LXXXVIII.

Ex radice exigua fibrola, rufescente, culmus
vnicus, cubito altior, vt plurimum læuis, exue-
git, in cuius summitate panicula alba, mollis, le-
uiter sparsa, ex multis laminulis composita, in
quarum qualibet semina minuta, subnigra & sub-
rotunda: folia est paucis, angustis, palmaribus,
& villosis, aliquot culmum cingentibus: ipsi vero
paniculæ, vtrinque solum tenuissimum subici-
tur, quorum alterum paniculam superat, alterum
non adæquat. Prouenit in nostris paludosis pra-
tis Michelfeldensibus; *Gramen* hoc 47. in prod.
siue *Gramen nemorosum* 3. siue angustifolium
maius. **Locus.**

GRAMEN PHALAROIDES
exile, supinum, humi sparsum, Da-
nicum Lobelii.
CAP. LXXXIX.

Videas [inquit Lobelius in Adu. par. 2.] pro-
pe Cronenburgum arcem Regiam muni-
tissimam Selandiæ Danorum, è regione equilis
horti Regii, sabuloso solo, ad latus maritimum
Gramen pusillum humile, humique sparsum, in-
numeris duarum triumue vnciarum culmis; ro-
tulis spicatis effuse fastigiatis, exilibusque apicu-
lis præditis. Foliolis vncialis longitudinis & la-
tiusculis, crassioribusque culmis pro plantulæ
magnitudine. Radix sulca, cirrosa. Tota albicat
herba sermiceia. **Locus.**

GRAMEN CRISTATVM
CAP. LXXXX.



Graminis **Descriptio.**
genus i-
stud sesquicu-
bitalibus as-
surgit calamis
perquam ce-
nibus, geni-
culatis, non se-
ne foliis, quæ
vaginz intar
satis longo in-
teruallo, cul-
mum comple-
ta, palmum
longa, ab eo
recedunt, au-
gusta. Spica
quadrantal-
is aut paulo lon-
gior, duobus
versibus in v-
nam par-

nam partem vergentibus, glumarum pallidarum, cristatarum, sinbricitarumve, flosculorum fuscorum, luteorumve, tremulas fibrillas explicat, dorso spicæ glumis viduo: Radices tenues & cristatæ.

C. Bauh. phyt. Gramen 12. siue cristatum: Eid. pin. Gramen cristatum & spicatum pratense siue cramen spicæ cristatæ læue. cramen varians florum colore, communiter ex pallido flauescente, aliquando puniceo. Hoc ante in prod. fecit cramen 18. & sic descripsit: Radicum capillamentis plurimis oblongis albicantibus abundat, quæ in vnum veluti calypitem coeuntia deorsum repunt culmis est pluribus sesquicubitalibus, geniculis paucis donatis: foliis brevibus, congestis, & circa caulem paucis, vncias quatuor vel quinque longæ: spicam habet tenuem oblongam, pallidè virentem, quæ Gallicristas plurimas, vel semen capitis gallinacci dictæ plantæ refert, cuius nomine cristatum in phyt. appellare placuit: quod nomen & D. Lobelius in Adq. parte altera probauit, cramen cristatum C. Bauhini nominans: prouenit in prato infra patibulum, aliquando ad montem Basiliensem. Idem, sed spica elegantiore & densiore, in monte VVasserfall & Montepelluli obseruauimus: simile ei ex Anglia D. Lobelius multis annis post misit.

De gramine cristato C. Bauhini hæc Lobel. in Aduers. par. 2. scribit: A cristatis palmaribus, dum curuantur, spicis, cristam gallinaceam emulantibus, hoc cristatum cramen scite a clariss. C. Bauhino vocatur, Alocuperoideis graminibus in stirpium Illustrationibus nostris annexere libuit: quo nihil frequentius variis editis pratis Londinensis agri, iuxta Hackneum (alibique multis in locis transmarinis) vbi à rusticis, vti nonnulla gramina, storeis, pergulis, transfennis, topiariis, coronariisque operibus arte manûque factis, elegantissime inuicem annexis, concinnandis, æstiuo tempore aulis & caminis ornandis aptum. Vernaculè etiam Heur vocatur.

GRAMEN SPICA CRISTATA SVBIHSUTUM Casp. Bauhini.

CAP. XCI.

C. Bauh. phyt. Gramen 12. siue cristatum: Eid. pin. Gramen cristatum & spicatum pratense siue cramen spicæ cristatæ læue. cramen varians florum colore, communiter ex pallido flauescente, aliquando puniceo. Hoc ante in prod. fecit cramen 18. & sic descripsit: Radicum capillamentis plurimis oblongis albicantibus abundat, quæ in vnum veluti calypitem coeuntia deorsum repunt culmis est pluribus sesquicubitalibus, geniculis paucis donatis: foliis brevibus, congestis, & circa caulem paucis, vncias quatuor vel quinque longæ: spicam habet tenuem oblongam, pallidè virentem, quæ Gallicristas plurimas, vel semen capitis gallinacci dictæ plantæ refert, cuius nomine cristatum in phyt. appellare placuit: quod nomen & D. Lobelius in Adq. parte altera probauit, cramen cristatum C. Bauhini nominans: prouenit in prato infra patibulum, aliquando ad montem Basiliensem. Idem, sed spica elegantiore & densiore, in monte VVasserfall & Montepelluli obseruauimus: simile ei ex Anglia D. Lobelius multis annis post misit.

GRAMEN GENICVLATVM, TABERN.

CAPVT XCII.

C. Bauh. phyt. Gramen 12. siue cristatum: Eid. pin. Gramen cristatum & spicatum pratense siue cramen spicæ cristatæ læue. cramen varians florum colore, communiter ex pallido flauescente, aliquando puniceo. Hoc ante in prod. fecit cramen 18. & sic descripsit: Radicum capillamentis plurimis oblongis albicantibus abundat, quæ in vnum veluti calypitem coeuntia deorsum repunt culmis est pluribus sesquicubitalibus, geniculis paucis donatis: foliis brevibus, congestis, & circa caulem paucis, vncias quatuor vel quinque longæ: spicam habet tenuem oblongam, pallidè virentem, quæ Gallicristas plurimas, vel semen capitis gallinacci dictæ plantæ refert, cuius nomine cristatum in phyt. appellare placuit: quod nomen & D. Lobelius in Adq. parte altera probauit, cramen cristatum C. Bauhini nominans: prouenit in prato infra patibulum, aliquando ad montem Basiliensem. Idem, sed spica elegantiore & densiore, in monte VVasserfall & Montepelluli obseruauimus: simile ei ex Anglia D. Lobelius multis annis post misit.

Dicitur Autori Leon. & H. cramen 3. genicula-

GRAMEN SPICAM FOLIO AMPLE-
-CTENS.

CAPVT XCIII.

C. Bauh. phyt. Gramen 12. siue cristatum: Eid. pin. Gramen cristatum & spicatum pratense siue cramen spicæ cristatæ læue. cramen varians florum colore, communiter ex pallido flauescente, aliquando puniceo. Hoc ante in prod. fecit cramen 18. & sic descripsit: Radicum capillamentis plurimis oblongis albicantibus abundat, quæ in vnum veluti calypitem coeuntia deorsum repunt culmis est pluribus sesquicubitalibus, geniculis paucis donatis: foliis brevibus, congestis, & circa caulem paucis, vncias quatuor vel quinque longæ: spicam habet tenuem oblongam, pallidè virentem, quæ Gallicristas plurimas, vel semen capitis gallinacci dictæ plantæ refert, cuius nomine cristatum in phyt. appellare placuit: quod nomen & D. Lobelius in Adq. parte altera probauit, cramen cristatum C. Bauhini nominans: prouenit in prato infra patibulum, aliquando ad montem Basiliensem. Idem, sed spica elegantiore & densiore, in monte VVasserfall & Montepelluli obseruauimus: simile ei ex Anglia D. Lobelius multis annis post misit.

H. Lugd. p. 425. cramen pratense Dalech. Catp. Bauh. phyt. cramen 10. siue cramen pratense, cuius spicam folium instar velicæ amplectitur. Eid. pin. cramen cristatum & spicatum pratense 4. siue cramen pratense spica purpurea ex verticillo prodeunte, vel cramen folio spicam amplexante.

GRAMEN TREMVLM.

CAPVT XCIV.



glumas sustinent tubescens, & squamulis pulchro ordine digestis compactiles, leuissimo attractu tremulos, minores quàm Tremuli maioris forma conoide.

in. Inodegrass. C. Bauh. phyt. Gramen 6. siue caule geniculato. Variare autem ait, ac Montpelij palmo minus, Basilicæ erectum ac cubitale.

In campis & pratis, ac locis graminosis prouenit.

Loc.

Descriptio

*N*on aded *Descriptio* Nalte fibras suas demittit cramen. hoc tremulum, culmum erigens tenuem, geniculatum, manem ad sesquicubitum interdum, humiliorem sæpè. Folia magna sui parte, culmum ceu vagina complectuntur, reliquam intrigunt breuiorem rigidam: à summo culmo multi tenuissimique rubentes pecioli

In nostra tabella, triplex proponimus Graminis tremuli genus. Nempe Gramen tremulum, minus, & maximum tremulum. Tremulum vero, & de quo nunc egimus, in medio tabellæ pingitur.

Synonyma C. Bauh. Phyt. *Gramen tremulum minus*: Eid. pin. *Gramen tremulum* 2. varians paniculæ colore viridi, & spadiceo. Lolium 10. & Aegilops Plinii, Trag. *Aegilops*, Gesh hort. Lon. *Graminis* 1. genus, Dalech. in Diosc. Ama. *Phalaris pratensis minor*, Adu. Lobel. icon. p. 44. *Amourettes tremblantes*, Clus. hist. *Phalaris pratensis* Ger. *Gramen polyanthos*, Lugd. p. 428. *Gramen leporinum* & *tremulum* itemque, *Linum D. Maria*, Tabern. *Gramen liliaceum* 10. Tragi, Thal.

Clus. Hist. post. de hoc ait: Graminis, seu viridis Poz. genus in omnibus quas vnquam lustravi regionibus, prout, (vt ceteræ herbæ) multis locis vestitas, cui similes paniculæ ferè, breuioræ tamen, & ab exortu satiores à summis culmis dependent. Id Galli & Arthelii seu Atrebatæ mei populares *Amourettes* etiam appellant ob panicularum elegantiam, sed vocem *tremblantes* adiciunt, ad alterius differentiam: quia vel vnico, vel pluribus eiuscapis manu re- tentis, omnes eius paniculæ perpetuò tremulae sunt. Germani *Zydem* / *hasenörling* / *hasenbrot* / & quibusdam *Jungfrauen haar*: Belgæ *Elyenbrendt* / & *Beuernelle*, vocant.

Geneuz passim in pratis mense Maio, nec non Basilez, ceu & Montbelgardi quoque reperitur.

Locus.

GRAMEN TREMVLM MINVS.

CAP. LXXXV.

Descriptio EX radice rufescente & quaquaversum repente culmos surrigit pedales, plus minus graciles, vix vno vel altero distinctos articulis, iubeas sustinentes paruas è folio vaginacæo, superna parte acuto, & iubam ipsam sæpè superante, media parte sui prominentes, quæ ex squammulis delicatulis, rotundis, pallidis, aut subflavescentibus & splendentibus, ex breuibus pedicellis pendulis, tremulis, sed in vnum tantum latus plurimum nutantibus, constant. Quibus notis singulis à maiori dicto tremulo facile distinguas licet. Folia cæterum inferna graminæa, pallide virentia, angusta, acuminata. Huius iconem in præcedenti tabella primo loco expressam damus.

Synonyma C. Bauh. Phyt. *gramen* 39. siue tremulum minus, vulgò *Hasenbrot*. An Graminis Liliacei species parua apud Thaliū in sua Martynia: Eid. pin. *gramen tremulum* 4. siue minus panicula parua.

Locus. In pratis montosis Basiliensibus prouenit.

GRAMEN TREMVLM

minus panicula magna. C. Bauh.

CAP. LXXXVI.

Synon. *Gramen tremulum* 3. siue minus panicula magna aliquando in cacumine tres aut quatuor ramulos exiles fundit, semenque triangulum habet. Idem autem facit cum Phalaride parua Cæsalpini, & Gramine *Amourettes* alio Clusii cur. post.

GRAMEN TREMVLM MAXIMUM.

CAP. LXXXVII.

Descriptio Vltimo est cubitali, gracili, inferius rubente, caucis geniculis donato, foliis angustis, raris,

breuibus, glabris 4. vel 5. vncias stipule (sicut in pili instar tenues tremulosque finditur peciolos, quorum vnusquisque spiculam gerit semunciale, paullo minus latam, compressam, ex flavo rubentem, squammularum maiuscularum, nitidarum & splendentium, denique similia capitula habet cum Gramine præiulo, (seu spiculas impurati) mutuo incubitu imbricatam, pro radicibus fibras est fortius. Gramen tremulum maximum exhibuimus, cum duobus prioribus, cui appictum capitulum maximum.

C. Bauh. Phyt. *gramen* 38. siue tremulum maximum: Eid. pin. *gramen tremulum* 1. siue maximum: an Phalaris altera, Cæf. *gramen Amourettes* maiori paniculâ candicante, Clus. cur. post. Colore panicularum variat, est rufescentis, est albicantis.

A multis annis habeo à Valerando Cheretensi gener etiam secus Romam passim ferè obseruasse se testatur, maxime verò in via quæ Romæ Victorium pergitur, vnde etiam attulit. Frater Casp. quæ aliquando misit, scribit se in monte *Ras* apud Monachos non longè Patavio collegisse, & in montibus Euganeis prouenire.

GRAMEN AMORIS DICTVM.

CAP. LXXXVIII.

Fibræ numerosæ, satis crassæ in caput amplexu coeunt, quo surgunt pedales culmi, graciles, lauibis vestiti foliis, per calamorum fastigia tremulis filiis pendunt paniculæ longæ pulcherrimæ, albicantes, vel ex atro purpureæ, vnciales circiter, culmi latitudine, compressæ, gemine veris squammularum contextæ, aristæ omni piloque carentes: radices capillares.

Dodon. Lat. *Gramen pharicense festum*. Tabern. icon. & hist. p. 638. *Gramen paniculatum feracissimum Heragrostis*, Liebgraff: Eid. pag. 642. *Gramen* Clus. hisp. & Hist. *Gramen amourettes* ob panicularum elegantiam, rusticis callis appellatur, graminis genus elegantissimum, Lob. Obs. p. 11. ic. pl. p. 7. *Gramen paniculatum phalarides* octat. *Gramen paniculatum*. H. Lugd. *Gramen pharicense* seu polyanthos secundum. C. Bauh. phyt. *gramen* 36. Eid. pin. *gramen tremulum* 5. siue paniculis elegantissimis, siue *gramen*, minus. Pappi præstant qui Canariam Plinii volebant.

Monspelijs vidi rotum album. Patavio attulit Frater siccum nonnihil rubens nomine Zet. *Gramen* Corrusi. Inuenitur nonnullis Hispaniæ locis ad dis & sabulosis, meminit etiam Clusius obseruare & colligere Parisiensi agro, non procul à trivertio Sequanæ, qui ferè ex aduerso monasterij vulgò dicti, *Les bons hommes*, secundum semitas frequenter. Narbonensi agro nonnullam occurrat. In gallobelgio, etiam frequens iuxta Auxiscum castrum, & vicinis locis passim, inquit Lobelius. Quamvis autem etiam in quibusdam Germaniæ locis proueniat, vti in Alsacia superiori, nihilominus tamen propter pulchritudinem plantarum in hortis etiam relinquitur.

GRAMEN PVLEHRVM PARVVM.

PANICULA LATA COMPRESSA.

CAP. XCIX.

Pvicelli huius graminis radices capillares sunt, coloris rufi, palmarum longæ, filis paruis, v-

ciam vnam, duas, tresve longa, tenuia, culmi triquetri, enodes, frequentes, palmates, & sessilibus, quorum extremis sessiles, sineque pediculis, ut plurimum (licet etiam interdum e medio productus pediculus brevis plures alias sustineat paniculas) imposita: panicula umbellam quodammodo metientes, speciosa, graminis montensis dicti, non ita dissimiles, compressile, semetipsum exciter longa, culmum late, bini, vertibus squammatibus compacta, colore ex viridi rufescentibus, sicuti, semen minutum nigrum, paniculis subiecta sunt tercia tota graminea, quorum vnum



reliquis multo brevius semper conspicitur.

Tragus germ. lib. 2. cap. 37. hoc gramen sine descriptione pingit sub nomine flau Riedes gras, Calamagrostis, idque secundo loco capite vero 43. meminit eius inter linceos tertio loco, & vocat flau Lintzen, hoc est, luncum exiguum, ac graminis genus facit. Lat. commode pingit p. 679. sub titulo Calamagrostis alterius speciei. Huius in contextu mentionem non facit: pagina vero 676. vocat luncum exiguum pratensis, de quo ait: Tertium quoddam lunci admodum exigui genus in quibusdam humidis pratis inuenitur, dodrantalis altitudinis, calamis ex vna stirpe supra viginti erumpentibus, lato, frequentibus, & stipato in fastigis semine dependente. De hoc genere cum ad Graminis genera pertinere videatur, plura supra cap. 33. Haec ille, Nos eo capite nil inuenimus quod conveniat praeter iconem.

C. Bauh. phyt. gramen 61. siue cyperoides minimum panicula subulana: Calamagrostis 3. quoad iconem Tragi pag. 679. luncus exiguus pratensis eiusdem p. 696. Eid. pin. gramen cyperoides 11. siue minus panicula sparsa subulnascens. luncus exiguus pratensis Trago. Calamagrostis 1. Tragi. con. H. Lugd. p. 1006. Carex minima Lon. graminum marinum spicatum minus, Cam. gramen cyperoides minimum panicula subulana Casp. Bauh. pin. Lobelio Aduers. parte 1.

Abundat locis humidis circa Montbelgardum, vigens spicis Iulio & Augusto. Ad Brylam Basilensium in palustribus & in Michelsed.

GRAMEN PARVUM PULCHRUM Aliud panicula compressa nigricante,

CAP. C.

Descriptio

Gramini paruo pulchro à Trago depicto, similem habeo aliam plantam, diuersam tamen: quippe maior paulo videtur, dodrantem interdum excedens, tota habitior, folia latiora, longiora: culmi trianguli, crassiores, similiter e-

Tom. II.

nodes: panicula hand secus disticha, squammarum, ut numero fere superiores ita magnitudine inferiores, colore nigricante, folia paniculis subiecta eundem habent positum, eandemque inter se proportionem, sed maiora quam alterius.



C. Bauh. phyt. gramen 62. siue cyperoides minimum panicula nigricante: Eid. pin. gramen cyperoides 12. siue minus panicula sparsa nigricante. graminum cyperoides minimum nigricante panicula, Lobel. ad. parte 1.

Idem locis cum praecedenti prouenit.

Locus

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS MINVS.

CAP. CII.



Longa hinc Descriptio
radix, obliqua, crassiuscula, ex qua fibrae tenues sursum in aliquot capita diuiduntur, ex quibus folia multa viciarium quatuor vel quinque, graminis pratensis similia: folia aliquot palmates vel pedales, spica viciarium trium vel quatuor, quales graminum cum cauda Muri maioris ad tenuiores, eodem modo quasi squaminate, an hoc à maiore variet tantum propter solum, asserere non ausim.

Tabern. icon. pag. 217. hist. p. 655. gramen Typhini

Tabern. icon. pag. 217. hist. p. 655. gramen Typhini C. Bauh. pin. gramen cyperoides 13. siue asperum primum: gramen typhoides asperum maius, forte Thalij. gramen Typhinum 1. Tab. gramen typhinum maius, Gei.

Vnde habuerimus non pecunia, frater quidem C. Bauhinus dedit Basileae pro gramine typhino 1. Tabern. qui prouenire locis siccis & graminosis campis scyphit.

Locus

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS FOLIIS LITUIS.

CAP. CIII.

Culmi aliquot cubitum excedentes, internodi adius circa unum nonnihil rubescentes, densis, R.

Descriptio

R.

rioribus, & ferè nullis superius, foliorum vagi-
na multum inuolutis, quæ ubi à culmis recelle-
runt breuia facis sunt, & angustæ, hirsuta. *Spica*
triun vnciarum, nitida, densissimis tenuibus glu-
mis compacta, luteola ferè, singula glumæ pla-
næ, angustæ, in acumen vnicum desinunt, tota
autem spica nonnihil diuisa conspicitur, *radix*
capillaris, alba, tenuis, ex capite crassiusculo, an-
tepar non obseruauimus Monspeli.

Gramen
alopecuroides minus
Lob.

Lbb. Ic. Plant. p. 7. & hist. Belg. p. 2. *Gramen* a-
lopecuroides minus, (quod ut in descriptione
eius refert) eiusdem ferè altitudinis est cum gra-
mine alopecuroides plus, sed culmis & spica te-
nerioribus, radice item & foliis inferioribus
multo minoribus.

Gr. alope-
cutinum 3.
Tab.
Tabern.
Gerardi.

Tabern. Ic. hist. pag. 64. *Gramen* alopecuti-
num 3. *Schiffmanni* gras. Eid. p. 84. *Gramen*
22. Illud hic nomen dñm pictorem Tabernamou-
tani *Gramen* hoc trifolium facere, ex male scil.
considerato Lobelij figura. Descriptio etiam eius
parum valet.


Gr. typhoi-
des repens
alterum
C. Bauh.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 50. siue typhoides re-
pens alterum: Eid. pin. *Gram.* typhoides 6. siue
culmo reclinato: *Gramen* alopecutinum maius,
Gerardi.

GRAMEN CVM PARVA

cauda muris, radice non no-
dosa, repens.
CAP. CHL.

Delc.



Gramen
repens ex
cuius radice fi-
brofa, & velu-
ti bulbulis no-
dosa, aliquot
emergunt cul-
muli cubitales
aut sesquicu-
bitales, te-
nues, laues, &
ab internodiis
reflexi, quos
ab imo statim
plusecula comi-
tantur folia,
glabra, breuia,
angusta. Ex
singulo cete-
rum interno-
dio singulum
prominet fo-

liolum: summitati spica incumbit parua, hispi-
dula, Lobelij Typhini *Graminis* figura, bicorni-
bus squamulis densissime farta.

An Capu-
tas, aut si-
milis?

Huic circa Bessfordiam reperto simile, si non
idem, obseruauit, in Ducatu Wirtembergico: in
quo an reperiantur radice bulbulis nodosa, & squa-
mulæ bicornes, non animaduerti: in ceteris dis-
crimen adhuc agnoscere non potui: utrumque
repat.

Synonyma

Lob. Ic. Plant. p. 11. *Gramen* aquaticum spicatum.
Tabern. Ic. & hist. p. 654. *Gramen* fluuiatile album.
reus huc gras. Eid. hist. *Gramen* 28. C. Bauh. phyt.
Gramen 24. siue aquaticum spicatum: Item, *Gramen*
98. siue nodosum alterum spica parua à fra-
tre lo. Baulino communicatum. Eid. pin. *Gramen*
spicatum, aquaticum 1. siue geniculatum spicatum:
Gramen fluuiatile spicatum Gerardi. Item, *Gramen*
nodosum 3. siue spica parua: 6. in prod. de qua ait,

radice est, parua, nodosa, albicante, fibris paucis
& breuibz donata, cui, ceu alter nodulus oblon-
gus insidet, qui in calamum cubito altiore, la-
uem, internodiis aliquot distinctu abst, folio ad
quemlibet nodum vno, angusto, vncias quatuor
vel sex longo: in summitate spica vnica, vix
vncialis, mollis, typhini graminis forma. In du-
metis vdis circa Bessfordiam (vrbē, diei itinere Ba-
silea distante) prouenit, vbi D. Ioannes Bauhinus
frater meus collegit & transmisit.

Quod nodosum est, in dumeris propè Bessfor-
diam, non longè à pago Daniutin nobis reper-
tum Augusto cum suis spicis. At quod sine bul-
bis, in ducatu Wirtembergico propè fontem Ad-
mirabilem Bollensem obseruauimus ad ripam ri-
uyli præterlabentis.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS

maioris longa, Maius.

CAP. CIV.



Gramen Typhini 2. Tabern.



*R*adices te-
nues, cul-
mi habet prin-
cipium bulbil-
lo oblongo si-
mile, cubita-
les, altioresque
interdum, folia
aspera, vagina
longiore, stipu-
lam circum-
plexa: summū
acumen pal-
mare, sæpè ec-
tiam longio-
rem, spicam su-
stinet, teretem,
caudæ magni
Muris simile,
mollem si sur-
sum versus
manu demul-
ceas, asperam
si contra, colo-
ris cinericii,
innumetis
squammulis in
bina breues
aristas desine-
ntibus, dimidia-
tos solenas aut
lateritias can-
nulas scan-
dulas imitatis
constantem.

Lobel. Icon.
Plant. & Obs.
p. 10. *Gramen*
Typhini gau-
des fabuleis &
marieinis. na-
talibus. Radix
pusilla, capilla-
cea, caulis do-
drantalibus & pe-
dalis. In Belg.

p. 11. *lisch doode gras*. Nimiū breuis Lobelij
descriptio est, ut ex qua certi quid colligi non
possit: figuram si consideres, non malè exprimit

Gra-

amen de quo hic agimus, appingit enim bulbosa caulium principia: sola magnitudo dubium parit, verum ea sola non sufficit ad differentiam constituendam.

Hist. Lugd. p. 433. *gramen typhinum*. Tabern. Hist. & Icon. *gramen typhinum* 2. Liefchgrass. Nescio an Tabern. hoc gramen differat a Lobeliano, multa alioqui habet communia, & potissimum culmorum principia bulbosa & alia pleraque.

C. Bauh. phyt. *gramen* 44. siue typhoides maximum spica longissima, gramen multum conveniens cum gramine *typhoides* maiore & molli apud Thaliu in Hircynia. Item gramen 46. siue Typhoides asperum latifolium. Lobelio typhinum. Et gramen 47. siue typhoides asperum angustifolium Tabern. Typhoides 2.

Nos donec intellexerimus differentiam à Fratre manifestam inter tria dicta gramina ea ab invicem non separabimus. In pin. non amplius tria, sed duo duntaxat statuit genera. Gramen typhoides 1. siue maximum spica longissima: 25. in prod. Et gramen typhoides 4. siue asperum alacrum. *gramen typhinum*, Lob. Lugd. *gramen gracense* 7. Dodon. *gramen typhinum* 2. Tabern. *gramen typhinum minus*, Ger. Porro Typhoides maximum in prothlis describitur: ex radice parva, nodosa, cui fibræ exiguæ & plurimæ adnatae, culmus exurgit rectus, sesquicubitalis, internodiis rarioribus distinctus, qui in spicam rectam, teretem, palmarem, virentem, in maturitate albicantem, tactu mollem, desinit, vtriusque aristas oblongiusculas & copiosas exhibentibus. Inter frutices circa Geppingam Ducatus VVirttembergici primum, dein non longe Bailea, in sepibus agrorum inter Michelsfelden & Huningen, & in salicetis Michelsfelden legitur.

Incrementum maxime adipiscitur gramen typhinum 2. Tabern. in solo humido, arenoso, & gremioso, in silva dicta Olsvald iuxta viam, sed precipue in pago Erlendach, & aliis eiusdem naturæ locis.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS purpurascens.

CAP. CV.

Descriptio EX denso foliorum gramineorum glabrorum Lagmine aliquot emergunt culmi, quorum alij pedales, alij cubitales, aut sesquicubitales, interdum purpurei, foliis internodiis latioribus vestiti, paucis atque exiguis articulis distincti: in summo spicam gerunt purpurascens, palmarem aut brevioram, teretem caudæ muris forma, sed confuso glumarum steriliu ordine refertam, ex quibus breues & tenellæ proflunt aristæ. Flosculi eius apices sunt luteo-



Tom. II.

li pallidi ex tenuissimis filamentis penduli. Radix meræ sunt fibræ.

Lobel. Ic. plant. pag. 9. *gramen alacropoides minus alacrum*. Eid. Hist. Belg. p. 10. Anders vossens sterens gras, in campetribus & iuxta semitas, culmis bicubitalibus paucis foliis donatis. Tabern. Hist. & Ic. *fuchsianus gras. gramen alopecurinum* 2. C. Bauh. phyt. *gramen* 49. *gramen typhoides repens*, *gramen alopecuroides minus alacrum*, Lob. At nostrum contra, quod exhibemus Gramen non est observatum repere, sicut nec etiam Lobelius, ac Tabernam. repens pingit. Eid. pin. *gramen typhoides* 5. siue spica angustiore, *gramen alopecurinum minus* Ger. Variat spica longiore & brevior.

Circa Montbelgardum loco siccò florens Locus & collectum Iunio: olim Genesæ mense Aprili ubi abundans observavi ad vineas Nolosodchij.

GRAMINI CAUDÆ MVRIS PURPVRA- scenti aliquatenus simile.

CAP. CVI.

Oblique radice agit crassam satis, tenuibus libris donatam, veteri præteritorum foliorum cespite amictam, ex qua è terra statim pluscula prodeunt folia graminea, vix triuncialis, raris pilis ad latera obita, striata, culmi surgunt aliquot pedales, cubitales, aut etiam altiores, teretes, rigidiusculi, paucis internodiis versus imae potissimum donati: quorum singulos ex longo intervallo seiuncta amictunt foliola sesquicubitalia, aut ad summum duas uncias longa, inferius alioqui similia. Summitati inhaerent spica, quæ primulum prorumpentes caudæ muris purpurascens spicam aliquatenus æmulantur, tum figura, tum colore, præterquam quod aristis nullis sit septa. Mox diuilla & aperta elegantem glumarum purpurearum aut xerampelinarum & pulchre splendentium thyrsu exhibet. Ex quibus flosculi vel potius apiculi vtrinque bifidi (dum nimirum floret) dependent, pulchelli, obscure purpurascens, tremuli, chamma cæterum castæ, inutiles. Sapor graminis vulgaris.

Siccò gaudet cespite, arenosis item, squalidis & saxosis viarum marginibus, aruorumque oris incultis, Montbelgardi ad collis proximi quæ meridiem spectat, nobis primum observata, florens Iunio.

GRAMEN CVM CAUDA LEPORIS aspera, siue spica murina.

CAP. CVII.

Pluscules surgit calamos graciles, rigidulos, pedales aut sesquipedales, in quorum summitate spica sunt breues, magnitudine & figurâ caudæ vulpinæ haud dissimiles, sed crispis alperis, vtrinque quoque muricatis, cum aristis longiusculis & leviter recurvis, & quæ ex brevi reflexu in summitate culmi nutant: in quarum sinu glumæ latent parvæ inutiles. Folia medio- cris longitudinis rigidiuscula, glabra. Radix densa satis, numerosam hirsutaru fibrarum prolem demittit.

C. Bauh. phyt. *gramen* 51. & *gramen alopecuri* Synon.



Locus.

des aspera spica. Eid. pin. Gramē alopecuroides 6. siue spica aspera. H. Lugd. p. 432. Gramen echinatum Dalechampii. An Taber. p. 678. Alopecuros alter spicis brevioribus [quàm in Alopecuro molli brevique spica] nec ita villosis.

Gener Cherlerus attulit ex Gallia Narbonensi, ubi non adeo infrequēs animadvertit.

GRAMEN ALOPECUROIDES
accedens, & Phalaridis, spica longiuscula, folio lanuginoto.

CAP. CVIII.

Descriptio

D Vras & frequentes satis ad infimo culmo pendentes habet fibras, easque candicantes: Culmus autem cubitalis, crassiusculus, propter terram rubescens: foliis pro geniculorum numero obseptus, palmo longioribus, Hordeaceorum latitudine, totis molli canaque lanugine tectis: spica singularis, vncialis, aut etiam sextantalibus, argenteo nitore micans, turbinata, glumis acerosis gracilibus mollibus, numerosis, densò stipatu coaceruatis constans.

Synon.

Lob. ic. Plant. p. 8. & Hist. belg. p. 10. Doffestecken gras / Gramen Alopecuroides, sic dictum (ait ibid.) quoddam spica sit oblonga, forma itidem caudæ vulpinæ. Calamo est bicubitali, articulis & foliis paucis. Radicula ex miris fibris constat. Tab. Hist. p. 640. & icon. Gramen Alopecurinum 1. fuchsianus gras. Eid. Hist. p. 643. Gramen 20. C. Bauh. Phyt. Gramen 45. siue typhoides molle: Eid. pin. Gramen typhoides 2. siue molle: Gramen alopecuroides minus, Gerardi. Frater Casp. attulit mihi hoc gramen Monspelii collectum. Lobelio vero suum provenit in campestribus, & iuxta semitas.

Locus.

ALOPECUROS ALTERA
maxima Anglica paludosa, siue
Gramen Alopecuroides
maximum.

Graminea paludosa maritima alopecuros

Locus.

Descriptio

Gramineo generi cognatam hanc paludosam maritimam Alopecuron statuit Lobel. in Aduers. parte altera. Est autem in riguis herbidis Comitatus Zont-hamptonie proximè Salinas & antiquas ædes Drayton vocatas, eis mare, duobus miliaribus Anglicis a Portsmouth, ex aduerso vectis Insule, plurima. Culmus cubitalis, sesquicubitalis, bipedalis & quâdoque procerior geniculatus, & folia illi Graminis aut Tritici, sed quinque uncialis sæpè speciosissima, habitior, sericea, spicata, caudataque panicula; Mospeliensium Pseudo-Schœnanthi. Hanc quoque vdis fossis lacustribus Essexiensis comitatus, le-

git author, iuxta Thamesis amoenissima fluentia, sed paulò minorem.

GRAMEN ALOPECUROS
spica longa tomentosa candicante.



Culmo est bicubitali, li ferè gracili, geniculato, foliis gramineis, glabris, ad tactum non asperis, squallida Schœnanthi folia quodammodo imitantibus, spica palmari, mollicella tomentosis candicantibus cum nitore velleris holosericeis glumis congesta, emicantibus tremulis.

lis, radice fibrosa infirma.

Lobel. in Adu. Obs. p. 43. Icon. p. 83. Maribus gramineus luncus foliis Schœnanthi: in Hist. Belg. p. 116. huic titulo præponuntur hæc voces, Welsch Schœnanthum / hoc est Pseudo Schœnanthum. H. Lugd. Gramen tomentosum: adumbrat Plinii & Theophrasti. Tabern. ic. & hist. Gramen sparsum secundum. Daß ander pfrimen gras. Caspar. Bauhin. Phyt. Gramen 119. siue Alopecuros spica longiore. Item Gramen 116. siue sparsum sextum. Eid. pin. Gramen alopecuroides 3. siue Alopecuros maior spica longiore: luncus marinus gramineus foliis schœnanthi, Adu. Lobel. icon. Lugdun. Schœnanthum adulterinum, Tab. Ger. Item: Gramen tomentosum 1. siue spicatum: Gramen tomentosum, Alopecuros vera Theophr. & Plinii, Lugd. Gramen sparsum 2 & Schœnanthum, Tab. luncus marinus gramineus, Ger. tit.

GRAMEN ALOPECUROS.
Spica brevis.
CAP. CIX.



HERBA mollissima aut brevis spica, ut pote duàm plùs minus vnciarum sed coccinior propius ad vulpinam caudam accedens, coloris albi & rari, glumis tomentosis vix apparentibus propter tomenti densitatem, aristis longiusculis mollicellis, circumcirca radiatis, Culmus genicul-

culatus, cubitalis, sesquicubitalis, foliis amictus gramineis, paruis, mollissimis pilis albis hirsutus: radix parua, alba, capillaris.

Descriptio Plinius lib. 21. cap. 17. Alopecuro spicam tribuit mollem, & lanuginem dentam, non dissimilem vulpium caudis: unde ei nomen fecit. Alit videtur Stelephuri loco Alopecurum accepisse, vti descriptio liquidò docet, inquit Lobelius, qui in Adu. pag. 17. hanc plantam describit & pingit, vti etiam in hist. Belg. p. 56. & Ic. plant. p. 44. pro cauda vulpis Montepelientium, Alopecuro Theophrasti.

Synonyma C. Bauh. phyt. Gramen 120. siue Alopecuros spica breuiore: Eid. pin. gramen alopecuroides 2. siue spica longiore: Alopecuros summa spica, Tur. Cauda vulpina Montpel. Adu. Lob. Icon. alopecuros maior, Tabern. Variat magnitudine & spicarum longitudine, quæ in altera longior, in altera breuior & rotundior.

Locus Circa Montspelium prouenientem obseruavi ad mare menle Maio. In Anglia Alopecuron prouenire negat Turnerus, allerens se in Germania solum & Italia vidisse. Notissimam, ait Lobel. frequentemque maritimis ad Magalonam, & Montpelio propinquioribus.

GRAMEN ALOPECVROS ALTERA LOBELII.

CAPUT CX.

Descriptio Aliud genus quoddam est caudæ vulpinæ Theophrasti, spicis tamen minoribus ac breuioribus, nec ita lanuginosis vt Montpelientis: Culmos quoque multo surrigit altiores, bicubitales: Folia graminea, radix nbrofa, Lobel.

Synon. Lobel. hist. Belg. p. 58. & Plant. Icon. p. 45. Alopecuros altera. C. Bauh. pin. Gramen alopecuroides 1. siue spica rotundior: Αλωπίκουρος Theoph. Ang. Cauda vulpina Montpel. elensum speciosior, Alopecuros Dod. Lugd. Tabern. Cam. Ger. Alopecuros altera. Lob. Icon. Cauda vulpina, Cæf. Variat: Creticum enim spica est maiore & ad tactum delicatior.

Græcè à Theophrasto dicitur Αλωπίκουρος, auctore Dodonæo. Lat. cauda vulpinæ Germ. Füßschwand. Belg. Doffen seccr: Gall. Queue de renard.

Locus Sesquimiliari Brugis distantibus campestribus iuxta Vlerfird copiose prouenire ait Lobelius. Dodonæi Alopecuros nascitur in aruis vnâ cum frugibus æstate, reperitur in pluribus Galliarum, præsertim Narbonensi, agris.

GRAMEN ALOPECVRO SIMILE GLABRUM cum pilis longiusculis in spica Onocordon mihi denominatum.

CAP. CXI.

Descriptio Calamus cubito altior, internodiis longis distinctus, quem inoffensè iusque deque contractes licet, quemadmodum & folia, quæ tamen non apparent cana lanugine obrecta: spica summo culmo seder, Phalaridi æqualis, textura dissimili, breuius & mollicellis pilosis glutinis compactis, ac aristis mollibus longiusculis, coloris cinericei.

Synon. Lobel. Ic. plant. pag. 8. & hist. Belg. pag. 10. gramen Phalaroides alterum, das ander Gras ghes Tom. H.

lyfende Cruyde von Spaenschsæder/oft Canariensæder, quod sic describit Phalaroides quoque appellauimus gramen hoc, licet spica eius Phalaridi (Hispanico aliàs semini dicto) non



per omnia respondeat. Radice quoque est fibrosa, culmo cubitali vel sesquicubitali duobus tribusve foliis donato. Tabern. icon p. 210. hist. pag. 642. figuram graminis phalaroidis des wilden Canariens grass sine descriptione ponit. C. Bauh. phyt. gramen 43. siue phalaroides: Eid. pin. gramen phalaroides 1. siue minus, siue Italicum: gramen a-

lopecuroides minus Gerardi.

Pulchrum Gramen habuimus Argentinae ex plantis Domini Agerij cum hac inscriptione, **Locus:** gramen Onocordon. Lob. Teut. ed. p. 10. ait tam in campestribus, quam iuxta semitas reperiti, sumus gramen phalaroides.

GRAMEN PHALAROIDES MINVS SIUE Hispanicum C. Bauhini.

CAP. CXII.

Descriptio Foliis est oblongis, angustis, viridibus, quorum vnum vel alterum, culmos cubitales, tenues, tubi instar cingit: in culmorum summo spica Phalaridi similis, sed angustior, uncias tres longa, insidet, nec radicem, nec seminem vidi: & nomine Phalaroidi alterius Hispania, D. Gillenius transmissit, ideoque gramen phalaroides 2. siue minus, seu Hispanicum denominavi, iequit Auctor in pin.

Synonyma

GRAMEN PHALAROIDES SPICA MOLLI, siue Germanicum, C. Bauhini.

CAP. CXIII.

Descriptio Gramen phalaroides 3. siue spica molli, seu Germanicum C. Bauhini in pin. pro gramine 27. sic in prod. describitur: culmo est cubitali, prioris rariore, vno alterove geniculo distincto: folio vno vel altero, eoque breui, culmum ambiente, cuius summo, spica biuncialis, prioris angustior, cinericei coloris, splendens & mollis insidet. Hoc Vltimenses, apud quos prouenit, à colore, Onocordon appellare intellexi.

Locus: Onocordon

GRAMEN PHALARIDI SIMILE QVOD etiam aliquid commune habet cum Alopecuro.

CAP. CXIV.

Descriptio Phalaridis haud aded ab simile est quod culmum quoque surrigit satis longum, glabrum.

Ri 3

brum. Ex cuius articulo folia culmum ferè tota ambientia prodeunt: mox carinata reddita velut è sinu prominent spicam squarrosum, vnciam vnam latam, duas longam, densiore squaminarum stipatu, quam in Phalaride, multò tamen molliore, quæ in acutiorem aristam desinunt. Quæ argenteo nitore fulgens, purpurâ dilutâ quoque decorata est, potissimum in suprema parte: Hæc autem desumptimus ex planta sicca non integra, quam Gener Cherlerus ex Gallia Narbonensi attulit.

Locus.

GRAMEN PLUMOSVM LOB. SPICA
candida & serici modo lucens.
CAP. CXV.

Descript.

Gramen plumosum foliis est duris, rigidis, & aridis, ad Schoenanthi folia non parum accedentibus, culmi similiter rigidi, sesquicubitus, aut cubitos duos, alti, spicæ longæ densæ, ex purpureo rubentes, paleaceæ, per maturitatem candidæ, & serici instar micantes, Lobel.

Lobel. Hist. Belg. p. 8. Pluym-Rinsgras. Eid.

in Ic. Plant. p.

6. Gramen to-

mentosum & a-

cerosum, Cala-

magrostis quo-

rundam, & vul-

gus Gramen plu-

mosum. C. B.

Phyt. Gramen

32. siue tomento-

sum Lobelii: An

Graminis arū-

dinacei alia

species Thal-

lio? Eid. pin.

GRAMEN ARUN-

dinaceum 3. siue

paniculâ molli

spadiceâ ma-

ius: Gramen to-

mentosum Lob.

Ic. Graminis to-

liacei 8. alia

species Thalii.

Synonyma



Locus

Locis nascitur senticosis Sylvarum quarundam, Flandriæ & Angliæ, iumentis inutile.

GRAMEN ARVNDINACEVM,
ramosum, plumosum album. C. Bauh.
CAP. CXVI.

Descript.

Synonyma

Locus.

Radice & foliis est arundinaceis, & in arundinis altitudinem excrevit: caule anguloso, albo, paniculam arundinaceam, ramosam, palmarem, albam, mollem, splendentem, instar serici albi sustinet. Gramen hoc 44. C. Bauhini in prod. Gramen arundinaceum 5. siue ramosum, plumosum, in pin. non longè Monspelio, circa Peraulæ & Magelonam reperitur.

GRAMEN MONTANVM
panicula spadicea delicatio-
re C. Bauhini.
CAP. CXVII.

Descriptio

Gramen quod C. Bauh. in pin. vocat paniculam montanum 1. siue Gramen montanum

panicula spadicea delicatior, in prod. pro Gramine 12. sic describitur: Radice est alba, breui capillacea, culmis ternis, quaternis, genicularis, pedalis, vno alteroq; folio cinctis, quæ etiam ad radicem breuia & pauca sunt: in culmorum summo panicula graminialis spadicei coloris, ex locustis minimis composita. Hoc tamen variat magnitudine, cum & caule sesquicubitali & spica semipalmari inueniatur: prouenit locis saxosis, maius quidem in monte Crenzacho: minus verò in monte Wasserfall dicto.

Locus

GRAMEN STRIIS PICTVM.

CAP. CXVIII.



IN hanc ut deduceretur fecit foliorum grata varietas, quæ Arundinaceis minora, rigore tamen non cedentia, striis albis & ex viridi glaucis alternatim virgata sunt: paniculas summo culmo sustinet palmares, candidantes, acerosas, mediocriter diuulsas: pro radice fibris nititur.

Descriptio

Coloris 14. fac.

Observatione sanè dignum, quod diligentissimus Botanicus & Phylater Arnoldus Gillenius Cassellensis asserit, nobisque in paucis graminis huiusce foliis Montbelgardi demonstrauit, colorem scilicet triplicem album viride & purpureum, siue potius incarnatum.

Lobel. Adu. & Ic. Plant. p. 4. Gramen sulcatum & striatum album. Camer. hort. Gramen pictum siue striatum, Mannæ vulgò dictum. Tabern. icon. & hist. p. 638. Gramen sulcatum pictum, Hispanicum, Spanisch gras / welsch gras 1. Eid. hist. p. 642. Gramen 10. C. Bauh. phyt. Gramen 26. siue variegatum: Eid. pin. Gramen paniculatum montanum 3. siue folio variegato: Gramen sulcatum, Adu. Lob. icon. Gramen striatum, Lon. Ger. Gramen pictum: Cam. Tab. Variat in colore foliorum.

Synonyma

Basileæ mense Iunio vidi in horto D. Fel. Plateri, qui vocabat Germ. humel saum i. e. Cæli Mannæ: In horti Montbelgardi & Cleruæ vocant des Eguillettes.

Locus

GRAMEN SYLVATICVM
paniculatum altissimum C. Bauh.

CAP. CXIX.

EX radice repente fibrosa, calami duorum triumve cubitorum exurgunt, qui paniculas paruas sustinent; foliis est latis, cyperti æmulis. Hoc in syluis circa Montem Belgardum prouenit, ex quo rustici chlamydes pastorales, & torques equis aratra trahentibus, faciunt.

C. Bauh.

Synon. C. Bauh. prod. *gramen* 14. Eid. pin. *gramen paniculatum montanum* 4. siue *gramen syluaticum panicularum altissimum*.

GRAMEN SPICA QUADRATA AD SECALE ACCEDENS.

CAPUT CXX.

Descriptio *Gramen* culmo bicubitali, infernâ parte nodorum articulatione distincto, supernâ enodi, glabro ceterum, & foliis gramineis glabris duarum vel trium vnciarum, pro articulorum interuallis singulis vestito. Spicam sustinet, quadratam, aliquatenus secalinam, compactam, cuius glumæ munitæ aristis breuibus haud panis, sed superioribus glumis appressis, & oppositis apparent lateribus. Radix fibrosa.

An hoc *gramen spica secalina* C. Bauhini, de quo infra?

Locus Ex ficcis suis plantis obtulit nobis Thomas Platerus circa Basileam collectum.

GRAMEN LATIFOLIUM SPICA TRITICEA LATIORE COMPACTA, C. Bauhini.

CAP. CXXI.

Descriptio *CV*lmo est sesquicubitali, vno alterove geniculo distincto, foliis frumentaceis, pediculis, spica triticea, palmari, lata, glumis acutis carente: Basileæ ad agrorum margines.

Synon. C. Bauh. prod. *gramen* 53. Eid. pin. *gramen spica triticea* 1. siue *gramen latifolium spica triticea latiore compacta & gramen varians latiore & angustiore folio*.

GRAMEN LATIFOLIUM SPICA TRITICEA DIUULSA C. Bauhini.

Descriptio *H*oc à priore, spica potissimum differt, quæ in spicas distinctas & angustas diuulsa est, & quæ sibi inuicem alternatim in culmo subsequuntur, quarum vtriculi breuissimis aristis armantur: in Italia ad agrorum margines.

Synon. C. Bauh. prod. *gramen* 54. Eid. pin. *gramen spica triticea* 2. siue *gramen latifolium spica triticea diuulsa*.

GRAMEN ANGUSTIFOLIUM SPICA TRITICEA COMPACTA, C. Bauhini.

Descriptio *H*oc foliis est angustioribus, sesquipalmariibus, rigidis, acuminatis, & albicantibus: culmo læui, rotundo, striato, sesquicubitali: spicis palmaribus, compactis: vtriculis rigidis & acuminatis.

Basileæ, ad sepes locis aridioribus extra portum Blasianam.

Synon. Casp. Bauh. prod. *gramen* 55. Eid. pin. *gramen spica triticea* 3. siue *gramen angustifolium spica triticea compacta*.

GRAMEN ANGUSTIFOLIUM SPICA TRITICI MUTICÆ SIMILI, C. Bauhini.

CAP. CXXII.

Descriptio *R*adicibus serpit oblongis, geniculatis, nodosis, candidis, quæ caules proferunt sesquipedales, Tom. II.

cubitales, rotundos, aliquot geniculis distinctos, spicâ oblongâ triticeâ, aristis carente, glumis paucis oblongis, similibus ei Tritico quod Fuchsio Triticum primum, aliis spica mutica dicitur. Folia obtinet arundinacea [iuncea in prod. vbi pro gramine 56. describitur] dura, angusta, oblonga, in acumen fastigiata, quæ ab vna caulis parte sunt disposita, inquit author Casp. Bauh. in phyt. vbi vocat *gramen* 31. siue arundinaceum, spica triticea *weitzengras*, atque similitudinem quandam habere cum gramine aquatico harundinaceo paniculato Tabernamontani. Ego non video quid commune habeat figura illa Tabernamontani, quæ paniculatam iubam habet, cum Fuchsij Tritico, quod spicam gerit, neutiquam verò paniculam aut iubam: quod mihi Basileæ demonstrauit, videtur potius spicam habere similem Lolio quàm Tritico. Eid. pin. *gramen spica triticea* 4. siue *gramen angustifolium, spica triticea mutica simili: gramen frumentarium segetaleve, triticeum, siue Triticea spica*, C. Bauhini, Lob. Ad. par. 2. 56. in prod.

Synon.

C. Bauh. not.

Notat Frater prouenire locis arenosis in Klyben circa Basileam suum *gramen*, vnde verò habuerim meum non recordor.

Locus

GRAMEN SPICA BRIZÆ MAIUS Casp. Bauhini.

CAPUT CXXIII.

Descriptio *R*adicibus & culmis est frumentaceis, foliis angustis, spicis palmaribus, multiplicibus, vtriculis aristis breuibus armatis: flosculis, vt in Tritico, luxcolis: tota planta ad viri altitudinem assurgit, & apud nos locis accliuibus ad Rheni ripam, & ad montis Crenzaoensis ascensum prouenit.

C. Bauh. prod. *gramen* 58. Eid. pin. *gramen spica Brizæ* 1. siue *maius*.

Synon.

GRAMEN SPICA BRIZÆ MINUS eiusdem.

Descriptio *T*ota planta palma minor est, radice exili, fibrosa, foliolis ad radicem breuibus, molliibus, canescentibus, spica vnciali, quæ modò simplex, modò gemina & terna, vtriculis aristis armatis: in agris Mospeliensibus D. Saltzmanus legit.

C. Bauh. prod. *gramen* 59. Eid. pin. *gramen spica Brizæ* 2. siue *minus*.

Locus.

Synon.

GRAMEN PHOENICOIDES, FOLIIS CONVOLUTIS, IUNCEIS AC PUNGENTIBUS.

CAP. CXXIV.

Descriptio *CV*bito altiore calarum tollit, internodiis longis geniculatum, foliis amictum sesquipalmariibus circiter, duris, rigidis, acutis, mediocriter latis, summo culmo spica insidet sesquipalmum longa, alternante glumarum muricarum squammatim compactarum polita, ad eum ferè modum quæ in Phœnice animaduertimus, sed maiorum multò, colore ex viridi in flauum vergente: radicem apparet esse perennem, oblique actam, fibrosam, duram, albam, ita ex sicca planta: Hoc *gramen* vnde habuerim nescio, huic

R 4

valde simile quod iuncum vocauit olim collectum circa Monspelium, cui folia rigida, initio lata, tandem velati in iuncum teretem conuoluta, in mucronem desinentia, sæpe spicam superantia, culmus in eo etiam obseruatus vix cubitus altus, delinens in breuem spicam, phoenice n aliquomodo exprimentem: an hoc quoque idem sit cum atrociter pungente quem describit Dalechamptius asserere non ausim, licet partes illius Graminis habeam: sed sine spicis, quas Dalechamptius non tradit: nec etiam in eo Gramine pungente quod habemus, folia sunt ad singulos nodos gemina, sed alternatim disposita: radix fibris multis capillata: crassioribus enim est fibris. Iconem exhiberemus nisi plantam siccam, ut nonnullas alias ipsi communicatas, Frater tenuisset.

Hist. Lugdun. *Oxyagrostis maritima* Dalechamptii. C. Bauh. phyt. *Gramen* 36. siue *maritimum*: Eid. pin. *Gramen arundinaceum* 8. siue *maritimum acutissimum*.

In maritimis Narbonens. Gallie obseruauit Gener Cherlerus, & ibidem etiam crescere Hist. Lugdun. testatur. I. Gargillus *Gramen maritimum* pungens vulgò *Benz* vocari ait & copiose in arenoso maris littore nasci scribit, refertque eo Anglos, conclauibus stratis: æstate quidem viuenti conciliare frigus: hieme siccato calorem fouere: vile precium in onus graue esse.

GRAMEN IUNCEVM MARINVM foliis conuolutis cum longa spica, simile Gramini nodoso.

CAP. CXXV.

Descriptio Vidi apud fratrem C. Bauh. *Gramen* quoddam marinum foliis ita conuolutis ut rotunda iuncæue existimarem, caput cubitalia sunt: ex radicibus duris prouenit crassiusculus spica similis est Gramini nodoso.

Quanam hæc sit planta C. Bauh. in pin. ex tam breui delineatione cognoscere admodum difficile est.

GRAMEN MARIE ODORATVM. CAPVT CXXVI.

Descriptio



Def. C. Bauh.

Hoc nomen ex Morte regio Bortusæ ad se missum *Gramen* impertiuit frater C. Bauhin. fibris crassis radicatam: folia plana quidem suapte natura; sed ita cœnatis marginibus conuoluta, ut teretem iuncum culmum imitentur, rigida, firma, pungentia.

C. B. *Gramen* suum 11. in phyt. & prod.

sic describit: Radicibus candidis geniculatis ferpit: culmo est bicubitali, geniculis paucis distincto, foliis angustis, longissimis, paniculam superantibus, in acumen fastigiatis, suauem, odorem spirantibus, cuius culmo panicula parua, leuiterque sparsa à pictore non rite expressa insidet: A Regiomontanis *Gramen Marie* dicitur, quod in fasciculos collectum: propter odoris fragrantiam, vestibus addiunt, ut D. Vasinarus, qui plantam transmisit perscripsit. Hæc ille, cuius iconem exhibemus. In pin. vocat *Gramen paniculatum montanum* 2. & *Gramen paniculatum odoratum*.

Gramen Marie

Synonyma

GRAMEN REPENS MARINVM spica exigua.

CAP. CXXVII.



Gramen geniculatum marinum alia folia profert spithamæ alta, ex quibus surgit culmus parua, spicam exigua ferens Graminis exilis durioris. Radix longa, Graminis geniculati instar. Frequentissimum in maritimis collibus, in Walheren, Lobel.

Descriptio

Locus

Synonyma

Lob. Icon. Plât. p. 11. *Gramen geniculatum caninum marinum*.

Tabern. icon. & hist. p. 637. *Gramen caninum* 3. Eid. hist. p. 641. *Gramen* 7. C. Bauh. phyt. *Gramen* 3. siue *caninum supinum marinum*. Eid. pin. *Gramen caninum* 8. siue *marinum spicatum*: *Gramen caninum marinum* Gerardi.

GRAMEN LONGIVS RADICATVM marinum, vtriculos pro spica gerens.

CAP. CXXVIII.

Hoc nomen aliter à precedenti differt, foliis, modo crescendi, & radice, quam quoddam spicatum loco inter folia profert vtriculos squammosos, Lobelius.

Descriptio

Tabern. icon & Hist. p. 641. *Gramen caninum* 4. & *Gramen* 8. C. Bauh. phyt. *Gramen* 4. siue *caninum supinum marinum alterum*. Lobel. in Hist. Belg. p. 22. *Ander cleyn duynen-lide gras*. Icon. plant. p. 22. *Gramen caninum longius radicans marinum alterum* Eid. pin. *Gramen caninum* 9. siue *marinum spica foliacea*: *Gramen caninum marinum alterum*, Gerardi.

Synonyma

GRAMEN GEMMEVM SEV nodosum alterum.

CAP. CXXIX.


Radices fert gemmæ rotunditatis, candidas veluti Margaritas, quatuor aut quinque in vicem

Descriptio

uicem herentes, ac si stilo essent transfixe, fibrosis
foliis ex postremo exeuntibus: culmos fert cubita-
les: foliis Tritici, iuba Milij, seminibus Auenæ
binis pendentibus tenuioribus à breuioribus arti-
stis, vt Oryzæ.

Hanc descriptionis author Cæsalpinus in ge-
nere Frumentorum recenset, sed semine inutili,
licet spicam ferat, vt Frumenta. *Perlaram* vulgò
appellat herbam in montibus, & Oryzæ sylue-
stem dicendam autumat.

C. Bauh. pin. *gramen nod. sem. 2.* siue *gemmaum*.
Propagatur radice graminis modo.


GRAMEN SPICATVM ANGVSTIFOLIVM
montanum C. Bauhini.

CAP. CXXX.

Descriptio **G**ramen hoc spicatum montanum 1. siue gra-
men spicatum angustifolium montanum in
pin. gramen 20. in prod. à gramine caryophylla-
to pratensi differt foliis, quæ angustissima: cau-
liculis, qui in hoc tenuissimi, plures & longio-
res: & loco, cum hoc solum in montosis, Maio
mente florens, proueniat.

Locus.


GRAMEN SYLVATICVM ANGVSTIFO-
lium spicâ albâ C. Bauhini.

CAP. CXXXI.

Descriptio **E**x radice rufa, transuersa, fibræ capillares de-
scendunt, & folia plura capillacea, palmaria,
etiam breuiora, rariùs longiora, exurgunt, vnâ
cum culmis tenuissimis, ipsis foliis plerumque
breuioribus, quibus spica vt plurimùm simplex,
candida, exiguis aristis donata, vnciam vix supe-
rans, insidet.

Synonyma

Gramen hoc spicatum montanum 2. in pin. siue
gramen sylvaticum angustifolium spica alba: gra-
men 21. in prod. in syluis humidis Huningensium.



GRAMEN CARYOPHYLLATVM NEMO-
rosum spicâ multiplici, C. Bauhini.

CAP. CXXXII.

Descriptio **R**adice est ex fibris capillaceis rufescentibus
composita, ex qua, tanquam ex cespite, fo-
lia semipalmaria, etiam breuiora, Veronica caryophyllatæ similia, prodeunt: inter quæ culmi
quàm plurimi capillacei, nudi, folia aliquando
superantes, spicas multas breuissimas & rufescentes
sustinentes, exurgunt.

Synonyma

Gramen hoc 22. in prod. *gramen spicatum mon-
tanum 3.* siue gramen caryophyllatum nemoro-
sum spica multiplici in vmbrosis & humidis ad
Bisclam & VVielam reperitur. Huic non mul-
tùm dissimile, sed radice magis geniculata, in via
Richana ad sepes ad sinistram reperitur.


GRAMEN CARYOPHYLLATVM MON-
tanum spicâ variâ C. Bauhini.

CAP. CXXXIII.

Descriptio **R**adicibus est paruis, fibrosis, oblongis, nigri-
cantibus, ex quibus instar cespitis folia, ali-

quando palmum longa, angusta, vt in gramine
spicato caryophyllatæ foliis, prodeunt: inter quæ
culmi plures, tenues, foliis nudi, in summitate
spicam modò diuulsam, modò compactam susti-
nentes.

Locus

In Basileensi vrbi vicinis collibus reperitur **Synonyma**
gramen hoc 23. in prod. vel vt vocat in pin. *gra-
men spicatum montanum 4.* siue gramen caryo-
phyllatum montanum spicâ variâ.


FESTVCA GRAMINEA GLVMIS VACVIS
C. Bauhini.

CAP. CXXXIV.

Descriptio **G**ramini 64. C. Bauh. in prod. in pin. verò
Gramini Festuca 2. siue Festuca graminea
glumis vacuis, ex radicibus fibrosis simul
iunctis, culmi aliquot geniculati, pedales, ad ra-
dicem lanugine pubescentes, foliis angustis, pau-
cis, donati exurgunt, qui glumos plurimos, laues
& vacuos, filamentis tenuissimis adpendentes,
partim virides, partim spadiceos, aristis oblon-
gis donatos, sustinent: hæc apud nos in tectis &
muris crescit: & cum glumi longis filamentis ap-
pensi sint, facile à quouis vento agitati, tremunt,
hinc Monspelientibus gramen tremulum dicitur.
Hæc aliquando, apud eosdem, glumis pau-
cioribus & aristis longioribus & recuruis in a-
gris reperitur, & Festuca graminea aristis incur-
uis nominari potest.

Descriptio

FESTVCA GRAMINEA EFFVSA IVBA
eiusdem.

CAP. CXXXV.

Descriptio **G**ramen hoc 65. C. Bauh. in prod. siue, vt in
pin. vocat, *gramen festuca 3.* seu Festuca gra-
minea effusa iuba, altius exurgit, caule viridi
& rotundo, qui in iubam pedalis longitudinis
effunditur, cuius glumi angustiores & longiores,
breuibus aristis cincti, pediculis capillaceis ob-
longis insident, qui per maturitatem albicant: in-
ter segetes reperitur.

Synonyma
Descriptio

Locus

FESTVCA GRAMINEA NEMORALIS,
latifolia mollis.

CAP. CXXXVI.

Descriptio **C**onstat ex calamis cubitalibus vt plurimùm,
sæpè bicubitalibus, hordeaceis, sed tenuio-
ribus, geniculatis, & omnino similibus ca-
lamis festuæ nemoralis maioris. *Folia* ei inter
omnes species sunt latoria, secundum longitu-
dinem interstriata, & molli lanugine obuestita,
cuius ratione attactui mollietiem eiusmodi offe-
runt, qualis in Althææ foliis tangentium digitis
obicitur. *Iubam* in oblonga profert spica, non i-
ta elegantem, vt iam commemoratorum Festu-
caceorum, coloris antequam flores exerat sub-
rubentis, deinde ex flauo pallidioris, vtriculos e-
tiam breuioribus pediculis appensos habentem,
quantitate ea, quæ medijs generis iam indicati
esse diximus. *Semina* continet paruula, oblonga
splendentia, & quasi Milij cuiusdam seminum re-
dimentum expropterea.

Descriptio

Synonyma Thalia descriptionis auctori, Festucaginis speciei in nostris graminosis, Festuca 4. siue nemoralis latifolia. C. Bauh. pin. gram. Festuca 4. siue Festuca graminea, nemoralis, latifolia, mollis.

FESTUCA IUNCEO FOLIO

Casp. Bauhin.

Synon:
Descriptio

Cramini 66. [vt in prod. C. Bauh. vocat] siue Gramini Festucæ s. seu iunceo folio (vt in pin.) ex radice parua fibrosa, alba, folia pauca, iuncea, semicubitalia longa, vt & culmus rotundus cubitalis exurgit, qui in paniculam aenaceam, sed angustiore, albam, angustâ, desinit, quæ ex oblongo folliculo [à folio constituto] paniculam luge superante, prodiit: cuius glumi rari, aristis longissimis & argenteis donantur. In Vallesia ad paludem vrbis Seduni copiose prouenit, vnde D. Burserus nobis attulit.

An Festuca nemoralis s. siue tenuifolia Thalia, de qua hæc scribit: In nostris syluis Herculicis non semel reperi, quam pro Festuca quinta habeo, ita vt dicatur Festuca tenuifolia. Omnia enim præter tubam cæteris tenuiora habet. Radice constat plurimis exiguis ac tenuibus circis prædita, ex qua straminei, tenues, teretesque ac flautes, geniculati, & cubitales calami prodeunt, foliis strictioribus donati. Tubam etiam hæc profert rariorem, in tenuissimis capillaceis, & multo longioribus, pediculis vtriculos exerentem, quantitate vtriculorum Festucæ graminæ nemoralis, coloris fului, ac argenteo nore micantem.

miogrostis Lob. & Hist. Lugd. cui & **gramen arundinaceum**: Tabern. **gramen arundinaceum maius** vt & Ger. Variat ratione loci: nam quod in arenosis, spica ac est crassiore: quod in montosis, ac dumetis humidis, spica est tenuiore.

Casp. Bauhin. olim in phyt. Gramen arundinaceum maius Tabern. separauit à Calamagrosti Lobelii. Nos de Gramine Tabern. plura mox seorsum dicemus. Lobelii descriptio non videtur nobis respondere iconi, in qua spica siue iuba non apparet similis Panico & Sorgho: magnâ etiam differentia inter paniculam Panici & Sorghi: radix etiam non reptans pingitur.

Pratis vdis, sed strigosis, macilentis & sabulosis neglectis familiare hoc genus Graminis. Pabulo haud cedit, nisi multum esuriant, & penuria melioris admodum laborent veterina, nec eo greges vescuntur, quippe quibus non modò ingratißimum, [& Saur, seu acidum, Rura vernaculè dicunt] verum etiam maciem, sitim & talem conciliare creditur, linguam & œsophagum vulnerare & arere, sanguinem in ventriculum elicere, vnde tumefactio & inflammatio & mors plerumque subsequatur. Quod si Babylone fuit n. tum vbi id maleficium adferre proditur, siccius & rigidius, grex verd imbecillior & alio duriore, minus mirum illius esu iumenta illic enectum iri. Sic enim videas interdum iumentorum labra & fauces cruore manantia & fauciatâ, quæ cum reliquo stramine per senescia, huius aut consimilia harundinea folia escant. Mediæ itaque inter Harundinem & Gramen est naturæ.

GRAMEN CALAMAGROSTIS LOBELII.

CAP. CXXXVII.

Descriptio



Synon:

Babylonio apprimè responder, ac quam Caninû Gramen altero tantò maius est, calamis & foliis rigidioribus, leabris, quibus ad Harundinem val-latoriam non parum accedit: radice geniculata, alba, promissiore & longo reptatu vagatâ, compressiore tamen & crassiore, Canario Gramini simili, sed vallatorum æquante: Spicata Panici aut Sorghi comosa lanugine.

Lob. Adn. Calamagrostis, vel Harundinaceum Gramen, fortè Babylonium: Eid. Ic. Plant. p. 6. Calamagrostis: Item hist. Belg. p. 8. Riedgras, & fortè Gras von Babylonien. Hist. Lugd. p. 434. Calamagrostis Lobelii, vulgò Lolhe. Casp. Bauh. phyt. gramen 28. siue arundinaceum aquaticum: Eid. pin. gramen arundinaceum siue spica multiplici, & auct. Dioscoridis: Cala-

GRAMEN HARVNDINACEVM

maius, Tabern.

CAP. CXXXVIII.



Radicem habet capillarem, humi serpente: folia ex utroque latere obiectum vehementer secantia, Harundini similes quoque cauos articulatos calamos, vna cum spicis, nisi quodd minores sunt. Planta admodum vulgaris notitia.

Tabern. ic. & hist. gramen harundinaceum maius, groß

Riedgras. C. Bauh. phyt. gramen 29. siue arundinaceum alterum. In pin. non ampliùs separata à Calamagrosti Lobelii. Mihi ambæ descriptiones conuenire videntur, quamuis figure sint diuersæ: verum Lobelii icon, vt præcedenti capimouimus, non responder descriptioni.

Littora, paludes, pratæque rigua quærit.

Locu:
Gra-

GRAMEN HARVNDINACEVM MINVS
cum spica.

Ricardo

Synon.



Locus

Locus
Descriptio

Radix & harundo nodosa priori respondent: folia verò sunt & latiora, & longiora: spicae plures magisque patulae.

Tabern. ic. & hist. *gramen harvndinaceum minus*. Klein riedes gras. C. Bauh. phyt. *gramen* 30. siue *arundinaceum spicatum*: Eid. pin. *gramen arundinaceum* 2. siue *spicatum*: *gramen harvndinaceum minus*.

Gerardi.


Prouenit in locis humidis & paludosis, vt precedens, quamuis non ita copiose.

GRAMEN MAIVS AQUATICVM

LOBELII.

CAP. CXXXIX.

Inter gramina vulgaris notitiae est istud, copioseque reperitur ad aquas & riuos, in Gallia, Anglia, Germania, Italia, & Belgio, potissimum verò in Batavia, vbi etiam secatur, optimo pabulo vaccarum, folia habet pollicem lata, lesquicubitarum, aut cubitos duos longa: culmus quatuor aut quinque pedum altitudine est, panicula miliacea: radix fibrosa.



Synon.

Lobel hist. Belg. p. 6. groot water gras met brede hirs aren.

Eid. ic. p. 4. *gramen aquaticum maius*. Tabern. ic. & hist. *gramen harvndinaceum paniculatum*, wasser riedes gras. C. Bauh. phyt. *gramen* 12. siue *paniculatum aquaticum*: Eid. pin. *gram. panic. aquaticum* 4. siue *Gr. aquat. paniculat. latifolium*: Lolii nomen genus, Tragi: *gram. maius aquaticum*, Lobelii: *graminis arundinacei alia species*, Thalii: *gramen harvndinaceum paniculatum*, Tab. & Gerardi.

GRAMEN AQUATICVM HARVNDINACEVM paniculatum, Tabern.

CAP. CXL.

Descriptio

Radicem agit transfuersam, repetentem, multis fibris donatam: calamos crassos, nodulos,

maiores quam cramen harundinaceum, sed minores, quam Harundo: folia cradini harundinaceo similia, sed maiora & longiora: paniculam haud dissimilem.

C. Bauh. pin. *Gramen paniculatum aquaticum* 1. Synon. siue palustre paniculatum altissimum: *gramen aquaticum harundin. paniculatum*, Tabern. *gramen maius aquaticum*. C. C.

In riuulis & paludibus stagnantibusque occurrunt.

Locus

GRAMEN HARVNDINACEVM ENODE.

CAP. CXLI.

Inter folia bicubitalia, semuncis angustiora, rigida, ex radice fibris validis crassisque fundata, culmus surgit teres, homine procerior, cauius, enodis, nudus, crassiusculus, firmus: in fastigio summo panicula palmo longiores, in tenues spicas desinentes, rubentes, à se inuicem longe interdum distitas.

Tragus hoc cramen ad caput de scirpo reuocat, Scirpique primum genus facit, dicens enim prouertio apud Plautum occasionem dedisse, *Nodum in scirpo queris*. Hoc autem in homines plus arquo anxios & curiosos torquetur, qui illic scilicet scrupulum mouent, vbi nihil est dubitandum. Ceterum Germanice *Bingenheimer* vocat, siue spicaturque eos à veritate non multum erraturos, qui vult Bohr, hoc est, Arundinem syluestrem appellant. Graece *ἄλυστος ἄλυστος* dicendum purat. Arbitratur & Syringiam Plinij. Ab aliis tamen Oxyshenos dicitur, vt in annotatione marginali legitur.

C. Bauh. pin. *gramen arundinaceum* 6. siue *enodemus montanum*: Scirp. 1. genus, Tragi: *Iuncus syluestris*, Lonic. quoad iconem: *Iuncus lychnanthemoides maior*, Thalii: *gramen harvndinaceum montanum*, Tabern.

Copiose prouenit prope pagum Colombier seu *nonrenx*, & in syluis inter *Lure* & *Laumont*: Item tempus in monte prope Krentzach & Leurach, ac in monte Saleux, in dumetis & humidis. Scirpus Tragi in altissimis, asperis & humectis syluis, nec non sub Iuniperorum fruticibus apud Mediomatrices nascitur. Iunio mense coles emittit, qui Augusto flaccescere incipiunt, ac firmi plane & rugosi euadunt: Qua de causa à rusticis mulierculis leguntur, quibus caseos recentes & prahumidos in aëre sicandos imponunt. Sed & ex iis nassa piscatorum conficiuntur.

Scirpus
Trago.Arundo
fil.
Syringia
Plin.
Oxyshenos

Synon.

Locus &

vltus

GRAMEN HARVNDINACEVM ENODE
de minus.

TRago Scirpi genus alterum multo tenuius, breuius, & magis exiguum, Germanis *Schmelen* vocatum.

Thal. Iunci lychnanthetis species media, Iuncus *oxyphorus* tenuis maior dicenda, stylos continens multo tenuiores, teretesque, sed non ita perpendiculari rectitudine, se sustollentes, palmo longiores, breuem & vix vncialem spadiceae ferme coloris spicam exhibentes. Est Brockenbergo familiaris.

Casp. Bauh. pin. *gramen harvndinaceum* 7. siue *enodemus syluestri*.

Ex iis nassa hoc Tragi Scirpo nonnulli pileos,

Scirpus
Trago.Iuncus
lychnanthetis
medius
Thal.Gr. arund.
culm. m.
n. fil.
C. Bauh.
vltus

minis modo, atque ita se ampliat: mascula solida est, foemina inanis: quippe hoc marem à femina distinguunt. Quaedam magnitudine praestantes, atque robustae, ut vicem hastarum praebent. Hæ circa Acesinum amnem oriuntur. Omnis autem Harundo viuax est, atque adusta melius refurgit: itemque stirpe crassa, numerosaque est, ob id mori pericax. Radix ipsa geniculata, quemadmodum gramini: verum non omnes simili modo informantur. Arundo autem geniculata est & corticem habet nervosum macilentumque, radicem geniculatam: perperum viret: à gelu enim torpere minimè potest, vulneraque facile corr. *Et hæc passim ex versione GAZZ.*

Quinque Harundinum (*χαλκίται*) genera, veluti notiora prodidit Dioscorides: In harum genere quædam Nastos, id est, plena solidave appellatur: ex qua sagittæ factitari solent: altera foemina, ex qua tibiis ligulæ conficiuntur. Alia syringias, hoc est, fistulosa, multa carne prædita, (*V. χαλκίται*) geniculis densior, ad librorum scriptionem accomodata. Alia denique crassa, & concava, circa amnes nascens, quæ etiam donax, & à quibusdam Cypria vocatur. Est & alia phragmites, quasi sepimentis idonea, gracilior, candicans, (*V. ἀπολεπτός* aliter λευκός, al. λευκός & λευκός) vulgò nota. Cuius radix contrita, ac tum per se, tum cum bulbis imposita spicula, aculeosque corpore extrahit. Ex aceto verò, luxata, doloris lumborum demulcet. Virentia porro folia rufa & imposita tum cryspelatis, tum aliis inflammationibus medentur. Cortex vltus & ex aceto illitus alopecias emendat. Cæterum paniculæ flos, si aures intrauerit exurdat. Eadem quoque præstare valet quæ Cypria Harundo dicitur.

Plinius, qui ex Theophrasto nonnulla mutauit, lib. 6. cap. 36. multò plures differentias agnouit. Inter ea, inquit, quæ frigidis gaudent, & aquaticos frutices dixisse conueniat. Principatum in his tenebunt Harundines, belli pacisque (belli, ad iacula: pacis ad scribendum) experimentis necessariorum, atque etiam deliciis (ad tibiis usum) gratæ. Tegulo earum domus suas Septentrionales populi operiunt (ob id panniculam tectoriam vocat Plautus in Milite:

Cuius tu legiones distastisti spiritum

Quasi ventus folia, aut panniculam tectoriam,
Turner.

Plaut. in fudente.

Quin tu in patudem is, exigisque Harundines,

Qui perlegamus villam, dum sudum est?]

durantque xuis tecta alta. Et in reliquo verò Orbe cameras leuissimè suspendunt (ex iis camerae fornicisque pergularum quàm leuissimi & minimè onerosi fiunt) Chartisque seruiunt calami, Egyptij maxime, cognatione quadam papyri. Probatores tamen Gnidij & qui in Asia circa Anaticum lacum nascuntur. Nostratibus fungosior subest natura, cartilagine bibula, quæ cauo corpore intus, superne tenui inatrescit ligno: fistilis, præacuta semper acie, geniculata. Cæterò gracilitas nodis distincta, leui fastigio tenuatur in cacumina, crassiore panniculæ coma, neque hac superuacua. Aut enim pro pluma strata cauponarum replet: aut ubi limotiore callo induit, sicut in Belgis, contusa, & interiecta nauium commissuris ferruminat textus (tabularum compages) glutino tenacior, rimisque explendis fidelior picce. Calamis Orientis populi bella conficiunt, Calamis spicula addunt irreuocabili hamo noxia. Mortem accelerant pinna addita calamis.

Tom. II.

Fitque & ex ipso telum aliud fracto in vulneribus. His armis Solem ipsum obumbrant. Propter hoc maxime serenos dies optant: odere ventos & imbres, qui inter illos pacem esse cogunt. Ac si quis Æthiopus, Egyptum, Arabas, Indos, Scythas, Bactros, Sarmatarum tot gentes, & Orientis, omniæque Parthorum regna diligentius computet, æqua ferè pars hominum in toto mundo calamis superata degit. Præcipuus hic vsus in Creta bellatores suos præcipitavit. Sed in hoc quoque, ut cæteris in rebus vicir Italia: quando nullus sagittis aptior calamus (Harundo sagittaria ea vocatur) quàm in Rheno Bononiensis am-

Harundo sagittaria.

ne, cui plurima inest medulla, pondusque (finiendo æti opportunum, voluere: contra flatus quoque pericax libra. Quippe non eadem gratia Belgicis. Hæc & Creticis commendationibus: quanquam præferantur Indi, quorum alia quibusdam videtur natura, quando & hastarum vicem præbent additis cuspidibus. Harundini quidem Indicæ arborea amplitudo: quales vulgò in templis videmus. Differre (de Harundine Epigeio, non de Indica id Theophr. qui masculam solidam esse, foeminam verò inancem, etiam scribit) mares ac foeminas in his quoque Indi tradunt. Spissius mari corpus, foeminae capacius. Nauigiorumque etiam vicem præstant (si credimus) lingula internodia. Circa Acesinen Theophrast. cap. 12. lib. 4. de Calamo tantum id scribit, qui hastæ vicem præstat) amnem maxime nascuntur. Harundo omnis ex vna stirpe numerosa. Atque etiam recisa fecundius refurgit. Radix naturæ viuax, geniculata & ipsa. Folia Indicis tantum breuia. Omnibus verò à nodo orsa, complexu tenues per ambitum inducunt tunicas: atque à medio internodio cum plurimum desinunt vestire, procumbuntque. Latere Harundini calamoque in rotunditatem bina, super nodos alternò semper inguine, ut alterum ad dextra fiat, alterum superiore geniculo ad læua per vices. Inde exeunt aliquando rami, qui sunt calami tenues. Plura autem genera. Alia spissior densiorque geniculis, breuibis internodiis. Alia rariot maioribus, tenuiorque & ipsa. Calamus verò alius rotus concavus (Falsum esse id apertissime ostendit hist. Theophr. de Orchomenio calamo. Plinius hæc mirè perturbat. Lego. Calamus verò alius Orchomenius rotus concavus &c. Quem verò Auleticon &c.) quem Syringiam (Syring. Theophr. Ita porro vocant, non quod utilis sit fistulis, quemadmodum Plinius exposuit, sed quod fistulosus & inanis sit) vocant, vtilissimus fistulis, quoniam nihil est ei cartilaginis atque carnis. Orchomenius est continuo foramine peruius, quem Auleticon vocant. Hic tibiis (Tibias à Barbaris inuentas fuisse tradunt, ideòque in describendis musicis instrumentis, quibus perstrepebat furiosa Bachantium cohors, rectè Catullum dixisse:

Harundo Indica arbor.

Mare Cyprum.

Harundinis delineatio.

Densitas Rarior.

Plinius loquitur.

Syringia.

Orchomenius, seu Auleticon.

Crassior ligno.

Alia differentia.

Donax fruticosa.

Harundo non aqua.

Barbarique horribili stridebat tibia cantu.

Apud Hom. Troiani de suis rebus prosperis læti, sese ut oblectent, pernoctantes in campo tibiis inflant. Olympiad. à Phrygibus inuentas fuisse tradit, vsuque in certamine Marisiam tibia, Apollinem verò cithara, Victorius cap. 10. 30. vtilior, fistulis ille. Est alius crassior ligno, & tenui foramine. Hunc totum fungosa replet medulla. Alius breuior, alius procerior, exilior, crassiorque. Fruticosissimus qui vocatur donax, non nisi in aquaticis natus: quoniam & hæc differentia est, multum prælata Harundine quæ in siccis proneniat. Suum genus sagittario calamo,

SS

*Differentia
à foliis.*

*Arundo
elegans.*

*Adarces,
Plin. nat.*

Characium

Plin. nat.

*Tibialis, f.
re Antioch.
sa.*

*Error quo-
rundam.*

*Plin. na-
turg.*

Zeugma

Bombycia

Plin. nat.

ut dixerimus, sed Cretico longissimis internodiis obsequentique quò libeat flecti calefacto. Differentias faciunt & folia, non multitudine, verum robore & colore. Valida Laconicis, & ab una parte densiora, quales in totum circa stagna gigni putant, dissimiles amnicis longisque vestiti tunicis, spatiosius à nodo scandente complexu. Est & obliqua Harundo, non in excelsum nascentis, sed iuxta terram fruticis modo se spargens, suauissima in teneritate animalibus. Vocatur à quibusdam elegia. Est & in Italia nascentis adarca (calamachne ea quoque dicitur cap. 10. lib. 32. vide cap. 12. lib. 10. Adarces enim est subfalsa concretio, humidis & palustribus locis, sicco celo, spissescens, Arundinis & herbis inhærescens: molli Alcyonio prorsus similis, valde spongiosa, &c. Ex hac Dioscoridis Historia apparet Plinium Adarces naturam non intellexisse, quoniam nec Harundini peculiaris est, nec è cortice comæ nascitur.) nomine palustris & cortice (Harundinibus atque herbis inhærens. Diosc. Ineptè Plinius Adarcen, quæ Salisago est, inter Harundinarum genera commemorat, vide cap. 12. lib. 10. & cap. 10. lib. 32.) tantum sub ipsa coma, utilissima dentibus, quoniam vis eadem est quæ Sinapi. De Orchomeni lacus Harundinetis accuratius dici cogit admiratio antiqua. Characium [Phragmitem ipse vocat cap. 10. lib. 32.] vocabant crassiorē, firmioremque, plotiam (plocimon Theophr.) verò subtiliorem, hanc in insulis fluitantibus natam, illam in ripis exparientis lacus, Tertia Harundo (In sequentibus multa Plinius ex Theophrasto male transcripsit. Apud Theophr. locus est cap. 12. lib. 4.) est tibialis calami, quem auleticon dicebant. Nono hic anno (Nono anno nasci putabant, quoniam eo temporis intervallo lacus augebatur, sed magno errore, Theophr.) nascebatur: Nam & Lacus incrementa hoc temporis spatio servabat, [prodigiosum id esse Theophrastus non ait, sed contigisse circa tempus eius infausti prælii] si quando amplitudinem biennio extendisset [si post imbres frequentes aqua biennio copiosa permansisset Theophr.] quod notatum apud Cheroniam, infausto Atheniensium prælio, & apud Lebadiam sæpe notatur influente Cephisso. Cum igitur anno permansit inundatio: proficiunt in aucupatoriam quoque amplitudinem: vocabantur Zeugitæ [Zeugitin aucupatoriam male Plinius exponit: Zeugiton enim dicebant eam, quæ crassitie & longitudine ad compingenda duarum tibiarum paria & coniugia, in Zeugon idonea & apta foret, ut *Lucianus*, quæ ob strigofam maciem tibiâ dignum sonum non ederet, sed bombum tantum. Apuleius 4. Asini nuptiales tibias vocat Zygiar, quasi iugales, sicut lunonem Zygiar, iugam siue iugalem vocant *in vincula iugalia cura*, ut inquit Poeta. Idem L. 6. Harundinem musicæ nutriculum appellat, lepidè qui dem, sed affectatè] Contra bombyciæ maturius reciproco graciles, feminatum latiore folio atque candidiore modica lanugine, aut omnino nulla, spadonum nomine insignibus [insignes Dal.] Hinc erant armamenta [Tibiar fiebant, quibus canerent. Armamentum licenter Plinius instrumentum vocat: quod Gazam impulit, ut apud Theophrastum parum aptè *Zeugiton* verteret Armamentarium:] ad inclusos cantus [Inclusos cantus dici volunt, qui in theatris aut templis muro circumseptis, vel etiam in privatis ædibus personarent, non autem in aperto ederentur, veluti tubis & cornibus. Al-

lus putat scriptum fuisse Inclusos pro Inclutos, unde factum sit Inclusos. Ennius de Cochle.

Hic datus est occasus Horatius inculca saltem.
apud Festum.]

Non silendo & reliquo curæ miraculo, ut venia sit, argento iam potius cani. Cædi solebant tempestivè usque ad Antigenem tibicinem, cum adhuc simplici musica (Tibia Theophrast.) vterentur, sub Arcturo: sic præparata aliquot post annos viles esse incipiebant. Tunc quoque multa domandæ exercitatione, & canere tibiæ ipsæ docendæ, comprimantibus se ligulis (conniuncti ore linguarum. Theophrastus) quod erat illis theatrorum moribus utilius. (In Theophrast. est quod ad usum exercitationemque canendi utilius fuit.) Postquam varietas accessit, & cantus quoque luxuria cædi ante solstitia, ceptæ, & fieri viles in trimatu, apertioribus earum ligulis ad flectendos sonos: quæ inde sunt & hodie. Sed tum ex sua quâque tantum harundine congruere persuasum erat: & eam, quæ radicem antecesserat laux tibiæ convenire: quæ cacumen dextræ: immensum quantum prælatis, quas ipse Cephissus abluisset. Aucupatoria Harundo à Panthormo laudatissima, piscatoria, Abaritana. [Hæc sunt viginti duo genera: quibus si addas Egyptianum, Gnidium, Anaiticum, Italicum, Belgicum, Creticum, Indicum, supra memorata viginti novem comperies, quot se recitasse ait cap. 11. lib. 24.] ex Africa. Harundinis Italici usus ad vineas (ad earum pedamenta & iuga. Vide varr. cap. 8. lib. 1.) maximè. Cato feri eam iubet in humidis agris, bipalio subactò prius solo, oculis dispositis intervallo ternorum pedum. Simul & corrudam, unde asparagi fiant: concordare enim amicitia. Harundinis igitur genera viginti novem [39. CH.] demonstravimus (pergit Plinius lib. 24. cap. 11.) non aliter evidentior illa natura, quam continuis nostris voluminibus tractamus liquidem Harundinis radix contrita & imposita, Filicis stirpem corpore extrahit: item Harundinem Filicis radix. Et quoniam plura genera fecimus, illa quæ in India Syriaque nascitur odorum vnguentorumque causa, urinam movet cum Gramine aut Apij semine decocta. Ciet menstrua adnota. Medetur convulsis duobus obolis pota, iocinori, tenibus, hydropi, tussi, etiam suffitu, magisque cum resina. Furfuribus hulcerumque manantibus cum myrrha decocta. Excipitur & succus eius, sitque elaterio similis. Efficacissima autem in omni Harundine, quæ proxima radici. Efficacia & genicula. Harundo Cypria, quæ donax vocatur, corticis cinere alopecias emendat: item putrescentia vlcerà. Foliis eius ad extrahendos aculeos vruntur. Efficacius & contra ignes sacros collectionesque omnes. Vulgaris Arundo extractoriam vim habet & recens rufa, non in radice tantum. Multum enim & ipsa Arundinem valere tradunt. Medetur & luxatis, & spinæ doloribus radix in aceto illita. Eadem recens trita in vino pota, Venerem concitat. Arundinum lanugo illita auribus, obtundit aurium. L. b. 12. cap. 10. de Harundinibus hæc subdit. Inter aquatilia dici debet & Calamochneus (Petiocalamitis Galeno, & lunestris calamachne. Vide cap. 36. lib. 16. cap. 12. lib. 10.) Latine adarca appellata. Nascitur circa Harundines tenues è spuma aquæ dulcis ac marinæ ubi se miscent. Vim habet causticam: idè acopis additur contra perfrictionum vitia. Tollit & mulierum lentigines in facie. Ex calami simul dici debent. Phragmitis

Calamochneus.

Arundo aucupatoria.

Harundo Italica.

Harundo in garris.

India Syriaque vnguentorum causa.

Alpecurus.

Lanugo.

Calamochneus.

Vitis caustica.

mitis (ad sepes faciendas utilis ob crassitiem & firmitatem. Eum esse voluit, quem ex Theophr. loco proxime citato appellavit *χαρὰν*.) radix recens tula luxatis medetur, & spinæ doloribus ex aceto illita. Cyprij verò, qui & donax vocatur, cortex alopecij medetur, & vlcibus veteratis, folia extrahendis quæ infixæ sint corpori, & igni sacro: panicula flos, si aures intrauerit, exurdat.

Ceterum conuenit hoc in loco obiter monere quoddam nomine Calami iam sapientis nominati, differens habeatur autorum significatio, attestantibus id verticulis subsequentiis.

Virgil. Egl. 1.

Aut hu ad veteres Phagos cum Daphnidis Arcum Eregisti & calamas.

Aristob.

Vulgus fuit gli alteri à quella banda Ond'era usito il calamo humida.

Mart.

Dat chartis habiles calamos Memphis cellas. Texantur reliqua tella palude tibi.

Idem:

Nabula decipitur calamis, & veribus ales.

Hoc enim in loco Cechinus intelligit per calamum primo loco Cannam siue Harundinem scriptoriam: secundo loco piscatoriam: Accipitur & pro fistula:

Virgil.

Tu calamos inflare leues:

Propria tamen *καλαμ* significatione Arundo siue Harundo, planta communiter ad amnes nascentis intelligitur. Græcis autem *καλαμ* & *καλαμ* *αἰσέδου*, ut vult Etymologus, dicitur. Arab. *Casab*, & *Hafab*: radix *Ofel nichafab*. Gerin. *Rohr*, *deefriedr*. Belg. *Riet*: Gall. *Rosier*: Ital. *Canna* à *far sieppe*: Hesp. *Cannu*. Angl. *Reede*: Boh. *Trest*.

ARVND VVLGARIS PALVSTRIS.

C. P. CXLIV.

Descriptio VVlgaris Arundo oblique geniculatam agit radicem, nouos subinde furculos, oculisq; continuo auctu protrudens, ex quibus culmi surgunt hominis altitudinem æquant, aut altero tanto maiores, minimo digito tenuiores, geniculati, inanes: ex quorum nodis lingulis teret, culmum inuoluentia folia excut, rigida, & aspera nonnulli, vncias duas lata circiter, cubito longiora, venosa, scapus summus in comatam mollem purpurascetem iubam, tandem villosiorē mol-



lioremque coloris cinericei redditam, natabundam effunditur, quæ ventis ludibrium debens si-

Tom. II.

ne feminis spe abripitur, glumis videlicet cassis contenta.

Matth. in Diosc. Arundinis Cyprij titulo olim posuit figuram quæ minus placebat eâ, quam in com. cum mag. fig. Lat. & Ital. nomine Arundinis palustris ac etiam (perperam tamen) pro Calamo aromatico exhibet.

H. Lugd. p. 100. Arundo vallatoria Dodonæ: Item Arundo palustris Matthioli. Dux vnius stirpis figure.

Geln. de coll. stirp. Arund.: Eid. hort. Arundo alia: Turn. Hort. Lut. & Lob. Adu. Arundo vallatoria: Lon. Arund. aut Calamus: Matth. & Tab. Arundo palustris. C. Bauh. pin. Arundo in dora 1. & Arund. vulgaris siue *φραγμις*, Dioscor. *καλαμ* *αἰσέδου*. Theophr. Lob. Obs. Arundo vallatoria. Phragmites Duf. Ruell. Corn. & Dod. Lat. *harundo* *phragmitis*. Amato, *harundo* *vallaris*: b. *harundo* *vallatoria*, Dod. Gall. Thal. & Gerardo: *harundinis* *gignus*, Trago. Calamus siue *harundo* *vulgaris*, Cordo in Dioscor. Calamus siue *harundo* *gracilis*, Cæf. Calamus Arundo vallatoria siue Phragmites Lob. Ic. plant. pag. 51. Canna secunda, quæ femina Diosc. Anguill. epist. 4. dicitur etiam Canna *sepiaria*, *καλαμ* *αἰσέδου*, Calamus vallaris, *harundo* *sepiaria*, *harund.* aut *calamus* *characias*. Theophr. & *canna* *vallatoria*.

In maritimis & locis palustribus passim obseruauit gener Cherlerus, sed speciatim inter Balerucanas thermas & lacum maritimum, ex fossis vdis & irriguis excerpit. Nascitur in aquis residibus, veluti in vrbium fossis, & circa fluminum laxiorum ripas: Iuba sub finem Æstatis excunt.

Ceterum quod ad facultates attinet, Calami Phragmitis, inquit Galenus, radicem cum bulbis, aculeos, & stipites ex alto extrahere quidam scripsere, ceutrahendi quædam vis ei inesset, nos tamen eius rei periculum non fecimus, verum, quantum gustu liceat conicere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeque acrem. Quin etiam folia ipsa abstergentis sunt facultatis: cortex verò eius combatus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiunctum habens absterforium quiddam, ut exsiccat & excalfaciat terro quodammodo ordine, plus tamen desiccat quam excalfaciat. Vitandus est eius flos, quem *αἰσέδου* vocant: nam si in aures incidat, adeo tenaciter adherens efficitur, ut auelli non possit, auditumque vitiat: quonobrem sapissime exurdat. Reliquas vires ex Dioscoride, Plinioque lege antè. Nobis (teste Trago) ad varia nostra Arundine vi licet. Sunt enim qui recta sua hisce contarciant, ut interim textores prætereant qui nonnulla pro filis glomerandis instrumenta ex illis conficiunt. Cortex vltus, ut videre est apud Tabern. maturat & repurgat, sicut & folia, quæ admodum sunt frigida & sicca. Radix in aqua aut vino decocta & e-pota mentes & vrinam citet, atque stranguriam ineditur. Hoc verò decocto si caput laueris, furfures emendabis. Æstare verò huiusce foliis conclauia consperguntur, in quibus ægri decumbunt, qui febribus ardentibus laborant, quod ær corrigatur, frigidiorque reddatur, atque patientes resocillantur. Recentia potro contusa & imposita erysipelati commodant, tumoresque scroti discutunt. Radix in subtilissimum puluerem trita, fistulis & vlcibus inspersa prodest. Sed & aceto vini in vnguentum commixta, enit dolorem luxatorum. Si barba alicui defluerit, & Cicer. Harund. vnc. j. Ciner. ranar. vltar. drach.

Sf 2

Matth. n. 1.

Locus.

Tempus.

Vires & vltus.
ex Galeno
Radix.

Folia
Cortex
bustus.

Flos
tandus.

Arundo
germ.
Eius vltus.

Cortex
vltus.

Radix
mō
set
nam
est.
Furfures

Febres.
Erysipelas.
Fistula.

Barba
de
flua.


Euseb.

Hæmorrh.
Euseb.Variolarū
Euseb.Sudorem
monet mo-
dula.Succus ff.
furacul-
lorum fa-
nat.Panis ex
radicib.Salem pro-
bat.

vij. sem. Eruc. drach. v. sem. Vrticæ drach. iij. Pul-
ueriscentur subtili modo & suffic. q. ol. Laurin. F.
vng. quo pars calua illinatur. Radices minutim
incise, & vel solæ, vel cum capis contusæ, ac in-
stat emplastri administrate, sagittas, aculeos,
spinas, & clauos extrahunt. Sola etiam contusa
cum melle in emplastrum redacta, si imponatur,
spicula quæuis & globulos extrahit. Contra ve-
nenatos ictus, ne sc. cordi venenum incommo-
det. 2. Rad. Harund. vnc. ij. Rad. Aristoloch.
3. j. Sem. linap. 3. semis. Capar. tost. num. ij. Ster-
cor. columb. vnc. ij. Omnia simul cum melle in
Emplastrum rediguntur, & bis in die imponun-
tur. Cinis corticum naribus inditus hæmorrhagi-
am sistit: cum aceto vero aut adipe Leonum,
aut utroque simul combinatus, illitu alopeciam
sanat. Radix in oleo communi incocta si per-
coletur aliquoties in die & parum auribus instil-
letur, dolorem eorundem sedabis. Contra vario-
larum relicta vestigia 2. Succ. expressi rad. Ha-
rund. seui asin. & mellis an. part. æqual. vel q. s. f.
vngt. quo maculæ illinantur. Recentis Harundi-
nis medullam contundito, eademque sinciput
& pedes illinito, tæque lectui committito, opti-
meque contregito, quo potenter sudorem prouo-
ces. Succus Harundinis fissuras labiorum & lin-
guæ sanat, si cum melle permisceatur: & sæpius
illinatur. Harundinum radicibus, ex autoritate
Aduers. tuis, arefactis & in farinam molitis e-
riamnum hodie nonnullæ gentes panem non in-
suauem conficiunt. Quin etiam gramineo est
sapore etiam nostratis Arundinis radix. Vmbri-
nopia salis naturalis ex Arundinibus vitione sa-
lem conficiebant, quo loco naturalis utebantur.

ARVND MAXIMA ET HORTENSIS. CAP. CXLV.

Descript.



STUDIOSÈ in
Svarios vsus
colitur Hort-
entis dicta
Arundo, mul-
tò maxima,
hastam lon-
gissimam æ-
quans, cala-
mis pollice
crassioribus,
validis, canis,
crebrè geni-
culatis, hauef-
centibus: co-
mosa iuba &
folia vallato-
riam imitan-
tur, maiora.
Radix longè
latèque sub
terra vagatur,

tuberosa, cuius teneri turiones cum grata dulce-
dine citari possunt.

In hortis colitur. Ego propter latitudinem fo-
liorum aliquando Papyrus esse suspicabar: nunc
verò cum Anguill. Donacem statuo.

Donax.

Arundo
vallatoria
Mart.

Matth. sibi persuadet esse Arundinem vallato-
riam. Fiunt, inquit, ligulæ tibiartum ex commu-
ni hac arundine Dioscoridi vallatoria nuncupa-
ta, quæ nostri in viridariis, ac hortis in topiariis
extruendis vtuntur ac palos viribus apulissimos
efficiunt. Quod autem vallatoria sit hæc nostra

communis mihi aliquando dubitandi præbuit
ansam Dioscorides: quippe qui dicat, cam esse
gracilem, cùm tamen communis nostra sit cras-
sior. Verùm cùm postea inuenerim Theophras-
tum crassiorē vel vallatoriam nominare, facile
sum ad credendum inductus Dioscor. hunc locū
esse deprauatum. Hæc ille, qui in com. cum mag.
icon. Lat. & It. habet iconem nomine Arundinis
domesticæ, quam pro suo more posuit pro ca-
lamo aromatico, olim posuerat aliam iconem
pro calamo aromatico, qualem etiam posuerat
pro Arundine, quæ Arundinem palustrem expri-
mere videbatur, hinc apparet quanta fides habenda
Matthiolo in plantis peregrinis ac etiam vulgari-
bus, is sapiens ad descriptiones plantas pingendas cu-
ravit.

Arundo
domestica.
Matth. cap.
viii.

Tabern. Hist. & Icon. Arundo domestica, Græ-
cè Διραξ & ῥα, quæ ῥύρεως, Arundo Cypria, Ha-
rundo domestica, hispanica, Canna hispanica,
Hispanischriedt/ Hispanischrohr & Zamrohr:
Item calamus aromaticus. Tabern. habet ico-
nem Matthiolinæ similem, & postea Matthiolū
imitatus ponit iconem non differentem pro ca-
lamo aromatico, ex quo apparet quanta etiam fides
adhibenda sit Tab. dicenti se vidisse verum calamū
aromaticum: verum hoc non nouum apud Ta-
bern. & alios qui pro suis venditare solent, quæ
non sunt, & miscere ac confundere plantas si-
mularèque se vidisse quæ non videntur.

Tabern.
proh.

Gerard. Harundo Cypria, Cypresse can. Et Gerard.
alibi, calamus Aromaticus. Gerardus sequitur
figmentum Matth. & Tabern. & pro calamo aro-
matico proponit plantam quam posuerat pro
harundine Cypria.

Casp. Bauhin. pin. Arundo inodora 2. siue Arundo
satina, quæ Διραξ Diosc. & Theoph. Arundo Mat-
thiol. Lac. Cast. Annica Ruell. Arundo dome-
stica, Matt. Lugd. Tab. Arundo Cypria, Dod.
gall. Amat. Ger. Canna quarta, quæ Donax,
Ang. Arundo magna, Gesn. hort. Italica maior,
Cam. Arundo donax siue cypria, Dodon. Arundo
donax satina, Lob. Ad. Obl. p. 28. Ic. p. 31. Cala-
mus siue Harundo crassa, Cels.

Synon.

Ex vsta huius radice Arabum spodium para-
tur, tamen si vt non necessariū, ita non magno in-
commodo. Ex hac Romæ sunt & Colus mulie-
rum, & vinearum ridentiæ: in Gallia sepes.

Vlt.

ARVND, PAPYRVS QVIBVS DAM, folio latissimo denticulato. CAP. CXLVI.



PAPYRI no-
mine, fra-
gmentum ru-
dis nec dum
elaborati fo-
lii, quale ad-
seruo, descri-
ptū exhibeo:
latitudo est
quatuor un-
ciarum, lon-
gitudō quan-
ta fuerit, non
queam certò
affirmare:
crassities triū
quatuorūq; fo-
liorum chartæ
nostræ: textu-
ra fungosa pe-
dicu-

Descriptio

diculorum Nymphaeae, fistulis similiter directis, membrana utrinque striata, mediocriter levis costis, folii margines obiter denticulati, nihilque secus medium percurrentem exemptilem costam denticuli quidam amant.

Arundinis huius peregrinae & pulcherrimae portionem dedit Pharmacopaeus Paravinus ad aquilam, cui congener videbatur Arundinis maxime.

ARVNDO ANGLICA FOLIIS IN SUMMITATE dissectis C. Bauhini.

CAP. CXLVII.

Arvundo indota 3. l. ut vocat Auctor in pin. Angl. (ut in procl.) Arundo 2. siue Anglica foliis in summitate dissectis: foliis est cubitalibus, duarum partiumve vinciarum latis, nervis ad quatuor per totam longitudinem excurrentibus, & c. Arundinis foliis in summitate in duos, tres, & quatuor apices divisissimam Di. Gargillus & Anglia mittit.

ARVNDO SCRIPTORIA.

CAP. CXLVIII.

Illustris D. Carolus Rym. ab Eckenbeken, notissimus Gandavensis, vir doctus, ex legatione ad Solimanum magnum, Caesaris Maximiliani nomine reuersus, inter alia multa peregrina Constantinopoli relata, calamos aliquot mini (Lobel.) communicavit Arundinis scriptoriae, cuius etiam nomen hodierna die ad scribendum usus est Constantinopoli & in Graecia. Crassiores hi calami non sunt asperius aut olivaceis penus, praeduri, coloris rufi, exstinctius obscurioris, laevore polio veluti splendentes, intus albi, in altis fistiles, ubi rumpuntur: inter nodia nodantalia aut pedalia, articulis adnascuntur alia ligulae, Lob.

Lob. plant. icon. p. 31. *Fistula vel Stringa* & *Arundo scriptoria*. Edl. pin. hist. Belg. p. 71. Riet em te schrienen. Anguill. epit. 4. *Canna* 3. *Calamph* scriptorius ap. Syringa: Tabern. icon. *Canna* 3. *Calamph* scriptorius. Schreber nect. / Schreber. Hist. *arundo scriptoria*, *arundo* 6. *Edl. pin. hist. Belg. p. 71. Riet em te schrienen.* Gerard. *Arundo scriptoria* Thuretic witten Kerde.

C. Bauh. pin. *arund. indota* 4 siue *arundo scriptoria* 6. *Edl. pin. hist. Belg. p. 71. Riet em te schrienen.* Theophr. *Syringia fistularis arundo* 3. Dod. gall. *Arundo fistularis* Amati.

ARVNDINIS SCRIPTORIAE INDICAE GEMMIS spadiceo colore.

CAP. CXLIX.

Indica Arundinis nomine, calamos concavos asserunt, scriptoriae affines, ut qui in cum utrum politer aptari possunt, quemadmodum periculo facto me docuit experientia: internodia dodrantalia: crassitudo quae vallatoris nostrati: color foris spadiceus siue rufus, intercurrentibus subinde maculis albicantibus, polio laevioris, intus albi: parietes quam in Phragmite crassiores, assulose franguntur.

Tom. III.

ARVNDO NASTOS SIVE FARCTA crassa & maior.


CAP. CL.



Lob. Ad. ic. p. 51. & Hist. Belg. p. 71. *Arundo Nastos* vel *farctus* Theophrasto: T. bern. icon. & Hist. *Nastos* 3. *pfeilrohr*. Edl. & *Arundo* 5. C. Bauh. pin. *Arundo indota* 5. siue *arundo farcta maxima* arundinis, qua Principes pro suspicionibus videntur & c. Dioscoridi, & Theophrasto. *Canna indica*, aliis quibus *Papyrus*, Matth. Ital. *Canna* prima species Diosc. Ang. *arundo indica* & *seprima*, Dod. gall. *arundo indica*, cum teres sit, *Papyrus* Antiquorum non recte statuitur, Guiland. *plumus*, *Papiri* Aegyptiae genus, Amari. Nestle, vel *farcta*, Lob. icon. *tertia*, Tabern. *Nastos* *Crispi*, cetera.

ARVNDO NASTOS SEV FARCTA TOXICA figurata.

CAP. CLI.



Hanc videre, nobis contingenda. Edl. Cl. Dom. Placetum, cum etiam fistula palamari liberali nos dominant in mu. Siquipedalis est baculus, utrinque testis, ut nequaquam integrum esse facile scit animadvertere, enodis, crassitudine vix in eum medio eius, feratis impressionibus eleganter

donatus, quae tertia eminentiores reliqua partes saturatiores, ac fere spadiceae, laeves, superficiei rebus lucentes. Reliqua pars peridiot est. Tota quoque zonulis nigris densa et tunc politis cincta est. Lignosa alioque eius est substantia ac inaequalis circa medullam sedens quae longitudinem poro: Odorem nullum in sicco & evanido fustulo prehensimus.

De Arundine Nasto Lobel. hac scribit: Scopus Antaeopix & alibi hercatores quodam, qui pro

Arundine

Upione videntur Arundine quadam pulcherrima, crebris geniculis distincta, admodum sarcta, lignosa, dura, recta, laevi, micante, rufsa, colore spadiceo & obscuriore secundum longitudinem variegata, discursantibus hinc inde lineis crispis, denticulos latera figurantibus, aspectu pulcherrimo. Et hanc & precedentem, pulchritudinis, raritatis, leuitatis, commoditatisque ergo argento consueuerunt circumdare. Crassissima aqua Arundinem quæ Donax nuncupatur. Vtramque nobis communicauit, nostri rerumque exoticarum & stirpium studiosissimus Iohannes Douue, alias Vogellanck, ciuis Antuerpiensis.

Synopsis

Lobel. Icon. pag. 53. & Hist. Belg. p. 72. *Indi-
nisch Diet / Nastos* siue *Arunda altera* Toxicæ, cre-
bris geniculis cincta, quæ etiam pro scipione &
iaculis vruntur. Tabern. Icon. *Arunda farcta*. *Can-
na* siue *calamus sagittalis*, *Indi nisch gesüle*
Nohr / pfeilrohr. Hist. pag. 703. *Arundo farcta*
seu *Nastos*. 1. *Arundo* 3. Diosc. *αἰσος*, *ῥαῖς* *αἰσος*
αἰσος: Theophr. *ῥαῖς* *αἰσος* *αἰσος* *Calamus farctus*, *Ha-
runda farcta*, *calamus coxigus*, *Harundo toxica*, si-
ue enodis, *Canna farcta*, siue *sagittalis*. Casp. B.
pin. *Arundo inodora* & siue *Arundo farcta* geni-
culatæ siue *sagittalis*: *Nastos* & *Arundo prima*, Dod.
gall. *Nastos* siue *farcta altera* *toxica*, Lob. icon.
Arundo farcta seu *Nastos*, Tabern. *Calamus sa-
gittalis* Ger. In Bali Insula, gestant *Cannas sa-
gittuomas*, ex quibus ceteros exilésque sagittu-
las ex Arundine fabrefactas [an ex prædicta a-
rundine:] in apice vero intoxicatas, efflant: in
in hist. Ind. Orient. part. 4. 39.

Am. Canina
sagittato-
rus infula
Ratze

Ad Ha-
runt. Verfe-
colori

Ал Навин-
до дивина.
гери инс-
галогит,
гери Тар-
вагит
Синхис?

An Harundines versicolores, quibus, referen-
te Chr. Columb. navig. cap. 94. in contignatio-
nib.edium Canibalarum pro trabib. utebantur,
mira arte textis complicatiquē.

Anhanc Arundinem intelligit M. Paulys Vener. l. i. de regn. Or. cap. 5. Chinchis Tartarorum Rex (cum castra posuisset in planitie quadam magna Tanduc nomine, proficiscens hostili animo contra regem Vncham) praecepit Incantatoribus & Astrologis suis, vt illi indicarent qualem eventum praelium futurum esset habiturum : Tunc Astrologi sciendentes Arundinem per longum in duas partes, posuerunt diuisiones ipsas in terram, vnamque vocauerunt Chinchis & alteram Vncham, dixeruntque regi. Interim quo nos inuocationes legerimus Deorum, nutu ipsorum fiet, vt hae duae partes Arundinis ad inuicem pugnent. Et cuius pars super alteram ascenderit, ille Rex victoriam in praelio obtinebit. Multitudine itaque ad spectaculum illud concurren- te, ceperunt Astrologi murmurare precatio- nes suas & legere incantationes, & mox commo- te sunt partes Arundinis contra se pugnantes, donec tandem pars Chinchis ascenderet super partem Vncham. Quo viso, Tartari de futura certiores facti victoria, confortati sunt. Tertia igitur die praelium commissum est, & multis v- trinque cadentibus, victoria tandem penes Chin- chin remansit. Sicque factum est, vt Tartari re- gnum Vncham penitus subiugarint.

Am Harms-
do quinde-
cimo p. 150.

An eadem cap. 65. Arundo quindecim passus in longitudine habens, & in spissitudine tres palmos: ex qua fiunt columna, tabula, & compagine, itémque imbricamenta. De hac Harundine idem lib. 2. cap. 36. hæc scribere videtur. Nascuntur in regione Tebeth: maximæ Harundines, quæ habent in longitudine passus quindecim: crassitudo verò in gyro tribus mensuratur palmis. Porro inter duos viciniore. nódos distantia est trium palmorum. Itaque quando via-

tores noctu volunt quiescere ; accipiunt fascēs magnos de illis Arundinibus & in vnam ponunt congeriem, subiectoque igne succendunt : quā igne correptæ incipiunt crepitare , rursusque in eis excitatur stridor, & fragor, vt eminus ad aliquot miliaria audiri possit, quem terribilem tonitruum animalia cum audiunt, obstupeſcunt , fugiuntque tamdiu, donec crepitus ab auribus eorum euaneſcat, illisque sic elusis mercatores & viatores tui petraſcant provinciam illam. Porro equi & alia iumenta, quibus mercatores preſtinere vtuntur, hoc audito ſtrepitu plurimum inhorreſcunt, & multa in fugam conuerſa dominis ſuis elapſa ſunt : ſed prudentiores viatores pedes eorum compedibus ligantes, vi ſecum ea retinent, ne territa auſugiant.

Ad auct.
la^{te}ra
ganda

An tandem c. 59. de eadem hæc reperit: in flumine quodam magno ciuitatis Singui canabeis funibus non vtuntur in nauigiis, nili pro malo & velo, sed pilorchas seu chordas faciunt de Arudinibus magnis, quibus naues quandoque per flumen trahuntur. Scindunt autem Arundines illas magnas quæ quindecim in longitudine continent passus, & scissuras colligantes, & contorquentes, funes longissimos faciunt, vt quidam longitudinem contineant trecentorem passuum. Et sunt pilorchæ illæ fortiores funibus canabeis. Cæterum, remis & malo nauis harundinea vtuntur circa Calcut. Harundo atque & teliloco succedit miliribus vrbs Indie Tayanari. In Insula Zaylon lanceæ, acenis gladiisque vicem supplet Harundo. An de prædicta Arundine sunt iam dicta intelligenda:

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

Major R.
 Capt. R.
 Lieut.
 Tels.
 Ensign

ARVND0 NASTOS SEV FARCTA,
 huc Toxica, gracilis & plicatilis.

CAP. CLII.



A Ntonius
AbAchio-
le | auctor est
Lob. Belg.
Cayro Aegy-
pti reuersus
inter alia ra-
ra, pulchram
attulit. Arun-
dinem, gracilem,
plicatilem, quæ ad-
uedta diceba-
turex Ori-
entali India, per
Adem & ma-
re rubrum, Si-
donem [Belg.
Ziden] prò-
pè Mecham,
& tandem
Cayrum &

Dealing

Alexandriam Aegypti. Recta est, laevis, splen-
dida, coloris lutei, lignosa, dura, farcta, haud se-
cis ac illa quae pro scipione est, crassitudine ca-
lami aromatici, aut Arundinis scriptoriae: gen-
cula duodenis, terdenis & quaterdenis pollici-
bus inuicem distant. Superficies squammata ser-
pentium dorsum aemulatur: nec odorem, nec su-
porem habet vllum, non magis quam farcta
quae pro scipione usurpatur: cuius vtriusque nec
radicem, nec folia vidimus.

Lob.

Synon.

Lob. Icon. plant. p. 53. *Nastos plicatilis*: Eid. Hist. Belg. p. 72. *Nastos* seu *farcta* siue *toxica*, gracilis & plicatilis, Anguill. *Epil.* 4. *Canna* (siue *Arundinis*) species tradita a Diosc. ex Syria allata gracilis & solida, & hac *Nastos* dicta. Tab. icon. *Nastos* siue *Arundo farcta* 2. *Indianisch* *gefule robr* *Robr* *gefule* mit *maref.* Eid. hist. *Nastos* 2. siue *Arundo* 4.

C. Bauh. pin. siue *arundo inodora* 7. siue *Arundo farcta* *Haua* *2107* *2108*, *2109* *2110* Theophrasto. *arundo summa* & *secunda*, Dod. call. *Nastos* seu *farcta*, siue *toxica* gracilis & plicatilis, Lob. icon. *Nastos secunda*, Tab. *arundo farcta* 4, 6 cr.

ARVND INDICA HUMILIS, RARA, AC inulitata.

CAP. CLIII.

Descriptio

QUæ hîc loco depicta est *Arundo*, *Calamus* & *lumi* sparsus, graminis modo, quod de *Arundine* epigeio prodidit Theoph. cortice fulvo contentus, lineis squamatis cingentibus distinctus, cauliculos alios multos utrinque producens, densa congerie stipatos, simili cortice, similiterque squamato virgatos, qui rursus & alios gignunt, prominentium veluti nodorum aut oculorum modo exertos, plures superiore parte quâ terram non attingit, pauciores inferiore quâ terræ insertitur, aspectu pulcherrima, densissima illâ tenuium cauliculorum furculorumque congerie, cum ceteræ *Arundines* folia tantum hinc inde mittant, nullos autem præterea vel furculos vel calamos: folium nostræ *Arundinis* simile a nodis exoritur, sed numerosius magisque multiplex, & plures complexu inuolucrorum per ambitum tunicas inducit. Hæc *Arundo* paucula in facies magnis *Costo arabico* & *Zinzibere* plenis aliquando reperta, veluti rara ac inulitata, hic doctis & rei herbariæ studiosis spectanda proponatur, inquit Author Hist. Lugd. qui *Arundinem* epigeion p. 1060 inscripsit.

Synon.

Gesl. hort. dicitur *Arundo humilis*: Item *Copia elega* *Ollingeri*. Suspiciatur autem *Copia* vocabulum esse corruptum, ac pro eo legendum *Canna*, idest, *Arundo*. De hac *Plinius* lib. 16. cap. 36. per obliquam *Arundinem*, non in excludatam nascentem, sed iuxta terram fruticis modo se spargentem, suauissimam in teneritate animalibus, à quibusdam *Elegiam* dictam, locutum fuisse arbitrat. Non interim negat posse *Chamæcalamum* appellari.

C. Bauh. pin. *Arundo inodora* 8. siue *Arundo repens*: Casl. *Arundo* 3. in maritimis.

ARVND INDICA VERSICOLOR.

CAP. CLIV.

Canna de Bengala Lusitanorum

Canna de *Bengala* *Lusitanis*: in Regno *Bengala* crescunt *Arundines* versicolores, medullâ plenæ, crassitudine *Arundinis* *Hispanis* similes, paulo tamen tenuiores: virides adhuc lentæ inflescentur, ad stamni modum, aut instar *Salicis* foris punctis versicoloribus notatæ sunt, haud secus ac si arce ita pictæ forent. Vrantur iis in *Lusitania* mulieres vetulæ pro *scipionibus*, quibus gressus titubantes sustinent, quarum varia genera apud Doct. *Paludarium* videre est in hist. Tom. II.

Ind. Orient. part. 2. c. 18.

C. Bauh. pin. *arundo Indica* 3. siue versicolor.

Arundo Ind. versicolor C. Bauh.

ARVND INDICA VERSICOLOR flexilis.

CAPVT CLV.

Rora vocant in *Bengala*, aliud genus eiusdem *Arundinis*, quod gracilius & luccinctius est, viminis ad modum flexilis, ex quo *Calathi* & alia multa pulcherrima conficiuntur: ex Hist. Ind. Orient. part. 2. c. 18.

Casp. Bauh. pin. *arundo Indica* 4. siue versicolor flexilis.

Arundo Ind. versicolor C. Bauh.

ARVND INDICA PVNICEA MOLLIS.

CAPVT CLVI.

Aruno, vel *Scirpi* potius genus, puniceæ coloris & mollis, quam parumper contortam, arcui pro sternio adaptant: nascitur in Regno *Congiano*, & in regno *Bengala* ad *Gangen* fluvium, Hist. Ind. Orient. part. 1. cap. 5.

C. Bauh. pin. *arundo Indica* 5. siue *punica mollis*.

Arundo punicea mollis C. Bauh.

ARVND INDICA VOLVBILIS.

CAP. CLVII.

Aruno *Indica* in insula *Sumarra*, varietate circa arbores vinciens, centum, ducentarum, imò trecentarum, & plurium *Oryzorum* longitudine, ita ut vix eius origo finisve deprehendi possit, circulis vasariis conficiendis, valde accommoda: ad Clusij curas poster.

C. Bauh. pin. *arundo Indica* 6. siue *volubilis*.

Arundo Ind. volubilis C. Bauh.

ARVND INDICA FLVITANS.

CAP. CLVIII.

Tumbas siue *Arundinetæ* fluctuantia in *Bah* insula: in Hist. Or. Ind. part. 3. cap. 2. & 40. & part. 4. fig. 10. pinguntur. *Arundines* longæ seu *Algæ* in salo fluctuant, part. 5. Ind. Orient.

ARVND INDICA LATIFOLIA.

CAP. CLIX.

Hic primum vnus, deinde plures stolones ex eadem radice prodeunt, cubiti vnus, interdum duorum aut trium altitudine, digiti crassitudine, geniculatæ *Arundinis* modo, quos circa genicula ambiunt folia multa, ampla, transversis hlis nervosa, foliorum *Muscæ arboris* specie, sed tenuia, herbaceo virore pallescencia, & in extremo acuminata, quæ cum primum erumpunt characeorum corniculorum modo conuoluta conspiciuntur, & gustata herbaceum quoddam saporem referunt primum, qui paulo post nonnihil acrimonie admixtum habet. In summo caule sunt flores, gladioli floribus formâ similes, coloris

Descriptio

re pherniceo pulcherrime nigrantes, capitulo cui-
dam hirsuto inhaerentes, quod cum flore non-
dum aperto cancri seu locustae marinae chelam
quidam tenus representat, floribus dilapsis aut
marcidis, capitula ista augentur, fiuntque trian-
gula, & veluti spinosa, fructus ricini modo, in
quibus semen per maturitatem fuscum & attum,
rotundum: radix nodosa, crassioribus fibris stipa-
ta, ex cuius nodis aliis adnatiscentibus radices a-
liar procurantur, matri similes, inquit author
Hist. Lugdunen. duas effigies proponens. Est
autem *Arundo*, seu *Canna indica* nominata, quo-
nam ex America primum delata fuit, & eius sto-
nes Cannarum seu Arundinum ritu genicula-
ti sunt, à nonnullis quia eius flos nondum aper-
tus cancri chelas colore & forma refert, flos can-
cri, ab Hispanis & Lusitanis *Cuentas*, à numeran-
do quod ex istius fructu, ut ex tenellis & deci-
mus malis Arantii, sphaerulae precatoriae fiunt, ab
aliis *cannacorus*, ambigue inter Cannas & Aco-
rum natura.

Synonyma Casp. Bauhin. pin. *Arundo Indica* 9. siue *latifolia*:
Canna Indica, Gelin. hort. Clus. Hist. [cui & flos
cancri nonnullis] Cam. Cae. *rubra* Eyst. *A-*
runo Indica florida, Adn. Lob. & *Cannacorus* quo-
rundam. *Papyrus*, Cast. *cladiolus Indicus*,
Cam. ad Matth. *Arundo* seu *Canna Indica*, Lögcl.
Arundo Indica latifolia siue florida, Tab. *Harun-*
do florida, Ger.

Locus. In Lusitaniae monasteriis quibusdam frequen-
tem vidit Clusius etiam media hyeme flo-
rentem. Hodie multis aliis in locis feritur & co-
litur à rei herbariae studiosis in hortiis, aut li-
gnetis doliis, ut soli meridiano facilius exponan-
tur: quoniam calore & apicatu valde gaudet,
aliosque planta borea flatu & frigore maxime
laeditur. Huius folia esse putant, quibus massas
gummi elemi obvolutas videmus in Septauiis.

ARUNDO INDICA LATIFOLIA, FLO- re luteo punctato.

CAP. CLX.

Descriptio.

EX radice nigricante, nodosa, & fibris cras-
sioribus donata, aliisque nodis adnatiscentibus,
caules plures sesquicubitales, crassi, Arundinis
instar nodosi, prodeunt, circa quos folia pallide
viridia, expansa, lata in acumen desinentia, ner-
uosa & tenuia: quae cum primum ante caulum
exortum nascuntur corniculorum chartaceorum
modo convoluta existunt. Cauli, flores gladioli
floribus forma similes, coloris lutei, punctis as-
persis variegati, capitello hirsuto inhaerent,
quod flore delapso augetur, subasperum fit, & se-
men nigrum subrotundum continet. Hae ut o-
mnibus suis partibus, ita & semine minor est
quam ea quae florem nudi coloris habet.

Synonyma C. Bauh. prod. *Arundo* 3. Eid. pin. *Arundo Indica*
10. siue *Arundo Indica latifolia* flore luteo pun-
ctato: *Canna Indica* lutea rubris maculis puncta-
ta, vel flore croceo guttato, Eyst.

Locus. Hanc in horto habet C. Bauhinus, in olla co-
lit, hyberno tempore in cellam repo-
nit, quae primo vere plures cau-
les, antiquis relictis, pro-
fert, & iulio mense
floret.

GRAMEN LONGISSIMUM,

CAP. CLXI.

DVorum, triumve cubitorum altitudinem no-
nunquam superat, foliis & caulibus tenuibus,
triangularibus pluribus, ex radice crassiuscula
perenni, nigricante, fibrosa, panicula parva, vix
viciales, in aliquot veluti paruas spicas diuisa:
flosculi ex apicibus luteolis: sapor nullus an-
ignis.

C. Bauhin. Phyt. *Gramen* 15. siue longissimum à
fratre Io. Bauhino ostensum. Non inuenio hu-
ius in pin. Casp. Bauhinum meminisse, nisi sit
eius *Gramen paniculatum montanum* 4. siue
Gramen sylvaticum paniculatum altissimum, pro
Gramine 14. in prod. descriptum, de quo alibi.

In montibus circa Genuam cubitum exce-
dit: Montbelgardi in sylvis duos & tres cubitos,
In Suringia repertum in dumeto cum paruis pan-
niculis brevibus florens Aprili. Montbelgardi
videntur hoc *Gramine* rustici ad equorum tor-
ques, quibus acerra trahunt. Efficiuntur etiam
ex eo chlamydes pastorales, quibus opiliones ad-
uersus pluviam videntur.

GRAMEN AQUATICVM CVM LON- gissima panicula,

CAP. CLXII.



CALAMI **Descriptio**
Cerastium
li bicubitales,
fibrarum & ge-
niculis demissa
radicantur, fo-
lia amicti la-
tiusculis do-
dractibus, &
longiorib. vagi-
na longa cala-
mum comple-
xis, à medio ve-
ro, limbo te-
nus gracilescit
culmi, panici-
culam cubita-
lem, & mino-
res numerosas
proferentes,
quarum singu-
lares vicialem
aut sesquicubitam

aequant, graciles, alterno glumarum situ con-
textae.

Gramen anatum Trago, germ. *Eurengraß*. **Synonyma**
Gramen fluviatile, 23. *Gramen fluviatile*, Tab-
bern. icon. & Hist. *Gramen aquis innatum*, Lob. ic.
pag. 12. & Hist. Belg. p. 14. *Gramen* 23. siue *panicu-*
latum aquaticum alterum Caspar. Bauhin. Phyt.
Eid. pin. *Gramen spicatum aquaticum* 1. siue
fluviatile Gerard.

GRAMEN

GRAMEN MARITIMUM FLUITANS
cornutum, C. Bauhini.

CAP. CLXIII.

Synon. **Descriptio** Gramini huic 17. in prod. vel vt in pin. vocat, Gramini spicato aquatico 3. siue maritimo fluitanti cornuto, ex radice exili capillata, culmus tenuissimus, geniculatus, cubito longior producitur ex quolibet geniculo, folia iunceae, communiter bina, culmum basilata, instar vesicæ, ambientia, in latus sparguntur, indeque cauliculus vna aut alter educitur, & tandem in capitulum membraceum finit, quod in foliola bina, terna, rarius quaterna, angustissima, in latus reflexa, & cornuta desinit. Tota planta stagnis Montepeliensibus mari finitimis innatat, gramen hoc spicatum aquaticum 3. in pin. 17. in prod.

GRAMEN AQUATICUM GENICVLATVM
Tabern. digitatum, atro-purpureum.

CAP. CLXIV.

Descriptio

Radice est fibrosa, ex qua pluseculi nascuntur teretes, geniculati, sesquipedales circiter calami, foliis ad articulos gramineis breuib, latis, acuminatis, amicti: in calamorum fastigiis spica nascuntur longæ, tenues, digitalis Ischæmi spicis similes, breuior, atropurpureæ Tabern.

Tabern. icon. & Hist. itémque Gerard. Gramen

aquaticum geniculatum, wasser knoden gras/ Hydragrostis.

Loc.

C. Bauh. phyt. pag. 8. Gramen 25. gramen aquaticum geniculatum. Eid. pin. gramen dactylodes 7. siue gramen dactylon aquaticum.

Passum in lacustribus & palustribus nascitur.

GRAMINIS DENTIS CANINI SPICA DI-
uilla tenuior nigra species.

CAP. CLXV.

Descriptio

Gramine Dentis canis primo & secundo, folia ac tenuiores: paniceae Ischæmo non dissimiles, colore nigrae: semen externa facie nigrum quidem, sed cortice detracto intus album.

Synon.

Lobel. Histor. Belg. pag. 15. de derde soorte van panice gras. Tabern. icon. & Hist. gramen panicum. Item Ic. plant. pag. 14. Panice affigie gramen perianth. Gramen panicum 3. Tabern. idem esse cum Lobeliano satis indicat icon, suspicor ab eo



Gerardi.


non diuersum aut saltem valde simile eiusdem Tabern. gramen aquaticum geniculatum, de quo ante: descriptio mihi conuenire videtur, nec figura multum discrepare.

Calp. Bauh. phyt. gramen 96. siue panicum filicis. spica nigra Eid. pin. gramen panicum 5. siue spicis nigris: gramen panicum paruum


GRAMEN FLORIDVM.

CAP. CLXVI.

Foliis ad summum vsque vestitus est culmus, Feum aliquoulsque inuoluentibus, a quo ubi recesserint, dum vnciarum longitudine sunt, in gracile acumen desinentia, leuia & glabra: panicula pulchra summam ornat stipulam, sesuncialis, muscariis amœnis contexta, strobilorum radiatis compluseculis foliolis constantium, cernentibus e medio apiculis.

GRAMEN EQVINVM MOLLE, SEMINE
ferè Hordei, magnum.

Cramen equinum siue Hippagrostis Gesneri, Rossgras circa Tigurum vulgò. gramen albicans, lanuginosum, molle, duos cubitos cum dimidio attingens: semine lato, latis magno, vt Hordei ferè. Refert ille in pratis nasci, sed parce. Habet hoc Camer. ex horto Nobilissimi viri D. Georgij Reteselij, vbi spontè inter cætera gramina proueniebat.

Synon.GRAMEN ALPINVM RABINVM DI-
ctum, foliis carnosiss, non apparen-
tibus nervis.

CAP. CLXVII.

Cramen alpinum quoddam Rabinum cognominant Lactarij, id est, præcipuum, foliis breuib, carnosiss (non apparentibus nervis,) circa radicem radiatis in orbem pluribus Gesneri nondum vidit. Pecori eius pabulo lactis copiam plurimum augeri aiunt, referente Gesnero de hort.

Gramen alpinum Rabinum Gesneri

De hoc Lob. in Adu. hæc scribit: gramen Rabinum vel Rauisium montanum, foliis Veronicae caryophyllatæ. Saginæ & lactis vbertati omnium laudatissimum: Montium accolæ opiliones Sabaudi & Heluetij Rabis vel Rabinum, quasi præstantius & præcipuum, dicunt: foliis autem est crassioribus, carnosioribus, breuib, montosis, vdis Angliæ & Heluetiæ familiare: Lobeliu, Lob. mont.

Gramen Rabinum Gesneri Rauisium montanum, Lob.

non se explicat in Obsera. In iconibus proponit figuram cum hac inscriptione. Gramen spicatum foliis Veronicæ Caryophyllatæ. An autem Rabinum intelligat nescio: Tabern. & frater C. Bauh. ab eo separant.

Synonyma
reliqua.

Tabern. Hist. p. 641. *Gramen Rabinum Rabinengras* & pag. 463. *Gramen* 24. Rabis grass Gesnero. Nobis dedit Guill. Turnerus, et autem missum erat ex Heluetis, nec unquam licuit virens videre ad picturam, folia alioquin sunt Gramini caryophyllæ valde similia, nisi essent maiora & longiora. Item pag. 645. *Gramen Rabinum* & Rabinum dictum quia opilionibus magistrale Gramen, id est, nobilius & melius inter alia pro cibo & impinguatione pecudum.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 54 & *Gramen Alpinum præcipuum*. Gesnero *Rabinum*. Eid. pin. *Gramen spicatum montanum* 3. siue *Caryophyllatum alpinum*.

GRAMEN MONTANVM SPICATVM fiore herbaceo, caule enodi.

CAP. CLXVIII.

Descriptio:



Gramen montanum spicatum Clusio, multis capitibus ex radice digitalis crassitudine, bifida interdum & trifida, multisq; tenuibus fibris supremâ parte hirsutâ, prodeuntibus constans, quorum singula proferunt terna aut plura oblonga crassa & nonnihil carinata folia, Caryophyllæ

illius, quod vulgò Gramen marinum maius cognominant foliis valde similia, infimâ sede sese inuicem amplectentia, gustu amariuculo & acrisulento, ex horum medio dodrantalis nonnunquam & pedalis exit cauliculus, firmus, lævis, nudus & enodis, qui summo fastigio, multos flosculos, spicæ instar, congestos, herbaceoque colore præditos, profert.

Synonyma Tabern. icon. *Gramen syluaticum* 2. *waldegras*/prouenit in pratis montis Herciniæ syluæ supra Denmersberg.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 69. siue *spicatum serotinum* & *montanum*: Eid. pin. *Gramen anenaceum* 1. siue *Gramen montanum anenaceum spicatum*: *Gramen marinum spicatum alcorum*, Gerardi.

Locum.

Inueniri inquit Clusius in montanis quibusdam pratis, duobus supra Badenses thermas, miliaribus. Similem autem in Flandriæ maritimis frequenter legere meminisse, quod vulgus, si memoria labitur, Suden appellaret.

GRAMEN HIRSVTVM ANGUSTIFOLIUM maius, C. Bauhini.

CAP. CLXIX.

EX radice exigua fibrosa, rufescente, culmus vnicus, cubito altior, ut plurimum lævis, exurgit, in cuius summitate panicula alba, mollis, leuiter sparsa, ex multis laminulis composita, in quarum qualibet semina minuta, subnigra & subrotunda: foliis est paucis, angustis, palmaribus & villosis, aliquot culmum cingentibus: ipsi verò paniculæ, utrinque folium tenuissimum subiicitur, quorum alterum panniculam superat, alterum non adequat. Prouenit in paludosis pratis Michelsfeldensibus.

Gramen hoc 47. in prod. siue *Gramen nemorosum hirsutum* 5. siue *angustifolium maius*. *Gramen* 79. (inquit in Phyt.) multum habet similitudinis cum icone Graminis nemorosi Dalechampii: plus verò cum eiusdem Gramine Leucanthemo, & tamen diuersum utrumquo habeo.

Descriptio:

Locum.
Synon.

GRAMINI LVZVLÆ AFFINE fiore albo.

CAP. CLXX.



Perennis vix Graminis Luzulæ siue nemorosi folia accedentibus, consimiliter pilosis: at culmi maiores, cubitales: florum manifestum discrimen, si liquidem in summo fastigio albi sunt, festuacei, cum in altero non in festucas, sed in capitula designant, seu paruos calyces semina claudentes, eosque nigricantes, cum huius festuæ albescant. Luzulæ modo quosdam habet pilos, qui etiam facile decidunt, a nostro pictore in sicca planta non obseruari.

H. Lugd. 426. *Gramen Leucanthemon Dalechampii*. Figura non placet, quia desunt pili. Casp. Bauh. phyt. *Gramen* 70. *Gramen hirsutum paniculis albis* Aeschimon Plinii Guilandino. Eid. pin. *Gramen nemorosum hirsutum* 6. siue *angustifolium minus paniculis albis*.

Gramen hoc prouenit Geneuæ in nemoribus, ut in colle la Bastie florens Maio & Iunio.

Locum.

GRAMEN RORE LVCIDVM NEMORENSE, siue Luzulæ.

CAP. CLXXI.

Gramen lucidum, radice nigrâ magna, fibrosa, geniculata, rufa, sapore cum leui dulcedine

Descriptio:

cedine adstringenti, culmo cum flore dodrantali, folio vno aut altero amplectente donato: spicæ, ternæ, quaternæ, aut quinz breues, ex quibus vna sessilis, reliquæ pediculis semuncialibus & vncialibus appensæ: flores singuli foliolis sex radiatis spadiceis, totidemque staminulis luteis, umbilicoque virente, stamen nigrum proferentes, constantes, quibus capitula succedunt triquetra, semina terna minuta continentia. Folia quadrantalia aut palmaria rigidiuscula, acuta, surrecta, extorsum striata, glabra, at in lateribus longa, cana, teneraque lanugine in folium etiam totum utrinque incurrente obsita: ista lanugo vel pili qui facile decidunt tacti, colligunt rorem qui splendet noctu irradiantibus stellis vel Luna, ita ut sit admirationi videntibus: herbam perquirentes, decidente rore inuenire non possunt.

Synon.

Gramen hirsutum nemorosum Lob. icon. pag. 16. & Hist. Belg. itemque Ger. *Gramen syluaticum* 4. siue *pilosum* Taber. ic. & histor. *Combreum Plin.* & *Herba Luzula heterura*, Anguill. epist.

An Gesn. hort. *Cypripella Cordi*: *Holostium* quidam docti, sed imbecillâ coniecturâ, augurabantur, longè verius, Lobelij iudicio, coniecturi: si *Ischemon* Plinianum dixissent.

C. Bauh. phyt. *gramen* 77. Eid. pin. *gramen nemorosum hirsutum* 1. siue *latifolium minus*. Item *gramen nemorosum hirsutum* 2. siue *latifolium minus*, magnitudine potissimum differens: datur & huius maius & minus.

Locus & tempus.

Lugduni provenit au *bûs de la belle Allemande*. Basilex Frater observavit in pratis Munchenstein. Genevæ incipit florere mense Martio.

GRAMEN LVZVLÆ MEDIVM.

CAP. CLXXII.

Descriptio



Radice donatum fibrosa, pro plantæ portione satis crassa, minus autem profundè radicatam: calamo recto, geniculato, sesquicubitali, in summitate cum æamine Luzulæ maximo latam producente lunci paniculam, in vaginis longioribus, quam latioribus, semen continentem album, acutum: Foliorum ma-

nifesta discrepantia: ea siquidem quæ ad articulos exeunt, angusta: quæ verò circa radicem, quæ terrâ emergit, conspiciuntur, semunciam lata sunt, sed acuminata ambo, pedemque longa.

Locus.

Collegimus florens Maij principio in valle Griesbachiana acidorum fontium, vidimusque inter stirpis C. Bauhini plantas siccas.

GRAMEN LVZVLÆ MAXIMUM.

CAP. CLXXIII.

Descriptio

Infrequentius est Luzulæ gramine parvo, radice firmatum, crassa, obliqua, nigra, nume-



Griesbachiana ad fontes acidos.

GRAMEN LVZVLÆ MINVS.

CAP. CLXXIV.

Frequentius est hoc Luzulæ gramine maximo, foliis tenuioribus sursum elevatis, angustis, mucronatis, pilis & seracea lanugine aliquantulum hirtis. Calamus exilis admodum; duobus, ditatus articulis, ex quibus folia duo vncias duas longa emergunt; vnum quidem in calami medietate, alterum verò in supermitate ubi cõma in tres, aut quatuor (ceu capitula) dividitur partes. Cypero

Descriptio



longo inodoro sylvestri pares. Radice exilibus fibris & capillamentis barbata provenit.

Prædictum gramen plurimum accedere videtur ad gramen exile hirsutum Cyperoides Lob. An idem tamen asserere non audemus.

Collegimus mensis Maij principio florens in valle fontium acidorum dicta Griesbach.

Locus & Tempus


GRAMEN EXILE HIRSVTVM, CYPEROIDES Lob.

CAP. CLXXV.

Minus est Gramine aquatico echinato cyperoides, alioqui culmis & foliis, hirsutis: men, ac sapore simile est: at flores breviores sunt, confertiores, compactioresque, luncorum modo, coloris ferrugineis: radices item iam dicto non absimiles.

Descriptio

Synon.



Cum hoc Gramine in multis conuenit Gramen nostrum Luzule minus, quod an idem sit, affirmare adhuc nobis non licet.

Lobel. descriptionis auctori in Hist. Belg. pag. 16. & Plant. icon. p. 15. *Gramen exiliter hirsutum Cyperoides*. Tabern. hist. & icon. *Gramen cyperinum pilosum*. C. Bauh.

Phyt. Gram. 71. siue *hirsutum cyperi panicula*: Eid. pin. *Gramen nemorosum hirsutum* 3. siue capitulis Psyllii. *Cyperella Cordi* & *Pseudocyperi species pumila*, Gesn. hort. *Gramen exile hirsutum cyperoides*, Lob. icon. *Gramen cyperinum pilosum*, Tab. *Gramen nemorum Dalechampi* Lugd. *Gramen exile hirsutum*, Ger. Variat foliis latioribus & angustioribus.


Locus.

Inuenit Lobel. locis fabulosis, eosdemque habet natales, cum Gramine aquatico echinato cyperoides. Tabern. prouenire ait locis humidis, arenosis, herbosis in Ostwaldt secundum vias & potissimum propè pagum Erlenbach.

GRAMEN NIGRO-LVTEVM VERNVM

CAP. CLXXVI.

Descriptio



Gramen nigroluteum à spicis quas habet primum nigras rotas: post expanso flore, maiore ex parte luteas, binas, ternasque, vnciales, & quadratales, vni culmo angulari striato, tenui, foliis aliquot circa infimum tanquam vagina obuolutis, in solo latiore dodrantali, aliis pal-

mari & minori: folia culmo longiora, Cyperi foliis similia, angustiora: radice nititur lignosa, laevis crassa, reptante, circa quam quæ terra emergit, densum quasi capillitium conspicitur ex foliis veteribus marcescentibus, & in fibras tenuissimas facessentibus: Hoc sanè Gramen videtur mihi non parum variare ratione loci ubi prouenit, quale descripsimus succissimis prouenit

in pratis, non nimium humidis maius crescit, & idem fortè cum Gramine cyperoides.

Effigies Lob. Ic. Plant. pag. 10. sub titulo *Graminis spicati folijs Veronica, Caryophyllata*, exhibitata, non malè conuenit cum Gramine nostro nigro luteo, quod insigniter variat, verum si ponit eam figuram pro *Gramine Rabino*, quod in Adu. dicit esse folijs *Veronica caryophyllata*, diuersum erit à nostro Gramine: quibus notum erit erit Gramen Rabinum iudicent. Tabern. & Frater Casp. Bauhin. separant à Rabino.

Tabern. Icon. & Hist. *Gramen caryophyllum*, *Waglin gras*. Eid. Hist. *Gramen* 23. Figura apud Tabern. eadem cum Lobeliana: si (quod perhibet Tabern.) verum est, suum Gramen esse culmo rotundo, laui, sine foliis, non erit nostrum. Sed potuit descriptio parari ex icone Lobelii, in qua nec anguli, nec folia in culmo apparent.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 52. Eid. pin. *Gramen cristatum & spicatum pratense* 6. siue Gramen caryophyllata foliis, spica diuisa. *Gramen spicatum folijs Veronica*, Lob. icon. *Graminis liliacei octauis* 4. species Thal. *Gramen nigrum*, Lugd. *Gramen caryophyllum* Tab.

Reperitur maius in pratis humidis, minus in siccis. Locus.

Genus floret Martio: Montbelgardi etiam Aprili.

GRAMEN FOLIIS CARYOPHYLLÆI
floris, angustifolium, C. Bauhini.

Hoc à priori differt [putat à Gramine Caryophyllæo eius latifolio quod 52. Gramen est] foliorum angustia, dein & cauliculis, qui in hoc & tenuiores & longiores quàm in priori sunt.


C. Bauh. Phyt. *Gramen* 53. & Gramen foliis Caryophyllata (malim Caryophyllæi floris dicere) angustifolium.

In montosis Mutetæ locis Maio florens observauit frater Casparus. Locus.

GRAMEN CYPEROIDES CVM
panniculis nigris.

CAP. CLXXVII.

Descriptio



Geniculatum incedunt, & prorsum radices crassiusculæ Cyperi longi radicibus similes, à quibus pendent fibræ crassiusculæ: folia selquicubitalia & cubitalia, carinata, Cyperi paria, caulibus triquetris, duobus cubitis non raro altior, enodis, cæteroqui nudus, per

fastigia foliis aliquot ipsius cacumen haud paulum separantibus donatur: à quorum sinu paniculae vel spicae quaedam emicant, dum triumve vinctarum, ex obscura purpura nigricans, triquetris loculis congestis semen eiusdem figurae, durum, nigrum comprehendens: supremam verò spicam, veluti summam perfectionem, nondum allecuta, è squamis spadiceis striatis atque glumis inanibus mollibus contexuntur. In hac planta mihi videtur non parum ludere pro ratione loci, nec certus sum an Gramen nostrum nigroluteum in hanc degeneret loco humidior: Hoc enim ut illud reliquias veterum foliorum multas habet, sunt ambo perennes plantae.

Synon. C. Bauh. phyt. *gramen* 55. siue spicatum folio triangulo: *gramen vulgò cognitum* Tragi: *gramen triangulum*, H. Lugd. p. 1004. Item, *gramen* 56. siue spicatum latifolium caule triangulo. *gramen cyperoides* Lob. Obs. p. 10. Ic. p. 11. Nullum intercedit inter hæc gramina discrimen, ideoque non separanda, vel ipso C. Bauhino subscribente. *Gramen cyperoides* 1. (inquit in pin.) siue *gramen cyperoides latifolium* spica rufa, seu caule triangulo, est graminis 4. genus Tragi, *gramen cyperoides* Lob. Cam. Tabern. Ger. & H. Lugd. p. 433. cui & *gramen triangulum*, p. 1004. & *Carex* Tragi, p. 1007.

Tabern. not. Ceterum, figura, cui apud H. Lugd. titulus est *gramen triangulum* fuit Dalechampi, ita dominantis plantam, Porro, ubi Tabern. observavit *Cyperoidis* graminis caulem rotundum, nescio: nisi forte in figura Lobelii ita pingatur, quod in multis plantis evenit: nec ita facile in omnibus iconibus plantarum anguli exprimi possum, nescio qua in re *gramen* Tabern. Typhinum ab hoc differat.

Locus & tempus. Tiguri vidimus florens Maio, Gesnerus vocabat *Cyperum adulterinum*: maximum observavimus Maio florens iuxta fluvium radicibus crassis reptantibus, tale quid pinxit Hist. Lugd. habuimus Lugdunà Dalechampio. Montbelgardii abundat.

GRAMEN CYPEROIDES LATIFOLIUM spica spadiceo-viridi minus C. Bauh.

CAP. CLXXVIII.

Synon. Descriptio *Gramen* hoc 40. C. Bauh. in prod. *Gramen* verò *Cyperoides* 2. in pin. radice est oblonga, multiplici, rufamirè capillata, caulibus triangulis, cubito minoribus: foliis Arundinaceis, pedalis, & quam in vulgari angustioribus: spicis ternis, quaternis, rarius quinis, alternatim succedentibus, angustis, trium, quatuorve vinctarum longis, coloris spadiceo-viridis, quarum primæ semper folium oblongum angustissimum subiicitur.

Locus Hoc in humidis ad Sellam novam Montpelis primùm vidimus: dein ex Lusaria à D. Franco *graminis Spravvaldensis* nomine accepimus.

GRAMEN CYPEROIDES ANGVSTIFOLIUM, spica spadiceo viridi, minus, eiusdem.

CAP. CLXXIX.

Synon. ET hoc auctori in prod. *gramen* 41. in pin. *gramen cyperoides* 3. in phyt. *gramen* 57. siue *cyperoides* Tom. II.

roides angustifolium, differens à *Cyperoide* Lobelii positivum foliorum forma, quæ in hoc duplò angustiora, acutiora & longiora.

Ceterum, radice est brevifore, lignosiore, parum fibrosa, & rufa: caule triangulo, pedali, foliis angustis, duris, semipalmatis, in acutiem desinentibus: spicæ aliquot angustissimis, oblongis, spadiceo-viridibus, alternatim dispositis, & pediculis longis capillaceis insidentibus, quod Aprilis mense circa Birsam reperitur. Aliquando tamen altius exurgit.

Descriptio

GRAMEN CYPEROIDES ANGVSTIFOLIUM, spicis longis erectis.

C. Bauh. pin. *Gramen cyperoides* 4. siue angustifolium, spicis longis erectis: *gramen palustre* maius. Lob. icon. quid?

GRAMEN CYPEROIDES VVLGATIVS aquaticum.

CAPVT CLXXX.



Descriptio *Gramen* *Cyperoides* vulgariùs aquaticum tres, quatuor, nonnunquam plures profert radices, longas, nigras, vinctas crassas, *Cypero* longo similes: folia etià similia, quæ non solum è radice, verùm è culmi quoque nodis exerceantur. *Calamum* verò triangularem, cubitalem: Flores densè spicatos, quos sublequantur spicæ quan-

Descriptio

doque simul quinque ferrugine clare, Tabern. **Synon.**

Gerard. & Lob. Icon. p. 10. *gramen cyperoides aquaticum*, vulgariùs. Tabern. icon. & H. *gramen cyperinum* maius, Gross Cyperß grass: Eid Hist. *gramen cyperinum* 6. C. Bauh. pin. *gramen cyperoides* 7. siue panicula sparsa maius: Variat panicula in altera compactiore & brevior, in altera magis expansa & longior.

Ubique in aquosis, palustribus, & stagnantibus **Locus** reperitur.


GRAMEN TYPHINVM; TABERN. SPICA multiplici nigra, accedens ad Gramen cyperoides.

CAP. CLXXXI.

Radice firmatum, obliqua, nodosa, vincta & plus crassa, fibris exilibus seu capillis ornata pluribus, à quibus folia prodeunt tria, longa, culmus amplectentia geniculatos, minoribus foliolis praeditos, ad quorum exortus supra me-

Tc

HISTORIAE PLANTARVM.



Synonyma

diam pennae longitudinem spica surgunt longæ, asperæ, atque nigre. Sapor acidus, adstringens.

Tabern.

icon. & Hist. Gramen Typhini. Liefche gras.

C. Bauhin. phyt. Gramen 48. Eid. pin. Gramen typhoides 7. siue spica multiplici: Calamagrostis prima Tragi descript. Cyperus typhinus Ger. Amans vdotum pratorum.

GRAMEN NEMOROSVM PANICVLIS
albis, capi llaceo folio, C. Bauh.

CAP. CLXXXII.

Synon.
Descriptio


Cespitis instar Gramen hoc (45. in prod. Nemorosum glabrum & in pin.) existit, quod ex radicibus capillaceis, folia copiosa, viridia, pilis tenuissimis limilia, pedem longa, emittit: inter quæ culmi tenues geniculati, cubitales, aliquando sesquicubitales, penè nudi in paniculam rariorem, albicantem, palmo minorem, ex glumis paruis aristis donatis compositam, abeunt: in Querceto non longè Michelsfeldâ copiosè provenit.

Locus.

GRAMEN CYPERINVM NEMOROSVM.

CAP. CLXXXIII.

Descriptio



Radice nititur fibrosa, capillari & ipsa principio exorta: folijs angustis, dodrantalib., acuminatis, foliorum Graminis vulgaris instar, iuxta quæ caules prodeunt tres, aut quatuor rotundi, angustissimi, pedem longi, quorum quisque producit spicas duas, aut tres ex luteo purpurascentes,

trium vnciarum longas.

Synonyma


Tabern. icon. & Hist. Gramen cyperinum nemorosum valde Cyperus gras. Eid. Hist. Gramen cyperinum 5. Casp. Bauhin. pin. Gramen nemoro-

sum glabrum 2. siue Gramen nemorosum spica subnigra, recurua: Gram. cyper. nemorosum Tab. & aerardi.

Hinc inde in sylvis, vli ginosis locis, herbaceis, & arenosis inuenitur præsertim autem in Locus dem Ostralde & linden felfer gemardh.

GRAMINIS CYPEROIDIS GENVS, PSEUDOCYPERUS Lobelio spicis vel panniculis pendentibus ex longis pediculis.

CAP. CLXXXIV.



Gramen de quo quo hic agemus solum visum apud fratrem Caspar. Bauh. panniculas fert similes Gramini cyperoidi aquatico spica nigra, verum in eo differunt, quod ex longis pediculis pendunt Graminis tremuli modo, non surrectæ, spicæ paniculæ ut etiam non

Descriptio

nigra in sicca planta latiores, in quibus longiusculi pili.

Lobel. Hist. Belg. p. 109. & Icon. Plant. pag. 76. Synon.

Pseudocyperus wälsche wilde Galigaen.

Casp. Bauhin. Phyt. Gramen 63. siue Pseudocyperus primus & secundus: Eid. pin. Gramen cyperoides 5. siue spica pendula breuiore: Pseudocyperus Gesn. hort. Lob. icon. Dod. Pseudocyperus in Thal. Gramen aquaticum, Lugd. Maius & minus habetur.

Ceterum & Pseudocyperi, seu Cyperi sylvestris, altero genere hoc scribit Thalius. Pseudocyperum in Thalius nomine, quod quidem, quoad folia & radicem [quæ huic quoque nigricans est, crassa, & frequenter capillaceis fibris obsepta] priori simile est, sed capitulis seminum differens, quæ, licet ut prius, in summo caulis ex nodoso tuberculo emittit in singularibus pediculis oblongis contenta, ea tamen pauciora, rariora, ac flauescens sunt, & squammata. Estque hoc rursus duplicis discriminis: Pseudocyperus enim maior, multis in locis reperitur, foliorum magnitudine ac latitudine, caulis item proceritate & tenuitate simillimus. Minor vero radice constat parua, spadicea, fibrata; folia continens Milio breuiora, digitalem longitudinem raro excedentia; cauliculum emittens, dodrantalem, interdum paulo longiorem, tenuem, paucis minoribus ac tenuioribus foliis ornatum, in cuius summo ex tuberculo nodoso, pauci, tenues, breues, pediculi emergunt, capitula parua, pauca rarique & squammata, spadiceæ coloris exhibentem.

Pseudocyperus
peru. ca
Cyper fil.
Thal.

GRAMEN

GRAMEN CYPEROIDES SPICA PENDV-
la longiore & angustiore, C. Bauh.

CAP. CLXXXV.

Descriptio

Caulis est cubitali, anguloso, striato, foliis oblongis, angustis, basi oblonga, caulem instar tubi vestientibus, ex quo veluti tubo, spica singula, uncias quatuor vel sex longa, angustior, prodeunt & propendunt, ipsum vero solum cuiuslibet spica subiectum oblongum est.

Synon. Locum.

Hoc gramen 42. C. Bauh. in prod. seu, vt in pin. vocatur, *gramen cyperoides* 6. siue spica pendula longiore & angustiore, locis humidis circa thermas Apponentes, Patauinorum crescit.

GRAMEN CYPEROIDES PALVSTRE
triquetrum, spica integra.

CAP. CLXXXVI.

Descriptio



Triquetrum Cyperi tollit caulem cubitalem & sesquicubitalem, cuius fastigium ornat spica, Panici quodammodo similis, rariore textura, fescucialis & sextantalibus, in loculis triangularibus nigricantibus, aut ex viridi rufescentibus semina continens. Milio ferè æquale, compressius. Radices fibrosæ, perplexæ, ex deciduorum foliorum fibris comolæ: folia mediocriter lata, caulem ferè longitudine æquant.

Synon.

Lobel. Hist. Belg. p. 20. & 29. water wilde Galgaengras. *gramen cyperoides palustre*: sic & in Id. p. 19. & Gerardo. Taber. icon. & Hist. *gramen cyperinum palustre*, wasser cypree gras.

C. Bauh. phyt. *gramen* 59. siue *cyperoides palustre*: Eid. pin. *gramen cyperoides* 8. siue palustre maius spica compacta: *gramen tuncum triquetrum*, Thal.

Locis aquosis obseruavi Genevæ.

GRAMEN CYPEROIDES SPICIS MINORIBUS, minus compactis, C. Bauh.

CAP. CLXXXVII.

Descriptio

Ex radice fibrosa, lignosa tamen, folia prodeunt angusta, graminea, palmum longa, inter quæ caulis sesquicubitalis, triquetrus, tubaspor, & magna ex parte nudus exurgit: in cuius summo spica parua, diuisa, & quasi aculeata consistit, quæ semina oblonga, subnigra, in aculearum cuspidem desinentia continet. Huius tres differentias notauimus: 1. est latioribus & longioribus.

Tom. II.

gioribus foliis, spicis maioribus, & ad riuulum molendinarium vrbis nostræ trans Rhenum reperitur. 2. à priori rarioribus & minoribus spicis differt, & in via Riechana ad sepes crescit. 3. foliis est angustioribus, brevioribus, spicis inter duas priores mediis, quod Patauij locis humidis anno 1578. collegimus, & cum D. Guilandino ostendissemus, Ischæmon Plinij censuit, quod non probamus: idem sed per omnia minus anno 1579. Montepessuli in humidis inuenimus, quod *gramen cyperoides* nominabant. Et hæc sunt, quæ de suo Gramine (vt in prod. vocat) 42. vel (vt in pin.) de Gramine cyperoides 9. siue spicis minoribus, minusque compactis, author prodidit.

GRAMEN PARVVM SYLVATICVM, PANICULIS forma pedum autum.

CAPVT CLXXXVIII.

Numerosas, sed & prolixas habet fibras, tenues: folia multa, nonnihil aspera, culmum ferè æquantia, qui dodrantalis, enodis, paniculas in summo gerit rufas, partim culmo appressas, partim digitatim ab eo recedentes.

Genevæ obseruavi in syluis. Idem reperi prope Machin in Burgundiorum montibus, florens Maij principio.

GRAMEN CYPEROIDES EX MONTE
Ballon, spica diuisa.

CAP. CLXXXIX.



Folia subinde dodrantalia, & breviora, pratensis graminis in morem angustioris, nullo utriculo donatus, cubitalis & sesquicubitalis, paniculam diuisam gerit in summo fastigio, Cyperi minus speciosi, corrigulato folio subiecto, radicum fibræ graciles, contortæ.

Lobel. Belg. Hist. pag. 19. & 20.

10. Kleyne waterwilde Galgaengras, *gramen cyperoides paruum aquaticum*, sic & Icon. plant. 19. & Gerardo: Taber. Hist. & Icon. Flein wasser cypree gras *gramen cyperinum palustre minus*.

C. Bauh. phyt. *gramen* 60. siue *cyperoides palustre alterum*. Eid. pin. *gramen cyperoides* 10. siue palustre maius spica diuisa.

Gramen cyperoides obseruavi in monte Ballon inter Gerarmegni & Lotharingum cum suis spicis mense Augusto.

GRAMEN PALVSTRE ECHINATVM.
CAPVT CLXXX.

Gramini palustri cyperoidi affine, cui tamen magnitudine cedit: summo cauli spica ad-

T. 1

nascuntur paucula, semunciam longæ, viridantes, triangularibus loculis minoribus, semen triquetrum quoque continentibus, muricatis, quibus supereminet summum occupans fastigium, imperfecta spica rufescens, longior fere duplo, vix sextam crassitudinis partem æquans, mollis, metris squammulis contexta. Radices prorsum agit, nigricantes.

Synonyma Hist. Lugd. pag. 1003. Gramen aculeatum. Lob.

bel. Hist. Belg. pag. 16. water gras met stes stende aren gras. Eid. Ic. Plant. pag. 15. Gramen palustre echinatum. Calp. Bauh. Phyt. Gramen palustre aculeatum: Eid. pin. Gramen palustre aculeatum vel minus germanicum. Variat speciebus longioribus, rotundioribus, sæpe in eadem planta: Item, Gramen palustre

Varietas.



aculeatum italicum vel maius.

Genevæ & Montbelgardi in paludosis occurrat.

GRAMEN MARINUM CYPEROIDES.

CAP. CLXXXI.

Descriptio.



cuius basi appositæ tria folia caput superantia, porracea, albescentia, dura, palmaria: nullo vel sapore vel odore excellit.

Synonyma

Lob. in Adu. luncus Cyperoides maritimus, & Gramen marinum cyperoides: Eid. plant. Icon. p. 87. luncus maritimus: sic & Tabern. luncus maritimus alius Pena. Hist. Lugd. pag. 1396. sine icon: Eid. p. 1391. Gramen maritimum Dalechampi. C. Bauh. pin. Gramen cyperoides 14. f. maritimum.

In littoribus & arenosis Narbonæ & Gallie provincie provenit.

CYPERVS IN GENERE.

CAP. CLXXXII.

Cyperus (malè Gaza apud Theoph. Gladiolum conuertit) in lacu Orchomenio provenit & ut reliqua radice numerosa adhæret, nam illa deorsum versus potissimum vertitur, virisq; intendit, qua de causa vix hæc interit, & omnino genus eius uniuersum diuturnius est. Radix plurimum in æqualitate à cæteris distat, quod pars quædam crassa, carnosaque sit, quædam gracilis atque lignosa. Quia & germinatione generationeque refert: nascitur enim de ramaceo illo radix altera tenuis, iuxta latus: deinde caro rursus in eo conglobatur, ex qua seculis promit, qui æqualitatem quandam peculiarem sortitur, in quo possumus germinem esse. In profundum quoque radices eodem modo demittit, quamobrem omnium maxime mori contumax, euellique difficilis est. Ei inter frutices, ut cæteris similibus palustribus harundinacea ex plantæ geniculis folia prodeunt. At verò odoris contraria ferme natura in loco est. Nam quamuis odoratus & siccus suapte natura sit, tamen viridis aut nihil olet, aut non æquè: sed eius etiam vigor intelligi debet. Sapor autem, aut odor, [hæc propter causæ cognitionem inferre placuit] aut suauitas, qua eueniat ratione lege Theophr. de caus. lib. 6. c. 16:

Cypero, quem alii Erysisceptrum vocant, Dioscorides folia tribuit Porro similia, longiora tamen & graciliora, caulem cubitalem, aut etiam maiorem, angulosum, lusco odorato rotundo similem: in cuius vertice folia parua exoriuntur & semen: radices autem subsunt, quarum & vultus est, oblongæ velut Oliuæ, inter se coherentes, aut etiam, rotundæ, nigra, odoratæ, amaræ. Nascitur in locis cultis & ærenosis. Optima est radix quæ grauissima est, & densa ac plena, ægrè fragilis, aspera, odorata, cum aliqua acrimonia. Talis autem est Cilicia & Syriaca, & ab insulis Cycladibus petita.

Bulborum generi quidam [autore Plinio lib. 21. cap. 17.] adnumerant & Cyperi, h. e. Gladioli radicem. Dalcis ea est, & quæ decocta panem etiam gratiorem faciat, ponderosiorēque simul subacta. Non dissimilis est & quæ Thesion vocatur gustu aspera. Cætera eiusdem generis folio differunt. Mago & Gladiolum alterum, quem Cyperon vocant, & ipsum palustrem, Iulio mense toto secari iubet & radicem, terriorque die Sole siccare donec candidus fiat. Quotidie autem ante Solem occidentem in lectum referri, quoniam palustribus, defectis nocturni rores noceant. Quidam (subdit Plin. cap. 18.) etiamnum vnum genus faciunt, lunci trianguli, Cyperon vocant. Multi verò non dissecarunt à Cypero vicinitate nominis. Nos distinguimus utrumque. Cyperus est Gladiolus, ut diximus, radice bulbosa, laudatissimus in insulis Creta, dein Naxo, & postea in Phœnicie Cretico candor odorque vicinus Narodo, Naxio acrior, Phœnicio exiguum spirans, nullus Aegyptio: nam & ibi nascitur. Discutit durities corporum. Iam enim remedia dicemus, quoniam & florum odorūque generi est magnus vsus in medicina. Quod ad Cyperon attinet, Apollodorum quidem sequar, qui negabat bibendum.

Cyperus
luncus.Folia por-
racea.Radix O-
liua.Cyperus.
Delictus.

Cyperus.

Cyperus la-
da.Pseudo-
cyperus.Gladiolus
nomen Ga-
lam.Cyperus
Caryphi-
scus.Laur. Pal-
la not.Prepara-
tio.Gladiolus
Theophr-
sti idem
cum Cy-
pero Diosc.

bonum: quoniam profectus efficacissimum esse
adversus calculos, eos fouet. Feminis quidem
abortus facere non dubitat. Minusque tradit,
Barbaros sultum huius herbe excipientes ore
lienes consumere: & non egredi domibus, nisi ab
hoc sultu. Vegetiores enim firmitioresque sic et-
iam fieri. Intertriginum & alarum vitis, perfric-
tionibus cum oleo illitum non dubie mederi.
Cyperos luncus est, qualiter diximus, angulosus,
iuxta terram candidus, cacumine niger, pinguis-
que. Folia ima porraceis exiliora, in cacumine
minuta, inter quae est semen. Radix Oliuae ni-
gra similis, quam, cum oblonga est, Cyperida vo-
cant, magni in medicina usus. Laus Cypero pri-
ma Ammoniaco, secunda Rhodio, tertia Thra-
cio, nouissima Aegyptia, quod & confundit intel-
lectum, quoniam & Cyperos ibi nascitur. Sed Cy-
peros durissima, vixque spirans. Ceteris odor &
ipsis Nardum imitans. Est & per se Indica herba,
quae Cyperis vocatur, Zingiberis ethigie: com-
manducata Croci vim reddit. Idem lib. 17. cap. 13.
de germinatione arborum dicit, ocysissima om-
nium Cyperum & Pseudo-cyperum inter frutices
esse, cumque protinus florere, semenque proferre.
Et hi sunt loci, quibus de Cypero egisse constat,
& cum eo Gladiolum confudisse.

Et haec forte occasio est, quod vagum & com-
mune multis nomen sit Gladiolus. Nonnulli (in-
quit Hermol.) distinctionis gratia Cyperon pro
lunco triangulari, siue quadrato nominant. Non
desunt qui Pseudo-Cyperum vocent Gladiolum,
de quo Plinius inter ocysissimas plantas. Quadra-
tus autem & angularis ad differentiam rotundi
lunci, quem Schænon Graeci vocant, cognomi-
natus intelligitur. Penultimam Cyperi quando-
que diphthongo longam, quandoque vocali bre-
uem Graeci scribunt. Dicitur hæc & neutro gene-
re Cyperum à Paulo. Habetur & Cyperus Indica,
quam Plinius Cyperin appellat, etiam si qui-
busdam exemplaribus Cypera legatur. Non pos-
sum non mirari quamobrem Laur. Valla Cyperum
in Herodoto Siler conuerterit.

Cyperum Galliz officinae nominant: ast rura,
referente Ruellio *Soucheti* nomine norunt, quod
Iunio mense radicitus erunt, digeruntque stipi-
tes in manuales fasciculos, quos prius insolatos
aceri imbre conspergunt, siccatoque frustatim
tundunt, ut odoris gratia vestes interpositis com-
mendent. Sunt qui censent Cyperum hunc, quæ
Gladiolum in Theophrasto Theodorus vertit à
Dioscoridis Cypero dissidere. Verum nusquam à
priori finitione posita superius inuenitur descis-
cere, imò Dioscoridis placita firmare. Siquidem
eius radix magna inequalitate notatur, quod pars
quædam crassa carnosaque, quædam gracilis at-
que lignosa sit. Nonne vides radicis tenuitatem
surculosam protinus in oliuaria tubercula verti-
cillari? Radices in altum duci, euelli, morique
contumaces quis non videt? Quod si reliqua quæ
sparsim à Theophrasto traduntur, prosequi li-
beat, inuenies huic nostro Cypero suffragari. Nam
palustrem esse idem affirmat auctor, caule enodi,
folio harundinaceo, tam terrenis quam aquis,
viginosisque prodeuntem: radice partim tenui,
partim carnosa, neruosaque, quæ vnguentis ex-
petatur, quæ non de Xiphio, id est, Gladiolo pos-
sunt audiri, cum merito debeat vnguentis abdi-
cari, ut pote virus olens, unde spathulæ foetidae
nomen ei dederunt officinae: namque sua odo-
ris grauitate lautiorum vnguentorum gratiam
aboleret. Vides ergo horum dicta authorum in

Tom. II.

eandem herbam referri. Plantas alteri iudicio
subscripsit, sed ferè suspicor eum dotes Cyperi
cum Gladiolo confudisse, vagamque iis & com-
munem nomenclaturam imposuisse. Cum Theo-
phrastus per a diphthongum scripsit, cum ad nos venit, aliqui c, aliqui t, ex vna re-
tinuerunt, Graeci quandoque diphthongo quan-
doque vocali breuem, penultimam scripserunt.
Cypitum tamen Theophrasti, à Cypero Diosco-
ridis nullo discrimine separati docuimus. Gale-
nus & Paulus in simplicium censu vnus tantum
meminerunt, non alioquin omissari, si aliqua di-
uerfitate ternerentur. Nec Plinio (qui in gla-
diolo Apollodorum, in Cypero Dioscoridem, a-
liosque Graecos sequitur) gladiolus à Cypero dif-
fert odore. Quare cum mihi Graeci omnes asti-
pulerunt, longe tutius fuerit vnum genus face-
re, neque discernere aut distinguere in gladi-
olo, qui Cyperus dicitur, & Cyperum. De an-
gulis Cyperi, grauis inter Auctores discordia. Cel-
sius quadrangulum luncum vocat, Plinius
Triangularem, Dioscor. angulosum, qui litem
videtur dicemisse, & vtriusque historiam confir-
mauit. Est non longè dissimilis radix, quæ voca-
tur officinis recentioribusque Medicis galanga,
odore Cyperum quadantenus imitante: unde
multi herbarum coniectores Cyperum Babylo-
nicam cognominant: Et hæc Ruellius de Cypero est
sententia.

Fuchsius depingit & describit Cyperum lon-
gum, sicuti Tragus, qui dicit hæc nomina: *cyperus*,
cyperus, & *cyperus* diuersarum plantarum ap-
pellationes quidem esse & tamen indifferenter
à plerisque cypero longo attribui, qui à Diosco-
ride Aspalathum quoque & Erythraeum co-
gnominatur, licet & hæc appellationes ad alias
quoque pertineant plantas. Hæc Tragus, qui quo-
modo dicat Aspalathum vocari cyperum non-
dum video, id non dicit Dioscorides.

Sed his omissis videamus quid dicat Cordus,
Plinius, ait, inter cyperum & cypitum differen-
tiam facit, sed magno errore. Reuera enim nihil
differunt: quare siue cyperum siue cypitum pro-
nuncies, aut alicubi scriptum reperias, eadem
erit planta. Est autem cyperus luncus odora-
tus, angulosus, triangularis siue, à quibusdam
etiam quadratus appellatus, sed male admo-
dum, non enim quadrangularis illi est, sed trian-
gularis caulis. Eius autem duæ species: alter
longas habet radices, is Graecis vocatur Cyperis,
in pharmacopoliis verò cyperus Romanus siue
longus: alter rotundas habet & sibi inuicem co-
hærentes radículas, quem pharmacopola cyperum
rotundum appellant: Graeci autem simpli-
citer: Germani vtrumque vocant *wilden Gal-
gan*. h. e. siluestrem Galangam. Patcius affertur
ad nos longus cyperus, hæc Cordus. Syluius &
Matthiolus, sicut & alii, ajunt reperiri quadran-
gulum, quod Cordo contrarium est.

Matthiolus, qui Cyperum longum depin-
git, hæc notatu digna habet. Tamen vnum tan-
tum cyperi genus memoriae prodiderit Dio-
scorides, cuius radices inter se coherentes oblon-
gas referunt Oleas, aut omnino rotundæ sunt:
visitur tamen cyperus in pluribus Italiae locis
qui radicibus constat longis. Et nascitur hoc cy-
peri genus laudatissimum propè Tinaui fontes,
circumstantibus palustribus locis in Iaspide fi-
nibus, Galangæ vocatæ persimile, non tantum
facie, sed etiam odore: commendatur etiamnum

T. 3

Plin. 17.

Gal. 17.
Paulo 17.
Cyp. 17.Cyperus
Gladiolus
nullus.Galanga
dicitur à
multis Cy-
per. Babylon.
nec.Fuchs. 17.
Trag.Trag. 17.
dargitur.Cordus.
Plinius 17.
er.Cyperus
quadratus
nullus.Cordus.
Cordus.

Matth.

Cyperus 17.
genera 17.
Trag. 17.Locus 17.
cand.

*Cyperus qua-
drangula-
ris.*
Delectum.

*Amato Cy-
peri tres
species.*

*Iunci alre-
as species.*

*Iunc. qua-
dratus Cel-
si.*

*Anellana-
da.*

Locus.

*Iunc. trian-
gularis Plin-
ii.*

*Cyperus
germanicus
radicis.*

*Cyperus
Diosc.
Romae coll-
ectus.*

odore is, qui in Hetturia provenit, radicibus fe-
re Filipendulae æmulis, sed non ob id illi fuerit
preferendus quem Syria mittit: quandoquidem
hic longè odoratior est, & subamarus, &c. Re-
peritur cyperus quandoque etiam quadrangula-
ri caule, unde non mirum, si quadratam luncū
eum vocaverit Celsus lib. 3. cap. 21. Optimus de-
fertur ad nos ex Syria & Alexandria Aegypti in
cuius defectu Italicum supponunt Officinae.

Consultius mea sententia esset [Amati verba
sunt] si in praesentia cyperi tres species potius
describerentur, quàm dux tantum, quum reipsa
conspicua, ita esse comperiamus: nā altera spe-
cies luncus est, folia Porri in parte decliviori
habens, longiora tamen & exiliora, in cuius ca-
cunine minuta sunt, inter quae semen exoritur:
cui caulis cubitalis & maior inest, qui plerum-
que quadrangularis conspicitur, nam radices ro-
tundae, nonnunquam oblongis oliivis sunt simi-
les, nigrae, suaviter olentes, & gustu aliquantu-
lūm amaricantes: hanc verò Celsus, verus Hip-
pocratis imitator, quadratum luncum appella-
vit, cuius in aquosis & palustribus plerumque
nascentis radices, medico usui servantur: quibus
universa Hispania abundat, nec opus habet Sy-
riacis, quas suā voce praecipue Salmanticenses
Anellanada vocant: nec enim in Italia, praesertim
Longobardia desunt, sed mytopolae parū cu-
riosioribus communioribus radicibus earum loco uti-
tur, iis autem radicibus affinis cum voce, tum fi-
gura, alia radix, quam universa Lusitania iuxta
ac Hispania lunca anellanada vocant. Secunda au-
tem species cyperi, ubique in aquosis comperi-
tur foliis à prima non dissimilibus, caule tamen
triangulati, cuius radices oblongae, &c. Hanc
Plinius triangularem appellavit luncum, cuius
radices, Hispaniae & totius Italiae mulierculae,
aceto paratas, pro odoramento ac suavi sultu re-
condunt. Nec communiores officinae alias prae-
ter has radices, pro vero cypero monstrant, ha-
bentque, quum tamen illae primae, oliivis similes, à
Dioscoride ut praecipue commendentur. Hanc
verò secundam speciem nominari cupimus, cui
veluti & primae Dioscorides caulem, non quidē
triangularem, aut quadratum inesse dixit, sed
angulosum potius, ut nos cautos redderet, quod
cyperus & triangularis & quadratus reperitur.
Item quod melius esset, triangulati illo, radices
oliivis similes habente uti: quanquam & altero,
pro uero dexterrimè uti possimus, prout hoc tē-
pore mytopolae continuo faciunt. cyperi spe-
cies, quam Dioscorides secundam facit, ex India
ad nos usque fertur. Huc usque Amarus.

In seplasiis radices cyperi cognomine longi
ostendunt, ex qua autem planta collectae sint,
mihi (inquit Cronenburg.) incognitum habe-
tur, quandoquidem nemo hactenus eam aperue-
rit. Indubitatum tamen est, omnes seplasiarios
illis radicibus uti. Sed dum hanc rem diligen-
tius inquirō, & has radices per omnes qualita-
tes examino, animus inclinat, ut ipsius cyperi
germanas radices esse credam, ac prorsum eas,
quas in Italia Matthiolus & Amatus nasci me-
morae prodiderunt.

Monachi gloriantur se collegisse verissimi Cy-
peri Dioscoridis radices in Romano solo, ac et-
iam intus Romam. Eas quidem non excedere
Olearum figuram & magnitudinem, & esse con-
nexas ad invicem, folio mediante, sicut radices
herbae Filipendulae. Nullam denique notam à
Dioscoride positam deesse eis. Plantam etiam
similiter convenire descriptioni Dioscoridis, ex-

cepto quod respectu alterius plantae, sc. Cyperi
sualis, haec minor sit. Raro equidem luncum tri-
quetrum supra binum palmum erigi. Supradictae
autem cyperi vusualis plantam multoties ultra
nonum palmum procendi. Huius igitur dictae
parvae plantae cyperi radicibus utendum esse, con-
tra communem vulgarem usum. Ex indubio te-
nendum, hunc esse verum cyperum Dioscoridis
nec ob stare quod in Italia sit parva planta, cum
& Dioscorides dicat caulem eius cubitalem esse
aut maiorem. Verum propterea non volunt as-
serere illum magnum seu vulgarem non esse cy-
perum. Quia licet ab ipso Dioscoride & aliis au-
thoribus non praecise scribatur, habet tamen
[excepta radice] omnes alias notas cypero at-
tributas. Nec magnitudo eius facit aliquid: ut
non sit cyperus. Fatentur enim ipsum esse cype-
ri speciem: sed à veritate formae radicum ipso-
rum, alterum rotundum, alterum verò cyperum
longum, appellandum concludunt: In usum au-
tem medicum rotundum magis commendant.

Anguillara, aliter ac alii, videtur existimare
cyperum Theophrasti à Diosc. differre, cum ait
cyperus tum ille qui descriptus est à Theophras-
to, tum ille Dioscoridis, notissimus est in Italia.
Vterque est in horto publico Parmeno. Haec An-
guillara.

Dodonaeus duarum specierum meminit nem-
pe longi & rotundi. Quod ad rotundum attinet,
nescio de quo loquatur, radicem non exactè de-
scribit.

Antidot. Florentinum meministrium his ver-
bis: Duorum generum in Italia reperitur: Vnum
exiguum, cui radices Oleae similes: Alterum ma-
ius, cuius radices inaequales & contortae. Hodie
quae ex Oriente adfertur melior est nostrata.
Haec Collogium Florentinum.

Cyperum (inquit Corn.) quem Celsus iun-
cum quadratum appellat, & Plinius triangularem,
Diosc. simpliciter angularem dicit, & similem
xantho, id est iunco rotundo ac odorato à Celso di-
cto. Nec cyperus alius à cypero est, velut Plin-
ex Theophrasto putavit, qui tamen eandem quae
Dioscorides descriptionem habet. Nec Galenus,
nec Aetius, nec Paulus ampliùs quàm unum cy-
perum agnoscunt cyperis tamen privatim radix
cyperi dicitur. At cyperi species in India nascentis
Zingiberi similis, ea esse creditur, quae tamen
hodie Zingiberis radicibus ammixta reperitur,
dum ex India illae afferuntur, & per Italiam fe-
rè, itemque in nostris Officinis Curcuma ap-
pellatur. Reperitur etiam inter Zingiberis radi-
ces allata, radix fulva, geniculata, ponderosa,
cri admodum sapore, quae Officinis Galanga ap-
pellatur minor: nam maiorem diximus esse Aco-
rum: & hanc cyperi aliquam speciem esse Her-
barii sagaciores conieciunt, & Babylonicum cy-
perum appellant. Haec ille.

De Cypero eiusque speciebus, haec Casp. Bar-
hin. in pin. nortensis aut nortensis, à radicis effigie
quae pyxidulam aut vasculum pusillum imitatur,
nomen accepisse viderur. Genera duo Dioscori-
des lib. 1. recensuit: alterum radice rotundā, quod
Officinae cyperus est: alterum Zingiberis ef-
figie, quod in Officinis Curcuma dicitur.

Cyperus alius amarus, alius dulcis est: amarus,
vel odoratus, vel inodorus: uterque vel ro-
tundus, vel longus: dulcis verò vel angustifolius,
vel latifolius est.

Klimes aut klimes & klimes Gracis: Latini-
nis cyperus dicitur, Officinae Latinum nomen
retinent. Inter Diosc. spuria numeratur: Roma-

*Cyperus
sualis*

*Cyperus
rotundus
& longus*

*Antidot. Flo-
rent.*

*Nomen
linguae*

in uocant *Iunci radices*, alij *Iuncum*. Ger. *wilde Galgaet*, & *mollrichende eefete Bingen*, hoc est sylueftrem *Galangam* & *Iuncum* odoratum angulosum (à caule nimirum) nominant. Gall. *Soncher*, fortè à radice quam Galli *Sonche* vocant cuius vis & vñs est præcipuus. Arab. *Saberade*, Hisp. *Iunca de olor*, & *Iunca auellana*, ut ait Matth. Amarus tamen dicit Salmanticens Pharmacopolas *Auellanada* vocare, & *iunca auellanada*.

Cyperi vetera genera nota nostro seculo sunt tria, præter Indicum, quæ cognita fuere Matthiolo, Collegio Florentino & mihi, Quorum 1. longus, Secundus quem rotundum nigrum Italicum vocamus, qui Dioscoridis uideretur. Tertius est rotundus Syriacus magnus.

Cyperum autem nomine aliquot donantur plantæ, in primis cyperi genera, de quibus hoc capite agitur, cuius radices oblongas dicit Plinius vocari cyperida. Secundò cyperus Plinio quæ est xyphion & gladiolus de qua suo loco. Tertio est cyperus in India Dioscor. de qua cap. de cypero Indico, apud Plinium cyperis dicitur cap. 18. lib. 21. Officinis *Terra merita*. Quarto cyperi nomine donatur *Galanga*, sunt enim aliqui qui cyperum Babylonicum cognominant, ut Ruellius & Syluius. Quintò est Pseudo-cyperus Plinio, qui an sit ex numero præcedentium vel planta diuersa difficile est diiudicare.

CYPERVS PANICVLA SPARSA SPECIOSA.

CAP. CLXXXIII.

Descriptio Radices importuno reptatu luxuriant, circa Monspelium: longæ, mox in Oliuares portiones exuberantes. que ita continuatæ ut in



Filipendula, odore grato, colore fusco: Culmi triquetri, bicubitales, striati, quos à radice statim comitantur folia multa longa, pediculi palmares, & dodrantes, aut etiam vix vnciales; panicula plurima, diuisa. Habent Sepalæ cyperum longam, quæ nec ipsa nodis destituitur, sed qui minores sunt quàm Syriacæ, maiores quàm

Creticæ, nec ita rotundi, sapore & odore suauis aromatico cum amaritudine. Hanc cum Monspeliana eandem autumo. Si figura non fuisset sculpta meliorem curassemus parandam.

Histor. Lugd. figuram titulo cyperi nostratis longi odoratoris posuit ex Lobelio: & præterea aliam pag. 99. à Matthiolo simpliciter nomine cyperi: vna meo iudicio sufficeret imago: nec duæ diuersæ plantæ exprimuntur.

C. Bauh. pin. *Cyperus longus odoratus* 1. siue cyperus odoratus longâ radice: & *Cyperus officinarum*: *Cyperus radice grato & furculosa* Theophr. Tom. II.

Cyperida, Plink. *Cyperus*, Matth. (qui & longum & rotundum vulgarem vna figura exprimit, ut & Lugd.) Ang. Fuchf. Tur. Lac. Geln. car. (cui & Iuncus angulosus) Cast. *Cyperus Romanus* siue *longus*, Cord. in Diosc. *Cyperus longus* (odorator, interponitur in lc. plant. pag. 75.) Lob. Adu. Eid. Obf. p. 40. & Hist. Lugd. *Cyperus longus*, Cord. Geln. hort. Dodon. Camer. Tab. Ger. *Cyperus secunda species*, Amat. *Cyperus primus & maior*, Cxi. *Galanga spinulosa*, Germanis.

Græci *ῥιζομαχάριον* aut *ῥιζομαχάριον*: Ger. wild *Galgant*. Nomina hoc eo, *Galangam* sylueftrem, & *mollrichende eefete Bingen*, id est, *Iuncum* odoratum angulosum, vocant: Belgæ *wilde Galgaen*, Galli *soncher*. Quin & *Galangam* Veleuriensem, quod ibi multum proueniat, Corn. appellat.

Cyperus noster longus, de quo loquitur etiam Fuchsius, nascitur in locis cultis & palustribus. In Germania non nisi cultus in hortis prouenit. Minuta folia in cacumine cum semine Iunio & Iulio mense producit. Dodonæus in Flandria tantum in hortis reperit. Sed licet afferant nonnulli cyperum in tractu Rhæni gigni, Tragus tamen nunquam, quàm in hortis satum prouenire vidit. Matthiolo cyperi radicibus longis genus laudatissimum nascitur propè Timæi fontes. Commendatur etiamnum odore is, qui in Hetruria prouenit, radicibus ferè Filipendulæ æmulis: sed non, ob id illi fuerit præferendus, quem Syria mittit. Longi, habitioris, odoratoris Europæi frequentior multo prouentus & vñs Septentrionalibus regionibus, ut Germaniæ, Belgio, Angliæ & Galliæ quàm Meridionalibus transmarinis: Lobelio & Pena testibus. Nos etiam cyperum quem descripsimus odoratum circa Monspelium variis in locis obseruauimus, ut iuxta urbem ad riuulum non longè à portu S. Gille ad sinistram eamque cum flore mense Iunio, Obseruauimus etiam in hortis quibusdam ut Tiguri Gesneri, Paterniaci lo. Textoris Medici, Patavij, Genæ.

CYPERVS PANICVLA CRASSIOR MINVS SPARSA.

CAP. CLXXXIV.



Descriptio Collit triangulari ad cubiti & sesquicubiti altitudinem, quæ stipant folia graminea, striata, carinata, acuto dorso gibba: in culmi summitate folia duo aut tria breuiora, angustiora, oriuntur, quorum sinu panicula se explicat fusca, flouescens pallentibus: radix è pluribus oliuatis glan-

dibus constat, colore foris fusco, intus albo, sub-

qui idem pro singulari sua humanitate & munificentia pluribus aliis exoticis Chetlerum donauit.

De huius viribus hæc Dioscorides: Vis ipsi est calefactoria, & aperiendi, urinam ciendi. Calculosis & hydropicis potu auxiliatur, itaque à scorpione ictis. Est ad vteri perfrictiones, & foementis adhibita prodest, menses ducens. Facit etiam ad oris vlcera & depascendo proserpentia arida trita. Miscetur & malagmatis calefactoriis. Narratur & alia species Cyperi in India. Cyperi radices maxime vsui sunt exalfacientes patiter & exiccantes absque mordacitate, autore Galeno. Itaque vlceribus, quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter adiungunt mirifice profunt: habent enim quiddam etiam adstringens: quapropter vlceribus oris conueniunt. Quin & incidendi vim quampiam illis inesse testificandum, quia & calculo vexatis congruunt, & urinam mensesque prouocant. Cypero vis in Medicina Philorhi, vt refert Plinius, illinitur pterygiis, vlceribusque genitalium, & quæ in humore sunt omnibus, sicut oris vlceribus. Radix aduersus serpentium ictus, & Scorpionum præsertim, remedium est, vulvas aperit pora. Largiori tanta vis, vt expellat eas. Urinam ciat, & calculos, ob id vtilissima hydropicis. Illinitur & vlceribus quæ serpunt, sed his præcipue quæ in stomacho sunt, ex vino vel aceto illita. Apud Ægyptios maximos ad medicinam vsus habent radices. Sunt verò odorata, atque acuti saporis. Hæ calefaciunt, exiccant sine mordacitate, incidunt, attenuant, oraque venarum aperiunt. Sed præcipue ad vlcera oris: & pudendorum sananda familiarissimum ipsarum tum puluis, tum combustarum cinis, est remedium: ex ipsis paratum decoctum, vel puluis, stomachum, cerebrum, pulmones, vterum, nervos, articulos, aliquibus diebus sumptum, plurimum calfacit, siccatur, roboratque naturalem calorem: ex quo omnibus morbis à cerebri tum frigida, humidaque temperie, tum frigidorum humorum distillatione concitatis, hæc efficacissimum sunt auxilium: non minusque stomachi cruditatibus, humiditatibus, flatibus, anhelitibusque difficultati, orthopnœa, usui, nec non hysteriis omnibus, mulieribus ex frigido, humidoque vtero effectis, aliisque morbis, ab istis vteri causis obortis, & articulorum doloribus. Familiare satis remedium ad suppressos menses eas esse ibi expertum est. Decocto ac puluere ad strangendum tum in renibus tum vesica lapidem, ac ad ciendam urinam frequentissime illi vtuntur, quod etiam non minus in omnibus chronicis febribus ac aliis diuturnis morbis frequentant.

CYPERVS AQUATICVS SEPTENTRIONALIS Lobelio.

CAP. CLXXXVI.

Descriptio

Scrobibus item & riuiis ad Scaldæ amœnissima fluente ponit Nouam Antuerpiam vrbem istdem foliis & inbara panicula prouenit. Radices nonnullas, sed paucas, teretes, oliuares, oblongiores instar Filipendulæ emittens glandulosas, gustu adstringentes, nulla odoris gratia: Lobel.

Lobel. Obs. pag. 40. lc. p. 72. *Cyperus aquaticus septentrionalis* 1. *Cyperus aquaticus* Lobelii. Ca



CYPERVS ROTVNDVS LITTOREVS
inodorus.

CAP. CLXXXVII.



trus, in quo racemosa iuba congesta. Gustu subadstringit, radix frigida & sicca odoris & saporis experts. Lobelius.

Lob. Obs. pag. 40. lc. plant. 77. *Cyperus rotundus littoreus inodorus*. Hist. Lugd. *Cyperus rotundus inodorus* Lobelii. Cxtalp. *Pseudocyperus*, cuius herban Nocum in Hetruria vocant. C. Bauh. pin. *Cyperus rotundus inodorus* 2. *Sine Anglicus*.

CYPERVS LONGVS INODORVS SYLV:
Lobelio.

CAP. CLXXXVIII.

N ostratis Cyperi altera species minor inodora, ferè neglecta, quam Theophrastus in

mer. hort. *Cyperus rotundus* nigra inodora radices habens. Casp. Bauhin. pin. *Cyperus rotundus inodorus* 3. *Sine Germanicus*.

Locus

IN Angliæ borealis & Belgij fluminum littoreis lene fluentiumque riuiolorum, & maris alluionibus, Cyperi genus non inelegans, radicem longè lateque sparsa sobole multis & bicubitalibus implexarum filamentis cypero rotundo parium oritur. Folia angulosa, caulis cubitalis & sesquicubitalis, nitidus, trique-

Synon



Synon.

Locus & Tempus.

Heluetia miscabant suis quintis essentis.

Lob. Adu. cyperus longus inodorus. Eid. Icon. pag. 76. cyperus longus inodorus sylv. Casp. Bauhin. pin. cyperus longus inodorus 4. sive Germanicus.

Cyperus adulterinus Gesn. in aquis Geneux circa Aru, florens mense Maio.

perus Gramineus, seu miliaceus Penz p. 993. Casp. Bauhin. pin. Gramen cyperoides 13. sive miliaceum: Pseudo-cyperus malvaceus, Thalii. Geneux, Basilea & Montbelgardi frequenter & copiose Maio mense florentem obseruavi.

Locus.

MALINATHALLE THEOPHR. ET Anthalium Plinio.

Inter edules radices quas Aegyptus fert Malinathalles à Theophrasto connumerantur: ait enim lib. 4. cap. 10. Locis autem arenosis, haud procul à fluuio distantibus, nascitur in terris quod Malinathalle (μαλινάθηλλον, Malinathalle Gaz.) appellatur, figurà rotundum, magnitud. uero Mespili [μίσπλου, sine nucleo, sine cortice: folia ut cyperus, κυρίως, Gladiolus Gaz.] mixta.

Has easdem planè notas suo Anthalio Plinius lib. 21. cap. 15. tribuit, dicens: Anthalium longius à flumine nascitur Mespili magnitudine, & rotunditate, sine nucleo, sine cortice, folio cyperi.

Mihi autem Trasi [de qua mox agemus] conuenire videtur cum Malinathalle, quod idem mecum sentiunt Casalp. Fab. Columna & Clusius. Contrarium uero tenet Bellonius, qui Malinathallen existimat esse Melanzana sive Mala insana, cuius opinio nec mihi, nec Dodonæo, nec Clusio probatur. Nos de Malis insanis agemus l. 34.

Dodonæus ait Malum quod vocant Aethiopicum cum Malinathalla non conuenire. Idem sentit & Hist. Lugdunen. & merito ut iudicauimus l. 34.

CYPERVS LONGVS INODORVS sylvaticus, uel montanus C. Bauh.

CAP. CXC.

Descriptio Radices habet oblongas geniculatas, rufescentes, folia plura, palmata uindia, angusta, subaspera, ad principium membrana rufescente simul uelita: caulem hactenus nullum obseruauimus: in syluosis montosis humidis, ut in monte nostro Mutero prouenit.

Synonyma Hic cyperus longus inodorus 5, Casp. Bauhin. in pin.

CYPERVS GRAMINEVS.

CAP. CXCI.

Descript.



Triquetrum cubitalis altitudinis caulem surrigit, quem folia comitantur, eius in medio tenuis ferè complexa, ubi à caule recesserunt, eius cacumè superantia, carinata, duplo Gramineis latiora, alioqui non ita dissimilia: summo caulis fastigio Miliaceæ in latum diffunduntur

panicula, granis confertis iunci grauida, quorum exortui folia subiiciuntur, inferioribus, nisi minora essent, similia. Radix fibrosa.

Synon. Lobel. in Adu. & Icon. Plant. pag. 79. cyperi gramineæ sive miliaceæ titulo ponit iconem, quæ non placet.

Hist. Lugd. duas dedit imagines, quasi diuersæ essent plantæ. Inuus latus pag. 98. & c.

HABALZELIN SIVE GRANVM Alzelin Veteribus.

CAP. CXCI.

Habalzelin granum est pingue [inquit Serap. cap. 37.] Ciceris magnitudine, citrinum exterius, & album exterius, & habet bonum saporè & defertur ex terris Barbariæ. Auicennæ granum Alzelin est boni saporis, & oritur in partibus Herfur.

Descriptio

Habalzelin porro esse Trasi existimant Bellonensis, Matthiolus, Montanus, Gesnerus, Alexander Bened. Lobel. & Pena, Rauuolffius, Fumanellusque. Negant Guiland. & de Trasi paulo post agemus.

Synonyma

Matthiol. scribit Guiland. Aethiopicum Piper cum Grano Zelini confundere: Gesnerus uero Guilandinum Croni uel Piper Nigrotum cum Alzelini commiscere: uide Hist. n. g. l. 5.

T R A S I.

CAP. CXCI.

Non simul depositis in terra uuida radicum bulbulis mihi enatū est Trasi, foliis quidem luxurians cyperinis, acuto dorso triquetris, minoribus, nec adeo stringenti infestis: uerū nec caulem quem triquetrum aiunt, nec paniculas quas Cyperinis proximas asserunt, produxit: bulbuli uero cyperi modo circularibus Zonulis præcincti, paruum æquant Auellanam candida dulci

Descriptio



*Malina
challa
Theoph.*

dulci, compa-
cta, vesca carne,
ex radicum fi-
bris penduli.

An verò *Trasi*, Theophrasti
sit *μαλπαζάλη*, si-
cut & Anthal-
lium Plinij
(quod ego qui-
dem teneo) Le-
ctoribus exami-
nandum relin-
quo. Meam opi-
nionem à Ca-
salpino confir-
matam inuenio,
& postea etiam
à Clusio. Bel-
lun. huius me-
minit in fine A-

uic. de nominibus Arabicis vocans gramen *Al-
zelen* vel *Allezzen*, Venetorum *Dulcighini*, & alio
nomine Arabico *Hal Alzezi*. Iul. Scaliger huius
mentionem fecit, dum ait *αλζιζα* falso putarunt
esse eam, quam terrestrem Zizipham vocat vul-
gus. Namque in nostrati agro ea sunt *Chamazzi-
zipha*.

*Malina
challa
Theoph.*

Cord. in Obs. Sylva, Herbam radice Nucis a-
uellanae figura & quantitate (ita enim vocat
Trasi) suspicatus fuit, esse xyphion Theophrasti,
aut Ornithogalon, aut *Moly* huc *Myle*, cum tamen
nec ulli plantarum à Veteribus denominatarum
respondeat.

Matthiol. in Epist. ad Fallop. Oloconitis Hip-
pocr. non est *Trasum*, quod Veneti *Dulcighinum*:
perperam Guilandinus contendit contra Bellu-
nensem Granum Zelin apud Serapionem non
esse *Trasum*: Ethiopicum Piper cum grano Zelin
confundit, perperamque Bellunensem impugnat:
Facultates grani Zelin Auicennae respondent
Dulcighino. Idem in Diolcor. *Trasi* saporis dulce-
dine castaneis proximè accedentes, sunt radicular
figura ac forma persimiles sericinis Erucis, quae
feruenti balneo elixi contrahuntur, dum serica
stamina inde mulieres conglomerant. Folia far-
ragini similia, cuius radicibus *Trasi* coherent:
Has verò satis representare videntur radices il-
lae, quas Doronicos vulgus Officinarum nomi-
nat. Et in Epit. *Trasi* ita Veronensibus appella-
ti, Veneris *Dulz. lini*: folia in cacumine mucro-
nata, cyperi modo, quem quidem planta tota
plurimum imitatur. Caules enim edit cubitales
& angulosos, in quorum cacumine folia exilia
in stellae modum radiantur, inter quae flores spe-
ctantur spicati subsuluescentesque. Radices habet
numerosas, è quibus globuli dependent bulbosi,
oblongi, subrubefcentes, Fabarum magnitudine,
etiam grandiores, alba dulcique intus medulla,
scabro putamine. Matthiolus olim Iconem po-
nebat in qua nulli caules nec flores, ea figura
est minus artificiosa, potius quoad radices: in e-
pitome postea & aliis commentariis mutata est
icon & descriptio, additque sunt caules & de-
scriptio non ex autopsia, sed fortè ex iconè aut
descriptione missa per Calzolarium, quam bene
relinquimus iudicio loh. Ponzæ Pharm. Veronen-
sis.

*Malina
challa
Theoph.*

Amatus in Diosc. cypero affinem ait, & in v-
niuersa Lusitania ac Hispania *lunca auellana* vo-
cari refert, significantius tamen luncum Auella-
nam.

Parum absuit quin *μαλπαζάλη* meditaretur Guil-
landinus *Mamiras* apud Paulum, & Holoconitum
apud Hippocr. non modò diuersorum generum
plantas denotare, verum etiam verèque vocem
ab Itatorum Dulcichinis (quae Veronenses *Trasi*
& *Trasi* vocant, Genuenses Ziziphas terrestres,
Hispani luncum Auellanam, Arabes *Habbaz*
discrepare. Est idem auror Dulcichina *αλζιζα*
dici non posse. Nihil tamen obstat contēdit
quominus Dulcichinum *Mamiras* dici possit. Ri-
det autem Bellunensem, qui Dulcichinum ab A-
uicenna granum *Alzelin* vocari asserit. Tandem
asserit Holoconitum Hippocr. non dissidere à Dul-
cichino.

Dulcichinis siue *Trasi* minoris in Africa ubi
vocantur *habalzelin* vocatis, & ab aliquibus in
Italia luncus Auellana, quem Amatus Venetiis
vendi scribit ex Ethiopia aduectum, Graecè
Schœnocaryon nomen hinxerit Gesn. hort. Idem
hæc ait ad Guiland. inter Epist. Matth. Dulci-
chinum Oloconitum Hippocratis negabas: nunc
verò coniugas: dubitavi ego possit ne idem Bul-
bocastan dici, nunc verò tecum sentio non
esse: assertam à te veram Tralliani lectionem
assentior. Tu Dulcichinum *Mamiram* esse affir-
mas, ego nego. Item Bellunenensis granum alze-
len &c. Alex. Benedictus idem sentit, tu contra-
dicis. Ego Dulcichinum granum alzelin esse
sentiam, Croni vel Piper Nigrotum cum grano
Alzelin contra Serapionis sententiam confundis.
Oloconitis Hippocr. non est Dulcichinum.

An Leri cap. 13. *Trasi* intelligit cum ait: Syl-
uestribus America est genus fructus quem vo-
cant *Manibi*, in terra proueniens Tubercum mo-
do & filamentis cohaerens, nucleus non maior
fatius Auellanis, eiusdem saporis, cinerei colo-
ris, cortice non duriore quàm Pisorum: an fo-
lia & semen proferat, licet sæpius comederim,
non obseruavi: nec recorder. In margine *Manibi*
species Auellanae (*niserte* gall.) proueniens in
terra. Multum similitudinis habet hæc radix cum
Trasi: an eadem affirmare non audeo.

Bellonij Obs. lib. 2. cap. 25. *Dulcequim* Itatorum,
siue *Dulcequim*, in Hispania Valentino agro *In-
cia abellan* vocata, cum *Malmathala* Theo-
phrast. & Plinij, multis notis conuenire videtur
Clusio.

De Dulcichino (ut vocat de purg. & Histor.
Lat. in fol.) hæc scribit Dodonæus. Dulcichi-
num cyperum rotundum refert. Folia etenim
eius arundinacea, oblonga, dorso eminente,
triangula, cyperidis similia, caulis angulosus &
iuba similiter respondent, omnia tamen bre-
uiora ac minora, à tenuibus radicum fibris, A-
uellanis ferè conformes, sed tamen aliquantò ob-
longiores, dependent globuli, veluti exigui bul-
buli, specie articulati, colore exterius rufes-
cente, interiore verò carne candidi, sapore gra-
to, dulcique & castaneis proximo. Stirpem ipsam
nostra ætas Dulcichinum, & radicular *Trasos* siue
Tragos appellat, aut *Trascos*. Cyperi species est, sed
dulcis, Theophrasto, ut satis apparet, non inco-
gnita. Libro siquidem de caulis septimo. Cype-
ri radices inter dulces atque edules refert.
Cyperi, inquit, radix dulcis, ut eorum
quæ in fluminibus & paludibus proueniunt.
Quod procul dubio, non de alio, quàm de isto,
accipi potest: aliorum siquidem cyperorum ra-
dices amarificant & minimè edules sunt. Non de-
sunt tamen, qui *Trasos* istos Arabum Medicorū
Habalzelin siue Granum Zelin esse constanter
existimant, quod tamen veritati parum consen-

*Gif. contra
Guiland.*

raneum. Nam Alzelin ab auctoribus Arabibus inter fructus siue Grana connumeratur, nequaquam autem inter radicales. Serapio quidem sic habet. Habelzelin granum est pingue, Ciceris magnitudine, citrinum exterius, & album interius: & habet bonum saporem, & defertur ex terris Barbariae. Idem affirmat Auicenna cap. 303. Ex quibus, quod inter haec discrimen sit, patet fit. *Hus usque D. d. nens.* Dodonaeus eundem suam desc. ad iconem Matthioli, ex eodem asserens, quod non vidit: duas icones habet, vnam sine caulibus, quae placet: alteram cum caulibus & floribus ex Maeth. minus artificiosam: cyperum esse dulcem Theophrasti asserere nondum possumus, nec etiam negare esse Habelzelin: non satisfacit nobis argumentum eius.

Lebel. in Adu. vocat Trasi Recentiorum, Afrorum *Hab-al Zelin*, & Trasi Veronensium [vt etiam Obs. pag. 4. & 41. itemque Ic. pag. 87.] statuens, cyperis congeneres, indeque cognomine cyperos esculentos.

Casalpini refert aliquos agri Veronensis *Zizela* terrestres vocare, cyperi genus hoc vulgo *Trasi* vocatum, quo Doronici radices adulterant.

Inter edules radices quas Aegyptus fert *Malinathalles* à Theophrasto connumerantur. Ex cuius textu Plinius mutuatus pro *μαλινάδαλα*, Anthaliu transcripsit: quod graece *αδάλια* scriberetur, ex *αδ*, & *αλ*, vel *δαλα* compositum, quod est regermino, parum distans à verbo *μαλινάδαλα*, quod ex *μαλ* aduerbium, & *αδάλια* conflatum est, significatque valde regermino, quod etymon proprium est huius plantae, quae radice vnica sata se propagat, innumeratque producit, auctore Columna.

Nos assumptimus iconem Columnae, cui flores, quos negat Pena ferre, dicens potius esse cyperi cum Trasi prouenientis Veronae. Clusius exhibet iconem sine caule & flore, quae nobis placet.

Trasi nostrum vel esculentum cyperum Dulcichinum à Guilandino vocatum, collocat Pona inter plantas, quae nec caulem, nec florem, vt nec semen etiam producant.

Synonyma

Casp. Bauhin. apud Matthiolum putauit esse cyperum radicibus dulcibus Theophrasti, quam sententiam videtur retractare in pin. dicēs: *cyperus esculentus* i. siue *cyperus rotundus esculentus angustifolius* *γυρδαρος*, Gesn. hort. *Trasi* Matthioli. *Caf.* *Caf.* Lugd. frag. *Herba radice magnitudine Anellana*. Cord. Obs. *Iuncus Anellana*, Ama. *Trasi Veronensium*, Adu. Lob. *Dulcichinum* Gesn. hort. Guil. Dod. *ulconis nuppor*. Fabric. *Cyperus dulcis* Theophr. Cam. Tab. *Cyperus esculentus*, Ger. *Malinathalla* (quali valde regerminans) *Theophrasti Aegyptiorum*, & *Anthaliu* Plini Dalechamp. in Plin. *Caf.* Column. *Margarita Aegyptia*, Antore libri *Aristotelis de plantis*, Dalechamp. in Plin. *Trasi folio cyperi*, Clus. in Garz. *habaz*, & portae. *Habel assis Tripolitani*: siue *Gramen alzelin Arabum*, Rauvolf. Plantam hanc nec caulem, nec florem, nec semen producere, sed sola radicum propagatione conseruari, Gesnerus lib. de hort. & Pona in suo Baldo affirmant. Contra Matthioli. Dodonaeus, Lob. Columna cum flore pingunt, & Casalpini, caules, folia & semen cyperi, & Fragosus flores spicatos aliquantum flauos, tribuit.

Locus

Hae planta propria Veronensis est, nullibi enim in tota Europa, praeterquam apud nos sponte nascitur. Prouenit verò copiosissime prope vr-

bem ad meridiem auctore Pona. In Aegypto colit radicem quam Itali *Dalegum* nuncupant, testatur Bellonius. Clus. frequentem reperit in agro Valentino in Hispania. Rauvolfius scribit Tripoli venalem in officinis proponi ex Aegypto delatam. Planta germinat Vere & Aestate. In fluminis Athesis scribitur sabulosis, vt tradit Alexander Benedictus. Autumno bulbuli leguntur, Vere seruntur in plures multiplicandi.

Trasi cremore pectoris & laterum vitia expurgantur. quo fit vt tussientibus opem non modicam praestent, tunduntur enim, maccanturque carni iure, deinde per linteolum exprimitur cremor, quem etiam veneris portionibus miscent Recentiorum nonnulli: Sunt, vt experientia compertura esse, & ex dulcedine conici posse, scribit Matthioli in calfacientium & humectantium genere, sed status quodammodo gi-gnunt. Excalfaciunt quidem & humectant ordine primo, leniunt, laeuigant, emolliunt, Veronenses pro bellariis vescuntur. Capiti non mediocriter conducunt.

Vitis & Vin.

TRASI MINORES.

C A P. CXCIV.

DE herba tota certi nihil adferre possum, ar-
radices rotundiores minoresque quam Tra-
si vulgaris Veronensium, mediocris Pili magni-
tudine, foris rugosae, nigriores, intus albæ, dul-
ces, sapore eodem cum Veronensium Thrafi.

An Gesn. hort. *Dulcichini* & *Trasi* minores in Africa vbi Habelzelin.

Anno 1599. accepi Trasi minores, missas à Carolo Paludano sub titulo *fructus ex capo grati esui* & postea anno 1598. ab eodem cum inscriptione *Trasi Indici*.

Descriptio

CACERAS TRASIVM MODO NASCENS, folia Iridis lutea.

C A P. CXCV.

Inuenitur in India radix Trasi modo ipsi ter-
re vilem nate, quae deinde per siccitates
caulem emittit dodrantalem, folia simul im-
plicata, virentia, Iridi lutea aquatica siue Gladiolo similia. Dehiscente per siccitates terra ex-
istit Tuberi modo, deinde siccata castaneorum
sapore refert, non siccata autem ingra-
ti saporis est: Caceras illic vocant, vt Gar. Arom-
1.2. c. 27. prodidit.

Casp. Bauhin. pin. *cyperus esculentus* i. siue *cyperus rotundus esculentus latifolius*. Caceras, Garziaz addit Clus. in notis, *μαλινάδαλα* Theophr. Caceras in Goa, Frag.

Synon.

PAPYRVS NILOTICA.

C A P. CXCVI.

Cum nobis incognita haec sit, nec vnquam vi-
sa, placuit in ea pertractanda cum ordinem
obseruare, quo ab ipsis autoribus est manifestata.
Non corticis igitur, siue libri, cui inscriberetur,
vt quidam putarunt est Nilotica, siue Aegyptia Pa-
pyrus, sed plantae magnitudinis speciose admo-
dum, cyperi similis, citigie, natalibus, etiamque
nomenclatura Aegyptia, qua in regione secus
fluens

fluens



fluente in Nili palustribus adolescit, nec è profundo emergit, sed tantum è vadosis frutescit, non procul à ripis, ut etiam diuina pagina narrat. Moſen diuinæ ſpei & elegantia delicatulum puellum à matre inuita eiecitum propè Nili ripam inter Papyros, vnde diuinitus iuſſu filiz Pharaonis eductus, indeq; Moſes vocatus,

quali aquis creptus, fuit. Niloticam Papyrum, vnde & qualem deſcribunt Theophrastus & Plinius aduectam, horrique Piſani torius oræ Thyrenæ, ſongè ameniſſimi & ruris ſtirpibus diſiſſimi inquilinam factam vidi & ſlorentem legi benivolentia Profeſſoris in Academia Piſana Andree Aeroariz Ciſalpini, quo etiam hortante nonnullos ſkolones Papyri & aliarum rariorum plantarum Geſnero miſimus: quarum oblectatus peregrina elegantia, ut erat incomparabilis modestiæ & eruditionis, non ita multo poſt literis gratulabundis hæc ſignificauit. Rarum ſpectaculum ſui mihi præbuerunt ſtirpes duæ munera tua rariffima, quarum illam Papyrum Niloticam vocas, altera, mihi tecum ignota eſt: ſed nec illam nouiſſem, niſi tu monuiſſes eſſe Papyrum Niloticam è Piſano horro lectam. Plinio videtur gemina Aegyptia & Babylonia, ex qua præparantur acu chartæ diuiſæ in prætenues, ſed quam tenuiſſimas philyras. Tua verò an ſic poſſit præparari neſcio: Plinianæ premuntur preliſ plagula & ſecernuntur ſcapo nunquam plures quam vicenæ. Plurima quæ ibi habet Plinius non aſſequor, nec cum Theophrasto conferre vacat, ſed peruelim ſcire cuiuſmodi tuæ ſint folia, & an non cyperus ſit, ac cum noſtrum opus in lucem exhibiturum depingendas, ac tibi acceptas feram.

Neutiquam mirum doctiſſ. Geſnero viſam eſſe cyperum, cum illi ſit congener & ſimillima: verum elegantior multo eſt, luncea harundinaceo-ve-ritriquetto caule, medulla faſcto tomentacea, quæ tuſa glutiniſque in ſpeciem ſubacta ducebatur in bætreas Papyraceas, quæ mutud ſibi appreſſæ folia craſſiora conſtabant ſcribendo apta, quemadmodum etiamnum ſit ex laciniis linei panni contuſi & in candidum gluten redacti. Medulla verd utebantur ex præcepto Antiquorum, quemadmodum hodie Chirurgi Itali linamentis & turundis ex medulla Sambucina aut ſpongiæ paratis, quod ſuis poris melius ſaniem imbibant, tuæque qualitate deſiccando fiſtulas latiores faciant, quod ſactitari ſolitum meminiſ Dioſcorides. Stripitum numeroſorum proceritas, leuis, nitida, ſurrecta ſenſim ſeptenſimve interdum cubitorum, quibus, niſi ad imum folia inſunt cyperi aut ſparganii repanda: radices autem arundinaceæ, fibroſæ, quas in Aegypto erutas aſſerebant, non illic ortas, propterea quia ſemine caret, tametiſ floribus eſt perquam ſpectioſis & luſulentam in ambitu caſariem effugian-

tibus: numeroſis, gracilibus thyrfuſis denſo & æquabili comarum ſtipatu, & apicibus prominentibus. Ferulæ in modum collectis, non ut cyperi ſparſis, quos circa ortum ambiunt radiatum, ſic folia, multò minora illis, quæ ſunt ad imum, ut in cypero: Ideirco veriſſimile ſit hanc veram Theophrasti eſſe, & Papyri deſcriptionem apud Plinium geminam eſſe, ſed mutilam, æque duabus diuerſi generis Papyris conſulam, nempe ex Aegyptia hæc & ex Babylonia, cuius etiam alij Scriptores, inemerunt. Nam ut nomen & res indicat, Theophrasti Papyrus non alia eſt, quàm Dioſcoridis, quæ notiffima omnibus fuit, ex qua præparabantur chartæ, & vtiſſima Medicis ad ora fiſtularum diducenda, nempe medulla, ut ſuperius oſtendimus, etiamq; è luncea medulla hodie fieri ſciamus, nam ipſam chartam non eſſe, ſed medullam, indicio eſt, quod Dioſcorides dicat cinerem crematæ Papyri, præſtantiorem eſſe quàm chartæ, & ipſos ſtipites neutiquam inſeri ſinibus aut fiſtulis ſotitos, ſed medullam, propter commoda quæ recenset Dioſcorides. Iſtoque aut vſum tuum ſunium, cum chartæ obſcurius Plinius tradit, cum dicit, reuntur omnes tabula madente Nili aqua, quod de ſumibus quis forte interpreteſtur. Et mox: turbidus liquor vin glutinis præbet, cum primò ſupinata tabula ſcheede illimitur longitudine Papyri, quæ potuit eſſe ſegmentis, verinque amputatiſ tranſuerſa poſtea erate peragitur, premuntur deinde preliſ & ſiccantur Sole plagula, atque inter ſe iunguntur, quæ medullæ gluten in chartas duci ſolitum inuete videntur. At ubi in Euphrate circa Babyloniæ naſci ſcribit, non eandem videretur deſcribere, ſed eundem vſum habere chartas, quæ diuiſæ acu in prætenues, ſed quàm latiſſimas, philyras præparantur. Quæ & iſta folia admodum lata, quibus metæ læcharatæ adferuntur paſſim inuoluntæ ex Auſtrinis trans Aequatorem Inſulis vocari poſſunt Papyraceæ, quemadmodum olim etiam folia Palmæ & aliarum arborum, quibus poterat quippiam commodè ſcribi, tamen non eſſe genuinam certum eſt. Quapropter conſultius eſt, ubi deſierit hæc noſtra Papyrus, cinerem parare ex cyperi vulgaris, aut lunci magni aquatici medulla vtendum ad de paſcentium vlceraſ tabieri feram compeſcendam.

Papyrus, quam *Berd* Aegyptij vocant, Alpino eſt planta fluminis Nili, binis aut pluribus caulis rectiſſimis ſupra aquam ſeptemve cubitis aſurgens. Caullumque in ſuſſigiis ſcapus innumeris capillamentis, longis, rectiſque contextus, cernitur. Folius quoque conſtat multis, rectis, enſiformibus, typhæ aliquatenus ſimilibus, triangularibus, ac mollibus. Chyrurgi foliorum medulla vtuntur, ad vlceraſ ora dilatanda. Ex ſcapique combuſto cinere, recentia vlcera curant, qui etiam maligna augeri (ſi ſæpe aſpergatur) non ſinit. Ex ſcapis recentibus aquam diſtillant, ad oculorum ſuſſuſiones, caligines, ac obſcuritates maxime proſequam.

Caſp. Bauh. pin. Papyrus 2. Biblios vel Syriaca, ſive *Synon.*
Sinhana. Sarr. Theophrasti. Biblios ſecundo, Euaſthio, Papyri altera ſpecies, quæ Papyrus in Sicilia Guiland.
 Papyrus, Caſ. Nilotica, in Adu. & Ic. p. 79. Tab.
 Ger. Papyrus Aegyptia, Penz. Hiſtor. Lugdun.

GRAMEN SPICATVM CVM PERI-
carpiis paruis rotundis.

CAP. CXCVII.

Descriptio



Seracsisque
folij, Phalangii
similibus. Cul-
mus verò spi-
thameæ lon-
gitudinis, spica
gerit instar
Plantaginis.

Lob.

Lob. Teut.
& Ic. Plant. p.
16. Zeege &
rentgras, Gra-
men marinum
spicatum: Clus.
Pann. Gramini
montano spica-
to simile in ma-
ritimis Flan-
dria frequens,
vulgo Euden

appellatum. Tab. icon. & Hist. Gramen aquati-
cum spicatum, Gecarhe wasser gras / Hydragro-
stis. C. Bauh. Phyt. Gramen 68. & Gramen spica-
tum alterum maritimum. Eid. pin. Gramen iun-
ceum & spicatum 17. siue Gramen spicatum alterum.

Locus.

Copiosè in Zelandia nasci ait Lob. in riuiolo-
rum ripis locisque aqua irrigatis: Vidimus apud
fratrem Casparum missum Norimbergæ.

GRAMEN TRIGLOCHIN.

Descriptio



Gramen
triglo-
chin ex capi-
te pendulis fi-
brosis com-
plicatis radici-
bus nectitur:
culmos tollens
nudos, enodes
iuceos, cubita-
les & sesqui-
cubitales, in-
terdum locis
squalidis pal-
mares ferè:
spicam à me-
dio gerunt
summo re-
nus: longâ se-
rie folculi
turbinati, for-
mâ ferè capi-

culorem Pyrolæ, delapsis primulâ floribus, nò
item magnitudine: quos excipit series mucro-
natorum fructuum, qui acuminè còtinui, inferiùs
spectante, in triplicem barbulam alati, instar tri-
dentis sagittæ, dissiliunt. Folia ab radice orta
culmos comitantur palmaria & doudrantalia,
perangusta, plana.

Synonyma

Lobel. Belg. Ander zec oft zeelandesch gher-

arent gras. Ic. Pl. Gramen marinum spicatum alter-
um. Tabern. icon. & Hist. Dünzengras 4. Gra-
men iunceum 4. & iunceum spicatum geßbrez.
Biesgras. Camer. hort. Gramen marinum spi-
catum alterum Lobelii. Maius cuius pictura est
apud eundem, ad lacus salios nascitur circa Ha-
lam Saxonie. Minus verò in pratis latioribus
& humectis circa Lipsiam, quod inter Calama-
grostis species Tragus depinxit.

Casp. Bauhin. phyt. Gramen 67. Eid. pin. Gra-
men iunceum spicatum 16. seu Trigloch: Cal-
magrostis 1. Trago, icon Calamagrostis 4. Hist.
Lugd. Carex minus, Lon. Gramen mixtum ex iun-
co & Gramine, Thal. Gramen marinum spicatum,
Ger. Gramen trigloch Dalechamp. Lugd. Gra-
men iunceum 4. vel Spicatum, Tab.

Hist. Lugd. iconem habet meliorem, quoad
fructum, quàm Lobelius, at flores Tragus rectius
exprimit, ut & Tabernamontanus.

Inuenitur inter Spiram & Heidelbergam, in locis
pratis locisque aliis humidis.

HYACINTHI PARVI FACIE

Gramen trigloch.

CAP. CXCVIII.



O Blongum
habet co-
marum; bu-
bâ, Allii Alpi-
ni in morem
simplicem a-
liâs, aliâs mul-
tiplicem, à cu-
ius imo demis-
sis fibris radi-
carur, foliato-
nissima, gla-
bra, palmaria
interdum ma-
iora, tria, aut
quinque, sta-
tim à radice
oriuntur: can-
tulus, durior-
cul, teres, gra-
cilis, nudus,
enodis, inter
folia surgit.

palmaris & sesquipalmaris: longam gerens spi-
cam fusculorum luteorum, [nisi fallit in sicca pla-
ta color] exiguorum, è quorum medio proten-
ditur stylus longiusculus, ita ut cum eo flos refe-
rat rudimentum capituli Pyrolæ delapsi flor-
bus: hinc stylus ille satis longo nixus pediculo
triquetrus apparet, inque tria spicula superiùs
coherentia, lubrus dehiscit, quo modo in Gra-
mine trifurco seu triglochine est observari.

In squalidis quibusdam locis maritimis Nar-
bonensis Gallie, & supra Admirabilem illum
Gari fluvii Pontem trigeminum, eruit Genet.
H. Cherlerus Iunio.

Locus

GRAMEN IUNCEVM MARINVM

densè stipatum.

CAP. CXCVIX.

R Adice & foliis est Graminis marini spicati
Zelandici similibus, duris & rigidis. Cuius
culmi

Descriptio



mi spicas gerunt lunci aquatici. Alioqui maritimo gramine haud melius est aut utilius.

Lob. Hist. B. p. 17. Teutsch dict Grassen; Teutsch dict bieß Gras. Fen. Et Icon. pl. pag. 17. Gramen iunceum maritimum dense stipatum. Tab. Hist. graminum iunceum 1. Binggrass. Et Icon. graminum iunceum minus.

C. Bauh. phyt. gramen 72. siue iunceum tertium: Eid. pin. gramen iunceum spicatum 11. siue gramen iunceum foliis & spica lunci minus; gramen iunceum maritimum Gerardi.

Ad litus Middelburgicum repertum refert Lobelius in Camba beymer heyden & in superiori comitatu Farzenlebog.

GRAMEN IUNCEVM EX MONTE

Baldo.

CAP. CC.

Descriptio

Mun culmum amittunt folia pauca, dura, ceteroqui nudum, enodem, dodrantalem, glomeratum è glumis candidis capitulum summo cacumine gestantem, cui ad basim subiecta bina foliola acuta, aduersa, alterum altero longius, parum tamen semunciam superans. Hac ex sicca: sic autem describit Frater in prod. Radice est parua, fibrosa, circa quam folia bina, ternave semipalmata: culmus iunceus, levis, enodis, & nudus, pedem superans: cuius summo capitulum instar Phalaridis squamosum in apicem desinens, ex albo leuiter rufescens, insidet, cui utrinque foliolum rigidum subiicitur, quorum longius, vnciam superans, deorsum vergit, alterum quod triplo breuius, recta effertur.

C. Bauh. phyt. gramen 75. siue iunceum montanum, gramine maritimo Dalechampij in multis conueniens, utpote caule & capite: Eid. in prod. gramen 36. In pin. gramen iunceum 12. siue montanum capite squamoso. Prouenit in montis Baldi summitatibus.

GRAMEN IUNCEVM MARINVM CAPITULO squamoso C. Bauhini.

CAP. CCI.

Synon.

Descriptio

Gramini huic 37. in prod. vel, ut in pin. vocat, gramine iunceo 13. siue minimo capitulo squamoso, capillares sunt radice: folia pauca, capillacea, vnciarum fere duarum: inter quae culmi vnciarum quatuor vel quinque exurgunt, in quarum fere summo capitulum vnicum minutissimum squamosum rufescens, cui culmi apex supereminet.

Tom. II.

In aquosis circa Altorffium Noricorum, vnde Locum D. Doldius misit: & Francofurti ad Oderam prouenit.

GRAMEN IUNCEVM MINIMVM ALTERVM eiusdem.

CAP. CCII.

Gramen hoc 38. in prod. in pin. verò gramen Synon: iunceum 14. siue minimum alterum, à priorum differt potissimum in capitulis, quae & summo cauliculo insident, & squamosa non sunt: in fossis Patavinis, aqua defluxa, reperitur.

GRAMEN IUNCEVM MINIMVM MARITIMUM C. Bauhini.

CAP. CCIII.

Quia planta dodrantem non superat, cespiti similis, ex cuius singulis radiculis, singuli cauliculi exurgunt, foliolis capillaceis paucis cincti, qui exiguis verticulis donantur, gramen Synon: hoc 9. in prod. in pin. gramen iunceum 15. siue minimum maritimum in Zelandiae maritimis, ad oppidum Gous, D. Gillenius collegit & transmisit.

GRAMEN SYLVATICVM PARVVM tenuifolium, rigidiusculum.

CAPVT CCIV.



Radice pro- tuberat ab vno principio multiplici (auctore Tabern.) fibrosa: foliis angustis, vulgato gramine similibus, sed plus firmatis, solidis, denso ordine stipatis. Culmi procedunt ex his plures, tenues, rotundi, ac duntaxat, spithamei. Spicae in horum sublimitate molles, capillares, subrufo-fescentes.

Tabern. Hist. & Icon. Gramen sylvaticum primum: Gramen nemorosum. Germ. waldgras; Buchß od Boschgras. Ital. Gramen sylvaticum Angl. weddegass. Belg. Boschgras. Ger. Gramen sylvaticum.

Casp. Bauhin. Phyt. Gramen 28. siue nemorosum primum: Eid. pin. gramen nemorosum glabrum 3. siue Gramen nemorosum spica rufescente molli.

In humido vliginoso & arenoso colo colligitur. Locum.

GRAMEN SYLVATICVM III. TABERN. paruum, tenuifolium, cum spica aculeata.

CAP. CCV.

Radix ab vna origine multiplex, exigua, filamentis referta: folia angusta, in acumen ab-

V u x



Synonyma

cuncta palmum medium fere longa: ex his oriuntur calami nouem aut octo tenues, apylli, æquales, spithamei. Horum summitates occupant spica parua, aculeata.

Tabern. Hist. & Leon. *Gramen syluaticum*, siue nemorosum, waldgras. Ger. *Gramen syluaticum minus*.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 29. siue nemorosum alterum. Eid.

pin. *Gramen nemorosum glabrum* 4. siue *Gramen nemorosum* spicis paruis asperis. Variat hoc latiore folio in dumeris & angustiore in pratis. Locum cum precedenti eundem adamat.

Locus.

HOLOSTIVM MATTHIOLI IVNCVEM. CAP. CCVI.

Descriptio



M Matthio-
stium vocant
plantulam in
palustribus ob-
uiam, pilum
aut sesquipal-
mum altam,
coliculis fre-
quentibus, te-
nuibus, non ri-
hil rubeantibus,
& in ramos
plures diuisis:
folia acuta du-
a, aut tres vi-
cibus longa, an-
gusta: floribus
secundum ra-
mulus, adeo-
que & in extre-
mitatibus cre-
bris, succedunt

vascula pusillum semen rufum pellucidum claudencia, radices sublim capillares.

Si Lob. in Ic. Plant. p. 18. per Holostium Matth. eandem intelligit, quam Matthiolus plantam, melius placet Lobelii figura. Matth. suam plantam non describit.

Synon.

Matthiolus mutata priore sententia in post. comm. editione Holostium exhibuit pictum, nulla adiecta aut figura, aut virium declaratione, inquit H. Lugd. p. 1188.

Gramen nemorosum videtur Thallio ea planta, quam Lob. titulo Holostii Matthioli insigniuit.

Tabern. icon. & Hist. *Gramen iuncinum*, Brotzengras / Ger. Daddengras. Fland. & Brab. Eozdegas. Gall. Herbe aux crapaux aut Crapandine. Eid. Hist. *Gramen iuncinum* 6. Ger. *Gramen iuncinum*.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 84. siue *Gramen nemorosum* 5. siue *Gram. nemorosum* caliculis paleaceis: duplex repens & erectum.

Pallim pratis mucosis, aliisque putridis, ac humentibus locis propenit.

Locus.

GRAMEN HOLOSTEVM ALPINVM minimum C. Bauhini.

Tota planta vix tres non superat: foliis capillaceis, vncialibus: cuius culinis capitula paleacea insident, copiose in Heluetia in S. Bernardi monte minore propenit. *Gramen* hoc in pin. nemorosum glabrum 6. siue *Gramen holosticum alpinum minimum*, 46. in prod.

Descriptio.

GRAMEN SPARTVM PLINII, SIVE Sportulatum Picuum.

CAPVT CCVII.



Spartum L.
Strinorum &
Plinii (inquit
Clus.) a Spartio
Graecorum frutice differens,
herba est graminea, folia proferens, immetola, tenuia iunceae, viridiaque, cubitalis longitudinis ex eadem radice prodeuntia, quæ, dum nouella sunt, latiuscula conspicuntur, & interiore parte canescentia, successu vero

Descriptio.

temporis contrahuntur & conuoluuntur, tumque iunceae, dura, flexibilia tamen, & marginibus ita coniunctis, ut vix rima appareat, nisi diligenter obferues. Inter hæc culmi exiliunt ipsi foliis paullo longiores, qui Vere & Aestate paruum arundinaceam paniculam ferunt, simili prope modum cum illa ratione florere: deinde oblongum semen, ut nonnulla Graminis generatim dicitur nititur fibrosis & peremibus, quibus mulre simul chascuntur plantæ contigua, tumefacta modo, ut interdum una planta, siue multarum simul congestarum plantarum culmus, duorum pedum spatium, vel etiam illo amplius in ambitu occupet.

Fuit hoc Spartum post Theophrastum Graecis notum, ut Plinius lib. 24. cap. 9. testatur in quo quæsitum proponit, num Genista Graecorum Spartum sit, de quo Homerus dicit, Nanium Sparta dissoluta. Cui breuiter respondet, certum esse, nondum eo tempore Africanum vel Hispanum Spartum in vii fuisse, ut credendum sit Genistam Graecorum Spartum esse, nostram vero Spartum illis ignotum esse, nec de eo ullam posteritati reliquisse memoriam.

Hermol. coroll. 771. Spartum alterum in Hispania & Africa finibus natum, *Leurea* siue *Egrea* dictum ab Athenæo. Amato Spartum aliud a Genista. Dodon. frum. Spartum herba a Plinio

Gramen.

Spartum.

lib. 19. cap. 1. descripta. Lac. Spartum vulgare, deferens à Genista. Clus. Spartum herba 1.

Lob. in Aduers. Spartum vulgò Elpho Hispanica Iuncea, vulgi Funispartion, an Linospartion Antiquorum? Eid. Obs. p. 45. lc. plant. pag. 88. Spartum Plinii, Clus.

C. Bauh. phyt. gramen 1. siue gramen spartum 1. Eid. pin. gramen spartum 1. siue panicula comosa: Spartum Plinii Clus. Lob. & H. Lugd. Spartum herba, Dod. Spartum Plinii 1. Tab. & Ger. Iuncea Ibericus siue Hispanicus, Dalech. in Plinium: descriptum Theophrasti.

In Batica regione Hispaniz parte, præcipue regno Mortienli nati tradit Amatus: veluti in Algarbia apud Lusitanos, Aphricæ contermina. Frequens nascitur, authore Clusio, collibus arenosis inter Vaëna & Alcalal-Real, atque alijs Baticæ locis: sed omnium abundantissimè ab initio Granatenlis regni, siue Baticæ limitibus, vsque ad Murgim urbem, vulgò Murgia dictam, vt non sine causa totus ille tractus Veteribus appellatus sit *Spartarius campus*, quo etiam noua Carthago, vulgò *Carthage*, vrbs maritima continetur: hæc etiam à nonnullis Spartaria cognominata est, ob Sparti (vt credibile est) eo agro nascentis abundantiam. Nascitur & Valentino regno, atque illud quidem superiore longè vberius & larius.

Porro, Sparti vsus, inquit Plinius, multa post secula ceptus est: nec ante Pænorum ætas, quæ primùm Hispaniz intulerunt. Herba est hæc (Iuncea Ibericus, siue Hispanicus, *descriptum Theophrasti*, ad nexus tantum utilis Dal.) sponte nascens, & quæ non queat feri, Iuncusque propriè aridi soli, vni terræ dato vitio. Namque id malum telluris est, nec aliud ibi feri aut nati potest. In Africa exiguum & inutile gignitur. Carthaginensis Hispaniz citerioris portio, nec hæc tota, sed quatenus parit, montes quoque Sparto operit. Hinc strata rusticis eorum, hinc ignes, faciesque, hinc calceamina, & pastorum vestis, animalibus noxium præterquam cacuminum ténacitate. Ad reliquos vsus laboriosè euellitur, cereatis cruribus, manibusque rectis manicis, conuolutum ossis ligneisve conamentis. Nunc iam in hyeme vix. Facillimè tamen ab Idibus Maiis in Iunias: hoc maturitatis tempus: Vulsu fascibus in aceruo animatum (adunatum) biduo, tertio resolutum, spargitur in Sole, siccaturque, & rursus in fascibus redit sub lecta. Postea maceratur aqua, marina optimè, sed & dulci si marina desit. Siccaturque Sole iterum rigatur, si repente vrgeat desiderium, persusum calida in folio, ac siccatur stans compendium operæ fateretur. Hoc autem tunditur vt fiat vile, præcipue in aquis marique inuictum. In siccò preferunt è canabi funes. At Spartum alitur etiam demersum, veluti natalium sitim pensans. Est quidem eius natura interpolis, rursusque quam libeat verustum nouo miscetur. Verumtamen amplectetur animo, qui volet miraculum estimare, quanto sit in vsu omnibus terris nauium armamentis, machinis ædificationum, aliusque desiderijs vitæ. Ad hos omnes vsus quæ sufficiant, minus xxxm. pass. in latitudinem à litore Carthaginis nouæ, minusque in longitudinem esse reperientur, longius vehi impendia perhibent. Hæc ille natur. hist. lib. 19. c. 2. Virgæ (inquit Amatus) huic ad summum cubitales sunt, solidæ, ad frangendum difficiles, vinculorum vsui præcipue, ex quibus cordæ, funes, Cameli & nauium ornamenta parantur: nec minus in ipsa Algar-

Tom. II.

bia & Batica regione, ex isto Spartò, infinitus sportularum & corbium calasthiceorum numerus, pro deferendis ficibus, & passis, alijsve mercibus ad vniuersam Germaniam, Prussiam, & Bohemiam, Galliam & Scythicam sunt, hodie verò Spartum hamato ligno conuolutum eradicatur, veluti quoque Plinius tempore, ossis, ligneisve conamentis enellebatur. Spartum eodem in vsu nunc est apud Hispanos, referente etiam Clusio, quo fuit Plinii tempore. Nam ex crudo & exsiccatò tapetes seu aulæa, storiæ, corbes, rudes, aliosque funes conficiunt: corbes etiam illi in quibus ficus, & vix passæ aduehuntur, ex Spartò contexti sunt. Sed ex illo aqua, instar lini, macerato, deinde siccato & tuso, calceamenti genus, quod ipsi *alpergates* appellant, paratur, funes etiam & alia subtiliora opera. Præfertur autem id quod Valentino regno crescit.

GRAMEN SPARTVM 2. CLVSIO.

CAP. CCVIII.



Spartum herba alterum Clusii nascitur Murciano regno, humidioribus præsertim locis, superiore tenerius, cuius valde rarus est vsus, vt quod storiæ aut huiusmodi operibus conficiendis minime sit idoneum, plurimus autem eius vsus in eâ regione, ad linos, saccos, quos lectis subleuant, implendos, vt nos stramine vi-

Descriptio

solemus, quoniam molliori, tenuioreque sit illico, quam primum: paniculam fert breuem, & pericarpio quodam, siue membranaceo folliculo inclusam: vti Narcissorû & similium fere flores.

Lobel. Hist. Belg. p. 122. & Obs. p. 45. Spartum alterum Clusii. Eid. plant. icon. p. 88. Spartum Plinii & Clusii alterum.

C. Bauh. pin. gramen spartum 2. siue panicula brevis folliculo inclusis: Spartum alterum Plinii, Lobel. Hist. Lugd. Tab. & Ger. Sparti herba alia species, Dodon.

Nascitur eodem quo superius illud ad multa vile, modo: panis tamen maturius flores producit: nam Latro suis floribus onustis legebat Clus.

Locus & tempus.

SPARTVM SPICATVM, PVNGENS

Oceanicum.

CAP. CCIX.

Spartum herba, siue Oceanicum aut matitum Clusii, nonnullis, Gallie, Fladrie que locis & aggeribus illis tabalosis, Oceano obiectis inuenitur, *Halm*, ab incolis, præsertim Fladris vocatum: quod priori Hispanico non valde dissimile est, sed multo maius & rigidius, cruribus eorum, quibus per eos aggeres sine octeis iter est, permolestum: pungunt enim & cutem penetrant eius folia. Crescit eodem modo quo superiora, magis tamen latè serpit Graininis modo: Spicum autem fert Secalis panis instar: eius vsus,

Descriptio

Vu 3



velatis suis ce-
spitibus & val-
de confertis, at-
que obliq. spar-
gentibus sese
radicibus, are-
nam huiorem
reddat, & colli-
get in aggerib.,
ne tam facile
marinis vndis
& fluctibus elu-
atur, & faci-
lius resistat te-
pestatibus, qui
in Oceano cre-
bra.

Ex Plinii l. 19
cap. 2. ac lib.
24. c. 9. ostendi
potest Genistā
& Spartium
diuersas esse plā-

ras, quanquam obscure vtramq; herbam discer-
nat, ac dubia procius fide tradat: tamen priori
loco per luncos aculeatos, siue virgas, longas, si-
ne foliis, eas omnino intelligere videtur, quas
Holandi Oceani magni accolæ, ob vigentem dā-
nosūque maris impetum, atque inundationem,
arenosis montibus inserunt, ne validiori arena
vento promptè defluat aut dissipetur. Plinius
montes his operiri, in citerioris Carthagenensis
Hispaniæ portione, scripsit. In Holandia Helm
vocant, quasi Galeam. Hanc omnino pinxisse
Dioscoridem lib. 4. cap. 139. arbitror Cronem-
burgus. Sed quo modo ad Diosc. Spartum refer-
ri possit non ostendit.

*Cronem-
burg.
Spartium
Hollandicū*

Synonyma

Calp. Bauhin. Phyt. *gramen n. 1.* Eid. pin. *gra-
men sparteum 3.* siue *spicatum, folijs mucronatis lon-
gioribus, vel spica fecalinea. Spartum versum,* Clus.
Hist. Lugd. *Spartum herba 3. maritimum,* Clus.
Hist. *Spartum nostras,* Lob. Obs. p. 45. Ic. 89. Hist.
Belg. pag. 123. *Spartum 5. & Plinianum 3.* Tabern.
Spartum Anglicanum, Ger.

GRAMEN PENNATVM, ALIIS Spartum.

CAP. CCX.

Descript.

Patenuia ē rad. capillatis germinant folia
dodrātia: alia superius teretia, inferius pla-
na: inter quæ surgentes *culmi* in cristam sesqui-
palmarem lanugine mollicca, vtrinque plumatā,
contortāque, desinentes. *Spartum herba* quin-
tum, siue Austriacum pennatum, non in locis au-
rā marinā atlatas (autore Clus. Pannon. & Hist.
post.) natum, sed procul à mari, procul ab are-
nolis illis aggeribus, spontè etiam crescens. Ha-
bet verò id *folia* pedalis longitudinis, gracilia, vi-
ridia, numerosa, plana initio: sed quorum lim-
bi tandem coeunt, lunci modo lauia, teretiaque
sunt, Sparti Hispanici foliorum instar, quibus nō
multum absumilia sunt, sed minora & graciliora:
inter ea *culmi* exeunt graciles, foliorum fastigiu
non superantes, qui *spicam* ferunt aliis dissimi-
lem, sed tribus aut quatuor oblongiusculis gra-
nis, longa contortaque cauda insignitis dunta-
taxat opulstantem, quæ in dodrantalem, imò pe-



dalem, inter-
dum veluti
penulam, te-
nuioribus ala-
rum auis illius
Mammotidæa
siue paradisi
vulgò nuncu-
pata, pennulis
fermè respo-
dentem, desin-
it: *radix* sub-
est à multis
capillamentis
graminisque
fibris compo-
sita, Hispani-
ci Sparti radi-
cis instar.

C. Bauhin. *Spartum*
Phyt. *gramen*
n. 8. siue *spa-*
rtum 8. vel pin-
natum: Eid.

pin. *gramen sparteum n. siue pennatum:* *Spartum*
Austriacum, Clus. Pann. *gramen 9. vel inuicem*
Dod. *gramen pennatum Dalechamp.* Lugd. Va-
riat iuba colore: est flauo, & etiam candido.

In aridissimis tumulis, apricis, lapidosisque
provenit. Abundè hoc genus, ut testatur Clusius, *locus & tempo*
nascitur in monte Badensibus thermis imminen-
ti, totaque illā catenā montium qui inde ad Da-
nubium vsque procurrunt, præterea ad syluulam
Lachn aliisque apertis & Gramineis locis Au-
striæ & Vngariæ: sed omnium vberriimè in Vi-
uario illo Neapoli Austriacæ vrbis contiguo, in
quo vberius lætiusque provenit. Semen maturum
Iunio, vel læuissimo auræ flatu excutitur, atque
cum sua pennula paululū volans, vbi decidit,
statim per Gramen irrepit & terrā se condit.

GRAMEN SPARTEVM VARIEGATVM, Calp. Bauhini.

CAP. CCXI.

Gramen 32. in prod. *gramen sparteum n. siue* *Synonyma*
variegatum foliis est quatuor vel quinque
vnciarum, rotundis, variegatis, quorum alterna-
tū pars vna viret, altera rubet: quod primo
Vere in Franckenhusius montibus copiosè repe-
riti, D. Iungermannus anno 1602. scripsit, & co-
lorem cultura mutare monuit: Spartique nomi-
ne, solū folia, misit.

SPARTVM MARITIMVM SIVE Oceanicum latifolium.

CAP. CCXII.

In fabulosis collibus Walcheta & Hollandiæ,
inquit Lobellus, reperitur Spartum. Vnum spi-
ca, radice, magnitudine, semine aceroso, ad
Spartum tertium Clusii proximè accedit. Discri-
men in folijs est *folijs*, quæ pulchra Frumentaceis
& Graminis striati sulcati folijs latiora, coloris
lauci.

De hoc scribit Clus. Spartum herba 4. Barau-
cum siue Oceanicum 2. à tertio maritimo siue
Oceanico.

Oceanico primo, minime differt tota planta forma, radiceque sub arena condendi, laréque spargendi licentia: eius tamen spicae breuiores videntur & Phalaridis potius quam Secales paniculas imitari, id Batavis, quibus valde familiare iisdemque visibus seruit quibus Oceanicum primum, etiam *Halm* dicitur.

Icon apud Clusium, quae eadem cum Lobeliana, monstrat magnam differentiam à priore Oceanico, in quo folia angusta pinguntur: verum respondet descriptioni Lobelij. Eid. dicitur in H. Belg. p. 113. & Icon. plant. p. 89. *Spartum nostrum alterum*.

C. Bauh. phyt. *gramen* 114. siue *Spartum* 4. Eid. pin. *gramen sparteum* 5. siue *spicatum latifolium*: *Spartum* 6. vel *Plinianum* 4. Tabern.

GRAMEN AEGYLOPS, BROMOIDES Tabern. longulimis aristis.

CAP. CCXIII.

Descriptio



Radice est multiplici (ut autor est Tabern. fibrosa, ex qua numerosum emergit agmen foliarum paruum angustorum iuncorum. Inter quae cerni vel quaterni assurgunt culmi tenues cubitales aut sesquicubitales, qui in summitate spicae gerunt glumis aenaceis similes, sed aristis acutis.

& longis, quae ex membraneo folio, vel utriculo spicam inferiorem parte complectente, proflunt, & in unum tantum vergunt larus. Glumae vero seminum sunt vacuae. Decidentibus vero aristis & ipsa sicca cum glumis suis in iubam è confusibus cirrhis contextam, instarque lini pansam delitescit, tandem vanescit tota.

Tabern. hist. *Aegypsis* 4. *Bromoides* 1. habere wach. Icon. *Aegypsis bromoides* (sic etiam Gerardo) *Wadelwach*.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 107. siue *Festuca longis aristis*. Eid. pin. *gramen Festuca* 19. siue *Festuca longifolia* aristis glumis vacuis spadiceis coloris.

Arenolis gaudet locis & siccioribus pratensibus: potissimum vero in viis inter Vormatiam & Frankental Palatinatus ciuitatem obuium esse testatur Tabernamontanus.

SPARTVM PARVVM LOBELIO.

CAP. CCXIV.

Descriptio

Duras crassasque fibras demittit: culmi numero plures, una parte foliorum circumiectorum voluminibus crassescunt, alioqui sili instar tenues, enodes, dodrantes, quos à medio ad

Tom. II,

summum usque conscendunt,



altera duntaxat parte erumpentes, eodemque vergentes, glumae durae, tenues, longiusculae: folia ubi stipulam non amplius inuoluunt, admodum tenuia, & fere rotundatrim, quatuorve unciaum longitudine: acceptimus apud D. Vldaricum Chelium, Medicum Argentinensem ex plantis Agerianis siccis.

Lobel. Hist. Belg. p. 114. & Icon. plant. pag. 90.

Synon:

flein *Spartum* van desen landen. *Spartum nostrum paruum*. Tabern. *Spartum* 7. vel *Plinianum* 5.

Casp. Bauh. phyt. *gramen* 117. siue *gramen sparteum* 7. Eid. pin. *gramen sparteum* 6. siue *luncifolium*.

GRAMEN SPARTEVM PRIMVM TABERNAMONTANI.

CAP. CCXV.

Gramen sparteum primum (inquit Tabern.) Gradue nititur fibrosa, longa: folia rigida, tenua, pedalia, nerno medium percurrente: culmi cubitales & altiores, teretes, laues, foliis multis amicti: spica digitali longitudine, interdum longiores, colore fusco obscuriore.

Tabern. Hist. *gramen sparteum primum* p. 114. Eid. pin. *gramen sparteum* 4. siue *spicatum* f. liis mucronatis breuioribus, *Spartum Anglicum* 2. Ger. tit.

C. Bauh. phyt. *gramen* 115. siue *sparteum* 5. Eid. pin. *gramen sparteum* 4. siue *spicatum* f. liis mucronatis breuioribus, *Spartum Anglicum* 2. Ger. tit.

Vberi prouentu, Tabern. annotante, nascitur in squalidis locis inter Hertzogenbusch in tabuletis, variisque aliis Brabantiae locis.

Synon:

Locus

GRAMEN SPARTEVM BASILEENSE CAPILLACEO folio, C. Bauhini.

CAP. CCXVI.

Ex radice fibrosa, culmi plures exurgunt, qui statim in folia capilli instar angustissima, in acumen molle fastigiata, palmum lepe, pedemve altiora, absumuntur: nec paniculam, nec spicam obseruauimus. Tota planta insigniter vitet, & ex multis plantis simul iunctis celpes constituitur: in paludibus Michelsfeldz prouenit *gramen* hoc *Spartum* 7. siue *Basileense*, folio capillaceo, ut autor in pin. vocat, vel, ut in prod. *gramen* 19.

Descriptio

GRAMEN SPARTEVM MINVS, VEL HOLLANDICVM, C. Bauh.

CAP. CCXVII.

Gramen hoc 30. ut in prod. vocat, vel, ut in pin. *Gramen sparteum* 8. siue minus, vel

V. 4

Holandicum pro radice fibras tenuissimas albas habet: folia copiosa, capillacea, pallida, trii quatuorue vnciarum, inter quæ culmi tenuissimi, palmo altiores, vno, alteroue internodio donati, & penè nudi efferuntur, qui paniculam pallidam diuissam sustinent: & communiter plures cespites constituunt. Nomine sparti Holandici ex Sylua Hagana D. Weckerlinus misit.

GRAMEN SPARTEVM MONSPELIA-
cum folio capillaceo minimum,
eiusdem.

CAP. CCXIX.

Synon.

Descriptio

Radicem habet Gramen Sparteum 9. siue Monspeliacum capillaceo folio minimum [ut ab autore in pin. vocatur] pro; in prod. descriptum, ex fibris albis, oblongis, capillaceis compositum, folia capillacea, vncialia: culmi tenuissimos, nudos, trium quatuorue vnciarum: paniculas paruas ex locustis minimis compositas & per maturitatem rufescentes: quod Monspelluli in agris æstiuo tempore reperitur.

GRAMEN SPARTEVM SETAS EQVINAS
referens Cesp. Bauh.

CAP. CCXIX.

Synonyma

Descriptio

Hoc [quod in prod. 32. est: in pin. verò Gramen spartum 10.] album est, & ex radice alba, setarum instar, folia cubitos quatuor longa producit, quæ forma & tenuitate, & robore caudam equinam eiusque setas referunt: ex quibus laue insule incolæ tapetia texunt. Cuius forte mentio fit in C. Clusi curis poster. sub Herba, Sparro Hispanico n. ab simili. Sic ex Insula Virginea, arboris cuiusdam cortex candidissimus, in pili tenuitate diuissas adfertur, è quo incolæ panos texunt: hunc corticem à D. Giltenio, Gramen verò à D. Saltzmanno accepimus.

GNAPHALIVM TRAGI, SIVE IVNCVS
Bombycinus.

CAP. CCXX.

Descriptio



Gnaphalium
Tragi.
Linum
pratense.

Implexis fibrarum radica-
tur, iucostol-
lens rectos
enodes, folio-
sos, in quoru
summitate e-
bifori vaginâ,
longis lentil-
que pediculis
appenduntur
paniculae to-
mentosa, can-
dida bombyci
opera & mol-
litie præstan-
tes.

A Trago in-
scribitur Gna-
phalion, &
Matresflac-
h. c. Linum

pratense, & Wissen wollen, id est, Lana pratensis cognominatur, statuiturque Iuncus Graminis genus. Eiusdem cum Trago opinionis est Cornarius.

Tabern. icon. & Hist. gramen tomentosum, Linum pratense, Linagrostu, Eriophorus, Linosyrium, Angl. Waterleese & Medowe woule. Fland. & Brab. Syde Biese volckbiefe / Quispelbiefe / Mattensplachß vnder wartenbiefe. Germ. flach sengraß. Errant qui Dioscoridis Gnaphalium faciunt.

Geln. de stirp. coll. vocat simpliciter Matresflachß: In catal. pl. appellari censet Alopecuron, & Frumentum caudatum à quibusdam, quæ opinio nobis non placet.

An Plinius lib. 19. cap. 1. de hoc ait: Aegyptii quartum Lini genus Orchomenium appellant. Fit è palustri veluti Arundine duntaxat (Fit è palustris arundinis foliis, vel duntaxat Dalech.) panicula eius.

Cesp. Bauhin. Phyt. oramen 122. siue tomentosum. Eid. pin. gramen tomentosum 2. siue gramen pratense tomentosum panicula sparsâ. Gnaphalium Diosc. Trag. Typha Diosc. Ang. Iuncus bombycinus, Adu. Lob. icon. pag. 87. Obs. pag. 44. gramen eriophorum, Dod. Linum pratense. Geln. coll. Icon. Gnaphalium Tragi, Hist. Lugd. pag. 116. Pseud. linum, Castacon. gramen iuncum lanigerum Thal. gramen tomentosum, & Linagrostu Tab. gramen tomentosum, Ger. Nonnunquam contractis pediculis tanquam pappus conspicitur.

Geneuz provenit in vliginosis pratis quâ itur Col. qui, cum suo tomento Maio. In valle Griefbachiana ubi fontes acidi, abundat. C. Bauhin. observavit Basilicâ propè Michelsfeld. Pterisque humidis & desertis Brabantia & Germaniæ locis, huiusmodi Gramen reperitur: præsertim Iunio ac Iulio mensibus, quando ex ipsis iuncis stylis lana candicans dependet.

Vi pollet adstringente & condensante, quare in vino nonnulli decoquunt, propinquantque alii profluvio, ac colica ab eadem causa exorta laborantibus, vires vteriores & facultates nos latent, Tab.

IVNCVS ALPINVS CVM CAUDA
leporina.

CAP. CCXXI.



Crebros
Cex parvis
radicibus sur-
rigit culmos
dodrantales,
interdum cu-
bitales, stri-
atos, foliis pro-
pter terram
stipatos, quæ
& ipsos cul-
mos aliquo-
tusque invol-
unt, aliquot
Iuncea folia
in stylum exe-
unt acutum,
paulloque su-
pra radicem
rufescentia,
sepe in fibras
como-

comolas faciscunt : ceterum singuli culmi in
 subinartatam caudam, canescentibus tomentosis
 squamulis, compactilem, fastigiantur, mollitie
 holosericeum prouocantem radieatur denique fi-
 bris aliquam multis, fragilibus.

Casp. Bauh. phyt. *Iuncus* 10. siue *Schoenolaguros*,
 missus à Fratre Io. Bauhino nomine Iunci alpini
 cum cauda leporina: Eid. in prod. *Iuncus* 7. siue
capitulo lanuginoso : Item pin. *Iuncus capitulo la-
 nuginoso* 3. siue *Schoenolaguros*, à capitulo haud
 multum leporum caudæ dissimili.

Provenit in monte eundo Ribesate ex fonte
 acido S. Petri Maijo, eodemque mense in procel-
 so monte, itingere Griesbachiano, Dornstet urbem
 Ducatus VVirtemb. versus.

IUNCUS ALPINUS BOMBYCINUS.

CAP. CXXII.

Vi. Bauhino in prod. *Iuncus* 8. in pin. verò
Iuncus capitulo lanuginoso 2. siue *alpinus bom-
 bycinus*, eorum ex radice aliorum Iuncorum simili,
 falsa Iuncæ exurgunt, inter quæ culmi plures te-
 nuissimi, palmo minores, qui capitulum par-
 uum, lanugine alba ornatum, sustinent.

In montibus Moraviz loco dicto Bessel, D.
 Fleissnerus eruit, & communicavit.

SCHOLNANTHOS SIVE IUNCUS
odoratus.

CAP. CXXIII.

Descriptio



Inter Schol-
 nanthi vulga-
 ris plantas repe-
 riuntur quedam
 festuæ, multæ
 simul iunctæ,
 Gramini similes,
 in quibus inter-
 dum ab una ra-
 dice oriuntur
 multæ veluti spi-
 cæ, cespiceo mo-
 do longitudinis
 palmi, coloris fe-
 re & forma fo-
 liorum Tritici
 circa inferiora,
 color enim est ex
 luteo pallidus, ut
 plurimum, vel
 quasi cinereus,
 interdum tamen

etiam rubent : rubent etiam superiores partes fo-
 liorum, quæ ubi graciles sunt circumvolutæ ab
 ipsa statim radice : folia sæpius inter se circum-
 voluuntur & efficiunt veluti caulem. Caules ha-
 bet multos ab una radice, circa quos conuoluun-
 tur folia in inferioribus, nodis (longè ab inui-
 cem distantibus) distinctos. A nodis exoriantur
 etiam folia, quæ caulem amplectuntur. Cau-
 les autem similes sunt culmis Tritici Auenæ,
 Graminis &c. quæ ratione verò dicuntur *glauus*,
 à Dioscoride, intus non sunt concaui ut prædi-
 ctorum, sed medulla fungosa farcti simili me-
 delle Iunci vulgaris : flores ex purpureo canescen-
 tes, papposa lanugine oborti, habent aliquid com-

mune cum Arundinis floribus, ac quodammodo
 similes seminibus Nerij. Radices multæ sunt satis
 longæ, duræ, denudatæ, ut plurimum, à cortice,
 quodammodo similes Cirris Hellebori, vel Va-
 lerianæ. Interdum adsunt radices paulò crassio-
 res, densæ, gemulatæ, gustu valentiores reli-
 quis, ex quibus tum circū oriuntur, tum ipsæ ve-
 luti spicæ quæ videntur veluti per terram repisse.
 Vbi recens est hæc planta, qualem ego vidi, ma-
 nibus confricata iucundi est odoris, & saporis
 non ingrati, licet videatur aliqua adesse amaritu-
 do cum acrimonia, luculenter linguam mordi-
 cante, quæ tamen solet efficacior esse in quibus-
 dam foliis remissis, cramineis, valde tenuibus, &
 carinatis.

Clusius apud Garciam sic describit: Natæ sunt
 nobis anno 1568. aliquot Iunci odorati plantæ, è
 semine, ex Italia misso. Est verò Iuncus plura mul-
 tis culmis assurgens, tenerioribus foliis quàm
 Gramen, seu *ma* (quam pulcherrimè refert) lin-
 guam mordicantibus inscunda & aromatica qua-
 dam acrimonia, quæ trita gratum quidem spirant
 odorem, sed in quo rose odor non eluceat: nam
 manducata potius Rosæ, præsertim Saccharo
 conditæ, odorem æmulari videntur. Nullum pro-
 tulit florem, quod seriùs prouenerit: imò primis
 frigoribus perit, ita ut annua planta censenda
 sit. Radix est numerosa & capillaris, non nodo-
 sa, ut ait Serapio, gustu feruido & aromatico.
 Eius *semen* ad viuum expressam interere hic li-
 buit.

Iunci duplex genus est (ut vult Diosc.) Vnus
 vocatur Iuncus lauis: alter Iuncus acutus, qui
 in summo acumen habet. Duplex autem & huius
 species est: Alter enim sterilis est: alter semen
 habet rotundum, nigrum: Et huius calami cras-
 siores sunt, carnosioresque. Est & tertium genus,
 multò carnosius & asperius, quàm illa duo, quod
 vocatur *holoschænos*, hoc est, Iuncus rotus. Ha-
 bet & hic semen in cacumine, simile præcedenti.
 Ceterum *Æthiopicus* (alijs *Serian*) Iuncus lom-
 niferum semen habet.

Plinius lib. 2. cap. 18. de Iuncis agens. Tria in-
 quit, genera eius: acuti sterilesque, quem marem
 & Oxy Græci vocant: reliqua *semenini*,
 ferentis semen nigrum, quem Melancranin vo-
 cant. Crassior hic & fruticosior. Magisque er-
 ranum tertius, qui vocatur *holoschænos*. Ex
 his melancranis sine alijs generibus nascitur. O-
 xys autem & *holoschænos* eodem cespice. Vri-
 lissimus ad vitilia *holoschænos*, quia mollis &
 carnosus est. Fert fructum eorumque coheren-
 tium modo. Nascitur autem is, quem marem
 appellauimus, ex semetipso, cacumine in ter-
 ram defixo. Melancranis autem, suo semine.
 Alioqui omnium radices omnibus annis inter-
 moriuntur. Hæc Plin. de libro 4. Hist. pl. Theo-
 phrastus transtulit. Sed mox de suo addit. Vius
 ad nasas marinas, vitilium nexus, elegantium
 Lucernarum lumina, præcipua medulla, ampli-
 tudine, iuxta maritimas alpes tanta, ut inciso
 ventre impleat penè vnciarum latitudinem: in
 Egypto verò cribrorum longitudinem, non aliàs
 vitiliorem. At verò hic locus haud dubiè corrup-
 tus est. Deest enim vnciarum numerus. Quæ
 verò puranda est cribrorum longitudo? Quan-
 quam autem) inquit Cornar. doctissimus quis-
 que ita hæcenus legerit, & locum hunc citave-
 rit; tamen ego sic lectionem restituendam iudi-
 co, ut legatur: amplitudine iuxta maritimas alpes
 tanta, ut inciso ventre impleant denum vncia-
 rum latitudinem: in Egypto verò cybiorum

Clus. loc.

Iunci duplex
Diosc.Iunci generi
ta tria,
Plinio.Plinio lo. no
corruptio.

HISTORIAE PLANTARVM

longitudinem, non aliis vtiliorem. Denum vni-
ciarum, id est, pollicum latitudinem implere di-
xit. Sunt enim æque duodecim pollices in
pede Romano, sicut in libra duodecim un-
ciae, velut lib. 5. cap. 9. comm. medic. declarat.
Et profectò proclive fuit penè vocem, per denum
substituere. Deinde cybiorum longitudinem im-
plere ait, eamque longitudinem non esse aliis,
quàm cybiis videlicet, vtiliorem, nimirum ut ip-
sis excipiantur ac colligantur. Cybium autem
appellari concisam pelamidè Plinius testatur. Et
hic facile fuit à cybigrà voce, ad eriborum vocè
delabi. Vetus noſter codex, cimbiorum scriptum
habet vnde ad hanc coniecturam devenimus,
quam cuiusque iudicio expositam, sequendam
aut reprobendam relinquimus. Porro subiungit
Plinius hinc vsum lunci medicum. lunciradix,
inquit, in tribus heminis aquæ decocta ad ter-
tias, tussis medetur. Semen tostum & in aqua po-
tum, sistit aluum, & foeminarum menses, capi-
tisque dolores facit. Et hæc consonè cum Diosc.
nisi quòd in aqua potum, pro *in aqua* dixit.
Est autem *in aqua* vinum aqua dilutum: deinde
rursus menses reddit *in aqua* suo more, velut
iam sapè dixi. Verùm quod hinc sequitur peni-
tùs alienum est à Diosc. sententia. At qui voca-
tur holoschoenos, eius folia quæ proxima sunt
radici, commanducantur aduersus araneorum
morsus. In vulgatis codicibus vox folia deest, &
Dioscor. ea non commanducari sed imponi vult.
Et tandem subdit Plin. Inuenio etiamnum vnum
lunci genus, quod Euripicen vocant. Huius semi-
ne somnum allici sed modum seruandum, ne sa-
por fiat. At hic Euripices vocis lectio doctis sem-
per suspecta fuit. Vetus codex Trepicen habet,
non minùs incerta lectione. Dioscoridis codices
parciim *in aqua* habent, partim *in aqua*. Hos se-
quutus iudicium doctis defero.

Galenus, luncus læuis alter, inquit, *in aqua*,
alter *in aqua* nominatur. Et gracilior quidem
ac durior est oxyſchænus, crassior autem & la-
xior holoschænos. Semen holoschæni somnife-
rum est. At oxyſchæni duæ sunt species, altera
sterilis, cuius vſus ad medicinam nullus est: al-
tera semen fert, & ipsum somniferum, sed minùs
quàm holoschæni semen. Inducit tamen hoc etiã
capitis dolorem. Amborum verò semina si cum
vino bibantur, fluxiones ventris resiccant, & flu-
xum rubrum cohibent. Ex quibus clarum euadit
temperamentum ipsorum esse compositum
ex terrea substantia leniter frigida, & aquosa: le-
niter calida, vt inferna siccare possint: & vapores
ad caput remittere leniter frigidos, quibus
somnum inducunt.

Celsus & Latinioreſ luncum odoratum rotun-
dum vocant, ad differentiam angularis, quem i-
dem quadratum appellant, Græcè *in aqua* appella-
tur per excellentiam, quum aliàs omnes lunci
species hoc nomine veniant. Hippocrates *in aqua*
in aqua, id est luncum odoris
iucundi, & benè olentem, ac odoratum, in lib.
morb. mulier. vocat, h. e. Aromaticum luncum, vt
Galenus exponit in glossis. In Officinis hodie
radices raro habentur. Quæ verò reperiuntur Fe-
stucæ siue culmi, Squinanthi nomine appellantur
corrupto illo ex *in aqua*. Nostri Wolſchende-
bingen vocant, Camelſchen / hoc est Fœnum ca-
melorum, velut etiam Galli pastum camelorum.
Et profectò Festucæ illæ Officinariæ præ-rasæ
apparent ex superna parte, quod ipsis à Camelis
contigisse verisimile est. Appellant etiam Græci
in aqua, quod in vnguentis recipiatur.

In Mazcate & Calaiate Arabiæ provinciis, *in aqua*
ab incolis *Sachbar* vocatur: à nonnullis verò *in aqua*
in aqua, id est, herba lotoria, aut lotionibus
idonea: tamen non negem [inquit Garcias] a-
liis etiam nominibus apud Arabes insigniri. Nā
Auicenna lib. 11. cap. 391. eum *adher*: Scrapio c.
19. *adher* appellant: quos sequuntur omnes Ara-
bici & Persici Medici hic agentes: florem verò
vocant *Foca*. Nam quod Syluaticus cap. 12. *adher*
& adhecarum vocari scribit, corrupta sunt vo-
cabula. Persis, qui ad iam dictas, vsque Prouin-
cias pertingunt, *Alas*, quod herbam significat, vo-
catur, quo nomine per excellentiam appellari
potest. Apud Indos peculiare nomen non est
sortitus, sed herba *Mazcatensis* appellatur. Sunt
qui *paleam de Mecha* nuncupent. Nec desunt qui
Pasum camelorum vocent, nec immeritò, sed ta-
men Cameli non sunt istic adeò frequentes, vt
hoc Gramæcum floribus omnino depascere pos-
sint. Sed sunt ibidem multi Asini, Muli, Equi,
quos Arabicos vocamus, boues Capræ, & oues,
quæ nullum aliud pabulum norunt quàm hanc
herbam, siue Gramen. Desertur quidem in In-
diam in vsum Medicum vsurpandis. Maximè
tamen copià per fasciculos colligantur in nau-
bus adsumunt equarii mercatores seu mango-
nes, vt equis subſternant, ne stercoreis & vrinæ
pæſore offendantur. Nam simul atque madue-
rit. recentem subſternunt, & madidum in maie
abiiciunt. Sed & nauæ fasciculos aliquot secum
aduehere solent, quos deinde in Italia vendunt.
Memini in Insula *Diu* vili emisse multos lunci
fasciculos, quos in Lusitaniam cum aliis aroma-
tibus mitterem: nullum tamen florem videre
contigit. Sed nec aliquo in pretio ab incolis ha-
betur, cum Gens sit rudis & syluestris. Nullus est
huius vſus apud istius regionis incolas: sed nos
duntaxat, & Medici Arabes & Persæ, eo vtimur.
Ipsi indigenæ eo se & sua iumenta lauant. Nunc
ad *Audres*, qui eius meminerunt veniamus. Dio-
scorides lib. 1. cap. 16. laudatissimè ex Nabathæa,
proximum Arabicum, quem aliqui Babylonium
vocant, pessimum ex Africa adferri scribit. Floris
culmorum, radiisque esse vsum. Eligendum eū
qui manibus confrictus Rosæ odorem emittit.
Scio in iis quas suprà enumeravi provinciis,
quæ Arabiæ nomine comprehenduntur, proue-
nire. An verò in Nabathæa gignatur (quæ à Na-
batoch Ismaelis nepote denominata, provincia
est Arabiæ Iudææ contermina) diligenter perco-
tatus sum à Medicis, qui in Hierusalem, Galilæa,
aliisque vicinis provinciis versati erant: Sed illi
responderunt, eum quo istic vterentur, ex Cairo
aduehi. Interrogati verò an in Cairo nasceretur,
an autem ex Mazcate adferretur, ignorare se di-
xerunt, quoniam medicamenta interdum igno-
ra manerent ob indigenarum negligentiam. Quæ
cùm audirem, inquirere non volui num Babylo-
ne nasceretur, tamen id fieri posse putem. Cùm *Africa*
verò Dioscorides Africanum improbet, non o-
portet nos admodum sollicitos esse in eo inuesti-
gando, præsertim cùm non adscripserit quæ
Africa regione proueniat. De floribus autem, cum
meam, tum reliquorum Medicorum negligenti-
am agnosco qui non iubeamus eum aduehi. No-
stræ etenim culpa factum est, vt eius vſus defierit.
In medicamentis odoratis, Dioscoridem incertis
comparationibus plerumque uti video, quemad-
modum & in hoc lunculo. Nam tritus iucundum
quidem spirat odorem, sed Rosæ haudququam.
Iucundus odoratus, Cornelio Celſo luncus rotun-
dus vocatur, & ad lunci vulgaris, & cyperi, siue
lunci

lunci

Euripice

luncus odoratus

Sachbar

adher

Foca

Alas

Herba

Mazcatensis

Palea

de Mecha

Pasum

camelorum

Equi

subſternant

Nunc

ad Audres

Floris

culmorum

radiisque

esse vsum

Eligendum eum

qui manibus

confrictus

Rosæ odorem

emittit

Scio in iis

quas suprà

enumeravi

provinciis

quæ Arabiæ

nomine

comprehenduntur

proue-

nire. An verò

in Nabathæa

gignatur

(quæ à Na-

batoch Ismaelis

nepote

denominata,

provincia

est Arabiæ

Iudææ

contermina)

diligenter perco-

tatus sum à

Medicis, qui

in Hierusalem,

Galilæa,

aliisque

vicinis

provinciis

versati erant:

Sed illi

responderunt,

eum quo istic

vterentur,

ex Cairo

aduehi.

Interrogati

verò an in

habetur etiam quodammodo differentiam : sed minime in
 eam altitudinem exerceat, quæ luncum. Avicen-
 na lib. 1. cap. 1. duo eius genera constituit, Al-
 terum enim Arabicum vocat, quod est odoratum
 Alterum in *Agami* nunc, per quod vocabulum
 Damascum intelligit. Sed quod Dioscoridis testi-
 monio, luncum fructum proferre nigrum pro-
 pter manifestus error est, cum Dioscorides nul-
 lum fructum meminerit. Serapio lib. simpl. cap.
 19. ex autoritate Bonif. scribit luncum habere
 radicem *Chulem* similem, latiore tamen, & mi-
 noribus modis cinctam, multos calamulos pro-
 ferens proferentem, qui fructum proferant simi-
 les floribus *Arundinis*, graciliorem tamen &
 minorem, simulque & in vno cespice multas plan-
 tas nasci. Huius radix admodum similis est *Chulem*, ut
 sub eo nomine à nonnullis appelletur, quemad-
 modum inriso dixi. *Matthæus Sihaticus* cap. 11.
 docem annis conservari asserit. Credo in siccis &
 mediterraneis regionibus multo tempore con-
 servari posse, cum humiditate non abundet. Sed
 in huius Provinciae maritimis, paucis annis in
 sua odoris fragrantia conservari potest. Quod ad
 Brassavolus & Monachos in Mesuen com. attinet,
 de illorum argumenta refellit *Matthioli*,
 Com. in Diosc. lib. 1. cap. 16. quare superuacaneum
 esse iudico quidquam his addere. Satis tamen Mo-
 nachorum in Mes. dist. 1. cap. 47. oscitantiam mi-
 ram non possum, qui galangam lunci odorati
 radicem esse contendunt, cum galanga in Sina
 nascatur, quæ bis mille ferè leucis ab Arabia ab-
 est, & plurimum ab luncum odorato differat tum
 foliis, tum radice: nec nisi satis proveniat ga-
 langa, quemadmodum & Calamus: luncus verò
 sponte nascatur, nec seratur. *Hæstius Garrius*.
Tempestivum nunc est, ut ad alios Auctores qui de luncum
scripserunt, deveniamus.

Anguillara sibi persuadet Squinanthum non
 esse luncum odoratum: quia in Squinantho, non
 reperitur caulis qui similis sit cauli *Cyper*i, ut
 videtur voluisse Diosc. Deinde quod radices quæ
 exhibentur non sint similes radicibus *Valeria-*
nae. Præterea quod in usu medico olim flos, cau-
 lis, & radix lunci odorati recipiebatur: nostri au-
 tem vltus tantum sit foliorum: res quæ non vide-
 retur silenda fuisse Dioscoridis ac etiam quod o-
 dor & sapor qui in lunci odorati caule & radice
 sentitur, in Squinanthi iisdem partibus non item.
 Cum in libris Arabum legimus (Monachorum
 in Mes. verba sunt) florem Squinanthi, non pos-
 sumus per Squinanthum intelligere florem schœ-
 ni, sed plantam eius, intelligunt enim per Squi-
 nanthum absolutè plantam ipsius schœni. Schœ-
 num autem non sunt illæ palæ, quibus ubique
 in Officinis videntur: quia descriptio Dioscor. de
 Schœno odorato non convenit illis, ut quilibet
 videre potest: non enim habet radices notabi-
 les ad Medicinæ usum, sed quasi capillaceas par-
 vas, & nullius roboris vel momenti, nec mordi-
 cant linguam ipsæ palæ, & quamvis sint æqua-
 liter odorata, non tamen spirant rosæ odorem: &
 quod maius est, videmus quod non producunt
 luncum, sed calamum nodosum, sicut & calamus
 hordei aut frumenti: quoniam ut plurimum ex-
 portantur cum parte ipsius calami. Vnde nonnul-
 li rectè existimant ipsum Squinanthum vsualem
 esse plantam calami aromatici. Reuera Squinan-
 thum non habemus. Sed multorum quidem non
 spernendum est opinio, quod hæc radix quia
 communiter pro Galanga utimur, sit radix ipsius
 verò Squinanthi. Etiam à nonnullis qui fatentur
 quod sit vltus plantam istius Galangæ vsualis,

habuimus quod ad vnguem correspondet Diosc.
 descriptioni de luncum rotundo, odorato. Galan-
 ga autem, quæ (ut supra diximus) Græcis inco-
 gnita fuit, & à nobis quoque minime cognosci-
 tur, alia planta est, & apud Arabes solummodo
 perquirenda. Vnde tam pro floribus quàm pro ip-
 so Schœno, (quibus caremus) quàm etiam pro
 ipsa radice posuimus, uti ubi oportet hac vsuali
 Galanga. Possumus quoque uti hoc vulgari Squi-
 nantho, quod esse plantam calami aromatici, o-
 pinantur plures, quoniam, ut in Dioscoride &
 ceteris fide dignis authoribus videri potest, vir-
 tutes & proprietates calami aromatici & lunci
 odorati, nihil, aut satis parum, inter se differunt:
 ex quo bene potest alterum pro altero compen-
 sati. *Hæstius Monachus*.

Cor. in Dioscor. hæc de Schœnantho scribit. Cor.
 Contuli aliquoties de Schœnantho cum merca-
 toribus, nonnullisque aliis grandævis & magnis
 viris, qui visendæ terræ sanctæ gratia in Orien-
 tem hinc proficiscebantur. Ij rerulerunt, nego-
 ciatores ex Syria Alexandriam ducere Camelo-
 rum greges, quos *Caravanum* vocant, impositas
 merces ferentes, cum autem in solitudines pro-
 veniant inter Syriam & Egyptum ad Arabiam
 sitas, neque pabuli, neque aquæ copiam inueni-
 ri, nasci tamen secus vias ubique aridis velut sti-
 pulas, easque numerosas, densas, & stipatas ex i-
 mo radicum cespice admodum odoratas, quas o-
 biter inter eundem aut alias quiescentes depa-
 sçant Cameli, eamque ob causam se pabulum
 hoc *Pamelstro* & *Pamelshen* appellare. Refere-
 bant etiam illos solere tali pabulo Camelos one-
 rare, ne in sterilibus deficerent iumenta: quod
 verò supersit Alexandriæ & Alkani vili admo-
 dum vendere. *Hæc Cordus*.

His sequentia opponit *Matthioli*: Flos ad nos
 non importatur, quod tamen mirum non est,
 cum etiam Galeni tempore non haberetur. Pro-
 inde, inquit lib. 1. de Antid. luncum odoratum ex
 Arabia allatum &c. Quæ Galeni (si licet nobis
 dicere quod sentimus) potius ridenda quàm pro-
 banda videntur. Arduum quippe fuerit credere,
 tam ingentem esse numerum Camelorum, qui lo-
 custarum modo in vniuersum Schœni flores de-
 pascantur, ut nulla penitus supersit planta, cui
 flos non deuoretur. Referunt quidam nasci odo-
 ratum iuncum etiam in Apulia, quin & in Cam-
 pania provenit, ut Brassavolus inquit Plinij au-
 thoritate. Sed vereor ne hallucinentur, quod nec
 inde flores adferantur, nec palæ: neque etiam
 id Plinius affirmanter asserat. Is, quo Seplasiarij
 passim videntur, non affertur aliunde, quàm ex A-
 lexandria. Ceterum non parua quidem diligen-
 tia, dum emitur est adhibenda: quandoquidem
 non desunt impostores, qui ad merces augendas,
 Schœnum palæarum, & herbarum quibuldam fe-
 stucis adulterent. Præterea videndum est, ne ve-
 tustate exoleuerit. Quod Dioscoridem oscitan-
 ter legerint, cum dicunt Schœnum luncum pro-
 ferre num calamum, facile patet, quandoquidem
 contrarium scribit Dioscorides, ubi Schœni v-
 sum reddit his verbis *χρῆται τὸν ἄλκοι, & γὰρ ἡ
 ἰσχυρὰ τῆς ψυχῆς*. Præterea quod communis vsus
 Schœnos actimoniam non habeat, pariter fal-
 sum est, palam est, Monachos vel nunquam
 Schœnum degustasse, vel si degustatum, illum ad-
 dedo vetustate exoletum fuisse. Quod autem no-
 stri Schœni radices tenues sint, nihil ad histo-
 riam refert: siue enim tenues sint, siue crassæ,
 eas non descripsit Dioscorides, Schœni flores ex
 Alexandria vni cum integra planta allatos ego

HISTORIAE PLANTARVM

In manibus habui, qui digitis attriti Rosarum odorem emittebant. Quamobrem non temere contra Monachorum sententiam affirmandum putauerim communis usus Schoenanthum, legitimus & probatissimum esse. Et in post. comm. Lat. & Ital. cum mag. fig. Fuchsum errasse crediderim, qui scripserit sua in methodo Schoenanthi stipites nullam acrimoniam mansu reliquere: in quo errore eum secutus est Anguillanus.

Plin. lib. 17.

Putamus nos rotundum odoratum luncum, qui non fuerit exoleus, nunquam degustasse Anguillanum, ut nec Fuchsum. Nec praeterendum erat quod aliquando, monit. Rondeletius praecceptor meus, figuram Schoenanthi odorati Matthioli fictam, potius, quoad flores, quod manifeste mihi quondam apparuit visis Verona apud insignem Pharm. Bellicorum Summitatibus Schoenanthi odorati in quibus erant veluti flocci: Lugduni copiosum habebat Valerandus Douper, pro Theriaca.

Amari.

Monachos quoque refutat Amatus, dicens: Schoenos siue odoratus luncus, in Africa & Asia praecipue nascitur, quanquam & in Campania & Apulia reperiuntur, viribus saltem impotentioribus, audior quoniam Latiniore rotundum luncum odoratum appellant & diuersum ab illo odorato anguloso luncus faciat, quem hodie Officina sub eodem ferè nomine habent, Schinanthum appellant. Verum iunci, florem significat, nam Schoenos Graece iuncus est, Anthos vero flos, unde Schoenanthum, quasi iuncus flos: quanquam hodie, veluti Galeni tempore, flos ad nos non affertur, unde ille libro de Antidotis primo, ita inquit, praeterea luncum rotundum Arabicum immitti praecipit, qui à vulgo, haud scio quomodo, lunci rotundi flos dicitur, quum tamen nos non adeo flosis copiam habeamus, tota enim aduehitur herba subinde ex parte superiori à camelis troscana libentissime eam depascuntur, & copiosissima in Arabiae vills crescentem habent, hac ille. Hodie quoque ex Oriente ad nos absque flore portatur, cuius folia, caulis & radix in Officinis habentur quae utinam pura essent, quum à multis adulteretur, illis varia immiscentibus, vel recentia saltem & non vetera portarentur, quum Galeno autore, facile schoenos veterescat, quod ex odoris amissione deprehenditur. Nonnulli tamen opinati sunt, ut Monachi, qui nuper Mesues antidotarium enarrarunt, quod hodiernum Schoenanthum officinis vulgare, Dioscoridis luncus iste odoratus rotundus non sit, quum in eo acutus ille desideratus sapor, linguam mordicans non percipiatur, nec quantulumque odoratum sit, nec manibus confectum Rosae odorem spiret. Item quod Schoenanthum hoc, non luncum aliquem ex se mittit, sed potius calamum, similem illi quem Triticum aut Hordeum facit, unde inter se multum differre pro firmo gloriantur: sed re vera eorum gloria in infamiam vertetur, quum in duplici errore comprehendatur, primo Dioscoridis textum non intelligentes, quum Dioscorides Schoenanthum, id est odoratum luncum, non luncum aliquem ex se loco caulis mittere, sed potius harundinem, aut calamum tradat ut in sua legitur lingua, quae ita habet, *ῥοσὶν ἢ ῥοσὶν*, id est, flos, id est, calamus, & radicis usus est. Ex quibus verbis satis percipitur, quam male Monachi isti Dioscoridem intellexerint, quum Schoenanthum, non luncum, sed calamum ex se caulis videretur: Secundo hallucinantur Fratres ij, quia experientia contradicunt affirmantes Officinarium Schoenanthum

Monachorum error.

thum in gustu linguam non pellicare, quum vera recens eam valentissime mordicat, unde credendum est, Schoenanthum ab illis gustatum verum omnino esse, à quo non solum odor, sed & sapor facile, ut ex Galeno didicimus, emanet. Sed quod Rosae odorem referat, qui illius flos viderunt, similem odorem habere attestante ut minime ambigendum sit, quod Officinarium Schoenanthum, luncus odoratus Dioscoridis sit, cuiusque vires inuestigat Galenus l. 1. simpl.

Fuch. de comp. med. ait iunci odoratum flos qui Actuarius & aliis recentioribus *arceuth* appellatur, maxime utendum esse. Huius tamen florem ad nos minime deferunt, sed culmum tantum eiusdem, superiore tamen parte à Capulis croci: Germ. *Ameltheu* / i. e. Equum molitorum, nominari in offic. vero Squinanthum. Ille praeterea perhibet qui culmos illos legiones esse negent, quod scilicet linguam non mordet, nec Rosae odorem spiret. Huius alios opponit, quod Schoenanthum recens & linguam valde mordicat, & Rosae odorem referre testentur. Nec mirum tur vetus & odorem & saporem amittere.

Anguillara & Monachi, ut ex haecenis disciparet, praecedentium [Cord. Syluii, Cronenburgi, Dodonaei, nec non Cornarii, ac Amari aliorum, qui vulgarem luncum odoratum recipiunt,] opinioni resistunt, negantque nostrum Schoenanthum, esse verum & Antiquorum, *quum argumenta sic refelluntur.*

Primum Anguillarae respondeo, ne non amaduerrere, Dioscoridem velle caulem Schoenanthum similem esse Cypero, ut ipse ait: nec etiam immo vocari luncum angulosum, ut dicit Dodonaeus.

Secundo, Dioscorides cum comparat Valerianam siue Phu Schoeno, non totam radicem, sed partes, videlicet *ῥοσὶν* intelligere.

Tertio, quod ad argumentum desuperant viribus & usu, quod ait nostri Schoenanthi vltim esse tantum foliorum, dupliciter respondeo. Primum forte eos usos adhuc virentibus, & sic posse, ut efficacior hinc sit recens, quam vetustior, qualem ut plurimum habemus. Apparet enim fibras rectas fuisse cortice, & tantum remanere lignosas partes, aut in cortice forte vis non parua est. Secundo laudantur radices à Dioscoride Galeno ab adstrictione, in quibusdam affectibus, quae adstrictio gustanti apparet, maxime in eorum radicibus proximis caulibus & vltimis. Flores laudantur à caliditate, ideo recipiuntur in antidotos, ut Theriaca, iis tamen caretis flos & culmis integris. Pro his vltimis summis foliorum, & merito, cum omnia in eis conperiamus, quae requirit Dioscorides, & Galenus licet forte imbecillius.

Quarto dicit non silendum fuisse Dioscoridis foliorum vltim: respondeo non siluisse Dioscoridem, nec Galenum, sed eos loqui primo generaliter de tota planta, deinde ne quis relictis vltis florum vel culmorum, vel radicem, vel ignoret vires valentiores in hac quam in illa parte esse, contendunt particularium in vltis esse partes predictas, & qua in se differunt.

Quinto dicit, se non sentire, neque laporem neque odorem in caule & radicibus: ad hoc respondeo idem quod iam de radicibus. Praeterea cum obscuriores sint vires forte in culmo & radicibus minus ei apparuerunt. Addiderim me nusquam legisse efficaciores esse vires in radicibus & culmis quam foliis, nisi in radicibus, ut dicta.

tionem adstrictionis. Hic eadem ratione respon-
det Monachus, qui reiciunt nostrum Schenanthum,
quod radices non mordicent linguam. Credo equidem eas non sensisse, cum nec in foliis
perceperint, in quibus manifestè tum Matthio-
lus, tum ego deprehendimus, nec non & Ama-
tas. Præterea non celebratur acrimonia in ra-
dice.

Sexto est quod respondet Monachus dicenti-
bus Schenanthum luncum non producere, sed
calamum nodosum. Calamum ferre fateor, luncum
cum requirit à Dioscoride non reperio: interea
quod modo luncus sit similis postea ostendam in
descriptione.

Septimo non morabor refutando opinionem
Monachorum Squinantum vulgare non esse
Calamum aromaticum, ut ipsi volunt, cum ra-
tionibus præcedentibus eueram eorum argu-
menta, & consentiam cum iis, qui credunt, nos
verum Schenanthum habere.

Octavo, refutanda esset eorum opinio, quæ exi-
stimant Calamum esse luncum odoratum. Ve-
rum hoc factum suo loco capite de Acoro.

Nono miror Matthiolum ridere Galeni ratio-
nes, seuque non meliores adferre, imò hac in
parte nullas.

Decimo, illud considerandum relinquo an me-
rito Matthiolus reprehendat Fuchium, nusquam
enim legi eum scribere, quæ dicit Matthiolus.
Recitat quidem loco supra adscrip. v. opinionem
quorundam, qui dicunt eum nos non mordicare,
non autem suam. Quinimò in fine hoc vetustati
attribuit Fuchius.

De luncis hæc notatu digna scripsit in suo pin.
Caspar. Bauhinus luncus à iungendo, Græcis οξυ-
σχῆνος, à locis & funibus dicitur. Dioscorides in o-
doratum & inodoratum diuissè videtur. Nam
lib. 1. de luncis odoratis, quem simpliciter οξυ-
σχῆνον excellentiam nominavit, egit. At lib. 4. de ino-
doratis tractauit: hunc duplicem fecit, vnum læ-
uem, alterum acutum: hunc sterilem, & alterum
femine nigro & crassiore calamo, & tertium in o-
doratis prioribus carnosiores. Sic Theophr. 4. hist.
1. tria sunt genera οξυ-σχῆνος, acutus & steri-
lis, qui mas: οξυ-σχῆνος, frugifer, quem μαλακῆνος,
articerum vocitat: tertius οξυ-σχῆνος dicitur: at de
odoratis 9. hist. 7. egit. Plinius lib. 11. cap. 18. quin-
que fecit, 1. Mariscum appellatum, 2. Marinum, O-
xyschenum, & huius tria genera: acutum, steri-
lem, quem marem & oxym: alterum semen fe-
male, quem Melantraphin vocant, & fructuosior:
magis tertius, qui Holoschenos nominatur.
Quare luncus alius est odoratus, inodorus alter,
vel alius locis aridis, alius aquosis provenit, hic,
vel in aquis dulcibus, vel maritimis. Rursum v-
triusque generis alij αμύχνης, in mucro-
nem pungentem desinunt, alij in fastigium obtu-
sum: sic alius αμύχνης, levis: alius πρῶτος, asper:
hic fastigio acutius, alius obtusius. luncus læ-
uis & in fastigio acutus, alius est Oxyschenos,
alius Holoschenos. Oxyschenos alter mas, αμύχνης,
nullo femine fecundus: alter femina μαλακῆνος,
nigum semen ferens: sic ad fecundum cla-
uatus: petrosus verò ad lapides referendus est.

Ceterum, luncus de quo præfati capite nobis
sermo est, vocatur οξυ-σχῆνος, id est οξυ-σχῆνος, & i-
nominatus. Hipp. οξυ-σχῆνος αμύχνης, & μαλακῆνος, Græcis
posterioribus. οξυ-σχῆνος Diosc. & Galeno. luncus o-
doratus, Plinio, Hermol. Ruell. Matth. Turn.
Lac. Lob. in Adu. & Obs. p. 42. Ic. plant. pag. 82.
Clus. in Garc. & H. Lugd. p. 1885. luncus rotundus
Celso. luncus rotundus odoratus, Marcell. Amat.

Tom. II.

to, & Corn. luncus i. sine odorato seu aromaticus,
C. Bauh. phyt. in pin. Schenanthus & luncus odoratus
reyes ac rotundus, Cordus Schenanthum Meluzo,
Lon. (cui & Cyperus rotundus.) Taberns (&
luncus aromaticus) Cam. (& luncus floridus sine
aromaticus) Acolta. Squinantum Varroni, An-
guill. Guil. & Officinis, quasi οξυ-σχῆνος, luncus
flos. Adhar & Adhir, Arabib. Sachhar, Arabib.
incolis. Palea de Mecha, & Passum camelorum, vul-
gd, & Germ. Camelfiro, hoc est, Camelorum stra-
men, Camelfibero, Fanum camelorum, wolkrich-
bende Binzen, luncum bene olentem, & Cam-
dischbero, Fanum Candia. Gall. Pajure de Cha-
meaux. Ital. Squinantio. Hisp. Paja de mequid.
Belg. & Angl. Schenanthum. Boh. Syti wons
ne.

Schenanthus, alius in Lybia nascitur, alius in Arabia, Locis
alius in Nabathæa. Adfertur & ex Egypto. In
Campania & Apulia quoque reperitur. Reponi-
tur ut alia: quotannis muratur, quamvis etiam
decennium seruari possit.

Vltum porro esse floris, & culmorum, & radi-
cis, hinc Dioscorides docuit: Vim habet vrinam
ciendi, menses ducendi, flatus dissoluendi: gra-
uat caput & moderate adstringit: habet insuper
vim atterendi, concoquendi, & aperienti: Flos
igitur ipsius in potu commodus est ad sanguinis
eductiones, & ad dolores stomachi, pulmonis,
hepatis, renum: miscetur etiam antidotis. Radix
adstringit: quapropter etiam nauseabundis sto-
machis exhibetur: hydropicis item & conuulsis,
cum æquali Piperis pondere ad aliquot dies. De-
coctum verò ipsius inflammationibus circa vre-
rum commodum est ad infessum: Galeno Schen-
anthos modicè calefacit, modicèque etiam ad-
stringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est,
Quocirca his de causis vrinam mouere, menses-
que ciere perhibet, siue in fomentationem,
siue in potionem adhibitum: prodesse & ie-
coris, & stomachi, ac ventris phlegmoni-
as. Magis eo adstringit radix. Quod verò
florem vocant calidius est: Porro in omnibus
suis partibus, in aliis magis, in aliis minus, gu-
stantibus apparet adstrictio: proinde medicinis,
quæ hæmoptoicis, siue sanguinem reicientibus
exhibentur, commiscetur. Ex Nabathæa lauda-
tissimus, vel Plinio teste, proximus Babylo-
nius, pessimus ex Africa & sine odore. Est autem
rotundus, vinctus mordacitatis ad linguam. Sin-
cerus in confricando odorem rosæ emittit, ru-
bentibus fragmentis. Discutit inflationes, ob id
stomacho utilis, bilémque & sanguinem rei-
cientibus. Singultus sedat, ructus mouet, vri-
nam ciat, vesicæ medetur. Ad muliebres vsus de-
coquitur. Opisthoronicis cum resina arida impo-
nitur. Hæc Plinius.

Vires & vi-
sus.

IVNCI GENVS EVRIPICE.

CAP. CXXIII.

Aliud etiamnum Iunci genus ex versione Descriptio
Hermolai traditur à Dioscoride, quod Eur-
ipicen, i. uernale: pro qua voce Cornarius à nobis
recedens αμύχνης legit, vide ante.) vocant: cu-
ius femine somni alliciuntur: sed modus in cofer-
uandus, ne sapor fiat.

Non desunt autem qui Euripicen Tropicen ap-
pellent, inter Recentiores: quorum plerique eti-
ditionis suæ periculum faciunt, multisque parti-
bus rei latine officiant.

Xx.

HISTORIAE PLANTARVM

Plinii verba de Euripice, legenda c. precedēti.

IVNCVS PANICVLA ARVNDINACEA.

CAP. CCXXV.

Descriptio



Caulis siue
styli huic
ex vno cespice
crebri, cubita-
les, aut altio-
res, teretes,
firmi, propter
terram ruben-
tes, dein ob-
scure viren-
tes, striati, pal-
maribus folio-
rum rudimen-
tis circa imū
obuoluti me-
dulla rarissi-
ma & prope-
modum mem-
branca, mu-
rone miti-
te, sed plerū-
que longo &

tenui, infra quem panicula iubata effunditur, ad Arundinaceam accedens, sed ei mollitie cedens, semen ferens tenue & fulvum, oblongis, in tria foliola dehiscētibz conceptaculis clausum: radix crassa, multis, crassis, intus albis, fibris donatur: cuius oculi primum erumpentes, squamis lucidis nigris compactiles conspiciuntur.

Synon.

Trago *Juncus vulgaris alter*, siue tenuior, cineracei coloris: *Juncus verrum genus*: *Holoscianus* Pliny: *Virgilij Juncus mollis* - *limosus*.

Dod. gall. *Juncus secundus*: Et sic lat. in fol. & de frum. sed ibidem primo loco pingitur: Dicitur & *Juncus laevis*, siue *χρῖστος* Lat.

Lobelius in Obs. pag. 43. in Ic. verò pag. 43. figuram habet Dodon. ei sub inscriptione *Junci laevis vulgaris panicula sparsa*. Sed ea non responderet descriptioni Aduersariorum.

Casp. Bauhin. phyt. *Juncus 1. siue acutus panicula sparsa*: Eid. pin. *Juncus laevis 4. siue panicula sparsa* *maritimus*: *Juncus oxychneus*, Anguill. *Juncus laevis* [seu *laevis*] Cordo in Diosc. Dod. Hist. Lugd. pag. 989. *Juncus laevis vulgaris* Lob. in Adu. & Thalia Genue & Montbelgardi hic *Juncus* a nobis observatus.

Locus.

IVNCVS MATTHIOLI.

CAP. CCXXVI.

Descriptio

Iuncus Matthioli Maximo ut omnibus nume-
ris minor, ita fortior, in edullam habet com-
pactiorem, albam, oleique in lampadibus bibu-
lam, & elychnii seu funiculi candelarii sebo im-
mersus, detracto magna ex parte cortice laui,
soléque aut fumo siccior redditus, vicem supplet:
flores è lateribus citra summitatem erumpentes,
rufescentes in orbem glomerantur.


An Lob. in Adu. *Juncus laevis vulgaris*?

An Trago *Junci vulgaris genus alterum car-
nosius*?

Synonyma

An Dod. lat. hunc describit pro *Juncus* primo?


Casp. Bauhin. phyt. *Juncus 2. siue acutus alter
panicula non sparsa*: Eid. pin. *Juncus laevis 7. siue*



panicula non
sparsa: *Jun-
cus* Matth.
Lac. & Cast.
Juncus laevis si-
ue *Oxychneus*
vulgaris, Hist.
Lugd. p. 984.
Juncus laevis gl-
omerato flore
Lob. Ic. p. 84.
Juncus palustris
minor Tab. An
*Juncus rotun-
dus*. Casalpini-
no.

IVNCVS PVNGENS, SEV IVNCVS
acutus capitulis Sorghii.

CAP. CCXXVII.



Dense su-
paros
tollit culmos
lesquicubita-
les, crassiuscu-
los, rigidos,
cortice spisso,
medulla soli-
ducula, alba,
quos statim à
radice crassis
fibris contex-
ta, involunt
foliaceae vagi-
nae rubentes,
dodrantem
circiter longe,
comitantibus
pinnatis cri-
stis Spartij Au-
striaci formā,
non a colore, Desip.

qui hic rufus, emulantebus: infra mucronem
autem culmorum pungentem tribus quatuorve
pollicibus exiliunt florum seminūque glomerata
capitula, quorum exortui subiectum est solum
indidē erumpens, ex latiore principio vaginam
imitata in acumen desinens.

Casp. Bauhin. in pin. *Juncus acutus 1. siue capi-
tulis Sorghii*: *Juncus 2. siue acutus* Anguill. Cordi in Diosc. & Castoris: *Juncus acutus*
cachymine Gesn. cat. *Juncus maritimus 1. Lob. Adu.*
Juncus rotundus alter, Casalpini, quid? *Juncus* in
maritimis nascente locis, acuto & ad vulnus in-
figendum infesto acumine praedito, *Oxychne*-
no vocato, nos carete dixit Cordus.

Casp. Bauhin. ad hunc suum *Juncum* referri
posse putat *Juncum palustrem*, & inusitatum Ca-
ricis genus, cuius folia peracuta, crura & pe-
des sauciantia traduntur par. 6. Ind. Occid. ex-
ped. in Floridam.

IVNCVS

IVNCVS ACVTVS MARITIMVS CAULE
triangulo, C. Bauhini.

Descriptio Radice est serpente, fibrosa, à qua alix radice
culi, prioribus exsiccatis, nascuntur: hinc
caules, quos ad radicem breuia folia cingunt, pe-
dales, trianguli exurgunt, & in extremitatem
pungentem desinunt, infra quam è latere stocus
racemosus, rufescens exit.

Synon.

Locus

Iuncus hic acutus maritimus caule triangulo, C.
Bauhin. in prod. & acutus, in pin. in littore Vene-
to, & à Petaulo via, quà Montepelio ad mare itur,
prouenit: & ad Danubium Linzj legitur, refe-
rente Busero. An Iuncus exiguus maritimus,
Czsl.

IVNCVS FOLIACEVS.

CAP. CCXXVIII.

Descriptio



Foliaceus
Iuncus ob-
liqua radice, fi-
bras albas de-
mittente, re-
prat: culmus ha-
bet bicubitales
& altiores, Iunco panicu-
la arundinacea
mibi dicto satis
similes, verum
non adeo circa
inum ruben-
tes, nec ita den-
sos crebrosque
medulla rara
praditos: quos
duo triue ali-
quousque ob-
uolunt seu va-
gina conclusos

folia, postmodum in stylos iunceos teretes abe-
untia, è lateris fissura panicula prodeunt sparsæ
magne (quarum capitula singularia parua) qui-
bus parum altior reliqua styli portio, alias etiam
breuior.

Nostri icon minùs dextrè facta, malè exprimit
folia obvoluentia.

A Dod. gall. videtur pingi pro primo Iunco, &
describi pro tertio, sicut etiam hist. frum. & Lat.
in fol. ubi dicitur Iuncus acutus. & Oxychæmus:
à Germ. Strop biesen: Belg. Yseren biesen.

Dodonæi figuram habet Lobel. in Obs. pag. 43.
secundo loco cum alia, quibus titulus communis
est: Iuncus lævis vulgaris: Adu. p. 43. & 44.
An verò descriptio Aduersariorum huic conue-
niat, iudicent doctiores.

An Tabern. icon. & hist. graminum Iuncum 2. siue
gramen Iuncum aquaticum maius, Groß vasser
binzgras: Fland. & Brabant. Groot
water biesgras: Angl. Great water rusch-
gras.

Casp. Bauh. pin. Iuncus acutus 4. siue panicula
sparsa: Iuncus 3. Dod. gall. acutus Dod. & Casto-
ri. Iuncus acutus vulgaris, Lob. icon. pag. 85. Iun-
cus Oxychæmus Dodonæi, Histor. Lugdun. pag.
85.

Tom. II.

IVNCVS FOLIACEVS CAPSVLIS TRIAN-
gulis.

CAP. CCXXIX.

Magnitudine non parum variat, alias palma-
ribus, alias plùs quàm cubitalibus culmis,

Descriptio



nodosis, com-
pressis aliquan-
tum, singulis,
ramosis, striatis:
folia & à radice
scatim, & ad ge-
nicula culmos
aliquousque am-
plectentia, gra-
minea, acutæ:
scutulis è culmo
diuiso exactis, &
ad diuaticatio-
nem radicem in-
sidunt capsellæ
quinque, sex,
plures, paucio-
resve, simul iun-
ctæ, triquetæ,
oblongæ, mucro-
natæ, ex rufo ni-
gricantes, nitidæ,
semita clauden-
tes perpusilla ruffa. Sed & culmulis alias perbre-
uibus, oblongis alias, spicæ quædam velut ex-
crementitiæ, & ex foliaceo quodam genere
squammata, rubentesque insident. vdis præfer-
tim & apricis hoc crebrò euenit locis, vt circa
Montbelgardum & Basileam in palustribus Mi-
chelsfeldensibus: radix qualis Iuncis, fibris admo-
dum capillata, hisque longis, & iuxta terræ faciem
coëuntibus, serpit, adeoque si culmi terram atti-
gerint, ex articulis fibras demittunt terram de-
nuò comprehendentes.

Lob. ic. plan. pag. 12. graminum aquaticum alterum.
H. Lugd. p. 1001. arund. minima. Tabern. icon. &
hist. graminum aquaticum, Hydragr. fist. Wassergras.
C. Bauh. phyt. graminum 66. siue Iuncum semine
triangulare: Eid. pin. graminum Iuncum 9. siue folio
articulato aquaticum: graminum Iuncum poly. arpon
Thali: Habetur maius & minus: in maiore, post
fœniscium, caulis nouus palmaris excresecit, cui
non amplius capitula corymbæa insident, sed
vtriculi viciales paleacei in capillamenta fissi,
modò virides, modò purpurascens: rarissimè
cum corymbis vtriculi reperiuntur. itæ C. Bauh.
Nos huc graminum polystachion Thali reuocan-
dum censemus.

Locis humidis copiosum obseruauimus Ge-
neua & Montbelgardi, florentem Iulio, & cum
capsulis Augusto.

Locus

IVNCVS TRIFIDVS.


CAP. CCXXX.

Ex longiusculis fibrosis radiculis scirpi pro-
ducuntur dodrantales, valdè tenues, quo-
rum singuli per extrema in tres stylos palmares,
acutos finduntur, interque hos ad exortum se-
dentia semina pauca, ex rufò fusca.

Descriptio

Pro Iunco 5. siue acumine reflexo trifido, sic à
C. Bauh. in prod. describitur: Ex radice nigra, ge-
XX 2

HISTORIÆ PLANTARVM



Synonyma

niculatâ & fibrosâ, iunci plures, tenues, palinum superantes, exurgunt, qui in summo in tres, rarius quatuor, stylos, tenuissimos, trium, quatuorve vnciarum, diuiduntur, in quorum summitatibus, post lunci diuisionem, panicula parua locata sunt. In pin. est. *Juncus acuminatus reflexus*, seu minor, vel trifidus.


Locus

In monte Fracto Lucernatum, in Pyrenæis & montibus Morauiz prouenit.

IVNCVS MAXIMVS HOLOSCHOENOS.

CAP. CCXXXI.

Descriptio



Nodosq; stylos omnium altissimos & crassissimos promit, medulla pumicosa & exigua, citra quorum fastigia è latere erumpunt panicula sparsæ, è capitulis turbinatis, magnis, squamatis, imbricatisque compactilibus, rufis, contextæ, pediculis nunc longioribus, nunc

breuioribus & ferè nullis: semen in squammas delitescit triquetrum.

Synonyma

Tragus licet luncum maiorem palustrem, germ. gross. meyer Bingen vocet, tamen Harundinis potius genus, quàm lunci existimat, indeque piscatoriam Abaritanam dicendam affirmat. Videtur alibi etiam luncum, Plinio Mariscum dictum, appellare. Ego autem non video quomodo ad Arundinem referri possit.

Locus

C. Bauhin. phyt. *Juncus* 5. Eid. pin. *Juncus laevis* 2. *Juncus maximus*, siue *Scirpus maior*, Mariscus Plinii: *Juncus palustris maior*, Tragi & Tabern. *Juncus grandis*, Holoschoenus Gesn. cat. & Dod. (cui & *Juncus* 4. magnus in hist. gall. in lat. *Juncus* 1.) *Scirpus*, lunci 1. species, Lac. *Juncus* 3. *holoschoenus* Anguill. & Cast. *Juncus* & *Scirpus*, Lon. *Juncus aquatilis maximus*, Lobel. Adu. & Ic. pag. 85. itémque Gerardo. *Juncus laevis aquatilis maximus*, Thallio: *Juncus rotundus* 3. Cæ. lunc-

cus laevis Ger. icon. *holoschoenus*, H. Lugd. p. 987.

Montipellii in lacubus: Basileæ & Montbelgar-di in Urbis fossis prouenit. Gaudet enim locis humidioribus, aquas crebrò aut semper habentibus.

IVNCVS PARVVS CVM PERI- carpiis rotundis.

CAP. CCXXXII.



Palmates sæpè, aliquando cubito nequaquam minores profert culmos iuncceos, foliis circa inum multis gramineis statim è radice obliqua, iucea, fibrata exortis, donatos, quorum scapus in umbellam inconditam Filipendulæ modo explicatur, cuius capitula singularia, polita, rotunda, folliculis nigri-

cantibus, semen obuolutum gestant, tandemque in tres exiles carinas dehiscunt.

Gramen iuncum maritimum, Lob. ic. pag. 18. sic *Synonyma* & Ger. *Gramen iuncum* 3. Tabern. *Gramen iuncum* 10. siue foliis & spica lunci, Casp. Bauhin. pin. Eid. phyt. *Gramen* 69. siue *iuncum alterum*. *Locus* In pratis & riguis obseruatur.

IVNCVS HUMILIS.

CAP. CCXXXIII.

Folia, stylosve profert sescunciales tres quatuorve, teretes, ex radice fibrosa, & pro plantulæ modulo, crassiuscula: vix enim vnciam superat.

Gesnerus, cum Tiguri prope lacum [Bazensæ] Felinum collegissem Maio mense, vocabat luncum humilem inutilem & Chamæschœnium.

Casp. Bauhin. in prod. est *Juncus tertius*: Eid. in pin. *Juncus laevis* 9. siue *Juncellus inutilis*. Huc referendum ait *Juncellum* omnium minimum Lobelii in Adu.

IVNCVS EXIGVVS MONTANVS, MV- crone carens, Casp. Bauhini.

CAP. CCXXXIV.

Radice est pusillâ, nigra, capillacea, cauliculo quatuor vel quinque vnciarum, cuius summo capitulum paruum, ex fusco purpurascens, quadrifidum, in exiguum rigidiusculum filamentum ambiens, infidet: folia ad cauliculi principium tria, iunceæ, vnciam longa.

Juncum 2. C. Bauhini in prod. siue eiusdem *Juncum laevis* 8. in pin. D. Burserus in Taurero Ratiadiensi

Radienſi collegit. Suſpicatur autem Caſp. Bauh. hunc eundem eſſe cum *Iuncus lychnanthemo tenui*, plures ex radice fibroſa emittente iuncos ſtylos, breues, digitales, ſpicā perſuſillā, ſpadiſcentēque in apice exornatos, Thali, quem nuſquam quā in Broccenbergo collegit.

IUNCUS FOLIATUS MINIMUS.

CAP. CCXXXV.



Iuncus minimus vnciales & ſeſcunciales emittit culmos, plures ex ceſpite ortos, enodes, paniculam ſingulos gerentes exiguam, glomeratam, ſemen glumis rubefcentibus triangulum occultantem, cui bina appoſita foliacea cornicula, alterum ſurrectum, alterum ſecundum culmum deorſum vergens: folia è radicibus

fibroſis capillaribus anguſta, vncialem longitudinem circiter adepta.

Nemaſo attulit Gener Cherlerus.

IUNCUS MINIMUS FONTIS ADMIRABILIS.

CAP. CCXXXVI.

Deſcriptio Egerem de ceſpite vno tollit magnam, foliorum & culmorum, quæ præ tenuitate ſtamina imitantur, lætè virentia, glabra, altitudine plus minus palmari: culmi autem nudi enodeſque, circa ſaſtigium (quod acutum) paniculam Iuncorum more ex latere emittunt, aliquando vnam, aliquando geminam, ex viridi ſuſcam, ſquammatam, exiguam, lenticulæ magnitudine, aut paulo maiorem, turbinatam.

Locus Inuenitur loco humido cum Holoſtio Matthioli propè Eichelberg, non longè à Fonte admirabili.

IUNCUS PARVUS MONTANUS CVM paruis capitulis luteis.

CAP. CCXXXVII.

Deſcriptio Longiſſimis fibris Iuncus hic montanus iſſue crebris demiſſis, ſtylos emittit palmares aut dodrantaes, tenues, multis foliorum propter terram inuolucris obſitos, qui cæterà æquabiles enodeſque in ſummo ſaſtigio capitulum geſtant, duplo triplòve breuius quàm Iuncus clauatus, inter ſquammas longiores emicantibus ſloſculis luteis.

Tom. II.



IUNCUS CAPITVLIS LONGIS, SIVE clauatus.

CAP. CCXXXVIII.



Perennis planta eſt, vt apparet ex reliquiis veterum foliorum, Nardo Celticæ ſimilibus.

Obſeruauit in Locum monte, cundo Ribellavve ex Fonte acido S. Petri in valle Griesbachiana, locis humidis, principio Maij floren.

Deſcriptio Scitur radice, multis fibris capillata: culmi ſtriati, nõ aſperi, teretes, enodes, ac ſine foliis, cubitum ſerè æquant, fungoli, circa imum rubentes, quorum ſummitas non in ſtylum exit acutum, ſed in ſpicam clauatam, ruſſeſcentibus ſquammas imbricatam.

Lob. Obſ. p. 44. Ic. plant. p. 86. Iuncus aqua-

ticus minor capitulis Equiseti. Hiſt. Lugd. pag. 986. Iuncus clauatus Dalechampi, ſive (in contextu) Iuncus alius ſæundus. C. Bauh. phyt. Iuncus 7. Eid. pin. Iuncus capitulis Equiseti. Iuncus maior, variis ſcrlpis latioribus & triplò anguſtiſſimis.

Geneux in aquoſis circa Arue, alibique in cenolis & ſtagnantibus aquis naſcitur: floret Mayo & Iunio menſibus.

IUNCCELLVS CAPITVLIS EQVISETI MINOR & fluitans, C. Bauhini.

Ex radiculis capillaceis Iuncus recurvus tenuiſſimus (6. in prod. Iuncus capitulis Equiseti alter, in pin.) prodiit, qui in plures Iuncellos duarum triumve vnciarum ſubdiuiditur, quorum aliqui erecti, aliqui reflexi, capitulum minimum ſuſtinent, & Iuncellis ſingulis foliolum tenue capillo ceu adponitur.

In aquoſis Angliæ fluitat, authore Gelenio.

X x

line erumpit, insigni leuore & æqualitate præditus, in cuius summo flores multi, longis pediculis, ex vno principio nascuntur, in purpura candidi, tribus foliis constantes, sub quorum intervallis alia tria (sed illis minora) sunt: stammina in se flores habent numero plerumque novem, croceo in summitate pulvisculo manus atrectantium inficientia. Habent singuli flores in medio capitulum, semini ferendo aptum & sex partibus divisum, quibus sunt singuli in summo repandi apices: omnibus huius capituli angulis singule adherent gutte, admodum parvæ, crystalli modo transluide, sapore & substantia mellis. Radices habet duas, quarum gracilior & nigrior descendit: crassior vero superius ferè in superficie terre transverberatur: utriusque propagines aliquot, & multæ fibræ adnascuntur: habent radices saporem dulcem, & glutinosum: nascitur autem pinguis, limolis & humentibus locis, quod fluviorum inundationes peruenire possunt.

Sunt qui Gladiolum hunc Cordi, Theophrasto dictum, esse suspicantur: sed Theophr. Cyperum intelligit.

Ad crumen harundinaceum, & Caricem acutam Virgilij referendum Tragus iudicat, ideoque craminis tertium genus, & Calamagrostin alteram vocat: eius autem figura non placet.

Lob. in Adu. Obs. p. 44. l. c. p. 36. dicitur *Iuncus cyperoides floridus paludosus*. Dod. gall. *otapavien & foid*, hoc est, Sparganium & Iris sylvestris, ac etiam Scirpus quorundam.

C. Bauh. phyt. *Iuncus* 3. siue *floridus*: Eid. pin. *Iuncus, floridus* 1. siue *maris*: *Calamagrostis* 2. *Tragi*: *Iuncus floridus Martii*. & C. fl. *Gladiolum palustre Cordi* hist. *Gladiolum aquaticum* Dod. Lat. *Sparganium*, gall. *Carex* alterum, Lon. *Iuncus cyperoides paludosus*, Eyst. *Iuncus cyperinus floridus*, Tabern. *Butomus* Theophr. Cæsalp. *Iuncus floridus Martialis*, H. Lugd. pag. 989. Eid. pag. 1006. *Calamagrostis prima*.

Montepelluli in maritimis & lacustribus palustribus, inter Iuncos præsertim observatur. Sic & in Italij ferè totius lacustribus, & vdis pratis maritimisque, iuncetis potissimum. A Maio ad Augustum usque floret.

IVNCVS FLORIDVS MINOR, C. BAVH.

Descriptio *R*adice est candida, geniculata, fibris plurimis adherentibus: caule palmari: foliis ternis, iuncis, oblongis, acutis, duobus caulem superantibus, cuius summo, singulis pediculis, qui quini sunt alternatim sibi succedentes, flores (quos non vidit author,) insident, quos fructus gemini rotundi, Orobi Cretici magnitudine, sequuntur.

Locus In palustribus Helvetiæ circa cernobium Eremitanorum, & in monte Fracto ad lacum Pilati Lucernatum D. Burserus observavit Iuncum hunc, quem in prod. C. Bauhinus novum fecit, & in pin. *Iuncum floridum secundum siue minorem* vocavit.

CALAMVS AROMATICVS IN GENERE.

CAP. CCLVI.

Theophrasti de Calamo aromatico duplex occurrit locus. Aikenam lib. 9. hist. cap. 7. Tom. II.

quod Calamus trans Libanum montem, inter ipsum Libanum, & alium quendam montem parvum valle minima exeat. Non, ut quidam dixerent, inter Libanum atque ante Libanum, inter quos campus amplissimus & pulcherrimus est, Aulos appellatus. Quæ verò proveniat, lacum in amplum spatium, iuxtaque eum palustribus siccatis, illum assurgere. Occupare locum plusquam triginta stadia. Viridem nequaquam esse videri, sed siccum: forma verò nihil ab aliis (*Plin. lib. 12. cap. 22.*) differre. Locum ingrediendi protinus odorem spirare, non tamen longius, ut quidam referant. In Arabia autem spirationem agri odoratissimam esse inter omnes. Et huius rei causam reddit C. caus. 22. dicens argumento hoc esse, quod tractibus æstivolis, meliora odoratorum genera proveniant, quod melius ibi concoquatur, & siccata oleant, vitidia autem nihil, ut Calamus & Iuncus.

Quæ ex Dioscoride & Galeno hic adducere possemus, ubi de viribus agemus, adscribemus.

Calamus (inquit Plinius lib. 12. cap. 22.) odoratus in Arabia nascens, (Plutarchus libro, Quod bruta ratione vivunt, id quoque prodidit, sed errore manifesto, Guiland.) communis Indis atque Syriæ est: in qua vincit omnes (annis, M.) A nostrisq. mari centum quinquaginta stadiis, inter Libanum montem, aliisque ignobilem, non (ut quidam existimaverunt) Antilibanum, in conualle modica iuxta lacum, cuius palustria æstate siccantur, tricenis ab eo stadiis Calamus odoratus gignitur. Nihil autem à cæteris sui generis differt aspectu: sed præstantior odore, statim è longinquo (aliena hinc Theophrastus, ex quo Plinius hæc ad verbum transcripsit, narravit, quod minimè verum esse Guilandinus testatur, qui eam regionem peragravit. Idem scripsit & Vitruvius: inuitat, mollior tactu, meliorque qui minus fragilis, & qui assulose potius quam Raphani modo frangitur. Inest fistula araneum, quod vocant storem. Præstantior est, cui numerosius. Reliqua probatio ut fulvus sit. Niger alias damnatur, (nec legendum, Reliqua probatio, ut niger sit. Damnatur aliubi.) Melior, quod brevior, & crassior, lentiusque in frangendo. (malim legi mandendo.) Calamo pretium in libras xi. iunco xv. Traduntque Iuncum odoratum & in Campania inveniri. Idem lib. 24. cap. 11. Et quoniam plura genera Harundinis fecimus, illa quæ in India, Syriæque nascitur, odorum, vnguentorumque causa, &c. Lege caput de Harundine, ubi vires traduntur.

Calamus aromaticus siue odoratus duplex est: alter Syriacus, ad ripas lacus Genesarethici, quem alij mare Galilee, alij mare Tiberiadis vocant, nascens, à vulgari nihil dissimilis præterquam quod, post quadragesimum diem siccatus, non nihil flagrat: alter Indicus, descriptus à Dioscoride olim, nuper à Garcia ab Orta, diversissimus à Syriaco. Dionysius de situ orbis *Indicus* vocat, à colore, non ut Eustachius putat, quod eius atrix India Erythræo contermina mari sit. Dioscorides *Indicus* esse tradit. Apud Vegetium lib. 4. de re veterinaria, Absyrus in confectione pulueris quadrigarij Calamum Syriacum & aromaticum, id est, Indicum, memorat. Et hæc Calami genera plurimum inter se discrepantia, Plinius ignorater miscuit ac confudit, teste Guilandino.

Quæ Paulus, Aetius, Plutarchus, Celsus, & Dionysius de calamo prodiderunt, à Theophrasti;

Plinius.
Plutarchus
error.

Theophr.
Lapsum.

Plinius lib.
24. cap. 11.
Indica.

Calamus
Syriacus
differt ab
Indico.

Plinius lib.
24. cap. 11.

HISTORIÆ PLANTARVM.

Diosc. Plin. & Galeni placitis re ipsâ nihil differunt. Quare his neglectis ad Neoter. devenimus.

Legi (inquit Hermol.) & in Meotide odoratum nasci Calamum radice subalbida, & line fistulis, plena intus & amara, specie Acori, de quo & falsi quidam sunt, Acorum cum putantes. Quamvis autem amarior, tanto & calidior est Indico. Vtrumque tamen genus Acorum odore superat. Terebinthibus ut Acorum incessitur: omninoque vicarium pro Acoro est. Ab Ionia & Ponto, & Herculiscolumnis profusque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricæ, ut si eadem non sunt planæ, maxima tamen germanitate visantur, ut autores plerique tradunt.

Aromaticus porro calamus, si Dodonæo gall. si Trago: si Clulio, præsertim verò si Matthiolo in apol. in Amatum credimus, non radix est, sed Calamus pretiosissimus, at qui hæcenus ad nos non fuit apportatus. Nam [inquit hic] quod Plinius ait efficacissimam in omni Harundine esse partem, quæ radici proxima, quis non videret de Harundine, non de radicibus intellexisse Plinium: examines enim partes in uniuerso calamo, radicibus proximis cæteris præstare dicit, quod facile prudens animaduertet Lector. Nec enim aliam ob causam Plinius maiori vi pollere eas calami partes, quæ prope radices habentur, quam quod eadem ubi crassiores, vegetiores, robustioresque in omni Harundinum genere reperiantur, quam in cæteris earundem locis: quo fit ut etiam calami ipsius genicula efficaciora pariter ipse existimauerit Plinius. Quippe & genicula robustiora sunt, & crassiora. Quam ob causam calamum illum prætulit Dioscorides, qui dense fuerit geniculatus. Quod verò Calamum, non radices describat Dioscorides, aperte quidem constat, cum ait. Calamus odoratus in India nascitur, melior est fuluus, dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum fistula. *Hæc ille.* Quæ tamen perperam Lusitanus intelligit. Quippe calamus in primis Harundinem designat, non radicem. Præterea proprium Harundinis est pluribus constare geniculis, & assulose frangi. Deinde fistula, in qua quoddam araneæ telæ simile concluditur, calamo tantum debetur, non radici, quæ solida, dura, lignosa & ubique ocellata spectatur in omni Harundinum genere. Adhæc fuluus color calamo sanè debetur, non radici. Quippe quod radix in Harundine perpetuo albicer. Ad id autem quod proprium sit radicis (ut Amatus contendit) ut ipsa geniculata dicatur, calamus verò potius nodis cinctus, Dioscorides ipse responderet. Quandoquidem is non modo quarundam plantarum radices geniculatas facit, sed etiam caules, & calamos nonnullarum stirpium reddidit geniculatos, ut facile quis certior fieri poterit, qui eius codicem legerit in Hydropipere, in altera Cyclamino, in Gentiana, in Panace asclepio, in Gramine, &c. Constat præterea Calami odorati, quo passim Sepalsæ vuntur, radices ex Lithuanæ, & Tartariæ finibus, quin etiam ex Ponto, ubi passim ferè proueniunt, ad nos conuehi. Quod maximo cuique argumento esse potest, eos cum Amato prorsus hallucinari, qui eas ipsas radices Calami odorati esse contendunt, quod nullus extet autor qui scripserit odoratum calamum alibi prouenire, quam in India & Syria. *Et hæc sunt Matthioli in Amatum argumenta,* quibus docere conatur calamum odoratum communis vsus, legitimum, genuinumque esse Acorum: quin concludit calamum odoratum harundinem esse non radicem.

Iam dictis adstipulant Aloisius Mundella in Brassavolum, & hunc in modum argumentatur. Si calamus aromaticus, qui in officinis pro calamo & habetur & venditur calamus odoratus est Dioscoridis: statuendum utique est calami descriptionem, vel calami ipsius esse, vel radicis, vel vtriusque apud Dioscoridem. Quod autem vtriusque non sit, colligitur, quia Autor non exprimit, quæ caulis aut radicis sint propria. Non radicis: primum, quoniam illius mentionem non facit. Deinde, quia radix, quam pro calamo venditant, non videtur ruffa: acrisque insuper & amara est, velut Acorus. Postremò in assulas non dissilit, h. e. per longitudinem assulas paruas, dum frangitur, non relinquit. His quoque addit: Non constat quomodo fistulæ araneorum plenæ existant in hac radice, quemadmodum in ea, quæ est calami Dioscoridis, quas araneas secundum Plinium florem cognominat. Quod si ergo calami est descriptio apud Dioscoridem, huic nostro vulgari quæ est radix conuenire non potest. Quare dubitat ne hic officinarum calamus, magis ad acori radicem accedat, quod Manardus, Cordus & alii quoque suspicantur, & Matthiolum omnino genuinum esse Acorum credit, & olim Io. Rodericus [Amatis Lusitanus: sub nomine enim Io. Roderici Lusitani superioribus annis commentarios in Dioscoridem in lucem euulgauit.] affirmabat. Nunc verò firmiter contrarium asseruat.

At verò cum huius rei diuersa penitus sint aliorum placita. Argumenta quæ pro negativa parte faciunt, paucis refutabimus, affirmatiuamque rationibus comprobabimus.

Matthiolo itaque dicenti, quod calamus aromaticus, non radix, sed calamus Dioscoridi sit, primum respondemus, calamum aromaticum simpliciter, per se, & absolute dictum, nec radicem, nec harundinem, nec tale quid esse, sed in hæc, tanquam totum in suas partes, diuidi: Et hac ratione æque radicem, ac calamum, aut tertium quid esse posse. Quod manifestè eius descriptio comprobaturque partim ad calamum pertinet, partim ad radicem, ut patebit. Quod ad nos non fuerit apportatus. Audit Amatum veriora testantem: calamum ex India Lusitani nostri singulis annis deferunt per mare rubrum in Cairum & Alexandriam deferentes. Venetias portant, calamis similem, unde nomen accepit. *Luceat adhuc Plinius efficacissimam in omni harundine eam partem esse dixerit, quæ proxima radici sit, non idem denegauit radici ipsi excellentiam, sed Arundinis tantum superiorem partem non ita efficacem asserit.* Præterea Theophrastus & Plinius alibi ipsam calami radicem desiderant, & eam cæteris partibus anteferunt. Nunc suo se gladio iugulat Mundella. Vtriusque (calami & radicis simul) descriptio non est, inquit ille: quia autor non exprimit, quæ caulis, aut radicis sunt propria. Pulchrè ratiocinatur si diis placet. Quæ consequentia: Non exprimit propria, ergo vtriusque non potest esse. Si non expressit, nec etiam contrarium affirmauit. Quod enim dicit optimum esse, qui fuluus est, ad radicem referendum est: Sicut & illud Plinii, subalbidus, in commendando viscosus, subacris, adstringens, ad radicem pertinet, velut ipsum experimentum docet. Quod verò frequentibus geniculis præditum ait, & assulose in multa segmenta dissingi, & fistulam araneis plenam habere ad calamum. Non radicis (pergit Mundella) quoniam ipsius mentionem non fecit Diosc.

Alisius Mundella

Mat. in furam

Ad nos ap. portatur.

Plinius in placet.

Mundella ratiocinatur.

Diosc. in clarum.

*Expositio
de rebus
medicis
mundella.*

Diosc. Quæ est rationis huius necessitas? Non meminit radicis, ergo descriptio eius non est. Dic quæso Mundella, Quid aliis in locis describit Dioscorides, ubi nec plantæ foliorum nec radicis, aut aliarum ipsius partium meminit. Dic, quid describit capite de Costo? Reclamat tandem ipsa experientia verbis, quæ opponit, Radix non videtur rufa, non dissilit: Non constat Mundellæ, quomodo fistulæ araneæ plenæ existant. Reclamat, inquam, ipsa Amati experientia, dum scribit, Venetias portant, Calamis similem, album & subrusum, crebris geniculis, in assulas dissilientem, fistulosum, araneo albo plenum. Sed iam probatum est descriptionem non tantum Calami, verum & radicis esse. *Utrum* si Calamus aromaticus Officinarum Acorus genuinus est, ut Matthiolus & alij quidam affirmant, frustra hi omnes entia multiplicant, separantque à se invicem quod unum est. Diuersis siquidem capitibus, de Acoro & Calamo tanquam de diuersis tradunt.

*Matthioli
de rebus
medicis
mundella.*

Hoc tempore penitus ignotum scribitur, quod Calamus aromaticus, cuius Veteres meminerunt, Officinatum communis Calamus non sit, sed radix, neque præscriptis notis insignita, ut ex Manardo, lib. 6. Epist. 1. lib. 8. epist. 1. cuius rationes inuatuus Matth. etsi aliorum armis muniatur, feroci admodum aspectu, ea in Brasauolum tela contorquet, ut sibi ipsi Vulcanus videatur: magno enim errore Brasauolum duci, satis palam esse supponit: quod tam facile sibi persuaserit, legitimum odoratum Calamum, illam esse radicem, quæ temerè omnibus in seplasis illius vicem explet, cuius opera si interisissent, quis non miscellum hunc Brasauolum cachinnis irritaret? hem quis non admiraretur tot contradictiones? tot lapsus? tantam inscitiam? tot gratia crimina? quæ tamen ab astuto hoc homine, eius sententias peruertere, corruptis verbis, diminutis clausulis, ei falsò adscribuntur: ut per Iovem lapideum iurare cogat, (inquit Apollo) me suis lineis depictum Matthiolum, vobis planè indicaturum: ita enim scribit Brasauolus, decimus agitur annus, quod Venetias verus Calamus aromaticus assertur, qui Calamus est, & non radix, at communis aromaticus Calamus, qui passim venditur, radix est, & non Calamus, id verò de quo in præsentia loquar, Calamus est, & non radix, qui folia habet circuncirca in aliquibus Calamis, quæ nostrorum Calamorum foliis assimilantur, & nisi putassem Galangam esse Acorum, non potuissim, non arbitrari vulgarem Calamum aromaticum esse Acorum, & torrè radix hæc, quæ Calamus aromaticus vocatur, est odorati Calami radix: Calamus autem verus odoratus, in Officina Campanæ, Venetiis vendebatur. En igitur Studiosi quibus verbis peritos insectetur? quàm fideli sermone candidissimos laceret? quàm cum multo rixis, se vbique molestissimum, ac infestissimum exhibeat? hæc sunt argutie quibus prægrandem confarcinavit librum, solo lepore illos læscens, suisque obruens calumniis, non saliam ob causam, nisi ut doctissimis aduersari videretur, & quocunque modo in eos argumentum effunderet, hac importunitate excruciatet, tantum sibi arrogans, ut quæ non dixerunt, dixisse velit, quæ enim in eius sententiam pedibus non eunt, tergiuerfatur, si quis nodus incidit, statim transiit, velut angue conspecto, aut saltem lippis oculis intuetur: etsi clarissimo suorum scriptorum testimonio sanissimi ingenij

videatur, ut quum minime compertum haber dixisse Diosc. & Galenum Calo no aromatico aliquid inesse amaritudinis: quod vel Ruellij versionem quam se imitari pollicetur, in sui operis initio, paulò segnius perlegerit, vel in eam, & quid perperam ex Græco translaturum, ut sui mortis est, aliquid iniicere tenebatur, quod cum ali-quanta acrimonia amarum Calamum transtulerit: id quod Secobienſis Lacuna, Græcis, Latiniſque literis eruditissimis, qui Ruellium fide- lius restituit, corrupta loca refarcinavit, aucta im- minuit, mutata ad pristinum candorem reduxit, malè huic tributum amorem nò annorauit, etsi Marcellis quod ad amaritudinem pertinebat, se reliquisse asserat, quia in melioribus illa vox non legatur. Manardus etiam lib. 3. Epist. 2. pro- bans Calamum non esse Canellam, inter alias differentias enumerat, quod in ea canella non sit amaro, innuere calamo amaritudinem inesse, vò hinc Fuchſij sententiam improbare non possit, atque an communis illa radix, calami odorati propria sit, quæ amariuscule, necne, nullum est in hoc euidens argumentum, quod etsi Harundi- dinis trunculum, cacumini annexum non defe- rant: folia Iridis similia, harundinacea, quadan- tenus præ se ferunt, sicca potissimum, an verò Acorus sit, eo in capite discutiendum relinqui- mus: hic tamen præterire non possumus Amati auctoritatem, ne dicam ambitionem, aut insolentiam, qua calamus aromaticum Officinarum Diosc. legitimum, suis notis repræsentare non ambigit, potius, ut credimus, somniando, quàm sensuum libertate, tam absurda proferendo: nec Matthiolum contraria astruentem, hoc est, cala- mum aromaticum harundinem, siue calamum, non radicem esse debere, deceptum asserere ve- reretur: quod licet Theophrastæ Plinius in cala- mo odorato calamum, & non radicem, laudare videantur, alibi tamen radices cæteris partibus anteferunt, idque ex Plinio manifestè percipi, lib. 24. cap. 11. quum odorati calami facultates e- numerans, inquit: Efficacissima autem in omni harundine, quæ proxima radici, efficacia & ge- nicula, ex quibus in omni Calamo radicem effi- caciorem esse partem contendit: id quod si Pli- nius intellexerit, vel ipsi pedagoguli diiudicent: Quis enim etiamnum mediocri ingenij ita ar- guerit? Plinius proximas in Harundine radici partes aliis præfert: ergo radix efficacior est pars? Quisiam etiam ex palliotenus Medicis, qui stultissimum hoc arguendi genus non exclu- dat? qui in te vulgarissima illum excutire non de- prehendat, qui inquam dum sitim sedare cupit, sitim alteram crescere non videat, ut quantò plus biberint, tantò magis sitiant Parthi: quum scilicet huiusmodi radix, quæ in multa segmen- ta nunquam assulosè frangitur, non fistula ara- neo velo simile quicquam occultente, quæ qui- dem Harundini debentur, non radici, sit saltem Calami aromatici radix: cuius nulla est ab Ama- to probatio: tot autem oculati testes ex Manar- do, ac Matthiolo contrarium asseuerantes, tot ab his rationes, quas hic rursus inculcare, ope- ra pretium non est, ut quum Brasauolum huic suo opinioni assentire testatur, secus quàm ipse di- ceret, ut supra: quum Diosc. calamum odoratum, non radicem, sed Calamum esse debere, scri- ptis mandauerit, quumque calamos equiseti, ora- minis, ac aliorum geniculatos reddiderit Diosc. non est quod radici proprium esse geniculatum, Calami autem nodis cinctum asserere debeat:

*Fuchſij
epist.*

*Amati
curp.*

*Calamus
est & non
radix.*

*Matthioli
quædam.*

quum autem calami aromatici esse officinarum Schœnanthum arbitrantur Calopodium, qui in Melue scripsere, nec illorum perniti opinionem, qui radicem calami aromatici vice ac ceptam, legitime calami radicem statuunt, quam magno implicant errore, non animaduertunt. Siquidē Schœnanthi Officinarum radices tradit capillorum modo, tenues, huius vero adulterini calami radices crasse sunt, & effatu dignae: propterea Schœnanthi radices esse non possunt, & per consequens: si Schœnanthum vulgare calamis est aromaticus, hæc radices non erunt calami odorati radices: quumque in assulas non dissiliat Schœnanthum id, non fiduum sit, non in mandendo lentum, melius discant, ne rudere potius, quam erudire videantur: veri tamen calami loco, radicē hoc nomine vtitam substituere malo, etiamsi Acorus sit, quæ multas calami qualitates obtinet, quàm Sparganium, latinis muscus arboreus, Officinarum vinca: & si Auic. cap. de musco, pro quo Thaleb reposuit Bellunensis, muscum fluuiatilem, aqueum, terreum, petrosam, maritimum complectatur, & cap. de Vinca arboreum videatur distinguere, aperta separatorum nominum & capitum confusione. Galen. verò ac Paulus in suis succedaneis, pro calamo sparganium cum Mathiolo supponant: hæc enim in alienam melle mittere creduntur, doctorum omnium iudicio, quod plura his ignota inserant, aut facultatibus dissimilia suggerant, ut Myrtum pro Cardamomo, &c. quorum est sylua: muscus verò arboreus, hypnos etiam vocat, hoc est villosa illa canicies arborum caudicibus adherens, multiplex est, ut suo ostendetur loco.

De hisce satis, vela retrahamus: vocatur græcè *καλαμὸς ἀρωματικός*, id est, *aromaticus*, h. e. clar. Calamus aromaticus, odoratus & unguentarius. Arab. ut Serap. Masabel derire: *Alfaharino*, *Alferira*. Bellunensi *Alderire*, *Aldarira*, & *Chafab darirbe*: item *Caratis* & *Caratim*. Germ. *Woltrichende wurtzriede* / *Woltrichende Kopr*. It. & Hisp. *Calamo aromatico*.

Præter calamum aromaticum quorundam Indicium & verum, sunt & aliæ plantæ, quibus calami aromatici nomen attribuitur.

Calamum odoratum Matthioli pingit, & ex eo Lacuna. Lonic. Acoſta, Durantes, Hist. Lugd. Tabern. & Gerardus, Calamum aromaticum nominantes, qui nihil aliud est quàm figmentum, nihil differens ab Arundine hortensi huc satius.

Malè in officinis calami aromatici nomine Acorum, de quo suo loco, venale proſtat.

Cassabusi Bellonius cum vulgo Pharmacopolarum Constantinopolitanorum calamum aromaticum esse opinatur, sed Qualebeni quidè & Matthioli iudicio, absurdissimè. Sunt enim calami lapidei: non verò cuiusdam plantæ.

Schœnantos quibusdam idem est cum calamo aromatico. Quare Colleg. Florent. huius loco Schœnanthon supponit. Idem & Borgar.

Opinio Marcelli dicentis calamum aromaticum esse Canellam, merito tanquam erronea damnatur ab Acoſta.

Notat idem Acoſta quosdā calamum aromaticum cum Galanga confundere. Et sanè constat Venetos pharmacoporos, Theriacam paraturos, calamo Galangam substituere.

Ancidotarium Romanum calami odorati veri loco Angelicæ radices, sed in minori quantitate commendat.


Calami aromatici nomine Argentoratenses hortulanæ venditare solent Phu maius & nobile: vide Tragum.

Plura de calami aromatici substitutis dicta ante, ubi Apollinis verba adscripsimus.

De calami aromatici viribus hæc Dioscorides scripsit: nascitur in India. Est autem optimus, qui fulvus (*κίττος*. Aet. *κίττος*) est, & frequentibus geniculis præditus, & qui assulose in multa segmenta diffingitur, fistula araneis plena (*αράχνης*. Plenam habens araneorum fistulam, Sarrac. Malè araneorum: oportet enim vertere telæ aranæ, aut re simili telæ aranæ, *Palinas* Salodiani.) subalbidus (*αλβιδος*. legendum *αρωματικός* Pal. Salod.) In commanducando verò viscosus (*κόλλος* leg. *κόλλος* Pal. Salod.) adstringens, subacris (*πικρὸς* Orbi. amarus, Ruell.) Potus urinam mouere potest. Vnde cum Gramine, aut Apii semine decoctus & potus hydropicis, nephriticis, urinæ stillicidiis, & ruptis conuenit. Ducit etiam menses & appositus & potus. Tussis quoque sanat suffitus per se ipsum, & cum resina terebinthina, si fumus per fistulam ore attrahatur. Decoquitur (*ἀπὸ λήθης*. Pal. *ἀπὸ λήθης*) etiam ad infusus muliebres, & ad uteri collusiones (vet. caret verbis, *ἡ ἰατρικὴ μαρτυρεῖται*.) Miscetur & malagmatis, & in suffitus, iucundi odoris gratia. Calamus odoratus, *arbor Galeno*, leuiculam quandam adstrictionem ac minimam acrimoniam possidet: magna ex parte essentia eius terrena est & aërea, in caliditatis frigiditatisque conjugatione temperata. Quomobrem moderatè urinam mouet, & facultatibus quæ iccori stomachoque imponuntur, misceri potest: tum in fomenta quoque vteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis mensibus assumitur, vtiliter admiscetur. Ponatur itaque habeaturque secundi ordinis eorum quæ excalefaciunt. Inest quoque ei quædam partium tenuitas, velut aliis omnibus odoratis siue aromatibus. Ceterum illorum compluribus tenuium partium plurimum, calamo verò non multum adest.

CALAMVS AROMATICVS VERVS quibusdam.

C A P. CCXLVII.



Calamum aromaticum creditum à triginta iam annis asseruo, vegeto amaro, cum lentore quodam præditum, recte crassitudinis pennæ cygnæ, internodiis longiusculis articulis, rutilanti & spadiceo foris colore, aliàs buxo, subrus candicante, intrinsicè substantiâ sîgosa raroq. texturæ farctum: ad genicula singula, calami ex aduerso

terfo sui pronascentur, ut calamo primario magnitudine cedentes, ita colore & compositione saporeque convenientes.

Similem calamum accepi anno 1598. ab insigni viro Io. Luzzio Ill. E. V. V. pharmacotheo. Alium sic descripsit Genser Cherlerus, Calami aromati. veri furculus, qui ad C. Bauhinum Argentina missus bicubitalis erat, Betulae instar ramosus, in cuius altera biuaticatione folium, vel potius folij fragmentum, nullo pediculo, sed principio angustiore haeret, vnciale, tribus nervis insignibus donatum, facie folij Indi, aut potius Plantaginis quinque-nervix, vnciae quadrantem latum.

Pinguis in nostra tabella calamum vnum cum radice ex Clusij, Garcia: secundum & tertium, cui rami ex sicca planta.

An Cordo in Diosc. Calamus aromaticus verus aliquoties in pharmacopoliis inter Squinanthi stipulas & spicam Indicam innotuit?

An Qualeeb. luncus odoratus Matthioli, mira acrimonia linguam gustantis mordicans, nihilque ramentum, praeter amatoris plurimum, inter gustandum derelinquens?

Lobel. in hist. Belg. pag. 75. in icon. Plant. pag. 54. sub titulo Calami odorati Libani, & calami aromatici ex Alepo missi, wolriechender Rierte figuram habet, quae eiusdem plantae, cum ea quam descripsimus, videtur.

De calamo suo odorato Libani in Obs. p. 10. haec scribit. Memini me vidisse Venetiis ad Angeli Symboli Calami aromaticum, quem Alepi Syriae Sequinus Martinellus doctus & industrius pharmacopaeus, forte delatum ex lacu inter Libanum & illum ignobilem montem Plinio memoratum miserat. Arundo erat geniculata, nitida, crassitudine paruum digitum aequans: color fulvus, ni labat memoria, saturior, odoratus, parum lentus, in mandendo, subacris & amarus. Iacobus Vrenhouius generosus Gandavensis, stirpium & artis Medicae peritissimus, calami aromatici doctores annulas araneorum telis plenas, fulvas, geniculatas, digiti minimi crassitudine, gustu plane aromatico, amaricante, Schoenantho praestantior, nactus est inter Schoenanthi festucas, quas Massiliam aduectas ex lacu Plinio memorato asserbant. Muleo maiores habuit praclarus vir Augerius D. de Bousbeke Flander Insulanus, Czaezar maiestatis Constantinopoli Legatus, stirpium exoticarum peritissimus.

Volunt nonnulli Calamum Officinarum esse Acorum Veterum: Ego autem (inquit Garcia) nullius opinioni addictus, libere dicam, quod sentio. Calamus aromaticus quo officinae in Lusitania videntur (aromaticum voco, non odoratum, ut plerique alij, quandoquidem aromadorem non significat, sed quod vulgo drogum vocant, neque etiam calamum odoratum scio, sed luncum duntaxat) idem est cum eo, qui in India magno est in usu cum viris, tum mulieribus & iumentis. Vocatur is in Guzarate Paz: in Decan, Bache: in Malabar, Pazabu: in Malayo, Dirimgu: in Persia, Heger: in Cuncam, quae est regio maritima, Varicam: Arabibus Cassib & Aldirra. Serapio lib. simpl. cap. 204. eum vocat Assabeldirra, sed corrupto vocabulo: omnes enim Arabes Medici cum Auicenna lib. 11. cap. 157. & 207. Cassab & Darirbe appellant. Idem autem sonat Cassab, quod Calamus, & Aldirra ex aromatibus: nam Dirire idem quod nobis aroma est. Quoniam vero Malayo incolae eius usum ab Arabibus qui ex Coraone erant, didicerunt, idcirco

corrupto nomine Dirimgu vocarunt. Ceterum non est odoratus, nisi e terra auulsus: quantoque viciore est, tanto mihi validioris, terriorisque odoris videtur, tamen aliud sentiat Ruellius. Porro quoniam Hippocrates & Galenus i. simpl. Indicam hunc calamum vnguentarium appellant. Plutarchus vero calamum Arabicum, & Cornelius Celsus calamum Alexandrinum: videtur etiam extra Indiam nasci. Ego, ut veritatem elicerem, sciscitatus sum a multis Coraone incolis & Arabibus, si apud eos nasceretur calamus: item an esset eis cognitus, eoque viceretur: Negarunt omnes apud se inueniri, nisi ab Indis aduectum mercimonij gratia, probeque sibi cognitum, utpote cuius plurimus apud eos esset usus. Non falluntur tamen, qui Arabicum vocant, nam ex India in Arabiam deferretur, & inde in alias regiones: neque qui Alexandrinum appellant, quoniam hunc Alexandriam, deinde Barut & Tripolim Syriae deferretur. Quod autem Manardus lib. 8. epist. 1. dicit in Pannonia se vidisse adeo recentem, ut non longe peritus videretur, fieri potest ut fallatur: aut si videris, satum forte in sporta, aut fictili vidit. Sed illud certissimum est, hunc aucti Calamum in eas regiones. Is vero, quo utimur, radix non est (pusilla etenim est radix) sed ipsius calami cum aliquantula interdum radice parte fragmentum. Hallucinatur ergo qui nihil nisi radicem esse scribunt, confirmandae suae sententiae causa, qua contendunt hunc calamum Acorum esse. Neque quod in Calamo est spongiosum & flauetcente colore, aliqua in re simile est araneorum telis, ut falsè putarunt Auicenna lib. 11. cap. 157. & Serapio simpl. cap. 204. quos Graecis & Latinis haec melius nosse oportebat. Denique quod calamus Acorum non sit, nec etiam Galanga, satis ex Auicenna & Serapione probari potest, qui tria distincta capita de Calamo, Acoro & Galanga scribunt. Praeterea qui Calamum describunt, aiunt eum in India nasci, quod verum est: nec enim in alia regione nascitur, Acorum vero non nisi in Europa nasci tradunt. Adhuc Calamus pallet, acris, calidus & siccus est in secundo ordine: Acorum, albet, amarum, calidumque & siccum est ordine tertio: Galanga autem utroque calidior & odoratior. Denique calamus & Acorum cerebri & nervorum morbis conueniunt. Galanga vero ventriculum roborat, flatum discedit, & oris halitum commendat. Galanga item & Calamus medicamenta sunt in hac regione ab initio cognita, & in Occidentem veli solita. Haec usque Garcia.

Sed quam erudite notat Clusius, dicens: Notarum officinarum calamus longe alius est ab eo, quem hic satis obscure describit Garcia, quippe cuius Calamus legitimus videatur a Veteribus descriptus. Noster vero nihil nisi radix est, cum aliquantula interdum foliorum particula. Cui cum omnes notae a Veteribus descriptae pulcherrime conueniant: Manardi & aliorum sententiam improbare non possum, qui Acorum legitimum esse volunt. Eo & Germani, & Itali, & Galli videntur, alij neque calamum non norunt. Solebat enim Antuerpiani Vlysiopone aduecti calami genus vsuali nostro simillimum, sed terri odoris & saporis horridi: quae nota illis communis erat cum calamo Garciae descripto: solam tamen hanc ob causam in usu apud nos esse desuit, licet omnes aromatarij multo efficacius eo, quo nunc utimur, fuisse assument. Ceterum, cum tertio recudenda esset Garciae historia, innotuit legitimus Calamus aromaticus, quem Paludanij

Contra
Ruellius

Calam. vnguentarium
Hipp. &
Gal.
Cal. Arabicum
Celsi, Plin.
Alexandri
no Celsi

In Arabia
non inueniuntur

Manardus

Radix non est

Auicenna
& Serapio
non capiunt

Acorum
non est nec
etiam Galanga

Garcia
Clusio notat

ex Syria & Aegypto redux communicauit, qui exactissime ad Dioscoridis descriptionem quadrare videtur. Umbellifera vero potius planta, quam harundinacea meo iudicio censenda est: etenim rectū habet caule, multis nodis, seu geniculis cinctū, leuē alioqui, intus cōcauū, & membranulā, uti Harūdines, præditum, qui assulosē frangitur, estque satis odoratus, gratique saporis, amari tamen, & nonnullius adstrictionis particeps: folia (ut ex vestigiis colligere licet) bina ex aduerso singulis geniculis sita caulem amplecti videtur: radix summo capite nonnihil extuberat, deinde in fibras desinit. Vicefimo quinto porro anno postquam nobis communicasset calamum illum Paludanus, mittebat ad me Lugduno Allobrogū Ant. Colinius pharmacopœus, similis calami fragmenta, significās se eo vsum in Theriaca compositione: ea autem, licet simili prorsus formā essent cum illo, quod à Paludano accipiebam, magis tamen amari saporis deprehendebam, nec vllius adstrictionis prædita, quod forsitan alterius ætati adscribendum: Et hæc Clusius in Garziam. Ego quoque Garcie non notum fuisse calamum aromaticum vulgarem suspicor: qualis Vlyssiponēsis calamus fuerit nondum mihi constat: umbellifera planta cur potius dicatur quam harundinacea, nescio, quum notæ adscriptæ à Clusio melius cum harundinacea planta conueniant, quam cum umbellifera.

Clus. bot.
harum.

Acosta nov.

Acosta dum reprehendit Ruellium, Manardum & Monachos, non animaduertit calamum aromaticum vulgarem Europæis plerisque dictū (quem multi Acorum putant) longè diuersum à calamo aromatico Indico, quem Garcias describit, in quo malè etiam Acosta Garciam imitatus est.

C Bauh.
arom.

C. Bauh. phyt. *Arundo* i. siue odorata: *Calamus odoratus Libani* Lob. ic. Plant. pag. 34. *Calamus à Paludano Patavi exhibitus*: An calamus odoratus Matthioli? Sed quid quæso commune habere potest figmentum Matthioli, cum Calamo odorato Paludani? Matth. in lat. comm. editis anno 1559. sub inscriptione calami aromatici figuram habet quæ est pars figuræ pro Arundine positæ, & per consequens falsam & non factam ad vsum calamum aromaticum Paludani, vel similem. In comm. lat. cum mag. fig. editis anno 1583. & Ital. editis 1568. nouam habet figuram magis artificiosam, quæ etiam pars fuit Arundinis. Tabern. vel eius typographus Bassæus Matthioli postremum figmentum assumpsit, quæ est portio Arundinis quam domesticam cognominat. Prudenter & doctè Camer. in hist. germ. & Epir. Matthiol pro calamo aromatico, à Paludano delatū calamum figurā exhibuit: sicut etiam Clusius apud Garciam, & nos cum Clusio quem à Valerado Dourez accepimus: Est autem hic calamus omnino diuersus à Matthioli imaginarij Paludani verò calamum fuisse Libani, vix puto demonstrari posse, licet in ea opinione perseveret C. Bauhinus in pin. ubi inter calamum aromaticum Indicum, & Calamum aromaticum Syriacum, & calamum aromaticum Matthioli quæ fictitium suspicatur, ita distinguit: *Arundo odorata* i. siue *Calamus aromaticus*, est *ῥαῦδος* & *ῥαῦδος* *μυρσίνος*, Hipp. & Galeni *ῥαῦδος* *ῥαῦδος*, Theophrast. *ῥαῦδος* *ῥαῦδος*, Dioscor. Orib. Aegin. & Actii: *ῥαῦδος* *ῥαῦδος*, Dionysii de situ Orbis: *Calamus Arabicus* Plutarchi: *Cal. Alexandrinus*, Celsi: *Cal. odoratus*, Plinii, Hermol. & Ruellii: *Cal. aromaticus*, Manardi: *Cal. aromaticus* Cordi in Dioscor. Fuchsi: Guil. Garz.

Synonyma
Calamum
arom.
Indicum.

Lob. Obs. Clus. ad Garz. Acost. Cels. & in 4. part. Ind. Orient. fig. 19. & *Diringo Malays*, & *Derin* go par. 3. Ind. Or. 39. *Diringo* 4. part. Ind. Or. fig. 20.

Arundinis odoratæ 2. seu Calami aromatici Syriaci caulem seu potius caulis partem anno 1579. à D. Paludano ex Aegypto reduces Patavi accepimus. Verum cum totam plantam à D. Doldio habeamus, breuem eius descriptionem (cum ab aliis non proponatur) adiicere lubet. Ex radice inutili, trium, quatuorue vnciarum longa, summo capite nonnihil extuberante, & in paucas fibras desinente, *caulis*, [modò vnus, modò plures] ferè bicubitalis, rectus, rotundus, leuis, fragilis, multis geniculis distinctus, exurgit, qui intus cauus, spongiosus & membranulā, (quasi tela alba subrenita,) uti Harūdines, præditus, qui assulacim frangitur, & in plures ramos diuiditur, hique in tenuissimos subdividuntur, ad modum Ligustri Aegyptiaci Alpini, vel Lentisci Peruviani, siue *Melle* Clusii: qui flores paruos, foliaceos, plurimos, singulis tenuissimis pedicellis insidentes, sustinent, ex quorum medio apex styli instar prodit. *Folia* pauca, semper bina, ex aduerso ad singula genicula sita, caulem amplectuntur, vnciam lata, selquivnciam longa, nervis aliquot per longum excurrentibus. *Caulis* sapore est aromatico, valde amaro, quo in Theriaca pro calamo vtimur.

Calam. 2.
vnc.
Synonyma

Scribitur, teste Garciam, per vniuersam Indiam plurimus verò in Guzarate & Balaguare. Hic etiam Gor (ubi multus eius est vsum) in hortis satus provenit, sed perpauous. Conuehitur ad maritimam, quoniam qui isthic nascitur non sufficit. Qui ex Balaguare adfertur, ad Occidentem mittitur. Calamus aromaticus, autore Linschot. crescit etiam in Sunda Insula laux regionis Indiarum Orientalium. Magna copia Chineses emunt in Chinam portant.

Locum

Familiaris eius vsum [ita enim Garcias scriptum reliquit] est mulieribus in veteri affectibus, & nervorum doloribus. Sed maxime experitur hieme à mulomedicis: contusum enim, additis Alluis, Ammi (quod est Cuminum rusticum) talis momento, butyro & Saccharo, iumentis aduersus frigora manè exhibent, vocantque id medicamentum *Arata*.

Vit.

CALAMVS AROMATICVS CECHINI Martinelli.

CAP. CCXLVIII.

Non inuenit Cechinus Martinellus, apud Dioscor. nec Galenū calamum aromaticum fuisse Veteribus Cannam (siue Arundinem) licet Neotorici id cerè existiment, decepti Plinii opinione, qui dicit calamum, & luncum odoratum, non differre ab aliis calamis & luncis: addunt id indicare nomen calami nihil aliud significare quam Cannam: suo autem iudicio calamus Latinis diuersimodè potest intelligi: Dicebantur de tenui Canna [siue Arundine] ex qua Veteres sagittas faciebant, qualis erat mos Orientalium licet non sit Canna (id est Arundo caua) de qua Virg. eclog. 3. & vario vocabulo Ariostus dicitur etiam calamus de Canna cum qua scribebant Antiqui calami etiam dicebantur *Canella* siue Arundines) palustrium aquarum, quibus tegebantur recta domuncularum rusticorum, de quibus duobus Marti. in suis distichis: Metaphoricè pro

Non dicitur
runc
Cannam
Arundinem
esse Cannam

Calamum di-
uersa figurā
facit.
Arundo so-
lu.

Arundo
serpenti-
Arundo
palea.

pro stylo scriptorio sumpsit Virg. Eclog. 1.

Scribere qua vellem Calamo permisit agresti
Pro Calamo concauo ad fistulas qui dicitur Sy-
righa:

Eclog. 1.

Pan primus Calamos caraconiungere plures
Institat.

Sub nomine Calami comprehenditur virga cui
alligatur filum ad piscandum, & virgulæ quæ
visco illinuntur pro captura auium.

Interdum Calami dicuntur de paruis Cannis
frumenti, quæ sæpe vulgò dicuntur.

Sumitur etiam pro omni re conuoluta instar
Cannæ: communiter dicuntur Calami arborum
& vitis.

Canna quoque Zuechari vocatur Canna cum
tamen non sit, sed ei similis.

Paulus etiam calamum odoratum vocat corti-
cem. Alius bonus auctor ait Calamum aromati-
cum esse crassum corticem canum, cum enim
colligitur extrahitur lignum: unde desumpsit no-
men. Cechi. Martinellus pro 210 ait calamum vo-
cari, quæ ita geniculata prouenit, vt hic Cala-
mus, quod prolixè prosequitur, & apud ipsum vi-
dere est.

Calamus presentatus per Cechinum Marti-
nellum Aromaticum habeatur pro vero & legi-
timo calamo aromatico, ac in confectiõibus
Theriaca ac Mithridati ceterisque medicamen-
tis adhibeatur, & remoueantur succedanea. Sed
libellis contra Cechinum incerti auctoris obla-
tis pharmacopœis Mantuanis contrarium om-
nino sentit. Non inquit, inquit, & Græcè,
aut calamus Latine, aut calamo Toscanè, nullus e-
rit ista stultus qui aliud intelligat quam Cannam,
ita etiam Virgilius & Aristotus nihil aliud intel-
lexerunt &c. & quomodo potest esse canna quæ
non sit canna &c.

ARVENDO SACCHARINA, ET SAC- CHARUM.

CAPVT CXXIX.



plantas vi lectur Saccharatus Calamus. Septenum
octonumve pedum Calamus, pollere crassiores
dentis geniculis, fungosa, perquam dulci, succu-
lentæque & albidâ medullâ obfatus promit.

Tom. II.

Folia binos cubitos æquant, angustiora tamen.
Donacis (siue Arundinis latius) scabra, & se-
cundum longitudinem striata, numerosa: Stolonibus
harundinibus ceteris concolores complectentia.
Comoso flore & quadantenus Sorghi. Radix ad
Cannæ radicem accedit, sed dulcior, succulen-
tior, minusque lignosa: unde germinula erum-
pant sationi opportuna.

Zēxaxoy, genus Mellis (υδιστ@) concreti in
India & Felici Arabia in Arundinibus (32) 33) κα-
λῆμα] inueniri prodit Dioscorides: Salis modo
coactum, dentibus vt sal fragile.

Galen. si npl. Sacchar appellat, & ex India ac
felici Arabia asseri quoque scribit, & in arun-
dinibus concretere. Esse autem & ipsum Mellis
genus, & minus quidem dulce, quam nostrum.

Archigenes ait, Sal Indum esse, colore & con-
sistentia Salis communis, gustu Mellis, magnitu-
dinis Lentis, & aut ad summum Fabæ, & ad.

Saccharon & Plinius Arabiam ferre dicit, sed
laudatius Indiam. Esse autem Mel (Mel Arundi-
num Indiarum vocat Theophr. Arist. & Strabo.)
in Arundinibus collectum, gummi modo candi-
dum, dentibus fragile, amplius, ac Nucis Auel-
lantæ magnitudine, ad medicinæ tantum usum.

Inueniuntur (inquit Seneca) in India Can-
næ, quarum humor pinguis, dulcisve in mel abit.
Quoniam vero non apud pensum mel hoc est, sed
plantæ excrementum, liquet inde etiam Anti-
quis notum fuisse Saccharum.

Cetera, quæ de Saccharo Veteres scriptis man-
dauere, inter vires compèrientur.

Hermolaus ex Neotericeis perhibet Saccharum
ex Alexandria Egypti & Cypro adferri com-
mendatissimum: Saccharum Græcos vocare Sac-
char.

Manardus astruit nouam opinionem, aliud
scilicet esse antiquorum Medicorum Saccharum,
ab eo quod nunc voce parum (vt fieri solet) mu-
tata, Zuecharum vocatur.

Cornarius, qui Saccharum idem cum Zuecha-
rò esse credit, nouisse perhibet Veteres, à Diosc.
& Plinij seculo, Saccharon, sed concretum qui-
dem, nec ex Cannis expressum veluti hodie ad-
feratur magna ex parte, in pyramides siue metas,
octo plus minusue librarum coactum.

Manardus & eum sequutus Fuchsius hunc in
modum in Matthiolo refutantur. Non desunt
inter recentiores Medicos, qui disputent, an Sac-
charum, quod sub mellis genere scripserunt Ve-
teres, præsertim Dioscorides, & Galenus in In-
dia, & felici Arabia nasci, idem cum nostrate
Saccharo dici possit. Et quamuis plerique repe-
riantur, qui dubio procul existiment, ac pro certo
assistent, communis usus Saccharum, & quod
ab Antiquis describitur, vnum eundem esse, quod
ex eadem proueniat planta, tamen Manardus
Ferrariensis, & Leonardus Fuchsius ipsum soci-
tus, maximam inter ea ponunt differentiam, om-
nino opinantes in alio, Arundinum genere con-
creuisse Antiquorum Saccharum, de quo inter
Mellis genera scripserunt Dioscorides, & Galenus:
concretereque ad hanc diem usque ex celesti
rore, quemadmodum & id, quod mannâ voca-
mus: non autem in his arundinibus, & quibus in
aqua decoctis huiusce raris Saccharum in Ma-
derâ, Sicilia, Creta, Rhodo & Cypro insulis, ac
etiam in Egypto exprimitur: Quia in re eos vi-
ros alioqui doctissimos, planè hallucinatos, cre-
diderim, quod nullo, vt puto, auctorem probato-
rum testimonio ducti sibi persuaserint, Mannâ in
modum ex rore concretere Antiquorum Sac-

Saccharon
Dioscorides
Mellis.

Sacchar
Galenus.

Sal Indum.

Dioscorides
Plinius.

Mel arundinum
Theophrastus.

Canna
mellata.

Loos
in Hispania
laurea.

Saccharum
Antiquorum
diversum
nostratè
Manardus
Saccharum
nostratè
Veteribus
nomen
Cana.

Saccharum
considerat
rio
Matthiolo.

Manardus
et Fuchsius
opinione
probata.

charum solis ardore super Arundinum folia tam in India, quam in felici Arabia. Quippe quod nusquam repererim scripsisse Dioscoridem, Galenum, nec Veterum, vel Recentiorum quendam, concretescere Saccharum in Arundinum foliis, ex rore Solis seruore concreto, siue potius exiccato, quemadmodum in quibusdam arborum frondibus manna per se concretescit. Quo fit, ut mihi refellenda videatur eorum sententia. Nam si verum illud esset, ut ipsi imaginantur, non modo, non est credendum, sed ne cogitandum quidem, Dioscoridem, qui diligentissime simplicium medic. historias, literis, memorizque mandauit, silentio præterisse tam pulchrum & admirabile, scitumque dignum naturæ opus in Saccharo concretis. Nec minus id reticuisse Galenus naturæ operum maximus indagator, quemadmodum nec reticuit lib. de alim. facult. aërei mellis historiam quod nos mannam vocamus, quodque sua ætate in monte Libano, aliisque locis super arborum frondes reperitum scribit. Quamobrem magis veritati consonam videtur, ut dicamus, nil aliud Veteribus Saccharum extitisse, quam nostris Sacchari Arundinum lachryma, seu liquor, qui nimia succi copia aperto in latere calamo præbulæ ac gummi, exterius concreuerit. Huic nostræ opinioni subscribit Plinius, ex cuius verbis facile cognosci potest, quod non ex rore, ut Mannæ euenit, coalesceret Antiquorum Saccharum super arundinum folia, sed quod fractis calamis earum internodiis cohereret collachrymas, & quibus vulgate nostrum conficitur. Quandoquidem, hoc modo refertur, gummiæque omnes scilicet sui arboris cortice emanant. Alia præterea hæc accedit ratio, quæ (ut quidem arbitror) Mannardi ac Fuchsi sententiæ prorsus aduersatur. Nam quemadmodum in Apulia, & Calabria manna à Sole tacta, dum arborum inhaeret foliis, paucis temporis intervallo in auram euanescebat (ut libro primo diximus in mannæ mentione,) eadem sane ratione id Saccharo euenisset, si ex rore (ut ipsi contendunt) concretisset. Siquidem à Sole tactum, rarefactumque facile desiliisset in auram, nec gummiu modo concretisset. Eoque magis quod nusquam legerim in Diosc. nec Galeno Saccharum è foliis Arundinum colligi, sed in ipsis calamis concretum reperiri. Quod etiam testatur Strabo l. 15. Geographiæ, ubi aperte scribit, in India Arundinem mel sine apibus gignere: non autem quod ex rore in arundine fiat, ut quidam peruersæ, ignarique Medicus mecum contendere, atque etiam, ut suam mordicus teneret opinionem, Strabonis codicem corrumpere non est veritus. Præterea cum memoriz prodiderint Dioscorides, Galen. & Plinius, Antiquorum Saccharum durum esse, Salis modo coactum, album, dentibus fragile, ex his coniectare licet, è rore Saccharum nequaquam fieri. Quippe quoniam manna, quæ eodem modo è rore concretescit, sal minime refert, nec dentibus fragilis deprehenditur, sed potius mandentibus tenax, & Cere modo lætescens. Quare crediderim Antiquis Saccharum fuisse tenuiorem, ac præstantiorem illius partem in arundinis Sacchariferarum medulla, quæ per internodiorum fissuras exiens Solis calore concentrat, ut & Saccharum nostrum calore ignis arte concretescit, & addensatur. Quod cum accuratissime perpēdissent homines, liquorisque præstantiam agnouissent, à natura edocti hoc arte se facturos existimarunt. Neque id incassum attentasse videntur: quandoquidem Sacchari integros calamos assumentes, minutum que

incidentes, ignis calore tandem decoxerunt, donec vniuersus liquor, absumptæ igni aquæ, diu effervescentes in Saccharum Salis modo in vasis fundo concreuerit. Verum etsi Sacchari arte facti nihil meminerint Dioscorides, & Galenus: non desunt tamen qui dicant, hoc etiam ante eos factum esse, Solini auctoritate freri, qui in Indiæ palustribus arundinem ita crassam progigni ait, ut fillis internodiis lembi vice vestiret nauigantes, è cuius radicibus dulcem etiam exprimunt humorem ad mellis suauitatem. At qui liquorem hunc, qui ex harum Cannarum radicibus elicitur, Saccharum nostri vsus fuisse existimant, procul dubio falluntur, quod Indi non modo ex decoctis Cannarum, sed aliarum quoque arborum radicibus sibi potus parent, cum illius cæli, & Soli clementiæ, frequentissime sint plantarum radices quæ mellea dulcedine imbuuntur, ut Strabo testis est loco super citato, ubi sic inquit. Nullus annus in India inuenitur utroque tempore sine pluuia. Quapropter contingit annum, feracem esse, cum semper terra sit fecunda: fructus autem arboreos multos gigni, arborumque radices, præsertim magnarum Arundinum, & natura, & decoctione dulces esse, aqua à Solibus repsecta, tam cælesti, quam fluuiali. Adde quod ea, quæ apud alios & fructuum & succorum maturitas dicitur, apud illos concoctio est: quæ tantum ad dulcedinem operatur, quantum ea, quæ per ignem fit. Sententiæ nostræ Lucanus quoque suffragatur illud explicans, hoc carmine.

Quique bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Quin etiam Marcus Varro, qui eodem fere tempore claruit, his tribus versibus attestatur, dum inquit:

India non magna nimis arboris efficit Arund.

Illius & lentis premuntur radicibus humor.

Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Ex iis palam est, hos omnes de factitiis Indorum potionibus, quæ iis vini loco sunt, fuisse locutos: non autem quod ex illis Cannarum radicibus Saccharum aliquod pararetur. Quandoquidem & nos è Glycyrrhizæ radicibus, quæ & decoctis, pressisque siliquis, sicut & alii è dactylis, dulces elicimus succos ad variis vsus potiones: quemadmodum & Occidentales Indi è pluribus dulcibus arborum fructibus suos sibi parant potus. Sed non ob id dicendum hos liquores, quod mellis dulcedinem præstarent, mel, neque Saccharum. Nec mirum sane si Indici Arundines radicibus dulcissimum præbeant succum, non modo illæ magnæ: sed etiam quæ ibi nascuntur, nostris fortasse non multo grauiores, cum etiam nostrates recentes manna, quadatenus ori dulces sentiantur. Quod autem minores Arundines in India radicibus dulces præbeant potus, superioribus carminibus explicauit abunde Marcus Varro cui non magna nimis est arbor. In hoc tamen à Solino dissentit: cui arundines, quarum meminit, validissime sunt proceritatis. Hinc ergo eorum sententia explosenda videtur, qui credunt ex illarum magnarum arundinum radicibus, Saccharum nostro similis factitasse Indos, quod non quidem Saccharum, sed dulcis inde potus vini loco sibi conficiant. Sed ut suam opinionem auctoritatibus fulciret Manardus Ferrariensis, utque lucidius comprobaret Antiquorum Saccharum, perinde ac mannam, ex rore fieri lib. 9. epist. 5. Auicennam etiam admittit, quem sungen alius ubique reperit, ac reproba-

*Antiquorum
Saccharum*

*Factum
Sacchari*

tis, afferens, quod cum ipse huius fuerit senten-
 tia, vltimo capite lib. 2. Antiquorum Saccharum
 mannam vocauit. Quod manifeste declarat Zuc-
 charum *alhaser* apud Auicennam huiusce arboris
 esse mannam, vel gummi, non autem Græcorum
 Saccharum in calamis concretum. Illud in-
 super nostram comprobat sententiam, quod eodem
 loco addidit Auicenna, sic inquit. Et in Zucchato
 quidem *alhusar* est cum abstersione pauca stipicitas,
 & amaritudo. Siquidem austeritatis & amaritudinis,
 quæ in Antiquorum Saccharo fuerint, nusquam
 meminere Dioscorides, & Galenus: nec item quod
 conferret id pulmōni, & aquæ intercuti, vt paulo
 infra voluit Auicenna. Qui etsi dixerit deinde
 Zucchatum hoc oculorum morbis, pariterque renum,
 & vesicæ vitiis auxiliari: non tamen ob hoc dici potest,
 Zucchatum *alhaser* esse Antiquorum Saccharum.
 Sed recte quidem contra Manardi sententiam, Auicennæ
 testimonio (cū & ipse hoc in loco Auicennæ
 auctoritate nitatur) probari potest, quod
 Antiquorum Saccharum gummi modo collachrymans
 in arundinibus concreveret, non autem ex rore.
 Quippe quod is de Zucchato agens loco nuper
 citato, ibique Antiquorum Saccharum recensens,
 inquit: Assumptum sicut gummi ab harundine
 abstergit oculum. Quibus palam sit, Antiquorum
 Saccharum, perinde ac gummi, ab interiori
 medulla exterioris emanasse, ibique postmodum
 Solis ardoribus concreuisse. Verum enimvero
 quod *Alhaser* apud Arabes sui generis arbor sit,
 & ab harundine maxime differat, & quod eius
 Zucchatum, quamuis ab Auicenna manna dicatur,
 quod fortasse granulis concreverat mannae
 similibus, ex rore haudquaquam fiat, sed gummi
 modo ab arbore destillet, manifeste ostendit
 Serapio cap. de Saccharo his verbis. *Alhaser*
 habet lara folia & habet Zucchatum quod egreditur
 ab oculis ramorum suorum, & a locis foliorum
 eius, & colligunt de eo homines rem convenientem,
 & in Zucchato eius est amaritudo, & egrediuntur
 ab hac planta mala quædam, sicut testiculi camelorum,
 e quibus liquor quidam emanat adurens, stipitæque
 facultatis, ad cauteria peridoneus. Et lignum quidem
Alhaser est leue, crassum, rectum, pulchrumque, & idem
 assimilauerunt canilenarij in canilenis suis brachijs,
 & crura do ninarum ligno eius: *hæc Serapio*.
 Ex quibus facile & Manardum, & Fuchsiū, viros
 alioqui doctissimos, hac in re hallucinatos putauerim.
 Cæterum Fuchsius, vt probaret Antiquorum
 Saccharum è rosco cœli lucto in calamis concre-
 scere, vtque illud à nostrate diuersum ostenderet,
 dicit, quod cum nostri vsus Saccharum perinde
 ac mel, calidum repertiatur, sitimque facile
 concitet, Antiquorum Saccharum esse non potest,
 ed quod Galenus suæ ætatis Saccharum id effi-
 cere non prodiderit. Cuius tamen sententia (pace
 sua dixerim) experimento minime responderet:
 à quo non discedit Galenus lib. 7. simpl. medic.
 ex cuius verbis clarum est, quod cum Saccharum
 melle minus sit dulce, minus etiam calidum
 sit necesse est. Eaque propter asserit Galenus,
 Saccharum non perinde ac mel, sitim excitare:
 non tamen quod nulla ab eo sitis excitetur,
 vti Fuchsius interpretari videtur. Quin etiam
 idem Galenus lib. 8. cap. 4. meth. med. Saccharum
 inter ea connumerat, quæ febricitantibus
 exhiberi possunt. His igitur rationibus, & auctoritatibus
 adductus sum, vt certò crediderim Antiquorum
 Saccharum ab iisdem arundinibus emanare, à
 quibus vulgare nostrum exprimitur.

Tom. II.

sed hanc tantum inter se differentiam esse, quod
 à natura factum sit nostrate factitio longe tenuius.
 Ideoque Auicenna: Zucchatum (inquit) *tabarzed*
 frigidius est & subtilius. Hoc laudibus extulit
 Paulus, & post ipsum Auicenna Archigenis auctoritate
Sal Indum ipsum appellans, ad linguæ scabritiem,
 ariditatemque in acutissimis febribus. Sed eo nos
 hac ætate, caremus, quod amplius non asseratur:
 quanquam ego non ita pridem à viris fide dignis
 accepi, qui *Diu Thome insulam*, itemque Maderam
 lustrarunt, adhuc iis in locis Saccharum inueniri
 in arundinibus sacchariferis concretum (illi non
 dissimile quod arte fit, & candidum cognominatur)
 postquam ab illis spontè emanatit gummi modo.
 Quod autem aditri desierit, non aliud in causa esse
 existimamus, quam quod hodie paucum admodum
 proueniat. Siquidem Dioscoridis, & Galeni tempore
 quo ad nos copiosum conuehebatur, cū adhuc
 non innotuisset exprimendi ratio, necesse quidem
 erat, vt arundines Sacchari liquore prægnantes,
 cū annis compluribus adoleuissent, & faciem
 nunquam expecta essent, per se liquorem exuda-
 rent, veluti innumeris arboribus gummi, & resinæ
 emanant. Proinde non mirum, si eius à natura
 facti Antiquis fuerit vbertas. Sed postquam
 luci dulcedo, fulgentisque auri titis docuit homines
 artem modumque, quo Saccharum concilis,
 decoctis, pressisque arundinibus copiosius elicerent,
 factum est, vt Indi quotannis vniuersos inciderint
 calamos, ac iterum quotannis seuerint, Hinc
 igitur euenit, vt nullis remanentibus, quæ Saccharo
 plurimum annorum ætate turgent, naturæ
 impedita sit operatio, deperditumque hac de causa
 sit Antiquorum Saccharum. Cuius vice eo Recentiores
 vtuntur, quod Officinæ candidum cognominant,
 arte factum, pellucidum, Salis solitij modo,
 dentibusque fragile, vt Antiquorum Saccharum
 vndeque referat. Competit perinde ac illud,
 scabritiei linguæ, pectorisque asperitatis. Verum
 ad hæc id præstantius est, quod in fistilibus,
 vbi violaceum lulapium assuetur, æstate
 concreuit: ed quod violarum diluti facultate
 humectet, leniatque magis.

Lobel. in Ic. plant. pag. 49. inscribit Arundinem
 Saccharinam Indicā, ac de eius Saccharo in Aduer-
 sarij hæc scribit: Non Indico Saccharo hoste
 prima laus, tametsi ex India primum in ceteriorem
 Asiam, Rhodum, Cyprum, aliisque non paucis
 loca transmississent. Nam hodie Canarium &
 Maderense longè omnibus suauitate & candore
 excellit: quippe tametsi quod Genuam ac Massiliam
 ex India, Alexandria, & alijs Aphricæ emporijs,
 Liburnicis Venetias asportant, sæpius excoctum,
 candore marmoreo Canarium prouocari multò
 tamen suauitate & dulcedine gratissima superatur.
 Dum enim lixiulo illo acriore, quasi sapone
 ex calce parato, faculentioris, nigriorisque
 pinguedinis sordes eluuntur & abstergantur,
 vber dulcedinis gratioris perit, atque nescio quid
 rancidæ acrimoniæ inurit: vnde bilis gignitur,
 & sanguis vritur, caput grauatur. Quod quilibet
 nosse potest ex esu vsuque *Thomei, rubri* vocati,
Sacchari, ex cognomine Insulæ, sub ipso ferinæ
 Equatore sitæ. Antuerpiam enim & Londinum
 Angliæ, vbi defecare solent quidam industrij
 artifices, si gustes adhuc impurum & rubrum,
 multò suauius & dulcius reperias, quam excoctum,
 lixiuæque & cortinas expertum. Et quia, quæ
 purius reddant industriam, cœlant Pharmacopœorum
 plebem: lubitum est hic monere. In Cortinam
 seu ahenum, Sacchari *Thomei*, vel alterius quantum
 voluit, immittunt. Lixiuij fortis sola ex cal-

ce vina parati, iustum modum, & quod ebullitioni despumationique suffecturum sit, affundunt: tum agitatione, scopulisque spumas tumidas multorum albuminum ouorum sensim affundunt, vicissim despumando, & rursus instillando, donec situlam plenam mellea & sordidioris pinguedine, despumando exemerint. Tunc probe limpida & fulua factum syrupum, lixiuio nondum absumpto, transmittunt per cilicium, colum, vel stamen, quo inibi festucas, quiskuliasque relinquat. Tum feruet denuo, donec expirarit in vaporem lixiuio. Quod si (ut ferè sit) feruens Saccharum impetu, artifice inuito, labrum effusiones & ebullitione superet, non aquam, nam sic [ut illi loquuntur] decoqueretur, & crudesceret: sed butyri momentum illico addunt, atque actutum resistent vndantes spumæ. Iam è Syrapo ad duritiem excocto Saccharo, infundibula, figlinae vasa, (Veneti ænea) quibus subrus in angustiore loco inest foraminulū, prius fontanā imbuta, Saccharo adhuc calente opplēt, eodem oburato foraminulo: recluduntque promo, cella, aut Hypocausto siccioris, tepidioris cūque induruerit, Meræ ordine disposuit latiore in basin inducunt, luto ex figlina fultæ aut pulla terra & aqua calida subacto dilutione, ac loriceam latam duorum, triumve digitorum. Quæ crulla ubi parum loci, partim Sacchari tepore sicco & bibaci aruerit, demitur, noua apponitur: bis terue repetunt: sed singula in mutatione fusi mucronem in foraminulum mittunt, ut facilius effluat crassamentum pinguius, & sordidius, quod Syrupum vulgè vocant, Gallis Melasse, qua quidem improbiore pharnacarii, suos stercoreos Syrupos condunt. Postremo bis aut tertio ex Metis eruzum fontana liquefaciunt: tumque in Metas infuso, referant subrus foramen, supernæque lutum addunt, cuiusmodi diximus. Notum fuit Saccharum Antiquis etiam Diosc. & Galeno antiquiori Theophr. huiusque præceptore philosopho. Paulus recesset inter Sales. Prius è Græcis Actuarius, Medicatos succos Saccharo exsepisse, nomēq, Iosacchari, Rhodosacchari commentus fuisse putatur. Varro & Strabo etiam ex radicibus succum promi suauissimum tradunt.

Tabern. vocat Arundinem saccharinam, & Calamum saccharinum, germ. Zuckerrohr / & Zuckerriedr. De Saccharo autem cuiusque speciebus hæc tradit: Veteres utebantur tantum Saccharo sponte effluente, erat eis ignota parandi ratio per decoctionem. Inter Græcos Medicos qui docuere cōdire cum Saccharo loco Mellis est Actuarius, deinde Nicolaus Alexandrinus. Arundo Saccharina dicitur etiam Harundo & Canna. Succus dicitur *Σακχαρος*, Arriano. *Μελ*, *αγρίων*, Paulo Aegin. *αλ. ινδίας*. Mellis genus: Galeno, Paulo, Aphrodisio lib. 2. probl. cap. 74. & Straboni. Serap. lib. simpl. cap. 30. *Zachar*. aliis Arabibus *Sachar*, *Zachar*, *Sudur* & *Suher*, Polonicè *Guseer*. Nostro tempore sunt nobis 7. Sacchari genera. Primum genus ad nos adfertur ex Lusitania ex insula Madera aut Medera: dicitur Saccharum Maderiense: hoc cæteris omnibus præstantius & præferendum in usu Medico.

Saccharum 1. Canarium, aut Canariense, quod defertur ex insulis Canarinis: bonitate secundū obtinet locum. Saccharum 2. Finum, Refinatum & Valentinum dicitur, quia Valentia Hispaniæ repurgatum. Præticis & pharmacopæis hodiernis Saccharum *Tabaczerh*, quod nomen competit Maderiensi Saccharo, Arabes enim per *Tabaczerh*

intelligunt optimum Saccharum. Saccharum Valentinum arte fit ex Maderiensi & Canarino, itaque repurgatur, ut acquirat similitudinem Marioris albi aut Alabastris, & ob suam pulchritudinem existimatur præcedentibus duobus præstantius: verum cum per lixiuio. ita præparatum sit, meritò ab usu medico reiciendum, per lixiuio. n. acquirit acrimoniam, aliquomodo amittit dulcedinem, acquirit aliam naturam & proprietatem, sitim excitat & valdè exsiccatur: caueant Pharmacopæi ab huius Sacchari usu in præparandis Tabellis quæ dicuntur Manus Christi & aliis, ac etiam in aliis medicamentis. Ex hoc Saccharo parant paruas Metas pyramidesve, quas inuoluunt papyro corulea. Quum vulgè sit persuasum melius Saccharum inuolui charta corulea: mercatores Saccharum vilissimum Thomassinum lixiuio dealbant & repurgant & candidius reddunt, verum semper molle remanet, nec ritè induratur: & quò candidius est eò plus habet Amili, quo adulterant hoc Saccharum dum repurgant, & parant pyramides libram ponderantes.

Saccharum 4. defertur ex insula Maltha, Saccharum est durum ut Canarium, sed magis cinereum, tertium bonitate locum obtinet, præferendum Valentino, eius usus in cibo, vocatur Saccharum Maltanum, Melismum aut Melitæum & cibale. Germ. *Malis zucker* aut *Sprußzucker*.

Saccharum 5. ex insula S. Thomæ, est omnium vilissimum, molle est & rufum, dulcius tamen Valentino & salubrius: vocatur Saccharum Thomassinum, Thomæum, præticis & pharmacopæis rubrum, Arabibus *Zuchharum Sadimenum*. Germ. *Thomæzucker*.

Saccharum 6. Miscellaneum dicitur, Germ. *Sarinzucker* / *Cassanzucker* / compositum est ex fragmentis omnium generum Sacchari, tam albi, quam rufi: defertur in doliis & capsis ad nundinas, eius usus ad Syrupos & cibos.

Saccharum 7. est liquidum instar Mellis aut Syrupi, defertur ex insulis ubi Saccharum coquitur & in metas reducitur: fit ex spuma Sacchari dum coquitur, semper manet liquidum, adfertur in doliis, satis vali venditur, ad multa vile esset loco Mellis, quia viliori pretio venditur, quam Mel, si non timenda esset impostura: dicitur *Remel*, *Mel Saccharinum*, aut *Sacchareum*: Gall. *Melasse*, Belg. *Syrôp* / Germ. *Zuckerhonig vndt Syrup*. Multi volunt vulgare Saccharum non esse Dioscor. & Galeni inter quos Manardus & alii qui cum secuti: verum qui diligenter considerabit Antiquorum scripæ, comperiet Antiquorum & nostrum Saccharum esse ex eadem plâta, nempe ex depicta Arundine, & præparatione tantum differre: Duo autem genera fuerunt Antiquis nota, primum de quo Diosc. Plinius & Galenus: quod erumpit vi Solis ob copiam succi, quo vsi sunt Veteres tantum in medicina, quod non adfertur amplius, sed eius loco substituit Saccharum Candit, quod arte præparatum ex Arundinibus iisdem ex quibus Veteres collegerunt suum Saccharum. Aliud Saccharum Veterum, quod parâtes, ex recentibus radicibus Arundinis Sacchareæ exprimebât, & crebatur eo modo quo vitur Melle, inde dictum *Mel Canna*, quod ex Aegypto, Rhodo, Cypro, Creta & Silicia olim afferebatur, quanquam non esset in medico usu ante Actuarii tempora, nihilominus Galeno non fuit incognitum, meminit enim lib. 4. simpl. Arundinum dulcium quæ in Aegypto proueniunt: quomodo fuisset Galeno incognitum Sacchari liquidum.

*Arundo
sacchar.
Cal. sac-
charinum.
Tab.*

*Saccharum
2. Maderi-
se.*

*Sacch. 3.
Canarium.*

*Sacch. 3.
Valentinum.*

*Sacchari
Valentinum
præparat.*

*Sacch. 4.
Maltanum.*

*Sacch. Tho-
massinum ra-
brum.*

*Zuch. Sa-
dimenum.*

*Sacch. mis-
cellaneum.*

*Sacch. 7.
Mel Sac-
charinum.*

liquidum, quandoquidem vulgare fuit diu ante Galeni tempora, ut apparet ex Marco Varrone, qui eius meminit, is vixit tempore Cæsaris, ante Adventum Christi, Statius meminit etiam Sacchari arundinacei: Lucanus Poeta meminit etiam Sacchari molliis. Strabo meminit vtriusque. Scribit etiam Solinus de iucco expresso ex radicibus Arundinis.

Synon:

Arundinis saccharinæ hæc sunt Synonyma nota. Dicitur C. Bauh. in pin. *Arundo Indica* 2. vel *Saccharifera*: *Arundo* 8. vel *saccharata*, Dod. gall. *Arundo ex qua Saccharum*, Cord. in hist. *Arund. saccharata Dalech.* in Diosc. *Sacchari Canna*, Gesn. hort. *Arundo Saccharina Indica*, Adu. Lob. Icon. H. Lugd. *Canna mellea*, Cæf. *Arundo & Calamus Saccharinus*, Tab. *Calamus Indicus*, par. 6. Ind. Or. c. 19. *Calamus Indicus Saccharites*, & *canna Saccharina*, in hist. Ind. Orient. part. 4. 5. & 6. cap. 38. & Hist. Occid. Ind. part. 3. 4. 8. & 9. De Sacchari differentiis & conficiendi modo, in nostris in Matthiolum notis, & lib. de comp. medic. egimus: Vide & Munsteri Cosmograph. l. 2. c. 91.

Locus:

Loca in quibus Saccharum provenit præter supra allegata, hæc passim annotantur: Insula Maderæ, quæ Oceano Atlantico innatat è regione Mauritaniz: Insula Hispaniola: Insula S. Mariæ, Terra sancta, Vrbs felicitis Arabiz Zibith, Sumatra, Brasilia, & Regnum Concha. Ex Arundinibus in aqua decoctis huius ætatis Saccharum in Sicilia, Creta, Rhodo & Cypro Insulis, ac etiam in Ægypto exprimi refert Matthiolum. Arundo Saccharina in nostris regionibus, (inquit Tabern.) raro propter frigus perficit florem, eam Arundinem primò vidi Francofurti in horto Pharm. Adami Kecken qui per aliquot annos eam aluit, sed tandem asperiore hyeme ei periit: ex eius radicibus & medulla excoquitur Saccharum in India, Arabia, Ægypto, Canariis insulis, in Insula Madera, Malta, Cypro, Sicilia & S. Thomæ. Lobel. Orbi Europæo iam multis ad Mediterraneum Oceanumque tractibus inquilina: ut Hispanicis, Lusitaniz atque amœnissimis Olibæ in Galloprovincia viretis, non procul & ex Adverso Stæchadibus insulis, quem virentem inibi & alibi habuimus, & in Belgio meminimus. Panguntur taleæ inæ radici abscisse, atque bellè primò proficiunt in Gallia & Belgio, sed hyemis sænitia enecantur, humentis soli, sed tepidioris æris, & auræ alumnæ ac amassæ.

Vires & u.

fas.

Diosc.

Gall.

Tabern.

Diosc.

De viribus & vfu Sacchari ita Dioscorides, Saccharum alio est idoneum, & stomacho vtile, si aqua dilutum bibatur: vexata verò vesicæ renibusque auxiliatur: quin & illitum ea discutit, quæ pupillis tenebras offundunt Saccharum Indicum & ex Arabia felici confectum Galenus minùs suo dulce statuit, sed similes ei vires attribuit, quod ad abstergendum, deliceandum, & digerendum pertinet. Quatenus verò nec inimicum ventriculo est, nec sitim adferens, eatenus ab illo substantiâ differre scribit lib. 7. simpl. medic. Ast 8. meth. med. cap. 4. Saccharum inter ea connumerat, quæ febrientibus exhiberi possunt. Saccharum (teste Tabern.) temperatæ est naturæ, calidum & humidum in primo ordine, primariò quidem *Maderiense, Canarium, & Melissum*, & ad Mel quàm proximè accedit. Similiter & *Finum*, quod non ita dulce, igneam & acrem, ex lixivio calcis, quo præparatur, assumit qualitatem, quâ *Th. manum* etiam superat, ideoque sitim causat ingentem, ita ut ad internos vsus inutile reddatur, quamvis vulgus Medicorum (quoniam præ cæteris candidissimum sit) magno errore


Tom. II.

contrarium teneat, optimùmque esse diiudicem. Quapropter eligatur semper vel Maderiense, vel Canariense. Saccharo cibi austeri & acidi corriguntur: saliti nimium attemperantur: crassi, attenuantur: ingrati verò suaviore redduntur. Emendantur, ut paucis multa complectar, Saccharo omnia, quæ medium excessere in culina. Quid namque aciditare & acrimonia præcellit acetum. Attamen nihilominus hocce virtus eius infringitur. Nec Pharmacopœi sine hoc suo (ut vellet & continuò deberent) officio satisfacere queunt. Nunc enim Electuaria, Syrupos, Iulepos, potiones, vina, conseruas, condita, succos, ac omnis generis confectiones, tabulas, panes Martios, & cætera, Saccharum ingreditur. Nunc quantum requirit omne genus animalium, volucres cæli, pisces maris, & pecora & reptilia terræ, & si quæ alia excogitari possunt, quæ ex Saccharo quotidie efformantur, ac variis coloribus depinguntur. Nunc quantum semina & fructus, Pinci nuclej, amygdalæ, auellana, pistacea, Citreum, Cinnamomum, Coriandrum, Anisum, Fœniculum & similia, quæ eodem obducuntur. Quæ quidem ut plurimum luxui, nocturnis potationibus, intempestivis conviviis magis abdicantur, quàm salutaribus medicinis. Sed quid prosint, experiuntur Magnates, qui gravissimis morbis subitò nonnunquam corripiuntur, symptomatibus periculosis continuò vexantur, simulatque sæpissimè morte ipsa extinguuntur. De quibus qui in acie & præliis potatorum versantur, multò certius, quàm ij, qui in umbraculis, & extra sciphi iactum (ita dicere liceat) vitam degunt, testimonium reddere sciunt. Spontaneæ igitur lachrymæ sunt, quibus nobismet ipsis ventriculum, Heparque afficimus, ipsumque adeò totius corporis temperamentum subvertimus, vitamque ipsam ante deperdimus, quàm constantem ætatem attingimus. Hac ergo ratione media hæc à Deo Bonorum omnium autore ad vitam conservandam concessa, non media ad vitam, sed media ad mortem, efficiuntur.

Saccharum Maderiense moderatè in cibo & potu vsurpatum, purificat sanguinem, spiritus recreat, membra corroborat. Per se quoque, aut modo dicto, assumptum, ad vitia thoracis & pulmonum vtile. Proficuum arteriæ asperæ contra raucedinem. Commodum quoque internis apostematibus, lateris &c. thoracis ulceribus, Tussim sedat, ventrem emollit, præsertim verò infantum. Doloribus thoracis medetur. Biliosi & Ictერი, extra medicinam eunt Saccharum, id enim facillè in bilem mutatur. Adhæc obest omni vicio, quod à bile originem suam traxit. Infantes si plùs de Saccharo ingerant, lumbrici non raro in ijs gignuntur. His itaque non nisi urgente necessitate, aut saltem minùs administratur. Non assentiendum iis, qui existimant Saccharum intestinorum obstructionem parere, quandoquidem abstergit & mundificat. Salutare admodum est renium, vrinariorum meatuum, & vesicæ affectibus. Non tantam, ut mel, sitim excitat. Dentibus valdè nocuum. Non enim nigros duntaxat reddit, sed & putrescere, vacillare, atque excidere facit. Quare sibi consulunt ij, qui assumpto Saccharo, os aquâ frigidâ cluunt. Ex frigidâ quoque haustum, raucam emendat vocem, à calore ortam. Contra tussim siccam, sitim & asperitatem faucium: æ. Sacch. vnc. j. Aq. frigid. mensur. j. Decoq. ad consumpt. tertiæ partis. De hoc decocto bibe quantum lubet. Si præstantius delide-

Yy 3

HISTORIAE PLANTARVM




Synonyma

niculatâ & fibrosa, iunci plures, tennes, palmum superantes, exurgunt, qui in summo in tres, rarius quatuor, stylos, tenuissimos, trium, quatuorve vnciatum, diuiduntur, in quorum summitatibus, post iunci diuisionem, paniculae paruae locatae sunt. In pin. est iuncus acuminatus reflexus, seu minor, vel trifidus.

Locus. In monte Fractio Lucernatum, in Pyrenaeis & montibus Morauiae prouenit.

IVNCVS MAXIMVS HOLOSCHOENOS. CAP. CCXXXI.

Descriptio



Nodos & stylos omnium altissimos & crassissimos prouit, medulla punicea & exigua: citra quorum fastigia e latere erumpunt paniculae sparsae, e capitulis turbinatis, magnis, squamatis, indurcatimque compactis, rufis, contextae, pediculis nunc longioribus, nunc

breuioribus & ferè nullis: semen in squammas delitescit triquetrum.


Synonyma. Tragus licet iuncum maiorem palustrem, germ. gross. weyer Bingen vocet, tamen Harundinis porius genus, quam iunci existimat, indeque piscatoriam Abaritanam dicendam astringat. Videtur alibi etiam iuncum, Plinio Mariscum dictum, appellare. Ego autem non video quomodo ad Arundinem referri possit.

Locus. C. Bauhin. phyt. iuncus 5. Eid. pin. iuncus lenis 2. iuncus maximus, siue Scirpus maior, Mariscus Plinii: iuncus palustris maior, Tragi & Tabern. iuncus grandis, Holoschoenus Gesn. cat. & Dod. (cui & iuncus 4. magnus in hist. gall. in lat. iuncus 1.) Scirpus, iuncus 1. species, Lac. iuncus 3. holoschoenus Anguill. & Cast. iuncus & Scirpus, Lon. iuncus aquat. maximus, Lobel. Adu. & Ic. pag. 85. itemque Gerardo. iuncus lenis aquaticus maximus, Thallio: iuncus rotundus 3. Cael. Inn-

cus lenis Ger. icon. holoschoenus, H. Lugd. p. 987. Montspeli in lacubus: Basilez & Montbelgar-di in Vitis fossis prouenit. Gaudet enim locis humidioribus, aquas crebro aut semper habetibus.

IVNCVS PARVVS CVM PERI- carpiis rotundis.

CAP. CCXXXII.



Descriptio. Palmares saepe, aliquando cubito nequaquam minores profert culmos iuncos, foliis circa imum multis gramineis statim e radice obliqua, iuncta, fibrata exortis, donatos, quorum scapus in umbellam inconditam Filipendulae modo explicatur, cuius capitula singularia, polita, rotunda, folliculis nigri-

cantibus, semen obuolutum gestant, tandemque in tres exiles carinas dehiscunt.

Synonyma. Gramen iuncum maritimum, Lob. ic. pag. 18. sic & Ger. Gramen iuncum 3. Tabern. Gramen iuncum 10. siue foliis & spica iunci, Casp. Bauhin. pin. Eid. phyt. Gramen 69. siue iuncum alterum. Locus. In pratis & riguis obseruatur.

IVNCVS HUMILIS.

CAP. CCXXXIII.

Descriptio. Folia, stylosve profert sescunciales tres quatuorve, teretes, ex radice fibrosa, & pro plantulae modulo, crassiuscula: vix enim vnciam superat.

Synonyma. Gesnerus, cum Tiguri prope lacum [Bazens] see [Felinum] collegisset Maio mense, vocabat iuncum humilem inutilem & Chamæschœnum. Casp. Bauhin. in prod. est iuncus tertius: Eid. in pin. iuncus lenis 9. siue iuncellus inutilis. Huc referendum ait iuncellum omnium minimum Lobelii in Adu.

IVNCVS EXIGVVS MONTANVS, MV- cronæ carens, Casp. Bauhini.

CAP. CCXXXIV.

Descriptio. Radice est pusilla, nigra, capillacea, cauliculo quatuor vel quinque vnciatum, cuius summo capitulum paruum, ex fusco purpurascens, quadrifidum, in exiguum rigidiusculum filamentum ambiens, infidet: folia ad cauliculi principium tria, iuncta, vnciam longa.

Synonyma. Iuncus 2. C. Bauhini in prod. siue eiusdem iuncus cum lauem in pin. D. Burserus in Taurero Radici

Radicali collegit. Suspiciatur autem Casp. Bath. hunc eundem esse cum *Iuncus lychnantheus* tenui, plures ex radice fibrosa emittente iuncos stylos, breues, digitales, spicâ perpusillâ, spadicefcenteque in apice exornatos, Thalij, quem nusquam quàm in Broccenbergo collegit.

IUNCUS FOLIATUS MINIMUS.

CAP. CCXXXV.

Descriptio



Iuncus minimus vnciales & fescunciales emittit culmos, plures ex cespice ortos, enodes, paniculam singulos gerentes exiguum, glomeratam, semen glumis rubescentibus triangulum occultantem, cui bina apposita foliacea cornicula, alterum surrectum, alterum secundum culmos deorsum vergens: folia è radicibus

fibrosis capillaribus angusta, vncialem longitudinem circiter adepta.

Locus.

Nemauso attulit Gener Cherlerus.

IUNCUS MINIMUS FONTIS ADMIRABILIS.

CAP. CCXXXVI.

Descriptio

Egerem de cespice vno tollit magnam, foliorum & culmorum, quæ præ tenuitate stamina imitantur, latè virentia, glabra, altitudine plus minus palmari: culmi autem nudi enodesque, circa fastigium (quod acutum) paniculam luncorum more ex latere emittunt, aliquando vnam, aliquando geminam, ex viridi fuscâ, squammatam, exiguum, lenticulæ magnitudine, aut paulò maiorem, turbinatam.

Locus.

Inuenitur loco humido cum Holostio Matthioli prope Eichelberg, non longè à Fonte admirabili.

IUNCUS PARVUS MONTANUS CVM paruis capitulis luteis.

CAP. CCXXXVII.

Descriptio

Longissimis fibris Iuncus hic montanus illeque crebris demissis, stylos emittit palmares aut dodrantales, tenues, multis foliorum propter terram inuolutis oblitos, qui cetera æquabiles enodesque in summo fastigio capitulum gestant, duplo triplòve breuius quàm Iuncus clauatus, inter squammas longiores emicantibus flosculis luteis.

Tom. II



Perennis planta est, vt apparet ex reliquiis veterum foliorum, Nardo Celticæ similibus.

Obseruavi in monte, cundo Ribellavve ex Fonte acido S. Petri in valle Griesbachiana, locis humidis, primo Maio floren.

Locus.

IUNCUS CAPITVLIS LONGIS, SIVE clauatus.

CAP. CCXXXVIII.

Descriptio



Serpente nitor radice, multis fibris capillata: culmi striati, nõ asper, teretes, enodes, ac sine foliis, cubitum ferè æquant, fungoli, circa immum rubentes, quorum summitas non in stylum exit acutum, sed in spicam clauatam, rufescentibus squammas imbricatam.

Lob. Obs. p. 44. Ic. plant. p. 36. Iuncus aqua-

ricus minor capitulis Equiseti. Hist. Lugd. pag. 986. Iuncus clauatus Dalechampi, siue (in contextu) Iuncus alius secundus. C. Bauh. phyt. 7. Eid. pin. Iuncus capitulis Equiseti siue maior, variis stirpis latioribus & triplò angustioribus.

Synon.

Geneux in aquis circa Arue, alibi in cœnosis & stagnantibus aquis nascitur: floret Mayo & Iunio mensibus.

Locus.

IUNCCELLVS CAPITVLIS EQVISETI MINOR & fluitans, C. Bauhini.

EX radiculis capillaceis Iuncus recurvus tenuissimus (6. in prod. Iuncus capitulis Equiseti alter, in pin.) prodit, qui in plures Iuncellos duarum triumve vnciarum subdividitur, quorum aliqui erecti, aliqui reflexi, capitulum minimum sustinent, & Iuncellis singulis foliolum tenue capillo ceu adponitur.

Synon.

Descriptio

In aquis Angliæ fluitat, autore Glenio.

Locus.

X x

dine erumpit, insigni leuore & æqualitate præditus, in cuius summo flores multi, longis pediculis, ex vno principio nascuntur, in purpura candidi, tribus foliolis constantes, sub quorum interualis alia tria (sed illis minora) sunt: stamina in te flores habent numero plerumque nouem, croceo in summitate puluisculo manus atrectantium inficientia. Habent singuli flores in medio capitulum, semini ferendo aptum & sex partibus diuisum, quibus sunt singuli in summo repandi apices: omnibus huius capituli angulis singule adhærent guttæ, admodum parue, crystalli modo transluide, sapore & substantia mellis. Radices habet duas, quarum gracilior & nigrior descendit: crassior verò superius ferè in superficie terre transuersa fertur: vtrique propagines aliquot, & multe fibræ adnascuntur: habent radices saporem dulcem & glutinosum: nascitur autem pinguis, limosis & humentibus locis, quò fluuitorum inundationes peruenire possunt.

Sunt qui Gladiolum hunc Cordi, Theophrasto dictum, esse suspicantur: sed Theophr. Cyperum intelligit.

Ad cramen harundinaceum, & Caricem acutam Virgilij referendum Tragus iudicat, ideoque craminis tertium genus, & Calamagrostin alteram vocat: eius autem figura non placet.

Lob. in Adu. Obs. p. 44. l. c. p. 36. dicitur *Iuncus cyperoides floridus paludifolius*. Dod. gall. *cyperoides* & *floridus*, hoc est, Sparganium & Iris syluestris, ac etiam Scirpus quorundam.

C. Bauh. phyt. *Iuncus* 8. siue *floridus*: Eid. pin. *Iuncus floridus* 1. siue *maritimus*: *Calamagrostis* 2. Tragi: *Iuncus floridus* Martb. & Cast. *Gladiolum palustre Cordi* hist. *gladiolum aquaticum* Dod. Lat. *Sparganium*, gall. *Carex* alterum, Lon. *Iuncus cyperoides paludifolius*, Eyst. *Iuncus cyperiniflorus*, Tabern. *Butomus* Theophr. Celsalp. *Iuncus floridus* Matthioli, H. Lugd. pag. 989. Eid. pag. 1006. *Calamagrostis prima*.

Montepelluli in maritimis & lacustribus palustribus inter Iuncos præsertim obseruatur. Sic & in Italij ferè totius lacustribus, & vdis pratis maritimisque, Iuncis potissimum. A Maio ad Augustum vsque florere.

IVNCVS FLORIDVS MINOR. C. BAVH.

Descriptio Radice est candida, geniculata, fibris plurimis adhærentibus: caule palmari: sedis ternis, Iuncis, oblongis, acutis, duobus caulem superantibus, cuius summo, singulis pediculis, qui quini sunt alternatim sibi succedentes, flores (quos non vidit author,) insident, quos fructus gemini rotundi, Orobi Cretici magnitudine, sequuntur.

Locos In palustribus Heluetiæ circa cœnobium Etemitanorum, & in monte Fracto ad lacum Pilati Lucernatum D. Burserus obseruauit Iuncum hunc, quem in prod. C. Bauhinus *nomini* fecit, & in pin. *Iuncum floridum secundum siue minorem* vocauit.

Synon.

CALAMVS AROMATICVS IN GENERE.

CAP. CCXLVI.

Theophrasti de Calamo aromatico duplex occurrit locus. Aigen. in lib. 9. hist. cap. 7. Tom. II.

quod Calamus trans Libanum montem, inter ipsum Libanum, & alium quendam montem paruum vâlle minima exeat. Non, ut quidam dixerent, inter Libanum atque ante Libanum, inter quos campus amplissimus & pulcherrimus est Aulos appellatus. Quà verò proueniat, lacum in amplum spatium, iuxtaque eum palustribus siccatis, istum assurgere. Occupare locum plusquam triginta stadia. Viridem nequaquam esse videri, sed siccum: forma verò nihil ab aliis (*Plin. lib. 12. cap. 22.*) differre. Locum ingrediens protinus odorem spirare, non tamen longius, ut quidam referant. In Arabia autem spirationem agri odoratissimam esse inter omnes. Et huius rei causam reddit *Geopon. 22.* dicens argumento hoc esse, quod tractibus astuosis, meliora odoratorum genera proueniant, quod melius ibi concoquatur, & siccata oleant, vitidia autem nihil, ut Calamus & Iuncus.

Quæ ex Dioscoride & Galeno hic adducere possemus, ubi de viribus agemus, adscribemus.

Calamus (inquit Plinius lib. 12. cap. 22.) odoratus in Arabia nascens, Plutarchus libro, Quod bruta ratione utantur, id quoque prodidit, sed errore manifesto, Guiland.) communis Indis atque Syriæ est. in qua vincit omnes (annis, &c.) A nostrisq; mari centum quinquaginta stadiis, inter Libanum montem, aliundeque ignobilem, non (ut quidam existimauerunt) Antilibanum, in conualle modica iuxta lacum, cuius palustria æstate siccantur, tricenis ab eo stadiis Calamus odoratus gignitur. Nihil autem a exteris sui generis differt aspectu: sed præstantior odore, statim à longinquo (alienâ fide Theophrastus, ex quo Plinius hæc ad verbum transcripsit, narravit, quod minimè verum esse Guilandinus testatur, qui eam regionem peragravit. Idem scripsit & Vitruuius:) inuitat, mollior tactu, meliorque qui minus fragilis, & qui assulosè potius quam Raphani modo frangitur. Inest fistula arancum, quod vocant florem. Præstantior est, cui numerosius. Reliqua probatio ut fulvus sit. Niger alius damnatur, (nec legendum, Reliqua probatio, ut niger sit. Damnatur aliubi.) Melior, quod breuior, & crassior, lentiusque in frangendo. (malim legi mandendo.) Calamo pretium in libras xi. Iuncus xv. Traduntque Iuncum odoratum & in Campania inueniri. Idem lib. 24. cap. 11. Et quoniam plura genera Harundinis fecimus, illa quæ in India, Syriæque nascitur, odorum, vnguentorumque causa, &c. Lege caput de Harundine, ubi vires traduntur.

Calamus aromaticus siue odoratus duplex est: alter Syriacus, ad ripas lacus Genesarethici, quem alij mare Galilee, alij mare Tiberiadis vocant, nascens, à vulgari nihil dissimilis præterquam quod, post quadragesimum diem siccatus, non nihil flagrat: alter Indicus, descriptus à Dioscoride olim, nuper à Garcia ab Orta, diuersissimus à Syriaco. Dionysius de seu orbis *indicus* vocat, à colore, non ut Eustathius putat, quod eius atriæ India Erythraea contermina mari sit. Dioscorides *xip* esse tradit. Apud Vegetium lib. 4. de re veterinaria, Absyrus in confectione pulueris quadrigarij Calamum Syriacum & aromaticum, id est, Indicum, memorat. Et hæc Calami genera plurimum inter se discrepantia, Plinius ignoranter miscuit ac confudit, teste Guilandino.

Quæ Paulus, Aetius, Plutarchus, Celsus, & Dionysius de calamo prodiderunt, à Theophrasti;

Plinius lib. 12. cap. 22.

Theophr. lib. 9. cap. 7.

Plinius lib. 12. cap. 22.

Calamus Syriacus differt ab Indico.

Plinius lib. 12. cap. 22.

Diosc. Plin. & Galeni placitis re ipsâ nihil differtur. Quare hic neglectis ad Neoter. devenimus.

Legi (inquit Hermol.) & in Meotide odoratum nasci Calamum radice subalbida, & sine fistula, plena intus & amara, specie Acori, de quo & falsi quidam sunt, Acorum cum putantes. Quanto autem amarior, tanto & calidior est Indico. Vtrumque tamen genus Acorum odore superat. Terebinthibus ut Acorum incessit: omninoque vicarium pro Acoro est. Ab Ionia & Ponto, & Herquile columnis profusque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphrice, ut si eadem non sunt planè, maxima tamen germanitate visantur, ut autores plerique tradunt.

Aromaticus porro calamus, si Dodonæo gall. si Trago: si Clusio, præsertim verò si Matthiolo in apol. in Amatum credimus, non radix est, sed Calamus pretiosissimus, at qui hæcenus ad nos non fuit apportatus. Nam [inquit hic] quod Plinius ait efficacissimam in omni Harundine esse partem, quæ radici proxima, quis non videt & Harundine, non de radicibus intellexisse Plinium: examines quim partes in universo calamo, radicibus proximas cæteris præstare dicit, quod facile prudens animaduertet Lector. Nec enim aliam ob causam Plinius maiori vi pollere eas calami partes, quæ prope radices habentur, quam quod eadem ubi crassiores, vegetiores, robustioresque in omni Harundinum genere reperiantur, quam in cæteris earundem locis: quo fit ut etiam calami ipsius genicula efficaciora pariter ipse existimauerit Plinius. Quippe & genicula robustiora sunt, & crassiora. Quam ob causam calamum illum prætulit Dioscorides, qui densè fuerit geniculatus. Quod verò Calamum, non radices describat Dioscorides, aperte quidem constat, cum ait. Calamus odoratus in India nascitur, melior est fulvus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plena araneorum fistula. *Hæc ille.* Quæ tamen perperam Lusitanus intelligit. Quippe calamus in primis Harundinem designat, non radicem. Præterea proprium Harundinis est pluribus constare geniculis, & assulosè frangi. Deinde fistula, in qua quoddam araneæ telæ simile concluditur, calamo tantum debetur, non radici, quæ solida, dura, lignosa & ubique ocellata spectatur in omni Harundinum genere. Adhæc fulvus color calamo sanè debetur, non radici. Quippe quod radix in Harundine perpetud albicet. Ad id autem quod proprium sit radicis (ut Amatus contendit) ut ipsa geniculata dicatur, calamus verò potius nodis cinctus, Dioscorides ipse responderet. Quandoquidem is non modo quarundam plantarum radices geniculatas facit, sed etiam caules, & calamos nonnullarum stirpium reddidit geniculatos, ut facile quis certior fieri poterit, qui eius codicem legerit in Hydropipere, in altera Cyclamino, in Gentiana, in Panace asclepio, in Gramine, &c. Constat præterea Calami odorati, quo passim Sepalix vtiuntur, radices ex Lithuanis, & Tartariis finibus, quin etiam ex Ponto, ubi passim ferè proueniunt, ad nos conuehi. Quod maximo cuique argumento esse potest, eas cum Amato prorsus hallucinari, qui eas ipsas radices Calami odorati esse contendunt, quod nullus extet autor qui scripserit odoratum calamum alibi prouenire, quam in India & Syria. *Et hæc sunt Matthioli in Amatum argumenta,* quibus docere conatur calamum odoratum communis vsus, legitimum, genuinumque esse Acorum: quin concludit calamum odoratum harundinem esse non radicem.

Iam dictis adstipulatur Aloisius Mundella in Bratlauiolum, & hunc in modum argumentatur. Sic calamus aromaticus, qui in officinis pro calamo & habetur & venditur calamus odoratus est Dioscoridis: statuendum utique est calami descriptionem, vel calami ipsius esse, vel radicis, vel vtriusque apud Dioscoridem. Quod autem vtriusque non sit, colligitur, quia Autor non exprimit, quæ caulis aut radicis sint propria. Non radicis: primum, quoniam illius mentionem non facit. Deinde, quia radix, quam pro calamo venditant, non videtur ruffa: ærisque insuper & amara est, velut Acorus. Postremo in assulas non diffilit, h. e. per longitudinem assulas paruas, dum frangitur, non relinquit. His quoque addit: Non constat quomodo fistulæ araneorum plenæ existant in hac radice, quemadmodum in ea, quæ est calami Dioscoridis, quas araneas secundum Plinium florem cognominat. Quod si ergo calami est descriptio apud Dioscoridem, huic nostro vulgari quæ est radix convenire non potest. Quare dubitat ne hic officinarum calamus, magis ad acori radicem accedat, quod Manardus, Cordus & alii quoque suspicantur, & Matthiolum omnino genuinum esse Acorum credit, & olim Io. Rodericus [Amatus Lusitanus: sub nomine enim Io. Roderici Lusitani superioribus annis commentarios in Dioscoridem in lucem euulgauit.] affirmabat. Nunc verò firmiter contrarium asseuerat.

At verò cum huius rei diversa penitus sine aliorum placita. Argumenta quæ pro negativa parte faciunt, paucis refutabimus, affirmatiuamque rationibus comprobabimus.

Matthiolo itaque dicenti, quod calamus aromaticus, non radix, sed calamus Dioscoridi sit, primum respondemus, calamum aromaticum simpliciter, per se, & absolute dictum, nec radicem, nec harundinem, nec tale quid esse, sed in hæc, tanquam totum in suas partes, diuidi: Et hac ratione æquè radicem, ac calamum, aut tertium quid esse posse. Quod manifestè eius descriptio comprobatur, quæ partim ad calamum pertinet, partim ad radicem, ut patebit. Quod ad nos non fuerit apportatus. Audit Amatum veriora testantem: calamum ex India Lusitani nostri singulis annis deferunt per mare rubrum in Cairum & Alexandriam deferentes. Venetias portant, calamis similem, unde nomen accepit. *Licet adhuc Plinius efficacissimam in omni harundine eam partem esse dixerit, quæ proxima radici sit, non ideo denegauit radici ipsi excellentiam, sed Arundinis tantum superiorem partem non ita efficacem asserit.* Præterea Theophrastus & Plinius alibi ipsam calami radicem desiderant, & eam cæteris partibus anteferunt. Nam suo se gladio iugulat Mundella. Vtriusque (calami & radicis simul) descriptio non est, inquit ille: quia autor non exprimit, quæ caulis, aut radicis sunt propria. Pulchrè ratiocinatur si diis placet. Quæ consequentia: Non exprimit propria, ergo vtriusque non potest esse. Si non exprimit, nec etiam contrarium affirmavit. Quod enim dicit optimum esse, qui fulvus est, ad radicem referendum est: Sicut & illud Plinii, subalbidus, in commendando viscosus, subacris, adstringens, ad radicem pertinet, velut ipsum experimentum docet. Quod verò frequentibus geniculis præditum ait, & assulosè in multa segmenta diffingi, & fistulam araneis plenam habere ad calamum. Non radicis (pergit Mundella) quoniam ipsius mentionem non fecit Diosc.

Aloisius Mundella

Matthiolum

Ad nos per

Plinius

Mundella

Diosc.

*Expositio
de radice
calamulæ.*
Diosc. Quæ est rationis huius necessitas? Non meminit radicis, ergo descriptio eius non est. Dic quæso Mundella, Quid aliis in locis describit Dioscorides, ubi nec plantæ foliorum nec radicis, aut aliarum ipsius partium meminit. Dic, quid describit capite de Costo? Reclamat tandem ipsa experientia verbis, quæ opponit, Radix non videtur ruffa, non dissilit: Non constat Mundellæ, quomodo fistulæ aranearum plenæ existant. Reclamat, inquam, ipsa Amari experientia, dum scribit, Venetias portant, Calamis similem, album & subrusum, crebris geniculis, in assulas dissilientem, fistulosum, araneo albo plenum. Sed iam probatum est descriptionem non tantum Calami, verum & radicis esse. Primum si Calamus aromaticus Officinarum Acorus genuinus est, ut Matthiolus & alij quidam affirmarunt, frustra hi omnes entia multiplicantes, separantque à se inuicem quod vnum est. Diuersis siquidem capitibus, de Acoro & Calamo tanquam de diuersis tradunt.

*Ad notandum
vera perpe-
ram Bras-
sauolum
esse.*
Hoc tempore penitus ignotum scribitur, quod Calamus aromaticus, cuius Veteres meminerunt, Officinarum communis Calamus non sit, sed radix, neque præscriptis notis insignita, ut ex Manardo, lib. 6. Epist. lib. 8. epist. cuius rationes mutuatus Matth. etiam aliorum armis muniat, feroci admodum aspectu, ea in Brasauolum tela contorquet, ut sibi ipsi Vulcanus videatur: magno enim errore Brasauolum duci, satis palam esse supponit: quod tam facile sibi persuaserit, legitimum odoratum Calamum, illam esse radicem, quæ temerè omnibus in seplasis illius vicem explet, cuius opera si interisissent, quis non miscellum hunc Brasauolum cachinnis irritaret? heu quis non admiraretur tot contradictiones? tot lapsus? tantam inscitiam? tot grauia crimina? quæ tamen ab astuto hoc homine, eius sententias peruertente, corruptis verbis, diminutis clausulis, ei falsè adscribuntur: ut per Iouem lapideum iurare cogat, (inquit Apollo) me suis lineis depictum Matthiolum, vobis planè indicaturum: ita enim scribit Brasauolus, decimus agitur annus, quod Venetias verus Calamus aromaticus affertur, qui Calamus est, & non radix, at communis aromaticus Calamus, qui passim venditur, radix est, & non Calamus, id verò de quo in præsentia loquar, Calamus est, & non radix, qui folia habet circuecirca in aliquibus Calamis, quæ nostrorum Calamorum foliis assimilantur, & nisi putassem Galangam esse Acorum, non potuissem, non arbitrari vulgarem Calamum aromaticum esse Acorum, & forè radix hæc, quæ Calamus aromaticus vocatur, est odorati Calami radix: Calamus autem verus odoratus, in Officina Campanæ, Venetiis vendebatur. En igitur Studiosi quibus verbis peritos insectetur? quàm fideli sermone candidissimos laceret? quàm tumultuosis rixis, se vbique molestissimum, ac infestissimum exhibeat? hæc sunt argutie quibus prægrandem confarcinavit librum, solo lepore illos lacerans, suisque obruens calumniis, non aliam ob causam, nisi ut doctissimis aduersari videretur, & quocunque modo in eos argumentum effunderet, hac importunitate excruciet, tantum sibi arrogans, ut quæ non dixerunt, dixisse velit, quæ enim in eius sententiam pedibus non eunt, tergiuersatur, si quis nodus incidit, statim transit, velut angue conspecto, aut saltem lippis oculis intuetur: etsi clarissimo suorum scriptorum testimonio sanissimi ingenij

videatur, ut quum minimè compertum habet dixisse Diosc. & Galenum Calamo aromatico aliquid inesse amaritudinis: quod vel Ruellij versionem quam se imitari pollicetur, in sui operis initio, paulò segnius perlegerit, vel in eam, si quid perperam ex Græco translaturum, ut sui moris est, aliquid iniicere tenebatur, quod cum ali-quanta acrimonia amarum Calamum transtulerit: id quod Secobienſis Lacuna, Græcis, Latiniſque literis eruditissimis, qui Ruellium fidelius restituit, corrupta loca refarcinauit, aucta imminuere, mutata ad pristinum candorem reduxit, malè huic tributum amarorem nō annorauit, etsi Marcellus quod ad amaritudinem pertinebat, se reliquisse asserat, quia in melioribus illa vox non legatur. Manardus etiam lib. 5. Epist. 2. probans Calamum non esse Canellam, inter alias differentias enumerat, quod in ea canella non sit amarus, innuere calamo amaritudinem inesse, vñ hinc Fuchſij sententiam improbare non possit, atque an communis illa radix, calami odorati propria sit, quæ amariſcula, necne, nullum est in hoc euident argumentum, quod etsi Harundinis trunculum, cacumini annexum non deferant: folia Iridis similia, harundinacea, quadantenus præ se ferunt, sicca potissimum, an verò Acorus sit, eo in capite discutiendum relinquimus: hic tamen præterire non possumus Amari autoritatem, ne dicam ambitionem, aut insolentiam, qua calamum aromaticum Officinarum Diosc. legitimum, suis notis representare non ambigit, potius, ut credimus, somnians, quàm sensum libertate, tam absurda proferendo: nec Matthiolum contraria astruentem, hoc est, calamum aromaticum harundinem, siue calamum, non radicem esse debere, deceptum asserere veretur: quod licet Theophrast. ac Plinius in calamo odorato calamum, & non radicem, laudare videantur, alibi tamen radices cæteris partibus anteferunt, idque ex Plinio manifestè percipi, lib. 24. cap. 11. quum odorati calami facultates enumerans, inquit: Efficacissima autem in omni harundine, quæ proxima radici, efficacia & genicula, ex quibus in omni Calamo radicem efficaciorē esse partem contendit: id quod si Plinius intellexerit, vel ipsi pedagoguli diiudicent: Quis enim etiamnum mediocri ingenij ita arguerit? Plinius proximas in Harundine radices partes alijs præfert: ergo radix efficacior est pars? Quinam etiam ex palliorenus Medicis, qui stultissimum hoc arguendi genus non excludat qui in re vulgarissima illum exentire non deprehendat, qui inquam dum sitim sedare cupit, sitim alteram crescere non videat, ut quantò plus biberint, tantò magis sitiant Parthi: quum scilicet huiusmodi radix, quæ in multa segmen-ta nunquam assulosè frangitur, non fistula araneo velo simile quicquam ocludente, quæ quidem Harundini debentur, non radici, sit saltem Calami aromatici radix: cuius nulla est ab Amaro probatio: tot autem oculati testes ex Manardo, ac Matthiolo contrarium asseuerantes, tot ab his rationes, quas hic rursus inculcare, opere pretium non est, ut quum Brasauolum huic suo opinioni assentire testatur, secus quàm ipse dicit, ut supra: quum Diosc. calamum odoratum, non radicem, sed Calamum esse debere, scriptis mandauerit, quumque calamos equiseti, graminis, ac aliorum geniculatos reddiderit Diosc. non est quod radici proprium esse geniculatum, Calami autem nodis cinctum asserere debeat:

Fuchſij
opinio.Amari
corruptio.
ver.Calamus
est & non
radix.Ad notandum
vera perpe-
ram Bras-
sauolum
esse.

quum autem calamum aromaticum esse officinarum Schœnanthum arbitrantur Calopodiani, qui in Mesue scripsere, nec illorum spernit opinionem, qui radicem calami aromatici vice acceptam, legitimi calami radicem statuunt, quam magno implicentur errore, non animaduertunt. Siquid Schœnanthi Officinarum radices tradit capillorum modo, tenues, huius vero adulterini calami radices crassæ sunt, & effatu dignæ: propterea Schœnanthi radices esse non possunt, & per consequens: si Schœnanthum vulgare calamus est aromaticus, hæ radices non erunt calami odorati radices: quumque in assulas non diffiliat Schœnanthum id, non solum sit, non in mandendo lentum, melius discant, ne rudere potius, quam erudire videantur: veri tamen calami loco, radicem hoc nomine vltatam substituere malo, etiam si Acorus sit, quæ multas calami qualitates obtinet, quam Sphagnum, latinis muscus arboreus, Officinarum vinea: & si Auic. cap. de musco, pro quo Thaleb reposuit Bellunensis, muscum fluuiatilem, aqueum, terreum, petrosam, maritimum complectatur, & cap. de Vineâ arboream videatur distinguere, aperta separatorum nominum & capitum confusione. Galen. verò ac Paulus in suis succedaneis, pro calamo sphagnum cum Mathiolo supponant: hæc enim in alienam messem irruisse creduntur, doctorum omnium iudicio, quod plura his ignota inferant, aut facultatibus dissimilia suggerant, ut Myrtum pro Cardamomo, &c. quorum est sylua: molcus verò arboreus, hypnos etiam vocat, hoc est villosa illa canicis arborum caudicibus adhærens, multiplex est, ut suo ostendetur loco.

De hisce satis, vela terrahimus: vocatur græcè *καλαμὸς ἀρωματικός*, & *ἀρωματικός*, inde hæc lat. Calamus aromaticus, odoratus & vnguentarius. Arab. ut Serap. *Hafabel derre*: *Alfaharino*, *Alterira*. Bellunenſi *Alderire*, *Aldarira*, & *Chafab darirhe*: item *Caratis* & *Caratim*. Germ. *wolfriche* *phende wurriede*, *wolfrichende Kopr*. It. & Hisp. *Calamo aromatico*.

Præter calamum aromaticum quorundam Indicum & verum, sunt & aliæ plantæ, quibus calami aromatici nomen attribuitur.

Calamum odoratum Matthioli pingit, & ex eo Lacuna. Lonic. Acosta, Durantes, Hist. Lugd. Tabern. & Gerardus, Calamum aromaticum nominantes, qui nihil aliud est quam figmentum, nihil differens ab Arundine hortensi sue sativa.

Malè in officinis calami aromatici nomine Acorum, de quo suo loco, venale proficit.

Cassabouferre Bellonius cum vulgo Pharmacopolarum Constantinopolitanorum calamum aromaticum esse opinatur, sed *Qualebeni* quidè & Matthioli iudicio, absurdissimè. Sunt enim calami lapidei: non verò cuiusdam plantæ.

Schœnantos quibusdam idem est cum calamo aromatico. Quare Colleg. Florent. huius loco Schœnanthon supponit. Idem & Borgar.

Opinio Marcelli dicentis calamum aromaticum esse Canellam, meritò tanquam erronea damnatur ab Acosta.

Notat idem Acosta quosdā calamum aromaticum cum Galanga confundere. Et sanè constat Venetos pharmacoperos, Theriacam paraturos, calamo Galangam substituere.

Antidorarium Romanum calami odorati veri loco Angelicæ radices, sed in minori quantitate commendat.


Calami aromatici nomine Argentoratenses hortulanæ vendicare solent Phu maius & nobile: vide Tragum.

Plura de calami aromatici substitutis dicta antè, ubi Apollinis verba adscripsimus.

De calami aromatici viribus hæc Dioscorides scripsit: nascitur in India. Est autem optimus, qui sulvus (*σιλψος*. Act. *σιλψος*) est, & frequentibus geniculis præditus, & qui assulosè in multa segmenta distingitur, fistula araneis plena (*ἀράχνης*). Plenam habens araneorum fistulam, Sarrac. Malè araneorum: oportet enim vertere telæ aranæ, aut re simili telæ aranæ, *Πασινας* *Salodianus*.] subalbidus (*σπαλβιδος*. legendum *σπαλβιδος* Pal. *Salod.*) In commandando verò viscosus (*κόλλος*, leg. *κόλλος* Pal. *Salod.*) adstringens, subacris (*πικρὸς* Orib. amarus, Ruell.) Potus urinam mouere potest. Vnde cum Gramine, aut Apii semine decoctus & potus hydropicis, nephriticis, urinæ stillicidiis, & ruptis conuenit. Ducit etiam menses & appositus & potus. Tullēs quoque sanat fustis per se ipsum, & cum resina terebinthina, si fumus per fistulam ore attrahatur. Decoquitur (*ἀπὸ* Pal. *ἀπὸ*) etiam ad infellus muliebres, & ad uteri collutiones (vet. caret verbis, *καὶ τῶν ἀσθενειῶν*) Miletur & malagmaris, & in fustis, iucundi odoris gratia. Calamus odoratus, *αὐτὸς* *Γαλένιο*, leuiculam quandam adstrictionem ac nimiam acrimoniam possidet: magna ex parte essentia eius terrena est & aërea, in caliditatis frigiditatisque coniugatione temperata. Quamobrem moderatè urinam mouet, & facultatibus quæ iecori stomachoque imponuntur, misceri potest: tum in fomenta quoque vteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis mensibis assumuntur, vtiliter admiscetur. Ponatur itaque habeaturque secundi ordinis eorum quæ excalefaciunt. Inest quoque ei quædam partium tenuitas, velut aliis omnibus odoratis siue aromatibus. Cæterum illorum compluribus tenuium partium plurimum, calamo verò non multum adest.

CALAMVS AROMATICVS VERVS quibusdam.

C A P. CCXLVII.



Calamum aromaticum creditum a triginta iam annis asseruo, vegeto amatore, cum lentore quodam præditum, teretè, crassitudine penæ cygnæ, internodiis longiusculis articulatis, rutilanti & spadiceo foris colore, aliàs buxæo, subrus candicantem, merinsecus substantiâ fugosa raræ, texturæ farctum: ad genicula singula, calami ex ad-

Schœnanthum Calamum loco substituitur.

Nomina linguar.

Aequiuoca
Calam. odor. Ind. Sc.
Calamum
Matth. si-
Acorus.

Acrost.

Schœnanth.

Canella.

Galanga.

Angelica.

nerfo sit pronascentur, ut calamo primario magnitudine cedentes, ita colore & compositione saporeque convenientes.

Similem calamum accepi anno 1558. ab insigni viro Io. Lutzio Ill. E. V. Viri. pharmacopæo. Alium sic descripsit Gener Cherlerus, Calami aromatici veri furculus, qui ad C. Bauhinum Argentinâ missus bicubitalis erat, Betulæ instar ramosus, in cuius altera biuricatione folium, vel potius folij fragmentum, nullo pediculo, sed principio angustiore hæret, vnciale, tribus nervis insignibus donatum, facie folij Indi, aut potius Plantaginis quinque-nerviæ, vnciæ quadrantem latum.

Pingimus in nostra tabella calamum vnum cum radice ex Clusij Garcia: secundum & tertium, cui rami ex sicca planta.

An Cordo in Diosc. Calamus aromaticus verus aliquoties in pharmacopoliis inter Squinanthi stipulas & spicam Indicam insuitus?

An Quilceeb. luncus odoratus Matthioli, mira acrimonia linguam gustantis mordicans, nihilque tamen, præter amatoris plurimam, inter gustandum derelinquens?

Lobel. in hist. Belg. pag. 73. in icon. Plant. pag. 54. sub titulo Calami odorati Libani, & calami aromatici ex Alepo missi, volutæ pendens Rieræ figuram habet, quæ eiusdem plantæ, cum ea quam descripsimus, videtur.

De calamo suo odorato Libani in Obs. p. 20. hæc scribit. Memini me vidisse Venetiis ad Angeli symboli Calami aromaticum, quem Alepi Syriæ Sequinus Martinellus doctus & industrius pharmacopæus, fortè delatum ex lacu inter Libanum & illum ignobilem montem Plinio memoratum miserat. Arundo erat geniculata, nitida, crassitudine paruum digitum æquans: color fulvus, nilabat memoria, saturior, odoratus, parum lentus, in mandendo, subacris & amarus. Iacobus Vtenhouius generosus Gandaviensis, stirpium & artis Medicæ peritissimus, calami aromatici doctores canulas aranearum telis plenas, fulvas, geniculatas, digiti minimi crassitudine, gustu planè aromatico, amaricante, Schœnantho præstantiore, nactus est inter Schœnanthi festucas, quas Massiliam aduectas ex lacu Plinio memorato asseriebant. Multo maiores habuit præclarus vir Augerius D. de Bousbeke Flander Insulanus, Cæsareæ maiestatis Constantinopoli Legatus, stirpium exoritarum peritissimus.

Volunt nonnulli Calamum Officinarum esse Acorum Veterum: Ego autem (inquit Garcia) nullius opinioni addictus, liberè dicam, quod sentio. Calamus aromaticus quo officinæ in Lusitania vtuntur (aromaticum voco, non odoratum, ut plerique alij, quandoquidem aroma odorem non significat, sed quod vulgò drogum vocant, neque etiam calamum odoratum scio, sed luncum duntaxat) idem est cum eo, qui in India magno est in usu cum vitis, cum mulieribus & iumentis. Vocatur is in Guzarate *Vaz*: in Decan, *Bache*: in Malabar, *Vazab*: in Malayo, *Dirimquo*: in Persia, *Heger*: in Cuncam, quæ est regio maritima, *Varicam*: Arabibus *Cassib* & *Aldirra*. Serapio lib. simpl. cap. 205. cum vocat *Assabeldiriri*, sed corrupto vocabulo: omnes enim Arabes Medici cum Auicenna lib. 11. cap. 157. & 207. *Cassib* & *Darirbe* appellant. Idem autem sonat *Cassib* quod Calamus, & *Aldirra* ex aromatibus: nam *Dirire* idem quod nobis aroma est. Quoniam verò Malayo incolæ eius usum ab Arabibus qui ex Coragone erant, didicerunt, idcirco

corrupto nomine *Dirimquo* vocarunt. Cæterum non est odoratus, nisi in terra auulsus: quantoque virentior est, tanto mihi validioris, retiorisque odoris videtur, tamen aliud sentiat Ruellius. Porro quoniam Hippocrates & Galenus i. simpl. Indicam hunc calamum vnguentarium appellant. Plutarchus verò calamum Arabicum, & Cornelius Celsus calamum Alexandrinum: videtur etiam extra Indiam nasci. Ego, ut veritatem elicerem, sciscitatus sum à multis Coragone incolis & Arabibus, si apud eos nasceretur calamus: item an esset eis cognitus, eoque virentur: Negarunt omnes apud se inueniri, nisi ab Indis aduectum mercimoniij gratia, probèque sibi cognitum, utpote cuius plurimus apud eos esset ulus. Non fallantur tamen, qui Arabicum vocant, nam ex India in Arabiam deferunt, & inde in alias regiones: neque qui Alexandrinum appellant, quoniam hinc Alexandriam, deinde Barut & Tripolim Syriæ deferunt. Quod autem Manardus lib. 8. epist. 1. dicit in Pannonia se vidisse adeo recentem, ut non longè petitus videretur, fieri potest ut fallatur: aut si videris, satum fortè in sporta, aut fictili vidit. Sed illud certissimum est, hinc auchi Calamum in eas regiones. Is verò, quo vtimur, radix non est (pusilla etenim est radix) sed ipsius calami cum aliquantula interdum radice parte fragmentum. Hallucinatur ergo qui nihil nisi radicem esse scribunt, confirmandæ suæ sententiæ causâ, quâ contendunt hunc calamum Acorum esse. Neque quod in Calamo est spongiosum & flauescens colore, aliqua in re simile est aranearum telis, ut falsò putarunt Auicenna lib. 11. cap. 157. & Serapio simpl. cap. 205. quos Græcis & Latinis hæc melius nosse oportebat. Denique quod calamus Acorum non sit, nec etiam Galanga, satis ex Auicenna & Serapione probari potest, qui tria distincta capita de Calamo, Acoro & Galanga scribunt. Præterea qui Calamum describunt, autem cum in India nasci, quod verum est: nec enim in alia regione nascitur, Acorum vero non nisi in Europa nasci tradunt. Adhæc Calamus pallens, acris, calidus & siccus est in secundo ordine: Acorum, albus, amarus, calidumque & siccum est ordine tertio: Galanga autem utroque calidior & odoratior. Demum calamus & Acorum cerebri & nervorum morbis conueniunt. Galanga verò ventriculum roborat, flatum discutit, & oris halitum commendat. Galanga item & Calamus medicamenta sunt in hac regione ab initio cognita, & in Occidentem veli solita. Hinc usque Garcia.

Sed quam eruditè notat Clusius, dicens: Notarum officinarum calamus longè alius est ab eo, quem hic satis obiectè describit Garcia, quippe cuius Calamus legitimus videatur à Veteribus descriptus. Noster verò nihil nisi radix est, cum aliquantula interdum foliorum partecula. Qui cum omnes notæ a Veteribus descriptæ pulcherrimè conueniant: Manardi & aliorum sententiam improbare non possum, qui Acorum legitimum esse volunt. Eo & Germani, & Itali, & Galli vtuntur, alij neque calamum non norunt. Solebat enim Antuerpiam Vlysiæ aduehi calami genus vsuali nostro simillimum, sed terti odoris & saporis horridi: quæ nota illis communis erat cum calamo Garciae descripto: solam tamen hanc ob causam in usu apud nos esse desuit, licet omnes aromatarij multo efficacius eo, quo nunc vtimur, fuisse adstinent. Cæterum, cum tertio recudenda esset Garciae historia, innotuit legitimus Calamus aromaticus, quem Paludanys

Contra
Ruellius.

Calam. vnguentarium
Hipp. &
Gal.
Cal. Arabia
cus, Plur.
Alexandri.
no Celfo.

In Arabia
Bosmanum
ind.

Manardus
lib. 8.

Radix non
est.

Auicenna
& Serapio
lib. 11. cap. 157.

Acorum
non est nec
est Galanga.

Garcia
Clusio not.

Garcia
Clusio not.

ex Syria & Aegypto redux communicauit, qui exactissime ad Dioscoridis descriptionem quadrare videtur. Umbellifera vero potius planta, quam harundinacea meo iudicio censenda est: etenim rectū habet caule, multis nodis, seu geniculis cinctū, leuē alioqui, intus cōcauū, & membranulā, vti Harūdines, præditum, qui assulose frangitur, estque satis odoratus, gratique saporis, amari tamen, & nonnullius adstrictionis particeps: folia (vt ex vestigijs colligere licet) bina ex aduerso singulis geniculis sita caulem amplecti videtur: radix summo capite nonnihil extuberat, deinde in fibras desinit. Vicesimo quinto porro anno postquam nobis communicasset calamum illum Paludanus, mittebat ad me Lugduno Allobrogū Ant. Colinus pharmacopœus, similis calami fragmenta, significās se eo vsum in Theriaca compositione: ea autem, licet simili prorsus formā essent cum illo, quod à Paludano accipiebam, magis tamen amari saporis deprehendebam, nec vllius adstrictionis prædita, quod forsitan alterius ætati adscribendum: *Et hæc Clusius in Garciam.* Ego quoque Garcie non notum fuisse calamum aromaticum vulgarem suspicor: qualis Vlyssiponēsis calamus fuerit nondum mihi constat: umbellifera planta cur potius dicatur quam harundinacea, nescio, quum nota adscriptæ à Clusio melius cum harundinacea planta conueniant, quam cum umbellifera.

Acolta dum reprehendit Ruellium, Manardum & Monachos, non animaduertit calamum aromaticum vulgarem Europæis plerisque dictū (quem multi Acorum putant) longè diuersum à calamo aromatico Indico, quem Garcias describit, in quo malè etiam Acolta Garciam imitatus est.

C. Bauh. phyt. *Arundo* i. siue *odorata*: *Calamus odoratus Libani* Lob. Ic. Plant. pag. 54. *Calamus à Paludano Patani exhibitus*: An calamus odoratus Matthioli? Sed quid quæso commune habere potest figmentū Matthioli, cum Calamo odorato Paludani? Matth. in lat. comm. editis anno 1559. sub inscriptione calami aromatici figuram habet quæ est pars figuræ pro Arundine posita, & per consequens falsam & non factam ad vsum calamum aromaticum Paludani, vel similem. In comin. lat. cum mag. fig. editis anno 1583. & Ital. editis 1568. nouam habet figuram magis artificiosam, quæ etiam pars suæ Arundinis. Tabern. vel eius typographus Bassius Matthioli postremum figmentum assumpsit, quæ est portio Arundinis quam domesticam cognominat. Prudenter & doctè Camer. in hist. germ. & Epit. Matthioli pro calamo aromatico, à Paludano delatū calamum figurā exhibuit: sicut etiam Clusius apud Garciam, & nos cum Clusio quem à Valerado Dourez accepimus: Est autem hic calamus omnino diuersus à Matthioli imaginario: Paludani verò calamum fuisse Libani, vix purò demonstrari posse, licet in ea opinione perseueret C. Bauhinus in pin. vbi inter calamum aromaticum Indicum, & Calamum aromaticum Syriacum, & calamum aromaticum Matthioli, quæ fictitium suspicatur, ita distinguit: *Arundo odorata* i. siue *Calamus aromaticus*, est *ῥαῦς* & *ῥαῦς* *ῥαῦς* *ῥαῦς*, Hipp. & Galeni *ῥαῦς* *ῥαῦς*, Theophrast. *ῥαῦς* *ῥαῦς*, Dioscor. Orib. Aegin. & Aetii: *ῥαῦς* *ῥαῦς*, Dionysii de situ Orbis: *Calamus Arabicus* Plutarchi: *Cal. Alexandrinus*, Celsi: *Cal. odoratus*, Plinii, Hermol. & Ruellii: *Cal. aromaticus*, Manardi: *Cal. aromaticus* Cordi in Dioscor. Fuchsi: Guil. Garz.

Clus. hab. *harundin.*

Arundo *vir.*

C. Bauh.

Synonyma
Calamus
arom.
Indic.

Lob. Obs. Clus. ad Garz. Acost. Cels. & in 4. part. Ind. Orient. fig. 19. & *Diringo Malays*, & *Deringo* par. 3. Ind. Or. 39. *Diringo* 4. part. Ind. Or. fig. 20.

Arundinis odoratæ 2. seu Calami aromatici Syriaci caulem seu potius caulis partem anno 1579. à D. Paludano ex Aegypto reduces Patanii accepimus. Verum cum totam plantam à D. Doldio habeamus, breuem eius descriptionem (cum ab alijs nõ proponatur) adiecte lubet. Ex radice inutili, trium, quatuorue vnciarum longa, summo capite nonnihil extuberante, & in paucas fibras desinente, caule, (modò vnus, modò plures) ferè bicubitalis, rectus, rotundus, leuis, fragilis, multis geniculis distinctus, exurgit, qui intus cauus, spongiosus & membranulā, (quasi tela alba subrepta,) vti Harundines, præditus, qui assulatim frangitur, & in plures ramos diuiditur, hi que in tenuissimos subdiuiduntur, ad modum Ligulstri Aegyptiaci Alpini, vel Lentisci Peruiiani, siue *Mole* Clusii: qui flores paruos, foliaceos, plurimos, singulis tenuissimis pedicellis infidentes, sustinent, ex quorum medio apex styli instar prodit. Folia pauca, semper bina, ex aduerso ad singula genicula sita, caulem amplectuntur, vnciam lata, setquiuunciam longa, nervis aliquot per longum excurrentibus. Caulis sapore est aromatico, valde amaro, quo in Theriaca pro calamo vtimur.

Seritur, teste Garciam, per vniuersam Indiam: Locum plurimum verò in Guzarate & Balagnate. Hic etiam Goz (vbi multus eius est vsum) in hortis satus prouenit, sed per paucos. Conuehitur ad maritimam, quoniam qui isthuc nascitur non sufficit. Qui ex Balagnate adfertur, ad Occidentem mittitur. Calamus aromaticus, autore Linschot. crescit etiam in Sunda Insula laus regionis Indiarum Orientalium. Magna copia Chineses emunt vt in Chinam portent.

Familiaris eius vsum (ita enim Garcias scriptum reliquit) est mulieribus in veteri affectibus, & nervorum doloribus. Sed maximè expetitur hieme à mulomedicis: contusum enim, additis Allijs, Ammi (quod est Cuminum rusticum) salis momento, butyro & Saccharo, iumentis aduersus frigora manè exhibent, vocantque id medicamentum *Arata*.

CALAMVS AROMATICVS CECHINI Martinelli.

CAP. CCXLVIII.

Non inuenit Cechinus Martinellus, apud Diosc. nec Galenū calamum aromaticum fuisse Veteribus Cannam (siue Arundinem) licet Neorotici id certò existiment, decepti Plinii opinione, qui dicit calamum, & luncum odoratum, non differe ab alijs calamis & luncis: addunt id indicare nomen calami nihil aliud significare quam Cannam: suo autem iudicio calamus Latinis diuersimodè potest intelligi: Dicebatur de tenui Canna (siue Arundine) ex qua Veteres sagittas faciebant, qualis erat mos Orientalium licet non sit Canna (id est Arundo caua) de qua Virg. eclog. 3. & vario vocabulo Ariostus dicitur etiam calamus de Canna cum qua senbebant Antiqui: calami etiam dicebantur *Canella* (siue Arundines) palustrium aquarum, quibus tegebantur tecta domuncularum rusticorum, de quibus duobus Marti. in suis distichis: Metaphoricè pro

Calam. *q.*
syn.

Locum

Vini

Non dicitur
runt
res
Calam
mam
arom
esse
Cannam

Calam. di
uerso
figm.
Arundo
se.
24.

Arundo
scriptum
Arundo
palust.

LIBER XVIII

pro stylo scriptorio sumpsit Virg. Eclog. 1.
Scribere qua vellem Calamo permixto agresti
Pro Calamo concauo ad fistulas qui dicitur Sy-
ringa:
Eclog. 1.

*Pan primus Calamos caraconiungere plures
distulit.*

Sub nomine Calami comprehenditur virga cui
alligatur filum ad piscandum, & virgulae quae
visco illinantur pro captura auium.

Interdum Calami dicuntur de parvis Cannis
frumenti, quae sepe vulgo dicuntur.

Sumitur etiam pro omni re conuoluta instar
Cannae: communiter dicuntur Calami arborum
& vitis.

Canna quoque Zuechari vocatur Canna cum
tamen non sit, sed ei similis.

Paulus etiam calamum odoratum vocat corti-
cem. Alius bonus auctor ait Calamum aromati-
cum esse crassum corticem canum, cum enim
colligitur extrahitur lignum: vnde desumpsit no-
men. Cechi. Martinellus quoque ait calamum vo-
cati, quae ita geniculata prouenit, ut hic Cala-
rous, quod prolixè prosequitur. & apud ipsum vi-
dere est.

Calamus praeparatus per Cechinum Marti-
nellum Aromatarium habeatur pro vero & legi-
timo calamo aromatico, ac in confectionibus
Theriace ac Mithridatii ceterisque medicamen-
tis adhibeatur, & remoueantur succedanea. Sed
libellus contra Cechinum incerti auctoris obla-
tus pharmacopoeis Mantuanis contrarium om-
nino sentit. Nominetur, inquit, *καλαμὸς* Graece,
aut calamus Latine, aut *calamo* Toscanè, nullus e-
rit ita stultus qui aliud intelligat quam Cannam,
ita etiam Virgilius & Aristotus nihil aliud intel-
lexerunt &c. & quomodo potest esse canna quae
non sit canna &c.

ARVND SACCHARINA, ET SAC- charum.

CAPVT CCXLIX.



plantas si leuor Saccharatus Calamus. Septemum
octonumve pedum Calamos, pollere crassiores
dentis geniculis, fungosa, perquam dulci, succu-
lentaeque & albidà medulla obfartas promit-

Tom. II.

Folia binos cubitos aequant, angustiora tamen.
Donacis (sive Arundinis sativae) scabra, & se-
cundum longitudinem striata, numerosa: *Scalones*
harundinibus ceteris concolores complectentia.
Comosoflore & quadantenus Sorghi. Radix ad
Cannae radicem accedit, sed dulcior, succulen-
tior, minusque lignosa: vnde germinula erum-
punt sationi opportuna.

Zoez, genus Mellis (*αίσιτος*) concretum in
India & Felici Arabia in Arundinibus (*αἰσιτὸν*)
inueniri prodit Dioscorides: Salis modo
coactum, dentibus ut sal fragile.

Galenus, si *αἰσιτὸν* Sacchar appellat, & ex India ac
felici Arabia afferri quoque scribit, & in arun-
dinibus concretoscere. Esse autem & ipsum Mellis
genus, & minus quidem dulce, quam nostrum.

Archigenes ait, Sal Indum esse, colore & con-
sistentia Salis communis, gustu Mellis, magnitu-
dinis Lentis, *αἰσιτὸν*, aut ad summum Fabae, *αἰσιτὸν*.

Saccharon & Plinius Arabiam ferre dicit, sed
laudatius Indiam. Esse autem Mel (Mel Arundi-
num Indicarum vocat Theophr. Arist. & Strabo.)
in Arundinibus collectum, gumminum modo can-
didum, dentibus fragile, amplius, ut Nucleus Aue-
lanae magnitudine, ad medicinae tantum usum.

Inueniuntur (inquit Seneca) in India Can-
nae, quarum humor pinguis, dulcisve in mel abit.
Quoniam vero non apud pensum mel hoc est, sed
plantae excrementum, liquet inde etiam Anti-
quis notum fuisse Saccharum.

Cetera, quae de Saccharo Veteres scriptis man-
dauere, inter vires compententur.

Hermolaus ex Neotericis perhibet Saccharum
ex Alexandria Aegypti & Cypro adferri com-
mendatissimum: Saccharum Graecos vocare *σακχα-
ρον*.

Manardus astruit nouam opinionem, aliud
scilicet esse antiquorum Medicorum Saccharum,
ab eo quod nunc voce parum (ut fieri solet) mu-
tata: *Zuecharum* vocatur.

Cornarius, qui Saccharum idem cum Zuecha-
ro esse credit, nouisse perhibet Veteres, à Dio-
sc. & Plinij secuso, Saccharon, sed concretum qui-
dem, nec ex Cannis expressum veluti hodie ad-
feratur magna ex parte, in pyramides siue metas,
octo plus minusue librarum coactum.

Manardus & eum sequutus Fuchsius hunc in
modum in Matthiolo refutantur. Noli desunt
inter recentiores Medicos, qui disputent, an Sac-
charum, quod sub mellis genere scripserunt Ve-
teres, praeteriam Dioscorides, & Galenus, in In-
dia, & felici Arabia nasci, idem cum nostrate
Saccharo dici possit. Et quamuis plerique repe-
riantur, qui dubio procul existiment, ac pro certo
asserunt, communis usus Saccharum, & quod
ab Antiquis describitur, vnum & idem esse, quod
ex eadem proueniat planta, tamen Manardus
Ferrariensis, & Leonardus Fuchsius ipsum secu-
tus, maximam inter ea ponunt differentiam, om-
nino opinantes in alio, Arundinum genere con-
cretuisse Antiquorum Saccharum, de quo inter
Mellis genera scripsere Dioscorides, & Galenus:
concretescereque ad hanc diem usque ex celesti
tore, quemadmodum & id, quod mannam voca-
mus: non autem in his arundinibus, & quibus in
aqua decoctis huiusce aetatis Saccharum in Ma-
dera, Sicilia, Creta, Rhodo & Cypro insulis, ac
etiam in Aegypto exprimitur: Qua in re eos vi-
ros alioqui doctissimos, plane hallucinatos, cre-
diderim, quod nullo, ut puto, auctorum probato-
rum testimonio ducti sibi persuaserint, Mannam in
modum ex rore concretescere Antiquorum Sac-

*Saccharon
Dioscorides
Mellis.*

*Sacchar
Galenus.*

Sal Indum.

*Dioscorides
Plinius.
Mel arun-
dinum in
dicarum.
Theophrastus.*

*Calam
mellis.*

*Lucius
in Hiero-
lanus.*

*Saccharon
Antiquorum
Medicorum
nosstrum.
Manardus
Ferrariensis
Cornarius.*

*Saccharon
considera-
rio
Matthioli.*

*Manardus
& Fuchsius
opinione
probata.*

charum solis ardore super Arundinum folia tam in India, quam in felici Arabia. Quippe quod nusquam repererim scripsisse Dioscoridem, Galenum, nec Veterum, vel Recentiorum quendam, concretescere Saccharum in Arundinum foliis, ex rore Solis fetore concreto, siue potius exiccato, quemadmodum in quibusdam arborum frondibus manna per se concretescit. Quo fit, ut mihi refellenda videatur eorum sententia. Nam si verum illud esset, ut ipsi imaginantur, non modò, non est credendum, sed ne cogitandum quidem, Dioscoridem, qui diligentissime simplicium medic. historias, literis, memoriaeque mandauit, silentio praeteriisse tam pulchrum & admirabile, scituque dignum naturae opus in Saccharo conficiendo. Nec minùs id reticuisse Galenus naturae operum maximus indagator, quemadmodum nec reticuit lib. de alim. facult. aërei mellis historiam quod nos mannam vocamus, quodque sua aetate in monte Libano, aliisque locis super arborum frondes repertum scribit. Quamobrem magis veritati consilium videretur, vadicamus, nil aliud Veteribus Saccharum exiisse, quam nostris Sacchari Arundinum lachryma, seu liquor, qui nimia succi copia aperto in latere calamo perfunde ac gumi, exterius concreuerit. Huic nostrae opinioni subscribit Plinius, ex cuius verbis facile cognosci potest, quod non ex rore, ut Mannae euenit, concretesceret Antiquorum Saccharum super arundinum folia, sed quod fractis calamis earum internodiis cohaereret collachrymas, e quibus vulgare nostrum conficitur. Quandoquidem, hoc modo resinae, gummaeque omnes scisso sui arboris cortice emanant. Alia praeterea huc accedit ratio, quae (ut quidem arbitror) Mannardi ac Fuchsi sententiae prorsus aduersatur. Nam quemadmodum in Apulia, & Calabria manna à Sole tacta, dum arborum inhaeret foliis, partio temporis intervallo in auram euanesceat (ut libro primo diximus in mannae mentione,) eadem sane ratione id Saccharo euenisset, si ex rore (ut ipsi contendunt) concretesset. Siquidem à Sole tactum, rarefactumque facile desiliisset in auram, nec gummium modo concreuisset. Eoque magis quod nusquam legerim in Diosc. nec Galeno Saccharum è foliis Arundinum colligi, sed in ipsis calamis concretum repertum. Quod etiam testatur Strabo l. 15. Geographiae, ubi aperte scribit, in India Arundinem mel sine apibus gignere: non autem quod ex rore in arundine fiat, ut quidam pernicias, ignarusque Medicus mecum contendere, atque etiam, ut suam mordicus teneret opinionem, Strabonis codicem corrumpere non est veritus. Praeterea cum memoriae prodiderint Dioscorides, Galenus, & Plinius, Antiquorum Saccharum durum esse, Salis modo coactum, album, dentibus fragile, ex his coniectare licet, a rore Saccharum nequaquam fieri. Quippe quoniam manna, quae eodem modo è rore concretescit, sal minime refert, nec dentibus fragilis deprehenditur, sed potius mandentibus tenax, & Ceremodo lutescens. Quare crediderim Antiquis Saccharum fuisse tenuiorem, ac praestantiorum illius partem in arundinum Sacchariferarum medulla, quae per internodiorum fissuras exiens Solis calore concreuerat, ut & Saccharum nostrum calore ignis arte concretescit, & addensatur. Quod cum accuratissime perpèderent homines, liquorisque praestantiam agnouissent, à natura edocti hoc arte se facturos existimauerunt. Neque id incallum attentasse videntur: quandoquidem Sacchari integros calamos affumentes, minurum que

incidentes, ignis calore tandem decoxerunt, donec vniuersus liquor, absumpta igni aqua, diu effervescebat in Saccharum Salis modo in vasis fundo concreuerit. Verum etiam Sacchari arte facti nihil meminerint Dioscorides, & Galenus: non defunt tamen qui dicant, hoc etiam ante eos factum esse, Solini auctoritate freti, qui in India palustribus arundinem ita crassam progigni ait, ut fissis internodiis lembi vice vecteret nauigantes, e cuius radicibus dulcem etiam exprimunt humorem ad mellis suauitatem. At qui liquorem hunc, qui ex harum Cannarum radicibus elicatur, Saccharum nostri usus fuisse existimant, procul dubio falluntur, quod Indi non modò ex decoctis Cannarum, sed aliarum quoque arborum radicibus sibi potus parent, cum illius caeli, & Soli elementia, frequentissime sint plantarum radices quae mellea dulcedine imbuntur, ut Strabo testis est loco nuper citato, ubi sic inquit. Nullus annus in India inuenitur vbi tempore sine pluuia. Quapropter contingit annum feracem esse, cum semper terra sit secunda: fructus autem arboreos multos gigni, arborumque radices, praesertim magnarum Arundinum, & natura, & decoctione dulces esse, aqua à Solibus tepesacta, tam celesti, quam fluuiiali. Adde quod ea, quae apud alios & fructuum & succorum naturitas dicitur, apud illos concoctio est: quae tantum ad dulcedinem operatur, quantum ea quae per ignem fit. Sententia nostrae Lucanus quoque suffragatur illud explicans, hoc carmine.

Quique bibunt cetera dulces ab arundinis succos.

Quin etiam Marcus Varro, qui eodem fere tempore claruit, his tribus versibus attestatur, dum inquit:

India non magnis nimis arboribus crescit Arabi.

Illius & lentis premittit radicibus humor,
Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Ex his palam est, hos omnes de factitiis Indorum portionibus, quae iis vini loco sunt, fuisse locutos: non autem quod ex illis Cannarum radicibus Saccharum aliquod pararetur. Quandoquidem & nos è Glycyrrhizae radicibus, quia & è decoctis, pressisque siliquis, sicut & aliis dactylis, dulces elicimus succos ad variam vltus potationes: quemadmodum & Occidentales Indi e pluribus dulcibus arborum fructibus suos sibi parant potus. Sed non ob id dicendum hos liquores, quod mellis dulcedinem praestent, esse mel, neque Saccharum. Nec mirum sane si Indici Arundines radicibus dulcissimum praebant succum, non modò illa magnae: sed etiam quae in nascuntur, nostris fortasse non multo grandiores: cum etiam nostrae recentes mannae, quadaeque ori dulces sentiantur. Quod autem minores Arundines in India radicibus dulces praebant potus, superioribus carminibus explicauit abundè Marcus Varro cui non magna nimis est arbor. In hoc tamen à Solino dissentit: cui arundines, quarum memini, validissimae sunt procerumque. Hinc ergo eorum sententia explosenda videtur, qui credunt ex illarum magnarum arundinum radicibus, Saccharum nostro similis factitasse Indos, quod non quidem Saccharum, sed dulcis inde potus vini loco sibi conficiant. Sed ut suam opinionem auctoritatibus fulciret Manardus Ferrariensis: utque lucidius comprobaret Antiquorum Saccharum, perinde ac mannam, ex rore fieri lib. 9. epist. 4. Auicennam etiam admittit, quem tamen alibi ubique reiecit, ac reproba-

Arundinis
Saccharum

Sacchari
Arundinis

vir, afferens, quod cum ipse huius fuerit sententia, ultimo capite lib. 2. Antiquorum Saccharum mannam vocauit. Quod manifestè declarat Zuecharum *alhasfer* apud Auicennam huiusce arboris esse mannam, vel gummi, non autem Græcorum Saccharum in calamis concretum. Illud insuper nostram comprobat sententiam, quod eodem loco addidit Auicenna, sic inquit. Et in Zuecharo quidem *alhasfer* est cum abstersione pauca stipticitas, & amaritudo. Siquidem austeritatis & amaritudinis, quæ in Antiquorum Saccharo fuerint, nusquam meminere Dioscorides, & Galenus: nec item quod conferret id pulmōi, & aquæ intercui, vt paulò infra voluit Auicenna. Qui etsi dixerit deinde Zuecharum hoc oculorum in oibis, pariterque renum, & vesicæ vitiis auxiliari: non tamen ob hoc dici potest, Zuecharum *alhasfer* esse Antiquorum Saccharum. Sed rectè quidem contra Manardi sententiam, Auicennæ testimonio (cū & ipse hoc in loco Auicennæ auctoritate nitatur) probari potest, quod Antiquorum Saccharum gummi modo collachrymans in arundinibus concreveret, non autem ex rore. Quippe quod is de Zuecharo agens loco nuper citato, ibique Antiquorum Saccharum recensens, inquit: Assumptum sicut gummi ab harundine abstergit oculum. Quibus palam sit, Antiquorum Saccharum, perinde ac gummi, ab interiori medulla exterius emanasse, ibique postmodum Solis ardoribus concreuisse. Verum tamen quod *Alhasfer* apud Arabes sui generis arbor sit, & ab harundine maximè differat, & quod eius Zuecharum, quamuis ab Auicenna manna dicatur, quod fortasse granulis concreuerat mannæ similibus, ex rore haudquaquam fiat, sed gummi modo ab arbore destillet, manifestè ostendit Serapio cap. de Saccharo his verbis. *Alhasfer* habet lata folia & habet Zuecharum quod credetur ab oculis ramorum suorum, & à locis foliorum eius, & colligunt de eo homines rem conuenientem, & in Zuecharo eius est amaritudo, & egrediuntur ab hac planta mala quædam, sicut testiculi camelorum, & quibus liquor quidam emanat adurens, stipticæque facultatis, ad cauteria petidoneus. Et lignum quidem *Alhasfer* est leue, crassum, rectum, pulchrumque, & idè assimilauerunt cantilenarij in cantilenis suis brachia, & etura do ninarum ligno eius: *hæc Serapio*. Ex quibus facillè & Manardum, & Fuchium, viros illoqui doctissimos, hac in re hallucinatos putauerim. Ceterum Fuchius, vt probaret Antiquorum Saccharum è roseo cœli lacte in calamis concreveret, vtque illud à nostrate diuersum ostenderet, dicit, quod cum nostri vsus Saccharum perinde ac mel, calidum reperiatur, sitimque facillè concitet: Antiquorum Saccharum esse non potest, ed quod Galenus suæ ætatis Saccharum id efficere non prodiderit. Cuius tamen sententia (pace sua dixerim) experimento minimè responderet: à quo non discedit Galenus lib. 7. simpl. medic. ex cuius verbis clarum est, quod cum Saccharum melle minùs sit dulce, minùs etiam calidum sit necesse est. Eaque propter asserit Galenus, Saccharum non perinde ac mel, sitim excitare: non tamen quod nulla ab eo sitis excitetur, vti Fuchius interpretari videtur. Quin etiam idem Galenus lib. 8. cap. 4. meth. med. Saccharum inter ea connumerat, quæ febrientibus exhiberi possunt. His igitur rationibus, & auctoritatibus adductus sum, vt certò crediderim Antiquorum Saccharum ab iisdem arundinibus emanare, à quibus vulgare nostrum exprimitur.

Tom. II.

sed hanc tantum inter se differentiam esse, quod à natura factum sit nostrate facticio longe tenuius. Ideoque Auicenna: Zuecharum (inquit) *sabarzed* frigidius est & subtilius. Hoc laudibus extulit Paulus, & post ipsum Auicenna Archigenis auctoritate *sal Indum* ipsum appellans, ad linguæ scabritiem, ariditatemue in acutissimis febribus. Sed eo nos hac ætate, caremus, quod amplius non afferatur: quanquam ego non ita pridem à viris fide dignis accepi, qui *Dini Thoma inf. lam*, itémque Maderam lustrarunt, adhuc illis in locis Saccharum inueniri in arundinibus sacchariferis concretum (illi non dissimile quod arte fit, & candidum cognominatur) postquam ab illis spontè emanarit gummi modo. Quod autem adferri desierit, non aliud in causa esse existimamus, quàm quod hodie paucum admodum proueniat. Siquidem Dioscoridis, & Galeni temporibus quo ad nos copiosum conuehebatur, cum adhuc non innotuisset exprimendi ratio, necesse quidem erat, vt arundines Sacchari liquore pręgnantes, cum annis compluribus adoleuissent, & faciem nunquam expectæ essent, per se liquorem exdarent, veluti innumeris arboribus gummi, & resinæ emanant. Proinde non mirum, si eius à natura facti Antiquis fuerit vberritas. Sed postquam lucri dulcedo, fulgentisque auri sitis docuit homines artem modumque, quo Saccharum concilis, decoctis, pressisque arundinibus copiosius elicerent, factum est, vt Indi quotannis vniuersos inciderint calamos, ac iterum quotannis feuerint, hinc igitur euenit, vt nullis remanentibus, quæ Saccharo plurium annorum ætate turgant, naturæ impedita sit operatio, deperditumque hac de causa sit Antiquorum Saccharum. Cuius vice eo Recentiores vtuntur, quod Officiis candidum cognominant, arte factum, pellucidum, Salis solliciti modo, dentibusque fragile, vt Antiquorum Saccharum vndeque referat. Competit perinde ac illud, scabritiei linguæ, pectorisque asperitatibus. Verum ad hæc id præstantius est, quod in fistilibus, vbi violaceum tulapinum asseruatur, æstate concreuit: ed quod violarum diluti facultate humectet, leniatque magis.

Lobel. in Ic. plant. pag. 49. insectibit Arundinem Saccharinam Indicā, ac de eius Saccharo in Aduers. lib. scribit: Non Indico Sacchato hodie prima laus, tamen ex India primùm in ceteriore Asiam, Rhodum, Cyprum, aliæque non paucaloca transmississent. Nam hodie Canarium & Maderense longè omnibus suauitate & candore excellit: quippe tamen quod Genuam ac Massiliam ex India, Alexandria, & aliis Aphricæ emporiis, Liburnicis Venetias a sportant, sæpius excoctum, candore marmoreo Canarium prouocari: multò tamen suauitate & dulcedine gratissima superatur. Dum enim lixiulo illo acriore, quasi sapone ex calce parato, faculentioris, nigriorisque pinguedinis sordes eluuntur & absterguntur, vber dulcedinis gratioris perit, atque nescio quid rancidæ acrimoniæ inuitur: vnde bilis gignitur, & sanguis vritur, caput grauatur. Quod quilibet nosse potest ex esu vsuque *Thomæ, vberi* vocati, *Sacchari*, ex cognomine Insulæ, sub ipso ferimè Equatore sitæ. Antuerpiam enim & Londinum Angliæ, vbi defæcere solent quidam industrij artifices, si gustes adhuc impurum & rubrum, multò suauius & dulcius reperias, quàm excoctum, lixiuæque & cortinas expertum. Et quia, quæ purius reddant industriæ, cœlant Pharmacopæorum plebem: lubitum est hic monere. In Cortinam seu ahenum, Sacchari Thomæ, vel alterius quantum volunt, immittunt. Lixiuij fortis tota ex cal-

Zuecharum
sabarzed

Sal Indum

Arundo
saccharina
Indica
Lb.

liquidum, quandoquidem vulgare fuit diu ante Galeni tempora, ut apparet ex Marco Varrone, qui eius meminit, is vixit tempore Caesaris, ante Adventum Christi, Statius meminit etiam Sacchari arundinacei: Lucanus Poeta meminit etiam Sacchari molliis. Serabo meminit utriusque. Scribit etiam Solinus de iucco expresso ex radicibus Arundinis.

Synon:

Arundinis saccharinæ hæc sunt Synonyma nota. Dicitur C. Bauh. in pin. *Arundo Indica* 2. vel *Saccharifera*: *Arundo* 8. vel *saccharata*, Dod. gall. *Arundo ex qua Saccharum*, Cord. in hist. *Arund. saccharata* Dalech. in Diosc. *Sacchari Canna*, Gesn. hort. *Arundo Saccharina Indica*, Adu. Lob. Icon. H. Lugd. *Canna mellea*, Cæf. *Arundo & Calamus Saccharinus*, Tab. *Calamus Indicus*, par. 6. Ind. Or. c. 19. *Calamus Indicus Saccharites*, & *canna Saccharina*, in hist. Ind. Orient. part. 4. 5. & 6. cap. 38. & Hist. Occid. Ind. part. 3. 4. 8. & 9. De Sacchari differentiis & conficiendi modo, in nostris in Matthiolum notis, & lib. de comp. medic. egimus: Vide & Munsteri Cosmograph. l. 2. c. 91.

Locus:

Loca in quibus Saccharum provenit præter supra allegata, hæc passim annotantur: Insula Maderæ, quæ Oceano Atlantico innatat è regione Mauritanix: Insula Hispaniola: Insula S. Mariæ, Terra sancta, Vrbs felicitis Arabiæ Zibith, Sumatra, Brasilia, & Regnum Concha. Ex Arundinibus in aqua decoctis huius ætatis Saccharum in Sicilia, Creta, Rhodo & Cypro Insulis, ac etiam in Ægypto exprimi refert Matthiolum. Arundo Saccharina in nostris regionibus, (inquit Tabern.) raro propter frigus perficit florem, eam Arundinem primò vidi Francofurti in horto Pharm. Adami Kechen qui per aliquot annos eam aluit, sed tandem asperiore hyeme ei periit: ex eius radicibus & medulla excoquitur Saccharum in India, Arabia, Ægypto, Canariis insulis, in Insula Madera, Maltha, Cypro, Sicilia & S. Thomæ. Lobel. Orbi Europæo iam multis ad Mediterraneum Oceanumque tractibus inquilina: ut Hispanicis, Lusitanix atque amœnissimis Olibæ in Galloprovincia viretis, non procul & ex Adverso Stæchadibus insulis, quem virentem inibi & alibi habuimus, & in Belgio meminimus. Panguntur talem imæ radici abscissæ, atque bellè primò proficiunt in Gallia & Belgio, sed hyemis sævitia enecantur, humentis soli, sed tepidioris æris, & auræ alumnæ ac amaliæ.

Vires & u. sus. Diosc.

Galen.

De viribus & vfu Sacchari ita Dioscorides, Saccharum alio est idoneum, & stomacho vrile, si aqua dilutum bibatur: vexata verò vesicæ renibusque auxiliatur: quin & illitum ea discutit, quæ pupillis tenebras offundunt Saccharum Indicum & ex Arabia felici confectum Galenus minùs suo dulce statuit, sed similes ei vires attribuit, quod ad abstergendum, desiccandum, & digerendum pertinet. Quatenus verò nec inimicum ventriculo est, nec sitim adferens, eatenus ab illo substantiâ differre scribit lib. 7. simpl. medic. Ast 8. meth. med. cap. 4. Saccharum inter ea connumerat, quæ febrientibus exhiberi possunt. Saccharum (teste Tabern.) temperatæ est naturæ, calidum & humidum in primo ordine, primariò quidem *Maderiense*, *Canarium*, & *Melissum*, & ad Mel quàm proximè accedit. Similiter & *Finum*, quod non ita dulce, igneam & acrem, ex lixivio calcis, quo præparatur, assumit qualitatem, quâ *Th. meum* etiam superat, ideòque sitim causat ingentem, ita ut ad internos vsus inutile reddatur, quamvis vulgus Medicorum (quoniam præ cæteris candidissimum sit) magno errore

Tom. II.

contrarium teneat, optimùmque esse diiudicem. Quapropter eligatur semper vel Maderiense, vel Canariense. Saccharo cibi austeri & acidi corriguntur: saliti nimium attemperantur: crassi, attenuantur: ingrati verò suaviores redduntur. Emendantur, ut paucis multa complectar, Saccharo omnia, quæ medium excessere in culina. Quid namque aciditate & acrimonia præcellit acetum. Attamen nihilominus hocce virtus eius infringitur. Nec Pharmacopœi sine hoc suo (ut vellent & continuo deberent) officio satisfacere queunt. Nunc enim Electuaria, Syrupos, Iulepos, portiones, vina, conferuas, condita, succos, ac omnis generis confectioes, tabulas, panes Martios, & cætera, Saccharum ingreditur. Nunc quantum requirit omne genus animalium, volucres cœli, pisces maris, & pecora & reptilia terræ, & si quæ alia excogitari possunt, quæ ex Saccharo quotidie efformantur, ac variis coloribus depinguntur. Nunc quantum semina & fructus, Pinci nucleï, amygdalæ, auellana, pistacea, Citreum, Cinnamomum, Coriandrum, Anisum, Fœniculum & similia, quæ eodem obducuntur. Quæ quidem ut plurimum luxui, nocturnis potationibus, intempestivis conuiviis magis abdicantur, quàm salutaribus medicinis. Sed quid prosint, experiuntur Magnates, qui gravissimis morbis subito nonnunquam corripuntur, symptomatibus periculosis continuò vexantur, simulatque sæpissimè morte ipsa extinguuntur. De quibus qui in acie & præliis potatorum versantur, multò certius, quàm ij, qui in umbraculis, & extra sciphi iactum (ita dicere liceat) vitam degunt, testimonium reddere sciunt. Spontaneæ igitur lachrymæ sunt, quibus nobismet ipsis ventriculum, Heparque afficiunt, ipsumque adeò totius corporis temperamentum labuertimus, vitamque ipsam ante deperdimus, quàm constantem ætatem attingimus. Hac ergo ratione media hæc à Deo Bonorum omnium autore ad vitam conservandam concessa, non media ad vitam, sed media ad mortem, efficiuntur.

vsus in cibo
luna.

vsus in
medic.

Luxui
dicatur.

Saccharum Maderiense moderatè in cibo & Sacchari potu vsurpatum, purificat sanguinem, spiritus Maderiense recreat, membra corroborat. Per se quoque, aut si viret. a modo dicto, assumptum, ad viria thoracis & pulmonum vrile. Proficuum arteriæ asperæ contra raucedinem. Commodum quoque internis apostematibus, lateris &c. thoracis vlceribus, Tussim sedat, ventrem emollit, præsertim verò infantum. Doloribus thoracis medetur. Biliosi & IctERICI, extra medicinam euntent Saccharum, id enim faciliè in bilem mutatur. Adhuc obest omni vitio, quod à bile originem suam traxit. Infantes si plùs de Saccharo ingerant, lumbrici non raro in ijs gignuntur. His itaque non nisi urgente necessitate, aut saltem minùs administretur. Non assentiendum iis, qui existimant Saccharum intestinorum obstructionem parere, quandoquidem abstergit & mundificat. Salutare admodum est renum, vrinariorum meatuum, & vesicæ affectibus. Non tantam, ut mel, sitim excitat. Dentibus valdè nocuum. Non enim nigros duntaxat reddit, sed & putrescere, vacillare, atque excidere facit. Quare sibi consulunt ij, qui assumpto Saccharo, os aquâ frigidâ eluunt. Ex frigidâ quoque haustum, raucam emendat vocem, à calore orram. Contra tussim siccam, sitim & asperitatem faucium: æ. Sacch. vnc. j. Aq. frigid. mensur. j. Decoq. ad consumpt. tertiæ partis. De hoc decocto bibe quantum lubet. Si præstantius desido-

Yy 3

deras. Adde drach. ij. Liquiritiz minutim incise: vnc. f. Vuar. Corynth. Bull. mod. dicto, percolen-
tūque, seruetur ad vsum. Saccharum hoc lacti re-
centi ad Iulepi consistentiam incoctum proficit
iis, quibus vitriolum aut alumen fuit propinatu.
Noxam enim eorum corrigit, quā post se relicta
intestinum omne laderent. De hoc bibet quan-
do volat. Medicina hæc, non vulgaris est antido-
tus contra tussim etiam infantum, si ad sitis vsq;
extinctionem ipsis de hac haurire concedatur.
Nunc in puluerem redactum & cum vnc. iij. Ol.
Amygd. recent. exprell. commixtum ebibitum
Colicam sedat. Oleo verò Rosar. aut Butyro rec.
mistum & epotum sanat omnes internos affectus
ab assumpto alumine, Vitriolo, Cantharidibus,
eiusdemque generis acerbis & erosiuis rebus ex-
ortos. Aduersus capitis, cerebri, thoracis & ven-
triculi dolorem à frigore profectum. ꝛ. Sacch.
Maderiensis vnc. viij. Rad. Ircos vnc. f. Zingib.
drach. ij. Galang. Maioran. Calam. arom. ana.
drach. i. Nucis Mosch. Cubeb. Cardamom. Cinnā.
el. Mentis. risp. Garyophyll. ana drach. f. Piper.
long. scrup. i. scorsum in puluerem subtilem re-
digatur. Cetera simul conterantur quā dili-
gentissimè, traicianturque per cribrum angu-
stissimum, ac misceantur. Fiat Tragæa, seruetur
in scatula ad vsum. Huius Tragæa manè ieiuno
stomacho cochlear vnum pane in vino prius ge-
neroso madefacto, exceptum, ac commanum, ca-
lescit refrigeratum caput, cerebrum, thoracem,
pulmonem, ac ventriculum, corroborat memo-
riam, & cor atque principaliora membra, sen-
sus adauger. Pectoris angustia medetur, & tussis
frigida. Anhelitum commendat, hilaritatem in-
ducit, appetentiam excitat, concoctionem iuuat,
absumit humiditates, status dissipat, neruoso ge-
neri conducit, renibus prodest, obstructions
hepatis & lienis reserat, naturalem colo-
rem inducit. Saccharum Maderiense subtilissi-
mo modo puluerisatum oculis inspersum obscu-
ritatem visus depellit, eosque lucidos reddit. In
frustula parua fractum, carbonibus impositum,
fumusque naribus exceptus, capitis lictis ca-
thartros, emendatque Coryzam. Contra linguæ
ranulam ꝛ. Sacchar. fini, Aluminis, viridis æris
ana. vnc. f. f. pulu. subtiliss. quem cum melle in li-
nimentum rediges, quo sæpius illines ranulam et-
iam inueteratam. Ut dentes conserues, Saccha-
rum hoc puluerisatum, cum melle commisce, & eò
sæpius dentes frica, quo facto aqua frigida os
collue.

Sacch. Ca-
marinum.

Ad vinum
clarum
reddendum.

Saccharum Canarium cum æquali portione
salis vsti puluerisatum, & cum oleo communi
decoctum, eoque mentum instar saponis lotum
barbam producit longam. Idem in puluerem
redactum, vlcera sanat, bis in die inspersum. Vi-
num turbidum sequenti ratione clarum reddes.
Accipe pro quolibet dolio Sacchari & Aluminis
vnc. viij. hæc diligentissimè simul puluerisata, & in
vino clarificando dissolue, eidemque infunde,
bacilloque foraminulento illud agita: hinc vas
ad 14. dies occlude, posteaque in aliud transfun-
de, & vinum clarum cognosces. Euaporatum verò
ita corrige: ꝛ. Sacchari pulueris. lb. f. Rasuræ
cornu cerui vnc. iiii. Quæ miscendo impones in
lintheum sacculum. Posthæc vino superinfunde
mensuram vnam lactis recenter mulsi, agitando
strenuè vinum baculo iam dicto. Quibus ita per-
actis sacculum indito, vasque fortiter obrurato.
Præstans in vindemiis sic effice. ꝛ. Sacchari iam
sæpius dicti vnc. xvi. Polypodii, Macis, ana. vnc. i.
Quæ contunde grosso modo, misce ac in succu-

lo include, vinoque cum elaboratum est ad 14.
dies iniice, vas verò diligenter occlude.

Aqua Saccharea in multis morbis vicem po-
tūs ordinarii supplens. ꝛ. Sacchari vnc. viii. Aq.
frigid. lb. vii. coq. igne lento, ad consumptionem
medietatis, percoletur, serueturque ad vsum, A-
qua hæc pro sitis vehementia ebibita, medetur
Cararrhis, raucedini, tussis, Orthopnææ, Pleuri-
tidi, affectibus calidis pulmonum, æstuantis ven-
triculo, & eiusdem generis imbecillitatibus.
Prodest insuper febre Ephemera laborantibus. Si
infantes quoque laborent, nutrices non alio,
quàm de hoc decocto bibant, quod illis admo-
dum salutare. *Alia in Cararrhis: ꝛ.* Huius deco-
cti lb. iiii. Succ. Granator. acid. vnc. iiii. Vfus eius
vt primæ. Tertia cum Cinnamomo, pro iis qui-
bus interdictum est vinum. ꝛ. Sacchari vnc. iiii.
Cinamom. drach. ij. Aq. fontis lb. vii. Imponantur
simul in cantharum linteo obturatum, suspenda-
tur in aquæ calentis balneo, permittanturque ad
ad minimum duabus horis coqui. Demum amo-
ue cantharum donec ex se refrigeretur, tandem
decoct. percoletur, serueturque ad vsum. *Alia*
pestilentialis quæ non solum sitim sedat, sed ipsi
veneno resistit, facultatēque vitalem reficit.
ꝛ. Sacch. vnc. vj. Succ. granat. acid. Cydon. ana.
vnc. viij. Aq. font. lb. viij. Ponantur vnā in vas la-
pideum in balneo aq. calentis per dimidium ho-
ræ, coletur ad vsum. *Quinta* ex pluribus com-
posita aduersum dispnæā, angustiam pectoris &
obstructionem pulmonum. ꝛ. Sacch. vnc. v. Vuar.
Corynth. bene lot. vnc. j. f. Sem. scoric vnc. f. Pa-
pau. alb. vnc. j. Sumit. Hissop. Saluæ, Viol. mart.
ana. M. i. Capill. Ven. p. j. Iuiub. rub. & nig. ana. n.º.
xii. Dactyl. mund. Ficus ana. n.º. iiii. Liquirit. rasc.
Sē. Anisi, Cinā. an. vnc. ij. Rad. Helē. 3. f. Incidend.
incidatur vasiq; cum Sacch. indantur, affundan-
tur aquæ duæ vel tres mensuræ, vas quoque ipsū
obturetur, ac balneo aq. calentis imponatur ad
hores 4. post vbi frigefactum fuerit, coletur ser-
ueturque ad vsum. Hoc quoque in loco vinum
illud Saccharatum nobis recludendum venit,
quod ꝛ. vini optimi vel Cretici lb. iij. Sacchari
albissimi lb. ij. Coquantur ad lentum ignem mo-
re Syrupi, serua & vtere cum duabus partibus a-
quæ vel aliter, vt vsu: postulabit. Senibus, frigi-
dis & debilibus conuenit, & quibus humor na-
turius, & calor naturalis imminuuntur: nutrit e-
nim & sanguinem generat, & replet partes prin-
cipales spiritibus. Syrupus saccharatus & eodem
modo paratur, & iisdem viribus pollet.

Vinum
saccharatum.

SACCHARVM CANDVM.

CAP. CCL.

Sacchari candi duplex genus in Officinis ha-
bemus. *Prins* & præstantius candidum est,
forma & facie salis gemmæ aut Crystalli splen-
dicans, nec vti Saccharum vulgare ita facile dis-
solubile sub lingua. *Alterum* obscure rufum est,
obiter splendens & velut per scintillas, prædicto
fragilius, quippe cui duritie haud parum cedit,
dulcore alioqui non inferius. Sed Saccharum
Candi inter reliqua omnia præstat, cuius con-
fectionem talem docet Tabern. Maderiensis
Sacchari purissimi libræ viginti plus minus in
minutissima frusta confringuntur, postea rerun-
tur, & in Caccabum aut aliud simile vas com-
modum immittuntur, superfusaque aqua fonta-

tata quantum ad dissolutionem sufficiat carbonibus accensis superponitur ad dissolutionem & ebullitionem, quam celerrime fieri necesse est. Etenim si diutius bulliat, flavescit. Quocirca quod parcius aqua affunditur, eo melius & candidius Saccharum efficitur. Saccharo itaque sic dissoluto, ebullito & in Syrupi consistentiam cocto: ad manum habere oportet arce instar, vas fictile oblongum, quadratum, coctum, interna parte vitreatum, ab ima parte interna summa versus suffulturis prominentibus binum digitorum distantia donatum, ita ut propter has veluti scalas angustiore fundo patientiore sit ore. His suffulturis siue scatis sic ordine dispositis bacilli tenues quadrati, duorum eisdem digitorum distantia a se invicem ordinantur atque disponuntur, incipiendo ab imo & progrediendo ad summa usque. Mox Saccharum adhuc bulliens, huic vasi infunditur ut repleatur: Quo facto obtegatur, & prope fornacem collocatur ad decimam sextam aut vigesimam usque diem. Vase tum detecto, maior Sacchari pars Crystalli instar canditata, eleganter bacillis adhærescere conspicitur. Quod restat Syrupi, nec dum condensati, lentè & cautè effunditur in Cacabum, ut denud bulliat. Sed post hanc ebullitionem modicè refrigeratum Saccharum, denud dictis bacillis, quibus iam Sacchari Candi magna pars hæret superfunditur, & in decimam diem uti prius stare permittitur. Quibus peractis omne Saccharum, candidum & clarum factum, baculis adhærescens deprehenditur. Sed ex nullo alio ligno dicti baculi parari debent, quàm ex abietino, pinastrino, aut tædino. His enim dictis lignis facilius adhærescit Saccharum quàm reliquis, quod experientia facile constat: Conditæ namque Saccharo radices aut fructus si doliolo ex abietino, aut aliquo ex prædictis ligno parato, immittantur. Syrupus faciliè adhæret vasis, condensatur, atque candescit, quod in aliis vasis haud ita temerè observaveris. Veneti *Saccharum Candi* ex repurgato Saccharo parant: & candore quidem atque claritate præcellit. Verùm quia istud Saccharum cum lixivio decoqui ac depurari (ut illi putant) solet: fieri nequit, quin istud Saccharum acrem, adurentem & feruidam quandam qualitatem acquirat, atque ob id haud absque damno in internis affectibus præscribi queat. Satiùs itaque fuerit, si ex laudatissimo Maderiano Saccharo paretur: quippe quod candore & pulchritudine priori neutiquam cedit, dulcore verò haud parum superat.

Preparatio A Venetis autore Lobel. sic paratur *Saccharum Candi*. Primæ notæ Sacchari accipiunt vicinas, tricenarve libras, pauca aquula fontana, ut liquefcat, faciunt: & ne multum in multa aqua bulliat (nam flavesceret) & quia parum aquæ inest illic in crassum syrupum abit. Tunc arundinaceos bacillos, aut ridicas pusillas, quas prius cancellatim, decussatimque ad ollæ imum, & latera aptarint, mergunt Saccharo, Syrupove calente, & vas paulò superius, quàm medio tenus opplente, multum involutum bombace densa, vas cella, aut Officina calefacta reponunt super assere, semimense aut viginti post diebus aperiunt os, & nondum concretum syrupum prius effundunt, repente affusa calida, ad syrupi eluendam pinguedinem. Quà denud & illic affusa, reponunt quovis calidiore, aut quovis alio loco: extractoque eodem die aut biduo vase, pellucidi candoris crystallinas bacillis aggestas habent glebas, multò durissimas, quàs citius vres, quàm liquefacies igni, nisi liquoze addito.

Tom. II.

Nostratè Candum etiàmque vulgatum Saccharum abstergit, oculisque prodest. Sacchari Veterum vice Recentiores utuntur (inquit Marth.) quod officinæ *Candidum* cognominant, quod pellucidum Salis fossitij modo, dentibusque fragile, competit, veluti Antiquorum, scabritiei lingue, pectorisque asperitatibus. Verùm ad hæc id præstantius est, quod in fictilibus, ubi violaceum Tulapium asseruatur æstate concrevit.

Saccharum Candum, arte præparatū quo utimur pro Veterum Saccharo, ignotum fuit (putat ita Tabern.) Veteribus & Recentioribus Grecis Medicis, ac nullus eorum meminit præter Nicolaum Myrepsium, qui nominat *κandy*, alij legunt *κάνδυ*, Lat. dicitur Saccharum Candum, Candium, Canditum, Crystallinum. Hyeronimo Montuo *zaccharum* & *Saccharum lucidum*: Hermolao *Saccharum Cantium*, Germ. *Candi Zucker* / *candi Eißzucker*, & *crystallinzucker*: duplex est, unum pulchrum clarum lucidum instar crystalli, quod præparatur ex Maderiano aut canarino Saccharo: aliud rubrum, rufumve quod ex Thomassino Saccharo paratur.

Sacch. Candi
lucum.

Pro Veteris
Saccharo
paratur.

Nomina

SACCHARVM CANDVM violaceum.

CAP. CCL.

Purpureum violaceum æquè pellucidum, sed pulcherrimum, nec minus utile, solis Venetis, dum illic ageremus, notum, sic paratur. Sumito, exempli gratia, Sacchari finissimi lib. 6. liquefcat & bulliant quàm fieri potest paucissima aqua, donec ad tabellarum electuarij crassitiem deducatur. Tunc affulis vnciis 24. expressionis coactæ compendiosæ, & recenseductæ ex frigida & violis contusis: aut potius violacea stillaticia (ne vires colorve deleatur) recrudescat, seu (ut illi loquuntur) decoquatur, ut recedat ad Syrupi superioris simplicis Candi crassitiem. Festucis, olla, & eodem loco & modo paretur elegantissimum Violaceum. Dum Saccharo percocto miscetur Violarum dilutum, vel expressio purpurea, qualem diximus, addendo aliquot guttas succi Limonum, viuidiore colore & limpidiore diaphano placebit. Denique utilissimum simul atque fragratius, curabimus parandum, additis drachmis duabus Iridis candidissimæ lacinia involutæ, quæ amica societate, solita est Violæ fragrantiam & gratiam, tum addere, tum excitare, nec parum sic Arteriis commodi adferre. Sic decet nitidum Pharmacopœum parare, nec perpetuò, quasi misellus foret servitor, Seraphico Vercellenti radiato Apollini auscultare, qui imperat vas condendum & obruendum sterquilinio, ut fermentando & putrefaciendo (forte & ipse persuasus à Theophrastinis stercoribus Philolaphis, suaves imbibat penitus fragrantias & vapores, stercoribusque adsciscat spiritus.

Blauer Candizucker (vocat ita Tabern.) *weyel candizucker*. Saccharum Candum cœruleum seu violaceum: paretur hoc modo: Accipe Sacch. finiss. lib. 8. Aq. violac. mart. quantum ad dissolutionem necesse fuerit ut fiat Syr. coq. lenitur ad perfectionem, ut tabulæ fieri possint. Dein affunde succi violac. absque pediculis & cū aq. violar. destillata expressi lib. 3. Iterum coq. ad consistentiam idoneam. Effunde in vas vitratum terreum, ad præsens institutum cum bacillis paratum eo modo, quo iam dictum procedendo.

Preparatio

Yy 4

si verò pellucidum magis & coloratum violaceū parare lubeat, Succo violarum adduntur aliquot guttæ succi Limonum aut Malorum Granatorum.

Vires

Saccharum hoc ruffi medetur, sicut & thoracis atque pulmonum affectibus, à calore exortis.

SACCHARVM PENIDIUM.

CAP. CCLII.

Descriptio

FACTITUM & Penidium est, quod ex Melisso fit, commune verò ex Thomaro, optimum verò ex Miscellaneo. Accipitur igitur Sacch. Miscellanei ad lb. iij. aut quinque, Aq. fortan. q. s. coq. leuiore flamma: parata autem habere oportet albumina ouorum quinque optimè prius agitata, de quibus penicillo quouis saccharum calens aspergitur, permittiturque aliquandiu coqui, donec sordes ouorum albumini adhæreant. His ita peractis Saccharum ab igne remouendū, à quo, ubi bullire cessauit, faeces cochleari tollendæ. Hinc iterum coquendum, rursusque albumine aspergendum, atque faeces demendæ, quod eousque reiterandum donec à spuma & omni impuritate liberum reddatur. Posthæc coletur, iterumque lento igne, attamen per gradus æquales, coquatur, vsque dum ampullas grossas producere incipiat, quibus apparentibus solum aut bacillum teretem, & æqualem in aqua frigida madefactum ad vnciam profundè in calens Saccharum mittito, cumque, vna quod ei adhæsit, cum Saccharo in frigida refrigerato. Quod tum demum perfectè coctum est si induratum facile detrahitur, nec masticatum dentibus agglutinetur: aut quādo eius portiuncula aliqua digitis extremis duobus distracta, in tenuissima quasi fila abit, quæ perpenſa digito, tanquam vitrum dissiliunt. Inde amorum ab igne, ampullisque sidentibus, super marmor, butyro, oleo amygdalarum, aut oliuarum inunctum effunditur, & manibus vel inunctis, vel amyli polline aspersis, ne adhæreat comprehensum, ex alto paulatim comprimendo, & fricando hinc inde demittitur aliquoties: tandem, ubi paulum refrixit, ferramento vincto parieti infixio obuoluitur, idque tantisper, dū bene lentum & candidum efficiatur. Quo autem diutius trahitur, eò candidius redditur. Tandem attractum famulis distribuitur, vt distrahendo torquendoque formetur modo consueto. Formatum reponatur loco calido.

Nomina

Medici Græci Sacchari huius non meminerunt. Nostri autem dicitur, *Saccharum penidium*, *Zuccharum penidium*, & in plurali numero *Penidia*, *Penidia*, & *Penidis*. Andrea Bellunensi *Alfenid*, & Matthæo Syliaticeo *Alferud*. Germ. *Zuckerpenid*, *penid*, & *Penidzucker*, ac etiam *getrechter Zucker*.

Vires

Mediocriter calefacit, emollit & humectat. In cibo & potu, aut alio quolibet modo vsurpatum, asperitati, tussi, & raucedini medetur, tumores emollit. Saccharum penidium puluerisatum & in cibis assumptum iis conducit, qui ex diuturno morbo macie confecti sunt, vt etiam phthisi & hætica febre laborantibus, si vnc. iij. aut quinque Sacchari cum mensura vna lactis asinini recenter mulsi sumant. Quibus pulmones laborant sine febre, iis continuò prodest Saccharum hoc cum lacte ebibitum. Paratur etiam ex hoc Electuarium pro variolis malè affectis collo, arteria

aspera, & pulmonibus. *Æ. Sacch. penid. in polineum redact. vnc. j. Mucilag. sem. coron. Gummi Arab. puluer. ana vnc. i. Misc. cum Syrup. lub. q. s. subinde sumant ægri etiam infantes de hoc El. medium cochlear.* *Æ. Saccharum penidium pulueris. cum butyro recenti. f. El. pro iis qui ex Alumine, Vitriolo, aut aliis acris & erosiuis assumptis offenduntur.* Saccharum penidium in la- & receti dissolue, eoque in Angina ad tumores emolliendos loco gargarismi vitior. Fit quoque aqua Sacchari penidi decocta, hoc modo. *Æ. Sacch. penid. vnc. v. Ap. font. l. viij. Decoq. igne lento ad consumpr. medietatis: coletur, serueturque ad vsum.* Inferuit autem ariditati arteria aspera, raucedinē emendat, sitim extinguit, tussim sedat promouet secretum, ventrem emollit, phthisicis utilis.

*Barro-
car.
Zac peni-
di decocti,
in aqua,*

Habetur tandem & Diapenidion sine speciebus calidis apud Nicolaum, quod *Æ. penidiorum vnc. ij. drach. β. Pinearum Amygdal. dulc. Sem. Papaueris albi ana drach. iij. scrup. j. Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis, Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli, Sē. Cucurbitæ, Sem. Citrulli, sem. Cucumeris, Sem. Melonis ana drach. j. β. Caphuræ G. vij. Sacchari albi quantum sufficit.* Fiat electuarium. Valer aduersus omnem thoracis noxam, tussim, vocis iacturam: tabidis denique & purulenta excreantibus succurrit.

SACCHARVM CANDVM ROSACEVM.

CAP. CCLIII.

EX Saccharo Maderiensi, aqua Rosarum distillata, & succo rosarum Zuccharinarum expresso paratur, eadem omnino ratione, quā Saccharum Candum violaceum, pulchrè rubens & pellucidum, maxime quidem si nonnihil succi Limonum aut Mali Citrei Saccharo superaddatur. Sedat sitim, confortat ventriculum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistit putredini, pestilentia & ventositati: Tabern.

*Descriptio
& prepa-
ratio*

SACCHARVM CANDVM
Cinnamominum.

CAP. CCLIV.

Eodem penitus modo fit inquit Tabern. quo Saccharum Candum, nisi quod aquæ communis loco, cinnamomea destillata recipiatur ad dissoluendum Saccharum, ac præterea olei Cinnamomi parum immisceatur. In affectibus frigidis thoracis & ventriculi commendatur, ac cor roborat & ventriculum.

Vires

SACCHARVM ALHEISAR.

CAP. CCLV.

Zuccharum alhusar, vt videre est apud *Quid sit* Auic. est Manna cadens super Alhusar, similis grumis Salis: parum, autem abstergit, austerum est & amarum: confert pulmone & aquæ intercuri, Oculorum morbis, pariterque renum & vesicæ vitis auxiliatur. Assumptum vt gummi ab Arundine abstergit oculum. Sed Alhaser, quemadmodum apud Serapionem legimus habet

Aut.

habet folia lata, Saccharum vero prodit ex oculis ramorum iuxta folia, quod colligitur, amarumque est: Huic plantae sunt Mala quaedam, veluti testiculi Camelorum, e quibus liquor manat adurens; austeraque facultas ad cauteria peridoneus: lignum eius est leue, crassum, rectum, pulchrumque, & idem assimilauerunt Cantilenarii, in cantilenis, brachiis & crura dominatum ligno eius.



Manardus ut comprobaret Antiquorum Saccharum perinde ac Mannam ex core fieri, Auicennam admittit, teste Matth. At nos qui huic opinioni minimè adstipulamur dicimus Alhufar siue Alhasser (ut Bellunenſis calligauit) nullo pacto Arabica lingua, Arundinem significare, sed aliam Aegypti & Arabia arborem. Quod Alhasser apud Arabes sui generis arbor sit, & ab Arundine maximè differat, & quidd eius Zacccharum, quauis ab Auicenna Manna dicatur, quidd fortasse granulis concreſcat Mannae similibus, ex core haudquaquam sed gummiu modo ab arbore distillet, manifestè ostendit Serapio.

TYPHA PALVSTRIS MAIOR.

CAP. CCLVI.

Descriptio Palustris Typha maior, altitudine procerum hominem aequat, vel etiam superat, caule sepe singulari, est ubi pluribus, rectis, rigidis, teretibus, lauibis, longis geniculis articularis: folia cubitos aliquot longa, vnciam lata, ancipiti acie stringentem vulnerant, crassiuscula substantia spongiosa, longissima vagina caulem involuentia, sapore subdulci, quorum alia statim a radice oriuntur, alia e cauthum geniculis: Ceterum caulis fastigium tomento in cylindri formam rufescente in pappos tandem abeunse obvoluitur, motionis clauam imitatus, mucrone palmari aut longiore præpilatus. Radix obliquo actu serpit, nouo sobolis pullulatu se propagans, ex albo rufesceus extrinsecus, intus vero niuei candoris veluti ex funiculis multis compacta, a qua frequentes dependent fibrae concolores, sapor denique faruosus est. Oculi vero ex radice primulum emergentes, subdulces, tenericaules.

Diximus inter Frumentacea de Typha, cuius Theophrastus variis in locis meminit. Hic autem de Typha sermonem habemus, quam prim. Historia 8. ex palustribus & in stagnis nascentibus, enoden & planam esse scribit: quamque 4. hist. 2. in lacu Orchomenio nascentes collocat, sine folio, radice haud numerosa. Huic Typhae & Diosc. recordatur, cui florum effigies turbinata, quasi typhonis sese gy-



tantis turbinè, aut gigan-
tis staturam
minacè signa-
ret, nomen de-
disse videtur.

Hanc Ty-
pham & Pli-
nius (Cornario
nobis attestan-
te.) C. tamen
Bauhinus cum
lib. 16. cap. 36.
inter aquaticos
Calamos de
hac Plinium e-
gisse scribit) &
Galenus, &
Paulus, & A-
etius in Simpl.
censu prætere-
runt: credo e-
quidem: de
græcis, quidd
multa alia ha-
berent, quæ
cū vsum præsta-
rent, quem Dio-
scor. de Typha
flore prodidit.

Nota est ho-
die Typha per o-
mnes ferè palu-
des & stagna oc-
currens, Germ.
Bolben simpli-
citer vocant, id
est, clauas, a si-
militudine vide-
licet ad ipsas, a-
lii Mosbolben à
natali loco ap-
pellant. Alii
Rönchbolben,
ab ipsa formata-
lii Warrenbol-

ben, hoc est, clauam stulti, alii Ließknospen,
Belg. Lieschdoden & donsen. Gall. Masse de: ne.
& simpliciter Masses appellant, & appositè qui-
dem, inquit Ruellius: Galliarum Massæ dixe-
runt, quidd sceptræ regum Massæ vulgò dictas,
perpolius caulis lanosa floccorum densitate
summatim fastigiatus æmuletur. Hetruscis Mar-
thiolo authore Marzæ s. de dicitur, quidd eius
lanugo, si in aures decidat, surditatem attuleret
Hisp. Borda, seu lanco Amac. rogaro. Angl. cattis
tayle & recde male.

Tragus Typham aquaticam inscribit, ac Pli-
nium lib. 16. cap. 36. inter aquaticos Calamos hu-
ius Typhae mentionem fecisse suspicatur, cum
hunc in modum scribit: Ceterò gracilitas nodis
distincta: leui fastigio tenuatur in cacumina, cras-
siorè paniculae coma, neque hac superata. Aut
enim pro pluma strata cauponatum replet: aut v-
bi limosiore callo induruit, sicut in Belgis, con-
tusa & interiecta nauium commissuris ferrumi-
nat textus, glutino tenacior, rimisque explendis
fidelior pice. Ad hoc autem credendum induxe-
runt Tragus victores Germani, qui doliorum
commissuris fideliter & tenaciter coniungendis
Typhae folia adhibent, maximè eius quæ in cau-
lem haud dum exiit. Vocant porro ea folia

A Galieno
Paulo, &
Aetio. emigra-
ta.

Nomina
linguarum.

Calamus
aquaticus
Pluma.



SPARGANIVM QVIBVSDAM.

CAP. CCLIX.

Numerosis fibris capillata radice nititur, folia tum à radice exorta, tum à caule, Typhinis similia, catinata, striata, acuta, elatiori dorso strigentis manum infesto vulnere scindentia, gustu nonnihil dulci: caule cubitalis & altior, teres, tortuosus, inæquali ramorum diuicatione brachiatus: flores

tuberculis ramorum, nullo pediculo, adnascuntur, aspergillum imitati, radiatis in orbem staminibus albidis apiculis fuscis sustentibus constantes, nullo relicto, fructu semineve caducis, alibi enim nascuntur, pilule echinatae Plani, ex conalis singulis singulos acinos continentibus



glomerata.

Plantam hanc a Germanis Riedgras appellatam Tragus Sparganium Dioscoridis esse iudicat. Eius figura nobis non placet: pulchriorem habet Matthioli, qui & ipse in prioribus commentis Sparganium Dioscoridis Galeni constituerat in postea tamen commentis Ital. reuocat in dubium an sit Sparganium, aut iniquius, ut vult in Aduers. Lobelius, qui Commentatorem illius non fuisse scribit reuocandi in collectione literæ, sic habentis: spina ad terram inclinata magis, vel procreantibus. Cæcilius in Obs. p. 41. & Icon. p. 80. picturam habet sub titulo Sparganii & Butoni Theophrasti.

Cord. in Diosc. Sparganium vocat Germe de genfradi, dicitque alibi Gladiolum à Veteribus etiam vocari.

Dodon. gall. Butoniam inscribit: Lat. Platanariam seu Boutonion. Platanariam quidem à fructuum cum Platani pilulis similitudine nuncupat. Non desunt qui Calamagrostin Dioscoridis esse velint, sed male.

Sparganium Diosc. apud Matthiolum bonam figuram esse testatur Anguillara: veram quantum ad eius descriptionem abest, vel solus pilularum situs ostendit, quæ non est à radice, sed in summo caulis modo, sed & multo infra eius fastigium & alibi quoque exoriuntur. Plus similitudinis Platanaria cum Germe habet, cuius Theophr. lib. 1. & 4. De stirp. Hist. sepius meminit, quodque ait locis palustribus exire, foliis multis angularibus, larundini ac Cyperi similibus: caule, qui æqualitatem peculiarem sortitus sit, & fructu nigro, Sidæ magnitudine proximo. Huius Butoni mentionem facit Democritus. Geoponicæ, Cassij Dionysii lib. 2. ubi ait folia ipsam habere Cyperi, grata bonæ pabulo: unde nomen, Ruellio auctore, accepit. In Greco exemplari habetur: *γέρμα δὲ γενφράδι*, sed pro *γενφράδι*, restituendum *γενφράδι*.

Pro Sparganio hanc plantam admittere videtur quoque C. Bauh. qui in pin. hæc scribit: *Σπάργανιον ἢ γέρμα δὲ γενφράδι*, fasciis, quod foliis eius latis & vitilium modo lentis pro fasciis nutrices videntur: cuius Diosc. lib. 4. meminit: *Γέρμας* Theophr. 4. hist. 8. cui mas & femina, & hæc sterilis. Dicitur hæc stirps Sparganium i. siue ramosum. Sparganium, Trag. Matth. Ang. Tur. Cord. in Diosc. Gesner. Lac. Cæf. Cast. Cam. Tab. (cui & Gladiolus palustris) Ger. Eyst. *Butonion* Theophr. Ang. *Butonion*, Ruell. Dod. gall. Gesner. *Platanaria*, Dod. Thal. *Sparganium* & *Butonion* Theophr. Lob. *Carex*, Lon. *Phleas femina*, Lugd. *Calamagrostis secunda*, Eidem.

Locus palustribus, perennes aquas habentibus exit, ac iuxta rivulorum quorundamque fluminum margines. Pilulas Augusto mense profert.

Locus & tempus.

SPARGANIVM ALTERVM.

CAP. CCX.

Sparganium alterum, non tantum pediculis stercentibus pilulas fert, sed & caulibus aliis eorum rotatim circumpositas transadigit, quibus mollioribus initium barbulum contractabilius muricatis Sparganii prius echinis: à quibus & illud dispertit quod in orbem acti flores glomerati, subsequeantibus capitulis æquales, tremulas staminum luteorum fibras vibrant: eo, in summo scapo ordine ut verticillorum series appareat.

Descriptio



Sparganium alterum (sic etiam vocat Gesner. H. Lugd. & Tabern.) per Lobelium in Obs. p. 11. & Icon. p. 80. exhibitum, plus similitudinis habere quam superiorem, cui Sparganium credit Dodonæus, qui Platanariam alteram inscribit. Cæf. Bauh. in phyt. & pin. dicitur Sparganium non tantum: Sparganium latissimum Gerardii.

Florens, nueni mensis Iulij in stagnis inter S. Cosmum & Bologna Castellum Sanguis.

Locus & tempus.

SPARGANIVM MINIMVM C. BAVH.

Sparganium III. siue minimum, ut author vocat in pin. ab eo in Prodr. sic descriptum reperitur: plantula est vniatrum quatuor, nam radice ex fibellis oblongis componitur, unde cauliculus vniatrum duarum effertur, & in capitulum exiguum subrotundum, cui aliud minus insidet, herbacei coloris & formæ, quemadmodum in Sparganio maiore, desinit circa quem folia utrinque quaternis, vel quina, angusta, canaliculata superantia.

Descriptio

Plantulam hanc D. Fureus anno 1617. transmisit, his ascripsit: Sparganium minimum & se-

meltrale, Northusii in lacunis quibusdam cœno-
lis, quarum partes superiores per æstatem exis-
cantur.

VT RECTA HUIUS LIBRI OBSERVETUR SERIES.

Hic que cum finem constituunt locum esse
debit post Gramen pratense panicu-
latum maius angustiore folio
Casp. Bauh. sicque post
caput 52.

GRAMEN PRATENSE MINUS.

CAP. CCLIX.

Gramen
minus
Lob.
Locus.

Gramen
4. vel
5. Tab.
Descript.

Gramen hoc minus (vt vocat Lob. in Adu.
& l.c. p. 1.) quod montanus vel decliuus, in-
cultus, exuētus & aridior ager, vt pabulo
gratius & vilius velleri, sic multo dedicatius, &
temine efficacius est.

Taberniqui in hist. Gramen 4. facit, & icon.
Gramen minus vocat, sic describit: Medium
est genus inter primum (Gramen repens Came-
rarii intelligo) & secundum (Gramen cum
spica aliquatenus arundinacea:) radicibus paruis,
albis, multis fibris donatis: culmi nodosis, spi-
thameis, aut paullo longioribus, quatuor aut
quinque folia sunt longa, angusta, quorum mediū
nervus percurrit, utrinque acuta, in acumen de-
sinentia: spica quasi ex testucis componitur plu-
ribus, binis semper oppositis.

Est Gramen pratense: Dodon. lat. Gramen pra-
tense minus Gerardo: Gramen pratense panicu-
latum 5. siue medium, Casp. Bauhin. pin. latiore &
angustiore folio.

Gramen

An fortè Gramen tenuifolium hirsutum?

GRAMEN AQUATICVM HARVNDINA-
CEVM PANICULATVM, Tabern.

CAP. CCLX.

Descript.

Radicem transversam agit fibrosam: calamos
crassos, nodosos, Gramine arundinaceo
maiores, alt ipsa Harundine palustri minores:
folia similia harundinaceo Gramini, sed maiora
& longiora: paniculam harundinaceam. Author
in sua hist. facit Gramen aquaticum 4. cognomi-
natque etiam in l.c. Gramen aquaticum harundi-
naceum paniculatum. Gorar. Gramen maius aqua-
ticum. C.B. pin. Gramen paniculatum aquaticum 1.
siue Gramen paniculatum altissimum.

Synonyma

Idem suspicamur cum Gramine maiore aqua-
tico Lobelii. Nec ab hoc sperandum putamus
Gramen harundinaceum paniculatum eiusdem
Tab. de quo infra.

GRAMEN PALVSTRE PANICVLATVM
minus, C. Bauhini.

CAP. CCLXI.

Synonyma
Descriptio

Gramen paniculatum aquaticum 1. (vt au-
tor in pin. vocat,) siue, vt in prod. Gramen
16. ex radice crassâ fibris albicantibus durioribus
donatâ, calamo rotundo, striato, cubitum supe-
rante exurgit, quem folia pallide virentia, latissi-
cula, pedalia, lubaspera inuestiunt: panicula pal-

maris est, rara, ex locustis albicantibus, acris ob-
longis arinatis, composita.

Hæc in dumeris humidis circa montem Gren-
rzacensem prouenit: at in vdis Michelsfelden-
bus, aliis exurgit.

GRAMEN PALVSTRE PANICVLA
speciosa, Casp. Bauhini.

CAP. CCLXII.

Hoc Gramen palustre paniculâ speciosa
quod in prod. 15. est, in pin. verò Gramen
paniculatum aquaticum secundum, ad bicubita-
lem altitudinem exurgit, calamo satis crasso: fo-
lia est paucis, pedilibus, latiusculis, per mar-
ginem asperiusculis, quorum aliqua rubuli in-
star, calamum mediâ ex parte ambiunt: panicula
est jubata, sesquipalmari, ex elegantissimis, par-
uis & subrotundis laminellis composita.

In humidis circa Patavium author collegit, &
in Halliz stagnis reperiri intellexit.

GRAMEN HARVNDINACEVM PANI-
culatum, Tabern.

CAP. CCLXIII.

Radicibus, nodosisque calamis Gramini ha-
rundinaceo maiori comparatur: author: fo-
lia autem sunt latiora, maiora & longiora: pani-
cula quoque multiplicior & latior.

Dicitur Gramen harundinaceum paniculatum, e-
tiam Gerardo. Gramen maius aquaticum Lob.
Icon. Plant. p. 4. Casp. Bauhin. pin. Gramen pani-
culatum aquaticum 4. siue latissimum: Gramen a-
rundinacei alia species Thalii; Loli nonum genus
Trago. Idem & nos esse concludimus cum Gra-
mine maiori aquatico Lobelii.

In humidis & paludosis non raro occurrat.

GRAMEN CARIOPHYLLATA FOLIIS
spica squamata.

CAP. CCLXIV.

CBauhin. pin. dicitur Gramen spicatum pra-
tense 7. siue Caryophyllata foliis. spica
squamata: Graminis loliacei octavi alia perpu-
silla species Thalii, cuius tota plantula palmatè
longitudinem non excedit, radicibus paruis, fi-
bratis, nigricantibus, foliis oblongiusculis, stri-
atis, recuruis ac imbricatis: coliculis tenui, in sua
summitate breuem, squamatarumque spicam con-
tinentis.

Huius figuram Gramini nigro luteo. iunxit
Lobelius in te. Plant. p. 10. sub titulo Graminis
spicati foliis Caryophyllata.

Nascitur locis aridioribus & apricis.

GRAMEN TYPHOIDES MOLLE.

CAP. CCLXV.

Radicem nititur exigua, fibrosa: caulis cubita-
lem & maiorem adipiscitur longitudinem,
nodisue distinguitur: folia sunt pauca, eadem-
que angusta & acuminata: spica longa glumis

ita dense stipata, ut caudam vulpinam præ se ferant.

Dicitur Tabern. descriptionis auctori, *gramen alopecurinum* 1. Lob. in Ic. p. 3. *gramen alopecuroides*: Germ. *gramen alopecuroides minus*: Casp. Bauh. pin. *gramen cyphoides* 1. siue molle.

Synon. Dubitamus an sit *gramen Alopecuro* accedens, & Phalaridi spica longiuscula, folio lanuginoso.

Locus. Secus semitas passim occurrit.

GRAMEN ECHINATVM DALECHAMPII

CAP. CCLXVI.

Descriptio *R*adicibus multis nititur, gracilibus, candicantibusque cauliculis, ex vno cespite multis hoc illuc diffusis: foliis arundinaceo, minore: capitulis in summo caule oblongis, tactu sic asperis, ut echinati videantur: semine minutulo, glutinosa obvoluto. Sapor totius plantæ ex farao subdulcis. Nascitur ad ripas Arares.

An *gramen cauda leporis aspera*: C. Bauh. pin. *gramen alopecuroides sextum*, spica aspera: *gramen echinatum Dalechampi*, H. Lugd. p. 431.

GRAMEN TOMENTOSVM ALPINVM
minus, C. Bauh.

CAP. CCLXVII.

Descriptio *E*X radice parua, inutili, calamus raro dodrantem superans, foliis duobus, tribusve vestitus exurgit, cuius summitati pappus insidet.

Synon. *Gramen* 28. in prod. *gramen tomentosum* 3. siue alpinum & minus, C. Bauh. in pin.

Locus. Prouenit in Heluetia, in D. Bernhardi monte minore ad lacum: in Rhetia Burserus collegit.

GRAMEN PALVSTRE IVNCEVM RACEMOSO semine, C. Bauh.

CAP. CCLXVIII.

Descriptio *F*oliis est paucis iunceis, culmo cubitali, ex cuius summitate, inter bina foliola, veluti racemus paruus propendet. Est *gramen* 35. in prod. In pin. autem *Gramen iuncum* 7.

In aquis circa Francofurtum ad Oderam D. Fleisserus collegit, & anno 1605. auctori communicauit.

GRAMEN IVNCEVM AQUATICVM
maius, Tabern.

CAP. CCLXIX.

Descriptio *R*adicem habet incuruam, minimi digiti crassitudine, hinc inde in imo multis fibris repentem: iunci sunt tenues & angusti, tesquipede alii, quatuor, aut quinque, longis, gramineis, ex nodis prodeuntibus, foliolis conspicui: flores nigro-lutei, iunci communis. In paludosis occurrit.

Locus. Auctori in hist. est *gramen iuncum secundum* Eid. ic. *gramen iuncum aquaticum maius*, groß wasser, binggen gras, *gramen iuncum aquaticum*, Gerardo. *gramen* 74. C. Bauh. phyt. siue *gramen iuncum* 5. & maius. Eid. pin. *gramen iuncum* 7. siue polyachion.

Tom. II.

An forte iuncus foliaceus.

GRAMEN IVNCEVM SYLVATICVM.
Tabern.

CAP. CCLXX.

Descriptio *R*adix magna, fibrosa: iunci siue culmi complures, pedales, nodis distincti, intus rari medullâ referti, extra colore ex nigro viridantes: è nodis siue geniculis prodeunt exigua, ex nigro viridia, graminea foliola: iunci in summitatibus seu in ramulos abeunt, producentes flosculos ærugineos, siue spadiceos.

Dicitur auctori in hist. *gramen iuncum* 1. Eid. ic. *gramen iuncum syluaticum*, waldbingen gras. C. Bauh. phyt. *gramen* 73. siue *iuncum* 4. Eid. pin. *gramen iuncum* 8. siue folio articulo: *gramen iuncum* 1. vel *syluat. nem. rosam*, Tabern. *gramen iuncum syluaticum*, Ger.

An iuncus foliaceus capsulis triangularis, & ædem cum eiusdem gramine triangulo?

Nascitur in humidis, arenosis, vmbrosisque locis, ac in siluis secus vias, locis graminosis.

Locus

GRAMINIS LOLIACEI OCTAVI III. SPECIES, Thalio.

CAP. CCLXXI.

Descriptio *M*inor (secundâ specie) est, breuioribusque ac tenerioribus cauliculis: foliis breuioribus ac strictioribus, spicis item paniculatis, spadiceis, breuioribus ac tenuioribus: Cùmque secunda species per totum caulem à radice usque in cacumen ex geniculis emittat suas paniculas: hæc cauliculo constat in inferioribus partibus enodi, in summitate tantum paucula genicula habente, ex quibus paniculæ binæ, tres, vel quatuor ad summum prodeunt. Panicula autem postquam delinuerunt, decidunt, ac eas subleuantur squamata capitula includentia semen nigrum, paruum, acuminato cuspe præmunitum.

C. Bauhino pin. *gramen arundinaceum* 4. siue panicula molli spadicea minus: *graminis loliacei octauis* tertia species, Thalio.

GRAMEN ECHINATO CAPITVLO,
C. Bauh.

CAP. CCLXXII.

Synon. *Gramen echinatum* 1. siue spica rotundâ c. *Echinata*, vel *gramen echinato capitulo*: *gramen echinatum tribuloides*, Columellæ, C. Bauh. in pin. nobis nondum visum.

GRAMEN SPICA PLANA ECHINATA,
C. Bauh.

CAP. CCLXXIII.

Descriptio *P*lantula palmaris est: radícula ex fibellis albis composita, ex qua foliola capillacea, pauca, vnciam longa, & festuca tenuissima, prodeunt: spicam habet vncialem, planam, quæ ex vtriculis minutissimis aristas acutas emittit: ex Hispania D. Albinus attulit *gramen* hoc spica plana echinata, siue *gramen* 49. in prod. *gramen echinatum* 2. in pin.

Synon.

22

GRAMEN LOLIACEVM MINVS,
spicâ simplici. Casp. Bauhini.

CAP. CCLXXIV.

Descriptio **E**X radice capillacea, cauliculi plures, rotundi, eduri, duarum vnciarum, & etiam semipalmares, f. lili paucis, angustis, & breuibus cincti, exurgunt, quibus spica duarum vnciarum, angusta, Lolio similis, insidet: in agris Monspelienibus frequens est hoc Gramen, quod in prod. est 61. in pin. verò Gramen loliaceum 4.

GRAMEN LOLIACEVM MINVS MULTI-
plici spica, C. Bauh.

CAP. CCLXXV.


Descriptio **H**oc maiori ex parte repit, & cauliculi est multis, vnciarum quatuor, folia paucis, & spica multiplici: cuius vtriculis semen paruum, oblongiusculum includitur. Et hoc, est in in prod. Gramen 26. in pin Gramen loliaceum 5. Monspelii prouenit.

Synonyma

GRAMEN LOLIACEVM SUPINVM
Lobelii, Casp. Bauh.

CAP. CCLXXVI.

Synon.



Gramen loliaceum 6. siue supinum C. Bauhini in pin. à Lobelio in altera Aduers. parte, Gramen phalaroides exile supinum humi sparsum Danicū nominatur, & sic describitur: Gramen pusillum, humile, humiq; sparsum, innumeris duarum triumue vnciarū culmis, torulis spicatis effuse fastigiatis, exilibusque apiculis præditis: Foliola

uncialis longitudinis & latiusculis, crassioribusque culmis pro plantule magnitudine. Radix fusca, cirrosa: Tota albicat herba per fœnicium.

Videtur propè Cronenburgum arcem regiam Selandiæ Danorum, è regione equilis & horti Regi, sabuloso solo ad latus maritimum pone rusticos lares.

**

GRAMEN MARITIMVM PANICVLA
loliacea, C. Bauh.

CAP. CCLXXVII.

Descriptio **E**X radicibus capillaceis, cauliculi plures, rotundi, recurui, altitudine impares, palmo inferiores, geniculari, foliis paucis, angustis, oblongis cincti, exurgunt, paniculam loliaceam, trium quatuorue vnciarum, sed ramosam, sustinentes: locis maritimis circa Monspelium, vnde D. Salzmännus attulit, hoc Gramen, quod in prod. 62. est, in pin. Gramen loliaceum 7. siue maritimum paniculâ loliacea.

Locum
Synon.

FESTVCA IVNCEO FOLIO SPICA
geminâ, C. Bauh.

CAP. CCLXXVIII.

Descriptio **H**æc, quæ est in prod. Gramen festucæ 6. culmo est sesquicubitali, rotundo, genicularo, & ramoso, cuius summitati spica, vix vnciam longæ, molles, rufescentes, aristis oblongis armatæ, ischæmo Gramini villosa similes, insident & semper duæ simul, vni oblongo pediculo insidentes, iunguntur: folia habet iuncea, longa, inordinatè disposita.

Synonyma
Descriptio

FESTVCA SEXTA, THALII.

CAP. CCLXXIX.

Descriptio **P**assim in agris prouenit Hæcynicis, folia brevioribus cauliculis tenuibus, striatis, in cuius summo racematim dependent, palmi longitudine, in tenuissimis & vix visu perceptilibus pediculis, parui quidam membranacei & paleacei vtriculi, quorum exteriores membranulæ rubent, quibus dehiscentibus candidulus flos emicat.

Locum
C. Bauhin. pin. Gramen festuca 9. siue Festuca graminea arvensis minor.

FESTVCA PRATENSIS LANVGINO-
sa, Casp. Bauhin.

CAP. CCLXXX.

Descriptio **E**X radice capillacea, rufescente, folia multa, angusta, pedalia vna cum culmis tenuibus, bipedalibus, foliaceis, molli & paucâ lanugine [culmi potissimam] asperlis, exurgunt: spica est oblonga, angusta, ex glumis oblongis, aristis donatis composita, & quasi in paniculam paruum expansa.

Basilicæ passim in pratis Gramen hoc, quod autor in prod. 68. constituit: in pin. Gramen festucæ 10.

Locum
Synonyma

FESTVCA

FESTUCA DUMETORVM, EIVSDEM.

CAP. CCLXXXI.

Descriptio

Gramini 69. (vt in prod. author vocat) vel (vt in pin.) Gramini festucæ 11. siue dumerorum, ex radice capillacea, nigricante, *culmi* plures, geniculis distincti, paucissimis pilis aspersis, duorum, triumve cubitorum, *foliis* oblongis, angustis cincti, exurgunt, in quorum summo *spica* oblonga, locustis raris, oblongis, cauli proximis, & aristis armatis constans.

Iulio mense in dumetis circa Birsam haud duntaxat, verum etiam in vepribus, locis siccioribus, prouenit.


FESTUCA DUMETORVM FOLIIS ANGV.
Ritlimis, pilosis, C. Bauhini.


CAP. CCLXXXII.

Descriptio

Gramini huic 70. in prod. Gramini festucæ 12. in pin. *radix* est albicans, ex durioribus fibris composita: ex qua *calami* aliquot tenues, vno alterove geniculo distincti, & penè nudi, exurgunt: *folia* sunt breuia, angustissima: laui, mollique lanugine hirsuta: calaminorum summitati veluti panicula, ex *spiciis* pluribus composita, quarum quælibet capillaceo pediculo insidet, multis glumis aristatis & candicantibus constans: prouenit in dumetis circa Cliben.

FINIS LIBRI DECIMIOCTAVI.





HISTORIAE

UNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER DECIMVS NONVS.

DE HERBIS BVLBOSIS ET HIS AFFINIBVS.



FRVMENTORVM quibus opes Cereis constant, affiniūque ipsi Graminum, ac hu rorsus affinitum Iunco-
rum & Harundinum natura indicat a propemodum est: ita connexu rebus, ut immensa herbarie natura syne-
chorum diuisa, palustrium, maritimorum, pratorumque, ac cespitum morosa perquirendo subtilitas simul dice-
retur. Succedant nunc Bulbose planta, caulium simplicitate, s. florūque figurā à distic haud ita aliena. Ac in
hāc quidem specie differentiarumque varietate in immensum propemodum luxurians cernitur natura. Innexis &
hominum cura nouas, omnique priore aq nostro huic Orbi incognitas ac inuisas florum diuisas, Hyacinthis, Bulbo-
codia, Narcissos, Tulipanos, Coronas Imperiales, & eiusmodi tripudiantis natura specimina. Non fuerat sanē
hoc decem in maiorum nostrorum hortis. Crescit profectū cum historia ipsa admiratio natura diuitiarum: quācū-
que copia maior dicenda restat, tanto magis mirari Dei Opt. Max. in creando potentiam, in largiendo & propagan-
do benignitatem subit. Nec dubie superata hoc modo posset videri etiam rerum natura ipsius inuoluntaria, si huma-
ni operis esset inuentio. Nunc verò Dei ipsius Protoplastu fuisse eam apparet, ac cerē diuinam, etiam cum h. mo ariū
mangonio eam variare nouit, nullo industrie miraculo maiore, si verum sateri volumus: sique verum quid in Ma-
gia naturalū insilensibus illis commentationibus gloriantur. Ostendemus ergo & hoc natura munus, & singula, mora
nostro, graphice depingamus.

CAPE SIVE CEPA RVBRA ET ALBA, ROTVNDATA AC LONGA.

CAP. I.

BVLBORVM, |
quantū vfi-
piam est in naturē
ditione, notissima
Cepa est, cuius ra-
dix acerrima, oculo-
los mordicando
lachrymas elicit,
ex tunicarum in-
uolucris contexta,
modò rubra [po-
tissimum tunicae
exteriores,] modò
alba, interdum or-
bicularis, aliās bul-
bo longo, pendulis
ab imo fibris al-
bis. Folia pedalia,
fistulosa, parum a-
crimonia videntur
radici cedere, si re-
centia fuerint:

sustinens florum caput pugni magnitudine, semen an-
gulosum acutum.

Iam olim Theophrasti & Dioscor. duo, magnam
Ceparum varietatem, ē locis, colore, magnitudine,
acrimonia, teneitudine, variōque mangonio peri-
ta fuisse constat. Ita namque Theophrast. scriptum
reliquit. Ceparum [?] genera plura, ut quae a locis nomina acce-
pere, Gardia, Gnidia, Samothracia: item Seranica,
& Fissiles, & Ascalonica. Ex his Seranica mi-
nimax, sed largae, dulces: Fissiles verò & Ascalonicae
tum cultu, tum natura inter se differunt: fissilem ete-
nim hyeme suā cum comā inertem relinquunt. Ve-
re externa folia detrahunt, & reliqua colunt: detra-
ctis his foliis, altero germinant. h. uolūque inferius
finditur: vnde fissiles appellatae sunt. Quidam vel
omnibus detrahenda folia censent, ut vim suam imo
contineant, neque effusa feminefcant. Ascalonicae
peculiaris quaedam natura notata est: etenim solae
fissiles, & quasi steriles ab radice consistunt, nec ea
parte crescere, ac proficere possunt: quamobrem
non eas deponunt: sed semine serunt: cum deinde
germinatum sit, transferunt. Perficiuntur aded ce-
leteriter, ut cum ceteris, aut etiam prius euelli pos-
sint. Plus temporis dimissa in terra, putrescunt.

Capo se-
rum.
Semen.

Theoph.
A loc.
Seranica.
Ascalonica.
Acritia &
natura.
Fissilia.

Ascalonica.



Detritio

Radix

Folia

Capitulum

caulis nudus, rectus, duorum, triumue cubitorum
altitudine circa medium in ventrem utrinque tur-
batarum turgescit, glomeratum in summo fastigio

HISTORIÆ PLANTARVM

Plantatæ caulem edunt, semēque tantummodò fundunt, cum exinaniantur atque inarescunt. Harum igitur talis natura est. Nunc explicatà Ascaloniarum naturà, alias Ceparum differentias Theophr. persequitur. *Διαφέρει γὰρ ἡ μία τῆς ἑτέρας* (Sic legit Gaza, non *ex vna*, vt habent vulgata exemplaria. Plinius legit, *ex vna*) τῆς αὐτῆς φύσεως τῆς αὐτῆς. Differunt & colore nonnullæ: etenim apud Ilium ceteræ quidem candidæ similes constant, sed colore candidæ admodum proueniunt, Sardinisq; similiter ferè affigant. Cretensium peculiaris maximè natura notatur, sed Ascalonis quodammodò proxima, ni sortè vel eadem dici debeat: est enim in Creta genus quoddam, quod semine quidem sacum in radice crassatur, depositum verò in caulem semēque totum funditur: sine capite, saporēque dulces est: id enim quasi è contrario ceteris habet: omnes namque depositæ melius, celeriusque perficiuntur. Omnes post æstivum proueniunt, tepido adhuc solo, vt depositas imbrēs occupent. Seruntur & toto capite & circumciso, sed germinationes haud similes fieri solent: parte namque inferiore Cepæ nascuntur, superiore herba tantum erumpit: scētæ in rectum germinare omnino nequeunt. Gethyum dictum sine capite est, & quasi longâ ceruice consistens, ob id germinatio tota in fronde: scēpiusque retundent, vt Porrum, quæ de causa semine seritur id nec deponitur. Cepas hisce ferè differentiis discernere licet.

Ex his plurima mutuatus est Plinius, de iis sic scribens: Cepæ genera apud Græcos Sardia, (Sarda Ch.) Samothracia, Aspidena, Serania, Schista, Ascalonia ab oppido Iudææ nominata. Omnibus etiam odor lachrymosus, & præcipuè Cypriis, minimè Gnidiis. Omnibus corpus totum pingue rudinis earum cartilagine. E cunctis Serania minima, exceptâ Tusculana, sed dulcis. Schista autem & Ascalonia coniunguntur. Schistam hieme cum coma sua relinquunt, vere folia detrahunt, & alia subnascuntur iisdem diuisuris: vnde & nomen. Hoc exemplo reliquis quoque generibus detrahi iubet, vt in capita crescant potius, quàm in semina. Ascaloniarum propria natura. Etenim velut steriles sunt ab radice, & ob id semine feri illas, non deponi, iussere Græci. Præterea seriunt circa ver, cum germinant, [germinant, CH. germinauerint. TH.] transferri ita crassescere, & tunc prosperare præteriti temporis pensitatione. Festinandum autem in his est, quoniam maturæ celeriter putrescunt. Si deponantur, [caulem mittunt, CH. neque legitur, & in M.] & caulem emittunt & [semine tantum ver.] semine ipseque euanescent. Est colorum differentia [amillo CH.] Samo enim & Sardinibus candidissimæ proueniunt. Sunt in honore & Creticæ, de quibus dubitant, an eadem sint, quæ Ascalonia: quoniam [sacæ radices agunt, CH.] latis capita crassescunt: depositis, [caulis & semine] caules & semina. Distant sapore tantum dulci. Apud nos duo prima genera. Vnum condimentaria, quàm illi Gethion, nostri Pallacanam vocant. Seritur mensibus, Martio, Aprili, Maio. Alterum capitata, quæ ab æquinoctio Autumni, vel à Fauonio. Genera eius austeritatis ordine, Africana, Gallica, [Tusculana, Ascalonia, Amitern. CH.] Tusculana, Amiternina. Optima autem, quæ rotundissima. Item rarsa acrior, quàm candida: sicca, quàm viridis: & cruda, quàm cocta: sicca, quàm condita. Seritur Amiternina frigidis & humidis locis, & sola Alia modo capite, reliqua semine. Proximæque &

state nullum semē emittunt, sed caput tantum, quod inarescit (inerecit, vt innox, cum inerecit &c. Dal.) Sequenti autem anno permutata ratione semē gignitur, caput ipsum corrumpitur. Ergo omnibus annis separatim semē Cape causa seritur, separatim caput seminis. Seruantur autem optime in paleis. Gethyum penè sine capite est: ceruicis tantum longæ, & idè totum in fronde: scēpiusque resecatur, vt Porrum. Idè & illud ferunt, non deponunt. Ceterò Cepas ter fossò solo feri iubent, extripatis radicibus herbarum in iugera denas libras. Intermisceri Satureiam, quoniam melius proueniat. Runcari præterea & sarriti, si non scēpius, quater. Ascaloniam mense Februario ferunt nostri. Semē Ceparum nigrescere incipiens, antequam marescat (inerecant. CH.) metunt.

Quales verò differentias Dioscorides agnouerit, ex infra de viribus dicendis mox patebit.

Ceterum Plutarchus lib. de Isid. & Osir. scribit Cepam Aegyptios Pelusiotas auersari, quod lachrymas eliciendo, Festos dies celebrantibus, molesta sit, & excitata sibi incommoda iis, qui religionis causa potu cibique abstinent. Præterea quia Lunâ decrecente vigeat & augeat, singulisque diebus flores promat, minuta verò deponat, & ad eiusdem vices redeat. Bias à rege Alyatte accersitus, regiâ fortunâ spreta, illum iussit *ῥηγνῆσαι τὸν κῆπον, ὅτι τὸν κῆπον ῥηγνῆσαι*. Rhod. c. 4. Lucil. lib. 5. Sar.

Flebile Cape simul, lachrymosaque ordine talla
Sic enim Festus vocat interiores Ceparum tunicas. Aui & Atai, inquit Varro, nostri cum Allium & Cape verba eorum olerent, ramen optime animati erant. Tunicatum Cape Persius eleganter vocat Satyr. 4.

--- tunicatum cum sale mordens Cape
Lucil. lib. 6.

--- lippus edendis
Acribus asiduo fuit Capis lachrymosis.
In Priapeis
Acribusque Capis, Alliumque fibratum.
Existimat Tragus Capas Alcalonias Theophrasti esse Cepas nostras magnas, fistiles autem & steriles, paruas illas esse, quæ plantentur & semē non proferant, coquisque in multo vsu sint. Gethyum tandem esse Cepas longas, mulieribus germanis dictas Varr, quia magis in herbam quàm bulbum excrecant. Sed mirum cur Tragus statim sequenti capite aliam tradat cepam sterilem siue fistilem.

Cordus vnam describit speciem nomine cape ouatæ, Cronnios ab Arist. dictam, quod oculorum tunicam popillanque mordaci vapore lancinando, conuincere contrahique cogat, lachrymas eliciendo: vnde Latinis Cepa lachrymosa. Cepa verò à capitis magnitudine.

A Celsalp. cepa colore rubra, aut candido, figura aliis testili, atque oblonga describitur.

Matthiol. in Dioscor. cepam pinguem, & aliquot species recenset.

Sunt & cepollæ ab Antiquis appellatæ, Cepis quidem maiores, quas vulgus nostrum (inquit Carol. Steph.) appellat *des vignonnertes*: Quæ paulo sunt maiores ferè sine capite, ceruicis tantum longæ, & à Græcis tantum Gethy nomen acceperunt, puto a nostris appellatas *des Ciboules*: Marisca simplex quæ ab Hermolao describitur, *Marisca*, à rusticis appellata, eam puto quam nostri appellauerunt *Oignon*. Cepa olim, inquit Turnerus, Latinis dicebatur *vna*, quod vnica planta ex vnica nascatur radice.

A. More.

Cretensium.

Tempus. Satis.

Gethyum.

Plinii differentia.

Serania. Tusculana. Schista.

Ascalonia.

Samothracia. Sardia. Cretica.

Gethyum. Pallacana.

Africana. Gallica. Tusculana. Amiternina.

Satis. Tempus.

Affirmatio. Gethyum.

Cultura.

Capa Aspidena. Ophiura. Morsus.

Capa fistilis. Talla.

Capa tunicatum. Cape mordens.

Capa lachrymosa. Cepa acria. Tragus.

Cronnios. Guda.

Capa Guda della.

Cepolla.

Marisca. Puto. Oignon. Puto cepam.

Dodon.

LIBER XIX

Dodon. Gall. & Lat. in fol. Figuram habet Lobelii & sub titulo *Cepa rotunda* describit.

Aduers. Lob. & Penz tradunt aliquot species *Cepz.*

Nos vnicam tantum proponimus iconem ex nostris empiricis, quæ exprimit tantum *Cepam* rotundam, eamque seinentem seménque proferentem maturum.

Sæpius obseruauimus magnas, latas & sessiles: rubras, ut vocant, ac etiam albas: Ex cultura autem & soli ratione existimamus potissimum pèdere, quod quedam *Cepz* maneant parue & rotundiores, quæ frequentiores sunt, potissimum rubræ, albz etiam *Cepz* solent esse rariore, quibus adhuc infrequentiores sunt longæ albz in Alsacia à nobis visæ: per longas siue sublongas *Cepas* non intelligimus eas, quas *Tragus* longas vocat *Cepas*, & *Theophrasti* *Gethyum*, nêpe quas mulieres *Germ.* vocant *Warr*, id est stultas, quia magis in herbam quam bulbum excrecant, est enim pulchrum genus particulare oblongatum.

Cepa & *Cepe* in neutro genere Latinis & officinis, Græcis *καπνισκός* dicitur, ut *καπνισκός* *πικρός*, teste *Athenæo*, quod odoris grauitate nictare nos faciat. *Al. Zwiibel* & *Zibel*, nonnullique *Böllen* dicuntur, & *Zippelen*. *B. Hyuin. G. Oignon*, *Sibula* *Fuch.* *It. Cippollo*. *Hisp. Cebolla*, *Ceba* & *Cebola*. *Arab. Basil* & *Bassal*. *Angl. Onion*. *Boh. Cybulc*. *Hung. Hagyma*.

Cepas obseruari *Patavii* in hortis magnas, *Watvillæ* albas longas, uti & alias latas magnas rubras, quas & *Montbelgardi* ex *Nemautiano* semine habui. Cæterum ubique in Italia, Gallia, Germania, Anglia, Vasconia prouenit, maximeque hororum cultoribus. Terram autem desiderat solutam, pinguem, vehementer subactâ, irriguam, stercoreatam. Scribit *Martio* aut *Aprili* in Italia, verum etiam Ianuario, ac *Februario*, *Palladio* autore, vel etiam *Novembri*, ut per vniuersam *Tusciam*, teste *Crescentio*, & sic super ipsarum seminarium velut pergularium, de aliquibus straminibus coopertum.

Sola quidem in arcis subinde seminatur, quandoque verò cum aliis herbis, veluti *Lactuca*. *Palladius* cum *Satureia* feri probat, quoniâ melius ut *Plin.* ait proueniat. Plantatur. a. in arcis per vnu semissem, vel *Spithamani* ab inuicem separata, & in area quatuor acies poni debent. Quas verò vis ante maturitatem comedere, plantabis in arcis ubi sunt cucurbitæ, cucumeres, citrulli vel melones. Et cum hæ creuerint sæpè colliguntur, ubi etiam si dimittantur, ad maturitatem proueniunt, licet non sint ita grossæ, sicut hæ, quæ in arcis solæ plantantur.

Cum plantari debent reicidentur radices usque ad grossitudinem vnius, vel medijs digiti iuxta *Cepam*, & per vnum digitum tantum sub terra mergentur. Hæc enim planta facile aded comprehendit, ut si solummodò ponatur, vel cadat super terram, vel ad partes longinquas portetur, etiam disseperta, in terra quasi arida, dum tamen optime puluerizata, plantetur, summa facilitate nascatur & augeatur. Sæpè circumfodi desiderant, & ab herbis quibuscumque liberari, quod si terra eodem anno stercoreata non fuerit, debet plantationis tempore stercoreari, ut optime conualeseat. Collectis autem *Cepis* maturis, quod patet cum se sustinere non possunt & amplius non augentur: meliores earum plantantur mense *Augusto*, ut anno sequenti semen faciant: deperiores verò plantantur ut in quadragesima viri-

des habeantur, mediocres verò seruantur, quæ si in augmento Lunæ euulsi fuerint claro vel sicco tempore existente, melius seruabuntur in loco obscuro & sicco.

Floret *Iulio* potissimum mense, deinceps semen profert, quod non antè legendum, quam cum nigrum colorem præ se fert. Is enim color maturitatis est index. Eatum semina durant per annum tantum. Sed in matris suspensa per triennium seruatur illæsa. Bulbi verò Vere plantandi sunt, a quibus semen separatur, quod *Augusto* mense ad perfectionem venit. Nouellæ autem *Cepæ* exactis mæssibus colligi ac reponi postulant. Quod si diutius *Cepa* inueterari (inueterare *CH.*) libeat, aqua salta tepida capita intingenda (vnguenda *CH.*) sunt. Ita diuturniora sicut melioraque vsui, sed in statu sterilia. Alii contenti sunt (sumo. *Ver.*) primò super prunas suspendisse, abundeque ita profici arbitrantur ne germinet. Quod facere *Cepam* extra terram quoque certum est, & cauliculo acto euanescere. His aduersantur *Nuces* teniuntque earum saporem.

Cepæ (7 *καπνισκός* *πικρός*) caput purgatum, ex qua tritum in linteum ligati, autore *Hipp.* subdito, si vterus picuita laboret. Quo in loco *καπνισκός* *πικρός* rectè legit *Cornarius* ut vult *Fœsius* *καπνισκός* *πικρός* *Aldina* exemplaria: Caluus istud omisit: Valicana impressio, 7 *καπνισκός* *πικρός* habet vitiosè quoque. Nobis autem placet legi *καπνισκός* *πικρός* præcedentibus lineis bis *Cyclamini* meminere. Pergit *Hipp. m. m.* Ad pueri aliam soluendam, si adultior fuerit, *Ceparum* interiores partes ex melle tritas indito. Ad quem locum pro *καπνισκός* *πικρός* cum *Corn.* legit: *Fœsius* idem apud *Tragum* *Cepam* oculis prodelle cõtra omnes Medicos. *Cepa* longa actior est *Dioscoridi* quàm rotunda: item flaua quàm candida, & sicca quàm vitidis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuicant, sitim mouent, ac extenuant, fastidium pariunt & expurgant, alio vitiles sunt: ex detractis purgamentis in oleum coactæ, hæmorrhoidas reliquosque excretionum exitus reserant, subdita pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis & incipientibus suffusionibus auxiliatur, anginae eodè perunguntur: suppressos menses pellit, caput purgat naribus intus: canis moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in sole vitilignes sanat, & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: vapo cum sale reprimat: contra calceamentorum, attritus cum gallinaceo adipe vitilis est: citæ aluo prodest in auribus sonitum ac grauitatem emendat: ad purulentas aures & eliciendam earundem aquam valet: alopecie earum succo perfricantur, qui celerius quàm *halcyonium* pilos euocat: largiore cibo *Cepa* capitis dolores ciet, coctique vehementius vrinam pellit: eos lethargicos est cit, qui valetudinibus aduersis, etiam coctæ, plus æquo velcantur: elixa & cum *Vuis* passis & *Ficu* illita, tubercula concoquit, & celerimè rumpit. *Galenus* ex quarto censet esse ordine exaltacientium, et si essentia eius potius crassatum sit partium: vnde etiam hæmorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta, alphas abstergit, tum alopecieis attrita pilos alcyonio citius restituit. Porro si succum eius exprimas, quod reliquum est, admodum terrex substantiæ est, cuiusque calidæ: at succus aquæ æræque caliditatis. Hic igitur iis qui sus-

Serua quando for
gendum
Dicitur
Asseruitur

Vires
Vitus
Vitis
Hippoc.
Infratib.

Ad aliam
soluendam
Hippoc.
Vires
Dicitur

Hæmorrhoidas
Oculorum
Morbus
Angina
Menses
Canis
Morbus
Vitis
Lippitudo
Calceamentorum
Attritus
Aurium
Dolor
Alopecia
Capitis
Dolor

Temper
Galenus
Hæmorrhoidas
Alphas
Alopecia

HISTORIAE PLANTARVM.

sunt sunt, aut aciem oculorum obtusum præ crassitudine humorum obtinent, inunctus prodest: atque ex huius temperatura tota Capa hirsuta est manducata.

Vitæ Olfactu ipso (inquit Plinius) & delachrymatione, caligini medentur, magis verò succi inunctione: soanum etiam facere traduntur, & vlcera oris sanare, commanducata cum pane. Et canis morbus virides ex aceto illicæ, aut sicæ cum melle & vino, ita ut post diem tertium soluantur. Sic & atrita sanant. Ita verus Codex, sed vulgati, trix falsò pro attrita habent. Coctam in cinere & epiphonis multi imposuere cum farina hordeacea, & genitalium vlcerebus. Succo & cicatrices oculorum, & albugines & argema inunxere: & serpentium morsus, & omnia hulecra (vulnera enim) cum melle. Item auricularum cum lacte mulierum: & in iisdem sonitum ac grauitatem emendantes, cum adipe anserino, aut cum melle stillauere (instillauere Dal.) & ex aqua bibendam dedere repente obmutescensibus. In dolore quoque ad dentes colluendos instillauere, & plagis bestiarum omnium, priuatim scorpionum Alopeccias fricare & pforas elisis capis. Coctas dysentericis vescendis dedere & contra lumborum dolores, purgamenta quoque earum cremata in cinerem illinentes ex aceto serpentium moribus, ipsasque multipede ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas. Proximi inutilia (inutiles Vet.) esse præcordiis & conuersioni, inflationemque & sitim facere dixerunt. Atclepiadis schola, ad colorem quoque validum (vividum. Vet. pallidum Aliud.) profici hoc cibo. Et si ieiuni quotidie edant, firmitatem valetudinis custodiri, stomacho vtilia esse, spiritus agitatione, ventrem molire, hemorrhoidas pellere subditas pro balanis: succum cum succo fœniculi contra incipientes hydropises mirè proficere. Item contra anginas, cum Ruta & melle. Excitari eisdem lithargicos. Varro, quæ sale, & aceto pista est arefactaque vermiculis non infestari, autor est.

Cautio Cæterum, ab omnibus in cibo abstinendum, maximè si cui biliosior sit natura: quum solis his qui pituitosum, aut crudum, & crassum ac viscosum humorem collegerunt, eiusmodi edulia conueniant. Porro quod Diosc. dixit, *capas* id est, Cepas appetentiam cibi excitare: & mox eadem *capas* id est, id est nauseam parere: ita intelligendum est, ut prius de moderato, postèrius de nimio ipsarum usu accipiamus. Sunt autem duplices *capas*, alteri nauseabundis, alteri anxij, & nullam decubitus formam faciliè ferentes admodum perniciosè affecti.

Capa (inquit Porta) purpureo flore esu atrabilem auget, albiflora pituitam medicamento purgat, umbellifera ad capillos facit testes, ostendunt ad Veneream valere, caule est cauo, ad tracheam, & fluxus: sobolescit ad fecunditatem: tumida est, ad tumores: alba dulcis, rubra acris, calida, & humida. Sed hæc qui volet experiatur.

De infectis Qui operas exercent, manè cepam crudam cum sale & pane theriacæ loco esitare solent aduersus aërem infectum, persuadentes sibi, eo dicturos à pestifera lue fore, qui hoc remedio vsi fuerint, nec illos spes fallit, siquidem experientia constat aduersus intemperiem aëris ut nihil vulgatus, ita neque efficacius quicquam hæc theriaca reperiri: at qui laboribus ac eiusmodi cibo minus assueti fuerint, nihil illo iuantur, sed la-

duntur potius, ut qui infaniarum, dolores capitis, caliginem oculorum, mentis alienationem, ac turbationem, nec non lethargicum morbum gignat. Capa continuè vsurpata in cibo alium emollit, urinam cient, pelluntque. Anticula nostræ crudam cepam conscindunt, ac in aquam fontanam iniiciunt, perque noctem in ea macerant, postea eam aquam pueris & infantibus potandam exhibent ad euacuandos ventris lumbricos, sanè haud infœlici successu. Continuo capæ vsu genitale semen augetur, ad eam verò rem vel maximè semen facit. Cepa magna excavata, theriaca deinde repleta & recta, ac postea in calidissimo cinere assata, deinum detractis exterioribus tunicis fusa, ac cataplasmatibus ritu imposita, pestes ac venenosa vlcera reliquasque collectiones malas & duritias efficacissimè emollit ac aperit. Cepa ut vult Holerius coquit, trahit, discutit, aperit. Quærit Langius, propter quod adustiones calido sedantur & substantiæ & calidum impediatur vesicæ effluere? Anne imbecille à robustiori corrumpitur & marcescit? Et verum id esse comperi, inquit Langius cum loco adusto philuræ cepæ sub cineribus coctæ tepidæ applicantur, aut succus cepæ expressus linteolis excipitur adhibetur, impediri ne vesicæ effluere. Ambrosius Paræus ad ambusta, modò ne epidermide pars sit spoliata vel vlcerata, mirè commendat capas crudas cortice liberatas, & cum momento salis subito applicatas, empyreuma enim extrahere, vesiculas prohibere. Hoc remedij genus contra calumnias fusè cum rationibus, cum experientia defendit lib. 12. c. 18. suæ Chirurgiæ, id quod etiam confirmat Fernellius methodi lib. 6. cap. 26. scribens: capas cum sale contusas parti impositas ambusta miraculo sanare. Scribit præterea Paræus se vidisse nobilem excipientem turturæ manus liquefcentis inflammatum lardum illitis prius manibus caparum succo.

Io. de monte in exper. Sume, inquit, cepas quinque vel sex, conscinde optimè, coque in sartagine cum butyro addito sale, cum voles te in lectura componere, comede omnes calidas, manè eundem cibum assume, id fac per quatuor dies & noctes, in hydropem mira videbis.

Verum ad calculum remedium à Domino Caertischin duce militari in Iula, communicatum Domino Lazaro, à Schuendi: Ollam nouam accipe, reple capis rubris concisis, affunde aquam, coque super ollam sedens calidum vaporem recipe per horam manè & vespere.

Marantha meminit nonnullos, Dioscoridem sapius reprehendentes, quod cepam scripserit capitis dolorem inducere, quia hanc, quandoque comederint, & tamen caput non doluerit. Sed sciant Dioscoridem velle cepam hunc effectum edere, largius & frequentius cibo vsurpatam. Ad Alopeciam post sotos inunctiones præscribit Fernellius ut manè & vespere caput confricetur capis contusis, dum prorsus rubescat, & mox melle oblinatur vice cataplasmatibus.

Ad vermes pectorum trium annorum exhibet M. Rolandus in potu decoctionem caparum. Item alibi puero 8. annorum laboranti vermicibus ventris tumore & dolore, febre & ictero.

Felice Platero scribente, tempore pestis ad præcautionem caparum succus variis modis exhibetur. Calor ignis in aspectum producit literas scriptas succo cepæ prius delitescentes.

Ad tollendos factores anhelitus, prouenientes à cibis quibusdā Thomas Morus capas commendat:

Vitæ

Lumbrici

Genitalia

Pestis

Quæstio

Ambrosius

História

Hydropis

Calculus

Alopecia

Vermes

pectorum

Succus

factores

Scitile

*Scilicet ne terras Porrum tibi spiret odores &
Proximè à Porro fac mihi Cepa uires.*

An porro Cepæ status excitent, & an in febri pe-
sillentiali laudentur in cibis ad præseruationem,
legantur Io. Matthæi verba posita capite de Ali-
lio.

Sed hic quæri solet, cur Cepæ lachrymas cie-
ant? Respondet Cardanus de varietate rerum,
non ob acrimoniam, quia nec Allium, nec Piper,
cum sint acriora. Oleum illitum cit lachrymas,
non nisi quia lentum sit, at Cepa quia acris, ocu-
los ferit: quia lenta, humorem educit. Quid i-
gitur lentor facit (nam hoc de Cepis à Rhodigi-
no scribitur), ut lachrymas cieat? Quia oculus
multos habet spiritus, unde ex eo multa perpe-
tuo fit resolutio, quæ cum impeditur, aut nimis
propere prouenit, aut cogitur, lachryma prodit:
impeditur à lentis, cogitur à frigore, propere exit
vel ob gaudium, vel ob dolorem, vel ob æstum
cerebri: atque his omnibus causis oculi lachry-
mantur.

Cepæ tandem comedere inter dormiendum,
si Artemidoro credimus, non est bonum, mani-
bus verò has gestare non est malum. Iplis tan-
tùm ægris significant hæ radices duplicia: Si
quis enim ægorus somniet, se multum Ceparum
absumere, grauitèrque decumbere, is saluus eua-
dit, à suoque morbo liberatur. Sin autem parum
edat, mortem ipsi affore prælagit. Qui enim mo-
tiatur parum plorant. Mæsti vero non ita con-
festim doloris sui obliuiscuntur, ideoque ipsis se-
pius flere contingit, longiorèque tempore. Hu-
ius autem rei ratio naturalis cum nulla sit, eius
dignitatem inter Græculas vanitates merito re-
ponimus.

CEPA ASCALONICA, SIVE FISSILIS.

Plures si-
mul coniū-
ctos bulbos,
Porraceis me-
diocribus sup-
pares, oblon-
gos, fibrosos
habet, sapore
Cepæ vulgaris:
folia exeunt fi-
stulosa, teretia,
glabra, eodem
sapore prædita.

Hanc Tra-
gus pingit &
describit, ni fal-
lor, dicens: Ce-
pa in Alsatia,
leuchel & Es-
leuchel appel-
lata est ea, quæ
Apicio Cepulla

vocata fuit, Theophrast. verò sterilis vel fissilis.
Gesner. horri. Cepa sterilis, fissilis vel Ascalonia
quorundam.


Ascalonitas autem Gallicas, Antiquorum Asca-
lonitides siue Palestinas Capas arbitrantur. Ad-
uersus quas Francigenæ Apperitz vocitant. Bul-
bus fortè est Setanius, quem Theophrast. & Plin-
ius Capæ genus quoddam testantur. Lob. Obs.
scribit Cepam Ascalonitidem vocari Angl. Sea-
lyon, Leon. pl. Ascalonitides Antiquorum. Prom-
ptum est colligere ex Theoph. Turnero, quam il-
le vocat Cepam fissilem, & Græci Crommyon

schiston, eam esse quam Angli vocant *Bolse* /
Germ. Sere aut *Siere* in Prussia Suerley, quod
idem ex Plinio confirmari potest lib. 19. cap. 6.
Nam Cepæ eis *Bolse* appellatæ eius sunt na-
turæ, ut si vna seorsim pangatur, breui ex eadem
radice multa propagentur, sine saru: sique ex
racematim coherentibus (ad 12.) radicibus vnâ
Autumno detractam depangas solam, ea sequen-
ti anno duodecim tibi pariet, si lætum sit solum.
Quare cum planta hæc hyemem in terra perfe-
rat, satius esset Angl. winter onyon cepam hy-
bernæ quam *Bolse* nominare. Distinguit etiâ
manifeste Plinius Ascaloniam & Fissilem. Ex cu-
ius verbis colligimus, vnum cepæ genus ra-
dice secundum esse: sed cum nec cepa vulgaris,
nec Ascalonia, radicibus propagetur, neque alia
vlla species, præter *Bolse*, sequitur hanc esse
cepam fissilem.

Cepam fissilem siue Ascalonicam transtuli in
Hortum E.C. collectam Bedfordiæ in horto N.
viri piz memoriæ Ioh. Vldarici à Stadione, & ex
Trenoy, ex horto N. viri Michaëlis à Franck-
mont, quos audiui vocantes S. Jacobo Zumbin.
Lugduni & Geneuæ habui cepas quas quidem
vocant *chollares*, multæ simul iunguntur parua
longæ, folia fistulosa ut in cepis capitatis. Capæ
Ascalonitides Hyemem Gæpingæ in horto Ill. E.
C. perferebant.

PORRVM.

CAP. II.



CEPIS

Porro pro-
pter affinita-
tem coniu-
gi desiderant:
adolescētis
enim adhuc
Porrum folijs
luxuriat se-
munciâ cir-
citer latis, al-
ternatim po-
sitis, inferio-
re superius
ceu vaginâ a-
liquouique
complecten-
te: adultis i-
dem positus,
sed longitu-
do cubitalis,
latitudo sex-
tantalis, for-
ma carinata,
color ferè
glaucus, sa-
por Cepace-
us. Vbi cau-
lescit, scapum
digitalem &
crassiorē ad
trās quatu-
orue cubitos
surrigit, soli-
dum, succu-
lentum, glo-
meratos in
pilam, quàm
vtraque ma-
nu vix com-
plectaris, flo-

Descriptio

Folia

Color

Scapum

Flosculi

Descriptio

Bulbus

Folia

Capula

Cepa

Cepa

Bulbus

Cepa

Bulbus

Cepa

Bulbus

Cepa

Bulbus

Scorodoprasum
Radix
Icones
An Scorodoprasum
Diosc. Tra-

ex crassiore vitici farina decoquit, oleoque insu-
sculos sustentem, suo vnumquemque pediculo
innixum, ex albido purpurascens, apicibus sa-
turioris tinctis purpura. Semen triangulum, atrum,
Cepæ: radix bulbosa, tunicis albis compactilis,
fibrata, sapore mitiore, quam Cepæ.

Porri icones dux sunt ex nostris empiricis. Hu-
ius iconem ponit Tragus, ni plurimum fallimur
lib. 2. cap. 68. pro Scorodopraso Dioscoridis. Des-
criptionem autem ponit cap. 70. Notandum ta-
men prope radicem siue Bulbum Scorodoprasii
Tragi, appictos nucleos, qui sunt Allii. Scimus aliud
sentire Gesnerum, & ad aliam plantam referre:
nec tamen propterea dimouemur à nostra opi-
nionem, quia Tragus nullibi meminit porri: des-
criptio etiam Tragi optimè responderet nostro
Porro, quæ est cap. 7. ubi hæc in verba prorumpit:
Medionatrices mulierculæ in hortis Allii genus
quoddam plantare consueverunt, quod radice, foliis,
& caule per omnia vulgare Allium æmularur, nisi
quod radix huius nequaquam ut illius multiplici
nucleo coagmetatur, Quar. quæ autem lachrymas e-
liciat, non tamen tam feruentis & acris est saporis
atque Allium, quin potius ad Cepam, quod ad
odorem attinet, accedere videtur. Quod verò faci-
lius à vulgari Allio Scorodoprasum discerni
queat, notandum est hoc latiora folia, & grandio-
res caules fundere, deinde quotannis nigro præ-
gnare semine, quod in cacumine fistuloti caulis
profert, non aliter atque Cepa. Radix, nec non
herba huius plantæ Allio respondent, sed odor ac
semen Capam repræsentant, quare illi natura
inest promiscua, Allii inquam & Cepæ, quo no-
mine à Dioscoride *καρδαμύνη*, hoc est, Alliopor-
rum [si ita liceat dicere] vocauit, Germani *Abers-
fneblaud* dicunt: posset & *Grosblaud*/ hoc est,
Porrum grande, dici. Ego sanè hoc Allii genus
id esse existimo, quod Veteres *Vilpicum*, *Gallicum*,
Cyprium, *Biticum*, *Antiscorodon*, *Aphrosi-*
on, & *Panicum* vocauerunt.

Natura
Allioporrum
Allium Vi-
picum, Gal-
licum, Cy-
prum, Bi-
ticum, An-
tescorodon
Aphrosi-
on, Cy Pa-
nicum.

Porrigent-
ia Turner.
Porrum.
Capum.
Sectium.
Ampela-
prassum.

Gethyllis
Diphilus.

Diosc. duorum generum meminit, duobus diuer-
sis cap. Plinius tria facit. Theophr. vnius meini-
nit, quod nec *καρδαμύνη* sit, nec *ἀμπέλας*. Qua-
re apud Theophr. tria quoque sunt genera. 1. *καρ-*
δαμύνη, lat. Porrum capitatum. Angl. & cfe
simpliciter. Germ. lauch, de quo in præsentia. 2.
Porrum sectium. Græc. *σέκτιον*, ut qui-
dam volunt, Angl. *freudhe lefe*/ quod genus non
nisi in Anglia vidit Turn. de quo mox. 3. *ἀμπέ-*
λας, Porrum vineale Germ. *Wildlauch*. Vnde
Anglicè dicere posset *Wild lefe*. Cuiusmodi nun-
quam vidit Turn. copiosius & pulchrius quam cir-
ca Wormaciam. Quod frequenter resecatur &
attondetur, Porrum sectium siue sectile Colu-
mellæ ac Palladio nominatur: Sed quod non re-
secatur Porrum capitatum est: Græcis *καρδαμύνη*.
Istud autem Diphilus apud Athenæum
vocari ait *γέθυλλος*: à nonnullis verò & *γέθυον* di-
ci. Gethyum autem Plinius Capæ speciem facit,
& Theophr. frequenter veluti Porri attonderi tra-
dit. De Porro capitato ita cecinit Marcial. Poëta:

Mittis præcipuos nemoralis Aricia Porros:

In nives virides stipire cerne comas.

Porri gene-
ra Corn.

Porri duo genera sunt hodie omnibus vbique
ferè cognita: Sectium vnum, & alterum capita-
tum: Vocat autem capitatum quod in caput in-
crescat Cornarius.

Marth. pingit, ac dicit Porros Hortorum cul-
tores nescire capitatos efficere Caparum instar,
quamuis ii apud Veteres in frequentissimo vsu
fuerint, quod longis qui proptè sectium appellan-
tur, sapidiore sunt: De his autem tanquam præ-

stantioribus scripsisse Diosc. non tamen quid à
sectiis genere differant, à quibus mangonio capi-
tati sunt: ac Porrum Capitatum & Sectium
genere non differre, sed mangonio: capitatum
autem è Sectiis, siue longo, fieri, substrata regula
in transplantatione, resectis prius foliis, annuat.
Eum autem mirari subit, cur mangonium adscri-
bat, siquidem hortorum cultores, ut ipse fatetur,
capitatos efficere nesciant: frustra docet, quod
fieri nequit. Quid si Marth. sibi conscius dili-
gentioribus se naturæ indagatoribus inuidiosè
negauit?

Πόρον & πείσμα καραύνη, Porrum, & Porrum capi-
tatum & Palladio masculino genere, Porrus dicitur,
Arab. Karas, seu Karat, Germ. lauch. Belg. parayer-
looch, Gall. Porreau vel porroy, Ital. Porro capita-
to, Præf. Hisp. Puerto. Angl. lefe. Boh. Por, &
Tosolegh. Hung. per Hagyma.

Monipellii maxima habent, ut & Patani, Por-
ra: Genæ & alibi copiosè serunt, ad hybernium
vsus: Montbelgardii, ubi frequens eius vsus se-
runt, transplantant, & reponunt hyeme eden-
dum. Floret & Iulio. De cætero, Porri sustinent
ferè omnem aërem, & terram desiderant medio-
criter solutam, ut optimè proficiant, & pinguem,
& stercoretam. Seruntur autem in locis calidis &
temperatis: mense Decembri & Ianuario: Fe-
bruario & Martio in temperatis & frigidis
cum terra fuerit ad æqualitatem redacta. Hæc
autem satio fit aut sola, aut in aliis herbis
mixtim, in terra optimè culta & desuper litta-
mine cooperta. Hæc semina sunt spissa spargendo,
deinde euelluntur Porri grassiores; prius nec
aufertur aliquid de ipsarum radicibus, cum sulcis
plantantur, sed quando cum palis debent planta-
ri, abscinduntur radices & summitas foliorum,
& plantantur mense Aprilis & Maio per totum
mensem Iunii, sed plantari possunt mense
Iulio, Augusto, Septembri & Octobri, & erunt
vtilis in sequenti mense Martio, & Aprilis. Nec
in plantatione Porrorum querenda est mollis
terra, sed mediocris est optima, & satis bona
est illa quæ fuerit, ferè sicca. Fit autem
duobus modis Porrorum plantatio, vno modo
subtilis, ut Bononiæ moris est, ut scilicet per v-
nam completam spithamam vnus sulcus ab alte-
ro distet, & sint ab invicem in sulco iacentes posi-
ti quaternis separati digitis, & cum sequentis sul-
ci terra trahitur super Porros & pedibus mol-
liter conculcatur. Secundo autem modo palo
plantantur, scilicet ut optimè pastinatis & dispo-
sitis arcis fiant foramina cum palo grosso, ferè ut
lancea, & concaua per vnam spithamam, & ultra
vno semisse distantia, in quibus ponuntur præpa-
ratæ porrectæ, foramina verò replentur, aut quic-
quid terræ in eis ponitur, sed elapsis tribus septi-
manis cum herba in eis nascitur sarculantur, &
herbis mundantur. Porri autem sic plantati sunt
meliores aliis, nec possunt facile siccim euelli, sed
hic modus magis laboriosus existit. Item hoc mo-
do plantatur optimè inter Cepas iam quasi gros-
sas, & euulsis Capis sarculantur & inueniuntur
optimè prouenire: cum euellentur, aliqui in vno
loco relinquuntur, ut pro seminibus reseruentur.
Cuius quidem semina possunt per triennium il-
lata suspensa seruari.

Hippocratis loci multi sunt, in quibus Porri
sum præscribit, quorum aliquos huc adscribere
superuacuum non est. Is igitur m. m. Si lac de-
ficiat Porratris & aqua macerata potui exhi-
bet. Item si ex partu vteri inflammationem con-
ceperint, ymblicis Veneris folia & Porra [et] [et]

Loco

Tempo

Socio

Plantandi
modus.

Plantandi
in sulco.
Plantatio
cum palo.

Sarculandi

Afferendi
seminis.

Vires & u-
lus.
Vires.
Diffinitio
autem
Hyp.

peraffuso exhibet. Ego nolim præscribere Porrum in prædicto affectu, nec etiam ad fluentem sanguinem, siue ex vtero, siue ex naribus. Idem si purgatione opus habere videatur, Porrum (scilicet) incoquere iubet, quo in loco Fæsius notat in sine lib. 2. *scilicet purgare*. Porri succum addi. Adhuc si vteros expurgare animus est: Porri & Cardamomi semen conterit ex vino & lacte cocto in maceratum, ac imo ventri illinit. Linimentum componit aliud ex Lasere drachmæ unus quantitate & succi Porri. At si purporea in grumos concreuerit, & dolor in infimo ventre oboritur, Porra cetera exhibet. In portione ad fluorem muliebrem Porri [scilicet] Calus] succum ex vino albo aqua temperato, propiatur. Quod etiam fluentem ex naribus sanguinem sedare dicit: quod si adhuc fluxus feratur ex vino Porri succum exhibet. Si vterus usque ad vesicam doleat, semen ex aqua tritum bibendum præcipit.

Porrum capitatum, inquit Dioscoridum, est, & mali succi, graui somnia facit, urinam ei, alio commodum est, attenuat, visus hebetudine inducit, mentes detrahit, vesicam vlceratam & renes lædit. Coctam autem cum prîsana, & in cibo acceptum, quæ in thorace hærent, educit. At coma ipsius in aqua marina & aceto cocta, ad intestus commoda est, in vteri conclusionem & duritiam. Edulcatur & magis flatus exors euadit, duabus in aqua cocturis, & in frigida aqua maceratum. Semen [scilicet] eius acius est, & vim quandam adstringentem habet. Vnde succus ipsius sanguinem mittit cum aceto, & maxime cum qui ex naribus fertur, manna aut thure addito, [eis scilicet] qui frigida sunt natura, Cresc. Veneri ita stimulat, & ad omnia in thorace vitia cum melle pro eclegmate usurpatur. Facit & ad tabe in cibo acceptum. Sed & arteriam purgat. Verum si assidue edatur, visum obscurat, & stomacho incommodum est. Succus cum melle potus, aduersus venenatarum bestiarum morsus opitulatur. Sed & ipsum Porrum impositum prodest. Auxiliatur etiam aurium dolori & sonitui, succus cum aceto & thure & lacte aut rosaceo instillatur. Tollit varos folia cum rhoë obsoniorum imposita, & epinectidas sanant. crustatque cum sale imposita emarginant. Cæterum seminis drachmæ duæ, cum æquali hæcatum myrti pondere potæ, veteres sanguinis ex thorace educationes cohibent.

Meminit Maranth. nonnullos Dioscoridem sepius reprehendere quod Porri semen in cibis visus obscuritatem inducere scripserit, quia hoc quandoque comederint, & tamen visus hebes factus non sit. Sed non animaduertunt boni viri Diosc. velle hunc effectum produci largiori & frequenti cibo esitatum.

Plinio autore, Porro capitato maior est ad eadem effectus quam sectiuo: Sanguinem autem resistentibus succus eius particulatim cum galla, aut thuris farina, vel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, vuluæque contractas aperiri putat: fecunditatem etiam feminarum hoc cibo augeri. Contritum ex melle vlcera purgat. Tussim & destillationes thoracis, pulmonis & arteriæ vitia sanat, datum in sorbitione prîsanæ, vel crudum præter capita, sine pane, ita ut alternis diebus sumatur, vel si putredine exerceantur. Sic & voci, vel Veneri, somnoque multum confert. Capita bis aqua inuenta cocta, aluum sistunt, & inflationes veteres. Hec Plinius in veteri codice legit, & ita vulgaris Macri libellus citat. Vulgata tamen Plinii exemplaria caule pro galla falso habent.

Galen. de aliment. ubi de cepis, allio, ac Porro agit, harum plantarum radices, inquit, edunt sepe homines, sed caulem raro, itaque folia, quæ multum acrem vim similem habent. Calefaciunt autem corpus, & crassos in ipso humores attenuant, & viscosos secant. Bis tamen aut ter cocta, acrimoniam deponunt, attenuant tamen adhuc, & paucissimum alimentum corpori præbent. Sed ad pleniorum Porri doctrinam scire conuenit, quod Porrus calidus & siccus est in tertio gradu, secundum cibum illaudabilis est, nocet enim stomacho, faciens inflationem ac ventositatem, & cum sui acumine nervos eius morder, habet etiam proprietatem faciendi fumum nigrum melancholiam generantium, qui ad caput subiens visui tenebrositatem facit, atque somnia terribilia & formidolosa inducit, unde caueant ab ipso cholericis, maniaci, & oppilationem in capite habentes. Sed diligentes eos comedere accipiant post eos lactucas, & Portulacas, Endiuas, & similia, ut eorum calor temperetur ab istis, aut elixentur, deinde bis aut ter lauentur, & esui postea dentur.

Bapt. Codronchius de virtutibus vocis ex auctoritate Arill. lib. 1. prob. 39. maxime laudat unam cum Plinio & Dioscor. Porrum, eo quod voci splendorem adferat & arteriam purget, vitari tamen debet assiduus vel multus illius usus, qui visus obscuritatem efficit, stomacho aduersatur, multaque alia incommoda facit, ea propter nisi robustis admodum, decoctumque cum melle vel in prîsana, erit exhibendum.

Apoll. tribuit ei temperamentum frigidum ac venenatum naturam, ac dicit à nemine edendum, nihilominus tamen commendat in febribus. Sed utrumque præter omnem rationem. Nonnulli accipiunt (ut Holeriana schola probat) Porros nouem aut decem recentes, medios transigunt filo, folia extrema amputant, ut odorem inspirer. circūdant collo obuertis foliis naribus, & deorsum versis capitibus. Malum uti qualitate manifesta operantibus, quàm hoc in quo qualitates repugnant, in Porro enim insignis caliditas & acrimoniam extenuans, sine ulla alstrictione: odor etiam caput grauans, videntur potius ad mouendum sanguinem, quàm ad reprimendum facere.

Tradit Alb. Magnus dici in libris Hermetis, quando proiciatur semen Porri super Acerum, redire accositatem eius. Crescentius contra ut acetum miteretur in vinum in eum semen Porri emittit.

Diligenter notandum est Ambrosii Paruum uti cauliculo Porri inuncto oleo ad deturbandam spinam aut ossiculum hærent in faucibus, ut videre est lib. 17. de operat. chirur. c. 24.

Remedium optimum ad lumbricos, credit Timor. Ross. Si folia Porri applicentur regioni vetriculi, æger interea sedeat in lacte tepido vel aqua mellita.

PORRVM SECTIVVM ET SCHOENO- prasson quibusdam.

Confertim in fasciculos plures nascuntur Chuius plantula, inplexu mutuo coherentibus bulbis albis, odoris Capaci, quo etiam prædita sunt iuncea folia fistulosa, Cepæ adolescentis: sesquipalium aut dodrantem etiam alta, flores ex verticulo albedo umbellatim prodeunt, quorum singuli, foliis constant semper acuminatis.

Temper.
Calidum.

Nara
Stomachū
nocet
Nervos
mica
visum ha-
berat
Quibus co-
mendum d
Porrus
Corrigem-
tia.

Vocem in-
uas

Apoll. rā
prebend-
cor.

Explosivū
quorundā
opium.

Acerum rā
fructus.


Spinā

Lumbricū

Descriptio

Odor.
folia

Flora



Nomina
& Synon.
Cepa munda
ma.

tempus.

Porrum sectile.
*Curat se-
ra, iuu.*

*Si nimium
durum dicitur.*

Gethyllis.
Cepa
Gethyon.

Ascalonica
Polestima.

Idem.

colore dilute
purpureo,
itria saturatio-
re medium fo-
lium percut-
rente; itamina
albida apici-
bus flori coh-
coloribus.

Porrum se-
ctium Tragi,
minimum est
Cepæ genus.
Quod verò il-
li in magnitu-
dine deest, hoc
numero resar-
cit. Siquidem
vna planta du-
centis non-
nunquam co-
pactis Cepu-

lis constat, ita tamen ut à se mutuò diuelli, & sin-
gula pargi, aut plures coniunctim plantari pos-
sint, & fructuosi quidem succellus plures namque
coniuncti, terræque insertæ, hyemis frigora fa-
cile ferant. Ex appetente Febuario rotunda,
fistulosa, & viridia proferunt foliola, minimis
lanceis similia, eademque copiosa & frequentia,
quæ Maio mense aduentante, capitulatis, & pur-
pureis floribus instar Cepæ sativæ in cacumine
erigunt. Sunt qui *Porrum sectile* esse existimant,
quorum iudicio ipse subscribit. Serapio *Porrum*
curat, vocat, Hebræi quidam *Kerešed* appellare
videntur. *Porrum sectium*, Græcis *ἀσκαλονίτιον*
ἐπίχον nostris [inquit Cornarius] *Schnitlauch*
& *Bisslauch* appellatum, eò quod coma frondens
adhuc ad terram usque refecari solet, & in ciba-
ria ac obsonia addi. Nouit & hoc Martialis Poëta
quid de eo sic ait in *Acneis*:

Fila Tarentini grauius redolentia Porri
Edisti quoties, siula clausa dabo.

Schœnoprasum Dodonæi gall. destituitur no-
mine Græco & Latino. *Porrum sectium* (quod
à Dodonæo *Schœnoprasum* ficto nomine, & in-
ferioribus Germanicis *Biesfloet*, aliis *Bisslauch*
vocatur) *Gethyllis* horri *Gethyllidem* appellauit,
quam Nicandri scholiastes *Ceparum* genus es-
se dicit. Carolus Steph. Ruellium secutus *Gethyon*
Theophrasti interpretatur *Portetam* vul-
gò à Gallis dictam & *Cinetam*, qua *Portaginem*
& *Capulam* hoc est *Porrum sectium* à Germa-
nis, vulgò dictum designant, idque in agro: Idem
in horto: *Bulbi* genus, inquit, vulgus nostrum vò-
cat *des Porretes*, vel *Oiggonettes*.

Auers. *Schoenoprasum*, Germ. *Bintzenlauch*
nominant, non *Bisslauch*: quam perperam Com-
mentatur Theophr. *Ascalonitidem* siue Palesti-
nam dicit.

Lobel. Obs. & Icon. pl. *Schœnoprasum*, Asca-
lonica Matthioli.

Lonic. *Porrum sectium*, *Porrum Tarentinum*.

Pars maxima Herbariorum Germaniæ, docet
nostrum *Cyue* (Turneri verba sunt) seu Germa-
norum *Schnitlauch* esse *Porrum Sectium*, lon-
gè tamen falluntur: siquidem illorum *Schnit-*
lauch *Gethium* est, inter *Cepas* à Plinio recens-
situm, non igitur *Porri* genus est. Ut enim om-
nia *Ceparum* genera fistulosa habent folia: ita
Porri genera folio sunt plagiato carinato.

Porrum sectium non nisi vbique obuium.

Porrum Sectium, ait Plinius lib. 20. c. 6. pro-

fluua sanguinis sistit in naribus, aut fito co-
turatis, vel gallæ misto, aut mentæ: Item ex a-
bortu profluua, potu succo cum lacte mulierum.
Tussi etiam veteri ac pectoris & pulmonis vitiis
medetur. Illitis foliis sanantur & ambusta, & epi-
nyctides: ita vocatur huleus, huleus aciem habe-
tans & in ang. Alii. Certè in M. hæc verba, quæ &
syce, desunt. Jquæ & syce, in angulo oculi, per-
petuo humore manans. Quidam eo nomine ap-
pellant pustulas liuentes, ac noctibus inquietan-
tes. Et alia hulea cum melle trito. Vel bestia-
rum morsus ex aceto: item serpentium. Aurium
verò vitæ cum felle caprino, vel pari mensura
mulsi: stridores cum lacte mulieris, capitis dolo-
res si in nare fundatur: dormitur siue in aurem
duobus succi cochlearibus, vno mellis. Succus &
ad serpentium scorpionumque ictus (potus. CH.)
bibitur cum mero, & ad lumborum dolores cum
vini hemina potus. Sanguinem verò excreanti-
bus & phthysicis, distillationibus lōgis, vel succus,
vel ex ipso cibus prodest. Item morbo regio, vel
hydropicis. Et ad renum dolores, cum prisanæ
succo acetabuli mensura, idem modus cum melle
vulvas purgat. Estur verò & contra fungorum ve-
nena: imponitur & vulneribus. Venerem stimu-
lat: sitim sedat, ebrietates discutit. Sed oculorum
aciem hebetare traditur: inflationem quoque fa-
cere, quæ tamen stomacho non noceat, ventrem-
que [mollire *non videtur*. Diosc.] mollire: Voci splen-
dorem affert. Eius frequens vsus est verno tem-
pore in cibis, ut acetariis & iusculis, eo modo
quo iuniores *Cepæ*: hinc *Tragus* ait, in nostris
regionibus, id est, Germania, *Porri sectii* verno
tempore dū aliz Culinariæ herbæ adolebant, ad
placetas quas *Pfannenfuchen* appellat, vtuntur.
Gustu *Cepa* refert, sed remissiore sapore præditū,
Nos sanè tum propter saporem tum propter formā
foliorū fistulolorum, potius ad *Cepæ* genus refe-
rendum censemus. *Tragus* 743. *Porrum sectile* ad
intinctus, qui cibis adiunguntur, admodum vtile
est, si cum aceto folia eius tusa temperentur. Et
Cepas, *porta*, & alia pauperum esse fercula, ac, se
mutuò consequi, trito fertur diuerbio. Affidus
eius & nimius usus capitis dolores excitat, sto-
macho, renibus, & vesicæ non satis conuenit. *Por-*
rum sectile aluum emollit, exulcerationibus pul-
monis cum melle prodest, vitia thoracis educit,
semenque genitale calefacit, & auget. Hinc Ba-
ptista Ejera ita cecinit.

Tabida cui cura pulmonis membra & ambelum
Pectus, cum Porri torrida coena vocat.

Cura mihi est stomachus, placidissima somnus,
dentes,

Sis licet elixum non tamen illud edam. &c.

Porrum Sectile ad omnis generis ulcera & apo-
stemata adhiberi potest licet *Cepa*.

ALLIUM VVLGARE ET SATIUM.

CAP. III.

EX *Cepaceorum* delineatione nonnullas *Alli* Descripti
notas rectè mutuabimur; *scapus* ergo proce-
rus, enodis, concavus, glemaratim congestos in
magna capita flores sustinet *Cepaceos*, rupto fol-
liculo apparentes, post modum & nucleos paruos
quib' posset propagari. Verum *folia*, non ut *Cepis*
fistulosa, sed graminea: bulbis denique non sim-
plex, sed numerosis nucleis sub vna comuni ran-
dem membrana collectis constar, sapore peracri-
vnde fibræ candidæ dependent.

De

De Aliis ,
quæ Cepacei
etiam generis
sunt, Theophr.
lib. 7. hæc tra-
didit : Differunt
Allia quod al-
terum sit sero-
tinum, alterum
præcox : est e-
nim genus
quoddam, quod
sexaginta die-
bus perficitur.
Differunt &
magnitudine
& paruitate.

Magnitudine
excellit maxi-
mè quod Cyp-
rium voca-
tur, quod non
decòquunt, sed
ad interita, quæ
Myrica appel-
lantur, vtutur,
& cum teritur
in molem ad
mirandam fla-
tu intumescit.
Præterea quæ-
dam ex spiciis
non coagmen-
tantur. Dulce-
dinis autem, o-
doris, & crassi-
tudinis Allio-
rum, quemad-
modum & cæ-
terorum sato-
rum, causa sit
natura loci &
cultus.

Ex quibus
hæc sumpsit
Plinius lib. 19.
cap. 6. Allium
ad multa, turis
præcipue, me-
dicamèra pro-
desse creditur.
Tenuissimis &
quæ separan-
tur in vniuer-
sum velatur
membranis,
mox pluribus
coagmentatur
nucleis, & his
separatim ve-
sticis. Asperi
saporis, & quod
plures nu-
clei fuere, hoc
est asperius.

Tedium huic
quoque halitu, vt Cepis, nullum tamen coctis.
Generum differentia in tempore. Præcox matu-
rescit 60. diebus, tum magnitudine. Et mox. Vl-
picum quoque in hoc genere Græci appellauere
Allium Cyprium, alii Ophioscorodon, præcipue

Africæ celebratum inter pulmentaria turis, græ-
dius alio. Tritum in oleo & aceto, mirum quan-
tum increseat spuma. Ex his itaque intelligi-
mus, quod Theophr. Cyprium appellari ait Al-
lium magnum, quod Latini Vlpicum dixerunt,
& Dioscor. Ophioscorodon. Deinde quædam
Allii genera nucleos non habere negat, quod so-
lum genus Diosc. in Aegypto nasci dixit.

Duo itaque sunt Allii genera, sativum & syl-
vestre. Hoc Colum. lib. 11. cap. 1. *ἀσπίδιον* vo-
cat, fortassis à spuma, quæ increseat, vt Plinius ait,
aut, vt Theophrast. *ἐκασπίδιον*. Idem Columella
non Cyprium, sed Punicum Allium appellat, vt
ἀσπίδιον appellatio facta videri possit. Verba
eius hæc sunt. Vlpicum quod quidam Allium
Punicum vocant, Græci autem *ἀσπίδιον* ap-
pellant, longè maioris est incrementi, quàm Al-
lium.

Galenus Allium quarto abscessu siccare & ca-
lescere dicit. Ophioscorodon autem sylvestre
Allium sativum validius esse, quemadmodum e-
tiam alia sylvestria. In Plinio tamen loca supra
citato, vulgari codices antiscorodon habent, pro
Ophioscorodon: & Dioscor. etiam Elaphoscoro-
don vocari ait: vt varix appellationes vnius rei,
pro occasione factæ videantur.

Ceterum nunc autore Dioscoride Allium
partim sativum est & hortense, & hoc in Aegyp-
to vnius capitis est, quemadmodum Porrum,
dulce, ad purpureum colorem vergens, paruum
reliquum vero magnum est, multorum capitum,
album. Vocant autem acinos in ipso, aglithas,
id est, nucleos. Est & aliud sylvestre Ophioscoro-
don vocatum, id est, Allium anguinum siue Vi-
perinum, & Elaphoscorodon.

Cordus in hist. dicit duo genera Allii, vnum
vocat Allium sativum multifidum: alterum, Al-
lium alterum sativum amphicarpon, & postea
cap. 78. tradit Allium simplex, indiuiduum v-
trumque.


Allium etiam si vulgò omnibus notum sit,
tamen affabre, Cornar. teste, depingitur à Plinio
lib. 19. c. 6.

Quas *ἀσπίδιον* & *ἀσπίδιον* Dioscor. dixit, Theo-
phrast. *ἀσπίδιον* appellauit, Plinius nucleos, Colu-
mella spicas. Græci item *ἀσπίδιον* & *ἀσπίδιον* ap-
pellant. Allium quod Græci Scorodon, vulgus
nostrum [ait C. Steph.] *des aux*. Ceterum caput
Allii Antiqui (inquit Galenus) *ἀσπίδιον* nomina-
bant vulgus nostrum *Teste d'aux*: Allii autem co-
mas cum capite solo Molyzam appellat.

Cam. apud Matthiolum de Allio scribit, sed
in eadem tabella ponit figuram Allii & Ophio-
scorodi. Debuisset itaque Camerarius indicaf-
se, quam figuram pro Allio posuerit.

Quod *ἀσπίδιον* Græci, Latini passim Allium h-
tense, domesticum siue sativum vocant, Arabes
Chaum, Chayin & Thum. Germ. Knoblauch vel
Knobloch, Belg. Looch. Galli *Ail* & *Aux*, It. *A-
glis* & *Aio*, Hisp. *Ajos*, Angl. *Garlyfe*, Boh. *Ges-
sueg*, Hung. *Jof Hagyma*.

Allium obseruatur vbique Gentium ferè: Lug-
duni verò maximum folio simili omnino Porro,
vt vix odore discerni possit. Allium non facile
seritur, Nam si ex semine hoc plantare necesse
esset, non solum tardius, sed etiam admodum exi-
guum proueniret, ita quidem (Theophrast. teste)
tertio demum anno perfectum redderetur. Asse-
rit autem Didymus, si Luna sub terris posita se-
ratur, & rursus altero à satum mense, antequam
nouis nucleis conglomeretur bulbus, sub terris
luna latente vellatur, odoris sorditate carere &



Ophioscorodon

Ophioscorodon

Aegyptium

Aglis

Ophioscorodon

Elaphoscorodon

Synonyma

*Locus, tem-
pus, satio,
suisio,
M. Agonia,
delectatio,
repositio,
adfermatio*

dulcescere, ubi verò ad iustam maturitatem peruenit, & perfectionem adeptum fuerit, ac quò plures in eo spicas coaluerint, hoc asperius & acrius sentiri. Sed ut historiam Allii absoluiamus, cum iam maturitatem suam consecutum est, id quod plerumque circa Festum D. Iacobi fieri consuevit, Allium euellit, ac vnà cum Cépitiis suis fronde in locis fumo peritis suspensum, ad insequentem usque annum conseruatur. Satiuum igitur Allium primo Vere, quo ciconiæ ad nos redire solent, in terram mediocriter cultam, aut naturâ suâ alioquin bonam, nec nimis fortem, aut lentam deponitur. Fiunt autem tum nucleorum eius aut spicarum diuortia, singulaque tum spicæ litatim depanguntur, interuacante digito longa mensura. Hæ verò spicæ intra paucos dies erumpunt. Cæterum, optimè plantatur in terra maxime alba, foliata & subacta, sine stercore, licet in alia terra etiam stercoreata proueniat. Sarculanda sunt frequenter, (ut Crecent. inquit, ut melius eorum capita crescant, si benè capitata facere volueris, ubi ceperint eorum stipites prodire, proculcas ita quòd succus reuertatur ad ea. Colliguntur cum eorum stipites se amplius sustinere non possunt, in lunæ defectu & claro aëre. In paleis condita vel fumo suspensa durabunt.

Ad faciei maculas, ephelidas dictas, Allii cortex, inquit Hisp. in uterum subditur, & postridie (postero die) inspectatur, num odor ad os proueniat, quod si sic, concipiet; sin minus, minime. Idem ait m. m. Cum mulier peperit, neque secundis est liberata, ea dare præstiterit ex quibus puerperii purgamenta potissimum expurgantur, Allia cocta aut assa ex vino & oleo, cum paruis polypis & Cépulis. In vapore & foru uterino, in ollam Allia sicca iniicienda, eaque minutim magis fracta, quàm quæ contusa sunt, & aqua quæ tribus digitis excedat ut macerentur assundenda, virulique marini adeps infundendus: &c. In coena autem & in cibo, maza panis & Allia cruda & assata, & cocta, concedenda. Si uteri ad coxendicem decurrant, menses cum crassi sint, non eant, dolor ad imum ventrem permeet, & ad lateris inanimitatem, morsumque percipiat: cum sic habuerit, copiosa & calida lauanda, eique Allia plurima, comedenda, danda. Scabies extenuatur, trito Allio defricto, eodemque remedio, aut ore Columella, curatur rabiosi canis morsus.

Ophio scorod.
Elapho scorod.

Vim acrem obtinet Allium ut contendit Dioscor. exalfacit, mordet, status pellit, alium turbat, stomachum exiecat, sitim gignit, inflationemque facit, summam corporis cutem exulcerat, & oculorum aciem esu hebetat. Eadem præstat esitarum Ophio scorodon, quod & Elapho scorodon, quasi Ceruinum Allium, nuncupatur. Sed & latas quoque tineas, in cibo pellit Allium, urinæque detrahitis: morsus à vipera & hæmorrhæo maxime, si quid aliud, confecto, dummodò continuò post vinum superbibatur, aut ipsum è vino teratur ac in potione sumatur. Quin & eodem vsus, & contra canis rabiosi morsus utiliter imponitur. In cibo verò sumptum contra mutationes aquarum proficit, [fauces expediendo, easdemque asperas leniendo] voci splendorem affert, veterem tussim crudam coctumue in cibo lenit. Potum autem cum origani decocto, pediculis ac lendes enecat. Combustum ac melle subactum illicumque, oculorum fugillationibus medetur, & Alopecius cum nardino unguento. Cum sale verò & oleo sanat papularum eruptiones. Vitiliginem quoque, lichenas, lentiginis, ulcera capitis manantia, furfures ac

lepras cum melle eximit. Cum thute & tæda decoctum ac in ore detentum, dentium dolorem imminuit. Cum ficulneis foliis & cumino, contra muris aranei morsus imponitur. Comæ decoctum foeminarum decessionibus additum menses secundasque partus extrahit. In eundem quoque vsu suffumigatur. Cæterum factum ex eo & oliua nigra intutum, quod mittoron vocant, esu urinæ cit, ora venarum patefacit, ac hydropicis quoque est vtile.

Cæterum, vires Allii largius aliquando, Plinius exponit quàm Dioscorides, dum inquit, Allio magnæ utilitates contra aquarum & locorum mutationes. Serpentes abigit & Scorpiones odore: atque ut aliqui tradidere ex bestiarum omnium ictibus medetur potu, vel cibo, uel illitu: priuatim contra hæmorrhoidas prodest, cum vino redditum vomitu. Ac ne contra areneorum murium venenatum morsum valere miremur, Aconitum, quod alio nomine pardalianches uocatur, debellat: Item Hyoscyamum; canum morsus, [inquit M.] in quæ vulnera cum melle imponitur. Ad serpentium quidem ictus potum cum [radiculis bulbo subannexis. Alii vestibis, id est membranis corticibus] restibus suis efficacissimè ex oleo illinitur: attritisque corporum partibus [vel si vesica intumuerit M.] vel si in vesicas intumuerint. Quin & suffit [hæc eadem ex Plinio tradit Ruellius quem non nominat] eo [secundas & partus. Ver secundas à partu. Aliud lego, secundos partus, ut infra cap. ii.] secundas partus euocari existimauit Hippocrates: cinere eorum cum oleo, capitis vulcera manantia sanitati restituens, Suspiciosus coctum, aliqui crudum [id tritum dedere M. id dedere. Diocles hydropicis cum centauro, aut inter duas ficos exceptum: vel fico portione dupla addita] fico duplici ad euacuandam alium, quod efficacius præstat, viride cum Coriandro in mero potum. Suspiciosus aliqui & tritum in lacte dederunt. Praxagoras & contra morbum regium vino miscuit: & contra ileum in oleo & pulte, sic illinens strumis quoque. Antiqui & infanientibus crudum dabant. Diocles phreneticis elixum. Contra anginas tritum imponi, & [gargarizare CH.] gargarizare prodest, dentium dolorem tribus capitibus in aceto tritis [minuit CH.] imminuit, vel si decocti aqua colluantur, addaturque ipsum in cana dentium. Auribus etiam instillatus succus cum adipe asferino: phthiriasæ & [porriginis Ver. & CH.] pruriginis, potum, item cum aceto & nitro compefcit distillationes cum lacte coctum, vel tritum [permistumque Ver.] permistumque casto, molli: quo genere & raucitatem extenuat: Vel phthirum in fabæ sobitione. In totum autem coctum vtilius est crudo, elixumque tosto: sic & uoci confert: [Tineas alii.] Tineas & reliqua animalia intercanorum pellit, in aceto mullis coctum. Testes in pulte medetur: Temporibus doloribus illitum elixum, & pustulis coctum cum melle deinde tritum: Tussi cum adipe vetusto decoctum, vel cum lacte: Aut si sanguis etiam excreetur, [vel pura CH.] vel purulenta, sub pruna coctum & cum mellis pari modo sumptum: conuulsis ruptis cum sale & oleo. Nam cum adipe tumores [ne in abscessum, vel gangrenam, transeant, Alii Cancerosos alii pestilentes, aut venenatos alii:] suspectos sanat. Extrahit fistulis vitia cum sulphure & resina etiam [harundinum infixas assulas, nam ex harundine sagittæ fiebant.] Harundines cum pice, lepras, lichenas, lentiginis exulcerat, sanæque cum origano, vel cinis eius ex oleo & garo illitur. Sic & sacros ignes.

Sug-

Sagillata aut liuentia ad colorem reducit, combustum ex melle. Credunt & comitiali morbum, [sanari M. & CH.] sanare, si quis eo in cibo utatur ac potione. Quartanas quoque excurrere porum caput vnum cum Lacerpiti obolo in vino austero. Tussim & alio modo ac pectorum suppurationes quantalibet sanat (facte CH.) tractat incoctum faba, atque ita in cibos CH. velbo sumptum, donec sanitatem restituat. Facit & somnos, atque in totum rubicundiora corpora. Venerem quoque stimulat cum Coriandro viridi tritum, porumque e mero. Vitia eius sunt, quod oculos habeat, inflammationes facit, stomachum laedit, copiosius sumptum (Galeno c. vlt. lib. 2. methodi, Allium sitim prorsus nullam facit.) sitim gignit, Cetero contra pituitam, & gallinis & gallinaceis prodest mistum fere in cibo. Iumenta urinam reddere, atque non torqueri trahunt (si eo trito M.) si trito natura tangantur. Apud Plinium porro per hemorrhoidas, non sedis affectionem accipere oportet, sed serpentis genus, in quo mas, hamorrhus: femina vero hamorrhols vocatur, velut Aetius 3. c. 23.

Maxime omnium in colica affectione apud Ant. Mariam Allium est in usu coctum.

Sed hic de allio perdifficilis oritur questio. Allium enim (inquit Iohan. Matth.) flatus generare docent Hippocr. co. n. 4. de victus rat. a. tex. 90. nec non epid. 88. text. 33. Plin. lib. 20. c. 6. Ruell. lib. 2. cap. 8. Diosc. vero Galen. & Aetius contra flatus praestantissimum esse remedium libens prodiderunt. Hippocr. Plinii & Ruellii sententiam confirmat quod Capas Aegin. & Oribasius ad generationem flatuum & vomitionem conferre docent: atque hic etiam facit quod communiter experimur post coctionem Caparum & alliorum frequentissimum excitari flatibus metus fieri. Verum cum clariss. sit Galeni doctrina lib. 3. de sympt. causis cap. 2. flatus fieri a visceris pituitosis vel cibis deficientem calorem habentibus: Allium autem & Cera, nec deficientem calorem habeant, sed manifeste excedentem, nec pituitotum humorem gignant, sed eum qui tota natura pituitoso humori repugnet, sequetur absurdum esse Hippocr. Plin. & Ruellii sententiam. Galenus ut Hippocratis auctoritatem in hac coctione tueretur, in com. de vict. ac. inquit librum istum non esse genuinum Hippocr. Idem de textu qui habetur a. Epid. responderi potest. Sciendum autem Allium & Cera per se & ex sua natura flatus minime quidem gignere, eo quod tercia sunt & calida, ex accidenti tamen, quando in corpus crudo phlegmate repletum ingeruntur, eo ipso dum phlegmata attenuare & resolvere nituntur, flatus quoque exulcerant: quos si bene accidentaliter exulcerant, sic per se etiam suaeque natura innati caloris beneficio dissipant & consumuntur. Idem in Discursu de febr. Pe. Ghentiali pag. 24. Ad praeservationem profunt Allia, Cera, Sinapi, Raphanus marinus, quae non alimentis sed condimentis loco vtiliter utantur. Mira igitur quorundam cumopitas, qui famosi haec rusticorum antidota ignoranti populo suspecta reddunt, & prorsus vitanda esse colunt: sed ex quo fundamento hoc ipsis liceat, ipsi viderint. Saepe quidem scio, immodico & frequenti rerum acrimia viscerum sanguinem incallescere, multumque biliosi humoris generari: pestilentes vero febres inde oriri, firmiori probatione indiget. Nonnulli cum viderent capas cum Theriaca sub prunis assatas & tumoribus pestilentibus impositas, venena attrahere, suspicari

Tom. II.

sunt easdem capas intra corpus assumptas omni externam malignitatem ad interna viscera pertrahere. Verum Gal. lib. 3. Temper. cap. 1. haec somnia satis refutat: non enim quae foris imposita attrahunt vel exulcerant, illa etiam intus assumpta idem praestant: acrimonia siquidem coctione & visceris ventriculi humiditatibus permixta plurimum remittit: unde Marcellus etiam ipsum caparum succum expressum, peste laborantibus propinare minime vetatur. Sic Roscellus praestans Medicus eundem succum ex capis presum pro arcano pestis remedio exhibet, reliqua vero caparum pulpa tumoribus pestiferis imponit. Accedit quod Solon antiquus auctor memoriz prodidit, caparum usum firmam valitudinem conferre. Nec Horatius Alliorum usum suspectum reddere potest, quando inquit:

Parentis olim si quis impia manu

Senile guttur fregerit.

Edas cicutis Allium nocentius?

O dura messorum illa!

Quia hoc veneni sentit in praecordia.

Apparet enim Horatium Poetarum more ludere, ac id cui forte allucius non fuit, iocose reprehendere. Constat alioqui Allii usum contra venena in Vngaria & Italia potissimum astutus tempore, quando messoribus & agricolis venenata reptilia nocere possunt, vtilissimum esse: Unde Virgilius

Nunc virides etiam occurrunt spinea laceratas

Thyrsis & rapido sessis, messoribus allum

Allia, Serpillumque verbas coniundis o-lentes.

Eiusdem conditionis sunt, Sinapi, Raphanus marinus & similia. Si enim naturam illorum perpendamus, omnia haec superfluas corporis humiditates consumere & venenis potentissime resistere valebunt. Hinc non sine graui causa Sinapi in compositionem Eleutherii, quod Quam aureum vocat, tanquam principalis pars ingreditur. Nec immoderatum horum omnium usum cuiquam consulere velim, sed quantum condimenti ratio permittit. Dignum & illud notatu, quod Iac. Ruellius prodit: Si matris per pudenda prodeat experimentum valde utile. Allium contusum in aqua ita dissolue ut nihil spirititudinis reliquum sit, ea aqua proluens matrix lauetur. Quod Forestius l. 9. Obseru. 10. notat. Mercatori cuidam Delensi de hydrope periclitanti cum crurum inflatione. Allium comestum maxime profuit. Quis solo aliquando in Gallia hydropticum curauit, cui exsequis profuturum ad eachexiam & hydroperum inclinatus videretur.

Sed nihil eque ex omni parte beatum. Nam ut Tragus perhibet, unum est in Allio detestandum, nimirum foetidus ille ac fortissimus odor, quo cerebro officit, caliginem oculorum facit, iram commouet, siuin excitat, somnumquo inducit: quae omnia in gallo gallinaceo videre est, qui Allium deuorauerit. Ceterum mirum alicui videbitur quia ratione fortentem anhelitum a Cera prouenientem teret Allii odor emendare queat, id quod Thomas Morus in suis Epigram. attestatur.

Deuotus facorem si vis depellere Cera,

Hoc facile efficiet Allia mansa tibi.

Spiritus at si post etiam grana Allia restat,

Aut nihil aut tantum tollere merda potest.

Sed posterius hoc pentametrum veritate carere Tragus hilce testatur. Si quis postquam Allium, elisauit, non possit odoris terri foeditatem sus-

Aaa 2

sum, ut Cera, sub quo, florum glomer purp-
tasit. staminulis emicantibus luteis, magnitu-
dine pugillari: sessili Clusio Cepaceis amiles,
sex exalbidis foliolis constant: quibus succedunt
trigona capitula, in quibus nigrum semen Cera
semini par eidem Clusio: bulbus ei infestilis, par-
at Cera equalis, multis albis tunicis constans,
libratis, florum glomeri suppar, & spicis multis,
allii ritu coherentibus, odore & sapore remissio-
re, Clusio graui odore, mediocriter inter Allium
& Porrum: Vetustate in alios maiores bulbos se-
se distidens, adnatis etiam extrinsecus bulbillis,
triangularibus fere, tunica dura inuolutis, semi-
nis vicem suppleturis: semen adhuc nullum vi-
dimus.

Sicut autem nomen Allii & Porri Scorodopras-
on refert, ita etiam, Cornario teste, qualita-
tes & vires vtriusque possidet. Officina hinc Al-
lium porrum vocant: Germ. verò Aherland
quasi iterum porrum dicas. Ast quam Plantam
per Allium porrum intelligat Cornarius con-
sideratione cetero dignum. Clus. in Pann. & hist.
post. Scorodoprasion primum. Lob. obs. & icon.
pl. pag. 157. Item Camer. apud Matthioli. Germ.
Scorodoprasion, Germanice Aher oder A-
herfnohlach. Gall. *ail porreau*. Ital. *aglio por-
ro*. Hist. *ail porrum*. C. Bauh. phyt. *Allium
terrestris* hinc Sphariticum.


An Tabern. icon. & hist. Porrum Syriacum,
Synspherlauch, qui sola contentus icone non
demonstrat quam plantam intelligat. Compil.
Tabern. sequitur Gerard, qui iconem eius habet
plantamque Alpinam efficit, quod non placet. Vo-
cat siquidem Scorodoprasion, Angl. *Creasmon-
taine garlic*.

Scorodoprasion nascitur Dioscoridi, velut ma-
gnum Porrum. Clusio Iunio & Iulio floret, qui
Viennam obseruauit, cui pauci bulbi Bizantio al-
lati sunt, postquam Viennam venisset. Vnicus au-
tem quem seruauerat, mirum in modum se pro-
pagauit, ut successu temporis multis elargiri po-
tuerit. Et quidem Iunio initio suum caput con-
torquet: Iulio autem erigit, eodemque mense,
bulbos ad maturitatem perducit, qui si terræ cre-
dantur, sui generis plantas procreant. Ego
Montbelg. copiosum habeo in horro Ill. E. C.

Allii & Porri qualitaris parriceps. Vnde etiam
mixtas vires habet, & facit quæcunque & Allii
& Porrum, remissè tamen. Olerum modo autho-
re Dioscor. in cibi usum venit, & velut Porrum
coquitur ac edulcatur. Galen. & in sapote, & in
odore mixtam Allii & Porri qualitatem Scorodoprasion ait habere: & eodem modo etiam in
facultate. Ita quoque Paulus, sicut & Dioscor.
Suum Scorodoprasion apud Turcas esse in deli-
tibus, Clusio aliquando referebat Illustr. Augerius
& Bousbecque.

ALLII GENVS. OPHIOSCORODON dictum quibusdam.

Allii genus, Porro & Scorodoprasio si-
mult, cuius bulbum multis nucleis con-
stantem, fibrisque numerosis exalbidis capilla-
rum, sessili parte circumuolutum tunica Cepacee
binæ aut ternæ ex albo purpurascens: *caulis*
singularis, minimi digiti crassitudine, ses-
quicubitalis, aut bicubitalis: *folia* ut plurimum
quinque Porraceis carinatis donatur: quæ post-
quam caulem aliquotque inuoluerunt, ab eo
abscedentia reflexa terram spectant, medio, au-
tore Clusio, inter Porrum & Allium odore: su-
Tom. II.



prima por-
ro caulispars
nuda, vndis-
latis, in gy-
rum vnum
aut alterum
spiratum ser-
pentinè mo-
re, intorquet-
tur, donec
taudem ca-
put erigat,
vagina albi-
cais, corai-
culat, extra
volumina
protrusa, lō-
ga & crostrata,
qua dehi-
scere bulbuli
apparent,
concelli, ini-

tid purpurascens, postea exalbidis, & inter hos
suspens. tot. planta grauem Allii odorem spirat.

De hoc Clusio in Pann. & hist. post. scribit, vo-
cans Scorodoprasion alterum. Sicut, inquit, qui
sp. cro. *ail* appellent quia, caput cum iuxta
caulis parte serpentinè instar se contorquet.

C. Bauh. phyt. Moly terræ hinc Serpen-
tinum Lobel. Allium 2. hinc Satiuum 2. amphi-
carpum Cordi. Allium 6. hinc capite ex multis
bulbis confecto & confecto, Scorodoprasion 2.
Clusii. Sed nunquid entia multiplicat Fr. C. B.
qui tres diuersas plantas statuit?

An Cordi in hist. pl. Allii satui alterum genus
quod Ampicarpus appellat.

Dodon. in fol. figuram Clusii habet nomine
Ampeloprasion cap. tamen 12. meminit *ail* *ail*
Cordi, nec tamen idem cum Ampeloprasio facit.

An Lob. Obs. & Icon. pl. p. 152. Moly serpen-
tinum vocatum.

Camer. in hist. Matth. in tabella Allii figuræ
habet duas notatas numero 3. & 6. quas refero
ad nostrum Allii genus Ophioscorodon dictum
quibusdam. Idem in horro Allium Creticum
vocat hinc Serpentinum, Scorodoprasion in Pa-
nonicis Clusii. Hortus Lus. Allium Creticum
serpentinum Scorodoprasion Clusio, *Moly serpenti-
num* Angl. *ail*. H. Welsch *fnoblach*, *schlangen
fnoblach*.

Iunio initio suum caput contorquet, Iulio verò
erigit, eodemque mense bulbos ad maturitatem
perducit, qui terræ crediti, sui generis plantas
procreant. Est à nobis plantatum in horro Ill.
E. C. Montbelg. multos bulbos habens, ex cuius
bulbulis decidentibus nouæ oriuntur plantæ
quorundam Basileæ coluit in horro suo Cl. D. D.
Iacobus Zuingerus.

ALLIUM SIVE MOLY MONTANVM latifolium.

Moly, inquit Clus. Pann. & hist. post. etiam
in Vngariæ, Aultrix, Stiria, Morauiaque
montibus Moly siue Allii sunt genera, foliis
floribus, vel capitibus inter se discrepantia: quo-
rum maximam partem ab aliis hæcenus mini-
mè obseruatam fuisse existimo. Primum, *caulem*
habet duobus cubitorum altitudine excrecen-
tem, quem, ad medium usque, ambiunt folia, mul-

ALLIVM SYLV. BICORNE
flore viridi.

Descriptio
Frater Casp. Bauh. inter suas plantas siccas attulit nobis Allii sylvestris genus, Allio nostro bicorni. radice & foliis simile, regerminans in radice, cuius bulbum plantauimus in Horto Ill. E. C. in quo prouenit: comam non proferebat cæruleam sed viridem, copiosiores etiam flores, nec bulbuli ad flores. Nomina hæc erant adscripta. Gerb. Theophrast. Pallacana Plin.: Guiland. Allium vrsini in vulg. Cortuso. Alias vidi, sed non obseruavi locum.




Considerandum an respondeat huic Allio, illud quod a Clusio in Pann. & post. hist. exhibetur pro Allii montani quarti. species 2. siue Moly montano obsoletiore flore, de quo ille scribit: Allii montani quarti alia inueniuntur species pariter a litud. excresecens, similibusque propè foliis prædita, cuius coma inter laxas, membranaceasque, & longum mucronem habentes tunicas late sese explicat, floribus coloris valde obsoleti plena: radix superiori similis, nucleos etiam in lateribus præfert. An Plantacon. p. 158. Allium rubentibus nucleis.

ALLIVM SYLV. BICORNE PUR-
pureum proliferum.

Descriptio
Tenui sed duro, tereti, glabro & singulari est caule, cubitum alto, in quo folia tria quatuorve sesquipalmaria & dodrantalia, admodum angusta, crassiuscula: scapo summo insidet capitulum è bulbillis viridantibus glomeratum, è quorum commissuris emicant tremuli pediculi numerosi, sextantem circiter longi, pinnantes, flores còcolores sustinentes, sed dilutiores, è senis foliis, quorum medium stria saturatior, peccurrit, compositi, è medio profluentibus staminibus purpurascens, radices bulbaceæ plures simul cohercent, oblongæ, albæ, fibratæ, sapore Porri.

Idem existimamus à Clusio Pann. & h. post. traditum pro Allio siue Moly montano 1. de quo ait: Cubitali assurgit caule, tereti, rotundo, viridi, in quo terna plarumque folia, superioris folio angustiora, & veluti graminea: summus caulis caput sustinet duabus laxis membranaceis tunicis longiore mucrone præditi obuolutum, quibus sese aperientibus, multi exigui bulbi simul congesti apparent, inter quos flores sex, purpurascens foliolis constantes, & oblongis pediculis inhaerentes dependent: rotundam, albam, longis candicantibusque fibris capillatam radicem habet.




Prouenit inter fruteta oriam Batilex.

ALLIVM SYLVESTRE MONSPESSVLA-
num albidum Joh. Bauhini.

Monspessuli spontis suæ Allium mihi reportatum, caulem habet bicubitalem etiam migorem, album, cauum, festucaceum ferè, cuius fastigium in Cepaceum caput, sed minus, glomeratur, floribus singulis ad Allii vrsini flores accedentibus, maioribus quàm alterius vilius Allii sylvestris, tactu siccidimis, pediculis equaliter longis hærentibus, albis, quos sena componunt folia apices luteos circumstantia, non prædeunt, quod obseruauimus, ex longis vaginulis, sed breuib. obuoluuntur tunicis pr. ulquam erumpant: folia magna ex parte caulem complexa, cubitalia ferè, angusta, graminea. Bulbus subest parvus, oblongus, albidissimis pelliculis infectus, cui annexæ non tantum capillares fibræ, verum & nuclei parui adnascuntur, odore viroso Allii.

Florens repertum Aprili in monte non longe à Villeneuve quæ est Frontignanum vno milliati à Montpelio: Non vito Moly Diosc. id suspicabamur. Casalp. Allium vrsinum alterum.

ALLIVM FLORE LVTEO
siue pallido.

Cauli cubitali tereti insidet umbella dehiscens folliculo membranaceo sese explicans, floribus longioribus insidentibus, senis foliis, toridemque staminibus & stylo tenui longiusculè constantium. Semen maturat nigrum triquetrum.

HISTORIAE PLANTARVM.

crum: *folia angusta, pedem longa. Radix bulbosa, fibrata, nucleos quoque parit, unde propagatur, odore Allii.*


De hoc Allio censemus Clus. Paan. & hist. post. hæc scribere: cum ait, Allii montani quarti species prima, terna iuncea folia, caulem cubitalem, rotundum, &c.

C. Bauh. Phyt. *Allium 12. siue montanum flore pallido odore.*

Allium pulchrum coma lutea dono accepi Argentinae ex plantis siccis D. Agerii. Vidi etiam pulchre florens apud D. Fridericum Meier Argentinae mensis Iulii 8. 1595. Clus. Suum Moly montanum flore pallido odorato circa Posonium & locis Niclasburg vicinis in Moravia Iulio florentem obseruauit.

MOLY LUTEVM BOTANICORVM latifolium allii odore.

Descriptio



Exoticum Elegans hoc Moly luteum Botanographis indictum, à N. le. Quest Rhizotomo scriptum & in Pyrenæis montibus, n. labat (aiunt Aduers. parte altera) memoria, crurum: floribus est luteis senis foliis, pluribusque staminibus coloribus donati. Ornithogali Arabici floris lactei similibus, mi-

noribus tamen, vno exorte & pediculis, quampluribus in spithameo cauliculo, binis *foliis* latiusculis, Tulipæ Bonemensis siue Apenninae vocatae similibus prædico: vno latiore, altero vt plurimum angustiore. Radice verò pari, sed breuiore. Hoc anno 1604. nobis floruit Londini in horto Nobiliss. V. D. Baronis Zouche, & Franqueuille. Tota planta allii fragrat odorem, eoque Moly propior quam Ornithogalo luteo; Ornithogali autem lutei nomenclaturæ, quò carius distrahatur, à Rhizotomis perperam donatur.

*Ornithogalum luteum
Moly montanum
latifolium
flore pallido.*

Hoc quoque descripsit Clus. Exot. part. 2. Append. 2. Cuius quidem descriptionem ideo apponere placuit, vt studiosis rei herbariæ, hæc exoticæ raritatis planta eò facilius innotesceret. Moly igitur montanum, inquit ipse, latifolium, flauo flore, nunquam antè mihi conspectum mitterebat anno 1601. Ioachim Vener. Ioanni Hogelandio, in cuius horto insequente anno flores protulit. Illius iconem, & historiam, quia à nullo alio hætenus, quod sciam, tradita, hic adponere libuit. Habebat verò illud bina duntaxat folia, infimâ parte sese mutuo amplectentia, decem aut plures uncias longa, vnâ lata, surrecta, firma, supinâ parte nonnihil carinata, Porracei coloris, at odoris Allium referentis; inter quæ assurgebat caulis enodis & satis gracilis, firmus tamen, virescens, pedem altus, aut paullo amplior, sustinens summo fastigio prodeuntes ex

membranaceo folliculo bifariam diuiso triginta aut plures flores vncialibus vel longioribus pediculis, iisque firmis, subnixos, senis foliis stellæ in modum expâsis constantes, foris pallescentes, interiore parte prorsus flauos; occupante umbilicum triangulari capitulo sex flauis staminibus cincto, quorum apices etiam flauis: qui mense Iunio explicabantur, succedebant trigona capitula semen nigrum inæquale continentia: radix erat bulbosa, gemina, vt Orchidis radicem quodam modo æmularetur. Subsequente anno aliquot similes plantas ab ipso Venerio etiam accipiebam, & illas quidem vel singulari, vel gemino bulbo præditas, quarum ternæ aut quaternæ germinarunt, & florem tulerunt anno 1603. aliquæ quidè vno duntaxat folio præditæ, aliæ autem binis, vno ampliore alterum angustius amplectente, inter quæ prodibat caulis enodis, flores è folliculo membranaceo emergentes sustinens. Similes etiam bulbos eodem anno, cum plerisque alijs Plantis in Pyrenæis montibus eruris, venales adferebant in hanc Prouinciâ Rhizotomi quidam Galli.

ALLIUM QVODDAM SILVESTRE flore purpureo.

AVellanæ magnitudine radix, multos nucleos membranaceis inuolutos complectitur, pitydas imitatos: *folia* longa, gramineæ tenuitatis, caulis sesquicubitalis, iuncea: cuius summo capitulum insidet parui Mespili ferè magnitudine, strobilus purpureis glomeratum.

Descriptio


ALLIUM SPHÆROCEPHALVM purpureum Sylvestre.



Allii Sphærocephali bulbos è multis contextus est nucleis albis, tunica alba inuolutis, fibratis odore Allii graui præditis: *folia* tria quatuorue, palmu longa, interdum minora pro natalium ratione, vigente flore marcida, caulem fistulosa vagina complectuntur, qui cubitalis aut sesquicubitalis, colore & forma iuncea, teres, solidus, firmus, in summo fastigio sphæram gerit, ouo columbino parem, maioremque, purpuream, floribus constantem glomeratis paruis, sex foliolis constantibus cum staminibus concoloribus, in pediculis breuib.

Descriptio

Nostre icones fuerunt emptæ, Clusii melius placet, quam ponit sub titulo allii seu Moly montani, qui de eo scribens: Altitudine, inquit, cubitali assurgit, caule nudo, viridi, paucis foliis viridibus obito, cuius fastigio insidet caput orbiculare, in quo è multis floribus breui petiolo prædi-



ris congestum, qui sex foliola, nunquam sese protulit explicata, habent, sex in medio staminibus & stylo, elegantis purpurei coloris: radix bulbosa, alba, nucleos interdum tenui membrana rector, & proxime caulē lateribus adnatos habens, sessili parte multas albicantes fibras. Eius odor, Allii instar caput ferit. In Vngaria circa Pöbniun duntaxat obseruata, quum Pannonicarum stirpiū historiam publici iuris faciebam, ad vinetorum in collibus Danubio imminuentibus stirum margines, Maio & Iunio florib. diuistum. Postquam verò Viennā discessi, & Francofurium ad Mœnū p̄ueni, aliquot stirpes inter segetes agitis Allii ubi vicinis inuentas, in meum hortulum transtuli propter stirum elegantiam Anno 1599. Tercio autem post anno, binos eius bulbos Neapoli accipiebam a Ferdinando Imperato, qui flores duntaxat protulerunt Lugdunū apud Barauos, ubi demum quale genus Moly montani esset agnouit: paulo tamen praecocius florere mihi visum est illos, quod in Vngaria, quod Francofurti obseruabam: nam & illud Lugdunum adferebam. Item Exor. par. 2. Append. 2. Aliud Moly montani genus ab isto non valde diuersum miscebat Venerius Burdegalis, quod flores protulit in meo horto mente Iunio, sed in honesti Lopez horto multo tunc extrinseco duntaxat Septembri: paucioribus tamen floribus praeditum esse videbatur, quam vel Pannonicum, vel Neapolitanum, vel Fran. obscurum, illius minus etiam elegantibus.

Car. Steph. de re hortensi describens dicit, Allium sylvestre, Aulex sarrag. Græcis Ophioscorodon, quoniam serpentis Allium.

An Cordo in Dioscor. Ampeloprasen. Germ. wilderlauch. An verò *gryphoprasen* Gesner. apud Cordum in hist. qui Tragi figuram habens, dicit: Tragus Caninum vulgò cognominari ait, & Allium sylvestre Bundesnoblauch / Ampeloprasen esse colligit: wilderfnoblauch.

Exor. de stirp. sylvestris Allii genus. Germ. Feldnoblauch. siue wilderfnoblauch, qua haec genus herba diuisq; semine pro scordio vsi sunt Pharmacopolæ, & adhuc magno errore vtuntur.

Tragus lib. 2. cap. 69. h. c. pingit sub titulo: Allium caninum, sed id cap. 27. describit ac dicit: Plin. lib. 19. cap. 6. Allium sylvestre Vaginum vocat, id verò quod in aruis sponte nascitur Allium, Quod in vineis nascitur *gryphoprasen* Dioscoridi vocatur. Apud Paulum Aeginetam Porum agreste Germ. wilderlauch nuncupatur. Ego, vt verum fatear, non rite intelligo Tragum: vercor ne non separet Allium nostrum bicornem ab Allio Sphærocephalo, iudicent Lectores.

Fuchs. icon. & hist. eandem figuram habet cum Trago, ac scribit vocatque Allium sylvestre

primum *gryphoprasen*, anguinum Allium, wilderfnoblauch.

Matthiol. in Dioscor. describit & figuram habet non multum dissimilem à Tragi vel Fuchsi figura, dicitque, in errore versantur Arabes & eos securi, quod pro Scordio Allium sylvestre, quod Græci *gryphoprasen* vocant in pastillos thetiaceos addiderint, & in illius locum suffecerint.

Brassauolus falli deprehenditur libro suo de simplicium. Examine Romæ prius excuso, ubi sylvestre Allium ampeloprasen, siue Scorodoprasen appellari scribit: primum quod existimat Allium sylvestre Scorodoprasum vel Ampeloprasum esse. Deinde quod crediderit Ampeloprasum & Scoroprasum vnam & eandem plantam esse.

Dodon. etiam huius figuram ex Trago vel Fuchsio habet quam non rite describit, ac Allium sylvestre paruum vocat.

An Plant. icon. Allium sylvestre tenuifolium Teut. 195?

An Aduers. Scorodoprasen siue Alliopotrū, cuius descriptio manca & imperfecta.

Clus. in Pann. Allium sem. Moly montanum purpureum elegantissimo flore.


Cordi descriptio conuenit cum planta picta & descripta à Clusio, licet videatur aliam intelligi Gesnerus.

An Catp. Bauh. Allium 4. siue sphericum minus, quod Ophioscorodi minoris nomine collegimus: An ab aliquo descriptum sit dubitamus.

Allium Sphærocephalum purpureum, pulcherrimum visu est, ubi flor. Flores reperimus iuxta castrum Beckordianum mense Iulio, itidem circa Montbelgardum in planicie Bacham versus Andincourt, in segetibus, unde transtulimus in Hortum E. C. & olim, in multum fallimur, Montspeli. Genus in vineis & segetibus: Frater C. Bauh. reperit in segetibus Batlex. Allium in aruis sponte nascens in summo proceri caulis purpureos flores ostentat, colore & forma conspicuos, ac membrana ambiens spicas tubescit.

Corpus (vt Porta ratiocinatur) in meliorem colorem mutat sanguinem emaculando.

ALLIVM SPHÆROCEPHALVM bifolium italicum.



Vix sesqui- Descriptio
palmarē
altitudinem
adaquat. Radicula mittit o-
liuati, fibrata,
alba, nullotun-
nicarum foris
conspicuo ve-
stigio prædi-
ta. Colentus
rigidus & pro
planta pro-
portione sic
tatis crassus,
terresque sur-
git, atrouires,
binis folijs
crassis & ca-
naliculatis
vestitus. In
summo flores

lamin compressiora euadunt, cubito longiora, caulis aequalia, qui nudus, angulosus, in caput albicans oblongum desinens, eo dehiscente umbellam explicat alii vesini umbellae similem, strobili sex foliis apicibusque compositis colore purpurascens: florens mensis Iunii principio.

Frater C. Battulit nobis nomine alii Plinii ex horto publico Parauino. Ei magna similitudo cum alio umbellifero Petro. Considerandum an forte tantum eius variatio sit, ratione loci vel an idem cum alio siue Moly Narcissinis foliis de quo Clus. Pann. & hist. postt.


An Lobel. Obs. Moly foliis Narcissi, & Icon. pl. pag. 161. de quo ait: Alterum proceritate, & caule non absumile: sed floribus caeruleis, & foliis compressis, Narcissi similibus, & ferè paribus, oblongis, & albis radicis bulbis Porraceis simul implexis & coherentibus magno capitulorum stipatu: Alium odore praefertentibus, cuius aliquot bulbos adhuc habemus munere Raphaëlis de Coxia, summi humanitatis & stirpi magni admiratoris, qui non modò exoticarum stirpium haud penitendum numerum, sed & easdem affabre, arguta manu, summoque artificio pictas, ut si quis alius apud Belgas nobis dedit. Tabern. hist. Porrum filu. 2. & Icon. Porrum filu. 1. wild brislauch. Compil. Tabern. non describit: sed tantum ait Porrum filu. duplex: vnu foliis acutis: contrarium tamen est in eius figuris: quod enim acutis foliis est, latioribus est: erant multae diuersae notae si intelligit easdem quas nos intelligimus. Vna notabilis à flore umbellifero. Nos existimamus ei incognitas illas plantas.

Gerard. Angl. allium sylvestre Crome Garlic allia sylvestria ex parte aperi. Diosc. & proceritate, Anguinum & Ceruinum Allium. Icon apud Gerardum est Tabern. Considerent Lectores an descriptio & nomina conueniant Iconi propositae, & an prouenit planta quae pericane demonstrata in planitie Mamels dicta, & in 35. lington prope Londinum.

Clus. Nascitur cum precedenti in Leytenberg supra Manderfort ubi tepida sunt aquae quatum vlu multi valetudinem curant [praeterim calculo obnoxii], & aliis montibus Vrbis Vicinae vicinis.

ALLIVM SYLVESTRE PERPUSILLVM lanceifolium moschatum.

Descriptio **A**ridis, autore Lobel. Adu. par. 2. Nitidum agrum agri Mospelii vicinis collibus hic exiguus bulbus, conuictor & alumnus parili bulbo Hyacintho Autumnali. Caulis palmarum, recto, rigidiusculo, exili: è cuius summo sex circiter erumpunt propaggines, è quibus strobili veluti in umbellam positi prodeunt, quinque aut senis foliolis constantes: paruis, angustis & oblongis, Ornithogali floribus similibus, acuminatis, lineis fuscis in medio per longitudinem interstinctis; Asphodeli albi instar: coloris albi obscurioris, staminibusque in medio, Moschi planè odorem suauissimum spirantibus, praeditis: quibus succedunt capitula rotunda in quibus tria vel quatuor triquetra, oblonga, nigraque semina continentur. Bulbi subsunt parui, albi, oblongiusculi, Allii sylu. similes, ingratiq. odoris. Folia emittit lincea, exilia, tenuissima:



quaterna aut quina numero, vix vnciam longa.

Cum D. Guill. Coys bulbos alimus in horto, munere D. D. Leisteri Medici clariss. & Mospelio in Britanniam reducis.

Anno 1607. apud Fratrem vidi hanc plantam siccam ac pictam nomine Moly perpusilli tenuifolia. odorati.

ALLIIS AFFINIS PSEVDORCHIS Monophyllos.

Descriptio **N**on incommode forsitan, inquit Clus. hist. post Pseudorchis appellari possit elegans plantula, quam ex Italia rediens obseruabat Anno. 1591. eruditus vir Guliel. de Mera Barauus Medicus, & mihi Francofurti communicabat, paulò antè meum ex eà vrbe discessum. Habet verdè illa vnicum folium, ex membranaceo quodam inuolucro prodiens, semuncialis latitudinis, duarum vnciarum aut amplioris longitudinis, multis venis secundum longitudinem excurrentibus, & medio nervo praeditum, valdeque tenue, dum ressecatum est: ex eodem inuolucro prodit & cauliculus semipedalis, aut minor, gracilis, à medio ad summum fastigium, strobili quibusdam onustus, quorum forma mihi ignota, quia siccam plantam duncaxat videre contigit, in qua inhaerebant adhuc strobilorum pericli, & bina aut terna capitella, instar Capitulorum Orchidis: radix bulbosa est, aliquot membranaceis inuolueris recta, praeter Orchidum naturam, sub qua multae tenues fibrae exeunt, ut in Alii generibus, cum quibus affinitatem quandam habere videtur, radicis ratione, cui plerumque adhuc inhaeret superioris anni exsiccata, & cauliculum retinens. Cum portò mediam quandam naturam habeat haec planta, & peculiare caput non videretur requirere, Orchidibus subiiciendam esse existimaui. Per me tamen semper licebit aliis, quo vellent loco reponere, & nomen illi imponere.

ALLIVM VRSINVM BIFOLIUM vernum syluaticum.

Descriptio **A**llium Vrsinum radice oblonga Porti est, tenuiore, longis & frequèribus fibris, capitata, membrana medicis crassitudinis inuoluta, Allium redolente: à cuius imo statim exoriuntur bina aut trina folia odore vehemènti Alii, & gustu feruido, lato vitore splendèntia, striata, tenera, sesquipalmum longa, in acumen desinentia, duas vncias lata, pediculo dodrantali virente, qui post in membranam tenuem, lucidam striatamque faciens floris alteriusve vicini folii pediculum ad radicis usque fibras vaginatur.



star obuoluit:
eodem autem
loco cum fo-
liis surgunt pe-
dunculi bini, ter-
ni, aut plures,
triangulares,
Cyperii modo,
dilute virescen-
tes in vulgum
factam latius-
culam exalbi-
dam, mucrone
virente striatam
desinentes,
quæ ubi se
explicauerit
umbellam o-
stentat: nume-
rosæ flosculis,
etiâ ad 40. cõ-
stat, candidis,
in stellæ mo-

dum radiatis, quos continent folia semina oblon-
ga mucronata, intra quæ stamina totidem alba,
titulusque concolor, ex umbilico tribus tuberculis
virentibus compacti. Solet autem cum florum
tum foliorum pediculos simul omnes membra-
nula eximia tenuitate pellucida, alba, striataque
obuestire, quæ expansis floribus inarida decidit.
Semen succedit trigeminum, rotundum.

Synon.

Est hoc *Allium Vrsinum* Corderi in Diosc. *Sylue-
stre Allium Ophioscor.* dum appellatum. Germ. *Ramp-
pen*, siue *Rampfen* & *Rampfen* in *Vrsinum* Plini-
o Eidem in hist. *Allium syluaticum*. Germ. *Wald-
knoblauch* / *Gerinsel*, hoc *Tragus Ophioscoro-*
don Dioscoridis esse putat: Aliqui *ursinum* co-
gnominant, Figurâ Tragi appositâ. Brunsf. figu-
ram habet sub nomine *Alpi syluestris*, dicitque:
Dioscorides meminit *Allii sylu.* Plinius *ursinum*
vocat, pro quo exhibemus *Heluetis* [quod qui-
dem Io. Agricola restatur] dictum *Rampfen* /
nominatur apud quosdam eorum *Allium agre-*
ste.

Casalp. de pl. *Allium ursinum* vocatur, de quo
Plinius, loquens, inquit: est & syluestre, quod *Ur-*
sinum cognominant, odore molli, capite præte-
nui, foliis grandibus.

Harchio & Trago Germ. *Waldknoblauch*.
Otho Brunfels ait vocari *Rampfen* hoc est *Ger-*
insel: vocatur & *Schlengenknoblauch*. *Allium*
Calabrinum, *Anguinum*, quod in Diosc. lib. 2. c.
141. potest etiam esse esse *Aphroscorodon* in Co-
lumelle lib. 13. cap. 3. Serap. *Scordium*. In hist. lat.
Allium syluestre waldknoblauch.

Fuchs. *Allium syluestre terrinum*, quod *Vrsinum*
cognominant: Germ. *waldknoblauch*. Item in
icon. *Allium vrsinum*, Angl. *Ranunculus* vel *Ram-*
sepeti. Matth. in post. lml. comment. *Aglio orfano*,
qui depingit: An Anguill. *Scorodoprassum* Bono-
niensibus *Aglio auerino* & *Fulpeco*. Lonic. *wald-*
knoblauch / *Rampfen* / *Rampfen* / *Gerinsel*, *O-*
phioscorodon, *Allium Calabrinum*, *Anguinum*, *Vrsi-*
num.

oplioforum
Bonn.

Gesner. de epl. stirp. *Allium vrsinum*, de hortis,
Allium syluestre bifolium, *Allium Vrsinum*, hodiè
non nullis hoc est *Aretoscorodon*, Dod. hist. Gall.
Allium 3. *Allium Vrsinum* Neoterici: Gall. *Ail-*
d'ours. Belg. *Borsloet*. Videtur Dioscor. *Scorodo-*
prassum, vel ut quidam putant *ampeloprasum*.
Aduers. Lob. & Pen. sicut & Gerardo *Allium ur-*

sium: *Abselein* siue *Moly Hippocraticum* Angl.
Rampfen. Postea tamen dicunt, an sit *Allium*
Vrsinum, Hippocr. *Moly*, cuiusmodi Galenus in-
terpretatus videtur, haud certum est. Lobel. Obs.
Allium Vrsinum. Germ. *Beerhands knoblauch*.
Ital. *Aglio degli orfi*. Icon plant. pag. 158, *Allium*
Vrsinum glarifolium. Clus. histor. post. Cum Victo-
riales longæ foliis magnam similitudinem habet
Allii Vrsini folia, licet molliora & teneriora.
Frequentissimum autem id est in omnibus Pan-
noniæ & Austriæ siluis, coniunctim plerumque
nascens cum *Lilio conuallium*, siue *Oenanthe*,
Austriacis, ut ante dixi *reisser baldrian* / *Vngat*.
Georgi veraga, hoc est, S. Georgii flos, dicta
& *Gernggy wyrag* à nonnullis, quod significat
vniõnis florem. C. Bauh. Phyt. *Allium 17.* siue
Vrsinum. Sunt qui Diosc. *Scorodopr.* aut eius
ampeloprasum, aut *Ophiosc.* sed male, conleant.
Camer. apud Matth. Germ. & in horro, *Allium ur-*
sinum, a *retoscorodon* syluestre flore albo. Quibus-
dam *Cornicum Perrium*.

Perrium
Cornicum

Vidi Bononiæ in horto Casalis Odonis, ut & *Locus*
Paratii Martio mense in horto D. Bernardini
Trenisani, Ferrariæ in horto S. Dominici à l'An-
geli. Genetæ prorumpere incipiunt folia in
horto meo in fine Martii, in principio Aprilis à
Basile incipit florere. Basilex etiam obser-
uati, & frater Casparus in *Munichstein* iuxta a-
quæ Inueni circa *Mysam* & in itinere versus
Clement & non longe à ponte *Montbelgar-*
den *Vauiaucourt* ad sinistram in colle, vnde
trastuli in *Horro* E. C. Lacti inditum, referent
Brunfelsio, ipsum coagulare dicunt.

ALLIUM ALPINUM



Allo Alpi-
no radix
est obliqua nõ
nihil in longum
bulbum defi-
nens, multaque
fibras perple-
xas emittens.
Inuoluitur mul-
tiplici cortice
varius fibris
transuersum
coeuntibus, &
quodammodo
reticulato: sin-
gulis annis, in
tore Clusio. Re-
liciter aliis bul-
bis circa ipsam
adnatis se pro-
pagat, fibris
deco implicatis.

Descriptio

ut difficile sit bulbos coniunctim natos & cohe-
rentes seiuagere, huius emergit caulis cubitum al-
tius, crassitudine minimi digiti, propter terram ru-
bescens, nodis, leuiss, superius viridis, striatus,
fungosus, cui insident glomeratim congesti flori.
Ceparum floribus similes, vincti longioribus pe-
diculis hærentes, candidi, è senis foliis singuli cõ-
stantes, totidemque apicibus & stilo: quibus tri-
quetra succedunt capitula, in quibus semina ro-
tunda, pulla: folia duo aut tria vagina sua caulem
complectuntur, forma foliorum *Allii Vrsini*, ner-
uosa.

uosa, sublonga, & lata, acuminata, sed maiora, rigidiora: Gērianx maioris foliis penè similia ve non malè cepset Cluius: Nostra icon quam iam sculptam eminius exprimit.

Symyom Lobel. & Pena Adu. Obl. & Icon. pl. 159. *Allium lasiosolum macul. sum. siue Serpentinum. Ophioscorodum.* Wirlung. *Sigmurtz: Radix victorialis.* Clus. Pann. & hist. post. Copiose nasci tradit in Dattrenstein duobus supra Gainingam nulliariibus, ubi montanis pastoribus *Lauland* dicitur, quibus magno est in vsu, aduersus corrupti aeris, & nebularum exhalationes. Inueniri & in montibus, qui Bohemiam à Silesia determinant, ubi à Germanis *Sigmurtz* appellatur, quia qui effodiendis metallis operam dant, magnas ceriasque illius vires, se experiri prædicant, ad sese muniendum aduersus impiorum spirituum insultus, à quibus frequenter illuc imperantur: vnde etiam *Vitt. vict.* nomen ab effectu inditum contendunt. Matthiol. *Allium anguinum* vocauit. Iosias Simlerus *allium alpinum* nuncupat, *Sigmurtz* & *Sibemiam* ab inuolucrorum, quibus tanquam reticulo *radix inuoluta*, multitudine. *Vulgus Herbariorum* & *radix longa* aut maioris cognomen dedit, ut à gladiolo discedant, cuius radicem ob corticis quo integitur, cum superiore similitudinem, *Victorialis* rotundam & paruum appellant. *Gēnerus*, passim: *Allium alpinum radice reticulata*, vulgo *Sigmurtz* *victoriae radix*, superstitione quadam. *Victorialis longa*. *Camer.* in horto *Allium alpinum: Victorialis mas & femina*. *Mari* folia multo sunt latiora, *femina* verò angustiora. *Apud Matthiol. Germ. Allium anguinum, Victorialis longa.* *C. Bauhin. Phyt. Allium* 18. *siue Serpentinum folio oblongo*, ea *Lobel.* sua figuræ & *Matthiol.* non depingit: melior ergo *Camer.* & *Eugd.* Item *allium 19. siue Serpentinum foliis rotundioribus, siue Alpinum mas* *Camer.* a nemine adhuc pictum. *Pingit Porta allium Alpinum*, nomine *allii anguini*: considerandum autem an maculatis caulibus, & an idem cum *Ophioscorodo*. *Tabern. Allium alpinum, Victorialis mas.* *Gerard. Allium alpinum lasiosolum seu Victorialis Brodeleanæ montane Garlich.*

Locus & tempus. *Allium alpinum* collectum in horto veteris amici in insignis Medici & professoris in Academia Argentineni *D. Melchioris Schitzii* prælati *Mönchelgardi* in horto *Ul. E. C.* ubi floret & semen fert. *Genex* habebam in horto, alatum ex montibus, folia protendebat in fine *Martii*. *Basileæ* vidi in horto *D. Doct. Felicis*. *D. Fridericus Meyer* dedit mihi semina nomine *Victorialis longæ* cum essem *Argentinx* 1591. *Heidelbergæ* vidi in horto *D. Sprengeri*, audio non longe prouenire spontè.

Vm Perhibetur teste *Wirlung*, radicè *Victorialis* collo perpetuo appensam arcere contractionem. *Est* *Portæ* fides habenda, crematum vitiliginis, lentigini, & fugillationibus valet. *Galenus* latius validius esse dixit, serpentes abigit odore, bestiarum omnium ictibus medetur: præcipue hæmorrhoidibus. *Allium alpinum*, ait *D. Balth. Hamelius pharm.* se exportu sedare conuulsionis speciem, dicta *frampff* se potè intellexisse sedare dentium dolores.

MOLY VETERIBVS.

Moly, inquit *Dioscor.* folia habet graminisimilia, sed quæ latiora ad terram sunt: flores violæ albæ similes, lactei coloris, minores tamen, & cum violæ purpureæ floribus comparandos: caulem album longitudine quatuor cubitorum, in cuius cacumine est *allii* speciem referens quiddam: *Radix* parua est, bulbosa. Hæc valde commoda est ad veteri apertiones, trita cum irino vnguento, & in pello apposita. Hæc descriptio, inquit *Comar.* videtur esse veri illius *Homericæ Moleos*, quod *Mercurius Vlyssi* contra *Circes* veneficia dedit: de quo ita *Odys.* 10. poeta cecinit.

Sic factus diuulsam e terra porrigit herbam. Mercurius, siui ille naturam me dæcet huius. Radix magna bulbi, sed lactis flos cæcolor exit.

Moly vocant superi.

De hoc *Plinius* lib. 25. cap. 4. ita scribit. Clarissima herbarum est nomero teste, quam à Diis vocari putat *Moly*, & inuentionem eius *Mercurio* assignat, contraque summa veneficia demonstrat. Nasci eam hodie circa *Pheneum*, & in *Cyllene* *Arcadis* tradunt, specie illa *Homericæ*, radice rotunda, nigraque, magnitudine *Cepæ*, folio *Scillæ*. Effodi autem difficulter. *Græci* autem flores eius luteum præter, quum *Homerus* candidum scripserit. *Ingenie* peritis herbarum Medicis, qui & in Italia nasci eam diceret, assertique è *Campania* vidi, aliquot diebus effollam inter difficultates læneas, radicis triginta pedes longæ, ac ne sic quidem solidæ, sed abruptæ.

Plinius hæc partim ex *Theophrasto* lib. 9. c. 19. inquit *Tragus*, transcripsit, cuius verba hæc sunt, *Gaza* interprete: *Moly* apud *Pheneum* exiit, atque apud *Cyllenem* esse (quemadmodum *Homerus* dixit) affirmant: radice rotunda non abunant *Cepæ*, folio *Scillæ*. Vlum eius contra veneficia summum, non tamen effodi difficulter, ut ait *Homer.* Hæc *Theophrast.* *Plinius* tamen *Homerum* sequutus, eam difficulter effodi tradit. Natio quoque *Pœæ*, *Homerum* sectans, ait,

Passer hinc florem dederat Cyllenias album, Moly vocant superi nigra radice retentum.

At contra hos omnes *Galenus* *Moly* hoc non habet, sed *Mylen* appellat, & *Dioscoridem* citans sic ait, *Mylen* radix, quæ bulbo paruo similis est, constringendi vim habet. Quare cum loliacea farina appositam ipsam veterum apertum sanare dicit *Dioscorides*. Hæc *Galenus* verba nullum aliud *Dioscor.* locum citant, quam præsentem, quo de *Moly* agit. Nam & ipse radicem paruum bulbosam ei attribuit, & vim constringendi apertum veterum assignat, dum ait, *quæ* *radix* *Mylen* *est* *bulbo* *paruo* *similis* *est*. Non enim accipiendum est commodam esse ad aperiendos vteros, videlicet conclusos, velut à multis intellectum est, sed aduersus vteros apertos, ut scilicet constringatur ac concludantur. Est enim *gubac* *trix* *Mylen* *radix* *bulbo* *paruo* *similis* *est*, ut *Galenus* verba clare habent. Atque ad hanc rem haud scio an non magis idonea sit farina loliacea, quam *Galenus* illi ammiscendam, esse dicit, quam vnguentum irinum, cum quo tritam illam *Dioscor.* in pello apponere iubet. Cerrè lolium in tertio ordine calefacit ac siccatur, ut ad hiantem & apertum veterum non ineptum esse possit. Irinum autem vnguentum contra molliet, & veteri conclusionibus conducit, & hæmorrhoidas aperit, velut lib. 1.

Locus:

Scilla folia:

Flores lutei:

Radix 30. pedes longa

Mylen Galeni.


Diosc. male autem præstat.

c. 53. Diosc. docuit. Et tamen etiam sic idoneè videtur, ut radix cū ipso teratur, & in pello subdatur. Mihi itaque videtur omnino fieri potuisse, ut alterum pro altero, vel apud Diosc. vel apud Galenum, à Librario agnitum sit, & ob similitudinem suppositum. Sed cur Moly in Mylen Galenus mutarit, nulla mihi ratio succurrit: nisi & hic Librarii error putandus est. In hac autem diffinitione, facilius etiam ferendum est nobis Moly hoc in totum ignotum esse. Ad quem modum Clusius Hisp. ait: Moly quod Plinius in Italia hactenus scribit mihi incognitum nec quenquam audire vel scribere memini, qui se vidisse diceret.

Ceterum *μολύ* à τὸ *μολύν* ab amolendis morbis, C. Bauh. dictum contendit.

MOLY DIOSCORIDIS PARVVM quibusdam.

Descriptio.



Folia proferunt graminea, in terram nonnihil reclinata, hirsuta, Allium obolētia & respicientia: *caulis* teres pedalis, levis, rotundus, callosus, in cacumine disrupta, membranā umbellam gerit *storum* candidorum, flores Allii Vrsini experimentum, maiorum paullo, & sex foliis constantium. *Radix* bulbosa, Allii

aut Auellanae magnitudine, nigricantibus membranis involuta, intus candida, succulenta, calidiuscula & subingrato odore.


Synon.

Cagnier. apud Matth. *Moly*, cuius Matthiolus meminit. C. Bauh. Phyt. *Moly secundum* siue minus. Matth. in post. : omne. at. Ital. *Moly* à Cortuso milium, vero ac legitimo. Diosc. *Moly*, similis planta: quod Gal. l. simpl. 7. *Myle* dicit. Hist. Lugdun. *Moly* Matthioli, idem prorsus opinatur, quod Clusius vidit Gadibus. Nascens hoc *Moly*, & initio Februarii flores proferens Gadibus, ea veteris urbis parte quæ in mare protenditur, eruebam, teste Clusio, non procul à sacello locum occupante, in quo Hercules templum fuisse ferunt *Moly* quod Dioscoridis dicitur vidimus Patavii apud Iacobum Anton. Cortusum Nobilem Patavinum, & in horto publico Patavino: odorem habentia Allii: prorumpentia Ianuario & Februarii: ab eo etiam semina accepimus: Visum etiam à nobis florens mente Aprilis Bononiæ in horto Nobilis d. *Gonzadinis*. Semina accepi Srurgardiæ ex horto Ill. C. VVirt. ferenda Montbelg.

Locum & Tempus.

MOLY MINVS FLORE orbiculato maiore.


Moly Dioscoridis antè dicto valde simile illud, inquit Clus. hist. post. *Moly minus*,



quod Moerkerckæ Flan. Descript. dicitur in cultissimo suo horto alebar de Dranoutre, Moerkercken, &c. *Caulis* eius palmaris, viridis, denos aut plures sustinens flores 6. nucis foliolis, non mucronatis, ut superioris, sed orbicularis & maioribus constantes, sentis in medio staminulis, inter bina porracea quodammodo,

sed angustiora *folia* assurgebat: *radix* erat rotunda, candicans, nucis porreae magnitudine, albicanibus fibris prædita. Vnde habuisset ignorabat, sed semine peregre accepto sibi natam eam plantam augurabatur.

MOLY THEOPHR. MAGNVM



Dvo aut Descriptio ex tria ex *radice* bulbosa, foris nigricante, intus alba, promittit *folia*, longa, lata, crassiuscula, Scilla foliis accedentia, tria aut quatuor longiora, inquit Clusius, Inuicem amplectentia, *caulis*, nudus, cubito maior, crassus, concavus, candidans, rotundus, *foliis* ex-

summitate, quasi ex umbella, gerit stellatos, albos, ex longiusculis pediculis, quos excipit capitula triquetra *semen* continentia nigrum, Ceparum semini simile. Addit Clusius iuxta caulem inter folia alius plerumque exiit cauliculus planus & foliaceus, seu verius folium summo veluti Allii nucleum gerens, initio candicantem, deinde pallescentem, qui, terra exceptus, germinat, & eiusdem generis plantam profert.


Anguill. ut existimat, *Moly* Theophr. & non Diosc. Adul. Lob. & Pen. An hic flos dicatur *Moly* liliiflorum Homericum fortè? Obi. & Ic. Pl. *Moly* liliiflorum bulbum in lilio gerens Theophr. & Homericum fortè. Videant lectores & perpendant an flos rite describatur. Differt à Diosc. *Moly* quod Theophr. lib. 9. cap. 15. & post eum Plinius lib. 25. cap. 4. ex Homero descripserunt. *Moly*

Home-

Homericum, cuius Theophrast. & post eum Plinius meminere: radicem negat (teste Clusio) Theophr. difficulter effodi vt Homerus tradit. C. B. Phyt. Moly 1. siue *Maim*. Hoc Theophrast. est Moly forte & Plinii radice rotunda. Sunt qui velint Scilla 2. genus esse quod Pancratiū Diole.

Moly quod Theophrasti quibusdam dicitur, primò succum vidimus apud Corr. Nob. Patauinum, postea virens in eiusdem hortu & [siccam plantam quis videns Allii magnum genus dixisset.] obseruauimus ferè florens mente Aprilii: Bononia in hortu Nobil. di Gonzadinis & S. Saluatoris al burgo di S. Catharina, præterea in hortu publico Patauino. Bosileæ quoque in hortu D. Felicis Plateri Florentem Maio. A Sprengerio accepi Heidelbergæ semen Moly, maximi quod Montbelg. sarum in hortu Ill. E. C. Alitur hoc apud nos (inquit Clusius) in hortis ab herbariæ rei studiosis, & Maio mense floret.

MOLY INDICVM SIVE CAUCAFON.



MOLY. Theoph. foliis & reliqua formâ simile, nunquā flores apud me, neque apud multos alios protulit: sed eorum loco *caulis* pedalis, ferè planus, aded infirmus, vt, nisi aliquo fulciatur adminiculo, attolli non possit, summo fastigio conglomeratum caput fert, multis veluti Allii spicis mespili vulgaris magnitudine constans, initid viridibus, deinde pallescentibus, quæ etiam in terra non repositæ, germinant, telluri tamen commissæ, in maiores bulbos adulescunt, foliaque & caules (non tamè singulis annis,) producant: radix, vt alterius, cepacea, rotunda, alba, multis tunicis ami-

ta, quarum externa fusca, vetustate sese separans, & in alios bulbos pangens. Aiunt apud nos [inquit Clus. Hisp. & hist. post.] herbariæ rei studiosi aliud quoque Moly genus, quod Indicum

vocant (alii barbaro nomine *Caucafon*), quoniā ex India primū in Hispanias perlatum esse ferunt, & inde ad Italos transiisse, ab illis certè Belgæ acceperunt. Lob. Obs. *Caucafon*, Moly Indicum vocatum quod nos Luteriæ vidisse meminimus in hortu Castellani, sumo caule bulbos sphærico pericarpio membranaceo inclusos gerebat: qui depacti faciliè propagantur. Folia bulbos & reliqua, cum Moly Liliiflore siue Theophrasti similia. Suspicamur nos Lobelio non benè notum Moly Indicum, id quod verisimile apparebit consideranti eius descriptionem & iconem quam hic proponimus primo loco, si quis conferat cum descriptionibus & iconibus Clusii & Imperati cuius iconem proponimus addito folio ex icone Clusii. Casp. Bauh. Phyt. Moly 4. siue Indicum. Ferd. Imper. Moly Indici & Caucafo nomine demonstrata planta, species est bulbi, cui parui bulbuli sunt pro flore & semine, singuli singulos habentes folliculos.

Crescit Constantinopoli, Viennamque adferri vidit, (dum istic vivebat) Clusius, Zumbul Arabi bulbis permixtum: & inde forsitan, etiam in Italiam: à D. tamen viro Ferd. Imper. intelligebat, Neapolitano regno spontè nasci.

BVLBVS ESCULENTVS VETERIBVS

HVC vsque prosequuti sumus culinariorum bulborum historiam, graeculentum quippe, Caparum. Porrorum, & Alliorum, quibus succedunt bulbi suauem gratumque odorem spirantes, qui & ipsi esculenti & non esculenti. Descriptio

Theophrast. lib. 7. cap. 14. autore, Bulborum plura esse genera manifestum. Magnitudine siquidem, colore, figura, & sapore differunt. Alicubi enim adeo dulces nascuntur, vt per se sine condimento alio edantur, quales in Taurica Cherroneso. Et paulò inferius. Quam & bulbosa plura, nec ita [lanigeris herbis] pauciora notare licet: Leucoion (Violam albam, Gaza) Bulbinem, Pyrrion [Opitionem Gaza] Coicen [non legendum non vt Gaza] & Sisyrinchium quodammodo, quæ quidem redigi ad bulborum genus desiderant, quod radice orbiculatur. Nam colore quidem penitus discrepant, cadent enim, nec squamis constant. Quæ sic reddidit Plinius: Bulborum genera differunt colore, magnitudine, suauitate: quippe quum quidam erudi mandantur, vt in Cherroneso Taurica. Et paulò post: Genera Græci hæc fecerunt, bulbinem, sitanion, pyrron, acrocotion, xgilopa, Sisyrinchium. In hoc mirum, imas eius radices crescere hyeme: verno autem quum apparuit Viola, minus ac oserahi. Tum deinde bulbum pinguescere, inquit Cornar. & Theophrast. Apparet locos esse corruptos. Nec idem, nec eodem modo dicunt. Idem tamen Plinius eodem loco Catonem Megaricos bulbos maxime celebrare ait. Post illos in Taurica Cherroneso natos ipse probat. Post hos, inquit, in Africa nati maxime laudantur, mox Apuli.

Sed hic obseruandum est, duo Bulbos propriè appellari, Esculeptum scilicet & Vomitorium. Verum generaliter omnes Olerum radices, quæ similitudinem ad bulbos habent, bulbos appellari. Sic Cels. lib. 2. cap. 18. Ex oleribus valentiora Rapa, Napique & omnes bulbi, in quibus Cepam quoque & Allium numero.

Quoad Bulbum satiuum, etsi ab annis 18. ma-

Bbb

gno labore perquisuerint, Turnerus in Anglia, Germania, & Italia nusquam tamen inuenit, neque ex Recentioribus aliquem legit, qui vidisse se dicat, excepto Amaro Lulitano, cui tamen reuera ignotus fuit perinde ac mihi vel Matthiolo. Cepam paruum, Hetruscis *Cipolla maligna*, Romæ verò Atcaloniam dictam Bulbi esculenti speciem esse volunt quidam: Sed Amati, Lacunæ, & Matthioli iudicio falluntur: Eorumque error manifestè deprehenditur ex Theophrasto qui Atcalonium sitileque Cepe inter Ceparum genera libro 8. cap. 4. de plantarum historia recensuit, non autem inter Bulbos, de quibus speciatim disseruit lib. 7. cap. 13.

Amar.

Sunt etiam qui Hyacinthum comosum in Bulborum esculentorum classe ponant, sed eorum sententiam probare non possum. Huius vires Diosc. in hunc modum prosequitur, Bulbus esculentus (*Σκίλλος ἑσκλητός*) quem edimus omnibus notus. Stomacho commodus, itemque aluo, fuluus, & qui à Libya affertur. Verum amarus, & scillæ similis, Stomacho commodior & concoctionem adiuvat. Omnes autem bulbi acres sunt, & calefaciunt, & ad Venerem concitant. Quare Martialis Poëta in Xenii;

*Scilla
mala.
Acer.*

Quum sit amarus coniunx, & sint tibi mortua membra,

Nil aliud bulbis quam satur esse potes.

Exasperant linguam & Tonsillas, multum nutriunt, carnes gignunt, inflationes faciunt. Idem impositi faciunt ad luxata, contusa, spicula infixa, & ad articulorum dolores, gangrænasque ac podagras, cum melle & per se. Item ad hydropticorum tumores, & canum morsus, similiter cum melle & Pipere trito impositi. Cohibent etiam sudores, & Stomachi dolores sedant, & furfures ac vlcera capitis manantia, cum nitro assato detergunt. Purgant & sugillata & varos, per se & cum oui vitello: & lentigines cum melle aut aceto. Contusas aures & contusos vngues cum polenta sanant. Auferunt etiam ficus, in calido cinere assati, & cum manarum capitibus vltis. Vlti verò & cum Aleionio permixti ac in Sole illiti, maculas Solares & cicatrices nigras depurgant. Si verò cum aceto cocti edantur, ad rupia faciunt. Cæterum copiosum ipsorum esum vitare oportet, sed quod neruos lædant. Hinc Ouidius.

Daunus an Libyæ bulbus tibi missus ab oris.

An veniat Megaris, noxius omnis erit.

*Galenus Bul-
bi tempera-
mentum.*

Marcellus Medicus empiricus. Veretrum inquit cap. 12. id est bulbus, quod est genus Cepar, in aceto decoquitur, idque acetum ore continetur, ut mobilitas dentium sistatur. Cæterò ut Diosc. reiectanea perhibent. Cum polenta & adipe sullo coctus, appositus, tumores & tubercula compendio suppurat & rumpit. Bulbum cibarium velut omnibus notum, non descripsit Diosc. inquit Corn. fuluum esse, & à Libya affertur: dixit- le contentus, & alterum amarum esse, & Scillæ similem. Nec Galenus sexto Simpl. phar. aliud dixit, quam bulbum qui editur, frigidiorum esse & crassorem, & viscosum humorem gignere, Nā & ægrè concoquitur, inquit, & flatuosus est, ac venerem stimulat. Impositus autem, eò quod amaritudinis & adstringendi facultatis particeps est, adstringit & glutinat, & nimium secat. Idem 2. de aliment. Editur, inquit, bulborum radix absque foliis, in vere aliquando etiam asparagus. Habet autem in seipso amaram & austera vim manifestam. Quare etiam stomachum exolutum quodammodo excitat ad appetentiam. Nec aduersatur his qui ex thorace & pulmone

expuitione opus habent, etiamsi naturam corporis crassiorum & viscosiorum habeant. Verum amaritudo resistit crassitudini, ut cuius natura est secare viscosa ac crassa. Vires bulborum diligenter præscribit Plin. lib. 20. cap. 10. Cæterum bulbi ex aceto & sulphure vulneribus in facie medentur. Per se verò trici neruorum contractioni, & ex vino porrigini: cum melle canum morsibus. Erasistrato placet cum pice. Sanguinem idem eos sistere tradit illitos cum melle. Alij si è naribus fluat, coriandrum & farinam adiungunt. Theodorus & lichenas ex aceto bulbis curat, & erumpentia in capite cum vino austero aut ouo. Et bulbos epiphoris idem illinit, & sic lippitudini medetur. Equè vitia quæ sunt in facie, eorum rubentes maxime, in Sole illiti, cum melle & nitro emendant: lentiginem cum vino, aut cucumi cocto. Vulneribus quoque mirè profunt per se, aut (ut Damion) ex mulso, si quinto die soluantur. Idem & auriculas fractas curat, & testium pituitas. In articulorum doloribus miscet farinam. In vino cocti illiti ventri, duritiem præcordiorum emolliunt. Dysentericis in vino ex aqua cælesti temperato dantur. Ad conuulsam intus, cum silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorem tussis illinuntur. Neruis viles: idem & paralyticis dantur. Luxata in pedibus, qui sunt tussis ex his, citissime sanant cum melle & sale. Venerem maxime Megarici stimulant. Hortenses partum cum sapa aut passo sumpti. Sylvestres interaneorum plagas & vitia cum silphio pilulis deuoratis sedant, & satiuorum semen contra phalangia bibitur in vino. Ipsi ex aceto illinuntur contra serpentium ictus. Semen Antiqui bibendum insanientibus dabant. Diocles oculos hebetari ab iis putat. Elixos assis minus viles esse adicit, & difficile concoqui, ex vi vniuersusque naturæ.

BULBUS VOMITORIVS Veteribus.

AT qui ab effectu, Vomitorius Bulbus vocatur, folia habet, inquit Diosc. multò lentiora quam Esculentus. Radicem autem similem, cortice nigro. Qualis autem herba vomitorius sit Bulbus hodie non cuius notum ait cum Cordo Turnerus: nonnulli verò eundem censent cum radice Narcissi de quo Dioscorid. lib. 4. cap. 155.

*Bulbus Col-
matorius.*

Radix si edatur per se, & si decoctum ipsius bibatur, vesicæ affectiones sanat, & vomitum mouet, inquit idem Dioscorides.

Nec miremur cum Marantha Bulbum vomitorium in cibo sumptum vesicæ malis mederi: namque id quod Græcè est *ἀντιεμετικὴν ἡ ἀντιεμετική* Ruellius vertit, ea radix mansa: cum potius esset sic vertendum, Hæc per se comedatur, vel, ut Marcellus, quæ in cibo sumpta eadem confusio est in Scandice, in Ornithogalo & multis aliis, quæ mandi ait Ruellius: cum potius edi vel in cibo sumi dicendū esset. Verum cum familiare quodammodo sit Plinio, ut hoc verbo mandi utatur pro eo quod est edere, ut in Bulbo vomitorio cuius radicem mandi ait L. 19. c. 5. voluit Ruellius magis esse cum Plinio confusus quam per se ipse

distinctus. Galenus de hoc testatur,
ipsum multò calidiorum
esse esculento.



SYA-

Sententia.

Editorial

F2002X

**Existent
perpetrator**

References

Ex alibi,

Et rursus ,

Marvin J. Ross

Tom. IL

DLBVS Description



Bbb }

grorum marginibus & secundum vias, quem ego a floribus racemi in modum extremo caule congestis *Botryoides* cognomino, nonnulli comosum minorem appellare solunt: nec desunt qui Bulbinem Plinii esse putent: Herm. *bunda fno* *blaud*, id est, caninum Allium: Belgæ a racemi instar congesta florum spica *druynteno* appellant. Eius duo inveniuntur genera vnum crassioribus, longioribusque foliis, florum etiam, racemo longiore, deniore, & odoratiore; alterum minora omnia habet, & magis vulgare est. Istorum duorum generum flores saturum admodum colorem habent, & quasi nigrum. Est verò & tertium genus brevioribus, latioribus, firmioribusque foliis quæ humi diffundi non solent, nec flexuosa sunt ut superiorum, sed surrecta: huius flores licet superioribus formâ similes, longè tamen aspectu hilariiores, dilutioris purpuræ, atque in caruleum tendentis colore præditi sunt. Id genus Viennæ, aut vicinis locis spontè non nascitur, sed ex Tyrolenti comitatu delatum esse fertur. Similes porro omnino plantæ non modò Viennæ, sed etiam antè in Belgica è semine Hyacinthi botryoidis, lacteo atque è niueo purpurascens flore (binæ eius enim inveniuntur differentie) natæ sunt: & inter illas etiam quæ ramolam tulerunt florum Vuam, hoc est, quæ Vux in modum plures congestos habuerunt racemulos, alios alius minores & graciliores: quibus similes plantas semine albi a me communicari natus habuit plures quàm quadragenas Ill. Balthasar de Barthyan in Zolonocho sub Martii finem florentes, Anno 1585.

A Dodon. hist. lat. de fl. & in fol. dicitur *Hyacinthus racemosus* & inter Neotericos. i. folia quasi rotunda: flores colore caruleo, aliàs diluto, aliàs saturato: subinde candido, aut ex albedo dilutè admodum purpurascens: *Hyacinthum Botryoidem* nonnulli cognominant. Ex esculentorum bulborum genere aliquo esse viderur. &c. Verùm hoc notandum, Dodon. non distinguere *Hyacinthum* odoratū ab inodoro, siue à Fulchrio exhibitō, de candido & albedo postea agemus.

Lobel. & pen. Adu. *Hyacinthus comosus minor*. Quidam Bulbinum Plinii veriore autumat: vulgus Prouincialium *Barrilix* vocat, quasi lagenulas: foliis iuncea. Addit in obs. dici quoque *Bulbum esulentum*, *Hyacinthum filu. Cordi*. *Hyacinthum exiguum* Tragi. *Hyacinthum Botryoidem* Herbariorum. Item lc. Pl. p. 107. *Hyacinthum Botryoidem vulgarem*. Et pag. 108. *Hyacinthum caruleum amœnum*. Nos *Hyacinthum siluestrem Cordi* non dixerimus, sicuti Gesnerus, ut & Dod. aliter sentiunt. Nec etiam cum Lobel. sentimus, hunc *Hyacinthum* eundem esse cum *Hyacintho* exiguo Tragi.

Tabern. icon. p. 625. tres *Hyacinthos* tradit, quorum primus depingitur nomine *Hyacinthi carulei minoris Klein blau* *Mergen blumen*. Alter p. 628. titulo *Hyacinthi botryoidis incarnati leibfarb trauben hyacinth*: Tertius his verbis, *Hyacinthus botryoides caruleus maior* *Groß veyel braun trauben hyacinth*. Fieri fortè fortuna potest ut his Tabernæ figuris aliqua conueniat *Hyacintho Botryoidi* inodoro, id tamen asserere non ausim, petiores de istis iudicent, siquidem Compilator non describit nec distinguit.

Gerard. cæcus, cæci ducis. Tabernæ tres figuras ponit: Quartum prima *Hyacinthus Botryoides caruleus* *Blau Grape flower*. Altera *Hyacinthus Botryoides caruleus maior*, *Gerat Grape flower*. Tertia *Hyacinthus botryoides caruleus amarus*,

Stic coloured Grape flower.

Camer. horto *Hyacinthus botryoides odoratus* *Pruni odorem referens maior*.

C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus 22. racemosus maior caruleus Botryoides Clusii*, *Caruleus amarus Lobelii*. Item *Hyacinthus 24. sive racemosus minor angustifolius primus Trago*. *Bulbine Gesnero*. *Hyacinth. vulgi* Lob. quibuldam *Bulbum coronarium* Theophr. 6. histor. pl. Variat floris colore caruleo diluto, saturato, candido, exalbido, dilutè purpurascens seu incarnato. Camer. & frater C. Bauh. hac in re longius à nobis recedunt, & à verò declinant. Sunt enim occasiones cur Tragi *Hyacinthum* & *Bulbistem Gesneri* huc non referendū censemur, sed ad *Hyacinthum* inodorum. Si *Hyacinthus* de quo hic agitur, solo colore ita variat cur non demonstrant: Scimus Dodonæum scribentem de hoc *Hyacintho* meminisse diuersorum colorum, verum is comprehendit alias species quæ sub aliis titulis traduntur.

Plurisque Italiz, Germ. Galliz, ac etiam Hispaniz locis (experientia Dodon. adstipulante) hic *Bulbus* exit: reperitur & in Belgio in *Atrebatum* ac *Marinorum* finibus, in syluis ac nemoribus: Folia eius qui ex Hispania in Belgiū allatus est, ante hyemem exeunt, Germanici verò ac Belgici non ante ver: flores Martio vigent aut Aprili. *Hyacinthum botryoidem* minorem caruleum foliis angustis & longioribus habeo in horto E. C. Montbelg. à me plantatum, qui tardius florer sequenti & diutius, ac ita se multiplicat ut tandem molestus sit: non differet meo iudicio ab eo qui *Monspelij* passim provenit, florètque. Lugduni in agris spontaneum vidi florèttem Maio ac etiam Patavij, & in montibus Appenninis siue Bononiensibus, nec non Basileæ in hortis. Repertus etiam ad Castellum Sponeck Illust. E. VV. iuxta Rhenum, unde in prædictum delatus hortum.

HYACINTHVS BOTRYOIDES.

vernus: minor, latifolius, caruleus, inodorus.



Planta est Descripio
sequipalmaris, radice bulbosa, fibrosa; sapore ut præcedēs amaro & lēto: foliis profert binæ aut ternæ striatæ, carinatæque interdū & potiss. primò proveniēs non multū latiora, quàm iam dicti, sed multò breviora, sæpè potiss. culta & ubi adoleuit latiora, qualia figura nostra Fuchsiana demonstrat, nec cæcis altitudinem attingentia: caulis singularis, tenuis, sesquipalmarum altus, flores sustinet racematim congestos ut superiores,

Lobel. metacur.

rior, sed non ut illa, odoratos, ratiore, breuiore, minores, magisque ventriosos, oris similiter arenatis coloratilique.

An Cordo Obs. sylva. Hyacinthus minor globosus, concauis, purpureis, deorsu. n. nutantibus, & gibbosam cotnam. constituentibus floribus in caule dodrantali breuiore: foliis porro multo minoribus, radice bulbosa: floret post Veris initium. Nascitur copiosiss. in Alpium Suevicarum planis pratis, in Hassia & Wederauia.

Trag. germ. lib. 2. cap. 71. vocatur. Ein and Knoblauch / Hyacinthus vernalis, Klein hands Knoblauch / Klein hyacinth. Et cap. 79. Klein frühlengen hyacinth / Et hist. lat. Alis genus aliud, agro Vermariensi valde familiare &c. qui ad Rhenum habitant hands zibel vocant. Et Hyacinthus vernus exiguus: omni odore destitutus: semine nigro.

Fuchsio hist. Hyacinthus caeruleus maior femina. Groß blau mergen blum weible: qui non describit nec distinguit exacte hunc Hyacinthum ab aliis.

Dodon. Gal. Bulbi esculenti genus minus, Peti. bulbe de sardin, fecit, figuramque Fuchsi exhibuit; qualis nostra. In postremis vero scriptis hunc non videtur distinguere a precedenti, ut dictum.

Gesner. horti Bulbine flore caeruleo.

Clus. in Pann. & post. hist. hyacinthus botryoides tertius breuioribus latioribusque foliis & firmioribus, quae humi diffundi non solent, sed erecta sunt: flores aspectu elegantes, dilutioris purpureae, atque in caeruleum tendente colore praediti sunt. Id genus ex Tyrolensi comitatu delatum esse fertur.

Camer. hor. hyacinthus botryoides alter minor inodorus, caeruleo, incarnato & albo flore. Sic ne? Camerariene vnum? hyacinthus albus & caeruleus. Nos quidem caeruleum ab albo separamus, de quo postea.

C. Bauhin. phyt. hyacinthus 23. siue racemosus minor latifolius caeruleus femina Fuchsi. Item hyacinthus 25. siue racemosus latifolius floribus dilute purpureae, Botryoides tertius Clusio, incarnatus Tabern. Nos quoque Clusii & Fuchsi eundem hyacinthum facimus.

Locis & scriptis Hyacinthus minimus vernus Botryoides caeruleus. Montb. prouenit sponte, transiit in hort. C. W. citius floret precedenti, folia etiam non reuincet tandem. Geneue idem forte in segetibus ultra pontem Arne floret Aprili. Ludic hic Hyacinthus foliis quae interdum latiora, potiss. ubi adultiora & culta: foliolato ex hortis Basil. misit Fr. C. Bauhinus.

HYACINTHUS BOTRYOIDES ALBUS.

Descriptio **H**Yacinthus Botryoides albus ex bulbo medioeriter magno & fibroso, albo, tunicis compacto, gustu nonnihil viscido, subacri, tandem & subamaro, folia profert quaternaria palmaria aut paulo maiora, latiuscula, carinata, herbaceo colore virentia, in quorum medio statim a radice surgit, Cauliculus palmari raro maior, teres, laevis, ex viridi luteolus, florem sustinens, nonnihil odoratum, in racemi morem congestum, ex flosculis multis rotundis, candidis, forma florum Ericae, terram spectantibus, leuiter deductis oris in sex labella extrorsum reflexa diuisis, ex breuissimis albis pediculis: in medio sena flami-

nula exalbida, breuia, cum stilo viridi, vix in conspectum venientia.

Clus. in Pann. & h. ait hyacinthus Corvudae lacteo flore, a superioribus florum forma non differt, sunt. n. concaui & tumetes, nulla tamen, vel perquam exigua odoris gratia commendabiles. Etiam in duas species distingui potest. Vna enim lacteam omnino florem habet, caulem exalbido, foliaque dilutius virentia, & quasi pallescencia: tota etiam planta tenerior, nec nisi primo vere, folia protrudit. Alterius flos niueo quidem colore praeditus est, sed cui perfusa videatur tenuis quaedam & dilatissima purpura, qualis in rosis albis nondum plane expansis, praesertim circa ungues: hac verustate & marcescente flore

intensior redditur: caulis è viridi purpurascit, folia viridiora sunt, & infima parte quodammodo purpurascencia.

Omnium femina in triangulis quibusdam vasculis continentur, rotunda, nigra, exigua: omnium etiam radix plurimos exiguos nucleos in ambitu generare solet, nulla tamen



abundantius quam duorum priorum. Florent ut plurimum Aprili, interdum etiam Maio, si Verum tempus ob praecedentis hiemis asperitatem serius incipiat. Lactei prior species olim nobis communicata à C. V. Alphonso Pontio, memini in Baldo monte erutam à Studiosis quibusdam ex Italia reducibus Viennam adferri: Altera ab amplissimo V. Coruso Dipcadi albi nomine in Belgicam missa.



An Cordo obs. silua. hyacinthus minor candidus, minori purpureo similis, maior paulo nascitur in Hessa & Wederauia, sed parcius quam purpureus.

Lobel. Obs. pag. 55. Dipcadi candida floribus varietas gemina. Dodon. in folio, hyacinthus Neotor. 1. flore subinde candido aut exalbido dilute admodum purpurascence, Italicorum plerisque Dipcadi appellant. An Camer. hort. hyacinthus Botryoides minor inodorus flore albo. Tabern. icon. & hist. hyacinthus Botryoides albus lacteus. weistrauben hyacinth. Casp. Bauh. Phyt. hyacinthus 26. siue racemosus albus tertius, vel lacteus vel minus dilutissima purpura perfusa, vel ex caeruleo virens. Gerard. hist. hyacinthus botryoides lacteus white Grape flower. Figuram habet Tabern. ac praeterea alium habet Hyacinthum, de quo sub maximo botryoides.

Habeo in horto H. E. C. missum Sturgardia per Clarissimum virum Dominum Schwarz horti medici praefectum.

HYACINTVS AUTVMNALIS
minimus, & maior.

Descriptio



Folia vix pollices quinque excedunt, tenuissima, tria quatuorue, ex albicante bulbo exorta, caulis palmo breuior, tenuis, flores à medio ad summum parui, cærulei, quos excipiunt conceptacula, parua, talis est Montpelienfis, quem cum maiore suis describit Clusius Hisp. & post. histor. his verbis: Hyacinthum Autumnalem, appellabamus, quia non nisi Autumno florebat. Quidam Bulbinem Plinii esse existimabant: sed Bulbines apud ipsum lib. 20. Nat. histor. c. 9. descriptio planè refragatur, cui porracea folia & rubicundum bulbū tribuit. Alii Theophr. *hyon* esse existimant, quod lib. 7. c. 12. inter eas quæ ante foliorum, & caulis exor-

tum florere incipiunt, reponit. Verum quidem est hanc plantam, florere incipere antequam folia emergant: sed alio loco Tiphys inter æstiuos flores meminit: quæ nota huic non conuenit.

Dodon. de flor. *Hyacinthus quinquus, qui serotinus est.* *Hyacinthus autumnalis.* In fol. p. 219. *Hyacinthus autumnalis minor, & p. 218.* *Hyacinthus autumnalis maior.* Gesner. hort. ex sententia Coldembergii. *Hyacinthus autumnalis.* Lobel. & Penz. Adv. & Ic. pl. p. 102. *Hyacinthus autumnalis minimus sed pulchellus.* Et C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus 6. siue autumnalis maior Clusii.* Item *Hyacinthus 7. siue autumnalis minor.* Gerard. Angl. *Hyacinthus autumnalis winter hyacinth.* Item *Hyacinthus autumnalis maior, Gerard winter hyacinth.*

Primum in hortulo duntaxat aluit Clusius, spontè natū non vidit maturius minore florentē, interdum uel sub Iulii finem, vel Augusti initio. Alterum ante 40. annos in vicinis Montspelio colliculis florentem sub initium Septembris eruebat; deinde Madritanā Parisiorum siluā eā parte quā ad Bononiensē cœnobium uergit, areno-

so solo & salebroso: postremū Salmanticæ proximis colliculis ad flumen Thormim sitis, lapido-
so admodum solo. E Verouenti Agro missus fuit Lobelio: plurimus postea etiam Lutetia Parisiorum, Narbonæ ad Aquas Marianas, & ad Cellam nouam Montspeliū visus nobis glareosis, asperis, Autumno ineunte, non Vere. Maior in pensilibus Belgii hortis alitur. Florentem circa Aurumnum vidimus in sylua propè Montpelium. Tiphys Theophrasti Dalech. nobis visum Stru-
gardia.

HYACINTHVS MAXIMVS
Botryoides, comâ cærulea.

EX cepaceo bulbo folia aliquot interdum scapolōgia, & plusquam semuncia lata, cæcia, per terrā sparguntur: inter quæ surgit caulis singularis, duas spithamas longus, nondum exiccatis floribus in pyramidalem thyrsū desinens, qui ubi expansi fuerint, longius inuicem abiunguntur,

colore obsoleto, concaui, ab angustiore basi quæ pedicello semunciali appenditur, sensum dilatati, vix tantillum hiantes oris in sex obscure partiti, ut difficulter conspici possint latentes apiculi cinerei: fastigium autem thyrsi in comosam iubam cæruleo purpuream, longis pediculis concoloribus explicatur: odore nullo eccellente, plerumque flores abundant puluere fuliginoso. Amara est hæc planta.

De hoc Hyacintho scribit Clusius. Hyacinthi primi Matthioli, siue comosi maioris à quibusdam cognominati, qui in multis Orbis Christiani prouinciis spontè nascitur, duo in Pannoniis genera obseruabam. Alterum præcox latiore folio, crassiore comâ, ineleganti tamen, maioreque bulbo. Alterum magis serotinum angustiore folio, tenuiore comâ, laxiore verdè & elegantiore: huius flores comæ proximi, ex cæruleo purpurascunt, eiusdemque cum coma sunt coloris, quæ nota in priore desideratur: bulbos etiam minores. Præcox Maio, hoc Iunio, floret. Semine autem ex Hispaniis anno 1575. Hyacinthi Orientalis Hispanici nomine missi [cuius tamen duo esse genera statim deprehendi, nam magnitudo dispar erat] Viennæ Austria bulbaceæ plantæ mihi natæ sunt, quæ tandem duo Hyacinthi comosi maioris genera pepererunt, à vulgaribus nec florum coma, nec foliis differentia, nisi quod alterius folia latiora & Muscari foliis proxima ineunte Vere duntaxat emergere solebant, alterius angustiora longioraque, etiam antè hiemem: minutius semen Hyacinthi comosi maioris æmulum erat, alterum crassius Mus-

Mulgaris semini perquam simile, quæ aded causa fuit, vt separatim fererem. Illud autem peculiare in nonnullis, vt præmaturi flores excussi, nigrum siue fuliginosum pollinem spargant vtilitati ferè similem.

Hyacintho sylvestri Cordi addita est figura Tragi, cum his verbis Gesneri: idem est ni fallor aut planè cognatus hyacinthus maior Tragi & Fuchsi, cuius iconem addimus quanquam cæruleis floribus, cum Cordus suos purpureos tribuat. In alia annotatione est scriptum verus est hyacinthus Medicorum. Nascitur Schenberge bey hersteth: vbi Braunlinck appellant. A Cordo in Dioscor. hyacinthus, quem medici intelligunt. German. Breßling vocatur. Ibidem quidem annotauit uelutiis vt quidem aiunt, nescio quibus Colose.

Tragus Germ. lib. 7. cap. 70. Groß hyacinth. Et cap. 79. die vierdten / Bauaris Sem zwibelin: Idè in hist. Jar. Hyacinthus maior Bauaris Sem zwibel, hoc est, Cæpa suilla.

Fuchsi. hyacinthus caruleus maximus. Et icon. hyacinthus caruleus mai. maior Großblauw Merzblumen mennle. Denegato vadimonio præceptorem nostrum vltro dimittimus, vt qui indistinctè de Hyacinthis scripserit, nec certè demonstrat, quis verus sit Antiquorum hyacinthus, hicne, vel stellatus maximus Matthioli. passim, hyacinthus petrusci Cipollæ Caninæ.

Dodon. Pancratium interpretatur herbam quam Fuchsius exhibuit pro Hyacinthi genere, quod Gesn. audit Monspelluli Ophioscorodon existimari à doctis, & vulgò Allium Caninum nominari. Lacun. Pancratium & Scilla minor. Dodon. Gall. Cæpe id est Cæpa, Bulbus esculentus, Germ. hunds knoblauch. Belg. hunds loof. Gall. Hyacinthus comosus spurius, siue tertius Neotoricorum. Anguill. vt existimat Bulbi esculenti sunt hodiè picti, pro hyacintho. Clus. hist. post. vulgarem vtrumque (Hyacinthum comosum maiorem) Vngari appellant Bygio hágymsa, serpenti Cæpa. Belgæ Brabant, Quispel. hoc est, Aspergillum, propter comam aspergilli instar expansam, Hispani Ajo de ciguennas, hoc est, Allium Ciconiarum Non desunt qui Pericarpum bulbii Plinii esse censent, cuius duas species esse dicie lib. Nat. Hist. 25. cap. 10. cortice rubro alteram, nigro papaueri similem: sed ex tam mutila descriptione, quis sententiam comode ferre queat? Illud autem verè dicere potest Cluius, nullum vnquam bulbium se gussasse, qui maiorem ad votandum vim ipsi fecerit hoc Hyacintho maiore qui in esculentorum bulborum classem ponitur. Lobel. & Pena Adu. Hyacinthus comosus. Dioscor. Tabern. icon. & hist. hyacinthus maior, Groszer hyacinth oder merzen blumen. hyacinthus purpureus magnus peregrinus, Groszer purpurbraun fremde hyacinth. Compiler uarietate rerum obrutus nudam proponit figuram cuius hyacinthi nescio pro peregrino.

L. Gerard. hyacinthus comosus, faire haire Jacint. hyacinthus comosus albus, wire haired Jacint. Gerardus quoque more suo quæcunque mutans binas figuras Tabern. habet: sed colorem alium tribuit: ac præterea ponit ex eodem Tabern. aliam figuram pro Hyacintho albo de quo post, lectior ista diligentius scrutetur & lucem adferat.

Camer. horti. hyacinthus comosus maior siue sectorinus, & minor siue præcox. Crescit in aruis passim in Italia. Anguill. Bulbii propriè esse dictum

volebat, & in Græcia adhuc vocari Cæpa. Ital. Cæpa Bononiam.

C. Bauh. hyacinthus racemosus maior. An Bulbine Plinii lib. 20. cap. 9. & lib. 19. cap. 5. Huius, inquit, genera duo. primum procerius latiore folio, crassâ comâ, maiore bulbo pingit Lob. Obs. p. 55. alterum angustiore folio, comâ tenuiore, minore bulbo pingit idem Lob. icon. p. 106.

C. Bauh. vt patet hyacinthos duos racemosos tradit ex Lobel. cui tamen prior figura in Obs. nò placuit, quia in illa non nutabat coma, ideoque aliam curauit parandam & in iconibus priorem omisit, reuertens postremâ, si duo existimasset genera vtramque vt existimo retinuisset. C. Bauh. apud Matth. hyacinthus. hyacin. sylu. Cordo.

Lobel. Italæ, Narbonæ, reliquæ etiam Galliæ tepidiori abundè in satis & viarum marginibus prouenit. In agris Monspellii & Genue in segetibus & pratis, ac inter Ferrariam & Bononiam. Bononiæ in horto Nobilis di Gonzadins in strâ maior florens Aprili. Item spontè in montibus Apenninis siue Bononiensibus è regione portæ S. Mamma. In cacumine montis Vindæ propè Balneum Aponense inueni in fine Februarii: vidi etiam Patavii in horto Nobilis à Pasqualigo. Basileæ in horto D. Doctoris Felicii Plateri. Repertum cum flore mense Junio inter Chemilli & Vesutium in Burgundia, euulli & plantauit Montbelgardi in horto Ill. E. C.

Locus & Tempus


HYACINTHVS ORIENTALIS QVIBVSdam constantinopolitanus.

Hyacinthus quem Orientalem, nonnulli Constantinopolitanum, appellant, radice est bulbosa magna, gustu viscido dulci, cui subsunt fibræ longæ, teretes, medioeriter crassæ: A qua exurgit caulis singularis, dodrantalis, læuis, teres, solus nudus, ad imum diluto virore pallefcens, supernè fuscus, micans: à cuius medio ferè ad summum scapum prodeunt semuncialibus pediculis ex viridi subnigris, deorsum nutantibus appensi flores tres, 4. & 5. ad vndecim aut duode-

Descriptio

cim & plures, odore suauis, hilari, cæruleo, aut mixto, aut rarius albo, omnino spectando colore, vinctales, teretes, concavi, campanularum quodammodo amuli, in text laciniis profundiusculas diuisi, stammina lateo puluere conspersa, breuia, penitus recondita continent: folia tria, quinque, sex à bulbo statim exorta, colicolum ad summum vs-

Hyacinthus Orientalis flore maior.



Hyacinth. minor Polyanthes.*Hyacinth. Orientalis Polyanthes foliis.**Hyacinth. Orientalis albus.*

superabat, sed folia firmiora erant, caulise-
nam inter illa prodiens maior, crassior vi-

que fastigium
nonnunquam
comitantur,
alias citrà de-
finunt, latius-
cula, carinata,
infecne herba-
ceo colore,
propius cacu-
men saturati-
us virentia.
Succedit capi-
tulum tricoc-
con ceu Lathy-
ridis huc Cata-
putia maioris.
Vnum genus
fert flores ma-
iores, colore c-
tiam à minore
variante, pur-
pureo quidem:
aliud minores,
verumq; modò
plures modò
pauciores:
quod minores,
idipsum quo-
que plures ferè
fert, licet etià
interdum duos
aut tres.

Quandoqui-
dem autè Clu-
sus horū Hy-
acinthorum di-
scrimina dili-
genter obser-
uauit, lubet to-
tam historiam
ex eo ponere.
Præter Hy-
acinthum Ori-
entalem inquit,
qui omnibus
fatis notus est,
cuiusque flo-
rem coloris in-
tensione vel
remissione ad-
modum variare
deprehendi,
(nā totus quasi
caeruleus, vel
subcineraceus,
vel dilutius
purpurascens
& hilaris, aut
saturatè pur-
pureus & ad-
violæ nigrae fe-
rè colorem ac-
cedēs inueni-
tur) in meo
hortulo ale-
bam, cuius
bulbus reli-
quorum ma-
gnitudinem
non admodum

cenos aut plures flores proferens, aliis quidem
similes: sed ex cineraceo quodammodò purpura-

Hyacinth. Orientalis purpurascens.

singuli quinis floribus erant onusti: sequente ta-
men anno nudum tulit caulem paucioresque flo-
res, cum longè plures expectassem, quandoqui-
dem primo factu tam fuisset fertilis. Verum dili-
gentissimus & eruditionis non contemnendæ Ia-
cobus Plateau mihi scripsit, Hyacinthum alere se
valde amplis foliis, magno, crasso, firmoque cau-
le, multis floribus prædito, colorem non addidis-
set, sed iconem misit Hyacinthi polyanthi maioris
nomine insignitæ: qualem hic exprimi curauimus.
Habeo quidem vnam stirpem valde lato folio &
saturatius virente præditam, cuius caulis etiam
crassus, firmusque, sed inferendis floribus par-
tior, ut pote qui plures dens non det, colque
non ad latus vnum spectantes & conuersos, sed
omni latere æqualiter quasi sparsos, saturatius
purpurascens, capita enim saturatius viren-
tia, quasi purpureæ insperso colore. Cete-
rùm, quod silentio minime premendum duxi, Ge-
neroso Wolfgango Christophoro ab Entzestorf,
semine à me communicato natus est Hyacinthi
bulbus, qui Aprilimense anni 1532. florere cepit,
& sequentibus annis similes primis flores profer-
re non desit. Eius folia aliis similia sunt, paulò ta-
men diutius virentia, inter quæ caulis emergit
fatis firmus, senos, septenos aut plures (habui e-
nim duodenos & quatuordecim) interdum flores
proferens crassiusculos, interiore parte omninò
niueos, foris etiam albos, sed quorum externa
tria folia ad *χολύχων* colorem quodammodo ac-
cedunt, non minùs tamen odoratos quàm supe-
riores Hyacinthos: iis succedunt trigona capita
dilutius virentia, semen etiam nigrum continen-
tia: radix satis crassa, candicans, multis fibris do-
nata. Anno porro 1587. Bizantio accepit Gene-
rosa D. Vngnadin magni muneris loco, & pro
hyacinthis niueo flore, quatuor exiguos bulbos
à reliquis discretos, quorum duo candicantes e-
rant, alii dilutè purpurei & coloris admodum flo-
ridi: vtriusque generis vnum mihi dedit: purpu-
reum vtrique subsequens hiems corrumpit, tamen
mei magnam curam habuerim, alter paucos de-
dit flores nosque omninò niueos, altero minores,
ut etiam tota planta multò tenerior & infirmior
est. Diuerlus autem ab utroque qui pro albo

*Hyacinthi
Orientalis.*

*Hyacinthi
Orientalis.*

HYA.

Hyacintho hactenus est habitus, cuiusque vnicā stirpem à C.V. Alphonso Pantio missam alebat in pensilibus hortis Il. lo. de Brancion, cum Viennā euocatus sum ex Belgica: cuius postea plures bulbos Viennā illi misit, nam istic satis frequens erat, cum valde sit liberalis in sobole generanda. Sunt verò illius flores antequam explicentur, albi, sed aperti oras tantum albas habent, reliquā parte quasi carnei coloris, cum tamen senescere incipiunt, ferè toti niuei fiunt. Turcæ omnes hyacinthos hactenus acceptos *Zambul* appellatione miserunt, additā voce Indi, cum Indicum, vel alia quapiam, cum locum vnde acceperint, inditare volunt. Florent omnes Aprili.

Huius itaque hyacinthi variae sunt species, quantum *vnā* hyacinthum Orientalem flore maiore vocare solemus, quæ modò plures, modò pauciores habet flores purpureos, cæruleosue. Huius iconem desumpimus ex Camer. Epit. Alterum autem siue hyacinthi minoris *Polyanthus* ex Plin. pag. 103. Tertium id est, hyacinthi Orientalis *Polyanthus* foliis, Figura est ex Clus. hist. post. pag. 175. Quartum id est, hyacinthi Orientalis albi, quæ exstat in Icon. Pl. pag. 106. Quinta denique est hyacinthi Orientalis purpureo rubei, quem depinxerunt Icon. Pl. pag. 104. Anguill. hyacinthus Theophrasti & Dioscoridis, Turcis *Zemleuder*. Aliud hyacinthi genus quod Orientale appellare placuit mihi Matth. in Dioscor. cum magn. figuris] Corrusus, quod sibi missum ex Orientalibus regionibus ferebatur, quod hyacinthus Orientalis *frembder hyacinth* cognominatur. In Epit. Camer. Icon. Figure sanè quæ ponuntur à Camer demonstrant hyacinthum maiore & minore flore: sed secunda non responderet figuræ Matthioli, quæ nihil aliud meo iudicio quam Ornithogalum maius album, ut suo diceretur loco, exprimit.

Dodon. de si. Hyacinthus quem Italia & Belgium Orientalem nominat, folia habet pinguiora & latiora, caules crassiores, flores potentiores majoresque, ac citius prædeuntes. Item in fol. uorum vnus maior, plures profert flores: alter minor pauciores. Figure, quas proponit Dodon. non displicent quamuis minùs exactè distinguat plantas.

Lob. & Penz Adu. hyacinthi Orientalis Græci varietas quam Indi *Zimbel* vocant, caulem habet Serpentariæ modo maculosum, & tortilia folia.

Tabern. ic. & h. hyacinthus Orientalis cæruleus, blauer frembd hyacinth. Item: hyacinthus Orientalis maior *Polyanthus*: Gefulter frembd hyacinth.

Halepi cum esset Rauwolf. obseruauit principio Februarii aliquot hyacinthi species, potissimum Orientalis quem vocant *Zimbel*.

Camer. hort. hyacinthus Constantinopolitanus Diosc. hyacinthus Orientalis, albo cæruleo flore, itemque purpureo. Turci vocant *Zemul*. Item hyacinthus Arabicus à D. Aicholsio communicatus. *Zimbel* Arabibus. Nos Arabicum quoque hoc capite ponimus, quia nondum nobis constat quantum differat à cæteris, & quia teste Rauwolfio cæteri hyacinthi Orientales ita dicuntur. Lob. etiam ut antè demonstratum ut meminuit etiam *Zimbel*, an idem cum hoc nescimus.

I. Gerard. hyacinthus Orientalis cæruleus thebleu Oriental Jacint. Item hyacinthus Orient. *Polyanthus Double Orientale Jacint*.

C. Bauhin. Phyt. hyacinthus n. siue Caule serpentariæ instar maculoso, Matthiolo Orientalis

alter, Lobel. Orientalis Græcus. Et hyac. n. siue Orientalis purpureus Lobel. purpure rubens, hyacinthus n. siue Orientalis albus i. Orientalis albus. Et hyacinthus n. siue Orientalis maximus. Matth. hyacinthus Orientalis Lob. Orient. maior *Polyanthus*. Tandem hyacinthus n. siue hyacinthus Arabicus Cam. Nostro iudicio si quid suspicandum ex nuda Matthioli figura, suspicor Matthiolo hyacinthum Orient. alterum potius cum maiore Lobelii conuenire quam primum, & primum Matthioli potius quadrare cum Lobelii Orientali Græco.

Idem C. Bauhin. apud Matth. hyacinthus Orientalis, hyacinthus caule Serpentariæ. hyacinthus Orientalis alter Matth. siue maximus [sed figuræ transpositæ erant, figuræque mutila. Matthioli figura hyacinthi Orientalis non demonstrat plantam, cuius figuram ex Tabern. ponit mihi Matthioli hyacinthus ille est Ornithogalum maius album, ut iam dictum, foliola quæ appingit ad singulos pediculos longiusculos, & aliam differentiam manifestam demonstrant ab hyacintho Orientali maximo, nec figura Matthioli inutilis est, ut quis existimet, si sumatur pro Ornithogalo dicto.

Orientelem siue Constantinopolitanum hyacinthum cum essemus in Italia vocabant *Zemleuder*, vidimus Veronæ in horto Nobilis di Mulcardo. Ferrariæ in horto Principis mense Maio nobis ostendit ipse Anguillara iam deflorescentem, & in quo capitula incipiebant prodire. Bononiæ in horto Nob. Alpaisel. Parmæ in horto Nob. Antonii Lalatæ, mense Aprili defloretat. Hunc etiam vidimus in horto Priuli & Pasqualigo Patavii. Genæ in aliquot hortis ut in nostro etiam mense Februario flores incipiebant protrudere & folia. Montbelgardi Genæ allatum prorupit Ianuario in horto nostro: trāstulimus in hortum Il. E. C. Wirtemb. accepimus etiam à D. Landgrauio, flore albo. Basileæ apud Doctorem Felicem: Nunc in horto Il. E. C. aliquot species habeo maiorem purpureum cæruleum & album.

Locus & tempus

HYACINTHVS BRVMALIS ALBVS.



L'ouanio Lad nos (inquit Lob.) primum misit hoc hyacinthi Orientalis venustissimum & rarum genus à D. prof. Regio D. Cornelio Gemma, iconè & oratione scitè expressum & descriptum. Eius bulbos Insulis ad me postea misit amicus singularis homines Baillet, Mercator Insulanus.

Descriptio

C. Gemmæ rarum hoc prorsus videtur atque exoticum hyacinthi genus: nam etli folio-

rum formâ & florum cum aliis plerisque conueniat, id tamen sibi vendicat singulare, quod statim sub Solis hibernum tropo sub terris erumpat, caulem quoque protrudens interdum per medias niues. *Florem* venustissimum laxat circa principia Ianuarii, ut apud me iam ter quaterue floruerit à fine Decembris vsque ad medium febr. Mensis Martii, non sine maxima pariter admiratione & aspectantium voluptate. Non gaudet humidis locis, sed ab humore prius quam frigida corrumpitur: ideoque & in tella fidelius asseruatur: semen tamen aut bulbi germen haecenus ab eadem planta impetrare non potui, quod florum illa nimis præcipitata prætersio facit. Sunt illi *folia* non ut cæteris laxa & mollia, sed succulenta, spissa, ac ferè semper erecta, ut in generibus Aizoi. Næm in his nulli conspicui: sed striæ solummodo rectæ ac veluti tenues fibræ. Durant autem virore constante vsque ad finem Iulii mæsis, ac multò diutius quàm cæteris usu uenit. *Flis* laui caule, nonnihil circa fastigia ad pediculos singulos excavata; propender candidus; nonnihil tamen sub inuia, & circa supremas oras quiddam subæruleum præse ferens, quo quidem euanescente sensim februario mense totus fit lacteus, odore fragrantissimus, in ea specie deinceps mense plus integro perseverans. *Radix* bulbosa, intus candida, foris rufa, circa foliorum exortus maculas quasdam, quales in *Serpentaria* mæsis caule spectantur, effundit, interfusæ purpurea nigra. Verum id maxime sub Veris auspicia, & cum terra rursum mandatâ caulem emeritum gerit.

Lobel. append. & Icon. Pl. *Hyacinthus brumalis*, *Orientalis albus*. C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus* 14. siue *Orientalis albus alter*.

HYACINTHVS MINIMVS

serotinus stictulis Hyacinthi
Orientalis.

Descriptio

HYacinthus Lobel. Adn. par. 2. minimus serotinus elegans, facie Orientalis Hyacinthi, scilicet palmares & spithamigos tenuissimos canticulos edit, tribus styculis & gracilibus petiolis, ex cæruleo dilutis, senis cæruleis venis striatis, Hyacinthi Orientalis similibus, sed longè gracilioribus, minoribusque, sex partibus oris sub finem Maij prædictos. *Foliola* angusta, spatha, spithammum longa. Hyacinthi Autumnalis maioris quantenus. Paruus item *bulbus*, albidus. Alitur in sicilibus à D. de Franqueville ex Gallia delatus, & acceptus ab honestissima matrona vxore D. D. L' Aoust, tanto florum amore capta, ut sibi merito Flore nomen vendicaret.

HYACINTHVS ODORATISSIMVS

dictus Tibcadi & Muscari.

Descriptio

HYacinthus Tibcadi dictus bulbo admodum magno, albicante, multis tunicis per textonitur, gustu amaro, cui appositæ fibræ paucæ quidè, sed crassæ & longæ, quæ Clusio perennes, nec singulis annis marcescunt & pereunt, ut Hyacinthorum, Narcissorum, Tuliparum, Liliorum, & multarum aliarum bulbacearum stirpium fibræ: *folia* quinque aut sex dodrantalia & longiora latitudine ferè vnciali, sex striis per longum discurrentibus, crassiusculis, carinata, satis crassa

& succulenta: *caulis* singularis, teres, satis crassus, nudus, admodum infirmus pro sua

crassitudine: hunc à medio ferè ad summum racematim coherentes ambiunt flores botryoides, quorum colores sic tradit Clusius: Intid interdum purpurascens aut virides, deinde ex purpura virides, aut ex viriditate albicantes, nonnunquam subærulei, aliquando nigricantes initio, siue saturate purpurascens, de-



inde pallidi vel flauescens, vel ab initio pallidi, postea flauis, postremo ubi tabescere incipiunt nigricantes aut pulli, lique mucrone quàm in aliis crassiore aut obtusiore interdum, qui marcescere incipientes, gratissimum moschi ferè aut aromaticum odorem referunt, licet qui flauo colore est, grauius quidpiam & Narcissinum quodammodo spirer: intelligo & niueo flore, atque etiam egregie rubente inueniri. Flores sequuntur capitula prægrandia triquetra, & veluti pinnata, in quibus semen nigrum rotundum. Clusius ait se oblectasse interdum hanc stirpem caulem in binos ramos diuidere, quorum singuli multis floribus ornati fuerint.

Marth. in Comment. Ital. & Lat. cum magnis fig. *Bulbus vomitorius*.

Dodon. de floribus, *Hyacinthus alter quidam spurius*, Matthioli pro *Bulbo vomitorio* depingere videtur, nullis interim notis eum describens, nullis testimoniis aut rationibus sententiam suam astringens. In fol. *Hyacinthus spurius Recentiorum alter*. Dodonæo penè euenit quod reprehendit in Matthiolo, descriptio ita ieiuna, ut difficile sit agnoscere de quo Hyacintho tractat nisi in post. histor. lat. fig. apposuisse.

Lob. obi. *Dipadi Chalcedonicum & Italicum*, *Bulbus vomitorius Matthioli*. Item Icon. pl. 109. *Dipadi Chalcedonicum & Muscari Clusii*. Tabern. icon. & histor. *Hyacinthus botryoides Chalcedonicus muscarius, fremdden rauben hyacinth*. Gerard. *Muscari Clusii*, & in Colored grapflower. C. Bauh. phyt. *Hyacinthus* 27. siue *racemosus Moschatus, Bulbus vomitorius Marth.*

Clusius: E vicinis Constantinopoli hortis ultra Bosporum in Asia sitis primum nostræ Europæ communicata est hæc planta. Hyacinthi species odoratissima Nobili viro D. Antonio Cortusio Tibcadi Arabibus dicta. In principio Martij florebat Patavi in horto prædicti. Montbelgardi in horto E. C. per Fratrem C.

Bauh. missum ex Italia, & per Landgrauium habuimus copiosum.

HYACINTHVS ODORATISS. TIBCADI
luteus.

Clusu nullam particularem ponit Muscari
flavo flore descriptionem, licet iconem ha-
beat.

In Exor. part. 2. Append. 2. annotat quæ se-
quuntur: In illis plantis Muscari quæ flavum pro-
ferunt florem, discrimen quoddam observabam.

Nam ex quæ
pallidas ab i-
nitio proferunt
florum gem-
mas, ante hye-
mem plerum-
que germina-
re solent, &
præciores
producent
flores, quam
illa, quarum
gemmae ab i-
nitio nigrescunt,
aut latitius
purpurascunt.
Ex illis autem
semine natus
mihi esse plan-
tas memini,
quarum flores
colore non re-
ferebant ma-



eris flores, sed alium quendam peculiarem nan-
tescebantur, ex viridi scilicet flavescentem: ma-
tris tamen florum odorem retinebant.

Tabern. Icon. & hist. Hyacinthus botryoides Chal-
cedonicus luteus, frembder gel trauben hyacinth.
E. Bauhin. Phyt. Hyacinthus 28. siue racemosus mu-
sicarum luteus. I. Gerard. Muscari flavum Vellaro
muscled grape flower. Lobel. ic. Pl. pag. 109.
Dipsadi flavum siue Muscari Constantinopolitanaum
siue Chalcidonicum Teut. 145.

Vidi Stuegardia in horto Ill. C. Witemb.

HYACINTHI TIBCADI LVTEI VARIE-
tas siue Muscari lutei præcox.

Mediocastri Martiacorum (inquit Lob. Adv.
part. 2.) in stipium exoticarum diuissimo
viridatio D. Cornelius Corne aiebat, Martio flo-
res laxans, initio subcaeruleos: Aprili verò au-
reos. Folia minime sparsa aut procumbentia,
vult alterius flauis Muscari sed Tibcadi floris æ-
rulei modo crecta. Cætera eadem.

HYACINTHVS STELLATVS BIFOLIVS ET
trifolius vernus dymetorum, flore
caeruleo & albo.

Ex radice bulbosa, oblonga, fibrosa, alba, gu-
stanti viscida & subdulci, exit coliculus iun-
ceus, fragilis, palmaris & pedalis, fuscus, radi-
cem verius exalbidus, duobus foliis, interdum tri-
bus, longiusculis, carinatis, à bulbo statim exor-
is, stipatus, qui in pediculos pro florum numero
plures paucioresve ad duodecim nonnunquam,
nunc breviores, nunc longiores, teretes diuari-
catur, licet aliquando ipse coliculi scapus flos-
culum singularem gerere reperitur: flores, pul-

Temp. 11.

chri, caerulei, rariis albi, stellati, sex foliolis di-
stinctis, angustis, mucronatis, constantes, in quo-



rum medio
staminibus sex
diluto caeru-
leo sustinetur
capitella sa-
turatus tin-
cta, pistillum
turgidulum
mucronatum
concolorem
circumstacia:
at si flos al-
bus, cum sta-
minibus quo-
que alba api-
cibus luteis
prædita pistil-
lum albu am-
binunt: succed-
it capitulum,
in quo semen
Trago autore
fulcum, Milio
simile. Clusio
in triangulis
vasculis non
atrum, ut cæ-
tera hyacin-
thorum gene-
ra, sed fulcum
duntaxat &
veluti fuligi-
ne infectum.
Icones quas
proponimus
sunt ex Fuch-
sianis quas e-
minimus, flores
in his non be-
ne picti.

Hyacinthus
vulgaris Clu-
sio, quia flori-
bus radiatim
expansis, & in

stellæ formam decussatis, stellati cognome apud
rei herbariæ studiosos inuenit, is videlicet qui
caeruleo est flore in quo varietatem etiam ob-
servabatur aliis floribus magis saturis & ad viola-
ceum quasi tendentibus, aliis ad carneum co-
lorem proximè accedentibus. habet autem ip-
sa planta vel terna folia, vel plurimum bina, ut
etiam illi bulbi quos Neapoli Francofurtum ad
Clusium mittebat Ferdinand. Imper. Qui albo
est flore, spontè nascentem nusquam videre ipsi
contigit, sed binos aut ternos eius bulbos Fran-
cofurti accipiebat munere D. Philippi Stephani
Sprengeri Pharm. Palatinalis Heidelbergæ: aliū
deinde exalbido & veluti cineraceo subcaeruleo
ue flore præditum, Lugduno Batavorum missum
à N. V. Ioanne ab Hogelande. Superioribus au-
tem generibus maturius flores, & in triangulis
vasculis semen fert, non atrum, ut cætera genera,
sed fulcum & tanquam fuligine infectum
cui non valde dissimile, etiam est illius semen,
qui albos profert flores. Viennenses porro Ma-
tronæ cum qui caeruleum habet florem, Blau
baldrian appellant, quasi caeruleum Liliū cō-
uallium nani Oenanthem vulgò Liliū conual-
lium dictam, ipsa baldrian nuncupant. Belgæ à

Tempus

Nomen

Oenanthē
Lilium com-
natum.

Ccc

Hyacinth.
stellatus
Lob. Icon. p. 99.
Liliiflorus.

stellato flore Sterrefens vocant. Sed & Hyacinthum stellatum vulgari aliqui formâ similem reperiri audit, quorum alter flores proferat, liliacee rubentes & quasi carnosos, alter, flavos: illos autem videre nondum iphi contigit.

Icon Clusiana sub titulo *Hyacinthi stellati albo flore* apud Lobel. obs. p. 53. Et icon. Plant. p. 99. est sub titulo *Hyacinthi germ. Liliiflori* siue *Floris Martii stellati*, *Narcissi caerulei Bockii*. sane placet icon pro caeruleo & albo, quia quod animaduertimus non differunt nisi colore. Brüssel. T. 1. Rhaph. 31. & 4. p. 150. *Narcissus Martius*.

An Cordo herba *Narcissi*, caule dodrantali, flore est in lateralibus pediculis cædido, stellato, aut cruciformi, odorato: radice bulbosa, Norimbergæ in horto Ollingeri.

Non vult litigare *Tragus* an hi bulbi, vel *Narcissi caerulei* & *albi*, blo *hornung blumen* blo *mergen blumen* sine referendi ad *Bulbos vomitorios* aut *Narcissos* vel *Hyacinthos*. Figuram unicam habet *Tragus* quæ minùs placet.

Fusch. hist. *Hyacinthus caeruleus minor*. *Hyacinthus albus*, seu *foemina*. Item icon. *Hyacinthus caeruleus minor mas*, *Heinblaw mergen blum mennele*. *Hyacinthus caeruleus minor foemina*, *Heinblaw mergen blum weible*. *Hyacinthus niueus weisse mergen blum*.

Gesner. horti. *Bulbus quidam sili. Hyacinthi speciei*, ut multi putant. In cat. plant. *Vaccinium*, *Hyacinthus*, *caeruleus*, *Blaw mergen blumen*. Item *Hyacinthus*, *Latinis* (ut quidam volunt) *Vaccinium*, *Blaw hornung blumen* / *Ein hyacinthen geschlecht*.

Lobel. & Penz. Adn. *Hyacinthus Germ. Liliiflorus*, *Angl. Our ladies flower*. Doctiss. quidam cum *Fuschio* Poeticum *Hyacinthum* diuinabant. Sed eius effigiatum congruentius multò *Dioscoridis* *Hyacintho* quàm *Poëtico* foret, flores caerulei purpurei. Item obs. *Hyacinthus Liliiflorus stellatus*, *Floris martii stellatus Germ.* *Hyacinthus bifolius Theophrasti*, *Belg. Sterrefens*. Et icon. Plant. p. 99. *Hyac. Germ. stellatus*, *Narcissus caeruleus Bockii*. Aduerf. part. 2. *Hyacinthus Germanicus stellatus*.

Cam. horti. *Hyacinthus stellatus flore albo & purpureo*. I. Gerard. *Hyacinthus stellatus Fusch. Starrie Jacynth. Narcissus caeruleus Bockii*.

C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus* 1. *caeruleus* siue *trifolius*. *Hyacinth* 2. siue *primus albus Narcissus candidus* Trago. *Hyacinthus Germ. stellatus albicans serotinus Lobel*. Et *Hyacinthus* 3. siue *caeruleus alter bifolius* Tab. icon. minor: *Dodon. Satyrium* 2. Dubito an *Tragi* planta eadem sit cum *Lobelia*, quia *Tragi* soler cum alio florere & flores habere albos, qui sex foliolis constant, *Lobelii* verò *serotina* flore albicante pingitur cum foliolis 5. tantum. Nullam præterea video occasionem separandi *Satyrii* secundi *Dodon*. ab *Hyacintho stellato primo*, ipsemet *Dodon*. in potremis non separat.

Narbonæ montosis arduis, *Geneux* aut *Helvetiæ* & *Germaniæ* in campestribus & iuxta tæpes, *Lobelio*, nascitur, flore caeruleo, purpureo. *Hyacinthus Camer. stellatus* flore albo & caeruleo, frequens in *Duc. Vviremb.* creber, ut *Fuchsius* quoque meminit & *Cordus* *Tubingæ* in siluulis inuenitur. Nascitur in nemoribus: atque hinc est quod *Galli* apud quos, *Plinii* testimonio, eximie provenit, ut *Ruellius* autor est, nemoralem & agrestem *Cepam* nominant. Et eius certe magna est copia *Verno* tempore in nemoribus haud procul à vico *Luschnow* iuxta *Tubingam* sito, ut vel etiam ex natali satis constet


flores hos quos pictos exhibet *Fuchsius* esse geminos *Hyacinthos*. Vere provenit mensibus minimè *Februario* & *Martio* *Theoph. l. 6. hist. c. 6.* hinc *Martius* flos dictus, cum itaque tempus etiam conveniat nemo est qui deinceps veros esse *Hyacinthos* dubitare merito possit.

E loco & tempore *Fuch.* asserit non dubitandum de suis pictis *Hyacinthis*, verum non demonstrat, qui sint ex iis, qui in *Ducatu Vviremb.* vel in *Gallia* proveniant, hinc apparet facinoræ argumenti.

Cronemb. *Satyrium* verum colligitur in tractibus sabulosis & arboribus confitis ex quibus nos olim frequenter erimus, ac maxime circa *Hellen* eximium *Holandia* oppidum.

Hyacinthus stellatus vernus modò bifolius modò trifolius à me observatus inter *Balneum Aponense* & *Arqua* & in monte *Venda*, & *Paravi* in horto *Nob.* *Pasqualigo* florens in fine *Februarii*; *Montspelli* allatus ex montibus circa *Gangem* mense *Aprili* cum foliis latis, radice bulbosa, & floribus caeruleis multis ab invicem divaricatis cum pediculis satis longis: *Geneux* copiose in colle circa *Castellum la Bassie* florens *Martio* mense, è regione *Champé* ultra *fluvium Arue* in syluosis locis mense *Februario* folia protrudens, & circa finem *Februarii* florere incipiens, ac ibidem non solum colore caeruleo, sed etiam pulcherrimo niueo: nec video differentiam quàm coloris: inveni etiam *Montbelgardi* ac habeo plantatum in horto *ll. E.C.* qui passim provenit, ut in colle cundo *Vauiaucourt* & in nemoribus versus *Arbomans*.

HYACINTHVS STELLARIS Albicans Serotinus.



Scilicet *Lob.* in *Append.* *Hyacinthus stellaris albicans serotinus*. Serius floret & folia exiliora habet, flos aspectu iucundus albicat. In *Belgium* delatus è *Biscayæ* moribus, & munere missus à *Mutone*. Item *Icon. Pl. p. 100.* *Hyac. Germ. stellatus albicans*, *Teut. 136.* Item *Aduerf. part. 2. Hyacintho*

tho Germ. stellatus congener *Hyacinthus serotinus albicans* & *Cantabrie* montibus delatus, cuius effigies *Icon. p. 100.* exprimitur. Septenis floribus & pluribus aspectu iucundissimis in hortis *D. l. Someri* & *D. Iacobi Knibii*: albis floribus variare memini & luxuriare cum *Hyacintho Stellari* *Bizantino* à *Clusio* descripto radice foris nigra, flore præcoci. Item *Hyacinthus stellaris albicans* *Boranicorum* eligit. *Icon. p. 100.* A stellæ instar radiatis floribus ab herbarum cultoribus sedulè vocatur *stellaris* aut *stellatus Hyacinthus*, floribus albis emarginatis septem & pluribus in horto

Locus. &
tempus.

Hyacinth.
stellatus
Lob. Icon. p. 99.
Liliiflorus.

horto Someri variat. Lobel. videtur mihi obscurus: Cur in post. Animad. bis mentionem facit Hyacinthi stellaris, hyacinthi albicantis: cur bis repetit descriptionem hyacinthi stellæ cum albis floribus, suum albicantem pingit cum floribus quinque, unus autem flos pingitur quinquefolius, an veraciter nescimus, stellares dicti solent esse sex foliis.

C. Bauh. Phyt. existimavit eundem cum Tragi Narcisso candido, quod nobis non videtur, non tamen negamus eum quem describit in Adu. postremis floribus albis eundem esse cum Tragi Narcisso ut antè dictum.

HYACINTHVS STELLARIS VERNVS parvulus, flore ex cæruleo cinereo.

Descriptio



Per similis autem Lob. Adu. part. 2. parvulus Hyacinthus stellaris Vernus, etiamque stellaris Hyacinthis conger pumilio, novus indictus hyacinthus, Ló. dini hoc mense Aprili 1605. in amœnissimo & exoticarum stirpium ditissimo hort. C.V.D. lo. Coys, cuius sæpe meminimus, flores laxavit ternos aut quaternos, stellatos, ex

cæruleo cinereos, senis foliolis, totidemque staminulis & apiculis cæruleis obscuris conflatos: pistillo in medio cum umbone aut apice ex cinereo cæruleo. Vix palmaris plantula est, foliis angustis, ut cærulei amœni floris parvuli Hyacinthi Botryoidis surrectis, minoribus tamen gracilioribusque, quaternis aut quinis, è quorum medio cauliculus prodit. Radix parva, alba, oblonga, parum fibrata, quæ ut & plerisque aliis novis Plantis ex Galliis delatis Georgius le Seigneur Britanniam ditavit.

HYACINTHVS STELLARIS MAIOR.

HYacinthus stellaris maior, autore Lobel. Adu. par. 2. omni sui parte duplò maior hyacintho stellati Germanico. Martiacis Medioburgensibus botanicis Belgis innotuit opera D. I. Someri, quem in hort. Magni Ducis hetruriz natus est. Flores intensioris purpuræ: Radicis bulbosus albet.

HYACINTHVS STELLATVS æstivus minor.

Descriptio

Quam primum è terra, inquit Clus. prodit hæc planta septena aut octona à radice promittit folia angusta, plana, viridia, & quodammodò splendens, circiter septem uncias longa, quæ sese humi diffundunt, & in orbem spargunt, at-

Tom. II.

que veluti contorquent: inter quæ assurgit cauliculus teres, brevis, binarum unciarum longitudinem non excedens, summo fastigio senos aut septenos *stosculos* alternatim ferens, veluti spicam congestos, iis formâ & colore præter similes, quos profert hyacinthus stellaris æstivus, cuius paulò antè meminimus, sed longè minores: his succedebant triangula etiam *capitella* extremo mucronata, nigrum *semen* continentia: radix erat bulbosa, fere orbicularis, crassæ Auellanz hispanicæ magnitudinem æquans, candida sed fulcâ membrana cæcta, è cuius intimâ sede numerosæ exiliebant fibræ, magnâ ex parte valde tenues, iis tamen admixtæ septenæ aut octavæ paulò crassiores. Florebat Maio mense cum maiore. Vnicam huius generis plantam, eamque *arvum* accipiebam anno Christi 1603. à Nicolao le Quilt siue Quelr Gallo rhizotomo cum bulbo unifolio, & aliis quibusdam à Lusitania, ut assererebat, petitis.

HYACINTHVS RARVS.



Descriptio

Radice nigræ hyacinthus nobis rarus dictus, bulbosa, magna, fibris donata, alba, alibi purpurascens, sapore subdulci, viscido, & nauseoso: folia à radice quina aut quaterna, per terram sparsa, unciam lata, Hyacin. stellati siue dumerorum latiora [à quo differt, licet affinis] sunt longitudine cubitali, ca-

rinata, striata & splendens: *caulis* tenuis v-nus vel duo, interdum quaterni, cubitum alti, alii palmum, scilicet palmum, & palmos duos longi, purpurantes, nitentes, angulati, flores sustinent in summo fastigio, quaternos, quinos, senosque, à lateribus ex foliis sex composito, sublongis, acuminatis, cæruleis, vel potius violaceis, vngue albicante, decurrente per longitudinem linea saturatiore viola tineta, ita à se invicem ad pediculum usque distantibus, ut radiatam stellam æmulentur: medium occupat *capitulum* rotundum canaliculatum, Pili parvi magnitudine, album, loculamenti *seminum* rudimentum, quod ordine circumstant *stamina* rigidola, sena, violacea, circa imum albicantia, è medio autem *capitulo* stilus violaceus emicat: pediculi, inferiorum quidem florum plus quam duas uncias longi, purpurantes, splendidi, surrecti, superiorum verò vix culmum latum longi, mediorum medio modo se habent.

Hoc Hyacinthi pulchrum genus attulit nobis **Locus** Frater Casp. Bauhinus ex Italia, collectum Patavii in hort. Trevisani: ex bulbis à nobis satis in hort. Ill. nostri Principis, flos emicuit Aprilis mense. Frater nobis retulit D. Cortusum nominare *hyacinthum* nondum descriptum cum

Ccc 1

hoc bulbo magnam affinitatem habere videtur
hyacinthus Stellatus Byzantinus Clusii: cui an
veriusque bulbosa plantæ nota fuerit differentia
statuito.

HYACINTHVS STELLATVS Byzantinus.

Descriptio



H yacintho nostro raro, in multis correspondente tradit Clusius nist. post. nomine hyacinthi stellati Byzantini; de quo ille ait, quater-na aut quina sunt folia humi fusa, longa, carinata, dilute virentia, hyacinthinis aded similia, ut ante quam florem conspicerem, hyacinthum esse crederem: inter hæc emerit di-

gitalis ferè longitudinis, gracilis, & infimus ca-
ticulus, priore anno ternos sustinens flores, altero
quaternos aut quinos, sex foliis constantes, dilu-
ti cerulei coloris, inodoros, qui Solis radiis illu-
strari instar florum hyacinthi stellati vulgaris se-
se explicarunt, & ex alba sex staminula osten-
derunt, quorum apices purpurei, stilo in medio
eorum assurgente: successerunt triangula capi-
tula, qualia in vulgari, sed inania, ut semen obser-
uare nequiverim: radix bulbosa est, non magna,
nigro cortice tecta, & fibris subtus prædita. Hunc
Bulbum Byzantio acceptum cum aliis stirpibus
Francofurtum ad me mitebat anno 1590. Ge-
neros. Domina Vngnadin nomine adscripto *Susam-
guile*, quâ appellatione initid Lilium Susianum
insignitum, deinde, Iris illa bulbosa præcox, quam
Marthi olus pro hemodactylo Constantinopoli-
tano exhibuit, Dodonæus pro Iride tuberosa. Flo-
res mihi protulit Aprili cum aliis hyacinthis.

tempus.

Lobel. Adu. part. 2. p. 485. *hyacinthus stellatus*
Byzantinus à Clusio descriptus. Videtur idem p. 486.
eundem tradere his verbis: hyacinthus stella-
ris Byzantinus tenuifolius præcox: effig. rar. pl.
p. 184. Affinis stellari hyacintho Germanico, fo-
liolis & effigie: sed minore vnciam longo, par-
uum digitum crasso bulbo: flores itidem stellatos,
obsoletè ceruleos, tenui superiore caule fufos,
Martio & Aprili laxat in hortis cultionibus Bo-
taniciis. Dubium nobis est de quo hyacintho
stellari Byzantino scribat Lobelius: ille hyacin-
thus stellaris Byzantinus cuius meminit Clusius in
post. h. A. p. 184. non est tenuifolius: nec Clus. ait
ei tenui folia.

HYACINTHVS STELLATVS Byzantinus alter elegantiss. sero- cinus, bullatus.

Hic præcoci deflorescente Hyacintho stella-
to longè elegantior, nitidis, stellatis, ceruleis,

amœnis, secundum sesquipalmares, spica-
mazos, lucidos, planos, rubentes cauliculos, flo-



ribus prodis;
Stellati Ger-
manici Hy-
acinthi latiori-
bus foliis: semi-
ne in pericar-
piis rotundo,
albo, lucido,
Synapi albi fe-
re. Radix Leu-
coio bulboso
par, intus alba,
foris rubens,
quæ nucleis ad
natis propaga-
tur. Hic Con-
stantinopoli
delatus quin-
quennio flo-
ruit in Londi-
nensi agro in
horto exotica-
rum Stirpium

Locus & tempus.

ditissimo Nobiliss. Baronis D. Eduardi Zouche,
Cambriae magni Præsidis, vnde quidam alii pos-
tea habuerunt. Lob. Adu. part. 2.

HYACINTHVS STELLATVS multiflorus cineracei coloris.



Mittelbar. *inquit*
Clus. Hist. post.
in Walachria
Zelandia insu-
la, alebat Wil-
helmus Ispar-
duyn Phatm.
Hyacinthum
Stellatum sub-
cineritium, cu-
ius iconem mit-
tebat Doct. vir
Tobias Ræl-
sius illius vrbis
Medicus. Is au-
tem multa ha-
bet folia humi
iacentia, in-
star foliorum
hyacinthi An-
glici, vel Belgi-

Descriptio.

ci ferè: inter quæ prodis cauliculus palmaris, vi-
cenos, tricenos aut plures interdum flores, spicæ
vel Vux instar, congestos ferens, seu foliolis con-
stans, medium occupante vimbone siue capitulo
ex sex staminibus, non secus ac in Hyacintho, quæ
stellati cognomen vulgò obtinuit, sed longè dilu-
rioris, & veluti ex ceruleo cineracei: floribus
succedunt capitula trigona semen continentia
radix bulbosa est, candida, instar radicis Hyacin-
thi Belgici. Floret cum vulgari, hoc est, sub ex-
tremum Martium, vel etiam Aprili: pauldum
men secius vulgari & c. in Exot.

Hyacinthus stellatus Byzantinus vel exoticus
Somieris inquit Lob. Ad. par. 2.] latè depressa spica
fasti-

fastigiatus, hyac. stellatus Cineracei coloris apud Clusium. Effig. Ratio. Plant. pag. 184. iam septenis & pluribus annis elapsis altera Stellati hyacinthi exotici noua species nobis Medioburgi innotuit operâ eiusdem Domini de Somer, qui primus bulbum eius in Belgium attulit. Facie totâ, sparsis foliis, & cauliculo Spithamæo quadantenus hyacinthum Belgicum vel Britanicum æmulatur: sed umbellæ instar-initiâ stipatim stellati subcærulei pallidi flores, Plantaginis roseæ modo in latam expressam aut aliquantulum depressam spicam, & tandem in longam fastigiati. Apud Britannos hortensis hodie, & bulbo propagatur operâ D. de Francque ville in horto Medico Nobiliss. Baronis Eduardi Zouch magni Præsidis Cambriæ siue Walliæ.

HYACINTHVS STELLATVS ÆSTIVS.

Descriptio



Hoc hyacinthi genus [ait Clus. Exot. part. 2. Append. 2.] suis floribus onustum, primum Maio mense anni à nato Christo 1606. conspiciebam in cultiss. horto perturbani & ornati Viri Lopez cuius Leydani, quod è Lusitania allatum esse asserbat: deinde illo ipso anno videbam

etiam in hortis Ioannis ab Hogelande, & Christiani Portetii. Quum autem neque eius iconem, neque historiam quispiam hæcenus (quod equidem sciam) exhibuerit, operæ prærium me facturum arbitrabar, si in hoc appendice proponerem.

Erat autem hæc planta quaternis, senis aut pluribus foliis prædita, viridibus, carnatis, palmum longis, satis angustis, humisque quasi in orbem stratis, alioqui satis firmis, instar foliorum hyacinthi illius stellati qui cineraceos flores profert, superiore capite descripti, inter quæ assurgebat palmaris cauliculus satis firmus, sustinens oblongis petiolis inter appendiculas purpurascens prodeuntibus, denos aut duodenos flosculos ex cæruleo purpurascens, nullius aut certe perexigui odoris, sex foliis constantes, umbilicum occupante umbone, siue capsuli rudimento mucronato, cincto sex staminibus ex albo purpurascens, quorum apices cærulei: fiebant tandem ea capitula triangula & mucronata, qualia ferè in Hyacintho Belgico siue Anglico: quæ maturitate dehiscencia, semen continere deprehendebantur rotundum, nigrum, splendens, hyacinthi Belgici siue Anglici semini prorsus simile: radix erat bulbosa, penè orbicularis & candicans, infimâ siue sessili parte in ambitu frequentibus & tenuibus albis fibris in latera se se spargentibus donata, & interdum yna etiam

Tom. II

crassior digitum penè longa; atque in profundum se mergente, ut aliquoties in aliis etiam hyacinthorum generibus obseruare memini.

HYACINTHVS BIFOLIVS THEOPHRAST. Lobel.



Lob. H. Belg. Descriptio Blower
Meybloomfens.
Et Icon. Pl. pag. 100. hyacinthus bifolius Theophr. Teut. 137. C. B. Phyc. hyacinthus 4. siue bifolius Theophr. Lobel.

HYACINTHVS COMOSVS BYZANTINUS candicans cum staminibus purpureis.



Quæternis, inquit Clusius, quina aut sena interdum habet folia, humi ut plurimum diffusa & expansa, nonnunquam procumbentia duntaxat, oblonga, hyacinthi primi Matth. foliis valde similia, latiore tamen mucrone prædita, & in lateribus veluti tenui lanugine obsita, præsertim infimâ parte, circa eorum

exortum, ingrati gustus & nauseam facili excitaturi: ex horum medio pedalis, nonnunquam maior, nascitur caulis, teres & rotundus, nudus, intus fungosus, foris viridis lævisque, quem à medio ad summum sexageni plerumque, aut plures ambiunt flores oblongiusculi, oris in sex laciniolas diuisis, sex staminibus purpureis intus præditi, inodori, initiâ candicantes, deinde cum marcescere incipiunt, fusci & inelegantis coloris: pediculi quibus flores nituntur, initiâ brevissimi sunt, deinde paulatim marcescentibus floribus excrecentes, quatuor unciarum aut amplius

Ccc 3

rem longitudinem adquirent, sic ut totus caulis suis floribus ita expantis onustus, aspergillum nō minus referre videatur, quā Hippuris quoddam genus: caulis suprema pars cum florum pediculis purpureis: incipit florere ab imis: trigona deinde capitula fert, exigua, pro plantæ amplitudine, in quibus paucum duntaxat, rotundum, nigrum, Hyacinthi comosi maioris semine minus continetur, interdum nullum, nam ut plurimum capitula inania sunt, nec arbitrat utinam Clusius plura collegisse ex vñica, quā habebat, plantā, ternis seminibus, aut [quando plurima] quinis aut senis: radix torunda, bulbosa, multis candidibus tunicis constat, exteriorē subfusca, & basi multis fibris fultā.

Nomina

Quo nomine à Turcis insigniatur, me latet: nam Muscati bulbis semper permixtus fuit: ego propter comæ & florum quandam cum comolo maiore Hyacintho similitudinem, *comosum Byzantinum* cognominaui. C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus* 21. siue *racemosus albus alter*. *Hyac. comosus* Clus. in Pann. & Hist. post.

Natales.

Circa annum 1578. primum allatus est Constantinopoli cum aliis variis generis bulbis Mag. V. Paulo à Trauthon Cæsareæ aulae Medicis & à secretiore Consilio, in cuius suburbano paucos bulbos videbat Maii initio florentes anno M.D. XX. Ex eodem tempore nullos missos meminit Clusius, præter vnum aut alterum, duntaxat semel atque iterum: quia forsitan non expetitur, cum nullā floris elegantia sit præditus.

HYACINTHVS COMOSVS ALBVS

cum cæruleis Staminiibus.

Descriptio



HYACINTHVS generis [Hyacinth. comosi] alius inuenitur [teste Lob. Appēd.] in hortis quibusdam Belgarum, foliis quidem similibus, sed flore albo, intrus cæruleis staminiibus decoratus, radicis tunice minimè rubent, Hyacinthus comosus albus. Item Icō. Pl. p. 107. Teut. 144. Pann. lib. 2. c. 13. & post.

hist. l. 2. c. 18. Hyacintho comoso Byzantino non admodū dissimilem & in Belgicā, & Viennæ aluit Clus. nullā aut perpulillā coma præditū, cuius flores obsoletioris coloris albicantis, Byzantini floribus satis accedunt, pediculi tamē flores sustinentes in longitudinē non excreseunt, semē & radix satis conueniunt. Vulgare eius nomen, *Hyacinthus comosus albus flore*. Nisi Clusius eandem iconem cum Lobelio haberet, dubitarem an Lobelii & Clusii descriptiones eiusdem essent

plantæ.

Camer. horti *Hyacinthus comosus leucanthemoides* & semine Italico [Norimbergæ] natus. C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus* 20. siue *racemosus albus* 1. Lobel. *comosus albus*. *Narcissus montanus albus caruleis staminibus*. *Narcissi montani iuncifolii minimi* genus alterum Lob. obs. in appendice sine icone. Lobel. non vocat in append. plantam, cui tribuit cærulea stamina *Narcissi montani iuncifolii* minimi genus alterum, nec est sine icone: Adest enim icon, sub titulo *Hyacinthi comosi albi*: bis igitur eandem tradit C. Bauh. plantam diuersis locis.

In Italia agentibus inuenta est *Hyacinthi* species in monte Gilbi, bulbosa planta foliis prædita *Hyacinthi dumerorum* quaternis, palmā longioribus: inter quæ caulis surgebat dodrantalis, summo cacumine flores multos gerens, quo modo à Lobelio pingitur *Hyacinthus comosus albus*, radix bulbosa alba. Similis etiam ex Italia per Fratrem C. Bauh. ex Italia innominata delata. Eandem non asserimus.

Locus

HYACINTHIS AFFINIS PLANTA.

An Bulbus *Eriophorus Peruanus*.



Descriptio

Caulis cancellis, cuius scapus magnum profert pediculorum quadrantalium, circa exortū viridiū, superius purpureorum numerū: quorum unusquisque florem fert masculculum purpureū, floribus *Hyacinthi nostri* rari similem, quinque foliis longiusculis constantem, apicibus mediū obtrinentibus. Succedūt tandē seminū conceputula, rotunda, crassiuscula, in stilum desinentia: porro singulorum pediculorum exortui ligulae adnascuntur ut in *Ornithogallo*, longæ, albicantes & pellucentes.



Pulcherrima hæc plāta Lugduni demonstrata fuit sicca, per Baronem quendam Germanum redeun-

indeuntem ex Hispania ex qua curauimus depingendam. Sunt ab eo tempore quo primum curauimus depingendam plantam modò descripam, circiter 40 anni, quum anno 1608. Hyacinthi Peruvianum nomine donata planta de qua mox, à qua non ausimus hanc diuersam aut eandem pronuntiare: Considerandum etiam quantum nostram hanc plantam à Clusii Bulbo Eriophoro Peruano in cuius icone ligule pediculis apparent [quas ipse Clusius appendiculas vocat] differat.

Sic autem Bulbum eriophorum Peruanum describit Clus. lib. 2. cap. 23. Elegantiss. Eriophori genus ab eruditiss. Viro D. Simone de Tovar Medico hispalense anno 1596. accipiebam nunquam antè mihi conspectum quod iam descripto adiungendum putauimus. Multa id ex radice promittunt folia, surrecta inuicem, deinde in terram sese inclinancia, densa, carinata, instar foliorum hyacinthi, viridia, splendentiaque, quæ minutim contracta, tenuissima stamina præbent, haud secus ac primum genus. Inter hæc folia sesquipedalis nascitur caulis, teres interdum & gracilis, firmus tamen, nudus, virescens, qui summo fastigio plurimos fundit flores, initio quasi in spicam congestos, deinde ab infimo sese explicare incipientes, & in latitudinem expandentes, qui sex foliolis stellatim decussatis constare deprehenduntur, coloris purpurei, circa umbilicum autem cærulei, ut & prominens umbo, atque sena quæ illum ambiunt staminula lata, flauis seu pallidis apicibus prædita, singula florum folia per longitudinem secante venâ ex atro purpurea, odor valde tenuis & exilis: oblongis vero gracilibusque innituntur flores pediculis ex viridi purpurascens, quorum singuli ex appendicularum candidarum & membrana acæcum tina produnt: floribus successerunt trigona mucronatæque capsula, semen continentia rotundum, nigrum, semini hyacinthi Anglici seu Belgici par: bulbosus & crassus, longiusculus & quodammodo pyramidalis, ex albo flauescens (cuius squamæ, petiolo ac in priore molli lanugine plene) infima sede multis crassiusculis fibris prædita: floruit extremo Maio insequente. Ceterum cum diligenter hanc stirpem considerat Clusius, & cū hyacinthi stellati Peruani icone confert, plurimis notis conuenire comperit, & illa ipsa icone hanc stirpem, aut illi parem, expressam esse, pene sibi persuadet: illud solum interest quod iconi folia non carinata, sed medio nervo protuberante, & subleuata adpicta sint, tum radix nimis obtuso mucrone. Hanc ob causam Lectori optionem relinquit, ut quo loco volet, iconem adapteret. Temporis Laniferi nomen huic bulbo inditum, ob tomenti copiam, quod laæ modo in stamina diduci possit.

HYACINTHVS PERUVIANVS.

Descriptio **S**turgardix in horto Iunii principio floruit Hyacinthus Peruvianus dictus speciosus admodum flore. Folia supra terram ferè sparsa, digitum circiter lata, pene glauca, uncias quatuor, vel palmum longa, sapore viscido. Caudis palmo non multò maior, rotundus, crassus, firmus: flores à medio caule innumeri prodibant, cum alternatim ambientes, ex pediculis oriundi, trium ferè unciarum, cærulei vel purpurascens, qui constant ex sex foliolis, sublongis, in acutum desinentibus: in aucta parte linea, siue costa ma-

gis cærulea vel purpurea: intus apices cærulei sex, in quibus minima capitula lutea, & in medio stilus cæruleus, cui libet rudimentum siue capitulum seminum. Floris sapor non manifestus, nisi fortè nonnihil acris & viscosus. An hic hyacinthus diuersus sit ab hyacinthi affini planta nondum asserere possumus, magna certè similitudine. Quicquid tamen in pictura Hyacinthi Stellati Peruiani Lobelii aduers. alt. part. bene conuenit & nobis placet, ex qua duos flosculos tantum accepimus, vnum apertum & alium clausum.



Hyacinthi stellati Peruani, ex Peruano Orbe exemplar ad Clusium misit Nob. vir Carolus de Tassis, quod lata, crassa (ut ex icone animaduertere licuit) habuit folia, Hyacinthi Orientalis.

lis, seu potius Eriophori bulbi, foliis similia, humi, magna ex parte, sparsa, & viridia, inter quæ prodiit nudus caulis, virescens, summo fastigio multis floribus, spicæ in modum simul congestis, onustus, qui ab imo sese primùm explicare incipiunt, instar Scillæ, Ornithogali & similium: pediculi oblongi, ex atro virescens, ex gracilium & exiguum foliorum alis orti flores sustinent, sex foliis stellæ instar expansis constantes, purpurei foris coloris, intus ex purpurea cærulei, umbone, quemadmodum in vulgari, floris umbilicula, cum sex staminibus illum ambientibus, occupante. Fuit ne aliquo odore præditus is flos, aut in semen abierit, nondum intellexi: radix bulbosa, crassaque instar radicis Hyacinthi Orientalis, fusco colore prædita foris, & multis crassiusculis fibris ab ima sede prodeuntibus firmata. Icon quæ proponitur à Clusio, antè ab eo etiam posita fuit pro Eriophoro Bulbo Peruano.

HYACINTHVS ANGLICVS SIVE BELG.

Descriptio **H**ic folia quatuor, & plura, caule longiora, repanda, caulis è bulbo vnico, dodrantalis exurgit, colore & crassitie Hyacinthi Orientalis: flores odorati, cærulei seu violacei, penduli, octo aut nouem, non eodem tempore se pandentes, non nigri, ut in Orientali, quanquam tales obiter intuenti videri possent, sed ex squammatim incumbens & subeuntibus sex foliis, oris multum reflexis, quibus adnatae sunt fibre luteæ ad albedinem tendentes, compositi: in quorum medio stilus tenuis, triquetrus, cæruleus, pediculo ferè vnciali, cui apposita ligula violacea pediculo longior, ad medium vsque florem pertingens. Semen atrum, reliquorum Hyacinthorum instar.



Dodon. sic describit: hyacintho nō scripto folia sunt oblonga, angusta; lauia & splendentia: Porri foliis angustiora & minora: caulis foliis viduus, glaber, teres, cuius coma florum pondere & mole, cū primū dehiscere incipiunt, grauata, deorsum recuruat: flores oblongi, teretes, concaui, in latus se pādunt, per oras reflexi, colore, vt plurimū cærulei, subinde albicantes: aut candidi siue iuui, aliquando etiam Violæ nigrae dilutam purpuram referentes: semen in siliquis triangularibus paruum, rotundum. Radix bulbosa, candida, perennis, lento succo, vti & tota herba, plena.

Dodon. Gall. Hyacinthus, *tacinthe*, quibusdam Belg. Blaw Meybloomfens. Clus. Pann. p. 191. Hyacinthus Belgicus siue nō scriptus Dodon. Et hist. post. hyacinthum nō scriptum Dodon. non modō circa Nachliniam & Bruxellas non postremas Belgicæ vrbes in pratis quibusdam & siluulis nascentem conspexi: sed in Gallia parte, Belgicæ vicinæ, vulgō Picardia dicta in siluulis erui dum Luteriam proficisceretur: nūquam tamē abundantiū, quā in pratis herbidiisque locis Londino vicinis, & etiam longiū ab ea vrbe distitis, vbi erueret memini qui cubitali constarent caule, & tricenos haberent flores, modō intensius purpurascētes, modō dilutiū, aliquando etiam omnino nīcos (quales etiam apud Bruxellas nasci solebant) vel mediā ex parte purpureos, alterā candicantes: sed carnei coloris etiam inueniri, non modō ad me perscriptis honestus vir & diligens Pharm. Iacobus Garetus iunior Belga, verū etiam binos eius bulbos postea misit, quorum alter corruptus, alter elegantē carnei coloris florem tulit an. 1591. deinde mirum in modum prolixis auctus est. Iconem à Dodon. & Lobel. propositam, Clusius ponit sub titulo hyacinthi hispanici de quo mox.

Lobel. & Pen. Adu. hyacinthus Angl. Belg. hyacinthus Bruxellensis. Magna huic cum Fuchiano affinitas, sed conspicua florum discrepantia. Semen in folliculo herbaceo attum, Nigella, vel Cæpe. Obs. hyacinthus Anglicus & Belg. Icon. Pl. p. 103. hyacinthus Belgicus candidus. Adu. 48. Teut. 104. Camer. hort. hyacinthus Belgicus. Tab. icon. & hist. hyacinthus Anglicus vocifer Englisher hyacinth. C. Bauhin. Phyt. pag. 47. hyacinthus 8. siue oblongo flore cæruleo, Lob. Angl. & Belg. subinde albicans aut candidus: aliquando Violæ nigrae colore. Item hyacinthus 9. siue oblongo flore albo, Lob. Belgicus candidus, An autem hyac. Belg. candidus differat à candido Anglico dubio, facile mihi persuaserim eandem plantam, variantem tantum colore & effigie. I. Gerard. hist. Angl. lib. 4. cap. 70. hyacinthus Anglicus, Blem Englisher harebels. Item hya-

cinthus Anglicus albus, vocifer (Englisher harebels. figura albi Hyacinthi ex Tabern. omnino displicet.

Hyacinthi Anglici nomine Tossanus Carolus Phatm. misit bulbū qui plātatus in hortō Il. principis Montbelgardi floruit eodem anno. I. Gargillus misit mihi ex Anglia flores siccos cum his inscriptionibus, hyacinthus Anglicus incarnato flore indictus vt reor. 2. hyacinthus Anglicus nīcus. 3. hyacinthus Anglicus cæruleus. In Belgio in aruis & iuxta agrorum margines, fructibus aut arboribus confitos: & præcipue quidem prope Mechliniam vrbe vbi copiosius nascitur, floret Aprili & Maio mense, Dod. Nusquam terrarum graminosi saltus & prata vberiori scarent copia, quā in Anglia: Lobelius.

Locus. & tempus.

HYACINTHVS HISPANICVS.

Hyacintho, inquit Clusius hist. post. non scripto valde abimilis non est hyacinthus hispanicus, folia tamen profert non aded splendentia, nec humi strata, sed potius surrecta, breuiorem caulem, flores dilutiū purpurascētes, & ad cæruleum colorem quodammodō tendentes, quorum odor etiam magis obscurus: semina, radix, ferē conueniunt.

Florēt eodem tempore cum Dodonzi non scripto, nempe sub Aprilis finem & Maio. Hunc in hispanicā meā peregrinatione non obseruaui, sed paucos ante annos Belgicā missum accepi à Generoso Dn. du Longatre, hyacinthi hispanici inodori nomine. Vnde porro ille habuerit, mihi incompertum.

HYACINTHVS STELLARIS CINEREVS.

Hyacinthus Stellaris cinereus acceptus à N. le Quelz, Rhizotomo Luteriano, mihi nōdum floruit: prouenit prope Fonteyn Gallaricæ. Quam plantam intelligat Lobel. Adu. alterā parte perpendendum: ante vnum tradidit hyacinthum stellatum Cineracei coloris apud Clusium in post. hist. quantum autem is differat non demonstrat, quanquam suspicemur, consideratā descriptione Lobelii hyacinthi totius albi siue Campanillæ, hunc hyacinthum pertinere ad hyacinthos Belgicos.

HYACINTHVS TOTVS ALBVS:

Campanilla.

Hyacinthus totus albus Campanilla: Congener fortē aut idem cum superiore (cinereus) qui flores summo caule vno versu aut ordine vti Gladiolus profert. Radix alba. hyacinthi stellaris. Oritur iuxta D. Oue Lusitanicæ: Gallis s. ual: nobis nondum floruit. Lobel. Adu. part. 2.

HYACINTHVS FLORE RUBRO

Hyacinthus quidem est flore rubro elegans, in Lusitania prope Cogni, flores siccatos vidit Lob. Adu. par. 2. operā Nicolai le Quelz Botanici.


HYACIN.

HYACINTHVS OBSOLETIOR

Hispan. Anglico similis.

Descriptio

HYacinthus obsoletior coloris hispanicus serotinus Clusii Pan. & hist. post. quina aut sena habet folia, oblonga, carinata, succi plena, coloris ex cineraceo virescentis, Muscati foliorum amula ferè, angustiora tamen, flexibilia, orbiculato ferè mucrone, candida venâ interiore parte per longitudinem excurrente, ingrati saporis: prodit *caulis* è medio foliorum, pedalis longitudinis, vel etiam amplior, gracilis, firmus tamen, nudus, duodenos, interdum etiam vices-nos, flores per intervalla ferens, deorsum spectantes, hyacintho Anglico non multum abimiles,



senis foliis cōstantes, quorū externa exteriora valdè reflexa sunt, interiora non aded, sed veluti tubulum quēdam imitātia: color in his valdè obsoletus, ut qui ex purpureo, pallido & virescente permixtus videatur, odor nullus: *semen* fert in triangulis capitulis, planū, nigrum, cartilaginōsū, circinnatè ferè rō-

tunditatis: scilla semini parē par: *Radix* globosa & rotunda, multis candicantibus tunicis constat, & numerosis fibris sessili parte prædita est. Sponte nascitur quibuldam Hispaniæ locis, unde primum in Belgicam delatus, nonnullis amicis floruit, à quibus semine communicato, nata mihi sunt plantæ Viennæ, quæ aliquot annis nulum semen tulerunt, anno vero 1582. & sequentibus abundè, quiniūdo semina 1583. nata, atque simul ac maturuissent circa matrem sata, illo ipso anno germinarunt Septembri, & quædam ex illis plantæ biennio post flores dederunt, deinde capitula suū semen continentia. Serò germinat, & folia in Autumnum seruat. Iunio autem cū Liliis floret, flores etiam, semine ex eodem capite excepto naturam stirpium variare solere observabam, ut alii aliis obsoletiores conspicerentur, quidam etiam virentes. Cū in Belgicam amicis primū mitteret hunc bulbū Franciscus Hollebeque, Regis Hispaniæ Simplificista & hortulanus in Arancioez, nomen adscriptum erat Hyacinthi flore coloris cineracei & terrei. Et sine dubio inter hyacinthi genera recensendus est.

Meminit huius Lobel. Adu. par. 2. his verbis: *hyacinthus obsoletior Hispanicus semine compresso. Pæcrani Monspelici, &c.* C. Bauhin. Phyt. hyacinthus 10. siue ex flore purpureo pallido & virescente mixtus. Camer. horti, *hyacinthus hispanicus obsoletior flore:*


HYACINTHVS MINOR HISPANICVS

angustifolius caeruleus & albus.

Descriptio

Accipiebam, inquit Clus. Exoc. par. 2. Append. 2. anno 1601. ab Eruditiss. viro Ioach. Venerio Burdigalā perpusillos hyacinthi bulbos, quorum nonnullos caeruleum florem gestare scribebat, alios candidum, eosque in Hispania legisse, priores quidem apud Pontem de Suert, posteriores in monte Seune de S. Tournais. Duorū autem, qui, de tribus quos conseruavi, florem tulerunt videlicet illius qui caeruleum illum habet, & alterius qui album, icones in vna tabella exprimendas curabam, quæ hic adponeretur.

Is porro qui anno insequente florem proferebat: ex radice bulbosa oliuæ pusillæ magnitudine, fusca membrana tecta, & multis fibris donata, quina aut sena promebat folia, longa, angusta, striata, & supinā parte carinata, viridia, humi plerumq; spatia, infernā parte, quæ telluri proxima, nonnihil purpurascētia, nec valdè abimilia



foliis hyacinthi botryocidis: inter quæ exiliebat gracilis cauliculus dodrantalis longitudinis, obsoletè purpurascens, levis, summo fastigio sustinens senos aut septenos flosculos, concauos, in sex paruas laciniās per oras diuisos instar florum hyacinthi Orientalis, sed longè minores, inodoros, subcaeruleo, & tandem caeruleo colore præditos, sex subflauiculis staminulis ex umbilico prodeuntibus, in quorum medio exiguus stilus: his succedebant trigona capitula, mucronata, semen continentia. Reliquorum verb duorum qui altero post iam descriptum anno floruerunt, vnus florem illi cuius modò historiam dedi prorsus similem habuit: alter verò rotum niueum, formā quidem à superiore non differētem: sed ipsius plantæ folia paullo angustiora mihi videbantur, cauliculus etiam dilutiùs virēre. Florebat vterque Maio mense, semen maturum præbuit Iulio: quod in viroque genere prorsus simile fuit, rotundum videlicet, nigrum & splendens. Cæterum illo ipso anno Nicolaus le Quele Parisiensis rhizotomus, varios bulbos in Hispania & Lusitania (ut ipse assererat) erutos huc venales adferebat, inter quæ istius etiam hyacinthi aliquot, quos vel album florem vel rubrum gestare dicebat: & sanè cum albi, rum rubri flores suis cauliculis adhuc inhaerentes inter pagellas repositos mihi ostendebat, quos formā non differre à modò dictis observabam: eum autem qui dilutè suauiterque rubebat, venas quasdam saturatiores obtinere deprehendebam per trium foliorum externorum longitudinem excurrentes.

Hyacinthi minoris Hispanici

Hyacinthi minoris Hispanici

Cauliculi coloris.

Albo flore.

HYACINTHVS MINOR


Hispanicus obsoleto flore.

Mittebat (inquit Clusius Exor. part. 1. in append. 2. Venerius anno 1602. Hyacinthi cuiusdam bulbos in Cantabris erutos, quorum flores albo cineraceo & ex albicante vitescentes esse scribebat: illorum vnus insequente anno flores dedit, huius obsoleti floribus prorsus forma & colore similes, sed meâ opinione paullo minores (quia forsitan bulbi nimium afflicti fuerant) folia etiam similia & valde longa, quæ ad mensem vsque Nouembrem ferè viridia permanserunt. Decembri autem subsequente quatuor alios ab ipso accipiebam, quorum flores obsolescentes scribebat: si Deus vitam produxerit, & hiems bulbos non corrumpet, obseruare poterimus an eiusdem sint generis. Sed etiam cum superioribus illis quorum vnum florem protulisse dicebam, alios quinos bulbos mittebat, quorum scheda quâ inuoluti, inscriptionem habebat, *Hyacinthus minimus serotinus caruleo fl. sc.* ex his terni folia produxerunt, Hyacinthi minoris hispanici iam descripti foliis non dissimilia, sed florem nullum: Decembri etiam insequente alios ab eo accipiebam simili nomine inscriptos: proxima autem æstas nos certiores faciet (si viuimus) an eiusdem sint generis.

HYACINTHVS INDICVS

Tuberosa radice.

Descriptio



Planta rara, cuius primam cognitionem acceptam fert Clus. hist. post. Bernardo Paludano: cuius caulem ab illo accipiebat bipedalem aut ampliorem, firmum, concuum, enodem, quem tamen per interualla ambiebant octo, aut nonnem folia incondito ordine disposita, & ipsum mediâ ex parte amplectentia,

vt nodorum quandam speciem præberent, circa inum longiora & latiora, supernâ parte breuiora, omnia tamen carnata, dilutiùs virentia, satis dura, & si quis vel in minimas partes confringeret, veluti tenuissima stamina, instar foliorum Eriophori vulgaris diuulsorum, ostendentia: summus caulis delinebat in duodenos aut plures flores (quorum vnus dantaxat apertus, reliqui adhuc clausi) confertum & in spicæ quodammodo formam nascentes, vnciam longos, summâ parte in sex lacinias aliquantulum reflexas diuissos, florum hyacinthi Asiatici instar, sed longè crassiores & magis succulentos, non minùs forsitan, quàm Mali Cirtii flores, sex staminibus è medio prodeuntibus [quorum apices pallidi] & illis breuiore stilo: odoratusque sit, an odoris ex-

pers, Clusium later, quia satis afflictum veçturâ, & mediâ ex parte contractum accipiebatur: qualem autem radicem haberet, non erat adscriptum. Missa porro fuerat Paludano hæc planta cum inscriptione, *Bulbus indicus florem album proferens, floris hyacinthi Orientalis æmulum*: Clusius propter tenuissima illa, instar telæ aranearum stamina, quæ cauli inharrentia folia, vel minutim contracta reddebant, Eriophori genus aliquod arbitrabatur, tamen & caulis foliis ornitis, & florum forma refragarentur, nec radix ipsi conspicienda esset.


De hoc ita Lobel. Adu. par. 2. p. 483. *Hyacinthus indicus tuberosus Clusii*: Peregrinum verò rarum & eximium hyacinthi genus ab Ill. Comite Ardenbergio & C. viro Paludano floribus albis missum, descriptit Clusius foliis longis &c.

HYACINTHVS MAVRITANICVS.

EX eâ Mauritania parte in qua Feza & Marocco vrbes sitæ, initio anni 1599. cum aliis bulbaceis plâris adferebatur hyacinthi genus exoticum, hyacintho oboletiori hispanico serotino valde dissimile, cum foliis, tum floribus: omnia tamen in hoc paullo maiora. Nam huius folia hyacinthinis, aut Ornithogali Arabici legitimi foliis satis respondebant: & inter illa prædibat caulis pedalis longitudinis aut amplior, crassior quàm in hispanico, firmus, impenitè viridis, virens, interdum etiam plures flores sustinens sex foliis constantes, quorum externa tria nonnihil explicantur, interna quodammodo coeunt, & tubi cuiusdam formam expriment, extremitate tamè aliquantulum reflexa, veluti in hispanico iam dicto, coloris autem magis obsoleti & fuscæ: de semine nihil pronuciare possum, quia nullum tulit: radix bulbacea, alba, hispanici radici non dissimilis, paullo tamen maior, & ad Ornithogali Arabici legitimi radicem valde accedens. Flores dabat Maio insequente: plantas verò omnes corrumpere cum multis aliis singularibus, asperissima quæ subsequēbatur hiems. nunc cum aliis bulbis, à Mauritania acceptum, Wilhelmus Parduyn & Io. Somer ciues Medioburgenses in Walachria amicis, teste Clusio & Lobelio Adu. part. 2. communicabant.

HYACINTHVS LATIFOLIUS

Dalechampi.



HYacinthus ex Dalechampi latifolius, qui in monte Aureo Aruernicæ spôte crescit: radice corticosa, Lilio simili: foliis sex aut octo, nigricantibus, crassis, latis, Lili ferè: floribus purpureis elegantibus, particulatim sese expandentibus: semine in capitulis rotundis.

modis herbaceis, Hist. Lugd.

C. Bauhin. Phyt. hyacinthus 18. siue latifolius Dalech. Hunc semel tantum vidimus Patavii in horto Clariss. Medici Bechar. Triuefani flore albo. In figura Dal. radix non videtur correspondere descriptioni eius, utinam aliquis nobis ex Arvenia bulbos mittat.

HYACINTHVS LILIOFOLIVS

stellatus.



E Biscaya Montibus inquit Lobel. Moutono itidem asportatus & ab eo mihi liberalissime communicatus hic admodum rarus & perelegans hyacinthus, quem apposite Liliaceum quis dixerit. Radice enim ac bulbo lilii est, sed minore & oblongiore, flavescente: ut Lilii eruentis,

siue Martagonis. Folia Lilio candido simillima: sena aut septena, inter quæ medius exilis nudus sine foliis spithameus caulis in cuius summo flores hyacinthi stellatis cæruleo-purpurei.

Hyacinthum stellatum Lilii folio cum sequente descriptione Viennam ad Clusium mittebat Tornaco Io. Moutonus. Attulit, inquit, qui Pseudo-Narcissos iuncifolios communicabat, ex iisdem lucis erutum bulbum, Liliaceo satis similem, sed oblongiorem, flavescentis coloris, ut Martagonis quorundam, siue Lilii sylvestris & montani purpurei radix: sena autem vel plura fere folia, Lilii albi [ante quam in caulem abeat] foliis similia, è quorum medio caulis exilis pede breuior, multos flores in summo sustinens, hyacinthi stellati vulgo nuncupati floribus, omnino pares, sex foliis constantes intense cæruleis, siue violaceis, eminente ex umbilico quodam veluti umbone, cuius causa hyacinthum stellatum *Agave* appellari flori succedat trigula capitula, in quibus semen. Mittebat etiam ille anno 1586. eius bulbum ex aliquot pallenscentibus squamis imbricatis dispositis constantem. Sed cum toto bimestri in itinere hæsisset, atque omnino flaccidus ad me pervenisset, terræ commissum subsequens hyems corruptit. Alterum deinde bulbum ab eo accipiebam, & aliquot post annos vnum etiam à Iacobo Plateau: sed omnes mihi corrupti. Eius porro iconem à Moutono etiam acceptam in app. ad suam Stirp. hist. exhibet Lobelius noster. Sed anno 1595. eius bulbum à N. V. Ioan. Boissot accipiebam, qui insequente anno mihi flores dedit. Similes bulbos ad ipsum (Exor. par. 1.) Append. mittebat Burdigala anno à Christi natiuitate 1600. & eam insequente Ioachim Venerius, quos partim in Pyrenæis, partim in monte Galliz Aquitanicæ, cui nomen *nos*, eruisse scribebat, ubi à pastoribus *garabug* appellaretur, qui etiam assereret, ani-

malibus eam plantam depascentibus caput intrinsecere, deinde morte in subsequi: addebat etiam illis vnicum, quem valde rarum inuentu significabat, niueos flores proferere, atque in monte *Puola* in Hispania legisse scribebat. Omnes quidem, præter vnum aut alterum, biennio post germinarunt, sed nullum florem tulerunt: tertio demum anno vnum cæruleum florem dedit: eius vero florem qui niueus esse debet, nondum videre contigit. Humentibus locis eas plantas gaudere scribebat. Eidem Clusio & aliis aliquot bulbi qui flores cæruleos gerunt, plures flores, vel longiorem floribus comam protulerunt, quam præcedente anno: qui tamen pro eo missus, cuius flores essent albi, nulli florem tulit quam illo ipso anno. Hogelandio planta vna, Porreto planta vna, non ulla planta vna, Clusio etiam vnica quam habebat planta: nam quam Venerius anno præcedente ipsi mittebat, hiems corruptit.

Lobel. in append. & lc. Pl. pag. 101. *hyacinthus stellatus Liliifolius floridus siue Liriophyllus*. Tabern. icon. & hist. *hyacinthus Liliaceus siue Liliifolius & Hyac. 7. hyacinth*. C. Bauhin. Phyt. *hyacinthus 5. siue folia & radice Lilii*. Mihi videtur hyacinthus Lobelii magnam habere affinitatem cum nostro hyacintho raro. I. Gerard. *hyacinth stellatus Liliifolius, hinc Jacynth*. *hyacinthus bifulvus Theophrasti*.

HYACINTHVS TRIPOLITANVS.



Folius est longis tenuissimis, Phalangio nostro similibus, caulis satis magnus, in cuius summitate quatuor flores speciosi, colore & magnitudine similes foliis tribus erectis in parua lride cærulea: radices formæ, & colore Tulipis similes: florebat Aprilis Tripoli ubi observavi. Rauvolf.

Camer. in Epit. Matthioli item ad eius hist. G. *hyacinthus Tripolitanus* quem accepi à Domino Rauvolfio. Rauv. itin. *hyacinthi species incolis Tripolitanis Ayur*. C. Bauh. Phyt. apud Match. *hyacinthus 16. siue Tripolitanus*.

HYACINTHVS EX THRACIA.

HYacinthum florem, qualem Diosc. describit in hortis nostris habemus, quæ ex Thracia Venetias tulimus. Folia habet bulbi protinus à radice, caulem dodrantalem, leuiter tenuioremque minimo digito, coloris herbacei, comam procumbentem, incuruam, plenam floribus olentibus iucundissimæ, coloris cærulei aliquantulum ad purpuram inclinatis, primo aspectu grati, deinde evanescentis antequam faciet, semine nigro,

Hyac. ex Thracia

Coriandri magnitudine, radice bulbosâ purpuranteque: floret initio Veris cum viola purpurea. Verum quia possit aliquis cauillari, dicens hunc quem descripsimus florem non esse Hyacinthum, cum Diosc. Hyacinthi florem non colorem cæruleum sed purpureum habere descripserit, qui nec de odore quicquâ meminerit dicimus Diosc. per purpureum violaceum intelligere, quippe cum & violam illam quam Ic. prophyria Græci vocant, cuius colorem violaceum siue lanthinum vocari diximus, unâ cum Plinio coloris purpurei esse descripserit: nam & Plinius Hyacinthi colorem violaceum dilutum vocauit: Fran. Massar. in 9. Plinii cap. 41.

LEUCOIVM BVLBOSVM

Hexaphyllon cum unico flore,
rarius bino.

Descriptio



crassiore, virente, nitat & deorsum spectat, exigui Cymbali modo, maior quam Triphylo ex foliis sapius sex, interdum septem, & octo, cætera candidis, mucrone acutiusculo, extrinsecus macula virente punctato, intrâ leuiter reflexo: in medio apices lutei sex modicâ inter se distantes stitum intinsum candidum ambiunt, odor ei non gratus qui Fuchsius violarum purpurearum pro-

Tota planta, quam Leucoium minus Triphyllon, crassior, bulbis multis, candidis tunicis, externa tamen fusca, constans, & candicantibus fibris, similiter capillatus, sapore viscido, acrimonia vix notabili: Folia porracea, ut Triphylo, sed latiora, splendidiore, tria, quatuor, quinque, viridia, admodum & nitida: Caulis dodrantalis, cum floret angulosus, striatus, canus, nudus, quem simul cum foliis inuestit, etiam ad medium usque vagina alba: Flos plerumque singularis, interdum geminus, raro tertius Clusio, pediculo longo appensus, & vagina peculiari in medio membrana, exalbidâ, ad latera

sus refert, Clusio Oxyanthe vulgò creditur odorem referens. Succedit flori capitulum ut in Narcissis siue membranaceum capitulum. Pyramido, ut ait Clusius, turbinatum, semine ex candido flauescens, oblongiusculum durum.

Duas proponimus icones ex nostris empiriis quarum una plantam demonstrat cum flore re incipit: altera cum semine profert, ut olim à Fuchsi exhibitæ fuerunt.

De Leucoio suo ita scripsit Theophr. lib. 8. c. 7. Leucoium (viola alba, Gaza) inter vernos flores primam se ostendit, ubi cælum clementius statim fuerit, etiam hyeme nondum exacta. Vbi vero immitius, postea.

An de hoc Plutarchus in lib. de amore fraterno:

Inter Echnopodas velut asperam & Ononiam
Nascuntur passim mollia Leuconia.

Mihi quidem videtur potius referendum hoc distichum ad Leucoium bulbosum quam ad Leucoia alia propter locum nariuitatis.

Brant. sub Narcissi titulo non solum Leucoium hoc pingit, verum etiam Bulbosodolum ac nomina utriusque plantæ cum nominibus Narcissi confundit.

Trag. hist. Germ. & Lat. weisshornungs blumen. Mergen blumen. Otho vult Narcissum: Parum refert si nominent Narcissum aut Ligustrum, weisshornungs violen. Quod autem quidam asserunt florere vere & Autumno falsum est. Nobis vera est in Germania aut sylvestre Lilium Diosc. lib. 3. no. eadem nemerocatala Quini, Crinanthemum, Porphyranthes, Bulbus vomitorius, Bulbus agrestis: Leth Leucoium Theophr. quod quidem Anemonem Limoniam interpretantur, constanter credimus.

Gesner. de coll. stirp. Leucoium bulbosum, weisshornung blumen. Item in cap. pl. viola alba Theophrast.

Fuch. hist. Arab. Theophr. diuersum à Diosc. Leucoio, quod plerique docti non animaduertunt, Lat. Viola alba. In edit. Lugd. Fuchsi addita hæc annot. Massario in lib. 9. Plinio deprehensum est. Et icon. Viola alba Theophr.

Viola alba Belgis, weisse Spöckel blumen / soemer Dorrefens & weisse Judoosen. Idem de fl. Leucoium bulbosum, exaphillon, Matthiolo Narcissi species.

Matth. in post. com. Ital. Narcissus 7. qui non describit.

Aduers. Lob. & Penn. Leucanarcissolirion pratense vernum, viola alba Theophr. vel Moly Rondeletio: An Plinio Lilionarcissus. & Icon. Pl. 119. Leucanarcissolirion paucioribus foliis.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 1. siue bulbosum, vulgare.

Clus. pann. & hist. post. Leucoium bulbosum praxos maius, Rhizotomis mulierculis Miesweyl, quasi palustris viola in Germ. weisshornungs blumen, id est, candidus Februarii Ros.

Thal. Hac. Leucoium bulbosum Theophr. seu Narcissus albus. Schlangen blumen.

Hist. Lugd. Theophr. lib. hist. 8. c. 7. inter vernos flores 70. hærere. & lib. 7. hist. c. 11. bulbosis annuerat Leucoium bulbosum, Fuch. violam albam appellat, non ab re. Germ. weisshornungs blumen / Lugd. Campanas blanches.

Prima florum (teste Fuchsi) Tubingæ hieme etiam nondum exacta, Februario nimirum mense & die diuo Valentino sagro, ubi cælum clementius fuerit, apparet in Aprili, ubi appropinquare iam ceperit Maius, euanesceat, inter initia Mar-

iii ad

tii ad perfectionem venit. Semen in Aprili ostendit in capitulis. Prouenit in vmbrosis syluis & locis, qualis est non procul à Tubinga paulò supra & infra monasterium Bebenhausen vocatū, vbi copiosissime nascitur. Plantatur nunc etiam passim in hortis. Dodon. Mense Maio pereunt caules & folia: sola radix perdurat vt Narcissi. Prodit maturè admodum, statimque inter bina folia sbrem ostendit vix liquefactis niuib: Maio mense semen maturefcit & folia marcescunt. In sylua quadam [Pannoniæ] non procul Zolonock Ill. Di. de Barthyan oppido vdis locis solummodò obseruabat Clusius, crescit etiā plerisque Germaniæ locis. Copiosè prouenit in monte Bar Com. Momb. in dumetis, vnde transluli in hortum Ill. E. C. habent etiam alii in hortis: copiosum inueni florens Mensis Martii principio inter Audincourt & Mandeure, olim dictum Epamanduodurum in itinere versus Dampierre, ex transplantatione interdum flores fert cum octonis foliolis, vel cum duobus floribus ex vno caule. Anno 1598. floruit Montbelgardi, fine Decembris in vno caule. Patauī oblectauit florens Februario in hortis nobilium, D. Cortusii & Pasqualigo: Ferrariæ in cœnobio S. Dominici à l'Angeli. Bononiæ in horto S. Saluatoris Alburgo di S. Catharina: Lugduni, Basileæ, Geneuæ, in hortis, cum esset Monspelii, reperi propè turrim de Late plantam cum pericarpis duobus, nō multum dissimilibus à pericarpis Narcissi vnum florem habentis, sed maioribus multò, in quo semina rotunda nigra, magna, huius Leucoii fuisse suspicor, ac in catal. horti Bēbi inuenio, Viola alba Fuchsi Verna late di Gallina.

Viola alba
Fuchsi.
La Gallina.
Vires &
Temperata.

Hoc Leucoium, ut annotauimus in descriptione, bulbum habet sapore viscido, acrimoniā vix notabili: Scribente Fuchsi folia ferè qualitatē omnis expertia, radix autem dulcis & glutinosa est, vt hoc nomine adstringat & exiccet, ut reliqui bulbi, digerētē leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut reliquos bulbos habere ex iis quæ commemorauimus satis constat, tamen nunc nullus, quod etiam, eius stirpis vsus est.

LEUCOIVM BVLBOSVM MINVS Triphyllon.

Delic.

Totum minus Leucoio præcedenti hexaphyllo, ex radice bulbosa parua, multis tunicis albis constans, externa nonnihil nigricante, & sessili patte, multis fibris appensis: donata gustu est lento, amaro, subacri: exurgit coliculus singularis, angulosus, vaginā albā ad mediam vsque longitudinem inclusus, tenuis, concavus, nudus, dodrantalis aut paulò maior, quem ferè ad summum vsque comitantur folia bina, porracea, glauca ferè, nec ita lucida vt Leucoii Exaphylli, vel vt ait Clusius, colore æruginoso & quodammodo cineraceo: extremum caulis tenet stas pediculo longo nutante, vaginulā aliquousque incluso, ynicus, paruus, foliolis tribus, penitus lateis, nonnihil obtusis, aliis interioribus, duplò longioribus, latioribusque constans, intra quæ alia tria, alternante situ, breuiora angustiora, rigidiora, latius casura, in summo, in quo extrinsecus, corculi ex diluto virore, pænè luteolo, effigiatu, intrinsecus discursantibus, per folioli longitudinem, alternatim striis albis, & viridantibus. Totius floris medium obtinent apices lutei, rigidiusculi, sex, stilusque exilis, candidus,

Tom. 11.

interioribus floris foliolis, dimidio breuioribus.



Clusio odor nullus aut perquam exiguus: florem sequitur capitulum vt Narcissi, Olius virentis [inquit Clusius] formam pænè exprimens, in quo semen candidius altero præcedenti: si s nocte se contrahit, cū Sole explicatur, etiam extra terram in hypocaulo, & vt dicit Clusius, radiis Solaribus illu-

stratus, aut sudo celo explicatus.

Theophrast. de Hist. pl. l. 7. cap. 13. Inter bulbosas Leucoium, vel, vt vertit Gaza, Violam albam recenset. C. Bauhin. Phyt. Leucoium bulbosum 7. siue minus. Clusius Pann. & Hist. post. Leucoium bulbosum præcox minus, Rhizotomis mulierculis weyffe veyl & Schneetropfe hoc est, alba Viola, & Niueæ gutta, ab insigni videlicet candore appellatur. Matthioli. Narcissus 2. Et in post. com. Ital. Narcissus sexus, à quo non describitur, sed figura tantum ponitur. Dodon. de flor. describit & depingit, ac vocat Leucoium bulbosum triphyllon. Aduers. Lobel. & Penz hunc tradunt sub Lenconasifolico præcox. Nonnullis Narcissus herbaceus Plinii putatur. Obs. & Ic. Pl. pag. 119. Lenconasifolico minimum. Hist. Lugd. quæ figuram habet ex Matthioli. vocat Leucoium bulbosum primum. Camer. hort. Leucoium bulbosum triphyllum vulgò ad Narcissum referunt.

Prodit maturè admodum cum præcedenti, vix liquefactis niuib: quas nonnunquam etiam penetrat: Non modò in Viennensi & Leytano talibus, sed etiam plerisque Pannoniæ pratis: vmbra tamen (teste Clusio) magis delectari videtur. Florens videtur in fine Februarii passim in montibus Euganeis, vt inter Thetmas Apontenses & Arquæ, &c. Item Patauī in horto Magnifici Laurentii Priuli. Hoc habemus Mōbelgardi in hort. Ill. E. C. vbi plantauimus, floret Aprili ac citius quàm Leucoium Bulbosum hexaphyllon, obseruauimus etiam florens in hortulo nostro Ianuario & Februario sub ipsis niuib: & anno 1597. fine Decembris.


Locus
tempus

LEUCOIVM BVLBOSVM PRÆCOX Byzantinum.

Leucoium [autore Clusio in post. hist.] bulbosum præcox Byzantinum Leucoio minori ferè simile est, ineuntēque Martio bina folia promit illi similia, sed latiora, ærugini etiā coloris, floris gemmam vt in illo completentia: crassiusculus caulis tandem succrescens, vnicum florem vanigulā inclusum sustinet, formā superiori similem, duplò ferè minorem, tribus externis foliis alarum modo expansis, prorsus niuis, interioribus verò brevibus, bifidis, vt in superiori.

V d d

re, simul coeuntibus, & veluti tubulum quempiam efformantibus, foris plerumque circa vngues virefcentibus, reliqua parte albis, oras tamen secundum crenas virides maculae inficiunt, anteriùs verò aut magna ex parte viridia sunt,



aut octo radiis ab imis vngibus secundum longitudinem ductis praedita: prioris fragrantiam vicumque emulatur hic flos, & suavius quidpiam spirare mihi videtur: radix secundo maior.

C. Bauhin. phyt. *Leucoium* 8. siue *bulbosus* minoris altera species. Lob. Adu. part. 2. *Leuco-Narcisso* *Lyrion*, siue *terreum bulbosum* *Leucoium prae-* *cox* Clusii.

Locum

Byzantio Viennam inferri coepit, Narcissi bulbis permixtum post annum 1592. Sed & simile penè mittebat Clus. Doct. Imperator Neapoli sub Autumnum anni 1592. è monte Virginèo curatum.

LEVCOIVM BVLBOSVM

Polyanthemum tardius florens,
floribus minoribus.

Descriptio



Leucoium hoc ut reliquis eiusdem generis serius, ita tota mole maius, radice crassa, longè maiore, bulbosa, quae multis succulentis tunicis ac etiam fibris constat, sapore amaro: caulem tollit vnum aut alterum pedalem, cubitale, & sesquicubitalem, fistulosum, crassum, viridem, qui ne plane rotundus sit impedimento est, vtrinque vel altero tantum latere elata costa acuta: folia Narcissina, virentia, caulem tanquam vagina inferiore parte complectentia, multa, Clusio quinque aut sex, carinata, semineiam aut vnciam lata, inuicem obtuso, quorum alia pari cum caule altitudine assurgunt, alia infra subsistunt: in singulorum caulium cacumine ad geniculum & vagina oblonga prodeunt flores, Leucoii bulbosi hexaphylli sunt.

les, paulò minores, numerosi, quini, seni, aut duodeni, tintinabuli modo penduli, sex aequalibus & niueis foliis constantes, quorum extimam partem virides maculae inficiunt, senis intus staminibus flauis, medioque lacteo stilo, apice viridi insignito, odorati: pediculis aliquando palmaribus, aliquando vix vncialibus, praesertim antequam flos expandatur; hique non simul sese explicantes, sed aliis expansis & ferè marcidis, alii primulum è vagina pullulantes prodire occipiunt. Floribus succedunt magna & trigona angulis obtusis capita, Pyri in modum ferè turbinata (quae facile à limacibus apud nos arroduntur priusquam semen mature scere possit) apud nos Montbelgardi: semen nigrum, Orobaecum, inquit Clusius, Lilia sphodeli flauo flore semini non absimile continentia.

Dodon. de flor. *Leucoium bulbosum Polyanthemum*. Aduers. Lob. & Penae meminerunt sub *Leuconarcisso*. Obs. & icon. pl. pag. 118. *Leuconarciss. sicione praetense*: & p. 65. *Leuconarciss. praetense vernum*, num *viola alba* Theophr. vel *Moly Rondelerio multiflorum*. Hist. Lugd. Dodonaeo *Leucoium bulbosum terreum Polyanthemum*, quibusdam videtur esse *Narcissus* 2. *Marcbioli*. C. Bauh. Phyt. *Leucosum bulbosum* 6. siue *maius*. Sunt qui *Acrocorion* Plinij lib. 19. c. 5. qui nil nisi nomen habet, esse velint. Clus. Pann. *Leucoium minus serotinum bulbosum*. Camer. hor. *Leucoium bulbosum Polyanthemum* vulgò ad *Narcissum* referunt.

Serius superioribus Leucoiis duobus plerumque; *Narcissus* germinare solet, atque Maio demum mense flores proferre. Vno duntaxat interamnibus Pannoniae loco hoc genus obseruabat Clusius, vliginosis pratis supra Warasdinum anno 1579. Meminit & illi simile planè duodeviginti prius annis eruere in pratis Laterae vicinis cum Monspelij viueret. Sed & eius genus quibusdam pratis ad Danubium sitis infra Viennam Austriae nascitur, cuius folia quidem similia, sed pallidiora, non aded mucronata, & veluti bifido mucrone praedita: flores item maculis ex viridi magis palentibus infecti. Altur hoc etiam in Germanicis & Belgicis hortis. *Leucoium bulbosum polyanthemum* habemus in horto Illustriss. E. C. Montb. nobis missum per Nobilem virum D. à Belle fontaine ex Byzantio ubi videramus in eius cultissimo horto: olim etiam visa fuerat haec planta Florentiae in horto Nicolai Ferrariensis. Accepimus quoque in Malinuster ex horto nobilis Viduae ab Ambringue, floret Aprili & Maio post alios duos praecedentes.

LEVCOIVM TRIPHYLLON


flore caruleo Someri.

Lobel. Adu. par. 2. *Violam albam* Theophrasti, à D. Fuchsio & Botanici vocatam, siue *Leucoion flore caruleo amoenissimum* in Albania, iuxta Fritillariam albam, purpuro-phaeo resulatum Constantinopoli rediens eruit praedictus D. I. Somerus, huius studii iucundi apud Mattiacos coryphaeus.

LEV.

LEVCOIVM BVLBOSVM AVTVMNALE
minus tenuifolium.

Descriptio



Cauliculo
altogracili, v-
nicū, interdū
alterū & ter-
tium ferens
florem omni-
d lacteum,
pendulum, sex
foliis constā-
tem, & tintin-
nabuli modo
formatū, ino-
dorum, ingra-
tūque gustus,
in quo pallida
stamina: flore
iam aperto,
denum pro-
deūt quaterna
aut quina, ca-
pillaria viri-
diāque folia:

(Eos attrituētia) radix bulbosa Lob. oblon-
ga, alba, satis crassa, pro plantæ exilitate, è multis
glutinosissimis tunicis compacta & anara, quæ can-
dicante membrana integitur.

Clus. Hisp. & post. Hist. Leucoium bulbosum mi-
nus Autumnale tenuifolium siue quinquum. Lob. ic.
pl. pag. 120. Leucanarcissolicon minimum Autumna-
le: Aliam iconem habet in Aduers. part. 2.
dicens: A foliorum quadam similitudine & exi-
litate Leucoi Autumnalis genus istud ab Egr. vi-
ro D. Theodorico Clurio in Lugdunensi Barano-
rum Academia horti Medici primo instructore
cultum, hyacinthi Autumnalis peregrinum &
elegans genus creditum fuit: cuius delineationē
Petro Clurio fratri suo debemus. C. Bauh. Leu-
coium 9. siue bulbosum Autumnale.

Locus &
tempus.

Extrema Beticā, quā Lusitaniā contermina
est, non procul Badaioz, quam nonnulli Pacem
Augustam esse existimant, ad flumen Anam sita,
nascitur, ubi sub finem Octobris & Nouembris
initio, cum suo flore cruebat Clusius, Vlyssipo-
niē proficiscens, vnde in Belgicā cum paruo
illo ferotino Narcisso amicis mittebat: qui diu
in pensilibus suis hortis utrumque aluerunt, nul-
lum tamen, quod sciat, florem videre potuerunt,
& an hæcenus bulbos conseruauerint ignorat,

LEVCOIO BVLBOSO FORTE AFFINIS
Bulbus flore intus luteo foris
purpureo.

Bulbus ex Hispania Clusio Pann. missus per
Regis hortulanum flore Campanulæ albæ
satis magno, terram spectante, colore
intus luteo foris purpu-
reo. C. B. Phyt. Leu-
coium bulbo-
sum. 3.

LEVCOIO BVLBOSO FORTE AFFINIS
Bulbus quidam.

Bulbus Clusio missus ex Hispania per Hortu-
lanum Regis, quatuor aut quinque flores
gestans, in modum Campanulæ albæ eiformatōs.
C. B. Phyt. 34. Leucoium bulbosum 2.

BVLBOCODIVM VVLGATIVS.



Descriptio

Bulbocodii
radix bul-
bosa, vt Leu-
coii bulbosi
Theophr. vul-
go dicti, ini-
nor, ex multis
tunicis com-
pacta, tactu &
gustu viscida
cū aliqua dul-
cedine acrimo-
niam tandem
aliquam relin-
quens, cui sub-
stant multe ca-
pillares fibræ,
nonnunquam
vnica, alias
plures ubi se
propagat: fi-
lia Leucoio
prædicto simi-

lia, longa, caulem ad summum fastigium comi-
tancia, angustiora, breuiora, colore diuerso, Albi
ferè, non tamen ex viridi lucentia vt illius, stria-
ta, costis duabus auersa parte prædita, terna qua-
terna, quina, tunicā vnā cum caule statim à radi-
ce exorta, aliquouſque inuolucra. Caulis palmaris
& dodrantalis, compressus, striatus, fistulosus,
cui insidet stis singularis, deorsum nutans, duas
vincias longus, sex pallidis & stellatim decussatis
foliis constans, magno, longo, flauoque & fim-
briato calice Campanulæ fere figuræ præulberis,
aureus, splendens, fimbria comata & laciniata, in
cuius medio apices sex lutei circa pistillum con-
colorem inuoluerunt, & lacinia est minimi o-
dore, non, vt aliqui volunt, nullo, qua parte ge-
niculo intermedio cauli flos adnascitur, mem-
branula exalbida florem, antequam explicet, in-
uoluit: pauloque infra floris medium sex folia
pallidula, micantia, mediocriter lata, mucronata,
ex ipso floris codio, recta foras se pandunt. Suc-
cedunt pericarpia rotunda, in quibus semen Ca-
mer. nigrum, in principio latiusculum, temporis
progressu rotundius. Lag. Garg. Binos flores in
eodem caule obseruauit Basilex.

Brunfel. Tom. 1. Rhaps. 20. ponit figuram sub
Narcisso, nec vllam particularem aliam eius
mentionem facit. Tragus Germ. Gälhornügs
blumen. Ortho Bruntel. inter Narcissos recen-
set. Matthiol. Narcissi nomine ponit com-
modam figuram. Lugduni, quod nos recordamur,
vocant Campanes launes. Montbelgardi, Cubere.
Dodon. Gall. Coquelourde, Gall. & Germ. Geel
hornungs blumen/ Lat. quibusdam Narcissus In-
tem & Pseudonarcissus. Item hist. flor. Et in fol.
Narcissus luteus syluestris. Belg. Geel Spoden
blumen. Gesner. de col. stirp. de hort. & in cat.
pl. Codiaminum.

Codiam-
inum

Flora Aduer. Lob. & Pen. *Torus luteus Narcissus montanus* Theoph. Icon. Pl. p. 141. & Obs. *Narcissus torus luteus montanus* Theoph. *Pseudonarcissus* Clus. & Dodon. *luteus* sylu. Adu. p. 51. *Bulbocodium* Theoph. *Cordiaminum*, ut vertit Gaza, nulp. *Campanilla*.

Clus. nulp. *Pseudonarcissus Belgicus*. Idem post. hist. *Pseudo narcissus vulgaris*: Sunt qui putent Theophr. l. 6. c. 7. *Calceæ* hanc esse, cuius meminit Plinius lib. 21. cap. 11. inter flores qui maturè e-rumpunt: ac quod bis florere ait Vere & Autumno: Austriacæ matronæ gelb beedel, id est, flauum caliculum & gelb Mergblumen / hoc est, flauam violam Martiam appellant: Galli nonnulli *Cequebourdes*, alij *Porrian*, à Porraceis videlicet folijs. Reperitur huius genus magis præcox, alioqui non valdè diuersum à iam memorato, cuius flos non pallidus, sed aureus instar maioris hispanici. nunc verdè colorem interdum mutare obseruauit, hoc est calicem illum medium non minùs pallidum habere, quàm sint sex illa externa folia ipsum ambientia.

Calice pal-
lido.

Taber. icon. & hist. *Pseudo Narcissus luteus* Josepho stablein Geel hornungo blumen. Camer. apud Matth. Germ. *Narcissus 4. luteus*, Josepho stab: interdum fert duos & tres flores, ut in horto meo (Norimbergæ). Item in Epitom. Matth. *Narcissus torus luteus*. C. Bauh. *Narcissus 14. siue luteus*, calice prælongo primus. Quibusdam censetur *Calceæ* hanc esse Theoph. ubi Gaza vertit *Cordiaminum* secutus proculdubio Plinium lib. 21. c. 11. Communiter cuiuslibet cauli flos vnicus insidet, aliquando verdè & duo.

Locus &
tempus.


Mulierculæ, ut Trag. scribit, hanc plantam in hortis sui terunt, propterea quod inter Vernos prima floreant. Reperitur non paucis Belgii locis circa margines agrorū & Veruactorum, humido præsertim solo & in tyliis locisque arboribus confitis, & similibus quoque cum in Germania, tum in hispania, transtertur etiam in hortos. Profert teste Dodonæo, sua folia, caules, & flores mense Februario & florer interdum sub niue. Semen maturum mense Martio, ita ut postea non ampliùs videatur. Tanta abundantia in pratis Londino satis vicinis, crescere certum est, ut in celebri illo vico, vulgò Ceapside nuncupato, Martio mense rusticæ mulieres maximà copiâ flores venales proponant, & omnes tabernæ eo flore exornatæ conspiciantur. Crescit & alijs Angliæ, & plerisque Germaniæ locis: memini & olim (inquit Clusius) cum Lounani humanioribus literis operam darem, ad siluulæ illius, Cœnobio vulgò Perck dicto vicinæ, margines legere spontè natum. Nobis verdè Mòrbelgardii abundat *Bulbocodium*, ut in monte Bar, vnde transtuli in hortum Ill. E. C. Obseruauit Geneuæ florens Martio, & in môte Thuiri mœse Iunio: Lugduni Februario: Patavii variis in hortis & alijs Martio. Montbelgardii Februario & Martio: florer interdum sub niue, semen maturat Martio, herba perit Aprili & Maio, manentibus bulbis in terra occultatis vsque ad sequentem annum. Abundat in colle prope *Dampierre* arcem ad Dubium: anno 1597. florebat copiosè Aprili.

Temperam.
& Vires

Calida & sicca est herba *Pseudonarcissi*, temperamento eodem ferè cum *Narcisso*: certa experientia inuentum est (si Dodon. non fallitur) duas drachmas huius radices adhuc recens, in uino aut aqua cocta cum paucis semine Anisi aut Foeniculi & parua portione Gingiberis exhibitas, purgare pituitam lentam & viscidam per inferiora. Itaque hæc radix utilis ad omnes n. orbos ex-

pituita viscida natos. Non dissidet à Diosc. *Narcisso* facie vel viribus. Xytidis modo purgare asserunt Aduerf. radices decoctum, ac rusticam plebem vomitiones cum eo moliri certum est.


BVLBOCODIVM HISPANICVM



Est (teste Descriptione Lob. Obs.) *Narcisso* montano Theophrasti facie non dissimili, sed latioribus folijs, maioribusque, omnino luteis. Alit eum Ioh. Baileet Insulanus & Muronus. Plant. icon. p. 121. *Narcissus torus luteus montanus* Theophr. Hist. Pseudonarcissi genus inuenitur à Clusio nonnullis veteris Castella præ-

tis, & locis montanis humidis Anglico quidè simile, sed folijs longè maioribus, magisque virentibus longiore caule, paulò minore flore, coquo prorsus flauo, & quasi aureo, videlicet tam externis folijs quàm calice: radix huius crassior est quàm in superioribus. Dodon. lat. in fol. *Narcissi* sylu. alia icon, qui non facit duas species. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 15. siue luteus calyce prælongo alter*. An Camer. in epit. Matth. Inuenitur *Narcissus 3. in montibus* prorsus *luteus* ferè *florens*.

BVLBOCODIVM FLORE PLENO.




Narcissi & multiplici foetura varietas, Belgicis amicorum hortis visu digna, ceteroquin omnia prorsus eadè. Tarnari primum [ut Lob. obs. testatur] repertus in hosto cuiusdam pauperis. *Narcissus lutea multiplex flore*, Eidem.

Hic calice pleno, inquit Adu. part. 2. variat, sim-

briatis oris, rugosis & complicatis folijs compacto; etiamque tanto copia cornu exuberante & dehiscendo, ut florem totum adimpleat, multiplicati *Narcissi* lutei, speciemque referat: intermixtis

mixtus tamen pallidioribus nonnullis foliis, & quandoque ex luteo herbaceis inferioribus senis floribus, radiatis aut stellatis foliis concoloribus, remanentibusque pariter aliis sui generis quandoque, in singularibus spithameis cauliculis simplicibus floribus. Cetera cuncta vulgari luteo Narcisso haud absimilia.




Clus. Hisp. *Pseudo-narcissus multiplex*, qui apud Belgas in hortis alitur, Belgico per omnia simile cum foliis, cum bulbo, sed flos calice caret, & eius loco innumera habet folia externis sex similia, colore pallido. Item hist. post. *Pseudo-narcissus pleno flore*. An Camer. hort. Narcissus ex

luteo pallidus flore pleno, nullo intus calyce? Dodon. in fol. *Narcissus filix multiplex*, qui medio calice caret. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 22. luteo flore* *Inteo multiplex calyce carens*. Taber. icon. & hist. *Pseudo-narcissus luteus Polyanthus*, Gesf. Joseph. stäblein.

In Virgilio quodam rustico praefectura Wilhelbre Sarum Episcopatus iuxta tuguriolum Veturae pauperula D. Ioan. Gerard. forte fortuna hoc elegans Narcissi genus offendit. Martio cogenere pleni floris Narcisso luteos flores laxarucundos.

BVLBOCODII PLENO FLORE SPECIOSUM genus Venerui.



ANNO 1604 scribebar ad me Venerius, inquit Clusius Exot. appéd. 2. se obseruat se Pseudonarcissi genus quoddam sibi ante non conspectum, cuius paucos reperisset bulbos: illum autem viuis coloribus depingi curabat, quia verò similis formae à nemine hactenus obseruatu

esse arbitror, in tabella eius iconem exprimendam curabam.

Quantum porro ex pictura quam ad me miscebat obseruare poteram, crescebat hac planta


Tom. II.

Pseudonarcissi vulgaris modo, quatuor oblonga viridia folia ex bulbosa radice producens, inter quae prodibat caulis laevis, enodis, viridis, pedem altus, summo fastigio membranaceum folliculū sustinens, & quo emergebat flos foliis pallidis, geminā serie dispositis praeditus, prominente ex eius umbilico calice siue tubo oblongo, cras habente nonnihil reflexas, easque crispas & incisas, autem prorsus coloris, veluti Pseudonarcissi maioris Hispanici tubus, attramen non simplici, vel ille, sed triplici, hoc est continente alterum tubum qui tertium comprehendebat: radix erat bulbosa, ex multis tunicis constans, quarum externa subfusca, multis fibris extimā sede praedita. Si vnicam dumtaxat plantam reperisset, nihil nouum uideretur, quia natura interdum sic in floribus ludere solet: sed quum aliquot similes obseruauerit, peculiare quoddam genus esse credendum est. Scribebat etiam vnam Pseudonarcissi vulgaris plantam binos flores in eodem caule gerentem obseruasse, quae aliqui vnicum solummodo proferre soleat.

BVLBOCODII SIVE NARCISSI FLORIS lutei multiplicis varietas.

Londini dilutiore maioreque flore uariat, & in foliorum floris extremitatibus angustiore, in horto D. I. de Francque ville. Radix Allii modo nucleis propagatur. Foliis est quam superiorum paulo latioribus & tantillum recuruatis. Adh. part. 2. Lob.

NARCISSVS CYPRIVS LUTEVS polyanthes flore pleno.



Deberit hoc admodum elegans Narcissi exoticum genus egregio viro Londinensi, D. Lette negotiatori Constantino-politano qui eius bulbos cum pluribus aliis à Cypro Insula delatos, amicis suis communiuauit, & hoc mense Decēb. 1604. folia pedalia, imā sede vnicam lata, superne angustiora, & flores vno caule foliis altiore plures, luteos, multiplicisque laxauit in horto praefati D. de Francque ville, & bulbo Narcissi crassiore, coloris Castaneae involueto re-

cto.

Hanc Narcissum esse, ex natura quorundam exoticorum bulborum, valde suspicor, quibus à natura insitum est, ut non nisi anno primo à quo in Septentrionales regiones algidiores de-

uecti sunt, soli & caeli natiui succo adhuc praegnant, flores laxent. Huius enim Cypri Narcissi folia Autumno germinare inceperunt D.

Ddd 3


Leette, D. Coys & aliis quorum sæpe mentionem fecimus, [inquit Lobel. Adu. 2.] sed nusquam floruit bruma aut Vere elapso, in prædicto horto de Franqueville mediâ admodum mansueta hyeme, ubi flores illic leuissimâ sæua superueniente aura marcescunt. Huius familiæ est Narcissus Polyanchos Byzantinus, & Liliû Alexandrinum Italarum, nec non aliæ Plantæ.

C. Bauh. *Narcissus* 16. siue luteus oris. Pseudo-narcissi genus admodum exile Clus. *Narcissus* 21. siue montanus coronatus.

BVLBOCODIVM MINVS.


Descriptio

Pseudo-narcissus minor Clus.



hispanico & forma & flauo colore persimilem, insidentem digitali, tenui, viridi cauliculo inter folia emergenti: flori succedit trigonum, obtrusum tamen angulis, & fere rotundum caputellum, in quo semen inaequale nigrum, satis magnam proportionem: radix bulbosa, exigua, foris nigricans. Nullus mihi hic fuit primus à Io. Mourono, Narcissi minimi montani latifolii nomine; deinde à Generoso Dn. de Longatre pro Pseudonarcisso minimo Hispanico flauo. Clus. hist. post.


BVLBOCODIVM MINIMUM coronatum.



Plant. icon. p. 122. *Narcissus minimus coronatus*. T. 122. Lobel. hist. Belg. Klein gez. cronde Berg Narcisse. Lat. *Narcissus minimus coronatus*. Mouron. nobis misit.

An Clusius Pann. *Pseudo-narcissi* genus admodum exile ex. Hispania nunc per Regis Hispania hortulanum. An

BVLBOCODIVM TENVIFOLIUM. flore luteo.



N. Asatur, inquit Clusius, quibusdam Lusitaniz, Bazarique collibus Pseudo-narcissi genus cui folia non lata ve superioribus, sed valde angusta, siue porius iuncæ, caulis tenuis, nudus, palmum altus, cuius extremitati insidet flos è vaginula emergens, qui sex foliis herbido pallefecibus & expansis constat, quorum medium calix flauus, calathi instar oblongus, oris prædictus non sinuosis & fimbriatis, vt superiorum, sed equalibus: radix exiguo Narcisso similis, intus candida, foris nigricans. hisp. & hist. post. *Narcissus iuncis foliis primus*. Sed Clusius iconem non habet pro tenuifolio primo, ideo nos ex Lobelio ponimus qui fortè idem cum eo de quo Lobel. in append. *Narcissus montanus iuncifolius minimus flore luteo*, palmaris longitudinis, tenuibus foliolis iuncis, multo exilioribus, interdum erectis, interdum ad terram reflexis: inter quæ cauliculus palmaris exeritur, in cuius summo extenui, instar cæterorum Narcissorum, consubili membrana, flos singularis, vulgato Narcisso montano similis, & penè par, aspectu suauissimo & hilariore: cui siquæ Narcissi succedit. Radicis bulbus quaptus nucis ponicæ nucleus. Huius peregrini floris primus me monuit C. V. Aluarus Nonnius Medicus Antuerptanus eruditissimus. Postea eius bulbo me donauit M. D. Maria de Brimeur, à cuius vrceis florentem plantam delineari curauimus. Paucis post diebus eiusdem icthem Tornaco ad me misit noster Mutorius, sed erectis foliis ab hac duntaxat variam.

Narcissus iuncifolius minimus alter flore luteo Lob. *Narcissus* 17. siue montanus luteus minimus: C. Bauh. phyt. Florebat Ianuario, cum Vlyssipone hispalim Clusius proficisceretur, ubi incolæ Campanilla, hoc est, Cagipanulam vocabant.

Narcissus iuncifolius minimus alter flore luteo Lob. *Narcissus* 17. siue montanus luteus minimus: C. Bauh. phyt.

Florebat Ianuario, cum Vlyssipone hispalim Clusius proficisceretur, ubi incolæ Campanilla, hoc est, Cagipanulam vocabant.

BVLBOCODIVM TENVIFOLIUM aliud flore luteo fimbriato.

[In figulina [vt scribit Lobel. in append.] adseruatur & colitur è Biscay montibus in Belgium delatus bulbus à quodam à Galicia redeunte: *Narcissus montanus iuncifolius minimus alter* flore luteo fimbriato reddendus pag. Obl. 63. Rugosus



gosis plicis, hmbriatisq; floribus habuit Mutonus, alioqui non differt à superiore. Narcissus montanus iuncifolius minimus, alter flore luteo hmbriato Mutoni, Lob. in append. T. 155. C. Bauhin. Phyt. Narcissus 18. siue montanus luteus hmbriato flore.

Clus. hist. post. cap. 17. i.

iconem habet qualem Lobel. sub hoc titulo *Pseudonarcissus iuncifolia*. 2. flauo flore: ac addit. Alter *Pseudonarcissus iuncifolius* tenuiora paulatim, licet surrecta, habuit folia, florem flauum, hoc est, calicem per oras leuiter & tenuiter hmbriatum, & sex illa foliola calycem ambientia, ex herbido pallescentia, in capitulo flori lucente nigrum rotundiusculum semen etiam tibi: radix pusilla, foris nigricans, bulbacea, tenuibus fibris à sede prodeuntibus firmata.

NARCISSVS FOLIS FLORIS ALBIS oblongo calice luteo.

Mittebat (inquit Clus. Exor. par. 2. in append. altera) ad me anno 1601. Erud. vir Ioach. Venerius Burdigala inter pleraque plantas quatuor Narcissi bulbos, quos duorum generum esse, & vnicū florem gestare scribebat, e singulis videlicet generibus binos. Illorum vnus insequente Aprili florem tulit. Quum verò similem autē videre nō meminerim, illius iconem in tabella exprimendam curabam quam Lectoris oculis proponere, atque eius historiam adieciham. Habebat porro 18 Narcissus terna, oblonga, & facis angusta, caxinataque folia, ex sui quodammodo ex viridi coloris: inter quæ prodibat caulis pedalis longitudinis, aut amplior, lauis, enodis, satis gracilis, firmus tamen, summo fastigio folliculum membranaceū sustinens, è quo emergebat vnicus flos longiusculus, summā parte in sena folia alba & in mucronem desinentia diuisus: cuius umbilicum occupabat calix flauus, semunciam longus, oris aliquantulum incisus & quodammodo hmbriatis, habens in medio stilum pallescentem, è iisdem cum calice longitudinis, cinctum sex staminibus flauis veluti farinā conspersis, eorum præsertim apicibus. Semen obseruare nequii, quia florem carpebam, ut à pictore commodius exprimi posset: valde autem suavis erat odoris. & Muscari floris odorem pene referentis: radix bulbacea oblongiuscula, digitalis crassitudinis, alba, è multis tunicis constabat, quarum exterior subtilissima, aliquot crassioribus fibris albis infimā sede donata. Alter ab eodem Venerio missus florem habat etiam Aprili altero post superiore anno, illi p̄brius similem: calicis tamen eius oras magis erant coccæ. Vnum etiam non valde dissimilem videbam apud Honest. virum Christianū Porretum, qui à Venerio acceperat: illius tamen


senā folia ex albo pallescebant, aut exarant, calix verò multo latior, & oras plane coccæas habens. Iac. etiam Plateau similem habuisse eodem anno florentem intelligebam: illum autem à rhizotomis quibusdam Gallis redemerat cum aliis bulbis è Pyrenæis montibus erutis.

Narcissum album montanum, calyce magno luteo Botanico Luteriano N. Quæle debet Lobel. Adu. par. 2. qui eius bulbos, vncias duas longos: & vnam, plus minus, crassitudine æquantes, in Pyrenæorum montium Souton iuxta Hanniers de Lepsen monte vocato eruit, nec dum illi floruerat.

Narcissus
albus 1601
Lob.

PSEVDONARCISSVS ALBO flore Clusi.

Inter Narcissos reponendam esse inquit Clus. Exor. par. 2. App. 2. eam plantam quæ Pseudonarcissi appellationem vulgò obtinuit, nullum esse opinor mediocriter in re herbaria versatum qui dubitet: Multæ autem sunt eius differentiæ &c. verum enim verò nouum quoddam genus repertum est quod valde rarum censeo, cuiusque binos bulbos anno 1604. ab Eruditiss. Venerio accipiebam: Horum alter florem mihi protulit insequente Aprili quemadmodum etiam aliis. Sed & eodem anno mense Decembri Rhizotomis quidam Gallus similes plantas adferrebat: valde elegans hæc planta, terna à radice bulbosa oblongiore, nigroque cortice siue membrana tecta (à cuius sede frequentes tenuesque oriebantur candidæ fibræ) proferebat folia, dodrantem vel paullo amplius longa, Narcissi angustioribus foliis valde similia, supinā parte caxinata, inter quæ nudus prodibat caulis satis exilis, non crassus, dodrantem altus, summo fastigio membranaceum folliculum gerens, è quo propendebat flos totus albus, Pseudonarcisso vulgatiore, quem Germani Gelbe hornüßge blumen. Belg. verò Gelele Tinsloesen appellant, formā quidem similis, paullo tamen minor, semunciam longus, sex foliis tubum amplectentibus



similiter constans: tubo autem paullo angustiore, & oras nonnihil hmbriatas habente, in quo sex alba stamina flauescente apice prædita, & medius stilus longior: nullum verò peculiarem odorem in eo flore obseruabam, qui aperiebatur Aprili, deinde Iunio semē proferebat in triangulari capite siue thecā, or-

biculare, nigrum & splendens, quale Narcissi iuncifolij albo flore reflexo, sed maius.



Dodon. sic describit: hyacintho nō scripto folia sunt oblonga, angusta, lauia & splendentia: Porri foliis angustiora & minorā: caulis foliis viduus, glaber, teres, cuius coma florum pondere & mole, cū primū dehiscere incipiunt, grauata, deorsum recuruat: flores oblongi, teretes, concaui, in latus se pādunt, per oras reflexi, colore vt plurimū cærulei, subinde albicantes: aut candidi si ueniunt, aliquando etiam Violæ nigrae dilutam purpuram referentes: semen in siliquis triangularibus paruum, rotundum. Radix bulbosa, candida, perennis, lento succo, vti & tota herba, plena.

Dodon. Gall. Hyacinthus, *lacinthe*, quibusdam Belg. *Blam Meybloomsen*. Clus. Pann. p. 191. *Hyacinthus Belgicus* siue *non scriptus* Dodon. Et hist. post. *hyacinthum non scriptum* Dodon. non modo circa Machliniam & Bruxellas non postremas Belgicarum vrbes in pratis quibusdam & siluulis nascentem conspexi: sed in Galliarum parte, Belgicarum vicinarum, vulgo Picardia dicta in siluulis erui dum Luteriam proficiscer: nusquam tamē abundantius, quā in pratis herbidiisque locis Londino vicinis, & etiam longius ab ea vrbe difficis, vbi eruerē memini qui cubitali constarent caule, & tricenos haberent flores, modō intensius purpurascētes, modō dilutius, aliquando etiam omnino niveos (quales etiam apud Bruxellas nasci solebant) vel mediā ex parte purpureos, alterā candicantes: sed carnei coloris etiam inueniri, non modō ad me perscripsit, honestus vir & diligens Pharm. Iacobus Garerus iunior Belga, verū etiam binos eius bulbos postea misit, quorum alter corruptus, alter elegantē carnei coloris florem tulit an. 1591. deinde mirum in modum prolixis auctus est. Iconem à Dodon. & Lobel. propositam, Clusius ponit sub titulo hyacinthi hispanici de quo mox.

Lobel. & Pen. Adu. *hyacinthus Angl. Belg. hyacinthus Bruxellensis*. Magna huic cū Fuchiano affinitas, sed conspicua florum discrepantia. Semen in folliculo herbaceo attum, Nigellæ, vel Cæpæ. Obs. *hyacinthus Anglicus & Belg.* Icon. Pl. p. 103. *hyacinthus Belgicus candidus*. Adu. 48. Teut. 104. Camer. hort. *hyacinthus Belgicus*. Tab. icon. & hist. *hyacinthus Anglicus weisser Englischer hyacinth*. C. Bauhin. Phyt. pag. 47. *hyacinthus* 8. siue oblongo flore cæruleo, Lob. Angl. & Belg. subinde albicans aut candidus: aliquando Violæ nigrae colore. Item *hyacinthus* 9. siue oblongo flore albo, Lob. Belgicus candidus, An autem *hyac. Belg. candidus* differat à candido Anglico dubio, facile mihi persuaserim eandem plantam, variantem tantū colore & effigie.

1. Gerard. hist. Angl. lib. 4. cap. 70. *hyacinthus Anglicus*, *Blomp Englissh harebels*. Item *hyacinthus Anglicus albus*, *mithe* (*Englissh harebels*). Figura albi Hyacinthi ex Tabern. omnino displicet.

Hyacinthi Anglici nomine Tossanus Carolus Pharm. misit bulbu qui plātatus in horto II. principis Montebelgardii floruit eodem anno. I. Gargillus misit mihi ex Anglia flores siccos cum his inscriptionibus, hyacinthus Anglicus incarnato flore indictus vt reor. 2. hyacinthus Anglicus niveus. 3. hyacinthus Anglicus cæruleus. In Belgio in aruis & iuxta agrorum margines, fructibus aut arboribus confitos: & præcipue quidem prope Mechliniam vrbe vbi copiosus nascitur, floret Aprili & Maio mense, Dod. Nusquam terratum graminosi saltus & prata vberiori scatur copia, quā in Anglia: Lobelius.

Hyacinthi Anglici nomine Tossanus Carolus Pharm. misit bulbu qui plātatus in horto II. principis Montebelgardii floruit eodem anno. I. Gargillus misit mihi ex Anglia flores siccos cum his inscriptionibus, hyacinthus Anglicus incarnato flore indictus vt reor. 2. hyacinthus Anglicus niveus. 3. hyacinthus Anglicus cæruleus. In Belgio in aruis & iuxta agrorum margines, fructibus aut arboribus confitos: & præcipue quidem prope Mechliniam vrbe vbi copiosus nascitur, floret Aprili & Maio mense, Dod. Nusquam terratum graminosi saltus & prata vberiori scatur copia, quā in Anglia: Lobelius.

Locus. & tempus.

HYACINTHVS HISPANICVS.

Hyacintho, inquit Clusius hist. post. non scripto valde ablimilis non est hyacinthus hispanicus, folia tamen profert non adeo splendentia, nec humi strata, sed potius surrecta, breuiorem caulem, flores dilutius purpurascētes, & ad cæruleum colorem quodammodo tendentes, quorum odor etiam magis obscurus: semen, radix, fere conueniunt.

Floret eodem tempore cum Dodonzi non scripto, nempe sub Aprilis finem & Maio. Hunc in hispanicā meā peregrinatione non obseruaui, sed paucos ante annos e Belgica missum accepi à Generoso Dn. du Longatre, hyacinthi hispanici inodori nomine. Vnde porro ille habuerit, mihi incompertum.

HYACINTHVS STELLARIS CINEREVS.

Hyacinthus Stellaris cinereus acceptus à N. le Quet, Rhizotomo Luteriano, mihi nō dum floruit: prouenit prope Fonteyn Gallæciar. Quam plantam intelligat Lobel. Adu. altera parte perpendendum: ante vnum tradidit hyacinthum stellatum Cineracei coloris apud Clusium in post. hist. quantum autem is ditterat non demonstrat, quanquam suspicemur, consideratā descriptione Lobelii hyacinthi totius albi siue Campanillæ, hunc hyacinthum pertinere ad hyacinthos Belgicos.

HYACINTHVS TOTVS ALBVS:

Campanilla.

Hyacinthus totus albus Campanilla: Congener fortē aut idem cum superiore (cinereo) qui flores summo caule vno versu aut ordine vti Gladiolus profert. Radix alba, hyacinthi stellaris. Oritur iuxta D. Que Lusitanæ: Gallis *S. Vual*: nobis nondum floruit. Lob. Adu. part. 2.

HYACINTHVS FLORE RUBRO

Hyacinthus quidem est flore rubro elegans, in Lusitania prope Cogni, flores siccatos vidit Lob. Adu. par. 2. operā Nicolai le Quet Botanici.

HYACIN.


HYACINTHVS OBSOLETIOR

Hispan. Anglico similis.

Descriptio

HYacintbus obsoletior coloris hispanicus serotinus Clusii Pân. & hist. post. quina aut sena habet folia, oblonga, carinata, succi plena, coloris ex cineraceo virescentis, Muscari foliorum æmula ferè, angustiora tamen, flexibilia, orbiculato fermè mucrone, candida venâ interiore parte per longitudinem excurrente, ingrati saporis: prodit caulis à medio foliorum, pedalis longitudinis, vel etiam amplior, gracilis, firmus tamen, nudus, duodenos, interdum etiam vices, flores per intervalla ferens, deorsum spectantes, hyacintho Anglico non multum ablimiles,

senis foliis cōstantes, quorū externa exteriora valdè reflexa sunt, interiora non aded, sed veluti tubulum quēdam imitātia: color in his valdè obsoletus, ut qui ex purpureo, pallido & virescente permixtus videatur, odor nullus: semen fert in triangulis capitulis, planū, nigrum, cartilaginofū, circinnatè ferè ro-



tunditatis, scillæ semini parè par: Radix globosa & rotunda, multis candicantibus tunicis constat, & numerosis fibris sessili parte prædita est. Spongiæ nascitur quibuidam Hispaniæ locis, unde primum in Belgicam delatus, nonnullis amicis floruit, à quibus semine communicato, natæ mihi sunt plantæ Viennæ, quæ aliquot annis nullum semen tulerunt, anno verò 1581. & sequentibus abundè, quinimo semina 1583. nata, atque simul ac maturuissent circa matrem facta, illo ipso anno germinarunt Septembri. & quædam ex illis plantæ biennio post flores dederunt, deinde capitula suum semen continentia. Serò germinat, & folia in Autumnum seruat. Iunio autem cū Liliis florēt, flores etiam, semine ex eodem capite excepto naturam stirpium variare solere obseruabam, ut alii aliis obsoletiores conspicerentur, quidam etiam virentes. Cū in Belgicam amicis primum mitteret hunc bulbū Franciscus Hollæbeque, Regis Hispaniæ Simplicita & hortulanus in Arancioz, nomen adscriptum erat Hyacinthi flore coloris cineracei & terrei. Et sine dubio inter hyacinthi genera recensendus est.


Meminit huius Lobel. Adu. par. 2. his verbis: *Hyacinthus obsoletior Hispanicus semine compresso Pærarii Monspelici, &c.* C. Bauhin. Phyt. *Hyacinthus* 10. siue ex flore purpureo pallido & virescente mixtus. Camer. horti, *Hyacinthus hispanicus obsoletior flore.*

HYACINTHVS MINOR HISPANICVS

angustifolius cæruleus & albus.

Accipiebam, inquit Clus. Exot. part. 2. Append. 2. anno 1604. ab Eruditiss. viro Ioach. Venerio Burdigalâ perpusillos hyacinthi bulbos, quorum nonnullos cæruleum florem gestare scribebat, alios candidum, eosque in Hispania legisse, priores quidem apud Pontem de Suert, posteriores in monte Seue de S. Tournais. Duodū autem, qui, de tribus quos conseruavi, florem tulerunt videlicet illius qui cæruleum illum habet, & alterius qui album, icones in vna tabella exprimendas curabam, quæ hic adponeretur.

Is porro qui anno insequente florem proferebat: ex ra-



dicè bulbosa oliuæ pusillæ magnitudine, fuscæ membranæ tecta, & multis fibris donata, quina aut sena promebat folia, longa, angusta, striata, & supinâ parte carinata, viridia, humi plerumq; sparsa, infernâ parte, quæ telluri proxima, nonnihil purpurascētia, nec valdè ablimilia

foliis hyacinthi botryocidis: inter quæ exilibat gracilis cauliculus dodrantalis longitudinis, obsoletè purpurascens, leuis, summo fastigio sustinens senos aut septenos flosculos, concavos, in sex paruas lacinnas per oras diuulos instar florum hyacinthi Orientalis, sed longè minores, inodoros, subcæruleo, & tandem cæruleo colore præditos, sex subflauo coloris staminulis ex umbilico prodeuntibus, in quorum medio exiguus stilus: his succedebant trigona capitula, mucronata, semen continentia. Reliquorum verò duorum qui altero post iam descriptum anno floruerunt, vnus florem illi cuius modò historiam dedi prorsus similem habuit: alter verò rotum niueum, forinâ quidem à superiore non differentem: sed ipsius plantæ folia paullo angustiora mihi videbantur, cauliculus etiam dilutius virere. Florebat vterque Maio mense, semen maturum præbuit Iulio: quod in vtroque genere prorsus simile fuit, rotundum videlicet, nigrum & splendens. Cæterum illo ipso anno Nicolaus le Quele Parisiensis rhizotomus, varios bulbos in Hispania & Lusitania (ut ipse asserēbat) erutos huc venales adferēbat, inter quæ istius etiam hyacinthi aliquot, quos vel album florem vel rubrum stare aiebat: & sanè cum albi, tum rubri flores suis cauliculis adhuc inhaerentes inter pagellas repositos mihi ostendebat, quos formâ non differre à modò dictis obseruabam: eum autem qui dilutè suauiterque rubebat, venas quasdam saturatiores obtinere deprehendebam per trium foliorum externorum longitudinem excurrentes.

Descriptio

Hyacinthi minoris Hispanici

Hyacinthi minoris Hispanici

Cæruleo colore.

Albo flore.

HYACINTHVS MINOR

Hispanicus obsoleto flore.

Mittebat (inquit Clusius Exot. part. 2. in append. 2. Venerius anno 1602. Hyacinthi cuiusdam bulbos in Cantabris erutos, quorum flores albo cineraceo & ex albicante virentes esse scribebat: illorum vnus insequente anno flores dedit, huius obsoleti floribus prorsus forma & colore similes, sed meâ opinione paullo minores (quia forsitan bulbi nimium afflicti fuerant) folia etiam similia & valde longa, quæ ad mensem vsque Nouembrem ferè viridia permanserunt. Decembri autem subsequente quatuor alios ab ipso accipiebam, quorum flores obsoleto scribebat: si Deus vitam produxerit, & hiems bulbos non corrumpet, obseruare poterimus an eiusdem sint generis. Sed etiam cum superioribus illis quorum vnum florem protulisse dicebam, alios quinos bulbos mittebat, quorum scheda quâ inuoluti, inscriptionem habebat, *Hyacinthus minimus ferè semis caruleo fl. ce*: ex his terni folia produxerunt, Hyacinthi minoris Hispanici iam descripti foliis non dissimilia, sed florem nullum: Decembri etiam insequente alios ab eo accipiebam simili nomine inscriptos: proxima autem æstas nos certiores faciet (si viuemus) an eiusdem sint generis.

HYACINTHVS INDICVS

Tuberosa radice.

Descriptio



Planta rara, cuius primam cognitionem acceptam fert Clus. hist. post. Bernardo Paludano: cuius caulem ab illo accipiebat bipedalem aut ampliorem, sumum, concuum, enodem, quem tamen per interualla ambiebant octo, aut nonem folia incondito ordine disposita, & ipsum mediâ ex parte amplectentia,

vt nodorum quandam speciem præberent, circa inum longiora & latiora, supernâ parte breuiora, omnia tamen carinata, dilutiùs virentia, satis dura, & si quis vel in minimas partes confringeret, veluti tenuissima stamina, instat foliorum Eriophori vulgaris diuulforum, ostenduntia: summus caulis delinebat in duodeuos aut plures flores (quorum vnus dantaxat apertus, reliqui adhuc clausi) confertim & in spicæ quodammodo formam nascentes, vnciam longos, summâ parte in sex lacinias aliquantulum reflexas diuisos, florum hyacinthi Asiatici instar, sed longè crassiores & magis succulentos, non minùs forsân, quàm Mali Citrii flores, sex staminibus è medio prodeuntibus [quorum apices pallidi] & illis breuiore stilo: odoratusque sit, an odoris ex-

pers, Clusium later, quia satis afflictum vestrâ, & mediâ ex parte contractum accipiebat: qualem autem radicem haberet, non erat adscriptum. Missa potro fuerat Paludano hæc planta cum inscriptione, *Bulbus Indicus florem album proferens, floris hyacinthi Orientalis æmulum*: Clusius propter tenuissima illa, instar telæ aranearum stamina, quæ cauli inhzrentia folia, vel minutim contracta reddebant, Eriophori genus aliquod arbitrabatur, tametsi & caulis foliis ornatus, & florum forma refragarentur, nec radix ipsi conspecta esset.

De hoc ita Lobel. Adu. par. 2. p. 488. *Hyacinthus Indicus tuberosus Clusii*: Peregrinum verò rarum & eximium hyacinthi genus ab Ill. Comite Ardenbergio & C. viro Paludano floribus albis missum, descripsit Clusius foliis longis &c.

HYACINTHVS MAVRITANICVS.

EX eâ Mauritania parte in qua Feza & Marocco vrbes sũt, initio anni 1599. cum aliis bulbaceis plâis adferebatur hyacinthi genus exoticum, hyacintho obsoleto Hispanico ferotino valde dissimile, cum foliis, cum floribus: omnia tamen in hoc paullo maiora. Nam huius folia hyacinthinis, aut Ornithogali Arabici legitimi foliis satis respondebant: & inter illa prodibat caulis pedalis longitudinis aut amplior, crassior quàm in Hispanico, firmus, impense viridis, virens, interdum etiam plures flores sustinens se & foliis constantes, quorum externa tria nonnihil explicantur, interna quodammodo coeunt, & tubi cuiusdam formam expriment, extremitate tamè aliquantulum reflexa, veluti in Hispanico iam dicto, coloris autem magis obsoleti & fusci: de semine nihil pronuciare possum, quia nullum tulit: radix bulbacea, alba, Hispanici radici non dissimilis, paullo tamen maior, & ad Ornithogali Arabici legitimi radicem valde accedens. Flores dabat Maio insequente: plantas verò omnes corrumpere cum multis aliis singularibus, asperissima quæ subsequēbatur hiems. Hunc cum aliis bulbis, è Mauritania acceptum, Wilhelmus Parduyn & Io. Somer ciues Medioburgenses in Walachria amicis, teste Clusio & Lobelio Adu. part. 2. communicabant.

Descriptio

HYACINTHVS LATIFOLIVS

Dalechampi.



HYacinthus ex Dalechampi latifolius, qui in monte Aurco Aruernic spôte crescit: radice corticosa, Lilio simili foliis sex aut octo, nigricantibus, crassis, latis, Lillii ferè: floribus purpureis elegantibus, particularim sese expandentibus: semine in capitulis rotundis

Descriptio

Loco

tandis herbaceis, Hist. Lugd.

C. Bauhin. Phyt. hyacinthus 18. siue latifolius Dalech. Hunc semel tantum vidimus Patavii in orto Clarit. Medici Bechar. Triuesani flore albo. In figura Dal. radix non videtur correspondere descriptioni eius, utinam aliquis nobis ex Armenia bulbos mittat.

HYACINTHVS LILIOFOLIUS stellatus.



E Biscaye Montibus inquit Lobel. Moutono itidem asportatus & ab eo mihi liberatissime communicatus hic admodum rarus & perelegans hyacinthus, quem apposite Liliaceum quis dixerit. Radice enim ac bulbo liliifolius est, sed minore & oblongiore, flavescente: ut Liliifolius cruentus,

siue Martagonis. Folia Lilio candido simillima: sena aut septena, inter quæ medius exilis nudus sine foliis spithameus caulis in cuius summo flores hyacinthi stellatis carulopurpurei.

Hyacinthum stellatum Liliifolio cum sequente descriptione Viennam ad Clusium mittebat Tornaco Io. Mouzonius. Attulit, inquit, qui Pseudo-Narcissos iuncifolios communicabat, ex illis iugis erutum bulbum, Liliaceo satis similem, sed oblongiorem, flavescentis coloris, ut Martagonis quorundam, siue Liliifolius sylvestris & montani purpurei radix: sena autem vel plura fert folia, Liliifolia [ante quam in caulem abeat] foliis similia, e quorum medio caulis exilis pede breuior, multos flores in summo sustinens, hyacinthi stellati vulgo nuncupati floribus, omnino pares, sex foliis constantes intensè caruleis, siue violaceis, emittente ex umbilico quodam veluti umbone, cuius causa hyacinthi stellatum *Arum* appellat: flori succedunt triangula capitula, in quibus semen. Mittebat etiam ille anno 1586. eius bulbum ex aliquot pallescentibus squamis imbricatis dispositis constantem. Sed cum toto bimestri in itinere hussisset, atque omnino flaccidus ad me pervenisset, terræ commissum subsequens hyems corruptit. Alterum deinde bulbum ab eo accipiebam, & aliquot post annos unum etiam à Iacobo Plateau: sed omnes mihi corrupti. Eius porro iconem à Moutono etiam acceptam in app. ad suam Stirp. hist. exhibet Lobelius noster. Sed anno 1595. eius bulbum à N. V. Ioan. Boissot accipiebam, qui insequente anno mihi flores dedit. Similes bulbos ad ipsum (Exot. par. 2.) Append. mittebat Burdigala anno à Christi natiuitate 1600. & cum insequente Ioachim Venerius, quos partim in Pyrenæis, partim in monte Gallia Aquitanicæ, cui nomen nos, cruisse scribebat, ubi à pastoribus *arabug* appellaretur, qui etiam assereret, ani-

malibus eam plantam depascentibus caput inru-
mescere, deinde morte in subsequens addebat etiam illis unicum, quem valde rarum inuentu significabat, nivosos flores proferere, atque in more Puote in Hispania legisse scribebat. Omnes quidem, præter unum aut alterum, biennio post germinarunt, sed nullum florem tulerunt: tertio demum anno vnus caruleum florem dedit: eius verò florem qui niveus esse debet, nondum videre contigit. Humentibus locis eas plantas gaudere scribebat. Eidem Clusio & aliis aliquot bulbi qui flores caruleos gerunt, plures flores, vel longiorem stamini comam protulerunt, quam præcedente anno: qui tamen pro eo missus, cuius flores essent albi, nulli florem tulit quam illo ipso anno. Høgelandio planta vna, Porreto planta vna, honesto planta vna, Clusio etiam vnica quam habebat planta: nam quam Venerius anno præcedente ipsi mittebat, hiems corruptit.

Lobel. in append. & c. Pl. pag. 101. *Hyacinthus stellatus Liliifolius floridus siue Liliophyllus*. Tabern. icon. & hist. *Hyacinthus Liliaceus siue Liliifolius & Arab. 7. hyacinth*. C. Bauhin. Phyt. *Hyacinthus siue folius & radice Liliifolius*. Mihi videtur hyacinthus Lobelii magnam habere affinitatem cum nostro hyacintho raro. I. Gerard. *Hyacinthus stellatus Liliifolius, hinc Jacinth. hyacinthus siue folius Theophrasti*.

HYACINTHVS TRIPOLITANVS.



Folius est longis tenuissimis, Phalangio nostro similibus, aut latius magnus, in cuius summitate quatuor flores speciosi, colore & magnitudine similes foliis tribus erectis in parua lride carulea: radices formæ, & colore Tulipis similes: florebat Aprili Tripoli ubi observavi. Rauvvolf.

Camer. in Epit. Matthioli: item ad eius hist. G. *Hyacinthus Tripolitanus* quem accepi à Domino Rauvvolfio. Rauv. itin. *Hyacinthi species incolis Tripolitanis Arab. C. Bauh. Phyt. apud Matth. Hyacinthus 16. siue Tripolitanus*.

HYACINTHVS EX THRACIA.

HYacinthum florem, qualem Diosc. describit, in hortis nostris habemus, quæ ex Thracia Venetias tulimus. Folia habet bulbi protinus à radice, caulem dodrantalem, leuem, tenuioremque minimo digito, coloris herbacei, comam procumbentem, incurvam, plenam florum olentia iucundissimæ, coloris carulei aliquantulum ad purpuram inclinatis, primo aspectu grati, deinde emanescentis antequam faciat, semine nigro

Coriandri magnitudine, radice bulbosâ purpuranteque: floret initio Veris cum viola purpurea. Verum quia possit aliquis cauillari, dicens hunc quem descripsimus florem non esse Hyacinthum, cum Diosc. Hyacinthi florem non colorem cæruleum sed purpureum habere descripserit, qui nec de odore quicquâ meminere dicimus Diosc. per purpureum violaceum intelligere, quippe cum & violam illamquam Ic. prophyrion Græci vocant, cuius colorem violaceum siue lanthinum vocari diximus, vñ cum Plinio coloris purpurei esse descripserit: nam & Plinius Hyacinthi colorem violaceum dilucum vocauit: Fran. Massar. in 9. Plinii cap. 41.

LEUCOIVM BVLBOSVM

Hexaphyllon cum vnico flore,
rarius bino.

Descriptio



crassiore, virente, nitat & deorsum spectat, exigui Cymbali modo, maior quam Triphyllis ex foliis sæpius sex, interdum septem, & octo, cætera candidis, mucrone acutiusculo, extrinsecus macula virente punctato, intrâ leuiter reflexo: in medio apices lutei sex modicè inter se distantes stitum intinum candidum ambiunt, odor ei non gratus quâ Fuchsius violarum purpurearum pro-

fus refert, Clusio Oxyanthe vulgò creditur odorem referens. Succedit flori capitulum vt in Narcissis siue membranaceum capitulum, Pyramido, vt ait Clusius, turbinatum, semen ex candilo flauescens, oblongiusculum durum.

Duas proponimus icones ex nostris empiriis quarum vna plantam demonstrat cum florere incipit: altera cum semen profert, vt olim à Fuchσιο exhibita fuerunt.

De Leucoio suo ita scripsit Theophr. lib. 6. 7. Leucoium (viola alba, Gaza) inter vernos flores primum se ostendit, vbi calum clementius statim fuerit, etiam hyeme nondum exacta. Vbi vero inmittitur, postea.

An de hoc Plutarchus in lib. de amore fraterno:

Inter Echnopodas velut asperam & Ononiam
Nascuntur passim mollia Leucoia.

Mihi quidem videtur potius referendum hoc dictum ad Leucoium bulbosum quam ad Leucoia alia propter locum natiuitatis.

Brunf. sub Narcissi titulo non solum Leucoium hoc pingit, verum etiam Bulbosellum ac nomina utriusque plantæ cum nominibus Narcissi confundit.

Trag. hist. Germ. & Lat. weißhornunge blumen. Merzen blumen. Ocho vult Narcissum: Parum refert si nominent Narcissum aut Ligustrum, weißmertz violen. Quod autem quidam asserunt florere vere & Autumno falsum est. Nobis vera est distinctio aut syluestre Lilium Diosc. lib. 1. 2. eidem nemerocatalactum, Crinanthemon, Porphyrantes, Bulbus vomitorius, Bulbus agrestis: keli Leucoium Theophr. quod quidem Anemone Limoniam interpretantur, constanter credimus.

Gesner. de coll. stirp. Leucoium bulbosum, weißhornung blumen. Item in cat. pl. Viola alba Theophr.

Fuch. hist. auz. Theophr. diuersum à Diosc. Leucoio, quod plerique docti non animaduertunt, Lat. Viola alba. In edit. Lugd. Fuchsius addita hæc annot. Massario in lib. 9. Plinio deprehensum est. Et icon. Viola alba Theophr.

Viola alba. Belgis, witte Spödel blumen, soomer Dorrefens & witte Zudloosen. Idem de fl. Leucoium bulbosum, exaphyllon, Matthiolo Narcissi species.

Matth. in post. com. Ital. Narcissus 7. qui non describit.

Aduers. Lob. & Penz. Leucoiarsolirion pratense vernum, viola alba Theophr. vel Moly Rondelario: An Plinio Lilionarocillus & Icon. Pl. 19. Leucoiarsolirion paucioribus foliis.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 1. siue bulbosum, vulgare.

Clus. pann. & nist. post. Leucoium bulbosum pratense minus, Rhizotomis mulierculis Neg. veyl, quasi palustris viola in Germ. weißhornunge blumen, id est, candidus Februarii flos.

Thal. Hac. Leucoium bulbosum Theophr. seu Narcissus albus. Schlangen blumen.

Hist. Lugd. Theophr. lib. hist. 6. 7. inter vernos flores & heuicet, & lib. 7. hist. 11. bulbosis annuerat Leucoium bulbosum, Fuch. (violam albam) appellat, non ab re. Germ. weißhornunge blumen, Lugd. Campanes blanches.

Prima florum (teste Fuchσιο) Tubingæ hieme etiam nondum exacta, Februario nimirum mense & die diuo Valentino facto, vbi calum clementius fuerit, apparet in April. vbi appropinquare iam ceperit Maius, euascescit, inter initia Martii ad

Loco

Causa

Fructus

Nascentia

Ligustrum

Narcissus

weißhornunge

blumen

weißmertz

violan

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

weißhornunge

blumen

tis ad perfectionem venit. Semen in Aprili ostendit in caputulis. Prouenit in umbratis syluis & locis, qualis est non procul à Tubinga paulò super & infra monasterium Bebenhausen vocatū, ubi copiosissime nascitur. Plantatur nunc etiam passim in hortis. Dodon. Mense Maio pereunt caules & folia: sola radix perdurat vt Narcissi. Prodit maturè admodum, statimque inter bina folia stertem ostendit vix liquefactis niuib: Maio mense semen maturefcit & folia marcescant. In sylua quadam [Pannonia] non procul Zolonoock Ill. Di. de Barthyan oppido vdis locis solummodò obseruabat Clusius, crescit etiā plerisque Germaniæ locis. Copiosè prouenit in monte Bar Com. Momb. in dumeris, vnde translati ipi hortum Ill. E. C. habent etiam alii in hortis: copiosum inueni floreus Mensis Martii principio inter Andiscourt & Mandeuere, olim dictum Epamanduodurum in itinere versus Dampierre, ex transplantatione interdum flores fert cum octonis foliolis, vel cum duobus floribus ex vno caule. Anno 1598. floruit Montbelgardi, sine Decembris in vno caule. Parauii obseruauit floreus Februatio in hortis nobilium, D. Cortusii & Pasqualigo: Ferrariæ in cœnobio S. Dominici à l'Angeli. Bononiæ in orto. S. Saluatoris Alburgo di S. Catharina: Lugduni, Basileæ, Geneuæ, in hortis, cum essem Monspelii, reperi propè turrim de Lare plantam cum pericarpis duobus, nō multum dissimilibus à pericarpis Narcissi vnum floreus habentis, sed maioribus multò, in quo semina rotunda nigra, magna, huius Leucoii fuisse suspicor, ac in catal. horti Bēbi inuenio, Viola alba Fuchsi Verna Lare de Gallina.

Vide
Fuch.
L. G.
L. G.
V. G.
Temp.

Hoc Leucoium, ut annotauimus in descriptione, bulbum habet sapore viscido, acrimoniā vix notabili: Scribente Fuchsi folia ferè qualitatibus expertia, radix autem dulcis & glutinosa est, vt hoc nomine adstringat & exiccet, ut reliqui bulbi, digerētem leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut reliquos bulbos habet ex iis quæ commemorauimus satis constat, tamen nunc nullus, quod iam, eius stirpis vsus est.

LEUCOIVM BVLBOSVM MINVS Triphyllon.

Delap.

Totum minus Leucoio præcedenti hexaphyllo, ex radice bulbosa parua, multis tunicis albis constans, externa nōnihil nigricante, & sessili patte, multis fibris appensis: donata gustu est lento, amaro, subacri: exurgit coliculus singularis, angulosus, vaginā albā ad mediam vsque longitudinem inclutus, tenuis, concavus, nudus, dodrantalis aut paulò maior, quem ferè ad summum vsque comitantur folia bina, porracea, glauca ferè, nec ita lucida vt Leucoii Exaphylli, vel, vt ait Clusius, colore æruginoso & quodammodo cineraceo: extremum caulis tenet stipes pediculo longo nutante, vaginulā aliquouſque incluso, ynicus, paruus, foliolis tribus, penitus lateis, nōnihil obrusis, aliis interioribus, duplò longioribus, latioribusque constans, intra quæ alia tria, alternante situ, breuiora angustiora, rigidiora, leui exsurā, in summo, in quo extrinsecus, corculi ex diluto virore, pænè luteolo, effigiantur, intrinsecus discursantibus, per folioli longitudinem, alternatim striis albis, & viridanibus. Totius floris medium obtinent apices lutei, nigridiusculi, sex, stylusque exilis, candidus,

Tom. II.

interioribus floris foliolis, dimidio breuioribus.



Clusio odor nullus aut perquam exiguus: flores sequitur caputulum vt Narcissus, Oliuæ virentis [inquit Clusius] formam pænè exprimens, in quo semen cādidius altero præcedenti: si s noctu se contrahit, cū Sole explicatur, etiam extra terram in hypocauſto, & vt dicit Clusius, radiis Solaribus illu-

stratus, aut sudo celo explicatus.

Theophrast. de Hist. pl. l. 7. cap. 13. Inter bulbosas Leucoium, vel, vt vertit Gaza, Violam albam recenset. C. Bauhin. Phyt. Leucoium bulbosum 7. siue minus. Clusius Pann. & Hist. post. Leucoium bulbosum præcox minus, Rhizotomis mulierculis weyſſe veyl & Schneetropſch hoc est, alba Viola, & Niueæ gutta, ab insigni videlicet candore appellatur. Matthiol. Narcissus. 2. Et in post. com. Ital. Narcissus sextus, à quo non describitur, sed figura tantum ponitur. Dodon. de flor. describit & depingit, ac vocat Leucoium bulbosum triphyllon. Aduers. Lobel. & Penz hunc tradunt sub Leconasifolico præcox. Nonnullis Narcissus herbaceus Plinii putatur. Obs. & Ic. Pl. pag. 119. Leconasifolico minimum. Hist. Lugd. quæ figuram habet ex Matthiol. vocat Leucoium bulbosum primum. Camer. hort. Leucoium bulbosum triphyllum vulgò ad Narcissum referunt.

Prodit maturè admodum cum præcedenti, vix liquefactis niuib: quas nonnunquam etiam penetrat: Non modò in Viennensi & Leytano latibus, sed etiam plerisque Pannoniæ pratis: vmbra tamen (teste Clusio) magis delectari videtur. Florens videtur nunc in fine Februarii passim in montibus Euganeis, vt inter Thermas Aponenses & Arqua, &c. Item Parauii in orto Magnifici Laurentii Priuli. Hoc habemus Montbelgardi in hort. Ill. E. C. ubi plantauimus, florēt Aprili ac citius quàm Leucoium Bulbosum hexaphyllum, obseruauimus etiam floreus in hortulo nostro Ianuario & Februario sub ipsis niuib: & anno 1597. sine Decembris.

Locus
tempus

LEUCOIVM BVLBOSVM PRÆCOX Byzantinum.

Leucoium [autore Clusio in post. hist.] bulbosum præcox Byzantinum Leucoio minori ferè simile est, incunetque Martio bina folia promit illi similia, sed latiora, ærugini etiam coloris, floris gemmam vt in illo complectentia: crassiusculus caulis tandem succrescens, vnicum florem vanigulā inclutū sustinet, formā superiori similem, duplò ferè minorem, tribus externis foliis alarum modo expansis, prorsus niueis, interioribus verò brevibus, bifidis, vt in superio-

D d d

LEVCOIVM BVLBOSVM AVTVMNALE
minus tenuifolium.

Descriptio



Cauliculo
est palmū
alto gracili, v-
nicū, interdū
alterū & ter-
tium ferens
florem omni-
nō lacteum,
pendulum, sex
foliis constā-
tem, & tintin-
nabuli modo
formatū, ino-
dorum, ingra-
tique gustus,
in quo pallida
stamina: flore
sā aperto,
demum pro-
deit quaterna
aut quina, ca-
pillaria viri-
diāque folia:

(Lob. atrovirentia) radix bulbosa [Lob. oblon-
ga, alba,] satis crassa, pro plantæ exilitate, è multis
glutinosi tunicis compacta & amara, quæ can-
dicante membranā integitur.

Clus. Hisp. & post. Hist. *Leucoium bulbosum mi-
nus Autumnale tenuifolium siue quintum.* Lob. ci-
vil. pag. 110. *Leuconarcissifolium minimum Autumnale*:
Aliam iconem habet in Aduers. part. 2.
dicens: A foliorum quadam similitudine & exi-
litate *Leucoi* Autumnalis genus istud ab Egr. vi-
ro D. Theodorico Clutio in Lugdunenſi Batau-
rum Academia horti Medici primo instructore
cultum, hyacinthi Autumnalis peregrinum &
elegans genus creditur fuit: cuius delineationē
Petro Clutio fratri suo debemus. C. Bauh. *Leu-
coium 9.* siue bulbosum Autumnale.

Extremā Bæticā, quā Lusitaniz contermina
est, non procul Badaioz, quam nonnulli Pacem
Augustam esse existimant, ad flumen Anam sitā,
nascitur, ubi sub finem Octobris & Novembris
initio, cum suo flore cruebat Clusius, Vlyssipo-
nem proficiscens, unde in Belgicam cum paruo
illo ferotino Narcisso amicis mittebat: qui diu
in pensilibus suis hortis vtrumque aluerunt, nul-
lum tamen, quod sciat, florem videre potuerunt,
& an hætenus bulbos conferarint ignorat.

LEVCOIO BVLBOSO FORTE AFFINIS
Bulbus flore intus luteo foris
purpureo.

Bulbus ex Hispania Clutio Pann. missus per
Regis hortulanum flore Campanulæ albæ
satis magno, terram spectante, colore
intus luteo, foris purpu-
reo. C. B. Phyt. *Leu-
coium bulbo-
sum.*
**

Tom. II.

LEVCOIO BVLBOSO FORTE AFFINIS
Bulbus quidam.

Bulbus Clutio missus ex Hispania per Hortu-
lanum Regis, quatuor aut quinque flores
gestans, in modum Campanulæ albæ efformatos.
C. B. Phyt. 34. *Leucoium bulbosum 2.*

BVLBOCODIVM VVLGATIVS.



Descriptio

Bulbocodii
radix bul-
bosa, vt Leu-
coii bulbosi
Theophr. vul-
go dicti, mi-
nor, ex multis
tunicis com-
pacta, tactu &
gusta viscida
cū aliqua dul-
cedine acrimo-
niam tandem
aliquam relin-
quens, cui sub-
sunt multæ ca-
pillares fibre,
nonnunquam
unica, alias
plures ubi se
propagant: folia
Leucoio
predicto simi-

lia, longa, caulem ad summum fastigium com-
tantia, angustiora, breviora, colore diverso, Albi
ferè, non tamen ex viridi lucentia vt illius, stri-
ta, costis duabus aversa parte predata, terna, qua-
terna, quina, tunicā vnā cum caule statim à radi-
ce exorta, aliquotque inuoluta. *Caulis* palmaris
& dodrantalis, compressus, striatus, fistulosus,
cui insidet flos singularis, deorsum utrans, duas
vincias longus, sex pallidis & stellatim decussa-
tis foliis constans, magno, longo, flauoque & sim-
briato calice Campanulæ fere figurā protuberans,
aureus, splens, umbria comata & laciniata, in
cuius medio apices sex lutei circa pistillum con-
colorem intorquentur, & lacinia est nigro o-
dore, non, vt aliqui volunt, nullo, quā parte ge-
niculo intermedio cauli flos adnascitur, mem-
branula exalbida florem, antequam explicet, in-
uoluit: pauloque infra floris medium sex folia
pallidula, micantia, mediocriter lata, mucronata,
ex ipso floris codio, rectā foras se pandunt. Suc-
cedunt pericarpia rotunda, in quibus semen Ca-
mer. nigrum, in principio latiusculum, temporis
progressu rotundius. Iag. Garg. Binos flores in
eodem caule obseruauit Basileæ.

Brunfel. Tom. 1. Rhaps. 20. ponit figuram sub
Narcisso, nec vllam particularem aliam eius
mentionem facit. Tragus Germ. *Gälhornügs
blumen.* Ortho Brunfel. inter Narcissos recen-
set. Matthiol. Narcissi nomine ponit com-
modam figuram. Lugduni, quod nos recordamur,
vocant *Campanes launes.* Montbelgardi, *Cubere.*
Dodon. Gall. *Coquelourde,* Gall. & Germ. *geel
hornungs blumen.* Lat. quibusdam *Narcissus lu-
tem* & *Pseudonarcissus.* Item hist. flor. Et in fol.
Narcissus luteus syluestris. Belg. *Geel Spoden
blumen.* Gesner. de col. stirp. de hort. & in cat.
pl. Codaminum.

Codaminum

Ddd 2

Flora
res.

Aduer. Lob. & Pen. Totus luteus *Narcissus montanus* Theoph. Icon. Pl. p. 141. & Obs. *Narcissus totus luteus montanus* Theoph. *Pseudonarcissus* Clus. & Dodon. luteus sylv. Adu. p. 51. Bulbocodium Theoph. *Cordiaminum*, ut vertit Gaza, hisp. *Campanilla*.

Clus. hisp. *Pseudonarcissus Belgicus*. Idem post. hist. *Pseudo narcissus vulgaris*: Sunt qui putent Theophr. l. 6. c. 7. *Coffea xodion* esse, cuius meminit Plinius lib. 21. cap. 21. inter flores qui maturè erumpunt: ac quod bis florere ait Vere & Autumno: Austriacæ matronæ gelb beedel, id est, flauum caliculum & gelb Niergblumen / hoc est, flauam violam Martiam appellant: Galli nonnulli *Coequelourdes*, alii *Porrien*, à Porraceis videlicet foliis. Reperitur huius genus magis præcox, alioqui non valdè diuersum à iam memorato, cuius flos non pallidus, sed aureus instar maioris hispanici. nunc verò colorem interdum mutare obseruauimus, hoc est calicem illum medium non minùs pallidum habere, quàm sint sex illa externa folia ipsum ambientia.

Calice pal-
lido.

Taber. icon. & hist. *Pseudo Narcissus luteus* Josepho stablein *Geel hornungo blumen*. Camer. apud Matth. Germ. *Narcissus 4. luteus*, *Josepho stab*: interdum fert duos & tres flores, ut in horto meo (Norimbergæ). Item in Epitom. Matth. *Narcissus totus luteus*. C. Bauh. *Narcissus 14. siue luteus*, calice prælongo primus. Quibusdam censetur *Coffea xodion* Theoph. ubi Gaza vertit *Cordiaminum* secutus proculdubio Plinium lib. 21. c. 21. Còmuniter cuiuslibet cauli flos vnicus insidet, aliquando verò & duo.

Locus &
tempus.

Mulherculæ, ut Trag. scribit, hanc plantam in hortis sui serunt, propterea quod inter Vernos prima floreant. Reperitur non paucis Belgii locis circa margines agrorū & Vernactorum, humido præsertim solo & in syluis locisque arboribus confitis, & similibus quoque cum in Germania, tum in Hispania, transtertur etiam in hortos. Profert teste Dodonæo, sua folia, caules, & flores mense Februario & floret interdum sub niue. Semen maturum mense Martio, ita ut postea non ampliùs videatur. Tanta abundantia in pratis Londino satis vicinis, crescere certum est, ut in celebri illo vico, vulgò *Ceaphide* nuncupato, Martio mense rusticæ mulieres maximà copiam flores venales proponant, & omnes tabernæ eo flore exornatæ conspiciantur. Crescit & aliis Angliæ, & plerisque Germaniæ locis: memini & olim (inquit Clusius) cum Lotharii humanioribus literis operam darem, ad siluulæ illius, Cænobio vulgò *Perck* dicto vicinæ, margines legere spontè natum. Nobis verò Mòrbelgardii abundat *Bulbocodium*, ut in monte *Bar*, vnde transtuli in hortum Ill. E. C. Obseruauimus *Geneux* florens Martio, & in mòre Thuri mense Iunio: Lugduni Februario: Patavii variis in hortis & aliis Martio. Montbelgardii Februario & Martio: floret interdum sub niue, semen maturat Martio, herba perit Aprili & Maio, manentibus bulbis in terra occultatis vsque ad sequentem annum. Abundat in colle prope *Dampierre* arcem ad Dubium: anno 1597. florebat copiosè Aprili.

Temperam.
et Vires

Calida & sicca est herba *Pseudonarcissi*, temperamento eodem ferè cum *Narcisso*: certa experientia inuentum est (si Dodon. non fallitur) duas drachmas huius radices adhuc recentis, in uino aut aqua cocta cum paucis semine *Anisi* aut *Foeniculi* & parua portione *Gingiberis* exhibitas, purgare pituitam lentam & viscidam per inferiora. Itaque hæc radix utilis ad omnes morbos ex-

pituita viscida natos. Non dissidet à Diosc. *Narcisso* facie vel viribus. Xyridis modo purgare asserunt Aduers. radices decoctum, ac rusticam plebem vomitiones cum eo moliri certum est.

BVLBOCODIVM HISPANICVM



Est (teste Desimpio Lob. Obs.) *Narcisso* montano Theophrasti facie non dissimili, sed latioribus foliis, maioribusque, omnino luxie. Alueum Ioh. Baillet Insulanus & Mutonus. Plant. icon. p. 121. *Narcissus totus luteus montanus* Theoph. Hisp. *Pseudonarcissi* genus inuenitur à Clusio nonnullis veteris Castella præ-

tis, & locis montanis humidis Anglico quidè simile, sed foliis longè maioribus, magisque virentibus longiore caule, paulò minore flore, eoque prorsus flauo, & quasi aureo, videlicet tam externis foliis quàm calice: radix huius crassior est quàm in superioribus. Dodon. lat. in fol. *Narcissi sylv. alia* icon, qui non facit duas species. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 15. siue luteus calyce prælongo alter*. An Camer. in epit. Matth. Inuenitur *Narcissus 3. in montibus* prorsus *luteus* ferè florens.

BVLBOCODIVM FLORE PLENO.




Narcissi & multiplici foetura varietas, Belgicis amicorum hortis visu digna, ceteroquin omnia prorsus eadè. Tatnari primùm [ut Lob. obs. testatur] repertus in horro cuiusdam pauperis. *Narcissus luteus multiplex flore*, Eidem.

Hic calice pleno, inquit Adu. part. 2. variat, sim-

briatis oris, rugosis & complicatis foliis compacto; etiamque tanto copiam cornu exuberante & dehiscendo, ut florem totum adimpleat, multiplicati *Narcissi* lutei, speciemque referat: intermixtis

mixtus tamen pallidioribus nonnullis foliis, & quandoque ex luteo herbaceis: inferioribus senis floribus, radiatis aut stellatis foliis concoloribus, remanentibusque pariter aliis sui generis quandoque, in singularibus spithamæis cauliculis simplicibus floribus. Cætera cuncta vulgari luteo Narcisso haud absimilia.



Clus. Hisp. *Pseudo narcissus multiplex*, qui apud Belgas in hortis alitur, Belgico per omnia simile cum foliis, tum bulbo, sed flos calicem caret, & eius loco innumera habet folia externis sex similia, colore pallido. Item hist. post. *Pseudonarcissus pleno flore*. An Camer. horti, *Narcissus ex*

luteo pallidus flore pleno, nullo intus calyce? Dodon. in fol. *Narcissus sylu. multiplex*, qui medio calicem caret. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 22. sine flore luteo multiplici calyce carente*. Taber. icon. & hist. *Pseudonarcissus luteus Polyanthus*, Gesf. Josephs stäblein.

In Virgilio quodam rustico præfatur Wilhelbre Sarum Episcopus, iuxta tuguriolum Verulæ pauperculæ D. Ioan. Gerard. fortè fortunæ hoc elegans Narcissi genus offendit. Martij cogenere pleni floris Narcisso luteos flores laxat iucundos.

BVLBOCODII PLENO FLORE SPECIOSUM genus Venerii.



ANNO 1604, scribebat ad me Venerius, inquit Clusius Exor. apped. 2. se obseruat se Pseudonarcissi genus quoddam sibi ante non conspectum, cuius paucos reperisset bulbos: illum autem viuis coloribus depingi curabat, quia verò similis formæ à nemine hæcenus obseruati

esse arbitror, in tabella eius iconem exprimendam curabam.

Quamvis porro ex pictura quam ad me mittebat obseruare poteram, crescebat hæc planta


Tom. II.

Pseudonarcissi vulgaris modo, quatuor oblonga viridia folia ex bulbosa radice producent, inter quæ prodibat caulis læuis, enodis, viridis, pedem altus, summo fastigio membranaceum folliculū sustinens, è quo emergebat flos foliis pallidis, geminâ serie dispositis præditus, prominente ex cuius umbilico calicis siue tubo oblongo, cras habente nonnihil reflexas, easque crispas & incisas, aurei prorsus coloris, veluti *Pseudonarcissi* maioris Hispanici tubus, attamen non simplici, ve ille, sed triplici, hoc est continente alterum tubum qui tertium comprehendebat: radix erat bulbosa, ex multis tunicis constans, quarum externa subfusca, multis fibris extimâ sede prædita. Si vnicam duntaxat plantam reperisset, nihil nouum uideretur, quia natura interdum sic in floribus ludere solet: sed quum aliquot similes obseruauerit, peculiare quoddam genus esse credendum est. Scribebat etiam vnam *Pseudonarcissi* vulgaris plantam binos flores in eodem caule gerentem obseruasse, quæ alioqui vnicum solummodo proferre soleat.

BVLBOCODII SIVE NARCISSI FLORIS lutei multiplicis varietas.

Londini dilutioris maioreque flore uariar, & in foliorum floris extremitatibus angustiore, in horto D. I. de Francque ville. Radix Allii modo nucleis propagatur. Foliis est quam superiorum paulo latioribus & tantillam recuruatis. Adit. part. 2. Lob.

NARCISSVS CYPRIVS LUTEVS polyanthes flore pleno.



D Eberdt hoc admodum elegans *Narcissi* exoticum genus egregio viro Londinensi, D. Lettre negotiatori Constantino-politano: qui eius bulbos cum pluribus aliis à Cypro Insula delatos, amicis suis communicauit, & hoc mense Decemb. 1604. folia pedalia, imâ sede vnicam lata, su-

Descriptio

perne angustiora, & flores vno caule foliis altiore plures, luteos, multiplicisque laxauit in horto præfati D. de Francque ville, è bulbo *Narcissi* crassiore, coloris Castaneæ involucro te-

Hanc *Narcissum* esse, ex natura quorundam exoticorum bulborum, valde suspicor, quibus à natura insitum est, vt non nisi anno primo à quo in Septentrionales regiones algidiore de-

Ddd 3



gosis plicis, fimbriatisq; floribus habuit Mutonus, alioqui non differt à superiore. Narcissus montanus iuncifolius minimus, alter flore luteo fimbriato Mutoni, Lob. in append. T. 155. C. Bauhin. Phyt. Narcissus 18. siue montanus luteus fimbriato flore.

Chf. hist. post. cap. 17. j.

conem habet qualem Lobel. sub hoc titulo *Pseudonarcissus iuncifolius*. 2. flauo flore: ac addit. Alter *Pseudonarcissus* iuncis foliis tenuiora paulo, licet surrecta, habuit folia, florem flauum, hoc est, calicem per oras leuiter & tenuiter fimbriatum, & sex illa foliola calycem ambientia, ex herbido pallescentia, in capitulo flori succedente nigrum rotundiusculum semen etiam tui. radix pusilla, foris nigricans, bulbacea, tenuibus fibris & sede prodeuntibus firmata.

NARCISSVS FOLIIS FLORIS ALBIS oblongo calice luteo.

Mittebat [inquit Clus. Exot. par. 2. in append. altera] ad me anno 1601. Erud. vir Ioach. Venerius *Burdigala* inter plerasque plantas quatuor *Narcissi* bulbos, quos duorum generum esse, & vnicū florem gestare scribebat, singulis videlicet generibus binus. Illorum vnus insequente Aprili florem tulit. Quum verò similem autē videre nō meminero, illius iconem in tabella exprimentam curabam quam Lectoris oculis proponere, atque eius historiam adieciēbam. Habebat porro is *Narcissus* terma, oblonga, & satis angusta, carinataque folia, ex sui quodammodo ex viridi coloris, inter quæ prodibat caulis pedalis longitudo, aut amplior, lauis, enodis, satis gracilis, firmus tamen, summo fastigio folliculum membranaceū sustinens, e quo emergebat vnicus flos longiusculus, summā parte in sena folia alba & in mucronem desinentia diuisus; cuius umbilicum occupabat calix flauus, semunciam longus, oris aliquantulum incisus & quodammodo fimbriatus, habens in medio stilum pallescentem, eisdem cum calice longitudinis, cinctum sex staminibus flauis veluti farinā conspectis, eorum præsertim apicibus. Semen p̄seruare nequii, quia florem carpebam, ut à pictore commodius exprimi posset: valde autem suavis erat odoris. & Muscari floris odorem p̄sens referentis: radix bulbacea oblongiuscula, digitalis crassitudinis, albā, & multis tunicis constabat, quarum exterior subtilis, aliquot crassioribus fibris albis infimā sede donata. Alter ab eodem Venetio nullus florem dabat etiam Aprili altero post superiore anno, illi prorsus similem: calicis tamen eius oras magis erant croceæ. Vnum etiam non valde dissimilem videbam apud Honest. virum Christianū Porretum, qui à Venetio acceperat: illius tamen

senā folia ex albo pallescebant, aut *exstans* erant, calix verò multo latior, & oras planè croceas habens. Iac. etiam Plateau similem habuisse eodem anno florentem intelligebam: illum autem à rhizotomis quibusdam Gallis redemerat cum aliis bulbis à Pyrenæis montibus erutis.

Narcissus album montanum, calyce magno luteo Botanico Lutetiano N. Quelt debet Lobel. Adu. par. 2. qui eius bulbos, vncias duas longos: & vnā, plus minus, crassitudine æquantes, in Pyrenæorum montium Souton iuxta *Baniers de Luson* monte vocato eruit, nec dum illi floruerat.

Narcissus
album montanum.

PSEVDONARCISSVS ALBO flore Clusii.

Inter *Narcissos* reponendam esse inquit Clus. Exot. par. 2. App. 2. eam plantam quæ *Pseudonarcissi* appellationem vulgò obtinuit, nullum esse opinor mediocriter in re herbaria versatum qui dubitet: Multæ autem sunt eius differentiæ &c. verum enimverò nouam quoddam genus reperiunt est quod valde rarum censeo, cuiusque binos bulbos anno 1604. ab Eruditiss. Venetio accipiebam: Horum alter florem mihi promittit insequente Aprili quemadmodum etiam aliis. Sed & eodem anno mense Decembri *Rhizotomus* quidam Gallus similes plantas adferrebat valde elegantes plantæ, terma e radice bulbosa oblongiore, nigroque cortice siue membrana recta (& cuius sede frequentes tenuisque oriebantur candidæ fibræ) proferebat folia, dodrantem vel paullo amplius longa, *Narcissi* angustioribus foliis valde similia, supinā parte carinata, inter quæ nudus prodibat caulis satis exilis, non crassius, dodrantem altus, summo fastigio membranaceum folliculum gerens, e quo propendebat flos totus albus, *Pseudonarcisso* vulgariori, quem Germani *Gelbe hornügs blumen*. Belg. verò *Gele Tuloozen* appellant, formā quidem similis, paullo tamen minor, seicunciam longus, sex foliis cubum amplexentibus

similiter constans: tubo autem paullo angustiore, & oras nonnihil fimbriatas habente, in quo sex alba stamina flauescente apice prædita, & medius stilus longior: nullum verò peculiarem odorem in eo flore obseruabam, qui aperiebatur Aprili, deinde Iunio semē proferebat in triangulari capite siue thecā, orbiculare, nigrum & splendens, quale *Narcissi* iuncifolii albo flore reflexo, sed maius.



orbiculare, nigrum & splendens, quale *Narcissi* iuncifolii albo flore reflexo, sed maius.

Stilo prodeantem sustinens, tenellum, candidū
eminens, & calicis oris fimbriaris: huius semen
non observari, radix superiori similis. Omnes
vero has elegantulas plantulas ipsi abstulit asper-
itum illa anni 1586. hiems.

Narcissus omnium minimus montanus albus
Lob. in append. T. 156. C. B. Phyt. Narcissus 28. si-
m. montanus albus minimus.

NARCISSVS IVNCIFOLIVS ALBVS
calyce magno D. Cor. Coorne tor-
tilibus foliis.



Narcissus
Iuncifol.
inquit Lobel.
Adu. pag. 2. al-
bus tortilibus
foliis floris
donato, caly-
ce magno &
longo nuran-
te, prominulo
pistillo tenui.
qui anno 1604.
floruit Me-
dio-Castri
Walachia ap-
ud D. C. Co-
orne, cuius
floris iconem
Londinum ad-
me misit. Idē
effereor cum
Narcisso Iun-

cifolio omnino albo, calyce amplo, prope Betam
Wallacia oriundo, empto à Nic. le Quele Rhi-
etome Parisiensi, Anno 1603.

NARCISSVS IN GENERE.

HYacinthis congener est Narcissus, qui (The-
ophrast. lib. 6. cap. 6. teste) etiam Lirion co-
gnominatur. Alii siquidem hoc, alii illo nomine
appellant, *Nelium* ad terram Asphodeli folio si-
mile habet, sed multò latius, vel ut Liliū: cau-
tem sine foliis herbaceum: & in summo *stemon*:
& in pellicula quadam velut in vase, *semen* ad-
modum magnum, colore nigrum, figurā oblon-
gum. Hoc excidens spontē germinat: sed & qui
colligunt id figunt: & radicem quoque plantant
quam habet carnosam, rotundam, magnam. Sed
in Narcissi descriptione Diosc. securus est Theo-
phrast. scribens: Narcissum aliqui, & ipsum ve-
lut Liliū, Lirion vocauerunt. Folia habet
Porri similia, sed tenuiora, & multò minora ac
angustiora: caulem cauum, sine foliis, altitudi-
ne palmum excedentem: in quo flos est albus, in-
terius croceus, in aliquibus purpureus. Radix est
dura alba, rotunda, bulbi specie, semen velut in
pellicula, nigrum, oblongum. Nec vlla diuersitas
(ait Cornar.) in folio est, quod Theoph. Aspho-
deli: Dioscorid. verò Porri folio simile dixit.
Nam & Dioscor. Asphodelo, Porri folium attri-
buit. Sunt & purpurea (autore Plinio lib. 21. c.
4) Lilia, aliquando gemino caule, & carnosiore
tandem radice, maiorisque bulbi, sed vnius: Nar-
cissum vocant: huius alterum genus flore candi-
do, calyce purpureo. Differentia à Liliis est &

hæc, quod Narcissis folia in radice sunt. Tertiū
generi cetera eadem, calix herbaceus. Ita Pli-
nius Lilia à Narcissis distinguit. Sed clariùs de-
inceps de Narcissis cap. 19. agit. Narcissi duo
genera, inquit, in vsum Medici recipiunt. Vnū
purpureo flore, & alterum herbaceum. De pur-
pureo eo Narcisso Virgin Buc.

Pro m. lli viola, pro purpureo Narcisso

Carduus & spinis spargit Palurus acutus.

Quidius etiam ad adolescentem Narcissum, flo-
ris Narcissi ortum referens, hunc affabrè depin-
git, ita canens:

*Nusquam corpus erat, croceum pro corpore
florem*

Inueniunt, folio medium cingentibus albi.

Virgil. purpureum Narcissum [ut putat Hadrian:
Spick. Itag lib. 1. cap. 11.] nominat, non quod vn-
dique sit purpureus: sed quia medium floris
(quod calicem Plinius appellare videtur) purpu-
reum cernatur. Plinius vnum genus Narcissi
purpureo flore recenset, alterum herbaceo: quod
tamen si de floris colore intelligat [inquit iam di-
ctus Spick.] falsum est. Non enim flori color
herbaceus, sed albus: in medio uerò aut croceus,
aut purpureus, aut albus totus. Herbaceum cau-
lem Narcisso adscripsit Theophrast. pro *masda*.
Videtur Plinius legisse *masda* & sic ad florem
non ad caulem herbaceum tenuisse. Ex his om-
nibus colligitur Narcissum esse ex genere flori,
qui à Cornario Zeytlosen / & herbistblumen / ap-
pellantur. Sunt enim multæ & coloribus diuer-
sæ species.

Ceterum, quod Plin. ait, à narce Narcissum,
non à fabuloso puero dictum, testatur hoc Plur. in
Sympos. qui quasi neruos hebetantem, & torpi-
das facientem grauitates, refert. Quapropter
& Sophocles magnorum subterraneorum Deo-
rum coronamentum eum vocat, quod scilicet
defuncti, & morte torpidi, torpido flore meri-
tò coronarentur. Appellatur autem etiam, Apu-
leio teste *alud*, *alud*, *alud*, *alud*, *alud*. *Ar-
du* quidem Narcissus propriè montanus est, ed
quod ab aquis remotus proneniat. *Beas* *Beas*
nomen ab effectu habet: Dioscor. siquidem au-
tore Narcissus etiam vomitum concitat.

Græci huiusmodi flores *Napxiōn*, Latini simi-
liter *Narcissos* appellant. Germ. *Narcissen* rōse
lin. Belg. *Narcissen* Spaensche *Jenetten* / Gal-
li peculiare nomen non habent, possent tamen,
autore Clusio *Narcisses* nominare. Hisp. *Narciso*
vocant. Omnem porro Narcissum præter eum,
quem peculiari nomine, *Deubibini* (Narcissum
mediopurpureum) Clusius appellari dicit, Tur-
cæ propriè appellant *Serin cade*, hoc est, Regium
calicem, quod flauum illud in medio flore, cali-
cis formam quodammodò referat: qui verò mit-
tunt eius bulbos vario corruptoque nomine, ut
plurimum inscribunt, nunc *Zerem cada*, modò
Zerem cades, interdum etiam ineptiore *Zerem cat-
ta*, addita voce *bianco*, vel *giallo*, cum colorem
album vel flauum designare volunt. Ac qui ple-
no est flore, plerumque *Zerem cada caramer* ap-
pellant, additis iisdem vocibus *bianco* & *giat-
to*, pro coloris florum, quos mittere se putabant,
varietate: tamen si sapissimè nobis impositum de-
prehenderimus: nam multos simplici flore hoc
nomine accepimus, contra nonnunquam pleno
flore præditos, hac simplici *Zerem cada* inscriptione.
Interdum etiam tam plenus, quam qui am-
plo simplici est flore, præsertim crasso prædicti
bulbo, Penachio nomine missi, *Guil caramer la-
le* (qua appellatio & Anemonem pleno fla-

*Narciso
miles.*

Narci.

*Cornu
Dionisi.*

re, & alias quasdam Stirpes accepimus [quæ voces Rose plene florem significant. Sæpius enim e-
tiam eiusdem generis bulbis diuersa nomina ad-
scripta fuisse comperimus: ut schedis additis mi-
nimè fidendum sit, sed cuius coloris florem sint
habituari Narcissi bulbi, ipsa autem nos docere
& certos reddere debeat.

Nascitur, autore Diosc. optimus in montanis
locis [probatissimus in Lyciæ montibus, Plin.]
odoratus: reliquus Porrum refert, & herbaceum
odorem remittit. Ast contra nasci odoratum
etiam in pratis refert Theophr. Eidylio 20. ubi
Europam cum suis prata ingressam, bene spiran-
tem Narcissum carpsisse, canit his versibus:

*Florida sed postquam venere in prata puella,
His illa, bac aliis se floribus oblectabat:*

*Narcissi illa quidem bene olense, atque illa
Nympha.*

Vires &
vires

Narcissus Theophr. serotinus valde est. Nam post
Æstivum floret, & circa Æquinoctium (Au-
tumni Plin.) ita quidem Theophr. quod postre-
mum etiam reddidit Plinius, & omnibus generi-
bus adscripsit. Narcissi omnes serotini.

Narcissi radix (autore Diosc.) siue estur, siue
bibitur, vomitus mouet: prodest ambustis ab igne
cum melle trita: præcisos quoque nervos agglu-
tinat imposita: luxatis item malleolis, diuturnis-
que articulorum doloribus trita cum melle, &
imposita subuenit: expurgat ephelin & althum
cum vertice semine & aceto: at cum Eruo & mel-
le ulcerum sordes expurgat, & abscessus qui ægre
maturantur rumpit: educit & aculeos infixos
cum Lolii farina & melle. Et in usu quidem Me-
dico tradendo Plinius non multum à Diosc. eu-
ariavit. Narcissus herbaceus vomitorius est, ac
ideo stomacho inutilis: aluos quoque soluens,
nervis inimicus, caput grauans. Vtriusque portò
radix mulsei saporis est. Ambustis prodest cum
exiguo melle. Sic & vulneribus & luxatis. Pa-
nis verò cum melle & auena, [arinez vet. lolii
scilicet] farina. Sic & infixa corpori extrahit. In
polenta tritus (trita Dod.) oleoque, capitis me-
deretur & lapide percussis. Purgat vulnera permi-
stus farine. Nigras virilgines omaculat. Ex hoc
flore fit Narcissinum oleum (unguentum Diosc.)
ad emolliendas duritias, calcificiendæque alle-
mit. Auribus est utilissimus, sed capitis dolores fa-
cit. Cæterum Narcissi radix, ut Galenus ait, us-
que adeò exiccandi facultate pollet, ut & maxima
vulnera glutinet, vel ad incisiones usque, quæ
circa tendones accidunt: habet verò quid-
dam absterforium & attractorium. Narcissi cuius-
cunque generis radicem præmansam vomitum
ciere Cluius sæpenumero expertus est.

NARCISSVS MEDIO PURPUREVS.

Descriptio Radix ei bulbosa & fibrosa, sapore amari-
cante: folia à radice statim exoriuntur cau-
lem tanquam vagina aliquosque inuoluentia, la-
titudine semunciali, pari cum caule longitudine:
caules singularis, sesquicubitalis, compressus non-
nihil, utrinque acutus, fistulosus; in cuius fasti-
gio stas vnicus amoenus, suauis olens, candidus,
mutans, pediculo per articulum cauli iuncto, va-
ginâ membranâ obuoluta, cuius ceruix in tri-
quetram saturatè virentem floris quasi basin de-
finit: hinc canaliculata fistula explatur, cui se-
na illa floris candidi folia cohzrent subrotunda,
quorum tria aculeum mollicellum proferunt, to-
tidem alternatim eo destituuntur: florem me-

dium obtinet corona fimbriata, ora rubenti, infra
quam circulus exalbidus, aliisque huic subiectus
luteus: sena in fistuloso canali stamina lutea, tria

modicè elata,
reliqua tantu-
lū apices pro-
ferentia. Figu-
ra nostra ex
emptiis non
placet.



Narcissum
suum medio
purpureum Do-
don. sic descri-
bit: Folia ha-
bet virentia o-
blonga, Porri
foliis similis
caulem angu-
losum, absque
foliis, dodran-
te aut pede al-
tiores, & in
summo florem
e membrana
erumpentem,

ut plurimum vnicum, subinde geminum, medio-
criter amplum, odoratum, ex sex candidis folio-
lis congestum, in quorum medio breui calix
est circinatæ rotunditatis, purpurei per oras co-
loris, intra quem stamina breuia, cum apicibus
subluteolis: capitula inde angulosa: semen in
his nigrum: radix bulbosa, quæ nucleos ex se
demittens, in multos faciliè bulbos multiplicatur.
Reperiuntur autem huius generis tres, forma,
colore, aut odore nequaquam, sed florendi
tempore, differentes: magnitudine etiam nonni-
hil, sed parum, dissidentes. Maiores medi: præco-
ces & serius prodeuntes, minores sunt. Narcissus
Dodon. gall. 2. flore singulari, in cuius medio: cir-
culus coloris pallidi aut herbacei cum fimbria
rubra. Eiusdem hist. fl. & in fol. Narcissus medio
purpureus, cui flos candidus, in cuius medio breuis
calyx purpurei per oras coloris. Narcissus Diosc.
Theophr. Plut. Sophoc. Apuleio, & Plinio. Nar-
cissus purpurei floris, cuius etiam Virg. in Bæcol.
Aegloga 5. & Theophr. 1. 7. meminit.

Trag. Narcissus Veterum, qui descriptioni Diosc.
& Serap. pulchrè responderet: flores nives in quo-
rum medio teres luteus ac eleuatus apparet cir-
culus, Lunâ quadam flammæ coloris circumda-
tus: Diosc. dicit nonnullos vocare Narcissum A-
nydron, alios Autogenes & alios Bulbon emeti-
con, alios Lirion, Romani Bulbum morbita-
rium, vel [ut alia legunt exemplaria] Vomito-
rium vocant.

Narcissus ille qui Trag. verus: Gesnero verò
potius Anemone Limonia videtur, quibusdam
Lilium Dina Maria dicitur. Lob. & Pen. Adu. Nar-
cissus medio purpureus Dod. Vulgariss. omnium Pœ-
ticus, cuius croceum florem videre est, foliis
mediam cingentibus albis, ut scitè canit Meta-
morph. estque idem Dioscor. Narcissus. Flores
candore micantes lacteo, corolla medium occu-
pante fimbriata ex croceo purpurascens. Obs.
Narcissus Poeticus mediocroceus & (vox, & su-
per flaua est) medio purpureus Dodon. Hisp. si-
rio blanco & Cebolina Adu. p. 50.

Clus. Hisp. Narcissus medio purpureus Dioscor.
qui nonnullis Narbonensis Galliz pratis spontè
prouenit. Idem Pann. & hist. post. Narcissum
qui medium calycem exiguum & planum, fim-
briaque

brigue rubente insignitur habet vnicum duraxat ferè semper, aut raro binos flores, eodem caule ferentem, Turce vocant *Deu bobini* vel *boini*, id est, Cameli siue caput nuncupant, quoniam floris collum longius quam ceteri Narcissi protensum habet.

Cur Frater separat Tragi & Lobelii Narcissum à Dodon. nondum animaduertere possum, nisi ea distinguens particula, Et postea, in Obloccasionem ei praeberet, verum superfluum esse satis apparet ex Lob. hist. Belgica & Plantini iconibus.

Narcissus verus non ita pridem vilis Trago fuit, primum namque è Burgundia in Germaniam deuenit, dein verò Bionti in orto quodam plantatus: Flores iustus Maii mensis emicant. Narbonensis, (tradente Lobel.) Gallique provinciae prata ornat Februario & Martio. Hortis Belg. Germ. & Anglicis inquilinus. Exeunt qui medio purpurei sunt (inquit Dodon.) plerisque Galliae locis, & apud Heduos ac Sequanos in Pratis. In Belgio prioris generis praecoces Narcissi florent Aprili. Circa Montipelum sponte Prouenit in pratis quibusdam. Idem passim in Germania habetur in hortis: Basileae habetur florens Maio in hortis. In orto patris mei vidi cum foliis sex ac etiam decem in vno flore. Genus florens in fine Aprilis. In Italia sponte prouenientem vidi. In Sabaudia sponte nascentem & Maio florentem inveni prope pagum *Cornuon* non longe à S. Mauritio. Mantuae in hortis. Bortaria in orto Principis ostendente Alois. Anguil. Montbelg. est mihi in orto Ill. E. C. Narcissus mediopurpureus maior, qui interdum fert duas flores ex vno pediculo.

NARCISSVS MEDIOPVRPVREVS magno flore: folio latiore.

Meminit Clus. hist. post. Narcissi lat. septimi, quem sic describit: Latiora reliquis folia, viridius ferè pallescentis coloris, inter quae satis prode *caulis*, nudus ut reliquis Narcissis, paullo infirmior, foris striatus, intus concavus, summa parte sustinens magnum, laxum, membranaceum folliculum, quo dehiscente exit vnicus, ut plurimum, *stis* magnus, odoratus, sex albis foliis medium calicem pallidum cingentibus constans, cuius umbra ex pallido purpureo: flori succedit satis exaltum triangulare caput, nigrum semine continens: *radix* crassior superiore & cum maiore illa, quam in Anglia sponte nasci dixi, comparanda, etiam soboles reliquarum Narcissarum, in hac, satis feliciter procreans.

È Syria allatum Dn. de Heusenstain dicebat: ferè etiam reliquis floret, nempe Maio mense. Id genus deinde satis frequens observabam Fracortortensis in hortis.

NARCISSVS MEDIOPVRPVREVS minor.

Spontè provenientem circa Blaumontium ardeem II. CEL. Wirt. observavimus Narcissum qui etiam in eius orto Montbelgardi & albis abundat flore omnibus partibus minore quam praecedentis, foliis eius angustioribus & acutioribus, tardius etiam florens. Clusio in Pann. pag. 276. mi fallor Narcissus *serotinus montanum*: & in post. hist. *Narcissus latifolius* 6. cui quaterni aut

quina Martio mense erumpunt folia, oblonga, angusta, inter ea deinde *caulis* nudus, mundus, intus fungosus, in cuius summo, è tenui membrana prodit, vnicus nonnunquam & alter, *stis*, sex



niveis foliis stellae modo decussatis constans, paruum calycem pallidum cingentibus, cuius orae rubella fimbria exornata, sex in eorum inaequalibus staminibus flavescens: flori suaviter odorato succedunt capitula, triangula, crassiuscula, in quibus nigrum inaequale semine: *radix* ut ceteris bulbacea, multis candicantibus tunicis con-

stans, externa, quae reliquas ambit, fusca, è cuius fissili parte plurimae subfuscae fibrae dependent.

Dodon. Gal. Dux species Narcissi planè similes Mediopurpureo, foliis, caulibus, semine & radice, nisi minores essent, & una altera citius floreret, & altera tardius. Item Hist. Lat. praecoces & serius prodeuntes minores sunt. Plant. icon. p. 113. *Narcissus minor serotinus mediopurpureus* T. 150.

Lobelius duas habet figuras sub eodem titulo, minor non placet, in Adu. posita fuerat pro Lillionatissolureo, verum apud Plantinum ademptus figura: unus è floribus. C. Bauhin. Phyt. *Narcissus* 5. siue *mediopurpureus minor*, quem Frater videretur separatè à Dodon. serius florente. Tabern. icon. *Narcissus serotinus albus*, *serotinus* spat *Narcissus* rōs lin. In hist. Narcissus 16.

Provenit magno (inquit Clusius hist. post.) miliari supra Garinga Charthuf. Monast. D. Virgini ad Thronum nuncupata, sacrum pratis quibusdam altissimo lacui vicinis ad praedium *zeta* Hoff dictum, in quo, curantibus Carthusiae moderatoribus, perhumaniter & luculenter excepti semper fuimus, dum in summa Berrens alben & Durrens in iuga tenderemus, aut ex iis iugis Garingam rediremus. Quo isthic tempore floreat, mihi non constat: Sed illa Viennam perlata, Maio mense in meo hortulo floruerunt: verisimile est autem natali loco serius florere. Memini & illi ferè similes in Euganeis montibus inuentos ad Studiosis ex Italia, reducibus Viennam ad me perlatos.

Narcissus medio purpureus minor & monstruosus.

In orto Bolleni apud fontem & Balneum admirabile, admodum proliferum observavi Narcissum stellatum cum minori corolla, rubente, monstruosumque suos exerente in hoc florum genere lusus. Inter alios verò in vno caule, quatuor flores gestabat, eisdemque omnes foliorum numero differentes, unus quidam vulgaris & sexifolius. Alter verò novem, tribus nimirum

proliferis: ac tertius decem, vno hunc excedens constabant. Quartus duplicem corollam, & præter duodecim in ambitum sed temerè disposita folia, gemina adhuc, cornuum instar sursum è medio terè floris prodeuntia, quæ duas illas corollas separant, habbeat, erat cæteris elegantior. Caulis non rotundus, sed latus ferè vnciam, densus aliquatenus, planus, & longus vt reliquorum, cum demum in quatuor diuidunt partes nodi illi, qui, vt in vulgaribus, paulò infra seminis repositorium vel capitulum adsunt, arida protecti cuticula.

*Narcissus parvus stellatus albus medio
suaue rubente vertice.*

Exoticus parvus Narcissus nouus stellatus albus medio suaue rubente vertice nondum Lob. Adu. p. 2. floruit, acceptus à N. de Quelt Botanico Lutetiano cum aliis Lusitanicis Narcissis bulbis.

NARCISSVS MEDIOPVRPVREVS
flore pleno.

Descriptio



Narcissus plenus quintus (Clusii in poster. hist.) è genere Narcissi mediopurpurei latifolii sexti qui ex laxo, membranaceo folliculo exit, proditque nouo Vere cum illo, foliis, aliisque rebus omnino similis, solum discrimen in flore est, qui sex quidem minutulis foliis latè expansis

constat, vt ille, sed in calice illo rubra fimbria ornato, alia sex folia paulò minora continet, singula peculiarem fimbriatum caliculum habentia, è quorum medio, aliquot alia minuscule folia staminibus permixta prodeunt: suauis admodum est odor, ad Mulcare quodammodo accendens. Singulares vt plurimum sustinet caulis flores, interdum etiam binos, vt qui simplici foliorum texturà constantem florem fert.

Locus & tempus.

Floruit mihi Maio mense anni 1590. præcedente Autumno à Io. Boissoro Bruxellis missus. Eodem tempore pro pleno etiam Narcisso accepi ab honesto viro Io. Mercurio Colonia bulbum, qui quidem sequente vere prodit & in summo caule vaginulam tulit: sed illa exarscens floris spem præcidit. At annis 91. planè similem superiori esse declarauit. Quo etiam anno mihi communicauit N. V. Philippus de Siruy, præfectus vrbis Montibus Hanoix, Narcissi bulbum, qui sequente anno florem tulit illis similem, sed viginti, & pluribus foliis constantem, intercurrente illa fimbriato calyce, vt iam dicto. At qui Ill. Com. de Arceberg floruit anno 1589. quatuor & sexagena folia habuisse scribebat ad me idem Boissor, & vnici bulbi, quem ab eodem

Comite impetrauerat, prolem superiore Augusto, cum aliis aliquot raris bulbaceis stirpibus ad me mittebat: verum tabellario, cui pyxidula, quæ inclusi erant, tradita erat Coloniam ferenda, in prædones incidente, cum illi adiunctis periiit magno meo dolore.

Dodon. lat. in fol. & de fl. *Narcissus purpureus floribus multiplicibus.* C. Bauh. Phyt. Habetur Patuui in horto Bembyano multiflorus polyanthes medio purpureus.

NARCISSVS FLORE SINGVLARI
albo pleno.



Narcissus plenus sextus albo flore, autore Clusii, post. videatur habere folia paulò angustiora (quàm quintus de quo proxime scriptum) alioqui non dissimilia, bis floris specimen, Viennæ mihi dedit, sed vitium fecit, Francofurti toto biennio folia duraxat nouo vere dedit: an id accidat, propter

fœcunditatem, proles enim singulis annis latè liberaliter subministrat, ignoro: at qui bulbum cum hac icone mittebat non, vir Iacobus Plateau, mihi significabat vnicum summo caule ferre florem sub Maii mensis finem, totum niueum & multiplici foliorum texturà constantem: huius radix minor est quarto genere.

NARCISSVS MEDIOCKROCEVS
tenuifolius.



Narcissus mediockrocei nomine à Lob. Adu. part. 2. pingitur planta singulati flore de qua tradit: In Londinensi suburbano hortulo honestissimi vici henrici Casabri egregii, florum & fructuum rariorum studiosissimi, Anno 1601. hunc indictum Narcissum in Belgio natum, obseruauit, palmaribus & quinque vinctalibus tenuibus, Hyacinthu Autumnalis foliolis, viridibus: Bulbo cæteroque

etque caule dodrantali & flore præcoci medietate, Narcisso non dissimili, minore tamen.

NARCISSVS MULTOS FERENS FLORES medioluteus Narbonensis.

Radice donatus est bulbosa satis ampla, nigricantibus aliquot tunicis septa, fibrisque multis capillata, intus omnino alba & si præcidatur, lentum quendam succum, ut reliqui bulbi exsillante, amara, unde *filia* producuntur Leucou bulbosi Exaphylli vel Porri solis ferè similia. Clusio virentia, longa: inter quæ emergit *caulis* unus, aliàs duo aut tres, caui, ltrati, nudi, vigentibus floribus, dodrantales, iisdem in semine abeuntibus plusquam cubitales, in cacumine ex membraneo inuolutro, *flores*, ex longis collis & pediculis triangularibus, promunt nouem, decem, vel duodecim, interdum duos duntaxat: Monspelii locis humidis [sed qui magnitudine paucitatem condensent, nisi forte alia species] pulchros, odoratos, quos constituunt folia sex, alba, Clusio



interdum *hexachia*, coronam luteam meditullium unde apices erumpunt ambiente. Semen nigrum, obscureum, rugosum, angulosum, saporis amari, in pericarpis minoribus quam Narcissi medio purpurei, Cardamomi minoris vulgò dicti, folliculis non multum absimilibus.

Lobel. &

Pen. Adu. & Obs. *Narcissus Medioluteus* Dodon. floribus senis, denis, duodenisque, minus candidis & circinnato verticis calveculo in luteum languescere. Galloprovinciæ, ubi gramine detrimento, *Donas* flores quos corollis innectunt, vocitat. Plant. icon. pag. 114. *Narcissus medioluteus Donas* Narbonensis. C. Bauhin. Phyt. *Narcissus* 7. siue *Medioluteus* tertius comoso flore. Tabern. icon. *Narcissus medioluteus* 2. *Narcissen rößig* *lan.* Et hist. *Narcissus* 7. qui nullam ponit descr. Dodon. hist. flor. & in fol. ait: *Narcissus medioluteus* alter siue tertius, foliis non modò quam primus (siue mediopurpureus,) verum etiam quàm *Asphodelus* latioribus longioribusque floribus in singulis caulibus quatuor aut pluribus candidis, minoribus, medio eorum luteo, calyce eminentiore, multò tamen quàm *Narcissi* lutei *filu.* breuiore: radix similis est & bulbosa.

De hoc scripsit Theophrast. lib. 6. cui latius, quàm *Asphodeli* tribuit solum. Scribit autem *Narcissi* florem esse luteum, siue melini coloris, quod de medio floris calyce accipiendum esse, Ouidii testimonio iam ostendimus. Florem etenim ait *Crocum*, albis tamen foliis cinctum. Exemplaria Theophrast. panè omnia *ultra* *72* *xxv* habent, quod Hermol. & Marcello occasio-

Tom. II.

nem dedit, ut *Narcissi* florem nigrum esse existimauerint, Sed pro *ultra* reponendum est *ultra*. Est autem Melinus color, idem qui ochra, siue luteus. Putatur autem & hic *Narcissus* ferotinus à Theophrasto haberi, & Autumno demum florere, propterea quòd in iis quæ extant exemplaribus, huius descriptionem mox subsequantur hæc verba: post *Arcturum* productio floris est, & circa æquinoctium. Verum ad *Narcissi* historiam hæc non faciunt: inter *Narcissi* siquidem descriptionem & verba ista, defectus achia-

Nascitur (inquit Clusius) plerisque Hispaniæ, quæ Mediterraneo mari obiecta est, locis, & omnibus ferè circa Mompelium pratis. Memini non procul Villà nouà oppidulo Magalonæ vicino, bulbum erui, cuius summus caulis decem & sex flores sustineret, ut merito *παλαιστρε* appellari potuerit. Illum in C.V. Guillelmi Rondeletii, apud quem vivebam, horto, terræ commisi. Floret in calidioribus regionibus mense Februario, eruiere memini etiam quoddam plantas Ianuario in pratis Boutoneto suburbano vicinis [ut interdum inter eiusdem generis stirpes alia aliis maturius geminat,] Apud Belgas verò non nisi Martio aut Aprili. Floret mense Februario, Martio & Aprili: semina durant ad Maium. Genæ florentem vidi in hortis in fine Aprilis. Patavii in horto publico cum multis floribus simplicibus, ut etiam floribus multiplicatis.

NARCISSVS PLVRES FERENS FLORES maiores præcocior medioluteus.

Narcisso (Clus. Hisp. & post. hist.) medio luteo (multos ferenti flores) similis inuenitur, paulò tamen præcocior, latioribusque foliis & amplioribus floribus, cui plerumque bini, terni, quaterni, aut ad summum seni supremo cauli inlident, Adfertur Constantinopoli cum plerisque aliis, & in scitilibus ut plurimum colitur, ubi floret Aprili, interdum etiam Martio, si Veris temperies paulò calidior fuerit, maior odoris fragrantia in hoc nares ferire videtur quàm in superiori: *Narcisso* latifolio Byzantino medioluteo 2. Hic *Narcissus* conuenit cum *Narcisso* medio luteo Narbonensi quæm diximus pauciores ferre flores, sed maiores. Huius [Byzantini] generis aliquot bulbos, *Narcisso* doppio nomine, mittebat ad me (inquit Clus. post. hist.) anno 1590. Ill. Heros I. Vinc. Pinellus, quos flores perlatus sperabam, sed subsequente Vereme mea spe frustratum deprehendi. Nā elegantes quidem flores habui, sed simplici sex foliorum serie constantes, superiore ampliores, omnino niueos, præter medium calicem flauum, odoris frangratissimi, septenos & plures summo caule simul nascentes: folia carinata, nec minùs lata habuit, quàm qui plenum fert florem, & crassiorum. Monitus autem quos miserat bulbos simplicem florem tulisse, aliis me impetruit minùs crassis, quorum flores, pleni fuerunt, paulò tamen minores *Narcisso* præcoco pleno flore.


Lobel. Obs. *Narcissus medioluteus species*, quam *Narcissum* præcoccum faciūt Herbarii peritiores Belgæ cum Clusio latioribus floribus & foliis. Casp. Bauhin. Phyt.

Narcissus 4. siue *Medioluteus* maior.

Ecc

NARCISSVS ALBIDVS MEDIOLVTEVS
cum aliquot floribus.

Descriptio



Plant. icō.
Narcissus albidus medioluteus T. 151. Lobel. Belg. witte droene Narcisse mit ein gelen crāg inr midde: prima species Narcissi medio lutei in Belgio foliis similibus valde candido Narcisso: caule maiore plerūque ferens flores 2. aut tres albicātes cum Corolla ochrē modo lutea.




Icon quæ apud Lobelium & Plantinum proponitur Narcissi albi nomine, eam Clus. in post. hist. posuit pro Narcisso latifolio, flore prorsus flauo: Dodon. histor. Lat. & de flor. Alter Disflorid. *Narcissus medioluteus* folia habet longiora quàm medio purpureus, latiora, & aliquantulum minùs virentia: caules pro-

ceriores, & in singulis flores 2. aut 4. prioribus similes: sed medio calyce luteo: semen & radicem bulbosam similia. C. Bauh. Phyt. *Narcissus* 6. sine *medioluteus* alter. Tabern. icon. *Narcissus medioluteus*. *Narcissen rōslein*. Et hist. *Narcissus*, 6. Tabern. mutauit figuram Lobelii non indicans quare non describit, ea quæ à nobis ponitur est ex iconibus, quas iam sculptas emimus. An Clusio *Narcissus præcox* simplici flore: foliis florum. *Narcissus*, de quo ante, de *Narcisso* flore medio luteo Naibonenfi.

NARCISSVS MEDIOCROCEVS
serotinus cum aliquot floribus.

Descriptio Plant. icon. *Narcissus mediocroceus* serotinus polyanthos. Lob. Belg. Gemeine wittesparde bloeynde Narcisse met veel bloemen. Foliorum latitudo & magnitudo eadem cum magni Narcissi lutei Hispanici, sed obsecutiùs virentia: Maio profert flores 2.3. vel quatuor pulchros,



magnos ex uno pediculo, qui constat plerumque foliis 6. & interdum 7.8. & 9. vt videantur flores pleni. Considerandum an hic Lobelii sit ille qui à nobis traditur sub *Narcisso medioluteo* cū duobus aut tribus foliis & quem in horto habemus de quo paulò post.

An Dodon. in fol. Alius

Narcissus tertius, est foliis non modò quàm primus (qui medio purpureus,) verum etiam quàm *Alphodelus*, latioribus, longioribusque, floribus in singulis caulibus quatuor aut pluribus candidis, minoribus, medio eorum luteo, calyce eminentiore, multò ramen quàm *Narcissi* lutei strobiliore: radix similis est & bulbosa.

De hoc ita Clus. hist. post. Nascuntur *Narcissi* quibus latiora folia & flores simplici foliorum textura constantes, in Belgicis & plerisque Germaniæ hortis: de quibus consulenda Clusio Dodon. & Lob. obser. Illud autem dicendum putauit, Maiorem illum amplis foliis, & in eodem caule binos vt plurimum, interdum ternos & quaternos flores magnos sustinentem, sex foliis albis constantes, & pallidum calicem cingentes odoratos, [etiam qui & duodenis foliis constarent,] in Anglia spontè nasci, à viris huc dignis intellexisse.

An Matth. G. & Lat. cum magn. fig. *Narcissus*. Et Ital. *Narcissus* 8. Figuram non artificiosam ponit Matth. sine descriptione, more consueti. Casp. Bauh. *Narcissus* 3. siue *medioluteus* pluribus floribus Matth. Lat. & ic. 4. *Narcissus* 1. Tabern. icon. *Narcissen rōslein* *Narcissus* 9. Matth. Et hist. *Narcissus* 12. Matth. 9.

Hic *Narcissus* fortè est qui prouenit in nostro Ill. E. C. horto Montbelg. cui interdum flores iunguntur cum pediculis suis, duo vt videntur pleni.

NARCISSVS MEDIOLVTEVS
Pisanus plures flores ferens.

Plant. icon. p. 115. *Narcissus medioluteus* Pisanus ex Italia delatus. Hæc icon Lobelii est posita à Clusio post. pro *Narcisso* latifolio flore prorsus albo secundo, de quo postea ex Clusio agemus. Lobel. hist. Belg. *Narcisse* in de middel geel von Dise ghebredt, *Narcissus medioluteus* Pisanus ex Italia delatus: Herbarii Belgæ cum nostro Clusio faciunt speciem præcedentis *Narcissi* nò pè mediolutei *Danais* dicti: latiora habet folia, & flores multos valde pulchros, cum corolla lutea in medio, paulò minores quàm in luteo, & color viuacior, missus Pisa, quidam dicunt Constantinopoli delatum.

Dodon.



NARCISSVS ÆGYPTIVS.

Descriptio

Narcissus [auctore Lobelio Adu. p. 1. d'Argers ab aliis Aegyptius nuncupatus, erutus ab eodem N. le Quel in Lusitania, propè D. P. r. Bulbo Narcissi mediolutei Narbonensis pari & simili, sed externis inuolueris nigrioribus. Flores, caulis, folia, Narcisso Pilano similia, sed flores varietate, quemadmodum Vere elapso annotauimus Londini in horto Nobil. Barons Zouche, aliis minoribus, rotundioribus, & veluti decurtatis: aliis verò vnâ pluribus & longioribus.

NARCISSVS CVM PLVRIBVS FLORIBVS
plenis corolla lutea.

Descriptio



Lationibus [inquit Clusius] folijs, quam primus simplex [nobis Narbonensis dictus] & quodammodo carinatis, ternis aut quaternis, caulis striatus, nudus, iuncus concavus, ut in superioribus, pedali altitudine assurgit, qui è membranaceo folliculo summo caulè insidente, ternis,

nos, quaternos aut plures (nam memini in hortulo meo Viennæ florere qui septenos habuerit) flores promit, senis albis, amplisque folijs, ut prioris simplicis tertium genus, constantes, quibus pro calyce sex alba alia folia sunt, minora tamen & flauo calicis fragmentis sic interfecta & diffundita, ut nulla calicis forma appareat, sed veluti apophysis flaua ad singula interiora folia adnata videatur: odoratissimus est ille flos, & grauedine quadam caput tentas: nullum semen in hoc genere obseruavi: radix interdum crassissima, multis spadiceis tunicis septa, & frequentibus fibris donata.

Tom. II.

Clus. Hist. *Narcissus flore multiplici*, & hist. post. *Narcissus plenus flore*. Hunc Lobel. Obs. describit his verbis. *Narcissus albus Polyanthus*. Chalcedonicus elegantior, hilarior & rarior. An *Narcissus* 8. Matthiol. non descriptus? in deliciis habetur: floribus multiplicibus & foliis aspectu iucundis, nucis, peramoenis: corona media lutea orbatis: cuius vicem multiplex florum forma supplet, quodam tamen lutei specimine permixto inter foliola dispersè adseruato. Plant. Icon. *Narcissus albus polyanthus*, siue Chalcedonicus elegantior, & rarior multiplex. Dodon. hist. fl. & in fol. inquit. Sunt & *Narcissi* multiplicibus floribus, cum primi (mediopurpurei) tum alterius generis (mediolutei) folijs & bulbis haud dissimiles. Eandem figuram habet cum Clusio & Lobelio, nostra figura non placet, est ex iis quas iam sculpeas emimus.

Narcissus exortens siue Constantinop. plenis floribus fragrantiss. qui primo suo anno ex Italia allatus [inquit Camer. hort.] floruit (Norimbergæ) sed postea idem bulbi nunquam, quamuis viret, & multa prole quotannis auferentur, florum præbuerunt. Turci vocant *Gul catamer late*. Et apud Matthiol. Germ. *Narcissus* 2. flore pleno, qui facile perit. Item in Epit. *Narcissus* 2. non differt à priore neque facie, neque viribus, quos admodum speciosos proponit, candidos quoque, sed quorum medium habet foliola. Miror ita similem facere Camerarium *Narcissum plenum* Camer. Matthiol. cum *Narcisso mediopurpureo*, à quo non solum florum plenitudine differt, sed etiam florum numero, cumque porius sit ex genere mediolutei, demonstrante ipsiusmet figura ex Matthiol. Idem hor. *Zirimada Catamer* floribus albis ex Constantinopoli.

Casp. Bauhin. Phyt. *Narcissus* 13. siue albus flore multiplici. Matth. in Dioscor. c. 11. inag. fig. Lat. lib. 1. *Narcissus* 2. Item *Narcissus* 8. In Ital. cap. 162. *Narcissus*. Item *Narcissus* 2. In hist. Germ. lib. 4. c. 141. *Narcissen rößlin* 1. siue odoratus *Narcissus*. Tabern. icon. pag. 501. & hist. p. 1. Gesfult *Narcissen rößlein*, *Narcissus* 1. Polyanthus Matthiol. Item icon. p. 604. & hist. p. 302. *Narcissus* 3. Matthioli 1. (Matth. 1.)

Bizantio singulis annis Clusio Viennam mittebatur.

NARCISSVS AMPLO FLORE, CO-
rona aurea plena.

Describi. D. scriptio
Deur à Clusio hist. post. *Narcissus pleno flore* legendus, qui folia, bulbum, caulem priorem [pleno] adeo similia habet, ut neuter ab altero discerni queat, soli flores discernere faciant, qui etiam è vaginula summo caulè insidente, emergunt terni aut quaterni, priori


E c s 2

magnitudine æquales, senisque foliis albis constantes, ampium aurei coloris calicem cingentes, adeò multipliciter, mirumque in modum implicatum, ut Leucorii flauo polyphyllum florem saturiore: n quodammodo æmuletur: odor perinde suavis ac in priore.

Clus. duntaxat in horto Generosæ Domine Vngnadin conspexit anno 1588. præcedente anno Byzantio illi missum.

NARCISSVS MINORE FLORE corona tota lutea.

Descriptio



Narcissum quendam pleno flore, sic describit Clusius hist. post. Folia & reliqua omnia superioribus (duobus plenis) ferè similia habet, paulò minora: flores in hoc etiam minores, ex albis foliis constantes, medium calycem flauū & plenum habet, emicantibus è medio oblongiusculis angustis

foliolis stellatim quasi decussatis, albi quidem coloris, sed cui & viridis foris, & pallidus interiore parte permixti sint, odor ferè qualis in priore, sed nescio quid magis aromaticum spirans, medium inter Narcissi & muscari odorem.

Clus. Pann. *Narcissus pleno flore, Narcissus minor* siue multiplex. In hist. post. *Narcissus pleno flore tertius*. Plant. ic. p. 15. *Narcissus albus alter, media simbriata lutea multiplici corolla*. T. 152. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 9.* siue albus corona multiplici lutea.

Descriptio

Habui [inquit Clusius] munere Philib. de Bruxellis Carl. dapiferi, cum plerisque aliis bulbis sub anni 1575. initium, eodem quidem anno & sequentibus folia produxit, at nullum florem: toto anno 1579. latuit, ut periisse existima-uerim. Anno subsequente Martio denuò prodit, & Aprili ternos flores, quales modò descripsi tulit: & proximo subsequente anno plures dum in Anglia peregrinaret, referentibus domesticis. Florent etiam superiores Aprili. At huic antè hiemem folia emergere non solent, sed nouo Vere duntaxat, eo videlicet anno quo florem dabit. Nam si ante hiemem illi prodeunt [rarissimè id fit] proximo anno non florebit. Sæpe etiam in reliquis præcocius Narcissis qui Constantino- poli mittuntur vel pleno flore vel albo medio luteo, accidit ut sterilitatis indicium sit si folia ante hiemem emerferint.

Narcissus Constantin. quem Ziden sari vocant. *Narcissus Constantinopolitanus* quem Ziden sari vocant ab amico ex illis locis [Camer. horri] transmissus bulbo anguloso, tunica tenui, nigra, vestito. C. B. Phyt. *Narcissus 12.* siue bulbo angulo- so.

NARCISSVS CVM PLVRIBVS floribus totus albus maior.

Narcissus latifolius Clus. totus albus priori (Narcisso medio luteo Narbonensi) formâ non dissimilis: folia habet terna aut quaterna, viridiora paulò iam dicto, longiora & angustiora: è quorum medio exilit caulis latiusculus, angulosus tamen & concauus, cui insident seni, septeni, interdum deni flores prioribus similes, sed oblongiores paulò, & omnino niuci, quorum vi-

Descriptio

delicet calyx ille medi[qui priore flauus] etiam albus est, odor priori similis, ut etiam radix.

Clus. Hist. *Narcissus totus albus prior*. & hist. post. *Narcissus lat. simplici flore prioris albo*. Hist. *Lilio blanco & Cebollinas*, quibuldam etiam *Narcisso de Semilla*, id est Hispalensis *Narcissus*, quòd à me primùm po-



stea aliis inde sit missus. Hæc planta ex illorū numero est quas stirpium Historiæ Lugduni expressit: auctor Dodon. tribuit & ab eo me tempus scribit. Ego verò non modò hanc, sed plurimas alias Dodonæum à me habuisse assero.

Lob. obs. *Narcissi mediolutei varietas, Narcissus totus albus*. Hist. *lanquillos blancos*. Belgicis hortis inquilinus factus opera Clusii. Plant. icon. *Narcissus totus albus*. Dodon. hist. fl. & in f. *Narcissus totus albus* siue quartus antedictis formâ similis, sed per totum florem & medio quoque candidus. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 10.* siue totus albus maior. An Camer. horti: *Narcissus albus maior*. Tabern. icon. *Narcissus albus weiß Narcissen roßlein*. Et hist. *Narcissus 5. albus*. Item Icon. *Narcissus nicens serotinus, weißpat Narcissen roßlein*. Frustrà nonnihil figuram mutauit neglecta descriptione. Hinc quis sit & loco positus nescio, cum eius tantum meminerit titulo tenus.

Illius nec capita neque semen obseruare potuit Clusius, nam Ianuario extremo nascentem pingui solo nonnullis Luitanix & Bæticæ locis & viginosis, multaque aqua stagnantibus, cum florentem obseruabat: 1585. tum etiam Februarii initio in summa Caipe eruebat duntaxat. Eius aliquot bulbi in Belgicam missi nondum flores tulerant octennio post.

Locus & tempus.

NARCISSVS FOLIIS CANDICANTIBVS cum pluribus floribus totus albus minor.

Narcissus totus albus alter superiore minor, firmioribus magisque candicantibus foliis, qualia ferè sunt in Narcisso marino qui Narbonensibus

mentibus Scilla sine Pañeratum dicebatur, caule breuiore, & binos, ternos aut quaternos duntaxat flores proferente. Ex Hispania (inquit Clusius) post meum reditum missus, reliquis Narcissis ferius, hoc est, Maio, Bruxellæ in quibusdam hortis floruit.

Clus. Hisp. Narcissus totus albus alter, Hisp. *Inquillos albus*. In post. hist. Narcissus latifolius niueus alter. Lobel. Obs. Narcissi mediolurei varietas, Narcissus totus albus paucioribus floribus & folia albido, rigidoque, Belgicis hortis inquilinus factus opera Clusii. C. Bauh. Phyt. Narcissus totus albus minor paucioribus floribus. An Camer. hort. Narcissus albus minor: In Clusii icone, plures duplò appinguntur flores, quàm tradat hunc Narcissum ferre, nempe octo. Huius icon est posita inter Icones Plantini pro Narcisso mediolureo Pisano ex Italia delato Teut. hist. Lobel. de quâ hic antè.

Narcissus niueus latifolius Byzantinus.

Descriptio Narcissus latifolius niueus tertius Byzantio, Clusio Hist. post. allatus 1587. sequenti anno *folia* dedit primo generi similia: *caulem* inter folia emergentem, pedalem, qui ternos & quaternos flores dedit eiusdem cum superiore magnitudinis, huius prorsus coloris, id est, calice etiam niueo, è quibus emergebant sona stamina, terua aliis longiora, flaua. Alius præterea aded illi in omnibus similis, ut vix quispiam discernere potuisset, nisi differentiam fecissent flores illo minores, & frequentiores in summo caule nascentes, odorem & fragrantiam lasmin præferentes: huius *femen* in trigonis capitibus conclusum, nigrum, inæquale: vtriusque *radix* minor paullo priore, & nigris tunicis sepra, *Zerincada catamer bianco* nomine missa fuit, ut & quinquennio antè: Floruit Maio mense.

Narcissus latifolius flore prorsus flauo.

Descriptio Narcisso latifolio flauo flore, siue quarto Byzantio *Zerincada catamer sari* nomine, Clusio allato, *folia* sunt proximè descripto similia, *flos* in illo variat, nam vel totus flauus est, vel omnino pallidus, præter calicem qui in hoc planè aureus est: *femen* in trigonis capitibus Narcissinum, inæquale, nigrum: *radix* tunicis spadiceo coloris tecta. Icon à Clusio apposita eadem est quæ apud Lobelium in Obs. Teut. siue Belgicis pag. 171. & Icon. Plantini p. 114. ponitur pro Narcisso albo medio luteo.

Narcissus pallido flore medio aureus.

Descriptio Tradit Clus. post. Hist. Narcissum pallidum flore medio aureum siue quintum sibi missum 1596. Hispali per D. Simonem Touar Hispalensem Medicum: cuius *bulbus* satis crassus erat extremo cortice, spadiceo colore præditus, qui Ianuario sequente, quaterna protulit *folia*, lata, & quodamodò carinata, ut præcederent aliquot, viridia, cubitalis longitudinis, inter quæ prodijt cubitalis aut altior, deinde duorum cubitorum altitudinem superans *caulis* (quam in reliquis Narcissorum generibus obseruare non memini) viridis, striatus, intus cauus, summo fastigio sustinens membranaceum quoddam inuolucrum, è quo exhibant suis petiolis innitentes *flores*, quini, seni, septeni, aut plures, senis foliis, instar aliorum Narcissorum simplici foliorum texturâ constantium

Tom. II.

præditi, coloris flauo, nonihil quidem pallescens, floridi tamen, quorum medius calix aureus, suauis valde odoris. An porro prolificum *femen* daturus sit, adhuc ignarus sum, quandoquidem eo florente eius historiam concinnabam Martii initio, ut is annus valde præcox fuit, nullâ, aut perquam exiguâ præcedente hieme, quæ demum extremo Martio valde aspera fuit, & multas stirpes corruptit. Non multum dissimilis erat, qui anno 1586. mihi floruit à Io. Boissot præcedente Autumno acceptus, quem Ferrariâ allatum scribebat. Mitit & alium cuius florem ex pallido virefcere aiebat, calicemque angustum flauum habere sed vtrumque bulbum corruptit hiems illa rigida subsequens.

Narcissus totus luteus foliis angustis Thracicus.

Iam inuenitur (teste Clus. Hisp.) & alius ex Thracia primùm delatus *foliis* siquidem Narcisso toto albo similibus & angustis, sed *flore* omnino luteo aut luteo aut pallido, odoratissimo: *femine* Narcissino simili, *radice* plerumque minore tunicis coloris spadiceo tecta. Sed qui pallidus est, coliculus medium planè aureum vel medio luteus, *radicem* æquè crassam, & folia non minùs lata, habet. C. Bauhin. Phyt. Narcissus 17. siue totus luteus.

NARCISSVS IVNCIFOLIVS flore luteo.



Cubitalis

Chuc can- *foliis* nudus, tenuis, in cuius cacumine desinens vericulus membranaceo, flores emicant, in meo quidè horto bini, alias plures, pediculis sextantibus, Narcissi vulgaris floribus similes, at minores è senis foliis radiatis totis luteis compositi, quo etiam eplote præditus est non tantum tubulus oblongus, sed & mediū florem cingens corona. *Caulem* comitantur *folia* pauca angusta, tenuitate & virore iuncea. *Radice* habet bulbosam fibratam.

Lubet hic subnectere Clusii similia Narcissorum descriptiones: Bina aut terna sunt oblonga

ga folia, angulosa, carnosa & pene rotunda, iunctis viridioribus & medullosis, lzuore coloreque quodammodo similia, nec minus flexibilia, inter quæ medius exilit caulis, rotundus, canus, nullis ornatus foliis, in cuius summo, ex tenui quodam membranaceo inuolucro, flores terni, quaterni, aut quini prodeunt oblongi [gemelli interdum] forma Narcissinis similes, odoratiores eo qui medio purpureus est, flauo omnino, hoc est tã interiori calice quàm ambientibus eum foliis, quæ vel mucronata, vel mucrone nonnihil orbiculato conspiciuntur: his succedunt triangula capita obtusis angulis, vt reliquorum Narcissorum, nigro & anguloso semine plena; minore tamen quàm aliorum: radix etiam minor, candida, nigricantibus membranis tecta. Istius genus inuenitur minus, gracilioribusque foliis, cauliculis e medio prodeuntibus pusillis, vnicum plerumque aut alterum florem duntaxat sustinentibus, flauum & odoratum vt alterius, sed foliis constantem firmiteribus & magis orbiculatis. Narcissus iuncifolius alter. A similitudine quam eius folia cum Iuncis habent *Jonquillos* vocant, hos Narcissum iuncifolium luteum dicere possumus ad differentiam alterius qui ex Thracia latiore folio defertur. Et hist. post Narcissus 10. seu angustifolius 2. & iuncifolius primus & 2. minor.

Bulbus vomitorius
negatur esse
Dodon.

Dodon. Bulbus vomitorius esse contendit: quo autem argumento ipse & reliqui qui eius vestigia sequuntur, id probare possint libenter intelligerem: Lobel. & Pena Adu. *Narcissus luteus Africanus*, an Bulbus vomitorius? Item Obs. p. 62. *Narcissus luteus iuncifolius præcox*. An bulbus vomitorius? Ibidem *Narcissus iuncifolius serotinus paucioribus foliis & floribus duntaxat diuersus*. Et p. 462. append. *Narcissus iuncifolius flore rotunda circumscriptis roseo reddenda*. Obs. p. 62. In horto C. D. Martiæ de Dorimont & D. Aluari Nonni alitur Narcissi iuncifolii genus serotino Narcisso per omnia simile: sed flos rotundior est & latior. Sed & Hist. Belg. p. 157. *Narcisse non der friden*. Narcissus iuncifolius præcox. Adhuc Gele spade *Narcisse met biese bladero*. Narcissus iuncifolius. Rursum p. 158. *Jonquilles met ronde bris de bloemen op de vyse van enckel Koostons*. Iu. iuncifolius flore rotunda circinitatis roseo. Et Alder meesse *Spanische Jonquille*, Narcissus Hispanicus iuncifolius quem &c.

Plant. icon. p. 17. Narcissus iuncifolius serotinus Lob. 62. T. 158. Et p. 124. Narcissus luteus Africanus præcox, an Bulbus vomitorius? Camer. horti. Narcissus iuncifolius maior & minor odoratissimo flore, vterque hyemis ætioris impatiens. Dodon. in fol. Narcissus iuncifolius maior & minor vterque Belgis hortensis est Diosc. est *Bulbus vomitorius* sine bulbus vomitorius. Tabern. icon. & hist. *Narcissen Roßlein*. Narcissus. 8. iuncifolius. 5. Et Narcissus 9. iuncifolius. 2. Item *Großgeel Narcissen Roßlein*. Narcissus 10. roseo luteus maior. Et tandem *flein geel Narcissen Roßlein*. Narcissus 11. roseoluteus minor.

Tab. vel eius Cõpilator de iuncifolius Narcissus duobus primis obiter ex Clusio pauca proponit, de duobus cum roseo flore nihil: figuras duas mutat nonnihil, sed meliores non reddit, tantum vt persuadeat ignaris ad vitas plantas paratas figuras: Cur duos roseo-luteos tradat non video: nec scio vnde desumpserit figuras cum nihil iuncis demonstrat in foliis, nec in floribus accedunt iuncifolio roseo Lobelii, cui flores duo ex vno pediculo, non soli ac etiam multum diffe-

rentes: plane hoc loco Matthiolum cum suis figmentis imitatur, nec satis mirari possum aliquem extraneum qui velit stirpium peritus esse, & eius natiis & figmentis patrocinari, ac ita veritati fucum facere.

C. Bauh. phyt. Narcissus 23. siue iuncifolius maior, Clusio prior, Lobelio Africanus. Narcissus 24. siue iuncifolius luteus minor. Lob. serotinus: Alterum diceremus (inquit C. Bauh.) apud Clusium nisi diceret hunc multo pluribus esse foliis monente etiam Lobel. Obs. p. 62. Item Narcissus iuncifolius flore rotundo, Lobelio roseo, huius maior & minor datur species, quarum Tabern. duas icones proponit nomine Narcissi roseolutei maioris & minoris. *Nastenus C. Bauh.* Sed dicquæso Tabern. vbi vidisti tales duas plantas, phantasticæ sunt icones imaginatarum plantarum, dignæ quæ iungantur multis Matthioli figuris.

Prior sponte nascitur in montanis pratis non procul Toletis, & circa Guadalupe. Posteriorem viginos inter Hispalim & Gades locis cum ipso flore eruebat Clus. Ianuario mense, at in Belgicis hortis neuter nisi Aprili floret, vel etiam Maio, licet interdum denud paulo ante brumam si initior sit aeris constitutio. Ex Bona, & Argertia (Chartaginisque finitimis locis Africa affertur: Non procul præterea Agathensi sinu affertur inueniri, etiamque ex Hispanicis nuper in Belgium & Franciam delatos audimus. Narcissus iuncifolius prior flore luteo, mihi in horto Ill. mei Princip. ex bulbis Struckardis missis, florens Aprili, hiemem apud nos facile profert.

Locus
Tempus

NARCISSVS IUNCIFOLIUS flauus amplo calyce.



Narcisso 9. seu angustifolio 1. Clusii in post. hist. bina aut terna sunt folia, pedalis aut maioris. longitudo, crassa & succulenta, instar foliorum Narcissi præcedentis tertii minoris, sed angustiora, & quodammodo media inter illa, sequentis iuncifolii maioris folia, carinata tamen & viridi colore

prædita proximè ad iuncifolii Narcissi foliorum viriditatem accedente. prodeunt inter folia caulis gracilis, instar eius qui subsequitur firmus, pedalis longitudinis, qui summo fastigio ex membranaceo folliculo, binos aut ternos flores promittit valde elegantes, maiores & laxiores quàm reliquorum Narcissorum iunceo folio, sex prædictos foliis flauis, quorum mediū occupat calix maior quàm in villo Narcissorum genere, semine namque longus, & per oras veluti sinuosus, paulo saturioris lutei coloris, continent breuia sex stamina flaua, apicibus aureis prædita, & stilum flauum extrinsecus parte

crassiores: odoratus est is flos, perinde atque Narcissi iuncifolii flores. radicem habet Narcissi sequentis bulbo aequali.

An Camer. hort. Narcissus luteus Polyanthos, id est, plures vno caule flores gerens fidei asserendus, brumæ sicutia impatientiss. Lob. Adu. par. 2. Iuncifolius Narcissus amplo calice flore luteo siue primus Clusii, è montibus D. Iacobo Gallæcie vicinis à Nic. le Quest ad nos deuectus. Iuncifolium Narcissum magno calyce luteo ad me misit, C. V. D. D. Kirch. Belleual. horti medici primus instructor in alma Monsp. schola.

Clusio demum conspectus est hic Narcissus anno 1595. Aprilis mensis suis floribus onustus apud Theod. Clurium Acad. horti præfectum Lugduni Batavorum, quo anno bulbi ipsi communicati, cum ab illo, cum à Cornelio van Hille Eccles. Rotterodamensi.

Narcissus iuncifolius minor flore pallido.

A Venerio accipiebam (inquit Clusius Hist. post. par. 2.) Narcissi iuncifolii alterius bulbos, qui minor ad aliorum differentiam vocari poterit. Prodebat is Narcissus, ex bulbo aliorum Narcissorum iuncea folio bulbis formâ non dissimili, valde tamen pusillo, quinque aut sex folia angusta quidem illa & iuncea, aliquantulum tamen planiora, dodrantem aut pedem longa, non nihil procumbentia, viridia: inter quæ prodibat vnus aut alter caliculus, gracilis, nudus, viridis, pedalis longitudinis, summo fastigio gestans folliculum membranaceum instar aliorum Narcissorum, e quo exiliebatur vnus aut alter flos longo pediculo innixus, formâ iuncifolii vulgaris floribus similis, sed paullo minor, sex foliis pallidioribus constans, cum medio calyce flauo, maiore aliquantulum & magis patente, quam in vulgaris Narcissi iuncifolii flore, è cuius umbilico pallidula breuiusque staminula emergebant, medio stilo prominente: odoratus quidem est flos: paullo tamen grauior est eius odor quam vulgaris iuncifolii. Florebat Aprilis. Spontè nasci in illa Gallie parte scribebat, quæ vulgò *Rouergue* nuncupatur. Congener cum Narcissis iuncifolius Hispanicis videtur Lobel. Adu. 2. Iuncifolius Narcissus erutus è Gallia præfectura Rouergue vernaculè vocata, & missus Burdegalo à D. Iacobo le Venier, qui nullos tractus Pyrenæorum montium vicinarumque regionum singulis annis sedulo non perlustrat.

Narcissus vernus præcocior flauo flore.

Nos iungimus Narcisso latifolio Indico alium propter similitudinem iconæ (qui potuisset etiam poni post Colchicum flore luteo quorundam,) quæ Clus. in Exot. pingit & vocat Narcissum vernum præcociorem flauo colore, ac sic describit: Narcissus genus reperitur ineunte Vere flores produciens, præcocius nouum, in his præteritis regionibus: mihi certe ante annum à Christi natiuitate 1600. videre non cõtingerat: propterea eius historiam & æconem dignam iudicabam quæ in hac append. adponeretur. Prodebat autem ille Narcissus quaternarius aut quina folia aliorum Narcissorum instar: plana, digitum pænè lata, lurrecta, viridia, Narcissi medio lutei foliorum æmula, inter quæ prodibat caliculus fere dodrantalis, planus, non valde firmus, levis & enodis, sustinens summo fastigio membranaceum folliculum, reliquorum Narcissorum modo, e quo emergebat vni-

cus flos coloris flauo, Narcissi Autumnalis maioris flauo flore præditi formâ non valde dissimilis, sex etiam foliis constans sescunciam longa, sescunciam latis, mucronatis, quorum terna interiora paullo longiora erant externis, totidem ex umbilico prodeuntibus staminibus candicantibus in flauum apicem desinentibus, atque illorum quidem tribus breuioribus quam cetera, cû medio stylo omnibus staminibus longiore radicem habebat crassam, rotundam, è multis iunicis constantem [quarum internæ albæ, externæ verò ex spadiceo nigricantes] & infimâ sede multis fibris præditam.



Præcox erat hic Narcissus nam quum eius bulbum ab Ill. viro lo. anne Vincentio Pinello missum Patavio sub initium Nouembris anni à Christi natiuitate 1600. accepissem, illico in fictili terræ committebatur, ut à celi inclementia per hiemem facilius præseruare possem: atque insequen-

te Februario florem producebat, & illum quidam nullâ odoris gratiâ præditum: quod an acciderit, quia liberum ærem non habuerit ignoro: nâ diligentius obseruare non licuit, propter subsequenti anni hiemem asperiores, quæ plantam prorsus corrumpebat: tum quia aliam similem postea narcissi non potuerim, tamen summam diligentiam non semel adhibuerim.

Narcissus flore caruleo.

Narcissus flore caruleo ex Hispania Clus. Panmi per Regis hortulanum missus. C. Bauh. Phyt. Narcissus 28. siue flore caruleo Clus. Lobel. & Pena Adu. Narcissus purpureo caruleus: Quibus asserunt non postremæ fidei amici se nactus totis floribus purpureis Narcissos prope Lanum fluvium, non procul Monspelio, quos tamen diu, sæpèque inibi & aliis adiectis pratensis frustra venati sunt, ac studiosos simplicium & præceptores suos, ut indicarent, rogauerunt. Monuit quidem Malachias Bernardus Med. Doctor Lobel. Adu. par. 2. se in horto D. Quintini Narcissum hunc solo flore caruleo à Mediocrocep diuersum collegisse.

NARCISSVS INDICVS LATIFOL.
rubro flore.

Elegantis Narcissi (inquit Clusius hist. post.) (qui inter eos qui latiora habent folia & erit) flos cum aliquot foliis mihi mittebatur à D. viro Bernardo Paludano qui Indicum cognominabat: ego eius historiam pro meo modulo ita cõcinnabam: Sena vel plura habet is Narcissus

Ecc. 1



lia, Narcissi vulgaris foliorum instar longa, ad quorum latus emergebat *caulis* laevis & enodis, intus concavus, summo fastigio in nodum desinens, membranaceum quoddam involucre purpureo coloris sustinentem, e quo vnicus flos sese exerebat sex longis & angustis foliis constans. qua-

lia ferè in Narcissi Autumnalis minoris (de quo cap. 16. huius libri) flore conspiciuntur, non ita tamen, ut illa, verum rubri saturi & splendentis coloris, instar floris Arundinis Indicae vulgò appellatae, cui non valdè dissimilis est, e quorum medio prodibant sex *stamina* eiusdem pene coloris, oblonga (quibus insidebant apices fusci coloris quia forsitan ex attritu corrupti) & medius stilus, sub quo rudimentum triangularis capitis, quod haud dubiè *semen* dedisset, fortè etiam maturum, nisi ipse florem præcidisset, ut mihi conspiciendum præberet: *radicem*, Paludano referente, habet bulbaceam, Cæpis vulgaribus rubentibus prorsus similem. Vnicam autem eius plantam habebat, ipsi missam ab Eruditissimo D. Simone de Tovar Hisp. medico, quæ florem dabat Iunio 1594. alterum expectabat sequente mense quoniam præcedente anno eadem planta bis illi florem protulisset mensibus Iunio & Quintili. At anno insequente, ex Indice Tovarici horti, & Epistolis quas ipse Tovar ab me deinde scribebat cognoscebam Narcissum Indicum Iacobum ab ipso nuncupatum.

Narcissus Indicus, Iacobus mihi indigitatus, ut scribit in epistola Cal. Iunii 1596. ad me data ex Occidentali India [ubi Azcal Xochilt, quod est Bulbus flore rubro, vocatur] nobis delatus: nulli rei herbarie Scriptori hæcenus, quod sciam, notus, cuius radix bulbosa, Cæpe rotunda similissima, verum supernè tunicâ pullâ: folia primum emittit crassa, oblonga, Narcissi marini, tibi Hemerocallis Valentina dicti, æmula: secundum folia verò, atque ad eò ex latere, pedalis & longior etiam emicat caulis, plerumque vnus, aliquando verò & alter, nonnunquam, pariter, [quanquam hoc rarò] interdum successivè, dilutè rubens, compresso tamen stilo, cauus, & interius subalbidus, qui in membranèam desinit vaginulam saturatè rubentem, & ad extremum acuminatam fissamque, e qua flos vnicus erumpit, oblongus, pediculo nixus viridiore, qui deorsum inflexus & veluti procumbens (ut in Leucio bulboso vel Lilio rubro, tamen non aequè nutans,) sex munitur foliis eleganti minù colore rubentibus, tribus superioribus: totidem inferioribus: quorum quod è superioribus mediù est, surrectius eminet: reliqua duo ad latera à medio reflectuntur: inferiora autem deorsum curvatur, cunctis, ita coccinatis, ut ensis etiam rubri, qui ab ordinis S. Iacobi Equitibus in veste gestatur, for-

mâ valdè referat, vnde Iacobus cognomen ipsi à me inditum. Sunt porro in hoc elegantissimo flore *stamina* septem similiter rubra: quoru[m] mediù aliquantò longius in triangularem apicem desinit: cætera sex apices translucens finiunt, interius fusci, superficie verò luteo pulvisculo obducti: cuncta autè, ad mediâ ferè eorum longitudinem, mediù ex inferioribus folium ambit: idem etiam à reliquis duobus interioribus còplexum: atque ubi hæc deorsum flectuntur, *stamina* ipsa sursum eleuantur. Illo ipso porro anno floris cum suo caule & foliorum iconem ad me mitteret Ill. C. Aramburgius, quam ad viuum depingi curauerat, ex planta quæ illi florem protulerat, à D. Tovar eodem anno accepta: deinde sequente Februario bulbi suis coloribus expressi iconem, qui crassus est, tunica exteriorè fusca tectus, fibrisque infima sede, nonnihil prominente, frequentibus, crassis plerisque & in alias tenuiores diuisis, & aliis minoribus præditus.

Lob. Adu. par. 1. *Narcissus Indicus rubro flore Clusii*, & *Narcissus Iacobus* D. de Tovar. à C. viro Bernardo Paludano acceptus Mediocastri Walacriæ vnicum florem laxavit D. Iohanni Somero. Sed cum exactior, latèque elegantissimi ac amoenissimi floris extensi icon Lutetia ex Christiani. Regis Henrici Bourbonii rarissimis plantarum exemplaribus delineata, enataque in horto D. I. Robini, allata mihi sit, huc inferendam operæpretium duxi.

PANCRATIUM VETERIBVS

Pancratium (*pancratium*) à vincendis & profligandis morbis omnes denominasse videntur.

Scillam, sunt (ut ait Dioscor.) qui appellant. Pancratium [ut idem describit] radix est, bulbo magno similis, subfulva [ut in *scilla*,] aut subpurpurea [ut in *scilla*,] amari ac feruidi saporis. Folia habet Lilio similia, sed longiora. Vm eandem quam Scilla habet. Præparatur & eodem modo, & exhibetur, faciens ad easdem affectiones. Minor tamen huius facultas est quam Scillæ. Vnde succus ex radice huius expressus, & ad Erui farinam ammixtus, & in pastillos efformatus, cum aqua mulla, & splenicis & hydropicis viriliter exhibetur. Hæc Diosc.

Plinius eadem ferè dicit l. 27. c. 12. his verbis: Pancration aliqui Scillam pusillam appellare malunt, foliis albi Lili longioribus, crassioribusque, radice bulbi magni, colore rufio. Alium foliis, succo cum farina Erui sumpto. Vlcera purgat. Hydropicis splenicisque cum melle datur. Alii decoquunt eam, donec aqua dulcis fiat. Ea que effusa radicem terentes digerunt in pastillos Sole siccatos.

Dodon. in fol. Plinium reprehendit, dicens: In Plinii verbis, & còtradictio quædam apparet & à Diosc. sententia diuersa: Si enim radices magni bulbi, quare Scilla pusilla appellatur: Folia Lili albi crassiora Plinius, angustiora habet Diosc. Atque vel hinc Plinii exemplaria plerisque locis corrupta esse apparet: proinde & quæ de utraque Scilla scribuntur posse vitata esse.

Cord. in Dioscor. Scillæ speciem facit. Pancratium, (inquit) minor Scilla est, quæ hodiè rarò ad medicinæ vsum affertur: quantitas & viribus maiori inferior.

Ci Bauh.

Calp. Bauhin. apud Matthioli. videtur securius eandem dicere cum Narcisso tertio Constant. Matthioli, & Narcisso marino Dodonæi: quis ex dictis verbis id potest asserere?

Scillam vulgarem omnem ruffam multi Pancratii volunt, quidam tantum inter eas minores bulbos. Videtur Calp. Bauhin. ab hac Scilla vulgaris separare Pancratium Clusii, quod non placet. Dicitur Pancratium quibusdam (nobis Pancratium Monspessulanum) nonnullis etiam Pancratium Lacunæ, & Hyacinthus ceruleus maxime Fuchsi, de quo Dalechamp. aliquando annotasse esse verum bulbum. Pancratium ex Dioscor. vim eandem quam Scilla habet. Preparatur & eodem modo, & exhibetur ad easdem affectiones. Minor tamen huius facultas est quam Scilla. Unde succus ex radice huius expressus & ad Erui secinam ammixtus, & in pastillos efformatus, cum aqua multi splenicis & hydropicis exhibetur. Aquam soluit (vt Plinius tradit) Succo cum farina Erui sumpto: vlcera purgat. Hydropicis splenicisque cum melle datur. Alii decoquunt eam donec aqua dulcis fiat. Eaque effusa, radices terentes digerunt in pastillos Sollicitatos, & postea vtuntur ad capitis vlcera, & cetera quæ repurganda sunt, item ad tussim quam tribus digitis apprehenderint, in vino dantes, & ad lateris dolores aut peripneumonicis Eclegmarte. Propter Ischiada in vino bibendum & propter tormina mensisque ciendos. Radix (inquit Gal. simpl.) Pancratii Scilla similem gustum offert: quare etiam quidam pro Scilla, si ea non adhibetur, efficit omnia in genere quidem similiter, sed longe imbecillius.

PANCRATIVM MONSPESSVLANVM, multis Scilla alba Parua.

Pancratium Monspelianum, radice nritur bulbosa, minore quam Scilla vulgaris ruffe, Lobelio Obseruat. cum maxima est, quanta maximi Lilii aut Arancii vel Limonii, oblonga, fibris donata, cortice Cepæ obiecta pullo, intus candido, tunicis vestita Cepaceis, pellucidis, leuiter striatis, aliquot detractis candidissimis, etiā in predictis Aris crassis, minus tamen quam Scilla dictæ, albis, viscidis, amaris sine acrimonia: f. lin septena vel octona, porraceis similia, cubitalia, pollicem circiter lata, coloris glauci, in obtusum mucronem delincentia: Inter hæc caulibus attollitur, parum foliis longior, crassitie Asphodeli generis, nudus, enodis, qui est fastigii folliculo membranaceo flos ternos, quaternosue ac etiam plures profert, magnos, foliorum ferè formæ, vaciastres vel quatuor longos, albos, apicibus luteis sparos, quibus succedunt pericarpia aliquot maxima, plena semine nigro, magno, lato, compresso: cui cum Aristolochiæ Clematidis vulgaris semine aliquid simile.

Monspeli olim vocabant Pancratium, & bulbum marinum: Lugdunenses & Geneuenses Pharmacop. plures vocabant bulbos hos Scilla, & pro eis vsurpabant: nescimus quâ ignorantia & negligentia aut auaricia, cum possent veras habere Scillas, tum albas, tum ruffas. Scilla à Diosc. & Theophrasto descriptæ non respondent, nec florendi modo, nec acrimonia: Cum Pancratium etiam non conueniunt, nec foliis, quæ non sunt Lilii, nec colore, nec acrimonia, siue seruore.

Sunt qui suspicantur Scillam esse Epimenidiæ Theophrasti, & Plin. Gesnerus putabat Scillam

albam, Anguill. esse Epimenidiæ, de ea autem c. de Scilla.

Quandoquidem autem Clusius describit plantam nostram prout obseruauit in Hisp. colore à nostro variante, lubet eius descriptionem hic subiicere. Hemerocallidi Valentini quæ inter Narcissi genera referenda, quia aut lena sunt folia,



oblonga, lata, Narcissinis similia, sed planiora, firmioraq; subcineracei quodammodo coloris. caulis inter ea assurgit, in cubitali interdum altitudine, & Leucoii bulbosi 4. (Leucoii bulbosi serotini maioris 1.) crassitudine, firmior, nudus & sine foliis, qui cacumine promittit membranaceum inuolutum, & co

dehiscente quinque aut senos, interdum plures, flores Pseudonarcisso vulgari similes, Lilii odorem spirantes, albos omnino: præter externorum sex foliorum neruum & extremos mucrones, qui viridi colore nonnihil aspersi conspiciuntur: in medio oblongo protuberante calyce per oras laciniato extant candida sex oblonga stamina, suis apicibus flauis ornato, & medio longo stilo, vt Lilio albo ferè: marcidis & defluentibus floribus subsunt triangularia capita in crassitudinem succellu temporis extuberantia, quibus semen continetur nigrum, magnum, compressum, fungosum: radix bulbacea, magna, alba, oblongior, lento humore plena, nigricante cortice obducta, quæ interdum adnatis Narcissorum modo se propagat. Caulis etiam & folia concisa, aut infracta, lentum humorem exstillant.

Bulbus littoralis Theophrasti. quod Monspeli Pancratium interpretantur, Et Pharmacop. vulgè pro Scilla minore habent, alii Hemerocallidem esse putarunt, decepti, testimonio Gesn. de horti. nomencl. Lilii marini, quæ apud Diosc. Hemerocallidi attribuitur. An eidem Pancratium quod aliqui pro Scilla substituant? An apud eundem Pancratium verum Wolffii & Scilla minor.

Hemerocallis Hispanica, meo tempore [inquit Clus. Hisp.] Rondel. Scilla vocabatur, & ex ea trochiscos, qui theriacâ ingreditur, Mopeliani pharmac. parabat. Postea Pancratium flore Lilii vocari cepit. Quæ in Valentino littore nascitur loh. Placæ Hemerocallis nuncupabatur, qui subluceos & pallescentes flores ferre asseuerabat: Hispani Amores minus vocant. Itali quidam Gliglio marino, caput etiam Constantinopoli adferri, Con Zambac nomine, inter varii generis Narcissos. Idem sequenti capite ait: Hemerocallis Valentini Scilla Epimenidia esse non potest, vt quidam volunt, quandoquidem eius Epimenidia cibus grata sit: Valentina verò He-

Hemerocallis Valentini Clusii Narcissi generis

Bulbus littoralis. Hemerocallis non est.

Scilla minor.

Scilla Rondel.

Pancratium flore Lilii. Hemerocallis flora suoluceos.

Con Zambac. Non Scilla Epimenidia.

Pancratium. *metocallis, siue Pancratium flore Lili Mompeliani, presens sit venenum. Et hist. post. Itali quidam giglio marino apud quos rubro aut purpureo flore inueniri, praesertim Ostiensi portu ipsi aliquando relatum est: ipsi certe alterius coloris flores videre non contigit quam albi, quandoquidem non nisi in maris littore sponte nascitur, Narcissum marinum, commodè appellari posse arbitrat.*

Rubro & purpureo flore. *Narcissus marinus*
Pancratium Dalech. quod Hist. Lugd. curauit depingendum & descripsit: foliis est *caeruleis*. (Lilii albi, ut Plinius vertit) longioribus & crassioribus, caule pedali & nonnunquam proceriore, anguloso, summo fastigio in quinque foliola candidiora, virgata, acuminata, sepe explicante, e quorum medio angulosa, breues, & veluti compressae siliquae pediculis subnixae, ex quorum vertice flos albus emicat, oblongus, inferne arcuatus, supernè latus ambitu supremo, in radios velut cuspidatum diuiso, pallidis apicibus multis, staminibusque inter extantibus: flore delapso semè in siliquis adolefcit & maturescens grandescit: floret mense Iunio. Ex his perspicuum est Pancratii Scillam non esse, sed speciem, flore potissimè ab ea distantem: Pancratium istud Mompel. Clusius Hemerocallidem Valentiam vocat. Negligenter sanè Dalech. icon & descriptio facta ad plantam liccam, ideoque minùs placenti: nec ea planta folia habet Lilii albi.

Bulbum (inquit Dodon. in fol.) ad Pseudonarcissi genus pertinere apparentem, placet aliis esse Pancratium, & quidem marinum. Pancratii autem bulbus ut Dioscor. refert, *ὑποκίττος ἢ ὑποκίττος*, id est, subbruffus aut subpurpureus est: istius verò albidus.

Matth. quantum ex iconè colligere licet inter Narcissos numerat & Constantinopolitanum cognominat, & praestat inter Narcissos retineri, & marinum dici, quam vel Scillam vel Pancratium temerè affirmare. Ast nos Narcissum Matth. ad aliam plantam referimus de qua mox. Narcissum hunc marinum teste Casalp. quidam Hemerocallen putant, quia id Lilium marinum à Diosc. vocetur, siue Elium ut Theodorus vocat in Theophrast. alia tamen ostendit pro legitima Hemerocalli.

Hemerocallis. Ad cunctos morbos affectus, [ut Lobel. & Penz. Adu. tradunt] profligandos promittit auxilium, bene ominata nomenclatura Pancratii quae tamen Scillae species, maritimusque bulbus est. Radices omnes Pancratii (Narbonensi) albae non rubrae, quod accidit regionis situ, & superioris aspectu. Lob. Obs. Iconem Clusii habet, ac dicit, Pancratii marini è floris colore varietas: Adu. p. 57. Hemerocallis Valentina Clusii. Narcissus Constantinop. Matth. non descriptus. Ital. *giglio marino*. hisp. *Amor myos* & *squilla menor*. Prorsum Pancratium Mompelienis idem; sed huic flores luteolos Hispanica littora dant: qui etiam interdum purpurei, & quandoque puniceos produunt. *Azulesnas de las Indias* Pancratium Mompeliaco similis est semine & bulbo: Num eadem sit asserere non aulim, ut cuius flores nondum apparuerint in hortis pensilibus Io. Matoni Neruicenis pharmacop. ex folio Narcissi. Icon pl. p. 168. Pancratium marinum, Hemerocallis Valentina Clusii. Item 169. Pancratium floribus rubris, cuius icon est apud Clusium pro Hemerocallide Valentina.

Bellon. dicit Bulbum littoralem Theophr. esse Pharmacopolarum Gallorum Squillam aut Scillam

lam; Verùm an de hac loquatur nescio, cum aliter existimet Dodon. Videant Lectores.

C. Bauh. phyt. Scilla 3. minor, Narcissus Constant. vel 3. Matth. *scilla 3. minor* Theophr. 6. hist. c. 1. Vbi Elium vertit Gaza & Lilium marinum. Variat floris colore, apud Momp. flore est albo, & alias subluteo, & pallidente: apud Italos rubro & purpureo, quandoque puniceo. Quare Tabern. huius tres figuras proponit. Idem apud Matth. Narcissus 3. Constantinop. Matthiolo in maioribus figuris, Tabern. Narcissus 8. Matth. in compend. exprimit Scillam minorem, quam vocat Narcissum marinum Dodon. fol. Casalp. Hemerocallis. Gesner. hort. Hemerocallis Valentina. Clus. hist. hisp. Lob. Cam. Pancratium verum Gesner. hort. Pancratium Cordi in Diosc. Nobis autem videtur ut postea dicemus, Narcissum Matth. potius respondere Lilionarcisso Hemerocalli facie Clusii: nec placet C. Bauh. opinio, dum dicit esse Hemerocallen Theophr. cui suffrutex est, qui non numeratur inter plantarum bulbos. Nec etiam est Hemerocallis Dioscor. quia non habet folia & caulem Lilii. Casalp. non recipit pro Hemerocalle Theophr. Gesn. eam opinionem refutat, dicit praeterea Pancratium quomodo asseri possit non videmus. In Epit. Matth. quam habemus impressam 1571. pro Narcisso & nihil est simile cum Valentina Clusii, sed quaedam icon, quae potius Tulipam malè electam demonstrare videtur.

Plurimum toto littore illo ab aquis Marianis ad usque Nerbonae urbis maritima sepius videntur & erueunt, sabulo arido, vndis alluto, mersum sesquipalium altè. In maritimis circa Valentiam Hispaniae frequens, ut toto illo maritimo tractu infra Mompelium, ubi Maio mense florentem, Iulioque & Augusto semen maturum ferentem, magna difficultate eruebat Clusius, tam altè arena maris fluctibus aggestamersa erat. Allata est etiam Viennam aliquoties dum istic vivebat, Constantinopoli, addita inscriptione, Albos ac odoratos flores proferre, medio inter Augustum & Septembrem tempore: & certè bis florem dederunt, recens allati bulbi Gen. viro Volsg. Christ. ab Ensfeldt Austr. sed illae ipsae plantae, nullum postea florem amplius tulerunt, quemadmodum nec ex omnes, quas è Gallia, Hispania, & Italia, sepius in Belgium delatas, vel semine natas aliquot annis aluit. Itaque hanc plantam, ut & alias quasdam, in illarum classem reiecit, quae mutato natali solo nunquam, aut rarissimè florere solent, cum videlicet conceptio iam in ipso bulbo, flore eruantur, & transferuntur. Ceterum ex semine nobis creuit, verum nullos flores produxit. Mompelii quoque ad maris ripam abundare obieramus, & quidem florentem Autumnò, ubi Pancratium & bulbos hos Scillam vocabant.

Littoris incolae piscatores & praedones, raptu interdum vicantes, rati hanc esse Cypre, vorantes ex sale & pane, quamuis famelici, tamen [teste Lobelio] nauticabant. Facultate igitur Pseudonarcisso luteo [Bulbocodio] affinis Dodon. videtur: nam & gustus tantummodo bulbus nauscam excitat, ut iam Lobel. auctor fuit. Magis venenatam qualitatem eis Cl. vit Rondel. attribuit, qui refert solbat exemplum de duobus piscatoribus, quorum alter cultrum, Hemerocallidis concisus uocco intrinsectum, fodari quem oderat, cibo sumpturo appositum, illic bonae fidei, nec insidias metuens, carnes propositas fecat,

Theophr.
Bollon.

Scilla 3. minor.
Narcissus Constant.
Hemerocallis.
Lilium marinum.
Colorum varietas.

C. Bauh. 6. 3.
vii. Lappae.

Locus & tempus.


Vires & v. fus.

fecat, usque vescitur, abstinente alio, qui se fame premi negabat, post paucos dies, misere sublatu fuit arguit hoc unicum Plinii testimonium Hemerocallidem Valentinam Epimenidiam Scillam esse non posse, quia edulis sit.

PANCRATHI MONSPELIANI VEL

Hemerocallidis Valentinae facie
Lilionarcissus, vel Narcissus
Matthioli.

Descriptio



Lilionarcissus Hemerocallidis facie (inquit Clusius hist. post.) quanquam cum Hemerocallide Valentinam, magnam affinitatem habeat, eodem tamen cap. non complectendum, sed peculiare illi tribuendum, duximus: notas enim qualidam habet ab Hemerocallide alienas.

Semine ex

Italia misso nata est Io. Bidaut, Canonicus Insulanus Jacob. Plateau scribat similis plantam ipsi mittam semine Florentia misso Martagonis cariss. appellatione. Eius bulb. Muscari crassitudinem equat, vel etiam superat, pauloque longior est, multis involucribus tunicis, quarum extrema fusca, sequens subrufa, tertia candidior: Eius radices seu fibræ, graciliores & frequentiores, quam in Muscari: sub Aprilis demum finem (nullos bulbos memini adeo tardè emergentes) senu aut plura producit folia, duplo ferè latiora quam Muscari, sed illis breviora, & subextremum Augustum marcescentia, simili planè ratione, quam Hemerocallis Valentinæ, cuius folia Augusto emergunt, deinde tota viridia hyeme perstant. Ex eodem bulbo bini interdum prodeunt caules ferentes singuli, circiter lunium mensē, folliculo inclusos sex aut 8. flores, paruo Lilio non dissimiles, medii occupante paruo calyce albo, in multas laciniis per oras secto, odorato, in quo sex alba stamina, flavis apicibus prædita, & mediis stilus albus: semen in thecis nigrum, minus, & magis rotundum Hemerocallidis semine. Iacobus Plateau Lilium Narcissum Orientalem appellaret, sed meo iudicio permittit. Ulius porro iconem ex ea quam ipse Plateau mittebat expressam hic subiecimus. De hoc scripsit etiam Exot. part. 2. append. 2. his verbis, Narcissus montanus me marinus alter, qui Matthioli. An Orientalis dici queat valde dubito, tamen fieri possit, ut in Oriente etiam nascatur: quotquot tamen illius bulbi in hanc regionem vel etiam in Galliam perlati, non ex Oriente adiecti, sed in Europa sponte nascentes reperti fuerunt. Nam ante biennium plurimos eius bulbos ex Illyrico adferebat Ioh. van Ophem Bruxellensis, quos ipsemet eruerat. Hoc verò anno 1603. scribebat

ad me Bononia Frater Greg. de Reggio. Ordinis Capucinorum sese ab eodem van Ophem litteras accepisset florentie exaratas, quibus significabat Corticam & Sardiniam insulas se perlustrasse, atque elegantissimas plantas reperisse, inter quas hunc Narcissum in altissimis Sardinie montibus nascentem, ac in vno eodemque caule quinque & triginta flores gerentem. Dietamnium præterea Creticum odoratissimum, minoribus & candidioribus foliis præditum, & multa elegantissima Crocigenera, & illa quidem locis etiam maritimis: quæ sanè ratione hic Narcissus vel montanus, vel marinus nuncupari posset.

Matthiol. Lat. cum magn. fig. & in Iconem sine ulla descriptione & annotatione à quo accepit iconem habet tertio loco sub titulo Narcissi Constantinopolitani, qui nobis videtur melius quadrare cum Lilionarcisso Clusii modo dicto quam cum Pancrathio Monspeliiano.


An 1608. Sturgardie vidimus in horto Ill. nostri Principis ducis Wirtemb. bulbosam plantam quam Narcissum Matthioli tertium vocant, qui ab annis plurimis est in horto peregrinarum herbarum, qui hyeme tegitur & cum hypocaustis calefit: Eam ducem vocant: mense Iulio folia magna ei erant multo latiora quam in Pancrathio Monspeliiano, magis aut Scillæ folia accedentia, colore etiam non glaucescente, aderant etiam in summitate caulis capita plura semen continentia nondum maturum. Hanc eandem plantam eodem nomine donatam per Hortulanum vidi Caroloburgi in Il. March. Georgii Friderici Baderis horto abundanti plurimis plantis.

Hist. Lugd. Narcissus 3. Constantinop. Matthiol. Scillarum aut bulbosum littoralium species videtur qualis in Gallia Narbonensi. Tabern. icon. Narcissus Constantinopolitanus, & Narcissus rosslein von Constantinopel.

Casp. Bauhin. ex Tabern. posuit in suo aucto Matth. iconem pro 3. Narcisso Constantinopolitano, idem existimans, cum Lobelii Pancrathio: Nos non possumus C. Bauh. assentiri secure assentiri in tuis Animad. in h. Lug. Narcissum Constantinop. Matth. esse Pancrathium Dalechampii.

PANCRATIUM INDICVM AVT NAR-

cissus Clusii Indicus maximus autumnalis quorundam, non amarus, albus.



Radice est (inquit Lob. Adu. par. 2. Jspithamum longa, brachialis crassitudinis, multis Cepaceis subalbidis tunicis squamosa, extimisque cuticulis ex rufis subfuscis, aut Castaneæ diluti coloris: scilicet parte maiore mediocrem pugnam equante: numerosis carnosis habitioribus

sed multumque prae-
ter rem non fuerit
lectorem obiter admonere falli multos, qui ex
his Plinii Theophrasti-
que locis, tribus annis di-
uersis temporibus, exempli gratia, Autumno, Ve-
ro, Aestate, Scyllas flores edere putant. Id por-
ro quomodo fiat ut cognoscamus, habendum sic
est inter bulbos omnes plantas Scyllam & Af-
phodelum quam diutissime florere, ob alimen-
ti copiam & vbertatem, quod Theoph. censet c.
caulis. & *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος* non *αφιδελος*,
ut in exemplaribus nostris legitur, particularem
florere. & ab imaparte caulis primum incipere:
Augusti ergo principio Scyllae caulem assurgere,
quod pluries observavi, cubitalem, aut etiam
proceriorem, densissimo florum stipatu conce-
ptum: imos flores primos produci, ac interim diu
aperiti vigent, medios turgescere, supremos glis-
cere tantummodo, quae *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος*, primus
ad florendum conatus. Exactis aliquot die-
bus flores qui primi reclusi fuerant, labi, mediocri-
que sese promere, supremis tantum intumescen-
tibus, quae est secunda *αφιδελος*: postremo defluen-
tibus mediis, supremos se explicare: quae *αφιδελος*
tertia est: hoc florendi ter repetito impetu,
terram quoque ter subigi oportere denuntiari,
priusquam fruges serantur. Flaccido vero & con-
torto caule folia nasci circa Ianuarii vel Iunem,
vel medium, quae aestatis post squaloribus ex-
arescant. De Lentisco Virg. prodidit post Aratum
quod de Scylla Theoph. his versibus:

*iam vero semper viridis, semperque granata
Lentiscus, triplici solita grandescere saeu:
Ter fruges sudens ista tempora monstrat
arandi.*

Quomodo autem Theophr. & Plinii corrupti de
de Scilla loci restituendi sint docet Idem Dale-
champius.


Hac de re huc Robertus Constantinus in suo
Lexico: *Σκυλλα* inquit (ut scribendum distin-
ctionis causa,) vel *αφιδελος* etiam, est herba bulbo-
sa, Scilla siue Squilla Varro, *αφιδελος*, vel eius
bulbus, aut Scillae species minor, *αφιδελος*
etiam a Diosc. *Σκυλλα* exponit eal. in glossis Hip-
pocratis *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος*, *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος*,
Plutarchus etiam in Pericle, ipsum ait, ob capitis instar
Scillae immen- & oblongi formam, *αφιδελος*
appellatum esse, quasi dicas Scillae capitonem:
Lib. 1. cap. 12. *αφιδελος* loquens Theophrast.
inquit, *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος*,
αφιδελος *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος*,
αφιδελος *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος*,
lib. 1. cap. 17. de Scilla dixit. Eadem ter florere, tria
tempora sationum ostendens &c. Quod autem
ipsa floreat ter, id intellige de floribus triplici ni-
xu: floret enim particulatim, id est *αφιδελος* siue
αφιδελος: ut idem Philosophus dixit: In Scil-
la quod intus tenerum ac molle quassique adeps,
αφιδελος *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος*,
Varro Scillae medium vocat. In eodem signifi-
catu *αφιδελος* in Lactuca usurpavit Plutarch. 4. Sym-
pos. *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος* *αφιδελος*,
ut apud ipsum videre est.

De Scillae equivocationibus & substitutis sci-
endum: Quod Scillam rubram vulgarem, quam
quidam nolunt Scillam esse, sed Pancratium, qui-
dam pro substituto recipiunt. Quod insuper
in dabium vocetur an forte Scilla alba sit eadem
cum rubra, differens colore tantum, an aliis fo-
liorum figura etiam differens. Quod auctore
Clusio dicitur Ornithogalum maius quod quidam
Scillam Epimenidiam vocant. Quod, Plinio teste,
Tom. 11.

cum Epimenidia Scilla edulis sit, Hemerocallis
Valentina illa esse non possit, certissimo argumē-
to est exemplum de duobus piscatoribus Ron-
delerii. Quod tandem pro Scilla, auctore An-
guillara, varii bulbi supponuntur.

SCILLA RVFFA MAGNA VVLGARIS.

Bulbum habet Scilla magnum Pomo Adami,
vel Citrio maiori saepe parem, multis crassis
fibris donatum, & laminis tuniceis, rubentibus,
viscidis contextum, sub bulbo multa fibra, e quo
folia emergunt, impensè virentia, cubicum lon-
ga, palmum ferè lata, succulenta, crassiuscula cū
multa visci-
ditate amarae
inter quae sur-
git caulis Af-
phodeli flori-
bus insignis,
serie longa
dispositis, &
successive sese
aperientibus,
candidis, Or-
nithogali
spicati flores
emulantibus:
Fuchsi caulis
ut in croco
prius prosili-
tum ex eo flos
in luteo can-
didus, qui
cum senuerit
folia denum
multis post
diebus emi-



cant lata, nullo nixa pediculo, cepitia quadam
specie, & pleraque ex his in terram deflexa: Mar-
thiolo amara est Scilla & acris, folia Lili qua-
lia.

Dodon. Gall. Hodierno tempore duæ reperti-
tur Squillæ, una foliis angustis, quæ vera Scilla,
altera latis, quæ vulgò videntur pro Scilla. Prima
& vera Scillæ bulbi sunt valde magni & crassi,
candidiores bulbis Scillæ vulgaris. Folia longa
& angusta sunt, colore cineritio, vulgari Squillæ
sunt etiam magni & crassi bulbi colore magis
ruffo, cortices spissiores quam in priore, folia ma-
gna & lata, Liliorum foliis similia. Flores parvi
& lutei, secundum summitatem caulis, succedit
deinde semen. Squilla defertur ex Hispania ad
usum medicum, quidam plantant in hortis (Bel-
gicis.) Prima species Cæpe genus peregrinum
dicitur: Serap. Cæpe muris. Secunda species po-
tiss. usurpatur in Ollie, pro Squilla, quamvis non
sit vera: sed Græcorum Pancratium, cui pares
vires quæ Scillæ, unde sine errore potest sumi
pro Scilla. Bellonio existimatur Bulbus litro-
ræ Theophrast. cum quo magna similitudo.
Pancratium Dioscor. & bulbus Theophrast. una
& eadem planta videntur. Scilla calida secun-
do gradu & sicca tertio.

Dodon. eandem iconem quam nos ex Fuchsi-
o habet, titulo Scillæ communis & Pancratii: is in
postrema historia icones duas, quales Clusius
habet, proponit: Nobis autem videtur Dodo-
næus suas descriptiones non ad plantas fecisse si-
bi obiectas, sed ex Antiquis & Neotonicis com-
posuisse: considerent igitur lectores Dodon. duas
descriptiones & quæ paulò post dicentur.

Fff

Descriptio

Scilla aut.

Scilla ob-
dura.Scilla vul-
garis.Locus.
Cæpe muris.Squilla of-
fic. & Pan-
cratium.
Bulbus li-
troræ
Theophr.
Temporibus
Icones

*Cep. Cep.
marina de
84.*

Cepaceo generi [vt rectè notant Lob. & Pena in Aduers.] tantoperè est compar Scilla: vt mul-
ti eam *Marinam Cepam* vocent. Quia autem in-
ter hanc & marinum testaceum pilcem à tunicea
squammarum compactili serie Squillam voca-
tum, tanta similitudo intercessit, hæc putatur sic
dicta. Potuit etiã à fabuletis maritimis Sole tor-
ridis, cuiusmodi sunt in Hispania & propè aride
Lusitaniz tesqua maritima. Huius duas differe-
tias colore dumtaxat inter Hispanicas tam
multas animaduertere est, quarum extimæ tuni-
cæ vni rubent, vt Capis oblongis, alteri alben-
t, magnitudine pares. Vtrauis maxima Pomû Assy-
rium nun superat: è tam multis autè millib⁹, quæ
quotannis tum Venetias tñ Antuerpiã deueni-
unt, nullam meminimus maiorem, eã quæ fata &
perbellè adula fuit Monspelii in horto Iacob.
Farges Pharmacopri. Vniuersa namque folii
carina, vel dorsum, palmum fermè lata, pedem
alta, crassitudo minor quàm Aloes, crebra è
bulbo pullulant squammarum compacta, caulis
sesquicubitalis, gracilis, flosculos Fragariæ
genit similes sed minores, in spicam postremò
deficiens.

*Matth. re-
prehendi-
tur.*

Neutiquam mirum Matthiolum, post alios Neo-
tericos nuperos, sententiam de Scilla mutasse,
cùm neutiquam visam sibi genuinam sed tantum
verbis depictam, fateatur. Quin etiã si verum
Pancratium vidisset, numquàm pro illo speciem
Scillæ subdidisset. Et foliorum gracilitas, à qua
se deceptum conqueritur, sanè non aliam spe-
ciem constituit Scillæ: sed tantum contingit ha-
bitiora & maiora adollescere folia, mutatione
cæli, soli & cultu.

Lobel. Obs. & Ic. pl. Scillæ rubentibus radicis
tunicis, folio Aleos carinato. Figuram habet ex
ex Clusio, ac dicit Pancratium verum Clusii.

Pancratium.

Clus. in post. hist. de hac Scilla scribit. Pancra-
tio [Hisp. dicto eodem nomine quo Scilla, *Cebol-
la*] amplitudo maior est [quam Scillæ,] extimæ
tunicæ rubent, foliaque ampliora, longiora, magis
carinata & quodammodò luteola. Abundè cres-
cit in Hispaniæ mediterraneis: bulbos erui, flo-
rentem autem aut semen ferentem nunquam
conspexi. Fabiano autem Itgas vt ad me scribat
in pensilibus hortis non modò caulem protu-
lit, sed etiam plurimos flores spicæ instar in eo
nascentes, sex foliis nascentes Scillæ (quantum
ex pictura, quam epistolæ coniunxerat colligere
licebat) florum amulos. *Pancratium* n. *Scilla* Græ-
cis, Pancratium Latinis dicitur. Hispanici eodem
quo Scillam [albam] nomine donant, *Cebolla al-
barrana*. Scilla, inquit Matthiolum, quæ vul-
gus officinarum Squillam vocitat omnibus vul-
gatis notitiæ est atque vtilissima, medicamentis
expetita, vt pote sine qua legitima Theriaca con-
fici non possit. Pancratium, quòd aliquibus pu-
illa Scilla vocatur, quoniam hodie in medica-
mentorum vsum non recipitur, idèd Medicis &
Sepiasariis neglectum est. Vnde etiam pauci for-
tassis sunt qui vel ipsam nouerint vel animadu-
uerint: cùm tamen variis in Italia locis gigna-
tur, præsertim in Apuleia, vbi magnus est Scil-
larum prouentus. Verùm etsi id in officinis non
habetur, nihil tamen iacturæ in medicina fieri
puto, quòd eius vicem maior Scilla valentius et-
iam præstet. Scillæ duo notantur genera, vnum
album alterum verò nigrum. Itinc nonnulli vt
Ruellius inquit, album mas, nigrum autem fer-
minam faciunt: quauquam magis rationi con-
sentaneum videatur vt contrarium existimari &

*Scilla Offi-
cy vera.*

*Scilla papi-
la.*

Locus.

*Scilla duo
genera.
Ruellius
notat vt
Matthiolum
repreh.*

esse debeat. Matthiolum decebat demonstra-
re qua in re differat Pancratium Italicum à Seyl-
la: ille in postremis com. non amplius eius me-
minit nec locorum vbi prouenit Scilla Officina-
rum: quare id fecerit ignoramus fortè quia de
re non perspecta scripserat: censuram etiam in
Ruellium omisit, & merito, nisi Plinium etiam
velit taxare ex quo Ruellius assumpsit.

Quandoquidem autem Matthiolum in post.
comment. nullam facit mentionem Scillæ albe,
verisimile nunquam ab eo vitam, nec etiam flo-
res Scillæ vulgaris quos pinxit cum quatuor fo-
liolis. Scillam porro vocari tradit in Epit. ab
Arab. *Haspel*, *Hasfel*, *Aschil* siue *Alachis*. Bulbo niti
ingenti subrubro, radicibus infernà sede nume-
rosis squammis crassis, lentò succo pregnantibus
acri & amaro, folia mittere Aloes similia, cau-
lem sesquicubitalem, læuem, & flores in summi-
tate subpurpureos. Idem ait in hist. Germ. Scilla
multas habet squammas subrubentes parum, sed,
multò maiores & crassiores fert ex vtriusque
caulis latere pulchros flores flauescences (*weiß
gelbe*) vbi flores exciderunt pluribus diebus
post ex bulbo prodeunt lata crassa folia sine pe-
diculo, vt in albis Lilis: Copiose prouenit in A-
puleia & Sicilia. Matthiolum in Epitome & in
hist. Germ. non sibi constar, dùm vno loco scribit
flores subpurpureos, alio autem flauescences.

*Nomina
Arabica.*

*Floris flau-
escentes.*

*Locus.
Matth. no-
tat.*

C. S. reprob.

Quàm bene etiam Casp. Bauhinus in suo an-
tò Matthiolo post Scillam hispanicam scripse-
rit, flores in summitate esse subpurpureos, iudicet
alii: nos albos in vulgari Scilla vidimus prout
annotauimus à quadraginta annis.

Cur porro Scillam ex Græcia & Italia in His-
paniam remittat Matthiolum mirari satis Guill.
nequit, vberissimo eius in Græcia & Apuleia pro-
uentu, nomine ritque vereti in limine ianuz
eam suspendendi, adhuc vsquè tēpora propaga-
to. Scillam esse decernit Guil. ex Galeni ten-
tentia, cui radices sint candidæ: Pancration cui
ruffe; Dioscor. autoritate. Ille Matth. si Scil-
lam terræ suæ harentem conspexisset, ternos
eam flores funderè haud negasset. Quod cur ex
Theophrast. adnotauerit, nec Narcissum ter flo-
rere, quod ibidem traditur, obseruauerit, magni
est apud Guill. momenti. Agnoscit sanè, cùm hoc
in loco, tum in aliis non paucis, ingenium ipsius
vastum & versipelle.

Amatus quoque similem Censuram contra
Ruellium cum Matth. habet, dicens, Pancratium
facit Scillam minorem & illam quidem nigram.
Ruellius arguit eum contra naturæ ordinem nigræ
ferè minimam facere cùm sit Masculus appella-
da. Verùm animaduertit Amatus Ruellium Pli-
nium imitatum.

Scillam siue Squillam pingit & Lacuna: Scribit-
que vocari in Castilla *Cebolla Albarrana*. I-
bidem dicitur Arabibus *Haspel* vel *Aschil*. *Cep.
Cep. marina*. Portugalesibus *Cebolla Albarrana*.
Gall. *Oignon marin*, *Charpentaire*: Scillæ flos al-
bicat & ad flauum inclinat. Si stirpium diligens
indagator fuisset, tradidisset nobis discrimina
Scillarum in sua Hispania prouenientium, ille
ponit iconem Hyacinthi maioris pro Pancration
nullà addidit descriptione.

Lonicernus qui Scillam, Cepam marinam, &
officinarum Squillam vocat, propriam addit fi-
guram, & descriptionem, atque caulem & flores
prouenire ante folia.

Scilla nostra (inquit Gesner.) vulgaris, siue Pa-
ncratium sit, siue alia species Scillæ, rectè & vtili-
ter in Theriacam additur: & vires omnes, quas
Vet-

Veteres Scillæ attribuerunt, egregie præstat, ut plurimis experimentis constat. Quamvis autem solium Liliæ eam habere aliqui obiciunt, non Aloes, quod Dioscor. requirit: non idcirco tamē à Scillarum genere excludi, & itaquam venenosa reici debet. Matthiolus eam damnat quasi in-
 tiorē iusto & parum efficacem. Anguillara cō-
 trario nomine quasi nimium vehementem & ve-
 nenosam. Ego tanquam bonam & convenientē Antidoti approbo. Debet enim ad Antidotos quæ in eodem genere efficaciora sunt, deligi, po-
 tius quàm lenissima. Esto vehementior quàm Scylla alba, edulisque (Scillæ nomine adhuc in quibusdam Græciæ insulis nota, ubi Scillam no-
 stram Cepulam caninam vocitant, ut Anguilla-
 ra docet,) at eo medicatior esto. Esto venenosa si in cibis, præsertim sæpius & copiosius, sumatur: non tamen venenosa erit si præparetur quo de-
 bet modo, & aliis multis miscetur: sed iam ve-
 nenosum & morborum multorum alexipharma-
 cum fiet. Alba verò & edulis si sic præparata antidoto misceretur, omnem vim medicamenti exueret. Esto Pancratium, ut vult Anguillara, nō idē tamen venenosa erit in antidoto, nec rei-
 cienda: cū Veteres Græci Medici, Pancratium adē simile fecerint Scillæ, ut ab aliis simpliciter quoque Scillam, ab aliis Scillam minorem ap-
 pellatum, & iisdem omnino viribus pollere, mē-
 tionibus tamen, scripserint, quod si venenosius esset quàm Scilla, minus profectō non dici de-
 beret. Et ut veneno eam non carere conceda-
 mus, non tamen ab antidotis excludenda est. Certe Plinius quoque vim Veneni Scillæ tribue-
 re videtur, cū scribit lib. 20. cap. 9. Oxymelitis scillitici tantam vim esse, ut animæ extinc-
 tæ speciem momento aliquo præbeat, id quod nos etiam a vino scillitico factum observauimus in in muliere, quæ eo potō in veteri strangulatione, aut perfunilem ei affectum ad breuissimum tem-
 pus incidit. Arabes etiam de Scilla venenata, lo-
 ci natalis præsertim ratione, loquuntur. Autho-
 res cū albam Scillam eligi iubent, præcipue ad acetum scilliticum, hoc ipso ostendunt, aliquam etiam esse ruffam Scillam, quæ quoniam multo acrior & vehementior est, præparari de-
 bet, ut minore periculo sumatur assando, torrendo vel elixando, alba verò cū inno-
 centior sit, præparari aliter non indiget quàm ut in taleolas secta sicceretur in umbra pro aceto vinōque medicatis ex ea parandis, ad theriacam verò Scillam albam deligere nemo iubet. Iam quod ad magnitudinem attinet Scilla vulgaris nostra duplex videtur maior & minor: quod si aliter quàm ætate differt: minorem Pancratium dixerim, maiorem verò Schinum, quo nomine Veteres (Hippocrat. Aristophanes Theophrast.) Scillæ speciem nominarunt: etsi Gazæ male Lentiscum verterit: ut & Cicero ex Arato: nisi forsan & ipse Aratus homonymia nominis de-
 ceptus, transcriptum ab aliis Schini nomen, pro Lentisco arbore &c. Hispanicā certe Scillā, quā cæteris acriorem esse aiunt & maiorem, folio Aloes, simpliciter Scillā dicerent: eaque si ad ma-
 num foret præparata ad Antidotos uteretur. Ego ex homine docto & fide digno cognoui, roxicum etiam apud Hispanos ex Scilla parari, sicuti ex Elleboro: quod magnum ipsius vehementiæ ar-
 gumentum est. At Scilla edulis alba quam in Creta & Cephalonia adhuc citari Anguillara tradit, non simpliciter Scilla, ut ipse putat, sed Epimenidia Theophrasti vocari debet. Diuidit autem Plinius quoque Scillam in genus medica-
 rum & cibarium. Quod si, ut dixi, Scilla nostra

vulgaris minor, Pancratium est: & à maiori spe-
 cie differt: vulgaris maior, quæ tum ruffa, tum albicans (ut audio) adfertur, (quæ colorum di-
 scrimina haud scio, an in minori quoque repe-
 riantur) non temerè Schinus vocabitur: Gale-
 nus quidem dubitat an Schinus Hippocrati idē, quod Scilla sit, vel aliqua eius species: sed ex Theophrasto à Scilla differre, eique cognatum esse liquidò apparet. Plutarchus Periclem Schinocephalum agnominatum tradit, ab oblonga & acuminata capitis figura: additque Schinum pro Scilla accipi. Hæc de Scyllæ generibus habui à me diligentius obseruata: ex quibus etiam con-
 stat [ornatissimè Calceolari] paratam à te nuper theriacam antidotum, è vulgaribus Scillis trochi-
 scos non temerè recepisse. Scilla Theophrast. ter floret in anno & tria arandi tempora signifi-
 cat: & Arato similiter, etsi is de mense loquatur. Sed Aratus primò Schinum ter fructum produce-
 re ait: deinde etiam Scillam ter florere. Et quoniam is primū ab Ilcis simul & Schini fructi-
 bus, prognostica quædam tempestatum signa ex-
 ponit, de duabus arboribus sentire videtur, Il-
 ce & Lentisco: cū Schinum verisimilius sit, il-
 lum quicumque hoc ante eum scripsit, a quo ipse nimirum est mutuatus, pro Scillæ specie accepisse: sicut & Theophrast. alibi accepit. Lentiscus quidem an ter floreat alicubi, non constat mihi: non sit autem mihi verisimile. Scillam ter flore-
 re minime dubito: non ubique tamen, sed in Græciæ & notis Theophrasto locis. *Scilla* igitur per tota in prima, scemenino genere, Lentiscum significat, & antiquioribus eorum aliquando speciem Scillæ: *Scilla* verò per oi diphongum masculino genere, luncum.

Vocat Tragus cum Iacobo Manlio Cepam muris *Neerzwibel*, alioqui dicitur Cepa mari-
 na, *Neerzwibel*. Squilla in officin. Quæ Scilla, Græcis dicitur, etiam apud Latinos nomen suum retinuit, Fuchf. Corn. & Cordo testibus, quan-
 quam Varronis exemplo nunc omnibus officinis Squilla vocetur. Nostrum *Neerzwibel* hoc est, Cepam marinam vocant, alii *Neerzwibel*, id est, Cepam murinam.

Bellon. lib. 1. Obs. cap. 18. ait: In Cretæ mariti-
 mis littoribus proueniunt copiosè radices, quæ Theophrasto littorales bulbi dicuntur, & ab Aromataris, Gall. venduntur pro Squillis aut Scil-
 lis. Quo in loco quamvis Dodon. existimet Bul-
 bos littorales Bellonii eosdem esse cum Scilla vulgari, nihilominus dubitamus: quid si Scilla sit Anguillare & fortè Pancratium Montspeli-
 anum ut suspicamur?

Camer. in Epitom. Matthiol. nouam figuram addit, in qua flores habent tantum quatuor fo-
 liola, an benè iudicent qui viderunt aut vide-
 bunt Scillam vulgarem florentem.

C. Bauhin. Phyt. Scilla 1. maior radice rubra: Pancratium Clusii: Scilla rubentibus radicis tunicis. Lobel. Obs. pag. 76. & icon. pag. 152. Flo-
 rem huius nemo pinxit, Plinio a profligandis morbis omnibus dictum videtur. Si nullus flo-
 rem pinxit necesse est iconem Fuchsi, Tragi, Dod. Matth. & aliorum esse falsam, quæ exhibet fuisse ante Clusianam.

Idem apud Matth. tres scillas tradit, de quarū prima dicit: Scilla maior radice alba Casp. Bauh. Brunfelsio. Scilla seu Cepa muris Trago, Mat-
 thiolo. Fuchf. Cordo in Dioscor. Gesner. hort. Hist. Lugd. Scilla communis, Dod. Gal. Scilla maior Castori. De secunda scribit: Scilla Hispanica, radice est alba. Nos de paulò post age-
 mus. De tertia verò sua Scilla ait: Scilla maior,

FFF 1

Ruffa ep
albicans.Schinus
species
Scilla.Scilla ter
flor.Schinus
Arato

Lentiscus

Squilla
Varroni
Gulgo.
Cepa ma-
rina
C. B. mur.Bulbi lit-
torales
Theophr.
Dodon. met.

C. B. mur.

radice rubra C. Bauh. Hæc radice est maiore: *Pancratium* Clus. uisp. Dod. Lugd. Tabern. *Scilla* rubentibus radicibus tunicis, foli. *Alue* carinato. Non inuenimus quemquam ex iam nominatis Scillam tradere maiorem radice alba, quinimò ii tradunt vulgarem officinarum, quæ ruffa non alba: non igitur tres facimus Scillas cum C. Bauhino, nec Clusii Pancratium separamus à vulgari Scilla de qua supra nominati.

C. Bauh.

Nomina

Linguarum

Locus & Tempus.

Scilla, Offic. *Squilla*. German. *Meerzwibel* *Meuß zwibel* Belg. *zee Aeyenyn*. Gall. *Sisyphe*, *Squilla*, *Charpentaire*, *signon marin*. Hisp. *Ceballina*, *Rebela Albarran*. Boh. *Hybula* *Morffa*.

Spontè nascuntur copiosissimè in Balearibus Ebuloque insulis ac per Hispanias. In Sicilia & Apulia copiose, maxime apud mare. Scilla ter floret, tria tempora satiorum ostendens: Non solum Venetiis vidimus Scillas multas rubras magnas, verum etiam Lugduni, ubi tamen meo tempore apud Pharmacopœos rarus erat usus, quemadmodum & Genevæ ubi Scillarum loco alios usurpant bulbos. Bulbi Scillæ in Offic. non faci qui constant corticibus, crassiss, ruffis, ac viscidis, folia produunt. Basileæ pharmacopœos vrentes obseruavi. Patauî vidi in horto publico Lugduno mihi missa quæ æstate latitans, tandem Autumno folia produxit Montbelgardii: sed non diu perdurauit frigore interempta, in horto E. C.

Delectus.

Eligenda bene magna & alba, ut docent tum Democrates tum Diosc. Secundum Galenum & Mesuem melior est quæ alteri connexa eruitur [sola enim & singularis, est venenosa] sapore dulci, acri, amaro, laminis splendentibus, ex agro libero: Auicennas eligit inter humiditas grauem & non magnam, mediæ magnitudinis & plenam. Foehus etiam expetit feminam candidissimam, iustæ magnitudinis, non admodum enormem, bene habitam & nutritam, neque putridam, neque gelu flaccidam, sed recentior ex terra sumptam, cum eius caules exactè aruerint, seu quando triticum merunt, quæ tum potissimum viget: Idque iuxta regulam Dioscoridis generalem, quæ ait, radices & succos ipsarum & cortices, auferre oportet quum herbarum folia amittere incipiunt. Colleg. flor. expetit collectam initio Iulii. Datur porio Scillæ à drachmis quinque ad drachmas duodecim: Oxymeri autem scillites ab aur. sex ad uncias tres: Trochisci autem à drachmis duabus drachmas quatuor.

Vltur.

SCILLÆ MAGNÆ ALBÆ.

Candidæ autem Scillæ, siue albæ magnæ, multæ, missæ fuerunt Antuerpiâ per D. Pharm. Coldembergium Val. Dourez, differentes à Lugdunensibus paruis, siue Pancratio Montpellierano, quas adhibuimus in conficienda Theriaca Lugduni & Genevæ. Discrimen autem à vulgari rubra, in iis non potuimus animaduertere, præterquam in colore: magnitudo eadem, squamæ crassæ & latæ, ex quibus apparebat folia, æquè lata esse, atque rubris. Ea in re multum differentes ab eorum bulbis, quibus utebantur pro Scillis, an idem sit sapor non annotauimus: non placet igitur duplex descriptio quam ante posuimus Scillæ albidæ traditæ à Dod. Existimamus eum scripsisse ex alienis, non iuxta plantas à se visas.

Is huius in fol. pro ea assumit iconem Scillæ

Hispanicæ, hæc de ea scribens: Scillæ historiam plerique dederunt, sed quia nemo hæcenus legitimam eius iconem exhibuit, facere non potui quin meis Observationibus infererem, cum eam & primum emergentem, & florentem, semineque onustam, plerisque Hispaniæ & Lusitanie locis eruerim. Est verò Scillæ *caule*, plerumque cubitalis aut maior, rectus, nudus, absque foliis, plurimis candidis & stellatis floribus ornatus, Asphodeli minoribus, ornithogali maioribus (quod quidam Scillam Epimenidiam putant:) explicari incipiunt, quemadmodum Asphodeli & quorundam aliarum bulbacearum stirpium flores: his succedunt triangula *capitula*, compressis angulis, & velut inania, in quibus tamen nigrum, planum, palaceum semen: quinque, sex aut plura demum emergunt folia liliacea, lata, viridia admodum, densa, siue carnosa, humi expansa: non nihil carinata: *radix* crassa est, multis tunicis albis lento quodam humore plenis prædita, multisque crassiusculis fibris capillata. Copiosè nascitur supra Olyssipponem, & plerisque aliis Lusitanie & Hispaniæ locis. Floret Augusto & Septembri maturæcit: folia maturo iam semine, & exarido caule, emergunt Nouembri & Decembri. Cur Dodon. & Clusius Scillam albam, verius Scillam censeant, quam ruffam, non possumus adhuc intelligere. Constat siquidem Veteribus Scillam fuisse duorum colorum: Albæ meminerunt inter Veteres Diosc. Plinius & Democrates in descript. Theriac. apud Galenum.

Locus & tempus.

C. Bauh. Phyt. *Scilla* 1. maior radice alba. *Scilla* Matth. l. 2. c. 168. & icon p. 344. *Scilla* siue *Cepa marina* Lobel. icon. p. 73. & Clus. Hisp. l. 2. c. 16. Sed legimus & nos Matth. & quidem plures editiones, quas inde fesso studio euoluimus, nullam tamen inuenimus iconem similem iconi apud Lob. & Clusium exhibitæ, nec etiam descriptionem, icon eadem est valde differens à Clusiana & Lobeliana, quæ licet non vndique placeat, placet tamen melius quàm nostra Fuchsiana.

C. Bauh.

Idem apud Matth. *Scilla* maior radice alba C. B. *Squilla* Brunfel. Trag. Matth. Fuch. &c. de quibus antè. Itè *Scilla* secunda Hispanica. Clus. Hisp. Castori. Lugd. *Scilla* Lonic. Cef. *Scilla* siue *Cepa marina* Lob. *Scilla*. Dod. fol. Cur à C. B. tradantur hic duæ Scillæ albæ nescimus, prior enim est rubra vulgari: etiam 2. Hispanica Scilla. Nec placet quod dicit Scillam suam secundam hispanicam Clusii à Lonicero tradi, vbi nam id factum nondum nobis constat.

C. B. lapsus alius.

Scribit Matth. Scillam hispanicam veram acrimoniâ ac virium præstantia communes nostras Scillas longè vincere, non demonstrans cuius coloris, & quâ in re differat à vulgari ruffa, quæ ei Pancratium, præterquam acrimoniâ.

Amatus Scillæ meminit, ubi quid velit non demonstrat: ex sequenti tamen capite apparet eum per Scillam, intelligere hanc albam: quam ipse feminam putat, Ruellium reprehendens quod masculum appelleret, in eo imitatur Matth. Verum non animaduertit Amatus Ruellium Plinimum esse imitatum.

Lobel. Obs. p. 75. *Scilla* siue *Cepa marina* Hispanica. Adv. 57. Hisp. *Cebolla Albarrana* & *Cepa marina*. Hæc ille, qui figuram Clusii habet. Ic. Pl. p. 151. *Scilla* Hispanica.

Anguill. Scillæ Candidæ siue Cretæ & Cephaloniæ meminit, eamque veram & legitimam existimat, & ait Nicandrum & Diosc. ac Orisbium laudare albam Scillam indicantes quo candidior

rem

otem eò mînds acrem. Ego interea apud Dioscoron non inuenio candidam mînds acrem, nec propterea laudatam à quoquam: considerandum igitur an hæc Anguill. Scilla diuersa sit ab Hispanica, alba, & an fortè Epimenidia Theophrasti & Plinii, & quantum differat à prædicta Scilla & in quibus: item an diuersa à Pancratio Monspeliaco.

Vires
Vim. Si duri fuerint vteri, ne concipiant, post adhibitu[m] totum Scillæ [*πρὸς οὐδὲν*] radicem longitudine sex digitorum, duorum crassitudine laxà conuolutam, Hippoc. subdit, tamdiuque apponit, quoad os vteri molle & latum sit. Aut ipsam Scillâ sine radice tritam eodemque modo laxà conuolutam apponit. Quibus modis, & vterum, si pituità laboret, purgat, aperit, & aquâ ducit.

Colo. De Scillæ viribus ita Dioscor. Scilla vim habet acrem & feruentem. Assata verò multum sui vsum exhibet. Farina (*σῆμις*: quidam vertunt pistorio opere) subacta, aut luteo oblitur, & in clibanum mittitur, aut prunis obruitur, donec circumfusa farina satis fuerit assata. Quâ ablata, si non flaccida facta est, altera farina aut luto oblito, eadem faciemus. Quæ enim non sic assata est, interaneis maxime noxia exhibetur. Assatur etiam in olla operculo tecta, & in clibanum immissa. Sumitur ex ea quod maxime medium est, externis circumcirca ademptis. Coquitur item incisa, ita vt prima aqua diffundatur, & alia affundatur, donec aqua non amara aut acris fiat. Sed & concisa filo transmissa siccat in umbra, ita vt frustra non se mutuo contingant. concisa itaque ad oleum & vinum & acetum scillicet utitur. Ad rimas pedum interna crude Scillæ pars cum oleo seruetur, aut cum resina liquata, imponitur. Commotis autem à vipera in cataplasmate cum aceto cocta. Ex assata verò contritis salis tosti partibus octo, ad vnam Scillæ partem additis, exhibemus cochlearium vnu, aut duo ieiunis, ad aluum molliendam. Addimus & in potiones, & compositiones aromaticas: (*ἀρωματισμένης*, quidam legunt *ἀρωματίζου*) & in quibus urinam mouere volumus, & in hydropicis, stomachicis quibus cibi innatant, & in morbo regio, torminibus, diuturna tussi, anhelosis, sanguinem reicientibus, [*αἱματουρῆς*] Ruellius ore reicientibus: satis autem est pondus trium obolorum cum melle delinctum, coquitur etiam cum melle, & editur ad eadem, concoctionem maxime adiuuans. Dicit autem strigientosa. Cocta verò ad eadem facit, similiter accepta. Vitanda est eius exhibitio, in his quibus exulceratio quedam intrinsecus est. Assata eadem ad verrucas pensiles, & perniones illita facit. Semen eius tritum carica aut melle exceptum, & in cibo acceptum, aluum mollit. Est etiam auxiliare contra veneficia medicamentum, tota præ foribus suspensa.

De iisdem Plinius [inquit Hist. Lugd.] confuse tractauit his verbis: Prodest & gingiuis, & dentibus, vel per se commanducata. Tincas & reliqua ventris animalia pellit ex aceto, & melle sumpta. Lingux quoque recens subiecta, præstat ne hydropici sitim sentiant. Coquitur plurimis modis: in olla quæ coniiciatur in clibanum aut furnum, uel adipe aut luteo illita, aut frustatim in patinis. Et cruda siccat, deinde conciditur, coquiturque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vsus sic coctæ ad hydropicos. Ad urinam ciendam tribus o-

Tom. II.

bolis cum melle & aceto potæ. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant vlcus, quibus innatet cibus. Ad tormina, regios morbos, tussim veterem cum suspirio. Discutit & follicis strumas quadrinis diebus soluta, furfures capitis, & vlcera manantia illita ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia, maxime vi concoctionem facias. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta, mista resina. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. *Hæc Plinius.* In quibus Marcellus, Vergilius & Corn. erroris cum insimulant, quod dixerit adipe aut luto illita, pro eo quod est apud Dioscor. *σῆμις ἢ ἡ μάλα σκληρὰ δόρεται*, id est, farina aqua subacta, quam pastam vocamus, aut luto oblitur: *σῆμις* enim & *σῆμις* hic non apicem, nec multis aliis locis apud medicos significat, sed pastam aut fermentum. Docet itaque Dioscor. & quomodo assata sit, & quomodo coquenda, & quomodo cruda concisa assiccanda, omnia clare & euidenter [inquit Cornarius.] Verum ea confuse tradidit Plinius lib. 20. cap. 9. Coquitur, inquit pluribus modis in olla, quæ coniiciatur in clibanum aut furnum, vel adipe aut luto illita aut frustatim in patinis. Et cruda siccat, deinde conciditur, coquiturque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Quod itaque tosti purgari dicit, & medium eius iterum in aqua coqui: hoc Dioscor. non vult, sed de assata siue tosta purgata, medium in usum assumi. Totam verò Scillam item incisam coqui, permutata aqua donec amaritudo aut acrimonia in ipsa non percipiatur. Ibidem tradit Plin. vim quoque ac vsum medicum Scillæ: & habet id etiam quod Dioscor. ad finem dixit, esse auxiliare contra veneficia medicamentum totam præ foribus suspensam, his verbis: Pythagoras Scillam in limine quoque ianux suspensam malorum medicamentorum introitum pellere dicit: quanquam idem quoque de Asphodelo lib. 21. cap. 17. prodiderit, velut embl. 154. Corn. meminit vbi etiam Theophrast. locum adduxit.

Quæ verò de aceto ex Scilla parando exacerdoque idem Plinius dicit, infra expendemus. Verum hic addemus, *ἀρωματισμένης* à Dioscor. & reliquis medicis Græcis dici, qui sanguinem ex infernis partibus sursum educunt, & per os reiciunt. Ceterum Dioscoridis modus præparandi Scillam (ait Lobel. Obs. ignauia & inscitia Pharmacariorum exoleuit. De Scilla sic differit Galen. lib. simpl. Admodum incidentem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc quispiam secundi ordinis censeat exalfacientium. Præstat autem aut assam aut elixam sumere: sic enim vitium eius vehementia exoluitur. Pauli testimonio Scilla calefacit & siccat ordine secundo: Mesue autem calida tertio & sicca propè secundum. Dodon. autem tertio. Sed Matthioli sententiâ, vsque aded calida est & sicca, vt exulcerare possit.

Hoc autem annotandum cum Syluio, Veteres excepto Mesue, non meminisse, neque cultri ex ligno Pini vel Cupressi, ad diuidendam Scillâ, nec acus lignæ, nec de medio eius abiiciendo, vt Neoterici faciunt. Quinimò Gal. ad Pisonē de Theriac. iubet sumere partes interiores Scillæ. De ratione extrahendi succi legatur Sylu. lib. 2. Pharmacopœiæ.

Si Scilla reponatur inter fructus arcet eorū putredinē. Ajōt minutim incisam & in vase vitreo melle pleno, per totam æstatem Soli expositam,

Fff 3

Plinius non

Temper.
Galen.

deinde collatam, præsentaneum esse remedium epilepticis.

Pancratium aded rusticis Hispanis exosum ut Clusium eius bulbos fruentem admonerent ne degustaret, præsentaneum enim esse venenum: Illi tamen aqua dum illa assatur extillante scabiem vtiliter illini & curari asserebant.

MEL SCILLITICVM.

Mel Scilliticum.
Quidam ætatis nostræ (verba sunt Matth.) Medici in cerebri, & nervorum frigidis affectibus Scillam crudam ab involucribus repurgatam minutim secant, & cum melle plurimo in vas vitreum coniiciunt, insolantque per æstatem, ardente præsertim Sirio; demum percolato melle vtuntur ad comitiales, & alias cerebri ægritudines, à frigiditate excitatas. Sed alia longè diuersa fuit Galeni ad hos vsus Scillæ parandæ ratio. Quippe qui consiliam Scillam nunquam melle commistam exposuit insolendam, sed ut ab ea succum Sole colliquatum in diebus canicularibus eximeret in fictile, vel vitreum, vas, in quo plurimum mel fuisset, dissectam Scillam inmitteret: deinde tantisper insolabat, donec Solaribus radiis ipsa liqueceret. Ex quo palam fit, quod plerique à Galeni instituto prorsus aberrant, ut qui Scilliticum mel conficiant Scillæ liquoris vice.

Oxymel Scilliticum.
 Tractaremus hic de Oxymellite Scillitico nisi maior esset historia, præterea iam incipit magis compositas vires nancisci, de eo Plin. l. 3. c. 2. Mesues lib. 3. de Antid. cum com. Sylui: ut & alii.

Vinum.
 Vinum quoque ex Scilla fit hoc modo, concisam velut dixi Scillam in Sole siccato, deinde ex ipsa contusa, & angusto cribro excussa, minam vnā linteo raro illigato, & in mulli boni ac recentis sextarios viginti mittito, & per menses tres macerari sinito. Postea vinum in aliud vas transfusum, diligenter coopertum reponito. Potest & humida Scilla in vsum assumi, Rapi modo concisa, & pondere duplicato. Debet autem per dies quadraginta insolari, & valde inueterari. Sed etiam hoc modo prædictum paratur vinum. Scillæ dissectæ & repurgatæ tres minas in Italicam metretam musti demittito, & senos menses in vase obstructo macerari sinito: post id tempus defæcatum & excolatum vinum reponito. Commodum est ad cruditates, & ciborum corruptiones, & eos qui hos reuomunt. Item quibus crassi in ventre aut stomacho hærent, lienosis, malo halitu præditi, hydropicis, morbo regio laborantibus, in difficultate vrinæ, tormina sentientibus, inflatis, resolutis, rigoribus diurnis, vertiginosis, contulsis. Ducit etiam menses, & nervos maximè lædit. Melius est quod vetustius est. Vitare tamen eius vsum oportet, tum in febribus, tum in his qui intus ulcus habent. Hæc Diosc. Hic subscribenda quæ Gal. tradit de vino Scillitico lib. 3. de paratu facilibus. Vinum fieri è Scillæ radice Plinius ita simpliciter lib. 14. c. 16. dicit. Sed quomodo fiat, & quem vsum de se exhibeat, neque eo loco, neque alibi vsquam, quod sanè ego (inquit Cornar.) sciam, tradit. Columella uero libri 12. c. 31. & vsum, & parandi modum sic tradit. Vinum Scillites ad concoquendum, & ad corpus reficiendum, itemque ad veterem tussim, & ad stomachum, hoc modo condire oportet. Primum ante dies quadraginta, quam vinum voles vindemiare, Scillam legita, eamque secato quam tenuissimè, sicut ra-

phani radicem, taleolasque sectas suspende in umbra, assiccentur. Deinde cum aridæ erunt, in musti aminari sextarios 48. Scillæ aridæ adde pondo libram, eamque inesse patere diebus triginta. Postea eximito, & defæcatum vinum in amphoras binas adicito. Alii scribunt in musti sextarios 48. Scillæ aridæ pondo libram & quadrantem adici oportere, quod & ipsum non improbo. Alii hoc ipsum Scillæ pondus, quod supra dixi, in musti duas urnas adiciunt, & per 40. dies inesse patiuntur. Hæc quantum consona sint his quæ Diosc. prodidit, conferentibus diiudicare facile est. In vulgaris tamen exemplaribus Columellæ, ad finem legitur, in aceti duas urnas adiciunt. Pro aceti autem voce, legendam esse vocem musti non dubium est. Sequitur enim aceti Scillitici præparatio mox c. 34. sequenti. Hic autem de vino Scillite parando agit.

Acetum Scilliticum.
 Acetum Scilliticum hoc modo Dioscor. præparatur. Scillæ albe purgatæ, concisæ, & filo tractatæ, ut frusta mutuo se non contingant, & in umbra ad dies quadraginta siccata, minam vnā accipito, & in aceti boni sextarios 12. mittito, & in Sole ad dies sexaginta macerari sinito, vase diligenter operto. Postea exemptam ac expressam Scillam ipsam quidem abiicito, acetum verò excolatum vasis excipito, ac reponito. Quidam minam Scillæ vnā, ad aceti sextarios quinque ammiscunt. Alii mox purgatam citra ressecationem, eodem pondere iniiciunt, & per menses sex sinunt. Et tale maiorem secandi vim acquirunt. Idoneum est si colluatur, ad gingiuas humore flaccidas, constringens ac firmans ipsas, itemque dentes mobiles. Putredines quoque & graueolentias oris satis emendat. Idem absorptum guttur firmat, & callosum facit, & sonum validum ac clarum efficit. Assumitur etiam ad stomachicos, ægrè concoquentes, comitiales, vertiginosos, melancholicos, & fatuos. Insuperque ad vteri strangulationes, & coxendicum affectiones. Refocillat & valde debiles, & corpus sanum ac benè coloratum facit. Visum quoque acuit, & ad auditus grauitatem (vide postea Cornarii verba) intillari potest. Et in summa ad omnia efficax est, exceptis internis exulcerationibus, capitis doloribus, & nervorum affectionibus. Datur quotidie sorbendum ieiunis, ab initio modicum, paulatim augendo vsque ad cyathum. Quidam tamen cyathos duos, aut etiam amplius exhibent.

Acetum Scillinum inquit Plinius l. 23. c. 2. inueteratum magis probatur, prodestque super ea quæ diximus, accrescentibus cibis: gustatum enim discutit prænam eam: & his qui ieiuni vomunt, Callum enim faucium facit, ac stomachi, odorem oris tollit, gingiuas adstringit, dentes firmat, colorem meliorem præstat. Tarditatem quoque aurium gargarizatione purgat, & transitum auditus aperit. Oculorum aciem obiter exacuit. Comitiales, melancholicos, vertiginosos, vuluorum strangulationibus, percussis aut præcipitaris, & ob id sanguine conglobato, nervis infirmis, renum virtutis perquam vtile. Cauendum exulceratis. Hæc Plin. post aceti tractationem, de aceto Scillino [inquit Cornar.] subiicit. Et in reliquis quidem à Diosc. non dissentit, sed quod nervis infirmis perquam vtile esse dicit, in hoc & Dioscor. & sibi ipsi contradicit. Diosc. enim dum ad omnia efficax esse ait, internas exulcerationes, capitis dolores, & nervorum affectiones excipit.

ipsa

Iste vero Plinius paulo antea de aceto agens, Velicæ & neruorum infirmis ipsum nocere dicit. In hoc itaque dissentio est, haud scio quâ occasione inducta.

Eius vero parandi hunc tradit modum. Scilla quæ candidissima fuerit, inquit, utilissima erit. Huic aridis tunicis direptis, quod reliquum è viuo est confutum suspenditur lino modicis intervalis. Postea arida frusta in cadum aceti, quamasperissimi pendentia immerguntur, ita ne vlla pars vas contingant. Hoc sit ante solstitium diebus 48. gypso deinde oblitus cadus ponitur sub tegulis, totius diei Solem accipientibus. Post eum numerum dierum tollitur vas, Scilla eximitur, acetum transfunditur. Hoc clariorem oculorum aciem facit. Salutare est stomachi, laterumque doloribus parum sumptum binis diebus. Sed tanta vis est, ut auidius haustum extinguat animæ momento aliquo speciem præbeat.

Aqua ex aceto Scillitico distillata est gravior & efficacior [Oxymellite], vomitu etiam valenter purgat humores in ventriculo crassos lentos, putres, dando ad sesquiunciam cum mellis aut sacchari rubri vnciis tribus.

De Aqua Scillæ ita differit Matthios. Squilla recentes detracto cortice exteriori, cultro incisq; vasi inferne foraminulento, & supra operculato lutoque munito imponuntur. Huius ollæ fundus immititur in alteram ollam subiectam in scobe terræ, & luto commissura circumdatur. Tam ignis excitatur circa superiorem ollam per noctem unam, horas decem aut amplius, Sic aqua defluit in ollam inferiorem, quæ cum farina vel pane mixta, gustata mures cito necat: citiusque si lithargyri paucum miscueris. Scilla in aqua macerata & à muribus pota eos interficit. De trochiscis Scillæ Andromach Theriacam hæc legimus.

Inde capillatam Scillam cum cortice sumptam, Pulce linas, medio confusa, ad fœcæ loco.

Aggeris riuuli cumulos superingere donec reddatur Scilla mollium igni caput.

Signa dabis, feruæ postea cum discutis ignes:

Exente, & ut laues dempsere exuatis,

Tres Scilla partes, Erui compone duabus Pistilloque creper concana pola diu.

Ac minimos tandem contusa premantur in orbes

Quos præcul à radiis mitior umbra tegat.

De pastillo scillitico & de præparatione Scillæ ad pastillum potest legi Fuchf. de comp. med. lib. 1.

Trachis
Syllitici

Hic autem ponemus rationem conficiendorum pastillorum Scylliticorum ex Galeno, quæ eadem est cum Andromachi præparatione: Verba autem Galeni hæc sunt l. 1. de Antid. cap. 9. Principio Scillam succulentam de terrea euellens, cuius folia penitus iam & scapus aruerint. Huic deinde cortice detracto duriorum particulam induces ex tritico nouo, quantumque fieri potest exquisito confectam, ipse postea multo calidoque cineri subiectam non prius extrahes, quoadusque circumposita pulicula crusta planè fiat. Quod si ubi hæc agis furnus aliquis adsit, vna cum pane Scillam illuc inferre potes, inde cum obducta plus iam exaruit, ipsam extrahes, & conteres. Satis assam vero Scillam intelliges, si festucam immisissam admiserit, scilla namque cum bene tostata est, furculos facile excipit. Vbi vero scillam diligenter attriueris, candidam Erui farinam admisce: nam quæ candida non est, amara supra modum esse consuevit. Cognitum autem vnicui-

que existimo prius oportere tenui cribro farinam excutere, ac præterea diligenter eam laugare. Scilla vero selqui pondere farinam superet opus est. Dico autem selqui pondere, ut si duas farinæ sumas scillæ tres accipias. Quam rem cum & Andromachus iunior asserat, nescio quâ ratione ductus velit Erui farinæ drach. octoginta esse, scillæ vero centum viginti, cum satis sit dicere, scillam erui selqui pondere superet. Postremo vero simulatque rotulas tenues ex hac mistura conformaueris, in cella, sicuti paulo ante dicebamus, ad meridiem vergente repones, quas tamen non in solis radiis collocabis. Verum sicut de pastillis Viperæ dictum est, ita in his quoque cetera perage: Hæc Galenus.

De Scilla venenata & remediis.

In Scyllarum genere quædam suapte natura venenosa prouenit, quæ sua malefica vi, etsi quam paræ deuoretur, illico tamen hominem torquet, quemadmodum Fungi, qui in lethali genere habentur. Venenosa igitur scilla [ut Mesues tradidit] sola, nec alteri annexa, prouenit, locisque oboritur fœdis, ac graueolentibus, ut apud Themas. Quapropter de hac differens Auic. inter venenatas plantas fen. 7. 4. volum. sic inquit: scillæ malæ vltus ventriculum exulcerat, & intestina, ipsasque Mesaraicas venas, aliisque meatus, qui è ventriculo in iecur permeant: Quo fit ut in visceribus oriantur punções, acutique cruciatus, & inde dysenteria. Quibus incommodis succurritur lactis potu, in quo ferrum, quod Græci stomopna, nos vero chalybem appellamus, pluries restinctum fuerit, deuoratisque ouorum vitellis, in aceto decoctis. Quicquam iis friza cibaria conferunt, pinguis carniū iura, recens, crudumque butyrum, & extrema iuuenum quadrupedum membra, aliæque permulta.

BVLBVS ERIOPHORVS.



Sunt huic Simula, ob- Descriptio
longa folia.
Hyacinthinia
ferè similia,
minus carno-
sa, & succulen-
ta, duriora
tamen, viri-
dia, mucro-
nata, sapore
ingrato, qui-
bus minutis-
sime etiam
confractis,
tenuia quedam
fila instar te-
lez arancarum
diduci possunt.
Ex horum medio
caulis exit cu-

hitalis aut amplior, rectus, scillini caulis æmulus, leuis, nudus, virescens, superiore vero parte ad cæruleum colorem tendens: in summo veluti oblongam ac densam fert spicam in denos vel plures versus, antequam explicetur, distinctam, primum viridem, sed paulatim (dum sese explicat in flores) cæruleum colorem contrahentem: flores senis foliolis stellatim expansis constant, triangulo umbone in medio protuberante,

Hyacinthi autumnalis floribus promemodis similes, inodori, colore cum suis pediculis cæruleo & internis staminibus, quorum apices initio purpurei sunt, &, ubi sese explicarunt, veluti pallescente quadam farina aspersi. Incipit florere ab imo, uti Scilla solet, & reliqui magna ex parte bulbi, qui flores racemi aut spicæ in modum confertos habent. Semen etiam obseruare volumus: sed flores admodum caduci, statim marcescere cœperunt, & relictis in caule tantum pediculis deciderunt. Radix crassa & bulbosa est, ex plurimis tunicis contexta, alba, tomentosa, & veluti araneorum telis obsita, multos circa latera natos bulbos habens, & crassis oblongisque fibris nirens.

Hæc est Clusii descriptio quam integram ex eo ponimus: potuissimus quidem describere, ut qui diu coluerimus & obseruauerimus veluti fila araneorum, quum franguntur folia, sed nobis flores non protulit. Liberum per nos esto cui libet iudicium asserendi an planta quæ exhibetur sit Bulbus Eriophorus Theoph. scribentis lib. 7. Hist. pl. c. 13. conitare Bulborum plura esse genera, sed maximam, peculiaremque præcipue differentiam lanigerarum herbarum. Eile enim tale quoddam genus, in littoribus nascens, cuius inter luminum corticem, eamque partem, quæ edulis est, lana sit, ex qua mappalia, vestesque quædam conficiantur. Sed huius bulbi, Theoph. neque regionem in qua id fiat, neque quicquam diligentius, præterquam Eriophoron id appellatum, in exemplaribus, quæ quidem Plinius inuenierit, tradit.

Bulbus porro hic Muscari maioris nomine Constantinopoli Clusio allatus fuit. *ipsoque Laniferi* nomen ipsi indidit, ob tomenti copiam, quod lanæ modo in stamina diduci potest.

Dodon. in fol. depingit, sub titulo *Bulbi Eriophori Viennæ nati*. Lobel. Obs. figuram Clusii habet, ac dicit eum veram Bulbi Eriophori Theoph. effigiem exhibuisse. I. Gerar. *Bulbus Eriophorus woolly Jacint.* *Bulbus bomyctinus commentitius.* falsæ dem basie Jacint. C. Bauh. Phyt. *Bulbus Eriophorus* Theoph. id est, *laniferus*.

Bulbum Eriophorum primum vidi anno 1578. allatum ex S. Lupo Burgundia, Plantatus in horto H. E. C. Montbelgardi, quum latuisset æstate & exstimationem putrefactum, Autumno produxit folia: tandem multiplicatus, verum multis annis florem non produxit, qui sanè mihi nondum visus: D. Martinus Chmielecius Prof. Basil. Basileæ in horto suo colit, ac in hortum H. C. Witt. plantandum dedit 1599 quum periisset mihi. Constantinopoli rediens attulit Philibertus de Bruxella, qui nonnullos Clusio dedit, quorum partim ipse, partim C. V. Ioann. Aicholtzius Medicus & professor Viennensis aliquot terræ concedidit. Clusio omnes perierunt, ille verò duos conseruauit, quorum alter etiam floruit non sine ingenti eorum lætitiâ. Generoso D. Longatre Iunio anni 1583. flores dedit.

Flores mihi proferebat insequente Aprili, quia videlicet, in frægili per hyemem adseruata: altera minor, quam horto credebam, & totius hyemis inclementiam in illo bellè perferebat, dumtaxat Maio, quemadmodum & illa prior, quæ etiam in horto reposita, altero anno florebat. Cæterum hanc plantam cum Narcissi speciebus quarum icones Matth. exhibuit suis in Diosc. com. historiam verò non dedit, diligenter conferens, non absumilem reperio eius Narcisso 4. qualis saltem

saltem extat in Comm. anno 1570. Venetiis editis.

Matth. Lat. & Ital. cum mag. fig. Narcissus 4. qui figuram habet cum solo titulo: non demonstrans unde acceperit iconem.

Narcissus
4. *Matth.*
Id. Arab.
Id. Arab.

ORNITHOGALVM CÆRVLEVM pallens, & ornithogalum Hispanicum minus.



Ornithogalis qualibet sui parte valdè cognatum [teste Lob. obs.] & affine, sed flos cæruleus, Hyacintho Autumnali penè par & similis. Ex Turnæsi vrbe primum D. Brancioni munere missum. Idè cum hoc fortè fuerit Ornithogalum Hispanicum minus siue sextum, quod auctore Clusio hist. post.] ex paruo orbiculari albi-

cante bulbo tena aut septena, nouo vere profert folia Ornithogalo vulgari ferè similia, sed paulò angustiora, nulla vena canticante per longitudinem secta, è quorum medio prodit singularis *canaliculus*, interdum & alter, palmariis, teres, sustinens senos, septenos, aut plures *flosculos*, alternatim quidem nascentes, sed quasi umbellam quandam efformantes, adè æquali sunt altitudine, non secus atque in vulgari & Arabico, senis foliolis ex albo subcæruleo umbilicum occupantibus: nulla adhuc capitula vel semen obseruare Clus. potuit: tota coma breui à floribus marcescente. Cômunicabat Clusio Generos. D. de Longatre *Hyacinthi stellaris serotini albo flore* inscriptione, qui ex Hispania missum dicebat. Floret Aprili.

Ornith. Hisp.
panicum minus
Clusio

Hyacinthi
serotinus
serot.
Locus & tempus

BVLBVS MONOPHYLLOS FLORE albo, an BULBUS Theoph.



Valdè rara est hæc planta (autore Clusio Exot. cuius certè flos ipsi ante annum 1605. non cõspectus. Eam autem redemerat cū aliis biennio ante à Gallo rhizotomo Nicolao le Quilt, Lutetia Parisiorum comitante, qui in Lusitania erutam asserbat. Vnico autem

Laniferus

Locus & tempus

autē ē terra prodibat foliis tenui primū & præ-
sus iunco, quod tandem pedalem adquirebat lō-
gitudinem: duabus autem supra terram vnciis
paud maiorem adquirebat latitudinem, & cana-
liculatu fiebat, extremā tamen parte manente
iuncea: ubi verō latorem adquirere incipiebat
latitudinem, ex eius medio exiliebāt triuncialis
longitudinis *calliculus*, tenuis, levis, dilu-
tius virens, in cuius fastigio alternatim siti erant
tres flores non valde magni [ut ex iconē obser-
uari potest, in qua voluit florum magnitudi-
nem expressā] qui sex foliis cādidissimis erāt præ-
diti, non multum ab similes floribus Graminis
Parnassi Herbariorum, siue Hepaticæ albæ Cor-
dis, sed nullo caliculo, ut illi, inclusi: ē quorum
medio prodibant sex alba *stamina* flauis *apicibus*
prædita, & umbilicum occupabat *capitellum* tri-
gulare, summo fastigio sustinens exilem *filum* al-
bum, *staminum* longitudinem non excedentem.
Odoratus autem erat iste flos, & spinæ appendi-
cis florum odorem æmulabatur. Eius *bulbus*
orbicularis erat formæ, nec Anellæ nuciis ma-
gnitudinem excedebat, fuscā membranā tectus,
sedēque illis multis tenuibus candidis fibris ob-
sitā. Bina folia, toridēque cauliculos habuit,
ut in tabella ad plantæ normam expressā videre
licet: flores autem aperiebantur medio lunio:
quæle semen prolatura fuisset, nihil pronunciare
possum, quandoquidem plantam ē terra eximere
coactus fuit, ut pictori exprimendam traderet: &
tamen bulbus postea terræ denuō fuerit com-
missus, caulis tamen cum flore breui emar-
cuit.

Quo nomine appellare debeat hanc plantam
dubitat, nisi quis forte *bulbus* esse censcat, cu-
ius Theophrast. lib. 7. Hist. Plant. cap. 13. ineminit:
sed quum eam non describat, & dumtaxat re-
ponat inter plantas quæ bulbosa radice constāt,
difficile est certi quidpiam statuere. Siue autem
bulbus, siue *bulbus* quis appellare ma-
lit, per Clusium semper licebit.

BVLBVS SYLVESTRIS FUCHSII FLORE
luteo, siue Ornithogalum luteum.

Descriptio



VERIS mu-
nus Or-
nithogalon
luteum radice
est bulbosa,
Ornithogali
albi bulbum
æquante, al-
ba, prætenui-
bus filamen-
tis fibrata, gu-
stu viscoso &
subdulci non
amaro, & a-
stringente, ut
anorat Fuchf.
& Dodon. ē
radice statim
folium emer-
git porraceū,
semunciam
ferē latum,

didrantalis circiter longitudinis, in terram ca-
ducum, coloris glauci, in teretem mucronem de-
sinens, glabrum, superius læue, inferius costis
plantagineis donatum, modō vnum, modō duo

aut tria, plura interdum folia sunt, pinguiuscu-
la, angusta, triquetra: comitatur ipsa ē bulbo
quoque ortus *caulis* singularis, angulosus, folius
breuior, subrubens, cetera nudus, alioqui fescū-
ciā ferē infra summum cacumen folio præditum
vnico aut altero textantali, vel palmari, nonnū-
quam glabro, aliās subhirsuto, oris paulū intro
flexis, ut carinam imiteretur: ē cuius sinu reliquis
caulis pergens, aliās indiuisus, *stamen* gerit vnum,
aliās subdividitur pluresque ad nouem vsque flo-
res sustinet, vnicuique diuisioni folio appposito.
Flores singuli ex longiusculis pediculis Ornitho-
galo similibus, senis constant totis oblongis, fo-
ris viridantibus, hirsutis oris luteis, intus peni-
tus flauis, medium occupantibus totidem *stami-
nibus* cum *apicibus* luteis: medietullum obsidet,
etiā nondum delapso flore subnascens *capit-
ellum* triquetrum, *seminis* conceptaculum, cuius
ex umbilico *filus* exit in apicem luteum delinēs,
Suspiciamur a Cordo in sua historia Sisyriachiū
dici, cuius radices sunt foris interdum luteæ, in-
tus verō candidæ, dulces, & Hordeum Pisumque
aqua maceratum sapore imitantes.

Trag. *Bulbus agrestis*, *Cepa stellata* genus,
Nonnullorum Germanorum *Asterzweibel*, *Seld-
zweibel* & *wildzweibel*/hoc est, teste Clusio, *Ce-
pa sylvestris*. Quia verō nos de ea nihil apud
Veteres Herbarios legimus, vocabimus inter-
rea Bulbum agrestem Fuchf. qui similiter bulbus
silu. dicitur, ac qui describit & depingit, adap-
tans sibi Discor. Plinii & Galeni verba.

Apud Amatū Lugdunū impressum posita i-
con huius bulbi, cuius mentionem non facit,
quod animaduertam. Gesner. hort. *Bulbus hirsu-
tus* *stultus* luteus. Nondum certe cognitum (Do-
don. Gall.) quomodo hic bulbus Veteribus dictus
sit, quidam Bulbinam putant: aliis est *bulbus* *escu-
lentus* id est, bulbus esculentus: ille nobis nomi-
natur *Bulbus sylvestris*. Belg. *Veltcyenyn*. Gall.
Oignon sauvage: hæc Dodon. qui depingit & de-
scribit.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 149. *Ornithogalum lu-
teum* Adu. pag. 56. Germ. *Geel feltzweibel* & *Az-
ferzweibel* / *Bulbus siluestris* Fuchf. & Trag. *Sis-
syrinchion Cordi*. *Bulbus esculentus* Latine. *Ornitho-
galum* & *Clusii hirs. post.* Ungari *Stellara* vocant,
quod quidam *Perdicium* Theophr. esse
censent, qui forsitan lib. 1. cap. 3. scribit plures illi
radices esse quā folia: adiecit tamen crassas
habere radices, quæ sanē nota huic non con-
ueniunt.

Casp. Bauhin. Phyt. *Ornithogalum* 5. siue *luteum*,
Bulbinam quibusdam, aliis *Bulbus esculentus*, aliis
vomitarius, nonnullis *Perdicium* Theophr. i. hist. n.
quibusdam *Bulbus maralis*.

Histor. Lugd. pag. 1502. *Bulbus sylvestris* Fuchf.
& Dodon. Sunt qui Bulbinam vocent, alii *bulbus*
esculentus, id est Bulbum esculentum, nominant,
quorum sententia peritis Herbariis haud placet.
Ruellio, *Bulbus* *sy.* non desunt qui *Bulbum vo-
mitarium* esse credant. Item Ornithogalum lu-
teum Lob. siue bulbus silu. Dodon. Inignis i-
gnorantia Compilatoris hist. qui duas habet fi-
guras & historias vnius plantæ diuersis locis.

Tabern. icon & hist. *Ornithogalum luteum* siue
Geelfeldzweibel. Melius nobis placet figura quā
exhibemus, quæ iam ex Fuchfio parata erat quam
noua Tabern.

Gerard. *Cepa agraria* Star wilde of Bethles
hem. Bulbinæ.
Basileæ prouenit circa Wild & Gundeldins
gen: Fr. Casp. Bauhinus collectum in Rhætia

*Cepa Stel-
laris*
Sylvestris.

Perdicium.

Hist Lugd.
Comp. bot.

*Cepa a-
graria*
Bulbinæ
*Locus &
tempus*

circa Curiam attulit: mensis Martii fine des-
flescentem obseruavi in horto Io. Heitzman
pharm. Bas. circa Lugdunum florentem Februa-
rio & Aprili, Montbelgardi etiam prouenit mihi
in horto Il. E. C. munere prædicti Pharm. florens
Martio. Clus. In Alpium pratis ubi siluæ desine-
re incipiunt. Lob. Non ita frequens Italia, Nor-
bonæque calidioribus visitur. In Aruernis &
ad Lugdunum pomeria. Sisyrrinchion primo Vere
folia emittit, nec proximo, sed altero anno, cau-
les floresque producit. Nascitur arenosis, iisque
aliquantulum humentibus aruis. Qui verò in
pingui planoque solo, sub arboribus nascitur (in-
quit Cornar.) quò fluuiorum inundationes per-
ueniunt, maior quidem est, sapore & viribus i-
gnauior. Vbiq; ad agrorum & siluarum exdua-
rum margines in Germania frequens, sed etiam
apud Vngaros circa sepes & agrorum margines
natum vidit Clusius.

Trago siluestris hæc Cæpa in cibo non vsur-
patur. At in Medicina non contemnendi est vsus.
Siquidem radix [ut idem Trag. testatur] in ca-
lido cinere torrefacta, ac cum melle tusa, inque
linteo impesita, vlcera depascentia, & manantia
sanandi, durisque tumores emolliendi vim ha-
bet. C. Bauh. Bulbum maiorem contusum, in-
fantibus lactantibus consulsione labbrantibus
in lacte exhibent. Hist. Lugd. Dictum autem est,
Pedicularum, quòd pedices ad id se voluerit ter-
ramque suffodiant. Non desunt qui vomitorium
bulbum esse credant, quòd vsu compertum sit ra-
dicis decoctum vomitiones ciere, & aluum va-
lenter ducere, non dissentiente Diosc. deline-
atione, scribentis, Bulbum vomitorium folia ha-
bere lori modo, latiora quàm Bulbus esculentus:
radicem similem bulbo, cortice nigro. Quæ si
per se edatur, vel decoctum eius bibatur, velicæ
malis medetur & vomitiones mouet.

ORNITHOGALVM PALLIDO FLORE.

Descriptio

Est hoc Clusio. Hist. poster. Ornithogalum 7.
non valde ab simile Bulbo silu. Fuchii, maio-
ri tamen folio constat, cauleque crassiore, licet infir-
mo: binique aut terni, quos sustinet flores, maio-
res, minus flauo, sed ex herbaceo, quodammodo
pallidi. Obseruabat in Stiriacarum & Austria-
carum Alpiu
pratis, ubi sil-
uæ desinere
solent.



An Tabern.
icon. ornitho-
galum maius
Erdnosfeldt
zwibel. Icon
Tabern. vide-
tur responde-
re Ornithoga-
lo Clusii mo-
do dicto, ve-
rum inepetè
ponitur pro
vero Ornitho-
galo, cuius eo
capite tradit
descriptio. Gerard. Orni-
thogalum lu-
teum, yellow.

star of Bethlehem.

Ornithogalum minus à Pyrenæis.

Binos à Venerio exiguos bulbos in Pyrenæis *Hyacinthi*
erutos accipiebat Clusius hist. post. in append. *stellati*
Hyacinthi stellati albicantibus floribus appella-
tione insignitos, quorum flores, quum anno
1600. conspiceret, non Hyacinthi, sed Ornitho-
gali parui esse deprehendebat: etenim & similia
folia, & flores non dissimiles. Ornithogali mi-
noris sexto loco descripti. (Ornith. cærulei pal-
lentis [c. 33. l. 2. plant. hist. foliis & floribus ha-
buerunt: in eo duntaxat differre ipsi videbatur,
quòd illius flores paulò maiores apparent, sex
etiam foliis constantes, ut illius, quorum singula
fieri foris, seu vena subcærulea secundum lon-
gitudinem per medium essent distincta, & sex
staminulorum apices, in hoc furui, qui in illo
violacei. Florebat Maio.

ORNITHOGALVM LVTEVM minus.

Videtur prodiit foliolo, duas aut tres vncias lon-
go, angusto, exalbidi coloris & acidi gustus:
iuxta quod tenuis vncialis *cauliculus*, vnum aut
alterum foliolum sustinens, & quorum medio bi-

Descriptio

ni aut terni
exiliu
stello
li stellati, in-
tus flauo, foris
ex viridi pur-
purascentes,
sex radiolis &
totidem sta-
minibus intus
præditi: iis
succedunt pu-
silla triangu-
la capitula, se-
mine ruffo, ex-
ili & inequa-
li plena, radix
alba, rotunda,
cineraceo pu-
tamine obdu-
cta, exigui Pisi
magnitudine.
Sed & hoc
cultura ali-



quantulum maius euadit.

Clus. Pann. Ornithogalum Pannonicum luteo fl. - *Locum*
re. Et hist. Ornithogalum. 10. C. Bauh. Phyt. Orni-
thogalum 6. siue luteum minus. Lob. Obs. Ornitho-
gali species multè minor folijs longè exilioribus &
angustioribus: in viridacis nostris prouenit.

Aprico magis delectari videtur, abundantius-
que crecit in apertis Meridiei oppositis.

Ornithogalum flauum cum staminibus rubris.

Ornithogalum flauum Alemarianum, circa
Alemarian Hollandiæ urbem repertum, mihi
non conspectum, inquit Clusius hist. post. sed N.
V. Io. ab Hogelande de eo me monuit. Binos
duntaxat id prædictum est folijs, angustis, longis.
Hyacinthi botryodis vulgaris cæruleo flore to-
liis valde similibus: cauliculo inter illa prodeun-
ti insident flores flauo, duplè maiores, staminibus
in medio rubentibus: ejus bulbosa radix adeo
vulgari

vulgari iam dicto similis, ut si miscantur vtriusque bulbi dignosci non possint. Pro Nono haberi poterit.

ASPHODELVS MAIOR FLORE ALBO,
ramosus & non ramosus.

Complures circumquaque ex vno radice capite Peonia modo propagantur radice, o-
huarib. tuberibus intercepta, gustu Monspelii, ut
verum fateamur, dulcibus, nullaque nobis lin-
guam acrimonia vellicantibus: folia carinata:
Lobelia Cypri, Oenanthes, aut Porri similia, tri-
quetra, viridantia, cubitum fere longitudine ex-
quant, statim exorta: inter quae surgit caulis sin-
gularis, rotundus, laevis, duos aut tres cubitos al-
tus, robustus, à cuius medio ad summum usque
fastigium numerosi conspiciuntur flores stellati,
Ornithogali maiores, foliis albis striâ rubrâ no-
tati constantes, apicibus luteis: quibus decidē-
tibus capitula succedunt Cerasis paria, semen
continentia copiosum, triquetrum, fuscum.

Sic nos de-
scriptimus

Asphodelum
cum studiis
incumbere-
mus Monspe-
lii ante 40.
annos: icon
nostra est ex
his quas emi-
mus: quum
autem Clu-
sius sum ali-
ter nonihil
describat sa-
pore diuersū,
& duos pro-
ponat, nos
totā ex eo hic
ponimus hi-
storiam quae
eiusmodi est.

Asphodelus
primus mul-
ta habet folia
oblonga, an-
gusta, trian-
gula, & velu-
ti carinata,
fungosa &
lenta, mucro-
nata: caulem
rotundum le-
uem, bicubi-
talem inter-
dum, in ra-
mosos super-
ne fissū, quem
à medio fere
sursum ver-
gendo exor-
nant multi
stellati tex fo-
liorum flores,
coloris intus



albi, foris uero neruo purpurascēte singula fo-
lia secundum longitudinem quasi distinguente,
[ut Ornithogali flos virescente linea distinctus
est,] totidem quot foliola staminibus medium

occupantibus: semen durum, lignosum, rugosum,
atrum, & figura triquetra, capitulo orbiculari fe-
rè, sed tribus eminentioribus costis praedito, &
ex viridi purpurascēte continetur, quod illo per
maturitatem dehiscēte, cadit: floret per partes
ut verè dicat Theophrast. & incipit ab imis. Ra-
dices ab vno capite numerosae exeunt, oblongae,
exiguas naris similes, sed inferiore sede crassiores,
atque in fibras desinētes, succi plenae, candicā-
tes, ingrati & acris gustus. Istius radices vide-
re memini dum Olyssipone Hispalim proficiscer-
er, atro erutas, quae ducentos aut plures ab
eodem capite pendentes, eoque ramosos ad nodū
napos haberent, ut quinquaginta aut amplius li-
bras totam plantā pendisse putem. Itaque nihil
mirum, si Plinius octoginta simul acervatis sa-
pe bulbis referat. Alter huic omnino similis,
exceptis caule, qui vnicus est, neque furculosus,
& flore qui omnino albus: illius etiam radix nō
admodum numerosa.

Placet in tota Asphodelorum varietate prius-
quam ad certas species descendamus veterem de
eisdem doctrinam more nostro proponere. Infit
autem Theophrast. lib. 7. Hist. stirp. ἡ δὲ ἀσφὸδελὸς
ἡ ὀνίχογανος ἡ τριανθῆς ἡ τριανθῆς ἡ τριανθῆς
Id est, Asphodelus longum & angustum, & ali-
quantulum viscosum folium habet. Et paulo in-
ferius: Caulem verò habet Asphodelus maxi-
mus omnium: Anthericus enim maximus est.
Et paulo post: Est etiam multi seminis Aspho-
delus, & semen ipsius lignosum est, forma trian-
gulari, figura nigra. Gignitur hoc in rōn-
do quodam, quod sub flore est, excidens æstate
ubi id dehiscit. Atque particulatim, quemad-
modum etiam in Scilla contingit, & primum ab
inferioribus partibus. At in antherico nascitur
vermis, qui in aliud animal volatile floridum
transmutatur. Deinde cum anthericus exarue-
rit, ipso erosio euolat. Videtur autem hoc pe-
culiare habere inter reliqua laui caule praedita,
quod cum angustus sit, propagines superne ha-
bet.

Asphodeli mentionem teste Plin. & Homerus
fecit. Radix eius naris modicis similis est, ne-
que alia numerosior, octoginta simul acervatis
saepè bulbis.

Theophrast. ut fere Græci, principique Pytha-
goras, caulem eius cubitalem, & saepè duum cu-
bitorum, foliis Porri sylvestris, anthericum vo-
cavere, radicem verò, id est bulbos, Asphodelon.
Nostri illud Albucum vocant, & Asphodelum
hastulam regiam, caulis acinosi: ac duo genera
faciunt, albucum est scapus cubitalis, amplius, par-
uus, laevis.

Galenus secundo De alim. radicem Asphodeli
Scillae radici similem esse dicit, & magnitudine,
& figura, & amaritudine: quae tamen si velut
lupini prepararetur, plurimum amaritudinis de-
ponit, & hoc modo Scillae praestat.

Sed de hoc ita disserit Dioscor. Asphodelus
[quem alii in eius spuris Anthericum, Roma-
ni Albucū vocant,] planta plurimis nota est, folia
habens Porro magno similia, caulem laeuem, qui
in summo florem habet Anthericū appellatum.
Radices subsunt oblongae, rotundae, glandibus si-
miles, sapore acres, & facultate calfacientes.
Dioscor. plurimis notam esse plantam Asphode-
lum dicit: & hodie plurimis nota est, qui ipsam
in Italia vident, ubi plurima etiam in horto-
rum cultu nascitur.

Verum in Germania pauci (inquit Cornar.)
aut nulli veram Asphodelum nouerunt. Nam ea

Folium:

Anthericum
Semen

Scilla mo-
do flores.

Porri fidi-
scili

Radix
Gal Scilla
similis.

radix quam officinis Aphodilum corruptè vocant, bulbosa quidem est, sed ex breui ac humili herba colligitur, quum Aphodelus caulem maximum habeat, vt inde Hastulae regiae [quod Sylu. inquit] nomen inuenerit. Itaque vt resignota, nullum apud nostros Aphodelus habet, si tamen vera Aphodelus est, quæ Aphodilus Officinis dicitur, velut à multis affirmatur, nostri ipsam Goldmurtz vocant.

Verum Aphodelum primus [vt interpret Kiberus apud Trag. monet] monstrauit is Herbarius, qui Latinus ex offic. Egenolphii in lucem prodit. Vidit aliquando Matth. eius aliquam radicem bulbis ultra centum radici coherentibus. Idem in hist. Germ. Aphodelus albus siue mas: olim non describebat: in Ital. cum magn. fig. describit quidem, sed colorem floris non annotat.

Albucum, seu veram Aphodelum semel duntaxat in Anglia vidit Turnerus. Nam quod vulgus illic appellat Affodil, vel Passodil, species est Narcissi. Sæpius vidit in Italia, & nonnullis hortis Antuerpiæ. Idem verò etiam in Anglia in horro suo colit.

Aphodeli duas species tradit Anguill. vnam in scopulis maritimis & arenosis locis nascentem, caule furculoso. Alteram caule simpliciter utramque autem speciem notissimam.

Maran. inquit Diosc. describit Aphodeli vñ genus: nos tria alia reperimus: flore & radicibus valde similia, licet folia multò minora habeant.

Geiner. horri Aphodelus Albus, Aphodelus maior & propriè Dioscoridis.

Dodon. Gall. hist. Aphodelus mas, cuius flos Græcis dicitur *αφωδilis*, & secundum Plinium Latine *Albucum*. Ait porro in hist. lat. flor. & in fol. & ex eo hist. Lugd. Aphodeli albi, flores esse colore candidos, aut ex valde diluto rubro modicè purpurascens, radices cum amaritudine leni, sapore astringente.

Meminit huius Aphodeli Hesiodus in operibus & diebus, vbi stultos ait ignorare, quàm magnum bonum sit in Malua & Aphodelo. Nam huius præcipuè Aphodeli radices edules sunt. Galenus tamen non de hoc Aphodelo, sed de bulboso eum scripsisse opinatur: eius tamen bulbos non nisi pluribus elixationibus esculentos reddi ipsemet testetur: quales non est verisimile Hesiodum commendasse, qui cibum aliquem paratu facilem insinuassee videtur.

Plinius Aphodelum [inquit Clus.] aliquibus Heroion appellari tradit, & Dionysio mare & feminam esse. Hispani priorem *Gamonas* vocant.

Lob. Obs. Aphodelus maior albus: Aduers. p. 45. Hist. *Gamonas* & *Gamonites*. Aphodelus maior albus. Aphodelus flore suauiter rubente. Item Tom. 2. Aphodelus ramosus.

Tabern. hist. & icon. *weiß Affodilmurtz*. *Aphodelus 3. albus*. Item *Rote Affodilen*, Aphodelus 6. rubens, cuius folia punctis notata.

Gerard. Aphodelus ramosus, *white Asphodel*. Aphodelus ramosus, *Brauched Asphodel*. Aphodelus flore rubente. *Rod Asphodel*. Duæ priores icones apud Tabern. sub titulis transpositæ sunt.

C. Bauh. Phyt. Aphodelus 1. siue albus ramosus mas, Clusio maior, Lobelio ramosus. Aphodelus 2. siue albus alter, Matth. Aphodelus, Lob. albus maior. Aphodelus 3. siue autumnalis. Cam. autumnalis siue maior. Dodon. flore incarnato,

Lob. suauiter rubente. Aphodelus 4. siue flore purpurascens foliis maculis aspersis. Idem apud Matth. aphodelus non ramosus, hastula regie Matth.

Græcis *αφωδilis*, Lat. *Aphodelus*, & *hastula regia*, quod dum floret prorsus sceptri regii effigiem referat, & *Albucum*, siue *Albucus* vocatur. Officinis corrupta voce *Afrodilus*, Arab. *Cheunce*, *Ehunte*, *Birnach*, *Abg*, seu *Axeras*. Germ. *Goldmurtz*, *weiß Affodilblum*, Brab. *Affodilen*, Gall. *Hache royale*, seu *Aphodel*. It. *Aphodela*, *amphodila*, An. *Affodil*, *daffodil*.

Floret in messe autore Dioscor. inter spuria. Oportet autem album Aphodelum secare circa æquinoctium vernum, antequam semen augetur. Arida Narbonæ littora Aphodeli communis feracissima sunt, vt scribit Lobel. nec minus montes à mari distiti. Sponte sua nascitur uterque, teste Clusio editionibus, saxosilque Lusitanæ, Hispaniæ, Galliæ quoque Aquitanicæ & Narbonensis, locis. Apud Belgas non nisi satus prouenit, vt neque in Germania. Floret uterque illic Martio & Aprili: in hortis Maio, & etiam Iunio. Prouenit ad vnum miliare à Monspelio, quæ itur Frontignan in colle saxoso, vidi præterea inter Aquas mortuas & Arelaten copiosissimè, in silua quæ dicitur *la Vignede*. In Italia in hortis colunt. Cortusius in suo & in horro Patavino. Bononiæ florentem Aprili in horro Nobilis di Gozandinis, vidi. Geneuæ in horro D. Coladonis Iurisconsulti, satus in mæo horro primum sequenti anno produxit folium vnicum, rectum, triangulum. Montbelgardi habemus in horro Ill. E. C. Wirt. delatum Monspelio, vbi hyemem ferre non potest nisi reponatur: Nos curauimus etiam Stutgardiam in horro Ill. E. C. deferendum. Basileæ habuimus in horro Parentis Bauhini Medici, vbi etiam alii plures. Florentiæ obseruauimus in hortis, & Parmæ florentem Aprili in horro Nobilis Antonii Lalatæ.

Aphodeli radices (ex Diosc. autoritate) potæ, vrinam & menses mouent. Sanant etiam lateris dolores, & tussis, conuulsa, ruptaque drachmæ pondere ex vino potæ. Facit & ad vomitum magis idoneos radix tali magnitudine in cibo accepta. Datur & commotus à serpentibus vtiliter trium drachmarum pondere. Integere autem oportet morsus, & radice, & floribus cum vino. Sordida item & depascentia vlcera, & mammarum & testium inflammationes cum polenta. At succus radices addito vino veteri dulci, & myrrha, & croco, ita vt hæc simul coquantur, illinendis oculis commodum sit medicamentum. Ad aures item purulentas idem succus per se in oppositam autem infusus, dentium dolores mitigat. Cæterum vltæ radices cinis alopecias replet. Oleum verò in exauias radicibus ad ignem coctum, exulceratis pernionibus, & ambustis illitum prodest. Et aurium dolori opitulatur, si in aurem infundatur. Viriliginem quoque albam cum linteis in Sole præfrictam, radix illita erit. At verò semen & flores excellens remedium sunt in vino poti, aduersus scorpiones & scolopendras. Sed & per alium infernè erumpunt. Et inter spuria dicitur radicem potam, appetentiam Veneris inhibere. Sed & Cræteuam radicem eadem dicere, & quod radix drachmæ pondere pota cum vino, podagræ dolores curet. Cæterum, inquit Theophrastus, multa ad alimentum vtilia exhibet. Nam & anthericus leuiter ad ignem tostus, in cibi vsum venit, & semen torrefactum.

Nomina
Linguarum

Locus &
tempus.

Om-

Omniaum verò maximè radix cum sicu rufa.

ASPHODELVS BVLBOSVS DODON.

sive Ornithogalum spicatum
flore virente.

Receptio



Similis Ornithogalo monspeliensis spicato, pugnium implet huius bulbosus, albus, subdulcis, à quo exeunt præparanda folia portacea, cacinata, humi ferè fusa sapore viscido; inter quæ surgit rectus caulis, vnicus, lauis, nudus, teres, duobus cubitis altior, potissimum culta, in quo cædralis spica florum Asphodeli & Ornithogali spicati, ex longis pediculis folliculo aliquoufque inuolutis, colore herbaceo, vel ex luteo pallido, odore grato, ex senis foliis stellatis constantium, in quorum medio recta surrectæ fibræ latiusculæ, foliis numero parces, albiore, in mucronem acutissimum desinentes, apices su-

finet ex luteo albidus, capitulum ambiens triquetru oblongum, Pericarpium tria interstitia habet plena semine Ornithogali albi spicati ita simili ut distinguere non possimus, paruum est nigrum, angulosum, sapore leguminoso, vel potius rugosum, Staphidis agræ modo solidum, intus candidum, sapore quali leguminoso: semine maturo se aperiunt in tres partes.

Icon nostra quæ ex empetris est, in quibusdā placet poriss. in spicato flore: altera quæ per incuriam depicta ex Plantini iconibus in eo displicet, quod pro nostra descripta planta, minus spicata sit.

Ornithogali maioris nomine meminit Clusius Pann. & Hist. post. quod sic describit: Omnium (Ornithogalorum) maximum, portacea habet folia sena aut plura, caulem inter ea emergentē cubitalem aut ampliorem, rectum, nudum, firmū, magnam florum spicam gerentem, qui explicati senis foliis constare conspiciuntur ex albo virentibus, & foris herbaceis omnino: iis succe-

Tom. 11.

dunt trigona capita, nigrum, magnūque semen continentia: radix satis crassa, bulbosa, multis tunicis candicantibus constans.

Dodon. cum list. Lugd. (bulbum fortè potius dixerit Gesn. horri.) bulbosum Galeni flore pallido [de quo lib. de Alim. facult. & simpl. med.] appellat, cum tamen nihil commune habeat cum Asphodelis excepto caule cum florum dispositione. Lobel Obs. Asphodelus Hyacinthinus totè Galen.

Cl. Baubin. Phyt. pag. 57. Asphodelus sive bulbosus. Camer. apud Matthioli. Germ. Asphodelus Galeni bulbosus bulbo & floribus albis, quæ aliqui sub Ornithogalo recensent. Suspiciamus Camer. apud Matthioli. non nouisse discrimen Asphodeli bulbosi ab Ornithogalo, flore albo Monspeliensi.

Dodon. apud Belgas non nisi hortensis. Floret **Locus & Tempus** Maio, & Iunio mente, aut ferè paulò. Clus. satis frequenter observabat inter segetes agrorum (Pannonia) Nemethvyyvar Ill. Bathiani vicinorum Maio florentem. Ego verò Genevæ passim & copiosè à la Bassie, & in colle iuxta Arve fluvium, è regione Champé, florens Maio mense. Montbelgardi in Horto E. C. plantatus perdurat.

Radix Asphodeli (inquit apud Dodon. Gal. de Virg. alim. facult. & magnitudine, & figura, & amaro Scillæ radice quodammodo est similis: si tamen ut Lupini pareat, maximam partem sui amarois deponit: inq; eo à Scillâ discrepat. Nam Scillæ qualitas difficillimè elucitur. Heliodorus certe Asphodelum laudat eam sit aut: Nec quanta in Malua & Albico sint bona, norunt. Equidem non quosdam rusticos, qui grassante fame, vix tandem compluribus elixtionibus, ac macerationibus in aqua dulci, esulentam ipsam reddiderunt. Porro hæc quoque radix, quemadmodum & Dracontii, facultatem habet tenuandi atque aperiendi. Proinde quidam pro summo remedio ipsius Asparagum ictero laborantibus exhibent. Vix autem cinis calidior, & exsiccantior, subtiliorque, ac digerere potentior efficitur: ac proinde & Alopecias sanat.

ORNITHOGALVM VETERIBVS.

Quoniam verò minus constat quale Ornithogalum Veteres descripserint, rectè non facturos existimamus, si teorim de hoc ex Veterum placitis pertractemus. Autore igitur Dioscor. Ornithogalum caules est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, à quibus prodeunt flores herbacei, qui cum hiantes se pandant lactei visuntur, inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat.

Vires ex Dioscor. posuimus sub Ornithogalo vulgari, ubi Camer. addit radicem dulcem & suavem.

Quod Dioscor. dicitur Dioscoridis dixit, Plinius semipedalem habet, fortè ex describentis errore, inquit Cornarius.

Ornithogalon itaque nouit etiam Plinius, sed Ornithogalen vocat. Theophr. & Galenus, & amuli eius Aërius ac Paulus, Ornithogalon non nouerunt. Nec nos ex Dioscoridis descriptione satis colligere possumus, quæ sit hodie ea herba.

• Cæterum quod Dioscor. dixit, inter ipsos flores prodire capitellum velut cachry incisum: id

Ggg

Cachry

Cachry.

Ornithogalum

Cornarii
et Ruellii
lapsus.

ambiguum est, an de Cachry, quod velut in a-
uellana nuce iulus, in multis arboribus nascitur.
sit accipiendum, de quo agit Theoph. lib. 3. hist.
pl. aut de Cachry rorisinarini specie, quod Græ-
ci inserto 7 scribunt 83, xv: sicut illud sine 7
83, xv. Et ad Cachry quidem nos magis ducit
conjectura id est, incitum: ad Cachry verò,
quod addit vnà cum pane id assari, velut Me-
lanthium. Hæc itaque ex auctoritate pendent iudi-
canda.

Ornithogalum nos existimamus verius esse
vulgare Matthiolo incognitum, licet in Italia
copiose proveniat, pro quo nescimus quam plā-
tam aut figmentum exhibuit sua icon: nostrum
duplex est. Cornar. auctore Ornithogalon est
ea radix quam Germ. Erdnus & Foffel forn ap-
pellant, quam alii apion volunt: hic sanè non
paruus est lapsus Cornarii ac etiam Ruellii ean-
dem nostro iudicio plantam intelligentis.

ORNITHOGALVM SPICATVM albo flore Monspess.

Descriptio



Hic radix
bulbosa
vnica est, ma-
gna, cepam i-
mitata, Clusio
candidior
quàm præce-
dentis, flore
virenti, & lon-
gior interdum
in amplā ma-
gnitudinem
extuberans: so-
lia cubitum
longa, polli-
cem lata, & ex-
tremo mucro-
ne acuminato:
caulis quan-
tū hactenus
obseruare est
datum; singu-

laris, robustus, cubito longior, ac etiam bicubi-
talis, teres, firmus, Clusio viridior præcedenti
flore virente, à medio ferè ad summum fasti-
gium, compluribus ornatur sensim sese aperien-
tibus floribus, tam denso agmine circa fastigium
stipatis, vt spicam ementiantur, quorum singula-
res tam prope ad Ornithogali albi minoris
flores accedunt, vt pro iis fallant decerpri, intus
albi, foris herbacei, apicibus in medio luteis,
foris præter oras quæ albæ sunt omnino virides,
interius vero dum explicati sunt lactei omnino
candoris: semen in triangulis capitibus alteri si-
mile, sed paulò maius & oblongius, nigrum, ru-
golum inæquale, vt in Staphide agria, sed paruum
admodum.

Matth. nor.

Matth. in Dioscoridem cum magn. fig. & Ital.
Hyacinthus Orientalis alter. Cuius solam ponit fi-
guram cum titulo, foliola ad radices pediculi, fa-
ciunt differentiam ab Hyacinthis.

Clus. Pann. p. 188. Ornithogalum maius Mōs-
pelianum. Et p. 191. Ornithogalum maius Mom-
peliano simile, è semine, Moly nomine à Rasso
ipfi Lutetia misso, natum. Camer. Epit. Matth.
Ornithogalum alterum maius. Et hist. Matth.
Germ. Ornithogalum Narbonense, quod etiam

dicitar Asphodelus bulbosus & appositae figuræ
ex Gesnerianis ad meam plantam. Aduert. in
titulo Asphodelus Hyacinthinus fortè Galeni:
Ornithogalum spicatum quorundam. Monspes-
liensium nonnullorum Pancratium. Aliorum As-
phodelus Galeni, & in margine, Asphodelus
semina Dodonzi. Ic. pl. p. 94. & Obl. pag. 47.
Ornithogalum spicatum Monsp. flore lacteo.
Ornithogalum intus forisque ex albo flavesceat,
neque candore lacteo vt Ornithogali renidet,
neque auersa parte herbidus. Radix verò minor,
oblongior, Ornithogali spicati. Item p. 48. Or-
nithogalum spicatum minus, siue altera species,
omnium parte longè minor, Belgica vireta en-
tuora alunt, cuiusmodi Liera D. Jo. Riffi, & D. Ma-
ritz de Brimon vxoris D. Contradi Schetz. Bene
fuisse Lob. si annotasset olim se idem existimas-
se cum Asphodelo, semina.

C. Bauh. Phyt. Ornithogalum i. siue maius spi-
catum, & huius species longè minor Lobel. quæ
ab Ornithogalo magno spicato, tantum magni-
tudine distare videtur, at verò cum Ornithogalo
magnissimo Diosc. conuenire. An Epimenidum.
Theophr. l. 7. hist. c. 31. de quo Plin. l. 19. c. 5. Epime-
nidii nomine. Idem apud Matth. Ornithoga-
lum maius spicatum, folia modò angustiora, mo-
dò latiora, in hist. Lugd. duabus figuris ostendit.
Sunt qui Diosc. Ornithogalum censent.

Hist. Lugd. Ornithogal. Narbonense Dod. Or-
nithogalo Narbonensi simile & magnitudine
tantum distare videtur, quod à Mycono habui-
mus. Ornithogalum magnum Myconi.

Inter segetes Mompeliano agro & per Hispa-
nias Viennæ etiam Clusio natum semine à Ras-
sio Lutetia misso Moly appellatione. Maio flo-
ret. Abundat Italia & prope Mompelium pro-
uenit inter segetes. Florens inente Aprilis. Mihi
delatum existimo ex Italia per fr. C. Bauh. nomi-
ne Asphodeli minoris albi Corussi. Est nobis
Montbelgardi in horto Ill. E. C. Wirt. vbi appo-
situm hieme floret quotannis.

Locus &
tempus.

Ornithogalum maximum floribus
prorsus natis.

Tametsi scripserim (inquit Clus. Hist. poster.)
Ornithogalum illud quod Dodonæus Asphode-
lum Galeni, omnium maximum esse, nunc tamen
sententiam muto. Nam postea aliud genus mihi
conspicuum est illo longe maius: cuius historiam
in hac Append. lectori proponendam censeui.
Multa id ineunte vere ab radice producit folia,
longa, dilutius virentia, latioraque, quàm Nar-
bonense & Byzantinum, inter quæ prodit sesqui-
cubitalis, & amplior interdum caulis, crassus, vi-
ridis, lzuis, magnam, longamque florum spicam
gerens, vt centenos, aut plures in eadem spica
numerare meminerim, sex foliis constantes, ni-
uei prorsus candoris, & nullo nervo viridi, vt
aliorum flores insignitos, qui interdum explican-
tur, sexque stamina breuia & latiuscula, alba, fla-
uis apicibus prædita, capitulaque trigonum cin-
gentia, & umbilicum occupantia ostendunt, no-
ctu verò contrahuntur, aliorum iuster: floribus
excussis, succedunt trigona capita: semen ro-
tundum, nigrum continentia: radix bulbosa, cras-
sa, candida, & lata iede multas fibras emittens.

Floret cum aliis maioribus Maio: interdum e-
tiam Iunio, pro anni præcocioris aut magis se-
rorini ratione. Eum bulbum accipiebam ornitho-
gali Arabici Lili Alexandrini appellatione insi-
guitum:

venitum : quemadmodum etiam Byzantinum eadem appellatione non semel ex Italia ad me missum.

Ornithogalum Byzantinum Clusio.



Ornithogalum maius Byzantinum (autore Clusio) paulo humilius Ornithogalo spicato albo Monsp. dilutius etiam caule & foliis, quod ex ipso Byzantio deferri aliis bulbis permixtum nullo addito nomine: noster pictor minus bene expressit eam iconem.

ORNITHOGALON CRETICVM ET Pannonicum albo flore.

Descriptio



Ornithogalum Creticum rariorum stirpium caeterumque, haud postrema, liberalitate eximii Medici Cretensis Honorii Belli ad Fratris, indeque ad nostras prouenit manus. Bulbo est nucis Auellana maiore, cuius lateribus noua proles ipso genitore

minor adnata erat: sapore tantillum amaricante: fibris tenuibus, ut in Cepis donato. Ex quo caulis prodibat pedalis in cacumine flores gerens vulgaris Ornithogali maioris, sed paucos, in spica morem digestos, sex foliis constantes, extrinsecus viridibus, interne albis: in quorum sinu veluti glomulus staminibus cinctus. Semen paruum nigrum rugosum, ac velut araneolis punctulis eleganter impressum, rotundum, nisi quod una parte modice exacutum sit, durum intus, candidum: sapore subdulci.

Simile si non idem est Pannonicum Clusii Ornithogalon flore albo, quod describit: addens, illud peculiare habet haec planta, ut natali loco, ubi sponte nascitur magna ex parte, cum floribus onusta est, sine foliis conspiciatur, aut saltem famose euanidis & flaccidis. At in hortis culta diutius plerumque folia retinere solet, & in ma-

Tom. II.

giorem amplitudinem exerceat, spicam aut vicinum aut plurimum florum nonnunquam proferens. Anno 1603. sub Kal. Decembres accipiebant Burdigala paucos Ornithogali bulbos, quos in Pyrenaeis montibus erutos esse adscriptum erat: cuius autem generis sint, proximus annus (si viuimus) nos docebit: quantum vero ex bulbi forma coniscere poteram, non videbantur dissimiles Ornithogali Pannonici flore albo iam descripti bulbis, quales etiam in aliis prouinciis nasci verisimile est.

Clus. Pann. Ornithogalum 1. siue Pannonicum minus flore albo. Post. hist. lib. 2. cap. 23. Ornithogalum quartum. Tabern. icon & hist. Ornithogalum Pannonicum, siue 2. Vngerisch Erdnuss aut feldzwibel. Casp. Bauhin. Phyt. Ornithogalum 4. siue album minus alterum. An Camer. Ornithogalum setorum, folio magis casto & minus pingui. Gerard. Angl. lib. 1. cap. 8. Ornithogalum Pann. Stir. Hungarie.

Largissime prouenire obseruauit Clus. apertis locis illo & late patente campo secundum siluulam pagi Lachn imminente, & in siccioribus pratis secundum Danubium, in monte Badenibus theminis imminente, totaque illa montium serie, inde usque ad Calenberg excurrente, & Hamburgense monte apertis & graminis locis. Bulbum & semina misit a D. Bello ex Cydonia Cretensi terrae commissurus in horto Montbelg. quem auspiciis Ill. D. Wirtemb. colimus.

LILIVM ALEXANDRINVM SIVE ORNITHOGALVM magnum Syriacum.



Summo caulem florem gerit magnum, Narcissi mediorocci patrem, quinque radiatis filis, in obtusum mucronem desinentibus, candidis totis, costatentem, cuius mesium occupat caputulum magnum, pericarpium rudimentum, circumstantibus acuminatis ligulis plusculis. Inter Lilio Narcissos sive Lobel. Obs. 18.

Ornithogala media est haec venusta planta: radice quippe Ornithogali: folia oblonga Narcissi prodeunt, imum caulem glabrum singularem, pedalem & cubitalem ambientia, in summo alis diuisum, quibus lilacei, lactei candoris, calycis instar, senis foliolis radiati flores, lunci aquatici, Alii vltimi longe maiores, Tulipe minores, obtusi, e quorum fundo glomerulus pullus protuberat. Semen pericardio tereti Ornithogali clauditur. Stamina luteola glomeratum fundum pullum ambientia.

Id fuse describit Clusius haec addens: Ex Italia missus bulbus Lilii Alexandrini nomine: Constantinopoli vero semper Zimbal arabi, quod

Ggg 2

Hyacinthum Arabicum sonat. Sed quoniam ad Ornithogali genera potius referendus videtur, quam ad Hyacinthos. Ornithogali Arabici nomen undiditlicet Matthiolus Narcissus e numero. Viennenses matronæ weiß Jacinthe/ hoc est, candidum Hyacinthum appellant.

Hyacinthi del padre nostro.

Narcissus Matth.

Nunc Italos hanc plant. *lacino del padre nostro* appellare intelligo [inquit Idem Clus. Exot. par. 2. Append. 1.] ob capitulum, siue orbiculum in medio flore conspicuum, ut opinor. Nonnulli autem (Lob. Obs. Tab. icon. & hist. cum Hist. Lugdun. Narcissus, cum quibus nullam affinitatem habet, à Matthiolo adnumerari censent, & ab eo Narcissum quartum appellati: sed falluntur, in eorum numero me aliquando fuisse ingenuè profiteor, sed istam opinionem nunc reuoco: nam alia est planta ab hac diuersa quam pro Narcisso quarto Matthiolus proponit: ea tamen etiam inter Ornithogali genera referenda.

Ornithogalum maius Dod.

Ornithogalum maius.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 10. Lilium narcissus polyanthos, Lilium Alexandrinum Neotericorum. Ornithogalum maius Dodon. C. Bauh. Phyt. Ornithogalum 7. siue maximum. Camer. in hist. Germ. Matth. Narcissus 5. Matth. Dod. Ornithogalum maius non facile ferens solum nostrum frigidum. Item c. 82. l. 4. Ornithogalum Arabicum aut maius Dodonæi, ex quo Matth. Narcissum facit. Et Horti, Lilium Alexandrinum inter Lilio-narcissos & Ornithogala medium, flos suauem odorem præbet.

Philipp. Hyacinth.

An Cæsalp. Dulipan & Hyacinthus albus de quo dicit: Caule est cubitali, crasso: coma in cæcumine, veluti umbellæ: floribus candidis, latifoliis: vasculis nigris: Bulbum fert grandio-rem, quam prædicta genera, cortice nigro: folia quoque maiora, sed simili modo prælonga, & strata, hanc sperauerim Bulbum vomitorium esse.

Locus & tempus

Belgis primum communicata hæc planta fuit, missis ex Italia eius radicibus Ill. Ioh. de Bracion, à C. V. Alphonso Pantio, & amplissimo L. Ant. Cortulo, deinde etiam Constantinopoli cum aliis raris stirpibus accepta. Semel istic florentem vidit Clusius Maior, Viennæ autem per sepe. Mira autem est huius bulbi naturam peramque re- pertus est uix vlla folia promere, nisi singulis an- nis exemplis aliquando tempore adferretur, de- inde Autumnio terra demum congregatur, tum enim deum germinare solet etiam ante bru- mam: nullus autem florere ipsi conspectus est, nisi recens Constantinopoli allatus. Nam ex illorum est numero, qui nisi istic eruti iam con- ceptum in vtero florere habeant, in frigidiore provinces translati, nullum dent. Preterea cum frigoris valde impatiens sit, neque Viennæ hye- mem in horto ferre potuit: sed in fictilibus re- ponendus, ubi bulbis circa matrem adnatis fel- iciter se propagare solet.

Tollanus Carolus Burgundicus Pharm. misit bulbos Libi Alexandrini, quos plantavi in Montbelg. horto Il. E. C. Dominus à Belle fontai- ne misit mihi Vespertio anno 1594. bulbos ex Ita- lia, qui non flore albo.

ORNITHOGALVM VVLGARE ET verius maius & minus.

Descriptio

Radix bulbosa candida quæ multos bulbos adherentes habet, veluti racemarium compactos,



fibrosos, se plu-
rimum multi-
plicantes, gu-
lta amarican-
te, lenta spu-
mosaque in-
cagine multi-
caros os re-
plentes: folia
promit angu-
sta, tenuia, lo-
ga, etiam ad
cubitum ipsi
caulem mul-
tum superan-
tia, carinata,
per medium
eorum lactea
discurrente li-
nea in terram
strata, mollia,
& inter hæc

caulem doctantalem, & sesquipedalem tene-
rum, teretem & nudum, qui circa fastigium pedi-
calis emittit, quorum unicuique subiectum, s. -
bulum oblongum, membraneum, acutum, flores
sustinentes e foliis senis compositos, oblongis,
lacteo intus candore, foris non nisi per oras, me-
dio herbido: intra quæ stamina latiuscula, sena,
candida, apicibus luteis: in medio capitulum ca-
nularum hexagonon stilum e summo profert al-
bidum, ex quo vasculum continens, inquit Ca-
merarius, semina compressa nigri coloris. Orni-
thogalum Diosc. & Plinii (quorum descriptiones
ante posuimus) affirmaremus, si crudum mandi-
obseruaremus.

Ornithogalum Matth. quod aded inter sege-
tes frequens oritur, ut, si Maio mense in aruis re-
quitatur perentis prius notis illi à Diosc. attri-
butis, facile ab omnibus inueniatur. Hist. Germ.
Ædonæ. Lat. cum fig. & Ital. Ornithogalum. s.
Item Ornithogallum secundum. Si Matthiolo
notum, cur non describit? cur contentus appo-
nere figuram non exprimentem verum Ornitho-
galum. Mirum in post. com. retinere priorem fal-
sam ac etiam secundam falsam addere nomine
Ornithogali secundi, nullum declarans discer-
tuen vel hinc solum satis apparet Matthioli ima-
ginaria in stirpibus pericia, celebri encomio, at-
tamen à stirpium ignaris decantata.

Lonicerus, quoque assumpsit iconem Mat-
thioli reticiendam, ut & qui illi patrocinatur.

Dodon Gall. vocat Ornithogalum. Belg. Vele
Aenyn. lib. aurem de floribus eas vocat. Bul-
bum Leucanthemon. Ibidem ei dicitur: vobis
Diosc. legicimum, & à Plinio Ornithogale.

Lob. & Pena Adu. Obs. & Ic. Pl. p. 148. Ornithogalem candidum vulgare. Belg. wit. Vele-
daynyn. Gal. Churlei, & aign. blanc chamepstre,
nlp. Le he Gallina.

Clus. Pann. Ornithogalon vulgare flore albo.
Hist. post. Ornithogalum quintum, vulgare o-
mnibus certe, quas petra grauerint, regionibus,
obuium in agris.

Hist. Lugd. ex Matthiolo, duas Ornithogali
plantas exhibet, quod duo esse eius genera existi-
met. Quorum utrumque cum caule foliosum sit,
& differat ab eo quod Dod. depingit, quodque
legitimum Diosc. Ornithogalon esse censet. Or-
nithogalum. 1. & 2. Matth. Ornithogalum Dod.
seu bulbos Leucanthemus.

Tab.

Tabern. icon. & hist. Bulbus Solsequius Weisfeldswit. Compil. Tabern. iconem Ornithogali [quæ non placet] cap. de Scilla sub modo dicto titulo exhibet, quæ erat ponenda folio sequenti pro suo Ornithogalo primo maiore, ubi alterius plantæ, nempe Ornithogali flore pallido, icon malè posita: Ibidem etiam considerandum an bene dicat Ornithogali flori albo folia non nihil aspera.

Gerard. Ornithogalum luteum Star of Bethlehem.

C. Bauh. Phyt. Ornithogalum. 2. Ornithogalum 1. March. an diversum a sequenti cogitandum. Item Ornithogalon. 3. siue album minus, Matthioli. Lob. Ornithogalon. Item apud March. Ornithogalum 1. Ornithogalum 2. siue album minus.

Copiosè provenit in pratis circa Dresdam ad Albim fluvium, ubi vero reperit Camerarius. Clus. Frequens est ultra Dravum & Warasdinum in agris, & nusquam non Clusio conspectum ubi fuit. Abundat in Italia propè Paraviu & iuxta Villenouam: floret Martio. Hanc apud Gesnerum vidi florentem mense Maio. Circa Lugdunum copiosè provenit. Inter Mulinam & Saseul Castellum & oppidum in Italia spontè. Basileæ vidi mense Febuario pulchrè prorumpens in horto D.D. Farlicis, vnde Montbelgardū transfusi virens mense Decembri. In horto E. C. VV. ira se bulbulis multiplicat, ut odiosum sit. In horto Nicolai Ferrariensis Aprilis mense florens obseruavi.

Coquitur à Diosc. cū pane, ut Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur. Camer. citans Diosc. addit: Est enim dulcis & suavis: ubi hoc inuenerit nescimus, in nostro Ornithogalo nullam dulcedinem aut suauitatem experimur, imò nobis amarecat.

Ornithogalo Vulgari simile latiore folio.

Ornithogalum hoc attulit mihi Hortulanus Ill. Gell. Wirt. Joh. Manaur iunior, quod mihi primò vitum Montbelgardi, florens anno 1610. Aprilis principio, vulgatiore nondum floris, nec caulis rudimentum demonstrante. Huius caulis erat brevis, flores exterius virides, interius albi: folia latiora duplè, lineà albicante destituta. Ornithogalum hoc vulgare aliud, teste Clusio, aiebat Viennæ in cultissimo horto, Gesnerosa D. de Heusenstein, latioribus foliis, crassiore caule, amplioribus floribus, paulò maiore bulbo, ex Tyrolensi comitatu allatum: alioqui cum quinto (vulgari) conueniens. Quale etiam Neapoli ad Clutium mittebat doct. Vir. Ferd. Imperator.

ORNITHOGALVM NEAPOLITANVM.

Nouum Ornithogali genus rectè mihi ante incognitum [inquit Clus. Exot. par. 2. App. 2.] Neapoli ad me mittebat an. 1600. Doct. Vir. Ferdin. Imperator, & illud quidem non elegas pro Arabico, quod ab ipso petieram. Proferebat anni insequentis primo Vere terna aut quaterna folia cæcinata, longa, Hyacinthinis non valdè dissimilia, verum angustiora, viridia: inter quæ prodibat caulis satis firmus, dodrantem altus, levis, viridis, sustinens superna parte quinos, vel etiam plures interdum flores, in anteriorem partem propendentes, rametis alternis in singulis caulis lateribus nascentes & cuiusdam membranulæ sinu, internâ parte candidis, exterâ autem ex cineraceo virentibus, orâque albas

Tor. II.

habentibus: floris umbilicum occupabat alter strobilus sex etiam foliis minoribus præditus, quæ extimâ parte quodammodo coibant, & veluti tubulum formabant, in quo apparebant sex alba staminula flauescens apicibus donata, & medius stylus albus: flores portò erant prorsus inodori quibus succedebant trigona capsula crassiuscula, in obrotum mutatione desinentia, quæ caulem propter gravitatem deprimētia, semen nigrum rugosum continebant: radice erat bulbosa, candidans, fuscâ tamen membranâ tecta, in conum supernâ parte fastigiata, in fernâ autem plana, perinde ac Ornithogali Arabici radix, minus tamen amplâ sedes, sed multis candidis fibris in situ præstita.



Ornithogali Arabici radix, minus tamen amplâ sedes, sed multis candidis fibris in situ præstita.

ASPHODELVS MINOR FOLIO fistuloso.

IN Asphodelorum classe & hanc quoque connumerant speciem minorem, quæ ex fibrosis phalangii (cuius planta satis similis) radicibus mediocriter crassis, non nodosis tamen, filia promit, multa, angusta, rotunda scet, tres aut quatuor uncias longa: inter quæ caulis surgit teres, in ramos aliquot fissus. Flores Asphodeli minores, sicuti & capitula.

Ante 40. annos descripsimus plantam repertâ mense Maio in Provincia per studiorum socium Leonhard. Rauvvolf. Augustanum Medicum cum esset in Monspelis. Huius autem semen ni fallimur nobis missum est ex Italia per Fr. C. Bauhinum quod satum Montbelgardi produxit plantam eodem anno, radicibus etiam fibrosis, foliis tantæ magnitudinis ut cubito essent longiora, striata, fistulosa, in acumen desinentia: & foliorum medio caules plures surgebant teretes, ramoli:



A medio caulem ad summum usque flores expandebantur senis foliolis constantes, colore lacteo lineâ ferruginea.

Ggg 3

HISTORIAE PLANTARVM:

neque unumquodque folium secundum longitudinem percurrente, staminibus in medio lacteis, apices ferrugineos sustinentibus: vascula suboriuntur triquetra ferè: semen nigrum triangulum claudens: florebat Montbelgardi Septembri: reconditus interdum proferebat hyemem, & eodem anno maturecebant semina.

Fistulosum Asphodelum videramus antè Tiguri, in horto D. Gesneri, florentem Maio, cum capitulis se demonstrantibus. Nobis etiam visa planta in oppido L'ise in horto præf. D. Friderici Capper nobilis summi amici nostri: obseruauimus etiam Stutgardie in horto Ill. C. W. florentem Maio.

Clusium nostrum Asphodelum fistulosum sic tradere arbitramur: Asphodelus tertius, ut foliis, caule, & floribus satis similis est superioribus, ita radicibus omnino differt, quæ non glandulosæ, sed fibrosæ, crassæque & numerosæ, ex vno capite nascuntur: folia Asphodeli, minora, multo angustiora, lentiora, dilutiorisque sunt coloris, & quorum medio sex aut plures eadem radice assurgunt caules cubitales, ramosi, quos sine ordine nascentes stipant flores, superioribus similes, sed minores, medium folium purpurascens venâ per longitudinem secante: floribus succedunt triangula capitula, initio viridia, deinde exalbida, in quibus semen rugosum, altero minus.


Dod. hist. fl. & lat. in fol. Pseudo asphodelus quidam non abs re videtur, aut minor Asphodelus. Gesner. horti ex sententia Coldembergii, Asphodelus annuus, & Asphodeli species altera radice breuiori. Anne eidem in append. Asphodelus tertius minor, Asphodelus maritimus quorundam: Tota Gesneri descriptio optimè conuenit nostro Asphodelo minori folio, fistulosum, nisi diceret foliis esse non caulis. Aduers. Phalangium Cretæ Salonensis. Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 4. sicut & Hist. Lugd. Asphodelus minor Clusii & Dodonæi. Clus. Hisp. & Hist. Asphodelus minor & tertius radice fibrosa, Valentini Gam. nullus, id est paruum Asphodelum, Granatenses *Cebolla de culebra*, hoc est, Cepam Colubrinam appellant. Parauina schola Asphodelum fistulosum, quod concava folia habeat forsitan. Tab. icon. & hist. Phalangium Narbonense *Erdspinnen* fraus Gerard. Phalangium Cretæ, Candy Spiderwort. C. Clusio Asphodelus minor. Pro hoc Phalangio non bene ponitur icon, quia Tabern. posita est pro Asphodelo luteo palustri, & ab ipso meto Gerardo iterum l. c. 64. pro Asphodelo Lancastrie: non bene etiam interpretari videtur Cretam Salonensem Lobelii per vocabulum Candy. C. Bauh. Phyt. Phalangium 3. siue minus foliis fistulosis.

Locus. & tempus.

Toro Valenrino regno, nullus ferè est alius Asphodelus: nascitur & Gadibus ad ipsam pontem de Suaco cognominatum, quo insula contineri coniungitur, & plerisque Granatensis regni locis: olim etiam campo illo lapidoso supra Arelatem, Massiliam proficiscens, secus semitas colligere meminit Clusius, semine ex Hispaniis a se delato: amicis natus est in Belgica, sed cum frigoris sit impatiens, peribat hieme, eam ob causam annum cesebant, donec ipso monitore qui magnas illius plantas hieme virentes in Hispania viderat] Ill. lo. de Brancion vnam ex iis quæ postea semine nate, fictili indicam conseruaret, quæ deinde aliquot subsequentibus annis flores, inarum semen præbuit, quod etiam terræ

credidit provenit. An porro alicuius in re medica sit facultatis à nemine hæcenus intellexit.

ASPHODELVS MINIMVS ALBVS



Nouum Asphodeli genus, inquit Clusius in Hist. apped. & à nemine descriptum, semine natum sibi esse scribebat Iacobus Plateau. Minor est tertio iam descripto, & ab eo plurimum differt: nam glandulosas radices habet instar Secundi generis, licet minores, & quorum capite

prodeunt quina aut sena filia, valde angusta, & longiuscula, inter quæ assurgit cauliculus rotundus, dodrantem aut pedem altus, singularis, nec ullis ramis præditus, in quo spicæ in modum nascuntur multi flores albi, sex foliis constantes, quorum singula internè & externè, verè quadam secundum longitudinem sunt notata, perinde ac Tertii præcedentis flores.

Iulii initio flores proferre incipere scribebat, quum reliqua genera suos abiecerunt, propterea magis illis serotinum censendum: hieme folia amittere, & noua denuò acquirere circa Aprilis initium.

ASPHODELVS LVTEVS.



Quamquam Asphodeli lutei meminisse non conueniuntur Veteres, tamè in Asphodelorum censum cooptandum hunc esse multa docent, radices ab vno capite multæ nate, sed longè tenuiores quam Asphodeli albi maioris, colore luteo præditæ, exportatis per tranuersum

fibris se propagantes: caulis Asphodeli albi modo sesquicubitalis, singularis, à medio ad summum floribus ornatus Asphodeli, sed luteis: quos excipiunt pericarpia rotunda semen continentia: filia porro

porro ut longitudine folia Asphodeli iam dicti vincunt, ita uisdem latitudine cedunt, colore glauco prædita.

De hoc forte Lobel. Adu. Asphodelus luteus minor, nusquam litoreis uisdem uisitur, tametsi hortis Batauinis & Gallie familiaris luteus hic Antiquis indictus, genereque diuersus, est enim radicibus prolixioribus, nec ita bulbosis, sed Corruæ modo minus tuberosis, leniisque turbinatis, e quibus Cyperi folia complura exeunt, exilia, saruto vitore. Caulis rectus floribus crebris luteis, alterius sinuibus, fastigio tenuis stipatus: seimentum angulum pericardius continetur priui modo.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 91. Asphodelus luteus minor. Adu. pag. 45. Iphyon Theophrast. Anguill. & Erizanthi Arabum quorundam. Considerandum an figura possit conuenire nostro Asphodelo minori luteo.

Matth. Ital. cum magn. fig. dicit Vnam Asphodeli specie proferre florem luteum: sed non distinguit radicibus & foliis ab altero.

Camer. apud Matthioli. Germ. & Epit. Gelb Affodil burg. Asphodelus luteus siue femina Plinii.

Quid autem sit Iphyon Theophrast. certò asseruare non potest Anguill. Asphodelus flore luteo pro eo potest demonstrari. Quod etiam Asphodelus luteus Recentioribus à Dionysio femina dictus sit testatur Dodon. hist. fl. & in fol. Gesner. hort. Asphodelus luteus. Præterea Asphodelus alius radice lutea. Hort. Lusit. Asphodelus luteis floribus.

Tabern. icon. Asphodelus luteus: & hist. luteus s. Item ic. Asphodelus luteus minor, & Hist. Asphod. 4. Compiler Tabern. non describit nec demonstrat qua in re ab albo vel à quarto minore luteo differat: præterea appingit male radices, quales albo. Icon autem Tabern. Asphodeli lutei minoris eadem est cum icona à Lobelio exhibitæ.

Gerard. sequitur Tabern. cuius iconem habet sub titulo Asphodeli lutei Gelb Affodil: verum cap. 64. iconem Tabern. minoris habet sub hoc titulo Asphodelus luteus minor The King's spear & post Xiphium Lat. Asphodelus luteus siue Dionysius, Hastula regia. An Gerardus nō insipiat, quod diuerso capite iconem Asphodeli Tabern. minoris ponat, iudicent periti: cure etiam Xiphii nomen ei tribuit.

Casp. Bauh. Phyt. & apud Matthioli. Asphodelus s. siue luteus & flore & radice. Hastula regia Trago. Nos Hastulam regiam apud Tragum non inuenimus. Hist. Lugd. duas habet figuras, vnam quidem Asphodeli lutei Dodon. Alteram verò Asphodeli lutei minoris Lobelii.

Asphodelum luteum Tiguri primò vidi apud Gesnerum, deinde Basileæ in duobus hortis, florentem Maio: fructu turgentem mense Iunio. Patavii in horro D. Corruæ & horro Patavino. Ferrariæ in horro Cænobii S. Dominici à l'Angeli. Bononiæ in horro Nobilis di Gonzadini. Aprilis ferè florens. Montbelgardi transtuli in hortum E. C. ex meo hortulo: Argentina etiam attuli ex horro Di. Friderici Meyer. Sturgardiz vidimus in horro Ill. E. C. florens Aprilis anno 1610. Lobel. Hortis Batauinis & Gallie familiaris.

ASPHODELVS MINOR RADICE LVTEA.

Asphodeli species peregrina radice lutea Gesner. Item in Append. Asphodelus alius etc.

dia magnitudinis, radice lutea.

Anno 1594. Sturgardia accepi mus semen mif. Locum a sum per Hortulanum Ducis Florentie cum hac Tempus. inscriptione. Asphodelus luteus minor Cretensis: semen valde angulosum & acutum, multò maius



quàm ea femina, de quibus mentio facta sub Asphodelo fistuloso: videntum erit an conueniat cū planta Gesneri: prouenit mihi, sed vnicum tantum produxit foliolum mense Iunio, cum fuisset sarum in horro E. C. Montbelgardi mense Aprilis.

ASPHODELVS LVTEVS ACORIFOLIUS palustris Anglicus Lobel.



Folia promit pul- Descriptio
chre virentia, aliquantulum striata, Iridis aut Gladioli similia, sed angusta, & dorante breuiora: caulem rectum, pedalem, Autherico satis similem: flores è senis foliolis, exiguis staminibus in medio, colore luteo pallentes, Asphodeli lutei æmuli, sed minores: se-

men perexiguum in oblongis acuminatis vasculis radix longa, geniculata, non absque fibris serpit graminis modo. Hæc ex Dodonæo.

Dodon. itaque lat. in fol. Asphodelum hunc palustrem quemdam vocat, Asphodelo sc. luteo caule, floreque similem. Huic refragatur autopsia Clus. Hist. post. scribentis: Pseudo-Asphodelum primum potius dixeris, quàm Asphodelum flauo flore palustrem: nihil enim Asphodelo simile habet præter flores, licet Dodon. caulem etiam similem faciat, qui tamen non est nudus, sed multis foliolis siue vaginulis illum amplectentibus donatus.

Hic Pseudo-Asphodelus maior appellari posset, ad differentiam subsequens.

Huius iconem exhibet Gerard. Angl. lib. 3. c. 64. nomine Lancasdhurr Asphodill / Lancasdhurr Asphodeli. Quæ postea ab eodem Hist. fuit

lib. 1. c. 31. male reponitur ex Tabern. pro Phalangio Cretæ.

Carap. ex. Lobel. Adu. Asphodelus acorifolius palustris, luteus, Angliæ, Flandriæque, vel potius Asphodelus palustris, & Pseudo asphodelus luteus: *Barb. yellom. Asphodil. Obs. & Pl. icon. p. 92.* Asphodelus minimus luteus, Acorifolius palustris, Asphodelus luteus palustris Dodon. in agro Lancastri Angliæ. Scribit autem Lobel. Adu. par. 2. Rhizotomus, quosdam Tabern. Asphodelum luteum palustrem, Batavorum, & Brugenium, confundere cum Lancastriensi Asphodelo luteo de quo post: verum si liceat verum dicere ipsemet id facit, in Adu. Obs. & Ic. Pl. vbi iconem sub dictis titulis ponit à nobis hic positam ac eandem cum Dodonæi iconem.

Tab. icon & hist. Asphodelus luteus palustris. 7. Geel wasser Iffodil wertz.

C. Bauh. Phyt. Asphodelus 6. siue palustris, Gesnero tertius. In quo ad sinistram descehit C. B. A. palustri siquidem longè diuersus Gesneri, qui nobis est Asphodelus minor folio fistuloso. Dodon. nasci tradit in humidis quibusdam ac palustribus Flandriæ ericetis: ætatis mensibus florens. Clusius eruebat aliquando in palustribus illis ericetis Maldeghemo vicinis, secundo à Brugarum vrbe Flandriæ celeberrima militari, mense Maio.

Floribus lixiuo maceratis puellæ crinem flammum inficiunt Lob.

PSEVDDO ASPHODELVS QVIBVSDAM.

Descriptio



Caulis dodræalis, aut etiam cubitalis, iuncus, vno aut altero folio gramineo donatus, spicam gerens florum paruorum, seminis foliolis constantium, ex luteo viridium, quos sequuntur capitula trigona, angulosa, minutissimo rusto semine facta: folia circa immum caulem ex fibrosa

radice numerosa, graminea, rigidula, glabra, duarum vniarum, aut maiori longitudine, acuminata. Clusio est Pseudo Asphodeli genus alterum, quod sic describit. Numerosa sunt illi folia, sese mutuo amplectentia, ut in superiore, & Iride, angusta, breuia, viridia, dura, amariusculi, & calidi saporis: e quorum medio cauliculus gracilis egreditur, pedalis interdum, aut maior, aliquot nonnunquam foliolis inhaerentibus, spicam florum ferens, sex foliolis constantium, alterius instar, sed minorum, pallescentis ex herbaeco coloris, & odoris expertum: quibus succedunt trigona capitella, interdum tetragona, & pentagona, minutissimum rustum semen continentia: radix vix corpus habet, sed tenuibus aliquot fibris duntaxat constat. Pseudo-asphodeli

minoris siue pumilionis folio Iridis nomen indidi ad prioris differentiam.

Lobel. Adu. par. 2. Asphodelus minimus Nortuegicus luteus, palustris, Scotticus & Lancastriensis. Anglo Britannæ mulieres apud quas frequens nascitur, à tingendis capillis, (wayden baire. i. Virginum Veneris) capillum vocitarunt: Capillus enim Veneris Anglis, wayden baire. dicitur. Non videtur diuersum à secundo Pseudo-Asphodelo Clusii, sed variare paruitate & magnitudine ratione natalis soli. Aliquot mensibus elapsis Nortuegico luteo Asphodelo parem & similem ex Scotia huc Londinum ad me misit Iac. Gargillus Botanicus insignis. Aequè Rhizotomi quidam, florum instiores, & vernacula lingua transcriptores, mira Metamorphosi literarum & linguarum inscitia, alienarum lucubrationum interceptores, & perfrictæ frontis depopulatores, falluntur, ac Tabern. cum suis asseclis, & Typographo suo, qui cautè nostris scriptis & iconibus tanquam suis abusi sunt, dum Lancastriensem Britannicum palustrem Asphodelum luteum, cum Batavo aut Flandrico Asphodelo palustri Dodonæi, ut alia pleraque adumbrant & confundunt. Si liceat nobis liberè dicere quod sentimus, confusionis si quid apud Tabern. in hac planta est, autor videtur esse ipsemet Lobelius, qui olim non distinxit, ut paulò antè dictum.

C. Bauh. Phyt. Holostrium glabrum viride.

In Snealpen (inquit Clus.) Neberg, atque aliis pratis montanis, & gramineis collibus, Iulio florens & Iulio semen proferens Pseudo-Asphodelum Clusii mihi misit insignis Pharmac. Tossanus Carolus anno 1590. Mense Iulio, cum suis capitulis trigonis quæ plantam Montbelgardi in horto Ill. E. Principis Eandem plantam habeo inter herbas siccas Gallia allatas puto ex montibus Sabaudia. In collibus quibusdam circa Auenionem & Nemausum Narbonensis Gallia, iisque vmbrosis & velut pratensibus obseruauit idem.

Locus tempus

PHALANGIVM CAP. IV.

Veterum *καλαγγιον*, quæ herba dici mereatur, cum hodie assertu arduum valde sit, nemo (vbi quidem speramus) inficias ibit, si de hoc, quæ ipsi quondam scriptis mandauerunt, sine vllis tamen verborum ambagibus præstiterimus. *καλαγγιον* igitur [inquit Diosc. lib. 3. c. 12.] aliis *καλαγγιον* [Phalangium] alii & hanc (*λευκαρχαμ*), Leucacantham] dicunt. Ramuli sunt ei duo, aut plures, inter se distantes (*διχαστοι*) in diuersa tendentes Plin. [*διχαστοι*]. Flores albi, similes Lilio, multas incisuras habentes: semen crassum (Ruell. latum. Marth. græc. Exemplaria) non *καλαγγιον*, sed *καλαγγιον* nigrum, velut lentis dimidium, multo tamen gracilius, Radicula parua, tenuis, & dum e terra extrahitur pallida, vel sublutea (*χλωρα*) ut vertit Dalech. & non viridem aut herbacei coloris, ut Plin. & eum sequuntur Ruellius. Postea autem, cum herba seruetur & contrahitur, albescens, quam notam à Diosc. traditam Ruellius omisit. Nascitur in locis terræ editioris. Huius folia, & semen, & flos si cum vino bibantur, ictis Scopione, & Phalangio auxiliatur. Dissoluunt etiam tormina. Finit Diosc.

Plinius lib. 27. c. 12. de Phalangio planè eadem

habet Phalangitis à quibusdam Phalangion vocatur, ab alijs Leucanthemon, vel, ut in quibusdam exemplaribus inuenio, Leucacatha. Ramuli sunt ei nunquam pauciores duobus, in diuersa tendentes: flos candidus, Lilio rubro similis: semine nigro, lato, ad lenticulae dimidia figuram, multo tenuiore: radice tenui, herbacei coloris. Huius folio, vel flore, vel semine auxiliantur contra Scorpionum Phalangiorumque & Serpenti-um idus. Item contra tormina.

Galenus Phalangitin ita nominatam esse dicit, quod eorum morbis à Phalangio opituletur. Esse autem tenuium partium & iocantis facultatis. Unde etiam tormina sentientibus auxiliari videatur.

Nomine autem Phalangii & Phalangitis plura sese offerunt species. Quippe Phalangium primum sine ramisum. Phalangium non ramisum. Phalangium flore lili. Phalangium de Asphodelo non repulso. Phalangium Tragi, Lob. & Penz Ad. p. 12.

PHALANGIVM QVIBVSDAM PARVO flore, ramosum.



E radice fibrisperenti crassiusculis, candidis, subdileibus, glutinosis, caritis surgit singularis, tenuis, laevis, teres, sesquicubitalis, cuius scapus in ramulos aliquot faciens, flores sustinet frequentes stellatos, & senis foliis compositos, emaculato candore Lili conspicuos,

quibus, pericarpia globosa succedunt. Lini capitulis aequata, per maturitatem in tres partes dehiscentia, semine ut vult Dodon. nigro, veluti Melanthii, non perinde tamen anguloso, resecta: folia graminea, porraceis tenuiora, angustiora, carinata pede aliquando longiora, ac etiam cubitalia, statim à radice exorta in terram repanda parum attolluntur. Item nostra est ex iis, quas scilicet enimus.

Alii Lobel. & Penz Phalangium, an Moly Plinii? Non recte Dodon. Moly vocat. Nomine enim Phalangii donatur multo sanè aptius quam Moly, seu Dioscor. seu Plinii, ut nonnulli voluerunt. Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 47. Phalangium ramosum. Dodon. lat. in fol. Phalangium ramosum, qui quondam in histor. Gall. pin-gebat pro Moly Plinii, addens à Belgis in hortis excoli ac Iulio florere.

Phalangium [ut Celsus. placet] Asphodelus parvus dici potest: nam in totum Asphodelo simile, multo angustioribus foliis brevioribusque, cauliculis ferme cubitalibus, modò simplicibus, modò ramosis: floribus latioribus, candidioribus & magis parulis: nascitur in asperis. Celsus videtur duo Phalangia simul tradere,

quorum vnum forte est quod vocamus pulchrius non ramosum. Quomodo etiam in totum Asphodelo simile, si folia angustiora, brevioraque? Phalangium ramosum.

Tabern. icon. Phalangium ramosum *Eds. Dod. ner.* spinnenfraut / quibusdam Moly Plinianum, sed ineptè.

Lugduni in collibus accliuibus ad Rhodanum, Eridanoque flumini collibus vicinis variis Londini & Belgii hortis colitur. Forte quod colitur diuersum est à precedenti Lobelii & idem cum sequenti. In accliuibus collibus nonnullis apud Gallos & alibi gignitur haud procul à fluminibus ac ripis aquarum decurrentium. Iunio ac subinde Iulio vigent flores, Augusto semina perficiuntur. Prouenit Phalangium ramosum Tab. in collibus & montibus Astatia, & in montibus iuxta Rhenum, quidam in hortis colant. Basilea in monte Montets, ut annotauit frater Casp. Baulinus, Burmi Rhætorum, Tiguri Iunio & Iulio florens: in collibus circa Geneuam florens Maio, & Iunio & Iulio: Montbelgardi in planitie ad Dubium inter arbores & Audinours, & in monte la Chaux ubi vires, cum flore Iunio & Iulio, & cum semine maturo Augusto: transfusi in Hortum E. C. Argentinae videtur florens mense Iulio in horto Di. Frederici Meieri, qui assererat se habere duas species huius Phalangii ramosi.

Camer. Laudatur aduersus milcos morbos & affectus, ac contra omne venenum non solum Scorpionum & araneorum venenatum, ut Dioscor. & Gal. de suo Phalangio scribit, quod asserere non potest, quia non expertus Camerarius.

PHALANGIVM PVLCHRIVS non ramosum.



Phalangium quod pulchrius dicimus, respectu precedentis, non sequentis, quod flore Lini dicitur, satis est precedenti penè similibus, latioribus paulo: tamen eodem, sed non ramoso: lori- bus paulo maioribus albis, multis, spicâ representantibus, & multo pluribus quam demon-

strat icon Lobelii in obs. & icon. Plantini: succedunt capitula sublonga, in quibus semina rotunda.

Phalangium hoc [teste Lob. Obs.] voluptatis ergo in hortis Belgicis Italicis & Anglicis colitur. Priori Phalangio ei omnia similia præterquam summus pedalis cauliculus, quem sine ramulis in pediculis lacteis stellati flores & semina in pericarpis antedicto similia sed maiora

Locus & tempus.

Descriptio

amburæ Phalangium non ramosum Aducrf. p. 18. lial. Phalangio.

Item Icon. p. 48. Phalangium non ramosum, Liliago Cordi. Non sine nota Lobel. in hoc à nobis recedit: nos enim Liliaginem Cordi ab hoc Phalangio separamus.

Dod. in fol. Phalangium non ramosum. Thal. in Harc. fortè Liliago altera minor. Camer. apud Matt. G. Phalangium maiori flore de quo ante. In horto, Phalangium minus. Tabern. icon. & hist. Phalangium non ramosum Erdspringen fraur. An hist. Lugd. p. 1495, planta quam Myconus ex Hispaniis misit, quam Lilium Polyrhizon nominavit: Lilium quidem, quoddam florum figura, colore, dulci & glutinoso sapore Lilium album referat: polyrhizon à radicum copia: rectè, an fecis, id peritis Herbariis æstimandum relinquatur.

C. Bauh. Phyt. Phalangium 2. maius alterum: Lilium polyrhizon Myconi. Considerandum an Myconi Lilium prædictum, quod etiam pingit Hist. Lugd. sit Phalangium pulchrius non ramosum. C. Bauh. hinc separat à suo Phalangio quarto siue non ramoso, nos autem dubitamus an diuersum sit id ramosum quod ei etiam dicitur Liliago Cordi, quæ nobis videtur Phalangium Liliæ flore: de quibus paulò post. Gerard. Phalangium non ramosum, Unbranched Spider wort. C. Bauh. Phalangium 4. non ramosum. Notum iudicium hac de re, lectores videant inter ea, quæ mox sequenti titulo dicemus.

Copiosum vidi simile, quod flore minore est quam leuicæ. Stutgardie in horto Ducis florens Maio: transfuli Montbelg. in hortum E. C. hist. Lugd. pag. 1497. Lilium polyrhizon. Myconi nascitur in hispania montibus, sed terrenis humidisque locis, quandoque iuxta fluentia.

adhuc ascriptum est, quàm adhuc habebamus anno 1606. Genent cum essem obseruauimus in Allobrogum monte vinoso Thuri florens Iulio: Fuit mihi etiam Genent delatum, & cultum in horto meo.

Liliago Cordi statim à radice folia profert Hyacintho similia, angustiora tamen: è quorum medio caulis assurgit cubitalis, aut aliquando maior, tenuis, teretique superius, vno atque altero intervallo singula habens folia, prædictis multò minora: in summo caule & adnatis flores producit sex, oblongis vncialibusque foliolis constantes, è mediis floribus, luteis apicibus, staminibus prominent, in summa Lilio, vel potius Asphodelo vero similes flores sunt, multò tamen minores, nec ita resupinatis partibus repandi. Radicibus nititur multis, culmi crassitudine, lentis, pinguibus, glutinosis, perennibus, ab vno capite, ut etiam in Asphodelo in diuersas partes distrahis, longitudine dodrantis. Saporem habet glutinosum & nauseosum aliquantulum. Nascitur editis apricisque locis iuxta rara & parua arbuta.

Gesner. ut antè dictum pro Liliagine Cordi ramosum exhibet Phalangium, nobis autem videtur Liliago potius conuenire Phalangio, flore Liliæ de quo hic agimus. Idem horti [ut antè inonuius] hoc vocat Phalangium floribus maioribus proueniens in Sabaudia & Rhætia: de collect. stirpium p. 91. Phalangitis maior montana. Iconem ni fallimur proponit Matth. pro Phalangio, nulla addita descriptione, solum ait in montibus prouenire: ea icon non est arrisiosa, sed malè exprimens plantam quam intelligimus.

Camer. in Epit. Matth. omittit Matthæ iconem pro Phalangio ponit iconem Phalangii ramosioris de quo antè.

Tabern. hist. Phalangium 4. Phalangium Matth. qui non descripsit, licet diligenter perquisuerimus, neminem audiuimus vidisse, dubitamus an vnquam fuerit in rerum natura, existimamus nunquam visum Matthiolo.

Lobel. & Pena Adu. Phalangium Matthiolo, pictum quidem non autem descriptum ipsis, nec multis doctioribus visum, fortè nec Matth.

Icon Dalechampii videtur non malè exprimere Phalangium Liliæ flore: an antem id intelligat considerandum. Præterea perquirendum, ubi Pena & Lobelius representant. Habet hist. Lugd. iconem Matthioli.

Liliago Cordi (quod Thal. Harc. scribit) aliquibus pro Phalangio habita cum potius quantum ad extremam faciem, aliquam sylv. Asphodeli speciem referat: licet radice bulbosa non constet. Eius radices hodiè plurimis locis copiosè erunt, ac hinc inde pro veri Rusci radicibus venduntur, vnde multa Pharmacopolia non sine insigni errore eandem pro Rusco reuendunt, cum tamen vtriusque radicem sapor vniuersimodi non sit. Hoc Medicos quosdam animaduertere oportebat: nec aded temerè imperitis Herbariis & Pharmacopoeis plerisque fidere.

Nascitur verò planta hæc copiosè circa Gerodum, item inter Wernigeroßam & Elbingeroßam. Eius duæ species sunt, Altera maior, folio longiore pauloque latiore, capitulo magis triquetro, in quo semina continentur etiam paulò maiora: Altera minor cui omnes partes sunt minores, strictioraque folia. Nos existimamus

PHALANGIVM FLORE LILII.

Descriptio



Radix è multis fibris albis longis Phalangii Ellebori radicibus similibus Liliorū modo, gustu glutinosa: folia Phalangii: caulis cubitalis ac etiam minor, rotundus, lauis, non ramosus, in cūis summitate prodire cernuntur ex breuib. pediculis flores magni duo, tresue vel

quatuor, paruis Liliis similes, eodem etiam odore grati, albi, vncias duas ferè longi, seminum capita sublonga.

Hanc reperi florentem Iunio an. 1561. in peregrinatione mea cū Gesn. in pratis mōtis Septimi, Burmii propè Kasest: tunc denominaui Lili vel Phalangii speciem, ut ad meam plantam liccam,

mus priorem Liliaginem Thalii esse nostrum Phalangium flore Lili : alteram minorem referimus ad Phalangium non ramosum: iudicet alii, qui venient in Hircinia Saxonica.

Casp. Bauhin. Phyt. Phalangium 1. siue magno flore, Matthioli & Dalechampii cuius figura melior. Phalangium 2. siue non ramosum, Cordo Liliago. Lobel. etiam Phalangium non ramosum. Dux huius species altera maior, folio longiore, paulo latiore, capitulo triquetro, semine paulo maiore: altera minor, cui omnia minora & folia strictiora: Huius radices saepe pro Ruscii veri radicibus, magno errore diuenduntur. Idem apud Matthiol. Phalangium primum, & Phalangium non ramosum: aliud magno, aliud paruo flore.

CROCUS.

CAP. V.



Crocum vbiuis orbe terrarum notissimum [latium intellige] at multa sanè mundi parte, quod natalem concernit verè exulè, accedunt.

Constat hic bulbo dulci, Auellanae magnitudine, multis fibris capillato: folia quinque aut octo, palmum aut etià dodrantem longa, admodum angusta, striata: caulis inter hæc oritur brevis, stertem sustinens vnicum, Chelidii flori similem, ex foliis caeruleis constantem, in quorum medio sunt stamina aliquot flammei ruboris, valde odorata.

Icones duas quas hic ponimus iam scilicet eminus. Bulbosi generis itaq; Crocus est tam fa-

rius, quàm sylvestris. De hoc Theophrastus atque ex eo Plinius hæc prodidit. Crocum naturâ herbaceum modo prædictorum erumpit, sed folio angusto ferè, namque in capillamenti modum extenuatur. Radix multa, carnosâ, & in totum viuax. Theod. Dorst. pro Cro-

coiconem habet Cantami, qui postea traditur.

Cord. Barbarus, Ruellius, Marcellus, & verus interpres & Plinius culpa librariorum cap. de Croco, legendo *Sulias* pro *Sulias*, mortarium interpretantur malè, cum Thuiam arborem intelligat. Cordo in historia, qui nomine Croci describit, Gesnerus figuram addit ex Tragi lib. 2. cap. 77.

Casp. Bauhin. Phyt. Crocus primus siue sativus.

Tragus qui depingit & describit, vocari ait Hebræis *Kark*, teste Elia Leuita: Arabibus verò teste Serapione *Sahasaran*. *Karkas* Dioscor. inter reiectanea à quibusdam *Karkas*, *Karkas* & *Karkas*. *Crocus* Lat. Germ. *Saffran* fran. Belg. *Saffraen*, Gall. *Safran*. It. *Zaffarano*, Hisp. *azfran*, *Sastra*, *Azsafran*. Angl. *Saffron*.

Crocus nunc in plerisque Germaniæ locis plantari capit, adeò facilliter, ut teste Michael. Neand. viribus Exorico non cedat. Nos, quidem Crocum colimus in horto E. C. copiosè allatum per Ciuem *Jaques à Salin* Milhulia, ei infesti sunt mures. Monspelii florentem repertum in cacumine montis *Eseron* plantatum mente Octobri: circa Aninionem propè Castellum Papæ vidi agros eo confitos. Basilea habent in hortis, Lugduni etiam & Parauii. Ferraria in monasterio S. Dominici à *l'Angeli*. Genex copiosè passim in hortis colitur ac hyeme folia reseruat, radix eius bulbosa dulcis est. Hodie non solum regiones ad meridiem, Africa, Cyrene, Sicilia, Gallia, sed etiam ad Septentrionem sitæ Anglia, & Hibernia laudatissimum ferunt, quo Belgium, Germania, aliq; vicini cibos condiunt, ac medicamentis miscunt. Matthiolus Crocum ex Aquila Vestinorum urbe primum sibi locum vindicare in Italia scribit, eo tamen præstantiorem esse qui ex Vienna Austriæ metropoli defertur. Agellos integros Closterneburgii, ac Croneburgii, nonnullisque aliis in locis circa Viennam Austriæ Croco lasciuientes Ioannes Schvab magna cum admiratione frequenter intuitus est. Crocum, inquit Theophr. tam montanum (quod inodorum est) quàm sativum, Autumno florescere incipiunt: statim enim primis imbribus florent. *Et rursum*: serò floret, seroque germinat, aut præmaturè, vtro scilicet modo tempus acceperis: Floret quippe Vergiliarum occasu, paucisque diebus, confectum Vere cum folia quoque expellit, quinimo prius: gaudet calcari, & melius ita euadit, radice attrita pede deorsum versus, idè iuxta semitas, fontèsque pulcherrimum exit: satis radice fieri allolet. Hoc siccatum ad certum usque temporis spatium reconditur, ac inueteratum acrem spirat odorem. Vna enim & quantum humoris aquosi est, exhalatur, & alimenti cellar accessio.

Hæc passim Theophrast. quæ Plin. lib. 21. cap. 6. ferè expressit, dicens: Crocum silvestre optimum: serere in Italia minime expedit ad scrupula usque singula areis decoquentibus. Seritur radicis bulbo, Sativum latius, maiusque & nitidius, sed multò leuius degenerans. Sed nec vbi que secundum, etiam Cyrenis, vbi semper flores laudatissimi. Prima nobilitas Cilicio, & ibi in Coryco monte: dein Lycio, monte Olympo: mox Centuripino Siciliæ. Aliqui verò Phlegrao (Aegæo, Turner.) secundum locum dedere. Adulteratur nihil æquè. Probatio sinceri, si imposita manu crepat, (crepitat. CHERLER.) veluti fragile. Humidum enim, quod eucrit

Synonyma
huguar,

Locus
tempus,

Tempus

Cultura.

nā per theatra replenda, *in his hactenus* intelligentes. Ego vero velut dixi *diu* lego, & de thynno ligno accipio. Ceterum Sepalariai Crocum perpetuū subterraneis, ac per hoc humectis locis seruant, quō ponderosius fiat, maiusque luerum inde sibi comparent. Crocus, quem & sapor & odor commendat, quique concoctionē mutat, non Medicis solum Officinis, sed etiam culis ad obsonia colore iucundo tingenda plurimum expetitur.

Vires et Crocus aut. Dioscor. vim habet concoquendi, *Diosc.* molliendi, leniter adstringentē, urinam eiendi: & *Calorem* colorem bonum inducit: & crapulam arceat, si *tonum fa-* cum passo bibatur. Fluxum etiam oculorum sistit *cr.* illicus cum lacte muliebri. Miscetur etiam vtiliter *Adm.* portionibus ad internas affectiones. In pestes quoque & cataplasmata ad vterum, & ad sedē *Adm.* additur. Sed & Venerem stimulat, & inflammationes ignis sacri illius mitigat, & in compositiones auriculares commodus est. Tradunt porro ipsum etiam occidendi vim habere, si cum *Adm.* aqua pondere trium drachmarum bibatur. Quō *Drachm.* verō facile conterī possit, in calido fictili ad Solem *Isid.* siccare (*Isid.* Bas. cod. *Empir.* Dal. quia tū *Terrae* odorem retinet Corn. in embl.) ipsum oportet, *radix* & celeriter versare, sed & radix ipsius cum passo *Trunc.* pota urinam mouet.

Ex Plinio Hæc & alia quædam prodidit Plinius. Dicitur inflammationes omnes quidem, sed oculorū maxime ex ovo illitum. Vulvarum quoque strangulatus, stomachi exulcerationes, pectoris & renum, iecinoris, pulmonum, vesicarūque, peculiariter inflammationi earum vehementer vtile: trem tussi & pleuriticis. Tollit & pruritus, urinā citet. Qui Crocum prius biberint, crapulam non sentiunt. Ebrietati eo resistunt. Coronæ quoque ex eo mulcent ebrietatem. Somnum facit. Caput leuiter mouet. Venerem stimulat. Flos eius igni sacro illinitur cum creta Cimolia. Ipsū plurimis medicaminibus miscetur.

in Galeno Crocus, inquit Galenus, paulūm quid adstringens habet, quod terreum frigidūque est: sed superat in eo calfaciens & qualitas, & facultas, ut tota eius essentia secundi sit ordinis excalfaciens, & primi exsiccantium. Quare concoquendi vim quandam obtinet, adiuvante scilicet in hoc paucula illa adstrictione: quippe quibus medicamentis, cum non admodum excalfaciant, paucula adest adstrictio, ea parem facultatem habent essentiis emplasticis vocatis, quas cum iunctas esse caliditati non vehementi contingit, *Ex Avicenna* hoc est, concoquentes esse ostendimus.

Ex Avicenna Scribit Avicenna Crocum Cephalalgiam excitare, & capiti nocere. Id quod non exiguo, sed nimio usu efficere potest. Vigiliis enim copiosius inducit, quæ modum excedentes capiti & sensibus obsunt. Moderatus autem Croci usus cerebro prodest, sensus vegetiores reddit, somnū & torporem excutit, latitiam gignit, corroborat cor. Thoracis crudos humores ad concoctionem perducit, pulmones aperit, & ab obstructione liberat: & ad hæc tam efficax est remedium, ut subinde phthisicis in summo vitæ discrimine, & propemodum animam agentibus, spiritum reducat, & vitam aliquot dies proroget: scrupuli dimidii, aut ad summū integri pōdo, cum passo, aut vino dulci propinatus. Quo etiam modo gravissimas subito irruentes dyspnoas citra febrem statim & momento temporis tollere experimēto compertum est. Laudatur ad hepatis & fellis

obstructiones, & ad regium morbum. Croci stamina trita carpis, aut sub mammis admoda illitæ, vires suas Cordi cerebrūque illicō transmittunt, quasque verriginem tenebricosam invehunt, aciem oculorum præstringunt, aut hebetant.

Scribit Serapio ex auctoritate Rhazis Crocū *Ex Serapione* drachmarum duarum pondere parum accelerare, maximèque inebriare, si cum vino misceatur: actantā latitiam parere, ut ex nimia latitia insaniam gignat. Quod experimento confirmat Amatus Lusit. asserens se mercatorem vidisse, qui cum in ollam in qua carnes coquebantur, multum Croci iniecisset, post earum esum, in tam profusum visum erupit, ut parum abstineret quin risu nimio & cachinno e vita excesserit.

His addenda Syniconis Serhi auctoritas. Crocus stomacho bonus est, inquit, ciborūque concoctionem efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethargica vitia iuvat. Discutiendi quoque vim obtinet, viceribus vtilis est, & ad spiritus difficultatem conducit. Si quis illo mediocriter utatur, bonum colorem habebit: sin verō ultra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibique inappetentiam faciet. Cum opio & lacte & rosacea pedum doloribus impositus ubi dolent, summopere prodest, superpositis Betæ foliis. Cum porro Dioscor. Crocum ad inflammationes valere asserit: considerandum Crocum concoctoriā & excalfacientem vim habere, & non nisi transacto inflammationis initio commodè adhiberi.

Hic adde est thoracis [inquit Camer. horti] affectibus amicus, ut sint qui ad 3s. atque etiam unum, cum dimidio molci grano, & vino optimo calido propinando, asthmaticos curaverint. Ad respirationem ex nimio frigore prohibitam, eodem modo plurimum conducit. Huius extractū ritè præparatum in minima copia datum per os, difficilem partum promouet, corroborando imprimis vires gravidæ & foetus.

Crocus (ut confirmat Tragus) cordi conducit, ideoque quibusvis eius affectionibus auxiliatur, sanguinem purgat, veneno aduersatur: quāobrem haud immerito aduersus pestem usurpatur. Quidam Crocum in oculis. Qui testa cum Theriaca & Sinapi, aliisque speciebus igne coquant, & ex illis demum hoc pacto totius electuarium conficiunt, quod ad internam faciat pestem, venenūque, per sudorem exigit. Crocus in cibo aut portionibus usurpatus, urinam cit, & morbum regium, ac menses mulierum educit, trahitque. Hæc radix Croci cum vino Apiano, aut alio quouis dulci efficacius præstat. Crocus paralyticis membris ac induratis nervis apprimè confert: quare Oxycroceum emplastrum ex Croco conficitur, ad emolliendam duritiem nervorum accommodatissimum.

Infantibus, scribit Matth. perpetuū ciulantibus, neque surgere queuntibus, arenulæque mientibus, pauxillum datur Croci cum lacte. Si verō iidein si offederint, nihil præstariū quān is Croci integri nonnihil tamdiu in aceto infundatur quoad eius colorem contraxerit, idque acetum bibatur. Si quis apoplexia correptus fuerit, aut lethargo & aphonia, Crocus cum aceto acerrimo & Castorio miscetur, in quo intincta pluma naribus indatur ex gravi enim stupore excitat. Ex floribus nondum decerptis staminibus, exstillatur aqua, quæ duabus à cena horis assumpta, somnum conciliat (Camerarius ad eum locum an-

notat, esse qui à floribus, post adempta semina, eliciant eam aquam, cuius summa dosi sit ζ iiii.) Crocus cum lixiuio & oleo oliuarum mistus, calidè appositus, cōfert in tumoribus vbi metuitur gangrena: ad quam singulare remedium est emplastrum ex Lupinis in lixiuio & vino albo coctis, addito tandem Croco. Stamina omnem mitigant calidum tumorem, cum oui albumine, & vitello imposita. Sertum ex Croci floribus capiti circumpositum, somnum inducit. Calidè podagra dolores imminuos lenit Crocus cum lacte, oleo rosato & paucis Apio simul mixtis. Auic. cephalalgiam facere scribit, & capiti nocere: id quod non exiguo, ait Dodonæus, sed nimio suo usu efficere potest. Vigiliis siquidem copiosior inducit, quæ modum excedentes capiti & sensibus obsunt: moderatus autem Croci vsus cerebro prodest, sensus vegetiores reddit, somnum & torporem exurit, letitiam gignit: corroborat quoque Crocus cor, thoracis crudos humores ad concoctionem perducit, pulmones aperit, & ab obstructione expedit. & ad hæc tam efficax remedium, vt subinde phthisicis in summo vitæ discrimine, & propemodum animam agentibus, spiritus reducat, & vitam ad aliquot dies proroget, scriptuli dimidii, aut ad summum integri pondo, cum Passo aut vino Pramnio, vel alio dulci, exhibitus: quo modo etiam datus, grauissimas subito irruentes, citrà febrem, dyspnoeas, statim & momento temporis tollere, non semel à nobis compertum est. Laudatur ad hepatis & fellis obstructiones, nec non ad regium morbum atque hinc bonum colorem Crocum efficere Diosc. scribit: additur eodem auctore ad omnes quæ interancorum causa temperantur potiones: sed nostra ætate ad eas potissimum, quæ menses, fetus, & secundas educunt, oculos ab cæthymatis & exanthematis cum lacte, aut Foeniculi, Rosarumque liquore præseruat illius, & humorum in eos fluxiones reprimat.

Adversarij Affirmant Aduersaria, Croci stamina trita capitis aut sub manibus admota, illitæ, vires suas cordi cerebroque illic transmittere, quasque vertiginem tenebrosam inuere, aciem oculorum perstringere aut hebetare.

Observat.
Ex sum. Croci parui iusculis in melancholica passione miscet Gesn. Dicamus urgente negotio quædam vt ex præscripto Diosc. ad Crocinum vnguentum præparandum spissabis antea oleum, velut de Suisino dictum est, eo pondere & mensura: & acceptis olei ad Suisinum spissari libris tribus & dimidia, immittito Croci drachmas octo, & sæpe per diem commoueto, ita vt hoc assidue facias ad quintam vsque diem. Sexta verò oleum de Croco purè defundito, & ad eundem Crocum olei mensuram vnā affundito, & ad triduum commoueto. Deinde ad defusum myrrhæ contusa & cribrata drachmas quadraginta ammisce-to, & in mortario commodè moueto, & sic reponito. Quidam oleo ad Cyprinum aromatis imbuto, etiam ad Crocinum vtuntur. Optimum ex ipso est quod abundè Crocum spirat, quod sanè ad vsum medicum expetitur. Secundum locum obtinet quod myrrham redolet. Vim habet calefaciendi & somnum inducendi. Vnde sæpe phreniticis conuenit, si ex eo irrigentur, aut ipsam olfaciant, aut etiam naribus illinant. Gignit item pus, & vlcera purgat. Facit etiam ad vteri duritias, & conclusiones, ad vlcera in ipso maligna, cum cera & medulla, & duplo oleo. Concoquit enim & mollit, & humectat, & mitigat. Fa-

cit & ad glaucomata oculorum, si cum aqua sublinatur. Proportionem verò cum ipso habet, & id quod Butyrium appellatur, & Onychinum, & Styracinum, vt quæ nominibus solum differant, verum præparandi modo & viribus similia sunt. In Crocino (inquit Cornar.) nihil est quod aliquem morari possit, si nostram translationem cum Græcis diligenter conferat. Quod dixi secundū locum obtinet id quod myrrham redolet, *ὀσμὴν μύρρης ἔχει*, in Græcis legitur: quod similitudinem significat, sed non aliam quàm odoris, vt ego puto: quum antea optimum spirare Crocum dixerit. Nam si quis Myrrham referre dicit, obscurum relinquit quæ in re similitudo illa posita sit. Et potest etiam hæc locutio inter eas referri, quas Galenus improprias in Dioscoride deprehendit. Paulus alium Crocini parandi modum habet, sed exemplaria Græca eo loco & corrupta sunt, & transposita. Nos autem in nostra Pauli translatione omnia in iustum locum restitimus, & in Dolabellis nostris in eundem omnium rationem reddidimus. Quod porro finem dicit, cum Crocino eandem vim & præparandi modum habere Butyrium & Onychinum & Styracinum: de Butyrino quidem facile credita est, itemque de Styracino: & ex appellationibus etiā aliquo modo constat: & de Styracino quoque infra Diosc. in Styrace repetit: sed de Onychino ambiguum penitus est, &c.

Diosc. similiter, Crocomagma facit ex Crocino vnguento aromatis expressis & efformatis. Est autem bonum id quod odoratum est, moderatè myrrham redolens, graue, nigrum, non lignosum, dum diluitur croci colorem abundè referens, læue, subamarum, & quod dentes ac linguam vehementer tingit, colore ad multas horas durare. Tale verò est quod à Syria affertur. Vim habet extergendi ea quæ pupillis tenebras offundunt, vrinam ciendi, molliendi, concoquendi, calefaciendi. Croci viribus aliquo modo respondet, plurimā enim de ipso parte obtinet. Crocomagma Diosc. ex Crocini vnguenti aromatis exprimit [ait idem Cornar.] & in massas siue pastillos efformat. Alia verò est Crocomagmatis præparatio, quam Damocratis versibus conscriptam, Galen. lib. 2. Antid. recenset: & Aërius lib. 2. c. 196. & 6. cap. 50. habet, constans ex Croci drachmis centum, myrrhæ Traglodyticæ, rosarum siccatum, amyli, gummi, singulorum drachmis quinquaginta, teruntur hæc cum vino, & efformantur in pastillos, qui in vinbra siccati in vsum veniunt, & ad capitis dolorem temporibus illinuntur. Et in aliorum quoque Pharmacorum præparationes miscentur. Galenus quoque lib. 2. c. 1. *ἐν τῷ κεφαλί* in capitis ex febribus dolore: Illinenda est frons, inquit, ex cyphi in frigidioribus, ex Crocomagmate in calidioribus. Hippocrates Crocomagma etiam *ἰσχυρὰ* appellat in libro De sterilibus.

CROCUS VERNVS LATIFOLIUS ALBO
flore interdum purpurascens venis vario.
Alius flore purpureo minore.


IN post. Hist. Clusius sub titulo Croci vernilari- *Descriptio*
folii albo flore hanc tradit descriptionem. Latifolii Croci prima species, terna & quaterna interdum habet folia latiuscula & breuia, duabus albis venis per eorum longitudinem subius excurrentibus prædita, inter quæ prodit è membrana flos breui pediculo nitens, sex foliis con-

*Crocomagma
ita vnde
ex quo modo
fit. Proba-
tur.*

flans albis, una parte cum pediculo purpurascē-
tibus, & in medietate flamina, cum brevitati-
do stilo continens: radix bulbosa, candida, te-
nuis cortice amicta, fibrisque candidantibus in-
fima sede praedita. Nulla inter reliquas Croci
veteris species, hac magis fecunda in edenda so-
bole. Eius vero flos interdum variat: nam ter-
naria exteriora folia, nonnunquam purpurascē-
tibus venis sunt aspersa, interdum soli foliorum

mucrones pur-
purascunt, ali-
quando etiam
purpureus ra-
dius omnia
folia secundū
longitudinem
media leuat.

Crocum au-
tem vernum
latifolium purp.
flore minore sic
describit. Similibus est
foliis latifolio
albo, paulo ra-
men angustio-
ribus, inter fo-
lia promens ē
membranaceo
involucro, e-
iusdem ma-
gnitudinis flo-
rem breui pe-
diculo innite-
tem, sex foliis
constantem
violaceam ad
caeruleum ten-
dentis purpu-
ra colore, yn-
gubus & li-
no. pediculo
saturatione
purpura nitē-
tibus: radix al-
teri similis, &
in edenda so-
bole satis fec-
unda inter-
dum. Nonnun-
quam, sed val-
de raro, fert
utraque hac
rotundū exal-
bidum semen
in triangulo
capiculo.



Primum, secundum, & quartum (de quo paulo post)
speciem meminit Ios. Similiter in Helvetia
descripserunt, atque illic in montanis inveniunt,
colore purpureo candido, & utroque mixto: Bu-
tric fungo vocari, & a lute montis incolis apud
quos in supremo iugo etiam nascuntur) & effra:
addit radicem suis esse gratam.

Audio & in Baldo monte agri Veronensis pro-
venire. Nonnulli primum genus Crocum vernū
ob foliorum & floris cum legitimo Croco simi-
litudinem vocant: Graece ἐζεία & ἐζεία dici pos-
set: alii Crocum montanum appellare malunt,
salutem tamen montanum Crocum postea dabi-
mus) Turcae Zafan vocant Crocum, & voces
addunt ak, mor, sari, quum album, violaceum, fla-

num colorem exprimere volunt.

Croci silu. verni tria observavi genera Dale-
champ. Primum minimum radice bulbosa, exi-
gua, rotunda, multiplici cortice vestita, inferne
Cepa modo fibrata: cauliculo dodrantali duo-
bus latiusculis foliis obvoluto, usque ad floris
exortum ter ascendentibus, quatuor inuper,
aut quinque foliis ex lateribus utrinque enatis,
oblongis, angustis, linea candida qua media in-
terflectat, aditus: flore Croci hortensis, parvo, su-
perne purpureo, inferne flavescente, exantibus
in medio fluminibus crocēis. Secundum priori
istiusmodi simile est, in quibusdam diuersum ne-
pe quod radice sit amphiore, ac densius fibrata:
caule proceriore, grandiore, crassiusculo: flore
maiore & latiore. Tertium radice est gemina,
Gladioli modo, leuiore, integriore, minusque la-
tero cortice obducta, parum fibrata: foliis qua-
tuor, aut quinque, longiusculis, sed angustissimis,
linea media candidissima distinctis: caule foliis
vacuo, recto: flore media sui parte purpura ni-
tente, supra & infra candido, interdum prorsus
albo. Crocus siluestris in plevisque Gallie locis
sed in Allobrogibus potissimum nascitur, pra-
sertim primus & tertius in niuolis montibus, ter-
ra nigra & pingui. Liguata nunc, & sub finem
Maii florem & folia statim promunt. Hanc ob
causam opinatur Clusii appellandum Crocum
Vernum, quod flore sit Croci, Verēque floreat.
Tres quoque figuras habet Dalechampius, & de-
scriptiones, nos priorem & tertiam accipimus,
secunda minus placet, quare ex nostris siccis v-
nam cum latioribus foliis.

Crocum sanē montanum silu. observavi Bur-
mii Rhetorum cum flore ac etiam semine Iunio.
Generis etiam cum essem reperi Iulii principio
in monte Thuyi, verū iam defloruerat & ade-
rat semen: transtuleram in hortum, nos autem il-
lud describere negleximus, purpureum colorem
in siccis animaduertimus.

Croci mei ubi primum erumpunt cum flore,
quidam extra terram, vix per quatuor uncias ex-
tant, unciam ferē duarum inter folia herbacea
qui interdum ea superant, in flore sex folia &
apices lutei, quos non animaduerti extra florem
continere ut demonstrat figura Dalechampii, flos
desinit in capitulum ex breui & unciam duarū
aut trium pediculo tenui, in quo semina: folia
herbacea tantum terna, angusta, Croci: quae su-
perant florem, & potissimum ubi incipit euane-
scere, & tandem ita exerceant ut palium exee-
dant, & latiora euadant multo quam in hortensio.
Pictor noster perperam pinxit quatuor folia
pro tribus: membranae aliquot tenues luteae am-
biunt simul pediculum floris & foliorum prin-
cipia, quae exprimuntur in figura Dalechampii
membranae etiam alia tunica amplexatur cau-
liculum floris, ad cuius initium vique, nec pe-
diculus ita nudus est, ut pingit noster pictor, qui
per negligentiam eam omisit: radices plerum-
que duplices, ut in Gladiolo, tunicis reticulatis
teguntur, subsunt deinde capillares radiceae.
Cur I' rater Phyt. separaret Clusii vernum maiorem
tertium a Lobelii Violaceo toto nondum ani-
maduertere possum.

Gesner. hort. Crocus silu. flore candido pul-
chro proficiente sub finem Februarii.

An Camer. hort. Crocus vernus purpureus.
Et apud Marchiol. Germ. Reperiuntur aliquot
species Croci silu. potiss. in altis montibus, flori-
bus albis purpurascētibz aut caeruleis (blau)
v plurimum Vero flores, in lura monte albus

Hbb

tur *Leffrat*, in alijs montibus Helueticis *butreiff*.

Sæpius miratur *Clusius* se, nec in Austriacis, nec in Stryiacis, neque etiam in Pannonicis montibus, illum *Croc*i verno tempore florentis genus inuenisse, tamen diligenter perlustravit, quum Helueticæ Alpes, illis etiam trigidiores, aliquot eius genera sponte alant.

Vires &
Vsu.

*Croc*i siluest. montani flore albo radice foris duntaxat quidam vtendum censent, tam *Clusio*, quam *Lobel.* testibus, intrus non perinde: illius pubi vrinas elicit crebras atque crassas, tumores *Hydropicorum* dilcutit, spicula euellit, isto agresti facilius abigeret e suis interulis pediculos *Ges* *Hibernica*, nam virosior est, & penetrantior. Venerat vulgarior præterquam quod *Hibernis* miseris tam importunos hospites, quietis & famis hostes abigit, etiam colorem floridum, vegetumque calorem, vigorem, & animorum ferocitatem artubus & alit & auget, illuineque sordidas velles colore commendat, militar: idcirco non parum conducibilis.

CROCVS VERNVS LATIFOLIVS perpetuus flore maiore.

Perelegans *Clusio* in post. hist. *Croc*i verno tempore florentis Tertia species latifolia purpur. flore maiore, quam ei mittebat *Doctiss.* *Ferdinandus Imperator*. Eius verò iam marcidii, & dudum tera erati bulbum vnicum accipiebat, qui sequente Vero folia quidem protulit: sed nullum florem. *Lugduni* porro *Bataurorum*, cum alijs *Croc*i verni latifolii speciebus florem dedit, illis formam similem, hoc est, sex folijs constantem, quorum externa tria paullo longiora, interna tria breviora amplectantur, multo tamen ampliora quam in secunda specie, licet illis colore nec valde disparia nec iniucundi odoris, tria stamina continentem alba, magnis flanis apicibus prædita, & inter illa *System* paullo longiorem, extremâ parte in tres quasi tubulos laxiores diuisum, aurei coloris: cum flore, & membranaceo, instar reliquorum, inuolucro prodeunte, exeunt terna, aut quaterna folia, proximè descripti folijs nõ dissimilia, paullo tamen longiora: radix bulbosa: superiore maior, & ad Quintæ speciei radiceis amplitudinè accedens.

CROCVS VERNVS ALBVS, CÆRVLEIS ous in latere folii, *Lobelio*: & *Croc*us vernus latif. albo verticolore flore primus *Clusio*.

Descriptio **L**Ob. Obs. & Ic. Pl. *Croc*us vernus albus. ætuleis oris spatis in latere folii: ex Italia D. Brancionus accepit. Hist. Lugd. figuram habet sub *Croc*o serotino *Lobeli*i. C. B. Phyt. *Croc*us a. siue *Alpinus* vernalis triphyllus, *Lobeli*i albus. 2. *Croc*i verni latifolii albi, verticolore flore primi folia *Croc*i facini & legitimi folia satis referunt, nisi breuiora essent: inter quæ bini aut terni prodeunt flores, primæ & secundæ speciei floribus maiores, sex folijs mucronatis constantes, quorum terna exteriora (quæ pallida sunt foris, crivus radiis ex atro purpureiscentibus, ab infima basi ad extremum solum duclis striata, internè alba sunt, ut & tota interna tria folia, staminaque in mediocribus habent *Croc*o montano similia, sed magis pallentem *System*: liberalius hæc *fenich* præbet in triangulis capitibus, rotundum, ex ru-



fo candicans: radix superioribus similis, foris membranâ fuscâ obducta, fibris infima sedē donata, & intus alba.

Clusium intelligere eundem *Croc*um cum *Lobelio* afferere non audemus: eundem iconem habet, quæ à nobis in nostra tabella notata est I. de altera iconē notata II. agemus paul-

lò post, sub *Croc*o verno latifolio albo verticolore secundo simplici.

CROCVS VERNVS LATIFOLIVS albo verticolore flore 2. simplici & duplici.



Quarto *Croc*o (inquit *Clusius*) verno latifolio albo flore similem, sed per omnia minorem, ante multos annos in Belgiam nobis mittebat C. V. Alphonfus Pantius, Ducis Ferrar. Medicus, cuius florem interdum oetoniis & denis folijs prædictum habui. Lac. Platean

etiam duodenis, illiusque iconem ad me mittebat, peculiare genus esse existimans: sed infrequente anno simplicem sex foliorum florem tulit.

Clusius habet in post. hist. Iconem *Lob.* ex *Plantini* iconibus pag. 139. quæ in tabella præcedenti, nobis paulò ante posita sub *Croc*o verno albo & notatur II. *Clus.* præterea aliam iconem habet, cui titulus *Croc*us vernus latif. duplici flore.

An *Lobel.* Obs. *Croc*us silv. albus duplex maior & minor. Flores illis albis, purpureis, violaceis lineis striati, quos ex Italia præclarus vir *Brancionus* accepit. Pagina verò sequenti de Ic. Pl. pag. 139. *Croc*us silv. purpureus, obsoletus, pallidus lineis striatus, quem D. Brancion *Alfonsi Pantii* Ferr. munere alit, supra figuram, *Croc*us vernus serotinus 1. flore purpureo rubente, violaceis lineis striatus.

Hist. Lugd. *Croc*us serotinus *Lobeli*i. C. Bauh. Phyt.

Crocus 3. siue **Alpinus Vernalis** purpureo violaceus 1. **Lobel.** **Vernus** serotinus 3. repetitur flore purpureo, aureo & vario. **An Camer.** horti **Crocus vernus** flore vario.

CROCUS VERNUS PURPUREUS
striis virgato flore.

Folia ex radice bulbosa statim promit, aliquot nonnihil repanda & longiora, culmo angustiora, rigidula; semina in cacumen desinentia, sulco candicante aduersa parte exarata, marginibus viridantibus. Sulco aduersa parte respondet porca elatior nitidi vitoris, a qua de uera



maniculata latera colore ferè sunt glauco: inter hoc emergit, nox à radice pediculi palmares & latiores, teneri, infirmi, maiore parte candidi, candida membrana vaginà diuoluti, superiore parte albis purpureisque striis distincti: singuli florum vnum sustinentes fragrantis odoris, nudum, spiculum antequam explicetur amulantem, foliis constanter tenui, vncialibus, acuminatis, quorum extrema tria complexu suo, reliqua in ocluso flore occultant, colore intus albicante, foris striis purpureis, pallide flauescens & albis pulcherrime virgata: tria verò reliqua, coloris intus forisque sunt dilutioris violacei, excepto vngue saturatæ violæ externa parte conspicuo: medium obsident tres fibræ puluisculo flauo resperse, alicuæ linguam imitant, stamina ambientes totidem saturati croci coloris.

In horto Ill. E. C. Montbelg. licuit in huius foliis lufum obseruare: siquidem extrema illa striata floris folia, vna aut altera profunda celsura per margines dissecta, animaduertimus: prouenerat autem ex bulbis à Genero Cherlero Romæ delatis, florebat circa finem Februarii & principium Martii.

De hoc fortè Clus. post. hist. Ioach. Iungermanus C. V. Ioach. Camer. ex sorore nepos mihi scribebat in herbatione, quam Comite Iosepho de Casa buona Sereniss. Ducis Flor. simpliciter ut vocant ad Tirrheni maris littora instituerat, tres Croci verni differentias inuenisse. Ex his elegantiore, vel albicantes, vel purpurascens flores proferre, quorum exteriora terna folia crassiores quasdam venas purpurâ saturâ infectas haberent, quæ mirum flori decorem adderent. Reliquas duas maiores esse, Croco satiuo non inferiores, & verique florem purpureum: sed in vna Colchici floris instar dilutum, in altera à Croci legitimi flore parum diuersum. Addebat, Iosephum admonuisse, aliud elegantissimum genus croci in istisdem pratis circa Liburni portum,

Tom. II.

quod florem proferret saturatissimâ purpurâ nitentem, quem, ut pore magis serotinum, conspiciere illi non licuisset.

CROCUS VERNUS LATIF. PURPUREUS
versicolore flore.



Crocus vernus species Clus. Hist. post. siue Crocus vernus latifol. purpureo versicolore flore, quem Alphonsus Parius mittebat, florem iam marcidum adhuc retinentem, & semen in triangulo capite maturum, ex quo mihi nate plantæ, quæ tertio anno flores proferre coeperunt: sunt verò in superioribus ampliores,

Descriptio

ad tertiam speciem florum magnitudine proximè accedentes, sex etiam foliis præditi, quorum externaria foris ex candido, quodammodo purpurascunt, & saturatissime, quasque atræ purpuræ, tribus vel etiam quinque lineis ab infima parte sursum ascendentibus insignita sunt, internè purpurascunt, interiora verò tria, vel dilutioris, vel saturatioris purpurei sunt coloris, circa vngues tamen similibus, ut exteriora; radius insignita: semina in triangulis capitibus subfulcum: folia superioribus speciebus longiora & latiora, Tertia foliis non valde ab similia, duabus etiam albis lineis subitis distincta: radix paulo amplior: huius florem etiam octonis foliis interdum luxuriantem habui quatuor videlicet internis, totidem externis.

In icone Clusii non apparent lineæ sursum ascendentes.

CROCI VERNI TRES SPECIES, FLAVA
aurea & pallida.

Crocus verni Maritimi latifolii flore flauo, prima speciei quaternæ aut pluræ folia sunt, ad quintæ speciei folia valde accedentia, longiora tamen & circa exortum latiora, binis candidis venis secundum medium nervum per longitudinem excurrentibus, ut in reliquis Croci speciebus, quæ emergere incipientia, florem simul ostendunt, sex foliis, dum explicatus est, constantem, exterioribus mucronatis, internis paululum orbiculatis, flauo coloris, vterunque odoratum, tria longiuscula latiusculaque stamina dilutius flauescens, intus continentem, & longiorem stylum summo fastigio in tria stamina diuisum, satiuo Croci staminibus parè concolorem: cui succedit, ut in superiore Croci verni specie, membranaceum triangulare capitulum, rotundo rufoque semine plenum: radix cum superioris radice conuenit, vel etiam maior est.

Hbb 3

solida, aliquot candicantibus fibris, sessili parte donata, & aliquot tunicis obuoluta: binos plerumque, ternos aut quaternos, vel etiam plures profert flores: nulla enim Croci verni species hac liberalior in producendis floribus.

Croci verni latif. aureo flore.



Croci autem verni latifolii aureo flore, speciei alterius folia paullo breviora, tamen latiora, illius qui nuncum fert florem foliis penè equalia, flori magis apertus, sex etiam foliis constat altero brevioribus, ferè orbiculato mucrone coloris prorsus aurei, tria stamina umbilicū occupantia breviora latioraque.

que Stylus alteri similis, summa parte interdum in quatuor staminula divisus, alterius Stylo concolor: florebat mihi anno 1584. & sequentibus duobus, paullo maturius flauo, & multos etiam dabat flores.

Croci verni latif. pallido flore.

Croci tandem verni latif. pallido flore tertia species folia non minùs lata habet, floresque sex foliis magis mucronatis, constantes, coloris omnino pallidi, viridibus venulis exteriorum foliorum vngues foris distinguuntibus, cetera nota continent.

Omnes has flauo differentias corrumperebat rigida illa hiems anni 1586. & plures quàm sexagenos bulbos iuniores earum semine natos, præter tres aut quatuor qui flauo genus conseruauerunt.

Crocus vernus latifol. flauo vario flore, Constantinopolitanus sive 7. Clusii, dubitat Lobel. Adu. pat. 2. an sit Crocus sil. vernus versicolor, aureo tuculo panno concolor, quem Galli *drap dor* vocant: de quo paulo post.

C. Bauh. Phyt. Crocus 12. sive vernalis flauus. Item 14. sive Vernalis pallidus. Camer. hort. Crocus vernus aureo flore.

Tempus

Florent autem omnes, inquit Clusius, Croci montani differentie ineunte Vere, alia aliis maturas, Martio, & Aprilis initio: nulla autem diutius (ob numerum florum subinde nascentium) ea quæ flauum fert florem, quæ omnium etiam liberalissimè semen præbet: ea primùm Germaniæ innotuit post annum 1579. Stephani van Hausen Norimbergensis diligentia, qui Constantinopoli, rediens in Seruaia sive Moesia superiore sub Belgrado florentem eruit Martio mense: postea & alii ante à me admoniti viderunt istinc Viennam redeuntes, in Thracia, non modò flauo flore, sed etiam albo & subcaeruleo: sed non eruerunt: Flauæ autem varietatis pauci bulbi allati anno 1597. Octobri mense, iugè adeò maridi & exsucci, ut verno tempore erutos appareat: nam & flores & folia adhuc retinebant, cimpriq; fuerant in foro Constantino-

poli. Vnus aut alter eorum quos redemeram, & terræ commiseram, prodierunt sequente Vere, vnicū duntaxat folium proferentes, & anno demum 1590. & sequentibus, flores quos descripsi mihi tulerunt Franhofurti ad Moenum, & Lugduni apud Batauos.

CROCI VERNI LATIF. FLAVI vario flore 1. & 2. species, vtraque flore simplici & duplici.



Crocus vernus latifolius flauo flore, sive Septima species, Clus. Histor. poster. quinque aut sex habet folia, tenuia, in-
instar ferè legitimi Croci, infima parte ex purpura nigricantia, è quorum medio vnum aut alterum flore promit aurei ferè coloris, legitimi Croci odorem non nihil referentem, sex etiam foliis constantem: ut reliqua Croci genera, quorum exteriora tria paullo angustiora, & magis mucronata, tribus crassiusculis radiis ex atro purpureiscentibus ab uno ad summum, secundum folii longitudinem excurrentibus, & multas interdum venas in latera spargentibus, insi-

gnita, terna interiora latiora sunt, & vngues habent foris etiam ex atro purpurascens, pedicellum qui florem sustinet, totidem purpurei coloris saturi radiis notandum, quot sunt in flore folia: umbilicū occupant tria flaua stamina, inter quæ stylus eminet extrema parte trifidus, aurei coloris: floribus succedunt crassiuscula trigona capita, adeò saturo purpureo colore infecta, ut atra videantur & splendens, quæ maturitate hirscentia, semen continere conspiciuntur superiori: quale, & magis rufum: radix bulbacea, ut in superioribus, sed præter illorum morem multiplici reticulatoque cortice obducta, & multis tenuibus fibris sessili parte, per reticulati corticis maculas

bulas se exercentibus, prædita, raro adnatos bul-
bos proferens.

*Strand-
m. lark,
fasc. Garro
June 3*

Illius alia est species, quæ nec radice, nec fo-
 lio, neque flore differt, exceptis, radiis, quæ aded
 latè sese spargunt, ut præter oras, totum exter-
 norum trium foliorum dorsum inficiant, ac pedi-
 culus etiam florem sustinens, totus ex purpura
 nigrescente splendeat. Vtraque species aliquo-
 ties florem dedit duodecim foliis constantem,
 sex internis aurei coloris, sex externis purpure-
 is radiis insignitis, deinde sexagona capitula: in-
 terdum etiam gemellos flores uni pediculo in-
 hærentes, quibus etiam gemella capita, utraque
 semine plena.

Lobel. Ad. par. 2. Crocus vernus latifolius fl-
uo vario flore, huc 2. Constantinopolitanus Clu-
si. Pleraque ferè Croci sylu. variceates Anglo-
britannica & Belgio inquilina.

Crocus vernus flore luteo, coronâ Phœniceâ.

Crocus vernus flore luteo, coronâ Phœniceâ au-
thore Lobell. Adu. Penes D. Somerum quorannis
Aprilis flores, delato & eruto bulbo ex horto ma-
gni Ducis Hetruriae.

937. Croci lutei & altri varietates.

Eius (inquit Lobel. Adp. pat. 2.) tres differentias
hunc Ioannes de Franque ville senior & iunior,
mercatores Cameracenses huius amoeni studii
cultores egregii. *Primum* quippe flore flauo siue
fuluo, nido: radice alijs non dissimili. *Alterum*
rariorem multo, precocissimam, flore fauro
colore fulgente. [An crocus Vernus latifolius
Clusii flauo vario colore Constantia] aurei splē-
doris foris elegantissimis violaceis nigris lineis
striato, auro texta Serico panno amulo, vnde
[Crocus aureo panno concolor] croci concoloris
aureo panno nomen, *Goud laken* vulgò Braban-
torum, & *Drap d'or* Gallorum. Staminaibus intus
luteolis: folijs tenuibus erectis: Bulbo subtus
aliquantulum fibrato, reticulo obiecto instar nu-
cis Myristicæ inuolucris, Macis vocati. Hoc alui
Hacknei figulino vase. *Tertium* flore pallido
ab alijs diuerſum: ceteris vt vt satis responden-
tibus.

Varietas. *Crocus vernus* aureo flore Clusii, varia flore intense, magisque luteo aut rutilo & aperto. Sed tota planta minor, alioqui omnino fere similis.

CROCUS VERNUS ANGVSTIFOLIUS

Floribus caeruleis siue violaceis interdum candidis, Hispanicus.

Descriptio **C**rocus verni angustifolii species prior (inquit Clusius hist. post.) terna, quaterna aut plurima habet folia, longa, viridia, Crocinis longè angustioribus gracilioraque, rotunda & capillaria ferè, inter quæ prodeunt bini aut terni cauliculi, viciales v. plurimum, anguloli, sustinentes flores sex foliis constantes, vt reliquæ species, inâ parte flavescentibus, intus nonnihil candicantibus, ceterâ ad caculeum tendentibus, siue violaceis succedunt & toti candidi odoratos, quibus insunt staminula: his succedunt folliculi, siue capitella trigona, exilè semen fuluescens continencia: radix exigua Auellaneæ magnitudine, duro spassiceoque cortice siue putamine tecta, intus alba, firma, subastringente gustu.

Clus. Hisp. & Hist. post A ppellatur hic bulbus
à nonnullis crocus vernus, quòd floreat croci.
Verèque floreat: folia tamen croci non sunt, sed
rotunda & capillaria planè. Nomen vulgare Lu-
stranis Galerie vicinis apud quos etiam nasci
quidam illius regionis incolæ afferrebant, *Nozel-*
ias pequeruas, id est, Auellanae parvæ.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 141. crocus silu. maior
Hispanicus, flore parulo, vulgò Nozilicha minor
& Nozellas. Nucula à radicis forma, quam etiā
gustu refert. Crocus vernus minor primus Clu-
bii. Hist. Lugd. crocus vernus minor. i.

C. Bauh. Phyt. crocus 14. siue vernalis minor. i.

Frequens inuenitur a Cluſio Gadibus Prior,
atque inter Afindum (vulgò Medina Sidonia)
& Calpen, locis falebroſis & apricis. Floreſcit cum
ſequentibus Ianuario & Februario.

Angustifolii croci verni nullas facultates cui- Vires-
quam exploratas intellexit Cluius.

*Crocus Vernus minor aler flore hyino
ex albo purpureo.*

Croci verni angustifoli species altera, foliis & Descriptio
radicis externo cortice illi omnino similem in
Beturix collibus Lusitanix finibus obtinebat.
Clus. hist. post. paulò minore flore, ex albo pur-
purascente, vix quæ e terra prominente, atque v-
num bulbum crucebat florem habentem e foliolis
octo compositum, quatuor externis paulò ma-
ioribus: radix erat gemina, candida, vna super
alteram insidens, quarum superior firma, dulcis
& edulis erat, inferior flaccida.

Crocus vernus minor alter Clus. Hisp. incolis
Cebollina [parua Cepa] dicitur, quo fere nomi-
ne solent Hispani minores omnes bulbos nun-
cupare. Lobel. obs. crocus vernus 2. Clusii Hisp.
Cebollina 1. parua Cepa. C. Bauhin. Phyt. crocus
11. crocus alpinus gemina radice.

Observavit hunc Clusius in Beturiz collibus. Locus & tempus.
Lusitaniz conterminis, florentem Ianuario.

CROCUS VERNUS ANGVSTIFOLIUS

terius Clusio flore multò minore
caeruleo.



formâ similis : paullo tamen maior est ; semen etiam crassiusculum :

Hhh, 4

Crocus vernus minor tertius Clus. Hisp. Iconem aliam ponit Clusius in post. hist. cum titulo *Crocus verni angustifolii violaceo flore*, quam autem pro tertio profuerat in Hisp. plantarum hist. in post. ponitur pro Croco tenuifolio, licet eius descriptio non respondeat.

Lobel. Obs. *Crocus vernus* Hisp. 3. minor Clusio. Et Plant. icon. p. 142. *Crocus sylv.* Hispanicus vulgo Nozilicha maior, *Crocus vernus* 1. Clusii. Hist. Lugd. *Crocus vernus minor* 3. Clusio. C.B. Phyt. *Crocus* 14. siue vernalis minor. 1.

Locus.

Hunc Gadibus duntaxat iuxta priorem inuenit Clus. eodem tempore florentem.

CROCUS MONTANVS AUTVMNALIS.

Descriptio



Crocum montanum primum, inquit Clus. Hisp. & histor. post. flore est sativi Croci, sed dilutior & minore, tribus iatus croceis staminibus, & stilo luteo summa parte in aliquot staminula diuiso: *folia* illi quaterni Crocinis similia, breuiora tamen, interiore parte, lineam quandam can-

dicantem secundum longitudinem, exteriore vero, binos tanquam canaliculos seu sulcos utrinque secundum nervum excurrentes habentia. *radix* minor quam in sativo, candida, plena, & veluti internodiis distincta, quia [quod omnibus aliis Crocis generibus, gladiolis & Sisyrinchio etiam accidit] plantam florentem, superior radicis pars augetur, inferior autem flaccescit & minuitur, utraque tamen denso quodam cortice & multis villis contexto inuoluta & tecta, tenuibusque fibris per corticem se exercentibus, sessili parte donata: subdulcis porro illa est initio, deinde ingrati saporis.

Hunc Theoph. lib. 6. c. 7. *κρόκος ὁ ὀπίσθεν* appellat, Latini *Crocum montanum* & *silvestre*. Lusitani *Pied de burro* (pedem alinum) vocabant. Quam vero de causa nescit Clusius. An adu par. 2. Autumnalis *Crocus sylv.* sine foliis ut Colchicum vulgare flores laxat. Item Obs. *Crocus montanus Autumnalis* Lusit. & Hisp. etiamque nostris, vulgo *Pied de burro*. Plant. ic. p. 138. *Crocus montanus Autumnalis*. Hist. Lugd. *Crocus montanus* Clusii. C.B. Phyt. *Crocus* 3. siue *Alpinus autumnalis*. Camer. hort. *Crocus montanus* Theoph.

Locus & tempus

Nascitur in nonnullis Lusitaniz rupibus, praesertim iis quae non procul à mari absunt, ubi Nouembri obseruabat Clusius & cum suo flore exuebat, anno 1564. & amicis in Belgium mittebat. Istic etiam Septembri floruit. Viennae Austriae & Francofurti ad Moenum, Octobri, interdum maturius: Maio tulit crassa, angulosa ca-

pitae, semine plena, quale Croci verni latifolii Quarta speciei semen est. Belgis, teste Lobel. hortensis & inquilinus factus, è maritimis Lusitanie collibus delatus.

Crocus angustifolius 4. flore purpurei saturati coloris.

Crocus verni angustifolii quarti ad Clusium mittebat diligentiss. vir Iosephus de Casa bona aliquot bulbos, quorum nonnulli sequentibus annis verno tempore florent tulerunt. Erant vero illis terna aut quaterna iuncta *folia*, prior angustifolio hispanico modo descripto similia, inter quae vncialis, tenuis, *caliculus* prodibat, membranaceum *folliculum* sustinens, ex quo *st. scilus* emerit sex foliolis constans purpurei sativi coloris, quibus *vugues* albis venis distincti. & *st. scilus* ex umbilico prodians: fugax admodum fuit hic flos, ut pote qui vnicò duntaxat die apertus manserit, *radix* Hispanici angustifolii radice par, multis tunicis, siue corticibus duris tecta.

Apud Clusium est icon, nescimus an pro hoc quarto posita an pro tertio: In iconibus Plant. p. 141. posita fuit cum priore Clusii angustifolii sub titulo Croci siluestris minoris flore patulo.

Crocus montanus secundus flore purpureo foliis orbiculato mucrone.

Crocus montani alterum genus. Clus. Hist. post. re simile primo, *florem* siue *foliis* promit Septembri, vnciali aut longiore pediculo innitentem, satis odoratum, sex aequalibus foliis orbiculato mucrone praeditis, & saturatioris purpurei coloris peneque violacei, constantem, tribus ex umbilico prodeuntibus flauis *staminibus*, & stilo extremum mucronem multitudine, crassiusculumque habente: nullum adhuc *semen* mihi obiectante licuit: nec qui bulbum mittebat, vllam eius mentionem in epistola faciebat: *radix* prioris radice valde similis, cortice è multis villis contexto inuoluta, oblongos interdum nucleos satis procul a matre spargens. Hoc [Alterum] Croci siluestris appellatione mittebat Nobilis, idemq; Doctiss. vir, Iohannes Boissot, vetere amicitia Clusio coniunctus, Francofurtum anno 1591.

CROCUS MONTANVS TERTIVS.



Crocus montani tertii Clusio Histor. post. *flos* inodorus etiam est, vel tenuis admodum & euanidi odoris, senis, ut reliqua Croci genera, *foliis*, quorum interiora terna paulò breuiora sunt, omnia autem orbiculato mucrone, albicantis initio coloris, sed in quo deinde temporis succellu,

lucet, dilutius quidpiam azureum perfusum
videatur: *flamma* ex umbilico prodeunt terrea,
flava, & in medio *stilis*, siue penicillus, intra
vel plura *flammina* diuifus. flami etiam coloris:
flaccoscent, vel iam marcido flore, quina, sena,
raro plura emergunt in ambitu *folia* ex tenui me-
brana, quæ florem nitid obvoluerat. Croci ver-
ni lili foliis folijs præte similis, hoc est, paulo la-
tiora quam latius, alba linea singula folia per lo-
gitudinem supina parte distinguente, & proni-
bus. *semen* haecenus nullum obseruauit Clusius
licet multis annis aluerit: *radix* digitalis, vel
etiam pillicaris est crassitudinis, orbiculata fere,
alba, solida, tunica spadicæ coloris obducta,
multis albis fibris subiecta nascentibus prædita,
quæ florum satis ferax est nam & ternos, & qua-
retnos, interdum et: un quinqs profert flores.

Misum est hoc festum Croci genus Byzantio
anno 1587. Octobri mense *Zafsan naby*, hoc est,
Croci gemmæ nomine, quod tamen, proflus ca-
ruleo non esse flore, idem mensis declaravit: At
otidius postquam terræ commisit flores pro-
ferre coepit.

CROCVS SYLV. BYZANTINVS SEROTI-
nus candidus caecillom tuberculatus.



DEbeatur
Aauthore
Lobel. Adu.
par. 2. Perele
gus Croci
lylu. autum
nalis scroti
num genus
D. Ioāni Par
kinton Lon
dunenti Phar
macopoiæ e
gregio & Rei
Herbariæ a
mantillimo,
qui eius bul
bos Bylantio
delatos sedu
lis doctiori
bus amicis
Herbarum
cultoribus

Britannia ingenio Imperitus est: ut Domino
Joan. Nafmich Botanico primario, & Chirurgo
Regio praeclantissimo, generoso item viro. D. I.
Covinarum peritissimo, & D. Iude Franqueville.

Vniuersa planta quinās & senās vncias altitu-
dine aequat. In palmari delicatiorē *cauliculi*, va-
ginula *predito*, flores laxat candidos, aliquantile-
lum dilata ceterū vmbra mixtos, ampliusculos,
Colchici paulò minores, senis foliis conflatos:
tabas *flaminibus* luteis inferioribus, Croci ver-
ni sylv. similibus, coridēque ternis sese exeren-
tibus calidioribus concoloribus *flaminulis* aut sti-
lis. Florat in hortis predictorum quorundam
Botanicorum per mensem Nouembrem in sextū
aut octauum Decembris, vñā cum foliis dilutio-
ris viriditatis (obscure virent Croci sylv. motani
foliis) *partis*, cernū vnciarum, lineis albis me-
dio exaratis, quæ paulatim marcescente flore ad
palmarem altitudinem & vncias quatuor excre-
scunt. *Radix* adultæ Nucem Myristicam æquat,
etiamque superat, rotundior tamen Gladioli si-
milis, intus alba, cōtine obducta lubifutē, Ac-

cedere videtur ad Crocum montanum tertium
Clusii.

Crotus veranus capillari folio.

Mittebat Venerius Clusio Histor. post. Croci
verno tempore florentis genus capillari folio,
quod Burdegalenti agro locis desertis nasci scri-
bebat, & duorum generum inueniri, vnum pur-
purascens folio: alteri quod rarius, albo. E-
cōtrē illius quod exulcū habet florem aliquos
ipsi bulbos semel atque iterum mūt. At illius
quod albo est flore, ne vnum quidem bulbū ab
ipso impetrare potuit: in alios sicē magis libe-
ralis fuerit: certus enim est eos, qui illud habe-
bāt ab ipso accepisse. Id autem exiguum radicem
habebat, bulbosum, duro spadiceo cortice rectā,
intar illius quod in Hispaniā obseruabat ad A-
nam flumē, vel eius, quod Casabonus ei mī-
tebat: qui insequēte anno bina aut terna pro-
dibāt quasi capillaria folia, viridita, surrecta, inter
quæ pediculus verius quā ca. lūlus vncialis lō-
gitudinis aut paulū maior, ab vna parte planus,
sustinens semivncialis magnitudinis florem sex
foliolis constantē, quorum terna exteriora paul-
lō longiora erant, & purpurei coloris, tribus ve-
nis saturationibus secundū longitudinem
exteriis distincta, tria interna breuiora & dilu-
tiore colore prædita, omniā autem internæ dilu-
tior purpureascebant, & angustā habebant pallidos,
ternis venis distinctos, & prodeuntibus ex vmbili-
co tribus fl. am. axil. breuibus, longo apice flauo
præditis, & medio stylo, extremā partē diuiso.

Florem proferebat initio Maii, qui Sole imple-
dente aperiebat, sub noctem aërem claud-
batur, & paucos dies durabat, nullius, aut pette-
nuiis odoris.

Срѣди шовтанихъ Русскихъ Активнаѣ.

Anno 1602. Gallo quodam *insensu*, qui multas plantas in Pyrenais montibus erutas adferebat, aliquot redimebam (inquit Clus. Exot. par. 2. Append. 2.) inter quas binos aut ternos Croci bulbos: horum unus inequentē anno Septembri florem ferebat, Primi Croci montani flore ampliorem, colorisque saturationis & quodammodo mediū inter illum & alterum in mea Plantarū historia descriptum, cuius mediū stylus multitudine summā parte perinde ac illius, magis tamen diluti coloris, & prorsus flavi: huius item folia marcescente flore, non statim prodibant ut in primo. An porro alii istius generis sint futuri, dies nos docebit, si non peribunt.

Croc filu. similis Rubre.

Bulbus montanus ignotus similis Croco siluestri
missus ex ! Hispania Clus. Pann. pag. 194. C. Bauh.
Phyc. Crocus 16. huc Croco siluestri similis.

Старі Зізанія

Croci Zizania, bulbus quidam nuper cum Cro-
co in Valleſia miſſus, ſuperficiēs Croci, magnis
intervallicis latet & redit. Geiner.

EPIHEMERON NON LETHALE

Veteribus.

САР. VI. 252

Ephemeron [*ephēmeron*] quod alii Agrostem Irin
Heur. ap. d., Ald. cod. *Heur.* Lilium, *Jappel.*

lance caulem, foliaque habet Lili, sed hæc tenuiora: flores candidos, amaros: semen molle: radicem vnâ digitali crassitudine, longam, adstringentem. Nascitur in syluis & opacis.

Plin. more suo paucis immutatis ita legit. Ephemerum folia habet Lili, sed minora, caulem parem, florem caruleum, [album Diosc.] semen superuacuum, radicem digitali crassitudine.

Ephemerum
aquinoc-
tione.
Colchicum
vulgare.

Ceterum Ephemerum à quibusdam pro Colchico vulgari habetur. A quibus recedit Lobelius qui Ephemerum non lethale suspicatur esse Hermodactylos officinarum. Diuersum quoque Ephemerum non lethale est, quod depinxit Matthiol. ab indigenis *Gigle Maru*, hoc est, Lilium stultum nominatum. Fuchsius plantam vulgò Lilium conthallium nuncupatam Ephemerum non lethale esse contendit. Ephemerum non lethale radicem dentium doloribus remedio esse scribit Diosc. si decocto eius colluatur. Folia verò in vino cocta illisæque, ordemata tuberculaque discurrere, quæ quidem humidi nihil dum contraxerint. Sed hic Fuchsius (puris) pro *hydr* [humidi] ex Galeno legendum censet. Galeni verba hæc sunt: Ephemerum non illud lethale ac deleterium, quod & Colchicum nominant, sed alterum quod & Irin agrestem cognominant, radicem habet adstringentem, & boni, suauisque odoris. Ex quibus palam fit, facultatis, temperaturæque esse mixtæ, nempe repellentis, & halitu [non halitu, ut per incuriam Typographi in Hist. Lugd. legitur,] euaporantis. Testificatur opera, quæ particularim edit. Siquidem non inefficaciter radix eius in dentium doloribus colluitur. Tum phrynatum augmento & statim folia conueniunt. Oportet autem ea in vino decocta, prius quam pus moueas illinire. Liqueat igitur ex his Galeni verbis, pro *hydr* esse legendum. Variat tamen ab hac lectione & Plinius, scribens lib. 25. c. 13. Ephemerum habet radicem dentibus præcipuam, concisam, in acetoque decoctam, ut tepido colluantur. Et ipsa etiâ radix mobiles sistit. Causis & exesim imprimatur, [imponitur,] Ver. Et seq. lib. 26. cap. 1. Folia Ephemerum tuberibus, atque tumorebus illinuntur, quo etiam duntaxat (& tantum Chl.) discuti possunt.

COLCHICVM VETERIBVS.

CAPVT VII.

DE Colchico Theophrastum ex professo quendam literis consignasse non ita constat: Licet non desint, qui Narcissum esse Plinii & Virgilii purpureum, affirmant, apud Theophr. Autumno florentem, post Arcturum circa Equinoctium. Verba Theophr. de Hist. pl. lib. 6. c. 6. hæc sunt: *Narkissos* aut *lukos* (sunt enim qui hoc, & qui illo nomine appellant) folium Aphodelo simile habet, sed multo latius & Lili, [sed non in aceto] quasi Liliaceum Maru. modò caulem nudum quidem foliis, veruntamen herbaceum, cui flos in summo, semen, velut in vasculo, membrana quadam clausum, grande, nigrum (uelut legendum, *uirtute*, Dod. Ita etiam Clus.) figura oblongum: hoc decidens, sua sponte germinat: verum tamen id colligentes etiam in terra depungunt. Serunt & radicem, quam rotundâ, carnosâ & grandem habent. Serotinus flos est, post Arcturum enim & circa Equinoctium floret. *hæc Theophr.* Quæ an Colchico Ephemero

respondeant, quilibet verba iam in medium prolata diligentius examinans, absque negotio facillè indicabit.

Ceterum Diosc. *καλχικόν*, aliis etiam *καλχικόν*, nonnullisque *καλχικόν* dici autor est. Lat. Colchicū, Ephemerum, & Bulbum agrestem, & stragulatorium. Colchicum autem, velle describit, sub finem Autumni florem edit Croci candidantem: deinceps verò folia bulbi, sed pinguiora: caulem dodecantalem cum rufo semine: radicem cortice præditam è nigro fulucente: quæ quidem delibrata candida, tenera, succi plena, atque etiam gustanti dulcis reperitur. habet verò bulbus eius mediam rinfiam fissuram, è qua flos erumpit. Plurimum in Messenia & apud Colchos enascitur. Et licet dicat Diosc. Colchicum radicem habere eam delibratam candidam, nostram tamen cum Marantha obseruauimus temporis diuturnitate rufescere: nec minus eam eam dulcem esse dicit, nostræ partes sunt scire, hunc saporem non nisi per Autumnum retinere: nam eam folia verno tempore profert amarissima esse quamobrem à nonnullis pro Colchico habitata non est.

Plinius, Galenus, Egineta, atque Aëtius huius meminerunt, quamvis non descripterint, appellant Colchicum hoc Ephemerum ventatum, lethale, deleterium.

Quæ de re sequentibus agit Serapio: *Serapio*, (sid est Hermodactylus Diosc.) Est herba quæ florescit in fine Autumni & eius flos albus, similis in figura sui flori croci, deinde emittit folia similia foliis bulbi, in quibus est humiditas adhaerens manui, & habet stipitem, longitudine vultus palmæ porrectum, cuius color est albus, declinans ad nigredinem, & habet radicem, cuius cortex est niger, ad rubedinem declinans, sed quando auferitur cortex apparet radix interius alba, mollis, dulcis saporis, & plena humiditate. Est autem radix ipsa rotunda, similis Cepæ bulbi, & habet radix ista in medio sui fissuram, ex qua egreditur stipes, supra quem est flos. Nascitur multum hæc herba in loco qui dicitur Karin. & terris quæ dicuntur Gnagna, hæc herba si comedatur occidit strangulando, sicut occidunt Fungi. Conferunt autem illi qui ipsam comederint omnia quæ conferunt illi qui comedierint Fungos malos, est autem summum remedium ei lac bouinum, non egerit namque alio adiutorio qui eam sumperunt, &c. *hæc Serapio*, qui Galenum citat vires enumerans [quas recensemus sub Hermodactyli titulo] verum nihil tale apud eum inuenimus; citat etiam Paulum, sed ex verbis Pauli ceritò asserere non possumus, de qua planta loquatur.

Colchici nomine enarratæ plantæ ordine sequuntur. *Narkissos Persicus* à quibusdam Colchicus dictus, de quo agimus post Colchicum luteum. Videtur porro Clusio Colchicum Syriacum à Alexandrinum quorundam, Tulipæ genus Apeninum de quo paulo post agemus. Scribit Hist. Lugd. *Meleagris* Dodonæi nonnihil accedere ad figuram Colchici Orientalis Matthioli de quo lib. 30.

COLCHICVM.

NON multis communis floreendi modis efficitur ut Colchicum prius semina ferre quam florem vulgus sibi persuadent: sed quemadmodum Croci, ita Colchicum Autumno solum promit

Colchicum
vulgare
radix


Colchicum
Autumno
dulce, Ver
autem in
maris

Serapio
falsè Galen
& Paulum
citat.

Tulipæ
Meleagris
flos.

Descriptio

foliis nudo & albedo, tenuique pediculo purpurei
carnetue coloris sin fena folia oblonga dimsum,



staminibus in
medio cro-
ceis: Vere so-
lia producit
tria aut qua-
tuor Liliacea,
sed longiora,
latioraque, in
terque ubi in
diversi abire
incipiunt, con-
ceptacula oriū-
tur seminum
oblonga, Lili
capitulis quo-
dammodo si-
milis, & duob'
tribus locu-
lis composita,
marcescente
& nigricante
membrana
obvoluta, in

quibus semina ad Raphani accedentia, periculis
brevibus ad mediam lineam uniuscuiusque lo-
culi adherescunt. Radix subest rufescens foris,
intus alba, bulbacea, altera parte compressa: in-
ter Castaneas.

Diligentem descriptionem Cordi lubet hic
adscribere quam habet hist. lib. 2. cap. 152. Colchi-
ci inquit (quod hodie Hermodactylum vocant)
tres sunt species. Primum enim cum siccatum
fuerit, foris nigrum, intusque fuscum in candido
colorem habet. Alterum in flavo subrubentem,
tertium vero candidum. Ex his nigrum, pauld
ante Autumnale æquinoctium florere incipit, vs-
que quod superueniens gelu sub ipsis pruinis su-
perbientes flores opprimat. Colchicum itaque
Autumno edit quincunciale, nonnunquam etiā
dodrantale, gracile, glabrum, candicans
atque egregie teneritudinis caulem, in cuius su-
mitate flos Lilio non dissimilis, sed minimē re-
pandis & reflexis deorsum foliis, sex vt pluri-
mum foliis longitudine sesquiunciam aut bessem
æquantibus, latitudine vero vnciā pauld angu-
stioribus, utrinque acuminatis, glabris, nitidis,
pinguibus, in attritu glutinosi, primum clausi &
convoluti, postea se explicantibus, constans, co-
lore in subrubente purpura albicans, in medio
luteo colore stamina, numero ipsa floris folia
non excedentia continens: qui postquam vnum
atque alterum diem duraverint, flaccescunt, de-
inde pauld post sequentis Veris initium folia pro-
fert longitudine dodrantali, latitudine vero vnci-
æ aut sesquiuncie, acuminata, crassa, Liliaceis
forma & substantiæ lentore similia, sed longio-
ra, sub terra coeuntia, & teretem, tenerum candi-
cantemque pediculum constituentia: in quorum
medio prope terram utriculus extrahat acumi-
natus, triquetrus, longitudine ad sesquiunciam
plerumque accedens, latitudine vero vnciam ad
plurimum æquans: rotundo, miliōq; maiori, pri-
mum candido, æstate deinde post solstitium ma-
turecente, ad rufum in nigro colorem transeun-
te semine plenus: quo sparso folia flaccescunt.
Inveniuntur nonnunquam duo aut tres utri-
culi simul coniuncti & ab vna radice prodeuntes,
cum eadem radix totidem flores produxerit, sed
vnus tantum ex his magnitudine præstat, alii ve-
luti abortivi sunt. Radice nititur longitudine

sesquiunciali, modicè in planum compressa, lati-
tudine vnciam plerumque quarta eius parte ex-
cedente, superius turbinata, inferius autem lati-
uscula parte veluti in paruum vnguem desinen-
te, & candidas fibras in terram demittente, &
parvis bulbis circa latera enatis se propagante:
foris multis in ruffo nigris tunicis vestita: ex
quorum numero eius ætatem cognoscere potes:
singulis enim annis singulas perinduit tunicas,
quibus detractis reliqua radice pars carnosā,
rotundaque candida, & lacteo succo plena est, ea-
dem ab vna parte rimam veluti habet, per quam
floris coliculus transiit, hunc enim non è supe-
riori & acuminata parte maioris radiceis Autu-
mno promittit, sed ab inferiori flaccescens vngui,
& latiore, contra reliquorum bulbosorum mo-
tem. Ea vero radix à cuius mucrone flos & folia
emittuntur, sulco caret, vsque in Autumnum, do-
nec subnascentia parvula alia emissio flore priorē
sulcet. Hinc est quod radices, quibus Vere & æ-
statis principio folia insident, cancellulatum illū
sulcum non habeant. Folia cum exaruerint, ve-
stigium quoddam turbinis impressum relinquunt.
Eadem radix quæ prior anno germinavit, se-
quenti anno flaccescit, Autumno succedit alia
admodum parva, inferius adnascentia, à cuius su-
periori parte Autumno flos prodit: nam hic mi-
nimè à maiore exit, minor hæc radix vna cum
flore adolescit, in Vere autem & æstate sequen-
ti simul cum semine ad iustam magnitudinem per-
uenit, quo tempore prior omnino perit. Siccata
radix tam foris quam intus fusca fit. Saporem
radix habet dulcem simulque amarum, tennem,
salivam prouocantem, & aliquantulum nauséo-
sum. Odorem vero omnes herbe huius partes,
grauem & nauseabundum spirant. Nascentur in
pratibus tam planis quam montanis solo pingui,
plurimumque in Wirtembergie Sueviæ, ubi Au-
tumno omnium ferè montium declivia, campi &
pratia his floribus albicant. Colchicum subru-
bens (quod à colore radiceis siccate ita cogno-
minatur) nigro in omnibus notis & proprietati-
bus assimilatur, præterquam quod siccata eius
radix, quamvis excorticata, rubescat. Saporem
quoque & odorem nigro similem habet, nasci-
turque eiusdem nature natalibus: rarissime ta-
men iuxta se simul nascuntur.

Olim quamplurimi cum magno multorum
vita periculo abusi sunt Colchico pro Hermoda-
ctylis, illud exhibentes, cuius rei testes est Her-
mol. in Dioscor. dicens. Colchicum haberi mo-
do passim prædicant: Hermodactylum Recen-
centiores pro Ephemeris accipiunt. Colchicum
copiose in Colchide nascitur. Estque in illis re-
gionibus venenata herba.

Quod vero apud nos [pergit Cord.] provenit,
amarum est, quo sapore veneni aliqua pars di-
luitur, nec tamen innoxium redditur. Homines
enim quos eo purgauerimus, strissima incurrit
accidentia. Colchicon ait a libi, Bulbus agrestis
aut flos Autumnalis, non est Hermodactylus, li-
cet id Serapio velit. Quidam vt Brunfelsius Nar-
cissum esse crediderunt. Sed reuera Narcissus
plurimum ab hac differt. Colchicum aliqui etiam
Ephemerum appellarunt. Nobis autem illud
consideratione dignum, an nostrate Colchicum
minus sit venenatum quam quod in Colcho pro-
uenit, vt vult Cordus, cuius argumentum non sa-
tis facit.

Nec placet Ruellium non distinguere Hermo-
dactylos vulgares à vulgari Colchico, dum scri-
bit: Officinæ Hermodactylon vocant, è quo-

Colchicum
subrubens

Hermoda-
ctylus
Ephemeris

Narcissus

Ephemeris

Cordus
ait.

Ruellius

Catapotia ad podagras tantoperè commendantur. Habet & in medicina suos vsus, quorundam venenis pro remedijs abutendo quorum medicina maioris mali periculum adfert. Hermodactylos quibus Catapotia tantoperè commendantur ab Aetio & Paulo, Ephemerum non esse satis mihi constat, etsi Recentiores, pro Ephemerum vsurpent, cum Paulus separatim tanquam diuersorum mentionem fecerit, tradens Hermodactyli radicem alui decoctionem inoliri, priuatim in articularijs doloribus, in defluxione decoctum eius dari, verum stomacho aduersari.

Pauli & Aetii Hermodactylum non sunt Ephemerum Canineca. Euch. Roslin.

Euch. Roslin in Herbar. sub nominibus Caninecae Gallorum weissen zeytlosen / Ebigerwedel, Colchici, Ephemeris, Hermodactyli [quod Colchicum dicitur] hermodactel wurz / Spindelblumen, confundit multas plantas, ac Colchico malè salubres facultates tribuit.

Neoterici duo hermodactyli genera statuunt (inquit Tagaultius) vnum radice oblonga, alterum rotunda. Qui radice est oblonga Ephemerum est Diosc. Galeni, Pauli & Aetii. Qui verò radicem gerit rotundam, eorundem haud dubiè Colchicon est, è quo Catapotia tantoperè ad podagras & arthritim commendata Officinæ conficiunt. Verum enimverò cum hoc Græcis omnibus Scriptoribus, atque ipsi etiam Plinio deliberrimum ac præsentaneum venenum sit, non admodum ceterè tutus est eiusmodi pilularum vsus: nisi fortè dicamus nostrum hunc Hermodactylum non aded venenosum esse uti illud Colchicum est Ephemerum, id est, quod in Colcho insula nascitur, Verum cum Hermodactyli quibus passim hodie vtuntur Officinæ in conficiendis huiusmodi Catapotijs, hæ nequaquam radices sunt [innocue enim, præsertim veteres gustari possunt] quas Veteres & Paulus Aegin. in articularibus morbis tantoperè commendarunt: securiùs sanè fuerit ab eis in totum abstinere. Quod autem Hermodactylus de quo scribit Paulus lib. 7. res alia sit ab Ephemerum & Colchico, eo argumento conuincitur, quod dicat Hermodactyli radicem, & per se, & ipsius decoctum peculiariter & priuatim articuloꝝ doloribus in ipsis fluxionibus plurimùm valere. Diuersa tamen capita de Colchico & Ephemerum iam conscripserat, quibus nullam vim sanandi arthriticos tribuit. Sed neque Diosc. neque Galen. neque Plinius, neque Aetius in Colchico aut Ephemerum, verbum de articuloꝝ morbis loquuntur. Proinde res alia Pauli Hermodactylus ab Ephemerum & Colchico esse videtur. Porro tametsi Ephemerum apud antiquos Græcos nomen sit generis significans idem quod apud Arabes Surugem, apud Recentiores hermodactylus, dictumque sit [ut putauit Theoph.] quoniam intra diem iugulet: præcipuo tamen nomine & peculiariter ad Ephemerum dicitur, quod veneno caret, innocensque est, & remedij ratione vimque saluiferam habet, tãtùm abest ut lethiferum sit, aut exitiosum. Colchicum verò per Antoniasiam, id est, Excellentiam loci in quo nascitur, & ob facinora Medæ veneficæ mulieris ex Colcho, de venenoso solùm Ephemerum dictum est. Maleficum hoc Ephemerum, Colchicum dictum, exitu Autumni in pratis florem edidit subcandidum siue albicantem: posteriùs, id est, ab eo tempore, folia bulbi pinguiora: caulem palmeum vel semipedalem, rufum semen, radicem rotundam, foris è nigra rufescentem,

Colchicum quod dictum.

quæ delibrata disquamatur intus albicat, tenetque ac mollis spectatur, lacteo mader succo, atque gustatu [ut autor est Diosc.] dulcis inuenitur. Bulbo medio rimula dehiscit, quæ flos erumpit. Quæ notæ omnes ad amissum Officinæ Hermodactylo conueniunt.

Quidam superites adhuc hodiè Medicus Ferrariensis, adserit se Colchicon gustasse, ac in eo Castaneæ saporem inuenisse, sed paulò post stricturnam quandam circa asperam arteriam præsentisse, ac si manu stringeretur: mox vaccinum lac bibisse, & nihil incommodi sensisse. Rura hodiè apud nos plantam hanc Canecam appellant, quod canes deuorata necent. Officinæ Hermodactylon vocant.

Hermodactylon.

Ceterum cum dicit Mesue de rotundo Hermodactylo tanquam de meliore se sermonem habiturum id sanè intelligendum est. Nempe Hermodactylum rotundum, qui Colchicon est Ephemerum, meliorem ac perfectiorem esse quod ad ea ad quæ valet pertinet, ut puta ad articulares dolores. Sed iam recitata verba Tagaultii tam distincta sunt, ut magis distingui velint. Quicumque enim considerabit radices hermodactylorum & conferet cum Colchici radicibus nostratibus exsiccatas, insigne descremen perspiciet, quicquid dicat Tagaultius de notis quæ conueniunt.

Tagaultius negatur.

De Colchico quidem nihil prodit Galenus [inquit Cornar.] Nec Plin. Colchici meminit, nisi lib. 23. c. 9. Officinæ Colchicon vocant Hermodactylon, sequentes in hoc Serapionem Arabem, qui totam Colchici apud Diosc. descriptionem Hermodactylo attribuit. Verum Paulus Hermodactyli radicem proponens, non addit Colchicum vocari. Et quamuis Colchici scorsum non faciat mentionem, tamen de Ephemerum agens, nò de veneno loqui se dicit, sed de eo quod Iris agrestis vocatur. Per venenum autem nihil aliud ipsum intelligere quàm Colchicum, ex Galeno clarum fit ex quo Paulus transcripsit. Non debuisset autem præterire, neque eo loco quo de hermodactylo agit, Colchici appellationem, si Hermodactylus Colchicum esset: neque lib. 5. cap. 48. ubi de Colchico verno agit, hermodactyli appellationem, si Colchicum hermodactylus esset. Quare diuersas res esse hinc colligitur. Sed & idem Paulus lib. 7. cap. 5. podagricam ex Hermodactylo compositionem recensens: & mox eandem purgatoriam addens, Colchici appellationis nullam mentionem facit, libenter alias exponere solitus, si quæ sunt obcuriores appellationes. Nostri Zeytlosen vocant. Quidam etiam Herbsblumen. hæc Cornar. Qui sui oblitus l. 4. c. 140. Collegit Narcissum esse ex genere florum, qui à nostris Zeytlosen & Herbsblumen appellantur.

Hermodactylon.

Iris agrestis.

Errat & Tragus qui putat esse Moly Homeri, quando scribit: Sunt qui putent Narcissum esse Theoph. lib. 6. cap. 6. & Virgilii lib. 4. Georg. inter quos est Philippus Melancthon in Syntaxi sua. Huic sententiæ subscribo quod ad florem attinet. At radix nec non folia huius plantæ, nobis à Dioscoride sub Colchico, Ephemerum, siue Bulbo agresti, comprehenduntur. Serapioni cap. 194. Surugem, Hermodactylum, Liliū sylvestre, & Achimeron, quod meo iudicio Ephemerum legi debebat. Serapio Hermodactylum venenum esse clamat, uti & Mesue, &c. Rursum cum Serapione, Mesue & Paulo Aegin. ingemino, ac constanter affirmo Colchicon quod Arabes, & Officinæ Her-

Her-

Hermodactylum dicunt venenum, nunquam in-
terd sumendum. Mesue Hermodactylum Homeri
Moly Germanis Pfaffenhoden & Nachtblumē/
Narcissus Poëtarum fabulis celebratus. Potest
fieri ut Dioscor. duobus in locis separatim hanc
plātam explicarit sub Colchico radicem & folia,
sub Narcisso florem. Hæc Tragus.

Ceterum, attestante Turnero, prudenter mo-
net Mithriol. non amplius Colchici radicibus
pro Hermodactylis esse utendum quem errorem
Serapio ac Mauritanii medici non animaduertē-
tes vel negligentes Dioscoridis monita ac con-
tra Galeni, Pauli, Nicandri & Plinii mentem per-
peram inuenerunt.

Castor. Dur. pag. 141. Colchicum, Bulbus agre-
stis pag. 142. falso Hermodactylus Pharmacop. in
pilulis ad Arthritidem, pro eo non ponant Col-
chici radices. Item pag. 169. Iris sylvestris *roz-
xirā* siue Ephemerum Arab. Zurungem. Mi-
ramur cur Castor eiusdem plantæ duo faciat ca-
pita & duas ponat figuras: videant etiam le-
ctores an postremo loco non confundat cum
Colchico; Ephemerum lethale.

Fallop. de purg. Hermodactyli radix, Arabibus
est radix Ephemeris Colchici. Hæc ille qui non
putat venenatum ut postea ostendetur. Non
probo eum non distinguere vulgatum Colchi-
cum, quod venenatum, ab officinarum Her-
modactylis.

Clusi. Hist. Colchicum vulgare Salnaticensib-
us, *Quia meriendas*, quibuidam etiam *Villo-
sa*.

In hist. pl. Lugd non bene ponitur Icon Col-
chici vulgaris sub titulo Colchici Orientalis Mat-
thioli, demendum igitur vocabulum Orientale,
nec placet quod illa statuit Colchici seu Ephe-
meri radicem medicamentis immixtam non esse
pernitiosam.

Colchicum, autore Thelio, passim in pratis.
Reperitur locis Septentrionalibus, prope Menbur-
gum, flore etiam candido.

Tabernacon. Colchicum masculinum, *Zeit-
losen männlein*. In Hist. Colchicum 8. Item Col-
chicum femininum *Zeitlosen weiblein*. In Hist.
Colchicum 9. Non demonstrat quæ in re differ-
rant, nec etiam figuræ multum sunt dissimi-
les.

Græcis *καρχῆρα* [Colchicum] & *ῥιζήνη* Diosc.
(Ephemerum) & *ῥιζήνη* quibuidam, *Bulbus
agrestis*. Germ. *Herbstblumen* *Zeitlosen* quibuf-
dam *wissen wild safran blumen* / *Nachtblumen* /
& *Bundshoden* / canis testiculi. Belg. *zintlosen*.
G. *Mort au Chien*, *Tue Chien*, *Montb. Des Violles*.
It. *Colchico*, *Zaffrano saluatico*. Angl. *wild
Safran*. Boh. *Ocum*. Hung. *Rosforchian* / quo
nomine alias etiam stirpes insigniunt.

Nodus iste flos quem Colchicon, seu ut Ossi-
cina (secundum Tragus) vocant, Hermodacty-
lus, Autumni tempore fundic, hiemis aduentan-
tis nos admonet. Quamquam verò exitu Aurū-
ni plerumque appareat: tamen non raro quoque
circa Festum S. Iacobi primum in deconsis pra-
tis, ac eo inde tempore usque ad finem Septem-
bris mensis spectatur. Folia autem post flores ge-
nerantur, qui primo statim Vere e terrâ erum-
punt. Semen in æstate Iunio potissimum mense
producitur: Nasceitur passim in omnibus pratis
Germaniæ. Prata humida (ut notat Gesner.) nus-
quam non abundant, Autumno florem Croci
prodit nudum, & nullis omnino foliis. Colchi-
cum Clusi omnibus Germaniæ & Vngariæ pra-
tis obuium. Colchicum siue Ephemerum lethale.
Tom. II.

le, Basileæ passim in pratis florens Septembri &
Octobri, Montpelii etiam prouenit. Genevæ
folia protrudit mense Aprili in pratis, Lugduni
abundat in monte Rossberg propè Masinunster
vidi florens Octobri. Montbelgardi passim floret
Septembri, & Octobri etiam in Horto Ill. E. C.
mense Februario: in pratis propè Montbelgar-
dum vidi aliquot plantas florentes.

Radix in cibo accepta, tradente Dioscor. ne-
cat per strangulationem, similiter ut Fungi. De-
scripsimus ipsam, ut ne quis fallatur & pro Bul-
bo edat. Præter opinionem enim imperitos illi-
cit, ob suauitatem. Auxiliantur his qui ederunt,
eadem quæ his qui Fungos superit. Lac item bu-
bulum potū. Quare si hoc addit, nullo alio opus
est auxilio. Et rursus inter Alexipharm. Qui
Ephemerum acceperunt, quod aliqui Colchi-
cum, aut Bulbum sylvestrem appellauerunt, eos
pruritus per totum corpus concomitatur, velut
a Scilla aut Vrtica excitatus. Internæ partes mor-
sum percipiunt, & stomachus cum multa gra-
uitate exasuat. Inualecente verò affectione, per
alium feruntur cruenta camentis amixtis. His
auxilium ferendum est, velut his qui Salamandrâ
hauserūt, & per vomitū, & per intus per Clyste-
rein. Antequam verò inualeseat Venenum dan-
dum est ipsis Quercus foliorum, aut glandium,
aut Malicorii, aut Serpylli decoctum cum lacte
bibendum: Aut Polygoni succus, aut Virgulto-
rum Viris, aut Rubi, aut Ferule teneræ me-
dullæ, aut baccarum Myrti succus cum vino. Sed
& ipsæ Myrti, baccæ, ruscæ, tritæ, & in aqua ma-
ceratæ, auxiliantur, si cremor ipsarum accipia-
tur. Facit similiter & Castanearum quæ Sardia-
næ glandes appellantur, pellicula media, cruda
cum aliquo ex relatis succis accepta. Origanum
item cum lixiuo potum. Exacte verò auxilium
sentiant, qui lac Asininum aut bubulum calidum
bibunt, & in ore tenent, ut hi quibus huius co-
pia est, alio nullo auxilio opus habeant. Hæc
Diosc. Eadem Paulus Aegin. de verbo ad verbū
lib. 5. cap. 47. Calidum & siccum nonnulli Col-
chicum in secundo ordine, seu à medio recessu
statuunt. Quamquam radix & flos huius plan-
tæ ad abigendos & ehecandos pediculos satis
conferant, tamen vltus eorum præsertim si interd
sumantur annuente Trago, minimè tutus existit,
ut quæ plius detrimenti quàm veritatis allatura
sint. Admonendi ergo mihi hoc loco sunt si quo-
rū interest pilulas pro podagricis præscribere &
conficere, ne suis confectionibus Colchicon, seu
Hermodactylum adhibere velint, quod hæc-
tenus magno cum errore commissum fuit. Cete-
rū articulatio morbo & podagra laborantibus
vtilis esse radicem Colchici Arabes scripsere,
quod & nos aliqua ex parte experti sumus, Ve-
rū tunc, cum forinsecus imponitur. Ferunt, le-
gitur apud Hist. Lugd. Turcas Colchici floribus,
vri cum inebriari volunt: eos enim vino mace-
rant, quo epoto adeo stupidi redduntur, ut in ec-
stasi abeant. Ad verrucas aut accipit N. L. Du-
cis Wirtemb. Medicus Colchicum [zeitlosen] iū-
dit, superligat, excidunt. Ad extirpandos verò
pediculos latos pudendorum contundit radices
Colchici, coquit cum aqua & locum affectum ea
abluit.

COLCHICVM ALBVM CVM PVRPV-
rascantibus Lineis.

Colchici picti radix, ut & aliorum bulbo-
ris in fusco nigricans, intus alba est, & ex Descriptis
iii

Vites, ver-
nenum &
remedia.

Aquilia
Lac.

Ephemer-
Colchicum
Bulbus
sylv.
Signa of-
fumpti Col-
chici.
Remedia

Cassanea
Sardina-
na gland-
pellicula.

Colchici flo-
res macti-
ant.

HISTORIAE PLANTARVM

illa parte (quod à nemine monitum est (vnde
florum canles erumpunt, in conum desinens , ad
quem in imo *bulbi* fibræ barbæ instar dependent:



Ex eo bulbo
caules nudi,
molles, splen-
dentes, candi-
di, striati, bini
vel terni pro-
deunt: in quo-
rum summo
totidem flores
(reliquis Col-
chicis figura
similes) can-
didi, purpura-
scentibus li-
neis, & macu-
lis eleganter
perserti: ho-
rum quilibet
foliola sex ha-
bet ad quo-
rum singulo-
rum princi-
pium, singula

adnata flamina, vt in Tulipis, cræceo puluere as-
persis. Semen sequente anno in vesicariis trian-
gularibus Valuulis fere fuscum, subrotundum, &
ex parte angulosum. Iunio mense maturum.
Iuuenimus in Heluetia in conuallibus ad radi-
cem montis Wasserfal & in hortum transtulim-
us Mense Septembri anno 1598.

Colchico vulgari similes bulbi.

Paucos colchici bulbos, vulgaribus bulbis valde
similes Neapoli Francofurtum ad me (ait Clus.
hist. post.) mittebat Ferdinandus Imper. qui mi-
hi Lugduni Batavorum demum flores dederunt,
vulgaris floribus non dissimiles, hoc est, vel dilute
vel saturate purpureos. Ex illis tamen, binos ha-
bui bulbos, quorum singuli quaternos aut quin-
os flores protulerunt anno 1598. & cum inse-
quente, non adeo altè allurgentes vt in vulgari,
sed breuiore, quorumque folia luci opposita
stellatim distincta apparebant, perinde
ac in dilutiore Fritillariæ flore: semen etiam
abundè præbet id genus, sed in minoribus
breuioribusque capitibus quàm vulgare.
Francofurti ex Italia accipiebam semen vulgari
Colchici semini par cum suo laxo capitulo, her-
modactyli Syriaci appellatione, quod terræ cre-
ditum necdum germinauerat quum inde disce-
derem.

COLCHICVM BIFLORVM.

Descriptio

NOuum & rarum Colchici genus est cuius
cognitionem acceptam fere Clusius Doctiss.
viro Moyli Quadrato qui monebat Verno tem-
pore sibi obseruatum in montano quodam pra-
to, non procul Heydelbergâ, vbi tum domicilium
habebat: edodum tamen antè, similem inueni-
ri plantam, ex Epit. de Plant. C.V. Ioachimi Ca-
merarii inclitæ Reipub. Noribergem. primarii
Medici. Io. Mulerus Pharm. Francofurtensis et-
iam assererat, sibi adolescenti conspectum in
pratib. Walz Sueuorum vicinis nouo Vere florens.
Perinde aurem crasso id constar *bulbo* ac vul-
gare Colchicum, ex cuius infimâ parte *colis* emer-
git quatuor uncias longus, ex membranaceo

involucro *florem* promens oblongo pediculo ni-
tentem, vulgaris flori formâ æqualem, sex foliis
constantem, sed minorem, quorum terna exter-
na maiuscula,



interna autè
tria angustio-
ra & breuio-
ra, saturatiùs
paulò purpu-
rascentia esse
videbatur: nec
filiâ, nec se-
men [si quod
tulit] obser-
uare licuit
Clusio per
morbum.

Lobel. Ani-
mad. part. 2.
Colchicū bi-
florum vulga-
ri simile, sa-
turiore flore
Clusii & Ca-
merarii. Con-
siderandum

an hoc Colchicum biflorum non sit idem cum
Camerarii verno, licet aliam iconem proponat
Clusius.

COLCHICVM VERNVM CLVSII.



Quadrage-
simo pri-
mo capite l.2.
meæ Ratio-
rum plant. his-
toriz, inquit
Clus. Exot. p.2.
Appèd. 2. Col-
chici verno
tempore flo-
rem profere-
tis mentio-
nem faciebâ,
quod tandem
biflorum esse
existimassem:
quia nouo Ve-
re cum suo
flore acceperû,
deinde Autu-
mno cum aliis
colchici gene-

ribus florem conspexissem. Quum autem non ni-
si Autumnno flores gestare postea obseruarem, istâ
appellatione illi conuenire non sum arbitratu-
sed præter naturam insolito tempore primum il-
lum florem tulisse sensiebam, vt in aliis plantis
interdum contingere videmus.

Verumtamen peculiare Colchici genus repe-
riri, quod nouo duntaxat Vere, cum Croci verni
& dentis Canini generibus, non autem alio tem-
pore flores gerat. Doctiss. vir Io. Vernerius
anno à Christi natiuitate 1601. Iulio mense ad me
scribebat, & sex eius bulbos miscebat, quos illo
ipso anno à monte Sorou in Hispania eruerat. Ho-
rû quatuor insequente Vere apud me flores tuler-
unt: vnus florentis, atque alterius cû suo capite
trigono semen continere iconem in subiecta
tabella

Colchicum
Neapoli.

Hermoda-
ctyli Sy-
riaci.

Descriptio

tabella exprimendam curabam. Non porro Vere cum Dente canino, Crocoque verno, ut dicebam, hoc Colchici genus prodire, & vnum aut alterum florem vna cum foliis producere solet. primis quidem diebus, antequam sese explicare & pandere incipiat, coloris albi, sed qui paullo post in purpureum dilutiorem mutetur, breui pediculo subnixum, sex foliis constantem, minoribus & angustioribus quam in vulgaris flore, & Croci verni albo flori formam valde similem, singulis foliis ex infima sede album *stamen* proferentibus, cuius apex flauus: exteriorum trium foliorum stamina interiorum staminibus sunt breuiora: e medio floris umbilico oblongiutculus exilit *stylus*, staminum longitudo, superans, albus, in tres partes summo diuisus. Nascebatur vero flos ille interterna folia catinata sese mutuo complementa, Colchici vulgaris foliis longe angustiora, montani tamen Hist. foliis paulo latiora: flori succedebat triagulum, membranaceum caputulum haud magnum, *semen* continens rotundum, subrufum: *radix* Colchici vulgaris radici siue bulbo, formam quidem similis erat, & fusca pelle obducta, sed longe minor, multas candidas fibras ex infima sede protuberante spargens. Plures similes bulbos anno insequente cum aliquot aliis elegantibus plantis ad me mittebat idem Venerius atque ad Hogelandium & Porrerum: sed meos cum iis qui prius missi, & plurimis aliis lectissimis plantis subsequens hiems corrumpebat: ut plerumque Cannensem cladem meus hortulus illa hieme acceperit, tamen etiam non vulgarem duabus precedentibus passus esset.

COLCHICVM VERNVM CAMERARIJ.

Descriptio



Colchicum Vere florens, cuius flore mense Aprili nonnunquam inuenit Camer. in Epit. Matthiol. prodeuntem ex foliis breuiutculis, ternis, herbaceis, quibus antequam emergat inuoluitur. Flos ipse obsoletiore colore purpurascit, quam qui Autumno prodit, apices

paruos luteos habet, & totus etiam minor strigosiisque apparet.

Gesner. annotauit apud Camer. horti, Colchicum subobscurum flore praeter altero & minore crescere circa Tigurum in Heluetia Aprilis initio, cum alia omnia in Autumno floreant.

Considerandum, an Colchicum vernum non sit idem cum colchico bifloro Clusii, vel eius verno, quamuis Icones differant.

Colchicum Polyanthes siue multiflorum purpureum.

Nihil a vulgarissimo Colchico differre videtur, praeterquam florum abundantiam: denos enim, duodecos, & plures purpureos dilutiores Septembri profert flores, quemadmodum Colchici

Tom. II.

Pannonicum polyanthes candidos eodem tempore. In Cameracensi deuexo agro, miliari paruo ab vrbe, in villa Nierui vocata, quo loco D. I. Fraqueville collegit. Perperam Pseudobotanici nuperi nugivenduli Colchicum purpureum Austriacum dixere, Lobel. Adu. par. 2.

COLCHICVM POLYANTHES CANDIDUM eleganti rubore varium.

In delitiis est (inquit Lobel. Adu. par. 2.) perlebens Colchici genus in Belgio, etiamque Londini in horto plantarum exoticarum ditissimo D. I. de Fraqueville, ob floris amoenitatem quinque vtr plurimum foliis latiusculis praediti, nonnullis candidis omnino, aliis vero rubore diluto prorsus tinctis, aliis candore & rubore hilariter secundum folii longitudinem dimidiatim distinctis, aliis denique mediolineis albis striatis. Quos flores edidit congestos, quorum v-

nus quatuor tantum foliis constabat, quam aliorum latioribus: totidem item staminibus luteis praeditus: at ceteri omnes quibus donati fuerunt. Folia latiora vere erumpunt, cubitalis longitudinis altiorisque, haud minus neque *semen*, neque folliculos, iam octauo anno edidit. Bulbus Colchico Pannonico albo maior.



COLCHICVM POLYANTHES ALBUM.



Sic describit Clus. Pann. & Hist. post. Colchicum, multiflorum albo flore. Multorum florum est, quod in quibusdam pratis Viennae Austriae vicinis, nec procul a Danubio sitis, inter vulgares plantas nascens ante multos annos observabam, ut in hortulum transferrem, deinde in pratis arce Starent-

berg Magnif. Dn. de Meusenstein vicinis, magna copia inuentum est. Septenos enim, denos, aut duodenos, vel etiam plures interdum promit flores lactei candoris, eleganti spectaculo: huius etiam folia, vulgaris Colchici foliis æqualia, sed dilutius virentia, inuente duntaxat Vere exeunt: copiosum fert semen subrufum in laxis triangularibus capitibus: radix, vulgari bulbo maior, ad Secunditamen, siue insequentis, amplitudinem non accedens. Istic & pauci bulbi reperti, quorum flores eleganter rubebant.

Colchicum rubro flore.

Camer. epit. Math. Colchicon polyanthion flores albos proferens. Item horri, Colchicum Pannonicum polyanthum flore albo: quamuis in Germania quoque interdum flore albo reperitur, sed non ita referto in vna planta. Plant. le. p. 144. Colchicum candidum Pannonicum polyanthion Clusii. Teut. 177.

Locus & tempus

Colchicum simile Anglico flore albo, Autumno pratis quibusdam Viennæ Pannoniæ vicinis, non procul à Danubio eruit Clus. Hist. p. 144. radices magnis, quæ nonnquam senos aut octonos flores simul protulissent.

Tabernæcon. Colchicum Polyanthos: & Hist. par. 2. p. 311. Colchicum 4. Item p. 520. Colchicum album Pannonicum Vngerisch zeitsosen. Hist. Colchicum 7. Ponendæ erant eius duæ icones sub vno titulo & in eadem pagina, vna enim monstrat florem sine foliis, altera folia cum trunculo sine floribus: nec numero distinguendæ erant.

Tabern.

Hunc Bulbum charissimus F. C. Bauhinus misit Basileâ, vegetum admodum mense Augusto ann. 1608. qui terræ commissus, floruit in horto E. C. W. Montbelgardi Septembri.

COLCHICVM CANDIDO flore Anglicum.

Descriptio



Istud nupiam Herbariis memoratum, quia Anglia copiosissimum sponte fundit, nec alibi facile reperias, Anglicum nuncupauimus. Perpulchra planta, lacteis floribus Ornithogali vel Asphodeli maioribus, Croci montani Syluestris paribus, cæcis seliquipalmatis: radix & folia,

alioqui pratensis vulgaris sunt: ea tamen foris fulca, intus candida. Londini hortis merse radices Hyemem ferunt. Vere emergunt, non secus ac in collibus & montosis prope Bristoliam &c. Aduers. Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 144. Colchicum candido flore Anglicum. An Moly Homericum radice nocua.

Moly Homericum. Lobel.

Considerandum an Lob. verè dicat Colchicum Anglicum candidum, nusquam memoratum, & an differat à Cordi candido, de quo multis annis

antè scripsit in sua hist. his verbis: Colchicum album floribus, foliis, semine, & radice Colchico nigro & subrubenti simile est, qualitate tantum ab illis differt: siquidem radix etiam cum siccata fuerit foris albicat, quanquam interdum flauescat cum inueterascit, intus verò candidissima, tenera, in tundendo mitis, mollis & tractabilis existit, quæ tusa farinam triticeam aspectu refert. Saporem habet dulcem & valde suauem, nulla amaritudine mixtum, spontè in Germania nascentem nondum vidi, sed cultam tantum, & è longinquis allatam lucis.

Candidum Cordi.

Verisimile est (inquit Dodon. purg. hist. & in fol.) albidum huius peregrini Colchici radices esse, quæ in Officinis Hermodactyli nomine veneunt: qui non propriè Colchicum dicitur. Monendi lectores ne considerato solo colore floris Colchici sibi temerè persuadeant vel non venenatum, vel eundem cum Hermodactylo Officinarum: Anguillara & Lobel. volunt Hermodactylos officin. alterius differentis plantæ esse radices, nempe Colchici Illyrici.

Dodon. ref.

Clus. Colchicum Polyanthemo Pann. affine, siue Anglicum albo flore.

Tabernæcon. & Hist. Colchicum album Anglicum. Item Colchicum album Germanicum. Duas icones habet Tabern. verum non demonstrat qua in re differant plantæ.

Thalio in Hærcyn. Colchicum flore candido quod propè Ilfenburgum reperitur. An Camer. hort. Colchicum flore albo, quod in Germania interdum inuenitur: Hist. Lugd. Lobelii Colchicum flore candido Anglicum.

Colchici albi nomine missum Heidelbergâ semen paruum, magnitudine ferè simile Papaueris Corniculati, non omnino rotundum, penè cinereum: seui Montbelgardi in Horto Ill. E. C. An idem fuerit cum præcedenti dubii hæremus.

Locus & tempus.

Colchicum pratense Salmaticum.

Colchicum pratense Salmaticum vulgari minus Salmaticenti agro obseruabat Clusius in altioribus pratis: dilutioris flore, atque in nonnullis plantis, lactei omnino candoris, inuente Vere folia duntaxat proferens. Hist. Lugd. Colchicum vulgari minus, flore omnino lacteo Clusii in pratis Salmantinis.

COLCHICVM PLENO FLORE



Legans est Colchici genus, quod apud Belgas inuenitur, cuius quidem cognitionem acceptam fero (inquit Clusius) Ill. Comiti Arembergio. Is Autumno 1595 bulbum ad me mittebat, ut florem conspicerem possem: sed cum nullum protulisset insequentem Nouembri iconem egregie expressam addidit. Flos vulgari colore persi-

Descriptio

perfoliis est, sed pluribus foliis constans, nempe vicenis aut pluribus, valde confertis, quorum sex externa reliquis maiora, vulgaris tamen foliis angustiora, inter quae *stamina*, ut in vulgari, flauis apicibus praedita. Ex alimenti copia plenum florem rutilum existimabam in iusto, quemadmodum natura interdum ludere solet in aliis floribus qui deinde ad ingenium redeunt: sed ipse Comes affirmabat, cum etiam Io. Boissot, singulis annis plenos flores id Colchici genus proferre, eoque plures, maiores, & maiore foliorum numero constantes quod bulbus maior & veracior est.

Originem ex Germania ducere aiunt, & primum in Belgium allatum à Rhizotomo, cuius nomen Nicolaus, qui frequenter à Belgio in Germaniam à Nobilibus quibusdam matronis ablegaretur. Huius autem Colchici plenos flores anno 1599. observabam esse versicolores & folia habere coloribus similibus distincta, quibus Colchici versicoloris alterius flores distincti sunt, hoc est, ex albo & dilutius purpurascens mixtos. Colchicum pleno flore Antuerpiam Londinum (Lobel. Adv. par. 1.) misit Clariss. vir D. Alvarus Nunnus summus Philos. & Med. parum à vulgari Colchico, nec nisi concoloris floris multiplicabili incremento diffidet. Surreptus fuit eius bulbus cum aliis plantis Nobiliss. Baronis Zouche.

COLCHICVM BYZANTINVM latifolium Polyanthes.

Descriptio



Colchicum Byzantinum, quod nunc vere germinat, terna, aut quaterna producit folia amplissima, Elebori albi foliis nec formâ, nec magnitudine valde absumilia, nec illis minus nervosa, magis tamen viridia, & sese mutuo amplectentia. Autumno cum vulgari numerosos fert flores, ut vicenos aliquando ob-

servare meminerim [ait Clusius Hist. post.] ex eodem bulbo prodeuntes, vulgaris quidem floribus forma & colore propè similes sed ampliores, crassioresque pediculo subnixos, foris dilutius, interne saturatius purpurascētes, & tanquā venis quibusdam per folia sparsis notatos. In quibus *stamina* ut in vulgari: satis copiosum semen fert interdum in triangulis laxis brevibusq; capitulis siue folliculis, triplo crassius vulgari: eius radix crassissima, pugnum æquans vel etiam amplior.

Constantinopoli singulares eius bulbi bis sunt allati dum Viennæ vivebam: Gen. D. de Heusen-stein, à qua prolem accipiebam.

Tom. II.

Colchicum Lusitanicum purpurei cum albo mixti coloris.

Cum Byzantini flore quandam affinitatem, autore Clusio, habere videtur flos eius Colchici, quod Theod. Clusius à Lusitania acceperat: nam sex etiam foliis constat, purpurei cum albo mixti coloris & velut stellatus [ut in Fritillariæ flore] dispositi, floridioris tamen: umbilicum etiam occupant sex alba *stamina*, flauis apicibus praedita, & medius *stilus* in staminula diuisus, purpurascens supremâ parte coloris: odor aut nullus, aut valde obscurus. Floret cum reliquis Colchicis.

Colchicum Lusitanicum serotinum flore albido cum tantillo rubore.

Bulbum adnatum sibi annexum habet, inquit Lobel. Obs. flos albidus, nitidus, tantillo summis foliis rubore confusus: alioqui perfoliis effigie & magnitudine vulgato nostro Colchico, quale Liex Brabantorum floruit Septembri & Octobri in apertissimo horto Mariæ de Brimeu.

Colchicum latifolium Boissoti.

Quantum genus à Boissoto accipiebam (pergit Clus. Hist. post.) crasso etiam Bulbo, quod terre commissum non modo non floruit, sed prorsus perit. Scribebat autem eius florem purpurei coloris esse, qui procul aspicientibus vulgari par appareret, at diligentius observantibus, coloris ex albo & purpureo distincti videbatur, satis ad Fritillariæ colorem accedens: folia item habere ampla, ad terram inclinata. Postea tamen, conspecto Colchici Byzantini, cuius bulbum ad ipsum mittebam, flore, diuisum à meo latifolio, suum Colchicum esse monebat. Forsitan verò idem genus erit, cum Lusitanico Clusii.

COLCHICVM ΠΟΙΚΙΛΑΝΘΕΣ siue versicolore flore.



Colchici Poikilanthos siue tertium genus [inquit Clus. H. post.] habeo munere Generosi Dn. de Heusen-stein, quæ in cultissimum suum horto suburbano ad Viennam urbem, binos aut ternos alebat, quos unde adquisivisset, ignorare se affirmabat. Non minus est crasso id bulbo, quam Primū, vel etiā crassiore: Octo-

bri, paullo serius quàm superiora, binos, ternos, aut quaternos, producit flores, vulgari breviores, & breui pediculo innixos, ut vix supra tellurem attollantur, quorum interiora tria folia ex pur-

111 3

purâ quodâmodo rubent, aut Hispanici montani floribus concoloria sunt, ut plurimum, exteriora autem tria vel omnino lactei candoris sunt, vel internè mediâ ex parte purpurea, aut crassioribus purpureis venis radiatim distincta, vel purpureis maculis aspersa, omnia verò mucrone magis orbiculato & obtuso quàm in vulgari: huius folia incunte Vere germinantia, ex viridi purpurascunt, deinde explicata saturius virent vulgariis foliis. Semel duntaxat eius semen legere memini, prioris semine minus.

Colchicum montanum alterum.

Aliud (inquit Clusius) Colchici versicolore flore genus accipiebam ab honesto viro Theodor. Coornhart anno 1599. quod bulbo, & foliis, cum vulgari prorsus conveniebat, & perinde aliè asurgebat, flores proferens vulgariis floribus formâ quidem similes, sed diverso colore, ex albo videlicet & purpurascete vario, dissimili tamen à præcedente, quia in hoc colores magis permixti, & purpurascens dilutior: binos vel ternos tulit flores, quibus successerunt longa, crassa, & trigona capita, vulgariis capitibus non dissimilia semen etiam simile continentia. Florebat cum vulgari, paulò maturius præcedente.

COLCHICVM MONTANVM flore purpureo.

Descriptio



TERNA, aut quaternaria sunt folia, digitalis longitudinis, carinata, firma, humitamen sparsa, saturatius virentia & splendens, vix semunciam lata, acidigustus, rufescentem colorem contrahentia dum tabescere incipiunt: stas sine foliis primùm exilit Septembri aliquando etiam Augu-

sto, sex longis, angustis, & ex purpura rubentibus foliis, totidem medio staminibus constans: hunc statim (præter aliorum Colchici generum morem) folia subsequuntur, & totam deinde hiemem perdurant, usque in Mensem Maium, vel etiam Iunium: radix bulbosa, non magna, multis ex rufo nigricantibus tunicis amicta, intus alba, solida, & cum quadam adstrictione dulcis, longiusculâ sede, quali in cæteris generibus, & adnatis in lateribus se propagans. Et sic descripsit Clusius, qui passim tum in Hispania, tum in Hispania, postea Colchicum montanum Hispanicum, siue quintum λευκόμυλον, aut tenuifolium, Salmaricensibus Merenderas vocatum, appellat.

Colchicum minus semine prægnans. Item

Colchicum minus florescens, Colchicum montanum Clusii: Cuius minorem speciem, olim latissimis pratensibus pascuis ad montis Lupi Norbonensis radices, ad diuersorium publicum, via qua Gangen vrbeulam itur, collegimus (inquit Lobel. obs.) Septembri flosculus stellatus croceus, aut Colchici vulgaris purpureo-ceruleus erumpit, sed minor. Idem esse audio cum Colchico montano Clusii nostri, quod olim seuerat in horto Cl. D. Brancionis pro Erythronæo, foliis croceis, angustioribus, in cauliculo vix palmum æquante, & interdum etiam maiore. Semen subrotundum, Colchici vulgaris, in siliqua triquetra. Icon. pl. p. 145. Colchicum minus semine prægnans Lobel. 70. Teur. 178. Item Colchicum minus florescens siue Colchicum Clusii Teur. 178. Obseruandum apud Plantinum in hoc Colchico simul, transpositum, figuræ autem sunt ex Clusio.

Hist. Lugd. Colchicum montanum Clusii, & Colchicum montanum minus Clusii.

Tabern. icon. p. 611. Colchicum montanum Clusii & Hist. Colchicum 10. Bergz. in fosen. Item p. 612. Colchicum minus Flein zeulosen: & Hist. Colchicum. 11. Ineptè Compiler ex vna planta duas facit.

An Camer. hort. Colchicum paruum Hispanicum.

Collibus Salmanticæ vicinis, solo valde lapidoso primùm eruebat, inquit Clusius, cum suo caule, dodrantali, firmo, & triangulari capite, in quo semen ex rubro nigrescens, siue fuscum, læue, exiguum, subrotundum Maio mense, anno 1564. Apud Belgas, apud quos, semine quod natali loco collegeram, natum est, nullum adhuc semen dedisse intelligo. Viennæ autem Austria, quoties ex meis stirpibus semen colligi, capite inclusum vix terrâ interdum emergente, & inter folia iam languida latente, aliquando digitali & palmari cauliculo innitente, vti etiam Francofurti ad Moenum, & Lugduni Batavorum.

COLCHICVM MONTANVM minus versicolore flore.



alba, exteriora media ex parte viridia, alterâ carnei quodâmodo coloris.

Colchicum montanum minus versicolore flore (vult Clus. post. hist.) Hispanico non multum est abimile, quod Jac. Plateau in suo horto Tornaci alere ad me scribebat, cum foliis, cum bulbo: flores autem differte, quorum omnia quidem folia longa & angusta etiam essent, interiora verò tota

COL-

COLCHICVM MINIMVM TENVIFO-
lium Gallæcium

Purp.

Nouum Colchici pumili genus (inquit Lob. Adu. par. 2.) alimus in horto operâ le Quelt rhizotomi Lucetiani ex Hispaniæ regionû Gallæcia delatum, foliis Croci montani minoribus, humi sparsis, binis, ternis, quaternis aut quinis, carinatis, vncias binas, aut sesquiunciam longis (mihi folia duo solum dedit.) Radice Colchici, Auellanz paruz nucleum æquante: flore vna cum foliis prodeunte, senis constante foliolis angustioribus, purpurantibus: totidemque stami-



nulis, & apiculis luteis præditis, è breui pediculo parum è terra emergente. Floruit nobis Anno 1493. Hoc etiam alitur in hortis Londinensibus, exoticis plantis ditissimis D. Coys, & D. I. Natlsmit Bocanici Regii primarii & Chirurgi.

HERMODACTYLI VETERIBVS.

CAP. VIII.

Purp.

Quod magno & pernicioso errore Serapio Colchicum & Hermodactylum confuderit, describens hunc iisdem planè verbis, quibus Dioscor. Colchicum, confirmat Paulus Aegin. l. 7. de Ephemero & Hermodactylis seorsum, tanquam de diuersis, tractans, ac quidem de Hermodactylo. Hermodactyli radix (inquit) & per se, & ipsius decoctum vim habet purgandi: priuatim etiam arthriticis nunc quum humores defluunt exhibetur: verum stomacho nimis quam aduersatur. Quidam verò in ipsis exacerbationibus, in omnibus arthriticis purgatione ex Hermodactylo vtuntur, verum attendendum est, quia stomacho incommodus est Hermodactylus & anxios ac ciborum inappetentes facit. In solis igitur his qui negotiis quæ differri non possunt vtuntur, ipso vtendum est, Compendio enim & post duos vt plurimum dies sedat fluxionem, vt quis ad consuetas functiones obeundas transire possit. Noui autem quendam qui non ipsam Hermodactyli substantiam exhibet, neque aliquod medicamentum ex ipso compositum, sed herbâ ipsam coquit, cum aliquo ex consuetis pharmacis, velut Aniso, aut Apio, & decoctum bibendum præbet. Et mirum est quomodo per Ventrem euacuatî à fluxione liberantur. Oportet autem præterea quod stomacho incommodus est, velut dixi, postea stomacho gratis, & corroborantibus, cum moderata caliditate, osculum ventris corri-

gere. Ceterum Alexander purgationem ex Coronopodio, meliorem esse dicit ea quæ sit ex hermodactylo, vt quæ eandem euacuationem & doloris sedationem efficiat cum hoc, nec stomacho incommoda sit. Hæc Pauli.

Aduarius lib. 5. Meth. Med. cap. 6. de antidot. compositionem habet, quam vocat ex hermodactylo, podagricis & arthriticis, vt quæ succos crudos ex alto detrahât, proficuum: Recipitque hermodactyli, Galangæ, Pyrethri, Zingiberis, Zaduatis, Anili, Gentianæ, Aristolochiæ, singulorum quadrantem, inellis sufficiens modum.

Inter alias quamplurimas compositiones purgantes, quas hic enumerare & longum & tediosum foret, Nicolaus Myrepsus in aurea Alexandrina recipit Hermodactylum rubrum & album. Quæ quidem compositio non instituitur ad purgationem.

De hermodactylo hæc Mesues lib. 2. cap. 6. de purg. hermodactylus est radix herbæ cuiusdam montanæ: & ea vel digitum longa, vel rotunda, ac eadem præstantior, si multum est alba, intus & foris, magna, mediocriter dura: alter Scillæ aut Raphano proxima, si creuit, si Vere lecta est, & menses deinde sex siccata est. Rubra autem & nigra mala est, & quæ in loco pingui & humido provenit, quod inde humor eius inflans, & excrementosus ei largior insit. Rara verò, laxa, & leuis est imbecillior. Calidus est ac siccus ordinis secundi initio, cum humiditate tamen excrementosa, flatulenta, nauseabunda, quæ ventriculo nocet, præsertim quando in eum ex partibus aliis excrementa confluunt, Pituitam crassam præsertim à iuncturis trahit, ob id podagræ, & aliis arthritidis differentiis confert, non sumptus modò, sed etiam Cataplasmate ad morus, præsertim cum vitellis ouorum, & farina hordei, vel mica panis. Inpinguat, sperma auget, viceribus confert, quia terget sordem eorum, & carnem in his putrem consumit. Cuminum, Zingiber, Piper longum, Libysticum, Mentastrum, Mastiche, mista, hermodactylum prohibent, ne suo humore excrementoso, & flatulento lædat ventriculum, neue status crassos & nauseabundos, in eo exciter, aut multa in ipso excrementa colligat. Si verò hermodactylus cum paucis Zingibere, & succo Raphani, vel cum Scillâ assata, aut Scillæ succo & Zingibere, & spica in trochiscos singatur, purgat celerius & plenius (per se enim tardè & imbecilliter vacuat.) Myrobalani quoque roborando stomachum hermodactylos cuiò deturbât, & humorum in ventriculum affluxum prohibent. Datur ab aureo vno ad aureos duos: annos tres seruatur.

Ceterum hermodactylus radice oblonga, Neotoricorum est Tagaultio Ephemerum Diosc. Galeni & Pauli, vt indicatur sub titulo Colchici vulgaris. De hoc autem quod à multis dicitur & censetur hermodactylus, sub suo titulo.

Existimat quoque Dodonæus hermodactylos Officin. esse Colchicum flore albo Cordi. Anguill. contrâ & Lobelio hermodactyli officin. sunt radices Colchici Illyrici luteo siue flauo flore.

Bruns. tenet hermodactylum Narcissum esse Gerin. Hornungoblum.

hermodactylus Mesuz quibusdam est Pseudohermmodactylus, qui aliis Satyrium Erythronium censetur.

hermodactylus (inquit Tragus) mihi dicebatur Cyclamini parua species, sed falsò.

hermodactylo tandem non venenato conge-

Coronop.

noluer.

Hermod. ruber & album & col.

Herba n. longa & rotunda: alba præstantior. Scilla aut Raphano similis Rubra & nigra mala.

Ceterum

Purgatio.

Diosc. Hermodactyli & quiuocationes & substituit Ephemerum veterib. Colchicum vulgare. Colchicum flore albo. Colchicum Illyricum flauo flore. Lencornus bulbosus Theop. Satyrium Erythronium quorundam Cyclamen. Itri bulbosum.

ner Lobelio, videtur Iris bulbosa latifolia hispanica Clusii.

Pro msa.

Matth. suum Hermodactylum habet de quo cap. de Iride tuberosa, qui non placet Lobel. & Dodonzo, nec nobis.

Palma Christi sine Orchis palmata.

Hermodactyli albi & rubri [Lob. Adh.] Nicolai, Actuarii & aliorum, non Cathartici, sed Cordi, Venerique amici: an sint Behen album & rubrum eadem? Vocem Hermodactyli æquiuocam fuisse, & Ephemerio Diosc. comparari potuisse, non modo caput Pentaphylli indicat [ut cuius radix Hermodactylus sit vocata, non tam similitudine, quam superstitione & incantatoria expiatione,] sed etiam quæ extant apud Actuarium & Nicolaum celebres admodum compositiones arguunt. Quippe Aurea Alexandrina illa & Diamoschum Hermodactylo rubro & albo non carent, misceturque aliis apud Arabes compositionibus cordialibus, &c.

Hermodactyle Suda dactyla.

Hermodactylum ad verbum interpretantur Mercurii digitum (interpretatur autem est Tagault.) quod digitorum forsitan imaginem quandam exhibeat, quo nomine etiam Pentaphyllon Dioscorides appellauit. Vnde factum est, ut plures Pentaphyllon, Hermodactylon, esse arbitrarentur. Verum Pentaphylli radix tantum à nostris hermodactylis vocatis differt, quantum lux distat à tenebris.

Fuchs. vir sua ætate celebris in Nic. Myr. In auream Alexandrinam Hermodactyli rubri & albi &c. Per hermodactylos hoc loco & alias etiam Nicolaus intelligit radices, quas Officina hodie vocant Behen album & rubeum, Quod etiam facit Actuarius. Idem in antid. Eldæ putat per hermodactylum intelligi Been. Et lib. i. c. 3. Actuarius certe, ut ex compositione Antidoti Diamoschi Sole Meridiano clarius conspicitur, & Nicolaus Myrepsus multis in locis Behen album & purpureum, nominant hermodactylum candidum & purpureum, forsitan quod digitorum quandam imaginem radix illa exhibeat. In antidot. Actuarii & Moscho nullam mentionem hermodactyli inuenio, ut dixit Fuchsius, habet enim Antidotum propriam ex hermodactylo, in qua non videtur loqui de Been, cum dicat eam antidotum ex alto derrahere. Idem Fuchsius de com. med. l. i. c. 94. hermodactylus Mesue radice digitali, est Behen.

Fuchs. ner.

Been.

Quæ autem radix nobis hodie [inquit Matthiol.] Hermodactylus dici possit, difficile quidem fuerit discernere, quod ex probatis rei herbariæ Scriptoribus hactenus neminem inuenirim, qui notis vllis eius tradiderit historiam. Verum tamen si ex vocabuli etymo conicere licet, nil aliud significare videtur hermodactylus, quam digitum hermetis. Vnde factum est, ut aliquando cogitauerim, an illa bulbacea radix, quæ manus humanæ formam refert, quamque vulgò Christi palmam appellant, ad hermodactylum accedere posset quodque sumpta non modo vomitiones, sed & alium cieat, ut testis est Nicolaus Florentinus, qui hac radice, pluribus factis vomitionibus, Biliorum quandam quaternarium curauit. hæc in medium proferre libuit, non quod ita esse certo asserere aulam, sed ut rei herbariæ studiosis res hæc melius æstimanda proponeretur.

Been.

Tormentilla.

Palmas.

Gesner. epist. l. 2. ad Occonem. Pro Been albo & rubro, si tormentillam ponitis, cur non relinquitis, quod ex maritimis tractibus adfertur Been rubri nomine: id enim à tormentilla colore, &

dore, sapore & nihil differt: à pallinacæ autem radice, quam been albo substituitis, totò genere differt tum forma, tum viribus. Ego pharmacopolis nostris ut vel radices, vel flores albos & rubros, Saccharo præstitim conditos, pro Been substituant consulo. Verum quidem, utrumque facile haberetur à Syria: est enim quod Allabe Barbari vocat Auicenna. Quæ radix, inquit Bellunenſis, similis est Rhaphano paruo, oblongo, aliqui hermodactylorum speciem quidam esse dicunt, & appellari apud Arabes etiam *Buziden*. Sic ille. Actuarius etiam pro Been, modo hermodactylum album & rubrum: modo Helenium album & rubrum scribit.

Diosc. [inquit Tragus] nullius meminit in scriptis suis hermodactyli, præterquam in Pentaphyllo, quod alias Tormentillam vocant.

Syluius in antid. pro Hermodactylo in doloribus iuncturarum substituit folia Anchuse & dimidium Bdellii. Quod idem Placot. facit.

Norat Castor Dur. quod in pilulis aduersus arthritidem pro hermodactylis, Pharmacopœi non ponunt Colchici radices, sed pro succedaneo videntur Centaurio minore.

Radix Hermodactyli habet virtutem laxatiuam, & similiter aqua in qua bulliit, datur autem propriè in doloribus iuncturarum, in tempore fluxus humorum ad eas, verum ipse est malus stomacho. Confert dolori Podagræ, & est laudabilis finis operationis eius, verum nimius vſus eius facit putriscari musculos. Confert tamen iuncturis multum. Surgen albus augmentum efficit in spermate. Albus est bonus podagræ, sed rubeus occidit, & non est frigidus nimis, ita quod narcotizet, quasi hoc esset, non esset laxatiuus. Hermodactylus est calidus in primo gradu. Rubeus occidit, & albus confert podagræ, & desiccet vlcera antiqua, & abstergit ea, & est frigidus & siccus in secundo. Si Hermodactylus esset calidus, mordiceret vlcera. Hermodactylus est calidus, multæ caliditatis. Est calidus & siccus in principio secundi gradus, & habet proprietatem sedandi dolorem iuncturarum & Podagræ, & confert variolis, & melior ex eo est ille qui est interius & exterius albus, & quando frangitur, est contractio eius facilis, & non dura. Niger verò & rubellus sunt ambo interficientes. Errauerunt autem qui putauerunt quod ipse sit Lagia agrestis quæ deferretur ab Africa, nam illa Lagia impinguat mulieres, quando bibunt eam, & humectat corpora sicca, & augmentum efficit in carne, & facit rubere faciem colore bono, quando datur in potu cum Sanchi, est calida, caliditate forti, & commouet sanguinem, & acuit eum multum, & fortassis inducet potanti se dolores calidos, adustiuos, & infert nocumentum magnum, & ægritudines sicut Erisipelam in capite & facie, & in membris aliis corporis. Hæc dicunt apud Serapionem varii, qui etiam de Hermodactyli temperamento & facultatibus contraria videntur statuere.

Niger & ruber.


COLCHICVM MINVS MALIGNVM. siue Hermodactylus Officinarum.

Officinarum Hermodactyli, radices referunt nostri Colchici, sed quantumuis inueterati extento sunt cortice minimèque rugoso, fusco, compressa Castaneæ figura, in turbinem fastigiata: imò parte fibrarum vestigiis apparentibus,

Descriptio

vnde

vnde ad macronem per longum insculptus cer-



nitur canali-
culus. Substā-
tia solida in
qua nullum
vel vestigium
fibræ villis
apparet, faci-
le in pollinem
teritur, sub-
dulcem, em-
plastica pulti-
cula linguam
emollientem.

Ruellius
existimans
hermodacty-
los officina-
rum esse Col-
chicum, vene-
num putat ef-
fe: vti ante
dictum.

Tagautius
quique Differentiam ostendens inter vulgares
hermodactylos & Colchicum vulgare securius
ait in totum ab eis abstinere, ac asserit non esse
Pauli hermodactylum: eius sententia in præce-
dentibus posita est.

Hermodactyli duo fastigia facit Mesues apud
Sylvium, vnum radice digitali longitudine, quod
Ephemerum esse videtur Dioscor. Galeni & Pau-
li, radice oblonga. Alterum radice rotunda, & ea
foris vel nigra | quod Colchicum est Ephemerū
& deleterium, præteritis autorib' passim frequēs,
flore Croci per Autumnum erumpente) vel ru-
bente, vel alba, vt intus, quam eligit solam, si
crassa sit ac modicè dura, & ex loco edito lecta:
calida sicca initio secundo gradus, stomacho ad-
uersissima est. Piruitam crassam à iuncturis præ-
sertim extrahit, ob id podagra, & ipsi arthritidi
prodest, per se, vel decocto sumpta, aut etiam
admota cum farina hordei, vitellis ouorum, mi-
ca panis. Hæc omnino est, quam Paulus hermo-
dactylum vocat & ab utroque Ephemero se pa-
rat. Veteribus indicta radix, vti & quæ rubens
Mesuz dicitur. An verò quæ in officinis osten-
ditur, horum sit Hermodactylus vel Colchicū,
discernere non est difficile his qui legunt, aut in-
segetas habent radices, nam delibratæ ad nos cō-
uehantur. Canis tamen largam eius vim per me
depassus innoxie, & multorum turò hac radice
purgatorum experientia quotidiana facit, vt cre-
dam, vel hermodactylum hunc esse Mesuz, &
Neotericorum Veteribus indictum, vel saltem
non esse Colchicum. Aduarium miror inter
purgantia simplicia hunc non descripsisse, cum
toties eius meminerit in compositis medicamen-
tis, ἡρμόδακτυλος λευκὸν ἢ ἄλβον, alicubi appellans.
Serapio hermodactyli nomine principio Dios-
coridis Colchicum representat, deinde etiam
Ephemerum. De omni hoc genere Musa in exa-
mine simplicis, & Tagautius suis in Mesue sim-
plicia annotationibus doctis pariter ac luculen-
tis accuratius scribunt. hermodactylus Me-
suz probatur radice rotunda. Quæ in Officinis
est affirmatur mihi ab his qui legerunt frequen-
ter in Gallia Narbonensi & Prouincia, esse folio
nigro, potraceo, flore per Autumnum Croci, sine
Croco tamen, foris nigra radice: quæ res decla-
rat esse Colchicum, innoxium tamen, aut saltem

innocentius experimur: fortè quia siccatum est,
nisi recens nobis vsurpatur.

Tragus hermodactylos officinarum reci-
pit pro hermodactylis Serapionis & Mesue
verum quod ait ipsos cum Paulo venenum dice-
re, putat idem esse cum Colchico, & iis abstinendū
in internis, foris secus eis vtendum, vt fece-
runt Arabes.

Fuchsio quoque teste, hermodactyli Mesue, duo
facit genera: Vnum radice digitali longitudine,
quod non est nisi Behen, & minime Ephemerū,
non lethale, vt nonnulli existimant. Alterum

radice rotunda: quod itidem in duo partitur
genera. Vnus enim habet radicem albam, crassā,
ac modicè duram, atque is est, qui in hodiernum
diem nomen Hermodactyli in officinis Medico-
rum retinet. Ac à Paulo quoque Hermodactylus
appellatur. Hic alui decoctionem molitur, pi-
tuitamque crassam ab articulis præsertim extra-
hit, Cæterum is, Paulo auctore, stomacho nimis

quàm aduersatur. Proinde aliqua quæ eius ma-
litiā corrigant ac vehementiam coerceant, illi
miscenda erunt: Vt sunt Cinnamomum, Malti-
che, Zingiber, aut Piper longum: Datur cum
Oxymellite Scillitico, aut melle rosaceo, pōdere
drachmæ vnius aut plūs aut minūs, pro lumen-
tis viribus. Alterum genus hermodactyli rotun-
di, foris nigram aut rubentem radicem obtinet.
Atque is est, qui Croci flores per Autumnum
passim in pratis ostentat, & vulgò hermodacty-
lus nuncupatur. Græcis vetustioribus Colchicon
dicitur: is intra corpus ut pote venenatus, turò
haud sumitur.

Hermodactylus non minore copiā reperitur
apud Monachos in Mes. In montanis, inquit, pra-
tis, & aliis locis grossi, & pulchri sunt, quod si
nesciuissemus eos esse malignos, aliquando co-
medissemus ipsos. Quoniā vt Dioscor. refert, re-
centes magnam voluptatem afferunt aspicien-
tibus, & præcipuè incautis de illorum malignita-
te, eò maxime quod dulces gustatu sentiuntur.
Sed nescimus desiccare eos sicut Orientales fa-
ciunt. Pluribus enim modis tentantes experi-
iporum desiccationem, nunquam effectum de-
siderii nostri consequuti sumus. Erenim multos
de hoc interrogauimus à quibus varios accepi-
mus modos. Verum tamen semper omni modo
efficiuntur duri vt lapides, rugosi, & vt Carbo-
nes nigri, forsā quia alio solo & celo nascuntur.
Colchicon Græcè idem est quod Hermodacty-
lus. Latine etiam Bulbus agrestis dicitur. Au-
thor enim noster in proprio capitulo duo gene-
ra facit. Vnum quod est longum, vt digitus, &
aliud rotundum. Rotundum quippe est Colchi-
con. Pro longo autem putamus intellexisse E-
phemerum, de quo Dioscorides separatim capi-
tulum fecit. In quo dixit Ephemerum habere
radicem &c. Non obstante quod dicat Colchi-
con etiam ab aliquibus Ephemerum, vocitari. Si-
militer Serapio in vno suo capitulo de hermo-
dactylis, duo cap. Diosc. constrinxit. Scilicet c.
de Colchico & capitulū de Ephemero, vbi per E-
phemerum Barbarè Achimeron legitur. De ro-
tundo autem, quod est Colchicum, Auctor no-
ster similiter, vt Serapio, posuit tres differentias,
scilicet, quod hermodactylosum aliud est albus,
& aliud rubens, & aliud niger. Et quod albus
est eligendus, rubens verb & niger sunt mali.
hermodactyli quidem aromataris & herbariis
noti sunt. Sciendum tamen quod recentes non
sunt administrandi. Teste ipso filio Mesue, qui

Behen.
Non Ephem.
merum.

Hermoda-
ctylus offi-
cin.

Hermod.
Pauli.

Hermod.
genus ab
serapio est
Colchicum.
Hermod.
vulg.
Colchicum.

Locus

Hermoda-
ctylus Orient.
ales.

Hermod.
Mesue long.
gus.

Ephemerum.
Serapio
duo inquit
capita.

Hermod.
Aromata-
ris.

*Errore in-
scriptum A-
uicenna.*

*Hermoda-
ctylus 2 spe-
cies Dodon.
mai.*

*Serapio re-
prehendi-
tur.*

*Reprehendi-
Hermoda-
ctylus vulg.*

*Cronem-
burgius no-
tatur.*

fit ait. Eremeliores sunt, in quibus iam præterit
medius annus, post bonam eorum exsiccationem.
Auicenna autem dicit, quod est radix
plantæ habentis Rosas albas & citrinas: in qui-
bus rebus manifestatur vel ipsius, vel interpretis
eius mala intelligentia, scilicet quod pro flore
Croci albicante (vt in Diosc. legitur) intellexit
florem Croceum, scilicet Citrinum, & album.
Vnde dixit: Rosas albas & Citrinas.

Secunda species hermodactyli Dodon. gall.
quæ inuenitur in officinis vocatur à Paulo Aegi-
neta, Mesue, Serapione, & à quibusdam aliis an-
tiquis medicis Græcè *ἡρμόδακτυλος*, Lat. hermo-
dactylus, ac hoc nomine in Officinis cognosci-
tur. Is autem quo in medicamentorum compo-
sitionibus utimur (ait idem Dodon. hist. purg. &
in fol.) ab isto differens est. Bulbus nempe huic
magnitudine & formâ satis respondens, verum
retectus, & albidus permanens, neutiquam ru-
gosus, modicè durus, tûdique facilis, cuius pulvis
candidus est. Valerius Cordus Colchicum
quoddam reperiri scribit superioribus simile, sed
flore candido. Nondum ego ausim allere
cum Dodon. Colchicum album Cordi idem cum
Hermodactylo Officinarum. Cordus non sepa-
rat figurâ, sed colore albo à vulgari Colchico;
Colchicum autem Illyricum cuius radices vo-
lunt esse Hermodactylos Anguill. & Lobel. dif-
ferunt colore luteo & figura.

Dilucidum est Cronemb. de comp. med. duo E-
phemeri genera ab hermodactylo Pauli discre-
ta existere, & quàm imperitè Serapio dum vni-
co velut pallio inscitiam suam tegit, de triplici
planta prodiderit. Iam si sincero iudicio, & ad
amissum, vt dici solet, Dioscoridis atque aliorum
Græcorum Colchicum spectemus, confera-
musque vulgari Officinarum Hermodactylo,
procul dabio eandem omnino radicem compe-
riemus. Quapropter haud iniuria esset, ab con-
suetudine medica eliminanda. Et si quispiam im-
peritè arrogans mihi quotidianam eius securi-
tatem obiiciat, illi respondeo, vel eò mitiorem
nostris hominibus videri, quod in Colchico solo
non exeratur: Sed in vniuersum innoxiam esse,
nemo sapiens pronunciarit. Ego nulli au-
tor ero, vt temerè periculum subeat. Cronem-
burg. nullam facit differentiam inter Colchicum
vulgare & Hermodactylos Officinarum, licet
manifestum sit discrimen.

Matth. vt antè ostendimus cap. de Colchico,
existimat Colchicum idem cum hermodactylis
Officinarum; erroris accusat Serapionem, Lin-
chium, & Monachos: denique reiecit omnino
Hermodactylos officinarum vt venenatos.

An Anguill. de hoc loquitur dicens: Colchicū
in Græcia & circa Sclauoniâ differt ab Italico, ra-
dices portantur in Italiam & venduntur pro Her-
modactylis. Nostri [hist. Lugd.] Colchici radi-
ces etiam si pro hermodactylis à quibusdam v-
surpentur, sciendum tamen ab Officinarum Her-
modactylis plurimum differre. Hi enim pere-
grini sunt, non perniciosi, vt multis seculis plu-
rimum vsus edocuit. Tabern. Hermodactylus Of-
ficinarum hermodacteln. Gabr. Fallopius tract.
de simpl. medic. purg. c. 53. tit. de Hermodactylis.
Hermodactylus est duplex, vnus est radix oblon-
ga digiti similitudine, & est hermodactylus Pau-
li. Hermod. verò Mesue est rotundus, & est E-
phemeron Colchicum Dioscor. & iste est in vsu
in officinis: & quantum in Colcho sit venenum,
tamen in hac regione non est venenum. Vfus


ipsius præcipue est conficiendas pilulas de her-
modactylis: pro decoctione autem, & pro infu-
sione raro est in vsu. At empirici probant vsum
Hermodactylorum, quia in morbo Gallico exhi-
bent puluerem ipsorum, & vinum etiam quod-
dam ex ipsis. Sed docti viri non exhibent sub-
stantiam Hermodactylorum, nisi & ipsi vtantur
aliquando medicamentis empiricorum: ac cre-
bro exhibent pilulas de Hermodactylis. Dosis
Hermodactylorum ait Mesue, est à drachma vna
vsque ad duas. Sed Fallopius non vitur Her-
modactylis in substantia: nec vidit vnquam
vllum doctum virum ipsis vtentem. Nullo
modo assentiri possumus Fallopio nullam fa-
cienti differentiam inter Hermodactylos Offici-
narum peregrinos & Colchicum nostrarum re-
gionum: quod non solum in Colchide venenum,
verum etiam apud nos, à quo caueant omnes,
quicquid dicat Fallopius: non sumus etiam vti
Hermodactylis Officinarum, quum non desint
nobis cetera medicamenta.

COLCHICVM ILLYRICVM SIVE Græcum non venenatum flore luteo.

Veneris munere Alberti Martinelli Alepo-
Syriz euulsas à fratre Cequino habui [in-
quit Lobel. Obser.] Colchici Anguillæ plan-
tas, pronis palmaribus septenis, denis, & duode-
nis foliis Colchici, striatis, mucronatis, reflexis,
in angustum fastigiatis, imbricatis, & lateratim
stipatis, è quibus in pusillo pediculo, flores ex-
runtur lutei, pallentes, terni vel quaterni, Col-
chici parui minores, staminibus item concolo-
ribus: siliqua non dissimilis. Radix foris Cera-

concreta
ne: intus eu-
nida & vieta:
quia in cau-
lem, folia, flo-
res, fructum,
& semen vis-
tota eruperat.
Anguillæ
& Cequino af-
fentiendum,
quibus acci-
ptam refero:
mihi tantum
siccata arida-
que visa.

Lob. Obs. &
tc. Pl. p. 147.
hermodactyli
non venenati
Officinarum.
Colchicum Il-
lyricum sine
Græcum non



venenatum Anguillæ [Lobel. hist. Lugd.] Ta-
bern. icon. & Gerard. Colchicum Illyricum
Griechisch wisen zutlofen / Græcæ Medon
Saffran /

Colchicum quod prouenit in Græcia & par-
tibus Sclauoniæ circa Sebenium Anguillæ non
illud est quod in multis locis Italiæ inuenitur,
prodegit enim folia angusta, similia bulbo, re-
flexa in terram radices euelluntur, ac in Italiam ve-
nales feruntur pro hermodactylo. Proferit
Autumno flores similes floribus Croci, sed mu-
to minores, tres aut quatuor in summitate can-
lis,

He dodrantalis. Colchicum Illyricum Anguilla-
ra nunquam Clusio conspectum.

COLCHICVM FLORE LVTEO
quorundam.

Subest *bulbus* oblongus, mediocriter magnus,
synde fibræ aliorum more dependent, sapore
præditus amaro: *folia* è radice statim exorun-
turscedentia ad Leucorum bulbosum, carina-
ta, atrequientia, & splendida, in mucronem ob-
tusum modicè definentia, crassa, vnciam plus mi-
nus lata, non totum dodrantem longa: inter hæc
caulis surgit palmo breuior, compressus, in cuius
fastigio, inante folliculo membraneo, *stos* appa-
ret totus luteus, Colchici florum forma, sex
foliis, totidemque staminibus & stylo luteis con-
stans.

Hanc bulbum sic descripsit Clusius: Narcissus

Autumnalis
maior. Persi-
co Narcisso
valde affinis
est Narc. Autū-
nalis, tamen si
neutrum flore
Narcissum æ-
muletur, sed
foliis foliis &
radice. Qui-
na autem &
fena habet fo-
lia, oblonga,
pollicem lata,
præ viriditate
ferè nigrican-
tia, splenden-
tia, humi ple-
rumque spar-
sa, inter quæ
brevis exit
cauliculus vi-



dis, rotundus, vix supra terram se attollens, cui
insidet flos superiori formâ similis, sed breuior,
tam omnino coloris, ex membranaceo folliculo
emergens, cuius exteriora tria folia interioribus
maiora sunt, eaque velut amplectuntur, omnia
autem mucrone sunt magis orbiculato, quam
Persici folia: sex stamina suis apicibus ornata &
hilus è floris umbilico emergunt: radix crassa est,
rotunda, intus candida, foris ut Narcissus nigri-
cans. Huius alia species inueniuntur angustioribus
foliis, in reliquis cum illo conueniens.

Dodon. hist. Lat. Narcissus autumnalis maior,
& Narcissus Marcelli dicitur. Lobel. Obs. Col-
chicum luteum, an Ephemerum non venenato
Dioscor. congener? Narcissus Autumnalis Mar-
celli Virgilii. Mutono flore luteo pallente. Li-
tium alterum Theoph. Dod. Adu. part. 2. Colchi-
co Narcissus Botanicorum: Narcissus autumna-
lis peritiss. in herbis, sive Colchicum luteum
vocatam, cum à floris figura, cum à tempore flo-
rescendi, verum de hoc maiore & de minore ad-
huc certatur & ambigitur num referri debeant
ad Colchici familiam aut Narcissos, quia vires
non sunt exploratæ: quare peritiores multi in
dubium reuocarunt, ut Io. Moutonius: Carolus
de noucin. Ancipitis utriusque naturæ videntur:
Radice siquidem conerctio & textura Narcissi
familie, quam Colchico proximior est: cætera
magis Colchicum æmulantur. Folia atrequientia

Autumno cum flore luteo è breui pediculo pro-
deunt. Proinde liberum cuique erit Narcissus,
aut Colchicum, vel Colchico Narcissum nuncu-
pare. Clus. hisp. Narcissus Autumnalis quorundam
& maior hisp. *Agaveus amarillus*, id est, Liliū
flauum. Idem hist. post. dicit, Nonnulli vocant
hanc stirpem Narcissum Autumnalem, alii Col-
chicum luteo flore, cum tamen nihil cum Col-
chico commune habeat præter florem, reliqua
sunt Narcissi. Quod si Colchicum dicendum,
omnia Croci genera etiam Colchicum appellare
licebit: E Thracia allatum est Cedonari nomi-
ne. Posset non incommode forsitan ad Lirium
alterum Theophrasti referri vel *vaquios* & *imenes*
Græcè dici.

Tabern. icon. Colchicum luteum. Narcissus
autumnalis maior, Geel wisen zeitsosen. Et h.
Colchicum tertium.

C. Bauhin. Phyt. Colchicum 10. luteum: Li-
rii alterum genus Theophr. lib. 6. cap. vlt. variat
in hortis Belgii angustioribus foliis autore
Lobel.

Sub Augusti finem, autore Clusio, & Septem-
bri, germinare incipit, & plerumque floret. Gau-
det montanis quibuldam hispaniæ pratis, etiam
in Italia sponte nasci audio, [ait Clusius.] Ex
Thracia antè paucos annos etiam adferri cepit,
cuius bulbos quod siccitate pallecerent iniriò
Persici Narcissi esse putabam: sed emergentia il-
lic, postquam telluri fuerunt commissi bulbi,
folia, omnem dubitandi occasionem ademerunt.
Colchicum flore luteo accepimus à D. Belle fon-
taine, plātandum in horto E. C. Vidi Argentine
in horto Di. Friderici Meier, à quo bulbos etiam
habui: qui in eius horro virentia habent folia
Februario, & Martio: anno 1606. in fine Octob.
floruit in horto Ill. E. C.

Locus &
tempus.

NARCISSVS PERSICVS CROCI FLORE
melino, Colchicis affinis.



Aplanè est
Clus. in Panth.
& in post. hist. Descriptio
Narcissus Persi-
cus & floris
duntaxat pe-
diculo prædi-
tus veluti cro-
cum Colchi-
cumque: exi-
lit ergo è me-
branaceo en-
cull, tanquam
ex vasculo, aut
theca *stos* ob-
longus, Croci
aut Colchici
floris æmulus,
sex foliis con-
stans ex flauo
pallenscens,
quorum tria

interiora paulò angustiora sunt, externa latiora,
& summo mucrone nonnihil incurua, sive ante
quam quandam habentia, quæ interiorum mucro-
nem amplectuntur & comprehendunt, ingrati o-
doris & Pauperis quasi virus redolentis, *stamina*
sex medium florem occupant, in foliorum vn-
guibus nata, sed interiorum foliorum reliquis

longiora, exiliter medio oblongior *stilis*, gracilis, & sine capite. *Folia* illi sunt Hemerocallidi Valentini non multum ab similia, lata, plana, eiusdemque cum illis coloris, hoc est, ad ærugineum tendentis, quæ ut plurimum conuoluuntur, aut sese circumagunt: *radix* crassa, bulbosa, à basi (quæ multis fibris donata est) statim extuberans, intus candida, foris pallidior quidem, sed aliquantum etiam nigricans.

Semel duntaxat Constantinopoli allatum est hoc bulbi genus, mihi que (ait Clus. communicatum à Philiberto de Bruxellis, cuius antè meminimus, anni 1575. initio, quem postea variis amicis cum in Belgicâ tum in Germaniâ distribui. Initio Narcissum Autumnalem maiorem, ex bulbi forma esse coniciebam, in qua opinione valde me confirmavit flos sub finem Septembris emergens. Sed postquam folia non subsequi animaduerti, & ineunte demum Vere prodire obseruavi, eaque ab illius foliis colore differentia: tum exactius collatâ inter se utraque plantâ, disparas esse manifestè deprehendi: æstate breue inter folia caput pollicem crassum, breui pediculo inherens, & summa tellure vix emergens, ferre aliquoties obseruavi, quod cum inane esset, seminis conspiciendi spes omnis sublata.

Nomina
Lilium al-
terum
Theophr.

Nomen Schedæ illi additæ inscriptum erat *Larem cada persiana*, id est, Narcissus Persicus. Multum verò conuenire videtur, cum Narcisso uel Lirio altero Theophrasti, cuius meminit Hist. Plant. lib. 6. c. 6. *florem* amplum illi tribuens, coloremque [ut eruditiores volunt] melinum non nigrum, figura oblongum, serotinumque admodum, post Arcturum & circa Equinoctium sese ostendentem, vel, ut sequehte cap. ait, Autumnis primis imbribus, quemque lib. 7. hist. c. 12. caulem tantum floris habere dicit.

Icon nostra facta est ad iconem quam habebat Clusius in Pann. eam autem in post. hist. mutauit quod folia attrinxit.

C. Bauh. Phyt. Colchicum n. siue melino flore. Narcissus Persicus Clusii. Quo nomine à Tabern. icon. & hist. cum Cam. hort. cognominatur. Fri-gori nostro libenter assuescit.

Colchicum vernum flauo flore.


Scribebat Iacobus Plateau [inquit Clusius Hist. post.] Colchicum se habuisse quod verno tempore flauum florem protulisset: sed bulbum cum eruisset corruptum reperisse.

Huius, ni fallor, meminit Lobel. Adu. par. 2. Narcissus luteus vernus D. Leet facie Narcissi Autumnalis lutei siue Colchico-Narcissi Botanico-rum: Narcissiniæ classis videretur noua, rarissima, & elegantissima planta, quæ quamuis tota facie Narcissum Autumnalem siue Colchicum luteum vocatum cum à floris figura, tum à tempore cum Colchico florescendi referat, Narcisso tamè propior, quia vere nouo flores laxat. Nouus igitur hic Byzantinus Narcissus folia cum floribus luteis Vere laxat, atrouirentia, situ initio bina, deinde utrinque plura, binum & tertium vaciarum, quæ postea excrestant longiora, Colchici Autumnalis lutei quadantenus: minora tamen paulò, & breuiora: cauliculus compressus ternas & quaternas vncias longus, floribus & staminibus luteis fastigiatus, præd. Col. lutei similis, sed minoribus. Bulbus Narcisso Autumnali huius speciei similis, satis magnus pro Plantæ ratione.

nunc debemus D. Leet, insigni Londinensi negotiatori; Constantinopoli à suis mercatoribus cum aliis rarissimis bulbis transmissam.

COLCHICVM PARVVM MONTANVM luteum, aliis Narcissus.

Narcissus Autumnalis alter siue minor [Clus. Hist. post.] Octobri mense quemadmodum Persicus, nudum è vaginula membranacea profert *florem* sex oblongis & angustis foliis constitutum, non æqualibus, nam exteriora paulò lon-



giora & latiora sunt, omnia autem mucronata foris fluorescentia, interius flaua, ad maioris colorem magis accedentia, flaua flammula medium florem occupat, odoratus est hic flos, soloque pediculo inherens, supra terram non arduatur: flore iam marcescente interdum incipiunt folia, ut pluri-

mum autem, ineunte Vere duntaxat, cernit aut quaterna, plana, viridia, & splendentia instar foliorum maioris, sed longè angustiora, & præter aliorum morem sese contorquentia, & cincinnorum instar conuoluentia: *florem* plurimum ipsis tulit anno 1591. initio Iunii in capitulis vnciis tribus, ferè trigonis, rotundum, nigrum, cui inherere materia: *radix* pusilla, nigra tunica tecta, inferioreque sede tenuibus fibris firmata. Secundus hic Narcissus potest dici *Narcissus autumnalis minor*. Mihi missus à Generoso viro Carolo de Houchin Colchici lutei minoris nomine, à Iacobo Plateau verò Colchici montani miniori lutei appellatione.

Lobel. icon. pl. p. 14. Colchicum paruum montanum luteum D. 10. Monnei Teur. 182. Item Aduers. par. 2. de Narcisso autumnali minore adhuc certatur & ambigitur, num referri debeat ad Colchici familiam aut Narcissos.

Tabern. icon. Colchicum montanum luteum minus, Flein geel Berg zeuslofen/ & Hist. Colchicum 12.

C. Bauh. Phyt. Colchicum 14. montanum paruum luteum.

NARCISSVS AUTVMNALIS minor & similes plantæ.

Vnicum cauliculum, digitalis longitudinis, gracilem, vacuum, habet hic Narcissus, cuius summo *florem* Narcissinum odoratum, sex foliolis albis constantem, & in medio exiguum calicem flauum continentem: flori succedit exile

exile trigonum capite, exiguum, nigrum, angulosumque semen continens: radix Narcisso luncifolio valde similis, minor tamen, multis candidis tunicis, lentoque succo praequantibus confusa, sed nigra quadam membrana tecta. Tota planta amara est, ut superiores Narcissi, verèque dixit Plinius, odorato sapore raro, vili non amarum.

Icon quam damus plantula à Clusio descripte figuram & magnitudinem affabre sanè exprimit.

Clus. uif. Narcissus quartus siue autumnalis minor. Et post. hist. Narcissus serotinus siue Autumnalis minimus: Incolz in Hispania Tomada appellabant.



Plan. icon. pag. 122. Narcissus autumnalis (ut & Dod. in fol.) parvus Clusii Lob. 62. Teut. 158. Lobel. B. 158. Klein spa. de Narcissen. C. Bauh. Phyt. Narcissus 29. siue (cum Tabern. icone) autumnalis minor Clusii.

Nascitur plurimus ad Anam flumen in Turdalis, ubi (inquit Clusius) florentem, & suis capitulis iam maturescere incipientibus eruebam sub Octobris finem, nullis è bulbo natis foliis, nec vlla eorum vestigia obseruans, quod sanè mihi admirationi fuit. Quantum intelligo per fratrem C. Bauhinum, qui communicauit, prouenit in monte Spiegel.

SPARGANIVM PLACÆ NARCISSO simile flore albo Lili.

Descriptio Vpra Valentiam salebrosis & petrosis locis nascitur quaedam planta bulbacea, binis foliis praedita, humi stratis, longis, crassiusculis, ex viridi nigricantibus, Narcissi maioris Autumnalis foliis ferè similibus, sed quibus interna parte secundum nervi medii longitudinem, alba quaedam latiuscula linea ducta est: radix bulbosa multis tunicis constans candidantibus & lenti viscidique succi plenis, ingrati amarique saporis, foris nigro cortice obductis. Etiam C. V. Ioan. Placæ Medicus Valentinus, pedalem caule[m] [nam radicem cum foliis diutaxat, eruebam, ait Clus. Hisp. & hist. post.]. Iteum, aliquot in summo flores Lili amulos, candidos ferentem, habere, deinde rotunda capitula, in quibus exiguum semen contineretur, assererat, & Sparganium vocabat. C. Bauh. Phyt. Colchicum 12. siue Colchico luteo similis (supple planta.) Sparganium Placæ Clusio.

Tom. III L

TULIPA SIVE LILIO NARCISSVS.

CAP. IX.

Bulbaceas inter stirpes, recensetur merito peregrina illa planta, quæ ob insignem in flore colorum varietatem, omnibus longè gratissimæ esse solet. Quæ de re lo. Posthius.

Multiplum vincti florum genus omne colore

Huc usque à Getiis Tulipa missa iugis.

Hanc vulgus Tulipam, doctiores verò Liliomarcissum appellant. Cùm autem non occurrat nobis, an aliquis de Tulipa verba fecerit, ante Doctiss. & diligentissimum Boranicum nostrum Præceptorum Gesnerum, lubet hic subscribere, quæ in fine operum Cordi, de hac memoria prodidit.

Anno à Natiuitate Domini 1559. initio Aprilis, Augustæ,



in hortu Magnifici viri lo-

han. Henrici

Ferruantiu di

inquit is, her-

bam hic exhibi-

bitam, ortum

è seipine quod

Byzantio (vel,

ut alii, è Cap-

padocia) allat-

um erat. Flo-

rebatur cum te-

poris flore no-

pulcherrimo

rubente, ma-

gno, instar Li-

li rubri, octo-

nis condito

foliis, quorum

quatuor foris

sunt, & toride

intus, odore suauissimo, leni, & subtili, qui breui euanescebat. Color interior pallidus est aut subflauus: & stamina tanquam Croci, in medio intercepta, seu genicula, ipsa quoque octonaria, ex quibus iidem alia exterius paulo sunt, alia interioris. Calix nullus. Caulis est circiter pedem altus. Folia in eo quaternaria albicant, crassiuscula, solida, duos palmos (id est digitos octo) longa, Orchon ferè foliorum figura, modicè recuruato margine (non aded quidem ut pictura præ se fert, quam antea expressam amicus quidam ad nos misit,) ex histria inferiora maiuscula sunt: summum, paruum. Maculae nulla dum erant, quas in adultioribus foliis apparere aiunt. Radicem non vidit, sed aiunt esse bulbosam instar nermodactyli ferè, vel Potri formæ & magnitudine, tertio anno florem producere: propagari de radice, bulbo puro adnascente, semen nullum proferre, siue naturæ, siue nostri cœli culpa. Turcico vocabulo Tulipam vocant aliqui. Sunt ex Turcis (inquit Kennmannus,) qui Tulipam dicunt nomen habere à flore, qui formam refert pileoli Dalmatici. Lili rubentis genus [pergit Gesner. hort.] videtur etiam Tulipa Turcarum, cuius picturam, cum ad vicum quendam Doctiss. misissem, is Cynorrhodon Plinii [vel ut ipse legere mauiit Cynorrhodon] esse putauit. Sed ita dictum à Plinio Lili in Italia quoque nascitur: Tulipa verò ista (nam & alia quendam hoc nomine vocatur herba luteo flore) Italiz (ni fallor) proutus pe-

Gesner. de Tulipa.

Descriptio

Tulipa:

Lili

rubent.

Cynorho-

don.

Cynorho-

don.

Kkk

Satyrium
Erythraicum
cum Tulipa
parabro
Tulipa alba

regina est, nisi in horto aliquo conspiciatur. Cynorrhodi quidem Lili Hyacintho similis Helychius etiam meminit. Satyrium Erythraicum fortè est Tulipa à Turcis dicta: quam vidi Augusti in horto Magnifici viri Io. Henrici Heruapci, quaquam semen ferre negant. Et hac is de Tulipa.

Satyrium
Erythraicum

Nos quidem Tulipam flore rubro, serere semina obseruauimus, quæ non respondent seminibus Satyrii à Diosc. traditi, idèd Satyrium Erythronium dicere non possumus: Tulipa tamen alba, multa habet quæ respòdent Satyrio triphylo Diosc. Suspiciamur præterea priorem Gesneri Tulipam esse inter Clusianas, de quibus postea, præcoccem rubram dictam, in eo tamen differt quòd Gesnerus tribuat flori octona folia: Clusius autem tantum sex: Secunda fortè referenda est ad Bononiensem deinceps tradendam.

Narcissus
S. Barib.
qui nota
est

Ineptè Matth. proponit quandam iconem sine ulla descriptione sub titulo Narcissi s. quæ ad Tulipam referenda videtur, in cuius caule folia octo spectantur, in flore sex foliola, in epitome verò septem in caule, quinque in flore.

Lotus ber-
ba Homero.
Alé Zempul
Lotus Diosc.
Lotus

Notatu digna sunt quæ Guiland. in Theone de hac planta scripsit: De herba non arbore intellexit Homerus in Iliade, quando Iouem rem cum Iunone habuisse canit, terra subter Lotum, Crocum & Hyacinthum gignente. Ac an ea sit Lotus, nomine barbaro & proinde peregrino, quærendum, quamquam parum refertur Autumno, si vel pro urbana vel siluestri Diosc. Loto capiatur. Verum cum Plinius tres laudasse flores annoter, Lotum, Crocum, & Hyacinthum, nec Lotorum, qui apud Dioscoridem habentur flores, præstanti fortuna commendabiles sint, vix fieri posset, Homerum de his locutum. Ceterum Lotus Aegyptiæ et si flore constet pulcherrimo, nullum tamen hac parte locum occupat, ut pote quæ in sicco nasci recuset, Croco & Hyacintho nequaquam in aquis prouenientibus. Nec sunt aquæ ad coitum aptæ, fundum petente corpore. Suspiciari quis posset Tulipam? inquit Dodon, qui tres differentes species agnouit, *πυτυρα* esse Theophrasti, si edulis bulbus esset & cogendo efficax. Nam *πυτυρα* quidem à Theophr. inter edules bulbos refertur & herba est, quæ lac cogitur, ut ait Helychius.

Lobelia
serena.

Pyram
Thyris

Gesnerus Tulipam Satyrium esse, existimauit, an autem conueniat & quantum, ex Satyriorum descriptionibus relinquentibus, diligentius considerandum.

Dodonæi icon prior, est apud Clusum pro Tulipa præcoce alba varia. Secunda autem est pro Tulipa præcoce rubra: in hist. flo. unica erat icon, quæ à Lobelio exhibetur in Obs. 2. loco, cui floris foliola non desinunt in acutum.

Limonia
Crimorhodon
Plinii
Satyrium

Dodonæi suspicioni subscribit C. Bauh. dicens apud Matth. Licet alii ad Anemonem Limoniam Theophrasti, alii ad Crimorhodon Plinii: alii ad Satyrium Erythraicum referunt, videtur tamen ad *πυτυρα* Theoph. referenda. Gesnero Anemone Limonia.

Lilimarcif-
fai purpu-
reus Narcissi
Plinii
Casse, Lale,
Zampul
Foliarum
purpureus

Tradit Lobel. in obs. Lilionarcissi varietates quamplurimas, inquiens: an purpuro-Narcissi Plinii, Turcarum *Casse Lale*, *Zampul*: Omnibus Tulipa siue Lilionarcissi speciebus foliorum numerus in caule pedali & sesquipedali, ternus, quaternus, quandoque quaternarius, septenus & octonarius: flores senis foliolis, interdum pluribus, quorum ungues flauent, calathum cithran-

tes, constant: quorum alii præcoces, alii autem serotini. Flos sex foliis obtusis purpurei sanguinei Lilionarcissi constat: Radix item & caulis persimilis, in quo quatuor, & nonnunquam plura, folia, liliaceis & portinis media: interdum inuitum bulbum in folio notauimus apud D. Io. vander Dille, cuiusmodi in Moly Homericæ. 2. Luculento pendente flore, supremis foliorum oris & fundo ad basim luteis pallentibus, medium cingente sanguineo subfusco: calyculorum oris & media carina foris luteis: cetera cuncta sanguineo fusco exoleto similia: medio intus stamine nigro, staminibus croceis obducto. Semina, ut reliquorum, compressa in oblongo tripartito membraneo anguloso folliculo: quæ itidem lata colorum varias subeunt mutationes, & sæpe degenerant, ut longo usu diligentissime animaduertit clariss. vir D. Ioannes Boissot.

Eriophori vocati radix cepaceo innohucro obducitur, molli sericeo tomento sarcto, castaneum ritu: flos ut reliquorum: sed calathi fundus siue foliorum ungues atrii & medio lutei conspiciuntur.

Eriophori
Lilimarcif-
fai purpureus
Narcissi
Plinii
Casse, Lale,
Zampul
Foliarum
purpureus

Luteo & medio pullo, fundo.
Maculoso, medio fusco folio.
Sanguineus toto calathi fundo pullo.
Vngue toto luteo.

Vngue pullo, triangularis luteis:
Flore odorato, aut inodoro:

Totus luteus maior Chalcedoniensis, sanguineo puniceo par, & similis: odoratus Croci emulatione & inodorus: præcox & serotinus aut pallidus.

Niueo candore & rubore confusus coccineus.

Purpureus sanguineus, puniceusque obsoletus, candidioribus oris, carinam intercurrente albo rubore mixta diluta linea, imò ad basim croceo vngue.

Purpureus coccineus, rubentibus oris, medio folio exteriore candicat, vnguis luteolus, summo medio tenuis coccineo luculento cruore.

Coccineus purpureus punicans, tribus exterioribus mucronatis foliis: internis vero retusis.

Rubellus pendente flore in acutum modice fastigiato.

Rubidus candore mixtus, nitidus, niueis oris.

Niueus, extremis & summis rubicundis, videntibus in caule foliis.

Candidus, striatis suauè rubentibus oris.

Patulus, rubidus, candicans.

Rubicundus, rutilans, luteola carina.

Sanguineo, puniceoque saturo liuescens, summis candidioribus oris, expallus, folio latiore, mucronato.

Obsoleta purpura, summo albicans, purpurante medio.

Imò & summo luteus amœnus, medio coccineo, sanguineo.

Luteus striatis rubentibus oris.

Rubellus niueis oris striatis.

Luteus hilaris oris phœniceis.

Niueus totus, fundo cantillam luteo.

Luteus, phœniceo confuse mixtus.

Lutolus phœniceus, dilutus.

Luteus coccineis rubentibus oris.

Candore & rubore confusis, Rosæ dehiscentis pallide colore.

Luteo

Luteophoeniceus luteovirentibus oris; septenis peramplis foliis.

Purpuraviolaceus.

Hactenus Lobelius apud quem hæc consideranda. Folia Tuliparum nobis non videntur esse vitore Liliaceo, nec seminis descriptio placet, quæ nec plurimum differt ab Aristolochia prædictæ semine. Dodonæus dicit cartilaginolum plantum. Illud etiam perpendendum venit, quod scribunt de Tulipæ nomine aliter ac peritissimum Guillandinus: Nec hoc negligendum, prædi in Aduers. florem cum quinque foliolis, ac etiam iconem proponi in qua tantum quinq. foliola sub titulo Lilionarcissi purpurei: eam autem iconem in iconum l. Plant. iterum proponit hoc titulo, Lilionarcissus sanguineus puniceus. Teur. 162. In Adu. ponit præterea alteram iconem sub titulo Lilionarcissi lutei, planè quersam, ac potius alicuius Narcissi quam Tulipæ, si non est error typographicus; de eis dicimus, quod ibidem paulo post dicit aduersum Matthiolum, pueros pueris pingere & illudere. De cæteris lequibus Lobeli in obs. & in lib. ic. Plantini postea agemus.

Camer. apud Matthiolum in Epit. pro Narcisso. Matthioli ponit descriptionem & pulchram iconem, quæ summe placet, & pro plurimis sufficere videtur, ac ideo etiam à nobis proposita: Tulipa peregrina, inquit etiam, & ante aliquot annos demum cognita, apud nos planta, de facultatibus adhuc ambigitur. Helichrysum Cræteum non adeo male ad luteum quadrat, quamvis herbam non integrè descriperit, sed tantum dicat florem esse similem Croco, colore aureo. Tulipæ dicitur quæ quod attinet. Præ aliis floribus varietas est in præcox: Præcox lutea vel palide aureo colore, vel pallida. Adhæc vel rubris maculis conspersa, & alia maiore ex parte rubens. Item vel aureo fundo vel nigro. Semina etiam differant, quæ in nonnullis flava sunt, in aliis nigrescent. Præcox rubra, eaque vel purpureascent, vel coccinea. Item purpureascent albis ornata decora. Nec non dilute rubens, vel incarnata, vnguibus vel inferioribus foliorum partibus candidis. Alba, sive prima omnia florere solet, sed & frigoris vehementia aliquando succumbit, si non satis profundè intra terram abdatur. Est vero quædam penitus candida, excepto fundo qui nonnihil flavescit: quædam dilute rubedine inficitur, & etiam violaceis maculis pulchre distinguitur. Media sive Dubia, lutea, lutea, pallida: itemque conglobato flore, non reliquarum parulo, & lutea media fusca, purpureis staminibus, & præter has, quæ virentibus staminibus variatur. Denique nana sive pumilio flor. aureo. Rubra coccinea, fundo flavo, nigro, subarcente, in exilium vergente. Est inter has quæ nigrum fundum habet & foliorum in flore virentes apices. Præterea parvula admodum strictis foliis, colore saturato rubro. Incarnata, languidi coloris, nigrescentibus staminibus. Serotina. Hæc plerumque maxima est & pulcherrima, sed minore colorum diversitate commendabilis. Lutea nimirum, aurea, pallida, itemque tenella & trifolia inter hæc, latifolia quoque rufum, eaque bicloros, nec non cristata Papaveris modo, sive & serotina, id quod etiam in rubra admodum grandi notavi. Est & lutea rubore purpureascent, qualis in Præmia colos. Tandem quæ Solis æquilis vocatur, fundo nigro, quem circulus aureus ambit, reliqua floris parte eximie rubicundatæ, varietas etiam in odore habetur, quæ in qua-

Top. II.

dam planè Lilium conuallium dictum æmuletur. His plerisque interdum accidit, ut proliferent extra terram, id est, ut inter alas foliorum proceliant bulbum, qui sentiunt tabescente matris superficie incrementum capessit, quemadmodum hoc à C. Clusio in Pannoniæ affabrè depingitur.

Ceterum miratur Adrian. Spieg. inter Narcissos telarum eum florem, quem vulgus peregrino vocabulo Tulipanum & Dulpanum vocat. Ipsi enim inter Lili genera rectius videtur collocandus. Quo no nime Veteribus dicta sit hæc planta, multi dubitant. Sunt tamen peritiores nonnulli, qui ad Satyrium Dioscor. quibusdam ^{Satyrium} ^{typus} cognominatum referendum censent, ad cuius sanè descriptionem multis notis accedit.

Hactenus autem Tuliparum bulbi nobis [inquit Clusius qui Liliaceam stirpem appellare videtur] Byzantiæ missi sunt, præcox quidem ^{Cassia} ^{locus} Serotina vero ^{Cassia} ^{locus} Canalla lalè: a locis nimirum unde primum Constantinopolim illari sunt appellatione indita: Cassia urbs est in peninsula Gazaria dicta, quæ inter Propontidem & Euxinam Pontum sita est. Canalla vero in Macedonia urbs maritima. Sunt qui Tulipam præsertim purpuream Coliosandam esse velint, à Veteribus inter Coronarias herbas numeratam: Nos Tulipæ duo primaria genera obiciamus: præcox unum, serotinum alterum, tamen inveniuntur quædam veluti dubia, quæ medio inter utrumque genus tempore florere soleant, potius tamen inter serotina habenda, quam inter præcoces.

Præcoxior Tulipa vnicum fert caulem, pedalem maximam ex parte, inter dum ampliorem, rotundam, ^{Tulipa} ^{præcox} ^{hib.} virentem, & breui quadam incanaque lanugine aspectum, non concauum, sed firmam medulla plenum, hunc plerumque tota amplectuntur folia, nonnunquam quaternâ & quina, inferiora lata admodum, ut etiam palmarum latitudinem explere viderim, & liliacea, longiora tamen, & crassiora, carinata, supra terram sese palidentia & contorquentia, superiora autem minora, & angustiora, eaque vel propendentia & nutantia, aut interdum surrecta, omnia autem colbre ex cæruleo virente aut æruginoso, & veluti farina asperso. Summo cauli insidet magnus flos, vnicus (geminus etiam aliquoties videtur summo caule coniuncti nascentes, vel bisido inhaerentes, sicutum spectans, sex foliis ut plurimum constans, tamen septenis & octonis conspexerim] eundem initio cum caule coloris, & interdum ad terram sese inflectens, illicque inaniens, ut colubri aut serpentis, caput in terra decumbentis emittitur, deinde paulatim sese subleuans, & colorem mutans, atque tandem sese explicans, & calachi Cyathum instar in fundo pandens, ex quo sena aut totidem quor foliis constat, stamina prodeunt, modò lutea pallida, modò nigrescentia, pediculis etiam quæ stamina sustinent, intum in modum variantibus. Exeusso flore, succedit membranaceum triangulare caput, satis magnum, oblongiusculum, vel breuius ventrequè magis prominulo, quò in tres partes a summo dehiscen- te conspiciuntur sex ordines seminis plani, cartilaginoli, liliacei fere, & circinata: propemodum rotunditatis interdum, alterâ tamen parte, quæ capitis centrum & interiora percingit, oblongiusculi ut plurimum, pallidi, fulvi, aut rubrescentis, & si imbres frequentiores ceciderint, etiam fusci. Radix bulbacea interdum, breuior est, nonnunquam oblongior, crassa, in inferiore sede non-

K k k 2

hil prominente, vti Colchici radix ferè, fibris aliquot tenuibus donata, & foris fuluescente, sed magna ex parte nigricante, membrana obducta, quæ interna parte lanuginosa est, Castaneæ corticis instar, aliquando autem adeò denso tomento plena, vt mollissimè recubet bulbus, qui solidus est, firinus, & velut albumen oui coctum candidus, gustantique dulcis, saltem non ingratus. Summa autem in præcoce est coloris varietas: nec maiorem in villo alio flore videre memini, nisi fortè in Papauere. Etenim aut omninò luteus est, aut ruber, aut albus, aut purpureus: interdum etià bini vel plures ex his coloribus in eodem flore permixti conspiciuntur. Non desunt qui cærulei omninò coloris se vidisse asserant, mihi sanè hætenus videre non contigit.

TULIPA PRÆCOX FLAVA.

L Vitea Tulipa vel ad auri fulgorem accedit [pergit Clus. in hist. post.] aut pallens, foliorum autem vngues plerumque aurei sunt, licet etiam habuerim veluti fuligine aspersos: odor quasi Cere recentis, sine etiam Croci, interdum nullus, vel admodum imbecillus.

Tulipa flava His notandum à Clusio poni in post. hist. iconem quæ non erat in Pannonicis, aliam iconem habet pro " Tulipa flava sine lutea" quam



ponit postea pro Tulipa præcoce alba, vt iterum monebimus. Quæ verò hoc loco proponitur in post. hist. pro lutea ponitur: ea est in libro Iconum Plantarum delineata hoc titulo p. 130. Lilionarcissus albus parvus & par-

tulus, medio iuxta carinam rubellus nitens, Lob. Teut. 166. An Schvven. in cat. Siles. Tulipa lutea 1. *Λιλιονάρκισσος* Theoph. Narcissus Matthioli. Geeler Tulipan, Gelbe Tursische Nareissen. Plures sunt nobis Matthioli impressiones, verum in nulla inuenimus iconem Tulipæ luteæ.

Habeo in horto E.C. Tulipam luteam præcoem, quæ pallens, vngues aurei parui florum, folia quina in cuspidem deflexa, florer principio Aprilis.


TULIPA PRÆCOX RUBRA.

Rubra Tulipæ color nunc saturatior est, modò dilutior, & gratissimè aspectus, interdum etiam in elegans, & obsoletus: foliorum vngues vel lutei omninò, aut tanquam leui quadam fuligine in luteo aspersi, in quibusdam nigra macula medium vnguem luteum tantummodò inficit, nullis totum ferè ita occupat, vt nihil nisi lutea

quædam linea nigrum vnguem ambiens conspiciatur: interdum adeò magni sunt isti vngues, vt dimidiam folii partem occupent. Huius verò

odor aliis gratissimus est instar Mali aurei, magna verò ex parte valde obscurus, vel Papaueris virus quodammodo referens. Hæc Clusius hist. post.

Clus. in Pannon. & Hisp. eandem iconem habebat. Icon eadem erat apud Platinum p. 126. hoc titulo Lilionarcissus purpureus sanguineus pu-



niceusve quintus Lobel. 65. Teut. 162. Hist. Lugd. ponit pro Tulipa maiore Clusi quam scribit esse Narcissum quintum apud Matth. Idem sentit C. Bauh. qui pro iconè Matth. ponit similem iconem Clusianæ. Camerarius in hist. Germ. & in Epit. nouam iconem ponit Tulipæ nomine. Schvven. Tulipa præcox rubra. Narcissus 5. Matth. Roter Tursischer Tulipan.

Tulipam rubram primò vidi Montebardi in horto Ill. mei Principis allatam ex Italia, pulcherrimus sanè flos omnibus admittendus, ex rubro fuscus cum vngibus luteis quotidie se expandens & recludens, multis diebus integer remansit mense Aprilis. Casp. Bauh. attulit bulbum, is non se propagauit, & tandem perit.

TULIPA PRÆCOX ALBA.

Tulipæ alba flos omninò candidus est, nisi tria exteriora folia dorso cineracei vel interdum etiam cærulei quidpiam coloris admixtum habere viderentur: vngues lutei, nonnun-

quam veluti fuligine aspersi, apices & stamina pallent. Huius (inquit Clusius) quibus vngues prorsus albi essent, apices nigricantes. Iam antè monuimus iconem hoc loco positam, in Pannonia olim locatam à Clusio sub titulo Tulipæ præcoxis luteæ, erit fortè ex prædicto loco transfere-



tenda dicta flava siue lutea & quæ hic alba dicitur eo relegenda: nobis tamen novus inde oritur scilicet quod in Iconibus Plantini pag. 118. hæc eadem sit icon sub hac inscriptione Lilio-Narcissus sanguineus puniceusve obsoletus tribus exterioribus interonatis foliis, internis vero retulis Lob. 67. Teut. 165. sanè icon non responderet titulo: interna folia non apparent in icone retula. Tulipa alba præcox in horto Ill. E. C. W. multis annis duravit non se propagans, ad hæc spetare potissimum referendus Narcissus Matthioli 15. Lob. etiam in Obs. meminit Lilionarcissi præcocius nunci.

TVLIPA PRÆCOX PURPUREA.

Purpurea Tulipa alias saturatior est, & violatæum, siue anachystinum colorem habet, alias Prænox floris æmula, nonnunquam dilutior, & Damascenam siue Prouincialem (quam eruditiores Prænestinam vocant) rosam colore referens: interdum vero ad eod. diluta, ut albescere videatur, aliquando ex purpura nigricat & obsoletior est: omnium autem vngues cum apicibus aut pallent, aut lutei sunt coloris, tamen nigros etiam apices habeant nonnulli, & pediculos eas sustinentes quadam veluti fuligine infectos. Inueniunt & odorata, & inodora.

Facere vero non potest, quin hic adiciat Clusius, quæ circa simplices has, & vnius coloris Tulipas obseruauit. Habunt enim anno 1585. & aliquot subsequentibus, cuius flos cum præcedentibus annis elegans ruber fuisset, postea variè commixtus ex rubro & flavo inter se confusis coloribus, modo flavo medium quasi folium occupante, modo rubro, vel utroque radiatim per oras discurrente, fuerit. Similiter flavam quæ flavam, & rubrum: & purpuream quæ album & purpureum colores variè inter se commixtos, & radiatim folia secantes tribuerint. At illud etiam obseruabat, quod quorundam natium colorem mutarunt, subinde corrumpi solitas, voluisse tamen ante, hæc colorum varietate heri sui oculos oblectare, tanquam ipsi extremum vale dicturæ. Quam hic iconem ponit Clusius pro Tulipa præcoce purpurea apud Icones Plantini p. 129. posita est pro Lilio-Narcisso purpureo violaceo Lob. 67. T. 165. In Pann. Ital. Italiam iconem habebat Clusius pro Tulipa præcoce purpurea, quæ in lib. 16. Plant. ita inscribitur, Lilio-Narcissus sanguineus puniceusve 8. Lobel. 66. Teut. 165. Schwench. Tulipa purpurea præcox, leibfarbner Turckischer Tulipan.



Tulipa præcox purpurea.

Tom. 11.

TVLIPÆ PRÆCOCES VARIAE.

Tulipa varia adeo multiplex est, ut difficile sit omnes eius differentias verbis exprimere. Nam cuiuscunque tan sem præcocius Tulipa semina excussa, & tellure sepulta germinant, non omnia retinere natium matris colorem, in varios colores transformant flores, præsertim Albæ, cuius semine prognatas plantas insignem colorum varietatem præ reliquis narcissi, experientia & diligenti obseruatione didicit Clusius. Semina enim in eodem capite nata, à semetipso collecta, eodemque fere momento terræ Autumnino commissa (quo tempore, non verno, ferenda sunt omnium bulbacearum & tuberolarum semina, ut feliciter proveniant, vel etiam maturius, cum sponte defluant) plantulas proximo subsequente vere produxerunt, quæ post quintum, sextum, septimum, imò etiam (ut alie aliis facilius adolefcunt,) octauum, nonum, & decimum annum flores protulerunt, eosque aut omnino albos & matrem referentes, aut albos varios, vel purpureos, ac purpureos varios, quorum videlicet purpurea folia albis oris ornata fuere. Quantum ad Flauas aut Rubras attinet, pleræque proles matris colorem retinent: sæpe etiam in alium commutant.

TVLIPA PRÆCOX LVTEA VARIA.

Luteæ variæ Tulipa flos explicatus, nonnunquam primis diebus totus luteus apparet, quarto deinde, aut quinto demum die, illius folia rubris virgulis, extrinsecus leuiter per oras distinguuntur, interiore parte omnino lutea remanente, præsertim tertia externa, & vnguem

nonnunquam habent veluti fuligine tinctam, apices interdum luteos, & pediculos eos sustinentes fulcos. Interdum externa floris tota circa medium ratis rubris radiis insignita sunt, interiora autem frequentioribus, & ad extremum usque folium fere excurrentibus, atque aureos vngues: pallida stannina habent. Nonnunquam exteriorum foliorum ora foris plane rubent, interiora a medio ad extremas oras rubris virgulis distinguuntur, interiora folia externe omnino rubent, interne autem à medio ad summum, rubrum necnum proctensum habet: latera vero rubentibus radiis exornata. Sunt etiam quorundam exteriora folia dorso omnino lateo sunt, per oras vero, dilutiori cinnabaris colore virgatim distincta, interiore parte ad vnguem usque cinnabaris color tota occupat, interiora autem folia



Kkk 3

cinnabaris etiam colore omnino infecta conspiciuntur, nisi duplex uetus luteus secundum longitudinem, & lutea virgula in extremas oras excurrerent, illius apices nigricant, pediculi eos sustentantes lutei, nonnulla tamen fuligine infecti, vngues aurei, magni, stamina quodammodo superant. Aliorum exteriora tria folia mucronata & lutea sunt, prater oras, quae purpuram rubescere radiatim intercurrente insigniuntur, deinde extremae orae luteae sunt, interna parte circiter medium folium, frequentes rubri coloris radios habent: interiora folia, orbiculato mucrone praedita ab infimo ad summum oblongis rubris lineis distinguuntur, prater extremas oras quae luteae sunt, interior pars minus radiata quam exterior, vngues magni lutei, quemadmodum stamina cum suis apicibus, hi odorati. Est & cuius folia extremam cuspidem orbiculatam habent, foris omnino aurea, luteis oris: intus autem omnino lutea, aurei siue potius rubri coloris, flauo permixti, linea radiatim medium folium, transuersumque secante: pediculi lutei sunt, apices cineracei: aliquantulum odoratus est. Cuius item folia orbiculato prorsus sunt mucrone, dorso in extremum usque mucronem luteo, oris latis, ex aureo rubris, vnguibus luteis dimidium folium occupantibus, staminibus & apicibus luteis: nonnihil etiam odoratus. Alii similiter huic pares, sed dilutioris colore praediti, staminibus & apicibus duntaxat variantibus: sed nec hi odore carent.

Icon à Clus. proposita iam olim exhibitae erat in Pannonicis sub eodem titulo: eodem lib. icon. Plantini reperitur p. 133, cum hac nomenclatura Lilio-Narcissus luteus coccineis rubentibus oris Lob. 67. Teut. 167.

TVLIPA PRÆCOX RUBRA VARIA.

Descriptio



TVLIPA praecox rubra varia flos, exteriora folia magna ex parte mucronata habet, interiora orbiculata. Aliquando autem utraque magnis oris aut fulgore splendentibus, sunt praedita, magnis vnguibus luteis, apicibus vel nigris vel obsolete purpureis & staminibus, ea sustentantibus

plerumque velut fuligine infectis: huius flos satis odoratus est. Interdum exteriora folia luteas oras foris habent, interius autem dilutius rubent, & quasi radiatim in luteas oras satis latis rubedo desinit: interiora vero similiter rubent, sed latiores oras habent, rubro colore, radiatim ut in exterioribus desinente, vngues luteos, stamina cineracei coloris: & istius flos nonnihil odoratus. Nonnunquam dilutioris minui colore rubent, utraque folia, mediocres oras habentia,

foris minui colore interiora folia fere tota occupant, virgatim tamen in oras luteas delinente, magnis vnguibus flauis, apicibus cineraceis, pediculis ea sustentantibus luteis, flos utique etiam odoratus. Aliorum exteriora folia, medio dorso luteo sanguineis virgulis distincta sunt, reliqua parte rubra, oris tamen luteis: interiora omnino fere rubra, sed rubro colore radiatim in aureas oras desinente, interiore parte tota prope modum lutea, nisi circa medium folium rubris radiis distinguerentur, vngues cum pediculis luteis, apices nigri. Quorundam folia omnia mucronata, externae dorso lutei coloris, reliqua parte sanguinei, prater oras quae luteae sunt, internae sanguineis radiis tota resperfa, extremis tamen oris luteis: interiora foris sanguinis modo omnino rubent, luteae seu flavae orae sunt, coloribus tamen sese inuicem commiscenibus, interna parte omnino flava sunt, nisi circa medium crebrioribus sanguineis radiis instar orbis quodammodo insignita essent: vngues, stamina, & apices cum superiore genere conueniunt. Sunt aliorum etiam omnia folia mucronata, oris aureis, reliqua parte rubris: prater exteriorum foliorum dorso, quae aureis quibuldam virgulis aspersa sunt, omnium vngues lutei radiatim in rubro commixti, pediculi lutei, apices nigri. Nonnullorum externa folia mucronata, interna orbiculata, tota rubra, exceptis oris, quae aurei coloris sunt radiatim in rubro desinentis: exteriora vero folia saturatiora sunt, omnia tamen interiore parte magis aurea sunt, vngues, stamina, pediculi, cum praecedente conueniunt: omnium istorum flores satis odorati. Inuenitur etiam cuius folia paruas oras aureas habent, elegantissimo rubro colore reliqua occupante, vngues flauos, stamina veluti fuligine tincta, apices obsolete purpureos. Haec Clusius.

Clusius icones duas suas sub eodem titulo posuerat in Pann. quandoquidem ante in lib. icon. Plant. p. 133, sint posita cum his titulis, integra planta pro Lilio-Narcisso luteolis auersa parte foliis secundum ora striis rubris decorato, intus vero luteo amareno: plantae non integrae titulus, Lilio-Narcissus luteus hilaris, oris rubris, striatis, carina subuicidi: Teut. 167.

TVLIPA PRÆCOX ALBA VARIA.



Descriptio

TVLIPA praecox alba varia aut omnia folia extrema parte mucronata habet, aut tria duntaxat exteriora, sed interiora orbiculata. In nonnullis externa folia ad extremum usque omnino fere alba sunt, exceptis oris quae elegantis & dilute admodum purpureis, siue carneis, ut ita dicam, coloris


coloris sunt: interiora verò magis purpurascunt, vngues lutei, deinde exalbidi, stamina cum suis apicibus flava. In quibusdam exteriora folia exalbido sunt dorso purpureis virgulis asperso, reliquâ parte purpurascente aut incarnatâ: interiora folia omnino purpurea sunt, vngues stellatim flavi, deinde albi, apices lutei, pediculi eos sustinentes veluti fuligine aspersi. Aliorum externa folia albo etiam tunc dorso, pluribus purpureis punctis distincto, inferiore parte dilutior purpura nitentia interna folia saturatioris sunt purpurea quâ in superiore, vngues flavi radiati stellâ instar, apices nigri, fusci pediculi. Interdum externa folia magnas oras carneo colore præditas habent, reliquâ parte alba: interiora verò quasi carnei sunt coloris. Nonnunquam externa folia pallescente sunt dorso, alia omnino alba, præter oras quæ foris brevibus & raris purpurascens radiis exornantur: interiora tota alba sunt. Quorundam exteriora folia dorso & extremo mucrone pallent, alioqui candida omnino, orâ interiore parte paucis purpurascens radiis distinguuntur: interiora folia à medio ferè ad extremas oras purpurascens radiis foris aspersa sunt, intus verò omnino alba, præter oras quæ rarioribus virgulis distinctæ sunt. Aliquando externa tria folia prorsus alba sunt: interiora autem oras nunc paucis, modo multis purpurascens radiis siue carnei coloris virgulis distinctas habent: omnium vngues flavi sunt, apices & pediculi pallent. Invenitur etiam cuius omnia folia coloribus quidem albo & carneo permixtis prædita sunt, sed qui cineraceum carneo colori temerè persusum referant, vel similis planè coloris cum tenuiore illo sericeo panno carnei coloris, cuius subtegmen album est, Germani Silberfarb/hoc est, argenteum colorem vocant: huius vngues exalbidi, apices obsoletè purpurascens, pediculi albi sunt.

Lobel. Icon. Pl. pag. 127. eadem est figura cum Clusiana [quam etiam in Pannonicis habebat] cui titulus est Lilio-Narcissus coccineus, rubentibus oris, mediis foliis candicans, & ad basin notulis rubris cordis effigie, aspersis, Lobel. 67. Teut. 165.

TULIPA PRÆCOX PURPUREA VARIA.

Purpurea Tulipa variz flos magnâ ex parte omnia folia mucronata habet, interdum tamen externa duntaxat mucronata sunt, interiora autem orbiculata & obtuso mucrone prædita: est etiam cuius omnia folia orbiculata habent mucronem, ut ex singulorum descriptione videre licebit. Nonnunquam igitur omnia folia mucronata præmixta polyphyllis, & pleno flore, purpureum colorem imitantur, orasque habent ex albo purpurascens, vngues, ex luteo viridique coloribus, simul quodammodo permixtis, subobscuros, exalbido orbe radiatim eos ambiente, pediculos flavos, sed veluti fuligine infectos apices nigros: illius flores magni sunt & admodum patuli. Mucronata etiam singula folia, foris ut plurimum purpurea sunt, interius mediâ parte carnei coloris, oris ex albo pallescentibus, vngibus, staminibus, & apicibus flavis siue luteis. Interdum omnia folia mucronata, foris & intus purpurea sunt omnino, extremasque oras albas

habent, vngues luteos albo orbe circumdatos, apices obsoletè purpurascens initio, deinde ubi obverti sunt (solent enim omnes bulbacei generis florum apices explicante sese flore se aperite & invertere) flavo polline aspersos, flavos pediculos. Aliorum singula folia etiam mucronata, & saturatior purpureo colore prædita, omnium orâ exalbida, vngues albi, in imo tamen flavi, apices & stamina pallida. In quibusdam omnia similiter folia mucronata, sed color purpureus dilutior, magisque floridus, orâ exalbida, vngues ex viridi pallentes, pediculi nigrescentes, apices pallidi: odoratus est plerumque istarum Tuliparum flos, reliquarum inodorus, ut etiam subsequenti.



mucronata, obscurioris purpureæ, & quasi anethistim colore prædita sunt, magnis autem oris albis, vngibus, staminibus & apicibus flavis. Quorundam contra florum singula folia orbicularis sunt oris, usque magnis & albis, reliquâ parte saturatior, nitentique purpureo colore prædita, flavos vngues à

bit albus oris, cineracei apices, flavi pediculi. Nonnullorum interiora folia aliquantulum orbiculata, dilutior purpureo colore splendent: interiore parte tota ferè alba sunt, omnium orâ magnæ, albæ, vngues, stamina & apices flavi coloris. Reperitur etiam cuius externa folia mucronata & reflexa, exteriori parte obscurioris purpureæ colore prædita sunt, interiora verò orbiculata & dilutius purpurascens, utraque autem in magnas albas oras desinentia, & interiore parte veluti purpureum orbem, totum florem per medium ambientem habentia, luteos & flavos vngues albo orbe inclusos, apices obsoletè purpurascens, flavos pediculos. Est præterea cuius omnia folia mucronata, & tria externa foris purpurea; omnia autem magnis oris albis prædita, interiori parte omnino alba, nisi mediâ eorum partem veluti purpureus oris secaret & varium faceret, cuius vngues flavos ambit albus circulus, stamina cum apicibus pallent.

Sed antequam finem huic capiti imponam (ait Clusius) adicienda putavi, quæ circa Tulipas, semine Constantinopoli missio natas, observabam. Magnum seminis illarum cumulum acceperat Ill. vir Augerius de Busbeque cum plerumque bulbaceis stirpibus eo anno quo Viennam venit: hæc, cum sequente anno in Gallia præficeretur, mihi reliquit: ea verò demum annis 1574. & sequente 1575. confestim [quod verum esset] & vieta, vizque nascitura existimarem, terræ mandavi. Ex his tamen argens Tuliparum numerus prognatus est, quarum nonnullæ quinto, sexto, atque etiam sequentibus annis flores co-

lerunt insigni colorum varietate commendabiles. Nam flauos omnino, rubros, albos, & purpureos, vel ex his coloribus inter se commixtis, hoc est flammam variam, rubram variam, albam variam, purpuream variam, nactus sum præcoces: sed inter illas etiam fuerunt, qui diligentius obseruanti, potius ad Dubiarum vel Serotinarum Tuliparum classem referendi videntur, quam Præcocium: nam licet æquali cum præcocibus, magnitudine nonnullæ assurgant, eodem tamen cum Dubiis, siue serotinis, tempore florere animaduerti: de his autem suis capitibus, Tulipa Byzantina genus alterum flore bino, rubescens & vario, mislum cum hac inscriptione *Lilæ de duobus floribus*, habet etiam Clusius, Præcocium sic concludens tractationem. Hæc sunt quæ de Præcocium Tuliparum varietate commentare libuit, nec me fugit, quin plures aliæ differentiæ tradi potuissent, sed eiusmodi, quas ad hæc enumeratas, tanquam primarias reduci, atque comprehendere sub illis posse existimo.

Lobel. ic. Pl. p. 129. habebat eandem cum Clusio iconem sub titulo Lilio-Narcissi rubelli nitidi, candidis oris Lob. 67. Teut. 166. Ipse etiam Clus. habuit in Pannoniis.

TULIPA PRÆCOX AMETHYSTINA varia.

Descriptio



Aces purpureas variis Clusii nobis videtur referenda præcox nostra Amethystina variæ cui Bulbus, cuius folia Amethystino colore & saturatiore quadam purpura tinctus, albis hinc inde maculis conferta. Oræ pulchre variant, sed dilatiore vbiq; in extremo etiam terè candicant,

versus quod purpureæ striæ excurrant, quoddam quasi stamen representantes. Ungues speciosi aurei, ad tertiam folii partem strias flauas quoque, aureoque nitore splendentes, emittunt. Apices flauis, stilus ut in aliis triquetris.

Locus & tempus.

Aprilis initio floruit in hortulo Ducis Wirtemb. quem colit elegantissimum in Castro Mörbelgardensi.

TULIPÆ SEROTINÆ

Serotina Tulipa, maiore est amplitudine, cubitale enim & tripedale interdum, habet caulem, firmiorem, crassiorem, rotundum, fungosa materie plenum, & breui etiam incanaque veluti lanugine, siue efflorescenti quadam, aspersum: hunc alternatim amplectuntur quaternæ plerumque folia, nonnunquam quina & sena, cæcinata, firmiora, quam in Præ-

cocis, ut plurimum erecta, non sursum aut ad terram inflexa, atque oris interdum adeo reflexis, ut sinuosa videantur, aliquando omnia æqualia. Summo cauli, qui pedali vel maiore plerumque, imò cubitali etiam nonnunquam longitudine, nudus supra folia eminet, vnicus infidet flos, magnus & oblongus, cyathi modo concavus sex foliis constans, extremo apice omnino mucronato vel orbiculato, aut tribus exterioribus duntaxat mucronatis, interioribus orbiculatis, ut in

Tulipa serotina Tuliparum minor.



Tulipa Serotina Tuliparum maior.



Præcoce, & e contra: caput in illa triangulari, membranaceum, crassius vix plurimum, & prominulo ventre, quo à summo dehiscens, sex ordines seminis plani, cartilaginei, fului, aut rubescentis, maiorisque quam in Præcoce conspiciuntur: radix præcoci similis, longiore tamen maioreque bulbo constat, plerumque in reliquis cum illa conueniens.

Tametsi autem hæc Tulipa non lecus ac præcox vincto vix plurimum conuicta caule, cum tamen interdum & ramulum habet: nam nate multi sunt rubro flore atque etiam flauo præditi, quibus ex infimi folii alii alter nudus & pedalis terminus, gracilior tamen, & ad summi folii

exortum tertius, crassitudine primarium caulem propemodum æquans, eademque altitudine nudus extelescens, adnascere, singulicam suum florem sustentens: interdum quaternæ, quinæ, & plures, frequentius vero accidit ut vincto ramo donetur, quam binis aut pluribus. In hac porro tam insignem colorum varietatem non deprehendi, sed flauas duntaxat, vel ad aurum colorem inclinantes, & rubras, quibus plerumque nigris, orbe aureo cinctis, atque vel odorato, vel inodoro flore.

Habebat Clusius in Pannoniis iconem Tuli-

pa polydonos minoris. Schvvenck f. Catal. Silef.
Tulipa lutea 2. Tulipa lutea polyanthos, Baler
Tulipan nux violen blumen.

TVLIPA SEROTINA FLAVA CVI quatuor folia in caule.



Tulipa se-
rotina
flava eiusdem
ferè coloris
est cum Præ-
coce, hoc est,
dilutioris &
quodammodo
flavi, vel pal-
lescentis, vel
intensioris, &
quasi auti mo-
do rutilantis,
vidi etiam cu-
ius foliorum
oræ sanguine-
is guttis asper-
sæ essent: fo-
liorum ungues
plerumque
ceræ recentis
colorem refe-

rent, interdum nigricantibus quibusdam venis
distinctis, conspiciuntur, vel nigra maculâ notari:
apices cum pediculis vel flavi sunt coloris, aut
cineracei, vel fuligine quadam infecti, aut omni-
no nigri.

Apud Lobelium Obs. p. 66. & in Icon. Plant.
p. 155. Figura est eadem cum Clusiana, cui titulus:
Tulipan siue Lilio-Narcissus latifolius obtu-
sus, phœniceis rubentibus oris Lobel. 66. Teut.
189. Hist. Lugd. Tulipa siue Lilionarcissus lu-
cus latifolius.

TVLIPA SEROTINA RVBRA.

Rubra serotina Tulipa color plerumque sa-
turatior est, & quali nigricat, interdum di-
lutor & perelegans: foliorum ungues aut omni-
no flavi sunt, quales in quibusdam præcocibus,
aut omnino nigri, qui Sole illustrati caruleum
quidpiam, permixtum habere videntur, vel ma-
culâ nigra nunc minore, modò maiore [câque te-
nu orbe aureo inclusa, ut oculum quodammodo
exprimere videatur, quâ de causâ à nonnullis O-
phio de Sole, hoc est, Solis oculus cognominatur]
flavum insicente, nonnunquam etiam totum fe-
rè occupante: apices cum pediculis vel omnino
flavi sunt, vel nigri, interdum apices cinerei co-
loris, & pediculi flavi. Cæterum harum Sero-
cinatum Tuliparum quæ vel flavi, vel rubri co-
loris flore præditæ sunt, nullæ hæcenus varia-
tem in latrone Clusio pepererunt, nisi quidd in-
terdum ex rubra semine, flava: contra ex flava
semine, rubra, natæ sunt, vnguibus sæpenu-
mero variantibus.

TVLIPA COCCINEA HOLOSERICEA.

Tulipa Coccinea, per terram spargit folia la-
ta, longa, carinata, & crebro flexu refle-
xus pulchrè undulata, colore glauca, alia è

caule orta repada, non ita undulata: caulis teres,
virescens, florem sustinet unicum omnes cocci
corinas amœnitate superantem, foliis surrectis
calathum effligantibus coccineo colore tin-
ctis, tribus tamen exterioribus externa
parte minùs hilaribus, atque his quædem foris
ungues luteoli, intus nigri sulco croceo ambiti:
interioribus, tam extrâ quàm intus ungues nigri
sulco similiter croceo circumscripti: in fundo
latent tres apices breves nigri, ex duarum me-
branarum quasi coitu seu cohesu compositi, pul-
visculo atropurpureo conspersi, quorum mediâ
occupat stilus longior triquetris ex lateo vire-
scens, capite triplo latiore, fimbriis multiplici
implexu crispis compacti, florens Aprilis in
horto Ill. E. C.

TVLIPA DVBIA.


Tulipa medio inter præcocem & serotinam
tempore florentes, videlicet quæ marce-

Descriptio

Tulipa dubia, maior.



Tulipa dubia, maior altera.



sciente præco-
cium flore su-
os explicant,
& serotinis
florere inci-
pientibus iam
senescunt, imò
interdum cum
illis etiam flo-
rent: Dubia
quodammodo
appellari pos-
sunt, cum v-
triusque ge-
neris natu-
ram refertant.

Sunt verò
inter eas non-
nullæ, quarum
flores & ipsa
planta seroti-
narum magni-
tudinem æ-
quant: aliz
quæ præcoces
non superant,
nec illis for-
ma sunt absi-
miles, & illæ
quidem vel
amplissimis
floribus præ-
ditæ, vel præ-
coce non ma-
ioribus: sunt
etiam quædâ
præcocibus
humiliores.
Singularum
autem diffé-
rentias quamdi-
lucide poterim-
us hæc expli-
cabitur, eandem
videlicet quæ
nobis sunt co-
spectæ: nam
quis reliqua-
rum infinitam

varietatem verbis exprimere queat?

*Dubia ma-
ior.
Pallidus.
flor.*

*Flava orbi-
cularis oris
flor.*

Aurea.

*Flava cum
rubris ve-
nit.*

*Albae
flor.*

*Orbicula-
ris aurea.*

*Albae
flor.*

*Saturata
virens.*

*Lilioneus
flor. luteus.*

*Lilio-Nar-
cissus pha-
nicus.*

Dubie igitur maiores, florem non minus am-
plum habent quam ferotinae. Illuminae vel
pallidum admodum, vel flauum, omnibus foliis
mucronatis, & vnguibz flauis instar Ceræ re-
centis.

Inuenitur etiam cuius omnia folia omnino
flaua, extremas oras orbicularas habent, ad præ-
maturi autrei Mali colorem accedentes: stamina
cum apicibus flaua sunt, illius flos odoratus.

Alia item cuius color omnino aureus, exter-
na deinde folia flauo dorso prædita, oras dilutio-
ris cinnabaris colore radiatim distinctas adqui-
runt: interiora verò folia cinnabaris etiam co-
lorem, atque insuper binos luteos nervos secun-
dum longitudinem, & flauos radiolos in latera
excurrentes: vngues huius magni, flauis, altitudi-
nem superant apicem, qui nigri sunt, pediculi fla-
uis, sed fuligine infecti.

Nonnunquam omnia folia orbiculato mucro-
ne prædita flauis coloris sunt, rubris ventis secun-
dum eorum longitudinem excurrentibus, nunc
tenuibus, modo rarioribus, atque etiam totum
dimidium folium interitum inficientibus.

Sunt quibus flores dilutius rubent, & cinnaba-
ris colorem quodammodo referunt, omnium fo-
liorum extremis oris mucronatis; vel saturiores
sunt, & quodammodo nigricant, exterioribus
foliis mucronatis, interioribus orbiculatis: vn-
guibus flauis, magnis vel parvis, nonnunquam
veluti fuligine aspersis, vel in omnibus foliis, vel
in exterioribus duntaxat: apices modò flauis &
leniter nigricantes.

Aliarum flores sunt coloris albi, exoleti, qui
ex ætate idicci queat; nam folia ex albo palle-
scunt, eorumque dorsum flavescent: interiora folia
orbiculata, vngues, & apices pallent.

Nonnullarum flores omnia folia habent ex-
tremo mucrone orbiculata, dilutissimi purpurei
coloris, & quodammodo carnei, maximos vn-
gues albos, quæ capiti adhærent flavescentes,
cum staminibus & apicibus.

Quarundam paullo saturatius purpurascunt,
& aliquatim prædulcium præcociorumque ru-
bescuntium vuarum quas Germani Terminer/
Austriaci Muscateller appellant, colorem refe-
runt: interiora folia orbiculata, vngues cum api-
cibus flavescent.

Reperiuntur item quarum flores saturæ ad-
modum sunt purpureæ, & nigrorum accidorum
Cerasiorum succum præ se referunt. Austriaci
moxel farb vocant: hærum vngues vel subca-
rulei sunt, vel ex caruleo nigricantes, stamina
fusa sunt.

Tulipe dubie primæ maioris Clusii icon fuit
inter icones Plantini p. 134. hoc titulo, Lilioneus
luteus phœniceus confusè mixtus Lobel.
65. Teut. 164. Alteri autem Tulipe iconi titulus
fuit, Lilio-Narcissus phœniceus peramensis oris
luteis Lobel. 65. Teut. 168.

TVLIPA DVBIA SECUNDA media prima.

Tulipe Dubie mediæ, quæ amplissimum flo-
rem habent, paucæ sunt à me obseruatæ. Ea-
rum vna valde pallidi coloris, coctum sulphur
fere referentis propterea Austriacæ nobiles ma-
ioræ Schwebelsfarb, id est, sulphurei coloris
cognomen illi indiderant: omnia eius folia mu-
cronata, vngues fuligine infecti. Eius vnicum

bulbum Byzantio allarum habuit Generosi Do-
de Haysenstein, quæ illius prolem communis
uit: floruit quidem illa anno 1586. & bonum se-
men dedit, sed subsequens rigida hiems cum
matre corrupta: semen anno sequente tetræ co-
missum. Viennæ in meo hortulo (inquit Clusius)
relictum.

Altera flauis elegantis coloris florem habet

cuius omnia
folia mucro-
nata, nigri
vngues, nigri
apices, fuligi-
ne infecti po-
diculi. Hæc
anno 1589.
florem mihi
tulit sedecim
foliis constan-
tem, eius ve-
rò proles tre-
decim: ar se-
quente anno
mater duntaxat
octo, pro-
les sex.

Tertius flos
ex flauo & rubro
rubro colori-
bus permix-
tus, magnis

sex mucronatis flauisque foliis constans, quæ ab
ungue omnino nigro, rubras venas per foliorum
longitudinem radiatim excurrentes, & in latera
spatias habet, nunc raras admodum, modò den-
tas & confertas.

Icon Clusii est in lib. icon. Plantini p. 132. cum
hæc inscriptione, Lilioneus luteus candidus suæ
rubentibus oris, Teut. 167.

TVLIPA DVBIE TERTIÆ mediæ secundum genus, flore præcocius æquali.

Tuliparum Dubiarum mediaram, quarum
flores præcocius sunt æquales, & caules in-
tra illarum ma-
gnitudinem
nonnunquam
constituunt, ve-
l plurimum au-
tem Dubia-
rum maiorum
altitudinem æ-
quant, multi-
plex est genus,
cuius differen-
tiæ difficillius
distingui pos-
sunt quam præ-
cocium, ob va-
riam colorum
mixturem per
totos flores
interdum dif-
fusam, vt lon-
ga & diligente
obseruatione
didici, inquit
Clusius, ali-
quas

Tulipa Dubia 3. media 1.



Descriptio

quas tamen ex his quae vel mihi floruerunt, vel apud alios creuisse significatum est, quia potero perspicuitate, pro ingeni mei tenuitate describam.

Sunt igitur quaedam Flauae dilutiores vel pallidiores, quarum externa folia quodam-

Tulipa Dubia media r. versicolor.



modò foris virescunt: aliae quarum folia orbiculata sunt, vngues tamen subvirescunt: quarum item folia flauis coloris elegantis, interiora tria supernè orbiculata, & quibusdam sanguineis guttis aspersa: Nonnulla omnia folia flaua habent, vngues cerei coloris, quales alioqui serotinae habet: aliae quarum vngues nigrae

& splendente macula sunt insigniti, vel ex fusco & viridi coloribus commixtis persuli.

Nonnullae Flauae variae sunt, nam licet omnia folia initio flaua sunt, tertio tamen vel quarto die postquam explicati sunt flores, singula folia tamen limbo rubro exornata conspiciuntur, nonnunquam etiam in proliis (nam satis fertifica est nullus apparet, vel alternis dumtaxat annis conspiciuntur: quaedam flaua folia habent, oras autem cinnabaris ferè colore infectas: aliarum folia pallidiora sunt, & rubris venis ornatas habent oras: quarum item folia etiam pallent, sed persufus est Mali aurei praenaturae color, praesertim circa oras: inueniunt etiam versicolor elegantissima, cuius color flauus & ruber ita commixti sunt, vt e sericeo panno flauo, cuius subtegmen rubrum est, constare flores videantur, illius vngues nigri sunt.

Aliarum flores albi quidem sunt, sed in flauum degenerantis coloris qui *viriditior*, qualis in Dubia maiore descriptus est, harum folia vel omnia mucronata, vel interiora orbiculato mucrone cōstant, vngues, stamina, apices pallent.

Quaedam flores *mixtae* etiam sunt coloris, sed alius color adiunctus, nam cuiusdam folia omnia mucronata, extremum illum mucronem rubro colore tinctum habent: alia pallidiora sunt, & oras rubris venis distinctas habet: in nonnullis foliorum ora, vel purpureis venis distincta, vel carnei coloris omnino sunt, qui etiam media folia occupat.

Vnam habui A.V. serotinae semine natae quae anno 1589. florem prius album protulit, licet initio virescens color persufus quodammodò conspiceretur, staminum apices fusci fuerunt.

Nonnullarum flores A.V. sunt octauae A.V. praecoci similes, ique, vel dilutiores, interioribus foliis quodammodò orbiculatis, vnguibus nunc exalbidis circa summum purpurascens macula sanguinis, staminibus exalbidis, eorum

apicibus nigricantibus, modò vnguibus & staminibus candicantibus, vel vnguibus exalbidis subcaeruleo orbe inclusis, albis staminibus, nigricantibus apicibus: aut saturatioribus foliis praesertim exterioribus mucronatis, omnium oris candicantibus, vnguibus exalbidis subcaerulea macula insignitis, albis staminibus, apicibus eorum nigricantibus: quarundam folia mucronata dilutioris sunt coloris aut saturationis. Inueniuntur etiam quarum flores plurimum ad A.V. praecoci secundae & tertiae colorem accedunt: & alia semine à Boisor misso nata elegans in cuius flore purpurex venae per totum folium dispersae sunt, floruit haec primum anno 1590.

Purpurearum flores coloris nunc sunt dilutioris & magis floridi, foliaque interiora orbiculata habent, exalbidos vngues, purpurascens stamina, eorum apices nigricantes: modò quasi similes Purpureae dilutiori dubiae maiori, candicantibus oris, vnguibus vel ex albo flauescantibus, vel flauis omnino, aut veluti fuligine infectis, aut ex caeruleo, flauo, & subvirescente coloribus commixtis: modò saturatioris coloris, cui albicantes tamen quaedam venae permixtae sunt, vnguibus aut ex flauo nigricantibus, aut flauis omnino, aut ex viridi nigricantibus, aut subcaeruleis, siue ex caeruleo flauescantibus, aut caeruleis omnino, nisi flauescens orbis ambiret: Sunt etiam quarum flores dilute purpurei illum ferè colorem referunt, qui in Caryophylleis floribus remissè miniatis & Silesia primum delatis conspiciuntur, Viennenses & Silesiae matronae Pommeranzfarb / quali autem Mali colorem illis tribuunt, quia dilutius rubenti colori flauus quodammodò persufus videtur, horum color vel dilutior, praesertim interiore parte & per oras, vel saturatior, interdum interne dilutissimus, foris saturatior, vngues vel flauis, vel flauum colorè fuliginosus ambit orbis, vel ex viridi nigricant, vel fusci sunt: vidi etiam quarum flos ad postremam differentiam Secundi generis valde accederet, rubro tamen colore alium superante: quaedam plurimum accedunt ad eamque inter Dubias maiores octauo loco reposita est, verum humilior, foliis interioribus orbiculato mucrone praeditis, vnguibus vel omnino albis, vel candicantibus, & superiore parte ad caeruleum colorem tendentibus, staminibus exalbidis, apicibus ad fuscum vrgentibus, vel vnguibus caeruleis, aut ex caeruleo virescantibus, vel nigricantibus: aliae Dubiarum maiorum nono generi similes ferè, licet minores, quarum vngues vel fusci sunt, vel ex caeruleo nigricant, vel flauis nigro orbe flauum colorem ambiente.

P.V. florum folia vel dilutioris colore purpureo sunt praedita, vel saturatioris, omnium oris mucronata, vel interiorum orbiculata exalbidis sunt, vngues aut albi, aut subcaerulei, aut albi quidem, sed quos latus orbis carnei coloris ambit, stamina plerumque nigricantia.

Inter reliquas Rubrae mihi natae quarum folia foris ad purpurascens colorem accedebant, interioribus autem coccinei ferè coloris erant, vngues, stamina, apices, flauis: item quarum flores rubri, foliis tamen exterioribus secundum longitudinem flauis color aspersis: & quarum color splendens, sed obscurus & ad laterrimum accedens, vngues flauis vel nigri: praeterea quarum flores R. serotinae similes, quae ab vnguibus nigris, flauo orbe cinctis *Orulus Solis* conuoluta est.

Alia item cuius flos nondum mihi conspectus dum hæc scriberem; verum pictura à nobili viro Io. de Hogelande Lugduno Barauorum missa anno 1590. deinde illius vnica quam habebat bulbuius eiusdem anni Autumnno, cuius flos omnia folia mucronata habet: eaque vt ipse Hogelandius ad me scripsit, initio quidem omnino viridia, deinde oris veluti pallescentibus, quæ tandem in rubrum colorem mutantur radiatim sese alteri colori commiscens, color etiam ille viridis senescente flore elanguescit, præsertim interiore foliorum parte: & sanè subsequētibz annis bulbuius ille florem mihi dedit, qualem descripserrat. Sed & alia semine mihi nata est, quæ similem florem produxit Lugduni Barauorum anno 1595.

Sunt omnes hæc dubiæ mediæ secundæ classis [præter postremum genus] mihi natæ semine, vel Byzantio allato, vel à Nobil. Virol. Boisor communicato, vel (quod magis mirandum) aliquot etiam præcoces. Nam anno 1586. ex purpureâ præcocius florēte habui P. serotinam elegantem dilutiorem: & P. V. autem præcoccæ, P. serotinam ad rubrum quodammodo tendentem, & P. V. serotinam dilutiorem elegantem: Anno sequente rursus à P. præc. Rub. serot. elegantem, ad carneum colorem accedentem, vnguibus ex caruleo nigricantibus: 1588. autem anno à P. præc. & P. serotinam: R. serot. vnguibus & lacinibus flauis, P. serot. nigricantibus vnguibus, & P. V. serotinam: ex A. præc. Flauam serot. & P. V. serotinam. Contra ex A. V. serotinâ natæ sunt præcoces Alba, Flaua, Rubra, vnguibus flauis, Rubra *Ochro di Sole*, & P. dilutior.

Cuiusdam porro R. V. quæ anno 1597. primum Bruxellæ florem protulit, semine nactus est iam dictus Boisor, & quædam Nobiles matronæ Dubias etiam Tulipas mirâ colorum varietate ludentes, vt ad nunc perscriptum est: etenim & flauas & pallentes, ex albe item pallescentes, siue *oxypurpureas* purpurascētes, intensius aut dilutius rubentes, lateritii coloris, atque aliis coloribus insignitas habuerunt: quibus etiam similes & aliæ elegantissimis coloribus variè mixtis postea mihi semine natæ, & singulis annis adhuc nascuntur, quibus pares numquam antè conspexi: ita Deus in istis floribus admirabilem suam potentiam ostendit.

Ceterum anno 1593. mittebat Iac. Plateau Tulipæ, quæ illi semine nata erat, monstrosæ quidem sed non inelegantis, iconem, colore à reliquis differentem: eius enim flos, ipso referente, prorsus viridis, internè sex parua crassaque alia etiam viridia complectens, caput ambiētia, vt initio parua Brassica florida siue Cypria videretur. Primo quò florem tulit anno, se neglexisse scribebat, vitium aut naturæ ludum esse existimans: sed cùm subsequētibz quatuor annis florem non variare animaduertēret, nullum autem probum semen præbēre, eius rei pertæsus, bulbuius alteri donauit.

Sed & mihi biennio post, ex semine natis serotina mihi florem dedit sex foliis, vt reliquæ, constantem, prorsus virentibus, exceptis oris quæ pallidæ erant, & vnguibus, quæ viridi pallescebant. Floruit etiam mihi anno 1596. alia viridis cuius oræ albæ fuerunt. Breuiter, singuli anni nobis proferunt nouum aliquod Tuliparum genus, nec ante cuiuspiam conspectum.

TULIPA BULBIFERA.



Nos Tulipa bulbifera iconem proponimus ex Clusio, quæ verò de ea scripsit paulo post, vbi de cultura tractabimus, recensentur.

Schvven. Cat. Siles. l. 2. Tulipa bulbifera, Lilionarcissus bulbam ferens in horto. Tabern. icon. Tulipa bulbifera. Narcessen lia tien.

TULIPARVM ICONES EX LOBELIO.
diuerse ab iis quæ Clusius habet in postrema historia.

Multæ sunt figuræ & icones Tuliparum ex Lobel. cum suis titulis in lib. icon. ph. quæ non sunt in poster. histor. Clusii, de quibus hic agere statuius vt illustrior sit historia Tuliparum.

TULIPA LVTEA OBTUSIS
foliis florum.

Nos sæpius obseruauimus in horto Ill. C. Wirtenb. Montbelg. pulchrum genus Tulipæ flore luteo, cui florum foliola obtusa, quæ nō se multiplicabat: cui optimè respondebat [potissimum quoad florem & folia] icon a Lobel. in-



Obsctu. p. 65. secundo loco posita, cuius titulus est: *Lilio Narcessus Chalcædonicus ceruus luteus, sanguineo purpureo par, & similis huic* in iconē florum cui foliola in acutum non desinunt: existimamus trahi à Clusio, pro dubia secunda flaua. Dodonæus lib. fl. eam iconem solam posuit pro Tulipa. H. Lugd. iconem habet

cui flos deorsum inclinatur, alioqui non multum differens à iam dicto: de eo scribit ea: Tulipæ genus

Ex præcoci-
bus inter-
dum seroti-
nis.

Colorum in
Tulipa
summa va-
rietat.


serot. 6.
videtur
ei foliorum
in flore se-
re.

serot. 6.
videtur
pallidæ
oribus.

Tulipæ genus quidam esse arbitrantur plantam quam *Oulendiam* Græcum vulgus appellat.

TVLIPA PHOENICEA LUTEIS ORIS
flore patulo.

Descriptio



Lobeli-
us ob-
serv. iconē
Tulipæ ha-
ber cū hac
inscriptio-
ne, Lilio-
Narcissus
luteis oris,
flore patu-
lo : huius
descriptio
fortè est
quæ antè
posita est
Lobelio se-
cundo lo-
co. In Ico.
Plant. libr.
huius figura
titulus est
est Lilio-
Narcissus

phoeniceus luteis oris, flore patulo. Hist. Lugd. coniunxit hanc iconem cum alia sub titulo Tulipæ luteæ.



candidis oris
Teut. 166. Nu-
dam & hic
absque descri-
ptione exhi-
bendo iconem
Lobelius, Le-
ctores dubios
& incertos re-
linquit.


TVLIPA RUBRA ; ORIS ET VA-
ginulis albis.

Hic, qualis aliis, radix bulbosa : folia quo-
que consimilia, non undulata : caulis sin-
gularis, cubitalis, fuscus. Flos senis, itidem ut al-
ter, foliis constans : singula sanguineo rubore in
media maioreque parte tincta, oris circumqua-
que & vnguibz albidis : apices crocei : stilius
ut ceteris triquetris. Hæc nostra fortè ad præ-
cedentes dubias Clusii referenda.

Schvven. in Car. Siles. meminit Tulipæ rubræ
candidis oris, Lilionarcissi rubelli candidis oris
Lob. Roter Tulipan mit weissen spitzen.


TVLIPA COCCINEA PUNICEAVE
Rutilans.

Descriptio



IN libro Ico-
num Plantini
p. 128. est figura
cum hac inscri-
ptione : Lilio-
Narcissus coc-
cineus puni-
ceusve rutilans,
Lob. 67. Teut.
165. Dolendum
est, quod Lobel.
Tulipas suas, nō
descripserit nec
natales earun-
dem assignarit,
ut rei herbariz
studiosi certio-
ris aliquid con-
cludere possent.
Amplius igitur
de his cogitan-
dum.

TVLIPA NIVEA TOTA.



Sunt in libro Descriptio
Sicon. Plant. p.
131. figuræ duæ
cum hac inscri-
ptione : Lilio-
narcissus niveus
totus, Teut. 166.

TVLIPA COCCINEA GANDI-
dis oris.

Libro Iconum Plantini pag. 140. est figura cum
hac inscriptione : Lilio-Narcissus coccineus
Tom. II.

TVLIPA CANDORE ET RUBORE
confusa.

Hanc iconem invenimus eandem in libro
LII

Iconum Planti-
ni p. 131. titul. Li-
lio-Narcissus cā-
dore & rubore
confusus Teut.
166.




TULIPÆ PVMILES.

Tulipa dubia pumilis.

Descriptio



Tulipa pumilis altera.



Tulipa du-
bia pumi-
lio, pedalem
altitudinē non
superat, imō
ut plurimū
infra eam cō-
sistit, foliis &
flore ad Præ-
cocem proxi-
mē accedens:
floris autem
folia omnia
mucronata:
sed exteriora
multo longio-
ra, foris obcu-
rē rubra, extre-
mis tamen o-
ris virentibus,
interiora om-
nia folia intē-
se rubent &
splendent: vn-
gues flavi ra-
diari, sed quos
nigerrima ma-
cula sic inficit,
ut orbis au-
reus & radia-
tus eam dunta-
taxat ambire vi-
deatur, & ocu-
lum quodam
modo emen-
tiatur: stami-
na cū suis api-
cibus nigricat:
huius radix
bulbacea in-
terdum erio-
phora est, nam
exterior illa
mēbrana bul-
bi substantiam
amplectens &

regens plurimo, denso, candido, mollique tomen-
to suffulta est, ut mollissimē bulbū recubare ne-
cesse sit.

Inuenitur etiam alterum pumilionis Tulipæ
genus, quod mihi (Clusii verba sunt) quidem
conspicuum non est: sed iconem suis coloribus
expressam accipiebam anno 1596. ab erudito vi-
ro Io. de longhe, Ecclesiastæ Middelburgensi
in Matthiæis, addita hac descriptione: Mirro ad
te Tulipæ cuiusdam iconem, ad ipsius plantæ si-
militudinem expressam, hoc est, eadem quā Tu-
lipa magnitudine, paribus caule, flore, foliis [quæ
paullō longiora & angustiora: habere debet] &
bulbo quem erui, ut pictor commodius exprime-
ret. Tribus iam annis continuus in horto habui
florem proferentem, sed vnicum: nec florem ha-
buit quādiu singulari folio prædita fuit, aliarum
Tuliparū modo: nā superiore anno habui flore
suo onustam, & aliam unicum folium producen-
tem, quæ nunc quaterna folia nacta, primum flo-
rem deum tulit, alteri prorsus similem, ut cer-
tum sit id genus maiorem amplitudinem non ad-
quisiturum. n. *Genus ille.* Tota verò planta [quan-
tum ex icone deprehendere potui] palmo maior
non est, quatuor promens folia angusta, carinata,
Tulipæ Mompelianæ foliis similia, interque
cauliculus prodit vncialis aut paullō longior, nu-
dus (præter aliarum Tuliparum morem) ex viri-
di purpurascens, summo fastigio florem gerens
sex foliis constantem, foris nonnihil purpuras-
centibus, intus candidis, umbilicum occupante
oblongo capitulo sex flauis staminibus lecto,
quod an semen protulerit, ignoro: florem autem
tulisse Aprili inde conicio, quoniam sub Maii
initium picturam mittebat, cuius bulbus exi-
guus, bulbitamen aliarum Tuliparum formam
referens, ex spadiceo nigricante cortice rectus.
Icone accepta, Croci verno tempore florentis
genus initio existimabam.

Cæterum non omnes flores diu in sua coloris
elegantia & venustate perdurant, verum nonnul-
larum magis eaduci, breui marcescunt, aliarum
firmiores sunt & coloris gratiam diutius reti-
nent, præsertim serotina & dubia, omnes ceterē
nubilo cælo sese contrahunt, & pluuio facili cor-
rumpuntur, etiam antequam expandi possint in-
terdum, si continui cadunt imbres: contra tem-
perato Sole illustrati, explicantur & diutius con-
seruantur: at vehemente etiam eius ardore ni-
midum excocti, & suo humore exhausti, facili de-
fluunt.

Neque omnes versicolores, tam præcoces,
quàm serotina, singulis annis eandem coloris
gratiam perpetuò retinent, sed alternis variare
sæpius obseruaui: exempli gratia F.V.A.V.
vno interdum anno niuidissimæ sunt, se-
quente vix alius color, quàm flauus vel albus
in eis conspicitur, sic R.V. & P.V. nonnunquam
magnas habent oras flauas & albas, sequente
valde exiguas.

In lib. icon. plant. p. 127. Tulipa pumilio, Teut.
164.

Cæterum tametsi seminibus terre mandatis
Autumno [inutilis enim bulbacearum, & tube-
rosarum maximā ex parte verna est satio] huius
plantæ genus conseruari soleat: interdum tamen
& nucleis maiori bulbo adnatis propagatur, sed
nulla inter præcoces Tulipæ fertilior, rubra, &
alba: omnium autem maximè serotina rubra, quæ
adeo fecunda est, ut etiam semine nata, & vix
b. ma. alias proles generet biennia aut triennia
ante-

*Tulipa al-
terna plu-
rimaque
annis ele-
gantiores
proferunt
flores.*

*Tuliparum
satis ex-
celsum.*

antequam florere incipiat, quod etiam faciunt plerumque dubia. Solent enim omnes Tulipæ nondum adultæ, & antequam flores proferre incipiant, ut plurimum singulis annis rectâ & quasi ad perpendicularum in dorantale & palmaré altitudinem profundius descendere (Apennineas excipio, & quasdam alias, quæ non in altum, sed in latus & obliquum, antè quàm floriferæ sint: proles è longis venis dependentes spargunt, ut proximo capite declarabimus:) serotinae autem illæ & dubiæ iam dictæ: etiâ in veteris bulbi exuvio qd substantiæ relinquere, quæ in aliû bulbum efformata, similiter in exuvio substantiæ quidpiam relinquit, quæ in alium bulbum transit: ut si quis cum dexteritate quadam & industria rimos & quadrimos eruat, exuviorum vestigia sequendo, nonnunquam velut catenam aliquot bulborum coherentium, & ex primo exuvio ortum ducentium inueniat: licet interdum accidat ut R. serotina iam grandior, nondum tamen planè adulta, instar Tulipæ Apenninæ siue Bononiensis proles in latus spargat, ut in meo hortulo, in quo varii generis bulbosæ stirpes florem elegantia & varietate commendabiles alebam & excolebam, dum Viennæ agerem, non semel observavi.

Tulipæ
bulbosæ

Memini & bulbos infimâ alâ, quasi summâ tellure natos, in serotinarum & dubiarum generibus, præferri (licet etiam in A-V, P-V, & quarundam aliarum præcocium alis bulbi mihi nati sint,) qui telluri commissi, eiusdem coloris cum matre florem subsequente anno produxerint: eundem colorem etiam retinent bulbi matris adnati.

Ex seminibus verò quæ sit propagatio, planè [ut dixi] incerta est, in præcociis nimirum & dubiis: nam serotinae magna ex parte suum genus conservare videntur, quemadmodum superiore capite dictum est, aut si aliquam mutationem adquirunt, exigua ea est, & plerumque in vnguium & staminum varietate, aut coloris intentione vel remissione consistit.

Solet caulis è medio bulbo erumpere: sed ipso cum foliis iam marcido, & siccato, si bulbum eruas, ad latus illius enatum conspicies [quod etiâ evenit in Iride bulbosa, Colchico & congeneribus aliis,] nouo bulbo paulatim succrescente, & totius plantæ succum ad se recipiente, quæ tempore commodissimè erui potest, erutus bulbus diu extra terram adseruari, & in alia loca etiam procul diffusa sine noxâ transferri.

Omnes autem cuiuscunque generis Tulipæ (ut etiam hoc breuiter annotem) quemadmodum longâ experientiâ didici, quamdiu florem non ferunt ætævali planè sunt, & vnicum folium singulis annis proferre solent: ac si, dum emersit, se explicare incipiens, secundum etiam eo inclusum appareat, illo ipso anno florem prolaturum spes est, nisi pruina, aut aliud ab insectorum erosionem incommodum eam intercipiat.

Inutilem sanè sationem Vernam Tuliparum observauimus, quia Tulipæ multæ in profunditatem descendunt, & sic perduntur: bulbis novimus qui substernant tabulas lapideas: in solo macro & sicco feliciter proueniunt, quàm in pingui & argilloso: plurimi feliciter ætate bulbos terra eximunt, & per plures septimanas extra terram referuant.

Locus &
tempus.

Tulipæ, si quidem fides habenda Lobelio, medio iam Vere floret, non modò in Italis, sed etiam Belgicis & Gallicis hortis. Natura luxu & lusa huius quàm multas venustissimas florum in de-

Tom. II.

litiis habent inter Belgas D. Carolus de Croy, Princeps de Chymey, D. Io. de Brancion, D. Io. Vander Dill, D. Maria de Brimeu. Io. Moutonius. In Thracia etiam, teste Dodonæo, & Cappadocia Tulipæ exiit: Italiam & Belgio peregrinus flos: Aprili mense florem Belgium videt: Thracia verò etiam Ianuario, veluti testis est Augerius Busbequius in itinere Constantinopolitano, qui ingentem ubique florum copiam media planè hieme, Ianuario mense sese inuenisse refert. Horum florum insignem varietatem observavi ego Sturgardiam & Montbelg. in hortis Ill. E.C. Vvirtemb.

Virid. Tulipæ.

An iisdem facultatibus cum Satyrio Tulipæ præditæ sint, neminem periculum fecisse intellexi, inquit Clutius. Io. Muller Pharmacop. Vienn. multos Tulipæ bulbos condit, radicem Orchidis instar, quibus longè suauiores, & palato gratiores deprehendebam: an verò id præstarent quod Satyrio tribuitur, nondum intellexi. Antuerpianus quidam Mercator cum horum bulborum non exiguum numerum ab amico, cum byssinis pannis Constantinopoli sibi missum accepisset, Cepas esse existimans, ex illis aliquot sub prunis assari iussit & vulgariū Ceparum modo, ex oleo & aceto in cenam sibi parari: reliquos, in horto, inter Brilicas & alia olera defodit. De viribus & facultatibus Tulipæ, nihil compertum habet Dod. aut à quoquam compertum reperit.

TULIPA MINOR LVTEA NARBON.

Minores Tulipæ (inquit Dodon.) foliis sunt angustioribus & ferè porraceis: cauliculis tenuioribus ac brevioribus: floribus minoribus, & minùs in latitudinem sese pandentibus: bulbis minoribus, alicubi in Gallia Narbonensi ac in Italia nasci feruntur.

Tulipæ minor. Descriptio.

Nonnullis Hermodactylus flore luteo dicitur, sed perperam tamen. Neque enim Hermodactyli species aliqua esse videtur. Narbonensem Lilio-Narcissum luteum montanum, Tulipæ speciem, erutam è Sequenæ Narbonensis iugis à plurimis iam annis, in Belgium deferendâ Lob. & Pena Adu. curauerunt amici Antuerpiarum, qui primum Tulipam illam vocarunt, ipsi verò Narcisso-Lilium luteum audaciùs fortè (uti solent, quod rerum cognitioni distinctiori consulant) indigitauerunt.

Hermod.



Flos itidem singulo bulbo & caule Narcissi minore, tenuiore, delicatior, vnicus, luteus, senis foliis constans, ad Liliû aut potius ad Liliû lutei Asphodeli florè æcedens, filamentis luteis è medio emittis. Bulbus exiliior multò, nucleum oblongum Allii æquat, sibi que sepiùs adnatum Allium exili filo ad-

Lili 2

nexum habet: folia ètassiora, parca, è caule me-
dis, porracea.

De hac Clusius: Tulipæ Apenninæ similis
penè est Narbonensis è Cebennis montibus à
Lobelio primùm oruta, & amicis in Belgicam
missa: minor tamen est in omnibus, flores foris
magis virentes, intus flauis, delicatius quiddam
spirant: radix etiam è tenuibus nervis in latera
soboles & bulbillos spargit.

Hist. Lugd. dicitur Tulipa minor Dod. & Ca-
mer. in hort. Tulipa minor Narbon. odorata &
cum mediis ferè florens.

Nos hanc Tulipam siccam habemus ex plan-
tis ficcis Valerandi Dourez, caule palmari, bulbo
sublongo, sub quo multe radicular, titulus est,
Narcissus luteus: icon quam proponimus est ex
his quas sculptas erimus.

TULIPA HISPANICA NARBONENSI paulò minor.

Descriptio

Tertio in monte quodam Arancio vicino na-
ta, in Belgicam à Franc. de Hollebeque Re-
gio hortulano missa, Narbonensi paulò minor
est: eius florem non vidit Clusius, sed Narbo-
nensi similem esse intellexit, qui folia tamen ha-
beat foris non omninò viridia, verùm purpuras-
cente etiam colore perfusa. Illius bulbos ali-
quando aluit, qui vnico duntaxat folio semper
germinarunt, adeoque inanes paulatim facti
sunt, vt tandem perierint. Miserat præterea idem
Franciscus & alios aliquot bulbos (vt Hispania
bulbacearum, & variarum aliarum elegantium
stipium maximè ferax est,) quorum maximam
partem in Hispania suâ peregrinatione non ob-
seruabat Clusius, qui tandem Belgicum aërem
reperientes, contabuerunt.

TULIPA LVTEA BONONIENSIS.

Descriptio



Mediocri-
ter ma-
gno bulbo
prædita est hæc
Tulipa, oblon-
go, fibroso, sa-
pore dulci &
grato, qualis
est Tuberum
terræ, spadiceo,
vt ait Clu-
sius, cortice te-
sta, qui in bi-
nas aut plures
res soboles
singulis annis
diuiditur, pro-
ximo anno
flores daturus.
quin & alias
subinde obli-
quæ & in late-

ra spargit, præsertim, quæ nondum florem tulit)
pon in altum rectà mergit: saulem profert cu-
bitalem, & bicubitalem, nonnunquam in ramos
binos aut ternos Clus. ac etiam plures ab vna ra-
dice, vt asserit Camer. diuisum, angulosum, colo-
re herbaceo, fastigium versus purpurante: folia
dodranalia aut ampliora, aliqua minora, vnciam
lata, partim à radice statim, partim à caule exeunt,
nullo pediculo, carinata, colore glauco. Flos vni-
cuique ramo, odore suauis Leucon Cheiri dicti,
sed imbecilliore, mediocriter magnus, foliis sex

constans, interdum octo Clus. quorum exteriora
tria, extrinsecus à luteo purpurascunt aut vi-
rescunt, intrinsecus lutea: tria reliqua penitus
lutea nisi quoddam mucrone tantillum rubeat: in
medio apices lutei seni cum stilo triquetro viti-
di. Succedit siliqua magna. Semen, teste Clusio
vt in reliquis Tulipis, sed longè minus.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 145. Bononiensis Lilio-
narcissus luteus [siue Tulipa] Narbonensi folio,
caule, & flore proximus, omnia tamen vegetiora
& grandiora, quandoque flores in caule biparti-
to geminos stellatos, & nonnunquam ternos vi-
deas, iucundo Leucon lutei odore.

Gesner. in fin. hist. Cordi, Tulipa alia Turcica
erudit in Italia, quam Guilandinus Satyrium
triphyllum coniiciebat: Lonchitis, inquit Ca-
lalp. cuius opinionem non probamus, à Lancea
culpide cognominata, quidam Narcissum luteum
vocant: folia fert Narcissi, &c.

Camer. hort. Tulipa Bononiensis, quæ maior
Narbonensi & plerumque polyclonos, odorata.
Item apud Matth. Germ. Narcissus 9. Tulipa Bo-
noniensis: Quæ planta sit Matth. Narcissus no-
nus hic, aut in Epit. Matth. Lar. 8. nescio, nisi sit
hæc Tulipa. Sanè icon quæ est in epi. Matthiol.
pro Narcisso 8. Tulipam aliquam denotare vide-
tur polyclonem non accuratè pictam nec descri-
ptam, quod vulgare Matth.

Hist. Lugd. Lilionarcissus luteus Bononiensis.

Schvven. Tulipa Bononiensis Narcissus 9.
Matth. Tulipa minor lutea Italica, velisq. ges-
ner. Narcissen lilien.

Tabern. icon. tulipa Italico. 1. Narcissen lilien.

Floret cum sesotinis aut paulò seriùs. Nobis
floret Montbelg. mense Aprilis in horto Ill. Princ.
cum binis floribus in vno caule, magnis, luteis,
qui diu durant, postea oriuntur magni calices.
Missi bulbi ab Ill. Guilhelmo Landgrauio nomine
Tulipæ Bononiensis, videram alias Bononiæ in
horto s. Saluatoris, folia sunt terna: ea multùm
multiplicat, florebat principio Martii: faciliùs
exterioribus apud nos videtur multiplicari nec faciliè
perire.

Locus &
tempus.

TULIPA PVMILIO ANGVSTI- folia alba.

Tulipa pumilioni angustifolia flos sendan
foliorum, albus: internis tribus candidis, la-
terioribus: angustioribus verò tribus exterioribus,
internè item albis, externè ex fusco rubentibus,

Descriptio



Croci floris
lutei ferè pa-
ribus & simi-
libus. Trago-
pogi instar fo-
lia angusta,
quina aut se-
na, humi pro-
cumbentia,
caulis palmo
altior. Radix
Monspelien-
sis Tulipæ
maior. Bono-
niensis ferè
par, subfusca
foris. Maxi-
mo in prætio
habetur & se-
dulo colitur
(teste Lobel.
Ada.

Adu. par. 2.) in hortis amantissimi D. Ioh. de Jonghe Mesopoli Myrtiacorum concionatoris, huius studii callentissimi.

TULIPA PYMILIO ALBA ALTERA
Lusitanica.

Descriptio



Vncialis aut sesquiuncialis hæc plantula hoc anno 1603 à N. le Quele Botan. Luteriano egregio accepta, exilioribus brevioribusque angustifoliis: Tulipæ superioris foliis: flore albo, exili brevisque pediculo: florem siccum vidit Lobel. Adu. par. 2. album, lenis foliolis donatū, staminibusque

rotidem: Bulbus valde parvus effigie aliarum Tuliparum, duriore involucrio, externè pullo, squamoso, obductus: interiore autem rubens, quem studiosè in hortu alere incepit, ut eius delineationem pressius cum multis aliis exhibere liceat: spontè in monte iuxta D. Oue ad maris littora.

COLCHICVM ORIENTALE ET
Syriacum quorundam.

Descriptio



Colchicū Orientale Italis, Zaffarano Orientale Matth. in epit. minoribus exit foliis, angustioribus, & magis acuminatis, caule rotundo, flore gradiori. Radice bulbosa, euidenter scissa, & lacteo succo prægnante. Camer. in Epit. Matthiol. aucta omisit tum ic. tum descriptionem.

Lobel. eam iconem habet Obs. cum hac inscriptione, Colchicum Syriacum Alexandrinum, Adu. p. 54. & Ic. Plant. p. 146. Colchicū Syriacū Alexand. Colchicum Orientale Matth. Teut. 179. De eo autem scribunt Adu. Colchicū decoctis Guaiaci, ad Luem Veneream, aliisque sudor.

Tom. 11.

rificis magno remediorum compendio & ægrotum commodo, admiscuisse Chirurgum quendam Venetum edoctum illic à plebecula.

Tabern. icon. & hist. Colchicum Syriacum, Alexandrinum, Orientale, Syrisch zerlosen. Gerard. Colch. Syr. Alex. Assyrian Medow Saffran. Cæterum Colchicum Syriacum vel Alexandrinum à nonnullis exhibitum, nihil aliud esse Clusio videtur, quam Tulipæ genus quale Apenninarum fortè, cui pictor nimis orbiculata folia tribuerit, ipsi verò plantæ nimis lata & brevia.

NARCISSVS AFRICANVS BIFOLIUS
sive exoticus.



Descriptio

Ecrassa lætaque vtrinque compressa, squamosa, velut nucleis compacta radice, bina tantum educit folia, vncias duas lata, latioraque: & vncias quinque longa, viridia, læviaque, sub tellure tamen aliis duobus foliorum rudimentis præditis hic peregrinus bulbus, paruum pugnum magnitudine æquans, cuius Lobel. Adu. par. 2. copiam fecit præclarus vir D. Iacobus de Keyser. Frater eius Gouarus de Keyser, bulbos eruit locis vicinis portui siue Capo bonæ Spei, & primus in Belgium detulit.

Narcissum exoticum appellauimus cui propior esse videtur, quoad nomen magis conueniens nobis innotescat.

NARCISSVS AFRICANVS
folio rotundiore.

Lobel. Adu. par. 2. p. 503. Narcissus Africanus folio rotundiore & complicato apud Dominum de Keiser variat.

Descriptio



LII 3

SATYRIUM QVORVMDAM

Erichronium Bifolium flore vnico
radiato albo & purpureo.

CAPVT X.

Descriptio

Satyrion hoc est radice duas uncias longa, alba, crassiuscula, & infima parte crassiore, superiore verò parte gracilescens: folia promit bina, raro ternaria, inquit Clusius, opposita, primò inurud se complectentia & florem occultentia, per terram fusa, Lili conuallium aut Allii vesini formâ, crassiora & magis carnosa, ex angustiore princi-

pio in ventrè
sextantem la-
rum dilata,
dein sensum
in mucronem
desinentia, a-
liquando sub-
rotunda & la-
tiora, si, quod
interdum fit,
vnicū habeat
folium, longi-
tudine pal-
marum, maculis
ex fusco ru-
benzibus, vel,
vt ait Clusius,
ex albo pur-
purascētibz,
latis, magnis,
variegata: in-
ter quæ surri-
gitur ciliatus
vnicus, læuis,
enodisque, te-
res, ruber, pal-
maris, cui in-
sideret vnus
deorsum na-
tans, ex sex
foliis oblon-
gis, mucrona-
tis, nonnun-
quam albis,
nonnunquam
purpureis cū
vnguibus in-
tus albis com-
positis, qui v-
bi aëris [Solis
radiis exal-
facti] repore
se explicat, ra-
diato posito
foliorum vi-
sendus ea sur-
sum reflectit



Cyclaminis instar: stamina in medio scna atropur-
purea stilum circumstant longiorem, album, tri-
cuspidem: nullâ odoris gratiâ, inquit Clusius
placens, sed solâ elegantia cōmendabilis: succedit
siliqua triangularis, nutas vt flos, in viridi spadicea:
Capitulū siue siliqua recte Clus. continet aliquot
semina Leucoii bulbosi præcocius alterius semini-
bus ferè respondentia, sed longiora, graciliora-
que, flauescens coloris. Quamdiu nullum flo-
rem dat hæc planta, vnicō duntaxat exit folio.

Est à nobis aliud genus in Italia obseruatum de
quo scribit Clusius: Ei folia longiora, maculas al-
bas diutius retinentia, initio dum exeunt, florem
etiam amplectentia, qui superiore maior plax-
runque est, vel lactei omnino candoris, vel mi-
stis purpurascēte alboque coloribus constans,
staminibus albis, apicibus nigricantibus, huic
succedit trigonum caput semina alteri paria con-
tineus: radix etiam longa & superiore crassior.
Hæc ille.

Satyrion Diosc. vera vix adhuc Herbariis bene

sunt cognita,
tamen ex Da-
lechampi cō-
iectura potius,
quàm certa as-
seueratione ea
hic exhibet
Hist. Lugd. E-
rythronium,
montosis & a-
prieis nasci-
tur: radice bul-
bosa, inâ parte
fibratâ, oblon-
gâ, Porro non
dissimili, formâ
subrufa, intus
candidâ, nullâ
grauitate odo-
ris iniucundâ,
veluti Or-
cheos, teneris,
gustu princi-
piò dulci, qualis est Castanea, deinde acri, Cepe
Aliconix modo, quam aiunt semine perfecto in
globosum caput colligi, mali figurâ, crescente ve-
ro caule extenuari, ac in longum produci, vt cau-
li quod satis sit alimentum velut de suo suppediet,
nunc simplici, nunc velut è duabus in vnum
coëuntibus iunctâ, subnascētibz aliis perpe-
tuo, & coherentibus duabus, tribusue, ac inter-
dum pluribus, quæ exhaustâ crassiore, postea ma-
gis auferunt: caule, si ortum eius à radice consi-
deres, procero, tereti, superne robusti: foliis Ru-
micis, aut Lili, minoribus, binis, nonnunquam
ternis, aliquando quinis, ad terram infractis, vi-
rentibus, sed maculis rubris conspersis, cæ crebris,
vt rubere magis quam virere videantur: flore pur-
pureo, Lilio rubro, quod Maragou vocant, figu-
râ simili, priusquàm pandatur, oblongo, dum re-
feratur est, sex foliis constans, ad radicem candi-
cantibus, reliquâ sui parte ostro purpurascēti-
bus, apicibus totidem quorū sunt foliola, niueis
superne velut atro capite conspicuis.

Alterum, trifolium videlicet, inuentu rarius,
priori omnino consimile, nisi quod guttis & ma-
culis lacteis folia variegantur, flos candidior. Vtri-
que semen oblongum siliquis includitur, nunc
triangulis, nunc quadrangulis, cōpissum. Inueni-
tur genus quoddam vnicō, ac lato folio, sine flo-
re, sine fructu. Marcem appellant Herbarii.

Florent Aprili & Maio mensibus. Satyriorum
historiæ id repugnare videtur, quod rotunda &
globosa radice non sint, qualem requirit Diosc.
At si Satyrion non sunt, tamen ob insignem & ve-
nustam figuram describenda fuerunt vulgato apud
Herbarios seruatō nomine, quoad verius sit
inuentum, aut è Veterum libris erutum.

Icones quatuor habet Hist. Lugd. primæ titulus
est Satyrion rubrum Dalechampi. Secundæ: Sa-
tyrium



styracis trifolium seu album Dal. Tettix Satyrium Dalech. forte Pseudohermodytylus Matthioli. Quartæ autem c. 14. Pseudohermodytylus Matth. In icone prima non placent duo caules nec radicem figura: in historia etiam displicet color radicis, & quod globosa dicitur, ac etiam numerus foliorum, qui plurimum est plantarum simul prouenientium non vnus solius. Non video cur Satyrium cum lacteis maculis & flore albo magis trifolium dicendum sit, quam præcedens: quod flore rubro: ac cur id quod vnicū fert folium dicendum sit genus quoddam mas nescimus, quandoquidem potius vitium est quoddam sepius quoque in Tulipis obseruatum. Icon 2. reijcienda non videtur, verum melius placet tertia. Quarta autem ex Matthiolo alio capite omnium pessima est.

Lobel. & Pen. in Adu. innotuisse scribunt non multis ab hinc annis bulbum perelegantem, cui amici Satyrium nomen fecerunt, quique a consultis Medicis materia peritis Lugdunensibus (qui condiendum curassent & exploratum habuissent) visus, Dioscor. genuinus sit habitus, nullā desideratā nota præterquam coloris, qui valde variat loci varietate, ut in Squilla, Capis & aliis bulbaceis videre sit: Folia cum habere bina, plurimum terna: flos ex albo purpureus.

Icon Lobelii nobis displicet, nec terna solet ut plurimum folia ferre, sed bina: nostræ etiam icones quas sculptas emimus non placent.

Satyrii Erythronii Lobel. Obs. seu Satyrii & Dentis canini Belgarum, Hermodytyli & Pseudohermodytyli Italorum Matth. flos aut purpurea rubet, aut candore micat, aut purpurea & candore confusus pallor. Hermodytylus & Pseudohermodytylus Italorum putatus foliis constat inferne angustis, qua radicis cervice iniuntur.

Dentem caninum Dodon. de purg. Satyrium plerique appellant, & quidem Erythronium dictum, desiderantur tamen nonnulla. In Matth. huic similis, (si non eadem eadem est) herba, pro Pseudohermodytylo depingitur. Quod si autē hæc est, perperam, duo adduntur bulbi. Ephemerum. Diosc. esse posset, si in descriptione pauca aliter se haberent.

Clus. Pannon. Dentalis 1. seu purpureo flore. Dentalis 2. seu lacteo flore vulgò Styriæ Medicis & Pharmacopæis *Dentalis* appellata, à nonnullis rusticis Schoß wurz. Ex Italia Apennino Pseudohermodytyli. & Dentis canini nomine missa: ex Allobrogibus verò Satyrii Erythronii. Eadem leguntur in post. hist. ubi Dentem caninum purpurascens & albo flore inscribit. Nos Dentem canis C. virum Vlysem Alexandrum Bononiæ: D. Gesner. & D. Melchiorem Guiland. hermodytylum nominare audiuius.

Camer. in Epit. Matthioli. figuram pulchram habet sub titulo Pseudohermodytyli & Dentis canini, qui vulgò It. *Hermodytylo bastardo*. Lectores huius Satyrii historiam conferant cum iis quæ Veteres de Satyriis scripserunt, quæ Annotamus cap. de Orchidibus ubi etiam reperient æquivoca.

Nascitur flore purpureo copiosè ad quorundam montium radices solo herbido vdo, in Styria non procul Gratzio. Similis planè cum hac coloris, in Allobrogum montibus erutam Valerædo Dourez sibi aliquando missam meminit Clusius: sed & circa Baionam nasci, vicinis Cantabrorum montibus, repperbat C. V. idemque Medicus Regius Io. de la Riviere. Floret Aprili, in-

terdum etiam maturius, in hortis præsertim culta. Flore albo aliquando accepit a C. V. Vlyse Aldro. tum a Jac. Antonio Cortuso Patricio Patruino, & ab Achille Cromero Medico cum Patruui viueret: verum similes etiam radices Francofurtum misit Io. Vincent. Pinellus. Veraque frigoris patientissima. Lugduni florebat Aprili in horto Valer. Dourez, (iud. Io. Bauhini) è iura monte, cuius sedulitate primum nobis, inquit Lobel. innotuit, eruta Alpibus Lemano finitimis: & postea in collibus Taurinensi Pado, sesquileucam distans, eandem eruius. Florentem in fine Februarii & Martio floribus albis vidi, in Montibus Euganeis inter Aponense Balneum & Arqua ac aliis in locis illorum montium: Hanc etiam in horto Priuli obseruavi. Antea siccam videram apud D. Gesnerum. Ferrariæ visa in canobio S. Dominici à l'Angeli, & copiosè in collibus circa Bononiam. Item Basileæ flore albo, mense Martio, in horto D. D. Plateri. Aliud floris genus colore differens nempe rubro ex purpura: album dat in hortis & spontè copiosè circa Geneuam florens Martio & in colle *la Bassie*: Lugduni habebam in horto meo Geneuæ acerisum. Prouenit mihi Montbelgardi in horto ex radicibus Geneuæ missis protrudens folia & florem Martio, & Aprili euascescens.

Styracis multierculas radicis exiccate pollicem pultribus puerorum inspergere solent ad eueniendas cicciondasque ventris tinea Clusio relatum est. Ex vino autem haustum, mirificè colidolores mitigare expertus est D. vir Thomas Hauvstein Sereniss. Archiducis Caroli primarius Medicus: qui multos eius bulbos non semel Viennam vsque misit, insuper corporis vires reficere & nutrire: ex aqua verò pueros epilepticos iuuare. Ad excitandam, autore Lobelio, uegetem magnam vim habere ostendit, humida & calida substantia, cum acrimoniz paululo iuncta.

MALEAGRIS SIVE FRITILLARIA saturatior & dilutior.

CAP. XI.



Maleagris ex radice emergit bulbosa, candida, solida, nullis tunicis septa, Clusio, sed veluti in binas, easque ut plurimum inæquales partes secta, è cuius medio protuberat quasi puluinus quidam, unde caulis emergit, sessili parte, multis fibris donata: caulem præmit tenuem,

Descriptio

singularem, dodrantalem & pedalem, interdum etiam maiorem, foris ex viridi purpurascens vel fusco obsoleto colore præditum, teretem &

leuem, intus fungosum : ad quem sine pediculis adnata hinc inde, nullo ordine *folia* Tragopogonis purpur. quinque sex, septem medio-



criter longa, angusta, carinata, subacido sapore prædita : in summo caule *flos* sæpè vnicus aliquando bini, interdù terni, qualem nos exhibemus (omnes autem Clusio eodem tempore se aperientes) ex pediculis vnicalibus, cauli concoloribus, incuruis nutantes dependent, pulchri, Campanæ instar, magni,

ex foliis sex compositi [Clusius habuit cum x. & duodenis] tessellato embemate, fritilli seu tabula latriculorū distinctis, plagis alterno rubore, carneo, sanguineoque, & albedine pictis, aspectu pulcherrimo, interiore superficie saturatiori purpurā splendente: singula folia ab imo costam eleuatam habent, ad folii vsque medium abeuntem, in tantillo puniceo, luteolam: in floris medio, *filamina* sex, capitulo farinā crocea asperso, *glisum* ambiunt triculpidem, coloris herbacei, odoris nullius; florem verò excipit *capitulum*, angulosum, vel, ut tradit Clusius, triangulare, vnicam plerumque longum, supernā parte crassius & sine coronā, alioqui Narbonensis Tulipæ capiti simile; quod in se continet *semen* pallidum, compressum, Tuliparum semini accedens, vel, ut ait Clusius, Tulipæ Narbonensis semen quasi referens membranaceo margine latiore, in quo nullum, contra quàm in Tulipa, germen conspicitur.

Ea ex qua curauimus parandam nostram iconem speciosior est & coloratior, paulò citius florens; altera, colore dilutior est, minùs speciosa, & nonnihil tardius florens.

Tempus

Flos interdum variat. Floret autem cum præcocioribus Tulipis, interdum etiam Martio in hortis: præcocior videlicet, nā genus etiam inuenitur magis serotinum, & cum Tulipis serotinis flores explicans, eosque vel saturatiores maculas habentes, vel dilutiores, quemadmodum genus magis præcox, magna autem ex parte, saturatior.

Clusius icones duas proponit: vni, titulus in Pann. p. 173. Fritillaria saturatior: p. 170. alteri, Fritillaria dilutior. In histor. verò Fritillaria & p. 153. Fritillaria dilutior. Is ait ad se primū missam hanc plantam à Pharmacopæo Aureliensi Noele Capperon vocato, qui nomen indidit: quòd eius areolæ verticillores Fritillum quodammodò æmulentur: vulgò Liliū variegatum antè appellata fuit: Meleagridem alii appellare malunt, quoniam eius foliola variis coloribus picta sunt, vti plumæ Meleagrides avis, quā vulgus Gallinam tue Perdicem Barbaricam aut Guineæ vocare solet, diuersis tamen.

Ceterum, qui latè Narcissi nomen extendunt [in-

quit Dodon.] non modò Tulipam, sed & Meleagridem ed referunt, quæ tamen à Narcissis differens est, Tulipæ similior, subinde florem germinans, quam nonnulli Fritillariam vocant.

Lobel. Obs. & plant. icon. p. 136. Fritillaria siue Lilio-Narcissus purpureus variegatus, Meleagris flos Dodonzi Teut. 170. Item Aduers. par. 2. Lilio-narcissus purpureo-violaceus tessellatus niger, saturatior, dilutior aut obsoletior purpurea, præcoccissimus, præcox, & serotinus; siue Fritillaria à fritilli similitudine, è Lilio-Narcissi genere, præsensibus Aurelianis oriunda iam diu omnium primò in Belgium delata fuit; deinde ex Xantonicijs, Pictauicenis & alijs Galliarum pratis, in Britanniam, aliasque Boreales plagas ab amicis missa &c. Præcox florem Februario sæpè laxat, obsoletioris purpureæ, nonnunquam dilutioris. Media mensè Martio cum præcoccissimis Tulipis floret, cui flos colore hilarior paulò, pronus propendulusue Campanulæ instar, Tulipæ minor, naturæ admirando opificio variegatus, quodam quali èblemate, subalbi, purpureo-violacei saturatioris, variorumque colorum, pictus, tessellatus, segmentatusque. Serotinæ Xantonicæ flos pulcherrimus est & saturatior nitidiorque purpureo-violaceo nigro colore gratissimus. Hæc nobis Antuerpiæ iam multis annis elapsis in deliciis fuit. Omnibus semen Tulipæ minus, clauditur oblongo triquetro vtrinque supernè compressio membranaceo pericarpio.

Spontè quibusdam pratis ad Ligerim flumen non procul Aureliā, vrbē Galliarum celebri, nascitur, vnde primū ad me (ait Clusius) missa fuit Machliniam, & Belgicæ communicata anno 1572. [nasci etiam in Normanniā & Britannia minore intelligo.] Deinde Viennæ Austriæ, aliquot bulbos accepi triennio post, munere Ill. V. Ioh. de Vulcop. Misit etiam aliquot post annos Ill. V. Augerius de Bousbeque. Anno verò 1579. in quibusdam pratis quadriduano itinere infra Budam Pannoniæ, ab iis qui Constantinopoli redibant, mensè Martio florens obseruata est.

Locum

Sed & postea pleræque semine mihi natæ sunt, quæ septimo & octauo demum anno, vel etiam serius floruerunt: quatum alix binos, quædam ternos, nonnullæ vel geminos, vel duodecim foliis constantes flores tulcrunt. Meleagris nobis per aliquot annos floret mensè Martio & Aprilis in horto Ill. Principis nostri, missa per Ill. Landgr. Philip. foelicis recordationis, eam nobis etiam misit ex Burgundia petitus Pharin. Tostanus Carolus: obseruauimus non primo anno nec secundo flores proferre, ac cum incipit vnicam, sequenti anno duos, postea etiam tertium; ea autem duplex tum coloratior, tum dilutioris coloris, fert flores Martii principio, & semine deciduo se multiplicat, verum primo Vere solum vnum tenue folium profert. Semina vbi matura committenda sunt terræ.

Tempus

FRITILLARIA NIGRA.

Fritillaria quæ nigra aut obscurior apud Lob. **Descriptio.** Adu. par. 2. vocatur, internè ex luteo virescit cum reflexis oris, viridibus lineis striata; à medio ad centrum subfusca tessellata est, flos vnicalis longitudinis, vti aliorum congenerum. Tessulis à medio interno similibus prædita est, cuius flos hilarior purpureascens. Obsoletioris coloris ex luteo

ex luteo magis vici, parum subfusc. a. intus mi-
nis tessellata, quemadmodum Fritillaria ex fusco
& luteo sublurida, cuius flos longitudine sesqui-
unciam aequat: omnibus per floris maturitatem,
sem. folia reflexa sunt.

MELEAGRIS SIVE FRITILLARIA

Pyrenæa flore minore.

Merebat Venerius bulbos Fritillariæ cuius-
dam [inquit Clus. hist. rar. in append. par.
27] è Pyrenæis montibus erutos, è cuius floribus
quos insequente anno proferebat, diuersam esse
obseruabam ab iis quas cap. u. lib. n. hist. Pl. ex-
hibui.

Autem quidem habebat Fritillariæ illo c. de-
scrip. formâ similem, minorem tamen: ex quo



prodibat pe-
dalis caulicu-
lus, gracilis,
viridis, senis
aut septenis
foliis septus, ex
viridi cinera-
ceis, qualia fe-
rè sunt in aliis
Fritillariis, in
cuius summo
fastigio nasce-
batur flos, alia-
rum Fritilla-
riarum flore
minor, sex so-
liis constans,
que extimas
oras, nonnihil
reflexas habe-
bant, vt parui
tintinnabuli
formam ex-

primeret, quorum terna exteriora, internis e-
rant angustiora, omnia obsoleti foris coloris, cir-
ca oras tamen (præsertim interiora) venis qui-
busdam flauescens distincta, internè verò ex
viridi flauescens & splendentis, à mediis por-
rò foliis ad ipsos vsque vngues [qui similem co-
lorem habebant] plurimis maculis saturatè pur-
purascentibus tessellatim dispositis notata: ex
umbilico prodibant sex breuia stamina longis ap-
picibus pallidis prædita, trifurco stilo è medio il-
lorum procedente: odor eius grauis, quasi Phalli
odorem referens, & proximè ad eum, qui in
Spatula fœtida percipitur accedens.

In earum porrò Fritillariæ Plantarum quæ è
Pyrenæis montibus eruuntur, floribus, non mi-
nor obseruatur diuersitas quàm in illis quæ vul-
gares in diuersis Gallie Prouinciis reperiuntur:
nam licet omnium quos mihi [loquitur Clus. Ex-
ot. in app. altera] quidem conspiceret licuit for-
ma quodammodò similis sit, sex videlicet foliis
constans, eorumque terna interna folia magna
ex parte tribus externis sunt latiora & ampliora,
quidam tamen flores illa repanda habent, hoc
est, illorum extimas oras reflexas habent: non-
nullorum verò oræ vel non sunt reflexæ penitus,
vel certè minimum: rursus illi flores qui extimas
foliorum oras reflexas habent: alii aliis saturatio-
nis sunt coloris, quidam etiam ad eò saturi, vt
nigri videantur, præsertim externâ foliorum par-
te, quæ nec tessellis distincta apparet: at interna
purpureis quibusdam maculis distincta, vel fre-

quentioribus vel minus frequentibus, aut magis
saturis, aut dilutioribus, eaque splendet. Illi ve-
rò flores qui folia repanda non habent, vel quo-
rum oræ paululùm duntaxat sunt reflexæ, ex-
terna parte vt plurimùm virescentis coloris sunt,
internâ autem ex viridi flauescens & splenden-
tis, quali pænè præditus est tenuior ille sericeus
pannus vulgò *casetas* vel *casar* nuncupatus, ex
flauis & viridibus sericeis staminibus contextus:
atque in illis tessellarum illa distinctiò obscurius
apparet: singulorum autem foliorum vngues in-
terna nonnihil caui subuirdem maculâ impressâ
habent: ex floris verò umbilico sex alba stamina
prodeunt, quorum apices pallidi, inter quæ trifi-
dus exilit stylus paulò supra stamina sese exerens.
Florent paulò serius quàm vulgares serotina
Fritillariæ, & semen ferunt in thecis siue capiti-
bus triangulis, vulgaris Fritillariæ instar, planum,
vulgaris semini prorsus simile, in quo nullum e-
tiam germen conspicitur. Interdum hæc planta
binos flores in eodem caule profert, quemad-
modum vulgaris. Audio huius generis plantas
reperiri quæ proferant florem pænè flauum, quas
nondum videre mihi contigit, Lobel. Adu. par.
2. Fritillaria Pyrenæa nigra foliis latioribus, qui-
nis aut senis in caule pedali, altiorèque. Floruit
Londini mense Aprili.

MELEAGRIS SIVE FRITILLARIA

Aquitana reflexis oris.



Nobilis
Vir Joh.
Boissot genus
habebat Fri-
tillariæ magis
serotinâ, quod
roto bimestri
post primû flo-
ruisse ad me
(ait Clus. Pân.
& hist. post.)
scribebat bi-
nis ornatum
floribus, mis-
sus bñm Au-
tumno: Maii
subsequentis
initio florem
aperuit sex so-
liis, vt in præ-
cociore, con-
stantem, quo-

Descriptio

rum extremæ oræ nonnihil reflexæ erant, dossi
neruus paululùm extuberabat, atque virescebat,
interiora terna folia externis erant latiora, om-
nia autem exterius ab uno folio ad extremas or-
as, obsoletæ purpuræ radiis, sub quibus nonni-
hil flauis conspiceretur, distinguebantur, interius
verò colore ex viridi flauescens prædita erant,
veluti sericeus pannus viridis, cuius subtegmen
flauum sit: sex stamina ex umbilico prodibant
pallidis apicibus obsita, alia aliis longiora. Nul-
lum semen tulit, proximo anno imminutus bul-
bus florem non dedit, tandem subsequens rigida
hyems omninò corripit.

Fritillaria hæc Aquitana siue secunda spe-
cies commodè Meleagris aut Fritillaria appella-
ri nequit, quandoquidem colorum in eâ varietas
simili modo non est distincta, vt in priorè ta-
meti & caule qui aliquantulùm tenerior, & fo-

Fritillaria
Pyrenæa
varietas.

liis, quæ in hac paulò angustiora magisque herbacei coloris videntur, & radice, atque etiam floris formâ nonnihil illam æmuletur.

Fritillaria Aquitana Clusii & Boissoti serotina videtur Lobel. Adu. par. 2. quadrare cum varietatibus *Fritillariæ* nigrae.

MELEAGRIS SIVE FRITILLARIA FLAVA.

Descriptio



Fritillariæ quoddam genus habuit Ioan. Somer, quod florem produxit sex quidem foliis constantem & nucantem, ut cætera Clusii genera: sed quorum folia sunt flauo coloris rubris maculis distincti, illorum medio neruo prominulo & virescentis coloris.

Fritillaria lutea Lobelii

Adu. par. 2. differt ab aliis floris colore luteo, rubris maculis segmentato. A Somero Mediburgensi studiose colitur: Iconem Londini iam biennio elapso accepit, sed minùs affabrè delineatam, uti D. Clusius monuit.

Huius *Fritillariæ* luteæ bulbos Lutetia Londinum misit I. Robinus Botanicus Regius ex Pyrenæis montibus delatos, prouenit autem in Pyrenæorum Canissaure.

Fritillariam flauo flore (de qua Clus. rar. plant. scripsit) vidimus oblatam Ill. Princ. Sybilæ Anhaltinæ Ducis Wirt. florentem Aprili, quæ erat ex horto Steckii, striae habentem internâ parte potissimum flauas.

Fritillaria alba ex phæo purpureo tessellata.

Fritillaria alba elegantissima ex phæo purpureo tessellata, collecta in Albania à Somero Constantinopoli in patriam redeunte: flos internè rubieundior est, vnguibus albis præditus, Lobel. Adu. par. 2.

Fritillaria floribus albis notulis aspersa.

Floribus albis notulis item fortuitis aspersis, apud Pictones Gallia Aquitanicæ reperiri, Lobel. Adu. par. 2. retulit Petrus Naudin Salmurii Pharmacopæus egregius, *Fritillariam*, non procul ab arduis saxosis viis, *Passelourdin* vocatis, iuxta S. Benedicti vicum, miliari à Metropoli Pictauio distitis, ubi viperæ commendabiles ad Theriacem, exili collo & caudâ, captantur.

FRITILLARIA ALBA ALTERA.

Fritillaria alba altera, quam in Lusitaniz monte oriundam iuxta urbem *Perre* vocatam anno

1601. florentem memini (inquit Lobel. Adu. par. 2.) in horto D. Matthiæ Craen Mediocæstrensi Mattiacorum aquâ mariæ ætorum Scriba. Anno 1604. huius copiam emit Londini I. de Franqueuille à quodam Botanico Gallo, qui manipulum floribus præditum albis, nullis maculis distinctis aut cellulatis vendidit.

Fritillariæ repertas esse plantas intelligit Clus.


Exot. append. 2. quæ album florem gestat, quæ præcocior sine generis an serotini sint ignorat, quia nullam similem plantam hactenus videre ipsi licuit, & rarissimè inueniri intelligit: videlicet inter aliarum myriades interdum vnam aut alteram plantam. Mutebat eruditiss. Venerius anno 1601. aliquot

Fritillariæ albo flore bulbos amicis. Hogelandus altero post anno binas habuit plantas quæ flores tulerunt, necis quibusdâ discretas: vnius enim flos totus albus fuit, alterius foris etiâ albus, internâ autem parte venis quibusdâ purpurascens distinctus: Porrectus vnicam habuit, cuius flos totus albus fuit.

An apud Recentiores medicum in vsum veniat *Fritillaria* Clusium fugit. Ob florum tamen elegantiam & venustatem expeti & diligenter in hortis coli potius existimat.

TIGRIDIS FLOS: DRACUNCULI species putata.

CAP. XII.



Pari quere- Description
la cum Dodon. Lobelio, & C. Bauhino, Plantæ huius peregrinæ historia non aggredimur. Siquidem nec nobis hactenus visa. Eius tamen Eiconem apud Cl. Alexandrū, viuis depictam coloribus videre contigit Genetio H. Cherlero. Qualem Lobel. affabrè expressam à I. de Brancion coloribus ari- viron

visentibus oblongis angustis & acuminatis foliis
 è pullo radicis bulbo: flore luteo, exiguis quam-
 plurimis notulis fortuitis puniceis variato: è
 cuius medio suave rubens stylus exeritur: Omni-
 bus herbariarum studiosis ipsam plantam hæcenus
 incognitam: Eiusque bulbum edulem credi per-
 hibet.

Lob. Obs. & Ic. Pl. p. III. Trigidis flos an Dra-
 cunculi species? Tigris autem, cuius florem Dod.
 videre nondum concessum est, quod referenda sit
 cognoscere, nec dum potuit, videtur tamen ex
 bulborum genere: aut, quod verisimilius, inter Ari-
 genera reponenda, & Dracunculi aliqua species
 esse, nisi pictura imponat. Hist. Lugd. & Gerardo
 Trigidis flos.


Gener Cherlerus eius partem aliquam, illam
 potissimum quæ floris nondum passim speciem ferebat
 apud Robinum Herbarium Regium Lutetie vi-
 dit: saltem ex similitudine eius quidam mori
 ita censuerunt. Verum ipsammet viridem plantam
 non vidit. Videant curiosi Rhizotomi an alicu-
 de ad nos inuehi possit. Scimus enim à Magna-
 nibus plurimis admodum desiderari.

LILIVM ALBVM VVLGARE.

CAP. XIII.

Florum delicie Liliū, ex radice bulbosa nu-
 cleis multis constante, caulem surrigit re-

ctum cubita-
 lem & sesqui-
 cubitalem, vel
 etiam altiore,
 singularem, re-
 rectum: cui ab
 imo ad sum-
 mum adnata
 folia, nullo pe-
 diculo: flores in
 scapo serie
 quadam plu-
 res non eodem
 tempore pan-
 duntur, odoris
 suauitate exi-
 mia, colore la-
 teo, senis pin-
 guibus repen-
 dis foliis cala-
 thum imitati:
 in quorum me-
 dio stilum lon-
 giusculum ex
 albo viridan-
 tem trifidum
 circumstant
 stamina, foliis
 numero & co-
 lore paria;
 quibus apices
 insident cro-
 cei. Lilio ad-
 scribit Cæsalp.
 semina rotun-
 da, ossa ex ro-
 to, nullā con-
 spiciuā medul-
 lā, sedentia in
 angulis &c.



Descript.

Lilium Veteribus.

Lilia quæ coloris differentia inter se distant, au-
 tore Theophrast. vnicum ferè caulem habent,
 duplicem rarè: quam differentiam cælum & so-
 lum efficiunt. Ex singulis caulibus aliquando vnu,
 aliquando plura Lilia emergunt: pars enim su-
 prema germinat. Sed hæc rariora. Radice est
 copiosa, carnosæ, rotunda. Fructus detractus ger-
 minat, & Liliū emittit, sed minus. Reddit &
 lachrymarum confluxum quandam, quem etiam
 ferunt. Gaza, nescio qua ratione motus, vertit,
 Fecit & lachryma cæcum quoddam confluuium
 quod etiam ferunt.

Ceterum quod dixit Plinius rubens Liliū
 Crinon vocari à Græcis, docti quidam legendum
 censent, *ἰσχυρὸν κρίνον*, vel composita voce *ἰσχυρὸν
 κρίνον*: nam etiam album Liliū Crinon vocant.
 Quod autem Liliū florem Cynorrhodon vocari
 apud eundem legitur, alii ex Hesychio lectione
 hanc retinendam, alii falsi suspectam, & Crinor-
 rhodon legendum censent. Cynorrhodi etiam
 appellatio nihil cum Lilio commune habet, ve-
 rum id Rosam sylvestrem multis aliis locis Pli-
 nius vocat. Crinorrhodon verò propriè Liliū
 rosam & florem significat, quem Hippocrates
κρινόρριον appellat.

Liliū etiam omnibus vbiq; ferè notum
 sit, [inquit Cornar.] tamen affabre admodum à
 Plinio lib. 21. cap. 5. depingitur. Liliū rosæ no-
 bilitate proximum est, & quadam cognatione in-
 guenti, oleique, quod Lirinon appellatur. Et im-
 positum etiam maximè rosas decet, medio pro-
 uentu earum incipiens. Nec vllis florum excel-
 sitas maior, interdum cubitorum trium, languido
 semper collo, & non sufficiente capitis oneri.
 Candor eius eximius, foliis foris striatis, & ab
 angustis in latitudinem paulatim sese laxanti-
 bus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris,
 tenuique folio & semine, stantibus in medio cro-
 cis. Ita odor, colorque duplex, ut alius calycis,
 alius staminis, differentia angusta. Et paulò post
 de rubente Lilio, itémque de purpureo subdit.
 Est & rubens Liliū, quod Græci Crinon vocat.
 Alii florem eius Cynorrhodon. Laudatissimum
 in Antiochia & Laodicea Syriæ, mox in Phæsi-
 lide. Quartum locum obtinet in Italia nascens.
 Sunt & purpurea Lilia, aliquando gemino caule,
 carnosiore tantum radice, maiorisque bulbi, sed
 vnius, Narcissum vocant. Huius alterum genus
 flore candido, calyce purpureo. Differentia à
 Liliis est & hæc, quod Narcissus folia in radice
 sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tertiū
 generi cætera eadem, calyx herbaceus. Quæ de
 tingendi ratione subdit, inferius recitabuntur. Et
 hæc partim de 6. lib. Hist. stirp. Theophrast. trans-
 lata sunt.

Lilia, inquit Dioscorides, coronamentis se de-
 dunt, Liria à quibusdam vocata, tradunt & pur-
 purea inueniri. Sic Liliū descriptionem perstrin-
 gens l. 4. c. 99.

Theophrast. Lilia etiam vocauit Narcissos: ac
 tradit etiam I. Drusius *οὐκ*, Susanna & Solanna
 dici.

Horatius breue vocat; quia non diu durat.
 Vnde D. Basilius in explicatione Psalmi 44. Nul-
 lum florem hoc melius exprimere fragilem hu-
 manæ naturæ conditionem refert. Idque etiam
 Theocritus.

Ἰσχυρὸν κρίνον ἔστι, μακρὰν τὴν ὄψιν ἔχον.

Candidum est Liliū, rubescit verò cùm de-
 cidit.

Crinon
 rhodon.

Lilium
 Plin.
 Descriptio

Lilium rub.
 Crinor-
 rhodon.
 Lilium
 purpureum
 Narcissum.

Disfr. nō.

que exsiccati possunt absque morfu seu vulnere omnia ingentia, & maxima quae in capitibus musculorum eueniunt, tum ea quae nimis mollia sunt & diuturna, atque egre ad cicatricem perducuntur.

Porro medicum vsum Lili exposit Plin. l. 21. c. 19. ubi inter cetera habetur. Succus qui floreo expressus est, ab aliis mel vocatur, ab aliis Syriū, ad emolliendas vulvas, sudoresque faciendos & suppurationes concoquendas. Falsū autem legi, mel vocatur: & legendum esse, Phaselinum vocatur: ex eodem Plinio patet, qui hunc locum citat l. 23. c. 5. Lirinon, inquit, quod & Phaselinum & Syrium vocauimus, renibus vtilissimum est, sudoribusque euocandis, vuluæ molliendæ, concoquendisque intus. Sed & laudatū in Laodicea Syria, & mox in Phaselide Liliū esse, ipse Plin. lib. 23. c. 5. dixit, velut locus suprā adductus testatur.

Ex Sineone Sethi odoratum frigido capiti prodest. Oleum verò quod ex ipso paratur, vim habet discutienti & emolliendi. Huius autem radice quidam vtuntur ad vulnere sanationem.

Tradit Marthiol. elixam Lili radicem, veteri ætate exceptam & illam, pedum clauos tollere, sed ante triduum remoueri non debere: Eadem ex adipe & oleo adhibita fluxos pilos replicare: cum multo autem potam, sanguinem extra vasa coneritum per alium tricare, suppurationes moliri & concoquere, & duritias quasque emollire. Stillatitiam floram aqua dari vtiliter potandam ægre parturientibus, & ad pellendas secundas addito croco & cassia. Oleū quod ex floribus paratur, valere ad omnes frigidos neruorum morbos, nempe ad conuulsiones, & resolutiones: præstat item ad emollienda articulum impedimenta, & scirrhusos quosque tumores. Illinitur quoque puerperis veri dolore languentibus, addito oleo è Lini semine, præsertim cum succida lana his calidis imbuta ventri superponitur. Additur clymatibus cum induratas faeces mollire fuerit opus. Lilia, quæ diu in oleo macerata fuerunt, inlita, prius calefacta, apostemata calida citra dolorem matitant ac digerunt, præsertim ea quæ sunt in articulis.

Unius aqua stillatitia ex floribus parata in partu facilitando & secundis expellendis (inquit Camer. hort.) efficacissima, vnde non temere in aliis affectibus danda. Folia incocta vino austero & vulnere diuturno imposita secundū Galeni doctri. in lib. 7. de simpl. Med. facult. multum iuuare, in eundem authorem annotauit Excell. Iulius Alexandrinus Cæsarius Archiater. Si serpentium ictibus auxiliare quispiam aggrediar, Maranthæ consilio Lili folia illinat: ad vetera vlcera, eius succum ad ambusta, eius radicem: nam si indifferenter omnibus eius partibus ad omnes hosce affectus vtatur, scopum non assequetur.

Liliū (inquit Porta) qui radices squammas habet lichenes, lepras & furfures in facie euadat, & vitiligines emaculat.

Lonicerus aliorum vestigiis insistent, Liliorū vites ita prosequitur: Flores mixti sunt nature, radix & folia dissipant, exsiccant, atque mundificant, plurimum tamen bulbus. Oleum infimo ventri inunctum, matricem refrigeratam vehementer calefacit, eiusque humiditates induratas emollit. Radix decocta, tu moribus duris applicata, eos maturat. Tosta verò contusa, cum a-

Tom. II.

qua rosacea commixta, ac reteratis ab interuallo vicibus admota ignem sacrum extinguit. Simili modo vulneribus imposita farscorica habetur. Eadem prægnantis ventri superposita partum promouet. Radix Lili albi domestici decocta, tusa, ac Oleo communi mixta, adhibita tumores emollit. Sed hæc super hanc rem dicta sufficiant.

LILIVM ALBUM SYRIACVM Rauvvolci.

Lili quoddam genus in Maiori Bazar pergrinum mihi obseruatum (inquit Rauvvolci) in mercatorū potiōsimū officinis, quod in paludibus, stagnis, vdisque provenire mihi narratum fuit. *Caulem erigit oblongum, colore & crassitie nostratium persimilem, latorem tamen multo,*

Descriptio

superna portillimū in parte, quatuor digitorum latitudine excedit, ita ut spathe senam in acutē desinenti conferri possit. Folia hunc utrinque stipant plusculā, tenella, satis longa, angusta et nuda, decidua. Summa Lilia aliquot occupat nostratibus similia.

lucius sic describit:

Classis de scriptis

Caules tamen vulgari Lilio non sunt breuiiores, si quis diligenter contulerit graciliores esse deprehenditur, rarioribusque & minoribus foliis septi, atque etiam ipsius flores aliquatō minores, atque tamen ac vulgares odorati. Nonnullæ verò radices in tantam molem excreuerunt



manu comprehendi possent: vñ etiam illarū plures quā sexagenos flores protulit: caulis autem planus fuit, & tres ferè uncias latus: anno verò subsequente ad ingenium rediit. Sic interdum natura in plantis ludere solet.

Liliacea radix missa Coudenbergio: quæ illi flores huic omnino similes tulit: quam quoniam

M m m

*Lilium fa-
tum.
Sultan
Zambach.*

*Martagon
Constant.*

*Martagon
candidum
Chalcid.*

Locus.

plerumque in extremo caule confertim nascebatur, & interdum vitium faciebatur, ipse Lilium fatum cognominare solebat.

Constantinopoli radices mille nomine *Sultan Zambach*, quibusdam amicis in Belgiam pro Martagone Constantinopolitano: Hinc apud Belgas modo *Sultan Zambach* appellatur, modo Martagon Constantinopolitanum flore albo, cum tamen, teste Clusio, vnica eademque sit planta, non duae diuersae. Sultan Zambach, propter amoenitatem & floris decus, vel fortè quod magno Sulcano dictum, Lili hoc genus appellatum videtur.

Lobelio Obs. Radix illi Lili cruenti, sed notulis, labeculisque purpurantibus variata, nuper Constantinopoli multa. Martagon candidum Chalcedonicum, Indidem delatum visenda venustatis, ut si quid aliud, istud Lilium asseritur: folia Lili albi nostratis candidiora, & radix ite cognata. Leon. Pl. p. 163. Martagon album, Lilium candidum Byzantinum Teut. 201.

Rauwolf. itin. Lili albi genus visum in magna Batzar de quo Theophr. lib. 4. c. 9.

Hist. Lugd. in append. p. 30. Lilium album Syriacum, quidam esse volunt Lilium à Theophr. memoratum lib. 4. c. 9. Ceterum de Stratiote aquatico Theophr. verba intelligenda sunt, cuius meminere Athenaeus lib. 14. & Plinius capit. 15. lib. 24.

Camer. hort. Lili albi species Constantinopoli allata. Apud Marti. Germ. Sultan Zambach. C. Bauh. Phyt. Lilium 2. siue album peregrinum, Clusii Sultan Zambach. Lob. Martagon album. Lilium 3. siue album peregrinum alterum Rauwolfii. Lilium pulchrum.

Lilium Byzantinum album ostendit Nobiliss. Frid. Meier Argentinae mense Maio, quod nondum florebat.

HEMEROCALLIS VETERIBVS.

Hemerocallis (ut Diosc. describit) folia & caulem Lilio similia habet, viridia velat Porrum: flores in ipso caule sunt per singulas propagines tres aut quatuor, fissuri, Lilio similes, quum hiare coeperint, colore vehementer pallido: radicem v. magnam & bulbosam. Hæc trita pota, & cum melle in lana apposita, pellum præbet, qui aquam & sanguinem ducit, Folia trita impolita, mammarum ex partu, & oculorum inflammationes mitigant. Sed & radix & folia ambustis commodè imponuntur.

Hemerocallis inter ea quæ folio tantum coronant Plin. numerat. Alio in loco, Hemerocalles, inquit, pallidum è viridi & molle folium habet, radicem odoratam & bulbosam. Quæ de Hemerocallide Diosc. accipienda esse, perspicuum est.

Ex illis verò quæ Theophr. lib. 8. c. 1. de Hemerocallide prodidit, colligere licet, eam à Diosc. bulbosa dissidere: Recentens enim suffrutices coronarios, hanc inter illos, lignosa esse radice, & minutis constare foliis affirmat.

Quando verò Plin. Hemerocalles folio tantum coronari tradit, sibi minùs constat: Theophr. enim (ut Dalech. annotat) simpliciter has esse coronarias scribit: ac eius descriptione alibi tradita truncaram & deprauatam esse patet conferenti cum Diosc.

Athenæus ex Theophr. Hemerocalles inter co-

ronarios flores numerauit, dicens lib. 3. Dipnos. ex Cratino:

Pascitur mihi caput ex charo Hemerocallide.
Floris Hemerocallis qui noctu flaccescit ad exitum Solis mox reuiuiscens, Cratinus in Effeminatis sic meminit:

*Anemuratum vernis calicibus, Serpille, Orco,
Hyacintho, Elychrysi ramis, Oenanthe,
caroque mihi Hemerocallide.*

Notatu sanè digna quæ Dodon. de Hemerocallide literis consignauit: Hemerocallidum, inquit, vna frutex, alia flos est. Hemerocallis frutex ex genere est coronariorum & lignosorum de quo Theophr. lib. 4. c. 21. Plin. lib. 21. c. 21. Alia Hemerocallis flos est, cuius descriptio apud Diosc. est suspecta: quod enim radicem addit *quorundam flos* & *in quibusdam* inuenit deprauatam: vel enim superfluis videlicet ampliata: vel duorum Liliorum mutilas descriptiones, in vnâ contractas, Hemerocallis videlicet & alicuius alterius Lili. Nisi fortassis & bulbosum aliquod sit Lilium apophyses faciens, & vnius tantum diei florem luteum habens: quales tamen nondum constat alicubi repertum esse.

Ceterum Hemerocallis Theophr. & Plinii frutex coronarius vulgò creditur.

Dod. & alii quidam Hemerocallidem Diosc. & Athenæi censent esse Lilium Aphodeli radice, & foliis, flore luteo.

Pancretium Monspellanum, quod quibusdam Scylla maior alba, nostro iudicio non bene dicitur Hemerocallis Theophrasti ac etiam Diosc.

Corona Imperialis Clusio dicitur Hemerocallis, est autem nobis occasio cur dubitemus, ut postea dicitur.


Habetur & Lilium Persicum hemerocallis, siue Susianum Pennachio, Persiano folio purpureo.

Dicitur quoque de Lilio rubro vel croceo minore, vide Lilium rubrum.

Hemerocallis Cornario Lilium flore nutante ferrugineo. Item Lonic. Gesnero Hemerocallis purp. C. Bauhino an Hemerocallis?

Est tandem Hemerocallis altera Marti. nobis Lilium flore miniato.

LILIUM RUBENS VEL CROCCEUM maius



PAr est magnitudine Lilio albo, nisi quoddam folia incondita, minùs sunt lata, ac firmiora, nervosiora, atque re splendens, longiora quàm in bulbifero, caulis maculatus, bicubitalis, summitas in pediculos aliorum facessens, singulis singulos flores inhærentes sustinet, Liliaceis magnitudine, for-

Datum

*Hemerocallis
equiuoca-
tiones.*

*Pancretium
Monspell.*

*Corona Im-
perialis.*

*Lilium Persi-
cum.*

*Lilium rub-
rum ma-
ius.*

*Lilium flo-
re nutante
ferrugineo.*

*Lilium flo-
re miniato.*

Descriptio

formâ, foliorumque numero similes, verum colore fusco coruscantes, saturatioribus intus stigmatibus punctati. Radix subest bulbosa & squamis compactis, alba, ex qua ramuli repentes novos generant bulbos.

Hemerocallin Matthiol. vulgus Lilium silu. nominat, cuius flores colore perquam pallido, ut Dioscor. ait, adeo ut fulgentis auri modo rutilent. In hist. Germ. Rote Goldgilgen. Hemerocallis. Boh. Lilium glare.

Camer.

Figura à Camer. pro hoc Lilio posita non placet. Facile crediderim Lonicerum sub his verbis (Lilium croceum, Gelb lilgen / quod excrevit interdum ad duos cubitos, læditurque à nimio Sole) scribere de Lilio rubente maiori, quamvis figurâ id minus exprimat.

Dodon. Gall. Lilium alterum rubrum ab Herbaris Martagon dictum. Item hist. fl. & in fol. Lilium purpureum maius, quod Matthiol. Liliū sylvestre in Italia appellari, & Hemerocallida esse, ait: quod tamen verisimile est Hemerocallida non esse.

Hist. Lugd. p. 1493. Lilium purpureum maius Dodon. de fl. Et pag. 1498. Hemerocallis prior Matthiol.

Anguill. de hoc Lilio ait esse Martagonis speciem radice alba, floris magnitudinis Lili, & epistola 13. ait: Non inuenitur planta quæ melius correspondeat Hemerocallidi Dioscoridis, quam Cynorrhodon Plinii, id est, Martagon Liliaceum, Lilium rubens vel croceum alterum, Hemerocallis Matthiolo, quod Italicum cognominat.

Lobel. & Pena Adu. Lilium purpureum siue Chymistarum Martagon. Gall. Lis orange. Colores Lilio candido quæstos mangonio fuisse, et si rei rusticæ Scriptoribus Plinius asseueret, tamē purpurei Lili duo genera sponte non arte oriri cum Dioscor. plurimi montes hodie testantur. Senilis vocis huius ignarus, Phœniceum n. Lilium, valde alioqui notum, dicit esse, colore perquam pallido Diosc. falso teste adducto.

Matth.

Tabern. icon. & hist. Rote heydnisch Lilien. Martagon rubrum. Figura Tabern. placeret pro Hemerocallide Matthioli, quamvis aliter sentiat, qui ei patrocinari statuit.

C. Bauhin. Phyt. Lilium 4. siue croceum maius, rubens Plinii: Lilium rufum Trago. Aliquando flore pleno reperitur, viduus & candido. Item apud Matthiol. Lilium croceum maius, rubens. Plinii fortè Hemerocallis Dioscor. Brunf. Fuchf. Gesner. Lilium rubens Dodonæo. Lilium rufum, Lilium purpureum maius Lugd. Camer. Fuchfio & Lonicero. Lilium croceum. Tab. Liliū croceum maius. Gesnero Martagon. Lilium purpureum maius Cæsalpino: Lilium sylu. aureo flore. Tragi Lilium rufum mihi ad minus referendum videtur non ad maius. Idem etiam de Lilio rubente Fuchfii & Gesneri: Tabern. Liliū croceum maius mihi videtur potius ad minus accedere, nec velim eius figuram ponere pro Hemerocallide Matthioli. Camer. apud Matthiol. novam figuram ponit pro Hemerocallide. i. quæ nō placet, & quæ fortè Lili rubri minoris. Lilium purpureum maius Lugd. huc non referendum existimo, uti antè dictum, maius pro minus scriptum. Martagon Gesner. de hortis f. 104. huc non pertinet. Cæsalpini descriptio convenit minori Lilio rubenti.

C. B. Loph.

Camer.

Lacina.

Nusquam non provenit [teste Matthiol. in Italia, quandoquidem circa mensem in arvis inter segetes, in pratis, in montibus, & in vallibus aureo colore emicat. Ego Lilium croceum maius

Tom. II.

siue rubens vidi Basileæ in horto Di. Doct. Feliceis Plateri: Montbelgardi habeo in horto Ill. E. C. Wirtemb. delatum ex Marbach ducatus Wirtembergici, ubi florebat Iunio.


Et licet secundum Dodon. purpureorum Lili- Tempus
orum in Medicina incognitus sit usus, & facultas incomperta. Scit tamen Lobel. bulbos Lili puniceæ eadem posse quæ Diosc. vult de Hemerocallide.

LILIVM RVBENS VEL CROCEUM minus.

Squamatus bulbus caulem promit angulosum striatum, altitudine sesquicubitali, cui temerè folia numerosa adnascuntur atro virore splendens, perquam angusta, secundum longitudinem nervosa: caulis fastigium in aliquot pediculos firmos, punctis rubris variegatos, modicè hirsutos diuiditur: quorum unicuique inseritur Liliaceus, colore ex rubro flavescente seu croceo, folia intus sulcata & punctis saturatioribus notata habens, odore suavi, staminibus & pistillo flori concoloribus.

Descriptio

Lilium rufum, Germ. Rote goldgilgen, Plin.



& Diosc. testantur Lilia rubra arte fieri posse, quod an verum sit necne, si affirmare poterit, qui hoc experti fuerint. Neque satis constat Trago, an hoc Lili genus Plinius Rufum dixit. Hieronymus Brunschweig Narcissum vocavit, nec temere quidē, cum & Theophr. ipse lib. 6. cap. 6. Lilia Nar-

cissi voce appellavit: Crediderim equidem radicem huius quoque Lili, sicut & albi, maturandis & emolliendis quibuscumque abiectionibus prodelle.

Pingit Brunfel. Germ. Lilium hoc croceum minus, sub genere alio Lili Goldwurz & Goldgilgen / aut Rorgilgen.

Apollin. Gelb lilien / cui tribuit eadem vires, quas Lilio albo.

Meminit Anguill. tertie speciei Martagonis radice alba: quam existimat Hyacinthum Homeri, Theocriti, & Pausaniz, ac Ovidii: ait etiam Dioscor. & Theophrastum huius plantæ meminisse. Non erraverit opinatur Gesner. hort. qui Hemerocallidem alpinam, appellaverit. Pingitur aut idem postea à Matthiolo pro Hemerocallide altera. In hortis hoc etiam diu vivit &c. Gesnero an hic assentiendum dubitamus. Si enim Matthiolus hoc Lilium intelligit per Hemerocallidem, quod non existimamus, flores malè pecti. Dodon. & Lobelius Hemerocallidem ab Lilio rubro minore separant.

Gesner.

M m m 2

*H. Lugd.
Hyacinthus
Ondus.*

Clusius vocat Liliū rubrum minus non bulbi-
ferum. Hist. Lugd. p. 1493. Liliū purpureum
maius [scribendum, ut iam diximus, erat minus]
Dodon. Item p. 1494. Alterum purpureum Liliū
minus.

Dodon. Gall. Lilli secunda species *αλφω πορφυρ.*

Liliū rubrum, Liliū rufum. Ouidio Hy-
acinthus. Belg. roode lilien. Hist. Lat. fl. & in fol. O-
uid. Huius generis Liliū Hyacinthum appellat
ab Hyacintho adolescente:

*Flos oritur, formamque capir, quam Lilia, si non
Purpureus color his, argenteus esset in illis.*

*Non satis hoc Phoebo est, [is enim fuit author
honoris]*

Ipse suos gemis foliis inscribit: & ai, ai.

*Flos habet inscriptum, fuisseque littera du-
cta est.*

Huius Hyacinthi meminit etiam Theocritus in
Epitaph. Bionis Eidylio 9.

*Νῦν ὕλην δὲ λάλειν καὶ τὴν χάριν αὐτῆς, ἵνα μὴ αἰ,
ἀδύνατον τοῖς πετάλοις.*

Ut & Virgilius in Bucol. Eclog. 3.

—Phaeo sua semper apud me

Munera sine Lavi, & saue rubens Hyacinthus.

Dicitur rubens Hyacinthus, qui ab Ouidio pur-
pureus appellatur. Color siquidem florum ru-
bens, subinde nominatur purpureus. Existima-
tur & iste Hyacinthus ferrugineus cognominari,
quod ferruginis instar rubeat. Sed non omnibus
haec sententia probatur, quibus ferrugineus non
alius videtur, quam ad caeruleum accedens &c.
Hyacinthum purpureum siue rubentem Recen-
tiorum plerique Hyacinthum Poëticum appel-
lant, at nobis magis placet hunc scriptum Hy-
acinthum dici. Theocr. Eidyll. 10. Hyacinthum
γελαντον, id est, scriptum appellat. Pausanias Co-
rinth. lib. 2. Scriptum Hyacinthum aut ei si-
millimum florem Comosandalon ab Hermio-
nensibus appellari, memoriae prodidit. Sunt in-
quit, corollae ex flore contextae, quem *κομοσάνδαλον*
incolae appellant. Hyacinthum illum existimo:
est enim ei tum magnitudine tum colore persimi-
lis: habet praeterea eandem luctus indices liti-
ras.

Lobel. & Penz in Obs. pag. 84. & Adu. pag.
61. Liliū purpureum minus, Chimistarū Mar-
tagon. Gall. *Lis orange*. Ital. *Giglio rosso*. plant.
icon. pag. 164. Martagon Chimistarum. Liliū
purpureum siue Phœniceum vulgare. Lobel. 84.
Teut. 204.

An Camer. apud Matth. Germ. *Rote Gold-
gilgen/Hemerocallis*.

Tab. 107.

Tabern. icon. & hist. *Groß gold gilgen*. Liliū
aureum maius. Quamvis Compiler maius vo-
cet, huc reducimus, quia figura satis accedit ad
minus: praeterea maioris bonam figuram alio
ponit titulo, miror eum qui Patrocinium Matth.
suscepit, hanc figuram maluisse assumere primā
Herocallide. Calp. Bauh. Phyt. Liliū 11. siue cro-
ceum minus.

Liliū croceum minus, Basilicae in hortis pro-
uenit; Nos habemus Montbelgardii in orto E. C.
id etiam collectum in Passauant in orto D. ab

Andlav. plantani in orto E. C. Hoc

Liliū reptitices propagines
ex sedimittit multas.

LILIVM PHOENICEVM DILUTVM.

Descriptio

Ob. icon. Pl. p. 164.
Martagō Chy-
mistarum af-
terum: Liliū
phœniceum
dilutum Teut.
204. C. Bauh.
Phyt. Liliū
5. siue phœni-
ceum.



LILIVM CRVENTVM LATIFOLIVM.

Bomnino tali,
quali Liliū albū
caule verd dona-
tur, non ut cetera
Lilia, crasso, qui
florem producit u-
nicum, cruentum,
sex foliis latis con-
stantem. Cauli fo-
lia rara, valde la-
ta, Plantagini si-
milis.

Tabern. icon. &
hist. Breyt bles-
terich blut gil-
gen: Liliū crue-
tum latifolium.
C. Bauh. Phyt. Li-
lium 6. siue cruen-
tum latifoliū. Tab.



LILIVM BULBIFERVM MAIVS.

Descriptio

Bulbicali
interdum
allurgit caule,
firmo, crasso,
f. l. septo li-
liaceis, suba-
tris, in summis
alis crassiores
bulbos gestans,
& amplios flo-
res rubros. Li-
lio puniceo
minori non
bulbifero con-
colores. Tene-
riores huius
plantae, ante
quam flores
ferre incipiāt,
bulbis secun-
dum caulem
inser-



inter folia natis non minus donatæ sunt, quam reliquæ duæ species: sed quando robustiores sunt floresque aliquot annis protulerunt, vix, nisi in summo caule, ubi in alas diuiditur, & secundum flores, maiores bulbi nasci solent.

Liliacea stirps, seu Liliū bulbiferum 1. siue ut Clus. appellat cruentum, Martagon bulbiferum 2. Liliacea stirps Clus. seu Liliū bulbiferum, siue ut appellant, Liliū purpureum siue rubrum maius, Martagon bulbiferum maius.

Lobel. Obs. Liliū cruentum bulbos gerens summo alis diuiso caule: Liliū cruentū varietas Martagon, cui flores rutilant, bulbos nucleis stipatos summo caule alis diuiso profert. Icon. Pl. pag. 165. Liliū cruentum Teut. 205.

Hist. Lugd. Liliū cruentum bulbos gerens Lobelii.

Casp. Bauh. Phyt. Liliū 7. siue bulbiferum latifolium.

Florat hæc planta Liliacea cum duabus subsequenteribus Iunio, alia aliā paulo maturius, semenque perficit Augusto, bulbi in alis (inquit Clusius) hæere solent, donec vento aut contactu excutiantur, imò interdum plantæ adhuc in hærentes, fibras deorsum spectantes agere solent, tanquam ad communem matrem terram aspirantes, & illā se condi cupientes.

Hæc quidem nullibi sponte nascens à Clusio obseruata est, sed eā primum Lix conspexit Clusius in horto Mariz de Brimeu, quæ deinde bulbis in terram depactis, reliquis Belgicis hortis breui tempore communis facta est, atque etiam nunc Viennensibus ac aliis vicinis, Clusii operâ: nam ipsa aliquot maiores bulbos è Belgica mitebat.

Solent verò cum hæc, tum aliæ duæ non bulbiferæ, cum primum florū geminas ostendere incipiunt, à formicis admodum infestari, sic ut eo tempore nunquam immunes ab ipsis conspiciere liceat: non secus ac Pzoniz flores antè quàm explicentur, qui mirum in modum etiam à formicis appetantur, præsertim qui plenus est, & ille etiam explicatus atque apertus.

LILIVM BVLBIFERVM INCANVM.



ioris colorem plurimum accedunt. Eius adulatoris caules paucos etiam bulbos, eosque superius minores, nisi in summis alis gestare solent.

Tom. II.

Liliacea stirps, Liliū puniceum, siue, [ut Clus. hist. appellat] cruentum: Liliū bulbiferum, siue Martagon bulbiferum 2. Et Pann. Liliū purpureum siue rubrum bulbiferum, Martagon bulbiferum incanum. Clusius proponit figuram quæ est Ic. Pl. secundo loco Liliū cruentū bulbos maiusculos gerentis, ubi duæ figuræ sunt sub vno titulo.

Casp. Bauh. Phyt. Liliū 19. bulbiferum incanum.

In montanis pratis Austriæ & Styriæ sponte crescit, sed rarior inuentu. Cæterum omnium flores terram spectant, & per interualla in summo caule nascuntur, foliaque ad pediculum reflexa habent: semen etiam in trigonis capitibus duplici serie in singulis angulis continetur, fuscū, planum, cartilaginofum: radix luteo Ochreæ colore infecta est, quam ob causam à Germanis Goldwurty id est, aurea radix appellatur.

Locus & tempus.

LILIVM BVLBIFERVM REPENS.



Quammodo

bulbo cum alis huius generis conuenit: cæterum caulis firmus, striatus, cubitalis, ac maior multo, maculis nigris notatus, lanuginosus, in alas diuisus, flores multos profert amænos, Liliū formā, nec non aliquatenus, odore, ex senis repandis aliquantum foliis, multo croco tinctis, intrinsecus multis liris asperatis

Descriptio

(qua parte & color folii mediū diluor, punctatq; saturatè sanguineis notatis: extrinsecus lanugine leui persusis: quorum non nulla elatiorem, latiorē, saturatioremque costam, profundo utrinque ad latera sulco, habet: medium florem obsident reliquorum instar sena stamina pistillumque triquetrum, eodem cum flore colore prædita: folia serè Martagonis, quorum alis bulbi frequentes inident. Multum se propagat bulbis ac etiam maioribus repentibus.

Lubet hic subnectere Clusii descriptionem quæ sic habet: Inter Liliū purpureum bulbiferum maius & incanum, media est magnitudine, nonnunquam etiam primum æquat: sed caules sunt infirmiores, gracilioresque, ipsique cum foliis dilutiore viore præditi: flores secundo generi similes. Hoc perpetuo secunda bulborum inter folia nascentium sobole onustum est: cuiusque radix priore minor è lateribus propagines spargere plerumque solet, quæ ad singula genicula in candidos bulbos excrecentes, subinde nouas in circuitu plantas producant, Liliū rubri minoris non bulbiferi modo: eius bulbi in alis nati, secundæ speciei pares, priori tamen magnitudine inferiores: omnesque terræ commissi sui generis plantam procreant, & secundo anno in cau-

M m m 3

sem bulbillis onustum excrefcunt. Ferunt tamen omnes hę plantę in capitibus triangulis semine latum cartilagineum subfuscum, quemadmodum Liliũ vulgare, quod non sterile est, sed sui generis etiam plantas profert: verũ quę ex bulbillis in alis natis crescunt plantę longę etius adolefcunt.

An Gesner. hort. Liliũ rubens seminiferum, Lilia crocea quę semina in caule habent? An Clus. Pann. Liliũ purpureum siue rubrum bulbiferum minus, Martagon bulbiferum minus, Martagon bulbiferum pratense. In hist. Martagon Liliacea stirps: Liliũ puniceum siue (ut vocat) cruentum, Liliũ siue Martagon bulbiferum? An Lobel. Obs. Liliũ quartum Lilio purpureo maioripar: flore Martagonis rufo: & secundum caulem sesquicubitalem bulbulis à medio ad summum vsque ornatur: Liliũ cruentum 4. Icon. Plantar. p. 166. Liliũ cruentum secundum caulem bulbulis donatum Teut. 204. An Dodon. Lat. Liliũ purpureum tertium, Liliũ bulbiferum? Hist. Lugdun. Liliũ cruentum aliud Lobelii. Casp. Bauhin. Phyt. Liliũ 9. siue bulbiferum minus. Habemus copiose in horto E. C. quod se facillè multiplicat ex bulbulis deciduis, quales etiam Sturgardie collectos plantauimus. Bulbulos interdum fert priusquam florem producat: alioqui in magnam crescit altitudinem & multa fert lilia.

Locus
tempus.

LILIVM CROCEVM flore pleno.



IN Iconibus colore depictis Ill. Principissę expressa hæc figura anno 1608. colore est croceo.

LILIVM BVLBIFERV cruentum angustifolium.

Lobel. Iconibus Plantarum. p. 166. Martagon cruentum angustifolium exiguis alis diuiso caule nucleis compactos bulbos gerens, Teut. 166.

C. Bauh. Phyt. Liliũ octauum, siue bulbife-



nam angustifolium, Lobelii Martagon cruentum angustifolium.

LILIVM FLORE NVTANTE ferrugineo duplex maius & minus.



Delapda

FVLVVS huius bulbos ex squamis acuminatis compactis, subduli & viscido sapore, fibris donatus albidis, aliis in imo, aliis quę cauli committitur, quem erigit bicubitalem, teretem, punctis rubetibus maculosum: cui ex intervallis radiata circumnascitur foliorum Lilia-

ceorum atrourentium series: circa caulis etiam summum, singularia folia temerè quę fors tulit apponuntur: caulis fastigium ornant Liliacei penduli flores, sex foliis pinguibus purpurascens, sanguineo saturatiore guttatis, reflexis admodum, constantes: quorum medullium occupant totidem ferruginei apices cum pistillo, odore graui.

Cordus sic descripsit: Caulem erigit plerumque bicubitalem, teretem, gracilem, & viridem, solidumque, inferius purpurascens maculis conspersum; foliis quincuncialibus longitudine, & duarum vnciarum latitudine, glabris, ex rotundo turbinatis, & pinguibus vestium, illę iuxta annexum angustioribus, superne nigrescentibus, inferne autem viridibus, eminecibus, ramosisque, à tergo & in mucrone coeuntibus venis: flores æstatis initio ptoni summo cauli adnascuntur Lilio figura similes, muled tamen minores: nā senis vncialibus constant foliis mediū digiti latitudine, sursum reflexis, colore in pallido tubentibus, intusq; purpureis maculis conspersis, substantia pinguibus, carnis & glutinosę.

stant

Stamina ferunt singuli flores fena, foliis numero respondentia, in quorum extremitate oblongum & transversum quiddam est, colore in purpureum, rubiginoso pulvisculo, statimque percuncto conspersum: e medio staminum prodeit incurvus apex in triquetrum rubensque capitulum desinens, viridi & triquetro folliculo insidens, qui defluentibus florum partibus solus remanet, & resupinus sursum incurvatur, paulatimque increfcit, donec vicia longior & semun- cia latior fiat, qui inferius angustior existit, idē sex eminentibus angulis toridemque lateribus costat, intus autem tribus membranis seu parietibus in tres cameculas per longitudinem di- viditur, in quibus bini contigui, parvorum, latorū, planorum, levium, sibi invicem superiacentium & florum seminum ordines continentur. Ra- dicem habet bulbosam, diuturnam, iuglandis quantitate, pinguis, crassis, acuminatis & flavis aut lucis squamis, veluti nucamentis sursum spe- ctantibus compositam: a qua alii exigui prode- unt bulbi, quibus se propagat. Saporum habent lentum, glutinosum & nauseosum, tam flores quam radices, Liliū saporē respondentem. Na- scitur in sylvis & frutetosis locis, tam editis quam planis.

Clusius in post. hist. duas proponit icones: v- na est titulo Liliū montani siue sylv. i. maioris, quæ apud Lobel. in Plant. pag. 168. est pro Heme- rocallide flore rubello, Teut. 207. Alteri verò i- conī appositū Clus. titulum Liliū montani siue sylv. minoris, eam autem iconem Lobel. inter i- cones Plantini p. 168. ponit pro Lilio montano. L. 207. Teut. 207.

Bruch. Germ. Goldwurz / Goldgilgen. Apud Doctos, inquit, nec apud Diosc. certum no- men nondum inveni: quamvis aliqui ad Hastu- lam regiam & Asfodilum aptare velint. Com- munia Herbaria, Asfodilum nominant, quod G. *heydnische blumen / vel heydnische gilgen* appellant.

Cord. in Dioscor. Hemerocallis sylvestre Li- lium est, quod Germ. *Gold polne / siue Gold- wurz* appellant. Pharmacopolæ verò Asphode- lum, sed falsò. *Goldgilgen* etiam dicitur.

Göfner. Cord. in hist. addit figuram ex Trago dicens: Hemerocallis rubens, quæ Italorum Mar- tagon videtur, quo pro Asphodeli imperiti qui- dam hæcenus abusi sunt. Olim in ea sui inquit Trag. sententia, ut crederem *Goldwurz* & *hey- dnische blumen* esse Asphodelum seu Hastulam regiam Dioscor. sed animadverti non esse, nec video quò rectius referri possit hoc Liliū genus, quàm ad Hyacinthum Poëtarum, de quo Virgi- lius Aëgl. tertia & Ovidius. Idem mecum sen- tit Marcus Platearius.

Appollin. fol. 94. vocat *Goldwurz / wild- schwertel* quod non placet.

Fuch. hist. cap. 40. Asphodelum Officinarum Asfodilum, Germ. *Goldwurz / Asphodelum* fo- minam vocat, quam propriè Hastulam regiam vocari dicit, hanc exhibet pro Asphod. fo- mina, Theophrast. lib. 3. cap. 12. & pro Asphodelo He- siodi, & Galeni lib. 2. de alim. facult. Hastulam regiam etiam Apulei putat. Verum in 1c. libro Fuchius mutata sententia vocat Liliū purpu- reum & *Goldwurz*.

Cornar. In Germania pauci aut nulli verum Asphodelum norunt, nam ea radix quam Offici- næ Asfodilum corruptè vocant non est. No- stris dicitur *Goldwurz*. Hemerocallidem Dio- scor. dictam Plinius ex Theophrast. Hemerocal-

les appellat lib. 21. cap. 10. & de eo tursus eodem libr. cap. 21. Galeno Hemerocallis appellatur, Herbariis Liliū sylvestre aut marinum. Nostris *Meerlilien* aut *wilde heydnische lilien*. Qui- dam tamen hunc Asphodelum esse: Alii & ve- risimilius, Narcissi speciem volunt.

Theophr. Golius in Quom. Hyacinthus, *Golde- wurzel / heydnische blumen*. Asphodelus idem. Hastula idem. Oportebat scribere quem Hyacin- thum intelligeret. Autore Matthiol. Inter Lilia maris annumerari potest quod Martagon Chy- mistæ appellant, & Fuchius Asphodelum fo- minam putaverat esse, sed hanc suam mutavit sententiam, sui erroris conscius factus. Item Epir. cum add. Camer. pag. 571. Martagon Chy- mistis.

Apud Anguill. fit mentio Martagonis vulgi & Alchimistarum, radice lusea, de hoc loquentem, ut puto.

Dodon. Gall. *lilium*, Liliū sylv. in qua- busdam Officinis Asphodelus, quā non sine ma- gno errore usurpant pro Asphodelo. Belg. *Lols- dens von Caluarian / heydens blumen* & *wils- de liliën*. Hist. flor. & in fol. Liliū sylvestre: Gall. *lis sauvage*. Non amplius ergo facit He- merocallidem.

Diligenter inquirendum qua in re differat Hemerocallis hæc Lobelii à suo Lilio monta- no. Ostendimus autem Clusium eam iconem ponere pro Lilio montano siue sylv. i. ma- iore.

Cas. Liliū in sylvis vulgò Martagon, Liliū sylv. Liliū purpureum gerens florem.

Thal. Harc. Liliū purpureum sylv. falsò pro Asphodelo habitum, *Goldwurz* passim. H. Lugd. Martagon Matth. Camer. hort. Liliū sylv. Mar- tagon flore subrubro & albicante falsò olim pro Asphodelo habitum. In hist. Matth. Germ. dicit flore pæne albo.

Tabern. icon. & hist. par. 2. pag. 527. *heydnische lilien mænlein / Liliū Sarracenicum mas.* I- tem ic. p. 640. & hist. par. 2. *heydnische lilien das weibllein*.

Casp. Bauhin. Phyt. Liliū 19. siue montanum nostrum maius. Clusio Liliū sylv. 7. Gesnero purpureum mas. Liliū 20. siue Martagon mō- tanum minus. Idem apud Matthiol. Liliū 16. siue Martagon flore rubello, an Hemerocallis Dioscor. Huius duas proponit icones Taberni nomine Liliū Sarraceni maris & foeminæ. Ut ve- rum fateamur nondum intelligimus divisionem C. Bauhini, dubii hæremus an Tabern. Liliū Sarracenicum mas, sit nostrum Liliū flore nu- tante maximum de quo paulò post.

Liliū purpureum Martagon dictum flore in- clinante, vidi Ferrariz in horto Monasterii S. Dominici à l'Angeli, Patavii in horto Triue- sani. Montbeigardi spontè copiosè in monte *Bar*. Ex horto meo transtuli in hortum E. C. Ba- silex Frater observavit in monte Murerz, vbi e- tiam observavi. Genex in montibus abundat. Passim utrumque genus Clusii provenit in sil- vis & vmbrosis pratis Leytenberg, corūq; mō- rium, qui à Calenberg Austria, ad Alpes usque procurunt: Nascitur & in plerisque Styriæ ac Vngariæ silvis, atque montibus illis siluosis, qui non procul Francofurto in ripa Mœni sito, ad Septentrionem absunt. Minus autem olim ob- servare meminir in multis Germania silvis, noq; modò editiore loco sitis, sed etiam in plano. Plantatur hodie in hortis hic Narcissus: (inquit Tragus) sicut alia quoque florum genera, volup-

Golius m.

Martagon
vulgi &
Alchim.Hemerocallis.
Non est
Asphodelus
Lilium
sylv.
Dodon. mutavit
sententiam.Lilium
purpur.
Dist.

Locus.

tatis gratia. Aliàs in altissimis syluis Helueticarum, & eà quoque quæ Hercynia dicitur, nec nõ monte Tonicui, qui à Vualgoia non longè abest, sponte sua prouenit.

Lilii Martagonis Vires.

Qui difficulter urinam reddunt, radicem in vino decoctam bibant: prodest id medicamentum mulieribus, inquit Tragus, quibus menses impediti sunt. Omnes calidi abscessus & tumores radice tusa emolliri possunt, præcipuè verò mamarum & genitaliũ. Quidam vini facibus prius concoquendam tradunt. Radix in cinerem redacta, cumque melle temperata, illita alopecias explet. Reliquas cum Lilio albo vires obtinet.

Del. m.

Perhibet quoque Camer. Empiricos vti radice in contusis membris & vlcibus. Contra Dodon. dicit: Vsum hoc Lilii genus in medicina nullum habere, cum tamen olim illi Hemerocallidis vires ascripserit. Minime tandem viribus, quas Apollinaris ei tribuit, fides est habenda.

LILIVM FLORE NVTANTE ALBO.

Descriptio

Lilii montani siue siluestris tertium genus siluosis montibus ad Francofurti Septentrionem inuentum, humile, Secundo generi proximum: florum tamen colore varium: nam antè quàm explicentur, foris carnei quodammodò coloris sunt, explicati verò, intus albi, & uoris quibusdam purpureis insigniti.

Similem litpein habui, inquit Clusius, munere N. V. Boullot veteris amici, quæ tandem adoleuerat perinde ac primi generis plantæ: sed eius radix Ochra colore minus tincta, quàm superiorum. Sed Francofurtensis quidam ciuis vnam habebat, cuius flores interiore parte omnino niuei, nec vllis notis distincti. Habui etiam à Doctiss. viro Ioachimo Venerio similis plantæ bulbum Burdigalæ missum, cuius forma ab illius bulbo non differebat, sed eius caulis & folia magis cædabant, flores autem antè quàm expanderentur multà lanigine erant obfusi: explicati verò prorsus niuei, nec vllis maculis infecti, staminum apices non ferruginei coloris vt aliis, sed flauis.

Est nobis Montbelgardi in horto Il. C. Wirtemb. Lilium flore nutante, quod cætera simile præcedenti flore lacteo, staminibus herbidis, quibus insident apices latei: pistillus virefcit florens Iunio. Attulit Gener. Io. Henricus Cherlerus Romæ ex horto insignis Pharmacopæi Coruini. Floret Montbelgardi Iunio.

LILIVM FLORE NVTANTE MAXIMUM.

Descriptio

Bulbus maximus profundè in terra laticans: caules aliquot cubitorum: florum ingens numerus, qui videntur minis maculati: folia angustiora videntur, multò plura, & quædam verticillatim disposita.

Hoc primum vidi in Than Alsatiz vrbe in horto Dj. à Pfirt parte vmbrosa, vnde transituli Montbelg. in hortum Ill. E. C. Witt. Obseruauimus postea in Duc. Wirtembergici vrbe Marbach in horto Ludimoderatoris florens Iunio.

Hoc genus suspicamur depingi & describi à Lobel. Adu. par. 1. Lilium silu. siue Hemerocallis moschata Polyanthes, Martagon Imperiale nuperorum, Insularis. nostris Gallo-Belgis, Martagon à l'Espine: Hoc Lilii montani nouum genus à florum fœtura coronata, Martagonis Impe-

rialis nomine insignitum aut vocitatum, conspexi. Peregrinæ elegantiz plantæ gaudis sum. Elapsis aliquot annis mihi huius bulbos nonnullos

munere dedit D. Ioh. de Fræqueuille, stirpium & floriariorum calientissimus qui annis plus decem illos Insulis à quodam Boranico nactus est & aluit, fouitque studiose in horti delitijs, vbi rarà transplantatione florum pyramidatum acervum, centum viginti & plurius, suauissimo spectaculo, iucundissimi



mi Rosæ Moschatæ odoris æmuli, densissimè bicubitalem ex purpureo fuscum caulem fastigiantem. Flores pares, similes Hemerocallidis secundæ nobis modò descriptæ; dilutiores & lucidiores, per exortus quinque aut sex variè & fuscæ caulem ornant, tortuosis ex fusco purpureis maculis latioribus diffusi, circum agunt & coronant. Semen in vasculis compressum, alijs ferè par & simile: Hoc primi ante omnes Botanici Gallo-Belgæ nacti sunt: sed vnde delatum nescio. An icon. Pl. 168. Hemerocallis flore rubello, T. 207.

An Clus. Lilium montanum 4. quoddam genus, cuius flores primo non dissimiles, sed seorsim explicare soliti, illique non inuauis odore præditi.

MARTAGON ALBICANS PICTVM ad iconem cum coloribus.





Martagon flore albicante, qui hoc anno 1608. non floret in horto Ill. Princ. sed picta coloribus iconæ exprimere curauimus, totus albidus est cum colore subæruleo & punctis plurimis notatus, apices cum capitulis longis purpureis, altitudine excedat quatuor pedes, Anno 1604. Iunii 2. Goldmurtz vti ascriptum iconi.

LILIVM

LILIVM FLORE MINIATO NVTANTE,
sive Hemerocallis Chalcedonica aliquibus.

Delcypio



Ex radice bulbosa, emergit caulis bicubitalis, minimi digiti ferè crassitudine, ima parte punctis rubentibus guttatus, ceterà virelscens, còcauus, paulò postquam è bulbo eluctatus est, radiatas fibras circumquaque emittens: per quem frequentia oriuntur folia indigesta, Lili Martagonis, striata, acuminata, per marginè nonnihil veluti pilosi ostentantia, sapore oleraceo prædita, flori cauli summo reflexo insidet plerumque vnus, aliquando duo aut plures, colore phœniceo pulcherrimo, quorum singuli Liliaceis similes senis foliis constant, vtcunque angustiorib⁹ quàm Lili albi, hæc striis notata, quæ extorsu reflexæ, cœu Martagonis, apicibus circa caulem cœunt, prominentibus, nudis, miniatiss apicibus, quos pallida flamina sustinent, quorum medium obtinet pistillum apicibus concolor. Semina, Clusio teste, sunt in anguloso capite plana, Martagonis

aut Lili sylvestris semini ferè similia, sed nigriora, minora, neque aded spongiosa, terræ commissa prodierunt, planaque foliola tulerunt: Radix vtplurimum non est aded magna vt quidam existimant, sed Lili semestris radicem haud multum superat, colorèque dum recens eruta est aded illi persimilis [etenim si diutius extra terram adseruetur purpurea ferè tota est & subinde quibusdà noris saturatè rubentibus inspergitur] vt etiam in stirpium cognitione admodum exercitati nisi eas inter se conferant, difficile discernere possint: Huius tamen radix è tenuioribus squamis contexta est, nec minùs fibris suprà & infra quàm illa donata.

Bulbum accepi (inquit Clusius) qui primis annis vnicum florem semper mihi protulit, tandem quaternos, altero tum insequente anno senos, còsque omnes ex summo extimòque caule simul prodeuntes, quemadmodum alteri floruit, tredecim flores extimo caule, eoque vnciam lato, sustinens, saturatè rubentes cùm præcedente anno quinque duntaxat extimo etiam subrotundo caule vt in eis tulisset. Sed & Patricia quædam Viennensis aliquot habuit plantas, inter quas vna extimo caule duas vncias lato tres & viginti flores tulit. Gen. lo. Van der Silf plantam habuit semine natam, quæ primo quo flores proferre cepit anno octonos, proximo autem insequente quadragenos protulit. Pictura à Rasso mihi donata videnos aut plures flores ab extimo caule plano propendentes habebat. Binas habui saturatiores flores gerentis plantas, quarum prior quaterna, altera septenos flores tulerunt, omnes summo caulis fastigio æqualiter innascentes, nõ temerè per caulem iparios, quemadmodum Lili album aut sylvestre ferè solent: singule autem hoc peculiare habuerunt, vt vnus medius inter reliquos surrecto pediculo nasceretur, & in alterà quidem ille duodenis foliis constans, & quodammodo gemellus, vt in secunda subiecta iconè videre licet. Cæterùm duorum generù esse videtur hæc planta: vna videlicet dilutioribus floribus prædita, altera saturationibus. Ego sine longà experientià didici, eas plantas quæ dilutiores ferunt flores, caulem & folia viridiora habere iis quibus saturatiores sunt flores: postremis enim caules & folia plerumque ex purpurâ nigricant. Deinde mihi conspectæ sunt radices Constantinopoli allatæ, quibus color purpurascens fuit, dilutiores protulisse flores: alix contra saturatiores. E horum verò numero, an certa aliqua differentia [vt inicidè existimabam] constitui possit, plurimum ambigo, cùm eas stirpes quæ numerosos tulerunt flores, subsequente interdum anno, paucos, aut vnicum duntaxat, habuisse obseruauerim: at læto & pingui solo depositos bulbos, plures vt plurimum proferre flores animaduersum.

Ob floris venustatem plerisque Italiæ locis *Ri-za de la Signora* appellatur hæc planta.

Lob. Obi. & Icon. Plant. pag. 169. Hemerocallis Chalcedonica purpureo sanguinea polyanthos. Lob. 85. Teut. 208. wilde lilien vom Caluarien / von Constantinopolen mit vole bloemen Belg. Iterùm Hemerocallis Bizantina altera Teut. 208. In indice Hemerocallis flore rubello: Belg. Schoon Claer weide lilie von Caluarie. Liliu Calcedonicum miniatum, sive Hemerocallis, admodum elegans hoc Lili genus ob floris decus colorisque flammæ nitorem: vtriusque Cinnabaris natui & factitii, intensi aut diluti coloris, miniatum tintillatione splendidiorum: eius duas va-

rietates aut plures observare licebit. Præcox, quinos, tenos, denosque ut plurimum profert flores: & nonnunquam eius radix excrevit & luxuriat ut caulem edat duorum ternumve digitorum latitudinis, qui Lobel. & Perz in Adu. amicis que sæpe triginta & plures flores protulerunt. Serotinum quandoque diu multique annis unicum florem edit: at temporis consequentis plures, sed serius, superioris Martagonis floribus elapsis, erumpunt flores quemadmodum amici notique iamdiu observavimus. Caulis cubitalis, cætera non dissimilia. Liliū rubrum, *Z. fuitare*, Liliū rubrum siue miniatum Chalcedonicum Constantinopoli missum, *Sultan Zambach*, ab aliis denominatum *Corona di Re*, hoc est, Corona regia, &c. Habetur præterea Liliū Byzantinum minus saturato flore *marbata*. Liliū Byzantinum miniato dilutius flore. Relatum est, conspectas esse Liliū huius Byzantini plantas, quæ florem ferrent prius niueum, in cæteris alteri patrem.

Hist. Lugdun. p. 1498. Hemerocallis altera Martholi: quæ Lugduni in orto quodam Dalech. induritia crevit.

C. Bauh. Phyt. Liliū 17. siue Martagon purpureo sanguineum polyanthos. Hemerocallis 2. Marth. Chalcedonica Lob. Liliū 18. siue Martagon phœniceum unico flore Clusio. Liliū rubrum *Zufinire*. Lobel. Hemerocallis Byzantina.

Florat Iunio aut paulo serius, Constantinopoli Viennam Clusio delatum, ex hortis ultra Bosphorum in Asia sitis bulbi allati: Nouo Vere solet emergere. Liliū genus flore unico minii coloris inclinato, ut Martagon, habui Montbelgardi in in orto E. C. missum Sturgardia, ubi flores vidi Iulio: folia vorare solent insecta quædam rubra: in orto Montb. protulit 2. flores. *D. à belle fuitare* Vesuntio misit mihi bulbū cum hac inscriptione: Hemerocallis Chalcedonica. Heidelbergæ sicca plantā nos donauit Dominus Sprenger.

De facultate huius comperti habemus nihil, nisi Dodonæo Circumforaneorum aliquis, quorum plena sunt omnia, pertinaciter resistere conetur.

LILIUM PRÆCOX NVTANTE flore rubro.

Descriptio

Habebat [inquit Clusius Hist. post.] Ampliss. vir Io. Martorf. Pat. Franc. genus Liliū tubri ex Sturgard. Ill. D. Wirt. orto acceptum, quod vno ferè mense maturius Byzantino flores proferbat: nempe sub finem Maii aut initium Iunii, ut mihi referebant qui viderant. Erat autem floris color (illorum testimonio) minus satur & longè dilutior eo, qui in floribus præcedente capite descriptus apparet: caulis sanè, ut ex planta quam mihi donabat deprehendere licuit, gracilior & breuior erat Byzantinis adultis, cubitalem videlicet altitudinem non multum excedens: *folia* quæ inhærebant angustiora & magis saturatā viriditate prædita: *bulbi* squamæ (nam squaræ radicem habet perinde ac Bizantinū) longè etiam breuiiores erant: tulcrat verò illo anno tres flores summo caulis fastigio æqualiter insidentes, mihi autem Lugduni apud Batauos sequente proximo anno unicum (tam longā enim in itinere morā radix valde afflictā fuerat,) eius, quem supra dixi, coloris, proximè autem insequente binos duntaxat. Licet autem natu-

rius altero flores proferret, illo tamen serius germinare solebat. Cæterum, sub initium anni 1594. monebat me Thobias Roelcius, Io. Somer varias & elegantes stirpes attulisse, inter quas binæ essent Lilia miniato seu rubro flore, maturius Byzantino flores proferentia, quorum alterum angustiora folia haberet illò quod Constantino- poli allatum: alterius verò folia multò breuiora essent, ac paulò latiora. Horum icones suis coloribus expressas, sed radice mutilas, cum aliquot vtriusque plantæ folijs sequente Iunio ad me mittebat.

Lilium præcox nutante flore rubro, tenuifolium.

Valdè autem diuersum est Angustifolium 3. Clusij, non quidem floris formā (nam eius etiam folia circumuoluta & reflexa) sed colore, qui Lilio cruento maiori non bulbifero similis est, tum situ, foliorumque per caulem sparsorum dissimilitudine: multa enim & conferta fert *folia*, cubitalem & ampliorem caulem confusè vestientia, admodum angusta, & longa, instar præne foliorum Tragopogi: caulis item fastigium flores profert non eodem ortu, ut in Byzantino, sed in summis alis, inter angustissima foliola *capitula* nascentes: an vtriusque radix Byzantini radicem æmuletur, me fugit, ait autor noster: nam nentius plantam videre mihi contigit. Sed & triennio post iconem suis coloribus expressam ad me mittebat idem Io. Somer, qualem ille depingi curauerat ad normam eius plantæ quæ ipsi eodem anno quinque & triginta flores protulerat. Illius floris (Exor. par. 2. Append. 2. scolo- rem plurimum ad Mali Aurantij præmaturū colorem accedere observabam: odorem autem non adeò suauem ut eius quod præcedente capite descriptum est, sed potius Liliū montani flauo flore odore referre. Habebat porro Ampliss. vir Nic. Vanden Branden Consiliarius Bruxellensis plantam similem Somerianæ, quæ anno à Christi natiuitate 1602. longè etiam plures tulisse fertur flores in unico, sed illo plano, caule: anno autem insequente non minorem florum numerum tulisse ad me scribebat. Cæterum aliud eius genus reperitur etiam præcox & angustifolium, longè nitidioribus floribus quàm Somerianum præditum; nam prorsus ininitos illos fert, ut Byzantinum, certe magis saturos quàm Somerianum, nec eos inodoros. Præfectus Curforum Bruxellensis sub extremum annum 1602. pusillum bulbū eius generis mittebat, quem ex Italia recenter accepisse scribebat: & licet is bulbus Nucis Auellanae magnitudinem vix superaret, sequente tamen anno quatuor flores tulit eius quem dixi coloris: eius etiam folia hæc angusta ut alterius, magis tamen saturā viriditate prædita, & magis splendentia mihi videbantur, atque inordinatè quemadmodum flores in caule nascebantur: observabam etiam eius caulem & folia non adeò breui marcescere ut alterius, sed diutius perdurare. Vtrumque genus, ab ijs qui diu aluerunt, Martagon Pomponij vocatur, & hac appellatione ex Italia se accepisse asserunt. Rarum adhuc est in his Prouincijs, quia adnatis difficillimè se propagat, nec apud quempiam ipsam plantam semen præbuisse intellexi.

De hoc Lob. Adu. part. 2. inquit. Eximio ornameto decorat Botanicoꝝ paradisos He- merocallidis Macedonicæ tenuifoliæ miniari coloris: Liliū siluestris montani Macedonici, &c.

Mar

Martagonis Pomponi, splendorum miniarum coloris. D. I. Someri: Martagonis Pomponi Someri: Lili rubri præcoci Clusii, luculentus flos, inraminatè fulgens, miniati coloris &c. Debetur hac planta, præfato D. Somero, qui primus eius bulbum è Macedoniæ montibus effossit in Belgium detulit, & amicis communicavit. Hanc quoque aliquot annis ob florum decus N. C. Arebergius studiosè coluit, nec non alii Medioburgenses.

LILIVM NVTANTE FLORE FLAVO.

Descriptio

Elegans Lili montani genus à nemine quod Clusius de sciat scriptum: cuius bulbum misit Io. Robinus & descripsit, florem habere ex aureo flavescentem, foliis instar Lili montani, aut Byzantini, ut sunt Lili montani siue Martagonis March. flores. Misit ad me, inquit, Burdegala eruditiss. Io. Venerius istius Lili crassos bulbos, monēbat alterum altero magis præcoces flores proferre: addebat insuper se aliud adhuc genus observasse, cuius flores nullis punctis internè distincti: nasci in *Cageire et barochi* nuncupatis locis, atque Pyrenæorum montium aliis, unde ipse retulerat. Ac se spontè nascentes eruisse natos in monte *Campsaure* vocato, & alio in loco, qui à Lilio nomen sumit: isticque à rusticis *Consol* appellari, id est, Consolidam, quod eius radice contusa & imposita, tam hominum, quam animalium vulnera, mirum in modum curari referant: atque adeo Pyrenæorum montium incolæ nullum aliud remedium usurpare.

Lilium montanum flore flavo Lobel. & Penz Adu non dissimilem vulgum, ortum, & natales habet, montium nempe Pyrenæorum, Lilio Byzantino miniato aut Sylvestri montano Lilio.

MARTAGON FLORE LVTEO PRÆCOX.

Descriptio



lis lunii 9. Eius flores sunt miniati ut ait hortulanus: Martagonis autem crocei flos apertus fuit u. lunii, intus punctis notatus, capitula apicum crocea ferè.

CORONA IMPERIALIS SIVE

Tusai alius.

Radix bulbosa, rotunda, crassa, diuersa à Liliis. Descriptio
Liliorum forma, est enim compressa ex magnis crassissimis & succulentis squamis compacta, colore interdum albo, nonnunquam etiam purpurascens, sæpè pallido, odore foetido & viroso, uti & foliorum: Colchicum olente, Clusio verò hireum, nares etiam procul feriente, qui eruit binas & amplius libras pendentem. *Caulis* tollit singularem, bicubitalem aut etiam altiore, digitali crassitudine, inferiore parte plusquam pollicari, firmo, intus fungoso, viridi, rotundo, quidem, sed ad cubiti altitudinem striato, *foliis*



magna parte stipatum numerosis, splendore viridant nitentibus, Liliaceis vel Lili montani floribus Lob. pluribus indidem ortis, & quali ordine, aliis inconditis, nullo mixto pediculo, sed latiore sui parte cauli adnatis, ita ut appendices paulum eminentes ab iis propagatis cautè reddant nonnihil angulosum. Supra autem densius

hoc foliorum agmen, caulis ad pedem, nonnunquam etiam cubitum protenditur nudus, sine foliis, gracilior quam inferius, & teres, neque striatus & viridis, sed latus & purpurascens coloris, Serpentarie instar maculosus, qui in summo rotidem parè in angulos desinit quot flores sustinebit, nempe binos, ternos, quaternos, quinos, senos, aut plures, omnes Vere quasi æqualiter, sed contrario situ nascentes, singulosque inter bina folia inferioribus longè minora & angustiora, equali ferè longitudine, quum flores primùm erumpunt, inter folia latent, candicantesque sunt, deinde paulatim incrementum sumunt, una etià succrescente eà caulis quæ illos sustinet nudà parte: florum verò *pediculi* qui sexunciales in augmento deorsum inflectuntur è quibus flores penduli sunt circum circa regum coronas imitati, Lili candidi, vel Martagonis pares, flammeo colore rutilantes, Lobelio ex phœniceo rubentes, patuli, senis constant foliis latis, per extremum mucronatis, pulchra striarum saturatione, siue purpurearum Clus. discursantium picturà variegatis, laciniata cæsurà lubinde ludentibus, vñgue autem, inquit Clusius, singulorum foliorum nonnihil foris eminente, & ex nigro purpurante, quorum vniuscuiusque fundum obicuriore colore pictum obsidet gemmantis liquoris margarita argentea limpidissima & dulcissime, pertinacis durationis, post multos etiam dies à refectione, de quo liquore Clusius ait: Flos absolutus & maturus expanditur, tintinnabuli mo-

do propendens, aurei Mali siue Cirrii colore, sed pallidiore, venis purpureis summam venustatem adferentibus: singulae floris folia interna parte in ipsis vnguibus singularibus tuberculis candidis praedita sunt, quae meridiano etiam Sole limpidissimam dulcemque aquam exstillant lachrimarum in morem, ut vniones propendentes Lobelio visci grapo ferè pares, videantur, sed abundantius pluuio tempore: ea deinde tubercula, marcescentibus floribus in albas lacunas abeunt. Ex ipso penitus floris umbilico prodeunt pro foliorum numero, stamina candida ad eò coniuncta, ut pro vno fallant obiter intuentem, apicibus maiusculis in Ochram vergentibus: breuiore trifido stilo inter ea latitante: Caulis reliquus supra nudus eminet supra florum coronatum agmen, confertè duntaxat minora & angustiorum comà: interdum etiam mihi, inquit Clusius, nati sunt supra flores non vnicus cauliculus siue ramulus, sed bini terni aut plures, suis etiam foliis singuli ornati: Creuit porro Viennae plantae vndenis pluribusque, aut paucioribus floribus praedita; caulis supra septenos aequaliter propendentes denuò nudus, quasi dodrantali longitudine assurgens, reliquos flores singulos inter folia nascentes protulit, longà, densa, & multifidà alia foliorum comà supra eos fusà. Sed & intelligebam ab his qui aliquot annis Constanti-nopoli haerant, caulem nonnuquam supra priorem illam florum aequaliter propendentium seriem, dodrantali longitudine attolli, aliamque florum seriem gestare, aliquando etiam tertiam, ac tum demum foliorum comam supereminentem: eas verò stirpes vnicum florum ordinem subsequentes annis plerumque ferè obseruari, ut peculiare genus non sit censendum, sed Naturae luxuriantis quidam duntaxat lusus, licet mihi etiam altero anno duplicem florum seriem gestare similem plantam meminerim. Habuit autem Viennensis quaedam Patricia, cuius caulis supra terram planus pedali longitudine extabat, deinde in binos ramos sindebat aequali longitudine excrecente, singulos vndenis floribus onustos, maguà etiam tusà supra eos foliorum comà. Habuerunt & alij & ego similes plantas in binos caules cubitali pæne supra terram altitudine diuisas, quorum alter octo aut plures, alter quinos aut senos flores tulit: mea verò planta hoc etiam peculiare habuit, quod eminens comà multifida fuit. At Viennae obseruata Tufai plàta, reliquas quas postea obseruauerim florum numero superauit: nam quinquagenis aut pluribus floribus onusta fuit. Illi. Carorum Principi Wilhelmo floruit planta quadragenis floribus. Iacobus Garerus Ciuis Londinensis monebat se plantam habuisse quæ binos & septuagenos flores protulerit. Habuerunt & alij similes interdum, in quibus plures flores nati, viceni nempe, triceni aut quadrageni: quotquot autem tam numerosos flores tulerunt, planos, latoque & valde striatos habuisse caules animaduerti, atque proximo insequente anno ad ingenium rediisse, hoc est, caulem rotundum, ternis, quinis, septenis aut octonis floribus praeditum habuisse. Nos quoque insignem lulum in eadem planta notauimus: vno anno vnicum caulem ferentem cum corona multorum florum, alio anno duos caules cum magno florum numero, in vtroque caule coronas: saepe nullos produxisse flores, nonnuquam adfuisse caulem sine floribus &c. Facunda futura capita sursum eriguntur magna Dei providen-

tia, inquit Clusius, ne dehiscenibus semina ante maturitatem excidant.

Carorum (inquit Clusius) aliud genus est, nec Tufai caule, nec foliis, nec florum forma à superiore differens: nam & illos in extremà lauis & nodi caulis parte aequaliter ferè in ambitu nascentes, singulosque inter binas angusta folia sustinet, ut superius, sed color variat, nec ut in precedente flauus, vel verius pallescens, sed ruber, aut sandiacæ Sandicisque colorem refert, instar Attaceli chelarum ferè: sex etiam latis & mucronatis foliis constar, vnguibusque ex purpura nigricantibus, cum suis interiore parte candidis tuberculis limpidum rorem stillantibus, & sex staminibus, stiloque aequali longitudine propendentibus. Hoc genus superiore magis venustum mihi videtur.

Variat item in nonnullis plantis florum color: est enim vel medius inter utrumque genus, vel ad prioris, secundive colorem quam proxime accedit.

Sed & quartam quandam differentiam obseruabam, licet eius florum color proxime ad secundum genus accederet: angustiora enim folia habebat, illaque & radicem nullo retro odore, quantum quidem naribus manifestè percipi posset, praedita.

Idem Pann. p. 121. & Histor. post. l. c. 7. Hactenus nullam plantam obseruare memini, quæ Hemerocallidem Diosc. descriptam exactius (in hoc à Clusio sumus alieni) reterat: alia est Hemerocallis cuius Athenæus meminit. Pannius iconem mittebat, Coronæ Imperialis nomine insignitam, quam appellationem apud Herbariorum vulgus adhuc retinet: bulbi verò à Cæsare Oratoribus Constantinopoli missi, nunc Turfai, modò Tufai, siue Tursai. Tursai autem (ut ab iis intelligebam qui Constantinopoli vixerant,) liliū regium significat. Interdum etiam bulbi missi Tursani & Tursanda appellatione: sed postremæ hæc voces à Turcis duntaxat nominibus adijci solent, ad rei, cui adnexæ sunt, magnitudinem exprimendam. Ex Persiâ verò Constantinopolim delatos illius bulbos omnino mihi persuadeo, quoniam cum accipiebam inter reliquas hæc fuit inscriptio, Tufai, flor Persianus esse à discolorato, con la testa abassi, hoc est, Tufai, flos Persicus ruber aut decolor nutante capite.

Vidit inter alias rariores stirpes hanc etiam nouam plantam nostra ætas, quæ vocant Turcicæ vocabulo Tufai, nam Constantinopoli allata est. Alii Liliū Persicum, à natali loco, vulgò ob similitudinem Coronæ Imperialis siue Regiæ appellant, quam peritissimus rerum simplicium C. Clusius, summus meus (inquit Camer. Embl.) amicus ad Hemerocallidem Veterum non male referri existimat. Huius flos maturus expanditur, ac in suis propriis pediculis planè deorsum floretur, at quamprimum flaccescere incipit, succedunt illi satis magna capita (ut quoque in Lilio rubro fieri solet,) quæ excusso flore statim sursum eriguntur, ne scilicet, si deorsum dehiscerent diutius, semina nondum maturæ putrescere ac excidant.

C. Bauh. Phyt. Liliū 13. siue Corona Imperialis flore luteo, Lobel. Corona Imperialis. Liliū 14. siue Corona imperialis flore rubro, Clusio Tufai 2. Liliū 15. siue Corona imperialis multiflora, Clusio Tufai 3.

Lobel. Obs. Liliū siue Corona Imperialis, Tursani & Lale Herbariorum. l. c. Plant. p. 171. Liliū

Coma mult.
tiffa.

Lufai na.
tura.

Nonnulla
Lil. Diosc.
Corona Im-
perialis

Turfai
Lilium
Tursai

Lale

Lilium Persi-

lium siue corona Imperialis Teut. 210. Item pag. 172. Corona imperialis phœnicea duplici corona aut serie florum. Teut. 211.

*Corona im-
perialis
herbaria.*
Aduers. par. 2. pag. 512. Liliū siue Corona im-
perialis Herbariorum, cuius varietates petamē-
næ & perquā speciosæ Belgio & Anglo-Britā-
niā iam nostra ætate inquilinæ, oblectationi
oculorum magis, hortorūque ornamento,
quā naribus dicantur: tetrum namque hir-
cinum halant odorem Imperiales Coronæ, qua-
rum varietates in caule, flore, & folio perspi-
cuz. Præcocior quæ statim Martio, nec dum
lapso floret: folio lato est, dilutiore viridi, &
flore non dissimili, sed pallidiore, à frigore for-
tè. Quæ media, est elatior, folio itē pallidiore sed
angustiore: & flore item dilutiore. Platicaulos, ut
Liliū albū & Martagon siue Hemerocallis Byzā-
tina interdū eūtu fortuito sit Imperialis Corona
numero florum increment: foliis angustiorib-
us, & Minii coloris saturiorib⁹, floribus aspectu
iucundis, quales floruerunt Londini in horro D. Ioh.
de Franqueville Anno 1600. & Hacknei in horro
Nobiliss. Baronis Eduardi Zouche 1601. Serotina
latioribus foliis atrouirentibus: flore autem ex
saturo phœniceo colore. Multis numerosisque
latioribus foliis constar, stipatim bicubitalem
caulem ab imo amicientibus, florum elegantissi-
morum saturiorum duplici serie coronatæ, non-
nullisque floribus caulis oomofum fastigium in-
ternascentibus, aspectu iucundissimo. Hæc variis
in hortis alitur & in honore habetur.

Inter sylvestria Lilia Dod. Lat. venit & nume-
randa Imperialis Corona dicta *Lale* & *Tursani*
patriis vocibus appellari affirmatus.

Hist. Lugd. Corona Imperialis Dodonæi. Co-
rona Imperialis 1. Rönigefron / Rönigolien.
Et Corona Imperialis 2. polyanthos, Gessult Rō-
nigefron / Liliū Persicum, *Tusai*, aut *Tousai*.

Temper.
Locu.
Floret Aprilis, interdum etiam Martio, si æris
temperies pauld calidior fuerit. Semen Iunio
maturum. Nusquam sponte nascentem hanc plā-
tam conspexit Clusius, sed Constantinopoli de-
latam, eo quo ad Maximilianum II. Viennam e-
uocatus est anno, primus Belgicæ hortis com-
municauit: & in Viennensibus reposita feliciter
provenit. Ante ipsius tamen discessum ex Belgio
eius iconem [qualem Dodon. in purg. hist. Ap-
pend. exhibuit] Ill. V. Ioh. Brancioni miserat C.
V. Alphonsus Pancius Ser. Ducis Fer. Med. Ob-
seruauit Stugg. in hort. Ill. E. C. vnde translata in
eius hortum Montb. floret Martio, ac hiemem
fert non reposita: Visa etiam Basileæ florere eo-
dem tempore, ac semen maturum proferre Iu-
nio.

Vita.
An apud Turcas medicum aliquem vsum ob-
tineat, non intellexit Clusius, arbitratu tamen
venustatis & ornatus potius causā hanc plantam
in suis hortis illos alere, quā ob villas eius fa-
cultates.

Hemerocallis vires licebit videre antè.

CORONA IMPERIALIS MONSTROSA.

EX Iconibus coloribus depictis Illustrissimæ
Princ. 1608. in magna iconē multo plures

Tom. II.



etant flores &
folia. Est mō-
strofa Corona
Imperialis.

LILIVM PERSICVM SIVE SYSIANVM.



Descriptio
D Onauit
D. Cher-
lero meo No-
biliss. Corus-
Patauii inter
alia raritatis
plena, Liliū,
Persicum ei di-
ctum: cuius
caule proce-
rus, non mul-
tū crassus,
cubitalis, rotū-
dus, *stus* ab i-
ma parte sur-
sum vortum
dense stipatur,
Lilli crocei fo-
liis, angustiori-
bus, acutiori-
bus, digitalis
longitudinis,

longè quā Coronæ imperialis angustioribus,
illis ferè similibus quæ in summo ipsius capite
nascuntur, virescentis ex cineraceo coloris, siue
quodammodò æruginosi (inquit Clusius,) qualis
in Tulipæ foliis conspicitur, contorquentur
verd illa, buxæque sunt odoris: summus caulis
longum gerit thyrsū *storum*, sesquiuncialibus
& longioribus pediculis hærentium, numerosorū,
pendulorum, terræque spectantium, Leucoil
bulbosi, Theophrast. & nolas imitantium, senis
foliis constantium, saturo purpurâ tinctorum, si-
ue, ut ait Clusius, foris purpuræ valde obsoletæ
colore præditos, internæ autem dilutiores, ino-
doras, vnguibus subuirescentibus. Ex umbilico
sex inæqualia *stamina* prodeunt purpureis apici-
bus primū conspicua, qui obuersi, flauo polline
conspersi apparent: tria deinde longiora *stami-
nula* coeunt, stilūque medium florem occupā-
tem æmulantur. Sequuntur deinde sex angula
capita siue triangula, quorū singuli anguli bis a-
lis sunt prædicti. Coronæ Imperialis capitibus fe-
rè similia, sed minora & breuiora: *semue* etiam
simili, paululū tamen breuiore: *Radix* qua-
lem nos habuimus bulbosa, Pomi Aranci magni-
tudine, subrotunda, fissa: magnis squamis lo-
Nan.

Forma, foliorumque numero similes, verum colore rutilo coruscantes, saturationibus intus stigmatis punctati. Radix subest bulbosa & squammis compactilis, alba, ex qua ramuli repentes novos generant bulbos.

Hemerocallin Matthiol. vulgus Liliū silu. nominat, cuius flores colore perquam pallido, ut Dioscor. ait, adeo ut fulgentis auri modo ruissent. In hist. Germ. Rote Goldgilgen. Hemerocallis. Boh. Liliū žlate.

Figura à Camer. pro hoc Lilio posita non placet. Facile crediderim Lonicerum sub his verbis (Liliū croceum, Gelb lilgen / quod excrevit interdum ad duos cubitos, laceraturque à nimio Sole) scribere de Lilio rubente maiori, quamvis figura id minus exprimat.

Dodon. Gall. Liliū alterum rubrum ab Herbariis Martagon dictum. Item hist. fl. & in fol. Liliū purpureum maius, quod Matthiol. Liliū sylvestre in Italia appellari, & Hemerocallida esse, ait: quod tamen verisimile est Hemerocallida non esse.

Hist. Lugd. p. 1493. Liliū purpureum maius Dodon. de fl. Et pag. 1498. Hemerocallis prior Matthiol.

Anguill. de hoc Lilio ait esse Martagonis speciem radice alba, floris magnitudinis Lili, & epistola 13. ait: Non inuenitur planta quæ melius correspondeat Hemerocallidi Dioscoridis, quam Cynorrhodon Plinii, id est Martagon Liliaceum, Liliū rubens vel croceum alterum, Hemerocallis Matthiolo, quod Italicum cognominat.

Lobel. & Pena Ad. Liliū purpureum sine Olymptarum Martagon. Gall. Lis orange. Colores Lilio candido quæstus mangonio fuisse, et si rei rusticæ scriptoribus Plinius asseueret, tamē purpurei Lili duo genera sponte non arte oriri cum Dioscor. plerumque montes hodie testantur. Senesius vocis huius ignarus, Phœniceum Liliū, valde alioqui notum, dicit esse, colore perquam pallido Dioscor. falsò teste adducto.

Tabern. icon. & hist. Rote heydnisch Lilien. Martagon rubrum. Figura Tabern. placeret pro Hemerocallide Matthioli, quamvis aliter sentiat, qui ei patrocinari statuit.

C. Bauhin. Phyt. Liliū 4. siue croceum maius, rubens Plinii: Liliū rufum Trago. Aliquando flore pleno reperitur, vidimus & candido. Item apud Matthiol. Liliū croceum maius, rubens. Plinii fortè Hemerocallis Dioscor. Brunf. Fuchf. Gesner. Liliū rubens Dodonæo. Liliū rufum, Liliū purpureum maius Lugd. Camer. Fuchfio & Lonicero. Liliū croceum. Tab. Liliū croceum maius. Gesnero Martagon. Liliū purpureum maius Cæsalpino: Liliū sylu. aureo flore. Trago: Liliū rufum mihi ad minus referendum videtur non ad maius. Idem etiam de Lilio rubente Fuchfii & Gesneri: Tabern. Liliū croceum maius mihi videtur potius ad minus accedere, nec velim eius figuram ponere pro Hemerocallide Matthioli. Camer. apud Matthiol. novam figuram ponit pro Hemerocallide, i. quæ non placet, & quæ fortè Lili rubri minoris. Liliū purpureum maius Lugd. huc non referendum existimo, uti antè dictum, maius pro minus scriptum. Martagon Gesner. de hortis f. 204. huc non pertinet. Cæsalpini descriptio convenit minori Lilio rubenti.

Nusquam non provenit (teste Matthiol. in Italia, quandoquidem circa mensem in arvis inter segetes, in pratis, in montibus, & in vallibus aureo colore emicat. Ego Liliū croceum maius

Tom. II.


siue rubens vidi Basileæ in horto Di. Doct. Felicis Plateri: Montbelgardi habeo in horto Ill. E. C. Wirtemb. delatum ex Marbach ducatus Wirtembergici, ubi florebat Iunio.

Et licet secundum Dodon. purpureorum Lili-
orum in Medicina incognitus sit usus, & facultas incomperta. Scit tamen Lobel. bulbos Lili punicei eadem posse quæ Diosc. vult de Hemerocallide.

LILIVM RVBENS VEL CROCEUM minus.

Squammatum bulbis caulem promit angulosum striatum, altitudine sesquicubitali, cui temerè folia numerosa adnascuntur atro virore splendentia, perquam angusta, secundum longitudinem nervosa: caulis fastigium in aliquot pediculos firmos, punctis rubris variegatos, modicè hirsutos dividitur: quorum unicuique flor insidet Liliaceus, colore ex rubro flavescente seu croceo, folia intus sulcata & punctis saturationibus notata habens, odore suavi, flammibus & pistillo flori concoloribus.

Liliū rufum, Germ. Rote goldgilgen, Plin.



& Diosc. testantur Lilia rubra arte fieri posse, quod aut verum sit necne, si affirmare poterit, qui hoc experti fuerint. Neque satis constat Trago, an hoc Lili genus Plinius Rufum dixit. Hieronymus Brunschweig Narcissum vocavit, nec temerè quidē, cum & Theophrastus ipse lib. 6. cap. 6. Lilia Nar-

cissi voce appellavit: Crediderim equidem radicem huius quoque Lili, sicut & albi, maturandis & emolliendis quibuscunque abscessibus prodesse.

Pingit Brunfel. Germ. Liliū hoc croceum minus, sub genere alio Lili Goldmurg & Goldgilgen / aut Rorgilgen.

Apollin. Gelb lilien / cui tribuit eadem vires, quas Lilio albo.

Meminit Anguill. tertiæ speciei Martagonis radice alba: quam existimat Hyacinthum Homeri, Theocriti, & Pausaniz, ac Ovidii: ait etiam Dioscor. & Theophrastum huius plantæ meminisse. Non erraverit (opinatur Gesner. hort.) qui Hemerocallidem alpinam appellaverit. Pingitur aut idem postea à Matthiolo pro Hemerocallide altera. In hortis hoc etiam diu vivit &c. Gesnero an hic assentiendum dubitamus. Si enim Matthiolus hoc Liliū intelligit per Hemerocallidem, quod non existimamus, flores malè picti. Dodon. & Lobelius Hemerocallidem ab Lilio rubro minore separant.

M m m 2

*H. Lugd.
Hyacinthus
Ondius.*

Clusius vocat Liliū rubrum minus non bulbi-
ferum. Hist. Lugd. p. 1493. Liliū purpureum
maius [scribendum, ut iam diximus, erat minus]
Dodon. Item p. 1494. Alterum purpureum Liliū
minus.

Dodon. Gall. Lilli secunda species *refroy mappuy.*

Liliū rubrum, Liliū rufum. Ouidio Hy-
acinthus. Belg. roode liliën. Hist. Lat. fl. & in fol. O-
uid. Huius generis Liliū Hyacinthum appellat
ab Hyacintho adolescente:

Flos oritur, formamque capit, quam Lilla, si non

Purpureus color his, argenteus esset in illis.

*Non satis hoc Phœbe est, [is enim fuit anchor
bonoris]*

Ipse suos gemitus foliis inscribit: & ai, ai.

*Flos habet inscriptum, funestaque litora du-
da est.*

Huius Hyacinthi meminit etiam Theocritus in
Epitaph. Bionis Eidylio 9.

*Νῦν ὁλυνδὲ λάλει αἰ οὐ χερσὶν αἰ, αἰ αἰ,
λαύβαν τοῖς πύλοις.*

Ut & Virgilius in Bucol. Eclog. 3.

—Phœbe sua semper apud me

Manera sunt Lauri, & suave rubens Hyacinthus.

Dicitur rubens Hyacinthus, qui ab Ouidio pur-
pureus appellatur. Color siquidem florum ru-
bens, subinde nominatur purpureus. Existima-
tur & iste Hyacinthus ferrugineus cognominari,
quod ferruginis instar rubeat. Sed non omnibus
hæc sententia probatur, quibus ferrugineus non
alius videtur, quàm ad cæruleum accedens &c.
Hyacinthum purpureum siue rubentem Recen-
tiorum plerique Hyacinthum Poënicum appel-
lant, at nobis magis placet hunc scriptum Hy-
acinthum dici. Theocr. Eidyll. 10. Hyacinthum
υάκινθον, id est, scriptum appellat. Pausanias Co-
rinth. lib. 2. Scriptum Hyacinthum aut ei si-
millimum florem Comosandalon ab Hermio-
nensibus appellari, memorie prodidit. Sunt in-
quit, corollæ ex flore contextæ, quem *κομωσάνδαλον*
incolæ appellant. Hyacinthum illum existimo:
est enim ei tum magnitudine tum colore persimi-
lis: habet præterea easdem luctus indices lite-
ras.

Lobel. & Penz in Obs. pag. 84. & Adu. pag.
61. Liliū purpureum minus, Chimistarū Mar-
tagon. Gall. *Lis orange.* Ital. *Giglio rosso.* plant.
icon. pag. 164. Marragon Chimistarum. Liliū
purpureum siue Phœniceum vulgare. Lobel. 84.
Teut. 104.

An Camer. apud Marth. Germ. Rote Gold-
gilgen/Hemerocallis.

Tab. nov.

Tabern. icon. & hist. Groß gold gilgen. Liliū
aureum maius. Quamvis Compiler maius vo-
cet, huc reducimus, quia figura satis accedit ad
minus: præterea maioris bonam figuram alio
ponit titulo, miror eum qui Patrocinium Marth.
suscepit, hanc figuram maluisse assumere primā
Herocallide. Casp. Bauh. Phyt. Liliū u. siue cro-
ceum minus.

Liliū croceum minus, Basileæ in hortis pro-
uenit; Nos habemus Montbelgardi in orto E. C.
id etiam collectum in Passavant in orto Dj. ab
Andlav. plantani in orto E. C. Hoc

Liliū reptrices propagines
ex se dimittit multas.



LILIVM PHOENICEVM DILUTVM.

Descriptio

Ob. icon.
L Pl. p. 164.
Marragō Chy-
mistarum al-
terum: Liliū
phœniceum
dilutum Teut,
204. C. Bauh.
Phyt. Liliū
3. siue phœni-
ceum.



LILIVM CRVENTVM LATIFOLIUM.

Bulbo innititur
Bomnind calis,
quali Liliū albū
caule verd dona-
tur, non ut cætera
Lilia, crasso, qui
florem producit u-
nicum, cruentum,
sex foliis latis con-
stantem. Cauli fo-
lia rara, valde la-
ta, Plantagini si-
milis.

Tabern. icon. &
hist. Breyt ble-
terich blut gil-
gen: Liliū crue-
tum latifolium.
C. Bauh. Phyt. Li-
lium 6. siue cruen-
tum latifoliū. Tab.



LILIVM BVLBIFERVM MAIVS.

Descriptio

Bulbicali
interdum
assurgit caule,
firmo, crasso,
f. l. septo li-
liaceis, suba-
tris, in summis
alis crassiores
bulbos gestans,
& amplos flo-
res rubros. Li-
lio puniceo
minori non
bulbifero con-
colores. Tene-
riores huius
plantæ, ante
quàm flores
ferre incipiāt,
bulbis secun-
dum caulem
inter-



inter folia natis non minus donata sunt, quam reliquæ duæ species: sed quando robustiores sunt floresque aliquot annis protrulerunt, vix, nisi in summo caule, ubi in alas diuiditur, & secundum flores, maiores bulbi nasci solent.

Liliacea stirps, seu Liliū bulbiferum 1. siue ut Clus. appellat cruentum, Martagon bulbiferum 1. Liliacea stirps Clus. seu Liliū bulbiferum, siue ut appellant, Liliū purpureum siue rubrum maius, Martagon bulbiferum maius.

Lobel. Obs. Liliū cruentum bulbos gerens summo alis diuiso caule: Liliū cruentū varietas Martagon, cui flores rutilant, bulbos nucleis stipatos summo caule alis diuiso profert. Icon. Pl. pag. 165. Liliū cruentum Teut. 205.

Hist. Lugd. Liliū cruentum bulbos gerens Lobeli.

Casp. Bauh. Phyt. Liliū 7. siue bulbiferum latifolium.

Floret hæc planta Liliacea cum duabus subsequentibus Iunio, alia aliā paulo maturius, semenque perficit Augusto, bulbi in alis (inquit Clusius) hære solent, donec vento aut contactu excutiantur, imò interdum plantæ adhuc inhærentes, fibras deorsum spectantes agere solent, tanquam ad communem matrem terram aspirantes, & illā se condi cupientes.

Hæc quidem nullibi sponte nascens à Clusio obseruata est, sed cā primū Lix conspexit Clusius in horto Marix de Brimeu, quæ deinde bulbis in terram depactis, reliquis Belgicis hortis breui tempore communis facta est, atque etiam nunc Viennensibus ac aliis vicinis, Clusii operā: nam ipsa aliquot maiores bulbos à Belgica mittebat.

Solent verò tum hæc, tum aliæ duæ non bulbiferæ, cum primū florū gemmas ostendere incipiunt, à formicis admodum infestari, sic ut eo tempore nunquam immunes ab ipsis conspiciere liceat: non secus ac Pzonix flores antè quàm explicentur, qui mirum in modum etiam à formicis appetuntur, præsertim qui pleus est, & ille etiam explicatus atque apertus.

LILIVM BVLBIFERVM INCANVM.



Vix cubitale (inquit Clusius) excedit altitudinem, caule etiam est firmo, striato, ex viridi nigricantibus foliis prædito, quæ tamē cum summo caule incanā lanugine pubescunt: eius flores igneo rubore non rutilant, ut in superiore, sed magis pallescent, & ad lili puniceum non bulbiferi maioris colorem plurimum accedunt. Eius adulescentioris caules paucos etiam bulbos, eosque superiore minores, nisi in summis alis gestare solent.

Tom. II.

Liliacea stirps, Liliū puniceum, siue, [ut Clus. hist. appellat] cruentum: Liliū bulbiferum, siue Martagon bulbiferum 1. Et Pann. Liliū purpureum siue rubrum bulbiferum, Martagon bulbiferum incanum. Clusius proponit figuram quæ est Ic. Pl. secundo loco Liliū cruenti bulbos maiusculos gerentis, ubi duæ figuræ sunt sub vno titulo.

Casp. Bauh. Phyt. Liliū 19. bulbiferum incanum.

In montanis pratis Austræ & Styriæ sponte crecit, sed rarior inuentu. Cæterum omnium flores terram spectant, & per interualla in summo caule nascuntur, foliaque ad pediculum reflexa habent: semen etiam in trigonis capitibus duplici serie in singulis angulis continetur, fuscū, planum, cartilaginofum: radix luteo Ochre colore infecta est, quam ob causam à Germanis Goldmurg/ id est, aurea radix appellatur.

Loces & tempus.

LILIVM BVLBIFERVM REPENS.



Quammaro bulbo cum alius huius generis conuenit: cæterum caulis firmus, striatus, cubitalis, ac maior multo, maculis nigris notatus, lanuginosus, in alas diuisus, flores multos profert amœnos, Lili formā, nec non aliquatenus, odore, ex senis repandis aliquantum foliis, multo croco tinctis, intrinsecus multis liris asperatis

Descriptio

(qua parte & color folii medii dilutior, punctisq; saturatè sanguineis notatis: extrinsecus lanugine leui persusis: quorum non nulla elatiorem, latiore, saturatioremque costam, profundo utrinque ad latera sulco, habet: medium florem obsident reliquorum iustar sèta stamina pistillumque triquetrum, eodem cum flore colore prædita: sèta sèrè Martagonis, quorum alis bulbi frequentes inident. Multum se propagat bulbis ac etiam maioribus repentijs.

Lubet hic subnectere Clusii descriptionem quæ sic habet: Inter Liliū purpureum bulbiferum maius & incanum, media est magnitudine, nonnunquam etiam primum æquat: sed caules sunt infirmiores, gracilioresque, ipsique cum foliis dilutiore virore præditi: flores secundo generi similes. Hoc perpetuo sæcunda bulborum inter folia nascentium sobole onustum est: cuiusque radix priore minor à lateribus propagines spargere plerumque solet, quæ ad singula genicula in candidos bulbos excrecentes, subinde nouas in circuitu plantas producant, Lili rubri minoris non bulbiferi modo: eius bulbi in alis nati, secundæ speciei pares, priori tamen magnitudine inferiores: omnesque terræ commissi sui generis plantam procreant, & secundo anno in cau-

M m m 3

lem bulbillis onustum exarlescunt. Ferunt tamen omnes hæ plantæ in capitibus triangulis semine latum cartilagineum subfuscum, quemadmodum Liliū vulgare, quod non sterile est, sed sui generis etiam plantas profert: verum quæ ex bulbillis in alis natis crescunt plantæ longè citius adoleſcunt.

An Gelsner. hort. Liliū rubens seminiferum, Lilia crocea quæ semina in caule habent: An Clus. Pann. Liliū purpureum siue rubrum bulbiferum minus, Martagon bulbiferum minus, Martagon bulbiferum pratense. In hist. Martagon Liliacea stirps: Liliū puniceum siue (ut vocat) cruentum, Liliū siue Martagon bulbiferum: An Lobel. Obs. Liliū quartum Lilio purpureo maiori par: flore Martagonis rutilo: & secundam caulem sesquicubitalem bulbulis à medio ad summum usque ornatur: Liliū cruentum 4. Icon. Plantar. p. 168. Liliū cruentum secundum caulem bulbulis donatum Teut. 105. An Dodon. lat. Liliū purpureum tertium, Liliū bulbiferum: Histor. Lugdun. Liliū cruentum aliud Lobelii. Casp. Bauhin. Phyt. Liliū 9. siue bulbiferum minus. Habemus copiose in horto E. C. quod se facile multiplicat ex bulbulis deciduis, quales etiam Stru- gardia collectos plantauimus. Bulbulos interdum fert priusquam florem producat: alioqui in magnam crescit altitudinem & multa fert lilia.

Locus
tempus.

LILIVM CROCEVM flore pleno.



IN Iconibus colore depictis Ill. Principissæ expressa hæc figura anno 1608. colore est croceo.

LILIVM BVLBIFERV cruentum angustifolium.

Lobel. Iconibus Plantarum. p. 166. Martagon cruentum angustifolium exiguis alis diuiso caule nucleis compactos bulbos gerens, Teut. 166.

C. Bauh. Phyt. Liliū octauum, siue bulbife-



rum angustifolium, Lobelio Martagon cruentum angustifolium.

LILIVM FLORE NVTANTE ferrugineo duplex maior & minus.



Fluus huius bulbos ex squamis acuminatis compactis, subdulci & viscido sapore, fibris donatus albidis, aliis in imo, aliis quæ cauli committitur, quem erigit bicubitalem, teretem, punctis rubentibus maculosum: cui ex intervallis radiata circumnascitur foliorum Lilia-

Descriptio

ceorum atroviuentium series: circa caulis etiam summum, singularia folia temerè quæ fors tulit apponuntur: caulis fastigium ornant Liliacei penduli flores, sex foliis pinguibus purpurascens, sanguineo saturatiore guttatis, reflexis admodum, constantes: quorum medietullum occupant totidem ferruginei apices cum pistillo, odore graui.

Cordus sic descripsit: Caulem erigit plerumque bicubitalem, teretem, gracilem, & viridem, solidumque, inferius purpurascens maculis conspersum; foliis quincuncialibus longitudine, & duarum vnciarum latitudine, glabris, ex rotundo turbinatis, & pinguibus vestitum, siue iuxta annexum angustioribus, supernè nigrescentibus, infernè autem viridibus, eminecibus, ramosisque, à tergo & in mucrone coeuntibus venis: flores ætatis initio proni summo cauli adnascuntur Lilio figura similes, multo tamen minores: nā senis vncialibus constant foliis mediū digiti latitudine, sursum reflexis, colore in pallido rubentibus, intusque purpureis maculis conspersis, substantia pinguis, carnosæ & glutinosæ.

flam-

lamina ferunt singuli flores sena, foliis numero respondentia, in quorum extremitate oblongum & transversum quiddam est, colore in nullo purpureum, rubiginoso pulvisculo, statimque percuncte conspersum: e medio staminum prodeit incurvus apex in triquetrum rubensque capitulum definens, viridi & triquetro folliculo insidens, qui desucentibus florum partibus solus remanet, & resupinus sursum incurvatur, paulatimque increscit, donec vicia longior & semuncia latior fiat, qui inferius angustior existit, idem sex eminentibus angulis totidemque lateribus costat, intus autem tribus membranis ceu partibus in tres camerulas per longitudinem dividitur, in quibus bini contigui, parvorum, laterum, planorum, levium, sibi invicem superiacentium & florum seminum ordines continentur. Radicem habet bulbosam, diuturnam, juglandis quantitate pinguis, crassis, acuminatis & flavis aut luteis squamis, veluti nucamentis sursum spectantibus compositam: a qua alii exigui prodeunt bulbi, quibus se propagat. Saporem habent lentum, glutinosum & nauseosum, tam flores quam radices, Liliis saporis respondentem. Nascentur in sylvis & frutetosis locis, tam editis quam planis.

Clusius in post. hist. duas proponit icones: una est titulo Lili montani siue sylu. i. maioris, quae apud Lobel. in Plant. pag. 168. est pro Hemerocallide flore rubello, Teut. 207. Alteri vero iconi apposuit Clus. titulum Lili montani siue sylu. i. minoris, eam autem iconem Lobel. inter icones Plantarum p. 168. ponit pro Lilio morano. L. 2. Teut. 207.

Asphodelus
Brunf. Germ. Goldwurz / Goldgilgen. Apud Doctos, inquit, nec apud Diosc. certum nomen nondum inveni: quamvis aliqui ad Hastulam regiam & Asfodilum aptare velint. Communia Herbaria, Asfodilum nominant, quod G. Heydnische blumen / vel Heydnische gilgen appellant.

Hemerocallis
Cord. in Dioscor. Hemerocallis sylvestre Liliū est, quod Germ. Goldpolne / siue Goldwurz appellant. Pharmacopolæ verò Asphodelum, sed falsò. Goldgilgen etiam dicitur.

Lilium
Asphodelus
Gessner. Cord. in hist. addit figuram ex Trago dicens: Hemerocallis rubens, quæ Italorum Martagon videtur, quo pro Asphodeli imperiti quidam hæcenus abusi sunt. Olim in ea tui inquit Trag. sententia, ut crederem Goldwurz & heydnische blumen esse Asphodelum seu Hastulam regiam Dioscor. sed animadverti non esse, nec video quò rectius referri possit hoc Lili genus, quam ad Hyacinthum Poëtarum, de quo Virgilius Aëgl. tertia & Ovidius. Idem mecum sentit Marcus Platearius.

Asphodelus
Appollin. fol. 94. vocat Goldwurz / wildschwertel quod non placet.

Hemerocallis
Lilium
Fuch. hist. cap. 40. Asphodelum Officinarum Asfodilum, Germ. Goldwurz / Asphodelum feminam vocat, quam propriè Hastulam regiam vocari dicit, hanc exhibet pro Asphod. femina, Theophrast. lib. 3. cap. 12. & pro Asphodelo Herodi, & Galeni lib. 2. de alim. facult. Hastulam regiam etiam Apulci putat. Verum in 1c. libro Fuchsius mutata sententia vocat Lilium purpureum & Goldwurz.

Asphodelus
Cornar. In Germania pauci aut nulli verum Asphodelum norunt, nam ea radix quam Officinarum Asfodilum corruptè vocant non est. Nostris dicitur Goldwurz. Hemerocallidem Dioscor. dictam Plinius ex Theophrast. Hemerocal-

les appellat lib. 21. cap. 10. & de eo rursus eodem lib. cap. 21. Galeno Hemerocallis appellatur, Herbariis Lilium sylvestre aut marinum. Nostris Meerlilien aut wilde heydnische lilien. Quidam tamen hunc Asphodelum esse: Alii & verisimilius, Narcissi speciem volunt.

Theophr. Golius in Onom. Hyacinthus, Golde wurzel / heydnisch blumen. Asphodelus idem. Hastula idem. Oportebat scribere quem Hyacinthum intelligeret. Autore Matthiol. Inter Lilia meried annumerari potest quod Martagon Chymistæ appellant, & Fuchsius Asphodelum feminam putaverat esse, sed hanc suam mutavit sententiam, sui erroris conscius factus. Item Epit. cum add. Camer. pag. 371. Martagon Chymistis.

Apud Anguill. sit mentio Martagonis vulgi & Alchimistarum, radice lusea, de hoc loquentem, ut puro.

Dodon. Gall. pag. 323. Lilium sylu. in quibusdam Officinis Asphodelus, quæ non sine magno errore usurpant pro Asphodelo. Belg. Zoldeus von Caluarian / heydens blumen & wild de lelien. Hist. flor. & in fol. Lilium sylvestre: Gall. Lis sauvage. Non amplius ergo facit Hemerocallidem.

Diligenter inquirendum qua in re differat Hemerocallis hæc Lobelii à suo Lilio montano. Ostendimus autem Clusium eam iconem ponere pro Lilio montano siue silu. i. maiore.

Cæs. Liliū in sylvis vulgò Martagon, Liliū silu. Lilium purpureum gerens florem.

Thal. Harc. Lilium purpureum silu. falsò pro Asphodelo habitum, Goldwurz passim. H. Lugd. Martagon Matth. Camer. hort. Lilium silu. Martagon flore subrubro & albicante falsò olim pro Asphodelo habitum. In hist. Matth. Germ. dicit flore pæne albo.

Tabern. icon. & hist. par. 2. pag. 527. heydnisch lilien mænlein / Lilium Sarracenicum mas. Item 1c. p. 640. & hist. par. 2. heydnisch lilien des weiblein.

Casp. Bauhin. Phyt. Lilium 19. siue montanum nostrum maius. Clusio Lilium sylu. i. Gesnero purpureum mas. Lilium 20. siue Martagon montanum minus. Idem apud Matthiol. Lilium 16. siue Martagon flore rubello, an Hemerocallis Dioscor. Huius duas proponit icones Tabern. nomine Lili Sarraceni maris & feminae. Ut verum fateamur nondum intelligimus divisionem C. Bauhini, dubii hæremus an Tabern. Lilium Sarracenicum mas, sit nostrum lilium flore nutante maximum de quo paulò post.

Lilium purpureum Martagon dictum flore inclinate, vidi Ferrariæ in horto Monasterii S. Dominici à l'Angeli, Patavii in horto Truciani. Montbelgardi spontè copiosè in monte Har. Ex horto meo transuli in hortum E. C. Basileæ Frater observavit in monte Mutetz, ubi etiam observavi. Genevæ in montibus abundat. Passim utrumque genus Clusii provenit in silvis & umbrosis pratis Leytenberg, corumque montium, qui à Calemberg Austria, ad Alpes usque procurunt: Nascentur & in plerisque Styriæ ac Vngariæ silvis, atque montibus illis siluosis, qui non procul Francofurto in ripa Mœni sita, ad Septentrionem absunt. Minus autem olim observare meminit in multis Germaniæ silvis, atque modò editiore loco sitis, sed etiam in plano. Plantatur hodie in hortis hic Narcissus: (inquit Tragus) sicut alia quoque florum genera, volup-

Golius

Martagon
Golius
Alchem.Hemerocallis.
Non est
Asphodelus
Lilium
silu.
Dodonæus
ait sententiam.Lilium
purpur.
Diosc.

Locus.

ratis gratia. Aliis in altissimis sylvis Heluetio-
rum, & ea quoque quæ Hercynia dicitur, nec nõ
monte Tonitru, qui à Vualgoia non longè ab-
est, sponte sua prouenit.

Lilii Mar-
tagonis Vi-
ces.

Qui difficulter urinam reddunt, radicem in
vino decoctam bibant: prodest id medicamenti
mulieribus, inquit Tragus, quibus menses impe-
diti sunt. Omnes calidi abscessus & tumores ra-
dice tusa emolliiri possunt, præcipuè verò mam-
marum & genitaliũ. Quidam vini facibus prius
concoquendam tradunt. Radix in cinerem reda-
cta, cumque melle temperata, illita alopecias ex-
plet. Reliquas cum Lilio albo vires obtinet.

Del. var.

Perhibet quoque Camer. Empiricos vti radice
in contusis membris & vlcibus. Contra Dodon.
dicit: Vsum hoc Lilii genus in medicina nullum
habere, cum tamen olim illi Hemerocallidis vires
ascripserit. Minimè tandem viribus, quas Apol-
linaris ei tribuit, fides est habenda.

LILIVM FLORE NVTANTE ALBO.

Descriptio

Lilii montani siue siluestris tertium genus sil-
uosis montibus ad Francofurti Septentrio-
nem inuentum, humile, Secundo generi proxi-
mum: florum tamen colore varium: nam ante
quàm explicentur, foris carnei quodammodò
coloris sunt, explicati verò, intus albi, & notis
quibusdam purpureis insigniti.

Similem stirpem habui, inquit Clusius, mune-
re N.V. Boslor veteris amici, quæ tandem adole-
uerat perinde ac primi generis plantæ: sed eius
radix Ochra colore minus tincta, quàm superio-
rum. Sed Francofurtensis quidam cuius vnam ha-
bebat, cuius flores interiore parte omnino niuei,
nec vllis notis distincti. Habui etiam à Doctiss.
viro Ioachimo Venerio similis plantæ bulbum
Burdigalæ missum, cuius forma ab illius bulbo
non differebat, sed eius caulis & folia magis cæ-
dicabant, flores autem ante quàm expanderen-
tur multà lanugine erant obfusi: explicati verò
prorsus niuei, nec vllis maculis infecti, staminum
apices non ferruginei coloris vt aliis, sed flau.

Est nobis Montbelgardi in horto Il.C. Wir-
temb. Lilium flore nutante, quod cæterà simile
præcedenti flore lacteo, staminibus herbidis, qui-
bus insident apices latei: pistillus virefcit florens
Iunio. Attulit Gener Io. Henricus Cherlerus
Romæ ex horto insignis Pharmacopæi Coruini.
Floret Montbelgardi Iunio.

LILIVM FLORE NVTANTE MAXIMUM.

Descriptio

Bulbus maximus profundè in terra latitans:
caules aliquot cubitorum: florum ingens
numerus, qui videntur minus maculati: folia an-
gustiora videntur, multo plura, & quædam ver-
ticillatim disposita.

Hoc primum vidi in Than Alsatiæ vrbe in
horto D. à Pfirt parte vmbrosa, vnde transiit
Montbelg. in hortum Ill.E. C. Wirt. Obseruavi-
mus postea in Duc. Wirtembergici vrbe Marbach
in horto Ludimoderatoris florens Iunio.

Hoc genus suspicamur depingi & describi à
Lobel. Adu. par. 2. Lilium silu. siue Hemerocallis
moschata Polyanthes, Martagon Imperiale nu-
perorum, Insularis nostris Gallo-Belgis, Mar-
tagon à l'Espérance: Hoc Lilii montani nouum ge-
nus à florum fortura coronata, Martagonis Impe-

rialis nomine insignitum aut vocitatum, conspe-
xi. Peregrinæ elegantis plantæ gauisus sum. Elap-
sis aliquot annis mihi huius bulbos nonnullos

munere dedit
D. Ioh. de Frä-
queuille, stir-
pium & floru
rariorum cal-
lentissimus
qui annis plus
decem illos
Insulis à quo-
dam Botanico
nactus est &
aluit, fouitque
studiosè in
horti delirio,
vbi rarà tran-
splantatione
florum pyra-
midatum acer-
uum, centum
viginti & plu-
rium, suauissi-
mo spectaculo,
iucundissi-



mi Rosæ Moschatæ odoris æmuli, densissimè
bicubitalem ex purpureo fuscum caulem fasti-
giantem. Flores pares, similes Hemerocallidis
secundæ nobis modò descriptæ; dilutiores & lu-
cidiores, per exortus quinque aut sex variè & fu-
se caulem ornant, tortuosis ex fusco purpureis
maculis latoribus diffusi, circum agunt & co-
ronant. Semen in vasculis compressum, aliis
ferè par & simile: Hoc primi ante omnes Bota-
nici Gallo-Belgæ nacti sunt: sed vnde delatum
nescio. An icon. PL. 168. Hemerocallis flore ru-
bello, T. 107.

An Clus. Lilium montanum 4. quoddam ge-
nus, cuius flores primo non dissimiles, sed se-
rius sese explicare soliti, illique non inuauo o-
dore præditi.

MARTAGON ALBICANS PICTVM ad iconem cum coloribus.





Martagon flo-
re albicante,
qui hoc anno
1604 non flo-
ret in horto
Ill. Princ. sed
picta colori-
bus iconem ex-
primere cu-
rauimus, co-
tus albidus
est cum colo-
re subcæru-
leo & pun-
ctis plurimis
notatus, api-
ces cum ca-
pitulis lon-
gis purpu-
reis, altitudi-
dine exce-

debat quatuor pedes, Anno 1604. Iunii 2. Gold-
murg, vti ascriptum iconi.

LILIVM

LILIVM FLORE MINIATO NVTANTE,
siue Hemerocallis Chalcedonica aliquibus.

Decriptio



EX radice bulbosa, emergit caulis bicubitalis, minimi digiti ferè crassitudine, ima parte punctis rubentibus guttatus, ceterà virelscens, còcauis, paulò postquam è bulbo eluctatus est, radiatas fibras circumquaque emittens: per quem frequèntia oriuntur folia indigesta, Lili Mar- tagonis, striata, acuminata, per marginè nonnihil veluti pilosi ostentantia, sapore oleraceo prædita, flori cauli summo reflexo insidet plerumque vnus, aliquando duo aut plures, colore phoeniceo pulcherrimo, quorum singuli Liliaceis similes senis foliis constant, vt cunque angustiorib⁹ quam Lili albi, hæc striis notata, quæ extrorsu reflexæ, ceu Martagonis, apicibus circa caulem cœunt, prominentibus, nudis, miniatæ apicibus, quos pallida flamina sustinent, quorum medium obri- net pistillam apicibus concolor. Semi- na, Clusio teste, sunt in anguloso capite plana, Martagonis

aut Lili sylvestris semini ferè similia, sed nigri- ora, minora, neque aded spongiosa, terræ com- missa prodierunt, planaque foliola tulerunt: Ra- dix vix plurimum non est aded magna vt quidam existimant, sed Lili semestris radicem haud mul- tum superat, colorèque dum recens erua est aded illi persimilis [etenim si diutius extra terram adseruetur purpurea ferè tota est & subinde qui- busdā notis saturatè rubentibus inspergitur] vt etiam in stirpium cognitione admodum exercita- ti, nisi eas inter se conferant, difficile discernere possint: Huius tamen radix è tenuioribus squa- mis contexta est, nec minùs fibris suprà & infrà quàm illa donata.

Bulbum accepi (inquit Clusius) qui primis an- nis vnicum florem semper mihi protulit, tandem quaternos, altero tum insequente anno senos, còsque omnes ex summo extrinòque caule simul prodeuntes, quemadmodum alteri floruit, trede- cim flores extimo caule, eoque vnciam lato, su- stinens, saturatè rubentes cùm præcedente anno quinque duntaxat extimo etiam subrotundo cau- le vt incus tulisset. Sed & Patricia quædam Vi- nensis aliquot habuit plantas, inter quas vna ex- timo caule duas vncias lato tres & viginti flores tulit. Gen. lo. Van der Delf plantam habuit se- mine naram, quæ primo quo flores proferte, ex- pit anno octonos, proximo autem insequente quadragenos protulit. Pictura à Rasso mihi donata vnicenos aut plures flores ab extimo cau- le plano propendentes habebat. Binas habui sa- turatiores flores gerentis plantas, quarum prior quaterna, altera septenos flores tulerunt, omnes summo caulis fastigio æqualiter innascentes, nò temerè per caulem sparsos, quemadmodum Li- lium album aut sylvestre ferè solent: singulae au- tem hoc peculiare habuerunt, vt vnus medius in- ter reliquos surrecto pediculo nasceretur, & in alterà quidem ille duodenis foliis constans, & quodammodo gemellus, vt in secundà subiecta icone videre licet. Cæterùm duorum generù ef- se videtur hæc planta: vna videlicet dilutioribus floribus prædita, altera saturatioribus. Ego sanè longà experientiâ didici, eas plantas quæ dilutio- res ferunt flores, caulem & folia viridiora habe- re iis quibus saturatiores sunt flores: postremis enim caules & folia plerumque ex purpurâ ni- gricant. Deinde mihi conspectæ sunt radices Constantinopoli allatæ, quibus color purpurascens fuit, dilutiores protulisse flores: alie contrà sa- turatiores. E floram verò numero, an certa ali- qua differentia [vt initid existimabam] consti- tui possit, plurimum ambigo, cùm eas stirpes quæ numerosos tulerunt flores, subsequente interdum anno, paucos, aut vnicum duntaxat, habuisse ob- seruauerim: at læto & pingui solo depositos bul- bos, plures vt plurimum proferre flores animadu- uersum.

Ob floris venustatem plerisque Italiæ locis Ri- zio de la Signora appellatur hæc planta.

Lob. Obl. & Icon. Plant. pag. 169. Hemerocallis Chalcedonica purpureo sanguinea polyanthos. Lob. 85. Teut. 208. wilde lilien vom Caluanen / von Constantinoplen mit vole bloemen Belg. Iterum Hemerocallis Bizantina altera Teut. 208. In indice Hemerocallis flore rubello: Belg. Schoon Elacer welle lilie von Caluarie. Liliū Cal- cedonicum miniatum, siue Hemerocallis, admo- dum elegans hoc Lili genus ob floris decus co- lorisque flaminei nitorem: vtriusque Cinnaba- ris natui & factitii, intenti aut diluti coloris, mi- nati tintillatione splendidiorem: eius duas va-

nietates aut plures obferuare licebit. Præcox, qui nos, senos, denosque vt plurimum profert flores: & nonnunquam eius radix excrefcit & luxuriat vt caulem edat duorum ternū nūc digitorum latitudinis, qui Lobel. & Perx in Adu. amicis que fæpe triginta & plures flores protulerunt. Secotinum quandoque diu multique annis vnicum florem edit: at temporis confequentis plures, fed ferius, fuperioris Martagonis floribus elapfis, erumpunt flores quemadmodum amici notque iamdiu obferuauimus. Caulis cubitalis, cætera non diffimilia. Liliū rubrum, *Z. finare*, Liliū rubrum fūe miniatum Chalcedonicum Conftantinopoli miffum, *Sultan Zambach*, ab aliis denominatum *Corona di Re*, hoc eft, Corona regia, &c. Habetur præterea Liliū Byzantium minus saturato flore *mauerher*. Liliū Byzantium miniato dilutiore flore. Relatum eft, confpectas effe Liliū huius Byzantini plantas, quæ florem ferrent prorfus niueum, in cæteris aliter patem.

Hiftor. Lugdun. p. 1498. Hemerocallis altera Matthioli: quæ Lugduni in horto quodam Dalech. induftriâ creuit.

C. Bauh. Phyt. Liliū 17. fūe Martagon purpureo fanguineum polyanthos. Hemerocallis 2. Matth. Chalcedonica Lob. Liliū 18. fūe Martagon phœniceum vnico flore Clufio. Liliū rubrum Zuhniare. Lobel. Hemerocallis Byzantina.

Floret Iunio aut paulo ferius. Conftantinopoli Viennæ Clufio delatum, ex hortis vltra Bosphorum in Afia fitis bulbi allati: Nouo Vere folet emergere. Liliū genus flore vnico mini coloris inclinato, vt Martagon, habui Montbelgardi in in horto E. C. miffum Stutgardia, vbi florens vidi Iulio: folia vorare folent infecta quædam rubra: in horto Montb. protulit 2. flores. D. à *belle fontaine* Vefuntio miffit mihi bulbū cum hac infcriptione: Hemerocallis Chalcedonica. Heidelbergæ ficcā plantā nos donauit Dominus Sprengerus.

De facultate huius comperti habemus nihil, nifi Dodonæo Circumforaneorum aliquis, quorum plena funt omnia, pertinaciter reſistere conetur.

LILIVM PRÆCOX NVTANTE flore rubro.

Descriptio

Habebar [inquit Clufius Hift. post.] Ampliff. vir lo. Martorf. Par. Franc. genus Liliū rubri ex Stutgard. Ill. D. Witt. horto acceptum, quod vno fere mense maturius Byzantino flores proferebat: nempe fub finem Maii aut initium Iunii, vt mihi referebant qui viderant. Etat autem floris color (illorum testimonio) minus satur & & longè dilutior eo, qui in floribus præcedente capite defcriptis apparet: *caulis* fanè, vt ex planta quam mihi donabat deprehendere licuit, gracilior & breuior erat Byzantinis adultis, cubitalem videlicet altitudinem non multum excedens: *folia* quæ inhærebant anguftiora & magis saturatâ viriditate prædita: *bulbi* squamæ (nam squaræatam radicem habet petinde ac Bizantinū) longè etiam breuiores erant: *tulerat* verò illo anno tres flores fūmo caulis fastigio æqualiter infidentes, mihi autem Lugduni apud Batavos fequente proximo anno vnicum (tam longâ enim in itinere morâ radix valdè afflicta fuerat,) euit, quem fupra dixi, coloris, proximè autem fequente biuos duntaxat. Licet autem matu-

rius altero flores proferret, illo tamen ferius germinare solebat. Cæterum, fub initium anni 1594. monebat me Thobias Roellius, lo. Somet varias & elegantes ſtirpes attuliſſe, inter quas bina effent Lilia miniato ſeu rubro flore, maturius Byzantino flores proferentia, quorum alterum anguftiora folia haberet illò quod Conſtantinopoli allatum: alterius verò folia multò breuiora effent, ac paulò latiora. Hortum icones ſuis coloribus expreſſas, ſed radice mutilas, cum aliquot vtriuſque plantæ folijs ſequentis Iunio ad me mittebat.

*Liliū præcox nutante flore rubro,
tenuifolium.*

Valdè autem diuerſum eſt Anguſtiſolium 3. Cluſij, non quidem floris formâ (nam eius etiam folia circumuoluta & reflexa) ſed colore, qui Lilio cruento maiori non bulbifero ſimilis eſt, tum ſitu, foliorumque per caulem ſparſorum diſſimilitudine: multa enim & conſerta fert *folia*, cubitalem & ampliorem caulem conſuſe veſtientiâ, admodum anguſta, & longa, inſtar prænè foliorum Tragopogi: caulis item faſtigium flores profert non eodem ortu, vt in Byzantino, ſed in ſummis alis, inter anguſtiſſima foliola *mauerher* naſcentes: an vtriuſque radix Byzantini radicem æmuletur, me ſiguit, ait autor noſter: nam neutrius plantam videre mihi contigit. Sed & triennio poſt iconem ſuis coloribus expreſſam ad me mittebat idem lo. Somet, qualem ille deſcripi curauerat ad normam eius plantæ quæ ipſi eodem anno quinque & triginta flores protulerat. Illius floris (Exot. par. 2. Append. 2.) colorem plurimum ad Mali Aurantij præmaturi colorem accedere obſeruabam: odorem autem non adeò ſuauem vt eius quod præcedente capite deſcriptum eſt, ſed potius Liliū montani flano flore odorè referre. Habebat porrò Ampliff. vir Nic. Vanden Branden Conſiliarius Bruxellenſis plantam ſimilem Sometianæ, quæ anno à Chriſti natiuitate 1602. longè etiam plures tuliffe fertur flores in vnico, ſed illo plano, caule: anno autem inſequenti non minorem florum numerum tuliffe ad me ſcribebat. Cæterum aliud eius genus reperitur etiam præcox & anguſtiſolium, longè nitidioribus floribus quàm Sometianum prædictum; nam prorfus miniatos illos fert, vt Byzantinum, certè magis ſaturos quàm Sometianum, nec eos inodoros. Præſectus Curſorum Bruxellæ ſub extremum annum 1602. puſillum bulbū eius generis mittebat, quem ex Italia recenter accepiffe ſcribebat: & licet is bulbus Nucis Auellanae magnitudinem vix ſuperaret, ſequenti tamen anno quatuor flores tulit eius quem dixi coloris: eius etiam folia hæc anguſta vt alterius, magis tamen ſaturâ viriditate prædita, & magis ſplendentia mihi videbantur, atque inordinatè queadmodum flores in caule naſcebantur: obſeruabam etiam eius caulem & folia non adeò breui marceſcere vt alterius, ſed diutius perdurare. Vtrumque genus, ab ijs qui diu aluerunt, Martagon Pomponij vocatur, & hac appellatione ex Italia ſe accepiffe aſſerunt. Rarum adhuc eſt in his Prouincijs, quia adnatis difficillimè ſe propagat, nec apud quempiam ipſam plantam ſemen præbuiſſe intellexi.

De hoc Lob. Adu. part. 2. inquit. Eximio ornameto decorat Botanicorum paradifos Hemerocallidis Macedonicæ tenuifoliæ miniati coloris: Liliū ſilpeſtris montani Macedonici, & Mar-

Martagonis Pomponi, splendissimi miniati coloris. D.J. Someri: Martagonis Pomponi Someri: Lili rubri præcox Clusii, luculentus flos, incaminate fulgens, miniati coloris &c. Debetur hac planta, præfato D. Somero, qui primus eius bulbum è Macedoniæ montibus effossit in Belgium detulit, & amicis communicavit. Hanc quoque aliquot annis ob florum decus N.C. Arbergius studiosè coluit, nec non alii Medioburgenses.

LILIVM NVTANTE FLORE FLAVO.

Descriptio

Elegans Lili montani genus à nemine quod Clusius de sciat scriptum: cuius bulbum misit Io. Robinus & descripsit, florem habere ex auro flavescentem, foliis instar Lili montani, aut Byzantini, ut sunt Lili montani siue Martagonis Marth. flores. Misit ad me, inquit, Burdegala eruditiss. Io. Venerius istius Lili crassos bulbos, monerat alterum altero magis præcoces flores proferre: addebat insuper se aliud adhuc genus observasse, cuius flores nullis punctis internè distincti nasci in *Cageire en barahis* nuncupatis locis, atque Pyrenæorum montium aliis, unde ipse retulerat. Ac se spontè nascentes eruisse natos in monte *Campsaure* vocato, & alio in loco qui à Lilio nomen sumit: istique à rusticis *Consol* appellari, id est, Consolidam, quod eius radice contusa & imposita, tam hominum, quam animalium vulnera, mirum in modum curari referant: atque adeo Pyrenæorum montium incolæ nullum aliud remedium usurpare.

Lilium montanum flore flavo Lobel. & Penz. Adu. non dissimilem vulgum, ortum, & natales habet, montium nempe Pyrenæorum, Lilio Byzantino miniato aut sylvestri montano Lilio.

MARTAGON FLORE LVTEO PRÆCOX.

Descriptio



lis lunii 9. Eius flores sunt miniati ut ait hortulanus: Martagonis autem crocei flos apertus fuit 11. lunii, intus punctis notatus, capitula apicem crocea ferè.

CORONA IMPERIALIS SIVE

Tutai alris.

Radix bulbosa, rotunda, crassa, diversa à Liliis forma, est enim compressa ex magnis crassissimis & succulentis squamis compacta, colore interdum albo, nonnunquam etiam purpurascens, sæpè pallido, odore foetido & viroso, uti & foliorum: Colchicum olente, Clusio verò hircum, nares etiam procul feriente, qui eruit binas & amplius libras pendentem. *Cantem* tollit singularem, bicubitalem aut etiam altiore, digitali crassitudine, inferiore parte plusquam pollicari, fimo, intus fungoso, viridi, torundo, quidem, sed ad cubiti altitudinem striato, *foliis*



magna parte stipatum numerosis, splendore viridantibus, Liliaceis vel Lili montani floribus Lob. pluribus indidem ortis, & quali ordine, aliis inconditis, nullo mixto pediculis, sed latiore sui parte cauli adnatis, ita ut appendices paulum eminentes ab iis propagatis caulè reddant nonnihil angulosum. Supra autem densius

hoc foliorum agmen, caulis ad pedem, nonnunquam etiam cubitum protenditur nudus, sine foliis, gracilior quam inferius, & ceteris, neque striatus & viridis, sed lævis & purpurascens coloris, Serpentinæ instar maculosus, qui in summo totidem pæne in angulos desinit quot flores sustinebit, nempe binos, ternos, quaternos, quinos, senos, aut plures, omnes Vere quasi æqualiter, sed contrario situ nascentes, singulosque inter binas folia inferioribus longè minora & angustiora, equali ferè longitudine, quum flores primùm erumpunt, inter folia latent, candicantesque sunt, deinde paulatim incrementum sumunt, una etià succrescente eà caulis quæ illos sustinet nudà parte: florum verò pediculi qui sexunciales in augmento deorsum inflectuntur è quibus flores penduli sunt circum circa regum coronas imitari, Lili candidi, vel Martagonis pares, flammeo colore rutilantes, Lobelio ex phœniceo rubentes, patuli, senis constant foliis latis, per extremum mucronatis, pulchra striarum saturationis, siue purpurearum Clus. discursantium picturâ variegatis, laciniata cæsurâ lubinde ludentibus, vngue autem, inquit Clusius, singulorum foliorum nonnihil foris eminente, & ex nigro purpurante, quorum unuscuiusque fundum obicuriore colore pictum obsidet gemmantis liquoris margarita argentea limpidissima & dulcissime, pertinacis durationis, post multos etiam dies à refectione, de quo liquore Clusius ait: Flos absolutus & maturus expanditur, tigrinabuli mo-

lium siue corona Imperialis Teut. 210. Item pag. 172. Corona imperialis phœnicea duplici corona aut serie florum. Teut. 211.

Corona im-
perialis
varietas.

Corona
imperialis.

Corona
media.

Corona
polyphylla
sive foliosa.

Aduers. par. 2. pag. 512. Liliū siue Corona im-
perialis Herbariorum, cuius varietates peram-
næ & perquam speciose Belgio & Anglo-Britā-
niæ iam nostra ætate inquilinæ, oblectationi
oculorum magis, hortorumque ornamento,
quàm naribus dicantur: tertium namque hie-
cinum halant odorem Imperiales Coronæ, qua-
rum varietates in caule, flore, & folio perspi-
cuz. Præcocior quæ statim Martio, necdum
lapso floret: folio lato est, dilutiore viridi, &
flore non dissimili, sed pallidiore, à frigore for-
tè. Quæ media, est elatior, folio itè pallidiore sed
angustiore: & flore item dilutiore. Platicaulos, ut
Liliū albū & Martagon siue Hemerocallis Byzā-
tina interdū cœtu fortuito sit Imperialis Corona
numero florum increment: foliis angustiori-
bus, & Minii coloris saturiorib*, floribus aspectu
iucundis, quales florere Londini in horto D. Ioh.
de Franqueville Anno 1600. & Hacknei in horto
Nobiliss. Baronis Eduardi Zouche 1601. Serotina
latioribus foliis atrouirentibus: flore autem ex
saturo phœniceo colore. Multis numerosisque
latioribus foliis constat, stipatim bicubitalem
caulem ab imo amicientibus, florum elegantissi-
morum saturorum duplici serie coronatæ, non-
nullisque floribus caulis comosum fastigium in-
ter nascentibus, aspectu iucundissimo. Hæc variis
in hortis alitur & in honore habetur.

Inter sylvestria Lilia Dod. Lat. venit & nume-
randa Imperialis Corona dicta *Lale* & *Turfani*
patriis vocibus appellari affirmatus.

Hist. Lugd. Corona Imperialis Dodonæi. Co-
rona Imperialis 1. Rönigefron / Rönigshilien.
Et Corona Imperialis 2. polyanthos, Gefeuls Rön-
nigefron / Liliū Persicum, Tufai, aut Tensai.

Tempus.

Locus.

Floret Aprili, interdum etiam Martio, si æris
temperies paulò calidior fuerit. Semen Iunio
maturum. Nusquam spontè nascentem hanc plā-
tam conspexit Clusius, sed Constantinopoli de-
latam, eo quo ad Maximilianum II. Viennam e-
uocatus est anno, primus Belgicæ hortis com-
municauit: & in Viennensibus reposita feliciter
provenit. Ante ipsius tamen discessum ex Belgio
eius iconem [qualem Dodon. in purg. hist. Ap-
pend. exhibuit] Ill. V. Ioh. Brancioni miserat C.
V. Alphonsus Pancius Ser. Ducis Fer. Med. Ob-
seruavi Stugg. in hort. Ill. E. C. vnde translata in
eius hortum Month. floret Martio, ac hiemem
fert non reposita: Visa etiam Basileæ florere eo-
dem tempore, ac semen maturum proferre Iu-
nio.

Vitis

An apud Turcas medicum aliquem vsum ob-
tineat, non intellexit Clusius, arbitratur tamen
venustatis & ornatus potius causâ hanc plantam
in suis hortis illos alere, quàm ob vllas eius fa-
cultates.

Hemerocallis vires licebit videre antè.

CORONA IMPERIALIS MONSTROSA.

EX iconibus coloribus depictis Illustrissima
Princ. 1608. In magna iconc multò plures

Tom. II.



erant flores &
folia. Est mō-
strofa Corona
Imperialis.

LILIVM PERSICVM SIVE SYSIANVM.



Donavit
D. Cher-
lero meo No-
bilib. Cortusius
Patavii inter
alia raritatis
plena, Liliū,
Persicum ei di-
ctum: cuius
caule proce-
rus, non mul-
tū crassus,
cubitalis, rotū-
dus, foliis ab i-
ma parte sur-
sum vortum
densè stipatur;
Lilii crocei fo-
liis, angustiori-
bus, acutiori-
bus, digitalis
longitudinis;

Descriptio

longè quàm Coronæ imperialis angustioribus,
illis ferè similibus quæ in summo ipsius capite
nascuntur, virescentis ex cineraceo coloris, siue
quodammodò æuginosi (inquit Clusius,) quales
in Tulipæ foliis conspiciuntur, contorquentur
verdè illa, buxique sunt odoris: summus caulis
longum gerit thyrsūm *strem*, selquiuncialibus
& longioribus pediculis hærentium, numerosorū,
pendulorum, terramque spectantium, Leucois
bulbosi, Theophrasti & nolas imitantium, senis
foliis constantium, saturo purpurâ tinctorum, si-
ue, ut ait Clusius, foris purpuræ valde obsoletæ
colore præditos, interne autem dilutiores, ino-
doros, vnguibus subvirescentibus. Ex umbilico
sex inæqualia *staminula* prodeunt purpureis apici-
bus primū conspicua, qui obuersi, flavo polline
conspersi apparent: tria deinde longiora stami-
nula cœunt, stilūque medium florem occupa-
tem æmulantur. Sequuntur deinde sex angula
capita siue triangula, quorū singuli anguli bis a-
lis sunt præditi. Coronæ Imperialis capitibus fe-
rè similis, sed minora & breviora: *semine* etiam
simili, paululū tamen breviora: *Radix* qua-
lem nos habuimus bulbosa, Pomi Arancii magni-
tudine, subrotunda, fissa: magnis squamis lo-
Naa

ficata, ex albo flauescens, tenui membrana cin-
cta, substantia eius qualis in reliquis bulbis: Ima
fossilis foramine plurimum pertusa caulis vesti-
gio. Sapor substantiæ peramarus, horribilis.

Sapor

Oder.

Nomen.

Clusio radix est magna, Tufai radici pæne æ-
qualis, è paucis squammis contexta, candidiori-
bus tamen & aliquantulum longioribus, nullò-
que tetro aut graui odore nares feriente præ-
dita.

Missi aliquoties pauci bulbi Tufai bulbis per-
mixti cum inscriptione Tufai Fier Persiano, si d-
manda Penachio Persiano: tandem postremò ac-
ceptus Susam-giule appellatione, quod è Susis
primum Constantinopolim allatus sit: hæcque a-
dèd causâ Liliū Sultanum nuncupari (ait Clu-
sius.) Munere Magnif. V. Iac. Contareni pa-
tricii Veneti ex Italia in Belgicam Ill. Io. de Brä-
cion missus bulbus Penachio Persiano nomine, bi-
cubitalem aut ampliorem tulit caulem quinquä-
genis floribus onustum, nullum autem semen:
imò ne germinauit quidem subsequente anno:
illius iconem dum florebat suis coloribus expri-
mebat Raphaël de Coxia Regius pictor, & exem-
plar mihi mitebat, ex qua nostra icon imitata:
flores sunt magis paruli, quàm in pictura expres-
si. Iconem habeo cum magno artificio depic-
tam munere Nicolai Rassi Regis Galliarum Chi-
rurgi, qui Hyacinthi nomine appellabat. De hac
planta scribebat Alphonsus Pancius: Penachio
Persian, è pianta bellissima, & è specie di Giglio
ò Marragon, diuerso della Corona Imperiale.

Lob. Obs. Adu. par. 2. & Ic. pl. pag. 170. Liliū
Persicum Lobelij, vulgò Pennachio Persiano. Hi-
stor. Lugd. Liliū Persicum Lobelij. Camer.
hort. p. 89. & Tabern. icon. & hist. Persische Gil-
gen/Liliū Persicum. C. Bauh. phyt. Liliū 12.
siue Persicum maius & minus, Luterià ad nos mi-
sit D. Iohan. Henricus Cherlerus. Audimus nos
Guilandinum existimasse Pennachio Persiano esse
hemerocallidem: verum hæc opinio, mihi non
satisfacit, multa non respondent & in primis col-
or.

Hemerocall.
L. Guss.

Floret Aprili, semen illius maturum cum Tu-
fai semine aut paulò post: Inter bulbos Constā-
tinopoli missa fuit Vicinam: ternos tulit caules,
singulos ternis floribus præditos, hic vicenis, ille
triccis, tertius plurib⁹. Bulbos cū selectissimis qui-
busq; aliis rigida & aspera hiēs corruptit. Non mo-
dò flores, sed abundè semen maturū protulerunt
Lugduni Batavorum. Verisimile est [autore
Clusio] è Susa vrbe Susianæ regionis Persidi vi-
cinæ primum delatam fuisse Constantinopolim.

Camerar. hort. Liliū Persicum: Ital. Pen-
nachi del Persiano apud nos quidem perdurat et-
iam in hyeme non nimis acri, sed bulbus semper
decrescit, nec florem quod ego sciam, in Germa-
nia produxit. In Belgio & Germania rarum ad-
modum fuit: Angliæ hodie alienigenarum opera
conseruatur & propagatur, Lobel. Passim in hor-
tis Italicæ colitur, vnde à Cherlero elegans allata:
speciosos ex Italia ad nos attulit Cl. D. Bierdun-
pfelius Med. doctor, & studii botanici sagacissi-
mus excultor, quos hortus Ill. Ducis Montbelg.
habet. Floret Maio & Iunio, Montb. postea perit:
vidimus Argentinæ in horto Dj. Frid. Meier.

LILIUM ASPHODELI RADICE

Luteum, siue lilio Asphodelus
quorundam Flore luteo.

Ad vñ vel duos cubitos excrefcit, caule tenui
sed rigido, tereti, cauo, læui, absque foliis in



summo in ali-
quot ramos di-
uiso, radice fi-
brofa, glandu-
lis appensis
donata, As-
phodeli radi-
cum æmula:
multæ oblon-
gæ ab vno ca-
pite descen-
tes, foris
buxea, intus
alba, sapore
subdulci, ex ea-
rum annexa fi-
bræ quædam
crassiores ser-
punt, quibus
in plures plā-
tas multipli-
cantur. Folia el

Descriptio

sunt numerosa, Porri aut Asphodeli, longa, cari-
nata, striolis per longum donata: flores odore
planè & formâ Liliū, sed colore penitus luteo,
post flores inquit Dodon. crassæ, triangulares gi-
gnuntur siliquæ in quibus semen nigritum & splē-
dens, Pæoniæ paulò minus.

Gesner. de hort. in append. Gladiolus Indicus
à Calceolario missus Typhæ similis, radicibus
nodis Filipendulæ similibus, quæ iamdiu in hor-
to habet, iisdem ferè floribus quibus Canna,
nempe croceis, Liliū specie, sed ii sine semine de-
cidant. Liliū luteum Ephemerum quod Tur-
cicum aliqui vocant, alii Gladiolum Indicum,
quem Asphodelis cognatum deprehendi: &c. Si
Gesnerus intelligit, Liliū non bulbosum, com-
paratio floris cum canna [scilicet Indica] non
placet.

Gladiolus
Indicus.Liliū specie
Liliū
Ephemerum
Gesneri mod.
Liliū
Liliū Asph.
Liliū luteum

Lobel. & Penz: Asphodelus Lili florus & Li-
rio-asphodelus, liliū luteum vel Asphodelum
Pharmacopæis Veneris.

Dod. in post. hist. non meminit ampliùs Liliū
non bulbosum lutei maioris & minoris, sed tantum
vnum tradit luteum, & aliud obsoleto colore ru-
bons: de quo mox, sicut etiam de luteo.

Cæsalp. Liliaginee vulgò appellantur duæ
Asphodelis affines, floribus croceis, figura & ma-
gnitudine Liliū. Maiori caules cubitales, flores
ampli, colore quasi igneo, qui celeriter marces-
cunt. Altera minor in totum non excedens di-
midium cubicum, floribus aureis, radices vt in
Asphodelo, maior in Vere tantum floret, minor
diutius propagatur. Hemerocallides videtur apud
Diosc. præsertim quæ maior: cui Diosc. teste Bul-
bo ingenti similis, videtur autem accipere glo-
bum radicum ingentem. Theophr. inter suffru-
tices coronarios recenset. Theodorus Elium ver-
tit. Hermol. in Diosc. non Elium legendum pu-
tat. Sed Liliū marinum. Plinii Hemerocallis
descriptio detruncata videtur ac deprauata vt pa-
tet conferenti cum Diosc.

Histor. Lugd. Liliū non bulbosum, Hemero-
callis Dod. Et p. 1590. Liriasphodilus, Lili florus
Lobelio. C. Bauh. Phyt. Liliū 21. siue luteum
Asphodeli radice. Tabern. icon. & hist. Gerl
Asphodelien, Asphodelus Liliaceus luteus i.
Clus. Pann. Liliasphodelus luteo flore elegans
& odorato, Vng. Zead Liliom: Croatis apud quos
etiam flore albo inueniri asserunt Illian Zveret.
Idem hist. Liliasphodelus luteo flore.

Camer.

Camer. hort. Liliū non bulbosum, siue Arundinaceum flore luteo, odorato admodum. Profert interdum germina in summitate caulis, ubi flores sine semine deciderunt, quæ terræ commissa statim radices agunt.

Locus & tempus. Peregrinū Belgio: Floret cū Lilio purpureo maiore & paulo antè, Lilia candida præcedens, Dodonæus. In Vngaria maximā copiā spontè nascentem in multis viginosis pratis, non procul ab oppido munitiss. Nemehvvyvar inueni, Clus. Liliū non bulbosum flore luteo plantam in horto Ill. E. C. ubi facillè provenit & se multiplicat, non ita tamen vt purpureum, semina proferens. Montbelgardi nondum vidi: Hanc plantam primū observavi Basileæ in horto Di. Doctoris Fælicis Plateri. Frater Casp. Bauh. attulit mihi Parauio ex horto Di. Triezani, qui anno-avit dici à Guilandino Asphodelum Hermaproditum Recentiorum. Erismbach Arabum.

LILIVM RADICE ASPHODELI PHOENICEUM, siue Lirioasphodelus quibusdam.



Non admodum absimilis est hæc planta Lilio Asphodeli radice præcedenti, sed in singulis partibus maior, radix quippe cōsimiliter glandulis oblogis, filo connexis, strumosa, alba, gustu propemodum fatuo: *caulis* digiti crassitudine, duos cubitos altus & maior, fistulosus, enodis, cuius fastigium in aliquot alas

diuiditur: *folia* maiora, carinata, latiora, quàm Lutei: *flores* in caulium ramis, altero tantò maiores, Liliaceis pares, foliis tenis constantes, colore tristiore rubent intrinsecus, lutea linea per medium decurrente ad vngues vsque rotos luteos: extrinsecus verò folia ad luteum, magis de- uergunt.

An Camer. hort. Liliū non bulbosum, siue Arundinaceum flore suberoco.

Clus. Hist. Lirioasphodelus puniceo flore quem Hemerocallidem esse Dodonæus censet. Hemerocallis flos est qui nocte tabesit, Oriente verò Sole pullulat, Athenzo teste, quale istud non bulbosum Liliū, præsertim quod purpureum & fugacissimum est, hoc enim vno tantum die viget, matutino siquidem tempore exortum vesperi flaccescit, quamobrem & propriè *hemerocallis* ab vnius diei pulchritudine dici potest: Cum Dioscor. etiam descriptione conuenit exceptis radicibus. Flores proponit vnius generis Ochra luteo colore: alterius verò purpureos. Purpurei etenim coloris & Hemerocallidem aliquam esse *hemerocallis* nomen, inter nothas appellationes repertum ostendit: Neque obstat Dod. in fol. quod

Tom. II.

Dioscor. Hemerocallidis magno bulbo similem tribuit. Omnia nomina conueniunt excepta tantum Bulbi Hæmatici appellatione: *hemerocallis* autem vox purpureo propria est.

Lobel. Obs. Lirioasphodelus phœniceus. Sunt qui Ephemerum & Hemerocallidem dixerunt Plant. ic. p. 94. Lirioasphodelus Lob. 48. Teur. 127. An Bellon. Lilia rubra Turcarum?

Gesner. hort. Liliū rubens arundinaceum Turcarum Bellonio. Si quis à radicis forma Cy-norhodon vocare voluerit aut à foliis Cannorhodon, non absurdè fecerit.

Dod. de fl. & in fol. Liliū non bulbosum flore rubro purpureo.

Taberna. icon. & hist. Asphodelus Liliaceus rubens Kor. Affodil lilien. Histor. Lugd. pag. 1590. Lirioasphodelus phœniceus Lobelii. Et p. 1499. Liliū rubrum non bulbosum, radicibus tantum differt à Lilio non bulboso luteo, quas multum fibratas habet. Non separabo à Lirioasphodelo, donec aliquis me moneat ubi viderit talē plantam.

C. Bauh. Phyt. Liliū 22. siue rubrum Asphodeli radice: Hemerocallis Diosc. Theophrast. & Plinii non potest esse Hemerocallis Theophr. est enim frutex.

Liliū non bulbosum habeo in Floro Ill. E. C. Wirtemb. Montbelgardi, quod mirè multiplicat, quorannis flores, semen autem non profert. Basileæ observavi in horto D. Fælicis Plateri: Suā autem propagante & reptante radice odiosum, ac multò magis quàm præcedens. Valde luxuriat, (vt Clusius testatur) in omnibus Autriæ, plurimisque Germaniæ hortis.

Facultates Lili non bulbosi incompertæ sunt, cum nullius hac ætate in medicina aut cibatu sit vsus. Hemerocallidis vires tradit Dodon.

GLADIOLVS SIVE XYPHION.

CAP. XIV.



Cum Iride bulbosa multā habent similitudinem Gladioli, *folia* cultrata, striata, caule in vagina tanquam concludum aliquouſq; circumplectentia: *caulis* sesquicubitalis, singularis, teretes, geniculatus, nonnihil, circa summitatem maximè, purpureascent: cui *flores* longā serie è vagina pro-

silientes adnascuntur, quasi intorti, longi, aliquomodo similes Iridi, sed minores multo, nunc vno versu eodem vergentes, nunc duplici, colore suauerubenti, formā Liliacea, foliis tenis constates, quorum tria inferiora, Zonam habent per longum decurrentem, modò saturatius purpurascens, modò in medio albescens, *apicibus* atro purpureis medium occupantibus. *Radix* duobus constat bulbis, gustu acri, altero alteri incumbente, alteroque magis quàm altero vegeto,

Nna 2

adnatis quoque per intermedias fibras subinde bulbillis quibus se propagat, sub bulbis sunt duae radices satis crassae, tres uncias circiter longae, praeter fibras quae desunt in icone Matth. Nostra etiam figura iam empta sculpta displicet.

Hunc porro Cordus hist. sua diligenter sic descripsit. Victoralis forma, id est silu. Gladiolus, rectum & mucronatum emittit folium: è quo alia duo aut tria erumpunt, Irid. similia, multò tamen angustiora, utrinque striata, & Iridis modo sibi inserta: iuncum, teretem, cubito longiorem, & glabrum caulem amplectentia: in cuius summitate quinque, sex aut septem egregiae figurae & coloris flores, Sole cancerum ingrediente, se proferunt, à se invicem distantes, in vnam partem caulis se inclinantes, & deorsum nutantes: constant hi sex foliis, uncia parum longioribus, simul ab vno exortu prodeuntibus: ex quibus quatuor semuncia paulò latiora sunt, colore roseo, sed multò latiore & pulchriore: interdiu, cum Sole tanguntur, ignis & scintillarum modo exteriori superficie coruscantia, & veluti flagrantis, reflexis labris profundioris calathi figuram referentia: reliqua duo foliola praedictis multò tenuiora sunt, ac intra florem constituta, inferius aliquantulum prominent, & candidam, longam, & in medio latiore maculam habent, quam vndique purpurea linea circumscribit, & terminat: superiori floribus folio stamen subest trifidum, & inter hoc & folium singularis apex. Floret paucis diebus, ab inferiori parte incipiendo: aperiente enim se qui in summitate est flore, inferior flaccescit & clauditur: floribus singuli folliculi succedunt, in rotundo modicè oblongi, tenuibus venulis distincti, Nucis Auellanae quantitate: qui cum immaturuerunt in tres partes diuiduntur, & tenuia, paleacea, flauaque semina ostendunt: in quibus rubens, cartilagineus, & paruus est nucleus: radicem habet non profundam, paruum, rotundam, bulbosam, ab imo basi versus germen turbinatam, aliquot crinitis & reticulatis tunicis, veluti loricis vestitam: quibus detractis duo exigui candidi, carnosique apparent bulbi vno alteri insidete, superiori quidem Veris initio, minore sed vegetiore: inferiore autè maiore & latiore, verum flaccido & fungoso: perit enim & flaccescere incipit, prioris anni bulbus Veris initio, supernascente alio: itaque simul decrescens & increscens radicem habet: nonnunquam etiam inferiori subest tertius bulbus, sed adeò flaccidus & inanis, vt inter escodiendum (quia non est spectabilis) negligatur, dum floret superior & minor bulbus increcit, vincitque soliditate & qualitate inferiorem: nam cum flaccescere flos incipit, digiti crassitudinem, & globuli figuram acquirit: fibras ab inferioris bulbi base emittit tenues, candidasque: saporem radix habet praeter ceteris herbis partibus excellentem, nempe dulcem & modicè acrem, relinquit enim in palato aliquandiu linguam & fauces aliquantulum vrentem & saluam elicientem. [flores & folia idem faciunt] acrimoniam.

Xiphion seu Gladiolum caeruleo flore describit Tragus, cuius descriptio integra post tradetur sub Iride tenuifolia Michelsfeld.

Gesner. Gladiolus vernus. Gladioli segetalis [linguae ceruinæ Apulei Dodon.] plerisque dicti, flores [purpurei:] vulgò appellatur *Monachius*: Arab. *Kassiflora*. Ital. *Gladiolo*. Et quamuis Diosc. tradiderit quòd superior radix magnitudine in-

feriorem superet, plerumque tamen contrarium videtur. Plin. hac in historia à Diosc. differit: siquidem in palustribus & aquis inueniri existimat. Ex quo facile crediderit Matth. Plinium illum vocare Gladiolum quem passim Officinae Acorum nominant. Lobel. & Pena Adu. p. 47. *Scor.* Gladiolus, Germ. *Schwertel*. Gall. *glais*. *Segetalis* Romanis. Hæc ille qui ait Narbonensē vnam habere florum ordinem, italicum duos. Item Obs. & Ic. Pl. p. 98. Gladiolus Narbonensis. Adu. p. 47. & pag. 99. Gladiolus italicus binis florum ordinibus.

Idem Adu. par. 2. Gladiolus minimus, minor quàm vulgaris Narbonensis Gladiolus: floribus concoloribus, minoribus vno versu digestis in pedali gracili caule: foliis item duplò minoribus. Radix Sisyrinchii aut Gladioli parui. Floret in hortis Londinensibus D. Guill. Gou. & D. de Franquenille Maio mense. Floris omnino albi Gladioli radices & semen anno 1601. à D. I. Robino Botanico regio Lutetià accepimus. Sata Londini in horto D. de Franquenille viguere.

C. Bauh. Phyt. Gladiolus. 1. utrinque floridus Matth. Lob. italicus 2. Gladiolus floribus ab vna parte caulis digestis silu. Cordi. Narbon. Lobell. Item hist. Matth. Gladiolus.

Nascitur Cordo editis, frutetosis & herbosis locis, magis tamen planis nec adeò altis: ac solum amat lutosum, prouenit copiosiss. in silu. lis frutetosis circa pedem Lanterbergi, quem hodie montem Diui Petri vocant, vno atque altero ab Hala Saxonica miliaribus. Frequens in Hetruria & in comitatu Gontienfi, in pratis & in arvis inter fruges, vnde Segetalis plerisque dicitur, Matthiolo. Passim Montipellii in segetibus prouenit. Florentem vidi mense Aprili, Hanc plantam prius videram in horto Di. Gesneri Tiguri, postea Prauii in horto publico, & Di. Triuesani, & Di. de Musali al. *ponte Molin*, Venetiis, ac spontè inter Ferrariam & Bonoriam: Lugduni habebam in horto: Geneuz frequens in hortis florens Maio: in Iulii principio reperi copiosè in prato vbi Gratiola & Oenanthe quædam inter Burdigni & Thuri florebat & semen habebat. Montbelgar di habeo in horto Ill. E. C. transplantatam ex hortulo meo, & ex horto Dj. à Morlot senioris: D. Agerio teste, qui plantam siccam dedit, prouenit in pratis pallidiorè flore, plantæ albo vidi Stutgard. in horto Ill. C. Wirtemberg.

Nunc Ensis appellati radix dulcis decocta & trita farinæ admixta panem dulcem atque innoxium reddit. Per multas iuxta eam scolopendras reperiunt, teste Theophr. gaudent enim eà herbà, frequentesque congregantur in ea. Potest ex autoritate Dioscor. superna radix cum vino & chure imposita, spicula & aculeos extrahere. Cum farina verò Loliacea & aqua mulla, panos discurit. Vnde eiusmodi euplastris additur. Ducit & menses apposita. Tradunt etiam superiorem radicem cum vino potam, Venerem stimulare: inferiorem verò steriles facere. Quin & supernam radicem cum aqua bibendam commodè exhiberi pueris, quibus ex intestinorum hernia, intestina in scrotum delabuntur.

Similes vires ei & Plin. lib. 25. cap. 21. attribuit dicens: Xiphii radicis superior pars cum chure trita, æquo pondere, admixto vino, ossa fracta è capite extrahit, aut si quid in corpore suppurat, vel si calcata sint ossa. Et rursus de eadem lib. 26. c. 8. Xiphii radix superior vrinam ciet. Infantibus enterocelcis datur ex aqua, & illinitur v-

ficet vitis. Et rursus c. 10. Appetentiam Veneris facit radix è Xiphio superior, data potui in vino.

Galeno Gladioli radix, & maximè altera suppetna, attrahendi, discutiendi, & nimirum siccandi vim habet. Et 8. de facult. simpl. med. Xiphii radix maximè altera quæ superior est, attrahit, digerit, desiccaturque.

IRIS BVLBOSA LATIFOLIA FLORE
cæruleo & candido.

Descriptio



Ena vè plurimum habet folia, longiuscula & latiuscula. Hemerocallidis Dodonæ, siue Liliasthodeli foliis ferè similia, breuiora tamen, alternatim inuicem amplectentia, mollia, in terram prona, superne ex viridi pallescentia, inferne verdè incana: è quorum medio stis exilit, è membrana-co inuolutro,

unicus, odoratus, cæruleus [interdum lactei cædoris] nouem foliolis constans, Iridis figurâ, quo marcescente, utrinque alii singulares succedunt. Nullus est illi calis, sed flos longo duntaxat pediculo insidet, vt in Croco: radix bulbosa, candida, Auellana instar dulcis, multiplici cortice nigricante inuoluta, cui (præsertim dum flores) aliquid, præter fibras, crassæ, longæ radicula subnascuntur, vt in Hyacinthi radicibus interdum fieri solet.

Lat. & Tempus

Huic Clus. Hisp. Iridis latifolia purpureæ siue corulæ cognomen dedit. Hanc Hispani, vel Lirio simpliciter, vel Lirio expandannal, Cordubenses Lirios azules, appellant, hoc est, Lirium, ensiforme, & Lirium cæruleum. In Histor. verò post. vbi eadem repetit, Iridem bulbosam, latifoliam, siue primam vocat. In Plant. Icon. pag. 96. Poëtarum Hyacinthus latifolius, Iris bulbosa, Latifolia Hispanica Clusii. L. 50. T. 133.

Inuenitur in Lusitaniæ, Bæticæque collium radicibus, non procul ab Anâ flumine sitis, & copiosè circa Antequeram & Cordubam. In Lusitania porro Ianuario, in Bætica autem Februario florentem obseruabat Clusius, & eruebat, apud Belgas delata [Cordubâ enim ad amicos Belgas aliquos bulbos mittebat] nondum flores dederat, quum octenio post inde discessit, ad Cæsarem Maximilianum 1. profecturus, ideoque nulum semen obseruare potuit: in illis tamen, quas in Hispania eruebat, stirpibus, intimam partem pediculi, qui primum florem sustinuerat, & inter folia reconditam, in rudimentum longi triangularis capituli desinere conspiciebat, multa candida granula continentis: quo argumento adducitur, semen Aprili aut Maio maturum istis esse posse.

Tom. II.

IRIS BVLBOSA TOTA VIOLACEA
vel cærulea.



Hic nucleatus bulbis, non minùs altum nobis caulem protulit, quâ Hispanicus Poëtarum Hyacinthus, pluribus utcumque foliis stipatâ, paullo latioribus, insigniter tamen acuminatis, carinatis, & interna parte membranâ candidâ succinctis, foris striatis: flores binos protulit, alterum alteri succedentem,

Descriptio

inferiore paullo ortu, ex vagina laxiore quàm Hispanicus iam dictus, nouem foliis similiter constantibus, sed extimis repandis multo per omnem dimensionem maioribus, extrema parte fimbriatâ, modicèque fissâ, cæruleo-violaceâ, mediâque sui parte, pro villosâ fimbriâ maculam luteam oblongam minorem, quæque non per folii Costam, vt in Hispanico, decurrit, habente, à cuius lateribus Zonula alba virgatæ excurrunt, vbi verò arctari folium incipit, (quanquam interni, altero tantum latius est Hispanicum) per Costam totam punctulis cæruleis albidisque guttatum est, extrinsecus autem ferè virescens: hisce tribus toridem superposita sunt purpureocærulea, angustiora quàm in Hispanico, nec vt in illo appressa, sed intervallo satis magno recedentia, bido nihilominus extremo, quibus subsunt ligulæ, quâ repanda folia spectant, albo purpureoque virgatæ, altera parte violaceæ: tria tandem surriguntur violacea, angustiore ceruice quàm in Hispanico, sed latiore extremitate.

Hanc sic describit nostro iudicio Clus. n. post. Crassiore & latiore folio, ac veluti Cepaceo, viridiore, parte interiore carinato, siue striato, multisque quasi bulbis argenteis respersis: crasso firmoque caule, quem quaternâ aut quina folia amplectuntur: binos ex vaginulis, vt plurimum, promit flores inuicem succedentes, interdum vnicum duntaxat, nouem foliis constantem, violacei prorsus & elegantissimi coloris, interdum dilutioris, inodorum tamen, quorum tria maiora sunt, ad terram inclinata & prona, vt in vulgari Iride, & labrorum instar propendentia, tria alia angusta & extrema parte bifida, alarâque iis incumbunt, usque ad luteam maculam [quæ maioribus pro fimbria est] pertingentia, tria alia surrecta, supremâque parte latiuscula, infima verò valde angusta: floribus succedunt trigona laxâque capita: quibus semen rugosum, fuluescens, Erui magnitudine, quod maturum, in capitibus crepitat, si moueantur: radix magna plurimis membranis tenacibus, nigricantibus circumuoluta, intus alba, & sessili parte fibris prædita, quæ singulis annis nucleos circa latera deponit. Hu-

N. 2

ius folia nouo Vere deprimunt germinant.

Est hæc Clus. Hisp. Iris bulbosa angustifolia purpur. Et hist. post. Iris bulbosa violacea siue 2.

Lobel. Ic. Pl. p. 94. Hyacinthus flore Iridis Theophrasti & Poëtarum, in Anglia proueniens Lobel. 48. Aduers. 47. Teut. 130. Adu. par. 2. Iris bulbosa Pyrenæa, quæ prouenit in Souton monte, Anglo-Britanica vocata minor, fortè eadem.

Quia verò Lobel. hanc Iridem primus Belgis communicauerat missis ex Anglia aliquot ad amicos bulbis, spontè istic nasci Clusius existimabat & in Angliam profectus anno 1571. frustra in agris & collibus requirebat, donec Bristolium quàm venisset, ubi Lobelium conueniebat, ab eo intelligeret, istic primùm illi innotuisse, ex hortis, in quibus colebatur, erutam, vnde Londinum amicis misisset. Verisimile, Hispanicis nauibus quæ plerumque Bristolium comeabant, primùm illuc ex Hispaniâ aut Lusitaniâ delatam. Multos post annos eruditiss. vir Io. Venerius, Clusium Exor. app. 2. monebat, hanc plantam maximâ abundantia spontè nasci in Pyrenæi montibus, atque anno à Christi natiuitate 1601. se inter multas myriades earum quæ cæruleum siue violaceum florem gerunt, vnicam plantam reperisse, quæ florem prorsus niuem haberet: anno autem insequente, quàm denud montes illos conscendisset, venularum plantarum quæ in illis nascuntur conquirendarum causa, paucas similes reperisse scribebat, quarum vnam Io. Hogelandio, alteram ipsi Clusio mittebat. Ea præter expectationem [nam valde adflicta] anno 1603. binos flores tulit prorsus niui coloris, præter parvam maculam flavam, quæ ut in iis quæ violaceum colorem habent, terna repanda folia inficiebat illosque ut violaceos odoris expertes.

Montbelgardi in horro Ill. E. C. floruit Iunio.

IRIS BVLBOSA VERSICOLOR

πικνιδάκης.

Descriptio



HABVI (inquit Clusius) anno 1592. plurimas Iridis bulbosæ versicoloris plantas, quæ propter magnam humiditatem, à frequentibus imbribus, feraces fuerunt proferendis amplioribus floribus, binis scilicet, vel ternis: binas, quæ quaternis floribus erant onustæ.

Summo, caulis

fastigio innati bini ex iisdem vaginis emergentes, quemadmodum in Secundo genere solent, alter alteri succedentes, in nonnullis etiam tertius: Alia, præsertim versicolores, latifloræ saturatiore, præter geminos illos flores in summo caule natos, ex singulari vaginâ infra illos sita, & altera sequente, singulares prodixerunt ramulos, teretes, geniculatos, sustinentes binas vaginas, è quibus emerferunt singulares flores, primariis non

minus elegantes, & perinde odorari. Habere etiam anno 97. multas Iridis bulbosæ plantas, quæ quaternos flores tulerunt.

IRIS BVLBOSA, CÆRVLEO & albo Versicolor.



Radix huic bulbosa, adnatis bulbis subinde se propagans, colore albus: caulem tollit ad cubitum vnum & dimidium, rectum, geniculatum, teretem; cui folia adnascuntur, carinata, pellucida, argentea membranula intrinsecus obducta, extrinsecus colore cæreo

Descriptio

striato, quorum latera cis fastigium, quod perquam acuminatum vix dimidii culmi latitudine est nonnunquam, coalescunt: flos ex vagina glauca emicans, pediculo canaliculato insidet amoenus, nouem foliis Iridum more constans, quorum tria surriguntur, non tamen capitibus coeuntia, sed modicè diffusa, colore, dilutè cærulea: his totidem alternatim intericiuntur repanda, quorum costa per longitudinem discurrens ex luteo virefcit (basis verò tum horum tum præcedentium lutea est,) extremitate partem, quæ latior & ferè rotundata, magisque teretem uersus reflexa, albam possident; loeoque supercilii æmula fimbria, crocea decurrit Zona ad ipsius usque folii cum pediculo commissuram, à cuius lateribus interna parte oblique linee purpurascens excurrunt: atque hisce quidem tribus totidem incumbunt folia, ex albo cærulea, exactè zonam cum virgatis lateribus obtegentia, eousque donec repanda folia dilatari incipiant, ibi verò zonæ luteæ finem denudantia, bifida extremitate, introsum reflectuntur, quibus subsunt singulis singula occultant ligula, quæ repanda folia spectant lutea: quæ verò postrema hæc, albida.

Hanc ni fallimur, sic tradit Clusius: Ei quinque aut sex sunt folia angusta & tenuia, cubitalis longitudinis, internâ parte striata & candicantia, externa autem rugosa; viridis cum cineraceo comixti coloris, caulem amplexantia cubitale, interdum etiam maiorem, nodosum, vnicum plerumque florem, raro binos, è membranaceis vaginulis proferentem, Iridis angustifoliæ floribus forma similem, &c.

Tertiam hanc Iridem Clus. in Hispan. bulbosam angustifoliam flore vario Hisp. *Lirio Ilyrie*. In post. verò Historia, Iridem bulbosam tertiam siue versicolorem appellat. Plant. icon. p. 95. Hispanicis Poëtarum Hyacinthus. Iris bulbosa angustifolia flore vario Clusii, Lob. 48. Teut. 130.

Copiosam habeo in horro Ill. E. C. Montbelgardi.

gardi, habetur etiam Stungardæ: florēt Iunio: eādem artulic Genet Romæ ex hortō Ill. legati Hispani, à Coruino Belga eiusdem Pharmacopœo experientiss. ficari alia plura. Sæpius nobis provenit ex semine sato primo anno vntem profertis florem.

IRIS BVLBOSA LVTEA.

Versicolori per omnia ferè similis (inquit Clus. in Hist. Iris bulbosa angustifolia luteo flore, cui à floris colore, flauæ, sine luteæ cogitomen indidi, quàmque Lusitani *Reyha-buer*, vocabatur. In post. verò Hist. Iris bulbosa 4. siue lutea: breuiore tamen est caule, gracilioribûque & ex viridi pallescentibus foliis: flos vnicus, interdum bini, contractiores, latiores tamen, ex vaginulis summo cauli



inherentibus prodeunt, lutei coloris, inodori, mediæ inter secundum & tertium genus magnitudinis, quemadmodum & *siliqua*, seu caput trigonum, in quo *semen* superiori simile continetur: radix tertii generis radici similis, quæ nucleis, non secus ac illa, propagatur. Sed hæc in flore quandam etiam differentiam habet, licet exiguam: nam inuenitur latiore aliquantulam, saturatioreque & magis rutilante aurescente colore, radice item breuiore, & crassiore, membranacea præterea illa vagina, vnde primum folia emergunt, sanguineo colore, à summis vaginæ oris in inferiorem illius partem radiatim desinente, magis infecta est, quàm illius, quæ diluore est flauo colore: nam illa interdum sanguineo hoc colore caret. Vtriusque autem, quemadmodum & Tertie, folia ante hiemem germinare solent.

Lobel. Icon. Pl. Hyacinthus Poëtarum luteus, Lob. 49. T. 112. Cuius in par. 2. Adu. aliquot tradit species.

Nascitur (inquit Clusius) pingui solo, & petrosi collibus ad Tagum sitis, supra Olymponeum, ubi eam eruebam Decembri Anno 1574. cū aliquot aliis rarissimis stirpibus, & inde ad amicos in Belgium mittebam. Floret tamen paulo maturius Tertio genere, eodem ferè quo secundum tempore: breui tamen se mutuo consequuntur, & interdum simul florere conspiciuntur.

IRIS BVLBOSA CÆRVLEA LVSTANICA.

Vinta (inquit Clusius) Iris bulbosa, mihi primum conspecta Lugduni Batavorum. Nihil verò ea differt caule, foliis, & forma floris,

ab Iride bulbosa, cuius flores versicolores, foliis floris color diuersus est. Nam nōuem, ut ille, foliis constat, quorum terna inflexa & terram spectantia, cærulea. n. habent colorem, venis saturatioribus à medio folio in latera excurrentibus distinctum, & ab illo ad vnguem vsque, maculâ flauam satis latam, medium folium per longitudinem secantem: terna illis incumbentiâ & gibbosa eiusdem etiam coloris, paullo tamen diluorioris: tria surrecta folia magis saturata, odor panis florum Tiliæ: binos autem, ternosque in eodem caule ferè flores, qui reliquarum Iridum bulbosarum floribus magis sunt ferocini, usque marcidis demum aperiuntur sub initium Iulii. Floribus succedunt triangula oblonga, ut in versicolore Iride bulbosa. E Lusitania porro hoc Iridis bulbosæ genus, paucos ante annos, primum in Belgicum deferretur. Sequente autem anno, è tribus bulbis ab amico acceptis, vnus florem longè elegantiorē iam dedit pro protulit, amplioribus labris nempe conitatem, tribusque foliis surrectis latioribus, gibbis etiam amplioribus, totūque adeo florem multa saturatione purpurâ nitentem, & magis expansum, idem tamen qui in altero odoratis præterea circum nodos, quibus folia inhærebant, ex purpura nigricabat. Hæc quæ mihi sponte nascens non ut obseruata, nullum nomen vulgare intellexi: sed qui hortorum cultura delectantur Batavi, Lusitanicæ cognomen dederant. Omnino porro istarum floribus, illius præsertim quæ vario est flore (quia ut opinatur Clusius, resicium quædam succum in lateribus exsudant) fornicem mirum in modum sunt infectæ. Præterea omnium istarum, tam illarum quarum mentionem fecimus, quàm subsequentiū, flores marcescere incipientes, hanc peculiarem notam habent, quod miluorum vngium instar contrahantur: quod etiam aliorum Iridis generum floribus euenit.

IRIDIS VERSICOLORIS CLASSIS

1. Clusio.

Vnt, authore Clasio, alia Iridis bulbosa species non ex quidem aliunde inuectæ, sed semine apud Belgas natæ, quarum historia prætermittenda non videtur, eamque ob causam, superioribus subnectendam esse existimaui.

Prima igitur versicoloris quoddam genus est, à superioribus diuersum non foliis, catiæ, aut radice, his enim cum Tertio aut Quarto genere conuenit, sed floris colore: quia tria eius folia ad terram inclinata, siue labra, flaua sunt, & Quarti generis foliis propendentibus liliorum instar ferè simili: magna tamen auræ macula in prominente & reflexo labro insignita, ad quam infimo folii vngue intrinsecus excurrunt aliquot venæ quodammodo purpurascētes: tria autem gibba & illis incumbentiâ, dorso & alis pallent, lateribus candicant: tria verò sursum erecta, ex albo subcærulea sunt, hoc est, albicantis sunt coloris, quem subcæruleæ saturatiores vel diluiores venæ distinguunt.

Alterius terna inflexa folia pallent, & labrum habent flaua maculâ insignitum, à qua ad vngue vsque angustiora sunt, ut in cæteris generibus, & interne quibusdam venutis purpurascētibz distincta sunt: tria gibba folia regulam tegentia, ex æquo sunt coloris, vel albicant, summo tamen

gibbo pallecente: terna surrecta exalbida sunt, nervus tamen per longitudinem excurrentis flavescent. Vtriusque flores odorati, Tertii generis supra descripti florum instar: radix etiam non minus quam in illo fecunda producendis nucleis. Illas habui munere Joh. Boissot anno 1586. quadriennio vero post, tres alias communicabat, quæ insequente anno hos flores protulerunt.

Prior quæ erit illius Tertium genus ab ipso acceptum, latiore, brevioraque fuit flore, cuius terna inflexa folia, lato & propendente sunt labro, mediâ aureâ maculâ (quam albus orbis ambit) insignito, per oras crispo, cærulei coloris, à maculâ autem usque ad vnguem folii, extenditur nervus extrinsecus virescens, intrinsecus pallidus, multis purpureis venis in latera excurrentibus, tria gibba alataque folia purpurascens sunt coloris, gibbus albicans, alæ cæruleæ, tria sursum erecta folia, ex cæruleo purpurascunt.

Alterâ, siue eius Quarta, florem habuit, cuius terna folia terram spectantia, flavi sunt coloris, aureâ maculâ labrum occupante, à quo ad infimos vngues: interiore parte sparse sunt quædam venæ dilutius purpurascens: folia iis incumbentia exalbida sunt, præter medium nervum ad extremum folium excurrentem & gibbum, qui pallidi sunt coloris, surrecta terna folia, infimâ parte ex cæruleo purpurascens venis sunt distincta, supernâ candicant.

Tertia siue Boissoti Quinta flos, terna incurva siue inflexa folia, prius lactei candoris fuerunt, præter maculam illam medio labro impressam, quæ aurei coloris erat: gibba præterea folia illis incumbentia, alba fuerunt, ut & terna erecta, exceptâ illâ infimâ parte circa vngues, quæ tenuè quidpiam subcæruleum habere visa est. Odorati etiam hi flores erant. Ex cuius generis semine natæ sunt hæ varietates, nihil ad me perscriptum, nec forsitan quispiam tam exactè observavit: odor tamen qualis in Versicolore illâ in Tertio genere supra descriptâ, me in suspicionem adducit, ex illo originem sumpsisse.

IRIDIS BVLBOSÆ VERSICOLORIS classis tertia Clusio.

Quas [inquit Clusius] Irides bulbosas primæ Flavæ-Variæ à Boissoto primùm mihi missæ, semine ego nactus sum anno 1590. duobusque illis sequentibus, subiciam.

Vna, quam F-V. hoc est Flavam-Variam maiorem, & omnium elegantissimam meritò appellare possum, caulem non minus altum habet, quam Tertium illud genus versicolore flore à me tertio loco descriptum, videlicet cubitalem aut ampliorem, folia latiora & breviora, media ferè inter illius & Secundi generis folia, florem maiusculum, cuius terna folia inflexa & terram spectantia lutei sunt coloris, & aureâ maculâ in medio labro insigniuntur, oris quodammodò purpurascens angustiore foliorum parte quæ gibbo integitur, intrinsecus multis subpurpureis venis in latera excurrentibus notata: gibba & incumbentia folia diluto purpureo colore sunt prædita: tria erecta valde saturâ purpura nitent, & quasi violacea sunt, præsertim medius per longitudinem extensus nervus.

Alterâ etiam F-V. & latiflora, sed paulò hu-

miliior terna ad terram inflexa folia flavi coloris habet, aureâ maculâ insignita, à qua, ad infimum folii vnguem, multis purpurascens venis interiore parte sunt distincta: gibba folia quodammodò purpurascunt, nervum tamen subflavum habent: tria folia erecta, purpurei sunt coloris.

Tertia F-V. floris forma eadem, & terna illa folia inflexa flavi coloris, aureâ maculâ insigniuntur, quâ verò parte bifidis & gibbosis illis foliis integuntur, radiis obsolete purpurascens distincta sunt: surrecta terna folia ex cæruleo purpurascunt, medius autem per longitudinem excurrentis nervus flavescentis est coloris, & tria aliis incumbentia, obsolete, cui flavi quidpiam permixtum est.

F-V. Quarta, etiam latiflora, terna inflexa folia pallida habet, aureâ maculâ insignita, quâ autem parte camerato folio integuntur, purpurascens venis sunt distincta: gibba folia, etiam purpurascunt: tria verò erectiora folia, cæruleum habent colorem.

Quinta F-V. quæ angustiflora est, tria ad terram spectantia folia, flava sunt, aureâ etiam maculâ medio labro insignita, & incumbentia illis folia candicant, nervus tamen eminentior quodammodò exsertitur: sursum assurgentia folia exalbida sunt, imâ parte subcæruleis quibusdam venis leviter distincta.

Sexta F-V. etiam angustiflora, & humilior, non valde absimilem matri, hoc est, Primæ à Boissoto missæ, habuit florem: sed quibusdam notis secundæ ab ipso acceptæ respondentem, ut media quædam species inter utramque censeretur possit.

Latiflora est, & elatior Septima F-V. cuius inflexa folia habent latiora labra, flavi coloris, aureâ maculâ insignita, quâ verò parte gibbis foliis integuntur, ad vnguem usque, interius ex cæruleo purpurascunt: gibba & alata folia etiam purpurascens sunt coloris, gibbo tamen dilutiore: surrecta folia latiuscula sunt, & illis magis purpurascunt, cæruleique quidpiam admixtum habere videntur.

Humilior, latiflora tamen, est Octava F-V. cui terna terram spectantia folia flava sunt, aureâ maculâ maiusculâ notata, internâ parte quæ cameratis bifidisque foliis tegitur, purpurascens radiis in latera excurrentibus distincta: gibba cristataque folia, purpurei cæruleo commixti sunt coloris, ipso gibbo ex purpura flavescente; erectiora folia, cærulei purpuræ permixti sunt coloris.

Angustiflora, sed humilior etiam, est Nona F-V. cuius trium foliorum, terram spectantium labra longiora sunt & pallida, orisque aliquantulum purpurascens maculâ aureâ longiore insignita, reliquâ parte bifidis foliis tectâ, internè purpurascens, præter medium nervum qui aurei est coloris, foris ex viridi pallecentis: gibba cum suis cristatis foliis, purpurea, gibbus paulò dilutior: surrecta terna folia, purpurâ saturatiore nitent.

Decima eiusdem ferè altitudinis est cum superiore, cuiusque terna folia ad terram prona, pallecente sunt labro, brevi flava maculâ in longos radios desinente infecto, angustior folii pars foris virescens, internè viridibus venis prædita: alata & bifida folia, exalbida sunt, ad prædictum colorem tendentia: gibbus pallecentis: terna folia quæ sursum atolluntur, alba sunt, medio nervo circa vnguem pallecente.

Vide.

Videtur, eadem quidem forma, sed dissimilis prorsus color: nam terna inflexa folia alba sunt, flava tamen macula insignita: gibba his incumbens, purpurea: etia sursum erecta purpurea, seu violacei sunt coloris: breviter non multum absimilis est Angustifoliae versicolori saturae, in prima classe.

Media quodammodo inter Latifloram & Angustifloram est Duodecima, eaque clarior, labris autem foliorum terram spectantium ex albo purpureascentibus, atria macula notatis, quae medium etiam folium per longitudinem secans, ad infimum usque vnguera angustior proteritur, vix latera interius saturationibus venis purpureis distincta: folia cristata & bifida illis incumbens, diluti purpurei, & quasi ad rubedinem tendentis sunt coloris, gibbo paulo magis saturo: similis prae coloris sunt surrecta folia, eorum tamen vngues aliquantulum saturatiores. Istam porro omnium flores odorati sunt, & Tertii generis floribus versicoloribus odoris gratia respondent.

Et haec quidem summae sunt differentiae Iridum bulbosa radice praeditarum quae mihi semine F. V. primae Boissoti natae: ab eadem tamen etiam natae, sed quarum colores proximè ad istarum colorè accederent: propterea minime huc inferendas putavi.

Illud praeterea in istarum Iridum plantis semine natis observabam, plurimarum vaginam illam initio emergentem, e qua ut in primo descriptis exeunt folia, rubri sine sanguinei coloris radicis esse affectam, non secus ac Quarti generis primae speciei in prima Classe vaginulam.

Sed & Decimum tertium genus semine mihi natum, quod florem demum tulit anno 1594. quadriennio videlicet postquam semen telluri creditum. Cubitali vero assurgit caule, nodoso & geniculato, instar aliarum Iridum huius generis, quem ambiunt longa & angusta folia, carnata ut in superioribus reliquis: tumus caulis sustinet florem reliquis formam similem & novem foliis constantem, sed colore diversum: nam terna maiora labro propendete prorsus caerulea sunt, timentem maculae, aurei coloris à medio labro ad infimum folii vnguem discreti, his incumbens, fornicataque & alata folia saturae purpureae colore sunt, ligulamque tegunt, terna surrecta, oblonga angusta, saturae purpureae (cui rubedo lenis admixta) nitent: odor tenuis, nec ad eas quae versicolore sunt flore suavitatem accedens: capitula trigona, longaque instar capitum versicoloris, quae tamen nullum semen tulerunt: radix bulbosa ut reliquarum Iridum bulbosarum, pluresque nucleos ad latera generans. Floruit primo anno circiter quindecim dies ante illas quae caeruleo & flavo sunt flore: altero cum istis, Iunio videlicet. Huic prorsus similem Hispali accipiebam anno 1596. ab eruditissimo viro D. Simone de Touar Hispalensi Medico, ut ex eius flore, quem infrequentis anni Maio dedit, observare potui: an vero semine ipsi nata esset, aut aliunde missa, nihil adscribebat.

Superioribus annis ut ante dictum est, in Flauae Iridis bulbosae semine natis plantis nullam varietatem observaveram: at anno 1597. cum in haec tum aliis insignem varietatem habui. Nam anno 1599. scortum in diuersis puluinis Flauae, Albae, F. versicoloris semina terrae commisi sub fine Nouembris: nata ex iis plantae nec loco motae, quarto post anno flores protulerunt: ex Flava quidem, aut flavos prorsus, aut flavos quorum

surrecta folia aut patiebant aut exalbida, vel caerulea erant, vel fuligine infecta cum fornicatis foliis: ex F. versicolore aurei, flaves, flauos item quorum surrecta folia alba erant, vel initio labra habentes flava aurea macula insignita, deinde flauus ille color maculam ambiens caeruleum colorem prorsus contraxit, folia fornicata & surrecta saturae purpureae nituerunt: vel etiam alios illis persimiles, quorum tamen flava labra oras auream maculam ambientes habuerunt virescentis ex caeruleo coloris, & alios matri similes: ex Alba vero pallidos, surrecta folia alba aut exalbida habentes, aut ex caeruleo purpurea, aut matri propemodum similes. Quam varietatem produciunt reliquae plantae illis seminibus natae, indicabit dies.

Idem Exor. par. 1. App. 1. ait. Ceterum ex Epistola quam ad me dabit Venerius illo ipso anno quo Iridem illam nino flore mittebat, varia alia Iridum bulbosarum genere ab ipso in Pyrenaeis montibus observata fuisse intelligebam: quae scripto comprehenderat, ut ad me mitteret exactam earum plantarum descriptionem: Verum, dum in variis illorum montium iugis, quae prae sexagena conscendit, perlustrandis erat occupatus, scriptum illud ipsi excidisse & periisse magno cum suo dolore: se enim non probe quoniam inter illa esset differentia meminisse, cetero tamen se scire, viginti sex generum descriptionem fecisse: eam autem Iridem quae flauam aut rubram habet florem, in earum numero non comprehendi, quoniam in illis montibus nullam huius coloris reperit.

Iugis Pyrenaei
dum bulbosae
varietatem
in Pyrenaeis
montibus.

IRIDES BULBOSAE ET ALBAE.

Miro colorum incremento bulbosae Lobelii Adu. par. 1. Irides, sat non secus ac Tulipae praecoces sat, semineque ortae, albae potissimum, variant, quae insigni metamorphosi, colorum varias subeunt differentias: In bulbo alioquin folio, caule, ceterisque plantae partibus discriminis perexiguum. Has differentias alunt cultiora D. Ioh. de Franqueville nostraeque vireta.

De Iridum bulbosarum viribus nihil compertum habet, aut ab aliis traditum accepit Cluius.

SISYRINCHIVM VETERIBVS.

CAP. XVI.

ET hoc quodammodo Theoph. aut l. 7. c. 13. de Hist. Plant. ad bulborum genus redigi desiderat, quod radice orbiculetur. Nam colore quidem penitus discrepat, candet enim, nec squamis constat. Huic peculiare datum est, ut ima [vna, Gaza legit] radix primo augeatur Hieme, cum ineunte Vere, quod in imo excreuerit, contrahatur, supernumque crescat quod manditur. Radix (ut idem inquit de caus.) ut reliquarum generis eiusdem, dulcis est, partes vero superiores ex causa siccitatis insuaves & propemodum insipidae.

Descriptio

Post Theophrast. inter genera bulborum quae Graeci fecere, Plin. l. 19. c. 5. Sisyrinchion nunciat: perhibens, mirum imas Sisyrinchii radices crescere Hieme: Vere autem, cum apparuerit Viola, minui & contrahi, tum deinde bulbos pinguescere.

IRIDI BVLBOSÆ AFFINE

Sisyrinchium maius.

Descriptio



Irides bulbosas proximè, sine contro-uerfia, subsequi debet planta quædam flore Xyridis, minore tamen, & orbiculata, ut Xiphium, cuius duo genera in Hisp. peregrinatione à Clusio obseruata, Maius & Minus.

Maius sic describit: oblongis angustisque foliis, mollioribus quàm Iridis bulbosæ folia,

& ad Allii aut Hyacinthi botryodis folia proximè accedentibus, striatis, viridibus, & humi plerumque fulis: rotundo, dodrantali, striato, firmoque caule: qui ex multis inuolucris tanquam è vaginulis, flores promit quatuor aut quinque, alternatim prodeuntes, hoc est, ut primo marcescente alter succedat, deinde tertius, & sic deinceps, Xyridis potiùs florem referentes, quàm Iridis, ex nouem foliolis compositos: quorum tria ut in iam descriptis Iridibus bulbosis, deorsum inflexa, pro simbrâ, luteam maculam etiam habent: alia tria sursum aliquantulum attolluntur: tria vero reliqua, quæ in aliis ligulam regere solent, surrecta, summa parte diuisa & bifida. Est

Locus

verò totus flos pulcher aspectu, coloris cærulei, præter maculas illas, & odore quidem præditus, sed valde fugaci: floribus succedunt folliculi, vaginis quibuldam cutaceis inclusi, ad eò tenui membranâ constantes, ut semen rotundum, paruum, subrufum, quod in illis continetur conspici possit: radix bulbosa, gemina, planta ipsa florente, & altera alteri inidens Xiphii modo, superior, plena, candida dulcis, edulis, & pueris expetita, inferior flaccida totam nimirum substantiam ad se trahente superiore, ut in Croco Xiphio,] & tandem euanescent cum inhzrentibus fibris: multiplici verò cortice reticulato, crasso, nigro integitur, Xiphii radicis instar, & adnatis sese propagat: nam quinas, interdum etiam senas, aut plures plantas quarum singuli bulbi suo retiformi tegmine inuoluti erant, alio villosio capacioreque tegumêto simul compressas erueremini, in collium supra urbem Olyssiponem accliuatibus, apud suburbanum Magn. & Gen. viri Ferdinandi Corinho, equitis Lusitani, multis peregrinationibus in exteras regiones factis, clari: atque etiam Gadibus, non procul à ponte, qui eam insulam continenti nunc coniungit: vnde eius bulbos in Belgium ad amicos mittebam.

Clus. Hisp. & hist. post. Sisyrinchion maius, Lusitani Nozelhas (quasi Nuculas siue paruas nucas) appellant, quod pueri istic eius bulbo perinde atque Auellanis vescantur, & in delitiis habeant. Plant. ic. p. 97. Sisyrinchium Cordi & Clusii

Lob. 90. T. 13. 3. Sisyrinchium Cordi nobis, & bulbos filu. Fuchsi.

Floret utrumque genus Martio, natali solo: sed apud Belgas Maio duntaxat: interdum etiam Iunii initio, idque valde tardè, ut pote quod æternis vix plurimum annis, duntaxat prodire soleat, imò paulatim plerumque contabescens, prorsus tandem sæpenumero pereat.

IRIDI BVLBOSÆ AFFINE

Sisyrinchium minus.

Descriptio



SIMILE Sest (inquit Clusius) præcedenti, minus tamè, gracilioribusque foliis: flores è vaginulis prodeuntes, colore superioris floribus similes, sed magis odorati: tenuiores etiam folliculi minore & exiliore semine pleni: radix item minor, non minùs tamen, quam superioris, reticularo cortice recta, & gemina.

Sisyrinchium minus, seu genus alterum, quod Hisp. *Lirio*, nonnullis *Masucas* dicitur, ad eum bulbum accedere videtur quem Theophr. l. 7. c. 13. hist. 90. vel 91. cognominauit.

Crescit Valentini Hispaniæ regno, sed Murcia frequenissimum obseruabat atque eruebat Clusius, præsertim tribus leucis supra eius regni Metropolim, Murcia vulgò appellatam, quæ Veteribus *Murgis*, dicebatur, itinere Granatensi.

Ad ventris tormina (inquit Clusius) vtile esse referebant incolæ sed deuorata radice, illic corpi salutatione esse exercendum.

FLOS PERSICVS SISYRINCHIO

congener.

Descriptio

Floris Persici (inquit Clusius Hist. post.) supremam caulis partem cum flore suis coloribus duntaxat expressam, anno 1594. Pragæ accipiebam ab Esaiâ de Gillon, meo sororis filio: pulcherrimus, summo cauli satis gracili & virescenti innitens, & ex membranaceo inuolucro instar folliculorum, qui Iridum flores ambiunt, emergens, tribus tantum foliis (si picturæ fides est adhibenda) constans, mucronatis, binas uncias longis, minimum digitum latis, dorso elatiore, cærulei coloris ad eò elegantis. ut cum centianella cæruleis floribus contendere possit: internâ parte ramosa quædam stamina in multas tenues fibras secta continere videtur rufi coloris, apicibus verò albis: infra illum addita erat alterius floris gemma suo membranaceo folliculo etiam inuoluta. Expressa autem fuerat hæc icon Constantinopoli à pictore industrio, de alterâ, quam

quam pictor quidam Persicus à Persia attulerat, ubi nasci, & *balé* vocari asserbat. Constantino poli verò esse ignotam hanc plantam. *Balé* porro, Turcis florem significare, antè dicere meminimus.

IRIS VULGARIS VIOLACEA SIVE
purpurea hortensis & silvestris.

Delc.

Iris hortis nostris vulgarissima, radice per obliquum agitur crassa, rugosa, gustu acri consumptoque superfluo humore tandem odorata: caules cubitales & sesquicubitales, ramosi, teretes: folia vnciam lata aut latiora, rigida, striata, in cultratum mucronem aut gladii exeuntia: flores amoeni, violacei, tribus foliis repandis, per oras infimas albo violaceoque variegatis, Costa interius ad medium usque folium crocatis apicibus villosa: totidem surrectis, obusis mucronibus, & fere rotundis, carinata inclinatione coeuntibus: intra quæ tria longè prædictis sex minora, dilutiore viola tincta, in summo fissa, quibus posticâ parte totidem concolores fibræ, albicantibus apicibus apprimuntur.

in infra
fuerit
Cada.

Quandoquidem Cordus in Hist. sua nobis diligentissime videtur Iridem vulgarem descrip-

sisse, lubet eius descriptionem ubiungere, qui ait: Iris quæ apud nos in hortis, vineis ac murorum coronis feritur, ab vno capite plura & erecta erigit cubito longiora fissa, duum digitorum latitudine, recti uenia, inferius in radicem capitibus coniuncta, ceu ex omnibus vnum fiat, & sibi in uicem inserta, singulorum a-



perito & inciso ventre ceu carina alterius dorsum excipiente, superius verò alæ modo in latitudinem explicata, & in mucronem gladii figura desinentia: è quorum medio caulis assurgit sesquicubitalis, rectus, teres, & glaber, veluti cinereo polline conspersus, facile abstergentibus cedente, quinque aut sex geniculis interseptus, ex quibus singula exeunt sine pediculo caulem amplectentia folia, inferioribus eò minora, quò summitati propinquiora: flores in summitate post medium Veris per intervalla erumpunt, primum conuolutis in turbinem membranæ, paulatim se in nouem folia explicantibus: ex his tria inferiora digitali sunt longitudine, circa exortum angusta, reliqua sui parte vncia multò latiora, deorsum inflexæ linguæ figura, foris liuidi coloris in cinereo, & iuxta principium viridia, intus verò purpurea, latis & lacteis venis se violaceo splendori miscantibus, maximè ubi versus exortum gracilescunt: adhæret iis in interiori sinu inferius lutei coloris & in longitudinem exprorecta lanugo, oblongis pilis, hirsutæ campæ

aliquam similitudinem referens: in summa totum folium Iridis omnes colores representat, unde nomen inuenit, lanuginem cuiusque folii aliud paruum obteggit folium, in summitate in duas partes dissectum, ab utroque latere herbacei coloris, in medio liuido extante dorso: reliqua tria folia, & ipsa linguæ aut cochlearis formam habent, prius tamen latiora, & paulò breuiora exiunt: & quemadmodum illa deorsum incuruata ascendunt, sic hæc sursum versus reflexa iunguntur: color his est utrinque in cinereo liuidus, quæ verò prioribus alterno positu adnectuntur purpuræ maculæ luteo colori insperguntur: durat fere octiduum flos, deinde contrahitur, exiccatur & decidit, inferius oblongum, ac sex angularem folliculum relinquens, intus in tria loculamenta interseptum, in quibus rotunda sunt & oblonga semina. Radicibus nititur multis, inuicem in latitudinem sibi adnatis, duum digitorum crassitudine, geniculatis, in transversum striatis, per superficiem terræ sparsis, foliis modicè in flauo rubentibus, intus autem candidis, ex inferiori parte longas tenuisque fibras in terram agentibus, ex his aliquot, quæ adhuc uascuntur lutei coloris in fine aut capite existunt: grauius tota herba, ut sambucus fere, dum teritur, spirat, præsertim radix, quæ etiam gustata, cocognidii modo fauces exurit.

Silvestris Iris, inquit idem Cordus, satiuæ similis est, paucisque notis à satiuâ distinguitur, foliis minoribus & hyeme prorsus non apparentibus, cùm satiuæ folia hyemis sequitur contumaciter resistent: caulem etiam quam satiuâ breuiorem fert, è quo flores fere viginti diebus ante satiuæ flores erumpunt, colore magis purpureo, quibus defluentibus, pollicari quantitate succedunt folliculi, sex lineis concavis in longitudinem striati, in maturitate tribus commissuris se aperientes, rotundo & cartilagineo semine pleni. Radicem habet digitali crassitudine, dodranæ breuiorem, geniculatam, transversam à posteriore parte, singulis annis putredine tantum fere amittentem, quantum ab anteriori parte æstibus capiti restituitur, nec satiuæ in modum densum capitem constituentem. Sapore & odore atque aliis qualitatibus satiuæ respondet. Nasceitur editis & cliuosis locis inter arbusta: Liliū Scheyber hense bey helsiet / quod omnium primò floret.

Iris sylvestris
flos cordæ

DE IRIDE VETERVM SENTENTIÆ.

Iris [Consecratrix] Theophrast. passim ita delineante, odoratam adeptæ radicem: folium non ut Gladiolus, sed harundinaceum potius. Odorata autem radicis rationem calori in terra concluso imputare debentus. Verum neque limosam, neque pinguem, neque lentam, glutinosamque terram esse oportet. Hac enim de causa Iris melior in Illyride, quam in Macedonia est: in Thracia verò, cæterisque frigidioribus locis, ac minus collisioni idoneis, odore penitus caret. Ager enim præpinguis, & humor multus & hyems vehemens prohibent. Tepidis tamen atque gracilibus minus odorata creatur propter molliorem aëris. Floret & Consecratrix (Iris) æstate, & Lauaria dicta, flos aspectu pulcher, sed caret odore. Odoratorum igitur [quibus unguenta vtuntur] in Europa, ut tractu frigidus, nullum præter Irin inuenieris, quæ tamen optima apud Illyricos exis: non quidem parte mari-

Iris Illyrica
ca cur m
lior.
Macedonia
ca.
Iridora
bi.

Illyrica

uma, sed mediterranea, magisque ad Septentrionem sita. Verum loci à locis differunt, ita ut producere meliorem possint. Non immerito lanè ni reuerentia præstaret Nos in Theophrastum inueheremur, In Europa namque multa odorata proueniunt, Nardus Celtica, Phu, Asarum, & alia quæ hic recensere non statumus. *Finis Theoph.* Gustus nullus ei accommodatur nisi quod ablaqueatam soleant resiccare: radicula enim quas Thracia fert, videlicet quæ odore Nardo similes, & aliæ quædam paruum exilemque odoris gratiam habent. Virides enim aut nihil olent aut non æquè: siccatæ nimirum redolent ut Iridis radix.

Ille quoque non omittenda differentia est [inquit Plinius lib. 21. c. 7.] odoramentorum multa nihil pertinere ad coronamenta: ut Irim atque Saliuncam, quanquam nobilissimi odoris utramque. Sed Iris radice tantum commendatur vnguentis & medicinæ nascens. Laudatissima in Illyrico. Et ibi quoque non in maritimis, sed in syluestribus Drilonis & Naronæ. Proxima in Macedonia longissima hæc & candida, & exilis. Tertium locum habet Aphricana, amplissima inter omnes, gustuque amarissima. Illyrica quoque duorum generum est, Raphanitis à similitudine, quæ & melior. Rhizotomos subrufa. Optima, quæ sternutamenta tractu (falsò legitur pro tractu iuxta veteris manuscriptorum codicis fidem Cornar.) mouet. Caulem habet, cubitalem, erectum. Floret diuersi coloris specie, sicut arqus cælestis, vnde & nomen. Non improbat & Pisidica. Et fossuri tribus ante mensibus mulla aqua circumfusa, hoc veluti placamento terræ bladiuntur, circumscripta mucrone gladii orbe triplici: & cum legerint eam, protinus in cælum attollunt. Natura est feruens, tractataque pustillas ambusti modo facit. Præcipitur ante omnia ut casti legant. Terebines non sicca modo verum & in terra celerrimè sentit. Optimum antea Irim Leucade & Elide ferebatur: iam pridem enim & feritur, nunc è Pamphylia. Sed Cilicium maximè laudatur atque Septentrionale.

Diosc. qui vnus duntaxat Iridis meminit, sic de ea differit: Iris à similitudine arcus cælestis nomen habet. Folia profert similia Gladiolo, maiora tamen & latiora ac pinguiora: Flores in caule æquali inter se distantia suos, incuruos, varios. Aut (hic legitur Attico more à pro Lac.) enim albi, aut pallidi (αἶμα Fuchs. vertit virides quam benè iudicent alii) aut melini aut purpurei, aut cærulei conspiciuntur. Vnde ob varietatem cælesti Iridi assimilari sunt. Radices subsunt geniculatæ, solidæ, odoratæ, quas post sectionem in umbra siccatas, & filo transmissio reponere oportet. Est autem melior Illyrica & Macedonica: & inter has optima est, quæ densam radicem habet, & aliquantulum obrusam & ægrè fragilem, & colore subfuluam: & quæ valde odorata est, & gustu amarior, & odore sincera, & non situm redolens: & quæ dum tunditur sternutationes mouet. At Africana colore alba, ad gustum amara, facultate secunda est. In vetustate verò terebines sentiunt, odoratiores tamen tunc sunt.

Marth. & Amatus scripserunt, se tum Antiquorum tum Recentiorum reperisse neminem, qui in simplicium medicamentorum libris, Iridis Astragalitis meminerit, idèd quid certi hac de re proferendum, se non habere.

Cæterum Gal. lib. 1. de comp. med. sec. locos c. 1. ex Sorano transcribens meminit Iridis, quæ cognomine Astragalitis dicitur.

Alibi quoque [lib. 10. & post eum Marcellus Medicus mentionem facit Iridis Chalcedoniæ & alio loco Iridis Illyricæ. Idem lib. 5. simpl. c. 2.]

Iris Græcum nomen (inquit Cornar.) apud Latinos retinuit, nostri ab odore *Diolswurz* vocant, vulgus Herbariorum Liliū cæleste, à colorum varietate quæ in floribus conspicitur, appellat. Sed quam idem vulgus intea Iris & Ireos distinctionem facit, iuxta vulgatum verbum: Iris purpureum florem gerit, Ireos album, ea vanissima habenda est. At melini flores sunt, qui Cydonii colorem referunt. Illyrica Iris laudatissima est, post eam Macedonica, quam etiam Galeus lib. 7. *ἰρις* in Asclepiadeo quodam acopo habet. Sicut etiam Carthaginensem in quadam ther. lib. 2. de antid. recipit, quanquam eam quæ ex Libya magna sua ætate plurima afferebatur, tantum ab Illyrica deficere asserat quantum mortuum corpus à viuo: etiam si in aliis gentibus non ita multum Illyrica inferior reperiatur. Sicut hodie de Italica & Gallica ac Germanica testari possumus.

Athenæus lib. 5. Deipnosoph. testis est Plinius scribere Iridis flores Lupos nominari, quod Lupi rictui labrisque similes sint. Iris radix autem Mesue simpl. purg. l. 11. c. 8. est herba, quam *αἶμα*, id est Liliælem, vocat author Græcus, cuius flos vel cæruleus, ac versicolor, ut Iris arcus cælestis, vnde illi nomen, vel albus. Alterius radix vel optima est, si magna, dura, densa, crebrè geniculata, ex albo rubescens, odore ceu viola aromatico, sapore acris, & mordente. Veris initio collecta secundam bonitatis rationem flos obtinet, cæruleus præsertim: albus enim ad omnia est imbecilior. Liliū cæleste, inquit Gorop. Iris est. Liliū Francis. Iris spei tessera. Nimis audaces illi fuerunt, qui varia singularum herbarum nomina principis capitum in Pedacio adule. ademerunt. Corrupta esse pleraque fateor, ut in Iride factum, ubi legitur *ἰρις*, vel ut Marcellus legi posse putat, *Talpida*. Quid clarius si legas *ἰρις* si *ἰρις* inueniri si *ἰρις*. Iridem alii Elpida, id est, spem &c. Iris lunonis dicta. Ternarii vis in Iride &c.

Iris siue Ireos siue Iridis in genituo casu proferas [ait Cord. in Diosc.] eadem est, quæ propter ineptè, quidam tanquam diuersas distinguunt, Iris & Ireos. Est autem Iris Illyrica ea radix quæ in pharmacop. Ireos & Germanic. *Diolswurz* appellatur: non quod verè sit violæ radix, sed quod odore violas imitetur. Ea propemodum sola ab Authoribus cunctis aliis eius speciebus præfertur. Sed suas habet quibus ab Illyrica distinguatur notas. Est enim horribilior, odore iniucundior, & multo maiore acrimonia gustanti molestior, faucesque grani Gnidii modo exurit, quæ propter caliditate quidem Illyricam plurimum superat: sed quantum hæc illa est superior, tantum etiam aromatico odore & sapore inferior existit. Vehementius quoque alium quam Illyrica purgat. Est etiam in floribus differentia, siquidem nostra Iris purpureum fert florem, in arcus cælestis, colorem varietatem, vnde totum Iridis genus nomen inuenit. Illyricum candidum verò producit. An Cordus degustarit & viderit Illyricam virentem ancipites hæremus. Nostra enim Iris odoratiores & siccatæ, ac siccatione multarum plantarum acrimonia & maligna.

Theoph.

*Radix:
Illyrica
Macedonica
Africana
Illyrica de
plan.*

*Sternutamenta
mouet.
Pisidica.
Colligendi
superstitio-
sus modus.
feruore*

Irimum.

*Liliū cæ-
leste.
Spei tessera.
In not quæ
nomina
supposita
Diosc. retin-
uit.*

Cord.

lignu.

lignitas retrunditur : illud etiam perpendendum an in Illyrica omnis Iris sit candido flore.

Placet etiam hic subiicere descriptionem Iridis Tragi, ut Lectores considerent, an easdem cum Cordo intelligat : Iris (inquit ille,) quæ Gladiolorum omnium præstantissima censetur, radicem habet serpente ac contortam, quæ supra terram potius quam intra humum conspiciendam se præbet, nam primaria radix nuda iacet, nec humo contegitur, at radice illi adnatæ intra humum latent, à quibus candida & primaria radix nutrimentum recipit. Maio mense inter folia quæ gladii formam imitantur, caulis exit rotundus, horum vasculis seu calycibus oblongis & acutis conspicuus. His oblongis quos diximus calycibus maturitate ruptis, flos exit diuersicolor. Nam tria illius præcipua folia, eà parte quæ versus terram inflectuntur, ex viridi & pallente colore diluta purpura, purpureis simul lineis, seu venis per hos ipsos colore ductis intus verò purpureo colores admixtis candidis, & puniceis lineis, media denique sui regione lutea lanugine superciliorum formam representante, emicant. His contraria tria alia in altum globi instar coacta sese attollunt, aquei coloris, ex purpura simul albicantis & lutei, non aliter atque reflexus splendoris aut fulgentis, aut cuiusdam admodum ex variis coloribus intertextis telæ, Germani cinnidorsum vocant. In medio integri floris, tria alia foliola breuia, angusta, arcus celestis instar, coloribus variis tincta apparent. Ex his quæ de floribus Iridis Germanicæ diximus, colligimus illos nouem foliis, totidemque coloribus constare. Hi ipsi flores odoratissimi cum marcescere ac decidere cœperint, nullum post se vel semen, vel fructum (quod ego sciam) relinquunt: neque etiam passim hæc Iris, nisi plantata fuerit, reperitur. Ego namque omnes ferè Germanicæ regiones crebris, herbarum gratia, professionibus susceptis, perlustravi, nec vspiam locum eam sponte nascentem inueni, nisi in altissimo quodam & graminoso monte non procul à Valentia arce sito, vnde euulsam in hortulos meos illam transtuli. Radix illius non perinde dura ac solida est, arque illius quam Genuensem dicunt, neque etiam adeò odorata, licet feruentis sit saporis, & linguam gustata adurat, non minus quam peregrina, quo fit ut in plantis diuersitas regionum magna constituat diuersitatē. Quemadmodum enim frumenta & vina pro situ & locis natalibus ab inuicem differunt, ita herbæ & radices pro ratione terræ in qua nascuntur, & cæli temperie, vel deteriores, vel meliores fieri consueverunt. Quamquam hæc nostra Iris, eà quæ quotidie vtimur longè sit inferior, multum tamè affinitatis cum eadem habet, si formam & temperamentum consideres. Quapropter vocamus illam Iridem, non quidem Illyricam, sed Germanicam. Et alibi: Cæruleus verò, Gladiolus, radice, foliorum forma, caule denique ad Acorū adulterinum ferè accedit, nisi quod flores huius [qui & ipsi tria folia sursum, tria alia deorsum vergentia, & in orbem pulchrè circumacta, obtinent] ex cæruleo colore purpurant, & nullo pòst se relicto semine decidunt. Dicimus insuper vtramque in caput 12. l. 4. apud Dioscor. collocandas, quo loco *ἰρις*, quam nonnulli *ἰρις ἁγία*, Iridem sylvestrem, Cacos, & Gladiolum vocant, descripta est. Quod si cui videatur *ἰρις* [de quo alio loco egimus] vocandum, cum eo minimè cōtendendum existimamus. Gladiolus cæruleus Tragi, fortè idem cum Iride sylu. Cordi, id tamè

Tom. II.

diligentiùs considerandum : nescimus cur ille non iunxerit Gladiolum suum cæruleum potius cum Iride quam cum Gladiolo flore *ἰρις* sive Pseudo acoro.

Iris nititur radicibus torosis, odoratis, & geniculatis, quas apud nos in Gallia (inquit Ruelius) adhuc exitu Veris terra erutas desiccant in orbis, & funiculo traictas priùs, lixiuo macerant ad exhauriendam succi vim, quo tinearum iniuriis, quibus adhuc herentes sunt oportune, minus pateant : dein siccatas recondunt. Plerique curatas adhuc modum Iris taleas armariis indunt, ut suo perquam iusundo odore vestes cominentur : nec his præparandi Veterum vsus exoleuit. Inuenitur inquit præterea, apud nos frequenter flos emaculati candoris, cuius radix cum Illyrica de odoris principatu contendit. Quod si vires quibus donatur radix libeat consulere, deprehendes quæ à Doctoribus traduntur, ad amissim respondere. Cum ergo tota Dioscor. pictura huic, quam Liliū vocant cæleste, suffragari cognoscat, eam esse Iridem nemo ibit inficiis. Sunt qui pudendo errore aliam assignent herbam recto, aliam casu paterno, ut Iris ab Ileos, tãquam purpureus color à niueo distingui putetur Herbarius. Verùm hæc opinio anilibus nugis adnumeranda, nec digna quæ esibiletur, nequæ à pulchris & rudibus explodatur.

Quam vulgus inter Ileos & Iris distinctione facit, ait Cornar. iuxta vulgatum versum

Iris purpureum florem gerit, & Ileos album : ea vanissima : Macedonicam Gal. l. 7. xij. habet, sicut etiam Carthaginensem in quadam the-riaca lib. 2. de antidot. Iridem Raphanitim Fuchsi,

quæ à similitudine Raphani sic est dicta, Gal. Paulus, Aërius, Astragalitim, quod radix eius cum Astragali radice similitudinem habeat, vocant. *Raphani-
itis
Astragali-
itis
Florentina*

Florentinæ quæ tantum Officinæ vtuntur, Germanica non dissimilis sapore acri & mordaci. Iris in vniuersum satiuæ & silvestris. Hæc duorum est generum : altera satiuæ & vulgari similis, foliis tamen, flore, caule, radiceque paulò minoribus. *Iris satiuæ
vulgari-
itis
Iris silu-
guis. simili-
itis*

Iridem Illyricam noui præferri [inquit Matthiol.] non quod genere vel specie à nostrate differat, sed quod cæli solique illius convenientia præstantioribus polleat facultatibus. Satiuæ (ut arbitror) ex agrelli originem duxit. Sunt qui putent nullam Iridem domesticam reperiri, quod scripserit Theophrast. nullum Iridum cultum accommodari. Sed si meo quidem iudicio decipiuntur, quandoquidem Theophrast. eo in loco non de omni in vniuersum Iride differit, sed de Illyrica tantum : quæ cum loci ac cæli clementia in Illyrico tractu optima sponte proueniat, non est necesse ut colatur. Præterea cum hodie Iris domestica passim in Italiæ hortis spectetur: silu. autem in pluribus montibus sponte nascatur, floribus & foliis satiuæ longè minoribus, radice tenuiore, breuiore & aridiore, nulli quidem absurdum videri debet, si nos vtramque depingi curauimus. Sylu. plurima oritur in Goritienis agro, Saluatino monte, & lapidiz collibus inter saxa, odore non ingrato, & in campestribus non longè à Sontii ripis. Recentiori Illyrica destituitur. Sibi manifestè repugnare videtur Plin. quod lib. 21. c. 7. Raphanitem, quæ candicat, Rhizotomo quæ rufescit anteposuerit : c. autem 2. Sibi prouocant. Iris ruffa melior est quam candida. Dioscor. præstat quæ subrusto constar colore. Cornarius Iridem Astragalitem & Astragalum idem esse existimat, quin & Plinio per Iridem Rapha-

ooo

Iris Astragalus & Raphanitis non est Astragalus ut Gal. Cornar. Iris non meminit Gal. in simpl. Matth. notatur.

Iris Offic.

Iris flore. luteo. pallido. purpureo.

Iris Illyrica.

Defenditur Plinius contra Matthiolum.

nitem Astragalum intelligi censet: verum ita Iridem Astragalitem à Galeno cognominatam esse putauerim, quod radice referat Astragalum: quemadmodum Raphanitis à Plinio dicta est, quod radice Raphanum repræsentet. Iridem memorie proditam fuisse Galeno in lib. simp. med. nusquam reperi. Si Iris sylv. Matthiolum tantum paulo minor est sativa, & in eo tantum differt ut primo dicit, nulla opus erat figura, si verò, ut ait, sibi contradicens longè minor, icon parum eius demonstrat plantam. Quomodo scit an Iris Illyrica differat genere vel specie, si non virentem viderit & contulerit cum Italica. Idem in post. Com. lat. & Ital. cum magn. fig. Iris capitula edit oblonga. Gladioli modo, crassiora tamen, in quibus semen concluditur rotundum Sesamæ magnitudine, quo fit ut in errore ducantur qui Iridem nullum ferre semen contendunt.

Iris cuius tantum radix à medicis commendatur, ea est herba. Amaro hæc scribente, quam hodie officina sub nomine Ireos monstrant. Reperiuntur varii colores, in vnoquoque flore, candidi, pallidi, lutei, purpurei, ut plurimum cærulei, ut facile quis intelligere possit Iridem dici, non ob diversitatem colorum in specie, sed in individuo potius. Quamquam non abs re esset quoque dicere, Iridem sic nominari, ob diversitatem varietatemque colorum in specie. Quum Iris quædam albos flores habeat, alia luteos, alia verò pallidos, nonnulla autem purpureos, ut Ferrariz in horto Magn. Marci Pii adorauimus, & eas diligentissimis discipulis nostris indicauimus. Iud hanc sententiam verissimam esse, varia Diosc. Græca exemplaria attestantur: cui Plinius subscripsit lib. 11. sue Natur. hist. cap. 7. quod dicit: Floret Iris diuersi coloris specie, sicut arcus cælestis, unde & nomen. Ceterum Iris Illyrica, omnium consensu cæteris præfertur, & omnium est laudatissima, quamquam tamen in multis orbis regionibus, minoris licet nominis nascitur: nempe in Hispania, Germania, Gallia, & Italia, quæ si non Illyrica, aut Macedonica, quibus primas & secundas Dioscorides adscribit: bona tamen censenda est, & eo magis quando odoratior fuerit. Illyricæ verò, ut refert Plinius, loco à nobis citato dux sunt species, altera Raphanitis, ob similitudinem sic dicta quæ eius radix cum Raphano habet. Altera rhizotomos, quæ melior habetur, quæ ad subruborem tendit, ut in præsentis loco Diosc. tradit, à quo nec Plinius dissidet. Matth. Plinium (pergit Anatus) errantem ostendere nititur, quum tamen Matthiolum ipse magis reprehensione dignus sit. Nam Plinius nihil quicquam à Dioscoride hac in re variat. Plinium accusat cum innuere videatur, quod Raphanitis melior est Rhizotomo subrufa, aded ut subrufam postponat non subrusæ, quum tamen Diosc. Iridem colore subrufo maxime laudet, & cæteris anteponat. At hæc tam parua sunt, ut paucis opus habeant responsis, præcipue si litteram legerimus, ut in codice antiquissimo ad hunc modum legitur: Illyricæ quoque duorum generum est, Raphanitis à similitudine, quæ & melior rhizotomos subrufa. Sic enim legendo omnis diluitur dubitatio. Nec enim aliud quam litera una permutatur: ut facile loco, quæ, perperam postea dictio, quæ, scripta fuerit. Sed esto phrasis, ut in Frobenianis habetur codicibus: legatur, scilicet, Raphanitis à similitudine, quæ & melior rhizotomos subrufa, iud contrarium, qui vel mediocriter in lectione doctrinaque Pliniana versatus fuerit, deprehendet, quum dictio quæ, non referat aliud, quam Rhizotomos subrufa, quæ, & melior. Quod Plinius verò sic intelligendus sit, & quod cum Diosc. subrufam Iridem laudat, non aliunde comprobatum iri volumus, quam ab ipso Plinio, qui se ipsum decalet, & cum Diosc. subrufam Iridem laudat lib. 11. c. 20. quo Iridis prosequitur iuuenta, dicens: Iris rufa melior quam candida: *ut Anatus.*

Iris Illyrica figurâ non differt ab Italica, nec alia in ea differentia cognoscitur, quam quod tum Vere tum Autumno floret. Hanc autem plantam esse Hyacinthum Latinorum ex Palladio apparet &c. Quod ad verba Diosc. [pergit Anguill.] *Idem si dicitur rufa & rugulosa &c.* ea non sunt vertenda ut quidam faciunt: Flores in caule æqualibus inter se spaciis distant, ut apparet sed verterem flores summo caule alterno situ &c.

Species [inquit in Antid. Mel. dist. 5. cons. 11.] Iridis à Melue dictæ, passim reperiuntur: quarum radices in nostra Italia cum seccantur, ita rugosæ & parue deueniunt, ut vix præter corticem (si cum ipso cortice seccantur) quicquam de sui interiori parte seu alba odorata pulpa retineant. Sine cortice verò, quasi ad nihilum rediguntur, cum seccantur. Quæ autem radices huiusmodi è plagis Orientalibus deferuntur decorticatæ, & licet, sunt carnosæ, & lenes, tanquam si tunc recensissimè fuissent collectæ, quapropter nostratibus meliores iudicantur. Huiusmodi enim plantæ, ferè omnibus notæ sunt. Quæ autem Illyrica dicitur, est species in Illyria, id est, in Sclauonia nascens, & est illa quam Diosc. meliorem esse testatur. Ipsa autem quam in nostro horto habemus, florem magis gerit quam Ireos, diuersi colorem, lineatum, viridem, siue cælestem, & rubrum, ut est cælestis arcus, id est Iris. Folia enim exiliora, nec non & minores radices, sed virtutes [ut putamus] maiores, quam dictum Ireos habet.

[Hæc Monachorum Iris Illyrica fortè Matthiolum minor.] Est etiamnum (præter præfatum) in Illyria & altera Iris, nostrati similis. Apuli vulgò *Spathulam* appellant, sed non fortidam, & à nonnullis *Lilialis* & *Lilium* dicitur. Quapropter quodcumque Ireos reperitur scriptum, absolute scilicet, quod non specificatur de albo, semper purpureum est ponendum. Et si haberi poterit de Illyrico administretur: sin autem non, Orientale, vel nostras substituendum erit. Similiter quodcumque reperitur scriptum Ireos, & non specificatur de flore, semper radix intelligi debet. Folia enim [quod sciamus] non habentur in usu. Item si queratur aqua Ireos, & non præcise scribitur sublimata, semper succus radicum, vel saltem decoctio ipsarum (ubi deficiunt virentes radices) debet intelligi: Idem censet Fuch. Hoc etiam notandum in radicibus Ireos, scilicet quod recentes quasi inodorate iudicantur, licet autem maximum & suauem spirant odorem.

Dodon. Gall. Iridis prima species; qui licet duas proponat descriptiones sativæ Iridis, vnam tamen solummodo figuram exhibet: per primam intelligit Fuchsi, ex quo desumpta icon, Tragi & Matthiolum quæ in horti colitur: per secundam intelligit album profectorem florem, quam Iridem Florentinam vocat. Idem de fl. ait: Iridis species floris colore differentes complures esse Diosc. innuit, non in vno colore, ut Lacuna existimauit: sed in diuersis, ut testis est Mula, &c. Iris Matth. alia est sativa eaque sel-

Iridis Italica radices Galde cognoscitur.

Iris Orientalis.

Iris Illyrica quæ in nostro horto differt.

Iris Illyrica radices, Iris alba lutea.

Foliorum nullus usus.

Radices recentes panem modera.

crassiem digerunt, vel attenuant: bilem, crassamque (crassa & choleras Plin.) pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant. Somnum conciliant, lachrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto serpentium [& areariorum Scorpionum, in pane vel aqua addit Plin.] ictibus auxiliantur, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura [genituras absunt, Plin.] effluit. Menses ex vino potæ pellunt. Decoctum earum forminarum foribus vtiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaque in eis venarum spiracula, ischiadicis (& lumbis cum resina illinitur Plinio.) infunditur. Fistulas ac sinus carne explet [sarcotica est.] Radices ex melle glandis [glandis modo, scitè collyrii modo, vertunt] modo subdita partus extrahunt: quinetiam coctæ & illitæ strumas veteresque duritias emolliunt. (Succo duritias omnes emollit. Plin.) Siccæ quoque vlceres replent & cum melle purgant (capitis præcipuè suppurationes veteres.) Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo magna cum vtilitate illinuntur. Admotæ cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lentigines & vitia cutis in facie à Sole contracta emaculant. Pessis, malagmatis, & acopis inseruntur. In vniuersum, magni sunt ad omnia vti.

Diosc. ergo & Plin. naribus subductam sternutamenta mouere tradunt. Sed hic (inquit Cornar.) subdita pro subducta falso legitur: quod vitii etiam in aliis locis occurrit, velut alibi indicatur.

Addit Plin. Infantibus eam circumligari salutare est. Dentientibus præcipua est, tinearumque vitio laborantibus instillata. Contra canum morsus ex oleo imponitur, & contra perfrictiones; sic & neruorum doloribus. Dolori capitis cum Cotoneis Malis aut Strutheis illinitur. Crapulas quoque & Orthopneas discutit. Vomitiones cit duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit imposita cum melle. Ad paronychias farinâ eius vtuntur. Halitus oris commanducata abolet, alarumque vitia. Sedis rimas & condylomata, omniaque in corpore excrecentia sanat. Ex eo quod constat Iridem calidam & siccam ac tenuium partium, amaramque cum aliqua tamen dulcedine esse, concludit Galenus, Eam vrinæ & menses prouocare, bechicum esse medicamentum, pleuriticis, peripneumoniacis ac purulentis congruens: conferre item comitialibus spasmodis, palpitationibus & tremoribus; ut & sinuosa vlceres carne implere, purgareque: lateris, iecoris, lienisue dolores sedare, vt & capitis: nec non genituræ profluuium congruere & ad vteri fomenta.

Iris calefactoria & multum tenuium partium est [attestante Paulo] extergiturque ac concoquit. Ad tussim itaque conducit, & humores in thoraceeductu faciles efficit, & tormina sanat & vlceres sordida purgat. Pota verò cum aqua mulla aluum euacuat.

Radix (vt nobis autor est Mesue) est solida sicca ordine tertio, acris: terget, coquit, resoluit, lenit, aperit obstructa, sedat dolores, pituitam crassam, & mistam illi bilem purgat, & præter hæc aquas serosas, idque elementer. Materiam crassam, lentam, hærentem in thorace, ac pulmone, coquit, tenuat, ac promptè educit, visceraque omnia expurgat. Hepatis quoque ac Lienis, & vicinarum partium tollit obstructions: affectus ab ea excitatos, hydropem, dolorem, tumo-

rem, duritiem, & similes sanat ac lenit. Omnes quoque tumores etiam duros, & strumas digerit, præsertim neruorum & iuncturarum maxime cū Betæ vel Brassicæ succo vel vino, & melle, & oleo chamæmelino. Cephalalgiam veterem sanat: præsertim cataplasmate imposita, & succo eius in nares attracto. Hic enim sternutamentum mouet & per nares detrahit vim maximam extremitatum in partes alias, per meatus occultos, aliqui defluxorum. Succus autem ex ea vt absintio extrahitur. Cum sapa autem tussim veterem, & humore crasso, lento, factam, multum iuuat, & eodem spirandi difficultatem. Vterum præterea expurgat. Pessio quoque supposita vel emplastro admota, vteri dolores sedat, menses euocat, abortum facit. Vlceres antiqua, sordida, purrida purgat, terget, carne proba implet, quali etiam ossa nuda vestit. Ischiadi salubriter aut clystere iniicitur, aut emplastro imponitur. Os si colligitur aceto cui incocta fuerit, dentium dolorem sanat, & rheumatismum sistit: supposita item hemorrhoidas aperit. Inuitam seminis vacuationem sumpta cohibet. Succus eius cum farina fabarum & cinerum illitus, faciem expurgat, eiusque maculas deterget. Oleum denique Iridum neruos & iuncturas firmat, spasmus ex repletiore Cephalalgiam, dolorem hepatis, splenis, renum, vteri, iuncturarum, thoracis & podagræ, pleuritidem, peripneumoniam, oblitum iuuat, catarrhum coquit, somnum conciliat temporibus inunctam: aurium dolores instillatum auri, narium graueolentiam ipsis iniectum corrigat. Fit autem Oleum Iridum ex floribus Iridis, & radicem dimidio, vt rosatum oleum & violatum. Ne ventriculum lædat, sumatur ex mulla & pauca spica, vel cū sero lactis, melle, & Mastice: ad affectus autem thoracis, & pulmonis, cum sapa, vt dixi, propinatur.

Gladiolus qui caeruleos fert flores [dicitur Tragogon] hoc tempore vtriusque corporis partibus adhibetur calidæ temperaturæ herba, & expellentis ac resiccantis facultatis. Radix lutei Gladioli astringit. Aqua caerulei Gladioli stillicidia pota aduersus omne genus veneni, ad febres ardentes tempore pestis facit, nec non ad incensum Epar, & pleuriticum morbum. Radix eiusdem vino decocta & pota hydropem expellit, menses trahit, & calculum renum stillicidio vrinæ auxiliatur, aqua eius radicis distillata trium aut quatuor cochlearium mensura, aliquoties per diem pota vsu gratiores est, sed in expellendo ea mala quæ recensuimus non perinde efficax. Eadem tamen continuè & frequenter pota, obstructions iecinoris soluit, vitia thoracis & pulmonis expellit, expurgatque, doloribus lienis & matricis ac torminibus opitulatur, aluumque soluit. In vniuersum magni ad omnia vsus est radix Iridis, nam non solum in vinum, & Cernisiam suspensa, hanc dulcem conseruat, illud verò iucundo cū odore, tum sapore commendat, sed & pistoriibus ad parandum formentum triticeæ panis magnoperè vsitata.

Præter vires quas illi adscribit Diosc. (si Marthiolo credimus) aliis pluribus potest, quandoquidem compertum est, maniam oris habrum commendare: dentium dolores mulcere, si radicis decocto iidem foueantur: coquit item, abstergit, digerit, resoluit, lenit, reserat, expurgat, & dicitur: vulnerariis medicamentis immista sarcotica est. Radicis expressus succus bilem flauam, pituitam, & aquas cures subeuntes pellit: hæmor-

rhoidas totu elicit. Radix ipsa contrita, & ex aceto bibita, omnibus aduersatur venenis. Succus natibus infusus cerebrum à pituita mirifice purgat: ventriculo tamen nocet, cum per se tantum bibitur: ideoque à peritis medicis exhiberi non solet, nisi admista mulla & Indica Nardo.

Illyrica regio [ait Amatus] hodie Sclauonia dicitur ex qua hodie quoque ad nos Iris optima adfertur, quæ calida & sicca, propè tertium gradum temperamenti locatur, & ex ea eclegma in Officinis contra pectoris vitia paratur. Nam tussis utilis est, & humores viscidos & contumaces extenuat: communis autem Iridis (nam Illyrica sicca ad nos defertur) succo contra hydropem vitur, non contemnendo profecto ituuamento, ut curatione 11. Centuriz primæ nostratim curationum abundè diximus, ubi vnciam integram electuarii è radice cum melle parati, pro alio subducenda propinamus: Imo & succi huius nostratis Iridis, ad vnciam vsque vnam, nonnunquam cum melle rosaceo colato, aliquando verò cum decocto Senz, vel aqua mellis mixtam præbemus.

Nostratis succum, aiunt Aduers. Hydropicis propinant Medicelli (ex horum N. Wier. Obs.) freti quidam: incertum maiorène cruciatu an commodo ægros vexet? Exhibent autem, teste Fallopio, 3iij. aut iij. succi (radicis) Iridis, & educit aquam satis copiosam, sed tanto cum dolore ut sit mixtum: idèd hocce remedio uti minime tutum, quantum id commendat Brassaola. Aquam distillatam è purpureis floribus Iridis cū speciebus Diatrionis, ranalon & Cinnamomo, ut efficacissimam in hydropicis commendat, teste Camer. Holerus & Gesnerus.

Ad Hydropem valet succus radicis Ireos, debet autem capi agrestis [inquit Gatinaria] quia fortioris est resolutionis, Hircos etiam hortulanum vtiliter operatur.

Dicit Gordonius quod sanat eos qui sunt possibiles sanari.

Vnguentum Irinum Dios. ita parare præcipit: Olei lib. 7. & quincunem, Spathæ lib. 6. & bessem sumito, & Spatham ammixtis aquæ heminis decem tenuissime contrusam, in ahenuin ad oleum immisam coquito, donec odorem contrahat. Deinde in craterem melle oblitum excolato. Ex hoc aromatis imbuto oleo primum Irinum præparatur Iride in spissato oleo, vel ut præscriptum est, macerata. Aut hoc modo. Olei lib. 70. & quincunem, ligni Balsami lib. 5. & sextantem contrusi, velut dictum est, simul coquito. Deinde exempto Balsami ligno, Calami contrusi lib. 9. & dextantem, Myrrhæ vino vetere odorato maceratz grumum iniicito. Postea acceptis ex spillati ita & aromatis imbuti olei libris 14. Iridis contruse æquale pondus immittito, & ad dies ac noctes duas finito, deinde fortiter ac violenter exprimito. Et si efficacius hoc esse voles, æquale Iridis pondus iterum atque iterum in ipso macerato, & excolato. Optimum est quod odore nihil aliud præter solam Iridem redolet. Tale verò est quod in Perga Pamphyllæ, & in Elide Achaïæ præparatur. Vim habet calefaciendi & molliendi. Crustas vlcera & putredines ac sordes repurgat. Et affectionibus circa vterum cõuenit, & inflammationibus & præclusionibus. Facit item eiicit, & hæmorrhoidas aperit. Facit & ad aurium sonitus, cum Aceto & Ruta & Amygdalis amaris. Et ad destillationes diuturnas, natibus ex eo illitis, & ad ozanas. Purgat etiam aluum cyathi mensura potum. Facit etiam ad val-

Tom. II

uulosas affectiones. Mouet quoque vrinas. Et ægre vomitibus opicatur digitis aut vomitorii ex eo illitis. In anginis etiam illinitur, aut cum aqua mulla gargarizatur. Ita etiam in faucium asperitate. Datur item his qui cicutam, aut fungos, aut coriandrum biberunt. Irini præparatio satis clara est. Aetius & Paulus idem parant, sed spissamentis pluribus inditis, quam Dioscor. in duobus parandi modis habet. Hodie simpliciter sine spissamentis paratum in Officinis habetur. Apud Strabonem libro 12. laudatur Selgica Iris, & vnguentum quod ex ea fit Silgesium appellatum. Quod dixit Cornar. optimum est quod solam Iridem redolet, in Græco habetur *αἰνῶν* falso pro *ἰρι*.

IRIS DALMATICA MAIOR FLORE vulgari minds violaceo.



Spectate
Spulchritudinis, & magnitudinis est hæc Iris, caule bicubitali, re-
recti, minimi
digiti crassitu-
dine: alis cre-
bris donato, in
quorum extre-
mis flores mul-
ti, magni, tori
cyanei, exce-
ptis paucis in
vnguim alis
stris obliquis
versicoloribus,
alternorumq;
foliorum sim-
bria crocea, an-
gusta quidem
sed clara: folia

Descriptio

verò: quàm in vlla alia in horro Ill. C. E. latiora, vncias tres lata nonnunquam: explicatas Aquilæ alas referunt, vltimo proximum sinu suo semper excipiente, colore glauca.

De hac ni multam fallimur Lobel. Obs. & Ic. Plant. p. 61. Leur. 87. Iris Dalmatica maior, cuius aspectus hilaris, peruenustus foliorum exortus, lateratim traiectus, & radiatim alas Pauonis explicatas imitatus: floribus pluribus ex vno caule multis concauo alis, luculentæ magnitudinis, violaceis nitentibus senis foliis, alternatim erig repandis. Vireta Belgica hanc in deliciis habent, munere Cl. Medici Panetii Ducis Ferrariensis. Semen præfert in siliquis angulosis.

Iris Dalmatica maior Clus. Hisp. vulgari forma & magnitudine similis, sed flos elegantior & vnicolor, atque in summo caulis fastigio & ramis confertim nascens: semen in breuiore siliqua angulosum, pallidum, & rugosum: floret Vere, sed serius aliis apud nos saltem. Et Iridi Asiaticæ ex rule omnium Iridum amplissima, Iris maior latifolia tertia Clus. Hist. post. siue Dalmatica maior, non valde absimilis est, quam ante multos annos in Belgicam vsque misit Alphons. Pancerius, nisi quod flores concolores, summo caulis fastigio magis confertos habere videtur, iucundissimo spectaculo: semen etiam in breuiore capite minus, pallidum, angulosum, rugosum.

0003

Tabern. Tabern. Icon. Dalmatica maior, Dalmatica velut in hist. Wiedmurg von Coustantinopel. Iris Chalcedonica altera. Egregius Herbarius Tabern. vel eius Compiler, descriptioni Lobellii huius Iridis addit, ex consideratione figuræ non plantæ, ac præter mentem Lobellii & Clusii dicit habere folia nonnihil angusta & acuta: titulus in historia transpositus competit alteri figuræ.

C. Bauh. Phyt. Iris 7. siue Dalmatica.

Camer. hort. Iris Dalmatica Clusii, quæ fortitan ad Illyricam nomine loci posset referri.

Iris Asiatica cerulea omnium Iridum ampliff. Dalmatica affinis.

Descriptio

Sena, septena, octonaque habet Altera folia, omnium Iridum amplissima, & in latum expansa, viridis cui rugo permixta videatur coloris, mutuo se amplectentia, è quorum medio caulem promit sesquicubitalum, interdum etiam bicubitalum vel ampliorem, firmum, crassiorem superiore, læuem, geniculatum, multisque alis concavum, è quibus copiosi (nullam enim feraciorum conspexi) vaginulisque inclusi prodeunt flores, magni, nouem foliis constantes, quorum terna inflexa dilute purpurascens atque ad ceruleum tendentis sunt coloris, multis purpurascens venis ab infima parte, & staminea simbria flaua in longitudinem & latera excurrentibus: bifida folia exalbescunt, gibbo tamen illorum dilute purpurascens: tria quæ sese attollunt folia, angustiora & ima parte quibusdam purpureis breuib. venis distincta sunt, ubi verò se in latum expandunt subceruleum habent colorem, dilutiorem adhuc quam inflexa: & florum Sambuci odorem, grauiorem tamen, quodammodo æmulantur: his succedunt rariores siliqua, siue capsula crassa, magna, triangularia, & obtruso mucrone prædita, quæ maturitate dehiscentia semen continere deprehenditur crassum, angulosum, durum, flauescens, superiori ferè par: radix crassa est, magna, nodosa, multis longis crassisque fibris donata, lateribus, vt reliquæ, se propagans, & si repurgata exsicceatur, odorata.

Cum Clus. petiisset à Magn. D. de Vngnad sibi mitti Constantinopoli Alara Susani, hanc consequutus est, quæ magnam habet affinitatem cum Dalmatica maiore Belgis nuncupata. Est in Pann. ipsi Iris 1. Asiatica cerulea: in post. verò Hist. Iris Asiatica cerulea, siue latifolia maior 1.

Casp. Bauh. Phyt. Iris 8. Iridi Dalmaticæ affinis.

IRIS DALMATICA MINOR flore purpure diluiores.

Descriptio

[Iridi Lufitanica seu bifloræ similis (inquit Clusius Hist. Hispan.) quam Pancius ad nos misit nomine Dalmaticæ minoris insignitam, nisi quod paulò angustiore folio videatur: flores purpure diluiores, & terni aut quaterni in singulis caulibus, oblongiori pediculo inherentes, semen in breuiore triangula siliqua, angulosum, pallidum & rugosum: floret seris Vere.]

Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 62. Teur. 88. Iris Dalmatica minor bifloræ Iridi facie, omnique sui parte persimilis, sed tota minor & flores diluiores



Iris maior latifolia Byzantina Dalmatica à Pannio missa similis.

Iris maior latifolia 18. Clusii Byzantio missa foliis quinto generi (Iridis maioris latifol. 5. siue Asiaticæ purp.) non dissimilibus, sed breuiore aliquantulum caule, in aliquot ramos diuiso, qui sustinent flores vaginulis emergentes, iam dictis paulò minores, quorum color medius inter secundi & quinti generis flores: radix quinta generi similis. Icon quam Clusius ponit pro iam dicta Iride est Icon Plantini p. 62. sub titulo Iridis Dalmaticæ minoris.

IRIS DILUTE CÆRULEA innolucro albo, fortè Dalmatica.



Tabern. bi. stor. & Ic. Wiedmurg. Iris dilute cærulea innolucro albo.

Proponit Tabern. vel eius Compiler figuram non integram siue vlla descriptione, si stirps noua cur non descripta, cur Matthiolum imitatur: si liceat aliquid coniectari, suspicor posse ad Chalcedonicam referri, quæ a

non nota, vt apparet ex descriptione Dalmaticæ, cui tribuit folia nonnihil angusta & acuta, quæ verba addidit de suo ingeniosus vir descriptioni Lobellii, consideratà potius figurâ quam plantâ, cuius nomen in historia transpositum vè antè dictum.

C. Bauh. Phyt. Iris 4. siue dilute cærulea innolucro albo Tabern.

Iris

aliquando Alfonso Pancii Medici Ferrariensis munere missa, & Belgii inquilina facta.

Casp. Bauh. Phyt. Iris 20.

Tabern. & Ic.

Iris maior latifolia siue *Damascena cerulea* Clusio. 4.

Iris maior latifolia quarta siue *Damascena* Clusii, non dispar est foliis & radice Iridi *Dalmatica* maiori, quam N. V. lo. ab Hoghelande misit Lugduno Batavorum anno 1590. *Damascena* nomine ipsi semine natam.

Cubitalem autem biennio post aut paullo maiorem protulit illa *caulem*, in quo multi ut in *Asiatica cerulea* *florae*, totidem quot ea foliis, nec minus amplis constantes, eiusdemque pene coloris, terna tamen inflexa paullo dilucius purpurascens & ad caeruleum colorem tendere videntur, atque magis complicari: terna bifida & gibba villosa fimbria incumbens, angustiora & cinerei quodammodo coloris: terna vero surrecta dilucius caerulei sunt coloris, & latis interdum candicantibus venis externa parte conspersa sunt: odor *Asiaticae* similis. Hoc autem in eius aliquot floribus observabatur, vnum ex illis foliis quae sursum attolli solent, subtus perinde, atque inflexa albescere, etiam aliquantulum inflecti, similis coloris esse, & fimbriam illam multis villis constantem habere. An porro in lingulis annis similes proferat flores, tempus docebit.

Iris asiatica purpurea maior latif.

Folia habet similia Iridi secundae (Inquit Clus.) siue *Asiaticae ceruleae*, paulo tamen breviora, & angustiora: inter quae exit *caulis* cubitalis, rotundus, digitalis crassitudinis, in aliquot ramos diffusus, qui promunt e membranaceis thecis *florae* superiore minores, nonnihil odoratos, quorum labra, siue folia ad terram inflexa, saturatioris sunt purpureae, & infra circa vnguem, quae videlicet hirsuta illa & pallescens fimbria excutit, variis venis distincta: his incumbunt tria alia latiuscula bifida folia, quae candicantes ligulas tegunt: deinde e latibus surgunt terna etiam folia, eleganti purpureo colore praedita, flori *Lusitanicae* biflorae fere similia, latiora tamen: succedunt triangulares *stigma* obtuso mucrone, in quibus *semen* inaequale: *radix* tuberosa, *Secundae* similis.

Est haec Clus. Pann. Iridi tertia, siue *Asiatica purpurea*, missa Constantinopoli nomine *Alia* *Asiaticae*. Huius iconem posuit in post. Hist. nomine Iridis latifoliae maioris 54. quae est 1c. Plant. pag. 59. sub hoc titulo, *Iris nostras* vulg. lib. 32. T. 35.

Casp. Bauh. Phyt. Iris 9. siue *Asiatica purpurea* Clusii.

Missae etiam haec Constantinopoli ab Ill. V. Dauide Vngnad. Floraeque Maio.

Iris maior latifolia flore purpureo cum aliqua rubedine.

Iris maior latifolia sexta, quam ad me (Inquit Clus. hist. post.) Viennam misit Io. Boissot 1581. congener fuit *Asiaticae purpureae*. Similia enim folia habuit, caulem paullo maiorem, flores similes, aliquantulum maiores, inodoros, quorum terna surrecta folia aliquid rubedinis habere videbantur: radicis amplitudine conveniebant.

Iris latifolia maior purp. quibusdam Illyrica.

Iridis maioris latif. genus 7. in *Francofurtensibus* hortis observabat Clus. hist. cui *Illyrica* co-

gnomen dederunt: longa autem latiusque folia habebat, *Dalmatica* maiori pene paria, caule non minus grandem, nec rariore minore siue flores proferbat, novem, ut reliqui, foliis constantes, quorum terna inflexa & terram spectantia, plane purpurei siue violacei, dilucius tamen, tunc coloris, nullis, nisi circa infimam partem, venis distincta, fimbria medium folii nervum occupante, albis staminibus, flavo apice praeditis donata, tria surrecta folia eiusdem fere, sed magis dilucius coloris, ut & tria bifida ligulam tegentia, & fimbria incumbens: odor satis suavis.

Iris maior latifolia cui in flore crassa vena purpurea.

Iris maior latifolia octava siue vulgatio altera, quam Clus. in hortis *Francofurtensibus* conspicebat, similia habet folia praecedenti sextae *Illyricae* cognominata, ab exortu circa radicem purpurascens, caulem cubitalem aut ampliorem, multos e vaginulis, purpurascens radiis insignitis proferentem flores, novem foliis constantes, quorum terna incurva multis crassis venis purpureis sunt notata, fimbria ad labrum inflexum protensa, capillaribus staminibus flavo apice praeditis donata, terna erectiora plerumque bifida sunt, coloremque habent obsoletum, in quo purpureum quidpiam magis vel minus saturum elucet, alata angusta folia fimbriae incumbens eiusdem cum surrectis sunt coloris, praeter medium nervum in longitudinem excurrentem, qui ex caeruleo purpurascit: odor florum Sambuci. Breuiter, Iridi obsoleta Belgica valde similis est.

IRIS LVSITANICA VERNA VIOLACEA,
& Clusii maior Latif. nona cum
venis purpureis.



Iris Lusitanica verna Lobel. Obs. *Dalmaticae* Iridi maiori cum foliis, tum caule & ternis quaternisve floribus similis, sed colore omnino violaceis, seu purpureis saturatioribus: cuiusmodi ipsam vidisse iuvat hoc Vere in Viridariis Ill. D. lo. van der Delf, & Mariz Schen. Icon. Pl. pag. 63. *Iris Lus-*

tanica Verna Teur. 89.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 12. Iconem eandem cum Plant. habet Clusius pro Iride latifolia maiore nona, cuius descriptio eiusmodi est. Mihi missum Bruxellis a N. V. lo. Boissot, Iridis maioris genus, quod Maio floret, quodque breviora quam *Iris maior octona* habet folia, alioqui non dissimilia, nec minus circa radicem, quae iuicet amplectuntur, purpurascens: caulem cubitalem & ampliorem, in alas diuisum, in quibus multi

flores, totidem quot præcedentes foliis præditi, quorum terna deorsum inflexa per oras tuberculea, circa ungues ex flauo candicant, deinde multis crassiusculis saturæ purpuræ venis ab imo in longitudinem excurrentibus sunt prædita, staminum fimbria superiori similis est: terna erecta folia candicantis ex cæruleo sunt coloris, eorum oræ quodammodò flauescunt, ungues tenuioribus venis distinguuntur, bifida & alata folia fimbriam tegentia ferè ex flauo candicant: odor præcedenti similis.

Iris maior latif. angustioribus foliis, purpureis floribus minoribus Clusio 19.

Iris maior latif. 19. Iris maior latif. 19. Clus. Byzantinæ magnitudine par, angustioribus tamen foliis, quam à Boissot accipiebam, caule gracili, pedem & semissem, interdum etiam cubitum alto, in ramulos diuiso, quibus insident flores omnibus prædictis minores, tribus foliis ad terram inclinatiss, dilutè purpureis, tribus verò erectis obsoleti purpurei coloris, qualis in vulgari quodam genere conspicitur: radix non magna, nodosa. Eius flos mihi primùm conspectus anno 1598. cæteris florentibus.

Iris maior latif. Romana cærulea Clus. 24.

Iris maior latif. 24. Iris maior 24. Iridi 23. siue Illyricæ par, Viennam mihi missa [ait Clus.] à I. Boissot Romanæ maioris cæruleo flore nomine: etenim caulem, folia, radicem omnino similem habuit, anno verò 1585. florem etiam pacem, exceptis tribus surrectis foliis, quæ ad cæruleum colorem magis tendebant, fimbriaque inferiorum magis flauescente, & odore vulgari Oxyacanthæ qui in præcedente ad bifloram Lusitanicam magis accedit.

Iris latifolia maior, cui oræ ad flauum obsoletum accedunt.

Iris maior latif. 10. Iris maior latifolia 10. Clusio, à Io. Boissot missa, paulò humilior, quàm nona: flores gestans, ei forma quidam similes, diuersi tamen coloris: nam terna inflexa folia, licet illius foliis non sint disparia, oras ad flauum obsoletum accedentes habent, venasque paulò dilutiores, terna sursum erecta obsoleti sunt coloris, ex flauescente & purpurascete mixti versicoloris, eius quam à Camerario accipiebam, foliis non absimilia, paulò tamen dilutiora, circa ungues etiam magis flauescencia, & tenuioribus purpureis venis notata, angusta, alataque folia simili colore prædita, præter medium neruum qui magis purpurascit: odor etiam florum Sambuci æmulus. Præter Iride modò dicta figura apud Clusium est quæ Icon. Plant. p. 59. ponitur nomine Iridis candidis floribus.

Iris latifolia maior cum oris purpurascens: ibi.

Iris latif. maior 11. Iris Clusio latifolia maior Vndecima, à Iohan. Boissot, similiter communicata decimæ paria habet folia, inter quæ cubitalis ferè & dictæ æqualis assurgit caulis, ternos aut quaternos è vaginis viridibus, oras purpurascens habentibus, ferens flores, quorum color obscurior & saturatior, quibus nonnunquam inspersæ luridæ maculæ &c. Odor idem cum superiore. Paulò tamen hæc scilicet floret.

Iris latifolia maior flore versicolore.

Iris latifolia maiorem 12. [quæ Clusio perit] præcedenti satis colore scribebat respondere Io. Boissot, & peculiare id habere, ut inflexa folia duobus diuersis coloribus secundum longitudinem sint discreta, altera videlicet parte reliquorum foliorum colori respondente, altera diuerso: eamque à Bruxellensi cinie accepisse, qui semine natam ibi assereret, cum aliis Iridibus, quarum nonnullæ vnicum duntaxat folium variegatum habebant, quædam versicolorem tantum neruum medium folium secantem, cumque vel ampliorum, & latiorum, vel angustiorum, ut mirum dictum sit quomodo Natura in his floribus ludat.

Iris latifolia maior versicolor cærulea dilutior Clus. 13.

Iris latifolia maiorem 13. Cui Bruxellensi semine natam scribebat Io. Boissot instar duodecimæ varietate colorum conspicuam, non adeò tamen elegantem, sed coloris ex cineraceo pallescentis, ut versicolor cærulea dilutior dici queat.

IRIS ALTISS. BICOLOR CÆRVLEO obsoletocinereo mixta.



R Anior Descripsi hæc Iris, proceritate vulgarem superans: folia non minus lata: floris autem suauiter odorati, & vulgari minoris, non obuia amœnitatis, cuius tria extrema folia repanda, summa orâ saturâ purpureâ tincta sunt, inde vsque ad fimbriam crocatam humani supercilii

æmulam, saturis lineis purpureis longis campum album percurrentibus, vtrinque autem à fimbriæ lateribus oblique ferrugineæ lineæ luteos margines distinguunt: terna quoque folia, ut in hoc genere fieri solet, introrsum curuata surriguntur, colore magna parte ex ferrugineo cinereo obsoletò, imâ parte ridigiuscula lutea saturâ ferrugine guttata: penitissima & vltima terna in colta foris intusque leuicula & sordida purpura pallescent, vtrinque lateribus luteo lurido infectis.

Lobel. Obs. Item in append. Iris flore cæruleo obsoletocinereo. Plant. icon. p. 60. Iris flore cæruleo, cinereo polyflora, Lobel.

Basileæ in horto D. Felicis Plateri vidi Iridem maximam & pulcherrimam, cui flores non multum differunt à vulgari purpurea siue cærulea, folia repanda sunt cærulea, superiora nescio quem ruborem habent, dedit mihi plantam, quam plantaui in horto E. C. ubi nunc abundat florens

Florēs Maio, cuius mihi videor habere paulò minorem speciem nonnihil variantem.

Iris maior foliis duobus coloribus distinctis, albo & viridi Clus. 16.

Iris maior latifolia 16. quæ ex eorum numero quas Boissot misit, Iridi maiori latifolia 15. (siue luteæ variegatæ) valde similis, & illius quidem semine natam putat Clusius: Folia tamen illi breviora & (quod rarum) magna ex parte duobus coloribus distincta, albo & viridi, sic quidem, ut albus per longitudinem excurrat, nonnunquam dimidiatum folium occupans, interdum ferè totum, aliquando tunc duntaxat partem: iisdem etiam coloribus interdum distinctæ vaginæ flores includentes: qui terna ad terram inflexa folia superiori similia habet ferè, staminea tamen fimbria tota flava est, bifida folia illam tegentia flava, cuius etiam coloris sunt terna illa sese attollentia & tota ferè surrecta, ut in præcedente, infimâ autem & angustiore parte, purpureis velut maculis internè aspersa sunt: odor qualis in præcedente, nonnunquam aded imbecillis ut vix deprehendatur. Floret Maio cum superiore.

Iris exotica colore quasi pallido fuligine perfusa Camerarii Clusio 14.

Iris maior latifolia 14. Clus. Paan. Iris 5. exotica Camerarii, siue obsoletior, quæ ex Iride varia caulifera Pannonica nata censetur. Hist. post. Iris maior latifolia 14. cui ampla sunt folia, & latiora longioraque quàm in præcedentibus, viridia admodum, rugosa, aliquantulum crispa, mucrone nutante, è quorum medio emergit cubitalis aut maior caulis, lævis, rotundus, viridis, in aliquot ramulos diuisus, qui è virentibus vaginulis satis amplas promunt flores, nonnihil odoratos, & ad vulgaris Oxyacanthæ floris odorem accedentes, quorum tria reflexa folia pallida multis crassis purpureis venis à foliis infima sede, & à fimbria, ad extremas oras sparsis, prædita sunt, labris etiam saturæ purpuræ nitentibus: tria illis incumbentia, sub quibus occultantur ligulæ, coloris pallidi tanquam fuligine perfusi, ut etiam sunt tria erecta, sed magis luridi: nullum mihi hactenus semen tulit, tamen multos annos iam aluerim. Maturius paulò floret secunda, & color floris aliquando saturior, interdum dilutior. Hanc nactus est à Ioach. Camerario Reip. Norib. Medico primario, vnde verò ille habuerit ignorat.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 12. siue exotica Camer.

Iris maior latif. pallidescens ex albo cum purpureis venis.

Iris maior latifolia 17. Clusii, quæ à Boissot missa, pedalem habuit caulem, rotundum, geniculatum, binos aut ternos, ex membranaceis vaginis promès flores, quorū terna terrâ spectantia folia pallidescens ex albo sunt coloris, multis purpureis venis ab infimâ foliorum basi, quæ angustior est, in latera, tum à fimbria, quæ flava est, ad extremas foliorum oras procurrentibus, quibus singulares, interdum binæ purpureæ maculæ sunt aspersæ: bifida folia fimbriam tegentia sunt coloris, cuius etiam terna surrecta [excepta eorum angustâ basi, quæ flavescentia] multis purpureis venis in latera procurrentibus.

Iris maior latif. purpurea foliis repandis candicantibus, purpureis venis distinctis Clusio 21.

Iris Clusii maior latifolia 21. Non minus minùs ampla habet folia quam 20. inter quæ caulis asurgit pedalis, teres, geniculatus, viridis, sustinens membranaceas thecas virides, per oras leuiter purpurascens, è quibus emergunt bini aut terni flores, iam descripto paulò minores, novem foliis constantes, quorum terna terram spectantia ab imo angustiora, candicantia interioris, saturæ purpuræ venis eleganter distincta sunt, latiore verò parte omnino purpurea: villosa fimbria infernâ parte flavescit: supernâ purpurascit: bifida foliola sub quibus later, floridi purpurei sūt coloris, ut terna folia surrecta: flos tenuiter odoratus. Hæc mihi inquit, nata est Francofurti ad Moenum, semine spontè deciduo, & florem dedit anno 1592. Maii initio.

IRIS FLORE ALBO.



Qui purpuream vulgarem Iridem rectè norit, is nullo negotio hunc albam assequetur: nullam quippe in radicibus, foliorum florumque forma differentia notabilem animaduertimus, in quibus tamen utriusque coloris non modicum est discrimen: folia enim colore ad glaucum magis accedunt.

Descriptio

flores paucos, sed eo tamen grato odore præditi, lacteo candore perfusi sunt, extimorum costis non minùs quàm Purpureæ extra virentibus, quibus intus lutea crocomata respondent, imorum autem foliorum margines luteæ strigæ percurrunt.

Tradit Ruell. inueniri frequenter Iridis florem emaculati candoris, cuius radix cum Illyrica de odoris principatu contendat.

Cord. in Diosc. & Obs. Sylv. Iris Illyrica flore candido. Non placet Cordum Illyricam astruere flore albo, ut postea diceretur.

Brunsch. & Gelin. hort. Iris flore albo.

Est autore Matthioli in sativorum genere, quæ nivei candoris flores profert, quam in pluribus Herrurtæ locis vidit, cuiusque radix fragrantia & virium robore Illyricam ferè æquat.

Dodon. Gall. Iris: altera flore albo, Iris Florentina, Officinis Iteos: Gall. Flambe blanche, Germ. weiß Violwurzel & weiß schwertel. Belg. witlich / quæ omnino præcedenti similis, foliis, caulibus, forma florum & radicum, nisi quod flores non habet diuersos colore, sed nivosos: Radix paulò minor, & optimi odoris maximè sicca. Cur Florentina potius censenda sit ea quæ albo flore quàm altera, non video, quandoquid ibidem copiosa, nec etiam radix nobis observata.

Iris Florentina.

Descriptio

flores, totidem quot præcedentes foliis præditi, quorum terna deorsum inflexa per oras subærulea, circa vngues ex flauo candicant, deinde multis crassiusculis saturæ purpuræ venis ab imo in longitudinem excurrentibus sunt prædita, staminum simbria superiori similis est: terna erecta folia candicantis ex cæruleo sunt coloris, eorum oræ quodammodo flauescunt, vngues tenuioribus venis distinguuntur, bifida & alata folia simbriam regentia ferè ex flauo candicant: odor præcedenti similis.

Iris maior latif. angustioribus foliis, purpureis floribus minoribus Clusio 19.

Iris maior latif. 19. Clus. Byzantine magnitudine par, angustioribus tamen foliis, quam à Boissor accipiebam, caule gracili, pedem & semissem, interdum etiam cubitum alto, in ramulos diuiso, quibus insident flores omnibus prædictis minores, tribus foliis ad terram inclinatiss, dilute purpureis, tribus verò erectis obsoleti purpurei coloris, qualis in vulgaris quodam genere conspicitur: radix non magna, nodosa. Eius flos mihi primùm conspectus anno 1590. cæteris florentibus.

Iris maior latif. Romana cærulea Clus. 24.

Iris maior latif. 24. Iridi 23. siue Illiricæ par, Viennam mihi missa (ait Clus.) à I. Boissor Romanæ maioris cæruleo flore nomine: etenim caulem, folia, radicem omnino similem habuit, anno verò 1585. florem etiam parem, exceptis tribus surrectis foliis, quæ ad cæruleum colorem magis tendebant, simbriaque inferiorum magis flauescente, & odore vulgaris Oxyacanthæ qui in præcedente ad bifloram Lusitanicam magis accedit.

Iris latif. 10. maior, cui oræ ad flauum obsoletum accedunt.

Iris maior latif. 10. Clusio, à I. Boissor missa, paulò humilior, quam nona: flores gestans, et forma quidem similes, diuersi tamen coloris: nam terna inflexa folia, licet illius foliis non sint disparia, oras ad flauum obsoletum accedentes habent, venasque paulò dilutiores, terna sursum erecta obsoleti sunt coloris, ex flauescente & purpurascere mixti versicoloris, eius quam à Camerario accipiebam, foliis non absimilia, paulò tamen dilutiora, circa vngues etiam magis flauescencia, & tenuioribus purpureis venis notata, angusta, alataque folia simili colore prædita, præter medium neruum qui magis purpurascit: odor etiam florum Sambuci æmulus. Præter Iride modò dicta figura apud Clusium est quæ Icon. Plant. p. 59. ponitur nomine Iridis candidis floribus.

Iris latifolia maior cum oris purpurascens.

Iris latif. maior 11.

Iris Clusio latifolia maior Vndecima, à Iohan. Boissor, similiter communicata decimæ paria habet folia, inter quæ cubitalis ferè & dictæ æqualis assurgit caulis, ternos aut quaternos è vaginis viridibus, oras purpurascens habentibus, ferens flores, quorum color obscurior & saturatior, quibus nonnunquam inspersæ luridæ maculæ &c. Odor idem cum superiore. Paulò tamen hæc ferè florere.

Iris latifolia maior flore versicolore.

Iris latifolia maior 12. [quæ Clusio petiit] præcedenti satis dolore scribebat respondere I. Boissor, & peculiare id habere, ut inflexa folia duobus diuersis coloribus secundum longitudinem sint discretæ, altera videlicet parte reliquorum foliorum colori respondente, altera diuerso: eamque à Bruxellensi ciue accepisse, qui semine natam ibi assereret, cum aliis Iridibus, quarum nonnullæ vnicum duntaxat folium variegatum habebant, quædam verticillatam tantum neruum medium folium secantem, eumque vel ampliotem, & latiotem, vel angustiotem, ut mirum dictu sit quomodo Natura in his floribus ludat.

Iris latifolia maior versicolor cærulea dilutior Clus. 13.

Iris latifolia maior 13. Cui Bruxellensi semine natam scribebat I. Boissor instar duodecimæ varietate colorum conspicuam, non admodum elegantem, sed coloris ex cinereo pallescentis, ut versicolor cærulea dilutior dici queat.

IRIS ALTISS. BICOLOR CÆRVLEO obsoletum cinereæve mixta.



R Anior Descriptio
hæc Iris, proceritate vulgarem superans: folia non minus lata: floris autem suauiter odorati, & vulgari minoris, non obuia amaritudo, cuius tria extrema folia repanda, summa oræ saturæ purpureæ tincta sunt, inde vsque ad simbriam croceam humani supercilii

æmulam, saturis lineis purpureis longis campum album percurrentibus, vtrinque autem à simbriz lateribus oblique ferrugineæ lineæ luteos margines distinguunt: terna quoque folia, ut in hoc genere fieri solet, interiorum curuata suffruntur, colore magna parte ex ferrugineo cinereo obsoletum, imò parte rigidiuscula lutea saturæ ferrugine guttata: penitissima & vltima terna in costa foris intusque leuicula & sordida purpura pallent, vtrinque lateribus luteo lurido infectis.

Lobel. Obs. Item in append. Iris flore cæruleo obsoletum cinereæve. Plant. icon. p. 60. Iris flore cæruleo, cinereæve polyflora, Lobel.

Basileæ in horto D. Felicis Plateri vidi Iridem maximam & pulcherrimam, cui flores non multum differunt à vulgari purpurea siue cærulea, folia repanda sunt cærulea, superiora nescio quem ruborem habent, dedit mihi plantam, quam plantavi in horto E. C. ubi nunc abundat florens

florēs Maio, cuius mihi videor habere pauld̄ minorem speciem nonnihil variantem.

Iris maior foliis duobus coloribus distinctis, albo & viridi Clus. 16.

Iris maior latifolia 16. quæ ex eorum numero quas Boissot misit, Iridi maiori latifolia 19. (siue luteæ variegatæ) valdē similis, & illius quidem semine natam putat Clusius: Folia tamen illi breviora & (quod rarum) magna ex parte duobus coloribus distincta, albo & viridi, sic quidem, ut albus per longitudinem excurrat, nonnunquam dimidiatum folium occupans, interdum ferē totum, aliquando eius duntaxat partem: iisdem etiam coloribus interdum distinctæ vaginæ flores includentes: qui terna ad terram inflexa folia superiori similia habet ferē, staminea tamen fimbria tota flava est, bifida folia illam tegentia flava, cuius etiam coloris sunt terna illa sese attollentia & tota ferē surrecta, ut in præcedente, infimā autem & angustiore parte, purpureis velut maculis internē aspersa sunt: odor qualis in præcedente, nonnunquam aded̄ imbec̄ illis vix deprehendatur. Floret Maio cum superiore.

Iris exotica colore quasi pallido fuligine perfusa Camerarii Clusio 14.

Clus. Paan. Iris 9. exotica Camerarii, siue obsoletior, quæ ex Iride varia caulifera Pannonica nata censetur. Hist. post. Iris maior latifolia 14. cui ampla sunt folia, & latiora longioraque quàm in præcedentibus, viridia admodum, rugosa, aliquantulum crispa, mucrone nutante, & quorum medio emergit cubitalis aut maior caulis, lævis, rotundus, viridis, in aliquot ramulos diuisus, qui ē virentibus vaginulis satis amplos promunt flores, nonnihil odoratos, & ad vulgaris Oxyacanthæ floris odorem accedentes, quorum tria reflexa folia pallida multis crassis purpureis venis à foliis infima sede, & à fimbria, ad extremas oras sparsis, prædita sunt, labris etiam saturæ purpure nitentibus: tria illis incumbentia, sub quibus occultantur ligulæ, coloris pallidi tanquam fuligine perfusi, ut etiam sunt tria erecta, sed magis luridi: nullum mihi hæcenus semen tulit, tamen multos annos iam aluerim. Maturius pauld̄ floret secunda, & color floris aliquando saturior, interdum dilutior. Hanc nactus est à Ioach. Camerario Reip. Norib. Medico primario, vnde verò ille habuerit ignorat.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 12. siue exotica Camer.

Iris maior latif. pallescens ex albo cum purpureis venis.

Iris maior latif. 17. Clusii, quæ à Boissot missa, pedalem habuit caulem, rotundum, geniculatum, binos aut ternos, ex membranaceis vaginis promēs flores, quorū terna terrā spectantia folia pallescens ex albo sunt coloris, multis purpureis venis ab infimā foliorum basi, quæ angustior est, in latera, cum à fimbriā, quæ flava est, ad extremas foliorum oras procurrentibus, quibus singulares, interdum binæ purpureæ maculæ sunt aspersæ: bifida folia fimbriam tegentia ex albis sunt coloris, cuius etiam terna surrecta (excepta eorum angustā basi, quæ flavescentia) multis purpureis venis in latera procurrentibus.

Iris maior latif. purpurea foliis repandis candicantibus, purpureis venis distinctis Clusio 21.

Iris Clusii maior latifolia 21. Non minus min⁹ ampla habet folia quam 10. inter quæ caulis affurgit pedalis, teres, geniculatus, viridis, sustinēs membranaceas thecas virides, per bras leuiter purpurascens, ē quibus emergunt bini aut terni flores, iam descripto pauld̄ minores, nouem foliis constantes, quorum terna terram spectantia ab imo angustiora, candicantia interiora, saturæ purpuræ venis eleganter distincta sunt, latiore vero parte omnino purpurea: villosa fimbria infernā parte flavescit: supernā purpurascit: bifida foliola sub quibus latet, floridi purpurei sūt coloris, ut terna folia surrecta: flos tenuiter odoratus. Hæc mihi inquit, nata est Francofurti ad Mœnum, semine spontē deciduo, & florem dedit anno 1592. Mali initio.

IRIS FLORE ALBO.



Quia purpuream vulgarem Iridem rectē noris, is nullo negotio hanc albam assequetur: nullam quippe in radicibus, foliorum florumque forma differentia notabilem animaduertimus, in quibus tamen verisq; coloris non modicum est discrimen: folia enim colore ad glaucum magis accedunt.

Descriptio

florēs paucos, sed eo tamen grato odore præditi, lacteo candore perfusi sunt, extimorum costis non minus quàm Purpureæ extra virentibus, quibus intus lutea crocomata respondent, inorum autem foliorum margines luteæ stric percurrunt.

Tradit Ruell. inueniri frequenter Iridis florem emaculati candoris, cuius radix cum Illyrica de odoris principatu contendat.

Cord. in Diosc. & Obs. Sylv. Iris Illyrica flore candido. Non placet Cordum Illyricam astruere flore albo, ut postea dicetur.

Brunsch. & Geln. hort. Iris flore albo.

Est autore Matthiol. in sativorum genere, quæ niuci candoris flores profert, quam in pluribus Hetruriz locis vidit, cuiusque radix fragrantia & virium robore Illyricam ferē æquat.

Dodon. Gall. Iris: altera flore albo, Iris Florentina, Officinis Icos: Gall. Flambe blanche, Germ. weiß Violwurcz & weiß schwertel. Belg. witelisch / quæ omnino præcedenti similis, foliis, caulibus, forma florum & radicum, nisi quod flores non habet diuersos colore, sed niucos: Radix pauld̄ minor, & optimi odoris maxime sicca. Cur Florentina potius censenda sit ea quæ albo flore quàm altera, non vidco, quandoquid ibidem copiosa, nec etiam radix nobis observata.

Iris Florentina.

Dodon.

minor, sed potius maior.

Plantin.
p. 100.

Plant. loc. p. 59. Iris nostras vulgaris candidis floribus. Lob. 32. Adu. 11. Teut. 84. Figura strigosa Iridis apud Plantinum non placet pro alba, alba enim non vidi strigosam, sed cum crassis nodosis radicibus. Lobelius posuit eam figuram in Belg. pro vulgari filu. Iride; hinc fortè accidit ut tr. C. Bauh. duas fecerit Irides albas.

Camer. in hort. Iris alba Illyrica vulgò, vel potius Florentina. Item apud Matth. German. Iris Florentina cum floribus albis.

Tabern. histor. & Leon. Iris alba weiß weiswurtz. Item Iris Florentina weiß weiswurtz. Duas proponit figuras Tabern. sed non demonstrat in quibus differant.

Tab. 100.
C. B. lapfus
Gart.

C. Bauh. Phyt. Iris 2. siue albo flore, Matth. satina niuei coloris, Lob. nostras vulg. candidis floribus. Iris tertia, siue Florent. alba, Gesnero Florentina: Cordo Illyrica: radices siccatæ non corrugantur & differt à præcedenti, quod hæc radice sit minore: Cur Frater separet Iridem Florentinam albam à Matthioli alba nescio: quum Florentia sit in Hetruria vbi obseruauit Matth. flore albo: Gesnerus non dicit Iridem Florentinam cuius meminit flore esse albo: Florentia obseruauit frequenter vtriusque coloris radices quæ solent pro Iride Florentina vendi, sunt maiores, crassiores, solidiores, candidiores, odoratiores, quàm vulgaris nostratis: an regio solù ne sit tantum in causa diuersitatis à nostra asserere non ausim, vel an sit species diuersa, vidi aliquando radice etià vendi pro Illyrica Iride, quæ sanè solida & odorata, sed minor Florentina: Cordi verba præcedenti capite adduximus, vbi non dicit an Illyricæ radix sit minor vel maior vulgari.

Locus &
tempus

Iride alba aliquando primo Vere collem plenum reperit Camer. circa Priuernum urbem in itinere Neapolitano. Vehementiores hyemes apud nos ægrè ferre potest, & in primis à niue liquefacta, & rursus gelascente tutanda. Iris alba in Austriæ & Vngariæ hortis rarior, & Clusii tantum operâ illis cognita, acceptis è Belgio radicibus.

Iris Florentina.

Basilæ accepimus datam ex horto insignis Pharmacop. Ioh. Heitzman, quam plantauimus Montb. in Horto II. E. C. eam primò videramus, Bononiæ & Florentiæ in horto Nic. Ferrariensis & aliis flore in totum niueo, exceptis apicibus luteis in medio foliorum: postea obseruauimus Genevæ & Lugduni. Non videtur nobis propter colorem album particulatim vocanda Iris Florentina, quum vtrique abundant Florentini, & vtramque indiscriminatim sumant à bonitate autem potius vtramque Florentinam de nominati, non propter colorem: quanquam vtriusque radix soleat etià candidior crassior & solidior vulgari esse. Narrabat mihi olim insignis Pharmacop. Valerius Doutez, qui in Illyria siue Sclauonia fuerat, Iridem ibi dari flore albo potius quàm purpureo, spontè in montibus provenire & radicem similem Florentinæ virentem gustu esse, non minùs seruenti quàm nostras, eam quæ in humidioribus locis nascitur deteriore quæ non possit siccare.

Illyrica.

Iris maior latif. candida cum multis foliis purpureis Clusio 27.

Iris maior latif. 27.

Lata pedalisque fere longitudinis folia habet elegans aliud Iridis genus, Iridis Aicholtzianæ foliis prorsus similia, radicem etià & caulem,

qui perinde atque in illa, ad foliorum latus ex radice nascitur pedalis, tenuis, in quo singulares aut gemini flores à vaginulis ex pallido virentibus prodeunt, forma Aicholtzianæ similes, sed colore variantes, nam terna folia propendunt candidant, purpuræ exoletæ venis ab infima eorum sede per latera excurrentibus vsque ad extimam simbriam subcauleis villis constantem, tria autem incumbunt & ligulam siue stamina regentia, alba sunt, eorum tamen gibbo subcauleo: terna surrecta etià candida, & ab infima, sed multis purpureis venis distincta, donec in latitudinem expandi incipiant: flori successit triangulum caput binas pænè uncias longum, crassiusculumque quod maturitate dehiscens lulio, semen ostendit rugosum, subfuscum, erui magnitudine: radix hieme folia non retinuit.

Floruit Aicholtzio primò Maii initio, Anno 1584. vnica quam habuit planta, eadem arcola in qua 2. Aicholtziana reposita erat, & quæ etiam oppositam arcoleam occupabat. Itaque non dubium quin eius semine deciduo nata sit, tamen huius flos odoris gratia commendabilis non fuerit, qui tamen in altera deprehendebatur. Mirum enim in modum variant quæ ex semine nascuntur Irides, non secus ac præcoces & dubiæ Tulipæ, atque Papauera, ut longà experientia didicit.

Tempus

IRIS LVTEA, FOLIIS FLORVM repandis variegatis.



A Mena Aest florum huius Iridis elegantia, alterna ex extimis tota lutea sunt folia, nigricante purpura circa medium guttata; alterna pulcherrimè virgata, striis suprema folii parte intrinsecus atro sanguineis per album Campi discurrentibus: inferna verò eiusdem faciei parte ad simbriæ

Descriptio

crocatæ latera vtrinque minùs saturis lineis, crebris admixtis concoloribus guttulis, luteolum campum obliquo ductu pingentibus, extrinsecus verò ex luteo herbida sunt: intima terna folia bifida penitus lutea, tergo appressas habent ligulas herbidas, apicibus lacteis.

Hanc sic describit Clusius. Iridi latifoliae maiori 15. rugosa sunt folia, minùs tamè lata, longa, & viridia quàm in 14. secundum radicem omnino interdum purpurascentia, è quorum medio caulem promit cubitalem, lauem, viridem, aliquot ramulis donatum, quibus insident flores è vaginulis emergentes, magni vel prorsus inodori, vel Oxyacanthæ vulg. florum instar odorati, coloris varietate commendabiles: nam tria folia quæ

quæ sunt speculant & atolluntur, rard se mutuo amplectuntur, aut cacumine nutant, sed plerumque (nisi marcescere incipiant) recti sunt, ut in Iride bulbosa, nonnihil tamen conuexa, angustiori ora, lutei coloris, quemadmodum illa quæ ligulas fimbriamque contegant terra ad terram inflexa, circa basin & exortum pallent, reliqua partem adicant, multis tamen purpureis radiis ab ipsa sede ad extremas usque folii (quod plerumque saturatius purpureo in earum stirpem floribus, quæ circa radicem nulla purpurea sunt suffusa) pallidas oras, eleganti pictura decurrentibus: villosa fimbria, qua parte integitur, lutea est, extrema verò exalbida, pallentes ligula, magna triangulari & obtuso aliquantulum mucrone prædita capita, semini Orobi magnitudine, fuscum, rugosum continentia: radix nuda, vulgaris Iridis instar, foris flavescentibus multis virisque nascentibus fibris firmata, quæ repurgata & exsiccata, odoratissima est, & cum lilyrica, quæ in Officinis habetur, odoris gratia contendere posse existimatur.

Est hæc ipsi in Pann. Iris 4. varia caulifera, Pannonica, sub quo titulo eam & Tab. exhibet. Lob. Obs. Iris lutea variegata. Icon. Plant. p. 66. Teut. 9. varia species. Flores sunt lutei Chamæridia Nonspeliaca tribus repandis foliis peregrina elegantia striatis, obscure violaceis. In Belgii hortis provenit munere Clusii.

An Matra. Ital. cum magn. fig. Iris flore luteo, quam in multis hortis Bohemæ vidit, & non vult intelligi: Acorum vulgare: Oportebat demonstrare discrimen inter Iridem luteam & Acorum vulgare, si poterat.

C.B. Phyt. Iris 6. siue sativa lutea, Matth. Iris sativa floribus nuctis. Iris 10. siue varia caulifera, vel 4. Clus. Iris 16. siue lutea variegata Lobel. Iris 17. Variegata Camerarii illustrata.

De hac Camer. hort. ait: Iris variegata è luteo & purpureo obsoleto flore, quem in locis natalibus non promit: in hortum vero translata, contra aliarum sylvestrium plantarum naturam, altero anno florere: & quotannis postea, ac longè latèque serpit. Idque verum esse experientia me docuit, cum eius generis plantas ex monte quodam Franconie propè arcem Comitum de Castello mecum deportassem in hortum. Foliis est Acori vulgaris, id est, Aquaticæ flauæ Iridis, sed latioribus, & rarissimè ut aliorum erectis, sed plerumque mucrone languido & incuruo.

In montanis supra arcem Dini Georgii, herbido solo, & collibus Scamphen imminentibus, in Vngaria transilvaniana, aliquot miliaribus supra Posonium, primùm observabat Clusius, genus illud cuius folia purpurascens colore circa radicem non sunt perfusa: deinde frequentius utrumque genus in Leytenberg monte supra maderstorf, & siccioribus pratis Sopronio vicinis. Crescit etiam in collibus non procul ab Entzestorf in Lange-thal, Magnif. D. de Entzestorf. Floret Maio: sub lunii linem semen maturum. Est mihi in Horto E.C. pulchra Iris primùm visa Basileæ: postea Sturgardiæ in horto Ducis Wirtemb. Basileæ in horto Guarini florentem vidi Maio: folia vulgari Iridi ferè similia, caules magni, flores lutei, qui in repandis foliis pulchras habent strias violaceas: habui Basileæ & Sturgardiæ.

Iris maior latifolia Osbrleucos Clusio 28.

Iris maior latifolia 28

Iris maior latifolia 28. multa habet folia, inuicem

amplectentia, cæterarum Iridum instar, vincta lata, inter quæ pedalis geniculatus, teres, viridis exilis caulis, summo fastigio sustinens binas membranaceas vaginas ex viridi pallescentes, è quibus emergit flos reliquis Iridum generibus tota similis, colore autem diversus, nam ex albo pallescit, siue *exilis* luxur est, & terna repanda folia ab imo ad extremas oras flavescentibus venis sunt distincta, fimbria albicante, sed quadantenus à bifidis foliis quæ simili colore sunt prædita, gibba tamen docti nonnihil purpurascens integitur, flavescente: surrecta folia ab imo gracilia, internâ parte multis in latera sparsis venis obsolete purpurascens sunt distincta, ubi verò sese in latum expanderunt, *exilis* sunt coloris.


Nullum in hoc flore odorem deprehendi: sed eius stirpem Maio florentem observabat Clus. Francofurti in Myleri Pharmacopœi horto. Ei similem, nec vlla ferè in re differentem etiam alebat, foli flores discrimen faciebant, qui paulò candidiores videbantur. Non dubium est multè plura inueniri maioris Iridis genera.

Iris maior latif. surrectu floris foliis flauis & purpureis lineis distinctis Clus. 20;

Iris maior latif. 20. Clusio à Boissor missa, quæ biennio pòst duntaxat florem tulit, à Decima nona, nec gracilitate caulis, qui in ramos etiam diuisus, nec angustia foliorum, nec radice differt: flores similiter magnitudine pares habet, sed diuersi coloris: nam terna ad terram inflexa, diluti, & quidem obsolete purpurei sunt coloris, multis saturatioris purpureæ venis à fimbria ad oras se spargentibus: fimbria flauis staminibus constar: bifida folia illam regentia obsolete flavescent: terna surrecta infernè angusta flaua etiam, sed purpureis venis distincta, latiore autè parte pallescentis coloris, quodammodò tamen suffusci, lentissimè, & quæ vix apparet, purpurâ: Sambucina odorem refert, sed paulò grauiorem.

Iris Clusio 20.

IRIS LATIFOLIA MAIOR SVSIANA VEL Chalcedonica, flore maiore variegato Clusio prima.



Sena aut 10. Scena habet folia, Iridis Lusitanicæ biflore foliis non ablimilia, mutuo sese ut in aliis Iridum generibus amplectentia: è quorum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rotundus, geniculatus, digitalis crassitudinis, florem sustinens omnium quos unquam in Iridibus con-

Descriptio

spexerim maximum, nouem, ut reliquorum, foliis constantem, colore tamen ab illis differente:

nam tria ad terram inclinata folia crassa sunt, inferiore parte omnino nigra, nisi quædam venæ ex purpura candicantes intercursarent, ab infima basi ad medium usque, nigri panni instar, medium folium occupante, toris multo dilutiora sunt: terna illa minora eis incumbencia quæ ligulas regunt, fornicata & bifida sunt, & eiusdem ferè coloris, paullo tamen dilutioris, licet ad obscuram purpuram accedentis: tria surrecta, palmaris sunt amplitudinis, & membranaceæ præ tenuitatis, plurimis lineis ab infima basi ad extremum usque folium excurrentibus, partim nigricantibus, partim ex cineraceo candicantibus, ut Americani Pauonis expansam caudam ferè imitentur, internè circa vnguem nonnihil hirsuta. Nullum *edrem* in hoc flore deprehendi, sed sola coloris varietate commendabilis est. Illi succedunt, sed raro admodum, *capita* trigona crassa, vncias tres, quatuor & quinque interdum longa, numerosum *semen*, rugosum, fuscum, Pili ferè instar magnum, continentia.

Nomen

Iris maior latifolia sive Susiana Clusii, quæ ob floris amplitudinem & venustatem primum locum merito sibi vindicare videtur, Constantinopoli missa est *Alaia Susani* & *Alaga Susam* nomine cum hac additione, *fiori belli pintati, et anno bono odore*, h. e. eleganter picti flores boni odoris: atque *sa si r bianco et negro*, id est, florem fert ex albo & nigro varium: elegantem sanè florem comperimus sed nullum gratum odorem deprehendimus. Ego [ait Clusius] quia ex Susa, Susianæ Prouinciæ Metropoli, primum in hortos Constantinopoli vicinos ultra Bosphorum sitos illatam puto (nam id nomen indicare videtur,) Susianam nūcupo. Hiemis iniurias difficilior fert in horto reposita reliquis Iridis generibus, quod, ut & plerique alii, nostro damno experti sumus. Rarius etiam cæteris floret, & vnicum, ut plurimum, florem profert, Maio: semen maturum Iulii initio.

Lobel. Obs. p. 14. Iris Chalcedonica maxima variegata, luculente magnitudinis, maculis fortuitis, transversis & obliquis, giluis, cinereis & puniceis, foliis tantillum, gladii ritu, vndantibus. Cætera cuncta Iridi vulgaræ aut Dalmaticæ similia. Vidimus Bruxellis. Plant. icon p. 67. Iris Chalcedonica variegata L. 34. T. 92.

An Camer. hort. Iris Bizantina à C. D. Io. Aicholtzio communicata, quæ hyeme in fistilibus apud nos asseruanda est.

Tab. 20.

Tabern. icon. Iris Chalcedonica variegata *weilwurz mis mancherley farben tyfflein beschreyet*. Item Iris Chalcedonica 2. *wielwurz von Constantinopel*. Quam intelligat Iridem Tabern. vel eius Compilerator nescio, non describit.

C. Bauh. Phyt. Iris 19. sive Chalcedonica maxima.

IRIS BIFLORA LVSITANICA flore violaceo Clusio 22.

Iris bifl.
Lob. 22.

Iridi Lusitanicæ seu bifloræ 22. folia sunt vulgaris breuiora & angustiora: alioqui non valde dissimilia: in summo pedali caule *flos* è purpurascens vaginulis prominet, nouem, ut aliarum Iridum flores, foliis constans, violaceo omnino, siue saturatioris purpuræ coloris, qui in inflexis & propendentibus foliis intensius nitet, viollosa illa simbria quâ donata sunt, proflus can-

didâ. Vnicum autem singularem caudes plerumque florem ferunt, interdum, sed raro, alterum, rarissime tertium, singulari quemque vaginula

Descriptio

inclusum, iucundissimi odoris, & Oceanum hem Liliolum conuallium cognominata emulantis: conspectus aliquando mihi eius flos duodenis foliis constans, ut interdum Natura in floribus luxuriat: semen angulosum, rugosum, in triangulari capite satis crasso, sed rarius fert: radix illi subest, nodosa, genicu-



lata, solida; pollicaris crassitudinis, gibba, intus candida, ingrati saporis initio, & paullo post feruidissimi gustus, multis fibris summa tellure hærens, & subinde in plures propagines è lateribus nascentes diuisa.

Nascitur multis Lusitanicæ locis supra Tabum vel pingui solo & in aruis, ut circa Conimbriam, celeberrimam Lusitanicæ urbem, ubi illam florentem mense Nouembri eruebam, vel salebrofis & lapidosis locis, ut circa Caxcays maritimam urbem & portum, unde delatam Olyssiponem, ad amicos, deinde in Belgicam misi, & inter chartas repositam cum aliis plantis ipse detuli: nam licet integro anno istic latuisset, terræ tamen commissa in horto Ill. V. Caroli Audomati, sequente Vere floruit, postea etiam Autumno, cuius rei causâ bifloram cognominavi.

Loco
tempus

Lob. Obs. & Ic. Pl. Iris biflora Lusitanica, an Astragalites Actii l. 13. c. 3. nostro Belgio, Hispanico delata solo, etiam inquilina facta est: Vere & Autumno florem odoratum violaceum, singulis caulibus cubitalibus & sesquicubitalibus, singulum aut alterum, villosa candore simbria tum proferens: densa breuique radice, frangenteque contumace, facie & foliis Dalmaticæ similis, sed magis sparsis.

Astragalites
Actii

C. Bauh. Phyt. Iris 13. Vere & Autumno florens.

Camer. hort. Iris Lusitanica biflora à Clusio depicta in Hispanicis & ad me missa.

*Iris Illyrica biflora similis Clusio 22.
flore purpureæ.*


Non multum à Lusitanica biflora (inquit Clusius) differre videtur, quam aliquando Venetiis accepit C. V. Io. Aicholtzcius Iridis Illyricæ appellatione, in cuius cultissimo horto florentem Maio conspiciebam. Quina enim aut sena ex singulis radicis capitibus promit folia, illius foliis simillima: *caulem*, raro ampliorem, qui in summo è vaginulis purpurascens florem promebat Lusitanicæ forma per similem, paulo tamen maiorem & teneuiorem, nec adeo suavis odoris,

odoris, licet ad eum satis accederet: nullum *semen* obseruabam: *radix* nodosa & geniculata vt superioris, odoris, cum virens est, ingrati, exsiccata verò satis grati: & insipidi initio gustus, postea tamen feruidi, faucibusque vrentis.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 14. siue Iridi bifloræ affinis.

IRIS FLORE VIOLACEO FOLIO VIRENTE, an Clusii 25. caule foliis nudo.

Describe.



Iris quædam est, foliis latis virentibus, ad colorem foliorum Spatulæ fortiter accedentibus, quæ striæ manifestæ percurrunt. Flos culmo insidet dodrantali aut pedali, totus violaceus, sex foliis constans alternatim repandis, iuxta quorum cilia partim alba, partim violacea, striæ albæ excutunt, sur-

rectorum foliorum dorso singulo singula apprimuntur ligula, extremo bifido. Inter surrecta verò & repanda folia apices oblongi, cærulei, farinacei, purpureis insident pediculis. Radix crassa, transueria, internodiis distincta, plurimis fibris crassiusculis ad summam basim donata: substantia molli, aquea, sapore amariusculo paulo post fauces vrente, nullo odore notabili virens.

Obseruata mihi primum in Vireto Nobiliss. D. Baronis ab *Aigle pierre*, cui ex Belgio allata dicebatur. Mihi ab hinc per plusculos iam annos in horto Ill. E. C. Montb. culta. Floret Aprili.

Considerandum an iam descripta sit Clusio Pann. sub Iride 7. siue caulifera purpurea. Et post. hist. sub Iride maiore latifol. 25. de qua inter alia hæc habet. Peculiarem autem habet hæc præter cæteras Irides notam, vt nulla folia per hiemem retineat, sed omnia flaccescant & exsiccantur, nudaque conspiciantur, deinde ineunte Vere noua germina proferat.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 12. siue hyeme folia amittens.

Iris maior latifolia purpurea caule nudo
alia Clusio 26.

Iris maior latifol. 26. Clusii, sine dubio ex eius semine, quod cum aliarum Iridum seminibus & multarum radicibus, ante aliquot annos in Belgicam ad amicos Viennæ mittebam, prognata est elegans Iris, quam ex Anglia rediens florentem conspiciebam Augusto in horto Nobilis Viri Io. de Hoboke, archigrammatei Antuerpiani: per omnia respondebat 25. nisi quod folia circa radicem saturatius purpurascere mihi visa sunt: an porò hyeme folia amittat, me fugit.

Tom. II.

IRIS HUMILIS LATIFOLIA COLORE violaceo, & saxatilis eadem, nec valde humilis, Clusio primum genus. Chamæiris niuea.



Iris hæc pusilla plantula est, radice crassa, alba, rugosa, acri: à qua folia exeunt aliquot, Iridis vulgaris foliis similia, semunciam lata, quas trèsvicinas longæ: caules brevissimi, quadrantales: flos violaceus & purpureus, vt in Iride vulgaris, sed per omnia minor, nec odore aliquo excellens.

Hanc sic tradit Lobelius: Minima & rarissima omnium Iridum: radicis plexu, substantia densa & colore Illyricæ non abhæmili, caule verò nullo, præsertim natalitii, folio latiusculo rigido, mucronato, palmum alto, cuiusmodi Gladioli: flore, semine, siliqua, Xyridis fortiter.

Hæc mox quæ

è terra assurgit humilis remanet, proindeque nonnullis Chamæiris nuncupanda videtur. Ex quo eam è Montpelienti agro in Belgium & Angliam transmissi, frigido humentique solo excepta non secus ac innumeræ calidarum regionum peregrinæ stirpes, soli & cæli temperie varias subit mutationes. Caulis illi quippe dodrantalis nonnusquam pedalis, flores albi aut lutei, aut violacei, alibi caule vidui, dilutè rubentes, violacei, striati, ex luteo pallentes, obseruantur. Commodam habet iconem Aduers. Iris paruz, qualis spontè prouenit. In Obs. aliam ad cultam siue satiuam. Vtræque est Icon. Pl. pag. 54 cum his titulis 1. Perpusilla Iridis latifolix varietas. Clusius pro modò dictis Iridibus Iconem aliam ponit, nempe eam quæ est Icon. Pl. p. 65. sub hoc titulo. Chamæiris niuea aut candida Lobel. 33. Teut. 91. De Chamæiride autem Latifolia, de qua hic agimus, scribit hæc Clusius in post. hist. Iridis genus humilior in Lusitanæ saxosis & mari-

Ppp

ad autem affinis locis supra Olyssiponem obser-
uabam, cuius folia eiusdem ferè cum Lusitanicâ
biflora erant latitudinis, sed breuiora: radix illi
similis, geniculata & obliqua: Flos mihi non
conspicuit, mensis enim erat Nouember, sed fili-
quas siue capita acuminata, inania in humili &
vix suprâ terram assurgente cauliculo reperi-
ebam triangularia, magna, pro plantæ proportionem.
Similis verò plantæ semen ad Ill.V.lo.de Bran-
cion missum est à Lobelio è Mompelio: ex quo
natæ plantæ superiori ferè similes, quæ florem
dederunt vel cæruleum dilutiorem & quasi cæ-
lestem, ternis labris deorsum inflexis paulò sa-
turationibus, aut candicantem omnino, aut pal-
lentem, eumque modò dilutioris & quasi exalbidi,
modò saturationis & ad flauū proximi coloris, aut
purpureum siue violaceum, & illum etiam disse-
rentem: nam vnus color plantæ nigræ violæ,
alterius prona in terram terna folia, ab ipsa basi
& exortu, ipsaque fimbriâ flauâ, albas & satis la-
tas venas ductas habebant, & variegatum Lima-
cis dorsum ferè referebant: semen in triangulis
magnis capitibus, Orobi magnitudine, pallidum,
rugosum, oualis formæ. Omnium verò flos ino-
dorus Aprili plerumque aperitur cum sequenti-
bus.

Pro Iride sua latifolia Clusius ponit iconem
Chamæridis niuæ aut candidæ Lob. Icon. Plant.
pag. 65.

C. Bauh. Phyt. Iris 11. Dodon. hist. Iris mi-
nor. Clus. Hisp. Iris humilis latifolia flore
purpureo siue violaceo. Item Pann. Chamæ-
ris latifolia maior coloris saturationis nigræ vio-
læ. In hist. post. Chamæris latifol. genus 1. Iris
minor *exauis* plerumque purpurea. Item apud
March. Germ. Iris sylv. humilior purpurea maior.
An Tabern. Icon. Iris siluestris minor latifolia
Flein breytletterich himmel schœrtel, cuius fi-
gura non placet.


Loens.

Plurima, autore Lobelio, oritur in agro Nor-
bonensi, locis aridis & saxosis, secus specum il-
lam sesquimiliare Monspelio distitam, via quâ
Frontignanam itur, in cuius, & rupium commis-
suris frequens adolescit prope Forulam.

Est mihi in horto E.C. Montbelgardi.

IRIS HUMILIS LATIFOLIA MAIOR acaulis: Clusio Chamæridis latifolia genus alterum.

Descriptio



Chamæri-
des [in-
quit Clusius]
prorsus *exauis*,
siue excau-
les, nunc des-
cribendæ re-
stant, quarum
videlicet flo-
res nullo cau-
le sustentur,
sed succulen-
tis & infir-
mis duntaxat
pediculis inni-
runtur, ut Cro-
ci, Colchici,
& similium.
Istarum etiam
duæ differen-
tiæ: Vna enim

maioribus latioribusque est foliis, latius maio-
ris foliis latitudine vix cedentibus: Altera paul-
lò minoribus & angustioribus, tamen Angusti-
foliæ Iridis, quam deinde describemus, foliis la-
tiora sunt.

Harum igitur maior breuius est foliis, inter-
terdum tamen etiam pedibus, Iridis vulgaris
modo latis, & secundum radicem magna ex parte
purpurascens; inter quæ multi flores è vagi-
nalis prodeunt singulari pediculo dodrantalique
fulti, vulgari paulò minores, Lusitanicæ bifloræ
æmuli, tum magnitudine, tum colore, qui satu-
rationis nigræ violæ est, præsertim tria folia ter-
ram spectantia, quæ villosam fimbriam, usque ad
bifida illa, quæ ligulas regunt, folia, ex cæruleo
purpurascens habent, sub ligulis verò, siue
staminibus, luteam: omnia autem florum folia,
tam quæ sursum attolluntur, quàm quæ repanda
terram spectant, inferiore & sessili parte, albis
quibusdam radiis variata sunt. Sunt autem eius
flores, vel aliquantulum odbrati, vel inodori:
triangula capita magna, mucronata, in quibus
semen orobi magnitudine pallescens, quod exsic-
catum rugas contrahit & fuluescit: radix no-
dosa est, ut reliquarum Iridum, & adnatis se pro-
pagat. Illius semine natū est Boissoto Bruxellæ
Chamæridis latifolia maioris genus, matri per
omnia simile, præter florem, qui non purpureus,
sed cæruleus elegans fuit.

Icon quam Clusius exhibet pro Chamæride
latifolia maiore ea est Ic. Plant. pag. 65. sub hoc
titulo. Chamæris latifolia flore rubello Lob.
31. Teut. 91. Non est acaulis quamvis talis in de-
scriptione dicatur ipsa planta.

Lob. Obs. Irides Austriacas humiles speciosas
rubris floribus & violaceis odoratis Charisf. viro
D. Brancioni Viennâ misit Clus. vna cum Cha-
mæride purpureo odorato flore.

Parvitas

Chamæris
flore rubel-
la.
Irides au-
striacæ Lo-
bel.

IRIS HUMILIS LATIFOLIA MINOR, & eius varietates quinque.



Chamæri-
di latifo-
lie minori
Clusio testis,
breuiora au-
gustioraque,
paululum sunt
folia, qualia
Chamæridis
Latifoliae His-
panicæ aut
Gallicæ, de
quibus initio
huius capituli:
flores paulò
minores: capita
triangula &
mucronata e-
tiam minora:
forma minus.
In floribus
summa varie-
tas: licet ferè

Descriptio

omnes fimbriæ villos supra stamina cæruleos ha-
beant, infra verò ut in modò dicta luteos. Ex
his verò paucas duntaxat adnotauimus, nam om-
nes, valde difficile.

Vna saturationis purpureæ colore nitentem ha-
bet florem, interdum etiam dilutiorem, illumque
odoratum, hunc minimè: ternis foliis quæ attol-
luntur

suntur & inflexa quodammodo supernè se mutuo contingunt, in utraque, modo orbicularis, modo longioribus & bifidis.

Chamaeiris latifolia minor
Chamaeiris latifolia
Altera odorato est flore, cuius inferiora labra nonnihil purpurascunt, surrecta verò cærulei sunt coloris.

Chamaeiris latifolia
Tertiz flos quodammodo rubet, interdum dilutior & suavi quadam rubedine velutique carneo colore præditus est, præsertim foliis sursum erectis: villosa fimbria superior pars albicat, inferior lutea est: est autem odoratus, aut inodorus. Horum omnium stamina cærulea.

Chamaeiris latifolia
In quarta floris color pallescens, nonnunquam exalbidus: folia sursum spectantia ab ipso statim exortu in utroque genere purpurascens quibusdam lineis decorantur, deorsum verò indurata, in pallescente exalbida sunt, in albicante autem viridi colore persufa: pallescens item Oxycanthæ vulg. floris odorem prorsus æmularur: alterius etiam odor.

Chamaeiris latifolia minor
Quinta solo floris colore à Quarta differt: is enim flavescit, & superiora folia purpurascens virgulis siue radiis exornatur, propendentia labra vel nigricante, vel diluta purpura in medio infecta sunt: odoratus huius etiam est flos. Stamina porro huius & quartæ alba sunt. Omnium verò foliola stannina & fimbria, magnam partem regentia, bifida sunt, binasque pinnas surrectas, ut ea quæ in Iridibus bulbosis, habent. Purpureæ præterea, albæ, & versicolores: folia secundum radicem plerumque purpurascunt.

Chamaeiris latifolia
Nascuntur omnes in nudis & apertis collibus Pannoniæ & Austriæ: Cæterum tamen insignem, inquit Clusius, varietatem ex semine deciduo spontè gigni non est dubium. Nam versicoloris semina à me in hortulo terræ commissa (illius enim ob floris elegantiam periculum facere volui) & pallidas, & albas, & versicolores matris similes protulerunt, & alias præterea ad eam quidem accedentes, sed leuibus quibusdam notis inter se discretas, quales verbis exprimere difficillimum, verèque de iis illud Poetæ dici posse existimem:

facies non omnibus una,

Non diuersa tamen, qualem decet esse sororum.

Chamaeiris latifolia minor
Clus. pro Chamaeiride latifolia minore, prima, excauli, iconem proponit cui caulis foliatus, quæ in Iconibus Plant. pag. 42. posita est sub inscriptione Iridis violaceæ parua Lob. 13. T. 89. Est etiam cum caule apud Clusium ic. cui super scriptum, Chamaeiris latifolia minor 4. quæ Icon. Plantini pag. 66. inscripta, Chamaeiris altera lutea T. 91.

Iris humilis latifolia minor tenerissima, Clusio Chamaeiris latifolia minor sexta.

Chamaeiris latifolia minor
Chamaeiridem latifoliam minorem sextam infra Budam in Pannonia Mæsiæ finitima Decembri erutam, dum Constantinopoli Viennam rediret Ianuario sequente mihi (inquit Clusius) Stephanus von Hausen dono dedit, quam propter teneritatem fistili credidit, & adèd diligenter fouit, ut Maii sequentis initio florem dederit: à Latifoliis autem minoribus iam descriptis nec radice differt nec foliis, quæ circa radicem non purpurascunt: nec eius flos illarum floribus dissimilis est, plurimum enim ad Quintum genus accedit: labra tamen propendentia obsoletum colorem pallido permixtum habent, & ab eorum ima parte usque ad extremam fimbriam quæ pallida est, purpureæ exeruntur venæ: pinnata

Tom. II.

terna folia quæ alba stamina tegunt, ex pallido albescent: sursum verò erecta pallida sunt, circa imum tamen obsoletè purpurascens radiis aspersa. Illo quidem anno exortus fuit. Sequente tamen breuem admodum caulem, vix ternos digitos supra terram eminentem habuit, cui insederunt bini flores. Eam cum reliquis ferè Iridum generibus, & selectissimis quibusque aliis stirpibus penitus corruptis anni 1585. asperissima hyems. Cæterum apud Belgas multò plura Chamaeiridis latifoliarum genera aluntur, semine nata, præsertim Bruxellis. Inter cæteros autem Ioh. Meirens, illius urbis Medicus, diligenti cultura summam in ista stirpe varietatem adquisiuisse perhibetur. Aliquot earum genera communicabat mihi 1590. anno N. V. Io. Boissot: sed cum quædam perierint, an cum superius descriptis illarum aliqua conueniant, nihil affirmare possum: duarum tamen quas conseruaui, & quæ biennio post florem dederunt: ut quarundam etiam aliarum, quæ in meo hortu spontè natæ, eodem anno floruerunt, historiam adiciam.

IRIS HUMILIS LATIFOL. MINOR ELE-
gantiss. variè picta, Clusio Chamaeiris 7.



Chamaeiris latifolia minor
Chamaeiram clarifoliam minorem 7. Boissot ad me mittebat, inquit Clusius elegantissimam: quæ radice quidem neque foliis à reliquis differens, neque etiam floris formâ: sed color diuersus, & adèd variè pictus, ut difficile sit, cum exactè verbis exprimere: &c. Flori succedebat longiusculum triangulare caput, quod pluuiæ corruperunt. Florem cum aliis Chamaeiridibus Aprili dedit nulla odoris gratia commendabilem.

Clusius iconem nouam proponit.

Iris humilis latifolia minor flore vario rursus foliis valde incuruis: Clusio Chamaeiris 8.

Chamaeiris latifolia minor
Chamaeiris latifolia minor 8. auctore Clusio, aliquam affinitatem habere videtur cum septima siue elegantissima ei spontè nata Fracofurti: florem cum aliis dedit Aprili. Nouem autem ut reliquæ folia habet, quorum tria deorsum inflexa & tertiam spectantia, longa, & præter reliquarum Iridum morem adèd incurua sunt, ut extremo mucrone floris pediculum aversa parte amplectantur: colorem verò habent infimâ parte flavescentem, deinde dilutè purpurascens, saturatioribus tamen venis distinctum, ab infima basi & villosâ fimbriâ candicante, flavescentibus apicibus donatâ, quàm integit bifidum foliolum exalbidi & pallescentis ex dilutè cæruleo colore

PPP 2

quali etiam surrecta tria sunt folia: odor se-
horum Sambuci aut Thalictri.

*Iris humilis latifol. flore pallide albican-
te & vario, an Clusio Chamæiris
latif. minor. 9.*

Logis

Tempus

Chamæiris
latifol.
Clusio 9.

Est nobis Montbelgardi in horto Ill. E. C. Iris
parua latifolia flore ex luteo pallido & albican-
te ac vario, quæ nobis missa Vezuntione à Dⁿⁱ
Belle fontaine: Eam prius videramus non lon-
gè à Marnant in Burgundia in horto Nobilis ab
Aigle pierre anno 1588. florebat Aprili.

Considerandum an hæc non tradatur per
Clusium in post. hist. pro Chamæiride latifolia
minore nona, de qua ait: Quam à Iacobo Pla-
teau accepisse scribebat Boissotus, radice, foliis,
floris formâ, cæteris Chamæiridibus erat similis.
Eius tria folia terram spectantia *anagallis* erant
coloris, ab imo ad extremam usque fimbriam
purpurascens radiis aspersi: sub fimbria ve-
rò, quæ folium sese magis pandit, purpureâ ma-
culâ erant notata, radiatum in latera se spargente,
oræ autem erant exalbida: fimbria ab imo ad folii
inflexionem flauis villis constabat, ubi verò pur-
puream maculam attingebat, albis: bifida folia
eam regentia alba erant, quemadmodum & ter-
na folia sese attollentia, sed neruus medius in
utrisque *anagallis*, infima pars surrectorum fo-
liorum obsoletæ purpuræ radiis distincta, supre-
ma verò, internè paucis notis leuiter purpuras-
centibus infecta: expers autem licet odoris, co-
loris tamen gratiâ non carebat. Illi non dissi-
milis spontè nata Francofurti, quæ eodem anno
flores dedit.

*Iris humilis latifol. minor flore vario
violaceo, Clusio Chamæiris 10.*

Chamæiris
latifol. minor
Clusio 10.

Descriptio

Chamæiris latifolia minor 10. mihi, inquit Clu-
sius, Francofurti nata non inelegans, quæ semi-
pedalem cauliculum proferebat, teretem, genicu-
latum, summo fastigio gestantem membrana-
ceum folliculum purpurascens oras habentem:
è quo emergebant bini flores non magni:
nouem etiam foliis constantes, quorum tria re-
panda basi erant angustâ, foris purpurascens,
internè autem candicante, & saturæ purpuræ
venis distinctâ, usque ad folii inflexionem: labra
verò propendentia ad eam saturi violacei coloris, ut
quodam modo nigrescere viderentur: fimbria
villosa flauescens infimâ parte, reliquâ purpu-
rea erat: terna eam integrentia purpurei erant
coloris, veluti & terna surrecta folia: nullâ
autem odoris suauitate commendabilis.

*Iris humilis latifolia minor flore vario, foliis
inflexis candicantibus, Clusio Chamæi-
ris latifolia minor 11.*

Clusius scribit Francofurti sibi natam Chamæi-
ridem latifoliam minorem vndecimam non ine-
legantem, quæ à tuberosa radice dodrantem aut
pedem longa producebat folia, instar eorum qui-
bus aliz Chamæirides sunt præditæ, lata videli-
cet & mucronata: inter quæ assurgebat cauliculus
duas aut tres uncias longus, sustinens summo
fastigio, veluti folliculum binis membranaceis
foliis constantem: è quo prodibat stros nouem
foliis præditus eiusdem formæ cum aliarum Cha-
mæiridum flore, quorum terna versus terram
inflexa, latiora, candicantisque coloris erant,

ab infimâ sede (quæ angustior) multis venis
ex flauo purpurascens in latera expansis di-
stincta, usque ad extremam fimbriam, siue superci-
lium, usque deinde à supercilio ad extremas oras,
quæ albescens, crassioribus, & coloris purpurei ni-
cidioris: terna verò surrecta, quæ inter illa nasce-
batur, infimâ parte valde erant angusta, venisq;
quibusdam surui & luridi coloris distincta, postea
in latum se pandebant, tenerrimæque erant, & exal-
bidi coloris: terna reliqua, quæ breuiora & in
fornicem convexa, bifidaque erant, aliquantulum
reflexis sursum alis, ligulam pallentem te-
gebant, & fimbria siue supercilio trium propen-
dentium & terram spectantium foliorum im-
minebant, colorisque erant albi, cui subcæruleus
color nonnihil admixtus, præsertim in ipso gib-
bo: odor nullus aut ualde exiguus.

IRIS ANGVSTIFOLIA MINOR

Clusio quarta.

Est nobis Iris angustifolia sicca ex plantis Va-
lerandi Dourez, dodrantalis, ac etiam minor

Descriptio



& maior: ra-
dice obliqua
torosa, sub qua
crassæ fibræ al-
bæ: veterum
foliorum ve-
stigia multa,
folia autem an-
gusta grami-
nea in acu-
men desinen-
tia: caulis ipse
foliis breuior,
in cuius supre-
ma parte ma-
gna capita,
seu siliqua, qua-
les in Xyride
siue Spathula
vulgari, ex te-
nui vagina
prodeuntes:

Quarta Clusio,
nec foliorum, nec florum formâ nec capitibus,
seminibus, aut caule, & radice differt à Tertia: hu-
milior est duntaxat, eius etiam flores paulo mi-
niores, & angustiores, meâ quidem opinione, at-
que etiam dilutiores. Primæ tamen floribus sa-
turatioribus. Illi porro Iridis maritimæ minoris
nomen est impositum, quoniam non nisi locis
maritimis spontè proueniat.

De hac censens scribere Lobel. & Pen. Adu-
his verbis: Iris maritima Norbonensis, an Me-
dium Dioscoridis? &c.

Hæc autem planta eadem videtur cum Xyride
maritima Hist. Lugd. de qua hæc tradit: Inter
permulta & varia purgantia quæ in littora flu-
tus eiciunt, planta hæc sæpius reperitur, quam
Xyrim marinam vocant Herbarii. Radice est
longa, crassa, geniculata, cortice rufo obducta,
multum fibrata: caule pedali, foliis vndique ag-
gestis aperto, longis, virgatis, in cacumine mu-
cronatis. In caulis fastigio tres quatuorue sili-
que prominent, & ipsæ rufescentes, angulosæ, se-
minibus sæctæ velut compressa dilatatis, rufa
membrana contextis, perspicua tamen vtrinque
macula in medio nigra: cum manduntur lignosis
& duris, gustu subatrinentibus.

Nas-

Locus. Nascentur hoc genus Clusii quibusdam Hispaniae & Galliae Narbonensis locis maritimis, veluti non procul Valentia, & monte Serio unde in Belgium delatum, suam varietatem hortos istuc exornat, non minus quam Austriacos, Clusii opera istuc à Belgio accersitum nam illo genere carebant Austriaci.

**IRIS GRAMINEA CUI PEREUNT
quotannis folia.**

Descriptio



P Viletrum quoque; sui spectaculum oculis offert in tanta Iridum varietate, & hec pusilla, ex cuius radice inodora, tenuiore & graciliore quam ceterarum Iridum, nodosa, nigro cortice recta, obliqua, breui tempore magnum caespitem occupante, ut cum difficultate erui queat, caules palmarum tenues sur-

riguntur: flos amoenus è subiecto calyce sex profundis sulcis, totidemque acutis poris exarato, emicat, foliis quidem senis aliarum more constans, sed multum diuersis: primum enim tria extrema folia repanda, extrema ora albis violaceisque striis obliquis variata sunt, inde contractius folium quasi ex isthmo eluctatum paulatim latefcit purpurascens in lateribus, nullà in medio hirsuta simbria, cuius locum supplet linea lata lutea striis purpureis picta, cui extrinsecus respondens costa ex luteo virefcit: hisce incumbunt similiter repanda tria illa bifida folia, quae in medio quidem è viola purpurascunt, à lateribus autem à diluto rubore ferè cinerea sunt, quibus auersa parte appriuntur stammina latiuscula cultrata coloris ferruginei: hisce alterno positu interiecta sunt tria reliquis minora duplò folia, colore violaceo, neutiquam in summo, reliquarum more coeuntia, sed apicibus conuolutis à se inuicem dissita. Odor nobis gratus Prunorum, & Clusio Armeniaci mali. Succedunt capita sublonga & turgida, valde eminentibus costis praedita: Hanc vocamus gramineam propter folia tenuia angusta valde, non rigida, virentia, longa, & quae hyeme accrescunt. Clusius ait se huius Iridis duas differentias deprehendisse, vnam pedalem interdum acquirere caulem teretem, binosque aut ternos in eo plerumque gestare flores, Alterius caulem vix dodrantalem superare altitudinem, & vnicum, magna ex parte florem proferre.

Dr. Illyr. ex Hermol. Est hæc Iris illa Illyrica ab Hermolao visa Padur in horto Felicis Sophiae odore Pruni praematurum.

Dr. Armeniaci ex Malo dr. Cord. Obs. sylu. Herba Irinis foliis Ollingero ex Italia pro Irade Illyrica missa. Iris sylu. altera Matthioli est foliis Gladioli longioribus, radice tenui, lignosa, geniculata, subrufo, inodoraque: Tom. II

caule breui, flore cæteris longè minore, odore Armeniaci Mali. Constat hic foliis nouem purpureis, quorum extrema, superiore tantum parte aureis pinguntur lineis: sunt qui hanc legitimam Illyricam putent, in quorum sententiam etiam iam pridem deuenimus, tamen rem longè aliter se habere postmodum comperi. Quandoquidem praefertur Illyricam nouerim non quod genere vel specie à nostrate differat, sed quod cæli, folique illius conuenientia praestantioribus polleat facultatibus, quod docuit ante Galenū Theophr. l. 9. c. 7. Scribitur iam Iris sylu. altera dicta, & in hortis frequens est, tum ipsius floris amenitate, tum coloris praestantia, tum etiam quod nouis delectentur homines. Sylvestris utrinque generis plurima oritur in Goritienti agro Salutarino monte, & lapidibus collibus inter alia, odore non ingrato, quamuis etiam ambas viderim in campestribus, non longè à Sontis ripis. Iridem esse Illyricam Hermolaus Barbarus existimauit: sed ab Illyrica & legitima Irade eam differre, Antonius Muza in Examine simplicium, satis ostendit.

Illyrica ex Hermol.

Nos (inquit Dodon. h. fl.) Chamæridem nuncupauimus, antiqua de stirpe appellatione, nisi forte Iris sit Astragalites dicta, cui aliquatenus similis est. Iris perpusilla sylu. angustifolia Lob. Obs. quam iamdiu descripserunt, & vocarunt Chamæridem Herbarii nostri, foliis gramineis, rigidis, spichameis & pedibus, pusilligladiosi similibus, floribus expansis, caeruleo-violaceis; aliquando purpurouiolaceis, nouem foliolis conflatis: caulibus palmarum & dodrantalis: radix gracilis, minimo digito duplò minor, acris, gustu Xyridis: in Germania & Belgio frequentior proventus. Chamæris autem inter Irides minima est, folia habet Gladiolo minora, angustiora, pinguiora: radices foris ruffae, intus candidae, durae, gustuque feruentes. Considerandum an sit minima Iris & folia an sint pinguiora quam Gladioli, nobis non videtur.

Contra Hermol. Chamæris

Plant. Icon. pag. 69. Chamæris angustifolia Lob. 34. Teut. 97.

Peregrina Iris Dod. non modò Belgio aut Germania, sed & Italia, ut fertur, est: non nisi in in hortis reperitur. Floret Maio mense: folia hyeme percutunt: Vere erumpunt noua. Prouenit utraque passim in pratis Viennae Austriacae vicinis ad radices montium sitis, praesertim quae in altiore caulem assurgit, pluresque flores profert, nec differre putat Clusius (minorem saltem) ab ea quam Dodonæus Chamæridem simpliciter, Lobellus autem Iridem perpusillam sylvestrem angustifoliam, appellant, Belgicis hortis iamdudum familiarem.

Dodon.

Locus & tempus.

Est nobis in horto Ill. E. C. Iris quaedam parua cui folia hyeme accrescunt. Genearum in hortis habent: folia producentem ibi vidimus Martio & florentem Maio: Geneva adferendam curauimus & plantandam in horto E. C. ubi nobis floruit etiam Autumno: Lugduni habebamus in horto, nec non alii: Placentiae in Italia obseruavi in hortis, & Basilae, audiui qui vocarent Grassilgen, Lilia graminea: quibusdam Cosmofadum dicta fuit.

Facultate & viribus hæc Iris acris & impense calida est, aliisque Iridibus similis.

**IRIS TENNIFOLIA MAIOR FLORE
caeruleo & striato, Angust. 1.**

P Lurimum differt huius radix ab aliarum: Est enim & compluribus fibris albis, cum non-

Descriptio

Ppp 3

Descriptio



nulla acrimonia adstringentibus conflata: folia autem cubitum aut sesquicubitum longa, semicircum lata, quae attritu olivaceum quid redolent, acuminata: caulis foliis longior, teres, in tres aut 4. surculos diuiditur, quorum singulis singuli insident flores, Chameiridis herbacea magnitudine, sed amoeniore elegantia: quorum tria folia repanda per extremitatem violacea sunt, inferius paullo albo violaceoque variegata, nullâ simbria Zonulae vicaria donata, sed pulcherrimis striis longis obliquis, violaceis, albidis, ferrugineis picturata: hisce tria bifida supra posita purpureo violacea, ligulas atropurpureas occultant: reliqua tria violacea surriguntur.

Plant. Icon. p. 69. Iris sylvestris Byzantina peramœna. Teut. 97. Falluntur qui Irin n. siue angustifoliam mediam, siue variam Irin angustifoliam Pannonicam Clusii vario flore, Constantinopoli collectam putant, & idem aut Illyricæ maioris, aut silu. Constantinopolitanæ cognomen illi in Belgica dederunt: cum Clusius non inde aduectam, sed in vliginosis pratis vrbi Viennensi vicinis erutam, & ipsius semina in Belgicam miserit.

Iris angustifolia altera quæ perelegans est nullibi Clusio Hist. post. fuit inspecta antè quàm in Austriâ proficisceretur: habetque cubitalia, interdum etiâ longiora, folia, admodum angusta, minimi digiti altitudinem non excedentia, viridia, nō tamen splendentia, summâ parte mucronata, infimâ verò quâ sub terra latent, purpurascencia, nullo ingrato odore, ut pleraque aliarum angustifoliarum, prædita: caules habet sesquicubitales, nonnunquam bicubitales aut ampliores, rectos, teretes, firmos, licet intus cauos, geniculatos, virides, summo fastigio in binos, aut ternos ramulos diuisos, quibus insident bini aut terni flores, Iridis bulbosæ versicoloris latifoliae floribus formâ similes, odorati: quorum terna folia deorsum inflexa, infimâ parte, & quatenus bifido alatoque folio ligulam occultente reguntur,

furno colore sunt, reliquæ verò parte (quæ in nonnullis breuior & latior est, in aliis oblongior & angustior) nunc candicante, modò purpureo, seu violaceo colore, vems saturatione purpurâ, nitentibus per folii longitudinem excurrentibus, & simbria siue supercilio carentes: tria solum erecta angustiora sunt, & cum bifidis illis exalbidas ligulas regentibus, purpurei saturi siue violacei sunt coloris: breues deinde succedunt siliquæ, siue capita triangulâ, breuiora quàm in præcedente, neque admodum mucronata, neque geminâ costâ eminente prædita, quæ per maturitatem nigricantem colorem contrahunt, & dehiscunt, semen inæquale, angulosum, non nihil compressum & durum continentia: radix nigra, tenuis, dura, nodosa, instar supericris, fibris duris & tenuibus prædita.

Clus. in Pann. & post. hist. præter modò dictam Iconem aliam habet, cui titulus Iris angustifolia 2. species altera, quæ non parum differre videtur, licet in descriptione nulla fiat differentia mentio.

Iridis angustifoliae silvestris varietates, Belgarum sedulitate in nostris hortis (Inquit Lobel. Obs.) culæ visuntur, angustifolia & latiore folio sesquicubitali Irides: sed vtrique flores terni & quaterni iuxta cauliculi cubitalis ramulos, ceteroquin cum supericore haud absimiles. Eas virentes primùm videndi copiam fecit in suo viridario peritissimus Allardus Ruerius D. Medicus Insulanus: postea Ioh. Doune, alias vogelsang: alique non pauci. Quas Irides intelligat Lobelius cerro affirmare non possum.

Primùm illam spontè prouenientem, non procul Vienna Austriæ in pratis supra Himbergam, Eberstorf ad paludes, atque Austriæ pratensibus locis (ait Clusius) reperiẽbam. Mittebat postea ad me illam siccam, in Sudetum montibus erutam Ludo. Camerarius. Anno verò 1579. frequentissimam circa Sackturniam Ill. Comitis de Zrinio arcem, aliisque pratis vliginosis inter Muram & Drauum Hungariæ Cisdanubianæ fluminis, quemadmodum etiam in Comitatu Saladiensi inter Lindvva & Musam fluvium observabam. Floret & semen profert eodem quo superior tempore. Iris hæc tenuifolia maior habetur in Horto Ill. E. C. missa Sturgardiâ.

Locus & tempus

IRIS ANGVSTIFOLIA FLORE ALBO.



Iris candidis floribus angustifolia, Lob. Ad. par. 2. Iridi Clusii vocata, siue Iridi angustifolia Clusii secundæ simile in pensilibus Adonidisque hortis alebat Mediocastri Mattiacorum D. Cornelius Coorue, sesquipedalibus aut pedibus longioribus foliis, paruum digitorum latis, in sesquipedali aut bipedali caule,

*caule: floribus albis aspectu suauissimis donato, quorum tereta repanda folia latiora venis siue nervis suave rubentibus. iocunde insignita sunt, nec non oris perpolitè brevioribus lincis concoloribus striata: aliis verò incoasubentibus ternis, & totidè angustioribus surrectis foliis penitus candidis. Radix Iridis Clusi vocata, siue angustifolia secundæ non ab simili, multis fibris donata. Francoalle, vulgò *Frankedat* à Nicolao von Brabâr in Belgium primum missa.*

IRIS TENVIFOLIA FLORE VIOLACEO,
an Clusi tertia

Descriptio

Hanc apud D. Platerum vidi, *f. lio* duriore, solidiore, rigidiorèque, quàm Iridis gramineæ, colore glaucò Iridis vulgationis, longitudine cubitali. *Caule* cubitalis, *flores* gerit intense purpureos, paucos, foliis non ita ut vulgò videmus, reflexis, instar florum Iridis gramineæ: cui etiam similes sunt subsequentes *siliquæ* angulosæ. Nos Basileâ Montbelgardum in hortum Ill. E. C. Wiltemb. transtulimus.

no. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Considerandum an hæc sit Iris angustifolia tertia Clusi hist. post. de qua scribit: Ex radice nodosa multa producit folia firma lōgiōra quàm secunda, & prioris foliis magis angusta, saturatque viriditate prædita, nonnihil etiam fœtida: inter quæ cubitalis assurgit caulis, firmus, aliquot flores proterens, Secunda floribus longiores, & Primæ floribus parè similes, sed longè saturatione purpura & quasi nigra præditos: quibus succedunt capita primæ capitibus similia, semine etiam simili plena: radix, ut dictum est, nodosa, dura, foris nigra, minimi digiti crassitudine, interna parte ex albo flavescent, antrorsum & in latera progrediens, aliarum angustifoliarum Iridum instar, & tandem veluti in orbem sese spargens (quod omnibus Iridibus est commune) multis fibris donata gracilibus, duris, siccis, lentis tamen, & fractu contumacibus, quarum anteriores & novellæ crassiores, molliores & candidæ. Cæterum huic suæ Iridi tertiæ Clusius Iridis marinx maioris nomen indidit quoniam iisdem in locis cum quarto proveniat.

An Dodon. Hist. & in fol. Iris quam minorem siue tenuifoliam appellant, aliis quidem similis, sed minor aut tenuior, quæ folia habet breviora, angustiora, nigrioraque, aut cæsi quasi coloris, quæ confricata, grauiusculum reddunt odorem, Spatulæ fœtidæ propemodum persimilem, sed tamen minùs graueolentem: caules similiter breviores, sæpe vix cubitales: in quibus flores bini, terni, alterni, colore cæruleo saturato, subinde Violaceo purpureo, formâ aliarum Iridum propemodum similes nisi quod ipsius foliola singula angustiora sint, & superiora contrâ in se mutuo nõ adeò recurventur, sed ferè erecta cōstant: inferiora verò ac deorsum reflexa simbram non habeant, sed folam lineam lætream: quæ tamen parte calyci proxima, nonnihil hirsuta est: radices quoque obliquæ, nodosæ, & sibi inuicem implicatæ, & quandoque quàm aliarum densiores, lōgas, multasque fibras inferiùs demittentes, foris ruffæ, intus subcandidæ aut subluræ, gustu feruido, uti aliarum.

Locus & Tempus

Nascitur in Germania, teste Valerio Cordo, & non procul. Floret eodem quo aliæ tempore. Videtur nonnullis Plinii Rhizotomos. Sed Rhizotomos Illyricæ est species & quidè præstantior, Plinio auctore: hæc verò contrâ aliis o-

dore & potentia inferior, nec in Illyride sed in Germania reperitur: proinde non Illyrica, aut Rhizotomos, sed sui generis Germanica & tenuifolia quædam Iris, quæ Spatulæ fœtidæ species haberi posset si semen quod in siliquis gignitur, non uti aliarum Iridum planum, sed velut Spatulæ fœtidæ rotundum esset.

Cæterum potentiâ huius radix vehementer calida feruensque est, facultate & viribus aliis Iridibus non inferior: ad eadem, ad quæ illæ, capropter, præsertim recens, virilis.

Ut verum fateamur Iridem Dodon. non possumus asserere eandem cum Clusiana 3. quia ic. à Dodonæo proposita pro Iride minore, à Clusio ponitur pro Iridis angustifoliæ 2. specie altera: præterea ignoramus an eadem sit cum Cordi & Gesneri Iride tenuifolia.

IRIS TENVIFOLIA MICHELFELDENSIS
spontanea: fortè Clusi Angustifolia maior siue prima.



Frequens est in palustribus Michelfeldensis prope Basileâ spontanea quædam Iris, caule duos cubitos superante: flore magno latiss, cæruleo, vel purpurascens. Siliquæ magna, longa, foliis cubitalibus, angustis, angustioribus inquam, quàm Gladioli. Hanc nobis Fr. Casp. Bauhinus loco dicto collectâ misit.

Descriptio

Considerandum an hæc sit Iris tenuifolia Cordi H. pl. [quæ Gesn. annotante, non procul Tiguro nascitur] tenuior satius, siluestri & Xyride, foliis dodrantalibus aut pedalis, semenciâ latitudine nunquam superantibus, plurimis à dōso radicem cæspite allargentibus. Caules satius Iridi similes profert, multò tamen graciliores, in apricis pratis cubitales, in frutetoto verò proceriores, flores foliorum numero positos & forma satius similes habet, nisi quod minores magisq; purpurei sint, & flava etiam simili lanugine careant, cuius vices occupant: iuxta singula tria inferiora & inflexa folia, totidem luentis in purpura coloris stamina. Radices subsunt multæ, transversæ, graciles, in superficie nigricantes, & propter vetustas foliorum reliquias villosæ, intus candidæ, sibi ipsis implicatæ, à quibus prædictarum Iridum modo exeunt fibræ & Cirri: trita, recentis adhuc folia medium inter sylvestrem Iridem & gramen odorem spirant: Radices verò præscriptarum more fauces exutunt. Nascitur in apricis planisque pratis, & frutetosis ac humentibus campis &c.

Hæc puto (inqt Gesn. hort.) est quæ in pratis humidis quibusdâ apud nos crescit copiosè: & semina quoque profert, Illyricæ similis, ut audio: com-

anuni urbana vndique minor. Eadem in hortulo meo iam aliquot annos durat. Ab hac differre puto duas siluestres à Matthiolo exhibitas, in montibus & collibus saxosis nascentes.

Tragus, fortè hanc tradit his verbis; In quibusdam humectis pratis & campis, quæ Rheno prope Vormatiam, & Oppenheimium oppida, adjacent, Gladioli cærulei quoddam genus inueni, cuius flores aquei penè coloris, sed cum cæruleo mixti videbantur esse, ternis versus terram inflexis foliolis singuli præditi. Cæterum quod ad reliqua attinet, hoc est, folia, caulem, & radicem: Iridi de qua sequenti agemus capite, per omnia accedit hic Gladiolus, nisi quòd tota sua substantia magis exigua, & angustioribus foliis & acutioribus illà esse deprehenditur. Semen fert in oblongis ac triangularibus siliquis, non aliter atque Gladiolus luteus. Inter omnes Gladiolos nullus sanè extat, qui mihi quidem aptius ad Xiphion seu Gladiolum Diosc. referri posse videatur, quàm hic ipse Gladiolus cæruleus exiguus, quem Germani *Flein blaw Schwerel* vocant.

Iris angustifolia maior Clusii Hispan. Iristo. Pann. Et Hist. post. Iris angustifolia prima & maior, quæ multa profert folia longa, rigida, angusta, nigra, quæ compressa vel contracta, ingratum tetrinque odorem spirant, propemodum ut Spatulæ foetidæ vulgò appellatæ folia, minùs tamen graueolentem: inter quæ caules teretes, oblongi & cubitales, interdum etiam longiores exurgunt, quaternos aut quinos flores ex vaginulis laterilibus prominentes, Iridis bulbosæ versicoloris floribus formâ non admodum dissimiles, colore cæruleo saturatiore prædictos, quibus succedunt oblonga capita trigona subrufa, multò firmitiora, magisque cartilaginosa, quàm latifoliarum Iridum, his paria quæ in Tripolitana, angulis etiam eminentibus, & quodammodò geminis, quæ dehiscentia, semen duplici serie digestum, aliquantulum compressum & angulosum, osseæque duriciæ, subrufescente membranâ tectum ostendunt: radices obliquæ, longæ, nodosæ, graciliores quàm in latifolia, Tripolitanz radicibus æquales, foris nigricantes, intrus candicantes, aut pallescentes, sapore acri & feruido, multas longasque fibras spargentes. Istius genus inuenitur, iam descripto per omnia simile, præterquàm quòd in eius foliis confractis nullus grauis odor percipitur.

Loca.

Primi generis primùm conspiciebat in Belgicis hortis cultam, deinde anno 1561. plurimam spontè nascentem in amplissimo quodam prato, flumini Rheno vicino, viâ quæ Mogutiâ Oppenheimium ducit, obseruabat: aliquot deinde post annos, herbosis quibusdam locis iuxta vias, & ad quorundam pratorum margines non procul à Manderstorf, quinto à Vienna Austriæ milliari, atque etiam apud Wakerstorf: postremùm anno 1597. in pratis quibusdam Hungariæ apud Lindvva Ill. V. D. Banasy arcem.

Floret vtrumque genus Maio, interdum duntaxat Iunio, si asperior hiems præcellerit: semen maturum est Augusto.

*Iris angustifolia flore violaceo, reflexis
foliis lacteis, & purpureis venis
variis. Clusii.*

Iris angustifolia.

Iris angustifolia quinta nec foliorum forma, nec radicibus multùm differt à maiore marina: nisi quòd folia habere non videatur tam atra viridi-

tate prædita: flores etiam plurimùm differt, nam tria surrecta folia purpurei sunt coloris & violacei, tria verò reflexa, & terram spectantia paulò latiora sunt, & multis lacteis purpureisque venis alternatim permixtis ab ipso folii vngue exorientibus, atque secundum longitudinem & in latera se spargentibus, gratissimam varietatem efficiunt. Floret cum marina, seriùs primâ, Iunio videlicet mense, semen maturitatem adquiret Septembris initio. Hanc spontè nascentem non vidit Clusius, sed in Belgicis duntaxat hortis cultam obseruabat.


IRIS TRIPOLITANA FOLIIS

longissimis flore aureo.

Proximis annis (inquit Clusius) Tripoli adferrebarur Iridis genus quod 1599. florem protulit Amstelredamensi Cui, qui eius caulem cum flore & siliqua ad me mittebat Iunio mense: ipsam etiam plantam biennio antè mihi communicauerat, quæ quidem etiamnum viget, sed florem nondum tulit: Est verò hæc Iris Tripolitana è cellisiorum aut aliis assurgentium genere, folia habens reliquis quas cospexerim multò longiora, bicubitalia videlicet, mediæ inter latifoliam & angustifoliam latitudinis, vnciam videlicet lata, reliquarum Iridum foliis magis viridia, non tamen splendentia, ut Xyridis: caulem habebat inter folia prodeuntem, quinque pedes longum, vel etiam longiorem, rotundum, firmitum, licet non valdè crassum, nodosum, & aliquot breuioribus foliis prædictum: in cuius summo bini & terni flores è vaginis prodeuntes, nouè foliis in ambitu quodammodò linuosis, constantes, Iridis bulbosæ flauo flore floribus formâ non dissimiles, aurei coloris, quorum tria maiora versus terram valdè reflexa, & iis incumbentia tria alia minora alata ligulam flauam regentia, tria reliqua è lateribus maiorum prodeuntia, assurgunt instar illorum quæ in Iridibus bulbosis conspiciuntur, bifidumque mucronem habebant: floribus successerunt trigona capita, in singulis lateribus geminâ costâ siue neruo secundum longitudinem eminente, non dissimilia capitibus Iridis angustifoliæ maioris, similibus etiam seminibus plena: radix digitalis crassitudinis, nigricans, & nodosa, instar radicis angustifoliarum.

IRIS TYREROSA BELGARVM.

Descriptio.



Eandem, inquit Lobel. Obs. quæ nostri. hodie Iridem bulbosam nuncupant & perperam Marth. Hermodactylum verum scit, cum Androandro peritiores Itali pleriq; Diosc. priorem Lonchitidem sanxerunt, quod nulla extaret planta propius Lonchitidem adun-

brans.

frans. Folia sunt Hyacinthi poetici, porracea, striata, rigida, quadrangula, in mucrone cuspidatim fastigiata. Flor. quadantenus Iridis, cuius **Descriptio** folia repanda, seu galericuli hiantibus comicis personis similes, obscure virentes, fimbriis nigricantes. Semen involucri clausum, (Lancea simile, triangulum Diosc.) angulosum. Radix ruberosa varie depacta: quæ in plures digitatim, flore marcido, propagatur: unde Hermodactyli nominis occasio. Quem ad vinum depingi Bononiz curavit benevolentia Cl. præceptoris Vlysis, ab hac nostrate tantillum variare videtur.

Plant. icon. pag. 98. Iris ruberosa Belgarum, Tent. 134.

Ad Irides pertinet (inquit Dodon in fol.) & quam ruberosam cognominari contingit: folia sunt huic oblonga & angusta, ferè Chamæziris folia referentia: tenuis cauliculus: flos verò in cacumine erumpit forma Iridis, verumtamen & minor, & angustiorum foliorum, qui obscure viret, ac, quo Iridis floribus fimbria loco, nigricat: capitulum satis magnum perfecto semine dependet, in tres rimas fatiscens: semen rotundum, Ochro minus, initio in albecat: non vnius formæ radix, ante florem duo aut tres veluti bulbi coherant, hoc verò enato in plures singuli extraherant propaggines, quarum nonnullæ digitum referunt. Peregrina stirps est, quæ ex Orientis partibus, & vicinis Constantinopoli regionibus, & in Italiam, & in Belgium illata fertur. Iridis sylvestris genus esse videtur: atque idcirco à forma radicum, Iris ruberosa dici potest. Matthioli Hermodactylon esse: alius Lonchitium priorem esse suspicatur. Cum Hermodactylo, quo Officina utitur, à Scapione sic appellato haudquaquam responderet. Si autem idcirco Hermodactylus, quod radix digiti figuram quandoque referat, alium esse à Scapionis Hermodactylo oportet. Nam Colchicum Dioscor. Scapioni est Hermodactylus: ab hac Iride autem differens est Colchicum. Lonchitium verò hanc esse priorem, non ita quoque constat: Si etenim ex eo Lonchitis nomen habet, quod semen triquetrum lanceæ cuspidi simile sit, hæc Lonchitis esse nequit: cum semen non sit triangulare. De facultatibus autem huius Iridis nihil scribendum occurrit.

Hermodactylus Camer. apud Matth. **Descriptio** ipse dicitur, Arabibus *surangen*. Ital. *Hermodactilo*. Folia hic mittit prælonga, binum dodrantum, ac etiam longiora, Porri aut Asphodeli quadantenus similia, longè tamen angustiora: breviora verò sunt, quæ circa radicem exeunt. Radices habet quatuor ex vna eademque basi prodeuntes, digitorum figura, colore subrufescente, albis in summitate vnguibus: caulis è medio profilit tenuis, in cuius summitate oblongum prominet capitulum Pyri figura, Ephemeræ Colchici modo.

Oritur in Orientalibus regionibus, & in Arabia.

SPATULA FOETIDA, PLERISQUE XYRIS.

CAP. XVI.

Nolentibus volentibus ab Equo ad Asinum, ab odore, inquam, grato, ad foetidam, plerisque Xyrin vocatam descendentes, hoc solatii secutus, Deum & naturam nihil unquam fru-

stra fecisse. Quemadmodum enim Asinus ad iter perficiendum, quamvis non tanto, tam celerè tamque expedito cursu, ut Equus accommodet, attamen ad melius esse saltem necessarius est. Simili planè modo Spatula foetida licet non ita iucundè ad cursum mundi huius faciat perficiendum, ad mala tamen plurima præcauendâ & corrigenda multum præstat.

Radix itaque incurua, Dodon. in nouellis plantis, rotunda & veluti Bulbi aut Cepæ alicuius cap-

Descriptio

put, ex qua fibræ dependent crassiusculæ, veteribus & multorum annorum plantis, multæ, longæ, geniculatæ, ubi inuicem implicatæ, magnum veluti caespitem constituent, denique ut formâ, ita & acrimonia intensa ad Iridem accedit: folia multa cubitalia & sesquicubitalia in cultratâ micronem desinunt, angustiora quàm vulgaris Iridis, atro virore splendentia, foetidum Cynicum odorem atteritu obolentia: inter hæc caules plures glabri, crassitie mediocri per media folia recti assurgunt, quorum singuli canaliculato calyci insidentem ferunt florem Iridis, sed minorem, novem



foliis constantem, quorum tribus repandis ex purpura obsoleta albicantibus, virgatis, nulla fimbria villosa donatis, æterna, modico intervallo imposita, fuliginoso colore, bifida, ligulas concolores occultantia: reliqua tria modicè erecta, ab exortu ad medium usque circiter fusca, deinde ex albido leniter purpurascencia: Lobelio flores dicuntur Iridis similes. tenuis foliolis surrectis nec reflexis, purpura saturatiore Violæ Martiæ, & in medio vasis nulliôs luteis, & phœniceis floribus succedunt filique oblongæ, (vel ut ait Cordus silvestris Iridis folliculis similes utriculi, sed paullo maiores & triquetri,) quæ per maturitatem Peroniz instar dehiscunt semen ostentant rotundum, rubrum, minoris Pisi magnitudine, gustu feruido: figura adposita, quas iam

sculptas emimus non placent: *radix* non bene picta; apud Fuchsiū & Matth. quoq; non placet.

Hanc his verbis lib. 4. cap. 12. delineauit Dioscorides: Xyris folia habet Iridis, & laxiora, & in cacumine acuminata: quorum ē medio caulis erumpit cubitalis, satis crassus, in quo siliquæ sunt triangulares, & super ipsis flos purpureus, medio puniceo: semen in folliculis simile fabis, rotundum, rubens, & acre: *radix* crebris cincta geniculis, longa ac rufa.

Xyris apud Cordum, sine dubio est illa Iridis species quæ ab Italici Spatula foetida nominatur, quam al. qui sine flore esse malè crediderunt. Producit verò Xyris siluestris Iridis species, folia caules, flores, & radices satius æqualia & similia, nisi aliquid impediret, nam flores magis saturatè ardent purpuræ.

Xyris ea Gladioli species esse videtur Corn. quam officinæ spatulam foetidam appellant.

Si Spatulæ foetidæ radix colore vti & flos responderent descriptioni Xyridis Dioscoridis, Xyridem assereret Anguillara.

Spatulam foetidam vulgò dictam Cordus & alii Xyridem Dioscoridis faciunt. Sed Diosc. Xyridi caulem crassum cubitalemque dedit, qui non est, inquit Gesner. in Spatula.

Lobelii & Penæ Adu. describant, & Xyridem adstruunt, ac putant legendum apud Diosc. *pro uacua*, radicem parua. Iis porro testibus leuiores isti notarum exactores, vt plurimùm indicant se nec multas plantas vernaculis natalibus eruisse, neque virium periculum multū fecisse. Dum enim nescio quid coloris & magnitudinis desiderant in radice & flore, nō meminerūt vtrius harum, vt pleraq; alias facillè nonnihil, non ita magna de causa, mutari. Etenim si Iridis radices & flores colore, magnitudine, densitate, bonitate & odore ad eò variat, vt cū Florentina si nostrā cōponas longè aliā colore & odore pures, quid nō possit tantilla mutatio Xyridi contingere.

Lobel. Obseru. & Ic. Plant. p. 70. Xyris agria Theophr. Teut. 98. *Epis* siue *l'eur d'yeux* Theophr. Adit. *radix*, siue *radix* appositè quidem *Epis* ob folii similitudinem, quasi rasorium cultrum aut nouaculam dixere. Est enim illi folium, ancipiti nouaculæ similius, acutiore acie, & tenuiore ridigioreque quàm Gladiolus aut Iris mucrone. Lat. plerumque Xyris, Iris silu. & Spatula foetida, tum ob eandem folii figuram (Spatula enim gladium significat) tum quòd grauem exhalet odorem, vulgò nuncupata est. Germ. welsch schwertel & wankelwey; fraut; à cimicibus necandis. Belgic. wankelwey; wilsch & stinckende lisch. Gall. *Spatule* ou *Glaioul puant*. Hisp. *Ciris spadanal*.

In Hetruria & aliis Italici locis spontè exit: apud Belgas [autore Dod.] vix aliis locis, quàm in hortis reperitur: florem edic Iulio & Augusto, semen Autumno maturatur. Spontè nascens quibuldā præsertim Gallo-prouinciæ & Angliæ, vbi quàm herissima, prope vda prata & litoreos maris aggeres inspicere licet Lobel. Flores apparent Iunio & Augusto in Anglia. Passim Monspelii prouenit inter dumeta secus vias. Florentem vidi Maio, eadem mihi visa in horto Cl. V. D. Fuschii. Genevæ habui etiam in horto semine turgentem Octobri. Patavii vidi in horto Iesuitarum & D. Triuesani, & Pasqualigo. Venetiis in hort. Nob. Cornari. Veronæ in horto D. Alexandrini Serrarii Medici & Nobilis, dicti Musardo. Ferrariæ in horto Monasterii S. Dominici à L'Angeli. Basileæ in hortis D. Doctor.

Felicitis Plateri & Zvingeri cum fructu mense Iunio. Habeo in horto E.C. cuius Stugardie in horto Ill. Ducis collegi semina.

Ea vi & acrimonia prædita est radix, tametia Corulam aut Cimices oleat, vt contra capitis vulnera [Diosc. quidem teste] faciat & fracturas educat auculeos & omne telum extrahat citè dolorem: admixta floris æris tertia parte, radice Centaurii quinta, & melle, sanet tumores & inflammationes cum aceto imposita. Radix cum passo contusa bibitur ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, vrinæ stillicidia, & alia profluvia. Semen ad ciendam vrinam efficacissimum est trium obolorum pondere in vino potum. Idem & lienem absumit cum aceto potum. Lobel. Ad alia profluvia bibitur non secus ac Rhabarbarum & Asarum: ventris fluores, materiam per vrinas deducendo & auertendo, supprimit: ceterum opilionibus & rusticorum plebi in præfectura Sômersetæ Angliæ, huius radice decoctum, aut etiam infusum purgationes, Iridis modo, molitur. In omni alia profluvia nolimus expetiri hanc feruidam radicem, fortè posset tolerari vsus in profluvio alui pituitoso.

IRIS PALVSTRIS LVTEA SIVE scorus adulterinus.

CAP. XVII.



IN obliqua & complatatas radices agit multum fibratas, quæ propter foliorum vestigia & venenosas reliquias foris villosæ nigrescunt, intus verb rubentes, substantia porosa, & cu filis quibuldā venosæ, sapore adstringentes strenuè nouis quotannis oculis,

Descriptio

instar Typhæ aquaticæ gemmæ: Folia Gladioli, vel Iridis potius, longa, mucronata, quorum quæ propè radicem sita sunt subtrusa nonnunquam apparent: caulis duos cubitos æquat, & interdum superat, rectus, levis, teres, spongiosus & interdum aliquousque inanis, in alas diuisus flores Iridum formā ferè, lutei, inodori: quorum tria folia reliquis sex maiora, extorsum repanda, lutea, fimbriæ supercilium imitantis loco, & vtrinque adiacentibus foli marginibus lineis nigris variegata: hecce intercedunt terna, alterno positu, surrecta, valdè angusta & breuia, tota lutea: sicut & intima quæ crista bifida reliquaque forma cum iride violacea vulgari conueniunt, solo colore illo luteo quo fulgent excepto, quibus à dorso appressa semina, ex luteolo tubidine quadam prædita: sapore est flos totus feruidissimus,

Xyris vera
Cordo.
Spatula
foetida.
Flores con-
tra opus-
nem quo-
rundam.
Gladioli
species,
Anguillara
dicit.

Locus &
tempus.

diffinitio, non quidem primo oculo, verum paulo post fauces omni pipere adentibus vix: filique longa; ut in Spatula, semina continent rufum, compressum Lupini instar. Odorem tota herba non spirat, Tragus semen tribuit luteum latum quod formam vicinam compressam referat, saporis ingrati planè.

Acorum falsum.
in luteo.
Pseudoacorus.
Persuatum est omnibus Acorum esse quæ Cordo Gelbschwertel, sed à veritate distat hæc opinio. Hermolao Barbaro, Acorus falsa vocatur Iris lutea siue Pseudoacorus. Nostri Septuaginta (inquit Tragus cum Brunfel. & Manardo) & Magistrorum contendunt Gladiolum luteum, Acorum esse à Dioscor. lib. 1. cap. 2. descriptum, sed non conveniunt: Germ. Gäl wasser gilgen / Liliū aquaticum luteum & Drackes wurz & Gäl schwertel / hoc est, luteum gladiolum vocant, dicimus insuper in cap. 22. lib. 4. apud Dioscor. collocandum quo loco xupis quam nonnulli Iris luteam, Iris sylvestrem, Cacos, & Gladiolum vocant, descripta est. Qui Sylvio frequens ostenditur, palustris Acorus est, insipidus, inodorus, non utendus nisi Medicus imperaverit.

Apollin.
Apollin. qui vocat Gelblilien, male cum Hier. Brunfel. Acorum purat, & deterius vires confundit utrarumque plantarum, quæ multum inter se discrepant. Figura quam habet est apud Tragam pro Iris seu Gladiolo caeruleo minore.

Non est Acorum.
Fuchs Icon. pag. 6. Gladiolus luteus, vel Acorus vulgaris, Gelbschwertel. Gladiolum luteum seu Iris luteam Officinæ perperam Acorum appellant: & maiore cum errore radicibus eius pro legitimo Acoro utuntur: Plerique hac occasione Pseudo-Acorum nominant: Dodon. Irisdem luteam sylu. aut potius Pseudo-Irisdem nuncupare mavult, Iridi pro Acoro similiorem.

Lilium aquaticum.
Gefner. hort. Acorus falsa, id est, Liliū aquaticum flore luteo.

Butomum.
Lobel. & Pen. Adu. Obs. & Icon. Pl. Acorus nostras palustris, id est Liliū aquaticum luteum Matthiol. 22. Butomon Theoph. Valetando Pseudoiris & Iris lutea Dod.

Clus. post. h. Iris palustris nonnullis, peritiores verius Butomon appellant.

Tab. Ic. & h. Iris palustris lutea, Geelwasser schwertel.

Nomina linguarum.
Iris palustris lutea, Pseudo-Acorus, siue Acorus adulterinus, Geel Gilgen / geelschwertel / geelwasser gilgen / geelwasserschwertel / Drackes wurzel / Belg. Geelisch & Boex boonen. Gall. Glayul & Flambe bastarde, Angl. Gladen or false Acorus.

Locus & tempus.
Nascitur ubique in palustribus aut his coniunctis ac vicinis locis cuiusmodi sunt rigua prata & fluviiorum margines: Pseudoacorus passim locis paludosis circa Montbelgardum, provenit copiosè etiam in hortis quod maturum observavi Septembri. Montpelii vbi abundat circa aquas floret Martio & Aprili. Bononiæ ad montes Apenninos florentem vidi Aprili, ut etiam in horto S. Salvatoris. Basileæ & Lugduni Maio, Acuri & Genovæ vbi abundat circa Arre. Tiguri aliquando degustavi flores, qui mihi tantum ardorem & feruorem excitant in faucibus ut summam acrimoniam vix potuerim mitigare Oxycrato: radix autem insigniter astringit.

Vires.
Radix lutei Gladioli, auctore Trago, vino detesta & pota, continuas alui fluxiones sistit, do-

lores vesicæ & coxendicis mitigat, & ad omnis generis sanguinis profluvia facit. Acorus Officin. raro intra corpus assumitur. Sunt qui è floribus eius aquam destillant, ad inflammationem oculorum. Alii Eclogina è radicibus aduersus calculum conficiunt. Nulli suaferim cum Trago vsus tam acris floris ad inflammationem oculorum, nec tam adstringentis radicis ad calculum, non benè etiam percipimus quomodo dolores vesicæ & coxendicis mitigare possit. Absurdum videtur quod Tuss. Duckerus ait radicem Acori vulgaris cum caliditate aliquid adstrictionis habere, siquidem insignem habet. An verò habeat caliditatem nobis nondum constat. Inueteratus est [inquit Turn.] error Medicorum & Pharmacopœorum, herbam suuentiam pro vero Acoro formam quidem similem, sed plurimum viribus differentem. Acorus calidus est in tertio. Gladiolus palustris (quem pro Acoro substituunt) frigidus est, mirumque in modum obstipans & adstringens. Gustus abundè monstrat eius radicem immensam adstringendi facultatem obtinere: hinc est quod diuersam planè à Veri Acori radice vim sortita sit: nam ut hæc tendium est partium & facultate calida, atque aded detergit, extenuat, atque discutit: ita illa consistentia crassatam partium, & facultate frigida constringit, dēlat, cogit & corrahit. Quare urinam non cit, ut verum Acorum, nec menses euocat, sed potius supprimit: sanguinem etiam vndeunque manantem cohibet: proinde rectè Pandect. author scribit, eum qui secum Acori radicem gesserit, à nullo sanguinis profluvio corripitur: & ex Recentioribus aliqui hanc facultatem Acori nostri obseruauerunt: atque hinc aded tradunt eius succum igne expressum, menses nimium promanantes constringere posse, id quod certè de Acoro vero affirmare vanissimum erit.

Notatu digna historia occurrit apud Clusium de Medico Viennensi magnæ autoritatis viro: Clusii verba hæc sunt: Viennæ magnæ autoritatis Medicus magnoperè se mirari scribebat, me in Acori historia non adscripsisse eius radicis vsus, sterilitatem mulieribus inducere: ego respondēbam me magis adhuc mirari quod hæc scriberet, quum non ignoraret, neminem à Veteribus hoc Acoro tribuere. Sed bonus vir adhuc in vulgari multorum opinione versabatur, qui existimabat Butomon, cuius radice nonnulli magno errore pro Acoro utuntur, legitimum Acorum esse, quum tamen prorsus dissimiles sint utriusque facultates. Ex hac Hist. Clusii patet quanta in hæc usque versentur omnes Iuniores Medici (ut quondam Nic. Lonicus ad Hieron. Monochium scitè verèque scripsit) qui herbarum & aliorum simplicium medicamentorum indagationem, non ad medicos, sed ad pharmacopolas pertinere opinantur, fata interim hominum non sua sed aliena fiducia gubernantes. Nos interim non existimamus Pseudoacori radicem sterilitatem mulieribus inducere, quinimò vtilem putamus ad promouendam conceptionem mulieribus nimium humidis ac gonorrhœa laborantibus. Radices [inquiunt Aduersi.] ut Doctus Belga ait, tantoperè adstringunt, & planè Iridis facultatibus aduersantur, ut neutiquam furidis auctor literis mandatit, hæc vel duntaxat appensas appressasque corpori quemlibet sanguinis fluxum sistere.

Tragus.

Non est Acorum.
Turn.

Butomon.

ACORVS VETERIBVS.
CAP. XVIII.

A Pud Theoph. nihil obseruauimus, quod Acoro Dioscoridis respondeat, legitur quidem vox Acori historia sua lib. 1. cap. 22. vbi Gaza vertit Veneria, non bene nostro iudicio.

Acorum depinxit Plin. lib. 26. c. 13. dicens: Acoros Iridis folia habet, angustiora tantum & longiore pediculo, radices nigras minusque venosas, cetero & has similes Iridis, gustu acres, odore non ingratis, ructu (ruptu Vet. eruru.) faciles. Optimæ Ponticæ, dein Galaticæ, mox Creticæ, Sed primæ in Colchide iuxta Phasin amnem, & ubicunque aquosis. Recentibus virus maius [magis. M. fortassis, vires magis] quam vetustis. Creticæ candidiores Ponticis. Siccantur tribus in umbra digitalibus frustis. Nec non inueniuntur, qui Oxymyrsinæ, radicem Acoron vocant: ideoque quidam hanc Acorum agrum vocare malunt.

Acorum folia Iridi similia habet [inquit Dioscor. lib. 1. cap. 2.] sed angustiora, & radices non dissimiles sed perplexas, & non in directum productas, sed obliquas ut plurimum, & superficie geniculis distinctas, subalbas (in albu), id est, interprete Ruellio, albicantes: potest tamen vocabulum, ut quidam volunt, significare, non nihil intus vel subtus albicantes, Turn.) gustu acres, & odoris non iniucundi. Præstat autem Acorum densum & album, incorrosum, plenum & odoratum. Hoc autem est quod in Colchide (αὐχιδί) & Galatia Aspletion appellatur.

Flores addit Serapio, & dicit esse Croceos.

Ceterum in Diosc. suppol. [Cornario teste] dicitur, Aliis etiam Chorus, aut Aphrodisius: Romanis Veneria, nonnullis Radix nautica, Gallis Piper aquaticum.

Vires Acori ex Veteribus quod attinet, traduntur ex post Calamum Aromaticum vulgarem.


Necessarium sanè non sanè non solum, aut etià scitu iucundum Equiuocum Acori & substitutum. Nam Calamus aromaticus Officinarum plurimis est Acorum, quamuis Garcias & Acosta Calamum aromaticum verum siue Indicum non fuisse malè censcant. Habetur & Acori nomine Galanga maior & minor, & Acorus Qualcebeni in Epist. ad Matth. Camer. apud Matth. Germanic. loco Acori habet Acori vulgaris particularem speciem, in Thuringia: Lobel. autem Obs. Iridem luteam in Bohemia. Gladiolum cæruleum siue Pseudoacorum Tragus. Perperam quoque olim Pseudoiride lutea vsi sunt pro aco- ro. Hæc à nobis traditur sub Iride palustri lutea, seu Pseudo-acoro. A. negr. Theophrasti, Veneria, & Herba diuener Anguill. Vbi Acorus apud Theoph. l. 1. c. 22. legendum ἀγορα vel ἄγορα, quod non animaduertit Anguill. nec Scaliger apud Theophr. obseruauit, nec Lobel. & Pena, nec Robert. Constant. Acorum syluaticum dicitur de Achillea. Millefoliæ striatioti attribuit nomen Acori syluatici. Acorus syluaticus Græcis Myriophyllon Apuleo: de quo sub Millefolio aquatice Matth. Non desunt, qui Acorum (inquit Ruell. p. 283.) Oxymyrsinæ radicem vocent, hanc verò Acorum siluestre. Alii verò Acori syluestris nomen Anagallidi communicarunt. Acoro deficiente, radix Azari substituitur: Gal. Fuch. Borgar. quod non placet propter vim purgantem per inferiora & superiora, quæ non tri-

buitur Acoro. Acori defectu ad flatum & hepatis & lienem iuuandum, Cumini par pondus & cetera partem Aristolochiæ substituit Auicenna, Syluius & Placotomus, Borgar. Fayardus in Gal. de simpl. lib. 6. c. 12. Pro Acoro, Radix Acanthi. Tract. quid pro quo ex Galeno.

CALAMVS AROMATICVS
vulgaris multis Acorum.

Quam nota Seplasis radix, & antiquum nomen, tam ignota multis sæculis extitit plantæ totius facies.

Ea igitur radix, quæ olim sola erat in Officinis admodum vulgaris, habebat figuram plantæ sub terra repentis, quæ nonnunquam excedebat longitudine palmum, quæ tamen compressior erat, quàm rotundior, geniculata (atramen Descrip.



non crassa ut in Iride) intus alba, odore grato prædita, satis amara & acris. Multæ foliorum partes siccæ, mutilæque reperiebantur, adhærentes, Iridis arundinacea folia quadantenus præ se ferentia: ex hortensi autem plantam sic describemus.

Radix longa, multis geniculis inequalis, summâ terrâ obliqua seu transversa hæ-

rens: externa parte candicans, quum sub terra latet: supra terram extans, virescens: interna parte candidissima, firma, atque amara, innumeris internâ parte adnatis fibris crassis & albicantibus, etiam odoratis donata: serpit autem & summa tellure sese diffundit, è lateribus, & singulis ferè articulis seu geniculis propagines alternatim in obliquum spargens, ut breui tempore magnum spatium occupent: f. l. surgunt cubitalia & sesquicubitalia aliquatenus spatulæ fertidæ, angustiora, colore herbaceo, margine subinde rubente, & propter terram penitus rubentia, mediâ costâ elariore, (Clusio Iridis tenuifoliæ maioris ferè, sed multò longiora, sapore subamaro acris & aromatico, tritaque iucundo & aromatico spirant odore, quem etiam resiccata & exsucca, vel post multos annos, inquit Clusius, retinent, sub hiemis initium marcescunt & siccantur, ineunte autem Vere noua germinant, ut in Iride angustifolia: pro flore iulum seu nucamentum profert rigidum & obliquè surrectum, teres, sensim in acumen desinens, squammulis imbricatis virentibus compactile, apicibus exsertis multis, luteis, prodiens è sinu medii folii statim à radice cum aliis exorti, ut reliquis angustioris breuiorisque, ita & crassioris: lulus vnicus (aliquando teste Clusio,) sed rarissimè geminus: folculis, dum se explicat pallidis, muscosis, inodoris, qua-

Acorus.
Iris.

Delictus

Aspletion.
Chorus A-
phrodisius.
Veneria.
Piper a-
quaticum.

Achillea.
Millefolia
striatioti.
Millefolia
aquaticum
Matth.

Anagallis.

quatuor foliis constantibus, plenus: is paulatim deinde incrementum sumit, donec humani ferè digiti longitudinem, crassitudinemque adquirat frequentibus tuberculis viridibus tam eleganti serie dispositis, ut recentem Pinastrum conum imulari videatur.

Legit & in Mæotide odoratum nasci Calamum Hermolaus, radice subalbida, & sine fistulis: plena intus & amara, specie Acori: de quo & falsi quidam sunt, Acorum eam putantes. Quanto autem amarior, inquit, tanto & calidior est Indico. Vtrumque tamen genus Acorum odore superat. Teredinibus ut Acorum incessitur: omninoque vicarium pro Acoro est, ab Ionia, & Ponto, & Herculis Columnis, prorsusque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricæ, ut si eadem non sunt planè, maxima tamen germanitate visantur, ut autores plerique tradunt. Sed fallitur Hermol. dum nostrum Calamum aromaticum vulgarem Diosc. putat.

Fallitur & Marcell. qui odoratum calamum, sua ætate adeò notum esse scribit, ut non sit longius de eo agendum. Apparet ergo Marcello non fuisse notum verum calamum, qui non erat tunc vulgaris, nec etiam nunc.

Hinc verius ait Sylvius: Qui in Officiis calamus est, non Calamus, sed radix est, neque ea Calami, sed plantæ alterius: neque ex India videri affert, quia vili venditur, & sæpè recens multum cernitur, subalbus, non pulcherrimus inter stragendum, ac viribus polleat indicat odor & sapor aromaticus. Acorus: quibudam Calamus aromaticus: ignotus quibus adhuc est verus Acorus, eius loco utuntur interdum Calamo odorato. Verus Acorus multorum iudicio nihil aliud est quam radix quæ hodie in omnibus totius Europæ pharmacopoliis, Calamus aromaticus appellatur.

Illi autem sententiæ subscribit Cordus in Dioscor. Vulgo, inquit, in omnibus Pharmacopoliis Calamus aromaticus est, sed nihil habet cum vero Calamo similitudinis, eam opinionem etiam ante nos oppugnavit Manardus & parens Eur. Cordus: Vocatur in pharmac. absolutè Calamus, aut cognomento aromaticus, neque geniculatus harundinis modo ex intervallo radices aut culmos habet, neque iubatam in summitate paniculam, sed magnum florem Iridi æqualem, colore luteum, caulemque & radices solidas: in summa Iridi cognata est plâta, nihilque aliud quam verus Acorus. Nihil movet nos Hermolai Barbari auctoritas, scribentis se legisse in Mæotide etiam odoratum nasci Calamum radice subalbida &c. Calamus quem Barbarus describit idem cum vocato vulgo Calamo aromatico existit, idèoque non meritis eos reprehendit qui Acorum esse putant. Hæc Cordus, quem imitatur Calamo vulgari aromatico tribuere florem Iridi æqualem, luteum, quum nullum tamen florem ferat, sed veluti solum lulo Coryli similem.

Brunkgerm. Tragus & Manardus Acorum eam esse radicem sentiunt, quæ Gerin. Calmus / Lat. & Officiis Calamus aromaticus dicta fuerit, sed perpetam.

Calamus Aromaticus seu odoratus verus (ait Fuch.) in officinis nostris non habetur. Nam qui hoc nomine venditur Calamus non est sed radix. Neque habet eas notas quæ illi à Dioscor. tribuuntur. Siquidem Arundini similis non est, nec odore fragrantissimo præditus est: fistulis denique totus plenus nequaquam est, nec ex India affertur. Qui igitur in officinis prostat, ma-

Tom. II.

dix est, non quidem veri odorati Calami, siquidè vili pretio venditur, & sæpè admodum recens cernitur, sed eius qui in Mæotide nascitur. Porro cum hæc radix in commanducando glutinosa sit, linguam adstringens, amara & subactis, eique propemodum omnes veri Calami Indici notæ quadrent, profecto tuto, & citra vilius reprehensionem pro vero Sepiasæ in eius penuria uti possunt. Argumentum Fuchii ab odore non placet, quia non videtur nobis deesse in vulgari Calamo odorato, in eo præterea adstrictionem non animaduerrimus qualem Fuchius asserit.

Cornar. hæc de Calamo ait. Calamus aromaticus siue odoratus officinarum genuinus est & non Acorum Diosc. ut quidam asserit, qui etiam hodie in officinis nomen retinet, & verus habetur, & nostri, sicut est, volucribus Calmus wurzel vocant. Quare non audiantur qui Calamum odoratum se nunquam vidisse asserunt, & non calamum, sed radicem, eamque magis albicantem quam fulviam, siue rufam, velut ipsi vocem interpretantur, pro Calamo vulgo vendi asserunt. Nam radicis Calami usus est, non ipsius calami. Verum descriptio Calami odorati, quæ ab aliis calamorum generibus distinguitur, partim ad Calamum, id est, harundinem ipsam pertinet, partim ad ipsius radicem. Quod enim dicit optimus, esse qui fulvus est ad radicem referendum est: quod frequentibus geniculis præditum ait, & assulose in multa segmenta distingi & fistulâ araneis plenam habere, (ad Calamum) quemadmodum etiam in nostris Calamorum generibus videmus: hodie subalbidus maxime probatur, quum alias ferè ad fulvum colorem declinet. Nos Cornarii distinctionem non probamus: Dioscoridem omnia de Calamo dicere, non de radice existimamus. Verisimile Cornarium nunquam vidisse verum Calamum aromaticum, nec etiam Calami aromatici vulgaris plantam integram, in qua nullus Calamus: Calamum verum habemus qui similitudinem habet cum arundine.

Non tamen probamus figmentum Matthioli in Calamo aromatico. Radicula enim (ut cum Theophrast. loquar) quæ Thracia fert, videlicet quæ odoris Nardo similis sunt (Nardus & Thracia) & alix quædam, quæ parvam exilèmq; odoris gratiam habent: videntur esse radices illæ, aut eiusmodi quas Ar vocant incolæ: nos falsò Calamum aromaticum. Nascuntur enim in Thracia & Ponto. Calamus autem trans Libanum. Qui non amplius conuehitur ad nos.

Bachanell. de consens. med. dicit Verum Calamum non haberi, & pro eo accipi radicem Acori.

Acorum Dioscor. facit Lonic. officinarum Calamum, proque Acoro in El. Diacori sumit, quoniam sanè respondeat descriptio Acori Dioscoridis. Sed Lonicus non contentus figura una, iterum aliam ponit, quæ olim posita fuerat à Matthiolo pro Acoro, & vocat Acorum Apothecariorum quasi different.

Helfricus: Acorus, Calamus Acori, Calamus, Galanga. Si Galanga eadem cum Acoro cur separat Helfricus.

Falluntur Monachi suspicantes, Calamum Aromaticum vulgarem esse radicem veri Calami: Calamus aromaticus officinarum (aiunt hi) non est calamus, sed si quis dixerit quod hæc radix quæ recipitur in Officiis pro Calamo est radix ipsius Calami: hoc fortassis poterit esse. Ver-

Qq q

Substitutum
Veri Calami
ms.

Partim

Cornar. dicit
vulgaris

Matthioli
Radicula
Thracia
Theophr.

Ar.
Calamus
Aromaticus
falsus.

Acorus
Calamus

Lonicus
not.

Helfricus
not.

Monachi
not.

Calamus
vulgaris
Calamus
vulgaris

rumtamen cum petitur Calamus non est. accipienda radix, nisi vigente necessitate in ipsius Calami penuria.

Non verum
Calamus.

Calamum Aromaticum qui in Officinis pro Calamo venditur non esse Calamum odoratum Diosc. suspicantur Manardus lib. 6. epist. Fuchsius in paradoxis: & Hermolaus, qui hunc Acori vicarium fecit.

Acori.

Equidem non video [inquit Alois. Mundell.] quomodo quorundam descriptio Calami apud Diosc. vulgari continere possit, tanquam ab eo longe aliena. Quare plurimum dubitamus ne verus sit Diosc. Calamus, sed magis ad Acori radicem accedat, quemadmodum etiam Manardus & alii nobiscum suspicari sunt. Pergit *Qualceben.* ad Matth. Calamum vulgarem, quem Acorum in suis Com. affirmas nec male, si florem Iridis similem in Acoro requiras [cuius tamen non meminisse Diosc. omnino metuo ne verus sit Acorus, quia ad virgissei floris modum efflorescit. Huic respondet Matth. Soie clarius Calamum vulgare nostrum nihil aliud esse quam legitimam Diosc. Acorum. Crediderim eum Manardo aliisque nonnullis id omnino legitimum Acorum esse, quod non modo Septaliæ, sed omnes in vniuersum Calamum falso odoratum vocant. Folia quæ integræ ad nos una cum radicibus [vñ hæc pictura demonstrat] à Constantinopoli allata sunt, ferè Iridis. Retulit mihi Io. Merula, qui [] loribus annis degit apud Lituanos, frequentiss. in Lithuania & circa Tartarorum fines: foliis Iridi æmulis: flore etiam simili, colore roseo purpurascente nulla ex parte vario: vocatur ab incolis suo idiomate *Tartar. Ibi Zelt*, id est, Tartarica. Non potui non maxime Brassavolum admirari, quod sibi tam facile persuaserit vulgarem Calamum legitimum & Calamum odoratum esse à Diosc. Theoph. Galeno & Plinio descriptum. Idem in Com. Lat. cum magn. fig. & Italicis: Acorum legitimum quod falso Calamum aromaticum vocant foliis Iridi angustioribus, radicibus haud in rectum descendentibus, sed in obliquum actis, in caulium cacuminibus, ut affirmabat *Qualcebenus*, nucamenta, legitimæ Acori plantæ imaginem damus, quam Constantinopoli ad me misit Cl. Augerius de Busbecke, à Nicodemia petita. Veritati se opponunt qui dicunt Calami aromatici radices Iridi non esse similes: delirant cum contendunt nihil aliud esse vulgaris Calami odorati radices, quam generis cuiusdem Iridis. Insaniunt cum dicunt recentes calami radices omni prorsus sapore & odore destitui, & paulò post affirmant easdem recenter effollas esse amariss. & odore admodum ingrato: minimè hoc credendum iudico, ut qui recentiss. hæc radices degustauerim, ac etiam Tartaros compertum habeam sapidissime pro obsonio cum pane deuorare: Legatur Anguillari libellus. Hist. quoque Germ. *Calamus/Acorum*, Bohemicè *prust moree*. Brassavoli porro sententiam refutat Matth. his argumentis: Primum ex ipsa Calami appellatione, deinde ex eo quod dixerint Theophr. & Plinius non differre hunc formam à reliquis sui generis, id est, ab omni Arundinum genere, vtrique constat odoratum Calamum genere & forma Arundinem præ se ferre, odoratum tamen, non autem esse radicem. Quocirca Plinius Diosc. fortasse secutus dixit. *Fistula* (hoc est cauitati) inest araneum, quod vocat florem: non autem radici, ut contendit Brassavolus araneum illud inueniri in vulgari illo Officinari. Præterea vulgare calami radices quas Acori esse censemus assulose nequaquam frangi pot-

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

Calamus
non alius
est, quam
Iridis.

sunt: sed transuersim, quemadmodum & Iridis. Ceterum has radices non esse calami, euidetur inuentibus apparet, quandoquidem etsi complures illius Acori radices habeantur, quæ licet gerunt in cacumine folia, Iridi omni ex parte similia: nulla tamen usquam inuenta est, quæ secum Arundinis trunculum cacumini annexum deferat: nempe Acori proprium, non odoratum Calami est, Iridis folia ferre. His itaque rationibus Fuchsi quoque sententia improbanda mihi videtur. Porro minime compertum habeo Diosc. nedum Galenum dixisse aliquid odorato Calamo inesse amaritudinis, quam tamen in Acoro haberi Galenus prodidit. Præterea maiori inest vulgari Calamo acrimonia quam suo referat Galenus.

Croneburg. de comp. med. sentit cum Matth. non esse vulgarem Calamum verum & nos eo destitui. Nihilominus tamen concedit substituere vulgarem eius loco non esse piaculum.

Amat. Lulie se opponit Matth. his verbis: Post longam investigationem summe assensero, communem Calamum aromaticum verum esse Acorum. Ex India Lusitani nostri singulis annis adferunt, veluti Mercatores ex ipsa India per mare rubrum in Chairum, & Alexandriam deferentes. Venetia portat, Calamis similem, unde nomen accepit, odore suavi, & aromatico, album & subrufum, crebris geniculis, qui quum frangitur in assulas multas dissilit, fistulosus, araneolo illo albo plenus, nam quum manditur glutinosus cum quadam adstrictione subamara sentitur, ut facile iudicare debeamus, Calamum odoratum vulgarem Officinis verum esse. Matth. credidit Calamum aromaticum harundinem siue Calamum, non vero radicem, esse debere: At mea sententia decipitur Matth. quum licet Theoph. & Plinius in Calamo odorato Calamum, & non radicem laudare videantur, alibi tamen Calami aromatici radicem desiderant, & eam ceteris partibus calami anteferant: Ut apud Plinium est l. 24. c. 11. In quo, quum Calami odorati iuuenta enumerat, inquit efficacissima autem in omni harundine, quæ proxima radici: efficacia & genicula. Per quæ verba manifestè percipitur, quod ex omni Calamo siue harundine radix efficacior est pars: quæ de causa Calami odorati radix quam Calamus potius in op. trahenda est, ut merito hætenus pharmacopolæ, hæc prætiosa & exotica radice pro vero & germano Calamo odorato, usi sint. Nec enim est quod alium desiderant, modò vulgarem recentem, minime verò inueteratum habeant, quem ex odore & sapore facile discernere possunt. Quantum verò ad Dioscoridem attinet, si quis introspectiens cum accuratius expenderit, inueniet illum potius de radice loqui quam de Calamo, quum radix geniculata dicatur, calamus verò potius, nodis cinctus.

Amato respondet Matth. in Apologia his verbis. Quod Plinius ait efficacissimam in omni harundine eam esse partem, quæ radici proxima, quis non videat de harundine non de radicibus intellexisse Plinium. Namque examinaturus quænam partes in vniuerso Calamo ceteris præstent, partes radicibus proximas ceteris præstare inquit: quod facile prudens animaduertet lector. Nec enim aliam ob causam putat Plinius maiori vi pollere eas Calami partes quæ prope radices habentur, quam quod eadem ibi crassiores, vegetiores, robustioresque in omni harundinum

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

Calami
non alius
est, quam
Iridis.

genere reperiantur, quàm in cæteris earundem locis: quo sit, ut etiam Calami ipsius genicula efficaciora pariter ipse existimauerit Plinius. Quippe & genicula robustiora sunt & crassiora. Quam ob causam Calamum illum præcudit Dioscor. quin densè fuerit geniculatus. Quod Calamum, non radices, describat Dioscorides, aperte quidem constat, cum ait: Calamus odoratus in India nascitur, melior est fulvus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plenà araneorum fistulà. Hæc ille. Quæ ramen perperam Lusitanus intelligit. Quippe Calamus in primis harundinem designat non radicem. Præterea propriū harundinis est pluribus constare geniculis, & assulosè frangi. Deinde fistula, in qua quiddam araneæ telæ simile concluditur, calamo tantum debetur, non radici, quæ solida, dura, lignosa, & ubique occlusa spectatur, in omni harundinum genere. Ad hæc fulvus color Calamo sanè debetur, non radici. Quippe quod radix in harundine perpetuò albicer. Ad id autem quod proprium sit radicis (ut ille contendit) ut ipsa geniculata dicatur, calamus verò potius nodis cinctus, Dioscor. ipse responderet. Quandoquidem is non modò quarundam plantarum radices geniculatas facit, sed etiam caules, & calamos nonnullarum stirpium reddit geniculatos, ut faciliè quis certior fieri poterit, qui eius Codicem legerit in Hydropipere, in altera Cyclamino, in Gentiana, aliisque nonnullis. Plinius tritici culmis genicula quaternaria, faris-sena, hordei octona tribuit. Hinc libro senect. Culmo geniculato inquit Cicero. Constat præterea hæc radices ex Lithuanis, & Tartari finibus, quinetiam ex Ponto, ubi passim ferè proueniunt, ad nos conuehi. Quod maximo cuique argumento esse potest, eos prorsus hallucinari, qui eas ipsas radices Calami odorati esse contendunt, quod nullus extet autor (quod viderim) qui scripserit odoratum Calamum alibi prouenire, quàm in India & Syria.

Sed de his quid nobis videatur, intellige. Figura & descriptio Calami vulg. Acori postremo à Matthiolo exhibita, satis demonstrat iconem non fuisse factam ad plantam missam Constantinopoli (ut ipse ait, sed potius arbitrio, ut quondam plures alias plantas: satis id indicant folia ad Iridem nimium accedentia. Non est quod cum furore (eius verbo utimur) Anguillaram delirare dicat, qui dixerit generis cuiusdam Iridis, quandoquidem ipse olim scripsit ex lo. Merula: auctoritate flore esse Iridi similem: quæ sapè verba in postremis commentariis non debebat omittere si vera, si falsò addita, corrigenda erant: Nolimus tamen dicere cum Anguillara Iridis speciem, quamuis habeat non pauca cum Iride communia, & merito Iridi subnectatur, licet flores, iulis Corylorum similes, multum differant ab Iridis floribus. Argumentum Matthioli à trunculo Arundinis inhiatum erat, quia deest etiam Iridis caulis: Matthiol. dicit partes mutilatas siccas reperi: adhærentes Iridi similes, Apollo autem arundinacea folia quadantenus præ se ferre: nos utrunque non malè dici posse existimamus. Theophrast. lib. 7. cap. 12. scribit Harundinaceum potius constare solum Iridi.

Argumentum præterea Anguill. ab odore gratiori in sicco Calamo aromatico vulgari ut demonstrat Iridis speciem & non Acorum, minus firmum est: Theophr. enim l. 6. de caus. cap. 17. non solum radices Iridis siccitas reddere ait,

sed etiam Arundinum & Iuncorum, & Gladioli.

Amatus Lusit. Matthiolum temerè reprehendit, & ascribit radici vulgaris Calami notas, quas Dioscor. vero Calamo attribuit: suspicor etiam non verum quod ait has radices ex India deferri.

Calamum vulgarem aromaticum existimauit Manardus esse Acorum, cum quo non sentit Anguill. credens potius aliquam speciem Iridis, ob quasdam partes quas habet conuenientes cum Iride: nempe quod hæc radix sit coloris carnei (incarnati) internè, & quod habeat folia quæ ei videntur similia: quod quò magis siccatur, eo meliorem acquirat odorem, & cum carie corroditur odorem habeat gratiorem, id quod dicit Dioscor. conuenire Iridi. Recens verò est ingratisissimi odoris & summè amara.

Aduers. Acorus Diosc. & Acorus Theophrast. Officinis falsò Calamus.

Radice quæ inter aromata ex Oriente allata venditur vulgò pro Calamo aromatico sperabat Cæsalp. flores & fructus, quales in Iride videntur, daturam ut folia, cum potius conuenire cum iuncis repperit sit, huic satis conuenit Costi Arabici descriptio, quamuis pauca eius notæ ab Autoribus tradantur. Sunt enim inæquales Costi radices & tuberosæ, ut patet ex Helenio quoad alteratur, & ex radice Rhodia cui Dioscor. Costum comparat.

Nostorum Officinarum Calamus (inquit Clus. apud Garc.) nihil nisi radix est cui omnes notæ Acori à Veteribus adscriptæ pulcherrimè conueniunt: Solebat Antuerpiam Vlyssipone aduehi Calami genus vniuersi nostro simillimum, sed retri odoris & saporis horridi. Quale genus retri odoris fuerit considerandum: de eo verò quedam capite de Calamo aromatico vero

Bernard. Palud. in extrema Lithuania Tartari ab incolis appellari asserbat, quod à Tartari illius usus primùm ipsis esset demonstratus.

Indocti practicautes pro Calamo aromatico Antiquorum, inquit Tabern. vero Acori falsò videntur, quem errorem confirmauit Cornarius.

Gerard. Angl. a corus Officinis falsò Calamus, Bastard or false Calamus.

Cæsp. Bauhin. Phyt. Acorus i. sine Officinarum Calamus aromaticus, huic volunt aliqui conuenire Costi Arabici descriptionem apud Dioscor. lib. 1. cap. 15. alii Iridi volunt cognatum, alii cum Iuncis magis conuenire statuerunt.

Viret hodiè planta, testis est Cæsalp. apud Sereniss. Magnum Ducem foliis valde odoratis: gaudet aquis. Anno 1574. Clusio primùm conspecta est Viennæ Austria legitimi Acori planta virens, munere Ill. V. Augerii de Boulebeque, Dauidis Vngnad, & Caroli Rym, qui ones Legatorum officio apud Turcarum Imperatorem defuncti fuerant. Hanc porro, cum frigoris patientissima, hiemis intemperiem non reformidet, quamplurimis communicabam, aded ut nunc vulgarissima facta sit. Ingenti quodam lacu ad radices præcellsi montis iuxta Prusam Bithyniæ urbem spontè nasci intelligebant, & humidis locis gaudere, & secundum fluentia longè felicius prouenire quàm siccis experiebantur. Sed & C. V. Bernard. Paludan. copiosè admodum supra Vilnam urbem in paludibus, extremà Lithuania Moskouia spectante inueniri referebat. Habeo in horto Ill. E. C. Montb. ubi se multiplicat, & iulos fert, à me apportatum Sturgardia ex horto Ill. Ducis.

Amatus
repreh.

Anguill.
non Acorum

Costi
Arabici.
Acorus
Calami
genus
vniuersi
notæ.

Acorus
Ga.
de d. d. d.
Costus
A.
Arabici
Iridis
cognatus.
Iuncus.

Locus
Tartarus.

HISTORIAE PLANTARVM.

ante etiam attulerat Ill. meus Princeps ex Pfortzeim Marchionis Badensis. Vidi Lutetia in horto Io. Robini regii hortulani: Argentina in horto Di. Melchioris Sebitani Medici, Sturgardiz in horto Ducis Pharmac. insignis hanc plantandi ratione docuit: Calamus plantandus solo humido & arenoso & non remoto ab aqua: quotannis ex terra eximendus & abicissis radicibus summitates in terram reponenda, distantia palmi: hac ratione valde multiplicatur atque ut plurimum floret secundo anno a transplantatione, iulus adest Iunio, Iulio & Augusto.

Virtus

Vim habet Acori radix calefactoriam, decoctum ipsius potum urinas mouet, ad lateris & thoracis ac hepatis dolorem, ad tormina item & rupta ac conuulsa commodum. Lienem consumit. Prodest & urinae stillicidio, & ad virulentarum bestiarum morsus & ad insectus velut Iris ad menses ducendos. Succus radicis depurgat ea quae pupillis tenebras offundunt. Radix autem & in Antidotis vtiliter ammiscetur, Diosc. Acori radice vtitur Galen. quae gustu acri & modice amaro, odoreque non inuicundo, ordinis tertii in calefaciendo & exsiccano. Vnde constat quod facultatis calidae est, & consistentiae tenuis. Huic consentaneum est, ut urinam moueat, & lienes induratos iuuat. Acorum in sua natural. h. passum commendat Plin. ad pectoris dolores, ad Tenesmum, ad diuitias & collectiones omnes, ad conuulsa & euersa, & ad interiores femininarum morbos. Cum radix Calami aromatici vulg. inquit Fuchsius, in commanducando glutinosa sit, lingua astringens, amara, & subactis, eique propemodum omnes veri calami Indici notae quadrent, profecto & citra vilius reprehensionem pro vero Sepplasia in eius penuria vti possunt. Lectores considerent quae Fuchsius de glutinositate & astringente in Calamo aromatico vulgari dicit. Acorus (autore Matthiolo) in vino aut hydromelite coctus, aut eius puluis inspersus & haustus, tollit a frigida pituita aut flatibus ortos morbos, quales sunt dolores colici, laterales, tussis, conuulsionem, obstructions hepatis & lienis: prodest iis in quibus ex ictu, aut contusione sanguis coit, & difficulter urinam reddentibus, difficulter concoquentibus datur quotidie Acori puluerizati ʒi. cum pari portione Cinnamomi ex vino absinthio calido. Vbi recentis Acori copia est, conditur Saccharo aut melle, quo modo ad nos importari solet, etiamque in Germania & Italia eadem ratione conditi consuevit, ad omnia praedicta efficac. Ex Acoro fit Oxymel ventriculo & frigidis insigniter vtile, hoc modo; In puluerem crassiusculum teritur, affunditur acervum, opercularur, post triduum ad dimidias coquitur, perque linteum transmittuntur, dein additur mel pro arbitrio: iterum coquuntur ad aceti consumptionem. De hoc Oxymelite datur quotidie vncia una cum supra dicto Acori decocto. Dodonzi aetate eclegmatis non absque fructu additur quando crassi, crudi, frigidique humores pulmonem & pectus occupant. Referebat Clusio Bern. Paludanus Tartaros plerumque circumferre hanc radicem, & aquam non bibere, quin prius Acori radix in ea fuerit macerata. Simile quidpiam de huius plantae nomine etiam tradit Marthias a Michovv Sarmatiz lib. 2. cap. 12. Recentes vero radices suo cortice delibratas & diligenter repurgatas condire solent Constantinopoli, atque in usum adferuare: mane enim ieiuni plerumque manducare solent aduersus corrupti

aeris contagia, ut referebat N. V. Philibertus de Bruxella. Condiunt etiam nunc in Germania Nobiles aliquot matronae in domesticum usum, & plerique Pharmacopaei, quorum nonnullos [adeo nunc vulgaris ista est planta] singulis annis ad centenas libras colligere intelligit, & non contemnendum ex ea quatuor facere.

GALANGA MAIOR

Galanga maior radix est duorum pollicum, maiorae crassitudine, crebris pollicibus apophysis subinde donata, cortice satis extenso, circularibus zonis cincto, fusco, aut rubente, substantia solidiuscula, cinerea, albicante, punctulis (quae extrema sunt fibrarum) notata, matrice magis fusca, fungosaque, odore grato acuto, sed qui cedit Minori, ut & saporis acrimonia.

Descriptio

Galanga Clusii.



Galanga Acori.



Binum fere cubitorum, inquit Garcias, altitudine attollitur, foliis mucronatis in modum Lanceae, radice crassa, nodosa, flore candido, seminifera est.

Costa autem sic describit: Duorum cubitorum altitudine crescit, nonnunquam amplior: folia habet Orchidii Diosc. similia, longiora tamen & latiora, supernè saturatius, inferius dilutius viridia: caulem ex foliorum inuolueris constantem vel in Orchidum generibus: strom candidum, inodorum semen exiguum neglectum, autem secundum caput crassam & bulbosam, reliqua ex parte

Zingiberi similem, sed maiorem, nonnunquam capitula Hastulae regiae modo proferentem.

Euch. Ross. pro Galgan (-Galanga) habet nescio quam fictitiam iconem.

Lonic. sub his verbis: Grossen Galgan/ Galanga

langua maior &c. Figuram plantæ non vix ponit, quæ potius nonnihil ad Galamum vulgarem accedere videtur.

Galangam maiorem [ait Anguill.] Acorum esse censet Lonicerus, quæ opinio verisimilior quam Manardi. Turcis & Arabibus adhuc hodie dicitur *serre*, (legimus nos à Serapione *Rd-lungen* dici, sicut ab Auicenna *Casurudat*) quo nomine Serapio Acorum appellauit: color qui attributus à Plinio Acoro lib. 25. cap. 13. in Galanga reperitur: cur vocata fuerit hæc radix Galanga nescio, quia non est Arabum Galanga.

Scribit Matthiol. epist. ad Quilcebenum, Toto cælo errare eos qui Galangam Acorum esse contendunt. Brassau. Afferere Acorum Diosc. aliud non esse, quam radicem, quam Otho Mauritanos secuta, Galangam vocent: adeò ut maluerint cum Lonicero errare, quam cum Manardo bene sentire. Brassauolus securum esse Fuchsum: Eumque cum sibi nimis pumilæ videretur prioris Galangæ radices quam ut Acori referrent, ac propterea Brassauoli sententiam non probandam duceret, in suis de stirp. comment. alteram crassorem Galangæ, quæ iam pridem in Italiam fertur Acorum contendisse, veram eam non esse Iridi si vilem. Maiorem Galangam minore ignauiore, colore etiam dilutiore, minusque odoratam. Explodendam Monachorum in Mesuen scribentium opinionem, qui contra Brassauolam & Fuchsum quasi velle videtur Galangam potius odoratum luncum esse quam Acorum, quod tamen planè falsum. In post. Com. cum magn. fig. Lat. & Ital. addit aduersus Anguillaram, leuem eorum rationem esse qui velint vno tantum inspectu Galangæ folio esse Acorum: tamen si concedant facile folium illud fuisse Galangæ, quod sciat hanc folio esse Cyperi latiore, vegetioreque, Iridi non omnino dissimili: Ait porò in hist. Germ. Galangam Dioscor. & veteribus Græcis ignotam, eamque esse duplicem maiorem & minorem. n. Matthiolus olim assererat Galangam non esse Iridi similem, nunc ait folia Iridi non admodum dissimilia: nò putò illi vnquam visam virentem fuisse.

Neque Acosta, neque Garcias ab Hort. Clusio satisfaciunt. In Galangæ maioris descriptione, præsertim si ea quæ Europæ Oheinz viuunt legitima est Galanga maior: etenim eius radices multò maiorem habent similitudinem cum Iridis, quam cum Asphodeli aut Zingiberis radicibus. Et certe omnino sibi persuadet Galangam nostram maiorem Iridis genus esse, huic fortè simile quod in sua Pannonicarum stirpium historia primum est, nihil tamen statuit.

Hist. Lugd. Galanga maior Penz. Item Galanga maior a Costa.

Castor. Durant. figuram Costæ habet, quam etiam nos ponimus, licet non placeat, quia insignem demonstrat varietatem si bene facta: quod vix putò.

Galanga maior feritur in Indiæ Iaua, duntaxat radice ut Gingiber non semine, licet apud auctores aliud reperiat Garcias. Sed tamen & ex semine sata prouenit in India, in hortis, sed exigua quantitate, quanta videlicet acetariis & huius Gentis vsui medico sufficit. Cum essem Patavii Galangæ maioris nomine plantam vidi in horto Nobiliss. viri Jac. Cortusii, Iridi valdè similem foliis & radice.

Calida est siccaque tertio gradu: ideoque confert phlegmaticis & Stomachi humiditatibus, digestionem calore suo iuuat, cruditates statuit. Tom. II.

que dissoluendo. Colicæ opitulatur, anhelitus suauitatem conciliat. Renes calefacit, semen, virgæque erectionem concitat, Serapio. Galangæ puluis naribus inditus, Cerebrum confortat. Confert etiam Cordis palpitati. Syncopas abigit. Vertiginosis ex plantaginis succo auxiliatur. Omnibus denique morbis à frigidityte ortis confert, Lonicerus. Insigne Pharmacum, quo nos [inquit Io. Agricola] intolerabilem cruciatum sedare adfueuimus qui nonnunquam circa ungues digitorum pedis cuiuspiam dolore inastimabili affligit, ut Paronychia dici possit. Accipio autem Scobem Croci Martis, sic Chymistæ Cuprum appellant, collige illam sub incude fabri eius metalli, misce ferè cum tantundem læuoris Galangæ, adpone dolenti loco, & illico ingentem illum dolorem sedabis.

Adeò autem vulgaris est, teste Acosta, apud Malabarentes huius radice vsus, ut non modò in medèdis morbis eà vsurpent, sed in farinâ etiam conuertant, ex qua, seu nucis Indiæ lacte, nonnunquam Sura, aut lagra excepta, certum quoddam panis genus pinunt in tenuium placentalium formam, quod *Apai* vocant: in delitiis est hic panis, præbentque iis qui ventriculi debilitate & frigidityte laborant in alui, doloribus, veteri affectibus, & vrinæ difficultatibus: ac miramèntius efficaciam experiuntur, siue ob humores crassos & pituitosos, statum ve aut arenulas in vteribus aut collo vesicæ congectas, vrinæ difficultas orta sit, vel etiam ex carnis excretescentia in ipso vesicæ collo aut meatibus nata. Præbent verò edendum huc panem, deinde haustum *Nimp*: (quæ veluti aqua ardens est) concedunt: in inguinibus verò supràque pubem & collum vesicæ, folia Nymphææ decocta in aqua & macerata, atque adhuc calentia applicant.

GALANGA MINOR.

T Alcola [quæ scilicet forma importari solet] minoris Galangæ digitalem, & minorem radice crassitudinem arguunt, unde iuncæ crassitudinis apophyses pronascuntur, eà ferè formâ quâ Cyperi radices conspiciuntur, Zonulæque circularibus, perinde ut maior, cinguntur, cortex exterior rufescens, at multo odoratior: substantia interior, ut rubricam æmuletur, dura, compacta matrice parua solida, sapore & odore longè vegetiore generosiorque quam Maior, & ferè aromatico totas fauces abundè implente. Eam cum præcedente habetur.

Garcias hanc dicit duorum palinorum altitudine frutescere, foliis Myrti, radice nodosa.

Euchar. hoc titulo. Galanga, Galgan / figuram habet falsam, quam etiam posuit pro Cypero.

Gesl. in cat. pl. Cyperus Babylonicus *Far d'hyr*, Galganwur / Galengal.

Matth. Galanga minor: Cyperus Babylonicus.

Lonicerus sub nomine *Flein Galgan* / hîc am habet figuram, quæ nonnihil ad calamum aromaticum accedere videtur.

Asserit Garcias Galangam veteribus Græcis ignotam, Arabibus non satis perspectam. His *Calnegian*, licet omnes Mauritani & Serapio corruptè legât *Culungen* aut *Galangen*: esseque duplicem, alterâ minorem in China Lauandoa. Alteram maiorem in Iaua Lanruaz. In India vtramque Lancuas appellari. Auic. & Serapionem exactam huius plantæ notitiam non habuisse hinc factum putat ut duo diuersa capita de

Descriptio

Resl. not

Cyperus
Babilon.
Lonic.
not.

Acorum nō
est.
Monach.
opinio
Schoenanth.
Caulogia.
Iunci odor.
radix
Monach.

Acorum.
Galanga
minor &
farpana.

Cyperus.
Folia Myr-
thi.

ea [quod etiam annotant Aduerf.] scripserint. Antonium Musi Leonicensi testimonio, velle Galangam esse Acorum Veterum, sed non esse. Explodendam Monach. dist. 1. c. 47. in Metuem, opinionem, qui Galangam Schoenanthi radicem velint.

Galanga (inquit Acofta ex verf. Clusii) medicamentum vñsibus humanis valde necessarium est, dignumque vt Pharmacopolæ in suis Officinis perpetuo habeant: vna minor, altera maior. Arabibus dicitur *Caulogia*, de ea confufe Auicenna, videntur Græci & Arabes, vt Auic. & Serapio, non habuisse perfectā eius cognitionem: Bellunensis in suo Dictionario ait Auicennā scribere de duabus, licet tantum vna. Opinio Monach. dum scribunt Galangam esse Iunci odorati radicem, a ratione longē abest, quam etiam redarguit Amatus in Diosc. Galanga minor adfertur ex China. Hæc aliqui dicunt esse Acorum: sed folia gladiolo non similia, Galanga non est radix Schoenanthi vt voluerunt Monachi.

Gariophyl. Galanga minore vtendum in omnibus compositionibus suadet Cordus in Disp. in Acor. Garyophyl.

Galanga minuta siue minor quam vocant Officini, an sit Cyperi species potius quam Galangæ aut Acori, est Lobel. & Penz in adu. difficile statuer. Folia si sunt Myrti, vt quidam affirmant, non parum ab vtroque illorum etiamque maiore Galanga distabit. Verisimile, aut diuersas putatas fuisse Arabibus vtramque Galangam aut non admodū notas Auic. & Serap. ac propterea eos caput duplex de ea instituisse: Lob. Obs. vbi figura ex Clusio lc. pl. p. 58. H. Lugd. quæ absurdissimum esse dicit, Galangam Iunci odorati speciem statueret: & Tab. icon. Galanga minor.

Minor cum Rhabbarbo ex Chinaram regione in Indiam aduehitur.

Locus.

RADIX S. HELENÆ GALANGÆ species.

Descriptio



EX Florida radices quædam rotundæ, ad nos importantur. Sunt ex longæ, nodis distinctæ, quibus dissectis perforatisque sunt Sphæculæ præcatoriz, quæ siccatæ rugantur, osseamque acquirunt duritiem. Extrinsecus nigræ, intus candidæ. Cortex adeo adheret medullæ, vt vnum fiat cō-

tinuum. Sapor eius aromaticus est & gratus vt Galangæ quædam species esse videatur: pollicari sunt crassitudine aut circiter. Herba verò parum habet caulis, & humi spargit ramos: folia fert ampla admodum viridia.

Nascitur communiter locis humidis in Flo-

rida.

Monard. par. 1. Ind. occid. l. 1. c. 4. *Pater noster* de S. Helena, quia portu quondam proueniat ita dicto. In Clusii verf. Radix S. Helenæ, qui annotat ex descriptione facultatibusque huius plantæ colligere liceret, ad Cyperigenus aliquod referri posse, sed videant Lectores quæ Clusius de Drackena scribit cap. sequenti.

Hist. Lugd. *Pater noster*, vel Radix S. Helenæ Monardi.


Calida est in fine gradus secundi, sicca in primo, aut aliquid magis. Herbam Indi lapidibus terunt, eaque vniuersum corpus balneaturi fricant: aiunt enim cutem adtingere, membraque roborare odoris gratia. Hocque sæpius faciunt, ob insignem utilitatem quæ inde ipsis resultat. Puluerem tenuissimum eius tam Indi, quam Hispani in vino infusum ad ventriculi dolores felici cum successu hauriunt.

DRACKENA RADIX.

CAP. XIX.

Radix Drackenæ ita bene descriptæ & depictæ Rapud Clus. de peregr. & Exot. vt nihil addendum videatur.

Londini (inquit) mihi donabat Gen. Eques



Frânciscus Drake quædam radices, cum tribus aut quatuor lapidibus Berzæ Peruanis, quas Autumno præcedente (absolutâ navigatione, quâ totum Orbem, superato Magellanico freto, circumueerat) secum retulerat, illas summas apud Peruanos estimationis esse asserens, propterea, illius

qui mihi eas donabat gratiâ, huic radici Drackenæ cognomen indebui, & ipsam in tabella expressam lectoris oculis proponebam.

Semunciali autem hac, magna ex parte, erat crassitudine, & prælonga, subinde in nodos & inæqualia capita extruberans, atque in summis capitibus, veluti è crallibus squamis contexta. Dentariæ *recedens*, siue verius *emacens*, [quam cap. 22. lib. 5. meæ Rarior. Pl. hist. describebam] sere instat, fortis nigricans, rugosa & dura, quia resiccata, interiore parte alba: tenues fibras hinc inde adnatescentes habebat, quædam crassiusculas, & maiusculas, duras & leuitas, à quibus alii nodi dependebant: nullo manifesto odore præditam esse obseruabam, sed saporem habere deprehendebam nonnihil adstringentem & linguam exsiccantem inritū, diutius verò manducatam, tenuem suauemque acrimoniam in ore relinquere. Magnam quidem affinitatem habere videbatur cum radice S. Helenæ, de qua Nicolaus Monardes lib. Simpl. med. ex Occidentali India delatorum.

Sed

Sed cum N. Elliot, qui Drake in ea navigatione comitatus fuerat, Hispanos in Peru maximo in pretio habere, nec nisi difficile reddim posse, referret, ab illoque didicisset, folia præfens venenum esse, ipsam autem radicem, non modò illius veneni, sed etiam aliorum antidotum esse, & cor ac vitales facultates roborare, si pollinis in modum trita manè ex paucillo vino sumeretur, ex aqua febris ardores mitigare: earum facultatum ratione, valdè conueniret cum radicibus, veneno aduersantibus, de quibus eodem libro Monardes, in his tamen aromaticum saporem, & & coloris gradum desiderabam, quem illis radicibus tribuit.

Hist. Lugd. Drakena radix. Tabern. Icon. Bèzoardica radix. Noster Gener. Io. Cherlerus anno 1606. ex Anglia Londino redeuns, munere celeberris Pharmac. Iacobi Gareri attulit radices Drakenas, quas cum aliquandiu masticarem, a credinem molestam adhuc sentiebam, quam postea etiam deprehēdebam, & in iis, quibus anno 1609. Basileæ Cl. V. D. Iacobus Zvingerus me donabat.

DRAKENÆ AFFINIS RADIX.

Drackenæ radices quodammodo alines videbatur [inquit Clus. Exor.] ex radices, quæ in ingente illa Prætoria nauis Proregem ex Orientali India reuehente, & ab Anglicis Naucleris occupata, reperi fuerant. Et enim tuberosæ erant, & quantū ex earum forma colligere licebat, summā terræ superficiē repentes, multisque vil-

lis & fibris obsitæ, fuliginoso colore præditæ, nō nihil tamen ad flauum tendente, saluam, dum manducabantur inficientes & amaræ, foliorum quidem aliquos pediculos adhuc retinentes: qualia verò illa fuerint, nemo facile dixerit. Ceterum magni vsus apud Indos fuisse, verisimile erat, quandoquidem prorex eas referret cum nobilibus aliis medicamentis in Orientali India natis. Iacobus Garerus cum sequente plantula ressecata mittebat.

Contrayena radix.

Ex Charcis prouincia Peruana radices quædam venenis resistentes (inquit Manard. apud Clus.) aduehuntur, Iridis radicibus valdè similes, sed minores, & sculnei folii odore. Hispani Indias inhabitantes Contrayena appellant, quasi dicas alexipharmacum, quoniam earum puluis ex albo vino sumptus, aduersus omne venenum cuiuscunque tandem sit generis, præsentissimum est

remedium, vino sublimato excepto, quod solā lactis portio extinguitur, vomitione illud resicere faciens, aut per sudores euacuans. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, educi ferunt. Ventris etiam animalia pellit. Gustata radix, aromaticum quiddam sapit cum acrimonia coniunctum: quare calida videtur secundo gradu.

ZEDOARIA.

CAP. XX.

Descriptio

Zedoaria duarum circiter unciarum longitudine, minimo digito minor, foris cinerea, extensa, intus ex cinereo fusca, duriuscula, solida, tanquam conererus quidam succus, paucis apparentibus per substantiam fibris, sapore amaricante, & acri aromatico. Huic per omnia similis altera, figurā duntaxat breuior, crassior, tuberosa.

Radices peregrinam naturam indagantibus Veterum notæ se primū offerunt annotandæ.

De Zurumbet igitur, id est, Zedoaria, Serapio *Zurumbet Arab.* ex variorum autoritate ita scribit. Zurumbet sunt radices rotundæ, similes radicibus Aristolochiæ rotundæ, in rotunditate earam, & sunt similes in sapore & colore Zinziberi, & afferuntur de Zeni. Zurumbet est calidum & siccum in secundo gradu, & impinguat, impinguatione conuenienti, & aufert ventositates. Et de proprietate eius est, quod aufert odorem Alliorum, & Ceparum & vini: proprietates eius est quod confert morbi venenosorum, & retinet ventrem, Resoluit apostemata propriè quæ sunt in matrice, & retinet vomitum & confert ventositati colicæ.

Ex Auicenna si roges, Zedoaria quid est? Respondet is: Porciones similes Aristolochiæ, minores tamen earum, & est in sua virtute. Et melior quidem est illa, quæ cum Napello crescit, & eius vicinitas debilitat plantam Napelli. Item Zurumbet quid est? Est lignum simile Cypero sed est maius & minus odoriferum. *Natura*: Calida est & sicca in tertio. *Operationes & proprietates*, Resoluit Ventositates. *Decoratio*: Est impinguatia, & abscondit odorem vini, & Alliorum, & Ceparum. Membra anhelitus & pectoris. Est lætificatiua confortans cor. Membra nutrimenti. Retinet vomitum. Membra expulsionis, stringit naturam, & confert ventositatibus matrici. *Venena*: Confert mordicationi venenosorum vermium valdè, ita ut propinqua sit Zedoariæ. *Permutatio*: Ponitur loco eius in venenosis, quantum ipsa & medietas eius durungi, & dux tertiarum ponderis eius de taraxacon sylvestri, & medietas ponderis eius de granis Citri.

Auicenna igitur easdem vires recenset, quas Serapio ex diuersis autoribus suo Zurumbet assignat. Hoc tantum distat, quod Auicenna calidum & siccum ordine tertio statuit. Serapio autem ex Aben Mesue calido & sicco duntaxat. Hic conferre morbis venenosorum, ille valde conferre morbis venenosorum vermium, ita ut ad Zedoariā proximè accedat. Quibus verbis innuit (inquit Hist. Lugd.) aliquid esse inter Zurumbet & Zedoariam discriminis.

Serapio de temper. simpl. cap. 161. Zurumbet aliud describit. Ex Galeno tradens id esse ex speciebus odoriferis, ac propterea admisceri in confectioibus aromaticis, & esse calidum & siccum prope tertium gradum, & in virtute sua simile Cathæ ligetæ & Cubebis. Ex Possidonio Cir-

Serap. not.

namomo Cubebam substitui posse: Et Paulum eadem quæ Galenus iisdem effere verbis. Male autem pro Cassidonio legit Possidonium. Zerumbet verò cum Pauli Arnabone idem facinæ eiusdem descriptionem subiungit auctore Isaac, Mesarugia & aliis, inquit: Est arbor magna quæ nascitur in montibus Lubnem, id est in Oriente, nullum faciens fructum, habens folia longa, quorum color est inter viriditatem & Citrinatam, similia foliis salicis, & ita color est ramorum etiam, & habet odorem sicut odor Citri, est calida & sicca, & styptica, resoluit & stringit ventrem. Virtus eius est sicut virtus Nucis Muscata, verum est subtilior ea. Quum sit sternutatorium cum eo, & oleo violaceo, confert dolori capitis feruido & humido, & confert stomacho & hepati propter suam aromaticitatem. Ex quibus perspicere licet Serapioni Zerumbeth & Zedoariam easdem esse radices, nisi depermutata sint eius exemplaria; item aliud Zerumbet arborem. Auicennæ verò diuersas esse plantas, ut qui Zedoariæ radices Aristolochiæ radicibus comparat, Zerumbeth lignum Cypero: nisi hic sit Interpretum error, qui Zerumbeth Aristolochiæ radicibus Zedoariam Cypero comparasse debuissent: præsertim cum ei quæ Cypero similis est, easdem prorsus tribuerit vires quas Serapio Zedoariæ, ut ostendimus. Hæc Arabes, de Zedoaria & Zerumbeth literis mandarunt. Ex quibus expendere oportet, an duæ radices, quæ in Officinis Zedoariæ & Zerumbeth nomine veniunt, ex sint quibus vti sunt Arabes. Sed hic quid dicendum, ex sequentibus colligemus.

Zadura.
vñs
Arnabo.
Costus
Zerumbeth.
Zedoaria
rotunda.

Zadura, alii Zeduaræ radice [de qua Serapio cap. 172.] nunc ferè nostræ ætatis [inquit Ruellius] Medici contra pestilentis æris contagia vtuntur. Officinæ & Medicorum vulgus Zedoariam nominat. Zadura per multis Recentiorum medicamentorum compositionibus expetitur. Arnabo Mauritanis nomine Zerumbeth venit, qui de ea re parum sibi constantes Zedoariam alibi interpretantur, nomenclationis aucupio planè nobis imponentes.

Zerumbeth
Serap.

Vulgaris vñs Zedoaria Anguillaræ est Costus. Zerumbeth & Zedoaria rotunda res eadem sunt secundum Serapionem, hodiè potest videri Venetiis, quò satis adfertur. Zerumbeth (ut scribit Syluius) Serapioni, Auicennæ, aliisque, & Zedoaria, Zedæp Actuatio in aurea antidoto dicitur, Zedæp eadem in diantho, & in diantho, alibi Zedæp & Zedæp: res est ac nomen barbarum Græcis prius incognitum. Est autem Zedoaria radix Aristolochiæ rotundæ æmula, sapore & colore zingiberis, calida sicca gradu secundo, eadè Serapioni dicitur zerumbeth sine h.

Zedoaria.
Zerumbeth.
Zerumbeth.
Zerumbeth.
Carnabium.
dum.

Idem sentire videtur Fuchs, qui de comp. medicam. ita scribit zadura, zaduaria, zudar, zadera & zaduar posterioribus Græcis appellatur, officinis zedoaria, Serapioni zerumbeth. Sapore ac colore ferè zinziberis. Quod Mauritanis zarûbet nominatur, id recentioribus Græcis zarnabû zarnabadû, vel Carnabium & Carnabadium. Paulo autem Arnabo dicitur. Serapioni est rotunda & globosa, Aristolochiæ rotundæ radici similis. Hæc hodiè inter zedoarias longas ex India & Oriente afferuntur. Hinc est quod plerique zerumbeth interpretantur zedoariam simpliciter, sed minù rectè, nam adiciendum erat rotundam, ut discrimen à vera & longa zedoaria hac adiectione innueretur. Quod propter pro zerumbeth, rotun-

da illa nobis vocata zedoaria accipienda erit. Faciem Zingiberis repræsentat, inquit Matthiolus, radix illa quam Mauritani, & Officinæ zedoariam appellant, odoratior tamen, amariuscûla, neque aded ut Zingiber acris. Huius nusquam, quod sciam, meminere veteres Græci, etsi Recentiores ab Arabicis edocti, nempe Aetius & Actuarius, eam suis medicamentorum compositionibus admisceant. Zedoaria [ut cap. 172. testis est Serapio] conuehitur è Sinarum regione ultra extremas Indiæ oras. Non desunt qui credunt, quod Arnabo, de quo scribit Paulus, & Mauritanorum zedoaria vñm & idem referant medicamentum. Verum Serapionis testimonio cap. 271. Arnabo apud Græcos nihil aliud designat, quàm zerumbeth apud Arabes: quippe quod hoc loco de zerumbeth eadem scribat Serapio, quæ de Arnabo ante ipsum adnotauit Paulus. Est autem Arnabo, ut ex Serapionis autoritate memorix prodidit Isach, arbor procera in Oriente proueniens. Quibus facillè patet, Arnabo non modò zedoariam non esse, sed nec in Europam ad nos aduehi. Quo fit ut Cordus aberrasse deprehendatur: quippe qui zerumbeth zedoariæ genus existimet. Hunc fortasse securus Fuchs in lib. de comp. medic. non sine magno errore putat zerumbeth & zedoariam idem esse.

Cæterum zingiberi aroma aliud simile Arnabo videtur, quod zedoariam Officinæ Arabes verò, zerumbeth vocant, à Græcis prætermisum, quia Carpesum Cubeba est, non verò zedoaria.

Diu exultauit Garc. zedoariam quæ celebrior est, eam esse quæ zerumba dicitur, & medicamentum est Persis expetitur, quod hinc [ex India] Ormuz defertur, inde Asiâ in minorem & Venetias: zerumbeth appellatur Arabibus, Persis & Turcis zeruba: in Guazarate, Decan, & Canara Caribæa: in Malauar sua. Copiosè prouenit in Malauar. Calecû videlicet & Cananor siluis spontè. Si autem pangatur aut feratur, plurimis etiam locis: inde à multis Zingiber siluestre appellatur, nec id sine ratione, quoniam eius folia Zingiberis foliis similia sunt, longiora tamen & magis aperta: eius item radix Zingibere maior. Radix crura, concinditur & siccat, deinde in Arabiam, Persiamque defertur, in Gidâ & Alexandriam; vnde postea Venetias & in alias regiones transfertur. Conditur etiam Saccharo, & Zingibere præstantior est.

Auicenna lib. 2. cap. 743. duntaxat Zerumba aut zerumbeth nouit. Sed quoniam eam vidit in frustra rotunda, interdum verò in oblonga, concisam ad Sinum Persicum vchi, duo genera esse existimauit zerumba & zerumbeth. Hæc etiam de causa folia, quæ non viderat, prætermisit: & quemadmodum ipsa radix ex India in alias regiones transferatur, duntaxat expressit. Et certè etiam hodierno die diuersum est præterium eius quæ in rotunda frustra resecta est, ab illius quæ in oblonga concisa est, ut minores Zingiberis radices vilioris æstimentur quàm prægrandes. Quod verò iuxta Napellum nasci optimam scribit, planè fabulosum est: quandoquidem Napellus vix hic reperitur [non sunt enim huius regionis siluæ procreando Napello aptæ,] & zerumba plurima, ut diximus, nascitur siluosis Malauar locis: tum etiam aliis multis sara prouenit: nec quemquam [tameis diligentissimè perquisuerim] hanc radicem iuxta Napellum vidisse intellexi. Præterea ex reliquis Auicennæ iam adductis locis manifestum est, quàm sibi parum constet,

Locna.

Zingiber
siluestre.

constet, ut facile hinc indicari possit eum Zumbet historiam planè ignorasse.

Serapionis autem legitimi Codices non habent additam expositionem Zerumbet, id est, Zedoaria, sed ab interprete insertam verisimile est, qui differentiam inter Zedoaria & Zerumba ignorabat. Id ex sequentibus facile deprehenditur, cum ait, è Chinæ regione aduehi, rarâque apud Indos inueniri. Zerumba verò abundè in India nascitur.

Non defuerunt qui crediderint, Arnabo, de quo Paulus lib. 7. cap. 3. scribit, idem esse cum Zerumbet, Verùm ex utriusque historia, satis manifestum est, diuersas esse plantas. Siquidem Arnabo Pauli arbor est procera, suauis odore fragrans: Zerumba verò graminea est planta, ut modo diximus.

Cæterum minùs sunt audiendi, qui aut Ben album & rubrum, aut Carpesium esse volùt: quoniam hoc vtrumque medicamentum huc non sine quæstu conuehitur. Zerumba verò hinc in exteras regiones exportatur. Præterea longè diuersa est utriusque facies à Zerumba.

Clasius apud Garciam ait Zeruba siue Zerumba forsitan erit ea radix, quam capite de Costo Venetiis adferri dixi, Zingiberi aded similem, ut nihil suprà, plerumque tamen maiorem, & intus pallescentem. Inuenitur Antuerpiæ apud quosdam aromaticos Zedoariæ quoddam genus illis Blockzeval, id est, tuberosa Zedoaria nuncupatù, rotundum instar Aristolochiæ rotundæ, foris nigricans, interdum cinerei coloris, intus candidicans, gustu vidualis Zedoariæ. Idem in append. hist. Dodon. Gall. cap. 28. Zedoaria rotunda Arabibus Zumbet (quamuis Serapio describat aliud Zumbet arborem) recentioribus Græcis Zedra, Offic. Galliæ Zumbeth. Belg. Zedoar bloc. Interdum reperitur cum Zedoaria vulgari, verùm ignari Pharm. reiciunt ut inutilem: Ex descriptione Isaaci apud Serapionem apparet Zedoariam Arabum diuersam à vulgari Officinarum. Rondel. opinatur esse Dioscor. Costum 1. siue Arabicum: pauca notæ deficiunt.

Zedoaria. Zeduarum siue Zadura herba & zerumbet: Prostant [ut voluit Lobel. & Pena in Adu.] peregrinæ duæ radices in officinis, neutra Græcis memorata: & vtræque & nominis sic radices eiusdem meritò putatur. Eidem Lobelio alibi: Zeduarium Officinarum, Belgic. Blockzedoar videnti & habendi copia fuit Antuerpiæ.

Casus 37. vicius. Hist. Lugd. Zerumbet Serapionis & Zedoaria eiusdem radices partes. Zerumbet Serapionis Clasius.

Zerumbet. C. 3. m. Casp. Bauhin. Phyt. Zedoaria 1. siue longa quæ ad Costum Syriacum Dioscor. referenda. Zedoaria 2. (quæ Græcis recentioribus Zedra) rotunda. Vnam tantum radicem censemus, licet formâ differant, sed eiusdem radices partes diuersas. Zedoaria 3. siue tuberosa foris nigricans, Zerumbet Serap. Clasius. Vnam Zedoariam existimo non tres: neminem inuenio qui duas rotundas faciat.

Vicius. Vnus ad colicos cruciatus, præsertim aduersum venenata, certissimus. Lob. & Pena Adu.

ZEDOARIA GARCIE.

Geiduar. Quid nos hic [inquit Garc. lib. 1. Arom. Hist. cap. 42.] Zedoariam appellamus, Auicennæ lib. 2. cap. 752. (tamen non nouerit) Geiduar dicitur, aliud nomen ignoro, quia nascitur regionibus Chinesium provinciarum vicinis. Magno

verò emittitur Geiduar, nec facile inuenias, nisi apud Circumforaneos quosdam & circulatores, quos Indi loques, Mauritanii Calandares appellant, hominum genus quod peregrinationibus & stipē emendicando vitam sustentat. Ab his enim & Reges & Magnates Geiduar emunt. Est verò Geiduar magnitudine glandis, eiusdemque ferè formæ, colore sublucido. Vnicum huius Geiduar fragmentum, quod circiter dimidiam vnciam pendeat, à Nizamoxa semel impetraui: sed id in Lusitaniam cum insigni lapide armenio missum, vñ cum naui periit. Ostenderam id prius Pharmacopolis in Chaul & Goa: sed nemo illorum nouerat quid esset. Aliud paucillum apud istos circulatores vidi: sed non emi, quod fraudem metuerem. Vtile est autem istud Geiduar ad plurimas, sed præsertim aduersus venena, & virulentorum animalium ictus, morsusque.

Porro hoc medicamentum Dioscoridi incognitum fuit, tum etiam Auicennæ. Incognitum etiamnum Europæ esse putat Geiduar Clas. hic descriptum, & difficulter cognitum iri credendū est, ob eas rationes quas noster Author in medium profert. Nam quam Zedoariam vocamus, nihil minùs est quam Geiduar: sed ex Zerumbæ forsitan erit generibus, quam sequenti capite noster Auctor describit. Tamen non desint, veluti in Costo diximus, qui eam inter Costi genera Diosc. descripta referendam censent.

Hist. Lugd. Zedoaria Garcie.

Casp. Bauhin. Phyt. Zedoaria 4. quæ Geiduar Auic.

ZINGIBER ET EIVS SILIQVA.

CAP. XXI.



Geiduar. Zingiberis *Descriptio* gradus pluribus tubibus planis, vnciam aut se-scunciam longis, digitali crassitudine, angusta ceruice commissis constant eâ ferè ratione quâ Anemones radix, vestigiis foliorum ceu Zonis præcinctæ, cortice extenso, ex cinereo sulco, substantia intus cinerea, albicante, solidiuscula, fibris

longis & crebris intertexta, sapore feruido aromatico, Piperis æmulo. Prior nostra icon est ex Lobelio parata, quam tamen reiecit, aliam veriore ponens.

Zinziber sic describit Garcias. Est similibus Iridi aquaticæ aut Gladiolo [non Arundini] foliis, magis tamen nigricantibus: caule cum foliis duorum aut trium palmarum altitudine, radice etiam Iridis, non serpente, ut voluit Ant. Musa exam. simpl. At nec admodum acris est, præsertim eius quod in Baçaim natum est, ob nimiam, quæ dominatur humiditatem.

Zingiber sui generis planta est, autore Diosc. in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens: cuius radices Cyperi modo parue sunt, candicantes & odoratae, atque Piper sapore imitantur.

Non est [inquit Plin.] huius arboris (Piperis) radix ut aliqui existimauere, quod uocant Zimpiberi, alii vero Zingiberi, quamquam sapore simile.

Gingiber, ut in Plinii Codice legitur, herba est nomenclatura Barbara, antiquitati viribus quam facie notior: ut cuius Diosc. radicellas duntaxat paruas ut Cyperi memorat, cui tamen non similes admodum & multo maiores sunt. Effigiem quae est tota Iridis aut Xyridis, ex vitore nigricantibus foliis surrectis, hic damus, aiunt Lobel. & Pena Adu. nullidum depictam, qualem alebat Antuerpianus Pharm. Guill. Drielsch. cuius munere accepimus: tamen si flores ut pote Septentrionali rigidoque caelo, nullos prompsit. Siliquam perelegantem habemus Morgano recens allatam ex Indiis Occiduis, pusillae Melegettæ parem: sed triplici carina triquetra graciliorem, & admodum Xyridis siliquæ accedentem: sed cortice capillulis obductam, albidam, intus oppletam semine pari, lucido, Melegettas manu facili, & multo gratiore, Gingiber prorsus testante: subter etiam quæ siliquæ hæsit scapo arguit Gingiberis stipitem: quare omnes istas siliquas, Cardamomi esse plantarum consimilium, nec Gingiberi absimilium, non abs te quidam peregrinator narrabat.

Huic Lobelin Obstr. tribuit semen aromaticum subastringens gustu, Zingiberis colore, album, Cardamomo maiori ferè par, sed oblongius, minusque feruidum, in triquetra item siliqua, rugosa, duriuscula, villis quibusdam & cirris obducta, chamæiridis pusillæ siliquæ non dispari. Libello autem de Balsamo ait, viso Zingibere legitimo, perspicue percepi Zingiberis iconem munere missam à Dreisch Commentitiam & effictam: quodam veteri Botanico Germano esse. Nouus variarum rerum, rariorumque Indicarum stipitem author Io. Hugo Linscortus Barauus non nisi illegitimam zingiberis effigiem dedit, nos legitimam effigiem damus. Arundinem Vallatoriam præ se ferre nuper enatam. Calecur ager profert zingiber, ut notat Vartomanus, quod haud dubie radix est, eruiturque nonnunquam pondo vnciarum duodecim. Nec omnibus est eadem amplitudo. Plus non agitur in profundum radix, quam ad ternos vel quaternos palmos, Harundinum modo. Cum eruitur Zingiber, relinquunt internodium radicis in serobe, unde erutum est Zingiber, terramque radice aggerunt, seu semina eius radicis, proximo anno eruturi fructum, id est, Zingiber. Qui Zingiber videntur in India, hac facie [id nos docente Ruell.] representant. Radix geniculatis serpit internodiis, crebroque ex iis & ex acumine nouas radices spargit: folia bis ræue in anno fundit arundinacea, sed quæ in breuiorem exilitatem fastigiantur: in totum Gramen dicunt æmulari, nec quicquam in ea regione frequentius inueniri. Subdunt nonnihil subesse discriminis in sapore quod maximè sentitur cum præcox vel intemperstia fuit messis. Oportunum legendi tempus cum folia inaruerint, alioquin & teredinibus obnoxium est, & carie tentatur: Cæterum [inquit Cornar.] quod Dioscorides radiculas Zingiberis paruas esse dicit, quales sunt Cyperi, id est lunci

quadrati: id etiam hodie in plerisque apparet. Secundum notandum est (monachibus Monachis,) quod Mesues in fine ipsius descriptionis docet nos cognoscere qualitates & notas boni zingiberis, dicens. Et sit zinziber album & mundum, & recens: dicit autem album ad differentiam illius quod videtur esse rubei coloris: quod quidem non est purum sed tinctum cum quodam bolo non Armeno (ut dicunt) atque vrinam esset, quoniam inde minus malum proueniret: sed cum bolo Apuleis, seu alterius loci nostræ regionis. Tinguunt autem ipsum, non ut bonificetur, sed ut sit magis ponderosus, & ut impleantur foramina vermiculorum, ne videatur perforatum, & non recens. Excusantes enim malitiam dicunt, quod ad meliorem ipsius conseruationem hoc faciunt, Attamen nos experti sumus, quod ita corroditur à tinctis tinctum. Primum nempe zinziber est album, & quod querit in præsentibus & sequenti descriptionibus, & aliis locis. Vnde sequitur, quod tinctum siue rubrum, & non album zinziber, non est admittendum ad medicinæ usum.

Aduehitur, inquit Mathioli, Gingiber in Italiam copiosum ex Calecut magno Indiæ emporio, atque ex Troglodytica Arabia non solum tractu temporis exiccatum, sed & saccharo recentissimum asseruatum, vel quodam mellis genere, quod quibusdam siliquis exprimunt. Id tamen longè magis Veneto præstat: cum hoc officinarum mangonio ex aridis fiat radicibus, longo temporis tractu, modò acerrimo lixiuio calece, quernoque cinere parato: modò muria: modò dulci aqua maceratis & edomitis, quibus odor non modò deperditur, ac euanesceat: sed & sapor & acrimonia subrahatur. Illud verò statim cum è terra effossum nulla ferè maceratione cõdiatur, Vires & facultates non exiit, sed eas seruat. Quamquam Brassauolus non rectè velle videatur, quod Venetiis magonizatum Gingiber gustantibus plus acrimoniae relinquit, quam illud quod recentissimum in India siliquarum melle, aut Saccharo conditum asseruatur, & cum aliis aromatum generibus ad nos conuehitur. Quod quantum a veritate & ratione dissonet, si iudicare poterunt, qui diu in myropolibus versati, rem omnino exploratam habent. Monachi de Carie contrarium asserunt contra Amatū dicentem: Aduehitur porro zingiber ex Insula Cananoris. Radix alba, quæ ne euanesceat, ac vermibus corrodatur, terra quadam rubra aqua dissoluta inficitur, ac sic infectam, rubrum zingiber appellant. Recentes radices, saccharo aut melleo quodam liquore ab Appolline condiuntur, natali solo delicatiores, & fœtilibus in Italiam apportantur, ut idem sit Venetiis & Mediolani, officinarum mangonio, ex aridis veterascentibusque radicibus: Verumtamen facillimè deprehenditur ex Brassauolo, quoniam ex recenti zingibere conditum, minus acre est, & gustu delectabile, ex veteri autem mordicat, nec ita gustum satiat, ac in fine nonnihil, velut filamentum, in ore relinquitur. Huius Matth. verba corrumpit, nec sinceram hominis mentem assequitur, potissimum quod acius illum dixisse noter, Venetiis mangonizatum Gingiber, dulce autem viride propria in patria conditum, quod si scripserit prædicta legentes diiudicent: Enimvero minus acre legitimum censet, id est minoris acrimoniae, sophistico comparatum, quod tum acerrimo lixiuio, ex querno cinere, caleceque maceratum, modò muria, modò dulci aqua mace-

Gingiber.
Diosc. not.

Siliqua.

Cardamomi
siliqua
fuerit
licet sua
priorum
siliqua
fuerit Lab.
X. inferens
non illegi-
tima.
Iam nota
Lobel.

Radix de-
scripta.
Folium
arundinacea.

Zingiber
album.
Rubrum.
Bolo Apu-
leis tinc-
tum.

Tinctura
non impro-
bit carum.

Brassauolus
reprob.

Zingiberis
radix cor-
rodatur
rubro.
Zingiber
rubrum.

modò muria maceratu, modò dulci aqua maceratur: in his etenim etli odoris, ac nativae acridinis parte spoliatur, non potest tamè teporis, curriculo, nò extraneae, ac intima subeunt induere acrimoniam, ex maceratione præter naturam imbuta, eaque acquisivita, actius quam recēs asseruatū appellari, quod si aridum, non præmaceratam, condituram fuisset, maiori profectò acumine gustum vellicaret: Sicque Matthiolum etiam impugnet, quòd humiditas aquea in viridi Zingibere de qua Gal. 7. sacrimoniam hebetat: ac nisi alios sales, recentioræ afferat, anagyrum monebit, & à probatissimis viris facile refelli poterit.

Maximil. Trans de Molucis insulis Zingiber hoc modo (teste Clus. apud Garciam cuius descriptionem iam antè posuimus) descripsit. Zingiber verò passim in singulis Insulis huius Archipelagi nascitur: aliud seminatim, aliud spontè provenit, sed quod seminatur nobilius est. Herba similis illi quæ Crocum (Indicum intellige, siue Curcuma) fert, & eo modo eius radix ferè nascitur, quæ Zingiber est.

Nunc Zingiber [ut Acoſta ex verſ. Clus. delineat] trium aut quatuor palmorum magnitudinè aſſurgit, foliisque est Milio maiori, quod lachryma lobi vulgò nuncupatur, admodum similibus, caule verò Alphodelini crassitie, ex multis foliorum involucribus constate, ut veluti exigua quædam arundo appareat: radicibus quodammodò tridi similibus. Mirabilis est figura Acoſta, quæ non respondet descriptioni, eaq; idem omittimus: Cōpil. H. L. scribit foliis Lachrymæ lob, seu Milii Solis: melius verò Clusius vertit, Milio maiori.

Hist. Lugd. Zingiber Penæ. Item Zingiber Acoſta. Anton. Zingafetta narrat in insula Thidotte nasci Zingiber, idque recēs panis modo, quòd recens acre non sit veluti est siccum, parvâ plantam quæ caules ferat palmum altos, folia item similia, sed angustiora & breviora, quorum nullus usus.

Plant. Ic. p. 70. Zingiber Lob. 17. Adu. 11. Teut. 99. Et p. 71. Zingiberis siliqua cum grâs suis Lob. 37. Teut. 99.

Zingiber Græcis *ζιγγίβρις*: Germ. *Zimber* / *Zimber*. Belgæ, *Gengeber* / *Gengber* / *Gember* / *Gingebær*: Gallis, *Gingembre*, *Zingembre*. It. *Gingebre*, *Zenzero*. Hisp. *Gengeure*, *Gengibre valadi*. Anglis *Genger*. Appellatur Arabibus (ut ait Garc.) *Perlis* & Turcis *Gengibil*, non *Lenzibel* [ut corruptè legunt Serapionis lib. simpl. cap. 336. exemplaria] in Guzarate, Decan, Bengala, cum adhuc recens & viride est, *adra*: siccatum verò, *sculte*: in Malauar, tam viride quàm siccu, *imge*: in Malayo, *aliaa*.

Pharmac. Guill. Driesch alebat Antverpiæ: Succulentè recens conditæ ex Indiæ variis locis, nec non Aphricæ finitimæ in Europam ultimam Septentrionalem & Meridianam vñum feruntur. Flisselingæ Zelandorum vidit Lobel. Obs. in horro Ill. Principis Mauritii à Nassavy, ubi alebat, solo leui, lateritiis fragmentis rubris quo gaudebat permixtò. Per similes aut eiusdem Zingiberis radices ibidem duo Pharmacopœi. Nascitur Zingiber in omnibus Indiæ provinciis Garcie cognitæ, semine aut radice satum. Nam quod spontè provenit, exigui est momenti. Optimum & frequentissimum est Malauasicum, Arabibus & Perlis maximè expetitur. Secundum locum obtinet quod in Bengala invenitur. Tertium quod in Dabul & Begaim, totaque eâ ora maritima nascitur. In solitudinibus & mediter-

raneis vix crescit, neque inde ad nos adfertur. Invenitur etiam in Insulis Diui Laurentii & Comato, quæ Aethiopiæ sunt conterminæ. Inde sumplerunt occasionem nonnulli, ut scriberent apud Troglodytas & Arabes nasci. Colligitur & eruitur Decembri & Ianuario, deinde aliquantulum siccatum limo obducitur, non quò maioris sit ponderis, sed ut foraminibus obturatis, diutius sine corruptione in sua humiditate naturali conservetur. Nam non probè obductum, tere dini obnoxium est: Galen. lib. 6. simpl. & Barbaria conuechi scribit. Si per Barbariam Indiam intelligit, bene quidem, at si eam Africæ partem quæ nunc Barbaria dicitur, malè. Diosc. autem lib. 2. c. 15. in Troglodytica Arabia nasci tradit: (Plin. in Arabia & Troglodytica.) Nascitur quidem apud Troglodytas & Aethiopes, sed aded exigua quantitate, ut ipsis incolis vix sufficiat. In Arabia verò non nascitur, quandoquidem ad Arabes exportatur.

Radices Zingiberis præceptore Dioscor. eligi debent, quæ tere dinem non senserunt. Celeriter enim, attestante Plinio, cariem sentiunt, quamvis in tanta amaritudine.

Viridi herba ad multa vtuntur, quemadmodum nos (inquit Dioscor.) ruta, in potionibus quæ cibo præmittuntur coquentes, & aliis costuris ammiscentes. Vin. habet calefaciendi, & incoquendi, alium molliendi, moderatè stomacho rômòdam. Facit etiam ad ea quæ oculorum pupillis tenebras offundunt. Annisctetur quoque antidotis. Et in summa Piperis facultatibus quodammodò simile est.

Zingiberis radix [teste Galeno] utilis est, quam vtrique ex Barbaria ad nos conuehunt. Excalfacit fortiter sed non statim primo ocurso velut Piper unde sanè & ipsum minus esse subtiliū partium partium quàm Piper existimandum, siquidem in tenues solueretur partes, & celeritè acta, ut illud, fieret calidum. Apparet enim illaboratam & crassiorè adhuc quandam ei inesse substantiâ, nec eam siccam & terrestre, sed humidâ potius atque aqueam. Quo fit ut facile perforetur, cum scilicet recemēticia insit humiditas. Neque enim quicquam eorum quæ aut planè sicca sunt, aut humida, sed elaboratam & familiarem continencia humiditatem, huic vitio obnoxia sunt. Idem usu venit Piperi longo: Atque hinc est quod diutius perseverat quæ proficiuntur à Zingibere aut Piperi longo caliditas, quàm quæ ab albo aut nigro. Nam sicut ab aridis calamis flamma simul celeritè accenditur, & vndequaq; dispergitur: eundè in modum quæ à siccis potestate medicamenti editur caliditas. At quæ prodit ab humidioribus, ceu ligna sunt viridia, & tardius accenditur, & durat diutius. Ex quo fit ut vtriusque medicamenti diuersus sit usus. Si quidem ubi totum corpus celeriter excalfacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt quæ & celeritè à caloris nostri contactu incaleſcant, celeriter quocunque ferantur. Verùm ubi partem quamvis refrigeratam recalfacere studemus contra agendum, nimirum quæ tardè caleſcentia plurimo tempore perdurant, ea præbendo. Ceterum licet Zingiber & Piper album hæ ratione [alii legunt longum] à nigro Piperi differant, non magna tamen est differentia: at Nasturtium, Sinapi, Thapsia, & agreſtium Columbarum stercoſi maiori tempore perdurant. Radix Zingiberis condita ad affectus ventriculi frigidos confert, sumpta inanè jejuno ventriculo. Corrigit omnem ventriculi humiditatem, ac om-

Troglodyta

Gingiberis

Deleum

Vires & vsus

Locus

Arboresc.

Locus recens non

Nomen linguae

Gingiberis

non corruptionem generatam in eo ob nimium esum fructuum. In Syrupo aut Saccharo condita confert tussi & refrigerationibus: pectus purgat, atque maturat pituitam viscidam & lentam. Valet contra obstructions hepatis, generatos à frigiditate & humiditate memoriam iuuat. Sperma auget & ad Venerem incitat. Denique Gingiber calefacit ac vtile est in cibis, datum cum purgantibus vehementioribus, ut Colocynthide, Homodactylis & similibus, eorumque malitiam corrigit.

Calidum esse 2. gradu & nonnihil humidum Dodonæus statuit.

Umbrello stomacho [aiant Aduers.] vires instaurat, calorem fouet, aliumque emollic. Dioscoridi: nempe si matura, sed tenera, recentisque radices comedantur, nondum exhausto humido lubricante & purgante, ut vidimus in Indis, quare vetustiores siccant potius & listunt alium. Succulentæ autem recentis conditæ, multa commendatione ex Indiæ variis locis, nec non Aphricæ finitimæ in Europam vltimam Septentrionalém & Meridianam vnam feruntur: tamen iam vi emolliente exoleat: maceratas lixiuio condiunt saccharo etiam nostrates Veneti, Antuerpientes, & alij Iustiores passim.

A multis, ut testatur Plin. ob id, quod tedium facile sentiant, radices Zingiberis conditi solite sunt. Quem ad finem Sachs. & Cronenburg de comp. med. zingiber conditum Mesuz ita conficiunt. Recipiunt zingiberis recentis, si habere possint, aut saltem arte humectati, partem vnam, cum Sacchari partibus tribus, & coquunt. Sunt tamen qui zingiber humectatum cum saccharo clarificato triplo condiunt. Humectandum autem zingiber album, purum, recens, aqua frigida affusa. Qua ratione non solum radices, sed & fructus sicciores recentibus similes redduntur. Biduo enim sine coctione, in aqua frigida macerata hæc omnia intumescunt. Sunt qui zingiberis & aliarum radicum libra vna coquunt in aqua, donec renerescant, deinde tritas per cribrum seraceum trahunt, & denuo cum Sacchari libris tribus ad mellis consistentiam coquunt. Zingiber verò conditum intemperiem ventriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea tardam ac deprauatam concoctionem, quæ cibos in acidam cruditate corrumpit. Viscerum lubricitatem corrigit, flatus dissipat, alimenti in iecur & vniuersum corpus distributionem accelerat.

Zingiberis species Mechinum dicta.

Descriptio

Est mihi zingiber, colore externo magnitudine & figura ad vulgare zingiber proxime accedens, quemadmodum & saporis teruore. Verum consistentia est compactiori, duriori, paucioribus fibris intertexta, coloris ex cinereo nigricantis, de quo ni fallor Lob. Conditur etiam & prostat in Officinis alia radix Mechinum hodie dicta zingiberi cognata, à quo nec maturitate aut improbitate differt, ut parum verè scripserunt, sed potius specie & concretionem, (cæret quippe fibris & filamentis) perspicuitate, fuscedine, soliditate, & actiore gustu, nec tedium exedi solita.

Lobel. & Pena Adu. & ex iis Hist. Lugd. Mech. & zingiber fuscum Officinarum.

Secacul [inquit Rond. de cur. morb. in paraly.] est quod vulgò Mequicum appellant, radix similima zingiberi, & conditur ut zinziger, sed est calidius, sine humiditate, quæ tamen reperitur

in zinzibere. Ob id zinziber patitur cariem non Mequicum, qua nota distinguitur à zinzibere, sicut etiam filamentis & villis quibus caret Mequicum, non autem zinzibere.

ZINGIBERIS MECHINI RARA
varietas.



Descriptio
Nec vni-
qua no-
bis visa antea
hec quam icon-
ne exhibe-
mus Mechini
species, nuper
adferri cœ-
pta, cuius
Morganus ali-
quot emit li-
bras. Vulga-
rum zingibe-
rem aut Me-
chinum re-
fert, sed ele-
gantiori aspe-
ctu, colore
Mechini, cor-
rice zingiberis
albi, sed squa-
matum geni-
cularum, & ferè

articularum veluti Doronicum: aspectu pellucido: gustu quam zingiberis multo actiore, & siccior: carie non exesa.

Lobel. & Pen. Adu. & Ic. Plant. Mechini rara varietas.

Hist. Lugd. Mechinum Penz. Rara Mechini species.

CVRCVMA SIVE TERRA
merita Offic. radice Crocea.

CAP. XXII.



Descriptio
Cvrsuma
Cvrum ge-
nerum pro-
miscue in my-
rotheis re-
peritur: vna
breuior, cras-
sior: altera
gracilior, lon-
gior: maxima
longitudo vir-
gula excedit
vncias, mini-
ma plusquam
dimidio mi-
nor: in vtro-
que genere o-
culi subinde
conspiciuntur
& radicum
nouæ propa-
gines, adhuc
zonæ circula-
res. Superficies rugosa, coloris crocei, qui in
penitioribus partibus intentior apparet, quo &
aquam in qua maceratur aut saluam si masticetur.

si aut salinam si masticetur, tingit. Substantia solida & compacta, nec ita teredini obnoxia ut Zingiber, sapor amarus cum acrimonia aromatica, nonnihil ad zingiberis saporem accedens.

Garciz radix recens, intus crocea, foris Gingiberi persimilis: vehementi amaritudine & acrimonia, dum recens est, caret: siccata verò acris est, sed non adeò ut zingiber, puròque sine noxa posse sumi: foliis est Milii maioribus, caulèque foliaceo.

Acostæ, maiora latioraque habet Crocum Indicum folia quam Orchis Serapias dicta, colore foliorum Scilla, dilutiora tamen & tenuiora.

Quid Plinio Dioscoridique fuerit Cyperus Indica herba, non facile fuerit ostendere, cum suo nomine nec Officinis, nec Herbariis quibuscumque, sed quodam potius ascriptio & vulgari noscatur.

Defertur ad nos (Ruellii sermo est) ex India radix, quam officinæ Terram meritam appellant. Ea Gingiberi permixta sæpius inuenitur, & prorsus cingiem eius refert, inanducataque magnam Croci liquoris viam reddere cognoscitur, pictoribus idè optimè cognita, & iis, qui pro phaleris equorum eam vtuntur. Siquidem inducta verum auri fulgorem mentitur, quare auri loco ad exornandas æneas laminas opifices vtuntur. Hanc igitur Plinii Cyperidem, siue Diosc. Indicum Cyperum id esse, quod terram meritam officinis appellari modò diximus, non ambigimus: cum ex India cum Gingibere deferatur, exteraque dotes ei ab iis Autoribus attributæ respondeant, nec effectu reclamante. Namque si libeat vim eius experiri, inuenies partes pilosas eam perunctas confestim glabrescere, tam apertè pilos detrahit. Hæc Ruellius à cuius opinione non videtur discrepare Syll.

Hoc interdum inter Zingiberis radices inuenitur (ait Fuch. de comp. medic.) & Curcuma Seplatis nominatur. Potrò Serapionis Curcuma, ut ex vtriusque Historiæ collatione patet, non est nisi Chelidonium maius. Quapropter de Serapionis sententia Chelidonii potius radice, quam Cyperi Indici Pharmacopœis vtendum esset. Nihil autem refert vtro vtantur, quod Cyperus quoque Indica præsentem Diosc. attestante, pilothri vim illita exhibeat. Idem Monach. in Mef. Cronemburg. de comp. med. lib. 1. Apollo. & Clus. in fine Dodon. Gall. cui *cyperus indicus* græcè dicitur, Lat. Cyperus aut Cyperus Indicus Diosc. Offic. Curcuma, & Cornar. Colleg. med. Florentin. idem facit, quanquam videantur contrarii omnibus ferè reliquis cum dicunt de hac radice: illud Curcuma Veterum esse non abs re plerique existimant. Idem cum superioribus sentit Amatus, qui dicit: Ruellius Cyperum Indicum, radicem quandam esse, quam Officinæ Terram meritam appellant, ait, quam nisi Curcumam Officinarum intelligat, procul dubio errat.

Curcuma, quæ à Veteribus Cyperus Indica dicitur, Cordo in Hist. duplicis est differentia, videlicet longa & rotunda &c. Idem in Diosc. ait, Cyperus Indicus cui à Dioscor. tribuitur amaritudo, quam vbiq; Curcumam in Pharmacopoliis vocant, quidam etiam Terram meritam.

Officinarum Mauritanos secutarum Curcuma (ait Matth.) præ se fert omnes notas, quas Indico Cypero reddidit Dioscor. Quandoquidem Gingiberi similis, eius odorem ferè redolet, gustu subamarefcit, & mansa Croci modo iuscit. Quibus etiam illud accedit, quod depi-

latoriis medicamentis quibusdam admiscetur. Verumtamen sciendum est hanc non esse Curcumam à Serapionis Interprete pro Chelidonio descriptam: ipse enim nihil aliud pro Curcuma intelligit, quam Dioscoridis Chelidonium: quod sit, ut non desit suspicio erroris vel Interpretis vel Scriptoris, cum Curcuma neque Mauritani, neque Græcum sit vocabulum: Aphri enim Chelidonium Kauroch appellat, vnde palam est Curcuma pro Kauroch in Serapione deprauatè legi. Quo factum est, ut priores tum Medici tum Seplatiarii, qui nunquam hæc perpenderunt, fuerint hallucinati: quippe cum eos lateret, cuiusnam plantæ radicem, Indica Cyperus referret, Chelidonii maioris radicem esse crediderunt, ob Croci succi similitudinem. Itaque Serapionis deprauatam lectionem secuti, Indicum Cyperum Curcumam vocauerunt. Indici Cyperi meminit Serapio Dioscoridem secutus, proprio capite de Cypero. Ex quo apertè conicit, Curcumam Serapioni deprauatè inscriptam, Seplatiarum Curcumam, quæ procul dubio Indicus est Cyperus esse nequaquam. Crocum Indicum, inquit Garc. in Canara appellatur *itad*: sic etiam in Malauar, sed propriè *mantale*: in Malayo, *cunher*: à Persis, *darzard*, quod lignum luteum sonat: ab Arabibus *haber*. Huius mentionem facere videtur Auicenna lib. 1. cap. 100. & Calednium siue Chelidonium appellare. Fieri autem potest, ut corruptum sit vocabulum, vocatque sit hæc radix initio Arabibus Aled, quemadmodum & Indis, postea verò corruptè Calednium. Ut autem hoc facilius credam, me impulit, quod eum, caput de Curcuma siue Cucurmani lib. 2. c. 166. [quod etià huic radici simile est,] scripsisse videam. Solet enim Auicenna de simpl. aliquo medicamento dubitans, diuersa scribere capita. Neque eorum auctoritas me mouet, qui per Curcuma Chelidonium intelligi dicunt, quoniam crocea sit radice, scribatque oculis perutile esse, quæ notæ etià Chelidonio conueniunt.

In nostris exemplaribus (inquit Clus. apud Garciam) Auicenna lib. 2. cap. 100. Chelidonium describit. Capite autem 166. de Chorchumani siue Chorchumma agit, cum hac interpretatione: Et est sex olei de Croco. Officinarum Curcuma, Dioscor. Cyperum Indicum volunt Recentiores. Præter nomina ab Orta enumerata ait Acosta ex vers. Clusii, Crocum Indicum, Arabibus etiam *Curcum*, Turcis *Sarosh* appellari.

H. Lugd. append. p. 11. Crocus Indicus Acostæ. Terra merita.

Tab. ic. Curcuma, Cyperus Indic^{us}, Gilb. murgel. Plant. Ic. p. 72. Terra merita, Curcuma Pharmac. Cyperus Indicus Diosc.

Cæterum Curcumam seu Terram meritam Offic. nos verum Indicum Cyperum statuimus. Nec illorum sententia nos mouet qui Galangam, Cyperum Babilonicum esse tradunt. Sicuti nec eorum, qui per Cyperum Indicam, radicem Chelidonii intelligi volunt.

Nascitur plurima in regionis Malauar parte, videlicet in Cananor, & Calcut. Prouenit etià hic Goæ, sed exigua quantitate. Magna eius copia ad Arabes, Persas & Turcos deferretur: qui omnes apud se non nasci, sed ex India adferri fatentur.

De viribus hæc prodidit Diosc. Narratur & alia species Cyperi in India nasci, zingiberi similis: quæ commansa crocea & amara repetitur: illita autem, pilis corpus denudat. Est per se, ait Plin. Indica herba quæ Cyperis vocatur, Gin-

giberis effigie : commanducara Croci vim reddit. Cypero vis in medicina psilothri. Illinitur prerygiis. Plinius non distinxit vires ut Diosc. quæ enim Diosc. attribuit primo Cypero, hic etiam secundo attribuit.

Hæc & nonnulla alia sic tradunt Auerf. At vires perquam similes quasdam habet [præter Croceum succum quem manu remittit] cum zingibere, tamen si gustu ignauiore, ingratiore, dote autem referandi viscera potiore : ideoque hodie plerique cum zingibere miscent ad Ictericum. Vis autem psilothri illa feruida videtur elanguescere, longa temporis & locorum intercapedine, atque teredine, cui eadem obnoxia est, sed minus quam zingiber. Pictoribus & Chymistis hodie frequens est. Croco indigeno [inquit Garcias] vulgò vtuntur ad tingēdos condiendosque cibos, eum hic, tum apud Arabes & Persas, ob eam nimirum causam, quod viliori ematur, quam noster Crocus, qui apud eos etiam prouenit : huius tamen etiam in medicina vsus est, præsertim autem in ocularibus medicamentis : tum etiam ab psoriam, si cum Mali aureæ succo & Cocci, siue Nucis Indicæ oleo misceatur. Ad eosdem affectus commendat etiam Auicenn. Curcuma.

COSTVS. CAP. XXIII.

Missâ descriptione Costi, genera & delictum ita delineat Diosc. Ex Costo præstat Arabicus, qui albus est & leuis, & plurimum ac iucundum habet odorem. Secundum locum obtinet Indicus qui plenus est & leuis, & niger, velut Ferula. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, odore nates percellens, Optimus autem recens, albus, plenus per totum, densus, aridus, non corrolus a teredinibus, non graue olens, ad gustum mordax ac feruens. Vim habet calefaciendi, vrinam ciendi, menses ducendi, & ad veteri affectiones auxiliarem, & in pestis & perfusionibus ac fomentis. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest : & ad thoracis dolores, & ad conuulsa ac inflationes, cum vino & absinthio. Sed & Venerem stimulat ex vino mulso : Ducit etiam lumbricum latum cum aqua, illinitur quoque cum Oleo in rigoribus ante febrium accessionem, itemque resolutis. Purgat & maculam Solarem illitus cum aqua aut [pro ñ legitur] Marc. quod ad me attinet malo legere ñ quam ita legerit Gal. de simpl.] melle. Ammisceatur etiam in malaginata & antidotos. Sunt qui admittis Helenii Cornageni radicibus adoluerent. Quod deprehensu facile est. Neque enim ad gustum feruens est Helenium, neque odoris gratiam validam & nates percellentem exhibet.

Costus leuiculam, planè amaram, plurimam autem acrem calidam in se qualitatem simul & facultatem continet, autore Galeno, adeò ut etiam exulceret, cum ex oleo corpus eorum quibus per circuitu rigor inuadit, ante accessionem illo confricatur : sic verò etiam in resolutis & lischadicis, atque in tumma in quibus excalefacere partem quamuis, aut ex alto in superficiem extrahere quippiam est opus, ad Costum confugitur. Eadem de causa vrinas mensesque prouocat, & ad rupta, conuulsa, ac laterum dolores congruit. Porro ob amaritatem quæ illi inest lumbricos necat, ob eandem & ad contractas vel ex Sole maculas, iohannis Græci vocant, cum aqua

aut melle vsurpant. Inest item stansosa quædam illi temperiei humiditas, per quam & Venerem excitat cum vino mulso. Hactenus Galenus. Libro verò de simpl. ipsi attributo quatuor Costi traduntur species, Ægyptius, Arabicus, Indicus, & Syrius.

Cæterum Theophr. inter ea [quibus ad vnguenta vtuntur] Costum reponit. Amaracinum enim ex hoc fieri scribit. Acredinem quandam, inquit, cum caliditate moderatam habet.

Plinius de Costo sic paucis agit : Radix & folium Indis est maximo pretio. Radix Costi gustu feruens, odore eximio, frutice aliàs inutili. Primo statim introitu amnis Indi in Patale insula, duo sunt eius genera, nigrum, & quod melius, candicans. Pretium in libras 16.

Auicennæ species tres sunt. Arabicus est, inquit, albus, leuis, aromaticus. Alter est Indus, qui est magis leuis. Tertius est amarus, grauis odoris, qui nominatur garyophyllata. In quo è Diosc. dissentit, scribente tertium esse Syriacum, grauem, colore buxeo, & odore feruentem.

Serapio de Costo omnia ex Dioscoride & Galeno exscripsit.

Officinæ Arabes secutz Costum fecere duplicem, dulcem & amarum. Diosc. tamen & Plinius neque dulcis, neque amari mentionem ullam fecerunt.

Horat. Achæmenium Persicum dicit. Achæmenii enim Persæ dicti ab Achæmino Rege, unde Costum venit.

Costus verus (si Bacch. credimus) non habetur, sed pro Costo quædam vulgaris radix venditur, nec inuenitur dulcis & amarus, ut vulgus putat, sed albus & niger, nunc Venetiis optimus venditur.

Costus amarus, siue Costus amara, siue Costum amarum (omnis enim generis Monachorum testimonio legitur) in Mesa. Antid. & in multis aliis locis dicitur ad differentiam dulcis. Nec conuiendum cum asserentibus dulcem Costum in rerum natura non reperiri, cum Costi sint plures species, & quod aliqua ipsarum dicatur dulcis proberetur per plures non spernendos authores. Nos autem non possumus determinare de Costo, quoniam adhuc nec Costum Amarum, nec Costum dulcem (supple veram) vidimus : quia hæc radix, quæ communiter hodierni aromatarii pro Costo vtuntur, non est Costus, nec Costi species : Etenim quilibet legens scripta doctiorum de Costo, clarè percipit, hanc Officinarum radicem, non esse veram Costum. Dioscor. quidem, Serapio & Auicenna tres describunt Costos, Arabicam scilicet, Indicam & Syriacam : sed cum loquuntur de costo Arabica, dicunt, quod est alba, leuis & Aromatica, & nihil de amaritudine tangunt. Quod autem subtruxerunt, Macer & Constantinus apertè dixerunt, quod nõ est amara. Vnde Costus Arabica, quia non est amara, rectè dulcis potest appellari. Sed quia nec amara, nec dulcis vera habetur Costus, loco eius secundum Auic. ponitur medietas ponderis eius de optimo Pyrethro. Et secundum alios, loco eius ponitur Helenium, id est snula vulgò dicta.

De Costo velut de re nota [ait Cornaz.] Diosc. tradit, ut cuius radicem solum expeti conllet, id quod Plinius quoque dixit. Radix Costi gustu feruens, odore eximio, frutice aliàs inutili. &c. Diuersa ab hoc (ait præterea) herba est indidem costus appellata hortensis, Piperitis aut Siliquastrum potius censenda. Ac quod

in pe-

Crocus no-
Acr.

Costus A-
rabicus.
Costus
Indicus.
Syriacus.

Delictus

Adulteriu.

Temper.
Exulcerat.
Ad lischad-
dem.

Ad lum-
bricos.

Niger.
albus.

Costus al-
bus & ni-
ger Vene-
tiorum.
Costus dul-
cis.

Costus Sul-
gatis non
est vera.

In porta auxiliari costum à Vipera morlis semun-
vix pondere dixi, in Græcis corruptè habetur,
Cordis yppias C. 373. id est auxiliatur sextantis,
hoc est duarum vnciarum pondere. Pro C. ergo
lego notam *quintum*, nimirum hanc C. quæ etiam
iuxta vox requirit : & sextantis pondus allàs
nimium esse apparet. Reliqua nota sunt in hoc
capite. Et de lunbrico lato in Com. medicis a-
gemus.

Costus 37
racus in
offic. Ger-
manicæ
quales.
Veri autem Costi (Cord. loquitur) in antiquis
& bene instructis per Germaniam Pharmacopo-
liis, species deprehendimus duas, quarum altera
Syriaci, altera Arabici Costi historia representat.
Altera enim radix est duum vel plurimum digito-
rum latitudine, per transversum in taleolas se-
cta, colore candida, pondere levis, gustu acris, a-
romaticæ acrimonia sua diu palatum oblidens,
odore acris, iucunda, orisque halitum ad longum
temporis spatium bonitate odoris commedans.
In summa, nihil deest quod ad Arabici historiam
attineat. Altera crassitudine iam dictam æquat:
sed buxo colore, & pondere differt, odore tamè
ac sapore Arabico omnino similis. Tales qui-
dem sunt Arabicus & Syriacus Costus. Indicum
verò nondum nobis videre licuit. Interim Phar-
macopolas hortamur ut verum Costum emere
studeant, & repudient tandem adulterinū. Vul-
gare illud Costu græde, terribilissimum & rancidum
saporem habens ex Helvetiorum alpibus & Ita-
lia ad nos adfertur. *Hæc Cordus.*

Illi autem contrarius est Marthiolus, dicens:
Qui in myropolis passim habetur Costus adul-
terinus est: quippe nec ulla odoris suavitare cõ-
mendatur: nec gustu adeò acris deprehenditur, ut
admodum exulceret, ut Galen. inquit. Proinde me-
dicamentis, quæ Costum excipiunt non erit meo
iudicio, imponendus, cum præterea nos planè la-
teat cuiusnam plantæ sit radix. Cæterum Septa-
fiaria, si legitimum consequi nequeunt, à pseudo-
costis abstinere, & Galenum, vel auctorem illi
sequantur: qui si Costus defecerit, ammoniacum,
vel helenium supponi iubet. Sunt insuper, qui
Costi loco Angelicam Recentioribus vocatam
supponenda, existimant: quorum sententiam ma-
gis probandam censerem, quam eorum, qui Pseu-
docostis utuntur. Costum enim hæc radix non
obscurè refert: quandoquidem eximia illa odo-
ris suavitare tam iucunde spirat, ut Angelicæ no-
men sibi merito vendicasse videatur. Acris præ-
terea est, nec amaroris omnino expertus. Quapro-
pter eos haudquaquam damnandos putaverim,
qui Angelicam Costi genus esse crediderunt. *Hæc*
Marth.

Huic postremæ opinioni de Angelica consen-
tit Collegium Med. Florent.

Extant, [id scribente Fuch.] in officinis Medi-
corum sub Costi appellationibus dulcis & amari
radices duæ, sed à Veri Costi notis plurimum di-
stantes. Nam nec candidæ, nec leues, nec gustu
feruentes, nec odoratæ sunt. Suspicio est Menthæ
Sarracenicæ, alteram saltem esse radicem. Nos
ut speramus veras Costos dulcem & amaram in
altera nostrarum stirpium hñt. Comm. editione
pictas dedimus. Nicolaus quoties citra adie-
ctionem Costi mentionem facit, semper amarū
appellatum intelligit, ut qui gustu feruidus sit.
Cum paucis adhuc vera Costus nota sit, eius su-
mendum succedaneum cum Galeno in suis anti-
ballemonis, nempe Helenium, cum utriusque i-
dem temperamentum sit, nec viribus inter se di-
scerpent, ut ex ambarum stirpium historię colla-
tione omnibus sit manifestissimum.

Tom. II.

Nostræ vulgaris Costus (inquit Cronenburg.)
mendax est. Quando autem verum habere non
possum [quem tamen in Officina Ioannis à Galé,
cum Mithridatium confarcinaret anno L. omni-
bus notis suprà scriptis, & vidi & gustavi] cum ex
succedaneis Galeni tantumdem Ammoniaci, vel
Helenii substituo. Visum Pseudocosti planè inter-
dico. Hodie verò in Officinis & myropolis, ut
habet Amar. dulcis & amarus dicitur Costus, qui
tamen amarum tantum exhibeant, & pro eo her-
bat cuiusdam radicem capiant, quam hortulanā
Romanam, siue Mentham Romanam aut Sarra-
cenicam Septasariii vocant.

Multi sanè Sunt, qui statuunt Zedoariā vulgare
esse Costum. Sic enim Cæsalp. inquit: Costi ge-
nus tertium quod colore buxo traditur fortè
Zedoaria fuerit vulgò appellata. Sed quod nobis
videtur cum Calaneo aromatico vulgi satis con-
uenit Costi Arabici descriptio. Adulteratur
(Brunfel. in Onom.) Costus Enulæ campanæ. Ho-
die pro Costo (inquit Cæsalp.) venditant Ferulæ
radices, concisas in taleolas, sapore quidem fer-
uente, sed sine odoris gratia: ut neque Costum
nigrum dici possit quamvis Ferulæ simile. Co-
stum Tragi est Petalites quam opinionem repro-
bat Cordus. Costus niger quibusdam dicitur
Angelica. Demum capiti iam circumferri [no-
tantibus in Monachis] & alia radix alba, ama-
ræque, quam nonnulli Medici Romæ Costum iu-
dicauerunt, atque pro Costo vera medicinis ad-
miserunt. Sed an vera Costus sit ignoramus. He-
lenium Comagenum nihil aliud est (ut vult
Zyving.) quam costus dulcis & albus Officinarū,
quæ & alium habent amarum & nigrum, qui
quid sit vir scire potest. Quidam pro costo ni-
gro exhibent Thapsiam radicem quæ vitanda.


Costus 37
racus in
offic. Ger-
manicæ
quales.

Mentha
hortulanæ

Zedoaria
Costi
fi.

Costus 37
racus in
offic. Ger-
manicæ
quales.

COSTVS ARABICVS ZZ. SIMILIS.



R Adices
sunt, qua-
les à triginta
annis penes
me habeo,
pollicari cras-
situdine, lon-
gitudine se-
lescunciali, aut
duarum vnciarum & se-
mis, tuberibus
exstantibus
hinc inde in-
æquales, Zin-
giberis in mo-
rem, interdù
digitatim fis-
sæ; colore sa-
ris intusque
Zingibetis
albi dicti, co-
cretionem non

Descriptio

ita etiam dissimili, solidiuscula, fibris respersa,
sapore amaricante grato, cum acrimonia sub finè
non ignaua, qui cum Zingibere Lugduni solebat
reperiri.

Costus hodie Lugduni frequens est Arabicus,
qui Sylusio missus est inde à Carolo Paludano
Medico: non tamen quem Arabici Scriptores
dulcem & amarum soli inuenerunt. Marth. le-
gitimus costus Arabicus apud Calceolat. Apud

R r r 2

Garciam: Venetiis adfertur Costi quoddam genus Zingiberis radicibus aded simile, vt nihil supra, intus etiam fibrosum sed pallefcens, & eximie amaritudinis. Non defunt qui Zedoariam vsualem inter costi genera referant: & primum apud Diosc. descriptum Costum esse autument, quod multas notas habet, quae Arabico illius Costo pulchre quadrent.

Hist. Lugd. Costus Syriacus & Arabicus. Camer. hist. Germ. ad Epit. Matth. Costus Arabicus omnino zingiberi cognata radix, not. G.

Lob. & Pen. Adz. zingiberis effigie Costus Arabicus & Syriacus: Item radix quae cepit e Syria & Aegypto Venetias asportari zedoariae effigie: primus omnium. Valerandus Dourea verum Costum esse censuit, cui Gesnerus primum frustum inter magnam copiam zingiberis forte repertum specimen futurum Venetias ituro dederat. Turcae infitiores persaepe vendicabant Valerando rati esse zingiberem sylu. Ea Venetorum Medicorum collegio oblata aded placuit vt dignam censuerint quae Theriacae infereretur anno 1543. Si cui propius zeduarium videtur exprimere noster Costus Syriacus Zingiberis radice simili & maiore, sua sane opinione fruatur: nam & hanc dicunt ab vsque vltimis Oceani Orientalis Chinaram plagis in Persiam & Syriam, vbi etiam sed pauca oritur, transmitti.

Tabern. Icon. & hist. Syrisch Costenwurcz. Casp. Bauh. Phyt. Costus 1. siue Arabicus Dioscor.

COSTVS INDICVS CLVSII, quibusdam loco costus.

I Ocostus nobis cognitus est radix pollicari crassitudine, cortice rectus crasso, rugoso, & inaequali, fusco foris, intus candicante, qui etiam color est reliquae radiceis, substantia vero solida; sapor amaricans cum acrimonia, quem manu

promit, vna cum odore violaceo vel Iridis Florentinae. Adhaeret frustum caulis ferulacei, striati, fufgosa, & ex albedo fuluifcente medulla copiosa factum.

Lobel. in Obs. Costus cum caulis ferulacei frustulo, radice pulla, num Diosc. Indicus Costus: Et Costus facie radiceis Ceteris mai-

ioris. Iam decem & quinque annis elapsis Venetias adferri cepit. Costus ille nigrior eximia Iridis suauitate, mixta tamen cum tancilla hirci graueolentia. Anridotis minime excludendus, etsi gustu peramarus & ingratus.

Plant. Icon. p. 74. Costus facie radiceis Centau-

rii maioris cum caulis ferulacei frustulo, radice pulla. Num Diosc. Indicus costus: Costus Indicus Clusii. Lob. 38. Teut. 104.

Garc. in ea est opinione, vt vnum duntaxat costi genus esse credat. Costus, inquit, Arabibus dicitur Cost aut Cast: in Malaca vbi eius plurimus est vsus, Persiae, & inde, vehitur in Chinam regionem. Graeci & Latini ab Arabibus nomen mutuati sunt. Nam quod Serapio lib. simplic. ap. 318. Chost appellat, corruptum est exemplar, legendumque Cast; & quotquot conueni Arabes, cum nunc Cast, nunc Cost, nunc Costi vocant. Describitur autem Costus ab iis, qui viderunt, Sambac effigie, & Arbuti aut Azimbri magnitudine, florem odoratum proferens. Porro quod Arabes eius duo genera faciant, amarum & dulce: fandum esse puto, quod hoc medicamentum cum recens est & incorruptum, nullius amagitudinis sit particeps, candidiusque persistat: vbi autem vetustate corrumpi incipit, amaritudinem contrahit, sitque nigricans.

Non videtur Clusio in Garciam huius Costi descriptio cum Veterum Costo conuenire. Nam ex Dioscoride, inquit, satis manifestum est, illorum Costum radicem fuisse, cum ait: Sunt qui admittis Helenii Comageni praedictis radicibus adulterent. Verisimile enim non est, fruticis ramum tantam habere cum radice affinitatem, vt radice adulterari possit. At nostri auctoris Costus minimam radicis habet, & ferè nihil nisi lignum est suo cortice contextum. Quare aut Veterum Costum ignorasse dicendum est, aut Arabum Costum (si is quem describit illorum Costus est), & veterum Graecorum Costo diuersam esse plantam. Costi genus Antuerpianum e Lusitania inuenitur solidum, cortice cinereo, intus candicante, interdum vero cinerei coloris: odorata est admodum radix, violaceum siue irinum spirans odorem, praesertim dum manditur: ei caulis fragmentum quod e terra extat, plerumque inherere adhuc conspicitur, ferulaceum quiddam referens, & fufgofam medullam continens, vt facile appareat Costo nostri Auctoris plurimum conuenire.

An Amarus in Diosc. de hoc ait, dicens, Franciscus Lusit. qui Ancona agit, mihi aliquos radices dedit, quas sub nomine Costi allatas esse dicebat, vt erant Venetias amicis misi, qui omnes verum Costum esse sensere &c.

Hist. Lugd. Costus Indicus. Matth. in post. com. Ital. Costus delatus ex India, vbi ipse Indis Cost dicitur quem existimo verum Indicium Diosc.


Camer. ad Hist. Germ. & Epit. Matth. Costus Lusitanicus qui Iridem redolet.

Tabern. Icon. & Hist. Indisch Cost 13tel. Costus Indicus.

C. Bauh. Phyt. Costus 1. Costus Iridem redolens, an Indicus Diosc.

Nascitur circa Guzarato, inter Bengala, Delli, & Cambaya, in Mandou & Chitor: Inde multi currus onusti vltis aduehantur in vltis primariae regni dictam Amadiba, quae in desertis sita est, & in Cambayete non procul a mari sitam urbem: vnde postea per maiorem Asiam, nonnullam Africam partem, & vniuersam Europam deuehantur.

Præcellit qui intus candidus est, cortice cinereo: inuenitur tamen etiam colore barbi, cortice pallefcens. Tanta est odoris fragrantia praeditus, vt plerisque nares feriat, & capitis dolorem excitet: gustu nec amaro, nec etiam dulci, tamen si iam senescens interdum amarefcit. Nam recens



Delatip.

acti gustu est, ut reliqua aromata. Hoc vtuntur in multis medicamentis Indici Medici.

COSTI MOLVCENSES DVO.

Rvpellensis Medicus Louanicus duas radices peregrinas Costum admodum similes, Lob. & Pē. Adu. impertuit quas acceperat à Nancieris ē Molucis Insulis, quarum altera maior

corticem referebat Sambuci adultioris & cineracei, ragis & plicis frequentibus, sapore & odore vehementi: altera minor radices Solani furiosi effigie, colore diluto pullo, guttu vrente, ut vix ardorem lingua ferre aut sustinere queat. Illis iam persuasum erat Costi esse speciem, tamen parum odorum esset, has autem

ambas Molucenses minus odoras iudicio studioforum subdidimus.

Plant. Icon. pag. 73. * Costus Molucensis corticosus, rugosus: †. Costus effigie radices Solani furiosi. ‡. Molucensis lignosus feruidior Ad. 35. Teut. 105.

Casp. Bauh. Phyt. Costus 3. siue alius corticosus. Costus 4. lignosus feruidus. Costus 5. siue effigie radices Solani furiosi. An à Casp. Bauh. Ex duobus costis Molucensibus Lobelii in Adu. bene tres fiant considerandum.

Hist. Lugd. Costus Molucensis corticosus.

COSTVS HELENII FACIE OFFICIN.

Monuit Cordus Dioscor. quosdam pro costo Comageni Helenii, hoc est Inulae in Comagene Orientis regione provenientis, radices vendere. Sunt enim nostra Campana Inula densiores, quapropter facile hodie imperitis pro vero costo substituantur, ac hodie non mi-

nus quam olim adferuntur. Ex præter hunc nullum alium habent Pharm. vero costo similiorem. Nostrati Inulae per omnia est similis, nisi soliditate tantum differret: colorem habet in cinereo candicantem, saporem amariusculem ut nostra, non tamen adeo acrem, idque adeo quam inueterascit antequam ad nos perferatur.

Lobel. & Pena Aduerf. Fusca, grauis, & inodora radix Helenii, compacta, concretionem ignota, qua Officina hodie abutuntur Pro costo.

Plant. Ic. p. 73. Costus Comagineus adulterinus Officinarum Teut. 102.

Casp. Bauh. Phyt. costus 6. siue amarus Officin. seu Helenium Comagenum Diosc. & Cordo Helenii Comageni radix: & Lobel. Ic. costus Comagineus.

An Tabern. Costus Officinatum amarus, Biter costen wurz.

COSTVS DVLCS OFFICINARVM

Centaurio magno cognatus.

RADIX

Rapud Camer. in Epit. notata D. Costi phatmac. species maior, solida, ponderosa & crassa radice, lineis à cætero radicis sed superficie ductis app. renibus multis, species videtur Centaurii maioris, et si odorem eius non habet, saporem vero dulcem.

Consideretur quæ dicuntur à Camer. de odore Centaurii maioris: illud etiam notetur ad hist. Germ. ponit figuram notatam D. sed radicem non separari à Costo notato B. Cæc. ibi fieri huius maioris Costi mentionem, unde igitur tanta dissonantia.

Tabern. Icon. & h. Costus Officinatum dulcis Sals. Costenwurcz, ita dictus, quia nullum singularem saporem aut odorem habet, ponderosior & solidior est amaro costo, contortus & rugosus. Non ausim asserere, costum Camer. & Tab. eundem. Vna tabella utriusque figuræ proponimus.

C. B. Phyt. Costus 7. Costus dulcis Offic. Tab. Ic. p. 904. Costus Offic. dulcis. Camerario litera D. costi Phatmac species maior.

COSTVS INGRATVS SIVE

Thapsia species.

Nvper vendi cepit (autore Cordo in Diosc.) costi vice radix per transversum in taleolas secta, crassitudine plerumque manum complens, foris fusco, intus candicante colore, cortice crasso, substantia rara & leui: odore, edm. teritur, rancidam aliquam pinguedinem oleum.

gustu supra modum acris, nauseosa, rancida, fa-
lsum creans & strangulationem comminans:
non sine vitæ periculo sumitur: est enim Tha-
piaz species in monte Gargano effossa, ut ipsi ex A-
gyptis audiui, qui semen eius nobis attule-
runt, in umbellulis, fideiuli aut Anethi modo, ena-
tum, crassum, nigrum, magnitudine & figura Tri-
tici, sapore radicis sue, quam Agyptiæ corrupto
nomine vñ cum Italici *Costones*, quasi *Costum a-*
marum vocant: foris imposita efficacius etiam
vero *Costo*, & profundius attrahit ruborem, tu-
moremque excitat & exulcerat.

C. Bauh. Phyt. Collaps octanum.

An Camer. ad Epit. Math. Figura notata A.
Costus est amarus Pharm. levis, albus, intus me-
dulla per medium magna; lineis in cortice trans-
versis, ingrato admodum & vitioso sapore, medi-
cato tamen.

CANNA SIVE ARVUNDO INDICA,
quibusdam flos cancri.

CAP. XXIV.



Inquilina
Orbi no-
stro, canle ge-
niculato cubi-
tum & sesqui-
cubicum alto
surgit: Felus
quam pro pla-
ta modo ma-
ioribus, cor-
nicula charac-
ta conuoluta
primo pul-
lulata zimu-
lantibus, quæ
ubi explican-
tur insigniter
apparent am-
pla, duorum
palmorum la-
titudine, crisi
quatuorue lō-
gitudine, re-

nera, membrana, modice in acumen desinentia,
à nervo medio secundum longitudinem decur-
rente, exortectis in margines agmine prædenti
venulis obliquis: caulem summum ornant *spores*
minio salutariorè tincti, Gladioli haud ita absi-
miles, capitulo verrucoso insidentes, quod dela-
pso flore grandescit, triangulumque fit & velut
spinosum (inquit Clusius,) ut Ricini fructus, in
quo continetur semen per maturitatem fuscum
atrum, & rotundum, Fabæ Veterum, siue fructus
Lori magnitudine: radix nodosa & crassioribus
fibris stipata, alios radicis nodos adnascens habens,
qui stolones etiam matri similes proferunt.
Hanc etiam describit Clusius, nec ferè aliter.

ferri soleant, non secus ac ex renellis Malis Au-
rantiis.

Lob. Obs. p. 29. Arundo Indica, florida, Cannae quorundam. Et p. 639. Folia Cannae Indicae, quibus G. Elemi involuitur. Aduers. Lobel. & Penz. Arundo Indica florida, ambiguit inter Cannas & Acorum naturae & figurae. Parum mihi videtur habere similitudinis cum Cannis seu harundinibus & Acoro, nisi id propter radices dicatur nodosae.

Gefn. passim Canna Indica : Gladiolus Indicus, isdem ferè quibus Canna, floribus, nempe croceis, Lillii specie, ab Hispanis *Chewa* vocata, Arundo Indica. Non placet comparatio Gladioli Indici cum Canna Indica, longè *diversus* flos : Gladiolus autem Indicus Gethero est Lillium non bulbosum flore luteo *umbellatim* *diversum*.

C. Bauh. Phyt. Arundo Indica latifolia.

Hist. Lugd. Arundo seu Canna Indica Clusii
& Dalechampii.

Canna Indica Montbelgardii pulchre mihi pro-
uenit, nata in Horto E. C. ac floruit Septembri,
eam habui Lugduni in horto, vidi etiam mense
Septembri Balthæ parvam plantam in horto D.
Felicis ante multos annos, & postea anno 1592.
mense Nouembri repositam pulchre florentem
mihi etiam antehac obseruata erat folio lato &
oblongo mense Aprili Bononiæ in horto ad S.
Saluador. Doctus vir Georgius Persburger Pa-
rauii annorarat ex Di. Guilandini colloquiis, in
horto Parauino Cannam de India esse Cassiani
Bassi Mestocalanum: Frater etiam C. Bauh. anno-
tauit se ita audiuisse Guilandinum nominantem.
Nos Elemi resinam huius foliis aliquoties vidi-
mus inuolutam.

Lufitania quibufdam monafterijs valde frequenter videbamus, inquit Clufius, fub fillicidijs ad muros fatam, etiam ipfa brumâ florentem: nunc paffim à rei herbariæ studiofis abitur in ficilibus, ornatus gratiâ, rarò tamen apud Belgas ad frugem peruenit, quoddã admodum germinet, nec hiemem ferre istic potius fit, vt in fequentem annum feruetur. Viennæ autem Auftriæ, multis annis in fictili alebamus, fingulis annis flores proferentem, & probum femen interdum dantem, licet non adco nigrum, vt quod in calidioribus regionibus crefcit, fed fufci duntaxat coloris, mifficet etiam fele radice propagantem, adco vt alternis annis fictili eximere, & nodos diuellere cogeremur, cã ratione, plures plantas ex vna adquirentes: verum hieme in hypocaustum feu vaporarium recipienda erat, & proximo feneftræ vitreæ loco, vt aëre extremo per rimulas ingrediente nonnihil refici poller, frigidioris aperi aëris, atque etiam cameratæ cellæ impatiens, femel autem aut bis ad fummum, fingulis hebdomadibus, adfufa leniter aquâ riganda. Illud etiam in hac planta obferuabam, è vetuftis ftolonibus, cum marcefcentes in vaporario præfcinduntur, tachymam exftillare albam, Tragacanthæ æmulam, fubdulcem & lentam, atque in ipsis folijs istic etiam fenefcentibus, tenue quoddam excrementum nitrî fapote.

C. 100.
 100.

Gladiolus
Indus. L.
In species
Chenop
Hesperis.
Gefner. m.

Loco
compus.

1940年

10-CE-11.

Conclusions

ORCHIS

ORCHIS SIVE TESTICVLVS
in genere.

CAP. XXV.

Cum bulbis, Capsa sc. Porro, Allio, Hyacin-
tho, Asphodelo, Croco, Colchico, Tulipa,
Liljo, Iride, atque alijs his affinitate quadam co-
gnatis, & Orchides sensere conveniat. De qui-
bus Theophrastus haec scripsit. Quod si vera sint, quae mi-
rabilia & rara de Scorpione [herba] narratur, id &
reliqua huiusmodi haudquaquam incredibilia dici
conuenit, quae aliarum plantarum viribus attri-
bui videntur. Humanis ergo corporibus vltra
illa quae sanitatem, morbos, mortemque spectat,
herbas quoque alias suis viribus quid conferre
posse affirmant, ut puta generandi seminis facul-
tatem, atque sterilitatem, & quosdam ex eodem
valere verumque facere, sicut qui testiculus (herba)
appellatur. Cum enim gemini sint, alter ma-
gnus, alter autem parvus, magnum efficacem ad
coitum datum in lacte caprino tradunt, minorem
verò obesse, ac inhibere. Habet foliū scillaceum
(exemplum) Laferis, verum lauius atque min⁹ cau-
lem simillimum (exemplum) spinæ, quam Pirum vo-
cant. Mirum ergo est, ab una eademque natura,
diuersitatem tantam virium proficisci. Nam vin-
tiusmodi esse duplicem, absurdum pu-
tari minime debet. Tum enim alij quidam, tum
Aristophylus Pharmacop. plataicus, vires quas-
dam compertas se habere dicebat, partim ut
quis magis coire valeat, partim ut nihil penitus
valeat. Id quoque se prorogare plus, minusve re-
poris posse, seu bimenſe, aut trimenſe: quae quidē
herba vel ad temperandos, castigandōque adole-
ſcentes aliquando se uti aiebat.

Orchis, quam Graeci Cynosorchin vocant, fo-
lia habet (ita describente Dioscor.) per terram
strata, circum caulem & fundum, oleæ molli si-
milis, angustiora tamen & lauius ac longiora:
caulem palmi altitudine: in quo flores purpure-
os, radicem bulbosam, oblongam, duplicem, angu-
ſtam velut oleæ, alteram inferius & alteram ple-
nam, alteram mollem & rugosam. Orchis au-
tem altera, quam alij Serapiadem vocant, velut
etiam Andreas (exemplum) ob multiplicem radicem v-
sum. Folia habet Porro similia, oblonga, sed la-
uiora & pingua, in alis incurua: cauliculos pal-
mam altos: flores subpurpureos. Radix subest
testiculis similis.

Cynosorchin, inquit Plin. aliqui Orchin vo-
cat, folijs Oleæ mollibus, ternis, per caulem semi-
pedis longitudinis, in terra stratis radice bulbo-
sa, oblonga, duplici ordine, superiore, quæ durior
est, & inferiore quæ mollior. Idem etiam de al-
tera Orchis Dioscor. sententiam exponit, partim
item Theophrast. Sed inter pauca mirabilis est,
inquit, Orchis herba, siue Serapias, folijs Porri,
caule palmeo, flore purpureo, geminâ radice, re-
sticulis simili. Quidam folio Scillæ esse dicunt, le-
uiori ac minori, caule spinoso.

Cæterum Theophrast. locum mendosum esse
testatur Plinius, ut recte Hermolaus annotauit.
Non enim Silphij, seu Laferis folium habet Se-
rapias, ut Gaza conuertit, sed pro Silphio
legens, licet id vulgata exemplaria habeant. Et
enim Silphio folium est Apij, non Scillaceum,
aut porraceum, ut Serapiadi.

Deinde quod sequitur de caule, & Gaza sic
tradidit: caulem simillimum spinæ, quam Pi-

tum vocant: penitus falsum ac corruptum est.
Siquidem spinosus huic herbae caulis, Apia
(Raphano silu.) inquit Hermol. non Piro simi-
lis est.

Cornarius tamen legendum arbitrat, ut
Sed nihil
pronunciat, studiosos saltem admodum vult.
Deinde Plinium legisse: & radicis siue tes-
ticuli, ad eam radicem, quæ Pyri figuram habet,
similitudinem esse: & eam vocero temere de
accreuisse sibi videri.

Orchis (inquit Apul.) Graecis dicitur Satyrion,
alijs Cynosorchis, alijs Extaticos, Erythron, Pa-
nion, Serapion, alijs Orchis, Aegyptij Menein,
Galli Vram, Itali Priapicon, alij Ominale, a-
lij testiculum leporinum nominant.

Multa (teste Rob. Const.) Orchidis genera
deprehenduntur, inter quæ, quod Laferem refert
odore, vulgò dicitur Benion.

Orchis Fuchio dicta herba est, quod radices
sibi ingicem haud secus atque duo testiculi co-
hæreant. Cynosorchis verò quod eanum testicu-
lis similem radicem habeat. Nota est herba vtra-
que Orchis & Herbarijs & Officinis.

Nostri (ait Cornar.) priorem Knaben Fraut
appellant: posteriorem Ragwurz / vtrâq; ab ef-
ficacia ad Venerem excitandam. Officina Te-
sticulum canis vocant & cum Satyrio confundit.
Lectores ex sequentibus facile cognoscere pos-
sunt an duæ Orchides Dioscorata notæ ut sibi per-
suadet Cornarius.

Errant (Matthioli quidem sententia) omnes se-
re huius ætatis Sepias, quippe quod Canis testi-
culis legitimi Satyrii vice passim in medic. vran-
tur. Nam hæ plantæ (si Dioscoridi credimus) no-
tis ac facie maxime inter se distant, quatinus vi-
ribus & facultate non longè sint dissimiles. Verò
aut Satysium hætenus in Italia videre Matth.
non licuit. Testiculorum porro in Ananienſibus
montibus aliisque compluribus locis non modò
duo inueniuntur genera: sed alia quoque longè
plura, quibus & illud addendum esse existima-
nt, cuius radix humanæ manus similitudinem
refert. In eo errasse videtur Fuchius quod Sa-
tyrium triphyllum, perinde atque canis testicu-
los cum duabus radicibus pictura expressit con-
tra Dioscor. delineationem. Hallucinantur præ-
terea, inquit ille, vnâ cum Mesue Patres illi cen-
tendi, qui eius antidotarium commentati sunt,
quippe qui malè sibi persuaserint, tot esse Saty-
rio radices, quot Cani testiculos. Verùm in Dio-
scoridem consulant, & hinc quam aptè decipi-
antur, intelligent. Sed his facile errandi occa-
sionem potuit dedisse Plinius, quem lib. 26. cap.
10. Orchin, id est, testiculum, cum Satyrio turpiter
confuisse constat. Matthiol. proponit aliquot
icones Testiculorum sine descriptionibus quæ
difficile discernere & potiss. ex magnis iconibus
Multæ sanè Orchios & Satyrii genera in nostris
regionibus (inſic Tragus lib. 2. cap. 82.) nascuntur,
quæ vno vocabulo Germ. Margendrehen vo-
cant, propterea quod nonnulla eorum folia ma-
culata, ac lituris quibusdam lugillata apparent.
Anicula alias, quæ plerumque variatâ perna ar-
tium Stendelwurz / Knabenfraut / & Ereug-
blumen / appellant. Theophrast. omnes lib.
de xeris voce comprehenduntur. Diosc. duo Or-
chios proponit genera, quorum alterum vtrâq;
vocat, hoc est, Testiculum canis, alterum ve-
rò quædam cognominari tradidit. Nescio quid
in hist. Germ. lib. 1. cap. 122. faciat figura Orchios,
eum in contextu eius nullam faciat mentionem.

ea merito in hist. Lat. omilla fuit.

Orchis siue Testiculus, & Cynosorchis satis notus est (ut sibi persuadet Anguill.) diciturque Herbariis Testiculus canis & *Cagliardi canine*: alterum genus dicitur Satyrium. Huius plantæ multa sunt genera: vni generi sunt tres testiculi cuius meminit Paulus Aeg. l. 4. c. 4. ac vocat herbam Serapiadem & Trisorchim.

Orchin herbam i. testiculum, multi vniq. Satyrion vocant non recte inquit Gesl. in cat. pl. Orchis vero altera (*ἡ ὄρχις*) Serapias nominatur. Idem hort. ait, Testiculus vel Orchis alba, species quamplurimas complectitur: Radices omnium ege. nino quæ in bulbo constant: qui in aliquibus palmatus seu digitaris est: reperitur species vna minor bulbo singulari. In hortos translatæ vix ultra annum mihi durant aut ad duos ad summum.

Cast. Dug. *ἡ ὄρχις* & *ἡ ὄρχις*. Testiculus, Arab. *shifi alhelb*. Primus, vel secundus, vel uterque Cynosorchis est à Diosc. descriptus, in cuius descriptione depravatè in Græcis exemplaribus legitur *ἡ ὄρχις* pro *ἡ ὄρχις*. Confirmat hinc Dodon. de fl. lectionem, Theophr. & similiter Plin. ut antè dictum. Est tamen in utroque autore huius Orchios descriptio deprauata. Pto. *ἡ ὄρχις* sive siquidem, ut Marcellus legit, in nonnullis Theophr. exemplarib. quæ Gæzæ male conuersionis occasione dedit, perperam legitur *ἡ ὄρχις*. Sequitur deinde, *ἡ ὄρχις* quod penitus corruptum videtur. Apud Plinium legitur, caule spinoso, & similiter depravatè: Cornarius tamen hac Plinii lectione fertur, ac Theophrasti locum hoc modo purauit restituendum: *ἡ ὄρχις* *ἡ ὄρχις* *ἡ ὄρχις* *ἡ ὄρχις*. Quomodo autem hæc Theophr. & Plin. corrupta loca restitui debeant expendendum reliquimus.

Eadem in generis tribu cum bulbis (testibus Lob. & Pena Adu.) Capaceis, Hyacinthis & aliis plerisque reponenda Testituli differentie atque Satyrii, quæ longè plures sunt, quam quot Priscis memoratæ: omnesque ab effigie radicis Orchis, ab effectu nonnullæ satyriæ vocatæ, quod Veneris incentiu essent præ ceteris bulbis, uti postea apud Latinos Plinium & Apuleium Veneris dicerentur: e radicis tamen bulbo inita est distinctio. Vnicus namque bulbus Satyrii est, geminus vel didymi specie Orchidi, quorum Caninus, Vulpinus, & Hircinus, & insigniores indidè præter varietates.

Cornelius Gemma professor regius in celeberrima Louanienſium Medica schola sex & triginta Testiculorum icones arguta & propria manu affabrè effigiatas Lobelio ut videre est in Obs. communicauit.

Primum genus, inquit Gemma, est Cynosorchidum: secundum Serapiadum: tertium verò Dactylidum, vel digiti vnius atque alterius speciem aprius præ se ferentiū. Cynosorchides voco duobus ordinibus præditos pectinatum ritu, ut singuli veluti singulas manus, præ se ferant, interdū duobus digitis, interdum pluribus; qui si à radice reliqua præ se ferantur, tanquā processus meri vel apophyses, optime congruent Diosc. notæ, ut Cynosorcheos vel Canini testis, nomen imponi possit: atque ad hoc vnicum genus infinitæ species referantur, quanquam quæ sub eodem insigni militant, potius feminei sexus ideam quam masculam, repræsentent. Serapiades autem exactè virilis testis imaginem referunt, atque in hac præ-

cipue animalculorum diuersissimorum specie mitabili Naturæ fecunditate atque ludibrio depinguntur. Medium inter hæc genus est a Dioscor. quoque sub Cynosorchide comprehensum, quod etiam oliuis oblongioribus siue compressis bulbosæ partes illarum optime congruunt, nisi non similes esse putemus, quia in oblongiores digitos enerventur. Eorum etiam summorum generum species fusè & exactè tradit idem Gemma, quibus recensendis hic sperledemus, speciatim de Orchidibus eorumque differentiis deinceps acturi.

Ait Hist. Lugd. ad correct. Dodonæi: Priorem in Dioscoride lectionem agnouit Plin. Orchis Oleæ mollia assignans foliis, & Theophr. ut ex eodem Plinio colligere licet, non de Cynosorchide, sed de Orchis Serapiade hic verba facere videtur. Orchios genus Serapias ab Antiquis cognominatur auctore Diosc. quoniam radix ad multa utilis sit. Sunt qui à Serapi Alexandrinorum Deo sic cognominatum velint, inquit Fuchsius, propter lasciuia impudentem quæ is Deus Canopi, ubi Templum & cultu & religione excellens habebat, colebatur, ut videre est apud Strabonem lib. Georg. 17.

Eadem H. Lugd. ex Dodon. hæc tradit: Officinæ Orchies, Satyria nominant, & coram bulbis legitimi Satyriæ vice vtuntur. Præbuisse occasionem videtur Apuleius, qui nullam inter Satyria & Orchies differentiam facit, sed utrumque Satyrium cum utroque Orchis, canis videlicet dicto, & Serap ade, confundit.

Orchis, Cynosorchis & Testiculus canis, Camer. hort. Maior flore dilute purpureascente, sine incarnato. Medius purpureo flore, Minor guttato sanguineo.

ἡ ὄρχις aut *ἡ ὄρχις* Rob. Const. *ἡ ὄρχις* & *ἡ ὄρχις*; Orchis, & Cynosorchis, Testiculus canis, Offic. Arab. *Chafi alkab*, seu *Chafi alhelb*. Germ. *Anaben fraut*, *Stendelfraut*, *Ragwurtz* & *Unser frauen raden*. Gall. *Satyrium*, in *Comillon de Chien*. Ital. *Testicoldi di cane*. Hist. *Coyon de perro*, Boh. *testamac*.

Nascuntur in pratis, collibus, siluis, montibus, vmbrosis, apricis, siccis, humidis, aliæ atque aliæ species; in lapidosis & arenosis locis Orchis seu Cynosorchis Diosc. Legit eas Apuleius mense Iunio, vel Iulio. Varia genera Orchidum, in pratis circa Monspelium florentia verno tempore conpeximus: Citea Lugdunum etiam diuersa proueniunt: nos particulatim describere negleximus.

Quæ Theophr. de viribus annotat vide antè. Orchios seu Cynosorchios radix Dioscor. editur cocta ut bulbus. Et de hac narratur, maiorem radicem si a viris editur, mares generare: minorem verò si a feminis edatur, feminas. Illud insuper narratur, etiam mulieres in Thessalia teneram cum lacte caprino bibendam dare, ut Venerem excitent, aridam verò ad inhibendam ac exoluendam Venerem: exoluque alteram ab altera si bibatur. Serapiadis verò radix imposita vim habet dissipandi tumores, repurgandi vlcera, & cohibendi herpetas. Aboler & fistulas, & inflammata mitigat imposita. Eadem arida nomas sistit, & vlcera putredinosa, & in ore maligna sanat. Sisti etiam aluum cum vino pota. Narratur autem & de hac quæcunque de Cynosorchide.

Eadem & Plin. tradit, Cynosorchis radices eduntur ut bulbi cocti, in vineis ferè inuenti. Ex his radicibus si maiorem edant viri, mares generant dicunt: si minorem feminæ, alterum sexum.

Orchis
capit.

Orchis
Theophr.
Bis depr.

Orchis
Satyria
Veneris
Bulbus

Orchidum
genera
Ar. Corn.
Gemma.

In Thessalia molliorem in lacte caprino viri bibunt ad stimulandos coitus: duriores vero ad inhibendos. Aduersatur alter alteri. Orchis alterius radix maior, siue ut alii dicunt durior, ex aqua pota excitat libines: minor siue mollior e lacte caprino inhibet. Eiusque radices sanant oris vlcera, thoracis putuitas. Aluum sistunt e vino pota.

Orchis, inquit Galenus & Cynosorchis eadem herba nominatur. Vis radice eius, quae bulbosa est & dupla, humida est & calida, & gustantibus dulcior (duriuscula Hist. Lugd. male) apparet. Verum maior radix multam superfluam & flutuofam humiditatem habere videtur. Quare etiam pota Venerem excitat. Altera vero minor vice versa, satis elaborata est, ut temperamentum eius ad caliditatem & siccitatem reparat. Vnde non solum ad Venerem non excitat, sed etiam in totum contra inhibet & reprimat. *Et mixt. subdit.* Orchis quam Serapiadem vocant, sicciorum vinum habet quam prior. Vnde ad Venerem non similiter idonea est: Sed imposita tumores discurit, & vlcera sordida purgat, & herpetas sanat. At siccata multo adhuc magis siccatur, ut etiam putredinosa & maligna vlcera sanat. Nam & subastringens quid habet. Et propterea cum vino pota, aluum sistit.

Camer. Radix Orchidum in vino stiptico cocta & rursus exiccata non leui successu datur in dysenteria.

SATYRIUM VETERIBVS IN GENERE.

Satyria 2. Dufc. Tro. Plin.
Satyria duo tradit Dioscor. Vnum, quod simpliciter Satyrium vocatur ab ipso, quodque alii Trifolium (*τριφυλλον*) dixerunt, quoniam ut plurimum folia tria (Marc. d. *ἡ τριφυλλία*). Lac. vero legit in antiquo *ἡ τριφυλλία* sic & Serap. & Orib.) ad terram refracta profert, Lapatho, aut Lilio similia, minora tamen & rubicunda. Caulem habet nudum (*ἄνυλον*) longitudine cubitalem, flore Lili specie, album: radicem bulbosam, magnitudine (*ῥίζα*) Mali (num quantitate, num alia ratione similem Malo velit Dioscor. valde ambiguum, Gemma,) fuluam (*ῥιζα*, fuluam potius, quam rutilam dici putat, idem Gemma, intrinsecus albam, velut ouum, gustati dulcem & ori gratam. Alterum, quod Satyrium Erythronium aut Erythraicum cognominatur, quodque semen habet Lini semini [quis sciat an deprauato codice Graeco pro *λεπτοσπέρμον* sit legendum *λεπτοσπέρμον*, vel *λεπτοσπέρμον*] simile, sed maius, robustum (*ῥιζα*) splendens, & laeue. Est radice eius cortex subgracilis [Orib. *πικρὸν* id est, densus Matthiol.] & fuluus: interna vero pars alba, gustati dulcis, & ori grata. Nascitur in apricis, & montanis locis. Et hoc inter spuria Diosc. alii Melium aquaticum vocant, alii Extaricon, alii Priapicum, aliis autem est Satyriscus, aliis Orchis, id est Testis Satyri. Romanis Moloniculum Veneris.

Satyria 1. Dufc. Tro. Plin.
De Satyrio ita Plin.: Duo Satyrii genera: vna longioribus foliis quam Olea, caule quatuor digitorum, flore purpureo, radice gemina ad formam hominis testium, alternis annis intumescens ac resedente. Altera Satyrion Orchis cognominatur & femina esse creditur. Distinguitur internodiis & ramosiore frutice, radice fascinis virili. [ego sane hic pro virili membro fascinum dictum accipio: vnde Horat. Ode & epod. Minusue laquet fascinum.]

Nascitur ferè iuxta mare. Graeci Satyrion, foliis Lili rubri minoribus, & tribus non amplius e terra exeuntibus tradunt, caule leui, cubitali, nudo, radice gemina: cuius inferior pars & maior mares gignat, superior ac minor feminas. Et *Satyria 2. Dufc. Tro. Plin.* aliud genus Satyrii (Erythraicon appellant) semine viticis maiore, leui: durè radice, cortice rubro iuxta album includi, sapore subdulce: ferè in montosis inueniunt.

Subiecit (inquit Corn.) & hoc genus Satyrii Plinius ad praecedens. Galenus vero & posteriores Graeci Satyrium Diosc. posterius omiserunt. Dalechamp. ait Plinium misculisse Orcheon, Satyriorumque descriptiones. Planta quae Graecis *ἡ τριφυλλία* Latin. quoque Satyrion dicitur [inquit Matthiol.] Arab. *Gaf alchaleb*, Chasi *aleraleb* iuxta Tatarum: Ital. *Satyrion* & *Satyrione*. Gerin. Sten. delmurg: Hisp. *Satyrion*, & *Sapinos de Raposa*. *Plin. not. Matth. c. 1.* Gall. *Satyrion*. Sed quum Matthiolus ante dixit verum Satyrium videre sibi non licuisse, cur tribuit illi inaniter vulgaria nomina.

Dolet Anguill. sibi incognitum Satyrium primum & secundum: Nec vix adhuc Herbarum vera Dioscor. Satyria bene cognita sunt. Nec ita obuium est, quam plantam per Satyrium Basilicum, cuius semen ad Epilepsiam commendat, intelligat.

Amatus ait veros Satyriones adhuc desiderari.

Fuchsius reprehendit Matthiol. quod Palinas inter Satyrii genera depingat, cum potius inter canis testiculos sint representandae.

Idem notat Mesuem & Monachos, quod Satyrii duos tribuant testiculos. Francisc. Alexand. vero ait contra Matth. Mesuem non dixisse Satyrium sine testiculo vulpis duos habere testiculos.

Satyrium autem Matthioli primum à Calce. Satyrii *4. quinoa.* olario ei missum, teste Pona in descriptione montis Baldi Phallon Hollandicum est, cui adaptata tria folia Lapathi, de eo agemus lib. 40. de Fungis, sub Fungo Phalloide. Satyrium quidem Erythronium dictum, volebat Val. Dourez esse medullam Nucis Cuciophorae, ut monimus lib. 3. *Fungus Phallodes Cuciophora Nucis modica.* Est & Satyrium Erythronium quorundam bifolium flore vnico albo aut purpureo radiato, de quo hoc libro post Tulipas egimus. Tulipa tandem rubro flore fortè est Satyrium Erythraicum auctore Gesnero: nos hanc opinionem improbauimus. Satyrium tamen triphyllon Dioscor. habet, quod conuenit cum Tulipa alba. Nunc Hyacinth. stellaris dumerorum quibusdam Satyrium verum dicitur, & Satyrium Erythronium: quam opinionem Dodonaeus in fol. reprobatur. Vltimò habetur Satyrium Erythronium Matthioli à Cerhino missum, auctore Lobelio. Corn. Orchis speciem, Satyrium primum existimat dicens: Satyrium nesciunt & nominant etiam Officinae, etiam cum Orchi confundant. Nostrum Sten. delmurg dicunt. Syluius Orchis speciem somniat Satyrium, idem Monachi in Mef. idem Cordus in antid. ac propterea cum superbè reprehendit Francisc. Alex. Satyrium Trifolium Fuchsin Hist. pl. est Orchis species: De comp. vero medicam. ait nullum Satyriorum cognitum. Tragus sub Satyrii & Orchidis nomine 19. plantarum species, ni fallor, comprehendit. Matth. ait omnes ferè Medicos huius aetatis & Sepalsarios errare, quod canis testiculis legitimi Satyrii vice passim in medicamentis vrantur.

Pro Satyrio quidam Manu Christi & Palma Christi vrantur, Fuchsius teste de comp. sed malè; *Antiballo: mena.*

quis, ut ait, ad libidinem nullum impetum excitat. Pro Satyrio substituit Fuchsius radices Orchios vel Cynosorchios. Cronemb. ait solere Sepiasarios Colonienses sumere Orchin Fuchsi matrem angustifolium. Satyriorum vice solent suscipi canum testiculi, ut ait Amatus.

Operz prærium ducit Tragus, paucis commemorare, unde Satyriones primam suam originem trahere videantur. Non enim ex semine proprio, ut sua fert opinio, hæc plantæ primam originem ducit, sed ex alieno potius, hoc est, ex spermate Turdorum & Merularum. Cum namque Vere appetente antequam Turdi terra nostra excedant, aues commiscetur, mira videas, maxime cum in Iuniperorum montibus, & pratis conuenerint, ita ut verisimile sit ex spermate horum, si quando in terram fortè deciderit, Satyriones primum nasci. Nam quemadmodum ex historia illorum videre est, tertio demum anno Satyriones primos proferunt flores, quos nullum ut diximus semen consequitur. Deinde constat Satyriones, nusquam latius prouenire, quam in montibus Iuniperorum & pratis, in quibus locis auculæ escas suas quærere assolent.

Virea

Satyrii Triphylli radicem bibere oportet in vino nigro austero ad Opisthoronum. Vtere (præceptore Diosc.) etiam ipsa, si voles cum muliere coire. Dicunt enim ipsam impetum ad coitum concitare: Erythronium vero fertur non secus atque Scincus libidinem excitare. Proditur etiam, si modò radix manu teneatur Venerem stimulare, eoque magis si bibatur in lacte Ovis colonice (in lacte Ouino M.) data, nervos intendit: eadem ex aqua remittit. Altera tumores & vitia partium earum erumpentia, cum polenta illita sedat, vel per se trita. De Erythronio ait: Venerem etiam, si omnimò manu Erythraici radix teratur [teneatur alii Cod.] stimulari narratur, adeoque si bibatur in vino austero. Arietibus quoque & hircis segnioribus in potu dari, & à Sarmatis, equis, ob assiduum laborem pigrioribus in coitu, quod vitium profeclum vocant. Et paulò post. In totum quidem Græci quum concitationem hanc volunt significare, Satyriion appellant. Hæc Plinius.

Idem de Indi herba apud Theoph. Prodigiosa sunt quæ circa hoc Theoph. autor alioqui grauis, septuageno coitu durare contactu herbe cuiusdam, cuius nomen speciemque non posuit. Possit itaque & hæc Satyrium appellari: sicut idem Plin. Aristolochiam Polyrhizon esse dixit.

Satyrium, aut Triphyllum (inquit Galen.) humidum & calidum temperatura est. Quamobrem gustu quoque apparet dulce. Attamen recrementitiam & flatuosam humiditatem possidet: quocirca ad Venerem concitat. Hæc verò & herbe ipsius radix præstare potest. Porro, ut quidam aiunt, ex vino nigro austero potum sanat opisthoronum. Hæc de Veterum Satyris.

ORCHIS BARBATA FOETIDA.

Historia Orchium vsque adeo obscura est propter insignem varietatem, ut nesciamus, quæ nobis præmittenda sit: videtur tamen Orchis quam Barbararum foetidam vocamus, à cæteris Orchidibus tot manifestis signis differre, ut facile à quolibet, à cæteris distingui possit, quæ occasio ut ab ea incipiamus Orchidum differentias recensere:

Eius igitur bulbi, & reliquæ plantæ partes, si cum congeneribus conferantur plerumque maiores videntur: quippe cum bulbis inglandem vni-

Descriptio



eum suo callo carnosio equares magnitudine obleruauerimus: folia multa, magna, Liliacea, laticia, & à radice, & in caule, ad ipsam vsque spicam ferè nata: caulis crassus spicam densam sustinet florum ferè tridorum: quorum singuli pediculo viridi [cui appositum foliolum sextante longius] intorto, ventri-

colo insident, calcari admodum breui, & viridi, galea & alis foris ex albo virentibus, intus purpurascens punctis & striis notato: à labello exteriori albido, interiori purpurâ punctato aruncus demittitur triplici cincinni viridanti compolitus, quorum laterales crispiores, & conuoluti interdum, medius longior bifidus propendet: odor grauis & viscosus: semen in capsulis pusillum, vel ut ait Dodon. in valvulis oblongis striatis perexiguum.

Hanc cognouit Dodon. scribens in Hist. Gall. *tragorchis*, Testiculus hirci, Gall. *Conillon de Bouc*: Boecullefens / vocatur etiam Testiculus leporis: sine iudicio in Officinis vsurpatur etiam pro Satyrio. Item hist. fl. & in fol. Tragorchis cui folia maiora quam aliorum Orchium. Testiculum leporis plerique appellant, nos ab odore, quo hinc cum dum in flore est, refert, *tragorchis*, & Hirci testiculum, dicere maluimus.

Lobel. Obs. Testiculus hircinus Adv. p. 62. Orchis Saurodes vel Scincophora, lacertarum emulatione, Corn. Gemmæ: siue Tragorchis altera, vulgaris testiculus hircinus seu Tragorchis, & Leporis testiculus nostras Adv. p. 62. Lobelius duas icones proposuit vnius plantæ, cur autem diuersis locis posuerit nescimus. In iconibus Plantini vnicam, eamque ponit quæ posterior p. 90.

Tab. 100.

Hist. Lugd. Orchis Saurodes vel Scincophora Gemmæ, Testiculus Hircinus vulgaris.

Tab. 1c. & Hist. Orchis hircinus 1. & 2. Boeckh. h. 1. & 2. Dux proponit icones: non tamen demonstrat quæ in re differant: videntur sanè duæ icones vnius plantæ.

C. Bauh. phyt. duas facit diuersas plantas: vni testiculum, Testiculus 14. hircinus longiore angustioreque folio. Alteri autem, Testiculus 15. hircinus breuiore, latioreque folio. Addit inter utramque non magnam esse differentiam: An ipse eam animaduertit considerandum.

C. Bauh.

Solo pinguiusculo nascitur, Lobel. Floret circa finem Maii ac ferè vsque ad medium Iunii: prouenit in collibus muscosis, præsertim inter umbrosas conualles. Circa Monteburgardum sæpius vidi etiam in hortu ill. E. C. priuquam ad-

Locus & Tempus.

part

mare curarem, sponte enim multis in locis proueniat: Inibi floret Maio.

Dodon. in hist. Gall. dicit: odor multum olfactibus capitis dolorem creat. Radix Testiculi succi plena, potissimum Testiculi hircini si edatur, aut cocta cum lacte caprino bibatur, Venerem excitat, roborat & corpus nutrit: Hecticis & iis qui alimento egent singulare remedium. Eum vero in Hist. Lat. pluraque omittere placet, ait autem: Nostra ætas omnium Orchium bulbi ad Venerem excitandam vitur: & pharmacopœi compositionibus eo facientibus indifferenter quousque admiscunt: præstantiores sunt Tragorchios bulbi. Assumendi autem non sunt ambo bulbi, sed durior, plenior & succi plus habens: flaccidior ac rugosior minus idoneus est. Est autem plenior, non semper qui maior, sed non raro minor, si videlicet bulbi colligantur priusquam stirps defloruerit: aut cum primum caulis erumpit. Nec etenim succulentior, alterum magnitudine superat, priusquam semen maturari cœperit. Nam alternis annis vnus bulbus intumescit, alter vero residet ac perit, ac cum durior ac succo plenior crescere incipit, alter flaccescit rugisque contrahit, donec maturato semine vna cum foliis & caliculis subinde totus subsideat ac pereat: eo qui interea creuit vegeto ac succi pleno: & vicissim. Cur Dodon. eligit potius fortidos, an quia fortent, ut Hirci qui talaces sunt? Quod ad nos attinet, nos existimamus odoris boni & grati potius roborare corpus, alere, & sperma augere quam fortida.

Omnia Testiculorum & Satyriorum genera [ut Trago placet] quæ Germ. *Scendelmurg* appellant, calida sunt & humida. Nec debent nisi necessitas id postulauerit intro sumi. Foris cataplasmatibus instar imponuntur, Radices rotundæ & pleniores (sunt enim ut diximus nonnullæ vacuæ, marcidæ & rugosæ) omnium Satyrionum, in cibo vel eclogmate usurpatæ, ad Venerem stimulos addunt legnioribus. Vtilis est hæc medicina ad conseruandum & augendum genus humanum, modò ritè & quo debet modo usurperetur. Rursus aridæ & marcidæ Satyrionum radices Venerem inhibent, quo nomine cœnobitis qui castrationem voverunt (ut hi loquuntur) vtilis fuerint. Paucos tamen in eo ordine hominum reperias qui id medicamentum experant. Radices plenæ in lacte caprino bibi possunt, aut cum albo Pipere & melle, instar Eclegmatis, confici ac assumi. Radices Satyri maxime eius quod odoratum esse diximus cum vino & melle decoctæ, vlcera oris & quæcunque eius vitia sanant. Radices eadem tussæ, & illitæ, inflammationes leniunt, tumores discutiunt, vlcera fluentia purgât, sanantque veluti Aron & Dracunculus maior.

ORCHIS GALEA ET ALIS ferè cinereis.

Descriptio **H**ic bulbi fibræque appensæ haud aliis ab-
similes: folia duas uncias lata, quatuor aut
sex longa, quaterna aut quina: caulis dodranta-
lis flores sustinet in spicam digestos, odoratos,
quorum singuli pediculis semuncialibus insi-
dentes, calcar breue exprimit: galea alisque foris
cinereis, intus rubentibus & saturatioribus pun-
niceis lineis striatis, quibus interiecta bina fo-
liola oblonga, valde angusta, rubentia: labellum
oblongum, in bis binas alas rubentes dissectum,



intus albi-
dum, punctis
rubris pictum,
foris ex albo
ad purpuram
declinans: in
ristu apices
herbidi. Cir-
ca Mombel-
gardum abun-
dat in colli-
nis pratis flo-
rens Maio,
Genevæ iti-
dem copio-
se.

Fuchs. hist. *Orchis mas*
Orchis mas
in vniuersum
maior quam
fœmina, pro-
ceriorque, ut
pictura ipsa

pulchrè declarat. Icon. dicitur G. Breit fœnas
benfraut mennle. Is autem pro descriptione
sue Orchidis ponit descriptionem Dioscorideam,
non tamen indicans se Dioscor. descriptionem
ponere, quæ sane non respondet iconi, folia enim
non sunt Oleæ similia.

An Trago, Satyrium mas quorundam, pri-
mum idemque vulgarissimum, Maio mense flo-
rens, quod in pratis reperitur, ternis aut quater-
nis plerumque foliis vestitum, Liliis similibus.
Porro in duas species hoc genus, quod ad florem
attinet dirimitur. Aliud namque flore comæ pur-
pureo, aliud niueo, cœque Aristolochiæ vulgaris
flori consimili, &c. Eius autem Icon Fuchsianæ
similis est.

Satyrium
mas

Aliud flori
purpureo,
Aliud
albid.

An Matthioli in Dioscor. picturam habet no-
mine Testiculi, postremo loco. Camer. in Epit.
hanc iconem omisit, & aliam substituit mutata
nonnihil descriptione: de planta autem, citius i-
conem Camerarius exhibet sub Orchide albâ
calcar longo agemus.

De nostra Orchide Dodon. Gall. Orchis pri-
mum genus, *le premier couillon de chien masle*
dixit. Orchis, Cynorchis, *nuve d'orchis*, Testicu-
lus, Testiculus canis: Odicinis Satyriones, quam-
uis parua sit similitudo. Foliis Lili conuallium, flo-
res odorati atque variegati. Dodonæus ean-
dem iconem ex Fuchsio habet quam nos: ve-
rùm lib. de flor. & in fol. mutauit iconem & nu-
merum, & dicit: Cynorchis altera foliis læui-
bus, oblongis & latis est, sed quam antecedentis
(Cynorchis prioris Dodon.) minoribus & an-
gustioribus, quinque aut sex, nonnullis caulè æ-
plectentibus, qui dodratalis est: spicâ densâ, bre-
ui, in qua flores multi, colore ex candore pur-
purascentes, multis purpureis punctis, & inte-
riore partes obscurioribus copiosis exiguis lineis
ornari: formâ galeam aut hiantem cucullum
quoque referentes, dependente ex singulis velu-
ti animalculi quadrupedis, aut homunculi exten-
sis brachijs & diuicatis cruribus absque capi-
te corpusculo, eodem ferè modo, quo ex Saturni
ore depingi solent dependentes pueruli: radices
subfut duæ globosæ, nuclei Nucis Myristicæ ma-
gnitudine: adherentibus ad annexum fibris ali-
quot crassis.

Lobel. Obs. Cynorchis maioris secunda spe-
cies Aduers. pag. 62. Cynorchis altera Dodon.
Angl. Doggie coddies. Alia icon est in Planti-

ni iconibus p. 175. hoc titulo, Cynosorchis maioris secunda species: & Cynof. altera Dodon. T. 214.

H. Lugd.
par.

Hist. Lugd. Orchis 1. species Dod. & Matthioli. Ic. ex Matth. quam non audemus dicere priorem Dod. lib. 8. nec in post. hist. suspicamur potius secundam, cuius descriptionem etiam ponit hist. Lugd. sed male nostro iudicio ad alteram iconem refert.

Tab. Icon. & Hist. Cynosorchis maior. 2. *Großfnabenkraut* 2. Et post. Testiculus latifolius & Matthioli, *Breyt Stendelmurg*. Duas figuras vnius plantæ.

C. B. Phyt. Cynosorchis tertia latifolia hian- te cuculo.

Thal. Hareyn. Orchidis Dodonæi secundum genus.

ORCHIS STRATEVMATICA MAIOR.

Sunt & Strateumaticæ vel Anthropinæ dictæ Squæ iudicio plurimorum ceteras pulchritudine vincunt: flores vt galeæ vel galeati homunculi trû-

cis duntaxat manibus pedi- busque. Prior eminente caule, folio amplif- simo, id est, ló- go simul & la- to, & subro- tundo inter i- nicia, flos inus candidus, mac- ulis purpureis interstinctus, foris velut fi- bris purpureis, ac citrinis, im- pensius rubés: huius prouen- tus vberior in syluula Flori- dæ vallis: erup- tit mense De- cembri, floret

à Maii auspiciis ad finem vsque.

Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 184. Orchis Strateumati- ca, vel stratiotes maior, siue Militaris C. Gemmæ, quam meritis Basilicam tertiam vocitare licet.

Hist. Lugd. Orchis strateumatica maior Basili- ca tertia Gemmæ.

Tabern. Ic. & hist. Testiculus & militaris Sten- delmurg.

Orchin latifoliam alteram, quæ haud dubiè genus Orchidis amplissimis foliis est, Clusius non modò in siluis Nemethvivar oppidi vicinis, sed etiam in Leytano saltu supra Manderstorf obseruabat, foliis quidem magnis & latis, sed in- fra superiorum amplitudinem, caule penè cubi- tali, magnis floribus spicatum congestis, eiusdem cum aliarum Orchidum floribus formæ, purpu- reis maculis aspersis, exalbida galdâ flores singu- los tegentes, radicibus geminis, crassis, superiore tamen breuioribus.

C. Bauh.

C. Bauh. Phyt. Orchis 18. bifolia altera Clusio, Orchis latifolia altera. Cur C. Bauh. vocat bifo- liam? Clusius non scribit talem esse, quinimò iconem, cui multa folia in post. hist. ponit quæ à Lo- belio Strateumatica dicitur: eam autem ipse C. Bauhin. separans à Clusiana latifolia altera facit Orchidum 34. siue militarem maiorem.



Descriptio

ORCHIS STRATEVMATICA MINOR.



Cognatū Stra- teumaticæ al- terum genus (in- quit Corn. Gemma,) folio quidem lato, sed breuiore, comâ magis propendu- lâ, propiusque cõ- fertis floribus, & ad vnum latus nu- rantibus galeis: co- lor foris ex albo & cæruleo nonnihil cineritio mistus: habet maculas co- loris puniceis: hi ad nos e montosis & asperis non pro- cul à Bruxellensi ciuitate mittuntur. Flos apprimè ve- nustus, utriusque ge- neris, sed inodorus.

Descriptio

Lobel. Obs. p. 92. & Ic. Pl. p. 184. Orchis strateu- maticam inot C. Gemmæ. Descriptionem Gem- mæ posuimus, quæ respondet nostræ Orchidi ga- leâ & alis cinereis, pro qua tamen Lobel. etiam videtur habere iconem: diligentius hæc hist. examinanda.

Hist. Lugd. Orchis Strateumatica minor Gem- mæ.

Tabern. Icon. & Hist. Testiculus strateumati- cus minor 10. Stendelmurg.

C. B. Phyt. Orchis 34. siue militaris minor.

Strateumatica folio Lili- foliis quàm simillima.

Præter iam dictas Strateumaticas, vel Militares, vidit aliquando Corn. Gemma & tertium genus folio lato, Lili foliis quàm simillimo, oblongo sci- licet, & in mucronem subrotundum desinente, cui flos Lili lacteus planè columbarum effigiem alis expositis pedibusque quàm optimè repræ- sentans. Gaudet montosis & aridis: floret eo- dem tempore cum Anthropinis.

CYNOSORCHIS PRIOR DODONÆI



Cynosor- chis pri- ma species, Dodon. hist. 8. & in fol. falsa habet lata, pinguis, Lili foliis prope- modum similia: caulem peda- lem, aut altio- rem, angulo- sum; & in eo flores copio- sos, spicatum digestos, colo- re rubentis di- lura purpuræ, cucullo aut galeæ patenti similes, ex qui-

Descriptio

quibus parte inferiori laciniolum quiddam, canis aut alterius animalis quadrupedis exuvio simile dependet, dilute & ipsum purpurascens, punctulis magis purpureis respersum: pro radicibus præter fibras supra adhaerentes, gemini sunt bulbi veluti testiculi, formâ aliquantulum oblongi, quorum vnus plenior ac vegetior alter rugosior.

Cynosorchis inquit Adu. omnium notissimus magnitudine, in pratis frequentissimus riguis, primò pillularum speciem habet Elleboris erumpentis, vel Colchici, deinde Liliis conuallii aut vulgaris: folia exerit terna aut quaterna, lenta, crassa, & mucore turgentia. Caulem verò sesquipedem longum, glabrum, nitidum, canum in summo: spicato flore conspicuum, odoratum, purpureum, maculis albicantibus, atque pallis variegatum: radix geminis constat bulbis effigie testiculorum, quos quasi pubes supernè multæ ambiunt fibræ, quibus, non secus atque ipsa planta superior, bulbi alimoniam adipiscuntur, & alternis perennem: alteri nempe iam flaccido & vacuo, altero succedente rurgido & succi viscidissimi limpidi pleno, albuminis Ovi, quasi foret semen genitale; magnitudo quanta maioris dactyli, interdum Nucis juglandis adulto: vieto verò, & rugoso multò minor, & situs inferior. Dulcis sapor, mucagineus, emplasticus, insulsus, odor candidus, pellucidus.

Lobel. Obs. Serapias Diosc. Cornelio Gemmæ: siue Basilica Syderites vel Erythraea floris omnino purpurei, & aliarum omnium facile princeps Cynosorchis nostra maior p. 62.

Icon. à Lob. & Dod. proposita similis admodum est Cynosorchis maiori alteri Lobelii & Cynosorchis tertio Clusii: neuter tamen certum aliquod discrimen tradere videtur: Lectorum præterea erit perquirere an hæc ab aliquo alio Botanico tradatur descriptione vel icona.

Hist. Lugd. Cynosorchis maior; Lob. Serapias Diosc. Gemmæ.

Tabern. Ic. & H. Cynosorchis maior. 1. Grossfnabenfratt: Icon eadem cum Dodonæo & Lob. descriptio autem diuersa à Dodonæi descriptione, quam Tabern. posuit pro suo Cynosorchide priore, ut dictum.

C. B. Phyt. Cynosorchis 1. latifolia, altera Liliifolia.

Thal. Harc. Orchidis Dodonæi primum genus. Eiusdem alia species foliis quatuor vel quinque multò longioribus, dodrantalibus.

ORCHIS ORNITHOPHORA FOLIO MACULOSO Lob. Ic. Plant. p. 183. Teut. 219.

Orchis Ornithophoræ foliis maculosis C. Gemmæ sunt, teste Lob. Obs. differentia accidentales plurimæ. Floribus: putpureis, purpurascens, albis. Foliis: prægrandibus, paruis, oualis figuræ, ex lato in acutum desinentibus, ex acuto in amplum & rotundum.

Floret medio Aprilis ferè, & quandoque sub initium Aprilis vel finem Martii mensis.

Hist. Lugd. Orchis Ornithophora, foliis maculosis, Gemmæ.

Tabern. Hist. & Ic. Testiculus 15. Ornithophorus satis latis foliis, striatis, valde maculatis, diuersorum colorum floribus, purpureis, albis, & ex purpureo pallido. Testiculus vulpinus, Fuchs.

Tom. 11.

hòblem. Folia lata cum nervis apparentibus, multis maculis aspersa, flores aut volanti similes, purpurei. Lectores considerent, an duæ icones & descriptiones vnus plantæ: non videmus occasionem cur Compilator separari capite.

C. Bauh. Phyt. Orchis 31. de qua Lobelius.



ORCHIS MAGNA LATIS FOLIIS, GALEA fulca vel nigricante.



Folia habet quatuor aut quinque, magna, Liliacea, palmaria, & sesquipalmaria, vnicia circiter tres lata, striata, nitida, & præter hæc duorum foliorum in terra rudimenta: caulis striatus, sesquicubitalis, superiora versus purpurascens, in quo florum thyrsos mascululorum, galea breui atropurea striata, quibus apprimuntur binæ alæ concolores, calcari paruo, ad pediculum longiusculum contortum angulosumque appressio: ex pediculo pender labellum exuuiæ martis aut zebellini expansas, egregie exprimens, vnà cum crusculis & cauda aduersa parte ex albo purpurascens: incima floris penetralia rubro candidoque variata sunt: odor levis non ingratus: sapor viscidus insuauis.

Hanc obseruauimus in Ducatu Wirtembergico cum contenderemus per montem ex vrbe Dornstet ad urbem Nagel, florentem mēsis Maii medio.

Icon quam proponimus ex iis quas sculptas eminus quod radices & folia attingit, non malè conuenit plantæ descriptæ, verum flores non placent: considerandum an ab aliis Botaniciis sit descripta.

§ 11

ORCHIS ALIVS PURPUREVS, ALIVS
ex roseo candidus Trago siue quartus.

Satyrium
primum
Diosc. Trago.
40.



Testiculus
a purpureo
roseo candidus.

Orchidis hęc icon quod sit referenda considerandum, nos iam sculptam emimus; huic ferè similis est apud Tragum, cui titulus Satyrium primum Dioscoridis, das 4 Stendelmurz Mennlin. Eisdem Trago est alia icon cui titulus, Cynosorchis mas quarto loco descripta. Hęc icon accedit ad iconem à Trago inscriptam, Satyrium

mas quorundam, de qua egimus sub titulo Orchidis galea & alis cinereis.

Tragus autem sic describit: Quartus Testiculus duum est generum si florem, quem alius purpureum prorsus, alius verd ex roseo candidum, purpureisque ac exiguis maculis notatum proferri consideres. Planta est omni ex parte satis magna, cuius viridia & mollia folia Lilium ferè referunt: Radices illius quæ succulentæ sunt & dulces binis oblongis aucularum ovis, aut veris galli gallinacei testiculis, conferri possunt.

Considerandum an alius quispiam botanicus huius Testiculi meminerit, & inquirendum an Tragus fortè intellexerit Orchion maiorem totum purpureum, licet nostra icon ac etiam icones ambæ Tragi minùs respondere videantur.

CYNOSORCHIS DELPHINIA MACV-
losis foliis flore purpuro-violaceo.



Cynosorchis Delphinia Lobel. Icon. Pl. p. 174. sessilibus est & maculosis, obtusioribusque foliis: flore purpuro-violaceo; caule sessilibus, quicubitali maiusculo, oiliuari gemino bulbo T. 214. Vide H. Belg. Lob. p. 214.

C.B. Phyr. Testiculus 8. morionis foliis sessilibus macularis.

Icon nostra ex

emptius an conueniat considerandum.

CYNOSORCHIS MINIMIS SECUNDVM
caulem maculosis foliis, floribus purpureis.



Cynosorchis. Lob. Ic. Pl. minimis & secundum caulem pedalem maculosis foliis: floribus purpureis, Lob. Ic. Plant. p. 174. Teur. 214. C.B. Phyr. Testiculus 7. morionis minor foliis maculatis.

ORCHIS MAIOR TOTA
purpurea non maculata.



Emino bulbo magno donata est hęc Orchis, altero oblongo: folia quaternaria aut sena, longa, lata, laxa, splendens: caulis dodrantalis & cubitalis crassus, in summo purpureus: flores confertim multi purpurei, & interdum albicantes, odore ferè nullo: labello tripartito, medio segmento protensiore, raris punctis purpureis in

viridi albicanteve notato, alis foris intusque purpureis, calcari satis longo purpureo. Hęc etiam folio maculato reperitur de qua antè.

Fuch. Orchis scemina minor. Icon. p. 119. Orchis scemina altera, Sed utal Enabenfrant weis ble das ander, Minor est ut signa demonstrat. Non placet Fuchsum iconem 4. loco ponere nec demonstrare quàm in re ea Orchis differat à præcedentibus, quæ nostro iudicio non erat separanda à secunda siue maculata Orchide.

Dodon. Gall. Orchios 4. genus, Second couillon de chren semelle, valdè simile foliis secundo (nobis dicto, Orchis maior tota purpurea folio maculato: flores carnei coloris cū maculis paruis fuscis (brunet:) Radices rotundæ, sublongæ, similes opis auium, minores radicibus secundi. Dodon. Iconem Fuchsi habet, an eandem plantam quam nos intelligat affirmare non possumus.

Mat-

Mathiolus multos Testiculos describit, sed tantum icones proponit, & primo loco in vna tabella duas quæ differre videntur, quod autem referendæ nobis certè incertum, si licet coniecturari, accedere videtur vna ad Fuchianam antè dictam: De altera icone eiusdem tabellæ vix habemus quod dicamus, conferatur tamen cum Cynosorchide tertio Dodonæi.

Hist. Lugd. Icones Matthioli duas in vna tabella proponit sub hoc titulo: Orchis 4. & quinta Dodonæi 1. Matth.

Tabernaem. & Hist. Cynosorchis maior prima *Groß Knabenkraut* / describitur à Dodonæo & Matthiolo foliis latis pinguibus, Liliorum foliis valdè similibus: caule anguloso palmum alto vel paulò maiore: flores spicæ modo purpurei, galeam apertam referentes, labrum inferius punctis purpureis notatum: radix consistit duobus globulis. Icon descripta est ex Matthiolo: descriptio autem ex Dodonæo de floribus (nulla icon) sed diuersa à Matthiolo: Descriptionem Dodonæi conuenire cum icone Matthioli dicere non audemus, nec etiam scimus an exet Orchis caule anguloso.

Item: Testiculus vulpinus 3. *Fuchshölein*. Compil. ponit iconem valdè foliosam per totum caulem [qualem habet Matthiol. sub prima Testiculorum specie] hanc non describit, ea enim descriptio quæ est tertio loco non pertinet ad Orchidæ cui numerus tertius ascriptus: Iconum p. 669. pro testiculo 12. posuit iconem (sine descriptione) folioso admodum caule. Casp. Bauhin Phyt. Testiculus 6. morionis fœmina alter.

Hanc Orchin florentem Aprili in pratis obseruavi prope Massonium Abbatiam: & prope *pont de Roide Burgundia*, præcedentem folio maculato, & non maculato, de qua hoc capite: vt & hanc cum sequenti in eodem prato. Maculatam collectam in monte *Bar* transtuli in hortum Ill. E. C. Circa Mombelgardum & Bessordiam, circa duneta florere adhuc Maio.

ORCHIS ORNITHOPHORA FLORE colore herbaceo.



& quasi quadrangulum.

Dodonæus omitta iconem & descriptionem quam habebat in hist. Gal. pro quinta, aliam in histor. flor. ponit, cui in fol. iconem addit plurimum dif-

Tom. II.

ferentem, de qua Lobel. Ic. Pl. pag. 181. Teut. 219.


Et Obs. Orchis Ornithophora, vel Ornithes folio laui C. Gemmæ. Testiculus noster papilionis alas expansas referens, Adu. p. 62.

An Lob. Adu. p. 63. Testiculus vulpinus foliis latiusculis & toto caule appressis, floribus Papilionibus volantes, alisue pallis se libantes amulantibus.

Hist. Lugd. Orchidis Dodonæo quinta quædā species reperitur: floribus caule herbaceo subvirentibus &c. Pro hoc quinto Orchide fortè malè posuit Hist. Iconem Matth. primam quam postea Iconem Lobelii & Dodonæi ponat sub titulo hoc: Orchis Ornithophora folio laui, Gémæ.

Casp. Bauh. Phyt. Orchis 30. spicæ ex herbaceo subvirente.

ORCHIS ORNITHOPHORA CANDIDA.



Plant. Icon. p. 183. Ornithophora candida Teut. 219. Vide h. Belg. Lobel. C. Bauhin. Phyt. Orchis 31.

ORCHIS MINOR PURPUREA ET ALIORUM colorum cum alis virentibus.



Radix interstes duos rotundos, alterum superiorem, alterum inferiorem, disticta, cum fibris aliquot adnatis: sicut octo aut undecim nonnullis, magna, duas uncias aut paulò plus longa, angusta: caulis palmum aut sesquipalmum altus vel altior: Flores suauicolentes, vni, sic se pudentes, rubentes, labello latiore, quàm præcedens, sinuato, calcarari etiam breuiore, saturatioribus punctis puniceis in albo carneone distincti: ala media parte virentes, magis tamen intus quàm foris.

Sti

HISTORIÆ PLANTARVM

ca candidæ crassiusculæ fibræ. Inueniuntur passim in pratis Viennæ vicinis.

Clusius pro sua Orchide quinta, ponit iconem Testiculi morionis maris Dodon. Hist. fl. & postrema, siue Lob. Obs. & Ic. Pl. Cynorchidis morionis cui folia maculata: Considerandum an sit eadem cum nostra purpurea minore, cui alæ virentes, quamvis C. Bauh. separet.

C. Bauh. Phyt. Testiculus 9. morionis foliis sessilibus non maculatis. Orchis colore vario Clusii. Testiculus 5. morionis femina Matthiolo Icon. p. 559. Testiculi species tertia. Lob. Cynorchidis morio femina.

Hunc Orchin minorem cum precedenti maiore obseruauimus florentem ex primis Aprilis in pratis humidis circa Montbelgardum: & propè Moruillars flore albo & caruleo & albido, hos etiam florentes Maio circa Montbelgardum transtuli in hortum Ill. E. C. Est ex primis speciebus Orchis vere florentibus, ac cum magno toto purpureo flore: Genere quoque obseruauimus.

ORCHIS SIVE CYNOSORCHIS tertius Dodon. Lobel. maior alter.

Nos iconem quam hic ponimus cum aliis sculptam emimus, de qua Fuch. icon. p. 38. Orchis femina angustifolia. Schmal snabenfraur. In hist. Orchis femina maior, ut pictura satis demonstrat. Fuchius iconem ponit tertio loco, sine

vlla descriptione, non demonstrans qua in re ab aliis differat.

Dodon. Gall. Orchis tertium genus, premier cordon de chene femelle, magna & lata habet folia, laliorum foliis penè similia: flores exerulei (perferi) radices rotundæ & sublongæ forma Ouarum autumli: perior rotunda & parua, inferior nonnihil



longior & crassior, utraque saporis valde dulcis. Dodonæus iconem Fuchianam habet in sua hist. Gall. Quo nomine tradat in hist. fl. & 61. asserere non audemus, nullam ibi signatam habet, considerandum an describat hinc: Tertia Cynosorchidis species folia edit angusta &c. Dodonæus in fol. eandem histoiam habet & iconem quam intersipit Cynosorchis tertius. Hæc autem icon est apud Lobel. Obs. p. 89. cum hac inscriptione Serapias Diosc. secunda C. Germæ, &c. Icon postea Dodon. & Lobelii tantam habet similitudinem cum Cynosorchide maiore Lobelii & priore Dodon. in post. hist. ut inigne aliquod discrimen statuere non possimus.

Hist. Lugd. Serapias Dioscor. 2. Germæ. Orchis Bahica altera, Cynosorchis altera maior Lob.

Hist.

Orchis Sc.
rapias
Triorchis
mas.

Fuch. nat.

Dodon. re
Orch.

ca candidæ crassiusculæ fibræ. Inueniuntur passim in pratis Viennæ vicinis.

In hoc genere duplex florum varietas reperitur præter iam dictam: vni enim labellum albicat, ex rariis in purpurea habens, purpurea fugiente punctatum, per reliqua cum iam descripta conueniens: alteri flos totus cum calceari albet, nonnihil ad lateum inclinans: alas cum superposito folio striz virides percurrunt; folium quoque floris pediculo appositum virefcit. Hæc Orchis multum ludit magnitudine & colore.

Fuch. Hist. 3. 3. 3. aut 3. 3. 3. Paulo & Aetio testibus, Græcis dicitur: Serapias Latinis: Germ. Ragwürz; Gall. Sacerum à trois cuillons. Triorchis Serapias mas. Triorchis manifeste ex ea appellatione argumento, quod non duabus, sed tribus testicularis radicibus in terra nitatur. Quo facile à prioribus discriminatur Orchidibus. Item Ic. Triorchis mas minor. Fuchius ponit descriptionem Diosc. pro sua, non demonstrans esse Diosc. quod non parum displicet. Si Orchis de qua hic agimus reperitur cum tribus bulbis siue testiculis, id euenit propter iuniorum plantam adiunctam & primæ provenientem.

Displicet & Dodon. qui in hist. Gall. hanc Orchidi, in sua descriptione tribuit tres bulbos, licet non viderit, quod patet ex lib. eius florum & postrema historia, ubi scribit in nulla Orchide non contigisse plures videre quàm duos bulbos.

Matth. in Diosc. quart. loco Testiculi species: In epit. pro tertio sine descriptione. In histor. Germ. pro secundo.

Poterit considerari icon Cynosorchis morionis femina Dodon. & Lobelij de qua antè: quæ videtur exprimere Orchidem de qua hoc loco agimus, multa respondent, eadem est etiam in Hist. Lugd. ut antè dictum.

An Tabern. Icon. & Hist. Cynosorchis morio 1. Gesprengt Snabenfräse: Hæc postrema Cynosorchis habet folia laxa, angusta, striata, similia angustæ Plantagini. Flores valde expansi, retro pædet veluti corniculæ: eis foliola quædam auriculæ Morionis similia. Icon Tabern. eadem est cum iconè Cynosorchidis Morionis femina Lobelij in Obs. & Icon. Plant. de qua antè proximo titulo egimus.

Tabern. icon & hist. Triorchis mas minor Klein Ragwürz Mannlein Icon modo dicta est ex Fuchianis, qualis nostra, cuius descriptionem non ponit, & non benè separat capite proprio ab aliis Orchidibus: nullam ponit descriptionem conuenientem.

An Clus. in Pann. & hist. post. hanc tradit, cum scribit: Orchis colore vario, siue quinta, quatuor aut plura habet folia, summa tellure iacentia, Belgicæ Orchidis quæ passim in pratis maturè purpureum florem fert, similia, sed nollis maculis aspersa: caulem palmatæ, aliquot minoribus foliis septum: cuius summum, multi flores, exigua galea duobus foliolis constante, tribusque aliis foliolis galeam ambiens, latiore barba propendente, & obtusiore calceari præditi, & in spicam natoentes exornant, coloris aut purpurei Saturationis, aut dilationis, aut ferè carnei, atque etiam omnino albi, barba tamen plerumque vel exiguis, vel maioribus maculis satue purpurascensibus aspersa, interdum etiam prorsus nullis, præsertim in lætioribus floribus: semen ut in reliquis contortis vasculis continetur: geminas radices, vnam superioris anni staccidioræ, alteram recentioræ, succulentæ, regunt mul-

Tabern. Icon. & Hist. Cynosorchis maior 4. Groß Knabenkraut. Icon Tab. est eadem quæ Lobelii & Dodonzi in post. hist. sed sine descriptione.

C. B. Phyt. Cynosorchis 1. latifolia floribus purpureis intus albicantibus.

ORCHIS MAIOR TOTA PURPUREA
maculoso folio.



Orchis maior tota purpurea folio maculoso, quæ in re differat de-
ptis maculis nig-
gris in foliis
considerandum
ab ea quam ma-
iorem totam
purpuream non
maculatam di-
ximus: dicitur
Fuchf. Icon. &
hist. Orchis
mas angustifo-
la, Schmal
Knabenkraut
Mennle / Al-
terum genus
angustioribus
foliis quam

Orchis mas latifolia, & maculosis magis, flori-
busque purpureis constat.

An Trago Cynosorchis mas, Testiculus quar-
tus duum generum, de quo pauld antè scripsi-
mus, alius roseo candidus.

Matth. Testiculi penultima figura ex Fuchfio
sine descriptione. Figuræ tamen ex Plantino
melius placent quam Fuchfii quas hic habemus.

Hist. Lugd. Iconem habet ex Matthiolo cum
hac inscriptione, Testiculus morionis mas Dode-
nzi, ibidem descriptio ex Dod. de floribus: addit-
que, Orchis secundum genus facit Dod. Matth.
Testiculum quartum.

Apud Dodon. Gall. Icon Fuchfiana: Orchis
secundum genus primo (siue ei cui galea & alæ
ferè cinerea) nonnihil simile, foliis tamen angu-
stioribus, tenerioribus, cum maculis nigricanti-
bus: Flores modò cærulei obscuri (*pers obscuri*),
modò niueicandoris, Radices oliuarum modo
rotundæ: vna noua & plena, altera fungosa ru-
gosa & flaccida. Idem hist. fl. & in fol. Testicu-
lus Morionis mas, cui folia sunt quinque, aut sex,
longa, lata, læuia, Lillii foliis similia, quædam mi-
nora, superius maculis aliquot subnigricantibus
signata: quorum vnum & subinde alterum cau-
lem quoque circumplectitur: caulis dodrantalis:
Flores in spica purpurei, circa umbilicum albidio-
res, odorati, & aspectu grati, posterius cornicu-
lum habent propendens, simile ferè corniculo
Regii floris: antèrè verò cucullum aut culari
& cristatum Morionis referunt. Nam cuculli
cuiusdam & patetis galeæ modo rosculus hiat,
& angusta foliola, quæ à lateribus surgunt, auti-
culas: quod verò è medio attollitur, cristam re-
fert: radices gemini sunt globuli nucleo Nucis
Myristicæ similes, supra quos fibræ exeunt. Si Do-
don. eandem quam nos intelligit, consideran-
dum an icon bene respondeat.

Tom. II.

Tab. Hist. & Ic. Cynosorchis maculata Ma-
rientreher Mänlein. Cynosorchis morio mas.
Gesprengt Knabenkraut: Quintæ speciei fo-
lia sunt crassa & lata, multis maculis aspersa. Flo-
res prioribus similes, coloris nonnihil viridis,
huic similis sexta foliis maculatis: quæ maculæ
sunt ex nigro virètes, flores albi & purpurei gra-
ti odoris, humiles capitulis Stultorum. Icon prior
Tabern. accedit ad iconem Matthioli, secunda ad
iconem Dodonzi: quas autem plantas intelligat
non asserimus adhuc.

C. B. Phyt. Testiculus 4. morionis mas foliis
maculatis.

Orchis fetidissima Clusii.

Similem quintæ (Orchidi colore vario) obserua-
bam [inquit Clusius in Pannon. & Hist. post.] in
pratibus vbi Londinensium in Anglia proximis, vbi
etiam eruebat grandiore paulo florum pur-
pureorum spicæ teterrimi fætoris.

Casp. Bauh. Phyt. Orchis 13. fetidissima Clusii.

ORCHIDIS GENVS PARVVM FLORE
prorsus purpureo odoris suauissimi.



Quintum
Testiculi
genus Trago
bipartitum est,
verumque folio
vestitur Lillio
simili: flore
emicans pur-
pureo prorsus,
nec enim illas
ostendit liru-
ras, coque in-
stat frumento-
rum in spicam
delinente cacu-
men: quod in
hoc genere mi-
nimum existit
suauissimo co-
mendatur odo-
re, & ad Gario-
phyllæam ac-
cedente. Nascitur verumque in asperis plerum-
que montibus subter Iuniperos, terra forti & al-
ba gaudens. Orchis quinta odorata, Das
5. wotrichend Margendrehen.

Tragus propriam huius habet iconem: con-
siderandum an icon nostra ex emptitiis pro ea
poni possit, vel an aliquam potius denotet Or-
chidem.

Perpendendum etiam an à Clusio in post. hist.
sic tradatur: Orchidis genus elegantissimum si-
ue tertium binis crassis bulbis præditum, vno
succo pleno, altero flaccidiore, quod in Orchidi-
bus vulgare est: foliis longis, angustis: caule in-
terdum pedali, spicæ florum elegante, odorata,
quorum galeola obscura purpurâ nitet, hiatus
cum propendente labro candicant, purpureisque
maculis insigniuntur. Inuenitur in pratibus Ne-
meth-vyyvar Dn. de Batthyay vicinis, supra Ra-
bam & inter flumina Muram & Drauum.

C. Bahin. Phyt. Orchis decimaquinta obscura
purpurea.

Sc.

ORCHIS MINOR FOLIIS TENUI-

tibus reflexis flore puniceo.

Orchidis minor species Thalii, foliis est tenuiori-
bus in terrâ reflexis, quinis, senis, septenisve: can-
ticulo breui, digitali, quandoque dodrantali, tenui.
Spica breuior florum puniceorum pauciorum.
Nascitur locis apricis circa Gerentodam.

ORCHIS PARVO FLORE RVBRO

sive phœnico.

Descrip.



Icones su-
pra posita.

Orchis hæc
palmo ma-
ior foliis plurib^{us}
non magnis, ~~an-~~
tem multum am-
plexatibus: flori-
bus veluti in spi-
ca sexcunciali
longa, & penè vn-
ciali lata, parvis,
rubris, & penè v-
nius coloris: an
fortè Testiculus
morio tertius
Dodonzi?

Icon quam po-
numus est ex iis
quas emim^{us}, quæ
aliquatenus ex-
primit nostram
plantam.

Considerandum an de hac scribat Clus. H. post.
Orchis 2. cui folia sunt plura, quam latifolia
alteri, angustiora: caulis gracilib^{us}, pedalis, flores
rubri pulcherrimi, quales ferè in Belgico illo Or-
chidis genere videre memini, quod e pratis Lo-
uano vicinis eruabatur. Crescit in eodem iugo
Geben pone areem, & plerisque gramincis locis,
inter flumina Muram & Drau^{um}, tum apud Sack-
turnya Ill. Comit^{is} de Zrinio arcè. Tradidit autè
hanc prius iisdem planè verbis in Pannon. sub
hoc titulo; Orchis flore rubro elegantissimo.

C.B. Phyt. Orchis 19. flore rubro elegantissimo
rubro. Montbelg. mense Iunio florèrem vidi.

TRAGORCHIS MINOR FLORE

fuliginoso.



LOb. obs. p. 90.
L&C. Pl. p. 177.
Tragorchis mi-
nor & verior C.
Gemma, sive Co-
riofmites, vel co-
riophora flore in-
star cimicū: flore
est fuliginoso, fi-
gura, color & n-
dor Cimicis, foliū
non absimile mi-
nori Delphinio
Saryisco: gau-
det irriguis: floret
cum Delphiniis.
H. Lugd. Tragor-
chis minor & ve-
rior Gemmæ.

C.B. Phyt. Test.
16. sive hircinus
minor.

Tab. Ic. Testiculus hircinus 3. minor, Klein Bode
p. 80. Icon quam his posuimus an respondere
possit Tragorchis minori considerandum.

ORCHIS BATAVICA



Dodrântali af-
surgit, caule
quem ternâ aut
quaternâ ambiat
angusta folia: su-
mus caulis susti-
net breuiorē spi-
cam florum ele-
gatis interius ru-
bri coloris: trifi-
do labro propen-
denie.

Orchis 6. sive
Batavica (Clus.
Pann. & H. post.)
ingrati odoris
est, quam nō ine-
ptè Tragorchia
minorem nuncu-
pari posse censet
Io. Hoghdadius.

Rara inuentu crescit in marinis aggeribus, in-
terdum etiam reperitur circa Hagam Hollandiæ.
In hortos autem translata, latius explicat florum
comam, in metâ quasi formam desinentem.

ICONES ORCHIDVM QVARVMDAM.



Icones pro-
positæ, sunt
ex iis quas
sculpeas emi-
mus, conside-
radum an sint
plantarum di-
uersarum &
iam traditis
insignis enim
varietas est
Orchidū. Sicut
nobis sunt ali-
quot Orchidæ
differtis, quas
accepim^{us}, Ar-
gentinâ à Dq.
Vldario Che-
lio insigni Ma-
diso ex plantis
ut existima-
mus D. Agge-
rii stirpem di-
ligentissimi in-
uestigatoris, ac
ab aliis, quas
describere nūc
non valemus,
nec pingere
lubet, quia ni-
hil certi pro-
ponere possu-
mus, ac ignora-
mus ubi colle-
ctæ, & an sint
iam descriptæ.

ORCHIS.

his Dodon. Matth. Testiculus secundus. Sub dicto titulo Hist. Lugd. est icon & ex Fuchio. Est & alia eiusdem plantae sub titulo, Orchidis 2. species, est & Orchis Spherodes Gemmae.

Tabern. Icon. & hist. Testiculus 7. Sphegodes Stendelmurg. Testiculus vulpinus 2. fuch. hód. In descript. 3. Folia quinque aut sex striata laeviuscula, Plantagini angustifoliae nonnihil similia, quaedam reflexa, caulis palmaris, cum floribus quinque vel sex, qui foliolis aliquot constar, in quibus partes inferiores habent aliquid nigri, quod refert imperfectam apem. Non placet Compilatore ponere Testiculum modò ab eo descriptum, capite diverso à Sphegode, quem non descripsit: si enim hic non idem, saltem erit valde similis. Huc etiam referendam censemus ineptam figuram cum flore quadripartito sine descriptione Tabernae iconum & Hist. cui titulus Triorchis scemina, Sagmurg weblein.

Calp. Bauhin. Phyt. Orchis 23. Fucum referens maior, foliolis superioribus candidis & purpureis.

Montbelgardi abundat florens Maio, etiam in hortu Ill. P. C.

ORCHIS MELITTIAS.



Lob. Obs. & Icon. Plant. pag. 180. Orchis Melittias, siue Apis cadauerulum exprimens Belg. Vienna Teut. 217.

Hist. Lugd. Orchis Melittias Gemmae, quae videtur referre Orchin Serapias Dod. in hist. stirp. Gall.

Tab. Hist. & Icon. Orchis Melittias, Biedmunda Gylmurg.

Calp. Bauh. Orchis 24. Fucum referens minor foliolis subuicentibus: vel Orchis apem referens. Orchis 6. & Satyrium alterum Diosc. Trago: Orchis Melittias Lobelio.

Orchidis tertiae Tragi meminibus nomini Orchidis Fucifloris, ubi eius descriptionem proposuimus, consideretur an & icon: perpendendum etiam an nostra icon ex empiriis eo referenda, vel eadem cum precedenti ad strigotem plantam minus concinne pictam.

ORCHIS SIVE TESTICVLVS SPHEGODES hirsuto flore.

Calp. aliaque expandit virentes, tristiorique & obsoletiore fuliginoso colore fucum potius aut vesperam quam apem praefert: folium infimum hirsutum, quod pro labello est, in quo non lutearum linearum, ut in illa, discursus vilius conspicitur, sed solum modò livida duae reliquae folio laeviores, depressioresque translucida lineola

coniuncta. H. masculam Romanorum efformant: alias vero duobus locis coeuntes insulam Ovali figura, lignosam hirsutaque circumscriptur.

Plant. Ic. pag. 180. Testiculus Vulpinus secundus Sphegodes

Teut. 177. Lobel. Obs. p. 48. nomine Testiculi vulpini aliam posuit iconem, quae apud Dod. in h. postrema est nomine Orchidis Serapiadis secundae minoris.

C. Bauh. Phyt. Orchis 25. Euciferens tertia.



ORCHIS MYODES GALEA ET ALIS.

herbida: & Orchis Serapias tertius Dodon. & Myodes, Lobelio.



Folia tria, quatuor aut quinque, viciant lata nonnunquam angustiora, longitudine circiter palmaria: caulis tenuis, palmaris, bipalmaris & maior: flores sustinet ex pediculo surrecto, ventricosos, cui appositum folium ad ipsius floris cacumē usque pertingens, raris, nullo calcari:

galea & alis colore herbaceo, reliqua parte muscae corpusculum affabre exprimente, prona parte albida otis ferrugineis, supina vero colore fuliginoso, Zona subcaerulea septum cingente, in ritu geminis corniculis stipato apices lutei occurrunt.

Lobel. Ada. pag. 62. Testiculus Vulpinus floribus muscam, sed colore rubiginosum obsoletoque & inamena fuscitudine purputascente Fucum exprimentibus. Considerandum an hae conveniant cum icone sequenti de qua Lobel. Ic. pag. 181. Item Obs. Orchis myodes prima C. Gemmae, floribus muscam exprimens.

Hist. Lugd. Triorchis Serapias tertius Dodon. Male impositus titulus Triorchidis, cum Dodonaeus dicat duos testiculos non tres vilos. Hist. praeterea ait: Orchis myodes prima Gem-

ma viderur referre Orchim Serapiam foeminam Dodon. in hist. stirp. (Gall.) Conferenti non videtur nobis respondere.

Tabern. icon. & Hist. Testiculus muscarius 1. Stendelmurg. Icon est eadem cum Lobelia: verum nescimus cur Compilerator hunc testiculum & ceteros separet capite proprio.

C. Bauh. Phyt. Orchis 26. muscæ corpus referens.

Circa Montbelgardum abundat florens Maio.

ORCHIS MYODES FLORE grandiusculo.



Lobel. Obs. & Ic. Plant. p. 182. Teut. 129. Orchis Myodes altera C. Gemme folio lauiore & flore grandiusculo. An Lob. & Pena Aduers. vulpinus testiculus foliis Plantagineis, venosis, reflexis, &c.

Hist. Lugd. Orchis Myodes altera Gemme.

Tabern. Hist. & Icon. Testiculus muscarius quartus Stendelmurg.

C. Bauh. Phyt. Orchis 28. muscam referens maior.

ORCHIS MYODES LVTEA.



Quadruplicem vulpinum testiculum meminerunt Lobel. & Pena floribus questum: Papilionis nempe, Fuci, Muscæ, postremi è colore qui luteus totus & ceteris rarior muleo nec descriptus. Erueunt hunc Norbonæ æstuosis & aridis sterilibus, declinibus inter Cistum marem & Ilicem Cociferam, atque in herbis Graminibus siluæ vi-

cinis.

Lobel. in Obs. habet iconem multis annis ante à Dodonæo de flor. exhibitam pro Orchide Serapiade tertio, ea omissa est à Lobelio inter icones Plantini: nescimus igitur an Lobelius bene posuerit Dodonæi iconem pro sua Orchide lutea: Dodonæus non tribuit suæ Orchidi florem luteum: An conuenire possit ea quam hic posuimus dubitamus, nos eam cum ceteris iam sculpsimus emimus. Apud Plan. Ic. p. 181. alia icon est non parum diuersa à Dodonæi & nostra cum hac inscriptione: Vulpinus testiculus siue Orchis Myodes lutea Narbonensis congener cum minimo Testiculo Vulpino, floribus muscam colore & effigie præ se ferentibus, Teut. 128. In hoc titulo nos non intelligimus quid luteum dicat, & muscam colore præ se ferre, muscæ enim vulgares non sunt luteæ.

Obseruauit Dalechampius apud Hist. Lugd. in editis montibus Orchiorum genus humile, rarum flore luteo, tribus aut quatuor foliis constans, cetera vulgò cognitis simile, prope oppidum Montpelio vicinum Viganium nominatum, id genus nascitur.

Tabern. Hist. & Icon. Testiculus muscarius, luteus, Geel Stendelmurg. Tabern. imitatus est Lob. assumpsit figuram Dodonæi, an bene iudicent alii.

C. Bauh. Phyt. Orchis 2. muscam referens Lutea Lob. icon. p. 181. Vulpinus Testiculus Myodes luteus Norbonæ.

ORCHIS PARVA AVTVM-nalis lutea.



D Vobis aut tribus foliis Plantaginibus quinque neriis similibus, venosis, glabris, imò caulem complexis, donata est: ipse vero caulis nuncus, pedalis, interdum dimidio minor thyrsus gerit longum fasciculatum pusillorum, ex herbido colore in luteum vergentium, suauis moschi ferè odore fragrantium, è caule

appresso veluti calyce prominentium: bulbis cauli imò adhæret vnicus exiguus, à quo fibræ propagantur quibus vnicus aut alter bulbis pendulus adhæret. Hoc Orchidis genus attulit nobis, non recordamur unde, Gener Cherlerus: Talein Orchidem attulit nobis Guillelmus Vaisant Chirurgus ex Mese in montibus Burgundicæ, franchei montagnes dictis, vbi Burgundicæ passeries vocant: Icon nostra quam iam sculpsimus non malè exprimere videtur: nos existimamus hanc depictam apud Lobelium Obs. & Icon. l. 1. p. 137. Teut. 122.

An Clus. Pann. Orchis pusilla, pallida, odorata:
& Hist. post. Orchis septima.

Tabern. Ic. & H. Triorchis lutea 1. & 2. Geel
Wagmurg 1. & 2. An Gesner. Hort. Testiculi si-
ne Orchidis species minor bulbo singulari, de
qua prius aiebat, Satyrii species an Orchidis
herba, quæ reperitur bulbo singulari semper si-
milis aliisq; cæteris, sed minor, foliis binis, con-
siderandum: Monorchin dixeris. C. Bauh. Phyt.
Orchis 43. odorata, radice unica, rotunda, Pili
magnitudine, Testiculi species minor bulbo sin-
gulari Gesn. Orchis pusilla pallida odorata
Clus. Orchis 41. Triorchis lutea foliis oblon-
gis & glabris: Triorchis lutea C. Gemmæ Lob.
pag. 94. Obs. & Icon. pag. 137. ubi bina iungatur
figura, ut secunda intelligenda. Orchis 42. Trior-
chis altera lutea. Orchis minor Leodienfis Lob.
Obs. p. 96. & Ic. p. 137. C. Bauhinum tres statuere
plantas constat, unam ex Clusio, duas ex Lobe-
lio, perpendendum quot sint. *Suspiciamus* apud
Lobelium duas icones unius plantæ nec scimus
an Clusii Orchis pallida diuersa sit, quamuis v-
nius tantum bulbi meminerit, uti etiam in iconē
nostra videtur bulbus appictus.

ORCHIS FRISIA HIRSVTA.



Lob. Obs.
& Ic. Plant.
pag. 186. & Hist.
Lugd. Orchis
Frisia littoralis
Gemmæ.

Tabern. Ic.
& Hist. Testicu-
lus luteus, Or-
chis lutea, Geel
Knabenfraut /
quam Lobelius
describit in suis
Obs. & nominat
Orchidem Fri-
siam littoralem,
duo habet folia,
bifolio similia,
paulo minora
quàm Plantago
angustifolia, as-
pera & hirsuta

radice: caulis palmum altus: Flosculi multi ex lu-
teo virides, ut in Hyacintho maiore: radices
duæ paræ rotundæ. Icon est Lobeliana.

C. B. Phyt. Orchis 40. lutea, hirsuto folio. Fri-
sia littoralis Lobelio, ubi duas iungit, ac prima fi-
gura huic conuenit.

*Orchis sive Triorchis lutea altera
nonnihil hirsuta.*

Triorchis lutea altera C. Gemmæ Lob. Obs. &
Hist. Lugd. folio est rotundior & latior quàm
superioris, virentior trifolia, & nonnihil hirsu-
ta: videtur eadem aut congener cum Orchide
Frisia Orientali: quæ gemina inferiora folia Bi-
folia, Plantaginis latifolia angustiora edidit, &
in dodrantali cauliculo herbaceos siue luteo vi-
rentes flosculos in horro D. Brancionis.

ORCHIS SIVE TRIORCHIS LVTEA
tertia oblongioribus radicibus.

Lob. Obs.
pag. 93. Tri-
orchis lutea ter-
tia C. Gemmæ,
oblongioribus
radicibus oliuari-
bus bulbis, Plant.
icon. p. 186. Tri-
orchis lutea ter-
tia Geelrags-
murg 3.
C. Bauh. Phyt.
Orchis 43. siue
Triorchis lutea
radice oblonga,
fibrosa.

ORCHIS SPIRALIS ALBA ODORATA.

Duplici radice nititur bulbosâ, oblongâ, vil-
losâ, ima versus acuminatâ, aliquot fibris
donatâ. E cuius summo folia, vaginato pedicu-
lo vnciali surgunt viridia, pingua, semunciam
lata, vnciam aut amplius longa, dorso crassâ a-
uerla parte, quâ ex atro virentes venulæ, ab imo
ad summum conspiciuntur. Iuxta hæc coliculus
quoque erigitur dodrantalis aut pedalis, teres, fo-
liolis acuminatis ceu vaginis vestitus, eisdem ta-
men vix ac ne vix quidem prominentibus. Flos-
culorum odoratorum thyrsus, albidorum, clavi-
culatimque hærentium ita nutat, ut spirarum in-
star summa versus circumagatur. Hi interna par-
te ex luteo virent, ad latus verd duo foliola can-
dida veluti alæ hærent: Vtriculi succedunt ut in
reliquis ferè Orchidibus, parui puluerulento se-
minio repleti. Thyrsus florum amaricat & iu-
cundi odoris est.

Descriptio

An Trago Satyrium 7. minimum das kleinste

Satyrion /
quod ait pro-
uenire locis
humidis Sep-
tembri. Re-
peruntur,
inquit ille,
bina Satyrii
genera ad-
modum exi-
gua, quorū
flosculi aui-
culas volan-
tes imitatur,
coloris ex vi-
ridi lutei,
Caulis horū
haud temerè
digiti longi-
tudinem ex-
cedunt. Na-
scuntur par-
tim in apri-



HISTORIAE PLANTARVM:

Trag. eis montibus Iunio mense, partim vero Autumno appetente in viginosis campis & pratis. Tragus habet iconem respondentem nostrae Orchidi spicatae albae, in sua descriptione intelligit forte etiam luteam, quamvis non distinguat aut particulatim describat.

Brunt. Tom. 1. Saryrion odoriferum.

Cordus hist. Testiculus candidus odoratus minor. Et supra figuram, Testiculus pumilio Tragi.

Testiculus odoratus Dodon. Gall. vocatur, *Conillon odoriferant*: Belg. *wolriedende Stans* del cruyt & flem *Standel cruyt*. Est hic Dodon. hist. fl. & in fol. Testiculus quincus odoratus huc pumilio nuncupatus, omnium foliis minimus.

Lobel. & Pena Adu. Testiculus odoratus, minimus omnium flosculis, odore Lilii conuallii. Obs. Testiculus odor. Orchis spiralis C. Gemmae. Icon. Pl. pag. 186. Teut. 221. Et Obs. Tetrorchis alba spiralis vel autumnalis C. Gemmae. Testiculi odorati varietas: non aliud à superiore, sed ut plurimum oliuaribus oblongis bulbis donatur. Icon. Plant. pag. 186. Teut. 226.

Orchidem flore albo, odorato vel Spiraalem C. Gemmae ad Camer. hort. misit ex Silecia D. Fridericus Sebizius.

H. L. Testiculus odoratus Dodonzi. Tetrorchis, vel Triorchis alba Gemmae.

Tab. III. Tabern. Icon. & Hist. Testiculus minor, odoratus, flem *wolriedende snabenfraut*, cui folia inter Orchides omnium minima Plantagini nonnihil similia: sed valde angusta & parua, colore viridi, caulis tenuis: flores multi parui, albi bene olentes: floret Augusto & Autumno. Et Triorchis odorata, *Groß wolriedende snabenfraut*. Non erat separanda capite hac Orchis à precedente.

Tab. IV. C. Bauh. Phyt. Orchis 44. Triorchis alba odorata oblonga radice Lob. Orchis 45. Orchis alba odorata minor. Saryrium odoriferum Brunt. Saryrium exiguum & 7. Trago. Testiculus odoratus spicalis minor Lob.

Locus. Editis incultis & aridis locis plurimum reperitur: Augusto aut Septembri flores promit, Dodon. Sabulosis arenis atque squalidis locis Norbonae matitimis & Angliae mediterraneis nascitur, Lob.

Tempus. Autumno ante Vergiliarum occasum in arenosis, siccis & accliuibus pratis interdum etiam humidis floret. Montbelgardi nobis occurrit Augusto & Septembri non longè ab hortoferrarum, Vnde in hortum Ill. E. C. transuli. D. Turnerus Medicus Anglicus dedit nobis collectam Heidelbergae. Circa Basileam ad Byrsch castrum haud ita infrequens.

Vires. Radix Orchidis potissimum odorati cocta in vino & pauco melle sanat vlcera putrida oris, inquit Dodonaeus, qui cur huius facultatis non meminerit in postrema historia nescimus.

ORCHIS RADICE REPENTE.

Descriptio. Vlchram Orchis speciem radice repente misit insignis Medicus D. Doldius, quem sic describit Camer. hort. Orchis minor *flosculis* albis, *foliis* crassis nigris, *radice* repente geniculata, & ubi folia emergunt, apparent pulilla rudimenta tanquam naturae testiculos effingere conatis. Nascitur spontè in opacis siluis, in ramentis arborum, quae longa vetustate emarsuerunt.



Ad horum trassatus durat, sed colorem acquirit magis pallidum, nec tam crassa manent folia.

Camer. hort. & Icon. p. 35. Orchis minor radice repente.

C. B. Phyt. Orchis 46. radice repente Camer.

ORCHIS LILIFOLIVS MINOR Sabuletorum Zelandiae & Barauiz.



Ortu & facie, cespitilique squamarum serie similis Eriophoro Bulbo, fibrillis impactus solo; eminentibus bulbis subviridibus. Cauliculus palmaris, flores non annotati fuere à Guillelmo N. mercatore Barauo, qui hanc descriptionem dedit Teutonice, & prouenire ait iuxta maritimos sabulosos aggeres Hardemo proximos, in silua Tersea vulgo, *Erdenbosch*. Idem sane reor (inquit Lobel. Adu. par. 2. cum nostro nouo Saryrio Zelandico infra scripto, in herbarione olim reperto, elapsa aetate 1603, iuxta aggeres sabulosos Walachiae inter Pyrolam nascente, quod omnes quadam foliorum similitudine ducti, nec non flosculorum herbaceorum (ni labat memoria) & longiusculi seminis fuliginosi inuolucris, Orchidis Littoralis Frisiae, Orchin sabuletorum maritimorum diximus. Radix illi gemina, quandoque cerna, sed raro altera alteri innata, foliaceis albis inuolucris tecta, intus viridis, gustu suavis. Infima fibrillis impacta sabuletis, arida, inutilis & flaccida. Cauliculi binum, ternum vnciarum: folia bina Liliacea duas vncias longa. E regione pagi *Oost-Capel*, id est, sacelli Orientalis, à me vltimum collecta. In Barauis est Charax-Orchidis nouum genus aggerum Zelandiae.

Figura non respondet descriptioni, potissimum quoad radices, quae nihil simile habent cum

cum Orchidibus, in quibus fibræ tenues ex bulbis prodire non solent, sed supra & iuxta bulbos.

Orchis amplissima foliis binis splendens.

Orchis prima amplissimis foliis, quæ à nemine (ut suspicatur Clus.) observata, bina habet folia, Ellebori albi foliis amplitudine non cedentia, aliquot venis à pediculo ad extremum usque folium productis insignita, supernè virentia, infernè dilutiora, prorsus tamen splendens: caulem cubitalem, paucis foliolis siue involucri præditum, pentagonum: flores in summo spicatum coherentes, cuius autem coloris, cuiusve formæ ignorat, cum antequam aperirentur, plantam duntaxat observaverit: radices binas, crassas & parvi Napi modo oblongas, supra quas infimo cauli inhaerent aliquot fibræ satis crassæ.

Solum conspecta est hæc *Orchis* Maio mense anni 1579. in declivitate montis, in quo extructa est arx Ill. V. Balthasaris de Barthyan p. m. Greben nuncupata, inter Drauum & Saum annes, binis ultra Waraidinum miliaribus.

C. Bauhin. Phyt. *Orchis* bifolia latissima.

ORCHIS ALBA CALCARI LONGO.



Hermaphrodica *Orchide* hæc haud temerè dicas, ut quæ Cynosorchis & Serapiades dictas, quod quidem ad radicem formam attinet, medium quiddam obtineat. Radix enim duplici constat bulbo sublongo, pyriformi, productiore demissa fibra, quæ in capite alias plures &

quæ crassas quaquaersum exerit. A qua in imo statim folia insignia prodeunt duo vel tria, lata, plantaginea, minus tamen nervis insignita superna parte, lævia, saturè virentia. Reliqua verò octuplo vel decuplo minora, angustioraque caule nullo ordine decorant pedalem aut sesquipedalem, angulosum, striatum: Cuius summa flores spicatum occupant odoratissimi, albi, Papilionem expansis alis æmulantes, quorum foliorum supremum leviter erectum obtuso mucrone sub se bina in summo, inclinatione quadam cœuntia, herbaceo colore prædita comprehendit: lateralibus duo alarum instar expanduntur: propendet autem longum folium, minus reliquis, album, & fere herbaceum, lingua caninæ exertæ instar, quod, ut in priore similitudine maneat, papilionis corpus referre dixeris: aversa floris parte prominere calcem longissimum, prope floris basin album, cætera viride: unicuique autem pediculo intorto herbidoque appositum est folium acuminatum, sapor foliorum amarus.

Tom. II.

Radicum aqueus insipidus.

De hac Dodon. Hist. fl. & in fol. Testiculus siue *Orchis Serapias*: folia profert duo aut tria, lævia, latiuscula, at Lili foliis multò minora: caulem dodrantalem aut altiore: flores in eo raros, candidos papilionibus expansis alis quodammodò similes &c. Eius icon est bifolia, olim in hist. Gall. lib. 2. cap. 46. ex Fuchio erat trifolia, ac ei dicebatur Testiculus Vulpis: Gall. *Conillon de renard* Germ. *groß Stendelkraut* Belg. *Groot Stendelcruyt*.

Satyrium Trifolium Græcis, *Satyrium trifolium* Latinis, Officinis nostris (inquit Fuch.) inognitum aut inusitatum: vulgò Testiculus Vulpis aut sacerdotis. Germ. *Stendelmurz*: Gall. *Satyrium à trois feuilles*, nominatur. *Satyrio* autem nomen fecerunt *Satyri*, qui primi sylvestres dii colludentes nymphis, per sylvas & antra ad firmiorem Veneream herbam hanc inuenerunt. Trifolium verò, quoniam tria fert folia ad terrâ versa. Folia tria fert Rumici aut Lilio similia, minora tamen & rubentia. Caulem nudum, longum, cubitalem. Florem Lilio similem, album. Radicem bulbo similem, mali modo extuberantem, foris rufam, intus oui modo albam, gustu dulcè, & origratam. Quod verò hic dicitur Lilio similem: non sic intelligendum venit quasi quantitati & tota figura Lilio similis flos sit, quando eidentissimum sit Liliū quantitate sua *Satyrii* florem multis modis superare. Denique nec figura etiam per omnia respondet: quare hæc similitudo ad colorem & floris essentiam referri potius debet, quæ planè eadem est cum Lili colore & essentia, id quod conferenti hos duos flores manifestum fiet. Icon. pag. 408. *Satyrium trifolium* reiß *Stendelmurz*. Fuchius non describit plantam cuius iconem exhibet, sed detorquendo accommodare conatur descriptionem Dioscor. suæ iconi, quam hic ponimus trifoliam, ut eam sculptam eminus, quod ei non commune.

Matthioli in Dioscor. cum magnis Icon. Lat. l. 3. cap. 126. picturam solam habet suæ descriptione sub Testiculi specie tertia. In Ital. cap. 137. Et appingit tantum duo folia: sub eo tamen titulo in eadem tabella icones duarum plantarum.

Dicitur Lobel. Obs. Testiculus Vulpinus primus Anglis heros Ballokes. Hist. *Satyrium*. Icon. Plantar. pag. 178. Testiculus vulpinus primus cuius flores culices exprimunt. Lobelius in sua iconè duo tantum habet folia: is præterea aliam habet iconem parum differentem nomine *Orchis Hermaphrodica* de qua mox: considerandum in quibus differat.

Hist. Lugd. Testiculi tertiæ species Matthioli in ea tabella ex Matthiolo dux icones diversarum plantarum, præterea Hist. Lugd. ponit eiusdem plantæ iconem alteram sub hoc titulo: *Orchis Serapias* primus Dodonæi: ponit & tertiam trifoliam, cum hac inscriptione: Testiculus vulpis Dodonæi, tres igitur icones vnius plantæ sub diversis ponit titulis.

An Thal. Hæc *Orchis* bifolia, flore purpureo & candido etiam in montibus passim ac prætis. Triplici autem differentia reperitur. Altera latifolia est, foliis orbicularibus fere, vnciarum sex longitudine, quatuor latitudine: tertia breviora omnia continet.

Camer. horti. *Orchis* bifolius, qui nonnunquam trifolius nascitur, unde Fuch. Dioscoridis *Satyrium* esse placuit.

Tabern. Icon. pag. 667. & Hist. lib. 1. pag. 394. Testiculus Vulpinus latifolius, Fuchs. Hb. Klein. flos

Tee

genblumen / Item Icon. p. 674. Hist. 35. Sary-
rium trifolium, Bod-seyl.

Tabern. in iconibus & hist. sui immemor
quatuor diuersas tradit huius icones: ac Com-
mentum videtur quod lc. pag. 574. & hist. 355. ha-
beretur sub hoc titulo, Satyrium Triphylū Bren-
delmorig.

C. S. 100.

C. Bauh. Phyt. Orchis Serapias 19. bifolia minor flore Papilionem referens. Satyrium trifolium Fuchsi. Testiculus vulpinus primus Lob. variat, communiter quidem est candido: reperitur & purpureo. Huius binæ icones apud Tab. nomine Testiculi Vulpini latifolii & Triorchis maioris. Nos in hoc genere purpureo flore non observauimus, nescimus etiam cur C. Bauhinus Orchidem 19. iam dictam à 21. separarit, de ea scribit: Orchis trifolia maior. Satyrium trifolium Fuchsi: Huius duæ icones apud Tabern. Satyri Triphylli nomine & sub Triorchis trifolia: inter hanc & Orchidem bifoliam minorem, parua nisi ratione numeri foliorum differentia.

**Locus &
Tempus.**

Non longe Montbelgardo cundo Hericuriam.
Obseruauimus praeterea variis in locis, nomina-
tim in valle montium aridorum dicta Griefbach,
ubi florebat & Iunio odoratissima.



tantum oblongas
partes dividitur.

Est nobis nesci-
mus vnde Orchid-
dis genus caule
palmari & pedali,
cui radices qua-
tuor crassæ vncie-
les, & sesquiuncia-
les, folia plura, vni-
cias tres longa
angusta, in acu-
tum desinentia.
flos parui, spicati,
sub singulis folio-
la longiuscula.

ORCHIS HERMAPHRO-
ditica bifolia.



Orchis Hermaphrodica secunda C. Gemmæ, Lobel. Obs. siue Orchis Psychodes (id est flore Papilionis) diphylla: oblongis cruribus, solo gaudet palustri: flos e-rumpit mense Iulio, omnino candidus, tener, qualis Oreadum. Icon. Pl. p. 178. Sphecodes: fortè legendum Psychodes Teut. 216. Quantum & in quibus hæc

Hist. Lugd. Orchis Hermaphroditica Gemma,
sive Orchis Pycnoides diphylla.

Tab. no. 1.

Tabern.icon. & Hist. Testiculos vulpinus 4.
hermaphroditicus, fruchtshödlin. Non placet
Compil.non subiungere hunc Testiculum Tes-
ticulo Vulpino latifolio suo. C.B. Phyt.Orchis
20.bifolia minor altera, vel Hermaphrodita.

ORCHIDIS GENVS QVIBVSDAM

Satyrion castratum. Item aliud
genus cum quatuor radicibus.

L Ob. Obs. p. 97. Satyrion castratum vel Eunu-
chum ex genere Cynosorchios C. Gemmæ. lc.
Pl. p. 192. Teut. 115.

Hist. Lugd. Satyrium castratum Gemma.

Tab. Ic. & Hist. Testiculus sextus, Castratus.

C. Bauh. Phyt. Sacyrium 15. cuius radix in dua



Icon. Plantarum
p. 178. posita Ico
cum hac inferi-
ptione , Culices
triphyllæ Teur.
217. Cesp. Bauh.
Phyt. Orchus 22.
trifolia minor,
Culices minores
triphyllæ Lobel.
Icon. 179. Vide
descriptionem in
hist. Belgica Lo-
belii.

ORCHIS BATRACHITES.



Lobel. Obs.
Orchis Ba-
trachites vel
Batrachoides
C. Gemmar. Lo-
bel. Obs. Belg.
vorffens. R. Ra-
nula à floris fi-
gura : Ex eorū
genere quæ se-
xus ambigu-
sunt, ut & Her-
maphroditicū
Testiculum nō
malè appelles
Sunt enim me-
dia inter Scra-
piades & Cy-
norchis,
maximè quoad
formā radicū.
Hist.

Hist. Lugd. Orchis batrachoides Gemmæ.

Tab. Ic. & Hist. Orchis batrachoides freschblumlich Geylburg.

Casp. Bauhin. Orchis 37. siue Hermaphrodica.

Buzeiden siue Buzeidam Arabum.

Ait Auic. Buzeidem esse medicinam ligneam Indam, in qua sit virtus similis virtuti Beem. Et Serapio, Buzeiden, inquit, est species Satyrionis. Salomon Ebēhasem. Buzeiden sunt radices duræ, albæ, similes behen albo, confert podagræ, & doloribus iuncturarum. Et est medicina Indiarum, quæ nos parum vitimur. Quidam verò deulere eam ad nos, & vidimus eam sæpe. Aben Melu-ai] Melius quod est ex buzeiden, est album, habens lignum grossum, & multas rugas. Illud verò quod est subtilis ligni, habens superficiem lenem, parum albedinis, est non bonum, nullius iuuamenti. Habix dixit sicut iste. Et dixit tum hoc, quod iuuamentum eius est sicut iuuamentum hermodactylorum, ad remouendos dolores iuncturarum, & ad conferendum podagræ. Mesarugiz. Buzeiden est calidum, auge in spermate. Et de proprietate eius est, quod laxat aquam citrinam. Sed illud est malum testiculis. Et rectificatio eius est cum Sinapi, & melius ex eo est nouum. Et dosi eius, pondus est drachmarum duarum.

Digit Citrini Arabum.

Asahafra siue Digit Citrini sunt, autore Auic. figuræ volæ manus colore mixto ex citrinitate & albedine duri & nonnihil dulces, quidam sunt citrini & puluerulenti absque albedine. Digit crocei, ut exemplaria habent, sunt gummi seu vena tinctorum: Rhais.

PAMATA SATYRIA IN GENERE.

CAP. XXVI.

Satyrium Canis. Græcis. Satyrium regium Latinis. Offic. Palma Christi. Arab. *Buchiden*: Auic. Digit Citrini. Germ. *Creuzblumen*. Gall. *Satyrium royal*. Palmam Christi propter similitudinem quam eius radix cum humana habet manu dixerunt. Verum Satyrium, inquit Matthioli, hætenus in Italia videre non licuit. Palmæ Christi radices, Auicenna Digitos Citrinos nuncupat, et si eas Digitos citrinos esse perperam, nullaque, quod libro suo legerim, ratione ducti, negent Monachi illi.

Fuchsius Palmam Christi non rectè inter Satyrii genera depinxit, siquidem ea potius meo iudicio inter Canis testiculos erat representanda.

Palmis duabus Christi adibus & Serapiadibus (aiunt Lobel. & Pena Adu.) accenset Tiorchum Serapiada Aegineta (addere enim tertiam quandam videtur,) terno donatam didymo, quam alias Palmam Christi opinabantur: cum quia succulenta minus, siccioreque est, & vehementer deterget, intro forisque viceribus adnota: tum etiam quod Melancholicis, Quaternariis, Epilepticis, neruorum obstaculo, & pituitosa saburra oppressis miram præstet opem, fluxum dysentericū sistat, quot qualisque facultates Palmæ Christi Recentiores vendicant, [ne cuiquam imponat

Tom. II.

Palmæ Christi vehementer purgantis homonymia,] dignandas sanè Aegyptiis Venerandæ Serapiadis deæ Augusto cognominæ: alioquin nihil attinuit à cæteris secreuisse, & Serapiadas nuncupasse. Rationibus hisce fauebat ex lectione coniectura, nam ubi *παύχην*: multi vsus, legendum *παύχην* multitudine radicem: & fortè vtrumque, multitudine multique vsus radicem innuebat, & mox inferius ubi Dioscor. *ῥίζα 3 ὅμοια ἐπ' ἑαυτῇ* id est, Radix subest testicellis similis, aut pusillis testiculis, legebam multitudine leuiore metathesi multo, quam in superiore capite, ubi pro Olea suffecerunt merito quidam Squillæ teneram Pancratium. Verum tamen si cui hæc minùs allubescant Serapiades, exploret superiorum Orchium facultates, quæ multo tamen ignauiores & mucore elumbes magis videntur, aut alias aptiores adducat, & lubenter vtrò indicas istas Palmatas Antiquis profitebimur. Heribidos pratensisque colles frigidiores amant tum minor tum maior, legimus etiam in Alpibus Rauisburgi & Nozoreti Germaniæ. Maio flore & foliis exit: maior foliis similibus, sed latioribus Porri, mucronatis, ad terram reflexis, crassis, interdum maculatis fuscis, & nigricantibus notulis: flores purpurascens Cynolorchis adeo similes sunt, ut nisi propius spectes easdem putes. Radici item geminus est bulbus, altero enanido, altero prægnante & succulento. vtroque tamè oblongiore, nonnihil compresso, & ima sui parte in fibras inæquales ternas aut quaternas veluti digitatas abeunte. Hunc marem appellant. Fœmina verò floribus candidis, vel e purpura rubetibus, diluteque caeruleis, cuculatis, crebriores maculas purpureas & rictum ostendentes habentibus: foliis minoribus, & inspersis punctulis: radice consimili. Sunt ut hist. Lugd. notat, qui vocant Palmam Christi Buzeiden, siue Buzeidam Arabum. Satyrii autem huiusce radices nihil minùs quam ligneæ sunt, nec ex India petuntur, ut voluerunt Auicenna & Serapio. Matthioli Satyrium Basilicum siue Palmam Christi Auicennæ Digitos Citrinos esse vult: At Satyrionis Basilici radices duræ non sunt neque croceæ, neque ad tingendum viles. Quare id à Digitis citrinis Auic. & Rhais perspicue differre videtur.

Thalys Hæcyn. pag. 112. Satyrium recentiorum Græcorum iuxta Dodonæum mas, alias Palma Christi: Serapias mas Anglis, Orchis autem fœmina Tragi. Atqui Satyrii huius maris cuius videlicet folia maculis destituuntur, diuersa aliquot differentia in Hæcynia occurrunt, quæ sub duobus præcipue generibus comprehendi poterunt, quorum alterum sit latifolium, alterum angustifolium: quorum etiam vltiorem tradit distributorem.

Orchis Serapias Lobelii Camerario horti, seu Satyrium basilicum aliorum, flore candido, dilute rubescens & rubello. Ex his tertium folia interdum maculis cruentis aspersa gerit, interdum (An Plantini icon. pag. 188. Palma Christi mas) sine maculis. Priora verò duo maculis in horto meo nunquam carent, nescio an alibi etiam.

Satyrium Basilicum mas & fœmina amarum est, referente Fuchio, magis tamen amarum quod maculosis constat foliis. Ideoque non perperam censent Auicenna & alii quidam ex recentioribus medicis, qui calidum esse & siccum in secundo ordine tradunt. Vsus eius ad erogandam cutem, ad neruorum dolores, & contra noxia medicamenta. Fertur & anuletum esse radix gustata. Semen ex vino sumptum nouem diebus, co-

Tii 2

*Serapia-
des
Orchis
facultates*

*Palma
mas.*

*Palma fœ-
mina.*

*Non sunt
Buzeidam*

HISTORIAE PLANTARVM

...a tuberosis, striatis, angulorum: florum pedi-
culis appositum folium purpurascens.

In hoc genere duplex florum varietas reperitur præterea dictam: vni enim labellum albi-
cat, rix tantillum purpurei habens, purpura fu-
gente punctatum, per reliqua cum iam descrip-
ta conueniens: alteri flori totus cum calcar al-
bet, nonnihil ad luteum inclinans: alas cum su-
perposito folio strias virides præferunt; folium
quoque floris pediculo appositum virefcit. Hæc
Orchis multam ludii magnitudinem & colore.

Orchis s. e.
rapas
Triorchis
mas.

Fuchf. Hist. *Orchis mas* aut *Orchis rapas*, Paulo &
Aetio testibus, Græcis dicitur: *Serapias* Latinis:
Germ. *Nagwürtz*; Gall. *Satirion à trois couillons*.
Triorchis Serapias mas. Triorchis manifesto
ex ea appellatione argumento, quod non duabus,
sed tribus testicularis radicibus in terra nitatur.

Fuchf. mas.

Quo facile à prioribus discriminatur Orchidi-
bus. Item Ic. Triorchis mas minor. Fuchfius
ponit descriptionem Diosc. pro sua, non demon-
strans esse Diosc. quod non parum displicet. Si
Orchis de qua hic agimus reperitur cum tribus
bulbulis siue testiculis, id evenit propter iunio-
rem plantam adiunctam & primam provenientem.

Dodon. re-
prob.

Displicet & Dodon. qui in hist. Gall. huius Or-
chidi, in sua descriptione tribuit tres bulbos, li-
cet non viderit, quod patet ex lib. eius florum &
postrema historia, ubi scribit in nulla Orchide non
contigisse plures videre quam duos bulbos.

Math. in Diosc. quarto loco Testiculi species:
In epit. pro tertio sine descriptione. In histor.
Germ. pro secundo.

Poterit considerari icon Cynosorchis morio-
nis femina Dodon. & Lobelij de qua ante: quæ
videtur exprimere Orchidem de qua hoc loco a-
gimus, multa respondent, eadem est etiam in
Hist. Lugd. ut ante dictum.

An Tabern. Icon. & Hist. Cynosorchis morio-
nis femina: Hæc postrema Cy-
nosorchis habet folia lanata, angusta, striata, simi-
lia angustæ Plantagini. Flores valde expansi, re-
tro pædet veluti corniculum: eis foliola quedam
auriculis Morionis similia. Icon Tabern. eadem
est cum icone Cynosorchis Morionis femina
Lobelii in Obs. & Icon. Plant. de qua ante pro-
ximo titulo egimus.

Tabern. icon & hist. Triorchis mas minor
Blein Nagwürtz Mannlein Icon modo dicta
est ex Fuchfianis, qualis nostra, eiusdem descrip-
tionem non ponit, & non bene separat capite pro-
prio ab aliis Orchidibus: nullam ponit descrip-
tionem conuenientem.

An Clus. in Pann. & hist. post. hanc tradit, cum
scribit: Orchis colore vario, siue quinta, qua-
tuor aut plura habet folia, summâ tellure iacen-
tia, Belgicæ Orchidis quæ passim in pratis matu-
re purpureum florem fert, similia, sed nullis ma-
culis aspersa: caulem palmarem, aliquot mino-
ribus foliis septum: cuius summum, multi flores,
exigua galea duobus foliolis constans, tribusque
aliis foliolis galeam ambiens, latiore barba
propendente, & obtusiore calcar præditi, & in
spicam nascentes exornant, coloris aut purpu-
rei Saturatoris, aut dilutionis, aut ferè carnei,
atque etiam omnino albi, barba tamen plerum-
que vel exiguis, vel maioribus maculis saturæ pur-
purascensibus aspersa, interdum etiam prorsus
nullis, præsertim in lacteis floribus: semen ut in
reliquis contortis vasculis continetur: gemmas
radices, vnam superioris anni flaccidiorem, al-
teram recentiore, succulentam, regunt mul-

ta candidæ crassiusculæ fibræ. Inueniuntur pas-
sim in pratis Viennæ vicinis.

Clubus pro sua Orchide quinta, ponit iconem
Testiculi morionis maris Dodon. Hist. fl. & po-
stremæ, siue Lob. Obs. & Ic. Pl. Cynosorchidis
morionis cui folia maculata: Considerandum
an sit eadem cum nostra purpurea minore, cui
ale virentes, quamvis C. Bauh. separat.

G. Bauh. Phyt. Testiculus 9. morionis foliis ses-
silibus non maculatis. Orchis colore vario Clu-
sii. Testiculus 9. morionis femina Matthiolo
Icon. p. 559. Testiculi species tertia Lob. Cyno-
sorchis morio femina.

Hunc Orchin minorem cum precedenti ma-
iore obseruauimus florentem ex primis Aprili in
pratis humidis circa Montbelgardum: & propè
Moruillars flore albo & caruleo & albido, hos
etiam florentes Maio circa Montbelgardum
transuli in hortum Ill. E. C. Est ex primis specie-
bus Orchis vere florentibus; ac cum magno
toto purpureo floret: Genæ quoque obserua-
uimus.

Locus &
Tempus.

ORCHIS SIVE CYNOSORCHIS tertius Dodon. Lobel. maior alter.

NOs iconem quam hic ponimus cum aliis
sculptam emimus: de qua Fuchf. icon. p. 118.
Orchis femina angustifolia, *Schmal Knaben-
frant*. In hist. Orchis femina maior, ut pictu-
ra satis demonstrat. Fuchfius iconem ponit ter-
tio loco, sine
vlla descriptio-
ne, non demo-
strans quæ in re
ab aliis diffe-
rat.



Dodon. Gall.
Orchis tertius
genus, premier
caillon de chene
femelle, magna
& lata habet
folia, latiorum
foliis pene si-
millia flores ca-
rulei [perfer:]
radices rotun-
dæ & sublongæ
forma Ono-
rum animum su-
perior rotunda
& separata, infe-
rior nonnihil

longior & crassior, utraque saporis valde dulcis.
Dodonæus iconem Fuchfianam habet in sua hist.
Gall. Quo nomine tradat in hist. fl. c. 61. asserere
non audeamus, nullam ibi figuram habet, conside-
randum an describat his. Tertia Cynosorchis
species folia edit angusta, &c. Dodonæus in fol.
eandem historiam habet & iconem quam inscri-
psit Cynosorchis tertius. Hæc autem Icon est
apud Lobel. Obs. p. 89. cum hac inscriptione Se-
raplas Diosc. secunda C. Gemma, &c. Icon postea
Dodon. & Lobelii tantam habet similitudinem
cum Cynosorchide maiore Lobelii & priore Do-
don. in post. hist. ut insigne aliquod discrimen sta-
tuere non possimus.

Hist. Lugd. Serapias Diosc. 2. Gemma. Or-
chis Babilica altera, Cynosorchis altera maior
Lob.

Hist.

Tabern. Icon. & Hist. Cynorchis maior 4. *Groß knabenkraut*. Icon Tab. est eadem quæ Lobelii & Dodonzi in post. hist. sed sine descriptione:

C. B. Phyt. Cynorchis i. latifolia floribus purpureis intus albicantibus.

ORCHIS MAIOR TOTA PURPUREA
maculoso folio.



Orchis maior tota purpurea folio maculoso, qua in te differat de-
pris maculis nigris in foliis considerandum ab ea quam maiorem totam purpuream non maculatam diximus: dicitur Fuchf. Icon. & hist. Orchis mas angustifolia, Schmal knabenkraut Menne / Alterum genus angustioribus foliis quam

Orchis mas latifolia, & maculosis magis, floribusque purpureis constat.

An Trago Cynorchis mas, Testiculus quartus dudum generum, de quo paulo ante scriptum, alius roseo candidus.

Math. Testiculi penultima figura ex Fuchfio sine descriptione. Figuræ tamen ex Piantino melius placent quam Fuchfii quas hic habemus.

Hist. Lugd. Iconem habet ex Matthiolo cum hac inscriptione, Testiculus morionis mas Dodonzi, ibidem descriptio ex Dod. de floribus: additque, Orchis secundum genus facit Dod. Mart. Testiculum quartum.

Apud Dodon. Gall. Icon Fuchfiana: Orchis secundum genus primo (sive ei cui galea & alæ ferè cinerea) nonnihil simile, foliis tamen angustioribus, tenerioribus, cum maculis nigricantibus: Flores modò cærulei obscuri (*pers obscuri*) modò nivescendoris, Radices oliuarum modo rotundæ: una noua & plena, altera fungosa rugosa & flaccida. Idem hist. fl. & in fol. Testiculus Morionis mas, cui folia sunt quinque, aut sex, longa, lata, læuia, Lili foliis similia, quædam minora, superius maculis aliquot subnigricantibus signata: quorum vnum & subinde alterum caulem quoque circumplectitur: caulis dodrantalis: flores in spica purpurei, circa umbilicum albidiores, odorati, & aspectu grati, posterius corniculum habent propendens, simile ferè corniculo Regii floris: antèrè cucullum auriculatū & cristatum Morionis referunt. Nam cuculli cuiusdam & patetis galeæ modo flosculus hiat, & angusta foliola, quæ à lateribus surgunt, auriculas: quod verò e medio attollitur, cristam refert: radices gemini sunt globuli nucleo Nucis Myristicæ similes, supra quos fibræ exeunt. Si Dodon. eandem quam nos intelligit, considerandum an icon bene respondeat.

Tom. II.

Tab. Hist. & Ic. Cynorchis maculata *Marienreber Mänlein*. Cynorchis morio mas, *Gesprenge knabenkraut*: Quintæ speciei folia sunt crassa & lata, multis maculis aspersa. Flores prioribus similes, coloris nonnihil viridis, huic similis sexta foliis maculatis: quæ maculæ sunt ex nigro virètes, flores albi & purpurei grati odoris, similes capitulis Stultorum. Icon prior Tabern. accedit ad iconem Matthioli, secunda ad iconem Dodonzi: quas autem plantas intelligat non asserimus adhuc.

C. B. Phyt. Testiculus 4. morionis mas foliis maculatis.

Orchis satidissima Clusio.

Similem quintæ (Orchidi colore vario) observabam [inquit Clusius in Pannon. & Hist. post.] in pratis vbi Londinensi in anglia proximis, vbi etiam eruebat in grandiore paulo florum purpureorum spica terribili foetoris.

Casp. Bauh. Phyt. Orchis 13. scorditissima Clusii.

ORCHIDIS GENVS PARVVM FLORES
prorsus purpureo odoris suauissimi.



Quintum Testiculi, genus Trago bipartitum est, verumque folio vestitum Lilio simili: flore emicans purpureo proflus, nec enim illas ostendit lituras, eoque instat frumentorum in spicatu desinente cacumen: quod in hoc genere minimum existit suauissimo commendatur odore, & ad Gariophyllæam accedente.

Gariophyllæam accedente.

Nascitur verumque in asperis plerumque montibus subter Iuniperos, terra forti & alba gaudens. Orchis quinta odorata, *Das 5. wirtschend Margendrehen*.

Tragus propriam huius habet iconem: considerandum an icon nostra ex emptitiis pro ea poni possit, vel an aliquam potius denotet Orchidem.

Perpendendum etiam an à Clusio in post. hist. sic tradatur: Orchidis genus elegantissimum siue tertium binis crassis bulbis præditum, vno succi pleno, altero flaccidiore, quod in Orchidibus vulgare est: foliis longis, angustis: caule interdum pedali, spica florum eleganter, odorata, quorum galeola obscura purpurea niter, hiatus cum propendente labro candicante, purpureisque maculis insigniuntur. Inuenitur in pratis Nemeth-vyyvar Dn. de Barthyian vicinis, supra Rabam & inter flumina Muram & Drauum.

C. Bahin. Phyt. Orchis decimaquinta obscura purpurea.

§§.

ORCHIS MINOR FOLIS TENUIORIBUS reflexis flore puniceo.

Orchidis minor species Thalii, foliis est tenuioribus in terrâ reflexis, quinis, senis, septenisve: caulibus breui, digitali, quandoque dodrantali, tenui, speciei breuior florum puniceantium pauciorum. Nascitur locis apricis circa Gerentodam.

ORCHIS PARVO FLORE RVBRO
sive phœniceo.

Descrip.

Iconis su-
pra pifia.

Orchis hæc Opalmo maior foliis pluribus non magnis, multum amplexatibus: floribus veluti in spica sexunciali longa, & penè vnciali lata, parvis, rubris, & penè vnius coloris: an forte Testiculus morio tertius Dodonæi.

Icon quam posuimus est ex iis quas enim, quæ aliquatenus exprimit nostram plantam.

Considerandum an de hac scribat Clus. H. post. Orchis 2. cui folia sunt plura, quam latissimæ alteri, angustiora: caulis gracilior, pedalis, flores rubri pulcherrimi, quales ferè in Belgico illo Orchidis genere videre memini, quod è pratis Louanio vicinis erubatur. Crescit in eodem iugo Greben pone arcem, & plerisque gramineis locis, inter flumina Muram & Drau, tum apud Sackturnya Ill. Comitibus de Zrinio arcè. Tradidit autè hanc prius iisdem planè verbis in Pannon. sub hoc titulo; Orchis flore rubro elegantissimo.

C.B. Phyt. Orchis 19. flore rubro elegantissimo rubro. Montbelg. mense Iunio florètem vidi.

TRAGORCHIS MINOR FLORE
fuliginoso.

L. Ob. obs. p. 96. L. & c. Pl. p. 77. Tragorchis minor & verior C. Gemma, siue Coriophora flore instar cimicû: Flore est fuliginoso, figura, color & odor Cimicis, foliis non absimile minori Delphinio Satyriscis: gaudet irriguis: floret cum Delphiniis. H. Lugd. Tragorchis minor & verior Gemma.

C.B. Phyt. Test. 16. siue hircinus minor.

Tab. Ic. Testiculus hircinus 3. minor, Flein Boche bddle. Icon quam his posuimus an respondere possit Tragorchis minori considerandum.

ORCHIS BATAVICA



Dodrantali asurgit caule, quem terna aut quaterna ambiunt angusta folia: summus caulis sustinet breuiorè spicam florum elegantis interius rubri coloris: trifido labro propendente.

Orchis 6. siue Batavica (Clus. Pann. & H. post.) ingrati odoris est, quam nò ineptè Tragorchis minorem nuncupari posse censeo Io. Hogheladius.

Rara inuentu crescit in marinis aggeribus, interdum etiam reperitur circa Hagam Hollandiæ. In hortos autem translata, latius explicat florum comam, in metæ quasi formam definientem.

ICONES ORCHIDVM QVARVMDAM.



Icones propositæ, sunt ex iis quas sculpras emimus, considerandum an sint plantarum diuersarum à iam traditis: insignis enim varietas est Orchidû. Sunt nobis sanè aliquot Orchidæ differētes, quas accepim⁹, Argentina à Dq. Vldario Chelio insigni Medico ex plantis ut existimamus Dj. Aggerii stirpium diligentissimi investigatoris, ac ab aliis, quas describere nunc non valeamus, nec pingere lubet, quia nihil certi proponere possumus, ac ignoramus ubi collectæ, & an sint iam descriptæ.

ORCHIS

**ORCHIS MINOR ANGVSTIFOLIVS IN
suprema parte longis foliis.**



Testiculi 16.
minoris
(Klein Enabens-
wurz) Tabern.
more solito nul-
lam exhibet de-
scriptionem. Si
icon ad plantam
facta, notabile
est Orchis ge-
nus, in eo diffe-
rens à cæteris,
quod folia supe-
riora iuxta flo-
res sunt longa,
cetera alijs sunt
breuia.

C.B. Phyt. Or-
chis 29. Tab. 16.
minor.

**ORCHIS PARVIS FLORIBVS, MVLTIS
punctis notatis, An Clusio Orchis
Pann. 4.**



Berorum al-
terio oliuari,
altero rotundiori
fibræ adnascun-
tur ut in cæteris:
caulis sesquipal-
maris & dodran-
talis, cui circue-
cta folia quina
septenæque, ses-
quiunciali lati-
tudine, longitu-
dine palmari,
quorum aliqua
repanda, alia
caulem inuol-
uunt: flores in spi-
cam satis breuē
confectim dige-
sti, ferrugineum
conum in fasti-
gio caulis ante-

quam explicentur æmulantes, odore melleo: flo-
res singulares exigui, calcari herbido breuissimo,
galea ferruginea, alis vel totis herbidis, vel ex di-
midio purpurantibus, intus rubro punctatis: la-
bellum simile quodammodo animalculo quadru-
pedi tripartito vel quadripartito, alato, foris pe-
nitius albicante, intus creberrimis punctis sarura-
tè purpureis notato: apicibus in rictu luteis.

An Trago, Tertium peculiare quoddam Sa-
tyrii genus, caulem proferens teretem & mollē:
folia Lilio similia: radices gemellæ & rotundæ,
exiguæ, flore copioso, ac racemū instar coacto, fo-
ris spadiceo, intus verò candido & minutissimis
maculis asperso plenum. Gaudet humo argilloso
nasciturque tam in pratis quàm montibus. Pro-
inde Iunio mense florere incipit.

Nos iconem Fuchianam proponimus [quæ
non placet] de qua ille Icon. p. 320. Orchis angu-
stifolia femina tertia; Schmal Enabentrans

weible das britt. Verùm quàm Orchidem in-
tellexit Fuchsius proposita iconē perquirendum;
quandoquidem nihil annotauit præter nomina.

Dodon. in hist. Gall. Iconem Fuchsi habet sub
hoc titulo Orchios quintum genus, *le tiers conil-
lon de chien femelle*: Valde simile est folijs se-
cundo (quod vocamus Orchin purpuream maio-
rem maculatam), flores parui, simul conglome-
rati, externè coloris Castaneæ, internè albi,
plurimis maculis notati: radices duæ similes du-
bus Nucibus longis & rotundis, vna maior al-
tera.

Dodon. in Hist. fl. & in fol. omisit hanc histo-
riam & iconem, quasi de planta incognita & quæ
non exararet olim scripsisset.

Clas. Pann. & Hist. post. sic describere videtur:
Quina aut sena sunt Orchidi quatuor folia: (spica
elegantium pusillorum florum purpurascēte ga-
lea rectorum, prominulo labro & in quatuor bar-
bularum diuiso, albo, purpureis punctis distincto)
parue calcari à tergo prominente, tenuis odoris;
sub quo, vñ in reliquis Orchidibus rotosum &
contortum est capitulum exiguum semen scobis
instar continens: geminas radices habet testicu-
lorum modo efformatas, vnam plenam, alteram
marcidam, supra quas ex imo caule ortæ fibræ ex-
panduntur. Nascitur ad montis Glesentfeld im-
minentis radices, binis supra Neapolim Austriæ
miliaribus, abundantius tamen in montium te-
nuis gramine sectorum decliuitatibus, supra Ra-
daun, Medeling, Baden, & plerisque alijs editio-
ribus siccioribusque locis Viennæ vicinis. Illi si-
mitem eruebam montibus Greben proximis, sed
longè ampliorem, crassiorēque & longiore spica
præditam.

Icon quæ proponitur ab Hist. L. sub Orchide
quinta Dodonæ exhibitæ est à Dodonæo vti di-
ctum, & Fuchsi. Verùm an ei conueniat descri-
ptio appositæ ex libro florum pro Tertia Cyno-
orchidis specie, considerandum: quia Dodonæus
in fol. pro ea longè aliam iconem proponit, nec
scimus an descriptio ex libro florum Dodon. ei i-
coni quam nos etiam habemus respondeat.

An Camer. hort. Orchis minor. Cynosorchis. Locu.
tempus.

Testiculus canis minor flore guttato sanguineo.
Circa Montbelg. abundat ac florere Maio: Ge-
neue Obseruauit florentem Maio: Frater Casp.
misit collectam in pratis propè Dornacum.

ORCHIS ROTVNDVS DALECHAMPI.



Et nobis im-
petas nostras siccas Descriptio
Orchis rotun-
dus Dalecham-
pii cognomi-
natus: quem
Hist. Lugd. sic
describit: radi-
ce constat ge-
mina, testicu-
lis simili, car-
nosa, supernè
fibrata: caule
vnicò, cubitali;
rotundo: folijs
ad summum
tribus vel qua-
tuor, latis, ve-
nosis, pallidis.
Arundinis in-
Sff 4

Sub Dodon. Matth. Testiculus secundus. Sub dicto titulo Hist. Lugd. est icon & ex Fuchio. Est & alia eiusdem plantae sub titulo, Orchidis 2. species, est & Orchis Spherodes Gemma.

Tabern. Icon. & Hist. Testiculus 7. Sphegodes Stendelmurg. Testiculus vulpinus 2. fuchiohodes. In descript. 3. Folia quinque aut sex striata latiuscula, Plantagini angustifoliae nonnihil similia, quaedam reflexa, caulibus palmatis, cum floribus quinque vel sex, qui foliis aliquot constar, in quibus partes inferiores habent aliquid nigri, quod refert imperfectam apicem. Non placet Compilatore ponere Testiculum modò ab eo descriptum, capite diverso à Sphegode, quem non descripsit: si enim hic non idem, saltem erit valde similis. Huc etiam referendam censem inceptam figuram cum flore quadripartito sine descriptione Tabernae iconum & Hist. cui titulus Triorchis foemina, Ragwur 3. weiblein.

Casp. Bauhin. Phyt. Orchis 23. Fucum referens maio, foliolis superioribus candidis & purpureis.

Montbelgardi abundat florens Maio, etiam in botto Ill. E. C.

ORCHIS MELITTIAS.



Ob. Obf. & Icon. Plant. pag. 180. Orchis Melittias, siue Apis cadauerulum exprimens Belg. Bienn Teut. 217.

Hist. Lugd. Orchis Melittias Gemma, quae videtur referre Orchin Serapias Dod. in Hist. stirp. Gall.

Tab. Hist. & Icon. Orchis Melittias, Bieblumid Gyltours.

Casp. Bauh. Orchis 24. Fucum referens minor foliolis subuidentibus: vel Orchis apem referens. Orchis 6. & Satyrium alterum Diosc. Trago: Orchis Melittias Lobelio.

Orchidis tertiae Tragi meminibus nomini Orchidis Fucifloris, ubi eius descriptionem proposuimus, consideretur an & icon: perpendendum etiam an nostrae icon ex empiriis est referenda, vel eadem cum precedenti ad strigosem plantam minus concinne pictam.

ORCHIS SIVE TESTICVLVS SPHEGODES hirsuto flore.


Alasque expandit virentes, tristiorique & obsoletiore fuliginoso colore fucum potius aut vesperam quam apem praefert: folium infimum hirsutum, quod pro labello est, in quo non lutearum linearum, ut in illa, discursus vllus conspicitur, sed solum modò lividae duae reliquae folio laeviores, depressioresque transversa lineola

coniuncta: H. masculam Romanorum effert: alias vero duobus locis coeuntes insulam Ovali figura, lignosam hirsutaeque circumscriptunt.


Plant. Icon. pag. 180. Testiculus Vulpinus secundus Sphegodes

Teut. 217. Lobel. Obf. p. 48. nomine Testiculi vulpini aliam posuit iconem, quae apud Dod. in h. postrema est nomine Orchidis Serapiadis secundae minoris.

C. Bauh. Phyt. Orchis 25. Fucum ferens tertia.



ORCHIS MYODES GALEA ET ALIS herbis: & Orchis Serapias tertius Dodon. & Myodes 1. Lobelio.



Folia tria, aut quatuor, vnciant lata nonnunquam angustiora, longitudine circiter palmari: caulis tenuis, palmatis, bipalmatis & maior: flores sustinet ex pediculo surrectos, ventricosos, cui appositum folium ad ipsius floris cacumē usque pertinens, rarus, nullo calcari:

galea & alis colore herbaceo, reliqua parte muscae corpusculum affabre exprimente, prona parte albidā ofis ferrugineis, supinā vero colore fuliginoso, Zonā subcaerulea septem angente in ricu geminis corniculis stipato apices lutes occulantur.

Lobel. Adu. pag. 62. Testiculus Vulpinus floribus muscam, sed colore rubiginoso obsoletoque & inamena fuscitudine purpureascente Fucum exprimentibus. Considerandum an hae conveniant cum icone sequenti de qua Lobel. Icon. pag. 181. Item Obf. Orchis myodes prima C. Gemma, floribus muscam exprimentibus.

Hist. Lugd. Triorchis Serapias tertius Dodon. Male impositus titulus Triorchidis, cum Dodonaeus dicat duos testiculos non tres vites. Hist. praeterea ait: Orchis myodes prima Gemma.

ma videretur referre Orchim Serapiam foeminam Dodon. in hist. stirp. (Gall.) Conferenti non videtur nobis respondere.

Tabern. icon. & Hist. Testiculus muscarius 1. Stendelmurg. Icon est eadem cum Lobelia: verum nescimus cur Compiler hunc testiculum & ceteros separet capite proprio.

C. Bauh. Phyt. Orchis 26. muscæ corpus referenti.

Circa Montbelgardum abundat florens Maio.

ORCHIS MYODES FLORE grandiusculo.



Lobel. Obs. & Ic. Plant. p. 182. Teut. 129. Orchis Myodes altera C. Gemme folio lauiore & flore grandiusculo. An Lob. & Pena Aduers. vulpinus testiculus foliis Plantaginis, venosis, reflexis, &c.

Hist. Lugd. Orchis Myodes altera Gemma.

Tabern. Hist. & Icon. Testiculus muscarius quartus Stendelmurg.

C. Bauh. Phyt. Orchis 28. muscam referens maior.

ORCHIS MYODES LVTEA.



QVadruplicem vulpinum testiculum meminerunt Lobel. & Pena floribus quæsitum: Papilionis nempe, Fuci, Muscæ, postremi è colore qui luteus totus & ceteris rarior multo nec descriptus. Erant hunc Norbonæ æstuosis & aridis sterilibus, decliuibus inter Cistum marem & llicem Cociferam, atque in herbis Graminibus siluæ vi-

cinis.

Lobel. in Obs. habet iconem multis annis ante à Dodonæo de flor. exhibitam pro Orchide Serapi-

piade tertio, ea omissa est à Lobelio inter icones Plantini: nescimus igitur an Lobelius bene posuerit Dodonæi iconem pro sua Orchide lutea: Dodonæus non tribuit suæ Orchidi florem luteum: An conuenire possit ea quam hic posuimus dubitamus, nos eam cum ceteris iam sculptis emimus. Apud Plan. Ic. p. 181. alia icon est non parum diuersa à Dodonæi & nostra cum hac inscriptione: Vulpinus testiculus siue Orchis Myodes lutea Narbonensis congener cum minimo Testiculo Vulpino, floribus muscam colore & effigie præ se ferentibus, Teut. 128. In hoc titulo nos non intelligimus quid luteum dicat, & muscam colore præ se ferre, muscæ enim vulgares non sunt luteæ.

Observauit Dalechampi apud Hist. Lugd. in editis montibus Orchis genus humile, rarum flore luteo, tribus aut quatuor foliis constans, cetera vulgò cognitis simile, prope oppidum Montpelio vicinum Veganium nominatum, id genus nascitur.

Tabern. Hist. & Icon. Testiculus muscarius 2. luteus, Geel Stendelmurg. Tabern. imitatus est Lob. assumpsit figuram Dodonæi, an bene iudicent alii.

C. Bauh. Phyt. Orchis 2. muscam referens Lutea Lob. icon. p. 181. Vulpinus Testiculus Myodes luteus Norbon.

ORCHIS PARVA AVTVM-nalis lutea.



D Vobis Dauri-
bas foliis Plan-
taginis quin-
queneruix si-
milibus, veno-
sis, glabris, im-
mense com-
plexis, donata
est: ipse ve-
ro caulis iun-
ceus, pedalis,
interdum di-
midio minor
thyrsus gerit
longum st. sen-
torum pusillo-
rum, ex herbi-
do colore in
luteum ver-
gentium, sua-
ui molchi serè
odore fragan-
tium, è caule

appresso veluti calyce prominentium: bulbis cau-
li imo adhæret vnicus exiguus, à quo fibræ pro-
pagantur quibus vnicus aut alter bulbis pendu-
lus adhærebat. Hoc Orchidis genus attulit no-
bis, non recordamur vnde, Gener Cherlerus: Ta-
lein Orchidem attulit nobis Guillelmus Vail-
lant Cluturgus ex Mefibe in montibus Burgun-
diæ, franchet montagnæ dictis, vbi Burgundicè
passenies vocant: Icon nostra quam iam sculptam
emimus non malè exprimere videtur: nos existi-
mamus hanc depictam apud Lobelium Obs. &
Icon. Pl. p. 187. Teut. 122.

An Clus. Pann. Orchis pusilla, pallida, odorata:
& Hist. post. Orchis septima.

Tabern. Ic. & H. Triorchis lutea 1. & 2. Geel
Wagmurg 1. & 2. An. Gesner. Hort. Testiculi si-
ue Orchidis species minor bulbo singulari, de
qua prius aiebat, Satyrii species an Orchidis
herba, quæ reperitur bulbo singulari semper si-
milis aliisq; cæteris, sed minor, foliis binis, con-
siderandum: Monorchin dixeris. C. Bauh. Phyt.
Orchis 18. odorata, radice vincta, rotunda, Pisi
magnitudine, Testiculi species minor bulbo sin-
gulari Gesn. Orchis pusilla pallida odorata
Clus. Orchis 41. Triorchis lutea foliis oblon-
gis & glabris: Triorchis lutea C. Gemmæ Lob.
pag. 94. Obs. & Icon. pag. 187. ubi bina iungatur
figura, ac secunda intelligenda. Orchis 42. Trior-
chis altera lutea. Orchis minor Leodiensis Lob.
Obs. p. 95. & Ic. p. 187. C. Bauhinum tres statuere
plantas constat, vnam ex Clusio, duas ex Lobe-
lio, perpendendum quor sint. *Suspiciamus* apud
Lobelium duas icones vnus plantæ nec scimus
an Clusii Orchis pallida diuersa sit, quamuis v-
nius tantum bulbi meminerit, vti etiam in iconẽ
nostra vinctus bulbus appictus.

ORCHIS FRISIA HIRSVTA.



L. Obel. Obs.
& Ic. Plant.
pag. 186. & Hist.
Lugd. Orchis
Frisia littoralis
Gemmæ.

Tabern. Ic.
& Hist. Testicu-
lus luteus, Or-
chis lutea, Geel
Knabenfranz /
quam Lobelius
describit in suis
Obs. & nominat
Orchidem Fri-
siam littoralem,
duo habet folia,
bifolio similia,
paulò minora
quàm Plantago
angustifolia, as-
pera & hirsuta

caulis palmum altus: Flosculi multi ex lu-
teo virides, vti in Hyacintho maiore: radices
duæ paræ rotundæ. Icon est Lobeliana.

C. B. Phyt. Orchis 40. lutea, hirsuta folio. Fri-
sia littoralis Lobelio, ubi duas iungit, ac prima fi-
gura huic conuenit.

*Orchis sive Triorchis lutea altera
nonnihil hirsuta.*

Triorchis lutea altera C. Gemmæ Lobel. Obs. &
Hist. Lugd. folio est rotundior & latior quàm
superioris, virentior trifolia, & nonnihil hirsu-
ta: videtur eadem aut congener cum Orchide
Frisia Orientali: quæ gemina inferiora folia Bi-
folii, Plantaginis latifolia angustiora edidit, &
in dodrantali cauliculo herbaceos siue luteo vi-
rentes flosculos in horro D. Brancionis.

ORCHIS SIVE TRIORCHIS LVTEA
tertia oblongioribus radicibus.

L. Obel. Obs.
pag. 93. Tri-
orchis lutea ter-
tia C. Gemmæ,
oblongioribus
radicibus oliuari-
bus bulbis, Plant.
icon. p. 186. Tri-
orchis lutea ter-
tia Geelrags
Wurg 3.

C. Bauh. Phyt.
Orchis 43. siue
Triorchis lutea
radice oblonga,
fibrosa.

ORCHIS SPIRALIS ALBA ODORATA.

Duplici radice nititur bulbosâ, oblongâ, vil-
losâ, ima versus acuminatâ, aliquor fibris
donatâ. E cuius summo folia, vaginato pedicu-
lo vnciali surgunt viridia, pingua, semunciam
lata, vnciam aut amplius longa, dorso crasso a-
uerla parte, quâ ex atro virentes venulæ, ab imo
ad summum conspiciuntur. Iuxta hæc coliculus
quoque erigitur dodrantalis aut pedalis, ceteris, fo-
liolis acuminatis ceu vaginis vestitus, iisdem ta-
men vix ac ne vix quidem prominentibus. Flos-
culorum odoratorum thyrsus, albidorum, clauic-
ularumque hærentium ita nutat, vt spirarum in-
star summa versus circumagatur. Hi interna par-
te ex luteo virent, ad latus verò duo foliola can-
dida veluti alæ hærent: Vtriculi succedunt vt in
reliquis ferè Orchidibus, parui puluerulento se-
minio referti. Thyrsus florum amaricat & iu-
cundi odoris est.

Descriptio

An Trago Satyrium 7. minimum daß kleinste

Satyrion /
quod ait pro-
uenire locis
humidis Sep-
tembri. Re-
peruntur,
inquit ille,
bina Satyrii
genera ad-
modum exi-
gua, quorû
flosculi aui-
culas volan-
tes imitatur,
coloris ex vi-
ridi lutei.
Caulces horû
haud temerè
digiti longi-
tudinem ex-
cedunt. Na-
scuntur pas-
tim in apri-



HISTORIAE PLANTARVM.

Trag. eis montibus Iunio mense, partim vero Autumno appetente in viginosis campis & pratis. Tragus habet iconem respondentem nostrae Orchidi spicatae albae, in sua descriptione intelligit forte etiam luteam, quamvis non distinguat aut particulatim describat.

Brunf. Tom. 1. Saryrion odoriferum.

Cordus hist. Testiculus candidus odoratus minor. Et supra figuram, Testiculus pumilio Tragi.

Testiculus odoratus Dodon. Gall. vocatur, *Conillon odoriferant*: Belg. *woltrichende Stanz del cruyt* & *Hein Standel cruyt*. Est hic Dodon. hist. fl. & in fol. Testiculus quintus odoratus sive pumilio nuncupatus, omnium foliis minimus.

Lobel. & Pena Adu. Testiculus odoratus, minimus omnium flosculis, odore Lillii conuallii. Obs. Testiculus odor. Orchis spiralis C. Gemmae. Icon. Pl. pag. 186. Teut. 221. Et Obs. Tetrorchis alba spiralis vel autumnalis C. Gemmae. Testiculi odorati varietas: non aliud à superiore, sed ut plurimum oliuaribus oblongis bulbis donatur. Icon. Plant. pag. 186. Teut. 226.

Orchidem flore albo, odorato vel Spiraalem C. Gemmae ad Camer. hort. milit. ex Silesia D. Fridericus Sebizius.

H. L. Testiculus odoratus Dodonzi. Tetrorchis, vel Triorchis alba Gemmae.

Tab. 100. Tabern. Icon. & Hist. Testiculus minor, odoratus, *Hein woltrichende Knabenkraut*, cui folia inter Orchides omnium minima Plantagini nonnihil similia: sed valde angusta & parua, colore viridi, caulis tenuis: flores multi parui, albi bene olentes: floret Augusto & Autumno. Et Triorchis odorata, *Groß woltrichende Knabenkraut*. Non erat separanda capite hae Orchis à precedente.

C. Bauh. Phyt. Orchis 44. Triorchis alba odorata oblonga radice Lob. Orchis 45. Orchis alba odorata minor. Saryrium odoriferum Brunfels. Saryrium exiguum & 7. Trago. Testiculus odoratus spicalis minor Lob.

Locus. Editis incultis & aridis locis plurimum reperitur: Augusto aut Septembri flores promit, Dodon. Sabulosis arenibus atque squallidis locis Norbonae matitinis & Angliae mediterraneis nascitur, Lob.

Tempus. Autumno ante Vergiliarum occasum in arenosis, siccis & accliuibus pratis interdum etiam humidis floret. Montbelgardi nobis occurrit Augusto & Septembri non longè ab horro ferarum, Vnde in hortum Ill. E. C. transtuli. D. Turnerus Medicus Anglicus dedit nobis collectam Heidelbergae. Circa Basileam ad Byrsch castrum haud ita infrequens.

Vires. Radix Orchidis potissimum odorati cocta in vino & paucis melle sanat vlcera putrida oris, inquit Dodonaeus, qui cur huius facultatis non meminerit in postrema historia nescimus.

ORCHIS RADICE REPENTE.

Descriptio. Pvlchram Orchis speciem radice repente misit insignis Medicus D. Doldius, quem sic describit Camer. hort. Orchis minor flosculis albis, foliis crassis nigris, radice repente geniculata, & ubi folia emergunt, apparent pusilla rudimenta tanquam naturae testiculos effingere conatis. Nascitur sponte in opacis siluis, in ramentis arborum, quae longa vetustate emarcuerunt.



Ad hominem status durat, sed colorem acquirit magis pallidum, nec tam crassa manent folia.

Camer. hort. & Icon. p. 35. Orchis minor radice repente.

C. B. Phyt. Orchis 46. radice repente Camer.

ORCHIS LILIFOLIVS MINOR

Sabuletorum Zelandiae & Bataviae.



Ortu & facie, copulitque squamarum serie similis Eriophoro Bulbo, fibrillis impactus solo; eminentibus bulbis subviridibus. Cauliculus palmaris, flores non annotati fuisse à Guillelmo N. mercatore Batavo, qui hanc descriptionem dedit Teutonice, & provenire ait iuxta maritimos sabulosos aggeres Hardemo proximos, in silva Terrea vulgo *Erdenbosch*. Idem sane reor (inquit Lobel. Adu. par. 2. cum nostro nouo Saryrio Zelandico infra scripto, in herbatione olim reperto, elapsa aetate 1603. iuxta aggeres sabulosos Walachiae inter Pyrolam nascente, quod omnes quadam foliorum similitudine ducti, nec non flosculorum herbaceorum (ni labat memoria) & longiusculi seminis fuliginosi involucri, Orchidis Littoralis Frisiae, Orchin sabuletorum maritimarum diximus. Radix illi gemina, quandoque terna, sed raro altera alteri innata, foliaceis albis involucris lecta, intus viridis, gustu suavis. Infima fibrillis impacta sabuletis, arida, inutilis & flaccida. Cauliculi binum, ternum vnciarum: folia bina Liliacea duas vncias longa. E regione pagi *Oost-Capel*, id est, facelli Orientalis, à me ultimum collecta. In Bataviae est Champ. Orchidis novum genus aggerum Zelandiae.

Figura non respondet descriptioni, potissimum quoad radices, quae nihil simile habent cum

Bulbo Eriophoro

Orchis littoralis

cum Orchidibus, in quibus fibræ tenues ex bulbis prodire non solent, sed supra & iuxta bulbos.

Orchis amplissima foliis binis splendens ibi.

*Orchis
amplissima
foliis.*

Orchis prima amplissimis foliis, quæ à nemine (ut suspicatur Clus.) observata, binæ habet folia, Ellebori albi foliis amplitudine non cedentia, aliquot venis à pediculo ad extremum usque folium productis insignita, supernè virentia, infernè dilutiora, prorsus tamen splendentia: caulem cubitalem, paucis foliolis siue muolucris præditum, pentagonum: flores in summo spicatum coherentes, cuius autem coloris, cuiusve formæ ignorat, cum antequam aperirentur, plantam duntaxat observaverit: radices binas, crassas & parvi Napi modo oblongas, supra quas infimo cauli inhaerent aliquot fibræ satis crassæ.

Solum conspecta est hæc Orchis Maio mense anni 1579. in declivitate montis, in quo extructa est arx Ill. V. Balthasaris de Barthyan p. m. Greben nuncupata, inter Draum & Saum amnes, binis ultra Waraldinum miliaribus.

C. Bauhin. Phyt. Orchis bifolia latissima.

ORCHIS ALBA CALCARI LONGO.



Hermaphroditica Orchidæ hanc haud temere dicas, ut quæ Cynosorchis & Serapiadés dictas, quod quidem ad radicem formam attinet, medium quiddam obtineat. Radix enim duplici constat bulbo sublongo, pyriformi, productiore demissa fibra, quæ in capite alias plures &

quæ crassas quaquaversum exerit. A qua in imo statim folia insignia prodeunt duo vel tria, lata, plantaginea, minus tamen nervis insignita superna parte, lævia, saturè virentia. Reliqua verò octuplo vel decuplo minora, angustioraque caule nullo ordine decorant pedalem aut sesquipedalem, angulosum, striatum: Cuius summa flores spicatum occupant odoratissimi, albi, Papilionem expansis alis æmulantes, quorum foliorum supremum leviter erectum obtuso mucrone sub se bina in summo, inclinatione quadam coeuntia, herbaceo colore prædita comprehendit: lateralia duo alarum instar expanduntur: propendet autem longum folium, minus reliquis, album, & ferè herbidum, linguæ caninæ exertæ instar, quod, ut in priore similitudine maneamus, papilionis corpus referre dixeris: aversa floris parte prominet calcar longissimum, prope floris basin album, cætera viride: unicuique autem pediculo intorto herbidoque appositum est folium acuminatum, sapor foliorum amarus.

Tom. II.

Radicum aqueus insipidus.

De hac Dodon. Hist. fl. & in fol. Testiculus siue Orchis Serapias. folia profert duo aut tria, lævia, latiuscula, at Lili foliis multò minora: caulem dodrantalem aut altiore: flores in raros, candidos papilionibus expansis alis quodammodò similes: &c. Eius icon est bifolia, olim in hist. Gall. lib. 2. cap. 46. ex Fuchso erat trifolia, ac ei dicebatur Testiculus Vulpis: Gall. *Conillon de renard* Germ. *groß Stendelfraut* Belg. *Groot Stendelcruyt*.

Satyrium trifolium Græcis, *Satyrium* trifolium Latinis, Officinis nostris (inquit Fuch.) incognitum aut inusitatum: vulgò Testiculus Vulpis aut sacerdotis. Germ. *Stendelmurg*: Gall. *Satyrium à trois feuilles*, nominatur. Satyrio autem nomen fecerunt Satyri, qui primi sylvestres dii colludentes nymphis, per sylvas & antra ad firmiorem Venere herbam hanc inuenerunt. Trifolium verò, quoniam tria fert folia ad terrâ versa. Folia tria fert Rumici aut Lilio similia, minora tamen & rubentia. Caulem nudum, longum, cubitalem. Florem Lilio similem, album. Radicem bulbo similem, mali modo extuberantem, foris rufam, intus oui modo album, gustu dulcè, & origratam. Quod verò hic dicimus Lilio similem: non sic intelligendum venit quasi quantitati & tota figura Lilio similis flos sit, quando evidentissimum sit Liliū quantitate sua Satyrii florem multis modis superare. Denique nec figura etiam per omnia responderet quare hæc similitudo ad colorem & floris essentiam referri potius debet, quæ planè eadem est cum Lili colore & essentia, id quod conferenti hos duos flores manifestum fiet. Icon. pag. 408. *Satyrium* trifolium vocat *Stendelmurg*. Fuchsius non describit plantam cuius iconem exhibet, sed detorquendo accommodare conatur descriptionem Dioscor. suæ iconi, quam hic ponimus trifoliam, ut, eam sculptam eminus, quod ei non commune.

Matthiol. in Dioscor. cum magnis icon. Lat. l. 3. cap. 26. picturam solam habet huc descriptione sub Testiculi specie tertia. In Ital. cap. 37. Et appingit tantum duo folia: sub eo tamen titulo in eadem tabella icones duarum plantarum.

Dicitur Lobel. Obs. Testiculus Vulpinus primus Anglis heros Ballokes. Hist. *Satyrium*. Icon. Plantar. pag. 178. Testiculus vulpinus primus cuius flores culices exprimunt, Lobelius in sua iconè duo tantum habet folia: is præterea aliam habet iconem parvam differentem nomine Orchis Hermaphroditicæ de qua mox: considerandum in quibus differat.

Hist. Lugd. Testiculi tertiæ species Matthiol. in ea tabella ex Matthiolo dux icones diversarum plantarum, præterea Hist. Lugd. ponit eiusdem plantæ iconem alteram sub hoc titulo: Orchis Serapias primus Dodonæi: ponit & tertiā trifoliam, cum hac inscriptione: Testiculus vulpis Dodonæi, tres igitur icones vnius plantæ sub diversis ponit titulis.

An Thal. Harc. Orchis bifolia, flore purpureo & candido etiam in montibus passim ac præcis. Triplici autem differentia reperitur. Altera latifolia est, foliis orbicularibus ferè, vnciarum sex longitudine, quatuor latitudine: tertia breviora omnia continet.

Camer. horti. Orchis bifolius, qui nonnunquam trifolius nascitur, unde Fuch. Dioscoridis Satyrium esse placuit.

Tabern. Icon. pag. 667. & Hist. lib. 1. pag. 394. Testiculus Vulpinus latifolius, *Satyrium* latifolius, *Satyrium* latifolius.

T 11

Hist. Lugd. Orchis batrachoides Gemmæ.

Tab. Ic. & Hist. Orchis batrachoides freschblumliche Geylmurg.

Casp. Bauhin. Orchis 37. siue Hennaphroditica.

Buzeiden siue Buzidam Arabum.

Ait Auic. Buzeiden esse medicinam ligneam Indam, in qua sit virtus similis virtuti Been. Et Serapio, Buzeiden, inquit, est species Satyrionis. Salomon Ebēhalem.] Buzeiden sunt radices duræ, albæ, similes behen albo, confert podagræ, & doloribus iuncturarum. Et est medicina Indiz, quæ nos parum vitimur. Quidam verò detulere eam ad nos, & vidimus eam sæpe. Aben Moūai] Melius quod est ex buzeiden, est album, habens lignum grossum, & multas rugas. Illud verò quod est subtilis ligni, habens superficiem lenem, paræ albedinis, est non bonum, nullius iuuamenti. Habix dixit sicut iste. Et dixit tum hoc, quod iuuamentum eius est sicut iuuamentum hermodactylorum, ad remouendos dolores iuncturarum, & ad conferendum podagræ. Mesarugiz.] Buzeiden est calidum, auget in spermate. Et de proprietate eius est, quod laxat æquam citrinam. Sed illud est malum testiculis. Et rectificatio eius est cum Sinapi, & melius ex eo est nouum. Et dos eius, pondus est drachmarum duarum.

Digitis Citrini Arabum.

Asahafra siue Digitis Citrini sunt, autore Auic. figuræ volæ manus colore mixto ex citrinitate & albedine duri & nonnihil dulces, quidam sunt citrini & puluerulenti absque albedine. Digitis crocei, ut exemplaria habent, sunt gummi seu vena tinctorum: Rhalis.

PAMATA SATYRIA IN GENERE.

CAP. XXVI.

Satyrion Græcis. Satyrium regium Latinis. Offic. Palma Christi. Arab. Bucheden: Auic. Digitis Citrini. Germ. Erengblumen. Gall. Satyrion royal. Palmam Christi propter similitudinem quam eius radix cum humana habet manu dixerunt. Verum Satyrium, inquit Matthiolus, hæcenus in Italia videre non licuit. Palmæ Christi radices, Auicenna Digitos Citrinos nuncupat, etsi eas Digitos citrinos esse perperam, nullaque, quod libro suo legerim, ratione ducti, negent Monachi illi.

Fuchsius Palmam Christi non rectè inter Satyrii genera depinxit, siquidem ea potius meo iudicio inter Canis testiculos erat representanda.

Palmis duabus Christi adibus & Serapiadibus (sunt Lobel. & Pena Adu.) accenset Triorchum Serapiada Aegineta (addere enim tertiam quandam videtur,) terno donatam didymo, quam alias Palmam Christi opinabatur: tum quia succulenta minds, licetiorque est, & vehementer deterget, intro forisque vlcibus adnota: tum etiam quod Melancholicis, Quaternariis, Epilepticis, nervorum offarctu, & pituitosa tabarra oppressis miram præstet opem, fluxum dyentericū listat, quorū qualesque facultates Palmæ Christi Recentiores vendicant, [ne cuiquam imponat

Tom. II.

Palmæ Christi vehementer purgantis homonymia,] dignandas sanè Aegyptiis Venerandæ Serapiadis deæ Augusto cognominæ: alioquin nihil attinuit à cæteris secreuisse, & Serapiadas nuncupasse. Rationibus hisce fauebat ex lectione coniectura, nam ubi *παλμα* multi vsus, legendum *παλμα* multitudine radicem: & fortè verumque, multifidum multique vsus radicem innuebat, & mox inferius ubi Dioscor. *ῥίζα ὅμοια ἐπὶ χιτῶνι* quæ, id est, Radix subest testicellis similis, aut pusillis testiculis, legebam multifida leuiore metatheti multo, quam in superiore capite, ubi pro Olea suffecerunt merito quidam Squillæ teneram Pancratium. Verum tamen si cui hæc minus allubescant Serapiades, exploret superiorum Orchium facultates, quæ multo tamen ignauiores & mucore elumbes magis videntur, aut alias aptiores adducat, & lubenter vltro indicas istas Palmatas Antiquis profitebimur. Heribidos pratensæque colles frigidiores amant tum minor tum maior, legimus etiam in Alpini Ratisburgi & Nozoreti Germaniæ. Maio flore & foliis exit: maior foliis similibus, sed latioribus Porri, mucronatis, ad terram reflexis, crassis, interdum maculatis fuscis, & nigricantibus notulis: flores purpurascens Cynolorchis adeo similes sunt, ut nisi propius spectes easdem putes. Radici item geminus est bulbus, altero euanido, altero prægnante & succulento. utroque tamè oblongiore, nonnihil compresso, & ima sui parte in fibras inæquales ternas aut quaternas veluti digitatas abeunte. Hunc marem appellant. Fæmina verò floribus candidis, vel e purpura rubetibus, dilutæ ex ruleis, cuculatis, crebriores maculas purpureas & rictum ostentantes habentibus: foliis minoribus, & insperitis punctulis: radice consimili. Sunt ut hist. Lugd. notat, qui vocant Palmam Christi Buzeiden, siue Buzidam Arabum. Satyrii autem huiusmodi radices nihil minus quam lignæ sunt, nec ex India petuntur, ut voluerunt Auicenna & Serapio. Matthiolus Satyrium Basilicum siue Palmam Christi Auicennæ Digitos Citrinos esse vult: At Satyrionis Basilici radices duræ non sunt neque croceæ, neque ad tingendum viles. Quare id à Digitis citrinis Auic. & Rhalis perspicue differe videtur.

Thalys Marcyn. pag. 112. Satyrium recentiorum Græcorum iuxta Dodonæum mas, alias Palma Christi: Serapias mas Anglis, Orchis autem fæmina Tragi. Atqui Satyrii huius maris cuius videlicet folia maculis destituuntur, diuersæ aliquot differentie in Marcynia occurrunt, quæ sub duobus præcipue generibus comprehendi poterunt, quorum alterum sit latifolium, alterum angustifolium: quorum etiam vltiorem tradit distributorem.

Orchis Serapias Lobelii Camerario horti, seu Satyrium basilicum aliorum, flore candido, dilute rubescens & rubello. Ex his tertium folia interdum maculis cruentis aspersa gerit, interdum (An Plantini icon. pag. 183. Palma Christi mas) sine maculis. Priora verò duo maculis in horto meo nunquam carent, nescio an alibi etiam.

Satyrium Basilicum mas & fæmina amarum est, referente Fuchio, magis tamen amarum quod maculosum constat foliis. Ideoque non perperam censent Auicenna & alii quidam ex recentioribus medicis, qui calidum esse & siccum in secundo ordine tradunt. Vtus eius ad erogandam cutem, ad nervorum dolores, & contra noxia medicamenta. Fertur & amuletum esse radix gustata. Semen ex vino sumptum nouem diebus, co-

Tii 2

*Serapias
des
Orchidis
facultates*

*Palma
mas.*

*Palma fæ-
mina.*

*Non sunt
Buzidam*

albicantem, odore non ingrato : radices duas, quæ sanè testiculos referrent, nisi ramis quibusdā, quasi digitis, humanam manum exprimere viderentur. Icon à Matthiolo proposita non responderet eius descriptioni, potius videtur Icon nostræ Palmatæ cum longis calcaribus rubellis.

Dodon. de fl. Satyrium alterum maius : quod fœminam vocant, Satyrium alterum Basilicum dicitur.

Lobel. Obs. (& ex eo Hist. Lugd.) Serapias fœmina pratensis, foliis notulis inipertis, siue Palma Christi : Adu. pag. 3. Satyrium Basilicum alterum Dodon. Icon. Pl. pag. 188. Palma Christi Serapias fœmina pratensis, Teut. 223.

Tabern. Ic. & Hist. Palma Christi maculata.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 5. Basilicum pratense maculosum.

Thal. Harc. Satyrium fœmina, foliis maculatis passim.

Locus.
Tempus.

Passim secus vias & in dumetis observatur : Cuius nodi in locis utunque obuiam per comitatum Montbelgardensem observauimus Maio & Iunio florentem. Eadem observata nobis in valle Griesbachiana ad thermas acidas. Basileæ quoque multis in locis occurrit. In hortum Mœbelgardensem translata maximo & lætissimo florum Thyrso prodit, qui & palmarum altitudine superaret. Cum essemus Genevæ observauimus florentem mense Maio.

PALMATA MACVLATA.

Descriptio



Non in eam altitudinem excrefcit in quâ præcedens, radicibus tamen tetradactylis conuenit, nec non foliis, nisi quod euidentius maculosa sint: flores vero purpureo colore præditi, saturisque punctis notati, cristas duas erigunt, alarum expertes : vnicuique autem flori appositum folium acuminatum saturatè purpureum.

Plant. Icon. p.

188. Palma Christi Serapias fœmina pratensis Lob. 95. Teut. 223.

Dod. de fl. Satyrium Basilicum alterum.

PALMATA ALBA.

Palmatæ maculatæ flore albo antè meminimus quæ à præcedenti fortè solo colore differt. Icon quam his ponimus, ex est iis quas emimus iam sculptas, quæ accedere videtur Lobelianæ albæ, qui eam separat à præcedenti: de ea legitur Lob. Obs. & Icon. p. 189. Serapias candido flore montana maculatis foliis. Cynosorchis montana, folio maculoso C. Gemmæ, pratensis item eadem nives flore crebra visitur, cætera haud abimilia.

Tom. II.



Hist. Lugd. Serapias candido flore Lobel. cætera haud abimilia Satyrio Basilico altero Dodonæi.

Tabern. Icon. & H. Palma Christi maculata montana benedictusburg.

C. B. Phyt. Satyrium 6. basilicum montanum maculosum.

PALMATA SIVE SERAPIAS PALVSTRIS latifolia flore albo subpurpurascente.



Serapias palustris latifolia, Cynosorchis palustris platyphylla folio læui, latoque flore albo subpurpurascente C. Gemmæ, Lobelio Obs. Præcior est Violacea Cynosorchis Icon. Pl. pag. 190. Teut. 224.

Hist. Lugd. Cynosorchis palustris platyphylos Gemmæ.

Tab. Icon. & Hist. Palma Christi palustris 3. Wasser handlens wurtz.

C. B. Phyt. Satyriū 2. basilicū matus latifolium.

PALMATA, SIVE ORCHIS PANNONICA floribus exalbidis, & alba Griesbachiana.



Illi primùm Lenascentia folia tria, aut quatuor habet Orchis 7. Clusu in Pann. octava in Hist. post. siue Pannonica, dilucioris & quasi pallentis viriditatis, nullaque macularum aspergine notatis, ingrati saporis : Palmarem caulem amplectuntur aliquot foliola: in cuius summo fastigio flores spicatum digesti

Trt 3

nascuntur, exalbidi & quasi pallescentis coloris, nullis punctis distincti, antennis motionum hiantibus cucullis similes, utrinque aurici, & latiusculo pallido labro propendente, posteriore vero parte corniculum habentes, ut *Consolida regalis*, aut *Linaria*, sed latius & obtusum, graviter odorati, florum *Sambuci* odorem referentes: ad horum exortum singula foliola nascuntur pallentia, & floribus colore respondentia: radices geminæ, veluti palmæ, in binos, aut plures digitos distributæ sunt, quarum vetustior fungosa, nigrior, & flaccidior est, altera candida, vegerior ac solida, paucis supra earum exortum nascentibus fibris.

Aliud genus est formæ, magnitudine, cæterisque notis illi par: sola varietas in floribus, qui in hoc purpurei sunt, foliola sub floribus nascentia etiam purpurascunt. Invenitur utrumque genus non modo in Leytano saltu supra Manderstorf, aliisque Austria inferioris silvis: sed etiam editionibus quibusdam pratis Viennensi saltui proximis. Floret autem Aprili, nonnunquam etiam Maio, pro mitiore videlicet aut rigidiore vernalis aeris constitutione.

Locus & tempus.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 13. flore *Consolidæ regalis Sambuci* odore. Collegimus *Palmatam* florentem Maio & Iunio, in valle fontium acidorum Griesbachiana ad Herciniam silvam cui radices & folia respondent iconi propositæ ex Clusio: Eadem est cum iam à nobis descripta *Palmata* flore albo circa Montbelgardum observata.

Palmata & Serapias Batrachites.

Lobel. Icon. Pl. p. 193. *Serapias Batrachites* vel *Myodes* Teut. 226.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 14. batrachites. Vide Hist. Belg. Lobelii.


PALMATÆ CUIUSDAM ICON.



Non occurrit nunc ad quam speciem *Palmatæ* hæc icon sit referenda, ea est ex iis, quas emimus iam sculpras.

PALMATA SERAPIAS PALVSTRIS leptophylla, violacea, maculata & non maculata.

Cynosorchis palustris altera C. Gemmæ, Lobel. Obs. serius florens, comâ violacæ, foliis interdum lævibus, interdum maculosis. Icon. Pl. p. 190. Teut. 224. Icon Lobelii non demonstrat folia tenuia, vel angusta esse.



Hist. Lugd. *Serapias palustris* altera leptophylla, Gemmæ. Itē *Serapias palustris* 3. Gemmæ. Minor Compilatore ex duabus iconibus à Lobelio propositis sub vno titulo, duas statuere plantas, vna ex iconibus representat plantam iuvenem, quæ caulem non protulit.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 13. basilicum maius latifolium alterum.

PALMATA ANGVSTO FOLIO vilissima palustris.



Cynosorchis palustris lævi folio & angusto, seu leptophylla omnium vilissima C. Gemmæ, Lob. Obs. quæ Icon. Pl. 193. T. 226. Figura Lobelii non demonstrat folia angusta.

Hist. Lugd. *Cynosorchis leptophylla* Gemmæ.

Tabern. Icon. & H. Palma Christi palustris 2. Wasserwendlen wurtz.

C. B. Phyt. Satyrium 16. palustre folio lævi.

PALMATA SERAPIAS MONTANA folio lævi.



Serapias montana folio lævi. *Cynosorchis montana* folio lævi C. Gemmæ, Lobel. Obs. & Icon. Pl. p. 191. Teut. 225.

Hist. Lugd. *Serapias montana* folio lævi Gemmæ.

Tabern. Icon. & Histor. *Serapias montana* Berg knabenkraut.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 11. basilicum montanum bicubitale.

Serapias montana folio lævi Lob.

PAL-

PALMATA FLORIBVS IMPENSE RVBRIS.



LObel. Obs. & Ic. Pl. pag. 191. Cynosorchis Dracontias foliis & floribus impense rubris C. Gemmae, floret circa finem Aprilis, aut initia mensis Maii. Nascitur in humidis, & viginosis, praesertim ubi nigrior terra est.

Hist. Lugd. Cynosorchis Dracontias Gemmae. Tabern. Ic. Tragorchis Boeckeyl. Male ponit Compil. hanc iconem sine descriptione capite separato ab aliis palmatis.

C. B. Phyt. Satyrium 18. palustre foliis & floribus rubris.

PALMATA PALVSTRIS NEPHELODES



Cynosorchis palustris, Lophodes vel Nepheledes C. Gemmae. Flos illi communis ferè cum ceteris maculosis, proinde huic communem appinximus deflorescentis Satyrii formam, una cum corniculis quibus ferè atomon prorsus includitur, Lobel. Obs. & Icon Plant. p. 191.

Hist. Lugd.

Cynosorchis palustris altera, Lophodes Gemmae. Tabern. Icon. & Hist. Palma Christi palustris. 1. Wasser heiden wurtz.

Casp. Bauhin. Phyt. Satyrium 17. palustre alterum maculatum.

PALMATA, SIVE CYNOSORCHIS MACROCAULOS GALERICULATA C. GEMMAE.

Cynosorchis macrocaulos, vel Conopsea, sive galericulata C. Gemmae. Floret circa medium finemque mensis Maii usque ad Iunii ferè medium. Lob. Obs. Flores in hac iconè multum habent similitudinis cum praecedenti nostra Palmata calcaribus longis.

Hist. Lugd. Cynosorchis Conopsea.



PALMATA CARYOPHYLLATA.



Plant. Icon. p. 194. Orchis Serapias Caryophyllata semine pragnans. Ex T. 2. p. 277. Flos Orchidis Serapiadis Caryophyllatae sive odoratae descripte p. 226.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 1. basilicum maximum. Vide Hist. Belg. Lob.

PALMATA ANGVSTIFOLIA MACVLATA PURPUREA.



Palmatam quam observauimus in valle Grischbachiana acidorum fontium, florentem Iunii principio, folia est angustis, maculatis & non maculatis, quinque vel sex alternatim per caulem proe-nientibus, inferiora latiuscula, vncià tamen multo angustiora, reced

Descriptio

T. 4

flexa, quatuor vel quinque uncias longa, superiora, breuiora & valde angusta: caule cubitali, alias maiore, interdum etiam minore: flores multi, spicam breuiorem exprimentes, purpurei: radices pluribus digitis constant.

Icon quam proponimus est ex iis, quas iam sculptas emimus, quæ aliquo modo expriment nostram Palmatam angustifoliam.

PALMATA RUBELLA CVM
longis calcaribus rubellis.

Descriptio

Duplici nititur radice palmata, vigore vicissitudinario annuatim in iis pulcherrima observatione se exerente; nam ea quæ caulium pabulum pariter & sulcum subministrat, tota



flaccida apparet effœtaque, quæ verò sequenti anno caulem productura, plena succulentaq; sapore viscido: plurimis alioquin digitis uncias longis prædita sunt. Obseruari sane nobis in utraque ad viginti quatuor: infra supraque palmatas radices aliz, crassitudinis fibram

ram Hellebori: folia prodeunt palmum longa caulem amplectentia, angusta, qui cubitalis, sesquicubitalis, atque etiam altior, quem parua & angusta quædam foliola stipant, suprema verò thyrus occupat peramœnus dodrantalis plus minus, strobilorum rubellorum, calcari prælongo, & unguiculis auium recuruo, præditorum, quibus dehiscentibus succedunt vericuli striati, seminis puluerulento ferrugineoque: odor non vehemens nec ingratus.

Icon nostra est ex iis, quas iam sculptas emimus, quæ non malè respondet nostræ Palmatæ, & a Fuchsio exhibitæ, nomine Satyrii Basilici maris primi.

Matth. nov. Matth. in Diosc. Palma Christi. Descriptio non respondet iconi: in comm. cum Iconibus magnis Latinis, Palma Christi maior. Item Epit. p. 561. vbi etiam descriptio non conuenit cum iconem.

Cam. nov. Camer. in Epit. aliam posuit iconem quam non diuersam a nostra suspicamus, in ea tamen non benè exprimentur calcaria, descriptio quoque non conuenit. Item in Histor. Germ. Matth. 4. Testiculus, Palma Christi.

An Lobel. Obs. & Plant. icon. p. 189. Serapias minor rubello flore nitente, angustifolia, nullis inspersis punctulis, Lob. 95. Teut. 224.

H. Lugd. nov. Hist. Lugd. p. 1562. Serapias minor rubra Gemmæ. Item p. 1568. Satyrium Basilicum maius Dodon. Planè displicet quod hist. ponat iconem ex Matthiolo & descriptionem ex Dodonæo diuersæ plantæ.

Tabern. Icon. & Hist. Palma Christi minor mas, Flein hendleno wurz Männlein, Creutzblum. Palma Christi femina hendleno wurz weiblein. Prima icon est ex Lobelio, altera est ex Matth.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 7. basilicum angustifolium, Palma Christi maior Matth. Orchis femina Trago. Satyrium 9. basilicum angustifolium tertium, Serapias minor rubello flore Lob. Nobis dubium an duæ plantæ, suspicamur vnam.

Palmatam quandam cum paruis strobulis rubellis & longis calcaribus in longis veluti spicis inueni Iunii principio in prato inter Malmunster & S. Germain. Transili Montbelgardum in Hortum Ill. E. C. Item inter Raupach & Bessfordiam Iulii principio, prouenit etiam circa Montbelgardum: olim collegi Tiguri.

Locum & Tetopos.

PALMATA MINOR ODORATISS.
purpurea siue nigra.



PALMÆ Christi, siue Digitorum Citrinorum Auiæ. genus minus Matthiolo quod in Ananiz montibus habetur foliis constat Croci: caule dodrantali, iuceo, læuique in cuius cacumine strobili emicat purpureus, amaranthi æmulus, qui recens odorem quam suauissimum reddit.

Dodon. ex

Matth. Satyrium basilicum minus. Satyrium basilicum alpinum, flore ex purpura nigro, tanquam adusto (vnde Brandlein nomen impositum:) odore omnium suauissimo, seu Styracis: quem etiam aridus & in pollicem tritus, diutissimè retinet.

Nos (ait Gesner. hort.) etiam aliquando plantauimus Lansanæ sed vix ultra annum puto in hortis durare, & semen inutile esse, sicut reliqua Orchis genera.

Bened. Aret. Palma Christi minor Matthiolo. Satyrii species odorata, & præstantissima Brandlin.

Minus modestè, inquit Adu. facit Senensis, qui hærentibus Citrinis digitos Auicennæ esse hæc Monachis conuiciatur, nullamque allatam rationem conqueritur: cum ipse ne vmbra quidem adserat vilius. Et vires Digiti Citrini huic asserit, magno incommodo eorum, qui fidem illi adhibitori forent.

Hist. Lugd. Palma Christi minor, Matth. Satyrium Basilicum minus Dodon.

Tabern. icon. & Hist. Palma Christi minor femina, Flein hendleno wurz weiblein.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 10. Basilicum angustifolium Alpinum, flore ex purpura nigro.

An Camer. horti. Orchidis Serapiadis siue Satyrii

rythi Basilici odoratissimo flore minimo quadam species alpina, coloris ex puniceo nigricantis, quem Dysentericis præbent fruxum cum Ovis, vel in puluerem redactum ex vino propinant.

Satyrium basilicon minus odoratum in peregrinatione nostra Rhætica per Vallem Telinam inuenimus in monte Burmio, tunc nominatâ fuit nobis G. Breenle & Italicè ibidè *Morere*. Cum essemus Mospeli delata hæc planta ex montib. circa Gangen. Genææ cum tempore pestis inferuimus, inuenimus in monte *Salena*. Huius eliccati puluis (inquit Matthiol.) ex aqua ignitum chalybem experta, epotus (ut perhibent ii qui ita esse experimento comprobant.) dysentericis maximè prodest. Idem aquam præstare aiunt, quæ per vitrea organa ex iis elicitur. Radices huic similes, sed quæ alteri magnitudine cedunt. Excalfaciunt utraq; (ut author est Auicenna) siccantque secundo recessu. Crassa corporis excrementa pellunt, facièmq; detergunt. Dantur maniacis magno iuuamento: quin & in neruorum affectibus. Seminis puluis drachmæ pondere ex vino potus, comitialibus subuenit. Item radicis decoctum vino diutius commistum, quod bibendum paratur tam in prandio, quam in cœna. Radices, Nicoli Florentini testimonio, febrem quartanam fugant: is namque earum tantum vlu Biliotum quendam curatum retulit.

SATYRIUM ERYTHRONIVM MATTH.

Satyrii Erythronii vocati radice, Mali effigie, tenui & raso: candida intus pulpâ, sapore dulci, orique non ingrato, Damasco Syriæ misit ad me [Clusius] Cechinus Martinellus Rauennas Pharmac. præstantiss. & rei herbariæ admodum studiosus, cuius imaginem excudi curauimus.

Hist. Lugd. Satyrium Erythronium Matthioli. Hanc, inquit Adu. ostentabat nobis (quasi nunquam vidissimus) & penè inuitis risum excutiebatur Iacobus Cortusius, dicens, se manibus duntaxat atrectando torum turgere Venereis libidinibus.

Nos annotauimus historiæ nostræ lib. tertio Valerandum Dourez. existimasse Satyrium Erythronium Matthioli esse medullam Nucis Castaphoræ.

OROBANCHE ET HÆMODORVM
Veteribus & in genere.

CAP. XXVII.

Duplicem esse Veterum Orobanchen ex mox tradendis colligere licet. Vnam

legumen sit, aut leguminum, Erui præsertim, vitium & pestis. Alteram quæ cauliculus tantum sit subruber.

Hanc Dioscor. describit his verbis: Orobanche (*Orobanchē*) cauliculus est subruber, ad duos dodrantes (sesquipedalis,) & interdum maior, insurgens, foliis subpinguibus, hirsutus, tener, floribus subalbicantibus aut melini coloris præditis. Radix subest digiti crassitudine perforata, ut inde caulis reficeretur. Videtur nasci inter legumina quadam, & ipsa strangulata. Vnde etiâ nomen accepit. Editor oleris modo crudus & coctus, ex patina velut asparagus. Quin & cum leguminibus coctus facere putatur, ut ipsa citius coquantur.

Inter reiectanea, Alii legunt *cyrenensis* alii *cyrenensis* [Leonem:] Cyprii *Sapphiræ* vocant. In communi *Lupus* nominatur. Sed ne stateram, quod dicitur, transgredi videamur, Theophrastum, qui primam & secundam Orobanchen seu legumen depingere videtur, adorimur. Quædam autem sunt (inquit lib. 8. c. 8.) perspicue multorum communia, sed quia in quibusdam maiorem vim habent (*admiranda*, sic legendum sensu ita postulante, non *admiranda*, ut in publicis exempl. legitur,) horum existimantur, veluti Orobanche (Eruanga Gazæ) Orobi, Aparine Lentis. Sed Orobanche quidem Eruum vincit propter imbecillitatem, Aparine autem inter lentes bene nutritur: & ea quidem Orobanche quodammodo similis est, quia totam plantam aggreditur & veluti brachiis amplexatur: sic enim strangulat, unde ei nomen. Quod autem statim à radice Cumino & Fœnugræco (*subnascitur* Hæmodoron) legendum vult Hist. Lugd. Gaza Hæmodorô. vnicauale est, nec dissimili caule, verum breuiore multo, & supernè quoddam veluti caput habet, radicem autem subrotundam. Idem de Caus. 22. de iis scribens, quæ vicinas plantas interimunt, ait: Orobancha vocata Eruum necat amplexu compressuque suo: & Limodorou (*admiranda*, sic legendum Hist. Lugd.) Fœnugræcum interfecit protinus radici adnascens.

Orobanches quoque leguminis in diuersis locis meminit Plinius. Est, inquit, herba, quæ Cicerenecat & Eruum circumligando se, vocatur Orobanche, quam alii Cynomorion appellant, à similitud. canini genitalis: cauliculus est sine foliis (quod male, ut dicitur,) pinguis, rubens. Estur & per se in patinis eum tenera est decocta. Et necatur cuminum ab imo dorso (legendum ab Hæmodoro Hist. Lugd.)

Illius & Galenus recordatur *simp.* 8. & Alim. i. his verbis. Aparine non modo non esculenta est, sed plantæ Lentis dum assurgit, vndique implexa, ipsam strangulat, suffocat & detrahit, non aliter quam Orobanche Eruum. Sicca frigidaq; est temperaturæ primo ordine.

Sed Cornar. in Dioscor. teste, Plinii locus prior de Orobanche ex Theophrasti lib. 8. hist. transcriptus. Quod porro lib. 22. dixit sine foliis, nos *admiranda* in Diosc. legimus, & foliis subpinguibus connectimus. Non enim penitus sine foliis est, sed in summo caule folia habet & inter ipsa flores prodeuntes. Nec ignota herba est, sed nonine peculiari caret, nisi quod vnter de Widen nostri eam appellant. Cornario subscribit Dodon.

Orobanchæ, sic & Latine Orobanche, Eruangina [à Theod. Eruanga] ab Eru strangulatu nomen adeptæ est, nempe quod *admiranda*, id est, quod Orobanchæ sine Eruum strangulat. Ne-



Cynomorion.
Leo. Thyrse
ne
Lycet.

Orobanchæ.
Eruanga.

Orobanchæ.
Limodorou
Hæmodorou.

Cynomorion.

Orobanchæ
in genere.

ga etiam vulgò (quasi Necam dicere vellent) appellatur, rapiendo enim leguminum inter quæ nascitur, alimenta, ea suffocat & necat.

Orobanchæ æquiuoca
Cuscuta
Helxine
mure tria-
gula

Hæc cum Thymo adnascatur, ait Marantha, Epithymi nomen sortita est. Orobanche Theophrasti an sit Cuscuta, ut vult Marantha considerandum. Orobanche Theophr. & Galeni fortè Conuoluulus niger Gesn. qui nobis Helxine semine triangulo dicitur. Videtur sanè Trago, quod præfens vitium, Angina, seu Orobancha, alter Culsus Scapionis sit, de quo cap. 41. ita scriptum reliquerit. Est secunda [Culsi sc. species] est nigra, & nominatur sic propter sui nigredinē, & habet semen nigrum &c. Nomina hæc adscribit Lebleb, & Volubilis minor. Cum verò Orobanchæ descriptio, quæ apud Diosc. extat, huic non per omnia quadret, iudicium candido lectori committit. Est præterea Orobanche Galeni & Theophr. fortè Helxine Cusampelos. Orobanche Diosc. Gesn. quad. p. 42. Aegoleptos Plinii [ni fallitur Gesn. quad.] Rusticis Malus Ros, aliis Malus Henricus dictus, perquam similis est Orobanchæ.

OROBANCHE FLORE MAIORE.

Delc. tip.



Cvitali altitudine exurgit & maiore, caule recto, tereti, hirsuto, pallido, aut luteolo aut subruffo, concava: in quo non tam sulca, quam foliorum rudimenta, angusta, longiuscula, seu ligula, celerrimè marcescentes rare: quorum etiam singulæ singulis floribus sunt subiectæ: flores in Thyrsis Orchidum more, sed ex longioribus interval-
lis. Melissæ Fuchii, magni, hirsuti impen-
se, colore ex purpureo obsoleto pallido (subalbido Matthiol.) rictum effigiantes, è quo prominēt apices nigricantes staminum albidiorum: labrum autem quod demittunt in tres lacinias est diuisum: ipseque

floris fundus melleo succo viscido mader. Radix bulbosa è squammis compactilis, non admodum altè demergitur. Sapor eius admodum amarus. Flores verò odorem spirant haud ita ingratum.

Orobanche, quam vidimus [inquit Matth.] omnibus notis legitimè responder: et si scriptis mandarit Theophr. lib. 8. de hist. & 5. de Pl. causis; Orobanche Eruum necare amplexu: ea tamen quæ à Diosc. representatur, & à Plinio lib. 22. cap. ultimo, nullo sanè amplexu, sed sua tantum præsentia legumina, segetes, Cannabin, & Linum interimunt, quæ prope ipsum oriuntur: quam ob causam Ananientes, quodd vicinas strangules, uerbam Lupi vulgò appellant: nonnullis Coda di Leone appellatur: aliis verò herba rora quodd vaccæ eâ deuorata [ut pastores facto periculo testatur] sitatum Taurum adeant. Sunt qui [ut loco citato scribit Plinius] Cynamorion eam appellant à similitudine canini genitalis: non inconcinna representatione: nam si quis eam contemplerur, glabro singularique caule profluentem, confarctos inter se flores, & quasi in glomum collectos monstrantem, genitalis canini effigiem referre perspicier, quod in summo crassius, & veluti galericulo contextum cernitur, Ex quibus omnibus non temere dicendum existimaucrim, vel Theophrastum hæc in re deceptum esse, vel aliam à Diosc. & Plinio Orobanchen concepsisse. In postremis mutata figura. Frustra Matthiolus repetit Diosc. descriptionem nihil addens de suo, quasi non nota ei fuerit planta.

Orobanche, inquit Turnerus, in multis Angliæ locis prouenit, Variis quoque Germaniæ locis obseruauit. Inueni quoque sæpenumero radicibus Genistæ vulgaris pertinaciter implexam. Item iuxta Trifolium pratense marcidum quod enecauerat, ut ex fossione comperi, reliquis omnibus circumcirca Trifoliis vegetis & vernantibus. Orobanchen interpretari licet Angl. Chofesische vel Stranglemede. Falluntur, qui Cuscutam credunt esse Orobanchen Diosc. Alii sine causa nuper Orobanchen nostram inter Satyræ retulerunt. Quod Matth. contra Theophrastum scribit (dicentem Orobanchen amplexu suo complexuque legumina enecare) solâ præsentia suâ id efficere, non placet. Quomodo enim legumina necet, solâ suâ præsentia cum venenata non sit: cum etiam ne venenata quidem plantæ eas inter quas nascuntur, interimant. Theophr. quoque & Diosc. repugnat. Fortè Matthiolus, quoniam nulla in Orobanche folia aut capreolos supra terram obseruauit, arbitratus nihil habere, quod strangulare possit, exceptâ solâ præsentia: neque perplexas radicum fibras animaduertit, quibus non sine errore caret figura ab illo proposita; Tragus tamen rectè fibras expresserat, titulo Satyræ Erythronii.

Reperitur planta Rapo Genistæ omnino similis, caulibus fuscis [brunastres] & coloris lividi, altitudinis pedis, floribus formæ & coloris Rapi Genistæ: Rapum Genistæ sine dubio species est Orobanches [ait Dodon. Gall.] & Limodori: ei autem similis planta est Diosc. & Cuscuta Lat. Orobanche & Eruangina, non tamen Orobanche Theophr. sed, quod dicitur, Limodori n. aliis ut Phocioni, isopogon, id est, leguminum Leo. Idem Hist. legum. Limodorus caulectus est pedalis aut maior, subrubens, fistulosus, fragilis: flores subcandidi aut sublutei: rictus immixtis floribus haud multum abimiles: floribus succedunt

Orobanchæ

Herba Leo-
pa. Cap. 42.
leone, Her-
ba rora.

Rapum Gen-
istæ.
Eruangina
Leo legu-
minum.
Lim. 1000
descriptio.

cedunt oblongi caliculi, in quibus semina minutis candicantia & inutilia. Radices sub sunt fornicatae, turbinatae, digiti aut pollicis crassitudine, foris squamis nigricantibus contextae: intus vero subcandidae aut subluteae: aridae vero cornu modo durefcunt. Theophrastus huiusmodi vitium *αμύδα* appellat, veluti *αμύδα* hoc est famem adferens, frugum enim alimentum ad se trahit, & perfecte adolere non sinir. Item Hist. in fol. Limodoron, seu Rapum Genista, tota facie Orobanchen Diosc. refert, hoc solo ab ea differens, quod non inter legumina exeat: sed ex fibris radicum Genistae quibus adhærescit.

Lobel. Icon. Pl. pag. 268. T. 2. Orobanche Hypogonista, & Rapum Genistae à similitudine. Ico eadem cum icona à Dodonæo proposita pro Limodoro siue Orobanche. Oculis quodammodo cognatum esse *αμύδα*, siue *αμύδα* Theophrast. vel *αμύδα* Diosc. & Cynomorion Plin., cuius varia genera inveniuntur multis provinciis communia. Orobanches siquidem legitur illius Diosc. siue *αμύδα* Theophrast. variz sunt species. Aliæ enim latiores sunt, aliæ humiles, albæ, exalbidi coloris, aliæ flavescentes, aliæ fuscæ, aliæ subæruleæ: nonnullæ aliarum radicibus adhæscunt, pluriusque per se subsistunt, & solæ inter alias plantas & graminia nascuntur: pleraque autem omnes unico simplicique caule sunt præditæ, interdum ramosum & multifidum illum habent. Omnium verò maxima passim in omnibus Europæ silvis nascitur, ut existimo: ceteræ nullas adii, quin ipsam non repererim: eam, quia apud Belgas sæpius vulgaris Genistæ radicibus innascitur, Herbariorum turba Rapum Genistæ appellat, Belgæ Brem Ræpe, Hungari, quia recta assurgit & firma est, *Misc. gerythia* mistalem candelam, siue cerum appellant, quæ subæruleo est flore, Cardui vulgaris inter segetes nascentis radicibus inhærentem olim erueremini cum Mompelii viderem.

Eandem habet iconem Clusius nomine Orobanches primæ quam nobiscum proposuerunt Dod. & Lob.

Ruellius Plinium secutus Orobanchen alteram Diosc. ita describit, ut cum leguminosa hanc confundat.

Ex emendato Theophrast. insigne in Plinio mendum corrigendum. Legimus enim lib. 20. c. 10. Et necatur Cuminum ab imo dorso, cum legendum sit ab Hermodoro.

Tab. Hist. & Icon. Orobanche 2. Ernenwurger. Sommerwurz.

Schvv. Orobanche Diosc. *αμύδα* Theophrast. Sommerwurz/Schmerwurz.

Prouenit in agris confitis Avena, Pisus, Fabis, Lentibus, & aliis ubi Genista non prouenit. In Belgio & arenosis maris litoribus non raro reperitur Dodon. Nascitur in segetibus inter legumina: Etiam in syl. sub Fagis. Maio & Iunio fleret, Schvv.

Montbelgardi multis in locis vidi Orobanche: Genetæ florentem vidi Maio & Iunio passim in plain palau, & pratis: Basileæ etiam florentem Maio, ubi copiose prouenit. Mompelii cum essem offendi florentem mense Aprili in monte prope Castelnæus, ut & alibi.

Orobanche, inquit Matthiæus, dicitur aliquibus herba tota, quod vacca ea deuorata (ut pastores facto periculo testantur) statim tantum adeant. Orobanches maioris Rapum Genistæ nuncupata, resiccatæ & trix puluerem ex tepido

vino haustum, præsens esse ad Coli dolores remedium Belgæ prædicant, Clusius.

OROBANCHE FLORE MINORE.

Orobanches vulgari similis est, caule simpliciter dodrantali, purpurascens, hirsuto, foliorum acuminatorum squammatim incumbentium, præsertim circa imum, rudimentis vestito: radicem fibras habuisse vulgari similes adhuc in planta sicca apparet. Spica floribus constat con-

fertis cucullatis, labello apem referente, calyce hirsuto multifido, eiusdem cum caule coloris, subiecto semper uniuicuique flori, folio oblongo, acuminato, hirsuto.

Hanc Orobanches speciem ubi collegerimus non recordamur: describimus ex planta sicca: huic sanè conuenit figura Tabern. nostra



quæ iam parata erat minus placeat. Fortè ad hanc Orobanchen referenda quæ Mompelii obseruauimus.

Tabern. Icon. & Histor. Sommerwurz, Orobanche prima Orobanche Matthiæi floribus ex luteo pallidis. Ernenwurger dicitur German. Theophrast. *αμύδα* Diosc., Cauda Leonis, Mala herba, Herba Tauri, & Herba Vaccæ.

OROBANCHE MINOR PURPUREIS floribus siue ramosa.



Ramosa. Descriptio. Est caule, sæpè verò etiâ plures dodrantales, aut breuiiores, emittit caules multo tenuiores, quàm Orobanches vulgaris, rigidioresque, duros, ruforescentes, hirsutos, in ramos cubiades diuisos, foliorum duntaxat vestigiis quibusdam ornatos: Flores spicati, minores, purpurei, ob-

longi, hiantes, & multifido calyce emergunt, cui

HISTORIÆ PLANTARVM

721

Locus & tempus.

Singulo singulum appositum foliolum acutum: sequitur capitula turgida puluisculo plena; radix tuberosa Auellanae magnitudine; fibratū propaginibus donata. Sapor plantę aliquantulum amarus. Czfalp. Orobanche altera ramosa.

Camer. in hist. Matth. Sommer wurz/ Erwenger, Orobanche.

Vidi Montbelgardi propē *Cmycelle* pagum in agro florentem Septembri, & primò prope Mōspeliū, vbi in legeribus mense Aprili proueniebat. Basileę etiam vidi, præcipuē in agris Canabī consitis. Non vbiq̃ue vulgaris est, multis tamen in locis reperitur, vt in Thuringia: Camer.

OROBANCHE MAGNA PURPUREA Monspessulana.

Descriptio



Orobanche affinis, planta florens prope Monspelium mēse Aprili in silua Gramont, cui digitalis crassitudinis altitudinis autem bicubitalis *caulis* adulescit totus purpurascens, cui serie quadam sursum vorsum apprimuntur *folia* satis breuia, amplexicaulia. Scapum obsident flores purpurei, Orchidis floribus similes, calcaribus breuibz, singuli foliolo in-

Acti: radix superiorem refert partem radicem Orchidis, nullis testiculis tamen aut bulbis donata. Sapor amarus, reterrimus.

Lobel. (cuius icon non placet) calcaria nulla appingit. Eidem dicitur Orobanche maior ē Gramontio lūco Monspeliensium.

Considerandum an Clus. Hist. pl. rar. huius meminerit nomine Pseudoleimodori Mompe- liani, eius verba sequuntur cap. de Pseudolei- modoro Austriaco Nido auis affini.

OROBANCHE AFFINIS NIDVS AVIS.



De Nido Auis scribens Tragus, ait flore esse & folio viduum, nihilque aliud esse quā pingue & rectum Asparagū. Quālis verò nobis perfectior re- pert^o *caule* sur- rigebat modò singularē, mo- dō duos vel tres pedales, aut cubitales, albicantes: fo- liis vestitos concauis, pel- lucidis, stria-

tis, neutiquam acutis, vt Lob. figura docet, sed ob- tusis, superna parte quodammodò cordis figuram exprimentibus. Quorum summa *florum* Thyrsus, Orchidum modo & formā, occupat, coloris hel- ui aut pallidi, qualis & foliorum tabidorum. Ac occlusi quidem ex breuibz pediculis, vt Tragus pingit: ad quorum exortum foliola parua un- gula sese exerunt. Vbi verò se aperiunt, Orchi- dum more hiant. *Galea* exigua, sub qua pistil- lum breue cum apiculis albicantibus: quod v- terinque ad latus bina foliola cingunt. *Labellum* magnum ima floris occupans cauum intus. Nul- lus odor notabilis. Dehiscentibus floribus, vtri- culi puluiscolorum succedunt striati, angulosi, re- siduis florum foliolis marcidis insigniti. *Radix* crassis fibris, succulentis, fragilibz, tota perplexa, nidorum auium structuram imitans, quorum ex- trema haud acuta obseruauimus, vt Lob. pingit in suo Nido auis, sed obtusa, vt Tragi & nostra exprimit. Sapor radicis ac totius plantę amarus, horridus.

Dodonæus considerata fortē iconē Tragi tri- buit flosculos, denegat folia. Dicit namque in hist. Gall. quibusdam Belgis *Dogel* nesci / *Nid d'oiseau* est sine foliis, flores cum caule coloris ligni. Lobel. Icon. Plant. Nido auis ex specibus Saryrii abortiui, Orchis abortiui, Saryrium abortiuum, species Hypocisti.

Non dubium est Clusio quin Leimodori ad- numeranda sit, ea quā Lob. Orchidem aborti- uam Germ. Morgendrehen / Belg. Dogel nesci appellant, quāque nonnulli Coagulum Pluuii esse hariolantur.

Nidum auis inueni florentem mense Maio in monte *Bar* quod medio miliari à Montbelgardo distat, inuenimus etiam Maio in sylua Abietum, itinere Montbelgardo Porentruū ad radicem Abietis. Audio prouenire Basileę versus Augu- stam ad Rhenum: Tiguri cubitalem collegimus. Lobel. reperit in altis montibus *Senones* in Gallis Narbonensi cū specibus Dentarię, prouenit etiā in Belgio in syluis humidis. Hinc rectē Tragus, in Vliginosis & vmbrosis syluis nascitur Maio mēse.

OROBANCHE ET NIDO AVIS affine Pseudo *Auget* super Austriacum violaceum.



Auget super Au- striacum Clusio in Pannon. Pseudoleimo- doron in post. Hist. congene- rem plantam Orobanche, quā superna parte ipsam æ- mulatur in mō- tibus supra Ba- denses thermas obseruabat, quę nūquā antea, quod memine- rit, ipsi fuit cō- specta. Pedali assurgit illa *can- le*, frequenti- bus secundum radi-

radicem foliis, tanquā vaginulis, inuoluto: spica gestas florum quatuor foliis constantium, superiore in corniculum desinente, & promulscide quadam inter media folia prominente, cui adnatae sunt duae tenues barbulae: floribus striata & longa sublinea capitula, semine exili & Orchidum simili plena: lubrotundam radicem non habet, qualem suo haemodoro tribuit Theoph. l. 8. Hist. Plant. cap. 8. sed crassas, longas, & obliquas fibras habet, quemadmodum ea planta quae vulgo Helborines nomen obtinuit. Tota stirps saepe purpurea & plane violaceo colore praedita est. Floret Iunio.

Lobel, Belg. Ic. Pl. Vogelst. Nidus avis ex speciebus Satyri abortivi, Orchis abortiva. Satyrium abortivum, species Hypocistis.

Considerandum an Lobelius male suo Nido avis eam iconem adaptavit, quam etiam miramur diuersis locis & nominibus propositam sine descriptionibus, quasi iconem tenus tantum ei fuerit nota planta, vel perpendendum an duas plantas confundat.

DENTARIA APHYLLOS MINOR Tabernamontani.



Dentaria aphyllus minor. Videndum quantum differat ab Orobanche nostra alba.

Tenella est plantula Spithameae altitudinis, succulenta, alba, sine foliis: cauliculus articulorum quibusdam vestigiis distinctus videtur. Cuius summa st. sicut tenelli aliquot occupant, ad Orchidis flores quam proximè accedentes. Radix alba est denticulata. In montibus crevit Augusto.

Hæc Tabern. Icon. & Histor. Flein Faal Fraut.

ANBLATVM CORDI, SIVE APHYLLON.

AD Orobanches speciem quandam accedere videtur, hæc planta: quae ex radice multiplici, mira squamarum denticulatarum congerie stipata, alba, molli, & succosa, caulem erigit minimi digiti ferè crassitudine, dodrantalem aut altiore, teretem, succulentum, fragilem, tenui membrana vestitum, aquea pulpa abundantem: iuxta quem ex longis intervallis auriculæ quadam membranae foliorum æmulae prodeunt, aduersæ quidem, sed altera tantillum eminentiore. Tertiam & supremam coliculi partem flores occupant plures hiantes, eodémque modo, nutantes, & antorsum spectantes omnes, breui pediculo appensi, à quorum tergo pediculorum quoque exortum foliola muniunt. Floris colorem ex rufio vel purpura candicantem dicunt: mihi hæcenus non visus. Illis succedunt vascula A-

Tom. II.

uellanae ferè magnitudine, à pediculo ad media calice foliaceo subhirsuto, renello, succoso & quadripartito vestita, lineis quibusdam ac canaliculis quadripartita, semine terendo cum pistili minima æmulante, densissime facta, quod utrumque totum ingratum, papaverinum sed sextuplo maius. Tota ceterum plantagultu est aquoso acerbiusculo, non sine aliquo amaritudinis sapore, quæ tamen in semine magis conspicua.

Cordo hist. lib. 1. cap. 10. addita hæc annotatio à Gesnero ut puto. Anblatum Germinid est Aphyllon. Orobanche aliqui putant, non tamen ea, sed ei similis. Nos aliquando Plinii Aegolethron (quam herbam ni fallimur nostri rusticici die böß blum & den bößen heinrich,) esse putauimus.

Vult Dod. lib. frum. ad Limodori genus referendum Valerii Cordi Anblatum. Anblatum verò etiam Dentariam aliqui vocari scribit Marcholus. Cæsalpinus Dentariam vult esse Arachidna speciem: sed cum Theoph. Arachidna iudicio meo nihil comune habet: de qua inter Legumina sub Arachnida Honorii Belli.

Copiose repertum Anblatum in Montbelgardensi monte Sar: Medio Maio compertum in montibus vrbolis sub arboribus cundo Porentino S. Veranum: flores præterierunt & semina erant penè matura, transtuli in Hortum Ill. E. C.

Persistans est ad rupturas, si in pollinem redacta herba drachmarum duarum pondere in iunculo in quo Symplytum bullierit quadraginta diluculis continuis sumatur. Imponenda quoque herba ipsa fractura, debiteque liganda pars. Eadem ratione hausta vinetibus interitis, variis, que affectibus à defluxione ortis prodest. Magnus usus aquæ destillatæ in fluxionibus & Epilepsia, Camerarius. Adstringit, refrigerat & abstergit: Datu rpoluis in potu, ad effectus maticis & colicos, Cæsalp.

A R V M.
CAP. XXVIII.

VBosa Allii radice, bulbis adnatis, nititur, Beadida: à qua filia exiit, oblonga, triangula, sagitta dictæ, sed latiora, minusque alata, supra infraque splendens, sed hinc minus, inde magis viridantia, maculis nigris interdum respersa, gustu, ut & radice, acerrimo, & linguam cultelli instar transadigente: inter quæ caui surgit palmaris, teres, striatus, in cuius fastigio à membranae vagina longa prominet pistillum atropurpureum, infimâ parte apiculæ corona arête cinctum, sub qua racemus baccarum, per maturitatem miniato colore pictarum, denso stipato confertarum.

V un

Arum An-
guerum.



Ari folium,
inquit Theo-
phrastus, quod
admodum am-
plum spargi-
tur, est cum la-
titudine cau-
atque Cucu-
meraceu, cau-
lis, ut etiam
flos, nullus. Ra-
dix inter Ole-
rum genera
multo ma-
gis carnosa, la-
uis & crassa: al-
tera tenuis at-
que nervosa, ut
sanè quispiam
dubitauerit, an
inter radices
hæc poni de-

Lupha.

beat: A. quod autore Diosc. apud Syros Lupha
dicitur, folia emittit Dracunculi, longiora (codex
Balthazar. Anguill. ex cod. antiquo, Oriba.
& Crat. Anguill. a. Matth. omnia exempl. micro-
tera) paucioribus distincta maculis (a. m. m. a. i.
immaculata) caulem dodrantalem, subpurpu-
reum, pistilli speciei: a quo croceum semen (Dra-
cunculo minori conuenit fructus croceus Cæ-
salp.) radicem Dracunculi albam: Hoc autem
inter Diosc. spuria, alii Anguill. alii Syros, alii
Cyperii etiam uolunt dicunt.

Almon
Thymon
Dracunculus
Colocasion

Plinius de bulbis agens, Arum omnino sic de-
scribit. Est inter genera, inquit, quod in Aegy-
pto Aron vocant, Scyllæ proximum amplitudi-
ne, foliis lapathi, caule recto dum cubitorum,
baculi crassitudine, radice mollioris naturæ, quæ
edatur (estur CH.) & cruda.

Hermol. cui simpliciter Aros dicitur, quam
distantiam pro Aro intelligat non demonstrat. Hæc
à similitudine illa ad Dracunculum, ab Officinis
Serpentaria minor appellatur: itemque latus &
Aron.

Plin. v.

Plinium notant Marcellus & Cordus: ille
quod Aron cum Dracunculo confundat: hic verò
quod radicem magnam habere scribat.

Tragus tres tradit species: Vnum, Ari pri-
mum genus & vulgare. Alterum, inuolucro &
pistillo ex albo luteolo. Tertium Ari genus
cum nigris maculis. Deinde ait: Omnes vno
consensu Herbarii, tradunt eam herbam, quam
Germani Aron vocant, Arum esse Diosc. lib. 2.
cap. 162. quod ille Lupham, Alimon, Thymon,
Dracunculum & Colocasion cognominat. Mihi
verò non Aron sed Arum videtur esse. Arum
quod sugillata lituris folia profert fortasse exi-
guus Dracunculus fuerit. Arum nonnulli, Ser-
pentariam, Colubrinam, Dracontium mi-
norem nominant. Dicitur apud Simonem la-
nuensem, latus, Barba Aron, & Pes vituli.

Nō Arum.
Colocasion.
Arisarum
Dracuncu-
lus tenuis.

Serpentaria
Colubrina
Aron.

Figura Matthioli ficticia ex Bistorta Rumice
& bulbo.

Dracunculus
minor
Diosc.

Fuchsio, cui Dracunculus minor Diosc. vide-
tur Aron & Aris, latus Officinarum, Pes vituli,
Serpentaria minor, & quorundam Sacerdotis vi-
rile. Anguill. asserit nostrum Arum esse Diosco-
ridis, ac apud illum legendum uolunt & non pa-
re.

Arum, ait Amarus in Diosc. non ubique acre,
mitte Galeno; Dioscoridi candida radix, Plinio
nigra.

Arum describit Dodon. eiusque figuram exhibet,
ac secundo pro Dracontio minore pro-
ponit, quod quomodo factum sit, non oc-
currit.

Diosc. videtur, ait Turner. ostendere Aron in
sua patria, non fuisse admodum acre ac apud nos com-
penitur. Galenus quoque scribit Aron candidum
& siccum esse in primo: Quod autem apud nos
prouenit, calidum certè est in tercio, unde forte
dixerit quispiam, nostrum Arum, non esse Dios-
coridis & Galeni. Verum Galenus seq. verbis lib.
2. de alim. fac. duo esse testatur Ari genera, alter-
um mitius, alterum acius.

Aron vulgare, [aiunt Lob. & Penz Adu.] est
plebeculæ Barba Aronis, & Sacerdotis veretrum
aut mentula, racemo purpureo punicante minia-
tulo: foliis maculis nonnullis nigricantibus
insignitis, unde etiam Dracontium vocatur.

Gichereum seu Gigarum Cæsalpino vulgò ap-
pellatum, foliis maculosis, maculis candidis vel
nigris, corniculo pallescente fœdi odoris, fructu
croceo in ætate: radix tactu pustulas excitat.
Diosc. hanc Dracontium paruum appellat, quan-
quam quædam superflua in eius descriptione le-
gantur, assumpta ex altera Draconia, iis reseratis
apertiss. erit historia. Plinius Dracunculum vo-
cat, diuersum ab eo, quem vidit in Lusitania radi-
ce subrutilla, quam quidam ab Aro non distin-
guunt.

Arum vulgare, inquit Camer. horti. Aliud du-
riore folio, virente per totam ætatem, & aliud
grande, pistillo albicante, rotundiore folio,
itidem durante in multam hyemem.

Obseruauit C. Bauhinus Phyt. Aron vulgatum,
aliud folio maiore & acutiore, aliud rotundiore,
aliud duriore per totam ætatem virente. Sic e-
ius quod maximo est folio, ipsius folii venæ om-
nes albicant, quod apud Italos frequens, ali-
quando maculis albis asperguntur. Reperitur
quod nigricantibus lituris, aliquando purpureis
signatur: quod verò apud nos vulgatissimum nul-
lis maculis notatur. Sic & pistillus colore va-
riat, alteri purpureo, alteri ex albo luteo colo-
re est.

Arum. 2. offic. Germ. Aronfrucht / pfaßens-
pint / Teutscher Imber. B. Calævoer. Gall. Pied de
veau, Vit de chien. Ital. Aro & gigaro. Hisp. yaro,
foia de yaro. Angl. Cocholbpin vel Rampe / vel
Aron. Hung. Matragulya quibusdam.

Nomina
linguæ

Arum in Hetruria & in agro Goritienfi fre-
quentiss. prouenit in campestribus, in vineis, in
semitis propter sepes, præsertim in maritimis
Senensibus. In Bohemia in montibus quibus-
dam copiosum admodum prouenit minus, Mat-
thiol. Arum cum maculis nigricantibus ubique
vitarum, vix dum hieme exacta folia edic, Lo-
belius.

Locus

Aron Monspelii mense Martio & Februario
prouenit. Mense autem Iulio fructu vidi ferentē
ad formam racemi. Basileæ etiā abundat. In Italia
habet tres species Ari, v. a. cū maculis nigris, aliis
luteis, tertiam sine maculis, ut Patavii, ubi Ianua-
rio, Februario, Decembri, Martio: Ferrariæ cum
maculis nigris in monasterio S. Domin. à L'An-
geli, Bononiæ mense Aprili cū maculis pallidis in
monte Apennino è regione S. Mammarum: Geneuæ
passim in sepibus quæ sunt Lani virens Martio,
Montbelgardi passim in sepibus virens Martio,
Aprili producentis florem. Collectum in L'isse
spontanum. Cum nigris maculis plantauit in
hort. H. E. C.

Tempus

Quæritur

Querit Io. Fabr. quid causæ subfir, quod Aron, vulgaris aliqui herba in vicino illo (Curie Rhetice) tractu nusquam reperitur, cum tamen inde ad vnum milliare in maxima nascatur copia, responderi has aliasque causas ad occultam naturæ vim relictas, vel potius ad ipsum naturæ magistrum & artificem.

Ari autem radix, autore Theophrasto, cibo idonea est: & folia eiusdem (decocta in aceto mædi nimirum possunt,) suavis profectò, & ad fracta utilis.

His addit Dioscor. Radix etiam decocta estur, quippe quæ minùs acris sit. Folia verò ad esum conduntur, & arida per se decocta manduntur. Radix, semen, & folia eisdem cum Dracunculo vires obtinent. Priuatim tamen radix cum simo bubulo podagricis impolita prodest. Cæterum eodem quo dracunculi radix modo reconditur, ac in summa obmitionem quâ prædita est acrimoniam esui aptior est.

Plinius Ari vires medicas per longum exponit, quibus ex ipso recentendis supersedemus, eadem quæ habet ex aliis plenius tradituri.

Galenus ex terrea & calida essentia Arum constare dicit, & propterea extergendi vim habere, sed non fortem velut Dracontium. Esse igitur in siccando & caletaciendo primi ordinis. Radices autem eius maximè utiles sunt, inquit, & in cibo acceptæ crassos humores moderate secant, ut expuitionibus ex thorace idoneæ sint. Sed Dracontion ad hæc commodius est. Idem 2. de aliment. radicem Ari similiter ut Rapi edicit, ex aqua coctam, cum Sinapi aut aceto, oleoque ac garo: cum quibusdam item intritis, cum aliis, cum quæ ex casleo parantur.

Radix Ari, ut vult Tragus, eius maximè quod maculata habet folia, siue sicca siue recens tusa, ac ad minùs drachmæ pondere sumpta, remedium est præsentissimum ac minimè fallax aduersus venenum & pestem: quidam tantumdem adiungunt theriacæ. Succus herbæ expressus mensura cochlearis, aut maiore, potus, easdem habet facultates: quod si illi parum aceti admiscueris, quominus linguam vellicet efficit: Aron in puluerem redactum, ac interdum drachmæ pondere cum binis sacchari drachmis sumptum, suspensiosis prodest, crassam enim & lentam pituitam incidit, excreationes iuuat, pulmonum & pectoris vitia purgat & ad rissum est maximè utile: idè remedium stomachum phlegmate, & atra bile infectum purgat: radix Ari siue recens siue arida, tusa ac sumpta, mulieres à partu validè purgat, potestque hoc pacto & iumentis purgandis exhiberi: eadem succus expressus & aqua destillata possunt. Tradunt etiam aquam Ari destillatam ramices sanare, singulis vicibus binis vnciis aut minore mensura potam: ad pestem ac anthracem vix præstantiorem ac salubriorem herbam noui, ac folia Ari recentia impolita: eadem siue arida, siue viridia, ad inueterata & putrida pedum vlcera faciunt: aqua Ari & succus, quouis vetera vulnera purgat sanatque. Ari folia cum radice in vino & oleo decocta, infestationibus calidis hieus sanant, & sedem præcidente in retrahunt: nonnullæ mulierculæ folia Ari cateis vermiculis scærentibus imponunt, qui sit ut abactis vermibus casei hac ratione à corruptione vindicati diutius durare possint.

Non desunt, inquit Matth. qui radicibus Ari Calzolarii vtantur ad arcendos a suis mensis Parasitos, & voraces Lurcones, earum puluerem delicatis epulis admiscentes: nam ubi fauces oc-

cupauerit, tam contumaci ardore afficit, ne posthac quicquam vorare queat, nisi bubulo capillatæ lacte diutius gargarizato, aut recentibus butyro sensim deglutito. Abstergit Arum, attenuat, aperit, incidit & prouocat. Decocta radix melle excepta, medetur pectoris morbis omnibus pituitosis, expectorat enim valentissimè crassas lentasque excreationes, ideoque asthmaticos maximè iuuat. Datur elixa, vel teruentibus cineribus tosta, vtiliter ruffientibus, ex amygdalino oleo. Idque bellè quoque præstat lac potum, in quo radix ipsa fuerit incocta. Illinitur eadem, aqua prius elixa, epiphoris, sugillatis, inflammatisque tonsillis, fabacea farina addita, & defructo subacta. Subigitur quoque oleo, & tumentibus hemorrhoidibus cònode illinitur: Radicis succus exedentia & contumacia vlcera curat, quemadmodum & narium polypum (omnia vlcera succus, Plin.) folia ambusta sanant. Dantur vtiliter seminis drachmæ dux ad menses educendos, & secundas pellendas ex vino. Nostrates mulieres ex Ari radicibus stillatitias aquas ad fucum parant, quas ad faciem erugandam illustrandamque magnis laudibus effertur. Id quod etiam efficaciter præstat insolaris radicis succus, cerussæ speciem referens, quem Gerla vulgò nominant, is siquidem mirum in modum carni splendorem, & candorem conciliat.

Nunc quid Porta importeret videamus: Aron folia distincta maculis habet: deionestantium Lunæ macularum imaginè. Dantur vtiliter seminum drachmæ dux ad ciendos menses. In Aro sigacis naturæ artificio multiplici membrana municus fortis. Partus omnium animalium extrahit, naturæ ostio circumlitum (idem Plinius,) & seminis vel radiceis drachmæ dux in vini cyathis duobus sufficiunt, si à partu non purgatur, ad secundas trahendas. Effigies Ari fructus ibidem. Calculosis confert (Io. de Mont. expert.) Ari herbæ & radicis contusæ succus cum vini cochlearibus tribus, quinquies ieiuno ventriculo assumptus.

Pateet autem ex hæcenus dictis falsum esse, quod scribit Fallop. tract. de med. purg. simpl. dicens: Neuter Dracunculus, scilicet nec Aron, nec alter, qui nostris Serpentaria dicitur, est purgatorius, quæ nuius secundum opinionem Mesues purgât. Sed utriusque sit non sunt in usu. Sed liceat hic subiungere, quod Odor. verè esse contendit. Vsum, inquit, tempore suilabuli nihil edere certum est: quippe quod neque exeat & caprus ventis intestinoque inani videatur. Narrat eius intestinum, per inedia ita conuenire, ut adductum prope cohereat: Itaque Vrsus latebræ egressum, primum herbam Arum dictam degustare, ut intestinum laxetur, & hiet.

ARVM BYZANTINVM.

Cum ante aliquot annos huius Ari tuber cum aliis tuberibus bulbisque Constantinopoli allatis, Vienne acciperem, inquit Clusius, hærebam, vtrum ad Ari, an Arisari genus referretur: deinde cum folia proferre cepit, primis duobus annis pro Arisari latifolio habui, ducente me in eam sententiam foliorum quadam similitudine. Nam ea conspicebam satis ad Arisari latifolii folia accedentia, nec valde mucronata, sed potius orbiculatam figuram referentia: nec radicem valde dissimilem. Verum postquam ea augeri cepit, digitalem longitudinem adqui-

Descriptio



siuit, multis tuberculis inaequalem, & vnicalem aut ampliore crassitudinem, multasque proles adnatas habuit: folia item protulit longè maiora, ad Ari foliorum accedentia, nec illis minùs splendens & inferne: eius autem florem duntaxat videre contigit anno 1596. licet toto octennio antè alu-

issem, singulis annis nouo Vere emergentem, atque interdum etiam ante brumam. In Vernis tamen foliis quandam differentiam obseruabam, non quod ad formam & figuram attinet, sunt enim illa prorsus similis formæ, sed inæqualis in magnitudinis & (quod valdè mirabar) in quibusdam plantis, licet ex eadem matre abruptis, (unicum liquidem tuber Constantinopoli accipiebam) folia erant nigris aliquot exilibus maculis distincta, alia minimè: tum etiam flos colore variat, nam plantæ maculis nigris notata folia habentes, penicillum purpureum folliculo inclusum habuerunt, aliæ verò candicantem Maio mense anni 1596. Atque postrema folia ante brumam pletumque germinare solent, alterius nouo Vere duntaxat.

ARISARVM LATIFOLIVM
quibuldam.

CAP. XXIX.

Descriptio



DVorum, Delle Clusio, est generum Arisarum, tamen Veteres vnici tantum historiam posteritati reliquerint, Angustifolium scilicet & Latifolium. Hoc Hederæ aut Smilacis ferè folia habet tria, aut quatuor, viridia, mollia, sat tamen carnosà, acris saporis, oblongo pediculo innixa, anteriore

parte, quæ pediculo adherent vtrinque pinnata, Ari foliorum instar, sed obrusioribus & quasi orbiculatis angulis: inter quæ pediculus duas vncias longus, multis rubris maculis distinctus

emerge, cui oblongus flos insidet, monachalia cuculli, siue Aristolochiæ floris modo efformatus, amplior tamen, extremâ parte fusci coloris qui deorsum radiatim tendit, in cæteris albus, caninum olens, pistillum obtusum, incuruum, & veluti ex cucullo prospiciens continens: radix rotunda, globosa, Aro minor, foris nigricans, intus alba, aliquando etiam muberosa & oblonga, initio dulcis, deinde acris, minus tamen Ari radice (licet Veteres contra sentiant) fibris aliquot supra eam expansis, vt in Orchidibus, cuius genus etiam inuenitur paulò amplexibus foliis, & rotundioribus aliquantulum atque mollioribus, pluribus tuberculis se propagans, oblongasque & crassas radículas sæpius in latum & obliquum spargens.

Arisarum [ex Diosc. sententia] exigua herbula est, cuius radix Oliuæ magnitudinem implet.

Eius mentionem fecit & ipse Plinius. Aris [inquit] in Aegypto nascitur, similis Aro, minor tamen, minoribusque foliis, & vtrique radice, quæ tamen Oliuæ grandis magnitudinem implet: alba geminum caulem, altera, vnum tantum emittens.

Arisaron multò minus Aro esse Galenus ait, sed eodem acris, radicem verò Oliuæ magnitudinem habere: eadem verba vt assolet, transcripsit Paulus, nec plura de ipso tradiderunt.

Apud Hippocratem in lib. de articulis, legitur vox *arise*, sed non pro herba, verum pro instrumento scobina appellato. Galenus autem in glossis Hippoc. inquit *arise* pro *arise* vocatur, *arise* dicitur *arise* ne *arise* vocatur. Dicit itaque Galenus, non solum instrumentum, sed etiam herbam esse, quæ *arise* appelletur. Nec intelligendum est vilo aliquo loco, *arise* vocem, pro herba apud Hippocratem reperiri. Hec igitur *arise* *arise* an sit eadem quæ *arise*, pro certo affirmari non potest.

Arisarum nihil aliud, quam Aron paruum esse putat Cornarius, quid autem per Arum paruum intelligat non demonstrat.

Corruptum, inquit Hermolaus, nomen Arisari herbæ Medici, vt ab ipsis iam non Arisaros sed Asarus dicatur. Est & Aris herba Hippoc. nec qualis sit, & an pro Arisaro capienda sit, non constat. Arisarum Plinius Erim [Arum], sed, vt credit Marcellus, corrupta ex Arisaro voce, appellat. Dubitauit in Plinian. castig. Barbarus diminutiua ne forma non Arisaros sed Aris, quasi paruum Aron vocanda planta hæc sit. Sed vocandam Arisaron esse Paulus testatur.

Arisarum Veronensium Plinii Aris. Virentis Arisari magna copia Lobel. & Penam donauit Francis. Calceolarius. Idem in Adu. quod mirum ex Matthiolo iconem assumunt: ac applicant Arisarum suo Veronensium: Matthiolus tamen non dicit suum Arisarum à Calceolario missum esse, cur igitur Matthioli figuram adaptant suo Arisarum Veronensium, an quia Matthiolus dixit Arum minus missum per Calceolarium: cur in Belgio sarum describunt, aliter quàm viderint: flores tribuentes, quos non viderunt, quandoquidem ex radices quas dedit Calceolarius aliam formam asscunt: sunt progressu temporis, indicium est Lobelium & Penn. suam descriptionem concinnasse ad iconem Matthioli, quam pro sua ponunt præterito eius nomine, & non ad plantam quæ creuerit in Belgio: nec placet tanè libro Iconum Plantini, figuram Lobelii et Ade.

ex Adu. vel potius Matthioli, & iconem Clusii ponit sub vno titulo, ita vt sint vnius plantæ duæ icones. C. Bauh. Phyt. Arisarum Dioscor. Aris Plinio. Arisarum. 1. latifolium maius, Arisarum latifolium alterum Clusii hñt. Hisp. quod foliis est amplioribus, mollioribus. Arisarum 2. latifolium: Arisarum latifolium primum Clusii. Arisarum latifolium Clusii, nunc idem cum Natbonensi Lob. Obs. Idem apud Matth. Arisarum Matthioli. Dracunculus alter, seu Hexicophyllos Cordi. Cordi Dracunculus nobis diuersus est ab Arisaro Matth. & est Arum Mathioli, de quo capite de Aro.

An Cæsalp. Aron paruum quod in locis asperis nascitur, & inter saxa plurimum in monte Sancti Iuliani prope Pisas: &c.

Arisarum latifolium in collibus Lusitanie frequens salebrosis & lapidoso solo, in sepibus & iuxta vias: vbi Nouembri & Decembri floribus suis præditum erubam, inquit Clusius, atque etiam nonnullis Beturiz locis solo fecundo & pingui, secundum publica vias & hortorum aggeres, vbi Ianuario & Februario.

Arisari herba, autore Diosc. longè maioris est acrimonie, quam Arum. Vnde imposita non nascitur. Colliria item ex ipsa sunt ad fistulas. Corrupta eadem indita cuiusvis animalis pudentum. Medetur utraque [Aris Plinii] vlcerebus manantibus. Item ambustis ac fistulis, collyrio in nulla. No. nas sicut decocta folia in aqua, & postea trita rosacea addito. Sed vnum miraculum ingens cōtacto genitali, cuiusq; feminini sexus animal in perniciem agi. Amatus addit, multos tanquam pretiosissimo secreto apud Germanos inferiores contra pestis contagia vt, quod satis mirari non potest Clusius, quandoquidem eius tempore toti Belgio fuerit incognitum.

ARISARVM ANGVSTIFOLIVM.



Folia huius longa sunt, & angusta, instar ferè Plantaginis angustifoliae foliorum, viridia, splendentia, quina, aut sena, post quæ folia seu cucullus longior & mucronatus, reuersum inflexus & albicans prodeit, è cuius rima oblongus veluti vermis exilit, spithamæ interdum longitudine, inflexus, coloris aut purpurascens, aut ex purpureo virescens, non ille quidem obtusus extrema parte, sed mucronatus: fructus racemi instar confertus, albus (non ruber, vt quidam, qui non obseruauerunt, prodidit) vix terra emergens suo tempore subsequitur.

Huius picturam Matthioli. sub titulo Arisari alterius exhibet, non quod probet, non enim verum putat) sed vt de hoc aliorum etiam sit iudicium.

Tom. II.

cium. Lonic. Diosc. & Aroen: Hisp. fragiliter perna, id est Fraterculus: Mundphod en, vulgò genitale Monachorum. Cæst. Duranti. Pseudoarisarum. Clus. Hisp. Arisarum alterum & Arisarum angustifolium. Gesner. de hortis, Arisarum. Angustifolium. epist. 11. p. 176. Arisarum foliis angustis. Lobel. Arisarum angustifolium cum fructu racinoso albo & corniculo purpurascens. Icon. Pl. p. 559. Arisarum Angustifolium. C. Bauh. Phyt. Arisarum 4. angustifolium. Idem apud Matthioli. Cæsalp. Arisarum, corniculo cum sua theca purpureo.

Lobel. in hortis Belgicis, Gallis, & Anglis colitur. In Ericetis & Filicetis Liguria provenit. Anguillarius Matthioli Patavio militi, qui testatus est plurimum nasci in agro Romano: Hinc confirmatur quod Cæsalpinus scribit, inter sepes non longè ab vrbe Roma inueniri. Clusius ipse nascens, (vt ego qui secum solum habeo foliū, quod Cortulus Patavii communicauit, non vidit, sed delatum in hortis alij, vbi florēt Veret at Julio & Augusto sine foliis fructum profert. Vix magis est latifolio Arisaro, neque tanta cura indiget.

Locut. scripta

DRACONTIVM SIVE DRACUNCVLVS
Veteribus & in genere.

CAP. XXX.

De uortia puydan (inquit Diosc.) aliis Aron, aliis Ifaron, aliis Iaron, aliis Hieracium, [inquit] aliis Biaton, aliis Harmiagtion, aliis Cyperis; Romanis Colubri, aliis Mauraria, aliis Singigialior: Caulem habet leuem, rectum, bicubitalem; baculi crassitudine, varium colore, vt Draconi similis sit, purpureis maculis abundè respersus. Folia fert Lapathi figura inter se impleta. Fructus producit in summo caule racinosum, cinerei primū coloris, vbi verò maturus croceus ac puniceus. Radicem habet magnam, rotundam, albam, cortice tenui obductam.

De minore verò Dioscor. sequentia prodidit: Sparnion, Dracunculus (alter Marcell. Dracuntium minus Hermol.) folia habet Hederae figurā, magna, maculas albas habentia, caulem rectum, bicubitalem, varium, anguem referentem, purpureis maculis respersum, crassitudine baculi: quæ de caule hic posita, superflua sunt. Cæsalp.] fructus in summo racemosus, colore primū quidem herbaceo, maturus autem croceus, gustum mordens. Radix quodammodo rotunda est, bulbi speciem referens, Aro similis, corticem habens tenuem.

Plinius, qui Arum cum Dracontio confundit, plura eius genera facit. Nec sanè caret difficultate, ni quoque confusione scatur, quod sparsim Aëtius de Dracontio prodidit.

Dissonant aliquantum in hoc genere Scriptores. Alii Dracunculum ab Aro separant, Alii idem existimant: Theophrastus Aro putauit genus esse sub quo species plures continerentur Dioscor. quatuor videtur fecisse genera. Dracunc. maior. Dracunc. minor. Aron. Arisarum: Serpentariam sunt qui vocent. Est & herba apud Hippocratem Ophis vocata cuius semen mulieribus medicinis vtile dicit. Quæ an eadem sit cum Dracuntio satis non constat. Idem Hippocr. Candidam radicem cum nominat Dracuntii radicem, vt Gal. vult, intelliges. Galenus, Paulus, Apuleius, Serapio, non nouerunt alteram & in-

Vnu

Dracunculus
Drac. sup.
Dracunculus

morem Dracunculium. Accredit Marcell. vnum tantum à Dioscorid. traditum, quamvis in cunctis & antiquis, Græcorum codicibus vtrumque eius caput legatur. Nos vnum tantum Dracunculium nouimus & qualem exceptis foliis Diosc. in vtroque capite describit: nouimus & Aron. Quam Plinius triplex Dracontium sibi demonstratum esse dicat, Galenus autem vnum tantum norit, idque Aro simile videtur Cornario in Diosc. supposititium esse alterum caput, quod Dracunculium maiorem describit, ideoque ipsum hoc loco exemit. Nam omnino de eodem eadem traduntur, sed diuersis verbis, ut ex alio Scriptore id caput adscriptum esse appareat. Multi apud omnes tandem momenti sit, quod ut Lugd. refert, in vetustissimis Latinis codicibus, vnicum duntaxat habeatur Dracunculi caput, alterius vestigium nullum.

Dracontia duo, præter terridum, quod in aquatilibus locis gignitur, facit Dodon. maius & minus, & prominare, quod non conuenit, Ari figuram proponit.

Apulcius Dracontion Draconteam appellat, & multa eius peregrina adfert nomina, quæ an maiori vel minori aut vtrique conueniant, non explicatur: ut Pythonion, Asclepias, Anchomanes, Sauchtomaton, aut Saucromaton, Therion, Schoenos, Dorcadion, Thyphonion, Crocodilion, Theriophonon, Eminon.

Alterum caput, Dracontii maioris nomine inscriptum, quod merito à nonnullis inter Dioscor. notha repositum est, tanquam legitimum agnouerunt, Oribasius, Marcellus, Matthiolus & Amatus Lusitanus; ac illud quidem priore loco collocant, hoc verò posteriore. Ego verò [Anton. Sarrac.] cum Serapione illud alterum, quauis in codicibus nonnullis occurreret, cōsulens prætermini, tanquam supposititium, & ex Crateo, aliue fortasse cuiuspiam scriptis perperam contextui Diosc. adiectum: maxime cum in vtroque capite diuersas quidem vtrunque voces, & ynam tamen eandemque historiam animaduertentem. Si etenim singula expendamus, vix aliud occurrit discrimen, quam quod Dracontii folia Diosc. hederæ comparat, ille quisquis sit, lapathum: itemque colorem fructus à principio herbaceum agnoscit Diosc. [falsò enim in Aldino exemplari & apud Orib. *χαλκός* legitur, *αἰνὴ τὴν χαλκὴν*] ille *χαλκός*, hoc est cineraceus. Sed fortasse Diosc. ad folii colorem, leuorem, firmitatemque: ille ad eiusdem longitudinem respexit. Cætera, siue descriptionem siue vires species, ferè consentiunt.

Porro si duplex est Dracontium, quemadmodum Veteres testari videntur inscriptiones, maius inquam & minus: maius Dracontium id agnoscere possumus, quod in plerisque hortis visitur, Autoris nostri descriptioni aptè conueniens: minus verò, Aron passim circa sepes nasci solitum: Sic enim Serapio Dracontii duo constituit genera, vnum quod Dracontium simpliciter, alterum quod Aron appellaretur: ac idipsum innuere quoque visus est Theophrastus tradidit Dracontii genus quoddam Aron appellari. Attamen quoniam cognatæ ac congeneres sunt hæ plantæ, ac vtriusque etiam hisdem prædictæ, earum nomina nihil mirum apud Plinium & alios rei herbariæ Autores ferè omnes passim confundi: quod vel ante sua tempora factitatum testatur est ipse Plinius, lib. 24. cap. 16.

Dracunculus & *Dracontia* siue *Drac.* Diosc. Lat. quibusdam *Serpentaria*, *Dracontium* & *Colubaria*: Arab. *Luf*, *Alluf*, Germ. *Schlangentrane*

Dracunculus & *Dracunculium* Belg. *Serpentaria*, *Dracunculium* / Gall. *Serpentaria* ou *Serpentine*. Lat. *Dracunculæ*, *Serpentina*: Hispan. *Tragopuntia*.

Nomen quidem *Schlangentrane* (*Serpentaria*) à figura sumpsit: caulis enim glaber purpureisque respectus maculis, versicolori facie corpus anguinum repretentat: vel à cauda, quæ illi subrutilla est & Draconis imitatio modo, inquit Herinolaus.

Dracunculus maior & minor Dioscoridis in vmbrosis circa sepes & macerias gignitur. Colligitur dum maturascit, & succus exprimitur siccatque in vmbra. Radix quoque messibus (*Hordeum* maturascente, Luna crescente Herinolaus.) eloræque particulatim concidi, & funiculo transfixa siccat in vmbra, atque ita recondi, solet.

Mayor Diosc. Dracunculus excalescit cum commixto vino. Elixus & tostus è melle in eclegma datur Orthopnoicis, tussientibus, ruptis, conuulsis, distillationibus piruitæ. In vino sumptus cupiditates ad Venerem mouet. Vlcera cacothæ: phagedænaeque sanat subactis cum melle aut illius: maxime si cum vite misceatur alba. Collyriis quoque vtuntur ex eo factis ad fistulas cum melle. Item ad partus eliciendos. Vitiliginis cum melle abigit. Polypus in naribus & carcinomata omnium generum dissipat. Succus ipse oculorum medicamentis ascescit: caligines, nubeculas, & albugines discutit: herba & radix grauidis, quæ recens conceperint, abortum olfactu inferunt. Idem præstat triginta seminis granarum, vtique si bibantur in posca. Quidam succum infundere cum oleo aurium dolori. Folia seu spissantia imposuere vulneribus etiamnum cruentis, sicut in vino decocta perniciosa habentibus. Eum qui folia manibus contriuerit feriri posse à serpentibus negant. Radicem quoque omnino habentem effollam animalia eadem fugiunt.

Expressus verò è minoris Dracunculi semine succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum abluunt: carcinomata illius sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt, odorem autem postquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare: radix excalescit: orthopnoicis, ruptis, vullis, tussi, distillationibus, auxiliatur: humores pectoris excreta faciles reddit, siue cocta tostaque cum melle, aut per sese edatur, siue fatina eius ex melle delingatur: vrinam pellit, Venerem excitat, cum vino potus, Phagedænas vlcera, & quæ cacothæ vocantur, tritus cum melle & Bryonia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipso ad fistulas & eliciendos partus fieri solent: qui radice suas manus perfricauerunt, à Viperis feriri negantur: illita ex aceto vitiliginis emaculat: tolia recentibus vulneribus linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decoctus in vino perniciosis appositus prodest: casus foliis inuolutus, à putredine defenditur. Succus radiis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctæque, ad sanorum vsus, pro oleo recipitur: in Gymnasis insulis, quæ Balears vocantur, coctam radicem cum melle multo in conuiuiis placentarium loco offerunt.

Dracuntium teste Galeno, quiddam Aro persimile obtinet tum foliis tum radice: cæterum illo tum acius, tum amarius: ac proinde calfactorium magis & tenuiorum partium: habet etiam

Locus

Vitis

loni-

leuicillam quandam adstrictionem: cetera ad eadem ferè cum commendat ad quæ Dioscorides: addens fructum valentiorum esse non foliis tantum, sed & radice.

Idem Gal. 1. de Aliment. Dracunculi æquè atque Ari radices bis terne elixatas, iis interdum in cibo offerri tradit, quibus crassorum lentorumque humorum copia in pectore pulmonibusne congesta est. At Theophrast. lib. 7. hist. stirp. Dracontii radicem ad cibum ineptam ac prorsus medicamentosâ facultate præditam esse tradidit, hisce verbis: Radix Dracontii, & esui inepta & medicamentosa existit.

DRACUNCULVS MAIOR VVLGARIS.

Descriptio



DRACUNCULO maiori profundè in terra depa-
ctaradix est ferè orbiculata,
volam implens, cuius lateribus
parui bulbi plures, quibus se
propagat, adnati consue-
runt, foris colore buxo, intus
candido, sapore feruido: *caulis*
unicus, rectus, pollicaris &
crassior, cubitos duos altus,
miraculosa colubri tergora

assabre mentiens. è tunicis conuolutis constans: ipsa verò folia pediculis dodrantalibus fungosis donata, in segmenta digitata finduntur, lauore & splendore Ari, crassitie & colore parit: è quorum medio eluctatus *caulis* vix digiti minimi crassitudinem æquat, è cuius scapo vagina pedalis exit, colore foris herbaceo, intus in purpura rubente, è sinu pistillum promens nigrum Ari pistillo maius, in mucronem acutiorem desinens: subsequitur fructus racemosus, granis per maturitatem rubentibus: Odor floris valde feridus.

Mach. ut.

Vtrumque (si Diis placet) Dracunculum Tridenti & Venetiis vidit Matth. Alterum quidem seu minorem & omnibus vulgarem, dicit esse foliis Hederaceis, albis quibusdam maculis conspersis. Nihil video similitudinis cum tohis Hederæ in Dracunculo maiori vulgari, quicquid dicat Matthioli, repotens Dioscor. verba pro te à se visa, idque suo more.

Amato addita est per Constantinum icon Dracunculi Fuchsi, non tamen existimo Amatam hunc tradere, quin puto nescire quid scribari.

Scribit Anguill. Veteribus fuisse duo genera Dracunculi, ex Crateua additum Dioscoridi caput de maiore, quod non sit ex textu demendum ut adulterinum. Dracunculum hunc maiorem esse Serpentinam nostram communem, nec hanc esse Dracunculum minorem Diosc. Videri Theophrast. de hac Serpentina communi loqui lib. 7. cap. 11.

Diosc. 1.
Dracunculus
Diosc. 1.
Dracunculus
Diosc. 1.
Dracunculus

Dracunculi seu Dracontii aut Serpentinæ Species duas statuit Gesner. hort. cuius vnam in appendice tradit, quam vocat Dracunculum minorem.

Theophrastus
Dracunculus
lib. 7.

Dracontia, Serpentina maior quin sit Diosc. Dracontium maius (aiunt Lob. & Pena) nullus inficias ibit. Nec vniuerso tractu Græco vlla alia Serpentina &c. Nouellæ plantæ potuerunt Plinio persuadere plures ut constituerit species Dracunculi, miscerèq; Ari ac Arisari cognatas differentias, ut in Bechio aliisque locis illi contigit. Nec alterius plantæ videtur geminata descriptio apud Diosc. sed ab alio quopiam, paulum diuersè descripta.

Diosc. 1.
Dracunculus
lib. 7.

Tabern. icon. Dracunculus minor. Klein Dracunculus, aut Schlangenkraut.

Gerard. Angl. Dracontium maius, Great Dracunculus.

B. Bauh. Phyt. Dracunculus. 2. polyphyllus, qui Diosc. maior videtur & Plinii. Apud Mart. idem.

Dracunculus maior apud Flandros & Gallos, Italosque, procerè crescit, inquit Amatus. Nos variis locis obseruamus.

Testis est Lobelius in Anglia aquam è foliis Dracunculi stillatitiam cum aqua Dracunculi esculenti, grassante peste, in viu esse ad sudores prouocandos, si vtriusque ʒss. cum Theriaca ʒj. sumatur. Dracontium calidum & siccum in secundo ordine esse dicit Amatus, & alium quoque tenere, idque experientiam quotidianam indicare, idèque Manardum minus benè Mesuem taxare certum esse. Dracunculum vim habere aduersus serpentes scribit Io. Fabr. cuius rei argumento esse possit, caulis eius lauis, versicolor, maculis purpureis distinctus, ita ut angui similis videatur, quin & florem habere mirabilem, ori hianti exsertaque linguæ similem, sicut & Aaron. Reliquæ vires antè traditæ fuere.

Vires!

Mand. de
repreh.

DRACUNCULVS AQUATICVS.



NON bulbosam e-
lior. am Dracuncu-
culorum Ari-
que more, ra-
dicem habet,
sed digitalis
crassitudinis,
perlongam,
geniculatam,
transuerso situ
limoso palu-
strium locorum
solo incumben-
tem, cui figitur
ex articulis de-
missa fibrarum
sobole nume-
rosa, bostry-
chi seu cinci-
ni instar. Folia
eiusdem ena-

Descriptio

scuntur geniculis dodrantalibus hærentia, Hederaceis paria, figura quoque similis, nullis per ambitum angulis, in acumen desinentia, polita, venosa: in folii sinu, quod summo cauli innascitur, racemus comprehenditur, ei similis quem Aaron profert.

Bellon. Obs. lib. 1. cap. 18. Dracunculus folio hederæ. Apud Cardam in Dioscor. quidam ad-

Vau 4

notat : Est ex alia species Dracunculi. Plinio wasser aron. Cordus in hist. lib. 1. c. 18. Dracunculus palustris. Fuchf. Icon. Dracunculus Plinii tectius, wasser Schlangenfräut. Matth. Epit. cum Camer. addit. Dracunculus aquaticus, Italis *Serpentaria aquatica* : Germ. wassernatterwurz. Turn. Dracuntium tertium variis in locis Germ. prouenit, ubi vocatur *Flein Schlangenfräut* / in Anglia uero minime. Gesner. hort. Aron palustre Coldenb. Camer. Hor. Dracunculus aquaticus Plinii. Castor. Dnr. Dracunculus aquaticus Italicus : *Serpentaria aquatica*. Dodon. Gall. Dracunculus palustris, quibuldam Arum palustre. Gall. *Serpentine d'eau ou aquatique*. Belg. *Drackenworecle*. Germ. wasser Schlangenfräut / wasser Drackenwurz / hist. Lat. in fol. p. 329. Dracunculus aquaticus & palustris non abs re. Perperam uero Hydropiperi rubens dicitur. Describitur istud Dracuntium à Plinio l. 24. c. 16. & tertia eius species est. Lob. & Pena Adv. Aquatica Anguina siue Dracunculus. Ic. plant. Dracunculus arundinacea radice Plinij. Hist. Lugd. Herbarijs Dracunculus palustris, quem Arum palustre alij vocant. Gall. *Serpent d'eau ou aquatique*. Tabern. Ic. Dracuntium palustre, wasser Drackenwurz. Gerard. Angl. Dracunculus aquaticus, wasser Drago.

C. Bauh. Phyt. Dracunculus 3. palustris, arundinacea radice Plinij. Item apud Matth. Dracunculus aquaticus.

Dracunculum aquaticum vidi anno 1595. mense Iunio in orto D. Sprengeri, postea habui Argentor. ex plantis siccis D. Aggerii. Fr. etiam C. Bauh. misit pulchram plantam siccam, quam accepit Hamburgo, Nascitur uirginosis palustribusque locis, & in ipsis paludibus ac pigris camporum riualis : solo macro & putrido maxime gignitur : pingui uero & humido nondum mihi uisa est nasci : Cordus. Iuxta riualos & libentes aquas frigidarum & calidarum regionum, ut in Belgio, Northmannia, Apuleia, & Hispania Granata, sponte emergere asserēbāt nobis, qui in hortos suos transplantarunt : Lobelius.

Facultas huius Dracuncii aquatici, aliorum, atq; ipsius Arii similis est, sed minus potens, minusque efficax videtur, Dodonæo & Matth. in Epitom. autoribus.

COLOCASIA.

CAP. XXXI.

Descrip.



Radix ruberosa duplex, altera alteri imposita intercedere ceruice, ut lagenam imitari videatur, alba, vesca, fibris aduatis se propagans : Julia terna aut quaternaria, Nymphaeae fœtorū figura & magnitudine, longis utrinque subrotundis albis, similiter donata, et alia

læuia, sed aversa parte nerui obliqui in margines excurrunt crassiusculi, à neruo per longum discussante producti, quos uenulae intercedunt undatim, pediculus autem crassus non extremo folii, sed aliquot digitos integro folio interitur.

Meminit huius Theophrastus lib. 4. cap. 10. de plantarum historia, ubi ita scribit. Faba Aegyptia in paludibus, stagnisque exst. Caulis eius, qui longissimus, quaterna cubita perficit : crassitudo digitalis est, similis calamo molli, non geniculato. Rimas intrinsecus habet tendentes per totum, lili modo. Caput in cacumine orbiculatum, vespertinum fauō non absimile, inque singulis cellis singulae fibræ continentur, paulo super id eminentes, multitudine plurimum terdenz. Flos papauere duplo maior colore roseus in plenum caput. Super aquam folia ad singulas fabas amplexa exeunt. Fabam quamque conterenti amarum illud, ex quo pilula fit, inflexum patescit. Fructus ita se habet. Radix illi crassissima, harundine plenior, rimas similiter atque caulis habens : manducatur & cruda, & elixa, & assa : coque cibo, qui incolunt paludes, vruntur. Nascitur itaque sponte vel plurima, ceterum & seritur in limo paleis largè admixtis, ut descendat, in eorumque maneat licque fabeta faciunt. Si autem semel apprehenderit, perpetuo manet. Radix enim valida est, nec procul harundinum stirpibus, uerum spinis subhorres. Quamobrem eam Crocodilus refugit, ne occurrens oculo offendatur, quoniam acutè non uidet. Nascitur hæc etiam in Syria, Ciliciaque. hæcenus Theophrastus.

Hanc amplissima emittere folia tradidit Plinius libro 21. cap. 15. ubi sic inquit. In Aegypto nobilissima est Colocasia, quam Cyathon vocant aliqui. Hanc à Nilo metunt : caule cum coctus est araneoso in mandendo : thyrsos autem, qui in folia emicat, spectabilis : foliis latissimis, etiam si ad arbores compareretur, ad similitudinem eorū, quæ Personata in nostris annibus vocantur. Adeoque Nili sui donis gaudent, ut implexis Colocasiae foliis, in variam speciem ualorum potare gratissimum habeant. Scribitur iam hæc in Italia. hæc Plinius.

Aegyptia Faba [ut Galenus auctor est libro primo de alimentis.] licet nostratē magnitudine longè præcellit, ita & naturam humidiores, magisque excrementiciam sortita est.

Colocasia, quæ Aegyptiis *Culcas*, nemo floribus vel fructibus uiquam præditam uidit : unde semper n. altum miratus est Alpinus Dioscor. Aegyptiam fabam flores atque fructus ferre, & eam item Colocaliam esse prodidisse.

Arum Aegyptium, Aegyptiis hodierno die Colocasia nuda, Camer. hort. Viennæ, in alterum annum egregiè uirebat, totaque planta acerrimè erat saporis.

Fabam Aegyptiam Matth. eandem cum Colocasia vulgò dicta nostro seculo non dubitamus esse, quamuis Matth. duas asserat diuersas plantas. In Faba eius Aegyptia, flores & semina ad descriptionem picta esse asserimus, donec nobis aliquis ostendat plantam cum foliis Colocasiae vulgaris & eum similibus floribus & seminibus.

Arum Aegyptium Gesner. horti eruditiores quidam, ut Guilandinus & Marantha esse docent, quod aliqui super pro Colocasia habuerunt. Matthioli hanc Fabam Aegyptiam existimauit.

Ari speciem illam [inquit Marantha] quam Aegyptium Arum eruditiores appellant : Colocaliam

Culcas.
Diosc. mar.
Faba Aegyptia.
Colocaliam.

Arum Aegyptium.

etiam bona pars materiz medicæ Professorum esse omni assuefactione affirmat, quæ cum in Aegypto, nec non in Sicilia (vt audio) perfectissime crescat, omnēsque sui partes compleat: in Italia tamen neque semen, neque florem, neque etiam caulem vnquam [quāuis diuersis locis cōstita à multis sic] vel certè rarò proferre est visa: hinc effectum est, vt eos multi acriter damnarēt, qui illam esse Colocasiam contenderent: nisi hoc solum argumento, quòd hæc planta caulem non proferat [quod non loci ratione, vitiòque, in quo hæc formatricem vim debilitissimam habet, neque vterius quàm ad folia ædenda extendi potest, sed suapte natura euenire existimabāt,) quasi verò si caulem proferret, Fabam Aegyptiam dici debeat. Ergo hi rectè quidem [vt mea fert opinio] illos reprehendunt, vt qui in errorem delabantur: sed non recta reprehensione vtuntur: quahdo illa planta inter Ari species retensenda omninò sit: quod ex foliis & flore, quem nobis licuit videre, à Luca Ghino viro nobis inprimis charissimo, dum viueret, missum: qui, præter magnitudinem, nullam ab Ari flore dissimilitudinem habebat.

Anguillar. qui Colocasiam nostram asserit Fabam Aegyptiam Theophrasti: eorum argumēta refutat qui aliter sentiunt: ridet aliquos qui attribunt semini quas Dioscorides radici &c. De radice spinosa aliter scribit quàm Bellonius. Obscuius verba hæc sunt: Colocasia in Creta & in Alexandria proueniens nominatur etiam Lotus & Fabā Aegyptiam. Perquisiuius cur Veteres vocarint Fabam Aegyptiam cum nullas Fabas ferat. Erroris occasionem inuenimus, nempe quòd Herodotus de duabus plantis locutus sit ad Nilum prouenientibus, quarum vna radicem habebat, rotundam quæ erat Colocasia: Altera in capite quodam ferebat quiddam Oliuari nucleis simile: reliqui post eum auctores alter alterius vestigia sequentes ad arbitrium deinde descriperunt. Nam quod Theophrast. radicem illi spinosam tribuit, rem aliter se habere experientia ipsa docet. Diolc. Fabam Aegyptiam describens Theophrastum ferè secutus est, & vtrumque interpretatur Plinius. Facessant, inquit, Clusius qui Colocasiam siue Fabam Aegyptiam, esse negant, quia flore & fructu caret, sed Arum Aegyptium esse cerebrose & pertinaciter contendunt. Item apud Garciam: Inham Lusitanis vocatur planta quædam amplissimis foliis, etsi nonnulli Arum Aegyptium esse censeant, Colocasia potius nobis videtur.

Lobel. & Penz Adu. Fabam Græcam & Aegyptiam apprimè olim innouisse Theophrasto & Dioscoridi certum est. An vero sit ista quam Commentator sibi persuasit, fides sit penes Bizantiam picturam, quam substantiant aliqui. Nos flores (legendum folia) & bulbi, Aronis speciem esse monuerunt. Et vtinam otium non defuisset Matthiolo, quum illi ostēdebatur vera Colocasia, nã ille accuratius stirpem verbis expressisset. Lobel. Obs. figuram habet hoc titulo, Colocasia siue Fabæ Aegyptiæ species, Arum Aegyptium Dodon. & Recentiorum, Hisp. *Maná de nuestra Señora*, Icon. Pl. p. 59. Teut. 706.

Hist. Lugd. Lotus Aegyptia Dodon. Bry fractes Ind. Orient. par. 4. Icon pag. 15. Talasse, Arum Aegyptium Colcaz.

Dodon. in fol. pag. 326. & pag. 563. eam sub Aro Aegyptio & sub Loto Aegyptia pingit & describit, inquit C. Bauh. apud Matthiolum.

In Creta ad maguos riuos copiosam reperit

Bellon. Colocasiam spontè sine culturâ prouenientem. Aegyptii quotidie ferè vescuntur radice Colocasiæ, quæ per totam Aegyptium magni est reditus: nihil venalius, inter Gazaro & Rama: inuenit idem Colocasia abundantem plantitiam quam aquâ ex puteo rigabant. Et hæc quidem sparsim traduntur à Bellonio. Apud Aegyptios non secus quàm nostri (inquit Alpinus) Rapis, agri Colocasiis pleni, abispectantur. Belgio satam hiemis scuitia deleuit. Frequens est multis Lusitaniz locis circa riuos, ex Africa primum eò delata: vidit Clusius etiam omnium maximam & amplissimis foliis Hispali in horto arcis Regiæ, vbique tamen & florem & fructum ferre negabant. Rauuolf. qui illam toto anno venalem Tripoli Syriæ conspexit, vt quæ incolæ frequenter vescantur, & tanta copiâ in Halepo coli asserit, vt eius radice, non minor numerus hominum alatur, quàm in Germania rapis, licet illis, & flauâ pastinacâ non careant: addit in riuiulis spontè nascentem obseruasse, florem auein vel fructum nunquam vidisse. Nullis etiam bladiis florem posse prolici tradit Lobelius. Colocasia est nobis in horto Ill. E. C. Montheig. Sturgardiâ delata, quæ facillè se propagat, verùm Hieme reponenda.

Aegyptii Culcas radices in iure coctas atque aliis multis modis in cibis paratas aliqdē esitæ, & eas tum crudas, tum coctas lib. nuss. Veneri indulgentes mandunt, quia putant cum se uen multum gignere, tum libidinem præcipuè excitare, Alpinus. Per Lusitaniam valde à mancipiis Aethiopibus expetitur, eaque cruda & cocta vescuntur.

Aquam concernans planta.

Apud Siberos nationem Americā inuenitur radix quæ supra terram eminent, amplissima habet folia, in quibus aqua continetur, non secus ac si in vase aliquo asseruaretur, vnguanare facillè non possit. Quin & ex radice dimidium sepe cantharum aquæ expressit, Benzo.

In regione Saboris repetit Vlk. Schmidel. de nauig. Amerinò. paucis in locis radicē extra terrā protuberantem, quæ magna lata gerebat folia, aquâ referta, quam continent in tempus nec facillè effluit. Singulæ radices singulas ferè mensuras dimidiatas continebant.

HETICH THEVETI. CAP. XXXII.



Hetich theveti. Le autote Theueto de Gallia Antarchica c. 53. duo repertuntur generatim coctura flauescit, mali Cydoni instar; alterum vero albescit: vtrique folia sunt Maluacea: semen vero nullū fert: quo fit vt syluestres isti Americani in taleolas discissis radicib. & terræ denud commissis propagent;

Florem ferè
re negant.

Vires &
Vitis

Ad Veneri

Radices &
quam rad-
dentes.

Locum

Defect

Faba Adu.
Adu.

Obs.

Palas.
Arum Adu.
Colcaz.
Dodon. nat.

Locum

Americano solo frequentes sunt hæc radices. Non aliud ferè Americanis in vsum cibarium eedit: itaque æquè vulgaris illis ac nobis panis.

Ocimum Pl.
Herich Americum, Ocimum esse Plin. lib. 21. c. 14. putat Dalech. apud Hist. Lugd. pro quo apud Theoph. lib. 1. hist. cap. 11. mendolè legit Vingum. Sic Plinius: Mandunt & Ocimum, cui pauca folia minimaque, verùm radix magna. Theophr. verò folia eius magna, germen breue, & x[?] non ut Gaza pusillum.] radix longa, sapore præstanti cibo idonea, quæ pro fructu colligitur, cum amnis in alueum redierit, eoque Deorum aras coronant. Quæ autem Theophr. folia ampla, Plinius pauca & minima dixit.

Robert. Const. in Theoph. vocem *Herich* corruptam dicit à voce *Her* Theophr. ac depingi in Americæ Obs. quomodo describit Theoph.

C. Bauh. Phyt. Rapum Americanum.

FAALIM THEVETI HELENIO

foliis similis.

CAP. XXXIII.




A Vchore Theueto Helenio, foliis præsertim; similis est herba quæ *Faalim* vernaculâ linguâ nuncupatur in Mom-baze insula, quæ olerum optimorum & simplicium med. omnis generis feraciss. atque eorum potiss. quæ venenis serpentium omnium, quibus regio hæc abundat, ad-

versantur. Huius herbe experimentum se vidisse ait in duobus commoratis a serpente, partim in terra degente, quâ illic *Alesah* vocant: cuius morsus adeo lethalis est, ut nisi statim succus huius herbe admoueat necesse sit hominem interire.

Hist. Lugd. Faalim Theuet.

BATATAS. CAP. XXXIV.

Tria huius plantæ sunt genera, quæ Batiam peragrans obseruabam (inquit Clusius hist. poster.) colore externo inter se differentia, etiam gustus suauitate: nam aut cortex externus quodammodo rubescebat, siue purpurascens erat & hoc genus præstantissimum iudicabatur, aut pallescebat, aut albus erat: singula tamen genera albam interius carnem habebant. Producent autem illa Cucumeris siluestris modò *sarmenta* humani digitata, satis crassa succulenta, læuia, quibus inhaerent folia utcumque carnosa, ex viridi canescentia. Ari foliis, seu potius Spinachii, haud dissimilia: *storem* an *fructum* ferat, è nemine intelligere potui; *radice* autem sit satio: ea plerumque dodrantalis est, grandis raphani nonnunquâ amplitudine, nam memini Londini me inuente



anno 1591. recentes admodum, & optimi quidem generis emere, quarum vna libram & amplius pendebar, inæqualis, cui raræ & breues adnatæ sunt: veluti fibræ: binæ autem, ternæ, vel plures ex eodem tanquam capite dependent aliquando radices, Siferis radicem instar, vel etiam singulares, imâ

parte obtusiores, deinde sursum progrediendo graciliores.

In Hispania [Indiæ] insula, ut Cardan. scribit, Batata folio est Hedere, radix admodum utilis segetis loco: crescit altitudine Erythrodani.

Anron. Pigafetta in lib. Nauig. *Battades* in Brasilii insula.

M. Fumee in Hist. gen. Ind. Occiduz, Batatas radices dulces.

Ut Lobelio Obs. fidus Clusius testis est, Batatas Hispanorum, siue Camotes, aut Amotes, foliis est scabris, & reptantibus, multis, Cumeris asinini æmulis. Plant. Ic. p. 647. Batata Hispanorum, Camotes siue Amotes.

Quidam Igname putant esse Theoph. lib. 1. hist. cap. 11. *τῆ ἀγορῆς* siue *ἀγορῆς* *ἵκκος*, non, ut apud Plinium legitur, Aracos. Satis conuenit hist. radicis Theoph. nisi Theophrastus scriberet folium non habere, neque foliis quicquam simile.

An Veteribus, inquit idem Lobelius, fuerit cognita hæc planta Clusius hæret ac propterea nullum nomen Græcum aut Latinum addit: Hispani *Batatas*, *Camotes* etiam nonnulli, aut *Amotes*, quidam etiam *Aies* vocant, tametsi nonnihil, ut aiunt, inter se differant, sitque *Batatas* radix longè tenerior & suauior, Qui plura de hac radice vult consulat Scaligeri exerc. 121.

Nunc adeo frequentes sunt in Hispania, inquit Manardus apud Clusium, ut singulis annis è *Ve-* *lez-Malaga* decem aut duodecim longæ naues, quas *Carauellas* appellant, iis onustæ Hispaniam inuehantur. Seruntur verò aut minores integræ, aut maiores in frusta concisæ, solo bene culto, & in suos sulcos ducto, feliciterque nascuntur: nâ intra octauum mensem in eam crassitudinem excresecunt, ut edi, & in alios vsus parari possint. Ipso verò Clusio auctore spontè nascitur in nouo Orbe, vicinisque Insulis, vnde primum in Hispaniam delatam ferunt: nunc in multis Batiaz maritimis locis seritur, vel integra, vel in taleolas secta, principatum autem obtinet Malacæ nata, quæ & Gades & Hispalim, imò Vlyssiponem etiam vsque deferri solet. Habuit aliquoties in Belgio satis recentes, sed quæ germinare noluerint, imò breuè corruptæ sunt, frigidiore nimirum regione. Sed & quas Londini cruebat, diuturniore morâ [nam Vietnam deserere volebat] antequam telluri comittere posset, corruptæ sunt.

Bata-

Batatas in omnibus Indiæ provinciis admodum communes, cibum multi alimenti esse existimat Monardes, medizque veluti esse substantiæ inter carnes & fructus, flatulentas tamen: sed assatz stutus deponunt, præsertim si cum generoso aliquo vino edantur: ex iis etiam sunt Conseruæ non minus gratæ, quam Cydoniorum carnes, morselli, placentulæ, & alia edulia gratissimi saporis: idoneæ enim sunt ad omnis generis Conseruas conficiendas, & edulia. Temperatz sunt, & coctæ vel assæ ventrem emolliunt: ac crude eiui non sunt aptæ, quoniam admodum flatulenta sunt, difficultisque digestionis. Eitur, teste Clusio, ab ipsis incolis, aut cruda, aut cocta: nunc Hispanis etiam in deliciis ob saporis gratiam & teneritatem, præsertim si sub cineribus cocta, & exteriore tenello cortice repurgata, deinde in orbem concisa, ex paucillò vino, stillatiquæ rosarum liquoris & Sacchari momento edatur. Sunt qui ex oleo & aceto, & sale eunt: nec desunt qui radices recentes coctas & repurgatas Saccharo condiant, & in usum seruent. Sed & radix nõ cocta, dum corrumpi incipit, si cultro secetur, non secus rosam olet, quam ipsa Rhodia radix. Quocunque modo condiantur assæ vel elixæ, nulli crustulo, aut alio cuius edulio cedunt dulcoratæ mollior, cutis aliquantulo tenacior, quam tuberibus aut Napis. Comeduntur & crude, viridis castaneæ gustum tum imitantes.

BATATIS AFFINIS IGNAME
sive Inhamæ.



Lectori non ingratum fore existimauit Cluius si Batatarum historiam, alterius cuiusdam crassæ radicis descriptionem subiiceret, quandoquidem Indiæ Occidentalis & insularum quarundam incolis familiari in usu est.

Varix autem interdum est formæ radix illa, & Ignamæ, siue Inhamæ appellatione ex

D. Thomæ insulâ, sub Aequatore sitâ, non procul à provinciâ Manicongo continente, delata anno 1596. radices habuit, quarum nonnullæ pedalem aut ampliorem longitudinem æquabant, brachialem autem crassitudinem, vel etiam quarum diameter esset quatuor vnciarum: pleraque dodrantalem longitudinem vix attingerent, nec earum diameter binas vncias excederet: aliquot etiam breuiiores, sed crassas, & in aliquot quasi breues napos infimâ parte protuberantes, rectas omnes scabro & inæquali cortice, vt Aristolochiz longæ legitimæ radices, & multis exiguis fibris sparsim nascentibus præditas: ipsa radicis substantia alba, lenta, & succulenta est, atque veluti grumosa, tenera tamen, nec ingrati saporis, trigu autem post momentum nonnihil asperi &

acriusculi: assa vero, tenerior est castaneâ, & pyri instar, cui grumosa substantia, edulis. Qualem caulem, aut folia habeat, non intelligebat.

Exstat figura apud Clusium in post. Hist. duplex, titulo Inhamæ Lusitanorum, quarum mino-



rem ponit Pl. Icon. pag. 647. sub titulo Ignamæ, & ante eum Lobel & Pena Aduers. de ea ita scribentes: Sisaro Anglico non parum accedere videntur Batades seu Ignamæ radices, quæ in Insulis non procul nolo Orbe distitis, suapte sponte oriuntur. Postea vernaculè tum indigenæ, tum Hispani illic vocant, quibus hæ in patina

& Veneris illicia frequenter ventunt: singuli bulbis, teretes, oblongi, Napum vtriusque obtusum æquant, color pullus illis foris, albidus intus, sapor gratus valde & tener, quasi Milii delicatioris, aut Fabæ frescæ, eoque gustu insulsæ sunt nisi condiantur. Quæ de verbo ad verbum recitat Hist. Lugd. sub Batatis Clusii, neglectâ interitâ Lobelii & Penæ Aduers. mentione.

Pet. a luates Naulg. Ignamæ radix ex qua fit panis. Munst. Colm. de Noua Africa, Ignamæ.

Diui Thomæ insularum eâ assæ & elixæ vesci intelligebat Clusius, cuiusque rei gratiâ Lusitani quidam, qui multos isthuc eum viros, tum feminas & pueros emerant, vt Vlyssipone pro mancipiis venderent, istas radices in arues intulerat, in miserorum alimentum. Sale, autem a duers. aceto & oleo interdum eduntur, & vino perfunduntur, nonnunquam coctæ prunis.

Ignamæ genus aliud.

Accipiebam inquit Clusius h. post. à Wilhelmo Parduyn radicem cum præcedenti Ignamæ siue Inhamæ, ei nec forma, nec colore, nec magnitudine dissimilem, quam Ignamæ etiam vocabat Lusitanus, qui illam ipsi dabat, licet aliud genus esse non inficiaretur: sed totius radicis cortex magis inæqualis erat, & veluti quibusdam tuberculis oblitus: è quibus tenues fibræ emergebant, præterea radix summo capite, paullo crassioribus durisque, & pedalis siue palmaris longitudinis, fibris, seu verius viticulis, magna ex parte spinosis, erat prædita. Nonnulli Team Per.

Considerent lectores quantum differat à Manihot & Iucca de quibus mox.

A G E S.

CAP. XXXV.

Agri species innumerae sunt apud Hispaniolæ incolæ, quarum à folijs & floribus varietas dignoscitur: harum species vna dicitur

Agri species

GUANAGNAX, hæc est intus forisque albida: alia **GUATAGUETI**, colorem habet violaceum foris, intus autem candidum, appellant alias **Agnes Zazurios**, hi tubescunt foris, intus candescunt, alias **Squinetes**, intus forisque albi sunt. Est **Tanna** ubique violaceus, ita ut flavesceat pelle carneque. Est alia dicta **Aril** quæ pelle violacea, carne candida. **Guaccaracca** pelle candescit, violascit carne. Sunt multa præterea, quæ nondum ad nos delata sunt. **Agnes** colunt in insula Cuba. Magis pro ferculis aut fructibus videntur, quam ad usum conficiendi panis: ut nostri raphanis, tuberibus, Napis, Pastinacis, & huiusmodi rebus: Hanc **Agnum** breuiter Historiam Pe. Martyr, lib. Ocean. pluribus in locis tradidit.

Yucca in Insulis Cuba, Hayri, & aliis, etiam lethalis est, in Insula S. Marthæ, salubris, comedunt crudam, rostim & coctam.



Ex S. Dominici vrbe accipi [inquit Manard. ex ver. Clus.] folia herbæ ex qua **Casani** fit. **Casani** autem panis est, quo Indi tot seculis vitam sustentarunt & hodie etiam vescuntur nostri Hispani: fit vero ex herba ab Indis **Yucca** nuncupata: cuius descriptionem, vires & noxas pluribus prosequitur, ut & Gomara Histor. gen. cap. 71. similia propemodum cum Manardo de **Yucca** referens.



Communis insulæ Canariæ incolis pastus siue victus arborea radix quadam est [inquit Vespur.] quam in farinam satis bonam comminuant, & hanc radicem quidam eorum **Yucca**, alii vero, **Ignam** vocitant.

Cæterum multa dicuntur esse **Iuccarum** genera. Vnum altero sauius, atque aliud alio pretiosius est, quo **Regulis** edulium paratur. Sunt quibus vescantur nobiles, sunt & quibus populus.

Lugd. hist. duas habet figuras, vnam ex **Theueto**, nomine, **Manihot** qualem exhibemus: Alteram, nomine **Yucca**, de qua nihil præter figuram & nomen. **Gerard.** Anglus in sua historia cum **Yucca**, ut vult **Lobelius**, confundit aliam plantam de qua mox.

Brasilianis frequens est hæc radix **Manihot**, totique **Americæ**, inquit, **Theueto**.


Radices, ait idem, **Manihot** **Americani** aut in mortario contundunt, tam siccas quam virides, aut radula ex amplo arboris cortice, lapillis duris vndique obsita, ut nos dentatis laminulis ferreis **Nuces myristicas**, in farinam redigunt, quam cribro excretam, adiecta aqua, igni superpositam in vase calfaciunt, quoad **Manna** granatæ instar grumescat, cuius mirifica bonitas & nutriendi vis, potissimum si ea recens fuerit: videnturque ut nos panem, tam cum cæribus quam cum piscibus.

MANIHOT THEVETI, YUCCA & Cassiui.

CAP. XXXVI.

Descriptio

Cassui.



Manihot.

Yucca.
panis.

Alia cap. 114. sub **Manihot**, habet quadam de Arbore succo venenato, ex qua farina & panis fit, ut videre est sub Arbore farinifera succi venenati.

Leri hist. Amer. cap. 9. **Manihot** radix bona in farinam reducta & bene cocta, si aliter comedatur venenum est.

M. Fumei hist. gen. Indiarum Orient. lib. 1. c. 25. In Hispaniola parant panem ex **Yuccæ** radice, cuius venenatum succum exprimunt. Item lib. 2. c. 71.

FINIS LIBRI DECIMINONI





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS.

DE RAPVNCVLIS, CAMPANVLIS
ET HIS AFFINIBVS.

Item de Rapunculis dixisse conueniet, si iustus ordo seruari debeat. Rapunculos dicimus, à radicum forma, quibus, quia bulb. sa nonnihil amulantur, illas & subiungendis duximus. Habent & id serè commune inter se Rapunculi, quòd Campanaceos flores, venustos sècèrè anquam arrham communis familia gerant.

RAPVNCVLVS VVLGARIS CAMPANVLATVS.

CAPVT. I.

Descriptio



VERIS acetariis expetitus Rapunculus vulgaris, radice minimi digiti serè crassitudine, Napi parui similitudine, alba, dulci: folia ex oblongo per extremum rotunda, per terram sparguntur, nonnihil incisa, hirsuta: caulis cu-

bitalis & sesquicubitalis, hirsutus, lactescens, foliis vestitus acutioribus, pediculorum expetibus: flores nolas imitantur, per oras laciniati, caerulei, quos *vascula* excipiunt oblonga.

Tabern. Ic. & hist. Rapunculus, i. e. Rapüntzel. C. Bauh. Phyt. Rapunc. i. siue esculentus. Item apud Matth.

Rapunculus 4. siue esculentus, fortè Rapum silv. Diosc. & Plinij. Cæsalp. Rapunculus vulgò. In hoc genere videtur apud Plinium latione seu Lassine, vt quidam desperam legerunt, teste Hermolao. Fuchsiu manifestò errore putare Rapum silv. esse Rapunculum vulgò dictum

Tom. II.



Rapunc
zel.

Tafome.
I. affine.
Fuchsiu.

re & annotant Matthiolus & Lacuna. Sed figura Matthioli nihil valet, nec per Glossatorem melior est reposita. Camer. apud Matth. Rapunculi, Pes locustæ Auic.

Schvv. Cat. Sil. Rapunculus aruenfis. Rapum *Pes locusta* hortense, Germ. Rapüntzel vocatum, Tragus interpretatur, Sifer & Sifarum, de quo Columel. *Sifer Sifarum.* lib. II. cap. 3. & Iacob. Manlius super Theriacam *Rapum* Auic. qui quidem putet, & non malè, minimum *Rapum* Naporum genus.

Gesner. de coll. stirp. Rapum siluestre 3. flore Calathi caeruleo, die råchten Rapüntzel. Item Rapum silv. Rapüntzeln, commune procerissimum. Idem de hort. ait esse Rapi silv. multa genera, quod tamen Diosc. simpliciter sic vocet videri sibi id, quod Tigurini vulgò Rapunculum nominant.

Lobel. & Pena Adu. Rapuntium paruum, Rapulum vulgò, Pes Locustæ Auic. Lob. in Obs. scribit quod albis floribus variet secus Brugellette Hannoniæ oppidulum.

Lonicet. hist. lib. 5. cap. 24. Rapüntzel, Rapunculum.

Dodon. Gall. picturam habet, ac scribit *ayem*, Rapa sylvestris, Neotericis Rapontu, Rapunculum paruum: Gall. *Raponce*: Ger. *Hein Rapüntzel*. Belg. *cleyne aut ghemeine Raponces* len. Et in Lat. de flor. Quintum genus Rapi sylvestris facit, ac vulgò Rapunculum nominari tradit, quasi paruum Rapum. Anguill. *Rapontuoli*. Fuchl. Rapum silv. vulgò Rapunculus Germ. *Rapöntzeln*. Gill. *Responce*, aut *Reponrhan*. Clus. in Pann. & Hist. post. Rapunculus vocatur vulgaris. Brunfels. Tom. 2. p. 36. *Raponeoli*, sine descriptione.

Rapunculus vulgò dictus, etiam si tum hori-
XXX

nibus sub primum Ver ad esum, cum aceto & oleo ac sale, effodientibus: tum subus, quibus gratissimus cibus est, eruentibus, raro comperitur ad eam altitudinem progressum, quam ipsi Diosc. attribuit: & si perueniat, à paucis cognoscatur, tamen à plerisque verum & genuinum sylvestre Diosc. rapum esse creditur. Nec nos (inquit Cornar. in Diosc.) nunc refellere volumus, quum aliud quod pro eo ostendamus; non habeamus. Rapunculus non respondet Rapo silu. Diosc. licet crebro & plerumque ad cubitalem altitudinem progrediatur, ac etiam excedat, quicquid dicat Cornarius. *Rapunculus* confundere Fuchsum cum Rapo siluest. testatus est Lacuna. Eorum autem sententia, qui putant Rapunculum, Rapum esse sylvestre Diosc. repugnat Theophrastus lib. 7. c. 6. de plant. hist. quippe qui silu. Rapum radice constare longa Raphani modo, breuique caule consistere scribit.

Cornar. 200.
Fuch.

Locus &
tempus

Rapunculus passim prouenit etiam in Horto E. C. Montbelgardi, ac tota hyeme viret. Genex obseruauit colligentes Februarii principio. Montpeli florentem vidi Aprili & Basileæ quæ itur Moutets Octobri: vt & Patavii: Nascentur in aruis non cultis, in collibus & pratis, quin etiam in hortis iam feritur, vt grandiores edat radices, Matth. Non modò hortis & satis familiare vbitis, sed etiam siluosis & lapibus cum frigidarum tum calidarum regionum, Lobel. Inter segetes prouenit. In hortis etiam ad acetariorum vsum feritur. Æstate floret & semine prægnat, Schvv.

Vires & v.
sus.

In caliditate & frigiditate [ait Matth. in Epit. Cam.] radix non longè abest à temperatis, imò nec in aliis qualitatibus. Estur cruda radix, ac pariter cocta in acetariis, quod maxime gustui placeat, & appetentiam excitet. Creditur quod radix elixa, & cum longo Pipere deuorata, lactis vbertatem in nutricibus faciat. Radix, teste Lobelio, candida, tenera, acetariis Vernæ quadragesimæ longè quàm Rapo aut Raphano delicatior. Lactis copiam augeri quædam nutrices elixa radice, ex Pipere sumptâ exploratum habent. Montbelgardi & Genex hyeme si non rigidior sit, vt & Vere, non solum radices in acetaria assument, sed etiam folia.

CAMPANVEA PARVA, ANGVILLARÆ Cantabrica.

Descriptio

Campanula, quam Anguillara facit Cantabricam, radice est alba, crassiuscula, modicè fibrosa, subdulci, à qua exeunt *cauliculi*, non surrecti, teretes, virides, aut subpurpurei, quorum folia primo ortu aliquatenus Violæ Martis primis minoribus foliis similia, minora, ex semuncialibus & vncialibus pediculis, quæ mox laciniata sunt nederaceorum instar in latumque magis proficiunt: at progressu temporis, ea potissimum quæ superiorem caulis partem obsident, formam multum dissimilem acquirunt, quantumque iis de latitudine decedit, tantum & plus longitudine proficiunt, sic vt duos digitos longa euadant, vix culmum interdum lata: denso autem agmine caulem stipant, acrimonia nonnulla & amaritudine prædita.

Clusius sic describit. Alunt etiam summa illa iuga præsertim in rupibus & præcipitiis, Campanulæ vel Rapunculi genus, cuius radicales fibræ valdè serpunt, & vicina loca occupant, subinde germinantes, & nouas stirpes procreantes: ha-

bent illæ initio orbitulata ferè folia, deinde statim alia angusta conferuim nascentia, Caryophyllæi secundo loco supra descripti foliis adeo similia, vt incautos plerumque fallat, qui interdum cum suo caespite erunt, Caryophyllarum collegisse existimantes. Emergit deinde ex horum medio gracilis cauliculus, in multos tenues ramulos diuisus, oblongioribus foliolis, nullo seruato ordine nascentibus, septus: stilosulos & singulis ramulis dependentes proferens Campanulæ, siue Rapunculi vulgaris floribus formâ similes, vel eleganti cæruleo colore præditos, vel saturato purpuræ colore, siue violaceo nitentes, vel dilutiore purpureo colore & quasi cineraceo, conspicuos, interdum etiam nitentes



capitula deinde Rapunculi vulgaris capitibus similia, aut potius illi Campanulæ minori, quæ cum in Belgica, tum plerisque Germaniæ locis, ad agrorum, aut silularum margines, sub fruticibus secundum profundiores & conuexas vias in vmbra prouenit. Floret Iulio, interdum etiam

iam Augusto. Tota etiam lætescit.

Campanula sylvestris minima siue 3. putari posset fortè Rapi sylvestris esse species, sed quia radix edulis non est, idè Dodonæo aliò referenda videtur. An eidem in hist. Gall. Campanula cærulea minor & sylvestris.

Clusius Pannozm. Campanula minor Alpina, vel Tracheligenus. In sol. Campanula minor Alpina rotundioribus imis foliis, capitulo Campanulæ minori quæ in Belgica & Germania est. Quam Campanulam secundo loco intelligat Clusius nondum nos intelligere facemur pro Campanula minore Alpina rotundioribus foliis.

C. Bauh. phytop. Campanula maior rotundifolia prima. Rapi sylu. genus minus quod Campanula cærulea Getn. de hort. Campanula minor rotunda: aliis Phyteuma, aliis Cantabrica Plinii lib. 25. cap. 8. ali Rapi sylvestr. genus: floribus est communiter cæruleis, subinde candidis.

Clus. in post. hist. Iconem eandem proponit quam Lob. & Dodon. Schvv. etiam non facit diuersam Clusii Campanulam à Lobelii. Campanula, quæ occasio vt hoc capite ponam Clusii descriptionem nec separem, vt facit C. Bauhinus, donec quid rectius fuerimus edocti.

Schvv. Cat. Sil. Campanula minor rotundifolia Dod. Campanula silu. minima, Clus. Pann. Campanula minor Alpina.

Tabern. Rapunculus silu. minor 1. Kleine Milchglöcklin / kleine Weiße Rapunzeln: Tota lætescit. Item Campanula minor 2. rotundifolia 1. nuno flore, kleine weiße Milchglöcklin.

Hyrcanica
Cantabrica

Rapunculus
silu. minor 2
Alto flore

An

An Gerard. Angl. Campanula rotundifolia, Robust leaved Bellflower. Campanula minor alba. Little white Bellflower.

Locus & Tempus.

Campanulam parvam quæ Anguillæ dicitur Cantabrica, vidi Patavii in horto D. Cortusii, Genæ ad radicem montis Saleuz, incipientem foliis prodire in principio mensis Februarii. Basileæ ultra Rhenum in sylva quæ itur Binto florentem adhuc Octobri, Lugdun: cum flore Septembri. Montheigardi passim in vrbe abundat in Arcis muris & portis, florens Iunio & Iulio. Mense Augusto observavimus non longe à pago Cron redeundo Porentrio Campanulam parvam sine Cantabricam Anguillæ cum flore albo.

Campanula minor rotundifolia altera C. Bauhini.

C Bauh. Phyt. Campanula 6. minor rotundifolia altera. Clus. Campanula minor alpina: flos nunc purpureus aut violaceus, modò colore diluore & quasi cinereo, interdum niveo. Clusius in hist. post. in folio pro Campanula minore alpina habet iconem Lobeli & Dod. quæ occasio vè Clusii descriptionem reliquerimus capite præcedenti: Schvven. quoque non diversam facit plantam Campanulam Clusii & Campanulam Lobeli, vè antè demonstratum. Nos adhuc ignoramus quam plantam intelligat per suam 6. Campanulam, nec scimus de qua scribantur sequentia, Schvven. Cat. Sil. Campanula minor pratensis C. Bauh. Campanula minor. 2. vicesen glöcklin / Schbelein. Hæc integra sæpe tegit præta. Succus ex flore cæruleo expressus viridem efficit colorem.

Campanula Linifolia cærulea, vel Rapunculus Campanulatus Linifolius.

Descriptio

Campanulæ tertiz Linifoliz cæruleæ C. Bauh. in phyt. ex radice tenui, emergunt caules quini, seni, plures, paucioresque, palmares & sesquipalmares, graciles, rotundi, in ramulos non divisi, foliis oblongis, angulosis, lino silv. similibus, confuso ordine infernè, at supernè ferè nullis, septi, stilosculi è caulium summitate dependent, cærulei, Campanulæ formâ, quibus succedunt capitula Rapunculo vulgari similia. Hæc alunt potissimum rupes & summa iuga montis wasserfall / vbi eam ante annos quatuor collegimus.

Rapunculus 7. siue Campanulatus linifolius Thallii, coliculos profert non admodum rectos sed procumbentes, foliosos, brachiatos, adnatis resectos. Folia ex primo prodeuntia sunt vncialia ferè subrotundiora, in mucronem tamen producta, in ambitu leniter dentata, similia foliis quibusdam violæ tricoloris, quam vulgò Florem trinitatis vocant: cætera, quæ caulem frequenter ambiunt, longiora euadunt, sed tamen striatiora existunt, lini foliis quodammodò affinia. Flores plures, cærulei, plicati, in ambitu divisi in hoc cernuntur. Vbius autem hæc species frequens est.

Schvven. Rapunculus silv. Campanulatus linifolius, kleine Rapunzel / kleine Glöcklin / Alperis & petrosis oritur. Quantum differat Campanula Linifolia à nostra Campanula parva nescimus, nobis quidem constat eam depositis prioribus foliis rotundis acquirere folia lini & penè diversam videri. Rapunculum 7. seu Campanulatum Thallii descriptio, non videtur malè

Tom. II.

quadrare nostræ Campanulæ parvæ. Schvvenck. tamen diuersum facit.

CAMPANVLA FOLIO HEDERACEO, species Cantabrinæ Anguillæ.



Tenella est plantula, coliculis tenuibus palmatis aut sesquipalmatis, ramosis: per quos folia tenera, hilarum viore petiula, Hederæ vel Cymbalariz, sed quorum laciniz sunt acuminata: stilosculi pediculo filii instar tenui longiusculo insidet, vni vnici, gracilis, oblongus, per summas oras lacinatus, cæruleus, cæteroqui pallidus.

Descriptio

Locus

A Fr. C. Bauh. accepi nomine Campanulæ Hederaceæ foliis: Genet Cherlerus ait se collegisse, iuxta Aureham in siluula palustri. Hanc ad nos (inquit C. Bauhin.) Lutetiâ Io. Henr. Cherlerus Philos. D. & nunc in Academia Nemausana Philosophiz professor, vna cum pluribus alijs misit.

CAMPANVLA ROTVNDIFOLIA minima.

Descriptio

Campanula 7. siue rotundifolia minima C. Bauh. in phyt. herba est vix quatuor digitos alta, quæ ex radice exigua, oblonga, alba, ramulos profert aliquot, exiguos subrubentes & subhirtos, coruæ asperæ vestitos, quos ambiunt foliola ex rotunditate oblonga, serrata, rigidiuscula, quorum inferiora latiora: cuilibet ramulo qui sæpè vnus, plerumque terni vel quaterni, stilosculi insidet vnici, tuberculæus, deorsum spectans, formâ calathi ex vno folio sexangulo, cui capitulum foraminulis percusum, vè in Campanulâ angustifoliâ, succedit, in quo semen minutum.

Hanc in Rhæticis montibus, cum Italiani Anno 1577. peteremus, Septembri mense, adhuc floribus onustam inter saxa copiosissè vidimus; nec maiorem inuenimus, quam cum Patavii Nobiliss. Iac. Antonio Cortuso Patritio Patavino ostenderemus, Cantabricam Plinii nominavit.

CAMPANVLA LINIFOLIA RARA, flore cæruleo.

Descriptio

Rara admodum videtur esse planta, caule est cubitali striato, foliis non ita multis vestito, tenuissimis & quouis gramine angustioribus, duas vncias longis, supernâ parte brevioribus temerè positis, quo loco prouenire quædâ propagines exoriantur in minutissima foliola des-

Xxx

nentes. In summo rami vestigio flores sursum spectantes in vnum quasi glomerem congesti sunt, Campanulæ planè similes, in extremo dissecti, cerulei, vt sicca Plateriana insinuat, ipseque Cl. D.D.F. Platerus adserit. Hos flores Calyculi foliacei minimi sustinent.

RAPUNCULI GENVS FOLIO serrato rotundiore.

Descriptio



Crescitur statim à radice tollit cantes, cubito altiores, nonnihil angulosus, subhirsutus, simplices, quibus ab imo ad summum adnascuntur alternatim folia nonnihil hirsuta, vncialia & sescuncialia, semina circiter lata, pauca vnciam attingunt, in acutum mucronem desinentia, per ambitum serrata, obliquis venis à medio nervo in margines expositis. Summitus scapus flores ex intervallis profert, Rapunculi vulgaris floribus similes, calyculo exiguo pinnae to persimili, ex pediculis vncialibus & sescuncialibus tenuibus. Radix alba Rapunculi vulgaris crassitudine, multifida, longiuscula.

Rapunculum vocant plantam descriptam, unde autem habuerim non recordor, similis, si non eadem, Argentinx 1599. Iulio sicca per Dum. Agerium demonstrata nomine Campanulæ prope Gestin in Styria collecta, in floribus siccis dicebat colorem fuisse dilutè caeruleum, pistillum longius extra florem apparebat: Folia in principio caulium rotunda ferè satis profundè crenata, brevissimis & vix conspicuis pilis obsita.

ERINOS, ERINEOS. VEL ECHINOS Veteribus & in genere.

Descriptio

Erinus, quod aliqui Ocimodes [Erinodes] alii Hydreron [Hydreron] quasi aquaticam herbam, Romani Ocimum [Ocimum] appellant, nascitur, autore Dioscoride apud fontes & fluuios, foliis Ocimi [Ocimum] sed minoribus (vncialibus) Tragus putat legendum (vncialibus) parte summa diuisis: surculis quinis, senisve dodrantalibus: flore candido, semine nigro & acerbo: folia & caules lacteo succo turgent (ita Ruell. quam lect. probat Matth. & Dalech. Cod. meus Basil. & Paris. imò Juss. in liquore plenis:) huius semen drachmarum duarum pondere ad mellis cyathos quatuor ammixtum, ad oculorum fluxiones si- stendas illinitur. At succus aurium dolorem sedat, cum sulphure vino & nitro instillatus.

Herba quoque quam Graeci Erineon vocant, inquit Plinius, videtur reddenda in hoc loco [post Caprificum] propter genulitatem. Pal-

mus alta est, cauliculis quinis, ferè Ocimi similitudine, flos candidus, semen nigrum, paruum: tritum cum melle Attico oculorum Epiphoris medetur [duabus drachmis cum cyathis mellis Attici quatuor. Cumulatim decerpta: Hæc vetus lecho Com.] utique autem decerpta manat lacte multo & dulci: herba perquam utilis aurium dolori, nitri exiguo addito. Folia resistunt venenis.

Echinus acerba est & repellendi ac siccandi vi prædita, ait Galen. de simpl. & ex eo Paulus: qui præterea aquaticam esse scribit, cuius seminis drachmæ, cum mellis drachmis quatuor illitæ, oculorum fluxionem sistant. Succusque ad aurium dolorem faciat.

Paulus bis eandem proponit plantam vt monent Cornar. prius ex Diosc. secundò ex Galen. in eo, nostro iudicio, demonstrans sibi non cognitam plantam: facili lapsu apud Galenum per Amanuenses scriptum crediderim Echinos pro Erinis, quod non animaduertit Paulus, quanquam Matthiolus Ruell. & Massar. dicunt in vetustis aliquot Dioscor. codicibus legi Echinos: ad h. præterea à Nicandro in antidotis Erinon inscribi. Hinc non refragatus fuerim Io. A. gricolæ, cui herb. Erinis eadem est, cum Echino, licet Paulus diuersas faciat. Item Diosc. propter similitudinem, post Ocimum descriptum. Sed quia lacte manat vt Caprificus, eodemque censetur nomine, ipsi subiunxit Plin. ipsamque Erineon vocans, ait eius folia venenis resistere. Quod vt doctè Constant. in Lexico notat, sumpsit ex Nicandro Theriacis. Quin & scholiast. ex Diosc. Erinis & Echinos dici ostendit. Galenus de Erinis tacens, Echino omnia tribuit, ubi & Erinis addendum xxiij. & Erinis & Echinos voces, idem in hac herba exprimenda significant.

Quæ Plinio Lactoris dicitur, quamque vulgò notam scribit, hæc & Lactaria & Anabula nunc dicitur. Eandem aut similem aliqui volunt, illi quam Militarem vocant. Et licet non desint, qui Diosc. Erinon faciant, attamen Gesnero in catal. pl. congeneres non eadem videntur.

Est autem Erinis herba appellata Cordo in Diosc. quod Caprifici modo lacteum liquorem remittat, hodiè satem incognita est: quamvis Ruellius eam cognouisse videatur, qui hæc scribit. Est & apud Hippocratem Echini herbae mentio. A Recentioribus Herbariis herba lactis appellatur, à quibusdam Lactoris, & militaris, alius Ocimum aquaticum. Lactariam rura vocant, trientalibus ramulis, quinis, senisve foliis, Ocimo longioribus, parte superna diuisis, albo flore, semine atro, pusillo, acro, duro. Herba succo manat, lactis tum colore, tum dulcedine, unde Lactaria nomen apud vulgus inualuit. Secus fontes & fluuios inuenitur. Has insuper et vires præter eas, quas Diosc. Plin. & Galenus Erinis suo adscribunt, assignat. Succus cum sulphure, nitroque instillatus, discutit oculorum caliginem, vomitionesque ciet. Folia in cibo sumpta patiendæ præstant facultatem. Vultus ferro factum intra paucos dies imposita ex oleo sanant.

Ceterò non obscurus est Diosc. inquit Anguilla cap. de Erinis, cum ait Erinis & Echinos, an intelligat simpliciter succo plenum, aut succo lacteo: de Tithymalis solet dicere Erinis, quicquid sit, nullam noui plantam quæ Erinis respondeat.

Nunc quod reliquum est, Erini & Erinis nomen

men sequentibus tribuitur plantis.

Matthioli Erinon volunt aliqui esse Hieracii speciem, de qua nos agimus lib. 24. sub Hieracii Sabaudi genere.

Dalechampius habet suum Erinum, quem hoc libro posuimus inter Rapunculos.

Erinum quidam existimant esse Esulam siue Tichymalum dulcem, de qua l. 34.

Querunt aliqui, an Noli me tangere sit Erinos, de qua lib. 21.

Rapunculus dicitur Erinus Nicandri & Dioscori.

Videntur aliqui existimare Rapunculum comosum esse Erinon.

Erinos Columnæ ad Rapunculos referenda, cum eiusdem Erini siue Rapunculi genere minimo, de quibus libro presenti.

Credit C. Bauhinus Elatinem Polychidem H. Lugd. eandem cum Erino minimo Columnæ, verum fallitur ut demonstratum lib. 19. sub titulo Alfine folio oblongo, hirsuto.

Erineon quidam putant esse Scrophulariam maximam radice fibrosa, de qua hist. l. 28.

Inter Diosc. ascriptitia Epimedio Erinei nomen tribuitur, Erineos pro Acino apud Plinium lib. 21. c. 15. quam Epitetron vocant, ut apud Dioscori. Epimedium ubi Erineos, Fab. Columnæ, cui Epimedium est Lunaria minor botryoides. Vide de his hist. l. 35.

Erneos, Erinos, Erineon, Erinia, Erina de Capulico, unde Erinos herba nomen accepit, vide hist. l. 1.

ERINOS MAIOR FAB. COLUMNÆ, RAPUNCULO AFFINIS:

Descriptio



Radice cōstat carnosa non magna, paruum Raphanum æquante ad summum, candida, gustu suavi, ex dulci acerba, acetatis expetita, lactescente, in medio, vel imo parum exuberante, à qua folia exeunt primo Vere. Ocimi foliis similia, minora verò, medii Ocimi foliis æqualia, per ambitum ferrata, superne hirsuta parum, atque viridia, inferne verò lzua, atque polita, albidioraque: caules postea ab radice emittit plures, secundum loci annique temperiem, pedales, vel maiores, angulosos, hirsutos: quos folia absque petiolis alternatim circumdant, longiora admodum, angustioraque, minutique ferrata, ita ut qui viderit plantam sine caule, atque postea caule præditam, diuersam absque dubio esse censeat, nisi domi cultam obseruauerit: folia quidem, quæ, antequam caules ederet, habebat terram tangentia, marcida euanescent, nec in illa amplius inueniuntur. Ex foliorum alis ramuli exeunt, in

Tom. II.


in quibus sicut in caulibus flori Maio exeunt petiolis paruis hærentes, caui, quinque diuisi in extremo dissecti, colore albicantes, & etiam purpurascens, intus thyrsum habentes qui in tres curuas partes diuiditur: quibus sicatis, florum basis exuberat, quæ hirsuta est, & in quinque viridia foliola definit, semen perficiens Iunio & Iulio, fuscum, minutum, compressum, gustu acerbum, quod cum perfectum & siccatum est, per basis foramina quæ tunc perusta sunt, decedit. Tota planta ex radice, ad florum calyces vique lacte manat dulci, disrupta.

In locis aquosis, flumini ripis, ac vallibus, ad fontes: & in Montium radicibus vbique frequentissima.

His igitur videtur, natali, loco, formâ foliorum, lactis copiâ & sapore, quæ notæ priuatæ sunt, de hincationi Erini Antiquorum respondere,

ERINOS FABII COLUMNÆ MINORI

Descriptio



Erini, siue Rapunculi minimum genus, noua est plantula atque pulchella ex D. Mariz Virginis monte aduecta: quæ radice habet paruum admodum, fibris diuisam, teneram, atque Rapunculo siue Erino à me depicto similem sapore, lactescentemque: folia emittit parua, admodum, digiti longitudine, parum hirsuta, oblonga, latioraque in summo, & per extremum serrata raris diuisuris, nam quæ proximiora sunt radici octo dentes circum habere videntur, superiora verò minüs, atque floribus hærentia binos, caulem emittit ab radice, ex singulis foliis alis diuisum, ita ut fruticosa videatur, angulosum hirsutum, tenuem: flosculos edit Aprili mense & Maio, inter folia, ex calyce parum hirsuto, in quinque folia desinente, ut in Rapuntio & Campanula pyramidalis dicta visitur, exeuntes, oblongos, cauos, similes Tracheliorum flori, purpureos, intus apicem vel thyrsum luteum in summo triplici diuisura intorem, ut in congeneribus, continentes. Semen perficit Iunio, & Iulio, minutum admodum, fuscum. Tota planta lacteo succo turget dulci, uti Rapuntium, ita ut gratus sapor palato.

An Erinos Cæsalpini, qui in adificiis nascitur riguis, palmi altitudine ramosa: foliis breuibibus angulosis, vnguis latitudine. flosculos in alis fert, figura Rapunculi, exiles, subcandidos, aut purpurascens: vasculum paruum figura Rapunculi, in quo semen minutissimum, lacte madet dulci.

C. Bauh. phyt. Erinon Columnæ refert ad Alfinem, verum ibi non reponendam capite de Alfine demonstrabitur.

Xxx 3

AVICULARIA SYLVII QVIBVSDAM.

Descriptio.



Mox è radice lxxpe plures fundit caules inermes dodrantes & cubitales, foliis vestitis mollibus, oblongis, per extremum rotundis, nonnihil serratis, crispis: è quorū sinu flores in conditu exeunt pulchri. purpureo violacei, quinque constantes foliis, quæ Occidente Sole in turbinatum apicem coeunt, apicibus in medio luteis, longis viridanubus foliis radiatim floris basi circumpositis, quæ summum postmodum coronant fastigium clauæ quadratæ vncialis quam delapsi flores relinquunt: radix singularis, tortuosa, lignescit.

Dodonæus qui in hist. Gall. hanc nostram presentem plantam Onobrychin appellauit, ait de flor. tertiam quandam Campanulam humilem Anonymon non esse Onobrychin, quod quandoque suspicatus, fuerit satis constare. Et hinc pater, quàm malè Lobel. Obs. sequuta sint Dodonæum, vocando eius & Belgarum Onobrychin alteram Gesner. de col. stitp. sanè melius inscribit Auculariam Syluii, Violam quandam anonymon. Iac. Theod. Icon. par. 2. p. 304. dicitur, Viola attenuis Fraßwen Spiegel: Item p. 316. Pentagonion, Viola pentagonio fūnftecke Weseln. Duæ habet figuras vnius plantæ, prior mala, secunda bona, non debebat separare.

Malè etiam ab Hist. Lugd. Onobrychidis primæ Dodonæi nomine exhibetur. Audini qui vocarent Auculariam Syluii, herbam cubitalem, cui flores pulcherrimi angulosi, violacei, folia parua, subrotunda, mollia. Copiosè in segetibus prouenit, Montspeli vidi florentem Maio, Basileæ Iunio & Iulio: in agris inter Basileam & Hagenc. Fr. C. Bauhinus obseruauit inter segetes propè S. Iacobum. Geneuz habebam in horto pulchrè virentem mense Aprili, florentem Maio & Iunio. Patavii obseruauim primò orientem inter segetes medio Februario. Attuli Argentina semen datum à D. Friderico Meier seminandum Montbelgardi in horto E. C. quod factum Martio, prouenit & floruit Iunio. Massa ferata Cortuso in agro Patavino, asserente D. Ranzio Medico apud Fontem admirabilem.

Iac. Theod.
H. Lugd.
Locus &
Tempus

Massa Ferata.

TRACHELIUM MINVS MULTIS.

Descriptio Trachelus, τράχελος à Grecis appellatur collum, atque aded tota spina à vertice vsque ad os sacrum, τράχελος hoc est, ob asperitate: quæ nominis ratio & huic plantæ congruenire potest: nisi ob dotes nonnullas quibus

Trachelio proficua sit, Trachelium dicenda videntur.

Trachelio autem minori radix sapore grato, caulis ramosus, hirsutus, sed tenuis breuior, folia breuiora, angustiora, crenata, hirsuta parum, flores in ramulorum extremis, simul multi confertim, pulchelli, carulei aut violacei, tanquam Campanulæ, otis in quinque lacinias dispersis.

Gesner. de hortis ait, Ex Rapi syl. generibus esse Vuularias quibusdam dictas in pratis nascentes.

Dodon. lat. de flor. & in fol. scribit, Rapi syl. tertium genus plerisque Ceruicariam minorem dicit. Gall. autem Trachelium minus, Perire Gantelee vocat.

Trag. Ceruicaria & Vuularia exigua, zapffenkraut, halskraut.

Lobel. & Pena Adu. Trachelium minus siue Ceruicaria minor, cui folia aspera Rapuntii aut Salutz, pilosa: flores densi, pulchelli. Obseru. Trachelium minus. Adu. p. 139. Trachelii varietates, Passim istud etiam asperis saxosis Angliæ & Gallobelgii siluosis fructat: sed stigiosius, hilari minus & amœno aspectu: alioqui persimile & congener. Item Trachelium minus. Radice fibrosa purpurantibus floribus stipatur, alioqui cæteris haud simile. Icon. Pl. p. 326. Trachelium minus Lob. 176. Teut. 400. Lobel. nobis obscurus videtur. Iconem habet Trachelii minora ramosi, qualem habet Dod. & Cluius.

Camer. Icon. p. 3. Rapunculos silu. umbellatus p. 94. [videlicet apud Thalyum,] cuius tres differentias depinxit congeneres iis quas author [Thalius] descripsit, quamvis non eadem. Quatum vna, nempe eluor signata i. responderi con à nobis propositæ, quæ est ex iis quas emimus iam sculptas.

Tabern. hist. & icon. Steingemsel / Symphytum petrum. i. Consolida petra prima.

Thal. Hæcyn. Ceruicaria minor Dod.

Clus. in fol. lib. 5. cap. 55. Ceruicaria Sphærocephalos. Trachelii genus floribus summo caulis & ramorum fastigio confertum, & quasi pilæ instar, in orbem nascentibus, cuius etiam secundum genus est paulò minus, flores singulares per caulem sparsos habens, præter sphæras illas summo caulis fastigio innascentes.

C. Bauh. phyt. Campanula 13. siue pratensis.

Schvv. Trachelium minus pratense umbellatum. Ceruicaria minor, Flein halskraut.

Abundat passim in pratis Montbelgardi etiam in horto Ill. E. C. spontè, vbi copiosè floret Iunio, Septembri & Octobri, Basileæ quoque & Geneuz obseruauit. Argentinz vidi in horto D. Frid. Meier, Iulio florens, flore purpureo cinereo & albo. Trachelio minori idem natales [cum maiore Lobelii] / qualidorum marginum & montium pratorum Germaniæ & Angliæ sunt. Ceruicaria minor Dod. Thali passim locis apricis maxime. In Silesiæ agris & pratis aridioribus frequentem scribit Schvv.

Trachelii minoris folia Rapuntii sapore primo Vere acetatis etiam adduntur, Lob.

TRA

TRACHELIVM RAMOSVM FLORIBVS
plerisque singularibus.

Descriptio



Est nobis nescimus unde planta sicca, ex Trachelio-
rum minorum
genere speciosa:
radix crassiuscu-
la, uncias qua-
tuor longa pa-
rum fibrosa: fo-
lia ad radicem
multa ex breui-
bus pediculis
vnciam vnā
vel duas longa,
mediam latā:
caulis hirsutus
pedales in ra-
mos diuisos,
qui desinunt in
foliis breuioribus, latis,
ex quorum me-

dio oriuntur magis Campanæ purpureæ, ple-
rumque singulares.

TRACHELII MINORIS SPECIES DVÆ,
sive Rapunculus silu. umbellatus
maior & minor Thalyo.

Lacteo est succo, sicut reliquæ Rapunculo-
rum species. Duplex verò reperitur: maior,
quæ rarius obuiam fit, ex vna radice numerosissi-
mos profert coliculos, tenues, teretes, scabros, hi-
spidos, sesquipedales, foliis plurimis, oblongius-
culis, angustis, simbriatis, ac hispidis præditos, in
umbella parua flores cæruleos continentes: se-
mine fuluente exiguo. Minor species locis aridior-
ibus ac soli expositis, maximè verò arenosis
frequentior est, foliis & caulibus breuioribus, ut
& umbella sua cærulea.

Thal. Harc. Rapunculus silu. cæruleus umbel-
latus maior & minor.

C. Bauh. phyt. Rapunc. 7. sive umbel. latifol.
Thalyo, Rapunculus silu. cæruleus umbellatus
minor. Camerario Hort. Icon. 8. Rapunculus 6.
sive umbellatus angustifolius Thalyo. Rapun-
culus silu. cæruleus umbellatus maior.

Schvv. Rapunculus silu. cæruleus umbellatus
angustifolius, quem C. Bauh. Nabelsche walde
Rapungel vocat, dicitque Augusto flores fer-
re in montanis recessibus ad Quissum fluiuium.
Quæ sit hæc planta nobis nondum constat: Ger-
manicæ linguæ periti considerent an umbellatus
bene dicatur Germ. Nabelsche.

TRACHELIVM MINVS ALBVM.


Descriptio

Observabam anno 1596. Augusto mense in
cultiss. horto Domini Friderici Meier, Tra-
cheliolum minus floribus albis non magnis, multis
simul in extremitate caulis, cubitalis, lauis: fo-
lia longo pediculo uncias tres longis, duos latis,
non in acumen desinentibus, ut cæterorum
Tracheliorum, serratis, vix asperis, glabris.

Hoc ex sicca describimus. Idem verò spicor
Tom. II.



fuisse quod an-
no 1600. adhuc
florens Septem-
bri obseruavi in
prædicti horto,
cuius flores al-
bi vbi exsiccati
subcæruleum
colorem acqui-
suerunt.

TRACHELIVM ALTISSIMVM HIRSV-
TVM ASPERIUS, FOLIIS ANGVS-
TIS, floribus parvis.

Radice cras-
sa nititur
& subdulci, cau-
lem erigit bicu-
bitalem vel tri-
cubitalem, cras-
susculum, hir-
sutum: foliis or-
natum angu-
stis, longis, ad
Echii folia acce-
dentibus, aspe-
ris: flores con-
sertim conglo-
merantur, ut in
Trachelio mi-
nore, campa-
nulat, sed mi-
nores, cum ta-
men planta
maior.

Hoc Trachē-
lii genus inue-
nimus 1592. mense Iunio florens, inter Sultz
Alsatiz & Zenne vrbes, attuli plantandum in
hortum Ill. E. C. Montbelgardi.

TRACHELIVM MAIVS PETRÆVM.

A radice lignosa, & tugola colore pallido pur-
purascente exente cauliculi multi striati,
subhirsuti, cubitales, & cum tubore vi-
rides, qui inordinatè emittunt folia oblonga, cre-
nata, nigricantia, suā pariter hirsutie communi-
ta, parte prona potissimum, vbi etiam albicant;
& Saluiz folia referunt, magis tamen angusta
& mucronata, inter quæ paruula quædam folio-
la prodeunt: in summo caule sunt flores multi a-
ceruatim congesti, quemadmodum in umbella-
ta Ceruicaria Penz: & inferius ex eodem globuli
quidam, at minori numero, & inferius magis in-
ter caulem, & folia, alii, & adhuc pauciores, for-
mam repræsentant illorum iam dictæ Ceruicariz,
sed minores, albi, & in quinque, & quandoque

Xxx +



septem mucro-
natas scissuras
diuisi: è quorū
centro multa
exerunt flamina
sublutea, quorū
vnum modo
Proboscidis e-
greditur, versus
cacumen satis
crassum, quod
dum maturatur
bifurcatum &
aduncatum eua-
dit: decedente
Augusto florens
conspicitur at-
que talis per
plures dies cō-
seruatur. Vnde
Pona hactenus
semen. minimè

obseruare potuit inter rimas florum asperrimo-
rum lapidum Baldi, solum circa Coronæ Tem-
plum pullulat.

Vires & v-
lus.

Trachelium hoc non acre, non amarum, sed
tantum adstringens esse sensu dignoscitur, mul-
toque magis ipsa Ceruicaria.

TRACHELIO MAIORI PETRÆO

Ponæ simile, si non idem.

Descriptio.



Noua hæc
nec hactenus
nobis visa
planta caulem
surgit [ve in
sicca quam ha-
bemus apparet]
cubitalem aut
altiore, cras-
sum, firmum, li-
gnosum, incano
tomento pubes-
centem, in ra-
mos nullo ordi-
ne diuaticatum:
foliis alterno si-
tu vestitum cre-
natis, itidem to-
mentosis, sed
magis parte a-
uersâ quæ & in-
cana. Ipsa porro

cauli hærentia folia quædam vncialia, longiora
etiam, semunciam ferè lata, quædam breuiora,
præsertim & angustiora quæ in summo consti-
tuta. Quæ verò ramis hærent prædictis multis
numeris minora, ramorum summam partem
occupat glomer densus atque crassus, colore in
sicca non satis apparente, facie quodammodò
florum Petasites, è quibus flamina emicant præ-
longa, & quantum conicere licet, nullus ma-
nifestus nec odor neque sapor.

Hanc plantam accepimus à Fratre C. Bauhino
nomine Crista Galli Recentiorum ex monte
Baldo: Longè tamen diuersa est à Crista Galli
quia Campanulas fert, ve primùm animaduerti-
mus 1609. ex pulchra planta Veronâ missâ per
insignem Botanicum & Pharmacopæum Petrū
Ponam. Nos quidem tenemus esse idem cum
Trachelio maiori petraeo Ponæ, qui in monte
Baldo eius iconem proposuit nōnnulli artificio-

am, nam in ea pro foliorum crenis longi pin-
guntur pili.

TRACHELIUM TRAGOPOGI

folio montanum Fab. Columnæ.



Non è flo-
rum for-
ma, natali lo-
co, annique
tantum tem-
pore quo flo-
ret, sed & la-
ctis copia, sub-
stantiâ folio-
rum, & sapore
totius plantæ.
Tracheliorum
varietati, sic à
Recentioribus,
quia trache-
æ locisque
vicinis medea-
tur, vt dictum,
appellatarum,
reddenda est
hæc noua plan-
ta, in D.M. Vir-

Descriptio.

Locus.

ginis Monte, sic vulgò dicto, exoriens.

Radix quidem habet crassiusculam albidam
lactescentem, & ex ea plures propaggines habentes
folia angusta, longa, duricula, Croci aut Tra-
gopogi formâ, & magnitudine. Veris fine caule
pedales edentes subrubentes, atque hirsutos,
quibus folia alternatim, rariâque hærent, in quo-
rum summo sex aut septem simul flores purpurei.
Nolæ forma, Trachelii vulgaris modo, ex basibus
singulis quinque foliolis viridibus constructis,
exerunt: fructus atque semina Trachelio etiam si-
milia Aestate perficit. Radix perennis est, atque
dulcis, esui apta sicuti vulgare Trachelium, & Ra-
puncium.

Clus. in fol. Trachelii genus elegans observa-
tum à Fab. Columna.

TRACHELIUM SIVE VIOLA

Calathiana Herb. Angl.




Cv nulla
præsentis
plantæ descrip-
tio à nobis ad-
feratur, ratio est
quod ad herbæ
iconem expres-
sam, eam teme-
rè more aliorū
effingere, no-
luimus. Siqui-
dem nec viua
in nostrū consp-
ectum vquā
venit, nec
nos, quod equi-
dem ingenuè
fatemur, linguā
Anglicanā quā
à Gerardo pag-
363. describitur,
calicamus, nec

quispiam alius præter eum, Trachelium hoc deli-
neauit. Vocat autem hanc Violam Calathianam,
Angl. The true Calathian Violet.

CAM.

CAMPANULA LYCHNIDEA.

Dele apur



Radice fibrata est, pal. num longa, nigrescens, neruum intus habens, in profundum acta, sapore dulci cum adstringente. Ex ea ramulos fundit multos, rotundos, villotos, incanos, vix pal. num excedentes, in quibus folia angustapilosa, incana, per cauliculos incerto ordine distributa, leuiter adstringentia: in summo caulium vertice flores exeunt Campanellae similes, quales in conuululo, rotundi, ex candido nonnihil purpurei.

Lychnidis speciem, Myconus appellauit, à foliorum figura, & florum quadam similitudine: quanquam non tam calida sit, ac reliquae Lychnides à Diosc. & Galeno traditae.

H. Lugd. Lychnidis silv. species Myconi.

C. Bauh. Phyt. Lychnis 14. siue silv. Campanula flore.

Locus & Tempus

In montibus & locis maxime siccis prouenire Myconus ac, nec alibi à se visam quam in montibus D. Mariae à Monteferrato. Floret Maio mense.



nor, magis fibrosa tortuosaque. An Theophr. l. 1. hist. pl. c. 21. Iafone. An Plin. l. 21. c. 22. Iafone. olus.

Autore Gesnero hort. Germanis quibusdam inferioribus Campanula caerulea, quae Coudenhambius Rapi silv. quod Rapunculum vulgo dicunt, speciem minorem facit, eamque hortensem, Belle videre, siue Belvedere, vocatur.

Non desunt, annotante Matthiolo, boni Simplicistae qui volunt plantam cuius figuram exhibet, esse verum Phyteuma: qua de re tamen adhuc aliis iudicium relinquit. Figura Matthioli depicta est ad siccam herbam.

Campanulam caeruleam satiuam Dod. in hist. Gall. vocat. Germ. Blau Clockens: lib. de flor. & in fol. Campanulam hortensem maiorem, eoque nomine depingit dicens: siluestrium Rapunculum species vulgo Campanula nominatur, plerisque, *velutidere*. Matthioli Phyteuma esse existimat, ei tamen Iafone Theophr. & Plinii similior videtur. Non sanxit autem Matthioli Campanulam hortensem esse Phyteuma, ut Lob. & Pena asserunt his verbis. Noltrates Campanulae duae hortenses, Persicifolia, lacteosa, flore volubilis: eis nola, caerulea, alba. Putantur mentis Theophrasti Iafone, capitula insunt foraminibus perna, quod imposuit Commentatori, quidamque putant & sanxit Phyteuma.

Clus. hist. post. Campanula Persica [Mali] folio nunc caeruleum, modo album florem proferens, alibi vero Campanula angustifolia, siue Matthioli Phyteuma.

Tabern. Icon. & hist. Campanula angustifolia Klein glöcklein. An eidem Icon. & hist. Rapunculus 6. nemorosus 2. valde Rapunzel. Item Rapunculus 7. nemorosus 1. valde Rapunzel.

Gerard. p. 367. Campanula Persicifolia pzeach lased Bosflower. Item Campanula lutea linifolia yello Bosflower. Falis h. titulus pro Rapunculo nemoroso 3. Tabern. cuius icon à Gerardo proponitur.

An C. B. phyt. Rapunculus 8. siue nemorosus folio oblongo crenato, Tab. Nemor. 2. Rapunculus 9. siue nemor. breui folio crenato Tab. Nemor. 3. Huius aliquot species obseruare licet, ut & Thalius in sua Hareynia monet, huc enim eius secundus, quartus & quintus pertinent. Rapunculus 10. siue angustifolius non crenatus, Thalyo campanulatus nerifolius 2. Item Campanula angustifolia, Lobelio Persicifolia.

Rapunculis an numero, ait Thalius, stirpes illas lacteo succo praeditas, ac Rapunculorum modo oblongioribus & lactescentibus radicibus, supernè prostrantibus constantes, & Campanulatos flores edentes, vnde Campanularum nomine communiter verbaris vocatè veniunt: quibus omnibus folia sunt Nerio similis, hoc

CAMPANULA ANGUSTIFOLIA
caerulea & alba.

Dele apur

Procera est ad cubitos duos, caule anguloso, rigido, ex atro virore splendente: folia striata, non multum culmo latiora, palmo longiora, rigida, leuiter denticulata, proxime cauli alternatim adnascuntur, eque eorum alis pediculi prodeunt, vnum, duos, aut plures flores sustinentes,

Campanae vel Calachi figura, ut in Rapuntio, sed magis patulos, in quinque acutiores lacinas dehiscences, colore plurimum caeruleo, raris albo, apicibus concoloribus: succedunt capitula, tribus foraminibus peritula, supra umbilicum sese tollentibus quinque foliolis. Radix quam Rapuntio mi-



giora ac latiora in quibusdam speciebus, in quibusdam etiam breviora ac angustiora. Hincque eas rapunculos *rapunculus* appellant. Harum aliquot species facile admodum industiore herbariz perfrutatori patebunt. Ego verò recensendo hic tot, quot illo in genere hactenus per Herculiam nostram mihi observare licuit. Rapunculus ergo Campanulatus Nerisifolius primus caulem habet sesquipedalem, teretem, parum striatum, inter folia adnata quædam seu brachiola explicatum: folia autem Nerii quincunciali longitudine, vncialique fere latitudine: *Primum* Campanulatum, cæruleum, in ambitu orificii parum dissectum. Secundus folia obtinet priora crebriora, pauloque angustiora, longioraque multo, utpote dodrantalia: caulem item crassiorum: florem prioris minorum. Tertium & ultimum quoque folia exhibet angustiora, secundo tamen breviora: flores verò ampliores maioresque, Cymbali alicuius patentioris in modum, in extremis oris diuisos. Quartus caulibus brevioribus, foliis item minoribus, quorum ea quæ radici propinquiora sunt, vnciarum fere trimum sunt longitudinis: dimidia autem latitudinis: quæ verò per reliquum caulis conspiciuntur, his breviora sunt: floribus est autem admodum patentibus repandisque, sed tertiis minoribus. Quintus caulis est pedalis, paulove procerior, asper, non admodum foliosus: folia verò sunt nigriora, vncias quatuor, aut quinque longa, vnam verò penè lata: flores cymbalares, minores, aperti, ventrie tamen eius non in rotundam cau tatem expansi, ut in illarum specierum floribus, quas iam recensui, videre est, sed plicati. Sextus Rapunculus Campanulatus aut Nerisifolius minor, caules erigit pedales, angulatos, scabros: folia eius, ea videlicet, quæ radici proxima sunt, vnciarum quatuor longitudinem assequuntur, vnius verò latitudinem: reliqua quæ cauli appenduntur, triuncialia sunt, & breviora etiam: caules huic speciei in summo in brachiola diuiduntur crebriora, tenuiora, flores exhibentia Campanulatos, cæruleos, plicatos, in ambitu ad orificium diuisos.

Schvv. Campanula angustifolia cærulea maior Matth. *et* *rapunculus* Diosc. Lob. Campanula Persici folia nostras Waldglöcklein / wald Cymbeln / Teubeg'osen, Grosse Schellen. Campanula minor angustifolia flore albo, weisse waldglöcklein. Item Rapunculus *rapunculus* aut Campanulatus Thal. wald rapunzel / wald Glöcklein. Minor non annotat Schvv. k. quem Nerisifolium Thalii ex iam recensitis intelligat.

Locus & Tempus

Campanula angustifolia flore cæruleo & albo copiosè prouenit in horto Ill. E. C. flore cæruleo inueni spontè florentem Iunio in Alsatia inter Sultz & Zenne Vrbes, alibi præterea flore modò cæruleo, modò albicante variis in locis inter dumeta inueni. Geneux cum essem abundanter vidi circa Montem Salcuz. & virentem ibi principè februarii inueni, prouenit etiam copiosè non longè à Geneua in colle *la Bassie*. Campanula angustifolia maior Schvv in collibus apricis & frutetis Iunio & Iulio flores, vsus neglecti.

Vires & Vitis

Horti voluptatis causa habent, tamen in oleo manducant, Lobelius.

VIOLA MARIANA DODONÆI, QUIBUSDAM Medium.

Descriptio

Radix vesca, dulcis, alba, longa, crassa: quæ caulem emittit plusquam bicubitalem, tere-

tem, bisutum, asperum, in ramos diuisum: folia Trachelitice Campanulæ maioris, angustiora,



longiora, hirsuta, crenata, & modicè per margines crispata: flores ramulorum extremitatibus insident, calathii seu Campanulæ formi, maiores quàm Tracheliti, ventriculi, oris in quinque laciniis diuisis, colore cæruleo seu violaceo, purpureo aut albicante, in quorum medio *stamina* latent lutea stilusque cæruleus, luteo puivisculo respectus: insidet autem totus flos calathulo crebris thornis hirsutis inæquali, in quinque acuminate foliola floris latibus appressa dissecto. Semen exiguum, spadicum.

Rapunculi *Diosc. loricatus* alterum genus grandius Diosc. Medio vocat: apud

quem autore Cæsalpino, legendum Seridi [folia similia] ut legit Orbazius [ac etiam Ruell. & Marcell. & Matthioli] non Indi, ut vulgati Codices habent.

Gesn. Rapi sylvestris genus maximum, quod aliqui Medion vocant.

Tabern. Hist. & Icon. Weis Marien glöcklein, Viola Mariana alba: & Braün Marien glöcklein, Viola Mariana purpurea: Medium, Germ. Glöckendün.

C. Bauh. Campanula 17. Viola Mariana. Sunt qui Rapum filu. Diosc. alii eiusdem [Dodonæus] Raphanum filu. alii Medion Diosc. sed malè, autumant. Variat flore nunc purpureo, cæruleo: nunc subalido aut lacteo: Reperitur quoque flore pleno.

Gerard. Viola mariana, Mercuries violets Couentrie Rapes / Maricetes blanc & white Couentrie bels, & Viola Mariana flore albo. Rapum filu. Græcis *ραπυνην* dicitur.

Violam Marianam Recentiorum plerique Medion esse volunt, quamuis Viola Mariana, Dod. teste, non admodum respondeat Medio à Diosc. descripto. Quare non Medium, sed potius verum Dioscoridis Rapum filu. videtur (*ραπυνην* dicitur) cum cuius descriptione magis

condemnit. Cuius tamen descriptio superfluum quorundam accessione corrupta.

Violæ Marianæ varietates tradit Clusius. Violæ Marianæ quibusdam Medium creditur, ut plurimum quidem Violæ coloris flores gestant: sed tamen etiam albos, interdum exalbidos, nonnunquam cineracei coloris, acque etiam versicoloris, hoc est, ex albo & violaceo, vel maculati vel radiati commixtos.

Locus
tempus.


Violam Marianam Dodon. siue Medium quorundam habui Genevæ in horto. Basileæ vidi in horto D. Fælicis Plateri: Patavii in horto D. Cortusii, Iannuario. is vocabat Medium: Bononiæ in horto di S. Salvador, alburgo di S. Catharina: Montbelgardi ex semine mihi fœliciter provenit in Horto E. C. flore penè candido & purpureo copiosius: primo anno non fert caules, ubi autem semina caules tulit perit & semine deceduo se propagat. Nascitur, ut aiunt, in silvis & montibus, nec non in opacis quibusdam tractibus ut Matth. refert, plerisque Italici ac Germanici locis: apud Belgas in hortis colligitur. Iunio, Iulio & Augusto mensibus floris eius productio: semen interea ad maturitatem pervenit, neque enim simul sed particulatim floret.

Vita.

Ceterum, quod ad facultates attinet, si Dodonæo credimus, radix Violæ Marianæ refrigerantis & nonnihil adstringentis est potentior: cui, ut aliorum sylvestrium Raporum, apta est, & non incommode acetariis additur.

MEDIUM DIOSC. RAUVOLF.

Descriptio



Inter frutescens in altum exurgit. Violæ Marianæ Dodon. persimilis est planta, nec ita obvia cuius differentia apparet, præterquam in foliis, quæ in hac diuisa magis, Cichorii instar. Flores etiā magis panduntur, octo foliolis in orbem dispositis constantes: radicis austeritas maior quā capitulorum seminum, quæ tamen nondum erant matura: Rauwolf.

Rauwolf. Medium verum Diosc. & Mindium Rhazis, cuius icon apud Rauwolf. par. 4. No. 284. Medium Diosc. vel Mindium Rhazis foliis Plantaginis minoris, Hist. Lugd. Quæ malè convertit Wegwart vocabulum Germ. Plantaginem, cum sit Cichorium.

C. Bauh. Phyt. Campanula 18. Viola Mariana laciniatis foliis, peregrina.

In profunda tenebrosa & aspera valle Libani: Rauwolf.

CAMPANULA MAIOR ET ASPERIOR
folio Vrticæ.



Medium Descriptio
Mad Violam seu Medium quibusdam dictum accedit radix alba, Rapunculi, sapore non minus grato, caules cubitales & altiores, hirsuti in quibus alternatim nascuntur folia Vrticæ, pilosa, acutiora: flores ex foliorum alis cærulei, violacei, aut albi, nolæ similes, Marianæ Violæ, sed minores, calycæ

parvos, nec ut in illa torulis cannulato, in lacinias quinque, sicuti & flores, diuiso: stilus triceps, colore purpurascens, albido, vel herbaceo, luteo, staminibus circumstipatur luteolis.

Fuch. Campanula, Germ. Balßtraut, hoc est, Ceruicaria. Gall. Gaudinastre Dame, ou Gantelle.

Dodon. de flor. Rapum silvestre 2. Belgis Balßcrut. Ceruicaria maior, Græcè γαυδινάστρη, plerisque Vuularia. In hist. Gall. Ceruicaria. Item Lat. in fol. Ceruicaria maior, cuius flores aut colore candidi, aut dilute purpurei, vel ad cæruleum inclinantes. Huius species quædam est foliis aliquantò laxioribus: floribus elegantioribus coloris purpureo cærulei, cuius radix aliquot annis viuax restat, & Vere regerminat.

Clus. in Pann. & hist. post. Trachelium foliis vrticæ, & Trachelium aut Campanula vulgò dicta. Campanula quibusdam herbariis vocata Archangelica.

Lobel. & Penz γαυδινάστρη, siue Ceruicaria & Vuularia, Belg. & Germ. Balßtraut. Trachelium siue Ceruicaria: Vuularia Tragi & Herbariorum. Campanula Fuchii & Archangelica quorundam. Trachelii varietates. Passim istud etiam asperis, saxosis Angliæ & Gallobelgiæ siluosis fructuat: sed strigosius, hilari minus & amœno aspectu, alioqui persimile & congener.

Thal. Harc. Ceruicaria maxima, foliis vrticæ maioris, caule sæpè tricubitali, floribus magnis cæruleis, quandoque etiam albis.

Tab. hist. lib. 2. & Icon. p. 412. 413. & 414. Ceruicaria, Vuularia, Campanula maior 1. Balßtraut. Maior 2. Groß balß traüt. Terna alba, Klein balß traüt. Ponit Taberna quidem icones: sed discrimen non tradit.

C. Bauh. phyt. Campanula n. folio Vrticæ. Variat flore candido, dilute purpureo, vel ad cæruleum inclinante. Reperitur & strigosior. Campanula 12. foliis Vrticæ, sed laxioribus, Dodon. Ceruicaria maior altera.

Gerard. Angl. Trachelium 1. maius. cantaburic belß. Trachelium 2. maius albo flore. Trachelium 3. maius Belgarum Lobelii, durch Trore voors [Tab. Ceruicaria 4. alba.] Trachelium 4. minus Small canterburic belß. Taberni. Ceruicaria 3. alba.

An Geiner. hort. Rapi sylvestris genus mas

Ceruicaria
alia, spectat

Tab. 415

foliis ferè vrticæ.

Schvv. Trachelium maius purpuro-niolicum
Braune Glocken / Braun finger hüntlin. Tra-
chelum maius albo flore. Cervicaria alba Tra-
go, Weisse wald glocken, gapffenfraut. Trache-
lium alpinum maximum. Cervicaria maxima, ac
hominis proceritatem sæpè assurgit.

Locus &
tempus

In Pann. Austria, teste Clusio, nullæ montosæ
sunt silvæ, quæ Trachelium vrticæ foliis subcæ-
ruleo flore non alunt: sublimiora iuga, vt
Schneeberg & alia similia, itidem quod albo flo-
re est. In Silesiæ pratis & silvis cædvis saltuosis
inuenit Schvvencsfeldius: maius flore albo in
conuallibus ad Boberum vmbrosis Iulio floret.
Alpinum maximum, sæpè in foueis nivalibus
vdis herbis affurgit, Iulio flores campanulæ
prominent.

Passim in comitatu Montbelg. prouenit Cam-
panula Fuchsi flore dilutè purpureo, vel ad cæ-
ruleum inclinante, vidi etiam candido propè
l'Isle Burgundiz, vnde transfusi in hortum Illust.
Principis. In monte Rossberg propè Masimuns-
ster inueni florentem mense Octobri, Geneuæ
etiam florentem Maio, Basileæ mense Iunio ex-
tra portam Stein in colle ad sinistram, & aliis
locis multis, radices similes Asphodelo, in sy lva
quæ itur Basileæ in Bintze Marchionatus florens
Octobri: Vidi Parauit in horto Domini Cortu-
sii. Campanulam Fuchsi flore omnino albo vidi
in dumetis eundo Basileam prope Feuray pa-
gum, mense Iulio 1607.


214

Vires &
Tèperam.

Gustu adstringit, vt hinc exsiccandi illi vim
esse quisque conicere, queat. Adstringendi ha-
bet facultatem, ideoque decoctum illius vnicè
ad oris exulcerationes, aliaque eiusdem mali,
quæ adstrictione indigent, confert. Vtilis etiam
haud dubiè ad alia quævis vlcera, ob insignem
quam obtinet in exiccando facultatem, Fuch-
sius. Radices porò omnium horum refrigerantis
potentia sunt & non nihil adstringentis, possunt
autem omnes vnà cum aliis in acetariis edæ. Sunt
etiam qui Cervicariæ radicem decoctum aduer-
sus incipientes oris & tonsillarum inflammatio-
nes conferre affirmant, Dodon. Radix alba tene-
ra in acetariis apta ieiunio verno præsertim, Lob.

CAMPANULA SIVE CERVICARIA MA- ior & maior, flore albo magno.

Descriptio



Nobis de-
dit Domi-
nus Agerius
plantam nomi-
ne Cervicariæ
maioris flore
albo, foliis gla-
bris, differt mul-
tū à nostra
Campanula
maior & aspe-
riore, ea enim
vix apparentes
habet pilos,
serraturæ etiam
minores, nec ita
inæquales, flos
Campanulæ a-
lii qui magnus,
albus. Tota
planta prædicta
minor atque te-
nuer apparet.

CAMPANULA ALPINA GLABRA FLO- re diluissimè cæruleo.



Plancha Cl. Deser.
panula est,
quæ nobis à
Domino Agerio Medico Ar-
gentinensi data:
flore coloris di-
lutissimi cærulei,
is collegerat
in vertice mon-
tis Tyrolensis:
nihil hirsuti, aut
asper, nobis in
hac planta ap-
paret, parua rami-
mus est ferè pe-
dalis: folia ali-
quid habent si-
militudinis cum
Hieracio Sa-
baudo, in cir-
citu serrata.

minora sunt quàm Campanulæ nostræ minore
flore, flores etiam paulò minores videntur in v-
num latus versi, ex breui pediculo nutantes.

CAMPANULA SIVE CERVICARIA BO- noniensis paruo flore.



Insignis & di-
ligens Bota-
nicus Dominus
Doctor Agerius Medicus
Argentinensis
pulchram plan-
tam dedit no-
bis nomine
Cervicariæ Bo-
noniensis, vt-
pote quæ Bo-
noniæ copiosè
proueniat. Ea
licet non inte-
gra, bicubitalis
erat, caulis ro-
tundus, fungo-
sus, non nihil a-
sper, folia per
caulem sine pe-
diculis hærent,

eum ferè amplectentia, in quo differt à nostra
Campanula repente flore minore, sunt etiam in-
latiora, latitudinis parè trium vnciarum, longæ
quatuor, plūs minūs, serrata, infernâ parte albi-
cantes pilos habent valdè exiguos: summitas
quæ floribus vestita pedalis est, & quamplurimis
abundat Campanulis, quibusdam ex breuibus
pediculis cauli hærentibus, aliis tamulis breuibus
duarum aut trium vnciarum.

CAMPANULA RIPENS FLORE MINO- re cæruleo.

Campanulæ Fuchsi affinis, sed radix impor-
tuna petulantia reptat, alba, crassè sic satis
fibrata, Descriptio.

fibrata, gustu dulci, suavi: caules cubitum vnum aut alterum alti, brachiati, subrubentes, serè glabri in quibus folia alternata, serrata, minimum hirsuta, nec aspera, ut Campanulæ iam dictæ, & angustiora, quæ in caulibus quidem carent pe-



diculis, at inferiora, ut latiora sunt ita longis pediculis sunt appressa: ex foliorum alis Campanulæ singulares prodeunt, violaceæ, magnitudine & formâ Rapunculi sativi, apicibus chloris, stillicitipis, calyculis in quinque lacinias, quot scilicet sunt floris lacinis, diuiso, floris verò selectæ lacinis pilosæ conspiciuntur. Nondum expansus flos pentagonus est, interque angulos pulchrè carinatus. Figura quæ Fuchiana est, nec prima folia habet. nec in cæteris rumis affabrè picta. Tolerabilis tamen.

lofæ conspiciuntur. Nondum expansus flos pentagonus est, interque angulos pulchrè carinatus. Figura quæ Fuchiana est, nec prima folia habet. nec in cæteris rumis affabrè picta. Tolerabilis tamen.

Alpinus m.

Gesner. de coll. stirp. Rapum minus suis radiculis serpens.

Rapum.

Dodon. de flor. & in sol. Rapi quartum genus.

Clus. in Pann. & hist. post. Trachelium aliud mollioribus foliis, radice mirè serpente, cuius rei causâ rei herbariæ studiosis est exosa.

Tempus & locus.

Montbelgardi in Horto Il. E. C. provenit mihi Campanulæ genus, radice reptante, quæ ita replet areas ut vix eradicari possit: eandem vidi in horto Di. Dancurtii in Audincourt, & aliis pagis ut Ram. Floret Augusto, Septembri & Octobri. Basileæ copiosè provenire observavit Frater.

Tempus & Vitis.

Similes facultates ac temperamentum huic Dodon. tribuit quod tribuebat Campanulæ Fuchsi, dicens, refrigerantis potentia & nonnihil adstringentis, ac radices edi posse in acetatis.

CAMPANULA SIVE CERVICARIA MEDIA THALIO FLORIBUS Cæruleis parvis.


Descriptio

Cervicaria Media Thalii, locis montanis & Soli meridiano expositis nonnunquâ prodit, caule tereti, aspero, foliis plerumque amictis, minoribus multò, viridioribus superius, inferius candidis, lanugine vestitis, quali folia Althææ, sicut & folia mediam figuram inter Vitis maioris breviora folia & althææ referunt. Caulis ut plurimum vnicus est sine ramosis adnatis, sæpe numerò tamen in plures dividitur brachiatis virgulas. Circa medium serè caulis ubi maiora folia exoriri desinunt, frequentes adnascuntur, ordine per certa intervalla usque in apicem caulis consequenter, ac ex alis peculiaribus ad latera erumpentes, tenuibus quibusdam foliis iisque incnspatis parum ac agminatim denique sibi cohærentibus constitutæ, ex quibus longa serie in scapo flores crebri prodeunt ele-

Tom. II

gantet cærulei, similes prioribus, sed multò maiores.

CAMPANULA PULCHRA à Tossano Carolo missa.



Hvis r. Descriptio. Hæc, non altè quidem ut illa demitur, sed innumeris tamen fibris latè cespitem occupat, candidatibus, lactifluis, dulcibus, caules coplures duorum aut trium cubitorum altitudine concaui sunt, minimi digiti crassitudine, striati, minimum hirsuti: folia Vitis, Campanulæ maioris quidem formâ, hirsuta,

palmari & lesquipalmari longitudine, latitudine palmari, in ambitu serrata, alternatim ex certis intervallis cauli apponuntur: ex quorum alis singulis singuli flores, partim sursum vergentes, & partim deorsum inclinantes ex brevi pediculo purpurascens, albidum cæruleo, calathi effigie, siue Campanulæ, in quinque lacinias longas acutius partem, floris glabri, intus hirsuti, oriuntur: apicibus toudem luteis, stilo dilutiore qui in suprema parte in tres partes finditur, quæ circumflexuntur: Calix quinque cuspides longos habet: flore marcescente succedit magnum caputulum Mespilo simile, deorsum inclinatum, in quo semen. Folia inferiora erant in iconè nostra pingenda latiora.

C. Bruh. Phyt. Campanula 10. siue foliis Vitis latissimis, quam in horto Ill. Ducis Vvirtemb. Montbelg. collegit. Clusius hist. post. & Lobel. Obs. & Icon. plant. tom. 2. hanc videntur exprimere nomine Trachelii maioris Belgarum.

Tossanus Carolus Pharmacop. Stirpium studiosissimus pulchram hanc Campanulam ex Burgundia misit: quæ quotannis Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret Iunio & Iulio.

Locis & Tempus

TRACHELIUM CANDIDUM ANGLICUM MAIUS, FOLIIS FERÈ DIGITALIS VEL CAMPANULÆ.

Semina venustæ & rarissimæ plantæ ad Lobelium misit D. Thomas Pennus Medicus Londinensis: ex boreali Angliæ tractu delata, ubi copiosa & nusquam alibi, vel à quoquam observata. Tota facie Cervicariæ maioris iam descriptæ absimilis, sed folia serè digitalis: Flores item Trachelii vel Violæ Marianæ, candidissimi & maiores & longiores. Caulis binum & ternum cubitorum surrectus. Radix fibrata, crassiuscula, lactescens, variè diuiscatur. Semen Trachelii, sed maius.

Lobel. Obs. Anglicum Septentrionale maius Trachelium candidum.

177



Gerard. Hi-
stor. Angl.
p. 364. Trache-
lum Gigan-
teum Anglis
Giant Thro-
atwort.

Campanulam maiorem siue maximam, teste



Dodonæo, sūt
qui Columna-
rem & quidem
Plinij iudicent,
cū tamen
herbz Colum-
naris nomen a-
pud hunc non
reperiatur, Alii
Anthemum e-
iusdem faciūt:
sed legendum
lib. 26. cap. 8. E-
ranthemum,
quod Anthem-
idis species
est multū à
Campanulis
differens.
Camer. hort.
Campana py-
ramidalis siue
laetescens 27.

PYRAMIDALIS VALERANDI HIRSVTA

Descriptio



PRIMO anno
mihī caulem
non produxit,
qui sequente
demum anno in
tantam excreuit
altitudinem, vt
facile larceam
æquaret, hirsu-
tus, medulla al-
ba fæctus, folijs
vestitus internè
& supernè hir-
sutis, acumina-
tis, serratisque,
Campanulæ
Fuchsi acceden-
tibus: flores lōga
seric, Campanu-
las imitati, Ra-
punculi vulgati
haud maiores,

cœrulei, per oras laciniati, ex vno pediculo plu-
res.

Loco

Pyramida-
lis

Quum Lugduni Medicum agerem provenit
mihī in hōrto meo, ex semine per Valerandum
Dorez affinem ex Sclauonia delato, ipse Pyra-
midalem nominabat.

PYRAMIDALIS LEVIS.

Descriptio

LAETE turgēt radix, Rapunculi similis, resti-
bili fertilitate, se multiplicans, etiam ex fru-
tulo repullulascens: ex qua caules trium qua-
tuorve cubitorum surgunt, leues: folijs vestiti
glabris, oblongis, fortuitis crenis incis, verū
inferiora folia palmum aut sesquipalmum longa,
palmo latiora, per extremum serè obtusa, & ea
quoque glabra, raris admodum casuris dissecta,
& vix dum serrata: flores à medio caule ad sum-
mum vsque fastigium cœrulei campanulas oris
laciniatis exprimunt.

Videtur nobis Hist. Lugd. Pyramidalis nostræ
levis duplicem & descriptionem & iconem pro-
ponere. Ac primam quidem pag. 642. sub hoc ti-
tulo: Pyramidalis Rapunculi genus Dalech. Al-
teram, p. 827. quam Campanulam laetescentem
maiorem Lobelij, seu Pyramidalem-Lutetianam
intēcabit.

ibid. præ reliquis plurimo lacte fæctens.

Lob. Obs. Laetescens Campanula maior. Py-
ramidalis Lutetiana. Icon Plant. pag. 497. Teut.
402. Tabern. hist. & Icon. Campanula Lactaria si-
ue laetescens M. Chg. & Flein.

Gerard. Campanula laetescens pyramidalis
Steeple milkie Bollflower.

C. Bauh. phyt. Campanula 2. laetescens.

Pyramidalis nomine ante plures annos, her-
bam vidi Basileæ in hōrto Domini Doct. Zvink-
kæ, vnde semen habui, quod scitum Montbelg.
in hōrto Ill. E. C. prouenit, & sequenti anno se-
men tulit, hæc autem Pyramidalis differt à Vale-
randi Dorez Pyramidali, hanc enim ad tantam
altitudinem prouenientem non vidi, præterea
folia differunt, in hac glabra, in alia hirsuta, quæ
etiam in hac non ita serrata: radices vt Rapun-
culis, quæ facili se multiplicant.

RAPUNCVLVS MONTANVS, SIVE Trachelium montanum.



Folia multa
propter
terram in qu-
busdam du-
bus viciis lon-
giora, in aliis
quaduplo ad
Echium accen-
dentibus, ex
angusto princi-
pio sensim la-
etescens, sen-
simque dein-
ceps in acu-
men definen-
tia, vtrinque
hirsuta, nonni-
hil crenata, co-
stâ medium lo-
cante. Inter
hæc surgit can-
lis serè cubita-
lis, hirsutus, enodis, vno aut altero foliolo exi-
guo donatus: flores in caulis scapo superiore,
quinque aut plures, singuli in singulis pediculis
non admodum longis, magni, Campanulæ Fuch-
si similes, ex cœruleo albescentes, calyce hispi-
do basin complectente: radix crassiuscula & lon-
gissima.

guloscula, esuigrata.

Hist. Lugd. Trachelium montanum.

C. Bauh. phyt. Campanula 15. siue foliis Anchusæ.

Locus & tempus. Inueni in peregrinatione mea Rhætica, cum D. Gesnero Burnonii, florentem Iunio. Habui etiam Argentinz ex plantis Agerii, qui collegit in montibus Styriæ prope Celticam Nardum.

TRACHELIVM PVNILVM ALPINVM,
lanugine pubescens, singulis floribus ex
singulis ramulis satis magnis.

Descriptio **T** Trachelium pumilum Alpinum Clusii, dodrantalis est plantula cauliculo striato, in plures ramulos diuiso, quorum singuli sustinent florem satis magnum, cauum, Campanulæ instar efformatum, in quinque angulos desinentem, quemadmodum vulgaris Trachelii, aut Campanulæ vulgæ dictæ flos, cinereo colore præditum: floribus succedunt capitula satis magna, trigona, nutantia, seu deorsum spectantia, quæ continent semen vulgaris Trachelii semini non dispar, sed minus & exalbidum: folia quæ per cauliculum sparsa sunt, latiuscula basi eum amplectuntur, & in oblongum mucronem desinunt: quæ verò summâ cellulæ stirpi inhaerent, latiuscula sunt, & longiore pediculo innixa: radix pro plantæ exilitate satis magna, candicans, supernâ parte in plura capita extuberans, & quibusdam fibris hirsuta: Tota planta lanugine pubescit, lacteoque succo abundat.

C. Bauh. phyt. Campanula 16.

Dem. Nascitur in Schneeberg, aliarumque vicinarum Alpium iugis. Flores profert Iulio.

ALOPECVROS ALPINVS QVIBVSDAM
Echium montanum Dalechampii.

Descriptio **P**ollicaris crassitudinis habet radicem, sensim gracilescens, palmo longiorem, in apophyses aliquot abeuntem, teneram, rubentem: caulis sesquipalmaris aut dodrantalis, crassitie respondet radici, cauus, singularis hirsutus, crebris foliis vestitus, aliis palmum ferè longis, aliis brevioribus, porissimum superioribus, latitudine semunciali, hispidis, ad Echii folia accedentibus: thyrsum trium vnciarum, aut palmarem, si maiuscula sit planta, gerit, florum inter folia emergentium ex cœtuleo pallescentium, oblongorum, & per oras lacinatorum, erumpentibus è medio staminulis.

Hist. Lugd. Echium montanum Dalechampii: aliis Alopecurum montanum.

Trachelium *supponit*, Clus. Pann. Ceruicaria maior tenuifolia, Thallio. Trachelium *supponit*, Clusii, & Ceruicaria maior tenuifolia, Camer. hort. Camps nula 14. foli. Echii, siue Ceruicaria martinicola Tra-



Tom. II.

gi. C. Bauh. phyt. cuius iconem expressam nondum vidit.

Alopecurum Alpinum quibusdam dictam, aliis **Locus** Echii speciem, quod non placet, cùm Genevæ essem, audiui reperiri in altissimis Sabaudæ montibus.

RAPVNCVLVS SPICATVS SIVE CO-
mosus albus & cœruleus: itémque fo-
lio maculato.



Descriptio **Q**uasi par-
uum Ra-
pū dicas, Ra-
pūntium, vel
Rapunculum
vulgus plan-
tam indigitat,
ob solius radi-
cis, quæ sapore
& magnitudi-
ne cum culmi
Rapunculo
habet, simili-
tudinem: alio-
qui folia sunt
Violæ Martiæ,
longis appen-
sa pediculis,
nonnunquam
nigrâ maculâ
notata, quan-
quam videas
& stricta ob-
longa; in can-
te bicubitali,
inani, angulo-
so, lac manan-
te: in cuius fa-
stigio spicatus
pulcher *Rap*
cœruleus aut
purpureo-lila-
ceus, ex mul-
tis corniculis
circa basin in
segmenta ar-
cuata fissis
compactus,
Huius flos al-
bus cinereus-
ve quoque re-
peritur.

Plant. Icon. p. 319. Rapuntium maius Alopecuri comoso flore, Lob. 178. Teut. 403.

Tabern. Icon. & Hist. Rapunculus nemorosus. i. Wald Rapunzel.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Rapunculus 2. siue spicatus albus, foliis maculatis mas, & non maculatis fœmina, floribus albis cinereis. Rapunculum 3. siue spicatum purpur. Dod. Rapum silu. maius Lob. Rapuntium maius Alopecuri comoso flore. Rapunculum 4. siue spic. cœruleu. Trago Rapunculum silu.

An Cæsalp. l. 9. c. 30. Dux flosculos ferunt veluti in spica dispositos densè, quarum vna foliis Rapunculi constat: Altera Archangelicæ minoribus.

Dodon. Gall. Rapum sylvestre maius, Rapuntium maius & secundum. Gall. grande Rapunzel.

Yyy 2

HISTORIAE PLANTARVM.

Germ. *Groß Rapünzel*-Belg. *Grote raponces* len, quod sine dubio est *aximius* & Cauda vulpis à Theophrasto descripta, Lat. de flor. Rapi inquit, sylvestris sextum quoddam genus. Rapunculum sextum, colore aliàs candido, aliàs caeruleo, aliàs purpureo, nonnulli Alopecuron appellant: Sed alia est. Tragus describit flore caeruleo: vocatque Rapunculum maius & Rapunculum sylvestre, Germ. *wald Rapünzel*. In hist. Germ. *Sie andere vnd gros Rapünzel*.

Lonic. speciem globosam habet flore purpurante. *wald rapünzel/gros wald rapünzel/Rapunculum sylvestre*.

Lobel. & Penz. Adu. Rapuntium maius Alopecuri comoso flore: Lobel. Obs. pingit cum longa spica.

Gesner. hort. Rapi sylvestris genera in sylvis ac montibus, quorum flores ceu in spica sunt, alii caerulei, alii pallidi. An eadem de col. Virp. Rapum sylu. floribus vnguium instar recurvatis? Item Rapunculi sylvestris genus floribus caeruleis in se recurvis?

Clus. in Pann. & Hist. post. Rapunculus Alopecuroides longiore spica, aut brevior, coloris albi vel violacei.

Schvv. Rapunculus montanus albus, Rapunculus montanus caeruleus.

Thal. Rapunculus sylu. communior, foliis Cervicariae mai. mucronatis, caule cubitali, laevi, tereti, flore spicato, ex viridi leniter albente: passim in pratis & locis quibusdam montanis. Mihi vocatur Rapunculus sylu. spicatus albens: licet eius speciem in Thuringiaca silva, floribus prorsus candidis viderim. Eiusdem species floribus caeruleis, &c.

Camet. hort. Rapunculus flore purpureo, candidante: spicato purpureo & albo.

Geneuz albus cum longa spica, variis in locis & prouenit, vt inter Urbem Montbelgardum Charmontey, & in sylua le Chesnoy: habui etiam in Horto E.C. à me plantatum, Rapunculum flore purpureo & albo globoso, serè vt in scabiosa, foliis minoribus, quale Geneuz etiam vidi, vbi prouenit aliud genus cum longa spica plena flosculis albis in monticulo la Bassie. Hoc genus eorum comedi in acetariis Montbelgardi: tale reperit Frater in monte Mutensi Basilienium, Rapunculum spicatum reperi mense Februario in montibus Euganeis Italiz. Rapunculum flore globoso Dalech. vocabat, ni fallor, Aphyllantes genus, cum qui globosum habet florem: Ex vicinis Montbelgardo locis magnum Rapunculum spica longa transtuli in Hortum E.C. Rapunculum flore albo folio maculato obseruaui florentem Augusto, apud Fontem aridum S. Petri. Minus hæc est Lobelio obuiam multis locis necnisi montosis aut aliosis pratis & couallibus, vti sunt Mindeni & Norbonæ Aquitanicæ vicinis pinguibus, etiam Belgii & Angliæ nemorosis. Natales eius, inquit Schvv. montosa & aliosa prata, conuallesque nemorosa. Iunio spica viget.

Radix, vt scribit idem Schvv. priusquam caulem protrudat, elixa cum sale, aceto & oleo macerata, cibi appetentiam parit, stomacho prodest & vrinas elicit.

RAPUNCVLVS FLORE GLOBOSO purpureo.

Descriptio

Cubitali assurgit altitudine caule satis gracili, parte inferiore purpurascens quodammo-

do, superna viridi cui inhaerebant aliquot folia, quatuor vncias longa, in ambitu serrata, dodran-



tab pediculo innixa, & ea quidem quæ infimæ parti caulis adnata erant, secundum pediculum, vnciam aut pollicem lata, deinde sensim in mucronem definentia, quæ vtrò medio cauli, & summæ eius parti inhaerebant, longè erant angustiora, & brevior petiolo fulta, non minus tamè longa: summum caulis fastigiū define-

bat in breuem & quasi orbiculatam florum spicā, quæ solis staminibus ex purpurâ caeruleis, constare videbatur: quibus deciduis apparebant caliculi pentagoni: radicem non adferebat, qui in nitere obseruabat, quia eruere non potuerat, inter saxa & confragosis locis nascentem. Tota autem planta laetæo succo abundabat, non secus ac reliqua genera.

Rapunculus Alopecuroides orbiculari penè spica Clus. Hist. post. sine icone.

Geneuz collegimus globotum purpureum radice longa.

Locum

RAPUNCVLVS MINIMVS FOLIO TENUI gramineo.



Omniū Rapunculorum minimus in montibus Rheticijs inuenimus, cui radix crassiuscula: caliculus tenuis dudum vnciarum comosum gerit florum cauleū. Rapunculi spicati: folia caulem comitantur, ipso penè longiora, filis instar tenuia, numerosa. C. Bauh. phyt. Rapunculus 7. siue umbellatus

folio gramineo. Florentem obseruaui Iunio in Rhætia.

RAPUN-

RAPUNCVLVS ALPINVS
paruus comosus.

Descriptio.



Radice squammis veluti compactili, ex veteribus foliis residuis, ut in Nardo Celtica penè videre est, crassiuscula, sensim attenuata, præditus est: folia fundente numerosa, vnciam vnam aut alteram longa, culmum lata, ad Nardum Celticam accedentia, longis nixa pediculis: inter quæ *canticulus* surgit, dum

vinciatum, non sine foliis quæ angustiora: cuius cacumini flores insident Rapunculi comosi, qui cærulei, quantum ex sicca planta colligere licet, stylis longis recuruis prominentibus: picta secundum eius magnitudinem, suntamen nobis plantulæ quædam paulò maiores. Hæc planta videtur habere nonnulla similia cum Rapunculo montis Baldi, cuius etiam vascula hîc pingenda curauimus, quia iam sculpta erat eius figura, ut paulò antè dictum.

Locus & tempus

Habui ex plantis Di. Agerii pro Rapunculo alpino Cam. flore cæruleo collecto, in Styriæ montibus.

RAPUNCVLO COMOSO SPICATO
aliquatenus affinis ex Baldo.

Descriptio.



Palmaris est *caulis* ad imum squammatus, foliis infimis Buttonatæ Bellidis cæruleæ dictæ similibus, superioribus Bellidis maioris profundè serratis, latioribus quàm inferiora, qualia etiam in summo caule radiatim crebra *flori* subiiciuntur, qui *caulis* comosus: singulares flores etiam maiusculi, utrem inflatum referentes, imò parte laxiores, albicantes, sensim

tenuantur in cernicem violaceam per extremas oras crenatam, vnde longè florem supereminens, *flora* tenue nigricans in tortiles veluti capreolos deflens emicat.

Hanc eandem plantam ni fallimur collectam
Tom. II.

in Bassanensibus montibus accepimus à D. Agerio, in qua folia vndique serrata & latiora cum vasculis ad Rapunculi vulgaris vascula accedentibus, quæ curauimus appingenda in tabella Rapunculi parui Alpini comosi, qui nondum erat sculpeus.

De hac planta hæc tradidit Ioh. Pona in descriptione montis Baldi. Trachelium petrum minus in ipsius Baldi altioribus summitatibus, cuiusvis alius plantæ sterilissimis, inter precipites illas cautes ab eisdem veluti cadentibus pendens, germinat. Eam fusè describens, ac addens perennem & adstringentem esse plantam.

C. Bauhino cum Rapunculum suæ Alpini spicato similem collectum in Baldo D. Guilandino ostendisset, is Rapunculum montanum, ac Nobiliss. Cortusum Cantabricam alteram Angularem nominavit. Eundem à Dre. Io. Neudorffero accepit, ut apud Matth. scribit, cuius una radix, quæ tuberosa, est inæqualis, Rapunculo vulgaris triplo maior: Ab eodem & duas alias Rapunculi species ex monte Sumano, necdum descriptas habet.

Icon nostra sicuti & descriptio factæ sunt ad plantam siccam, quam adhuc habemus, quæ delata fuerat ex monte Baldo per Abrahamum Bechium Medicum, quamque Frater C. Bauhinus Basileæ misit.

RAPUNCVLVS SONCHI FACIE
umbellatus.

Guilland. de Mera Medicus rediens ex peregrinatione Italica communicabat Rapunculum nunquam antè Clusio conspectum, qui abruptus similis erat, ut Rapunculus flore globoso purpureo, & sine radice, quam eximere non potuerat. In pedalem autem excreuerat altitudinem, vel etiam brevior: plura, quàm Primum habebat folia, breuiore pediculo, eoque plano subnixa, supernè viridia, infernè exalbida, instar foliorum Sonchi, quibus valde forma respondebant, erant enim, ut illa, in ambitu dentata, sed minora: summo *cauli* innitebatur veluti umbella, longiusculorum calyculorum stratorum, in quinque angulos definentium, in quibus *flor*, coloris non comperti, quia neque ipse Mera referebat, neque vllus, in totâ plantæ umbellâ, restabat, ex quo coniecturam facere licuisset.

Considerandum quantum Rapunculus Sonchi folio Clusii differat à Rapunculo, montis Baldi antè dicto.

RAPUNCVLVS CRETICVS PETROMARULA.

Herbam teneram lacte turgentem floribus cæruleis visui gratam Imperati, sic describit Honorius Bellus. *Folia* profert cichoracea, magna, profundè incisa, in orbem diffusa, saturè virentia, infernè splendentia, ad purpuram aliquando tendentia, ut Cyclaminus, læuia, cum autem semine nata prodit, prima eius folia Violæ nigræ foliis simillima sunt, rotunda, & aut nihil, aut parum duntaxat serrata: *canticulos* autem multos habet, rotundos, striatos, bicubitales, aut tricubitales: quibus inascuntur *flor*es copiosissimi, purpurei, hyacinthi Orientalis florum æmuli, densè compacti, ut spicam, eamque magnam referre videantur: quibus

Yyy

succedunt semina minutissima : radice firmatur magna alba, in alas diffusa, eduli, sapore rapunculi radicem imitante. Tota planta lacte abundat.

Rapunculus quem Creticum ac in acetanis gratum dicit Imperatus, herba est Cretæ siue Candix propria dicta ibi *Petra Marola*.

Rapunculi speciem à Nobiliss. Cortuso *Petra Marola* nomine accepit C. Bauhinus.

Vocatur vulgò *metagoula* hoc est, *Petra Lactuca*, licet [teste Hon. Bello in epist. ad Clus. ex Cydonia Cretæ] cum *Lactucis* nihil aliud commune habeat, quàm

quod lacte abundat. Et quia radix manducata, tum etiam caulis adhuc tener, Venerem stimulare vulgò dicitur, idè nomine obsceno *metagoula* vocatur.

Rapunculi genus videtur Clusio.

Hanc exhibet Io. Pona in descriptione Baldi, nomine *Petromarula*, seu *Lactucæ Petræ Cretæ Belli*.

Cretica planta est, & nusquam alibi quod sciat Hon. Bellus, spontè provenit, ea reperitur ubique in aruorum marginibus, secus vias lato solo, inter saxa & super parietes. Floret verò & æstatis principio, Maioque & Iunio arescit tota, præter radicem, quæ Octobri folia proferre incipit, & viret tota hyeme.

ERINVS DALECHAMPII.

Descriptio
Locus.



ERINON Equod Dalechampius propè Lugdunum collegit in riuo subterfluente extremo suburbiū versus pontis fornices, quo Rhodanus iungitur, radice est in multas fibras diuisa, caulis multis, palmatis, angulosis, furculosis, cum franguntur lacte manantibus, gustu valdè acer-

bis, canā lanugine propè verticem obductus, foliis ocimi, minoribus tamen quàm in primo genere, quod ocimum citratum Serapio vocat, in

ambitu minimè incisus, nec crenatus, iuxta capitulum fastigia, & arduo præter impetum inquit Dioscorides, in longum & angustum veluti fissis penè instat Pinastris.

Quæ sit Ennus Dalechampii, vt verum cum Fratre C. Bauhino in phyt. p. 427. fatear, nondum mihi constat: hoc mihi valdè, quod Dalechampius flores & semina pingere curauit, nec descuperent: figura præterea non videtur respondere descriptioni, vnum enim habet caulem, cùm Dalechampius dicat multos habere. Sed & Fabio Columnâ teste, non est Erinus quam poscimus Dalech. hist. lib. 9. cap. 171. proponit, foliis minimè incis. Ac an rectè suprâ citata Dioscoridis verba verterit, & vera sit ab ipso depicta planta, quilibet ex supradictis iudicabit.

DIGITALIS PURPUREA.

CAP. II.



EST vbi cubi Descriptio
Etos duos superat Digitalis purpurea, caule pollicem crasso, anguloso, hirsuto, subrubente, concavo, ex radice fibrosa, amara: flores in thyrsi longioris morem: frequentes ab vno caulis latere, penduli, breuib. hirsutis pediculis, quorum singulis est appositum foliolum acuminatum, calathi

aut digitalis sartorii munimenti effigiatura, colore foris coccineo, excepta inferiore parte quæ propter nonnullam admixtam albedinem carneo est, intus verò similiter purpurea, inferiore parte (quæ & pilis longis obsita est) versicolore, albis maculis nigro guttatis: floris basi penitus adnascuntur stamina alba, aut purpurascencia, contorta, quæ apices didymos croceos guttatos sustinent: stilius tenuis purpurascens ex hirsuti oblongique pericarpis mucrone protenditur, cui postea inclusum continetur semen minutum. Folia Verbasci opinionem rectè sustineant, oblonga, in acutum desinentia, hirsuta, in ambitu serrata, supernè atroviuentia, infernè incana.

Digitalis purpurea Anguill. Fuchsius, quem minor non diligentius eam describere.

Hanc pulchrè describit Dodon. Gall. non tamen additâ figurâ dicens: hæc herba vocatur Digitalis, Campanula sylvestris & Nola sylvestris: est, vt quidam scribunt, species Verbasci, Græcis dicta *αυξάνη* & *ἀνάνη* cum qua magnā habet similitudinem: de flor. autem, satis commodè depingit & describit, dicitque: Fuchsius appositè Latine Digitalem nuncupauit, descriptionem autem Lychnitis non conuenit.

Digitalem flore luteo & purpureo vna figura [quæ ad luteam videtur pertinere] & descriptione Tragus comprehendit, non distinguens plantas nisi colore florum, ac ait. Quod ad caules & folia attinet, posset hæc planta Verbasci ad-

iungi:

ungi: At si vel florem vel eius facultates spectes, videtur sine ad Galiopsin referenda, de qua Diosc. lib. 4. cap. 90. Nos Campanulam seu Nollam silv. nuncupamus.

An Ruell. lib. 3. hist. cap. 37. Baccharis herba, nostrates Officina non norunt, rura apud nos Diuz Mariz Chirothecas appellant.

C. Bauh. phyt. Digitalis 1. seu purpurea. Digitalis, inquit is, dicta à florum similitudine, qui digitale referunt: Sunt qui ad Verbascum, alii ad Alismatis alterum genus apud Plinium referunt.

Digitalis purpurea *Digitalis* Tabern. Germ. fingerfraut/ fingerhüt/ braun fingerfraut/ braun fingerhüt/ waldglöcklin & waldschell. B. Dinger hoet cruyt. Gal. Digitale, digitier, gans nostre Dame. It. gantelli. Angl. foxe glouc. Hung. Dy fu gyzcu fu.

Digitalem purpuream habeo in Horto Exc. C. quam plantavi & seminaui, collectam propè Girarnegni ubi fodina argenti, copiosè etiam reperi inter Masmunster & S. Thamarix in monte Rolsberg, ubi etiam collegi semen, mense Octobri florebat adhuc sub arboribus, altitudinis hominis, ni etiam maior, cum foliis latis & valde hirsutis: non longè à Lutea provenit, & in montibus circa Thermas Plumbianas florens Iunio. Geneuz habebam in horto, Bizantii vidi in horto Domini Doctoris Chiffleti, Basilez in horto Domini Doctoris Fælicis Plateri: Bononiz in horto S. Saluatoris al burgo di S. Catharina. Montbelgardi in Horto E. C. floret Iunio, Iulio, & Augusto, flore purpureo & pænè rubello. Semine maturo Iulio: prope Castellum Passavant Ludrensis ditionis. Flore albo in horto Montbelg.

Descriptio

DIGITALIS FLORE MAGNO CANDIDO

Bicubitalis est planta, cui radix digiti crassitudine, alba: folia Digitalis purpurez, hirsuta: florum magnitudo par, sed color lacteus, inferna parte intrinsecus punctis fuscis aspersis.

Icon. Plant. p. 572. Digitalis alba. Teut. 674. Digitalem flore albo à se visam Basilez scribit Fr. Casparus Bauhinus: Eam ego cum pulchro magno flore purpurez similem habeo Montbelgardi in horto Ill. E. C. florentem Iunio & Iulio.

DIGITALIS LVTEA FLORE MAIORE, folio latiore.



Minor huic quam Purpurez magnitudo: nec dissimilis radix: caules angulosi, nonnihil hirsuti: folia angustiora, longa, infernè nervis hirsutis rugosa, superne penitus glabra, attrouirentia, in ambitu crenata, sapore subamaro & aceto: flores Digitalis purpurez pares, foris intusque hirsuti: sed colore, extrà quidem di-

lute luteo, intus verò croco saturatiore, languidèque luteo versicolores.

Figuram Fuchsi Dodon. Gall. habet, non autem describit: sed tantum colore floris luteo distinguit à purpurea, licet foliis multum differat. Digitalis tertia eidem de flor.

An Digitalis lutea Anguill. Digitalis Fuchsi minor flore maiore, Gesner. hort. Digitalis maior flore grandiusculo pallido, Cesp. Digitalis lutea, Geelfingerhüt, Fuch. Thal. ac Tabern.

Casp. Bauh. phyt. Digitalis 2. siue lutea magno flore. Sunt qui Calathianam Violam apud Plin. lib. 21. cap. 6. censent. Hæc non solum floris colore à purpurea variat, sed & foliis, quæ in illa Verbasco similia, in hac verò ex viridi nigricantia, sed lanuginosa.

Digitalem luteam flore maiori luteo reperi copiosè florentem Iunio inter Montbelgardum & Meruelze, eandem habeo in horto E. C. per me satam, ubi ex luteo pallido & albicante florens Iunio & Iulio: Bononiz in Italia vidi in horto S. Seruatoris al burgo di S. Catharina. Quam essem Geneuz reperi in monte Thuri mense Iunio cum suis magnis floribus, foliis latis & hirsutis: prope Castellum Passavant in Ludrensi ditione flore ex luteo albicante copiosè florentem Iulio vidi.

DIGITALIS FERRUGINEA FOLIO angustiore.



Tres aut quatuor cubitos altus est caulis mediocriter crassus, cæres, levis, cuius scapus summus in alas aliquot tenditur: folia Digitalis subulter angustifolia foliis proxima, longa, angusta, acuminata, attrouirentia, nerubla, averla parte subhirsuta, leui crenarum vestigio per ambitum incisa, alternatim cauli adna-

scuntur: flores longa serie thyrsocide dispositi, Digitalis purpurez, breviores, rigidiores, foris toti hirsuti, ferruginei, intus eodem colore saturatiore & stris variegato picti, labro productiore villosa dependente, in medio requiæ hante latentibus sub superioris folii margine apicibus luteis: insidet autem floris recurva basis calyci stellato quinque radiis constante.

Digitalis pilup flore alias ferrugineo, angustiore calathio, foliis attrouirentibus Lob. Obs. Digitalis ferruginea Ic. plant. p. 573. Teut. 675. C. Bauh. phyt. Digitalis 4. siue angustifolia flore ferrugineo.

Anno 1592. primùm à me visa Digitalis quam Ferrugineam existimo vocari: floruit pulchrè in horto Ill. E. C. per me plantata: missa autem fuit planta per Insignem Medicum D. Christopho-

rum Schvartz ex horto Ill. Ducis Wirtembergici Principis mei, cui præest, pulchra sanè planta quæ floruit Iunio & Iulio.

Virg. Tragus cum Digitalis amara sic herba, facillè colligi posse autumat, illam naturâ suâ calidam & siccam esse. Itaque usum illius extare posse in iis, quæ ex calfactionem, extenuationem, absterfionem, & purgationem expostulant. Rucius asseueranter scribit, herbam hanc haud dubiè cum opus est extenuatione, absterfione, purgationis & obstructionis liberatione, efficacem admodum esse. Nam, ut testatur Galenus lib. 4. simpl. fac. cap. 17. amari lapores abstergunt, & expurgant, & quæ in venis est, crassitiem inducunt: quomobrem menses etiam quæ amara sunt mouere possunt, ut ex thorace & pulmone pus educere: potest ergo hæc herba serè omnia quæ Gentiana. Plurimi verò sit vulgatio illa & purpurea ad omnia vulnera sananda, inquit Aduersaria: de qua etiam in Obi. Lob. Somerseti Angliæ rustica turba huius decocto febricitantibus purgationes & interdum superpurgationes & vomitiones, humidioribus aluo, molitur.

**DIGITALIS FLORE MINORE, SVBLV-
tea, angustiore folio.**

Descriptio



tanquam thyrsus longa serie effigiantes, quamquam ortu diuerso, eodem tamen serè omnes vergunt, dimidio minores Digitalis purpureæ floribus, colore luteo in herbaceum languente, idque tam intus quàm foris, labro intrinsecus villosa, quorum vnique ad pediculum folium acuminatum penitus glabrum est appositum. Semen in oculis aliarum huius generis more.

Gesner. de col. stirp. Digitalis flore minore, albior: Eisdem hort. Digitalis maior flore maiore, cui serè attribuendum nomen quod citat Spiz münd fræs. Dodon. de flor. Digitalis quarta flore subluteo. Digitalis lutea, Aduers. C. Bauh. Digitalis seu lutea flore paruo. Duas Lobelius Icon. pingit. Hanc enim nostram minorem ramo expressit, quæ ad bicubitalem altitudinem apud nos excreuit, folioque est longiore, & latiore, pallidiorèq; quàm sit Digitalis lutea flore magno. Quam verò pingit oblongis angustisque foliis, necdum vidimus. Hæc censetur Damalo-

nium Dioscoridis, & primum Plinii. Fistula pastoris Aucenna.

In peregrinatione nostra Rhætica cum Gel-
Locus & tempus
nero Digitalem cum floribus minoribus repeti, cui ascripti flores huic albos esse odoratos, folia satis solida, glabra, bicubitalem caulem & floruisse Iunio circa Walsstätt. Digitalem hæc Genevæ ex vicinis montibus in hortum transtuleram, virebat mense Ianuario, florebat Iunio. Basileæ quæ itur Mouters, in monte Mouters, & iuxta Basileam extra portam S. Albani, florens mense Iulio. Frater obseruauit etiam in monte Munchstein vicino. Montbelgardi quæ itur Dun, & eundo Abevillers. In monte Rossberg prope Malmunster inueni adhuc florentem Octobri, altitudinis trium circiter cubitorum, flores tamen minores multò quàm in Lutea quæ minor, huic folia glabra. Montbelgardi in Horto H.E.C. mense Iunio, & Iulio & Augusto, florent pulcherrimè flores ex luteo serè albi.

**IESMINVM MEXICANVM, SIVE FLOS
mexicanus muleis.**

CAP. III.



IAsmunū Me-
Descriptio
xicanum à natalibus dixerant plantam radice nitentem, crassa, Madragoræ simili, cubit. lem longitudinem sepe excedent, paucis fibris donata, circulos Mechoacæ instar si transuersa secetur ostentante, foris nigra, intus alba, sapore primùm saturo, deinde nonnihil acri, & fauces vexante: quæ

terram versus in cernicem paulò minòrè, rugosam desinens, caules deinceps, plures producit proceros, quadrangulos, nitidos, nonnihil hirsutos, succulentos, qui in ramos diuiduntur, non illos quidem oppositos, sed æquè tuberoso ad ortum & velum geniculato principio, mox alios aliosque eodem modo pariteros, caulis instar quadrangulos: folia ramorum origini subiecta aduersè parti ramo vacuè foliis respondent, foliis Solani Bellæ donæ similia, acutiora, aucta parte nonnihil candicante, vtrinque glabra, sapore feruido & virente: flores Solis impatientes ex ramorum alis, eorumque fastigiis ex breuib; pediculis Conuoluuli maioris sed minores, itidem ut illi integri, in calathum laticusculum, plicis quinque habentes diffunduntur, sensuque in tubulum gracilescens, globulo paruo folliculis multifidis amplexo inseruntur, colorum festiua & hilaris varietate ludentes, iam lutei, iam puniceï, alias puniceo luteoque confusis versicolore [quam varietatem in eadem planta est obseruare] librarum circibus è tubulo prominentibus, odore.

odore non inuauit. Vnicuique flori succedit semen pulchrum magnum, Ciceris ferè, pentagonum, rugosum, nigrum medullâ alba, quod relicto folliculo suo facillè excidit.

Et licet nunc aded vulgari sit notitiâ, vt nulla ferè sit opus acuratori descriptione, Clusii tamen Historiam, vt qui plura notatu digna obseruarii assumere libuit. Primum igitur emergit Oryzi quod Cereale nonnulli cognominant, aut Circeæ Lutetianæ ferè modo: deinde caulem promit cubitalem vel etiam interdum amplio-rem, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flauescens, frequenter vt Balsaminæ caulis geniculatum, & in multos ramos eodemque similiter nodosos diuisum: qui ex ipsis prodeunt, non bini vtrique, & ex aduerso oppositi, sed singulares duntaxat, alternatim modò in vnam, modò in alteram partem vergentes, & quem primum seruarunt ordinem aut seriem, perpetuò ferè retinentes, hoc est, vt tertius, quintus, & septimus ramus in eandem partem spectent in quam primus: quartus verò, sextus, & octauus [si modò tot primariis ramis planta sit prædita] eodem latere nascantur quo secundus: folia in singulorum ramorum nodis bina aduersis pediculis semper nascentia, Siliquastri foliis præne similia, viridia, satis carnosâ, succulenta, circa pediculum ampla, extremo mucronata, quæ trita, Siliquastri grauem odorem, gustata verò, ingratum saporem, & tandem illius, vel foliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum referunt: flores in extremorum ramulorum alis singuli, longi, concaui, in quinque sinus, antequam aperiantur, complicati, explicati verò Tabaci floribus non valde dissimiles, non tamen in mucronatos angulos, vt illi, desinentes, sed in obtusos, Conuoluuli florum instar, Tabaci etiam floribus ampliores, elegantissimâ interdum purpurâ, siue Kermesino colore nitentes, nonnunquam Lateritiâ, aliquando flauâ, aut pallentes, interdum prorsus albi, vel exalbidi duntaxat, nonnunquam obsoletè rubentes aut flauescens, sæpius binis coloribus simul elucescentibus, vel purpureo mediam floris partem occupante, aut radius modò purpureis alternatim totum distinguentibus, vel interdum magnis, nonnunquam exiguis purpurascens maculis vario situ & mixtura per totum florem, vel flauescens, pallescentemue, aut album, candicantemue, vel obsoletum, aspersis, odoris satis suavis, & Narcissinum quidpiam referens, sex oblongis staminibus, stiloque paulò longiore è medio flore emergentibus: valde autem caduci sunt hi flores: nam cum ractu explicari incipiunt postridie sub horam octauam antemidianam [per æstus præsertim sese contrahere incipiunt, florum conuoluuli modo: at temperatiore aurâ, integro nonnunquam die expansi permanent, & sub noctem duntaxat contrahuntur: singulis tamen diebus alii recentes aperiantur, qui si integri quotidie decerpantur, & inter chartas reponantur [diu enim colorem retinent] atque deinde inter se conferantur, iisdem quidem coloribus constare deprehenduntur: ac eorumdem situ & mixtione, inter se variare, quisquis diligenter obserauerit, animaduertet. Quæ sanè insignis varietates, quotquot hunc florem obseruant in summam admirationem, non immeritò rapere debet: etenim diutissimè viret, & à Iulio mense ad Octobrem vsque [nisi pruinæ interueniant] numerosâ florum sobole luxuriare solet: caliculi flores amplectentes, & in quinque mucronatas

lacinias sunt diuisi, virides & quasi membranacei, in quibus vnicuique semen, nullâ membrana siue pericarpio inclusum, mucrone, cui flos insedit obtuso, infima verò, quâ caliculo adhæret, parte, tanquam exigua coronâ ornatum pentagonum ferè, bæcæ myrti propè magnitudine, initid viride, maturitate fuscum, & quibusdam veluti tuberculis oblitum, spontè, vel tenui vento, vel leuissimâ cōmōtione decidens, nucleūque continens album, qui tritus in candidissimam, & amyli instar niveam friabilemque pulpam resoluatur: radix satis crassa & pæne raris est, intus alba, foris nigra, aliquot fibris prædita, gustu nonnihil acti, cui admixta sit superficialia quædam dulcedo. Eam licet annosam initid censeremus [nam singulis annis nobis erant ferenda, hyeme radicem in horto relictam corrumpente] viuacem tamen esse, ab optimo & peritissimo viro Sebastiano V Volmaro Ill. D. V Virtemb. Pharmacopœo, & horti Medici tum temporis Præfecto, sumus admoniti. Is enim cum sub Autumni exitum aliquot plantas eruillet, & caule præciso, ex illis vnam, propter formæ elegantiam exiccandam seruasset, initio autem Martii sequentis cuidam amico ostendere vellet, eam succulentam & quasi reuirescentem deprehendens, terrâ in fistillâ obruit, & paucos post dies folia proferre cepit, deinde circiter Cal. Iulii etiam flores. Cuius rei postea nos etiam aliquoties periculum fecimus, atque etiam alii nostro exemplo. Sed exigui momenti est compendium illud conseruandarum hyeme radicum: nam nouo Vere terræ commissa, forsitan flores proferent quindecim diebus antè quàm illæ plantæ, quæ semine terræ eodem tempore credito, surtiantur. Aliud autem genus habuimus, quod licet à superiore, caulibus magnitudine & crassitudine, ramorumque situ & foliorum formâ non differret, color tamen stolonis & florum dissimilis est: nam dum primum terrâ emergit, caliculi foliorumque pediculi, vt Betæ rubræ iam recens nascentis, purpurascunt, manetque is color in adultæ etiam caule & ramis: flores verò rubente nitidissimâque purpurâ infestati videntur, sex etiam tenuia stamina longiorēque stilum continentes, eiusdem cum superiore odoris. Hi verò non mutantur, sed vniuersi perpetuò sunt coloris, & quem primi habuerunt, reliqui deinceps retinent: semina in caliculis singularia, superioribus respondentia: radix non dissimilis. Hoc genus è superiore semine, cui rubri flores insederant, originem trahere non est dubium, qui proximo anno & aliis subsequētibz, vtriusque generis semina seorsim terræ mandauimus, vt diligentius istam varietatem & colorum distinctionem obseruare possemus, & compertimus ex rubri floris semine nullas alias stirpes prognatas, quàm eas, quæ rubros flores darent. Idem periculum fecimus de grani flauo flore genitis, è quibus prouenire obseruauimus, quæ nullos alios flores darent, quàm flauos. Simile etiam de alborum florum semine factum periculum, ex quo natæ plantæ, albos quidem initid flores dederunt: sed qui sub Autumnum primum explicabantur duorum colorum euadebant, commixtis in eodem flore albo & purpureo, minùs tamen quàm in versicolore primum descripta. Illud præterea obseruabam in ista distincta satione, ex solis plantis rubræ se nunc natis, statim ab exortus initio agnosci posse, quos flores sint daturæ: ex versicolorum autem, flauorum, & alborum semine prouenientibus, nullum certum indicium, si mixtæ sint satz, sicuti

Admirā.
In 2. rubris
flora

Admirā. fl.
no flore

Admirā. fl.
no flore

giora ac latiora in quibusdam speciebus, in quibusdam etiam breviora ac angustiora. Hincque eas rapunculos *rapunculus* appellant. Harum aliquot species facile admodum industriore herbarum persecutori patebunt, Ego vero recensendo hinc tot, quot illo in genere hactenus per Hircybiā nostram mihi observare licuit. Rapunculus ergo Campanulatus Nerisifolius primus caulem habet sesquipedalem, teretem, parum striatum, inter folia adnata quadam seu brachiola explicatum: folia autem Nerii quincunciali longitudine, vncialique ferme latitudine: fl. r. Campanulatum, cœruleum, in ambitu officum parum dissectum. Secundus folia obtinet priora crebriora, pauloque angustiora, longioraque multo, vixit dodrantalia: caulem item crassiorē: florem prioris maiorem. Tertius &iple quoque folia exhibet angustiora, secundo tamen breviora: flores verò ampliores maioresque, Cymbali alicuius patentioris in modum, in extremis ovis diuisos. Quartus caulibus brevioribus, foliis item minoribus, quorum ea quæ radici propinquiora sunt, vnciarum ferme trium sunt longitudinis; dimidix autem latitudinis: quæ verò per reliquum caulis conspiciuntur, his breviora sunt: floribus est autem admodum patentibus repandisque, sed tertiis minoribus. Quintus caulis est pedalis, paulo ve procerior, asper, non admodum foliosus: folia verò sunt nigriora, vncias quatuor, aut quinque longa, vnam verò penè lata: flores cymbalares, minores, apertè, ventre tamen eius non in rotundam cavatatem expanso, ut in illarum specierum floribus, quas iam recensui, videre est, sed plicato. Sextus Rapunculus Campanulatus aut Nerisifolius minor, caules erigit pedales, angulatos, scabros: folia eius, ea videlicet, quæ radici proxima sunt, vnciarum quatuor longitudinem assequuntur, vnius verò latitudinem: reliqua quæ cauli appenduntur, triuncialia sunt, & breviora etiam: caules huic speciei in summo in brachiola diuiduntur crebriora, tenuiora, flores exhibentia Campanulatos, cœruleos, plicatos, in ambitu ad officum diuisos.

Schvv. Campanula angustifolia cœrulea maior Matth. *Walddglöcklein* / *wald Eymbeln* / *Taubeg. ocken*. Grosse Schellen. Campanula minor angustifolia flore albo, *weisse Walddglöcklein*. Item Rapunculus *Waldrapunge* / *wald Glocken*. Minor non annotat Schvv. quem Nerisifolium Thali ex iam recensitis intelligat.

Locus & Tempus Campanula angustifolia flore cœruleo & albo copiose provenit in horto Ill. E. C. flore cœruleo inveni spontè florentem Iunio in Alsatia inter Sultz & Zenne Vrbes, alibi præterea flore modò cœruleo, modò albicante variis in locis inter dumeta inveni. Genex cum essem abundanter vidi circa Montem Salcz. & virentem ibi principid Februarii inveni, provenit etiam copiose non longè à Geneva in colle *la Bassie*. Campanula angustifolia maior Schvv. in collibus apricis & frutetis Iunio & Iulio floret, vltus neglecti.

Vires & vltus Horti voluptatis causa habent, tamen si in oleo remandi queat, Lobelius.

VIOLA MARIANA DODONÆI, QVIBUSDAM MEDIUM.

Descriptio Radix vesca, dulcis, alba, longa, crassa: quæ caulem emittit plusquam bicubitalem, tere-

tem, lutescens, asperum, in ramos diuisum: folia Trachelii siue Campanulæ maioris, angustiora,



longiora, hirsuta, crenata, & modicè per margines crispata: flores campanulorum extremitatibus insident, calathii seu Campanulæ formi, maiores quàm Trachelii, ventriosi, ovis in quinque laciniis diuisis, colore cœruleo seu violaceo, porpurneo aut albicante, in quorum medio stamina latent lutea stiliisque erectior, luteo puluisculo respersus: insidet autem totus flos calathulo crebris thornis hirsutis inæquali, in quinque acuminate foliola floris latibus compressa dissecto. Semen exiguum, spadicum.

Rapunculi alterum genus grandius Diof. Medio vocat: apud

quem autore Cæsalpino, legendum Seridi [folia similia] ut legit Orbazus [ac etiam Ruell. & Marcell. & Matthioli] non Iudi, ut vulgati Codices habent.

Gesl. Rapum silvestris genus maximum, quod aliqui Medion vocant.

Tabern. Hist. & Icon. Weis Marien glöcklein, Viola Mariana alba: & Brün Marien glöcklein, Viola Mariana purpurea: Medium, Germ. Glockenbünn.

C. Bauh. Campanula 17. Viola Mariana. Sunt qui Rapum silu. Diof. alii eiusdem [Dodonæi] Raphanum silu. alii Medion Diof. sed male autumant. Variat flore nunc purpureo, cœruleo: nunc suballido aut lacteo: Reperitur quoque flore pleno.

Gerard. Viola mariana, Mercuries violets Couentrie Rapes / Marietes blanc & white Couentrie bels, & Viola Mariana flore albo. Rapum silu. Græcis *ῥαῦνον ἄγριον*

Violam Marianam Recentiorum plerique Medion esse volūnt, quamvis Viola Mariana, Dod. teste, non admodum respondeat Medio à Diof. descripto. Quare non Medium, sed potius verum Diofcoridis Rapum silu. videtur (ῥαῦνον ἄγριον) quæ Græcis dicitur) cum cuius descriptione magis

Diof. l. 1. c. 116. c. 117.

Dod. 1. 1. c. 116.

Med. 1. 1. c. 116.

Rapum silu.

conuenit. Cuius tamen descriptio superfluum quorundam accessione corrupta.

Violæ Marianæ varietates tradit Clusius. Violæ Marianæ quibusdam Medium creditur, ut plurimum quidem Violacei coloris flores gestant: sed tamen etiam albos, interdum exalbidos, nonnunquam cineracei coloris, atque etiam versicoloris, hoc est, ex albo & violaceo, vel maculatum vel radiatum commixtos.

Locus **tempus.** Violam Marianam Dodon. siue Medium quorundam habui Genevæ in horto, Basileæ vidi in horto D. Fœlicis Plateri: Patavii in horto D. Cortusii, Iannuario. is vocabat Medium: Bononiæ in horto di S. Salvador, al burgo di S. Catharina: Montbelgardi ex semine mihi fœliciter provenit in Horto E. C. flore penè candido & purpureo copiosius: primo anno non fert caules, ubi autem semina caules tulit penè & semine deciduo se propagat. Nascitur, ut aiunt, in silvis & montibus, nec non in opacis quibusdam tractibus ut Matth. refert, plerique Italix ac Germaniæ locis: apud Belgas in hortis colligitur. Iunio, Iulio & Augusto mensibus floris eius productio: semen interea ad maturitatem pervenit, neque enim simul sed particulatim florer.

Vires. Ceterum, quod ad facultates attinet, si Dodonæo credimus, radix Violæ Marianæ refrigerantis & nonnihil adstringentis est potentia: cœtui, ut aliorum sylvestrium Raporum, apta est, & non incommode acetariis additur.

MEDIUM DIOSC. RAVVOLF.

Descriptio



Inter frutescens in altum exurgit. Viola Marianæ Dodon. persimilis est planta, nec ita obvia cuius differentia apparet, præterquam in foliis, quæ in hac diuisa magis, Cichorii instar. Flores etiā magis panduntur, octo foliolis in orbem dispositis constantes: radice austeritas maior quā capitulorum seminum, quæ tamen

nondum erant matura: Ravvolf.

Ravvolf. Medium verum Diosc. & Mindium Rhazis, cuius icon apud Ravvolf. par. 4. No. 284. Medium Diosc. vel Mindium Rhazis foliis Plantaginis minoris, Hist. Lugd. Quæ malè conuertit Wegwart vocabulum Germ. Plantaginem, cum sit Cichorium.

C. Bauh. Phyt. Campanula 18. Viola Mariana laciniatis foliis, peregrina.

In profunda tenebrosa & aspera valle Libani: Ravvolf.

CAMPANULA MAIOR ET ASPERIOR
folio Vrticæ.



Medium **Descriptio**
Mad Viola seu Mediū quibusdam dictum accedit radix alba, Rapunculi, sapore non minus grato, caules cubitales & altiores, hirsutissimi quibus alternatim nascuntur folia Vrticæ, pilosa, acutiora: flores ex foliorum alis cærulei, violacei, aut albi, nolæ similes, Marianæ Violæ, sed minores, calycē

paruo, nec ut in illa torulis cannulato, in laciniis quinque, sicuti & flores, diuiso: stilus triceps, colore purpureo, albido, vel herbaceo, luteo, staminibus circumstipatur luteolis.

Fuch. Campanula, Germ. Halskraut, hoc est, Ceruicaria. Gall. Gaudinistre Dame, ou Gantelle.

Dodon. de flor. Rapum silvestre 2. Belgis Halskraut. Ceruicaria maior, Græcè γαυρίων, plerique Vuularia. In hist. Gall. Ceruicaria. Item Lat. in fol. Ceruicaria maior, cuius flores aut colore candidi, aut dilutè purpurei, vel ad cæruleum inclinantes. Huius species quædam est foliis aliquantò lauioribus: floribus elegantioribus coloris purpureo cærulei, cuius radix aliquot annis viuax restat, & Vere regerminat.

Clus. in Pann. & hist. post. Trachelium foliis vrticæ, & Trachelium aut Campanula vulgò dicta. Campanula quibusdam herbanis vocata Archangelica.

Lobel. & Penz γαυρίων, siue Ceruicaria & Vuularia, Belg. & Germ. Halskraut. Trachelium siue Ceruicaria: Vuularia Tragi & Herbariorum. Campanula Fuchsi & Archangelica quorundam. Trachelium varietates. Passim istud etiam asperis, saxosis Angliæ & Gallobelgiæ siluosis fructuat: sed strigosius, hilari minus & ameno aspectu, alioqui persimile & congener.

Thal. Hæc. Ceruicaria maxima, foliis vrticæ maioris, caule sæpè tricubitali, floribus magnis cæruleis, quandoque etiam albis.

Tab. hist. lib. 2. & Icon. p. 412. 413. & 414. Ceruicaria, Vuularia, Campanula maior 1. Halskraut. Maior 2. Groß hals kraut. Tertia alba, Klein hals kraut. Ponit Taberna quidem isoches: sed discrimen non tradit.

C. Bauh. phyt. Campanula n. folio Vrticæ. Variat flore candido, dilutè purpureo, vel ad cæruleum inclinante. Reperitur & strigosior. Campanula 12. foliis Vrticæ, sed lauioribus, Dodon. Ceruicaria maior altera.

Gerard. Angl. Trachelium i. maius. cantabulrie belg. Trachelium 2. maius albo flore. Trachelium 3. maius Belgarum Lobelii, dūrdy Trote voort [Tab. Ceruicaria 4. alba.] Trachelium 4. minus Small canterburie bela. Tabern. Ceruicaria 3. alba.

An Gœlner. hort. Rapi sylvestris genus mas

Ceruicaria alba, specul

Tab. 186

fibrata, gusto dulci, suavis: *caules* cubitum vnum aut alterum alti, brachiati, subrubentes, serè glabri in quibus *folia* alternata, serrata, minimum hirsuta, nec aspera, vt Campanulæ iam dictæ, & angustiora, quæ in caulibus quidem carent pe-



diculis, ac inferiora, vt latiora sunt ita longis pediculis sunt appressa: ex foliorum alis Campanulæ singulares prodeunt, violaceæ, magnitudine & formâ Rapunculi sativi, apicibus chloris, stilo triplici, calyculis in quinque lacinias, quot scilicet sunt floris lacinia, diuiso, Floris verò sextæ lacinia pilosæ conspiciuntur. Nondum expansus flos pentagonus est, interque angulos pulchrè carinatus. Figura quæ Fuchsiana est, nec prima folia habet. nec in cæteris numis affabrè picta. Tolerabilis tamen.

Gesner. de coll. stirp. Rapum minus suis radiculis serpens.

Dodon. de flor. & in sol. Rapi quartum genus. Clus. in Pann. & hist. post. Trachelium aliud mollioribus foliis, radice mitè serpente, cuius rei causâ rei herbariæ studiosis est exosa.

Montbelgardi in Horto li. E. C. prouenit mihi Campanulæ genus, radice reptante, quæ ita replet areas vt vix eradicari possit: eandem vidi in horto Di. Daucurtii in Audincourt, & aliis pagis vt Ren. Floret Augusto, Septembri & Octobri. Basileæ copiosè prouenire obseruauit Fiater.

Similes facultates ac temperamentum huic Dodon. tribuit quod tribuebat Campanulæ Fuchsii, dicens, refrigerantis potentia & nonnihil adstringentis, ac radices edi posse in acetariis.

CAMPANULA SIVE CERVICARIA MEDIA THALIO FLORIBVS CÆRULEIS PARUIS.

Descriptio Cervicaria Media Thalii, locis montanis & Soli meridiano expositis nonnunquâ prodeit, caule tereti, aspero, foliis plurimis amictis, minoribus multò, viridioribus superius, inferioribus candidis, lanugine vestitis, quali folia Althææ, sicut & folia mediam figuram inter Vrticæ maioris breuiora folia & althææ referunt. *Caulis* vt plurimum vnicus est sine ramosis adnatis, sæpe numerò tamen in plures diuiditur brachiatis virgulas. Circa medium serè caulis vbi maiora folia exoriri desinunt, frequentes *excrecentiæ* adnascuntur, ordine per certa intervalla vsque in apicem caulis consequenter, ac ex aliis peculiaribus ad latera erumpentes, tenuibus quibusdam foliis iisque incispatis parum ac agminatim densæque sibi coherentibus constitutæ, ex quibus longa serie in scapo flores crebri prodeunt ele-

Tom. II.

ganter cærulei, similes prioribus, sed multò maiores.

CAMPANULA PULCHRA à Tossano Carolo missa.



Descriptio
Huius *radix*, non altè quidem vt illa demittitur, sed innumeris tamen fibris lacteæ cuspitem occupat, candidatibus, lactifluis, dulcibus, *caules* coplures duorum aut trium cubitorum altitudine concaui sunt, minimi digiti crassitudine, striati, minimum hirsuti: *folia* Vrticæ, Campanulæ maioris quidem formâ, hirsuta,

palmaria & sesquipalmaria longitudine, latitudine palmaria, in ambitu serrata, alternatim ex certis intervallis cauli apponuntur: ex quorum alis singulis singuli *flores*, partim sursum vergentes, & partim deorsum inclinantes ex breui pediculo purpurascens, albidum cæruleo, calathi effigie, siue Campanulæ, in quinque lacinias longas acutas partiti, foris glabri, intus hirsuti, oriuntur: apertibus totidem luteis, stilo dilutiore qui in suprema parte in tres partes finditur, quæ circumflectuntur: Calix quinque cuspides longos habet: flore marcescente succedit magnum *capitulum* Mespilo simile, deorsum inclinatum, in quo *semen*. Folia inferiora erant in iconi nostra pingenda latiora.

C. Bruh. Phyt. Campanula 10. siue foliis Vrticæ latissimis, quam in horto Ill. Ducis Vvitemb. Montbelg. collegit. Clusius hist. post. & Lobel. Obs. & Icon. plant. tom. 2. hanc videntur exprimere nomine Trachelii maioris Belgarum.

Tossanus Carolus Pharmacop. Stirpium studiosissimus pulchram hanc Campanulam ex Burgundia misit: quæ quotannis Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret Iunio & Iulio.

Locis & Tempus

TRACHELIUM CANDIDUM ANGLICUM MAIUS, FOLIIS FERÈ DIGITALIS VEL CAMPANULÆ.

Descriptio
Semina venustæ & rarissimæ plantæ ad Lobelium misit D. Thomas Penneus Medicus Londinensis: ex boreali Angliæ tractu delata, vbi copiosa & nusquam alibi, vel à quoquam obseruata. Tota facie Cervicariæ maioris iam descriptæ absimilis, sed foliis serè digitalis: Flores item Trachelii vel Violæ Marianæ, candidissimi & maiores & longiores. *Caulis* binum & ternum cubitorum surrectus. *Radix* fibrata, crassiuscula, lactescens, variè diuiscatur. *Semen* Trachelii, sed maius.

Lobel. Obs. Anglicum Septentrionale maius Trachelium candidum.

Yyy



Gerard. Hi-
stor. Angl.
p. 365. Trache-
lum Gigan-
teum Anglis
Giant Thro-
atwort.

Campanulam maiorem siue maximam, teste



Dodonzo, sūt
qui Columna-
rem & quidem
Plinii iudicent,
cū tamen
herbz Colum-
naris nomen a-
pud hunc non
reperiatur, Alii
Anthemum e-
iusdem facit:
sed legendum
lib. 26. cap. 8. E-
vanthemum,
quod Anthe-
midis species
est multū à
Campanulis
differens.

Camer. hort.
Campana py-
ramidalis siue
laetescens 147.

PYRAMIDALIS VALERANDI HIRSVTA

Descriptio



PRIMO anno
mihī cansem
non produxit,
qui sequente
demum anno in
tantam excreuit
altitudinem, vt
facile larceam
æquaret, hirsu-
tus, medulla al-
ba factus, folijs
vestitus internē
& supernē hirsu-
tus, acuminatis,
serratisque,
Campanulæ
Fuchsi acceden-
tibus: flores longa
serie, Campanu-
las imitati, Ra-
punculi vulgati
haud maiores,

cœrulei, per oras laciniati, ex vno pediculo plu-
tes.

Locus

Pyramida-
lis

Quum Lugduni Medicum agerem provenit
mihī in horto meo, ex semine per Valerandum
Dorez affinem ex Sclauonia delato, ipse Pyra-
midalem nominabat.

PYRAMIDALIS LEVIS.

Descriptio

LAETE turgēt radix, Rapunculi similis, resti-
bili fertilitate, se multiplicans, etiam ex fru-
stulo repullulascens: ex qua caules trium qua-
tuorve cubitorum surgunt, leues: folijs vestiti
glabris, oblongis, fortuitis crenis incis, verū
inferiora folia palmum aut sesquipalmum longa,
palmo latiora, per extremum serē obtusa, & v-
quoque glabra, raris admodum casuris dissecta,
& vix dum serrata: flores à medio caule ad sum-
mum vsque fastigium cœrulei campanulas oris
laciniatis exprimant.

Videtur nobis Hist. Lugd. Pyramidalis nostræ
levis duplicem & descriptionem & iconem pro-
ponere. Ac primam quidem pag. 642. sub hoc ti-
tulo: Pyramidalis Rapunculi genus Dalech. Al-
teram, p. 817. quā Campanulam laetescentem
maiores Lobelii, seu Pyramidalem-Lutetianam
inscribit.

150. 151, præ reliquis plurimo late scetens.

Lob. Obs. Laetescens Campanula maior. Py-
ramidalis Lutetiana. Icon Plant. pag. 197. Teut.
402. Tabern. hist. & Icon. Campanula Lactaria si-
ue laetescens 150. 151. 152. 153.

Gerard. Campanula laetescens pyramidalis
Steeple milk flower.

C. Bauh. p. hyc. Campanula 2. laetescens.

Pyramidalis nomine ante plures annos, her-
bam vidi Basileæ in horto Domini Doct. Zvving-
keri, unde semen habui, quod istum Montbelg.
in horto Ill. E. C. prouenit, & sequenti anno se-
men tulit, hæc autem Pyramidalis differt à Vale-
randi Dorez Pyramidali, hanc enim ad tantam
altitudinem prouenientem non vidi, præterea
folia differunt, in hac glabra, in alia hirsuta, quæ
etiam in hac non ita serrata: radices vt Rapun-
culis, quæ facile se multiplicant.

RAPUNCVLVS MONTANVS, SIVE

Trachelium montanum.



Folia multa
propter
terram in qu-
busdam dua-
bus vaciis lon-
giora, in aliis
quadruplo ad
Echium acce-
dentibus, ex
angusto princi-
pio sensim la-
tescentia, sen-
simque deinceps
in acu-
men definen-
tia, vtrinque
hirsuta, nonni-
hil crenata, co-
stâ medium se-
cante. Inter
hæc surgit cau-
lis serē cubita-
lis, hirsutus, enodis, vno aut altero foliolo exi-
guo donatus: flores in caulis scapo superiore,
quinque aut plures, singuli in singulis pediculis
non admodum longis, magni, Campanulæ Fuch-
si similes, ex cœruleo albescentes, calyce hispi-
do basin complectente, radix crassiuscula & lon-
gissima.

guscula, esui grata.

Hist. Lugd. Trachelium montanum.

C. Bauh. phyt. Campanula 15. siue foliis An-

Locus Inueni in peregrinatione mea Rhætica, cum
tempus. D. Gesnero Burnonii, florentem Iunio. Habui
etiam Argentinx ex plantis Agerii, qui collegit
in montibus Styriæ prope Celticam Nardum.

TRACHELIUM PUMILUM ALPINUM,
lanugine pubescens, singulis floribus ex
singulis ramulis satis magnis.

Descriptio **T** Trachelium pumilum Alpinum Clusii, do-
drantalibus est plantula cauliculo striato, in
plures ramulos diuiso, quorum singuli sustinent
florem satis magnum, cauum, Campanulæ instar
efformatum, in quinque angulos desinentem,
quemadmodum vulgaris Trachelii, aut Campa-
nulæ vulgæ dictæ flos, cinereo colore præditum:
floribus succedunt capitula satis magna, trigona,
nutantia, seu deorsum spectantia, quæ continent
semen vulgaris Trachelii semini non dispar, sed
minus & exalbidum: folia quæ per cauliculum
sparsa sunt, latiuscula basi eum amplectuntur, &
in oblongum mucronem desinunt: quæ verò
summâ tellure stirpi inhxrent, latiuscula sunt, &
longiore pediculo innixa: radix pro plantæ exi-
tate satis magna, candicans, supernâ parte in
plura capita extuberans, & quibusdam fibris hir-
luta: Totâ plantâ lanugine pubescit, lacteoque
succo abundat.

C. Bauh. phyt. Campanula 16.

Nascitur in Schneeberg, aliarumque vicinarum
Alpium iugis. Flores profert Iulio.

ALOPECUROS ALPINUS QVIBUSDAM
Echium montanum Dalechampii.

Descriptio **P**ollicaris crassitudinis habet radicem, sensim
gracilescens, palmo longiorem, in apo-
phytes aliquot abeuntem, teneram, rubentem:
caulis sesquipalmaris aut dodrantalibus, crassitie re-
spondet radici, cauus, singularis, hirsutus, crebris
foliis vestitus, alius palmum ferè longis, aliis bre-
uioribus, potissimum superioribus, latitudine
semunciali, hispida, ad Echii folia accedentibus:
thyrsus trium vnciarum, aut palmarem, si maius-
cula sit planta, gerit, florum inter folia emergen-
tium ex cæruleo pallescentium, oblongorum, &
per oras lacinatorum, erumpentibus è medio
staminibus.

Hist. Lugd.
Echium mon-
tanum Dale-
champii: aliis
Alopecurum
montanum.

Trachelium
Dodonæi, Clus.
Pann. Ceruica-
ria maior tenui-
folia, Thallio.
Trachelium
Dodonæi, Clusii,
& Ceruicaria
maior tenui-
folia, Camer-
hort. Camp-
nula 14. foli-
Echii, siue Cera-
uicaria mat-
tenuifolia Tra-



Tom. II.

gi. C. Bauh. phyt. cuius iconem expressam non-
dum vidit.

Alopecurum Alpinum quibusdam dictam, aliis **Locus**
Echii speciem, quod non placet, cùm Genevæ ef-
sem, audiui reperiri in altissimis Sabaudix mon-
tibus.

RAPUNCULUS SPICATUS SIVE CO-

mosus albus & cæruleus: itémque fo-
lio maculato.



Descriptio **Q**uasi par-
uum Ra-
pū dicas, Ra-
pūntium, vel
Rapunculum
vulgus plan-
tam indigitat,
ob folius radi-
cē, quā sapore
& magnitudi-
ne cum culmi
Rapunculo
habet, simili-
tudinem: alio-
qui folia sunt
Violæ Martiæ,
longis appen-
sa pediculis,
nonnunquam
nigrâ maculâ
notata, quan-
quam videas
& stricta ob-
longaq; incan-
te bicubitali,
inani, angulos-
so, lac manan-
te: in cuius fa-
stigio spicatus
pulcher flos
cæruleus aut
purpureo viola-
ceus, ex mul-
tis corniculis
circa basin in
segmenta ar-
cuata fissis
compactus,
Huius flos al-
bus cinereus-
ve quoque re-
peritur.

Plant. Icon. p. 329. Rapuntium maius Alopecu-
ri comoso flore, Lob. 178. Teur. 403.

Tabern. Icon. & Hist. Rapunculus nemorosus. 1.
Wald Rapunzel.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Rapunculus 2.
siue spicatus albus, foliis maculatis mas, & non
maculatis femina, floribus albis cinereis. Ra-
punculum 3. siue spicatum purpur. Dod. Rapun-
culu. maius Lob. Rapuntium maius Alopecuri
comoso flore. Rapunculum 4. siue spic. cæruleu.
Trago Rapunculum filu.

An Cæsalp. l. 9. c. 30. Dux flosculos ferunt vo-
luti in spica dispositos densè, quarum vna foliis
Rapunculi constat: Altera Archangelicæ mino-
ribus.

Dodon. Gall. Rapum syluestre maius, Rapun-
tium maius & secundum. Gall. grande Rapun-
tium.

Yyy 2

Germ. *Groß Rapünzel* Belg. *Grote raponcel* Ien. quod sine dubio est *αλμπικου* & Cauda vulpis à Theophrasto descripta. Lat. de flor. Rapi inquit, sylvestris sextum quoddam genus. Rapunculum sextum, colore aliàs candido, aliàs cæruleo, aliàs purpureo, nonnulli Alopecuron appellant: Sed alia est. Tragus describit flore cæruleo: vocatque Rapunculum maius & Rapunculum sylvestre, Germ. *wald Rapünzel*. In hist. Germ. *Sie andere vnd gros Rapünzel*.

Lonic. speciem globosam habet flore purpurante. *wald rapünzel*/ *groß wald rapünzel*/ Rapunculum sylvestre.

Lobel. & Penz. Ad. Rapuntium maius Alopecuri comoso flore: Lobel. Obs. pingit cum longa spica.

Gesner. hort. Rapi sylvestris genera in sylvis ac montibus, quorum flores ceu in spica sunt, alii cærulei, alii pallidi. An eadem de col. stirp. Rapum syl. floribus vnguim instar recurvatis? Item Rapunculi sylvestris genus floribus carnaleis in se recuruis?

Clus. in Pann. & Hist. post. Rapunculus Alopecuroides longiore spica, aut brevior, coloris albi vel violacei.

Schvv. Rapunculus montanus albus, Rapunculus montanus cæruleus.

Thal. Rapunculus syl. communior, foliis Cervicaria mai. mucronatis, caule cubitali, lœvi, tereti, flore spicato, ex viridi leniter albente: passim in pratis & locis quibusdam montanis. Mihi vocatur Rapunculus syl. spicatus albus: licet eius speciem in Thuringiaca silva, floribus prorsus candidis viderim. Eiusdem species floribus cæruleis, &c.

Camer. hort. Rapunculus flore purpureo, candidante: spicato purpureo & albo.

Geneuz albus cum longa spica, variis in locis & provenit, ut inter Vrbem Montbelgardum Charmontey, & in sylva le Chesnoy: habui etiam in Horto E.C. à me plantatum, Rapunculum flore purpureo & albo globoso, serè ut in scabiosa, foliis minoribus, quale Geneuz etiam vidi, ubi provenit aliud genus cum longa spica plena flosculis albis in monticulo la Bastie. Hoc genus eodem comedi in acetariis Montbelgard: tale reperit Frater in monte Muxensi Basiliensium, Rapunculum spicatum reperi mense Februario in montibus Euganeis Italiz. Rapunculum flore globoso Dalech. vocabat. ni fallor, Aphyllantes genus, eum qui globosum habet florem: Ex vicinis Montbelgardo locis magnum Rapunculum spica longa transtuli in Hortum E.C. Rapunculum flore albo folio maculato observavi florentem Augusto, apud Fontem aridum S. Petri. Minus hæc est Lobelio obuiam multis locis necnisi montosis aut aliosis pratis & couallibus, ut sunt Mindeni & Norbonæ Aquitanicæ vicinis pinguibus, etiam Belgii & Angliæ nemorosis. Natales eius, inquit Schvv. montosa & aliosa prata, conuallesque nemorosa. Iunio spica viget.

Radix, ut scribit idem Schvv. priusquam caulem protrudat, elixa cum sale, aceto & oleo macerata, cibi appetentiam parit, stomacho prodest & vrinas elicit.

RAPUNCVLVS FLORE GLOBOSO
purpureo.

Descriptio

Urbitali assurgit altitudine caule satis gracili, parte inferiore purpurea quodammodo.

dd, superna viridi cui inherebant aliquot folia, quatuor uncias longa, in ambitu serrata, dodecantali pediculo innixa, & ea quidem quæ infimæ parti caulis adnata erant, secundum pediculum, unciam aut pollicem lata, deinde sensim in mucronem desinentia, quæ vero medio cauli, & summa eius parti inherebant, longè erant angustiora, & brevior petiolo fulta, non minus tamè longa: summum caulis fastigium desinebat in breuem & quasi orbicularem florum spicam, quæ folis staminibus ex purpurâ cæruleis, constare videbatur: quibus deciduis apparebant caliculi pentagoni: radicem non adferebat, qui in itinere observabat, quia eruere non potuerat, inter saxa & confragosis locis nascentem. Tota autem planta lacteo succo abundabat, non secus ac reliqua genera.



tali pediculo innixa, & ea quidem quæ infimæ parti caulis adnata erant, secundum pediculum, unciam aut pollicem lata, deinde sensim in mucronem desinentia, quæ vero medio cauli, & summa eius parti inherebant, longè erant angustiora, & brevior petiolo fulta, non minus tamè longa: summum caulis fastigium desinebat in breuem & quasi orbicularem florum spicam, quæ folis staminibus ex purpurâ cæruleis, constare videbatur: quibus deciduis apparebant caliculi pentagoni: radicem non adferebat, qui in itinere observabat, quia eruere non potuerat, inter saxa & confragosis locis nascentem. Tota autem planta lacteo succo abundabat, non secus ac reliqua genera.

Rapunculus Alopecuroides orbiculari pend spica Clus. Hist. post. sine icone.

Geneuz collegimus globosum purpureum radice longa.

Locum

RAPUNCVLVS MINIMVS FOLIO TENUI
gramineo.



Descriptio. Omnium Rapunculorum minimum in montibus Rheticis inuenimus, cui radix crassiuscula: caliculus tenuis dudum unciam communem gerit florem cæruleum. Rapunculi spicati: folia caulem comitantur, ipso pend longiora, sili instar tenuia, numerosa. C. Bauh. phyt. Rapunculus 7. siue umbellatus folio gramineo. Florentem observavi Iunio in Rhætia.

RAPVN-

RAPUNCVLVS ALPINVS
paruus comosus.

Descriptio.



Radice squammi-
veluti compa-
ctili, ex veteri-
bus foliis resi-
duis, ut in Nar-
do Celtica pe-
ne videre est,
crassiuscula,
sensim attenua-
ta, praeditus est:
folia fundente
numerosa, vn-
ciam vnam aut
alteram longa,
culmum lata, ad
Nardum Celti-
cam acceden-
tia, longis nixa
pediculis: inter
quae cauliculus
surgit, duum

vinciarum, non sine foliis quae angustiora: cuius
cacumini flores insident Rapunculi comosi, qui
caerulei, quantum ex sicca planta colligere licet,
stylis longis recuruis prominens: praeter secun-
dum eius magnitudinem, sunt tamen nobis plan-
tulæ quaedam paulo maiores. Hæc planta vide-
tur habere nonnulla similia cum Rapunculo mō-
tis Baldi, cuius etiam vascula hic pingenda curavi-
mus, quia iam sculpta erat eius figura, ut paulo an-
te dictum.

Locus
tempus

Habui ex plantis Di. Agerii pro Rapunculo al-
pino Cam. flore caeruleo collecto, in Styria mon-
tibus.

RAPUNCVLO COMOSO SPICATO
aliquatenus affinis ex Baldo.

Descriptio.



Palmaris est
caulis ad-
imū squamma-
tus, foliis infimis
Buttonatæ Bel-
lidis caeruleæ di-
ctæ similibus, su-
perioribus Bel-
lidis maioris pro-
fundè serratis, la-
tioribus quàm
inferiora, qualia
etiam in summo
caule radiatim
crebra flori subi-
ciuntur, qui cau-
lis comosus: sin-
gulares flores e-
tiam maiusculi,
utrem inflatum
referentes, imò
parte laxiores, al-
bicantes, sensim

tenuantur in cernicem violaceam per extremas
orascrenatam, unde longè florem supereminens,
flapen tenue nigricans in tortiles veluti capreolos
definens emicat.

Hanc eandem plantam ni fallimur collectam
Tom. II.

in Bailluensis montibus accepimus à D. Agerio, in qua folia vndique serrata & latiora cum
vasculis ad Rapunculi vulgaris vascula acceden-
tibus, quæ curauimus appingenda in tabella Ra-
punculi parui Alpini comosi, qui nondum erat
sculptus.

De hac planta hæc tradidit Ioh. Pona in des-
criptione montis Baldi. Trachelium petrum
minus in ipsius Baldi altioribus summis, cuius
cuius alius plantæ sterilissimis, inter præcipi-
tes illas cautes ab eisdem veluti cadentibus pen-
dens germinat. Eam fusè describens, ac addens
perenem & adstringentem esse plantam.

C. Bauhino, cum Rapunculum n. siue Alpinum
spicato similem collectum in Baldo D. Guilandino
ostendisset, is Rapunculum montanum, ac
Nobilis. Cortulus Cantabricam alteram Angul-
lata nominavit. Eundem à Dre. Ioh. Neudorff-
fero accepit, ut apud Matth. scribit, cuius vna ra-
dix, quæ tuberosa, est inæqualis, Rapunculo vul-
gato triplo maior: Ab eodem & duas alias Ra-
punculi species ex monte Sumano, necdum des-
criptas habet.

Icon nostra sicuti & descriptio siæ sunt ad
plantam siccam, quam adhuc habemus, quæ de-
lata fuerat ex monte Baldo per Abrahamum Be-
chium Medicum, quamque Frater C. Bauhinus
Basilea misit.

RAPUNCVLVS SONCHI FACIE
umbellatus.

Descriptio.

Guilland. de Mera Medicus rediens ex pèr-
Gnatione Italica communicabat Rapun-
culum nunquam antè Clusio conspectum, qui
abruptus similis erat, ut Rapunculus flore glo-
boso purpureo, & sine radice, quam eximere non
potuerat. In pedalem autem excreuerat altitudi-
nem, vel etiam breuiorem: plura, quàm Pium
habebat folia, breuiore pediculo, eoque plano
subnixa, supernè viridia, infernè exalbida, instar
foliorum Sonchi, quibus valde forma responde-
bant, erant enim, ut illa, in ambitu dentata, sed
minora: summo cauli innitebatur veluti umbella,
longiusculorum calyculorū striatorum, in quin-
que angulos definentium, in quibus flori, coloris
non comperti, quia neque ipse Mera referebat,
neque vllus, in tota plantæ umbellâ, restabat, ex
quo coniecturam facere licuisset.

Considerandum quantum Rapunculus Son-
chi folio Clusii differat à Rapunculo, montis Bal-
di antè dicto.

RAPUNCVLVS CRETICVS PETRO-
marula.

Herbam teneram lacte turgentem floribus
caeruleis visui gratam Imperati, sic des-
cribit Honorius Bellus. Folia profert ci-
choracea, magna, profundè incisa, in orbem dis-
fusa, saturè virentia, infernè splendentia, ad
purpuram aliquando tendentia, ut Cyclaminus,
laxa, cum autem semine nata prodit, prima eius
folia Violæ nigra foliis simillima sunt, rotunda, &
aut nihil, aut parum duntaxat serrata: cauliculus
autem multos habet, rotundos, striatos,
bicubitales, aut tricubitales: quibus inos-
cuntur flori copiosissimi, purpurei, hyacinthi
Orientalis florum æmuli, densè compacti, ut spi-
cam, eamque magnam referre videantur: quibus

Yyy 3

HISTORIAE PLANTARVM.

succedunt semina minutissima : radice fitimatur magna alba, in alas diffusa, eduli, sapore rapunculi radicem imitante. Tota planta lacte abundat.

Rapunculus quem Creticum ac in acetariis

gratum dicit Imperatus, herba est Cretæ siue Candiz propria dicta ibi *Pietra Marula*.

Rapunculi speciem à Nobiliss. Cortuso *Petra Marula* nomine accepit C. Bauhinus.

Vocatur vulgò *πετρουλά* hoc est, *Petra Lactuca*, licet (teste Hon. Belli in epist. ad Clus. ex Cydonia Cretæ) cum *Lactucis* nihil aliud commune habeat, quàm

quod lacte abundat. Et quia radix manducata, tum etiam caulis adhuc tener, Venerem similitudine vulgò dicitur, idè nomine obsceno *πετρουλά* vocatur.

Rapunculi genus videtur Clusio.

Hanc exhibet Io. Pona in descriptione Baldi, nomine *Petromarula*, seu *Lactuca Petrae Cretæ* Belli.

Cretica planta est, & nusquam alibi quod sciat Hon. Bellus, spontè prouenit, ea reperitur vbique in aruorum marginibus, secus vias lato solo, inter saxa & super parietes. Floret verò & æstatis principio, Maioque & Iunio arescit tota, præter radicem, quæ Octobri folia proferte incipit, & viret tota hyeme.

ERINVS DALECHAMPII.

Descriptio

Locus.



ERINON quod Dalechampius propè Lugdunum collegit in riuo subterfluente extremos suburbii versus pontus fornices, quo Rhodanus iungitur, radice est in multas fibras diuisa, caulis multis, palmatis, angulosis, serratis, cum franguntur lacte manantibus, gustu valdè acerbis, canâ lanugine propè verticem obdusis, foliis ocimi, minoribus tamen quàm in primo genere, quod ocimum citratum *Sesapio* vocat, in

ambitu minimè incisus, nec crenatus, iuxta camlinum fastigia, *Dracopis* inquit Dioscorides, in longum & angustum veluti fissis penè instar *Pinastris*.

Quæ sit *Erinus Dalechampii*, vt verum cum Fratre C. Bauhino in phyt. p. 427. fatear, nondum mihi constat: hoc mihi valdè, quod Dalechampus flores & semina pingere curant, nec descripserit: figura præterea non videtur respondere descriptioni, vnum enim habet caulem, cum Dalechampus dicat multos habere. Sed & Fabio Columnâ teste, non est *Erinus* quam postremò Dalech. hist. lib. 9. cap. 171. proponit, folus minimè incisus. Ac an rectè suprâ citata Dioscoridis verba vertent, & vera sit ab ipso depicta planta, quilibet ex supradictis iudicabit.

Quæ sit *Erinus Dalechampii*, vt verum cum Fratre C. Bauhino in phyt. p. 427. fatear, nondum mihi constat: hoc mihi valdè, quod Dalechampus flores & semina pingere curant, nec descripserit: figura præterea non videtur respondere descriptioni, vnum enim habet caulem, cum Dalechampus dicat multos habere. Sed & Fabio Columnâ teste, non est *Erinus* quam postremò Dalech. hist. lib. 9. cap. 171. proponit, folus minimè incisus. Ac an rectè suprâ citata Dioscoridis verba vertent, & vera sit ab ipso depicta planta, quilibet ex supradictis iudicabit.

DIGITALIS PURPUREA.

CAP. II.



EST vbi cubicus, *Descriptio* *Erinus* duos superat *Digitalis* purpurea, caule pollicem crasso, anguloso, hirsuto, subrubente, concavo, ex radice fibrosa, amara: flores in thyrsi longioris morem: frequentes ab vno caulis latere, penduli, breuibus hirsutis pediculis, quorum singulis est appositum foliolum acuminatum, calathi

aut *digitalis* sartorii munimenti effigiatum, colore foris coccineo, excepta inferiore parte quæ propter nonnullam admixtam albedinem carneo est, intus verò similiter purpurea, inferiore parte (quæ & pilis longis obsita est) versicolore, albis maculis nigro guttatis: floris basi penitus adnascuntur stamina alba, aut purpurascencia, contorta, quæ apices didymos croceos guttatos sustinent: stylus tenuis purpurascens ex hirsuti oblongique pericarpii mucrone protenditur, cui postea inclusum continetur semen minutum. *Folia* *Verbasci* opinionem rectè sustineant, oblonga, in acutum desinentia, hirsuta, in ambitu serrata, supernè atrouirentia, infernè incana.

Digitalis purpurea Anguill. Fuchsius, quem mi-Fuchsius tor non diligentiùs eam describere.

Hanc pulchrè describit Dodon. Gall. non tamen additâ figurâ dicens: hæc herba vocatur *Digitalis*, *Campanula syluestris* & *Nola syluestris*: est, vt quidam scribunt, species *Verbasci*, Græcis dicta *ρυχίτης* & *Αΐουδης* cum qua magnâ habet similitudinem: de flor. autem, satis commodè depingit & describit, dicitque: Fuchsius appositè Latine *Digitalem* nuncupauit, descriptionem autem *Lychnitis* non conuenit.

Digitalem flore luteo & purpureo vna figura (quæ ad luteam videtur pertinere) & descriptione *Tragus* comprehendit, non distinguens plantas nisi colore florum, ac ait. Quod ad caules & folia attinet, posset hæc planta *Verbasci* adungi:

Augi: At si vel florem vel eius facultates spectes, videtur sine ad Galiosin referenda, de qua Diosc. lib. 4. cap. 90. Nos Campanulam seu Nollam silv. nuncupamus.

An Ruell. lib. 3. hist. cap. 37. Baccharis herba, nostrates Officina non norunt, rura apud nos Diuz Mariæ Chirothecas appellant.

C. Bauh. phyt. Digitalis 1. seu purpurea. Digitalis, inquit is, dicta à florum similitudine, qui digitale referunt: Sunt qui ad Verbascum, alii ad Alismatis alterum genus apud Plinium referunt.

Digitalis purpurea *auxvins* Tabern. Germ. fingerkraut / fingerhüt / braun fingerkraut / braun fingerhüt / waldglöcklin & wald schell. B. Dinger hoer cruyt. Gal. *Digitalis, dygiter, gands nostre Dame, le gantelli.* Angl. foxe glouc. Hung. Dy siu gyzeu siu.

Digitalem purpuream habeo in Horto Exc. C. quam plantavi & seminavi, collectam propè Girarmegni ubi fodinae argenti, copiosè etiam reperi inter Malmunster & S. Thamarix in monte Roßberg, ubi etiam collegi semen, mense Octobri florebat adhuc sub arboribus, altitudinis hominis, ni etiam maior, cum foliis latis & valde hirsutis: non longè à Lutea provenit, & in montibus circa Thermas Plumbarias florens Iunio. Genevæ habebam in horto, Bizantii vidi in horto Domini Doctoris Chiffletii, Basileæ in horto Domini Doctoris Forchii Plateri: Bononiæ in horto S. Salvatoris al burgo di S. Catharina. Montbelgardi in Horto E. C. floret Iunio, Iulio, & Augusto, flore purpureo & pænè rubello. Semine maturo Iulio: prope Castellum Passanant Ludrensis diocesis. Flore albo in horto Montbelg.

DIGITALIS FLORE MAGNO CANDIDO

Bicubitalis est planta, cui radix digiti crassitudine, alba: folia Digitalis purpureæ, hirsuta: florum magnitudo par, sed color lacteus, inferna parte intrinsecus punctis fuscis aspersis.

Icon. Plant. p. 572. Digitalis alba. Teut. 674. Digitalem flore albo à se visam Basileæ scribit Fr. Casparus Bauhinus: Eam ego cum pulchro magno flore purpureæ similem habeo Montbelgardi in horto Ill. E. C. florentem Iunio & Iulio.

DIGITALIS LUTEA FLORE MAIORE, folio latiore.



Minor huic quam Purpureæ magnitudo: nec dissimilis radix: caules angulosi, nonnihil hirsuti: folia angustiora, longa, infernè nervis hirsutis rugosa, superne penitus glabra, atrovirentia, in ambitu crenata, sapore subamaro & acro: flores Digitalis purpureæ pares, foris intusque hirsuti: sed colore, extrà quidem di-

luteo, intus verò croco saturatiore, languideque luteo versicolores.

Figuram Fuchsi Dodon. Gall. habet, non autem describit: sed tantum colore floris luteo distinguit à purpurea, licet foliis multum differat. Digitalis tertia eidem de flor.

An Digitalis lutea Anguill. Digitalis Fuchsi minor flore maiore, Gesner. hort. Digitalis maior flore grandiusculo pallido, Cæsalp. Digitalis lutea, Geelsingerhüt, Fuchsi Thal. ac Tabern.

Cæsp. Bauh. phyt. Digitalis 2. siue lutea magno flore. Sunc qui Calathianam Violam apud Plin. lib. 21. cap. 6. censent. Hæc non solum floris colore à purpurea variat, sed & foliis, quæ in illa Verbasco similia, in hac verò ex viridi nigricantia, sed lanuginosa.

Digitalem luteam flore maiori luteo reperi copiosè florentem Iunio inter Montbelgardum & Meruelze, eandem habeo in horto E. C. per me satam, ubi ex luteo pallido & albicante florens Iunio & Iulio: Bononiæ in Italia vidi in horto S. Servatoris al burgo di S. Catharina: Quam essem Genevæ reperi in monte Thuri mense Iunio cum suis magnis floribus, foliis latis & hirsutis: prope Castellum Passanant in Ludrensi diocesi flore ex luteo albicante copiosè florentem Iulio vidi.

DIGITALIS FERRUGINEA FOLIO angustiore.



Res aut quatuor cubitos altus est: caulis mediocriter crassus, teres, laevis, cuius scapus summus in alas aliquot scanditur: folia Digitalis subtiliter angustifolia foliis proxima, longa, angusta, acuminata, atrovirentia, nerubla, aucta parte subhirsuta, levi crenarum vestigio per ambitum incisa, alternatim cauli adna-

scuntur: flores longa serie thyrsioidè dispositi, Digitalis purpureæ, breviores, rigidiores, foris toti hirsuti, ferruginei, intus eodem colore saturatiore & stris variegato picti, labro productiore villosa dependente, in medio reliquante latentibus sub superioris folii margine apicibus luteis: insidet autem floris recurva basis calyci stellato quinque radiis constante.

Digitalis pilup flore aliis ferrugineo, angustiore calathio, foliis atrovirentibus Lob. Obl. Digitalis ferruginea Ic. plant. p. 573. Teut. 675. C. Bauh. phyt. Digitalis 4. siue angustifolia flore ferrugineo.

Anno 1592. primum à me visa Digitalis quam Ferrugineam existimo vocari: floruit pulchrè in horto Ill. E. C. per me plantata: missa autem fuit planta per insignem Medicum D. Christopho-

odore non infuauit. Vniuenique flori succedit semen pulchrum magnum, Ciceris ferè, pentagonum, rugosum, nigrum medullà alba, quod relicto folliculo suo faciliè excidit.

Et licet nunc aded vulgaris sit notitiæ, vt nulla ferè sit opus acuratori descriptione, Clusii tamen Historiam, vt qui plura notatu digna obseruari assumeret libuit. Primum igitur emergit Ocymi quod Cereale nonnulli cognominant, aut Circæ Lutetianæ ferè modo: deinde caulem promit cubitalem vel etiam interdum ampliorē, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flauescens, frequenter vt Balsaminæ caulis geniculatum, & in multos ramos eodemque similiter nodosos diuisum: qui ex ipsis prodeunt, non bini utrinque, & ex aduerso oppositi, sed singulares duntaxat, alternatim modò in vnam, modò in alteram partem vergentes, & quem primum seruantur ordinem aut seriem, perpetuò ferè retinentes, hoc est, vt tertius, quintus, & septimus ramus in eandem partem spectent in quam primus: quartus verò, sextus, & octauus [si modò tot primariis ramis planta sit prædita] eodem latere nascantur quo secundus: folia in singulorum ramorum nodis bina aduersis pediculis semper nascentia, Siliquastris foliis parè similia, viridia, satis carnosæ, succulentæ, circa pediculum ampla, extremo mucronata, quæ trita, Siliquastris grauem odorem, gustata verò, ingratum saporem, & tandem illius, vel foliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum referunt: flores in extremorum ramulorum alis singulis, longi, concaui, in quinque sinus, antequam aperiantur, complicati, explicati verò Tabaci floribus non valde dissimiles, non tamen in mucronatos angulos, vt illi, desinentes, sed in obtusos, Conuoluuli florum instar, Tabaci etiam floribus ampliores, elegantissimæ interdum purpuræ, siue Kermesino colore nitentes, nonnunquam Lateritii, aliquando flauis, aut pallentes, interdum prorsus albi, vel exalbidi duntaxat, nonnunquam obsoletè rubenæ aut flauescentes, sæpius binis coloribus simul elucescentibus, vel purpureo mediam floris partem occupante, aut radiis modò purpureis alternatim totum distinguentibus, vel interdum magnis, nonnunquam exiguis purpurascensibus maculis vario situ & mixtura per totum florem, vel flauescens, pallescentemue, aut album, candicantemue, vel obsoletum, aspersis, odoris satis suavis, & Narcissinum quidpiam referentis, sex oblongis staminulis, stiloque paulò longiore è medio flore emergentibus: valde autem caduci sunt hi flores: nam cum roctu explicari incipiant postridie sub horam octauam antemidianam [per æstus præsertim se contrahere incipiunt, florum conuoluuli modo: at temperatiore aurâ, integro nonnunquam die expansi permanent, & sub noctem duntaxat contrahuntur: singulis tamen diebus alii recentes aperiantur, qui si integri quotidie decerpantur, & inter chartas reponantur [diu enim colorem retinent] atque deinde inter se conferantur, iisdem quidem coloribus constare deprehenduntur: ac eorumdem situ & mixtione, inter se variare, quisquis diligenter obseruauerit, animaduertet. Quæ sanè insignis varietates, quotquot hitum florem obseruant in summam admirationem, non immeritò sapere debet: etenim diutissimè viret, & à Iulio mense ad Octobrem vsque [nisi pruinæ interueniant] numerosâ florum sobole luxuriare solet: caliculi flores amplectentes, & in quinque mucronatas

lacinias sunt diuisi, virides & quasi membranacei, in quibus vnicum semen, nullâ membrana siue pericarpio inclusû, mucrone, cui flos insedit obtuso, infima verò, quâ caliculo adhaeret, parte, tanquam exigua coronâ ornatum pentagonum ferè, bæcæ myrti propè magnitudine, initid viride, maturitate fulcum, & quibusdam veluti tuberculis oblitum, spontè, vel tenui vento, vel leuissimâ cômotione decidens, nucleûque continens album, qui tritus in candidissimam, & amyli instar niueam friabilemque pulpam resolutur: radix satis crassa & paucis est, intus alba, foris nigra, aliquot fibris prædita, gustu nonnihil acris, cui admista sit superficialia quædam dulcedo. Eam licet annosam initid censeremus [nam singulis annis nobis erant ferenda, hyeme radicem in horto relictam corrumpente] viuacem tamen esse, ab optimo & peritissimo viro Sebastiano V Volmaro Ill. D. V Virtemb. Pharmacopœo, & horti Medici tum temporis Præfecto, sumus admoniti. Is enim cum sub Autumni exitum aliquot plantas eruiisset, & caule præciso, ex illis vnam, propter formæ elegantiam exiccandam seruasset, initio autem Martii sequentis cuidam amico ostendere vellet, eam succulentam & quasi reuirescentem deprehendens, terrâ in fistili obruit, & paucos post dies folia proferre cœpit, deinde citatè Cal. Iulii etiam flores. Cuius rei postea nos etiam aliquoties periculum fecimus, atque etiam alii nostro exemplo. Sed exigui momenti est compendium illud conseruandarum hyeme radicum: nam nouo Vere terræ commissa, forsitan flores proferent quindecim diebus antè quàm illæ plantæ, quæ semine terræ eodem tempore credito, surt nati. Aliud autem genus habuimus, quod licet à superiore, caulis magnitudine & crassitudine, ramorumque situ & foliorum formâ non differret, color tamen stolonis & florum dissimilis est: nam dum primum terrâ emergit, caliculi foliorumque pediculi, vt Bææ rubræ iam recens nascentis, purpurascunt, manetque is color in adultæ etiam caule & ramis: flores verò rubente nitidissimæque purpurâ infecti videntur, sex etiam tenuia stamina longiorumque stilum continentes, eiusdem cum superiore odoris. Hi verò non mutantur, sed vnius perpetuò sunt coloris, & quem primi habuerunt, reliqui deinceps retinent: semina in caliculis singularia, superioribus respondentia: radix non dissimilis. Hoc genus è superioris semine, cui rubri flores infederant, originem trahere non est dubium, qui proximo anno & aliis subsequen- tibus, vtriusque generis semina seorsim terræ ma- dauimus, vt diligentius istam varietatem & colorum distinctionem obseruare possemus, & comperimus ex rubri floris semine nullas alias stirpes prognatas, quàm eas, quæ rubros flores darent. Idem periculum fecimus de granis flauo flore genitis, è quibus provenire obseruauimus, quæ nullos alios flores darent, quàm flauos. Simile etiam de alborum florum semine factum periculum, ex quo nati plantæ, albos quidem initid flores dederunt: sed qui sub Autumnum primum explicabantur duorum colorum euadebant, commixtis in eodem flore albo & purpureo, minùs tamen quàm in versicolore primum descripta. Illud præterea obseruabam in ista distincta satione, ex solis plantis rubræ se nine natis, statim ab exortus initio agnosci posse, quos flores sint daturæ: ex versicolorum autem, flauorum, & alborum semine prouenientibus, nullum certum indicium, si mixtæ sint satæ, sumi

Admira-
lis 2. rubris
flora

Admir. fl.
no flora

Admir. alb.
flora

posse, quia eisdem omnes sunt coloris in tene-
ra aetate. Aliud porro Rubræ genus mihi Viennæ
Infusio rose natum, semine ex Italia allato *lasmin rosso*, hoc est
lasmini rubri, nomine: in fistilibus quidem na-
ta plantæ, pusillæ & humiles erant, latè nihilo-
minus ramos fundentes: quæ autem in horto
sarz, superiori generi rubros flores gerebat lon-
gè ampliores, & latissimè ramos spargentes, ead-
em serie quâ in suprâ descriptis alternatim na-
scentes, eundemque ordinem seruantes, ut vide-
licet alternis in idem latus semper vergerent, at-
que spectarent, ipsi similiter cum suo caule ad-
modum succulenti, & frequentibus nodis siue
geniculis præditi, atque magna ex parte purpu-
rascentes: folia in hoc genere magis atra, magis
splendentia, interdum maiora, altera parte ma-
gis prominula, & inferius suum exortum in ner-
uo habentia, similis tamen cum superioribus &
odori, & saporis: flores aliis forma pares, eod-
emque modo ex postremarum alarum sinubus
nascentes, oblongiores tamen, tenuiores, & co-
lore dilutius rubente, extremâ etiam parte mi-
nùs ampli, sex similiter staminula cum stilo in
meditullio continentes, suamque odorem
spirantes: semen in caliculis, rubro alteri simile,
hoc est, angulosum, & tuberculis oblitum, sed
breuius & magis crassum: radix etiam breuior
& crassior alterâ, interdum in binos aut ternos
ramos crassos diuisa. Magis serotina est reliquis,
& nisi Solem valdè apricum habeat, vix ad fru-
gem peruenit in frigidioribus regionibus. Ex ra-
dicibus tamen, per hyemem in fistili siccâ terrâ
pleno, conseruatis loco calido, plantas Viennæ
habui, quæ maturum semen protulerunt: sed
cùm per meam absentiam, ex horto non essent
erutæ (zua illa hyeme anni 1586. corruptæ sunt,
& genus illud mihi intercidit: Lugdunum verò apud
Barauos semine peregrinè accepto, denud
natum 1599. Sed illud mirum in omnibus his
plantis & obseruatione dignum, quod, cùm ta-
bescere incipiunt, primùm folia, deinde integri
ramorum articuli simul decidant, & circa nudos
iam remanentes nodos, candida quædam efflo-
rescentia interdum adnascatur, quæ temporis
successu concreta, salis gustum referat: cuius pos-
tremæ notæ C.V.D. Ioach. Camer. pro nostra a-
micini primus me admonuit. Caterum peregrina
& venusta hæc planta, varia pro regionum di-
uersitate obtinuit nomina: Etenim ex Hispaniis
semen primùm missum est, *Marabilla del Peru* ap-
pellatione, propter admirabilem florum in ea-
dem stirpe varietatem: deinde *arrebaleras* no-
men inditum: ex Italiâ nunc Indici, nunc Mexi-
cani *lasmini* nomine, ob suauem videlicet eius
florum odorem: Belgæ *Solanum odoriferum*, à fo-
liorum cum Solani foliis similitudine, & florum
odori gratiâ vocarunt: Peruanos, à quibus ini-
tiò semen ad Hispanos peruenit, *uachal indi*,
crassâ & in palato formata pronuntiatione, no-
minare intelligo: Mulierculæ Viennenses, apud
quas etiam in deliciis est, *Gescheet Indianis*
heblumen, id est, versicolores Indicos flores
nuncupant. *uachenus ille*, qui videtur nobis fru-
ctus huius Mexicani floris malè Arbori tristi
quondam appinxisse: eius autem figura melius
placet quàm Plantini.

Gelseminum rubrum nuperimè visum flori-
bus puniceis putat Cæsalp. Mandragoram apud
Theophr. vocari. Sed non placet Cæsalpini opi-
nio, quandoquidem comperitur in hac plâta fru-

ctus racematus, vinosusque suo sapore, qualem
requirit Theophr. vires etiam non videntur cõ-
uenire. Melius sentit Camer. de hac plâta in hor-
to. scribēs: Gelseminum siue lasminum Indicum,
sub quo nomine cùm primùm fuerit ex Indiis a-
liis communicatum, semper postea hoc nomen
retinuit, quamuis sit planta sui generis, & pauca
habeat cū Gelseminis communia. Magis propriè
Flos Mexicanus à loco natali: *Sanquinia* quidam
ex Hispanico Marabillas.

Hist. Lugd. lasminum rubrum Dalechampii,
Flos coccineus.

Habui semina à Fratze C. Bauhino cum hac
inscriptione: semen Indicæ plantæ pulcherrimæ.
Habui à Volmaro insigni Pharmacopæo Ill. Du-
cis Vvrt. A.D.D. Fel. Platero, qui vocauit *Tan-*
manthin Peruanum & *Flacquetin Indorum*. A
Do. à Pfaffenlap ex semine collecto in Suffz. Ac-
cepi semen Sturgardiæ quod missum fuerat ab
Hortulano Ducis Florentini cum hac inscriptio-
ne *Meraniglia di Peru maggior*. Item *Meraniglia*
di Peru flore albo. Accepi à Tossano Carolo ex
Burgundia cum hac inscriptione, *Flaculi Indii*. Se-
mina hæc in horto Montibelgardico Ill. Ducis
Vvrt. sata plantas aliquoties proferebant, quæ
semen maturabant Septembri & Octobri, cuius
plurimum, ubi nigrescebat, spontè cecidit. Mo-
nitus à D. Camerario ramos in terram deposui
qui apprehenderunt.

Scripsit ad Clusium Patavio amplissimus Vir
Iac. Antonius Cortusius, eius quæ vario est flo-
re radices binas drachmas interò sumptas egregiè
aquis educere. Quod è sapore iudicare potest
autor H. Lugd. aquosa & humida est quædam
eius portio: ignea verò, calidaque & sicca altera,
quæ discutere valentes possit tumores frigidos.

CAMPANULA SERPYLLI FOLIA

Ioh. Bauhini.



*V*iticulos *Descriptio*
habet fru-
ticosas Ser-
pylli, longas,
multas, in va-
rios ramulos
tenuiores diui-
sas: in quibus
folia ex aduerso
coniugatim po-
sita, Serpylli
æmula, iis ta-
men quædam
maiora, alia mi-
nora, crenata,
nonnihil pilo-
sa, brevissimis
pediculis adne-
nexa. Ex ra-
mulorum ex-
tremitatibus
pediculi oriun-
tur palmares serè, foliis nudi, in quibus flores bi-
ni terniue, deorsum curuantes, Campanularum for-
mâ, minimi digiti vngui magnitudine cedentes,
colore, si rectè recordor, caruleo.

C Bauh. phyt. Campanula 9 siue Serpyllifolia
Ioh. Bauhini.

LINIFO-

Nomina

Ch/m.

Locus &
Tempus

Vires

Descriptio

Locus & tempus

Hanc in Rhæzia florentemestate interuenimus. Frater indolem siccam sine flore misit anno 1592. Gener lo. Hent. Cherlerus ex monte Gottardo attulit.

LINIFOLIA CAMPANULA lutea.

CAP. V.

Descriptio



Folia per caules ferè sesquipalmares alterno situ, oblonga, angustaque, Lini latius foliorum æmula, laxe: canles superius in ramos abeunt qui flores gestant insignis magnitudinis, vncial longiores, et pæco colore micantes, calyce in quinque lōgas aristas fillo, capitulo tequente Lini, sed magis turbinato: vix

longa, crassa, lignosa, in planta capite tuberosa diuisa.

Depingunt & describunt Adv. ac sic determinant: Campanula lutea Linifolia Montis Lupi, flore volubilis. Hæc Lobel. Obl. videtur Viola Calathiana Plinii, flore luteo.

Hist. Lugd.

Hist. Lugd. Hyslopus nemorensis & lutea. Sciendum autem nos iconem solum H. Lugdunensis, huc referre, non item descriptionem, quæ non congruit figuræ.

Plant. Icon. pag. 414. Campanula Linifolia, Tent. 500.

C. Bauh. phyt. Campanula 4. siue Linifolia lutea.

Locus & tempus

Cum essem Monspeffusi mihi allata ex proximis montibus Linifolia Campanula lutea. Gener Cherlerus attulit collectam in planitie propter montem Lupi.

SOLDANELLA MONTANA quibusdam.

CAP. VI.

Descriptio

Oblivam agit radicem, nigram, crassiusculam, tuberosam, multas longas fibras quibus terræ hæret, demittentem, folia tria, quatuor aut quinque pediculis è radice ortis duum aut trium vnciarum nituntur, vncialia aut paullo maiora, circinata rotunditatis, crassa, solida, atro virore splendentia, in quibus nervi vix nisi siccis apparent obliqui: caulis inter folia surgit vnicus vt plurimum, vel duo, dodrantales, nudi, qui superius in ramulos paucos diuisi flores gerunt duos trève, nutabundos, nolum imitantes, cæruleos, fimbriatos, stylo longiore prominulo. Succedunt corniculati vnicus brevis totus,



strita per su-
premam oram
crenata, semen
continentia.

Hæc sic
depingit Clus.
Sena habet,
vnc oclona fo-
lia, crassa, in
orbem ferè
circinata, Bras-
sicæ marinz,
quam vulgo
Soldanellam
vocant, æmu-
la, sed duriora,
superne viri-
dia, inferne
dilutior viri-
ditate splen-
dentia, gustu
primum exsic-
cante, dein-

de acri & ingrato: flores gerit in lzui, nudo, gracili, tubrubro, palmarumque cauliculo binos ternos aut plures, purpureos vel saturatos, vel dilutos colore, imdotos, Campanulæ modo efformatos, deorsum spectantes, & propendentes, vnic folio in quinque profundas crenas (quæ aliquantulum laciniatz sunt) & totidem alias singulares, diuiso, constantes è medio protuberante veluti quoddam umbone in longum stilum desinente, qui in vasculum, vel corniculum potius euadit, oblongum, durum, membranaceum, mucronatum, partim durum, virelens, simul congestum semen continens: radices fibrosæ, candicantes, ex vno veluti capite dependent, quod adnatis se propagat.

Est & aliud genus minore folio, neque circa pediculum, qui breuior graciliorque est, aded circinato, sed sensim ab ipso in latitudinem excrecente.

Inueniebat etiam in ascensu montis Herrenalben in quibusdam vmbrosis locis quoddam genus amplius foliis, sed tenellis admodum, quæ parte inferiore non virebant, superiorum modo, verum non minus rubescebant, quàm Cyclamini flore odorato folia. Soldanellam montanam Aduers. sine flore pingunt, licet illi florem Gentianellæ minoris cæruleum assignent. Dalech. apud Hist. Lugd. florum picturam habet, sed malam. Vocat Lunariam minorem & Asclepiadem quorundam. Ic. Plant. p. 602. Soldanella montana. Tent. 715. Camer. apud Matth. Soldanella alpina. Violam alpinam foliis Asari minoribus hanc inscribit Gesner. hort. C. Bauh. Phyt. Soldanella tertia siue alpina rotundifolia. Et altera siue 4. folio minus rotundo. Variat prior foliis & floribus: alia foliis superne virentibus, inferne dilutior virore splendentibus: alia foliis inferne virentibus: flos purpureus, nunc saturatior, nunc dilutior, flore etiam niueo reperitur.

In arduis montibus & celsis Alpibus quæ Inf. purgum & Ranis purgum ambiunt colligi: ac in quibusdam montibus Auenione non diffius magna gliscere copia audiunt Aduers. Copiosè nascitur in Austriz & Styriæ Alpibus, perpetuè niue obstitis, nusquam verò latior, aut vberior, rem conspicebam, ait Clusius, quàm in iugo Vvechschel nuncupato, supra Aischpang Magn. vi-

Locus & tempus

anno 1576. vnicam plantam lactei proesus candoris flore inueniebam. Floret istuc Iunio, interdum Iulio, & Augusto, nimum maturius aut ferius liquecentium ratione. In hortos autem translata, etiam Aprili, vel cum Primulâ veris rubrâ floret: difficulter autem cicurari potest. Hanc herbam pulcherrimam florentem vidimus in montibus Rhaticis dictis Chempseche & Albula, Iulio mense 1601. Tunc fuit mihi denominata Cyclaminis species. Habuimus anno

1595. in Horto U. E. C. Montbelgardi, allatam Argentina ex horto D. Friderici Meier.

Ex Theophrastinis illis arusticatoribus nonnullos huius foliis, cuticulâ summâ deglubitis, asciticique abdomini admotis, aquas educere, & vulnera illiâ minificâque carne & cicatrice claudere, tradit Lobelius, quod non vidimus. Folium crassiusculum est, & subadstringens, amaricante sapore, Seldanellæ planè simillimum.

FINIS LIBRI VIGESIMI





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS PRIMVS.

HERBÆ SILIQVOSE, PLERÆQVE ACRES, INTER
QVAS MVLTÆ CVLINARIÆ.

POST Rapunculos, quid potius subiungi mereatur quam Rapa, ac his consimiles Napi, Brassica, & huiusmodi
alia? quas si pleraque in culinas acutas quis dicat, ut rumen impleant, ut ille ait, nulli reluctabimur.
Illud potius Herbaria Studiose ostensum volumus, omnes infra decendas plantas id habere commune, ut semina
siliquis inclusa gerant, acris sanè pleraque sicut & ipsa planta.

BRASSICA VETERIBVS ET IN GENERE.

CAPVT. I.



ORTIS & culinz familiaris
Brassica (ραφανός) quam Theo-
phrast. trifariam diuidit hist. pl.
lib. 7. cap. 4. Ac primum quidem
in eam, quæ crispa (ἀσφύλλα) deinde
in eam quæ læuis (λεῖσις) habet folia: & tertiam agrestem

[ἀγρία]. Videtur autem priorum (duarum) Bras-
sicarum similiter & hæc esse differentia, quod har-
um quædam nullum, quædam malum semen
habent. In vniuersum autem crispa [ἀσφύλλα] & me-
liore succo, & maioribus foliis est, quam læuis
[λεῖσις].

Notandum autem non hinc solum Brassicam
ῥαφανός à Theophrasto nominari, & ita
à Theodoro conuerti, sed alius etiam in locis (sz-
pissimè, in quibus Scaliger ῥαφανός pro Bras-
sica usurpat, & non pro radice neque radícula,
quæ ῥαφανός quoque à Græcis vocatur. Ipse
etiam Aristoteles Brassicam interpretatur. Scribit
enim lib. 5. cap. 19. hist. Nascuntur Erucæ ex virē-
tibus foliis, maximè Raphani, [ραφανός] quam
nonnulli ἀσφύλλαν [Brassicam] vocant.

Adhuc & Athenæus lib. 9. ῥαφανός Theophrast.
ἀσφύλλαν esse dicit, ita siquidem illic ait. Theophr.
verò ad hunc modum scribit. [ῥαφάνη ἢ ῥαφανός]
(ῥαφάνη δὲ τὴν ἀσφύλλαν) ἢ μὲν ἐστὶν ἀσφύλλαν, ἢ δὲ ῥα-
φανός: Raphanus, Brassicam dico, altera crispis est
foliis, altera siluestris [leuis Dalechampius].

Antiquos Raphanum Brassicam vocasse mon-
strat Apollodorus Carystius.

Raphanum scio vocare nos: ac hospitis
Vos Brassicam.

Plinius negligentius legit, imò nec animad-
uertit quidem, quæ Theoph. ac Aristoteles de-
Tom. II,

Brassica scripserunt, ipse siquidem lib. 19. cap. 7.
Raphano radici tribuit, ac rursus eiusdem libri c.
8. ad Brassicam quoque retulit, Catonem, qui illa
ex Theophr. transcripsit, his verbis citans. Sed
Cato Brassicæ misas canit laudes, quas in meden-
di loco reddemus. Genera eius facit tria: vnam
[latius Cato] extensis foliis, caule magno; alteram
crispo folio, quam Papiniam vocat: tertiam mi-
nutis caulibus, lenem, teneram minimè pro-
bat.

Idem Plinius eadem tria genera libr. 20. cap. 9.
reperit. In tres, inquit, species diuisere Græci an-
tiquissimi. Crispam quam Selinada [legendum
videtur Selinoidea, huc Selinoiden, ex Catone
c. 157. vocauerunt, à similitudine Apii foliorum,
stomacho vtilem, alium modicè mollientem.
Alteram leam, latius foliis è caule exeuntibus. Vn-
de caulodem quidam vocauere, nullius in medi-
cina momenti. Tertia est propriè appellata Crā-
be, tenuioribus foliis, & simplicibus densissimis
que, amarior, sed efficacissima.

Quò verò Catonis sententiam de Brassicæ ge-
neribus clariorem reddam, verba eius ex cap. 157.
adscribam. Nunc uti cognoscas genera earum,
prima est leuis, quæ nominatur λεῖσις, grandibus,
& latius foliis, caule magno, validam hæc habet
naturam, & vim magnam habet. Altera est cris-
pa, quæ à similitudine Apii ὀσπύλλαν vocatur.
Hæc est & aspectu, & natura bona ad curatio-
nem, validiorque est quàm suprà scripta est. I-
tem est tertia, quæ ῥαφάνη vocatur, minutis cau-
libus, tenuioribus foliis, & acerrima, omnium est
istarum tenui succo vehementissima.

Atque hæc tria genera Brassicæ agnoscit etiam
Eudemus Atheniensis libr. de clericis apud

Z z z

Raphanus
Crispa.
Lenis &
crispus.

Catonis
Brassica.

Raphanus
Crambe.

Lenis.
Crispa.

Crambe

Halmyrida Athenzum lib. 9. nimirum quod Halmyrida [quia
Leophyllum nisi in maritimis non provenit] *Leophyllum*, &
Selinum *Selinum*.

Niphilus Septinius contra, videtur duplicem
 Brassicæ statuere differentiam, speciosissimam,
 seu dulcem, quæ Cumis: & amaram, quæ in Ale-
 xandria oriatur. Quod autem semen in Alexan-
 dria Rhodo fertur in annum efficere brassi-
 cam dulcem, sed quæ post id tempus pro natura
 loci amarescat. Nicander in Georgicis.

Lentis quidem Brassica, interdum verò sylvestris
obuia,

Cum feritur foliosa, in arcibus hortorum pubescit:

Crispa verò, fruticosa, Tyrio colore foliis nitenti-
bus,

Aut Phæniceis, & Halmyridi similis,

Cymis decolor, & aspera, similis est

Soleis, quas assuunt mutat oris calceis.

Cæterum, etiam dicta genera complectitur
 Diosc. sub Brassica sativa, sub qua etiam Egi-
 ptiam habet, quæ propter amaritudinem in Egi-
 pto non estur, ait Plinius. Addunt autem Dio-
 scor. & Plin. adhuc genera duo, sylvestrem alte-
 ram, de qua paulò pò st: & alteram marinam, de
 qua Hist. n. lib. 15.

Sed & cætera genera complura sunt, pergit
 Plinius. Cumanū sessili folio, capite patulum. Ari-
 cinum altitudine non excelsius, folio numero-
 sius, quàm tenuius. Hoc viliissimum existimatur,
 quia sub omnibus penè foliis fruticat cauliculis
 peculiaribus. Pompeianum procerius caule ab
 radice tenui, intra folia crassescit. Rariora hæc an-
 gustioraque, sed teneritas in dote, si frigora non
 tolerat: quibus etiam aluntur Brutiani prægran-
 des foliis, caule tennes, sapore acuti. Sabellico
 vsque in admirationem crispa sunt folia: quorum
 crassitudo caulem ipsum extenuat, sed dulcissimi
 perhibentur ex omnibus. Nuper subiere Lacu-
 turres ex conualle Aricina, ubi quondam fuit la-
 cus turrisque quæ remanet: capite prægrandes,
 folio innumeri. Alii in orbem porrecti, alii in la-
 titudinem torosi. Nec plus vllis capitis post Tri-
 tianum cui pedale aliquando conspicitur, & cy-
 ma nullis serior.

Ex omnibus itaque generibus quæ ex cultu,
 locis & forma nomen adepta apud Plinium, duo
 nostris vulgò notissima sunt, inquit Cornarius:
 Alterum sessili folio, atque ita conflexo, vt om-
 nia simul vnum caput efficiant. Quare etiam fas-
 puosol, id est, caulem capitatum vocant: sicut et-
 iam Græci *καυλοειδὲς κεφαλαίω* dicunt: Alterum ex-
 tensis foliis, caule magno, quod partim *Schlaüs-*
chen, partim *Losen*, partim *Stauden* appellant.
 Caulium itaque & coliculorum appellationem,
 de Brassica etiam nostri habent, in eo quod ip-
 sam *föl* vocant, quamvis aliqui etiam *fraut* no-
 minent, id est olus, quomodo item *Launè* ap-
 pellatur, ob excellentiam.

Est plurima sint Brassicæ genera, vt ex vete-
 ribus rei rusticæ Scriptoribus liquet, quatuor ta-
 men duntaxat, quas hodie vñtatas esse scribit
 Fuchf. producit: quarum vna Græcis *λαία* [laia] *laia*
 nominetur, grandibus & latis foliis, caule ma-
 gno: & Germ. *Breiten oder grosser föl* vocetur,
 Gall simpliciter *Choux*. Altera crispa, quæ à simi-
 litudine Apii *παρασπονδία*, id est, Apiana nuncupe-
 tur, vulgò *crispus caulis*, Germ. *Krauser föl*,
 Gall. *choux crispés*. Tertia quæ propriè Crambe,
 minoribus caulibus, & tenuioribus foliis, flo-
 re luteo. Germ. *kleiner föl*, vt ab aliis discerna-
 tur, nominari possit, aut simpliciter, & sine ad-
 iunctione *föl*, Gall. *choux rouges*. Quarta, quæ

sessilis sit folio, & capite patula.

Brassicarum nobis notæ hæc, inquit Gesner.
 hort. Alba, nigra, crispa, hirsuta & rubra, quæ
 non multum differt à nigra, ita vt sæpius vna in
 alteram mutetur, quod Olitores testantur. Item:
 capitata Brassica hortensis vbinam spontè nasci-
 tur nescio.

Tragus præter sylvestrem, has recenset brassi-
 cas. brassicam sativam maiorem. brassicæ sativæ
 maioris speciem alteram. brassicam crispam, &
 capitulatam, de qua separatim egit.

Matthiolus sua brassicæ genera Veterum ac-
 commodare studens ita scribit. Sativa brassica,
 Theophr. & Plinio authoribus in multiplici re-
 censetur genere. Id quod & horti in Italia atto-
 stantur: nam in iis multiplex & varia crescit brassi-
 ca. Inter quas nominatim & ea (brassica crispa)
 quam Plinius Sabellicam appellat tradidit, quæ
 crispis admodum foliis, Lactucæ modo in se
 concluditur, intus albicans, tenera, subdulcis, &
 quæ hac ætate omnium præstantissima habetur.
 Est & capitata conglomeratis vndique in orbem
 foliis, Plinio Lacuturris appellata, quæ vulgò *Ca-*
pucci dicitur. Est insuper ex iis, quæ nostris Italiæ
 hortis proveniunt, alia quædam [brassica rapo-
 sa] Jenuis caulis Rapi in morem extuberat, mani-
 diūque subinde medulla, pingui iure incocta
 raporum modo. Huius non reperio meminisse
 Plinium, nec eo vetustiores alios, qui de horto-
 rum sationibus scripsere, sicuti nec illius, quæ fo-
 liis admodum per ambitum lacinatis, minutim-
 que intereisis assurgit.

Ex multis Brassicæ speciebus quatuor recipe-
 re videtur Camer. horti: Cypriam, siue Pompeia-
 nam [multifloram], quam vulgò *cauliflori* vocant:
 Rapiaculem, Apianam crispam, & Albam Ge-
 nuensem, quæ nobis Brassica tenuiter secta.

Lonicerus meminit Brassicæ albæ, latæ, crispæ,
 capitatæ, & sessilis, sed, quod mirum, nullam de-
 scribit.

Simili modo Ryffius oscitanter & ieiunè ni-
 mis de Brassica solis nominibus certat. Quatuor,
 inquit, earum genera. Prima *laia* [laia] *laia*
föl: altera crispa, à similitudine Apii *παρασπονδία*,
frauser föl, vocata: tertia *κράμνη*, *kleiner föl*,
 & quarta *κράμνη κεφαλαίω*, Latinis Brassica Lacu-
 turris, vel testua aut sessilis, siue capitulata. Ger-
 manis *Cappis fraut*, Gallis, Capini vel Cabini
 colex, nonnullis albi vocati, reliqua Brassicæ ge-
 nera Galli communi vocabulo *Chouls* [caules]
 appellant. Facit & quatuor genera Amatus, quæ
 non describit. Horum genus alterum Lacutur-
 rem & Caputium vocat. Hisp. Repollo, Colhes
 Morcianas: *Caputia*, Gall. *choux pommés*: Germ.
Cappes fraut. Hæc in orbem porrecta ait, clausa
 & apprimè dura, per medium secta, in numero
 cernitur folio. Amati verborum testis fuerim, si
 ea de quarta, & non de secunda specie tradiderit.

Nostra ætas, vt ait Dodon. non paucas quo-
 que observavit, vel colore, vel forma differentes,
 Brassicas. Quædam enim sessili folio patula sunt
 aliæ contracto capitata, nigra nonnullæ, pleræ-
 que albidæ, vel etiam saturato colore virentes.
 Iam & laui folio istæ: illæ verò crispe, aut laci-
 niato. Est & in caulibus differentia. Nos de eius
 octo speciebus [Brassica sc. vulgari, sativa, rubra
 capitata, crispa, selinoide, sylvestri Crambe di-
 sta, capitata albida, Sabauda & cauliflora,] quas
 depingit & describit, seorsim tractabimus, vti &
 de ea quæ sylvestris ab ipso inscribitur, & sylvestri
 perfoliata, quam Perfoliatam siliquosam voca-
 mus.

Camme-

Commemorat Aug. Gall. Brassicam, *Cauli o*
Verzi, crisp, capuciat, Verzi fiori, Verzi rapi, & ca-
pucci ferrati.

De brassica duplici campestri Clusii agemus
sub titulo *Perfoliatæ siliquosæ*, *Caulis siue bras-*
sicæ, quas *Aduersaria* tradunt diuersas, sunt hæc:

Alba, sessilis, glomerata, aut capitata,
Lactucæ habitu.

Eadem conuoluta & arctè occlusa,
apud Belgas, rubro colore, enematibus
aptior.

Sabauda, vulgò *Sauoye*, patula &
minùs occlusa, foris virens, intus al-
bicans.

Racemosa nonglobosa, vulgò Ita-
licè *Cauli flore*, siue florida Pompe-
tana.

Laciniosa alba, & Rubra Cumanæ
vulgation.

Nigra, vndantibus, crispis & lacinio-
sis foliis.

Marina multiflora, Sylvestris, mono-
sperma.

Caulorapa, brassica peregrina, me-
dio caule turbinata & rapata.

Obseru. Brassica vulgaris satiuæ, ca-
pitata, florida: botrytis tenuifolia, laciniosa. Et
Icon. Plant. *Lactuca satiuæ* sessilis, siue capitata:
vulgaris satiuæ, alba, sessilis, glomerata, aut capi-
tata, *Lactucæ* habitu: patula crispa Sabauda æstiu-
a: Sabauda hyberna, florida botrytis, marina
sylvestris multiflora monosperma: Rapa Bras-
sica peregrina, caule rapum gerens, tenuifolia,
laciniosa, & fimbriata. Dalech. apud Hist. Lugd.
Brassicæ tria prima genera facit. Brassicam sati-
uam, sylvestrem & marinam. Nobis relictis dua-
bus posterioribus de satiuâ hic tantum sermo sit.
Diuidit autem satiuam in albam & rubram. Albæ
septem tradit species. Albam vulgarem seu læ-
uem satiuâ: Albam crispam, Capitatam albidam,
Capitatam polycephalon, Pompeianam aut Cy-
priam, Brassicam floridam Dodonæi, Asparago-
den, & Raposam. Rubræ agnoscit species 4. Ru-
bræ speciem primam, quam Cumanam vocat, &
Brassicam læuem Catonis, eamque primam om-
nium à Fuchio descriptam esse dicit: secundam,
quam Dodon. Brassicam Lacuturtem appeller:
Tertiam, Dodonæo *αλμυδὴ* Lat. Apianam di-
ctam: & quartam quam Dodon. nigra, sed Fuch.
Crispam & *αλμυδὴ* Apianam à similitudine
Api cognominet. Huic insuper adiungit Cris-
pam Trigi, & Tenuifoliam laciniatam I. belii,
cuius gemina varietas Brassicas suas Taberna in
duo primum distrahit genera: in domesticum si-
ue satiuum, & sylvestre, de quo pòst Satiu aliud
esse læue, idemque duplex, ex viridi album, &
rubrum. Aliud crispum, capitatum aliud: aliud
proliferum floridum, Italicè *Cauli fiori* dictum.
In specie quidem recenset has. Brassicam 1. *Föl*
fräut 1. Brassicam 2. *Föl* *fräut* 2. Brassicam 3.
bram *Rottér Föl*. Brassicam capitatam, *Cappes*
fräut / *Cappes Föl*. Brassicam capitatam rubram
Rott Cappes. Brassicam crispam *fräut Föl* *fräut*
Brassicam proliferam, *Büschel Föl* *fräut*. Brassi-
cam crispam proliferam, *Büschel fräut Föl*. Brassi-
cam proliferâ floridam *Blümen Föl*. Brassicam
Anglicam, *Englisch Föl* *fräut*. Brassicam Sabau-
dam *Sapphysch Föl* / de qua dubitamus an eadem
sit cum Brassica capitata rubra: Brassicam Sabau-
dam crispam, *Sapphysch fräut Föl* *fräut*. Bras-
sicam tophosam, *Buckel Föl*. Brassicam Selini-
fiam latifoliam, *Breyt fräut Föl*. Brassicam Selini-
fiam angustifoliam *Schmal fräut Föl*. Caulora-

Tom. II

pum, siue Rapocaulum, *Rüben Föl*, & Caulora-
pum longum, *Langrüben Föl*, quas nos non se-
paramus, & Brassicam rapicaulem inscribimus.
De quibus omnibus suo agemus loco, vt & C.
Bauhini 26. speciebus, ac etiam Hadriani lunâ
lex, inter quas & marinam numerat.

Brassica olus est vulgatissimum, ait Cæsalp. flo-
res pallidi aut candidi, color alius virentior est,
aliis candicans: aliis ad purpureum vergens: cris-
pitudine & læuitas tum in genere virenti, quod ni-
grum vocatur, tum in candido reperiuntur. At
purpureum nequaquam crispum adhuc visum
est. Omnium crispiss. inter nigra reperitur: Plinio
Sabellicum: Theoph. Crispum. In hoc genere Se-
linida & Apiana Plinio. Candida & purpurea
breuiore caule, sed qui magis crescit in caput so-
liis rotundioribus: Crispa inter candidas crescit
in caput oblongum, candida, tenerrima. Læuis
non nisi ex iure pingui paratur. De hac Plinius
inquit, læuis constat foliis & caule exentibus:
vnde Caulodis dicta est, nullius in medicina
momenti: hinc sumptum vulgare nomen *Cauli*
apud nos. Quædam in caput rotundum crescit
Caputios vocant. Plinius Cumanum vocat. Qui-
busdam caulis in caput extuberat Rapi similitu-
dine vulgò *Terzutos* vocant &c.

Κραυβή (brassica) Græci, quasi *Κραυβή*, inquit
Suidas, quod pupillas oculorum, quas Græci *Κόας*
vocat, hebetet. In qua sententia fuit Columella
cum scribit.

Nunc veniat quamvis oculis inimica Cor-
amblæ.

Et melius *Κραυβή* quasi *Κραυβή* dicta est, quod
vel *Κραυβή* vel rectius *Κραυβή*, id est, quod
crapulæ satietatique aduersetur, vt dicitur. Græ-
ci veteres etiam (vti dictum) *Κραυβή* vocarunt, ob
mutuam quandam amicitiam & affinitatem v-
triusque seminis, vetustioris præsertim, vtramque
plantam generandi. Nicander Colophonius in
Glossis apud Bæotos *Κραυβή* Brassicas nominari
ait. Hoc tamen Dalech. non ad alias, quam capi-
tatas, vel eas, ad quarum radices velut Rapum
extuberet, refert. Brassica à Latinis appellatur,
quasi præseca, inquit Varro, quod huius scapus
minutatum præsecatur: siquidem nunc tonsili,
nunc cymoso caule spectatur. Sunt qui dictam
existiment quasi passicam, quod ex caule minu-
tum præsecetur vt passa fiat, vel *Κραυβή*, id est
à vorando dictam verisimile est. Estur enim to-
ta à plebecula, tum cruda, tum cocta, vel muria ser-
uata: à Germ. *Föl*. Belg. *Fool*: Gall. *Choux*. Ital. *Cau-*
li, *Caulo*: Hisp. *Verca* *Colhou*: Angl. *Cole* / *Colwure*
tes: Hungar. *Vörös* *kapusta*: Boh. *kapusta* & *Kely*.

Cæterum, Olus hoc Lachrymis Lycurgi à Li-
bero patre vitibus adalligati natum prodidit
Nestor, in eo libro qui Alexicepos inscribitur:
perniciosa forsitan cum ea (Viti) odio flagrare
hisce fabularum inuolucris innuens. Vitus enim
& Brassica tantâ laborant discordia, vt si in agris
olus hoc assitum Viti prosiliat, vel vinum exilus
proferat, vel ipsa confestim marcescat, vel certè
sarmenta eius contabescant. Tam pertinax inter
has plantas inimicitia, vt si deflexionis impe-
tu vna procidat, aut laxior in fauces decumbat,
inieccto capiti Brassicæ crudæ succo in excelsum
oris protinus resiliat. Si Brassicæ fuerit vicina Vi-
tis, luxuriantes eius palmites potius repandi cur-
nabuntur, quam recti velint propius accedere
intestini non immemores discordiæ. Similiter si
quis feruescenti in olla Brassicæ vini paululum
iutatum instillauerit ne ampliùs quidem exco-
nuctur, sed suis vitibus defuncta ad perniciem

Lxx 2

Nomina
linguarum

Germ. *Groß Rapünzel*-Belg. *Groteraponce*-
len, quod sine dubio est *Andromeda* & Cauda vul-
pis à Theophrasto descripta, Lat. de flor. Rapi-
inquit, sylvestris sextum quoddam genus. Ra-
punculum sextum, colore aliàs candido, aliàs cz-
ruleo, aliàs purpureo, nonnulli Alopecuron ap-
pellant: Sed alia est. Tragus describit flore czru-
leo: vocatque Rapunculum maius & Rapuncu-
lum sylvestre, Germ. *wald Rapünzel*. In hist.
Germ. *Die andere vnd gros Rapünzel*.

Lonic. speciem globosam habet flore purpu-
rante. *wald rapünzel/groß wald rapünzel*/
Rapunculum sylvestre.

Lobel. & Penz. Adu. Rapuntium maius Alo-
pecuri comoso flore: Lobel. Obs. pingit cum lon-
ga spica.

Gesner. hort. Rapi sylvestris genera in sylvis
ac montibus, quorum flores ceu in spica sunt,
alii czrulei, alii pallidi. An eadem de col. stirp. Ra-
pum sylv. floribus vaguim instar recurvatis?
Item Rapunculi sylvestris genus floribus czru-
leis in se recurvis?

Clus. in Pann. & Hist. post. Rapunculus Alo-
pecuroides longiore spica, aut breuiore, coloris
albi vel violacei.

Schvv. Rapunculus montanus albus, Rapun-
culus montanus czruleus.

Thal. Rapunculus sylv. communior, foliis Cer-
uicariae mai. mucronatis, caule cubitali, lzui, tere-
tu, flore spicato, ex viridi leniter albente: passim
in pratis & locis quibusdam montanis. Mihi vo-
catur Rapunculus sylv. spicatus albens: licet eius
speciem in Thuringiaca silva, floribus prorsus
candidis viderim. Eiusdem species floribus czru-
leis, &c.

Camer. hort. Rapunculus flore purpureo, can-
dicante: spicato purpureo & albo.

Geneuz albus cum longa spica, variis in locis
& prouenit, vt inter Vrbem Montbelgardum
Charmontey, & in sylua le Chesnoy: habui etiam
in Horto E. C. à me plantatum, Rapunculum flore
purpureo & albo globoso, ferè vt in scabiosa,
foliis minoribus, quale Geneuz etiam vidi, vbi
prouenit aliud genus cum longa spica plena flos-
culis albis in monticulo la Bassie. Hoc genus ce-
cum comedi in acetariis Montbelgardi: tale re-
perit Frater in monte Mutensi Basiliensium, Ra-
punculum spicatum reperi mense Februario in
montibus Euganeis Italiz. Rapunculum flore
globoso Dalech. vocabat, ni fallor, Aphyllantes
genus, eum qui globosum habet florem: Ex vi-
cinis Montbelgardo locis magnum Rapuncu-
lum spica longa transtuli in Hortum E. C. Ra-
punculum flore albo folio maculato obseruavi
florentem Augusto, apud Fontem aridum S. Pe-
tri. Minus hæc est Lobelio obuiam multis locis
nec nisi montosis aut aliosis pratis & conualibus,
vbi sunt Mindeni & Norbonz Aquitanicz vicin-
is pinguibus, etiam Belgii & Angliz nemorosis.
Natales eius, inquit Schvv. montosa & aliofosa
prata, conuallesque nemorosa. Iunio spica viget.

Radix, vt scribit idem Schvv. priusquam
caulem protrudat, elixa cum sale, aceto & oleo
macerata, cibi appetentiam parit, stomacho pro-
dest & vrinas elicit.

RAPVNCVLVS FLORE GLOBOSO purpureo.

Descriptio

Vbitali assurgit altitudine caule satis gracili,
parte inferiore purpurascens quodammo-

do, superna viridi cui inhærebant aliquot folia
quatuor uncias longa, in ambitu serrata, dodran-



tali pediculo in-
nixa, & ea qui-
dem quæ infi-
mæ paræ caulis
adnata erant,
secundum pe-
diculum, vnciam
aut pollicem
lata, deinde
sensim in mu-
cronem desin-
entia, quæ ve-
rò medio cauli,
& summæ
eius parti in-
hærebant, lon-
gè erant angu-
stiora, & breui-
ore petiolo
fulta, non mi-
nus tamè longæ
summum caulis
fastigiū desine-

bat in breuem & quasi orbicularem florum spicā,
quæ foliis staminibus ex purpurâ czruleis, con-
stare videbatur: quibus deciduis apparebant cali-
culi pentagoni: radicem non adferebat, qui in ri-
nere obseruabat, quia erueri non potuerat, inter
saxa & confragosos locos nascentem. Tota autem
planta lacteo succo abundabat, non secus ac reli-
qua genera.

Rapunculus Alopecuroides orbiculari penè
spica Clus. Hist. post. sine icone.

Geneuz collegimus globosum purpureum ra-
dice longâ.

Locum

RAPVNCVLVS MINIMVS FOLIO TE- nui gramineo.



Descriptio
Omnium
Rapun-
culorum mini-
mum in monti-
tibus Rheucis
inuenimus, cui
radix crassius-
cula: calculus
tennis duum
vnciarum co-
molum gent
floræ czruleæ.
Rapunculi spi-
cati: folia cau-
lem comitan-
tur, iplo penè
longiora, filis
instar tenuia,
numerosa.
C. Bauh. phyt.
Rapunculus 7.
siue vrabella-

tus folio gramineo.

Florentem obseruavi Iunio in Rhætia.

RAPVN-

RAPUNCVLVS ALPINVS
paruus comosus.

Descriptio.



Radice squammi-
veluti compa-
ctili, ex veteri-
bus foliis resi-
duis, ut in Nar-
do Celtica pe-
ne videre est,
crassiuscula,
sensim attenua-
ta, praeditus est:
folia fundente
numerosa, vn-
ciam vnam aut
alteram longa,
culmum lata, ad
Nardum Celti-
cam acceden-
tia, longis nixa
pediculis: inter
quae *cauliculus*
surgit, duum

unciarum, non sine foliis quae angustiora: cuius
cacumini flores insident Rapunculi comosi, qui
caerulei, quantum ex sicca planta colligere licet,
stylis longis recuruis prominentibus: picta secun-
dum eius magnitudinem, sunt tamen nobis plan-
tula quaedam paulo maiores. Hae planta vide-
tur habere nonnulla similia cum Rapunculo mō-
tis Baldi, cuius etiam vascula hic pingenda curau-
mus, quia iam sculpta erat eius figura, ut paulo an-
te dictum.

Locus &
tempus

Habui ex plantis Di. Agerii pro Rapunculo al-
pino Cam. flore caeruleo collecto, in Styria mon-
tibus.

RAPUNCVLO COMOSO SPICATO
aliquatenus affinis ex Baldo.

Descriptio.



Palmaris est
caulis ad
imum squamma-
tus, foliis infimis
Buttonariæ Bel-
lidis caeruleis di-
ctæ similibus, su-
perioribus Belli-
dis maioris pro-
fundè serratis, sa-
tioribus quàm
inferiora, qualia
etiam in summo
caule radiatim
crebra flori subi-
ciuntur, qui cau-
lis comosus: sin-
gulares flores e-
tiam maiusculi,
veterem inflatum
referentes, imò
parte laxiores, al-
biantes, sensim

tenuantur in cernicem violaceam per extremas
orascrenatam, vnde longè florem supereminens,
Rayæ tenuè nigricans in tortiles veluti capreolos
desinens emicat.

Hanc eandem plantam ni fallimur collectam
Tom. II.

in Bassauensibus montibus accepimus à D. Age-
rio, in qua folia vndique serrata & latiora cum
vasculis ad Rapunculi vulgaris vascula acceden-
tibus, quæ curauimus appingenda in tabella Ra-
punculi parui Alpini comosi, qui nondum erat
sculptus.

De hac planta hæc tradidit Ioh. Pona in des-
criptione montis Baldi. Trachelium petrum
minus in ipsius Baldi altioribus summitatibus,
cuiusvis alius plantæ sterilissimis, inter præcipi-
tes illas cautes ab eisdem veluti cadentibus pen-
dens, germinat. Eam fusè describens, ac addens
perennem & adstringentem esse plantam.

C. Bauhino eum Rapunculum n. siue Alpinum
spicato similem collectum in Baldo D. Guiland-
no ostendisset, is Rapunculum montanum, ac
Nobilis. Cortus Cantabricam alteram Anguil-
laræ nominauit. Eundem à Dre. Io. Neudorf-
fero accepit, ut apud Matth. scribit, cuius vna ra-
dix, quæ tuberosa, est inæqualis. Rapunculo vul-
gato triplo maior: Ab eodem & duas alias Ra-
punculi species ex monte Sumano, necdum des-
criptas habet.

Icon nostra sicuti & descriptio factæ sunt ad
plantam siccam, quam adhuc habemus, quæ de-
lata fuerat ex monte Baldo per Abrahamum Be-
chium Medicum, quamque Frater C. Baulinus
Basilea misit.

RAPUNCVLVS SONCHI FACIE
umbellatus.

Guilland. de Mera Medicus rediens ex pere-
grinatione Italica communicabat Rapun-
culum nunquam antè Clusio conspectum, qui
abruptus similis erat, ut Rapunculus flore glo-
boso purpureo, & sine radice, quam eximere non
potuerat. In pedalem autem excreuerat altitudi-
nem, vel etiam breuiorem: plura, quàm Primum
habebat folia, breuiore pediculo, eoque plano
subnixa, superne viridia, inferne exalbida, instar
foliorum Sonchi, quibus valde forma responde-
bant, erant enim, ut illa, in ambitu dentata, sed
minora: summo cauli innitebatur veluti umbella,
longiusculorum calyculorum striatorum, in quin-
que angulos desinentium, in quibus flores, coloris
non comperti, quia neque ipse Mera referebat,
neque vllus, in tota plantæ umbellâ, restabat, ex
quo coniecturam facere licuisset.

Considerandum quantum Rapunculus Son-
chi solo Clusii differat à Rapunculo, montis Bal-
di antè dicto.

RAPUNCVLVS CRETICVS PETRO-
marula.

Herbam teneram lacte turgentem floribus
caeruleis visui gratam Imperati, sic des-
cribit Honorius Bellus. Folia profert tri-
choracea, magna, profundè incisa, in orbem dif-
fusa, saturè virentia, inferne splendentia, ad
purpuram aliquando tendentia, ut Cyclaminas,
læua, cum autem semine nata prodit, prima eius
folia Violæ nigra foliis simillima sunt, rotunda, &
aut nihil, aut parum duntaxat serrata: cauliculos
autem multos habet, rotundos, striatos,
bicubitales, aut tricubitales: quibus inno-
scentur flores copiosissimi, purpurei, hyacinthi
Orientalis florum æmuli, densè compacti, ut spi-
cam, eamque magnam referre videantur: quibus

Yyy 3

HISTORIAE PLANTARVM.

succedunt semina minutissima : radice firmatur magna alba, in alas diffusa, eduli, sapore rapunculi radicem imitante. Tota planta lacte abundat.

Rapunculus quem Creticum ac in acetariis gratum dicit Imperatus, herba est Creta siue Candia propria dicta ibi *Pietra Marola*.

Rapunculi speciem à Nobilibus. Cortuso *Petra Marola* nomine accepit C. Bauhinus.

Vocatur vulgò *petra marola* hoc est, *Petra Lactuca*, licet [teste Hon. Bello in epist. ad Clus. ex Cydonia Creta] cum Lactucis nihil aliud commune habeat, quàm

quod lacte abundat. Et quia radix manducata, tum etiam caulis adhuc tener, Venerem stimulare vulgò dicitur, idèd nomine obscuro *petra marola* vocatur.

Rapunculi genus videtur Clusio.

Hanc exhibet Io. Pona in descriptione Baldi, nomine *Petromarula*, seu *Lactuce Petrae Cretice Belli*.

Cretica planta est, & nusquam alibi quod sciat Hon. Bellus, spontè prouenit, ea reperitur vbique in aruorum marginibus, secus vias lato solo, inter saxa & super parietes. Floret verdè & æstatis principio, Maioque & Iunio arescit tota, præter radicem, quæ Octobri folia proferre incipit, & virescit tota hyeme.

ERINVS DALECHAMPII.

Descriptio

Locus.




ERINON quod Dalechampius propè Lugdunum collegit in riuo subterfluente extremo suburbii versus pontus fornices, quo Rhodanus iungitur, radice est in multas fibras diuisa, caulis multis, palmatis, angulosis, furculosis, cum franguntur lacte manantibus, gustu valdè acerbis, canâ lanugine propè verticem obductis, foliis ocimi, minoribus tamen quam in primo genere, quod ocimum citratum Serapio vocat, in

ambitu minimè incisus, nec crepans, iuxta caulinum fastigia, *dracunculus* utitur inquit Dioscorides, in longum & angustum veluti fassis pendè instar Pinastris.

Quæ sit Erinus Dalechampii, vt verum cum Fratre C. Bauhino in phyt. p. 427. fatear, nondum mihi constet: hoc mihi valdè, quod Dalechampius flores & semina pingere curauit, nec descripserit: figura præterea non videtur respondere descriptioni, vnum enim habet caulem, cùm Dalechampius dicat multos habere. Sed & Fabio Columnâ teste, non est Erinus, quam postremò Dalech. hist. lib. 9. cap. 171. proponit, solus minimè incisus. Ac an rectè suprâ citata Dioscoridis verba verterit, & vera sit ab ipso depicta planta, quilibet ex supradictis indicabit.

DIGITALIS PURPUREA.

CAP. II.



SECVBI CUBI. Descriptio. Etos duos superat Digitalis purpurea, caule pollicem crasso, anguloso, hirsuto, subrubente, concauo, ex radice fibrosa, amara: flores in thyrsi longioris morem: frequentes ab vno caulis latere, penduli, breuibz hirsutis pediculis, quorum singulis est appositum foliolum acuminatum, calathi

aut digitalis factorii munimenti effigiatum, colore foris coccineo, excepta inferiore parte quæ propter nonnullam admistam albedinem carneo est, intus verdè similiter purpurea, inferiore parte (quæ & pilis longis obsita est) versicolore, albis maculis nigro guttatis: floris basi penitus adnascuntur stammina alba, aut purpurascens, contorta, quæ apices didymos croceos guttatos sustinent: stilius tenuis purpurascens ex hirsuti oblongique pericarpii mucrone protenditur, cui postea inclusum continetur semen minutum. Folia Verbasci opinionem rectè sustineant, oblonga, in acutum desinentia, hirsuta, in ambitu serrata, supernè atroviuentia, infernè incana.

Digitalis purpurea Anguill. Fuchsius, quem mi-Fuchsius tor non diligentius eam describere.

Hanc pulchrè describit Dodon. Gall. non tamen additâ figurâ dicens: hæc herba vocatur Digitalis, Campanula syluestris & Nola syluestris: est, vt quidam scribunt, species Verbasci, Græcis dicta *oxyris* & *apollis* cum qua magnâ habet similitudinem: de flor. autem, satis commodè depingit & describit, dicitque: Fuchsius appositè Latine Digitalem nuncupauit, descriptio autem Lychnitis non conuenit.

Digitalem flore luteo & purpureo vna figura [quæ ad luteam videtur pertinere] & descriptione Tragus comprehendit, non distinguens plantas nisi colore florum, ac ait. Quod ad caules & folia atinet, posset hæc planta Verbasci adungi:

ungi: At si vel florem vel eius facultates spectes, videtur sine ad Galiofin referenda, de qua Diosc. lib. 4. cap. 90. Nos Campanulam seu Nollam silv. nuncupamus.

An Ruell. lib. 3. hist. cap. 37. Baccharis herba, nostrates Officina non norunt, rura apud nos Diuz Mariz Chirothecas appellant.

C. Bauh. phyt. Digitalis 1. seu purpurea. Digitalis, inquit is, dicta à florum similitudine, qui digitale referunt: Sunt qui ad Verbascum, alii ad Alismatis alterum genus apud Plinium referunt.

Digitalis purpurea *Daxnzhins* Tabern. Germ. fingerkraut/ fingerhütt/ braun fingerkraut/ braun fingerhütt/ waldglöcklin & waldschell. B. Vinger hoet cruys. Gal. *Digitalis*, *digitier*, *ganas* *nosre Dame*. It. *gantelli*. Angl. *foxglove*. Hung. *Dy* *fiu* *gyzeu* *fiu*.

Digitalem purpuream habeo in Horto Exc. C. quam plantavi & seminavi, collectam propè Girarmegni vbi fodina argenti, copiose etiam reperi inter Masmunster & S. Thamarix in monte Roisberg, vbi etiam collegi semen, mense Octobri florebat adhuc sub arboribus, altitudinis hominis, ni etiam maior, cum foliis latis & valde hirsutis: non longè à Lutea provenit, & in montibus circa Thermas Plumbarias florens Iunio. Geneuz habebam in horto, Bizantii vidi in horto Domini Doctoris Chiffleti, Basilez in horto Domini Doctoris Felicis Plateri: Bononiz in horto S. Saluatoris al burgo di S. Catharina. Montbelgardi in Horto E. C. floret Iunio, Iulio, & Augusto, flore purpureo & pænè rubello. Semine maturo Iulio: prope Castellum Passauant Ludrensis ditionis. Flore albo in horto Montbelg.

~~~~~

#### DIGITALIS FLORE MAGNO CANDIDO

**B**icubitalis est planta, cui radix digiti crassitudine, alba: folia Digitalis purpurez, hirsuta: florum magnitudo par, sed color lacteus, inferna parte intrinsecus punctis fuscis aspersis.

Icon. Plant. p. 572. Digitalis alba. Teut. 674. Digitalem flore albo à se visam Basilez scribit Fr. Casparus Bauhinus: Eam ego cum pulchro magno flore purpurez similem habeo Montbelgardi in horto Ill. E. C. florentem Iunio & Iulio.

~~~~~

DIGITALIS LVTEA FLORE MAIORE, folio latiore.



Minor huic quam Purpurez magnitudo: nec dissimilis radix: caules angulosi, nonnihil hirsuti: folia angustiora, longa, infernè nervis hirsutis rugosa, supernè penitus glabra, attrouirentia, in ambitu crenata, sapore subamaro & acro: flores Digitalis purpurez pares, fors intusque hirsuti: sed colore, extrà quidem di-

luteo luteo, intus verò croco saturatione, languideque luteo versicolores.

Figuram Fuchsi Dodon. Gall. habet, non autem describit: sed tantum colore floris luteo distinguit à purpurea, licet foliis multum differat. Digitalis tertia eidem de flor.

An Digitalis lutea Anguill. Digitalis Fuchsi minor flore maiore, Gesner. hort. Digitalis maior flore grandiusculo pallido, Casalp. Digitalis lutea, Geelfingerhütt, Fuchsi. Thal. ac Tabern.

Casp. Bauh. phyt. Digitalis 2. siue lutea magno flore. Sunt qui Calathianam Violam apud Plin. lib. 21. cap. 6. censent. Hæc non solum floris colore à purpurea variat, sed & foliis, quæ in illa Verbasco similia, in hac verò ex viridi nigricantia, sed lanuginosa.

Digitalem luteam flore maiori luteo reperi copiose florentem Iunio inter Montbelgardum & Meruelze, eandem habeo in horto E. C. per me satam, vbi ex luteo pallido & albicante florens Iunio & Iulio: Bononiz in Italia vidi in horto S. Seruatoris al burgo di S. Catharina: Quam esse Geneuz reperi in monte Thuri mense Iunio cum suis magnis floribus, foliis latis & hirsutis: prope Castellum Passauant in Ludrensi ditione flore ex luteo albicante copiose florentem Iulio vidi.

DIGITALIS FERRUGINEA FOLIO angustiore.



Tres aut quatuor cubitos altus est caulis mediocriter crassus, teres, lavis, cuius scapus summus in alas aliquot scinditur: folia Digitalis sublatez angustifolia foliis proxima, longa, angusta, acuminata, attrouirentia, nerubla, aucta parte subhirsuta, leui crenarum vestigio per ambitum incisa, alternatim cauli adnascuntur: flores longa serie thyrsioidè dispositi, Digitalis purpurez, breviores, rigidiores, fors totè hirsuti, ferruginei, intus eodem colore saturatione & stris variegato picti, labro productiore villosa dependente, in medio rictu hiantè latentibus sub superioris folii margine apicibus luteis: insidet autem floris recurva basis calyci stellato quinque radius constante.

Digitalis piluiflora alias ferruginea, angustiore calathio, foliis attrouirentibus Lob. Obs. Digitalis ferruginea Ic. plant. p. 573. Teut. 675. C. Bauh. phyt. Digitalis 4. siue angustifolia flore ferrugineo.

Anno 1592. primùm à me visa Digitalis quam Ferrugineam existimo vocari: floruit pulchrè in horto Ill. E. C. per me plantata: missa autem fuit planta per Insignem Medicum D. Christopho-

Yyy 4

rum Schvartz ex horto Ill. Ducis Wirtembergici Principis mei, cui praeest, pulchra sanè planta quae floruit Iunio & Iulio.

Tragus cum Digitalis amara sit herba, facile colligi posse autumat, illam naturâ suâ calidam & siccam esse. Itaque usum illius extare posse in iis, quae ex calfactionem, extenuationem, absterfionem, & purgationem expostulant. Rucius asseueranter scribit, herbam hanc haud dubiè cum opus est extenuatione, absterfione, purgationis & obstructionis liberatione, efficacem admodum esse. Nam, ut testatur Galenus lib. 4. simpl. fac. cap. 17. amari sapores abstergunt, & expurgant, & quae in venis est, crassitiem inducunt: quomobrem menses etiam quae amara sunt mouere possunt, ut ex thorace & pulmone pus educere: potest ergo hæc herba ferè omnia quae Gentiana. Plurimi verò sit vulgatio illa & purpurea ad omnia vulnera sananda, inquit Aduersaria: de qua etiam in Obs. Lob. Somerseti Angliæ rustica turba huius decocto febricitantibus purgationes & interdum superpurgationes & vomitiones, humidioribus aluo, molitur.

DIGITALIS FLORE MINORE, SVBLV-
teo, angustiore folio.

Descriptio



tanquam thyrsus longa serie effigiantes, quam ortu diuerso, eodem tamen serè omnes vergunt, dimidio minores Digitalis purpureæ floribus, colore luteo in herbaceum languente, idque tam intus quam foris, labro intrinsecus villosa, quorum unicuique ad pediculum folium acuminatum penitus glabrum est appositum. Semen in oculis aliarum huius generis more.

Gesner. de col. stirp. Digitalis flore minore, albiore: Eidem hort. Digitalis maior flore maiore, cui fortè attribuendum nomen quod citat Spitzwünd fraus. Dodon. de flor. Digitalis quarta flore subluteo. Digitalis lutea, Aduers. C. Bauh. Digitalis seu lutea flore paruo. Duas Lobelius Icon. pingit. Hanc enim nostram minorem tam expressit, quæ ad bicubitalem altitudinem apud nos excreuit, folioque est longiore, & latiore, pallidiorèq; quam sit Digitalis lutea flore magno. Quam verò pingit oblongis angustisque foliis, necdum vidimus. Hæc censetur Damato-

nium Dioscoridis, & primum Plinii. Fistula pastoris Auicennæ.

In peregrinatione nostra Rhætica cum Gesnero Digitale cum floribus minoribus reperi, cui ascripti flores huic albos esse odoratos, folia satis solida, glabra, bicubitalem caulem & floruisse Iunio circa Walsart. Digitale hæc Genæ ex vicinis montibus in hortum transtuleram, virebat mense Ianuario, florebat Iunio. Basileæ quæ itur Moutets, in monte Moutets, & iuxta Basileam extra portam S. Albani, florens mense Iulio. Frater obseruauit etiam in monte Munchstein vicino. Montbelgardi quæ itur Dun, & eundo Abevillers. In monte Rosberg prope Malmünster inueni adhuc florentem Octobri, altitudinis trium circiter cubitorum, flores tamen minores multò quam in Lutea quæ minor, huic folia glabra. Montbelgardi in Horto Il. E. C. mense Iunio, & Iulio & Augusto, florent pulcherrimæ flores ex luteo serè albi.

Locus & tempus

IESMINVM MEXICANVM, SIVE FLOS
mexicanus multis.

CAP. III.



Asinum Mexicanum à natalibus dixerunt plantam radice nitentem, crassa, Madragoræ simili, cubitalem longitudinem læpè excedentem, paucis fibris donata, circulos Mechoacæ instar si transuersa secetur ostentante, foris nigra, intus alba, sapore primùm saturo, deinde nonnihil acro, & sauces verante: quæ

terram versus in cernicem pauldè mündè, rugosam desinens, caules deinceps plures producit proceros, quadrangulos, nitidos, nonnihil hirsutos, succulentos, qui in ramos diuiduntur, non illos quidem oppositos, sed æquè tuberoso ad ortum & veluti geniculato principio, mox alios aliosque eodem modo pariteros, caulis instar quadrangulos: folia ramorum origini subiecta aduersè parti ramo vacuè foliis respondent, foliis Solani Bellæ donæ similia, acutiora, aucta parte nonnihil candicantia, vtrinque glabra, sapore feruido & virente: flores Solis impatientes ex ramorum alis, eorumque fastigiis ex breuibas pediculis Conuoluuli maioris sed minores, indem ut illi integri, in calathum lutescens, plicas quinque habentes diffunduntur, sensuque in tubulum gracilescens, globulo paruo folliculis multifidis amplexo inseruntur, colorum festiua & hilari varietate ludentes, iam lutei, iam puniceï, alias puniceo luteoque confusis versicolore [quam varietatem in eadem planta est obseruare] libraturum curhis è tubulo prominentibus, odore.

odore non infuauit. Vnicuique flori succedit semen pulchrum magnum, Ciceris ferè, pentagonum, rugosum, nigrum medulla alba, quod relicto folliculo suo facile excidit.

Et licet nunc ad eò vulgaris sit notitia, vt nulla ferè sit opus acurationi descriptione, Clusi tamen Historiam, vt qui plura notatu digna obseruant assumere libuit. Primum igitur emergit Ocymi quod Cereale nonnulli cognominant, aut Circæ Lutetianæ ferè modo: deinde caulem promit cubitalem vel etiam interdum amplio-rem, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flauescens, frequenter vt Balsami- næ caulis geniculatum, & in multos ramos eod- demque similiter nodosos diuisum: qui ex ipsis prodeunt, non bini vtrinque, & ex aduerso op-positi, sed singulares duntaxat, alternatim modò in vnam, modò in alteram partem vergentes, & quem primum seruantur ordinem aut seriem, perpetuò ferè retinentes, hoc est, vt tertius, quin- tus, & septimus ramus in eandem partem spe-ctent in quam primus: quartus verò, sextus, & octauus [si modò tot primariis ramis planta sit prædita] eodem latere nascantur quo secundus: folia in singulorum ramorum nodis bina aduer- sis pediculis semper nascentia, Siliqua stri foliis parè similia, viridia, satis carnosæ, succulenta, cir- ca pediculum ampla, extremo mucronata, quæ trita, Siliqua stri grauem odorem, gustata verò, ingratum saporem, & tandem illius, vel foliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum refe- runt: flores in extremorum ramulorum alis sin- guli, longi, concaui, in quinque sinus, antequam aperiantur, complicati, explicati verò Tabaci flo-ribus non valde dissimiles, non tamen in mu- cronatos angulos, vt illi, desinentes, sed in obtu- sos, Conuoluuli florum instar, Tabaci etiam flo-ribus ampliores, elegantissimæ interdum purpu- ræ, siue Kermesino colore nitentes, nonnun- quam Lateritii, aliquando flauii, aut pallentes, in-terdum prorsus albi, vel exalbidi duntaxat, non- nunquam obsoletè rubentes aut flauescens, sæpi-ssimè binis coloribus simul elucescentibus, vel purpureo mediam floris partem occupante, aut radius modò purpureis alternatim totum di- stinguentibus, vel interdum magnis, nonnun- quam exiguis purpurascens maculis vario situ & mixtura per totum florem, vel flauescen-tem, pallescentemue, aut album, candicantem muc, vel obsoletum, aspersis, odoris satis suauis, & Narcissinum quidpiam referens, sex oblongis staminibus, stiloque paulò longiore è medio flo- re emergentibus: valde autem caduci sunt hi flo- res: nam cum noctu explicari incipiant postri- die sub horam octauam antemidianam [per- æstus præsertim sese contrahere incipiunt, florum conuoluuli modo: at temperatiorè aurâ, integro nonnunquam die expansi permanent, & sub noctem duntaxat contrahuntur: singulis tamen diebus alii recentes aperiantur, qui si integri quotidie decerpantur, & inter chartas reponan- tur [diu enim colorem retinent] atque deinde inter se conferantur, iisdem quidem coloribus constare deprehenduntur: ac eorundem situ & mixtione, inter se variare, quisquis diligenter obserauerit, animaduertet. Quæ sanè insignis va-rietates, quotquot hunc florem obseruant in summam admirationem, non immeritò rapere debet: etenim diutissimè viret, & à Iulio mense ad Octobrem vsque [nisi pruinæ interueniant] numerosâ florum sobole luxuriare solet: caliculi flores amplectentes, & in quinque mucronatas

lacinias sunt diuisi, virides & quasi membræ acci, in quibus vnicuique semen, nullâ membrana siue pericarpio inclusû, mucrone, cui flos insedit ob- tuso, infima verò, quâ caliculo adhæret, parte, tanquam exigua coronâ ornatum pentagonum ferè, bæcæ myrti propè magnitudine, inuitò vi- ride, maturitate sulcum, & quibusdam veluti tu- berculis oblitum, spontè, vel tenui vento, vel leuissimâ cômotione decidens, nucleûque conti- nēs album, qui tritus in candidissimam, & amyli instar niueam friabilemque puluim resoluunt: radix satis crassa & paucis radibus est, intus alba, foris nigra, aliquot fibris prædita, gustu nonnihil a-cri, cui admista sit superficialia quædam dulce- do. Eam licet annosam initio censeremus [nam singulis annis nobis erant ferenda, hyeme radi- cem in horto relictam corrumpente] viuacem tamen esse, ab optimo & peritissimo viro Seba- stiano V Volmaro Ill. D. V Virreimb. Pharmaco- pœo, & horti Medici tum temporis Præfecto, su- mus admoniti. Is enim cum sub Autumno exitum aliquot plantas eruiisset, & caule præciso, ex illis vnam, propter formæ elegantiam excicandam seruasset, initio autem Martii sequentis cuidam amico ostendere vellet, eam succulentam & qua- si reuirescentem deprehendens, terrâ in fictili obruit, & paucos post dies folia proferte cœpit, deinde circiter Cal. Iulii etiam flores. Cuius rei postea nos etiam aliquoties periculum fecimus, atque etiam alii nostro exemplo. Sed exigui mo- menti est compendium illud conseruandarum hyeme radicum: nam nouo Vere terræ commi- sz, forsitan flores proferent quindecim diebus antè quàm illæ plantæ, quæ semine terræ eodem tempore credito, sur t nax. Aliud autem genus habuimus, quod licet à superiore, caulis magni- tudine & crassitudine, ramorûque situ & folio- rum formâ non differret, color tamen stolonis & florum dissimilis est: nam dum primum terrâ emergit, caliculi foliorûque pediculi, vt Betæ rubræ iam recens nascentis, purpurascunt, ma- nentque is color in adultæ etiam caule & ramis: flores verò rubente niuidissimæque purpurâ in- festi videntur, sex etiam tenuia stamina longio- rêmque stilum continentes, eiusdem cum supe- riore odoris. Hi verò non mutantur, sed vniùs perpetuò sunt coloris, & quem primi habuerunt, reliqui deinceps retinent: semina in caliculis singularia, superioribus respondentia: radix non dissimilis. Hoc genus è superioris semine, cui ru- bri flores insederant, originem trahere non est dubium, quia proximo anno & aliis subsequen- tibus, vtrinque generis semina leorsim terræ ma- dauimus, vt diligentius istam varietatem & colorum distinctionem obseruare possemus, & competimus ex rubri floris semine nullas alias stirpes prognatas, quàm eas, quæ rubros flores darent. Idem periculum fecimus de granis flauo flore genitis, è quibus provenire obseruauimus, quæ nullos alios flores darent, quàm flauos. Si- mile etiam de alborum florum semine factum periculum, ex quo natæ plantæ, albos quidem i- nitio flores dederunt: sed qui sub Autumnum primum explicabantur duorum colorum enade- bant, commixtis in eodem flore albo & purpu- reo, minus tamen quàm in versicolore primum descripta. Illud præterea obseruabam in ista di- stincta satione, ex solis plantis rubræ se nine na- tis, statim ab exortu initio agnosci posse, quos flores sine daturæ: ex versicolorum autem, flauorum, & alborum semine prouenientibus, nul- lum certum indicium, si mixtæ sint satz, summi

Admirabilis
est rubi
flore

Admirabilis
est floris

Admirabilis
est floris

rum Schwartzi ex horto Ill. Ducis Wirtembergici Principis mei, cui præest, pulchra sanè planta quæ floruit Iunio & Iulio.

Tragus cum Digitalis amara sit herba, facile colligi posse autumat, illam naturâ suâ calidam & siccam esse. Itaque usum illius extare posse in iis, quæ excastrationem, extenuationem, abster-sionem, & purgationem expostulant. Ruchius af-fecerant scribit, herbam hanc haud dubiè cum opus est extenuatione, abster-sione, purgationis & obstructionis liberatione, efficacem admodum esse. Nam, ut testatur Galenus lib. 4. simpl. fac. cap. 17. amari lapores abster-gunt, & expurgant, & quæ in venis est, crassitiem inci-dunt: quamobrem menses etiam quæ amara sunt mouere possunt, ut ex thorace & pulmone pus educere: potest ergo hæc herba ferè omnia quæ Gentiana. Plurimi verò sit vulgarior illa & purpurea ad omnia vulnera sananda, inquit Aduersaria: de qua etiam in Obs. Lob. Somer-seti Angliæ rustica turba huius decocto febrici-tantibus purgationes & interdum superpurga-tiones & vomitiones, humidioribus aluo, moli-tur.

**DIGITALIS FLORE MINORE, SVBLV-
teo, angustiore folio.**

Descriptio



Dvorum cubitorum altitudinem æquat vel etiam superat, caule digitali, ramo-so, laui, ex ra-dice pollicari e-micante: cui alternatim ad-nascuntur folia spithamam lō-ga aut breuio-ra, duas aut tres uncias la-ta, acuminata, in ambitu cre-nata, supernè glabra, atrouir-entia, infornè herbida, sub-hirsuta: flores

tanquam thyrsus longa serie effigiantes, quan-quam ortu diuerso, eodem tamen ferè omnes vergunt, dimidio minores Digitalis purpureæ floribus, colore luteo in herbaceum languente, idque tam intus quàm foris, labro intussecus villosa, quorum unicuique ad pediculum folium acuminatum penitus glabrum est apposi-tum. Semen in loculis aliarum huius generis mo-re.

Gesner. de col. stirp. Digitalis flore minore, al-biore: Eadem hort. Digitalis maior flore maiore, cui fortè attribuendum nomen quod citat Epiz-mund frasis. Dodon. de flor. Digitalis quarta flore subluteo. Digitalis lutea, Aduers. C. Bauh. Digitalis seu lutea flore paruo. Duas Lobelius Icon. pingit. Hanc enim nostram minore ramo expressit, quæ ad bicubitalem altitudinem apud nos excrescit, folioque est longiore, & latiore, pallidiorèq; quàm sit Digitalis Luteæ flore ma-gno. Quam verò pingit oblongis angustisque fo-liis, necdum vidimus. Hæc censetur Damaso-

nium Dioscoridis, & primum Plinii. Fistula pasto-ris Auicennæ.

In peregrinatione nostra Rhætica cum Ges-nero Digitalem cum floribus minoribus repen-ti, cui ascripti flores huic albos esse odoratos, folia satis solida, glabra, bicubitalem caulem & flo-ruisse Iunio circa Walsstätt. Digitalem hæc Gene-ux ex vicinis montibus in hortum transtuleram, virebat mense Ianuario, florebat Iunio. Basileæ quæ itur Moutets, in monte Moutets, & iuxta Basileam extra portam S. Albani, florens mense Iulio. Frater obseruauit etiam in monte Munch-stein vicino. Montbelgardi quæ itur Dum, & eun-do Abevillers. In monte Rosberg prope Mal-munster inueni adhuc florentem Octobri, alti-tudinis trium circiter cubitorum, flores tamen minores multò quàm in Lutea quæ minor, huic folia glabra, Montbelgardi in Horto H.E.C. men-se Iunio, & Iulio & Augusto, florent pulcherrimè flores ex luteo ferè albi.

**IESMINVM MEXICANVM, SIVE FLOS
mexicanus multis.**

CAP. III.



Jasminū Me-xicanum a natalibus dixe-runt plantam radice nitentem, crassa, Mi-drageæ simili, cubitalem lon-gitudinem læpè excedentem, paucis fibris donata, circulos Mechoacæ instar si tran-uerla secetur o-stentante, foris nigra, intus al-ba, sapore pri-mum saturo, de-inde nonnihil acri, & sauces vexante: quæ

terram versus in cernicem pauldè minorè, rugo-sam desinens, caules deinceps plures producit proceros, quadrangulos, nitidos, nonnihil hirsu-tos, succulentos, qui in ramos diuiduntur, non illos quidem oppositos, sed æquè tuberoso ad ortum & veluti geniculato principio, mox alios aliosque eodem modo pariteros, caulis instar quadrangulos: folia ramorum origini subiecta aduersæ parti ramo vacuæ foliis respondent, foliis Solani Bellæ donæ similia, acutiora, auerla par-te nonnihil candicante, utrinque glabra, lapore feruido & virente: flores Solis impatientes ex ra-morum alis, eorumque fastigijs ex breuibas pe-diculis Conuoluuli maioris sed minores, iudem ut illi integri, in calathum luteum, plicas quinque habentes diffunduntur, sensuque in tubulum gracilescens, globulo paruo folliculis multifidis amplexo inseruntur, colorum festiua & hilaris varietate ludentes, iam lutei, iam puniceæ, alias puniceo luteoque confusis versicolor-es [quam varietatem in eadem plagâ est obser-uare] fibrarum circibus & tubulo prominentibus odorato.

odore non insuauis. Vniuenique non succedit semen pulchrum magnum, Ciceris ferè, pentagonum, rugosum, nigrum medullà alba, quod relicto folliculo suo faciliè excidit.

Et licet nunc adedè vulgaris sit notitià, vt nulla ferè sit opus acuratori descriptione, Clusi tamen Historiam, vt qui plura notatu digna obseruari assumeret libuit. Primum igitur emergit Ocymi quod Cereale nonnulli cognominant, aut Circæ Lutetianæ ferè modo: deinde caulem promit cubitalem vel etiam interdum amplio-rem, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flauescens, frequenter vt Balsami- næ caulis geniculatum, & in multos ramos eod- demque similiter nodosos diuisum: qui ex ipsis prodeunt, non bini utrinque, & ex aduerso op-positi, sed singulares duntaxat, alternatim modò in vnam, modò in alteram partem vergentes, & quem primum seruarunt ordinem aut seriem, perpetuò ferè retinentes, hoc est, vt tertius, quin- tus, & septimus ramus in eandem partem spe- ciant in quam primus: quartus verò, sextus, & octauus [si modò tot primariis ramis planta sit prædita] eodem latere nascantur quo secundus: folia in singulorum ramorum nodis bina aduer- sis pediculis semper nascentia, Siliquastris foliis præne similia, viridia, satis carnosà, succulenta, cir- ca pediculum ampla, extremo mucronata, quæ trita, Siliquastris grauem odorem, gustata verò, ingratum saporem, & tandem illius, vel foliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum refe- runt: flores in extremorum ramulorum alis sin- guli, longi, concaui, in quinque sinus, antequam aperiantur, complicati, explicati verò Tabaci flo- ribus non valde dissimiles, non tamen in mu- cronatos angulos, vt illi, desinentes, sed in obtu- sos, Conuoluuli florum instar, Tabaci etiam flo- ribus ampliores, elegantissimè interdum purpu- ræ, siue Kermesino colore nitentes, nonnun- quam Lateritii, aliquando flauæ, aut pallentes, in- terdum prorsus albi, vel exalbidi duntaxat, non- nunquam obsoletè rubentes aut flauescens, sæpius- bimè binis coloribus simul elucescentibus, vel purpureo mediam floris partem occupante, aut radius modò purpureis alternatim totum di- stinguentibus, vel interdum magnis, nonnun- quam exiguis purpurascens maculis vario situ & mixtura per totum florem, vel flauescen- tem, pallescentemue, aut album, candicantemue, vel obsoletum, aspersis, odoris satis suauis, & Narcissinum quidpiam referentis, sex oblongis staminibus, stiloque paulò longiore è medio flo- re emergentibus: valde autem caduci sunt hi flo- res: nam cum noctu explicari incipiant postri- die sub horam octauam antemidianam [per- æstus præsertim se contrahere incipiunt, florum conuoluuli modo: ac temperatiorè aurà, integro nonnunquam die expansi permanent, & sub noctem duntaxat contrahuntur: singulis tamen diebus alii recentes aperiantur, qui si integri quotidie decerpantur, & inter chartas reponan- tur [diu enim colorem retinent] atque deinde inter se conferantur, iisdem quidem coloribus constare deprehenduntur: ac eorundem situ & mixtione, inter se variare, quisquis diligenter obseruauerit, animaduertet. Quæ sanè insignis va- rietates, quotquot hunc florem obseruant in summam admirationem, non immeritò rapere debet: etenim diutissimè vires, & à Iulio mense ad Octobrem vsque [nisi pruinæ interueniant] numerosà florum sobole luxuriare solet: caliculi flores amplectentes, & in quinque mucronatas

lacinias sunt diuisi, virides & quasi membranacei, in quibus vnicum semen, nullà membrana siue pericarpio inclusū, mucrone, cui flos insedit ob- tuso, infima verò, quæ caliculo adhæret, parte, tanquam exigua coronà ornatum pentagonum ferè, hæcæ myrti propè magnitudine, initio vi- ride, maturitate fuscum, & quibuldam veluti tu- berculis obsitum, spontè, vel tenui vento, vel leuissimà cōmotione decedens, nucleūque conti- nēs album, qui tritus in candidissimam, & amyli instar niveam friabilemque pulpam resolutus, radix satis crassa & paucis dicitur, intus alba, foris nigra, aliquot fibris prædita, gustu nonnihil aci- cri, cui admista sit superficialia quædam dulce- do. Eam licet annosam initio censeremus [nam singulis annis nobis erant ferenda, hyeme radi- cem in horto relictam corrumpente] viuacem tamen esse, ab optimo & peritissimo viro Seba- stiano V Volmaro Ill. D. V Virtemb. Pharmaco- pœo, & horti Medici tum temporis Præfecto, su- mus admoniti. Is enim cum sub Autumni exitum aliquot plantas eruiisset, & caule præciso, ex illis vnam, propter formæ elegantiam exiccandam seruasset, initio autem Martii sequentis cuidam amico ostendere vellet, eam succulentam & qua- si reuirescentem deprehendens, terrâ in fidili obruit, & paucos post dies folia proferre cepit, deinde circiter Cal. Iulii etiam flores. Cuius rei postea nos etiam aliquoties periculum fecimus, atque etiam alii nostro exemplo. Sed exigui mo- menti est compendium illud conseruandarum hyeme radicum: nam nouo Vere terræ commis- sa, forsitan flores proferent quindecim diebus antè quàm illæ plantæ, quæ semine terræ eodem tempore credito, suæ nati. Aliud autem genus habuimus, quod licet à superiore, caulibus magni- tudine & crassitudine, ramorumque situ & folio- rum formâ non differret, color tamen stolonis & florum dissimilis est: nam dum primum terrâ emergit, cauliculi foliorumque pediculi, vti Betæ rubræ iam recens nascentis, purpurascunt, ma- nentque is color in adultæ etiam caule & ramis: flores verò rubente nudissimæque purpuræ in- secti videntur, sex etiam tenuia stamina longio- remque stilum continentes, eiusdem cum supe- riore odoris. Hi verò non mutantur, sed vniùs perpetuò sunt coloris, & quem primi habuerunt, reliqui deinceps retinent: semina in caliculis singularia, superioribus respondentia: radix non dissimilis. Hoc genus è superioris semine, cui ru- bri flores insederant, originem trahere non est dubium, qui proximo anno & aliis subsequen- tibus, vtriusque generis semina seorsim terræ ma- dauimus, vt diligentius istam varietatem & colorum distinctionem obseruare possemus, & competimus ex rubri floris semine nullas alias stirpes prognatas, quàm eas, quæ rubros flores darent. Idem periculum fecimus de granis flauo flore genitis, è quibus provenire obseruauimus, quæ nullos alios flores darent, quàm flauos. Si- mile etiam de alborum florum semine factum periculum, ex quo nati plantæ, albos quidem in- initio flores dederunt: sed qui sub Autumnum primum explicabantur duorum colorum euade- bant, commixtis in eodem flore albo & purpu- reo, minùs tamen quàm in versicolore primùm descripta. Illud præterea obseruabam in ista di- stincta satione, ex solis plantis rubræ se mine na- tis, statim ab exortus initio agnosci posse, quos flores sint daturæ: ex versicolorum autem, fla- uorum, & alborum semine prouenientibus, nul- lum certum indicium, si mixtæ sint satæ, summi

Admiranda
sunt rubri
flores

Admiranda
sunt flauo
flores

Admiranda
sunt albi
flores

giora ac latiora in quibusdam speciebus, in quibusdam etiam breviora ac angustiora. Hincque eas rapunculos *rapunculus* appellat. Harum aliquot species facile admodum industriore herbarum per scrutatori patebunt. Ego vero recensito hic tot, quot illo in genere haecenus per Hartyam nostram mihi observare licuit. Rapunculus ergo Campanulatus Nerisfolius *primus* caulem habet sesquipedalem, teretem, parum striatum, inter folia adnata quodam seu brachio. la explicatum: *folia* autem Nerii quincunciali longitudine, vncialique ferme latitudine: *fl. r. v.* Campanulatum, caeruleum, in ambitu orificii parum dissectum. Secundus folia obtinet priorum crebriora, pauloque angustiora, longioraque multo, ut potest dodrantalia: caulem item crassiorum: florem priorum maiorem. Tertius &iple quoque folia exhibet angustiora, secundo tamen breviora: flores vero ampliores maioresque, Cymbali alicuius patentioris in modum, in extremis oris diuisos. Quartus caulibus brevioribus, foliis item minoribus, quorum ea quae radici propinquiora sunt, vnciarum ferme trium sunt longitudinis, dimidia autem latitudinis: quae vero per reliquum caulis conspiciuntur, his breviora sunt: floribus est autem admodum patentibus repandisque, sed tertii minoribus. Quintus caulis est pedalis, paulove procerior, asper, non admodum foliolosus: folia vero sunt nigriora, vncias quatuor, aut quinque longa, vnam vero penè lata: flores cymbalares, minores, aperti, ventis tamen eius non in rotundam cauitatem expanso, ut in illarum specierum floribus, quas iam recensui, videre est, sed plicato. Sextus Rapunculus Campanulatus aut Nerisfolius minor, caules erigit pedales, angulosos, scabros: folia eius, ea videlicet, quae radici proxima sunt, vnciarum quatuor longitudinem assequuntur, vnius vero latitudinem: reliqua quae cauli appenduntur, triuncialia sunt, & breviora etiam: caules huic speciei in summo in brachiola diuiduntur crebriora, tenuiora, flores exhibentia Campanulatos, caeruleos, plicatos, in ambitu ad orificium diuisos.

Schvv. Campanula angustifolia caerulea maior Matth. *et* *triv.* Diosc. Lob. Campanula Persici folia nostras Waldglöcklein / wald Cymbeln / Teubeg'ocken, Grosse Schellen. Campanula minor angustifolia flore albo, weisse waldglöcklein. Item Rapunculus *rapunculus* aut Campanulatus. Thal. wald rapungel / wald Glocken. Minor non annotasse Schvv. quem Nerisfolium Thalii ex iam recensitis intelligat.

Locus & Tempus

Campanula angustifolia flore caeruleo & albo copiose prouenit in horto Ill. E. C. flore caeruleo inueni sponte florentem Iunio in Alsatia inter Sultz & Zenne Vrbes, alibi praeterea flore modò caeruleo, modò albicante variis in locis inter dumeta inueni. Geneux cum essem abundanter vidi circa Montem Salcuz, & virentem ibi principid Februarii inueni, prouenit etiam copiose non longè à Geneua in colle *la Bastie*. Campanula angustifolia maior Schvv. in collibus apricis & frutetis Iunio & Iulio floret, vltus neglecti.

Vires & vltus

Horti voluptatis causa habent, tametsi in opere mandiqueat, Lobelius.

VIOLA MARIANA DODONÆI, QUIBUSDAM Medium.

Descriptio

*R*adix vesca, dulcis, alba, longa, crassa: quae caulem emittit plusquam bicubitalem, tere-

tem, hirsutum, asperum, in ramos diuisum: *folia* Trachelis siue Campanulae maioris, angustiora,



longiora, hirsuta, crenata, & modicè per margines crispata: *flores* ramulorum extremitatibus insident, calathis seu Campanulae formae, maiores quàm Trachelis, venticiosi, oris in quinque lacinas diuisis, colore caeruleo seu violaceo, purpureo aut albicante, in quorum medio *filamina* latent lutea stilisque erectior, luteo puluisculo respersus: insidet autem totus flos *calathulo* crebris chorulis hirsutis inaequali, in quinque acuminatis foliis floris latibus appressa dissecto. Semen exiguum, spadicum.

Rapunculi *Diosc. lob.* alterum genus grandius *Diosc. Medio* vocat: apud

quem autore Celsalpino, legendum Seridi [folia limilia] ut legit Orbazus [ac etiam Ruell. & Marcell. & Matthiol.] non Indi, ut vulgati Codices habent.

Cels. Rapi sylvestris genus maximum, quod aliqui Medion vocant.

Tabern. Hist. & Icon. Weiss Marien glöcklein, Viola Mariana alba: & Braun Marien glöcklein, Viola Mariana purpurea: Medium, Germ. Glockenhäut.

C. Bauh. Campanula 17. Viola Mariana. Sunt qui Rapum silu. Diosc. alii eiusdem [Dodonzus] Raphanum silu. alii Medion Diosc. sed male, autumant. Variat flore nunc purpureo, caeruleo: nunc suballido aut lacteo: Reperitur quoque flore pleno.

Gerard. Viola mariana, Mercuries violets Couentrie Rapes / Marierres blanc & white Couentrie bels, & Viola Mariana flore albo. Rapum silu. Graecis *ραπυνη* *ερα*

Violam Marianam Recentiorum plerique Medion esse volunt, quamuis Viola Mariana, Dod. teste, non admodum respondeat Medio à Diosc. descripto. Quare non Medium, sed potius verum Dioscoridis Rapum silu. videtur (*ραπυνη ερα* *Rapum silu.* quae Graecis dicitur) cum eius descriptione magis

conuenit. Cuius tamen descriptio superfluum quorundam accessione corrupta.

Violæ Marianæ varietates tradit Clusius. Violæ Marianæ quibusdam Medium creditur, ut plurimum quidem Violacei coloris flores gestant: sed tamen etiam albos, interdum exalbidos, nonnunquam cineracei coloris, atque etiam versicoloris, hoc est, ex albo & violaceo, vel maculatum vel radiatum commixtos.

Locus
caput.

Violam Marianam Dodon. siue Medium quorundam habui Genevæ in horto, Basileæ vidi in horto D. Felicis Plateri: Patavii in horto D. Cortusii, Iannuario. is vocabat Medium: Bononiæ in horto di S. Saluador, alburgo di S. Catharina: Montbelgardi ex semine mihi feliciter preuenit in Horto E. C. flore penè candido & purpureo copiosius: primo anno non fert caules, ubi autem semina caules tulit perit & semine deciduo se propagat. Nascitur, ut aiunt, in siluis & montibus, nec non in opacis quibusdam tractibus ut Matth. refert, plerisque Italix ac Germaniæ locis: apud Belgas in hortis colligitur. Iunio, Iulio & Augusto mensibus floris eius productio: semen interea ad maturitatem peruenit, neque enim simul sed particulatim floret.

Vita.

Ceterum, quod ad facultates attinet, si Dodonæo credimus, radix Violæ Marianæ refrigerantis & nonnihil adstringentis est potentia: ceterum, ut aliorum sylvestrium Raporum, apta est, & non incommodè acetariis additur.

MEDIUM DIOSC. RAVVOLF.

Descriptio



Inter frutes in alium exurgit. Violæ Marianæ Dodon. per similes est planta, nec ita obuia cuius differentia apparet, præterquam in foliis, quæ in hac diuisa magis, Cichorii instar. Flores etiā magis panduntur, octo foliolis in orbem dispositis constantes: radicis austeritas maior quā capitulorum seminum, quæ ta-

men nondum erant matura: Rauwolf.

Rauwolf. Medium verum Diosc. & Mindium Rhazis, cuius icon apud Rauwolf. par. 4. No. 284. Medium Diosc. vel Mindium Rhazis foliis Plantaginis minoris, Hist. Lugd. Quæ malè conuerit Wegwart vocabulum Germ. Plantaginem, cum sit Cichorium.

C. Bauh. Phyt. Campanula 18. Viola Mariana laciniatis foliis, peregrina.

In profunda tenebrosa & aspera valle Libani: Rauwolf.

CAMPANULA MAIOR ET ASPERIOR
folio Vrticæ.



Medium ad Violam seu Medium quibusdam dictum accedit: radix alba, Rapunculi, sapore non minus grato, caules cubitales & altiores, hirsuti in quibus alternatim nascuntur folia Vrticæ, pilosa, acutiora: flores ex foliorum alis cærulei, violacei, aut albi, nolæ similes, Marianæ Violæ, sed minores, calycē

paruo, nec ut in illa torulis cannulato, in laciniis quinque, sicut & flores, diuiso: stilus triceps, colore purpurascens, albedo, vel herbaceo, lutescior, staminibus circumstipatur luteolis.

Fuch. Campanula, Germ. Halskraut, hoc est, Ceruicaria. Gall. Gants nostre Dame, ou Gantrelle.

Dodon. de flor. Rapum sylvestre 2. Belgis Halscruyt. Ceruicaria maior, Græcè γαργαλιάρη, plerisque Vuularia. In Hist. Gall. Ceruicaria. Item Lat. in fol. Ceruicaria maior, cuius flores aut colore candidi, aut dilutè purpurei, vel ad cæruleum inclinantes. Huius species quedam est foliis aliquantò laxioribus: floribus elegantioribus coloris purpureo cærulei, cuius radix aliquot annis viuax restat, & Vere regerminat.

Clus. in Pann. & Hist. post. Trachelium foliis vrticæ, & Trachelium aut Campanula vulgò dicta. Campanula quibusdam herbaniis vocata Archangelica.

Lobel. & Penz γαργαλιάρη, siue Ceruicaria & Vuularia, Belg. & Germ. Halskraut. Trachelium siue Ceruicaria: Vuularia Tragi & Herbariorum. Campanula Fuchsi & Archangelica quorundam. Trachelii varietates. Passim istud etiam asperis, saxosis Angliæ & Gallobelgiæ siluosis fructuat: sed strigosius, hilari minus & ameno aspectu, alioqui per simile & congener.

Thal. Hæc. Ceruicaria maxima, foliis vrticæ maioris, caule sæpè incubitali, floribus magnis cæruleis, quandoque etiam albis.

Tab. Hist. lib. 2. & Icon. p. 412. 413. & 414. Ceruicaria, Vuularia, Campanula maior 1. Halskraut. Maior 2. Groß Halskraut. Terna alba, Klein Halskraut. Ponit Taberna quidem isotes: sed discrimen non tradit.

C. Bauh. phyt. Campanula n. folio Vrticæ. Variat flore candido, dilutè purpureo, vel ad cæruleum inclinante. Reperitur & strigosior. Campanula 12. foliis Vrticæ, sed laxioribus, Dodon. Ceruicaria maior altera.

Gerard. Angl. Trachelium 1. maius. cantabularie belg. Trachelium 2. maius albo flore. Trachelium 3. maius Belgarum Lobelii, dūrdy Troet voort [Tab. Ceruicaria 4. alba.] Trachelium 4. minus Small canterburie belg. Tabern. Ceruicaria 3. alba.

An Gælnet. hort. Rapi sylvestris genus mas

Ceruicaria
alia species

Tab. Hist.

Hist. Lugd.

fibrata, gusto dulci, suavi: *caules* cubicum vnum aut alterum alti, brachiati, subrubentes, fere glabri in quibus *folia* alternata, serrata, minumum hirsuta, nec aspera, vt Campanulæ iam dictæ, & angustiora, quæ in caulibus quidem carent pe-



diculis, ac inferiora, vt latiora sunt ita longis pediculis sunt appressa: ex foliorum alis Campanulæ singulares prodeunt, violaceæ, magnitudine & forma Rapunculi saui, apicibus chloris, stilo triplici, calyculis in quinque laciniis, quot scilicet sunt floris laciniis, diuiso, Floris verd se-
ctæ laciniis pi-

lofæ conspiciuntur. Nondum expansus flos pentagonus est, interque angulos pulchrè carinatus. Figura quæ Fuchsiana est, nec prima folia habet. nec in cæteris nimis affabrè picta. Tolerabilis ta-

Rapum mi-
nor.

Gesner. de coll. stirp. Rapum minus suis radiculis serpens.

Rapum.

Dodon. de flor. & in fol. Rapi quartum genus.

Clus. in Pann. & hist. post. Trachelium aliud mollioribus foliis, radice mitè serpente, cuius rei causâ rei herbariz studiosis est exosa.

Tempus &
locus.

Montbelgardi in Horto Il. E. C. prouenit mihi Campanulæ genus, radice reptante, quæ ita replet areas vt vix eradicari possit: eandem vidi in horto Di. Daucurtii in Audincourt, & aliis pagis vt Ran. Floret Augusto, Septembri & Octobri.

Tempus &
virtus.

Basileæ copiosè prouenire obseruauit Frater.

Similes facultates ac temperamentum huic Dodon. tribuit quod tribuebat Campanulæ Fuchsii, dicens, refrigerantis potentia & nonnihil adstringentis, ac radices edi posse in acetatis.

CAMPANVLA SIVE CERVICARIA MEDIA THALIO FLORIBVS CARULEIS PARUIS.

Descriptio

Cervicaria Media Thalii, locis montanis & Solimeridiano expositis nonnunquâ prodit, caule tereti, aspero, foliis plurimis amictis, minoribus multò, viridioribus superiùs, inferiùs candidis, lanugine vestitis, quali folia Althææ, sicut & folia mediam figuram inter Vrticæ maioris breuiora folia & althææ referunt. Caulis vt plurimum vnicus est sine ramosis adnatis, saepenumero tamen in plures diuiditur brachiatas virgulas. Circa medium fere caulis vbi maiora folia exoriri desinunt, frequentes *cauliculi* adnascuntur, ordine per certa intervalla vsque in apicem caulis consequenter, ac ex alis peculiaribus ad latera erumpentes, tenuibus quibusdam foliis iisque incispatis parum ac agminatim den-
seque sibi coherentibus constitutæ, ex quibus longa serie in scape flores crebri prodeunt ele-

Tom. II

gantet carulei, similes prioribus, sed multò maiores.

CAMPANVLA PVLCHRA à Tossano Carolo missa.



H Vitis *ra-*
dis. Non altè quidem vt illa demittitur, sed innumeris tamen fibris latè exspitem occupat, candidatibus, lactifluis, dulcibus, *caules* coplures duorum aut trium cubitorum altitudine concaui sunt, minimi digiti crassitudine, striati, minimùm hirsuti: *folia* Vrticæ, Campanulæ maioris quidem formâ, hirsuta,

Descriptio

palmarum & sesquipalmarum longitudine, latitudine palmari, in ambitu serrata, alternatim ex certis intervallis cauli apponuntur: ex quorum alis singulis singuli *fiores*, parum sursum vergentes, & partim deorsum inclinantes ex breui pediculo purpurascens, albidum caruleo, calathi effigie. siue Campanulæ, in quinque laciniis longas acutas partiti, foris glabri, intus hirsuti, oriuntur: *apicibus* totidem luteis, stilo dilutior qui in suprema parte in tres partes finditur, quæ circumflectuntur: Calix quinque cuspides longos habet: flore marcescente succedit magnum *capitulum* Mespilo simile, deorsum inclinatum, in quo *semen*. Folia inferiora erant in iconè nostra pingenda latiora.

C. Bauh. Phyt. Campanula 10. siue foliis Vrticæ latissimis, quam in horto Ill. Ducis Vvirtemb. Montbelg. collegit. Clusius hist. post. & Lobel. Obs. & Icon. plant. tom. 2. hanc videntur exprimere nomine Trachelii maioris Belgarum.

Tossanus Carolus Pharmacop. Stirpium studiosissimus pulchram hanc Campanulam ex Burgundia misit: quæ quotannis Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret Iunio & Iulio.

Locis &
Tempus

TRACHELIUM CANDIDUM ANGLICVM MAIUS, FOLIIS FERE DIGITALIS VEL CAMPANULÆ.

S Emine venustæ & rarissimæ plantæ ad Lobelium misit D. Thomas Pennæus Medicus Londinensis: ex boreali Angliæ tractu delata, vbi copiosa & nusquam alibi, vel à quouquam obseruata. Tota facie Cervicariæ maioris iam descriptæ absimilis, sed folia fere digitalis: Flores item Trachelii vel Violæ Marianæ, candidissimi & maiores & longiores. Caulis binum & ternum cubitorum surrectus. Radix fibrata, crassiuscula, lactescens, variè diuaticatur. *semen* Trachelii, sed maius.

Lobel. Obs. Anglicum Septentrionale maius Trachelium candidum.

177



Gerard. Hist. Angl. p. 365. Trachelium Giganteum Anglis Giant Throatwort.

Campanulam maiorem siue maximam, teste

Dodonzo, sūt qui Columnarem & quidem Plinius iudicent, cū tamen herbae Columnaris nomen apud hunc non reperitur, Alii Anthemum eiusdem faciūt: sed legendum lib. 26. cap. 8. E. anthemum, quod Anthemidis species est multū à Campanulis differens.

Camer. hort. Campana pyramidalis siue lactescens



PYRAMIDALIS VALERANDI HIRSVTA

Descriptio



PRIMO anno mihi caulem non produxit, qui sequente demum anno in tantam excreuit altitudinem, ut facili lanceam aquaret, hirsutus, medulla alba factus, foliis vestitus inferne & superne hirsutis, acuminatis, serratisque, Campanulae Fuchsi accedentibus: flores longa serie, Campanulas imitati, Rapunculi vulgati haud maiores,

cœrulei, per oras laciniati, ex vno pedicelo plures.

Locus

Pyramidalis

Quum Lugduni Medicum agerem prouenit mihi in horto meo, ex semine per Valerandum Dourez affinem ex Sclauonia delato, ipse Pyramidalem nominabat.

PYRAMIDALIS LEVIS.

Descriptio

LACTE turgēt radix, Rapunculi similis, restibili fertilitate, se multiplicans, etiam ex frustulo repullulascens: ex qua caules trium quatuorve cubitorum surgunt, leues: foliis vestiti glabris, oblongis, fortuitis crenis incis, verum inferiora folia palmum aut sesquipalmum longa, palmo latiora, per extremum serē obtusa, & ita quoque glabra, raris admodum cœsuris dissecta, & vix dum serrata: flores à medio caule ad summum vsque fastigium cœrulei campanulas oris laciniatis exprimunt.

Videtur nobis Hist. Lugd. Pyramidalis nostræ levis duplicem & descriptionem & iconem proponere. Ac primam quidem pag. 642. sub hoc titulo: Pyramidalis Rapunculi genus Dalech. Alteram, p. 817. quam Campanulam lactescentem maiorem Lobeliū, seu Pyramidalem Lutetianam inscribit.

ixhu, prae reliquis plurimo lacte scatens.

Lob. Obs. Lactescens Campanula maior. Pyramidalis Lutetiana. Icon Plant. pag. 497. Teut. 402. Tabern. hist. & Icon. Campanula Lactaria siue lactescens Michxg. & Flein.

Gerard. Campanula lactescens pyramidalis Steeple milke Eolflower.

C. Bauh. phyt. Campanula lactescens.

Pyramidalis nomine ante plures annos, herbam vidi Basileæ in horto Domini Doct. Zwingkii, unde semen habui, quod satum Montbelg. in horto Ill. E. C. prouenit, & sequenti anno semen tulit, hæc autem Pyramidalis differt à Valerandi Dourez Pyramidali, hanc enim ad tantam altitudinem prouenientem non vidi, præterea folia differunt, in hac glabra, in alia hirsuta, quæ etiam in hac non ita serrata: radices ut Rapunculis, quæ facili se multiplicant.

RAPUNCVLVS MONTANVS, SIVE

Trachelium montanum.



Folia multa propter terram in quibusdam duabus vaciis longiora, in aliis quadruplo ad Eschium accedentibus, ex angusto principio sensim lactescencia, sensimque deinceps in acumen desinentia, utrinque hirsuta, nonnihil crenata, costâ medium secante. Inter hæc surgit caulis serē cubitus

lis, hirsutus, enodis, vno aut altero foliolo exiguo donatus: flores in caulis scapo superiore, quinque aut plures, singuli in singulis pediculis non admodum longis, magni, Campanulæ Fuchsi similes, ex cœruleo albescentes, calyce hispidobasini complectente, patet crassiuscula & longiora.

si longiora

gula, esu grata.

Hist. Lugd. Trachelium montanum.

C. Bauh. phyt. Campanula 15. siue foliis Anchusæ.

Locus * Inueni in peregrinatione mea Rhætica, cum
tempus D. Gesnero Burnonii, florentem Iunio. Habui
etiam Argentinz ex plantis Agerii, qui collegit
in montibus Styriæ prope Celticam Nardum.

TRACHELIVM PVMILVM ALPINVM,
lanugine pubescens, singulis floribus ex
singulis ramulis satis magnis.

Descriptio **T** Rachelium pumilum Alpinum Clusii, do-
drantalisis est plantula cauliculo striato, in
plures ramules diuiso, quorum singuli sustinent
florem satis magnum, cauum, Campanulæ instar
efformatum, in quinque angulos desinentem,
quemadmodum vulgaris Trachelii, aut Campa-
nulæ vulgæ dictæ flos, cinereo colore præditum:
floribus succedunt capitula satis magna, trigona,
nutantia, seu deorsum spectantia, quæ continent
semen vulgaris Trachelii semini non dispar, sed
minus & exalbidum: folia quæ per cauliculum
sparsa sunt, latiuscula basi eum amplectuntur, &
in oblongum mucronem desinunt: quæ verò
summâ tellure stirpi inhaerent, latiuscula sunt, &
longiore pediculo innixa: radix pro plantæ exi-
litate satis magna, candicans, supernâ parte in
plura capita extuberans, & quibusdam fibris hir-
luta: Tota planta lanugine pubescit, lacteoque
succo abundat.

C. Bauh. phyt. Campanula 16.

Locus Nascitur in Schneeberg, aliarumque vicinarum
Alpium iugis. Flores profert Iulio.

ALOPECVROS ALPINVS QVIBVSDAM
Echium montanum Dalechampii.

Descriptio **P**ollicaris crassitudinis habet radicem, sensim
gracilescens, palmo longiorem, in apo-
phytes aliquot abeuntem, teneram, rubentem:
caulis sesquipalmaris aut dodrantalisis, crassitie re-
spondet radici, cauus, singularis, hirsutus, crebris
foliis vestitus, aliis palmum ferè longis, aliis bre-
uioribus, potissimum superioribus, latitudine
semunciali, hispidis, ad Echii folia accedentibus:
thyrsus trium vnciarum, aut palmarem, si maius-
cula sit planta, gent. florum inter folia emergen-
tium ex cæruleo pallefcens, oblongorum, &
per oras laciniatorum, erumpentibus è medio
flaminulis.

Hist. Lugd.
Echium mon-
tanum Dale-
champii: aliis
Alopecurum
montanum.

Trachelium
dorsalis, Clus.
Pann. Ceruica-
ria maior tenui-
folia, Thalo.
Trachelium
dorsalis, Clusii,
& Ceruicaria
maior tenui-
folia, Camer.
hort. Camps-
nula 14. soli-
Echii, siue Cera-
uicaria mar-
tenuitolia Tra-




Tom. II.

gi. C. Bauh. phyt. cuius iconem expressam non-
dum vidit.

Alopecurum Alpinam quibusdam dictam, aliis **Locus**
Echii speciem, quod non placet, cùm Genevæ es-
sem, audiui reperiri in altissimis Sabaudiz mon-
tibus.

RAPVNCVLVS SPICATVS SIVE CO-
mosus albus & cæruleus: itæmque so-
lio maculato.



Descriptio **Q**uasi par-
uum Ra-
pū dices, Ra-
pūntium, vel
Rapunculum
vulgus plan-
tam indigitat,
ob solius radi-
cis, quæ sapore
& magnitudi-
ne cum culmi
Rapunculo
habet, simili-
tudinem: alio-
qui folia sunt
Violæ Martiæ,
longis appen-
sa pediculis,
nonnunquam
nigrâ maculâ
notata, quan-
quam videas
& stricta ob-
longa; in can-
te bicubitali,
inani, angulos-
so, lac manan-
te: in cuius fa-
stigio spicatus
pulcher flos
cæruleus aut
purpureo-viola-
ceus, ex mul-
tis corniculis
circa basin in
segmenta ar-
curata fissis
compactus,
Huius flos al-
bus cinereus-
ve quoque re-
peritur.

Plant. Icon. p. 329. Rapuntium maius Alopecuri comoso flore, Lob. 178. Teut. 403.

Tabern. Icon. & Hist. Rapunculus nemorosus. 1. Wald Rapunzel.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Rapunculus 2. siue spicatus albus, foliis maculatis mas, & non maculatis femina, floribus albis cinereis. Rapunculum 3. siue spicatum purpur. Dod. Rapum silu. maius Lob. Rapuntium maius Alopecuri comoso flore. Rapunculum 4. siue spic. cæruleus. Trago Rapunculum silu.

An Cæsalp. l. 9. c. 30. Duæ flosculos ferunt veluti in spica dispositos densè, quarum vna foliis Rapunculi constat: Altera Archangelicæ minoribus.

Dodon. Gall. Rapum syluestre maius, Rapuntium maius & secundum. Gall. grande Rapunzel.

Yyy 2

Germ. *Groß Rapünzels-Belg.* *Grote raponce* len, quod sine dubio est *ἀλμυρα* & Cauda vulpis à Theophrasto descripta, Lat. de flor. Rapi inquit, sylvestris sextum quoddam genus. Rapunculum (extum, colore aliàs candido, aliàs caeruleo, aliàs purpureo, nonnulli Alopecuron appellant: Sed alia est. Tragus describit flore caeruleo: vocatque Rapunculum maius & Rapunculum sylvestre, Germ. *wald Rapünzel.* In hist. Germ. *Sie andere rind gros Rapünzel.*

Lonic. speciem globosam habet flore purpurante. *wald rapünzel/groß wald rapünzel/Rapunculum sylvestre.*

Lobel. & Penz. Adv. Rapuntium maius Alopecuri comoso flore: Lobel. Obs. pingit cum longa spica.

Gesner. hort. Rapi sylvestris genera in sylvis ac montibus, quorum flores ceu in spica sunt, alii caerulei, alii pallidi. An eadem de col. *styp. Rapum sylu. floribus vnguim instar recurvatis? Item Rapunculi sylvestris genus floribus caeruleis in se recurvis?*

Clus. in Pann. & Hist. post. Rapunculus Alopecuroides longiore spica, aut breviori, coloris albi vel violacei.

Schvv. Rapunculus montanus albus, Rapunculus montanus caeruleus.

Thal. Rapunculus sylu. communior, foliis Cervicariae mai. mucronatis, caule cubitali, laxi, tereti, flore spicato, ex viridi leniter albente: passim in pratis & locis quibusdam montanis. Mihi vocatur Rapunculus sylu. spicatus albens: licet eius speciem in Thuringiaca silva, floribus prorsus candidis viderim. Eiusdem species floribus caeruleis, &c.

Camer. hort. Rapunculus flore purpureo, candicante: spicato purpureo & albo.

Geneux albus cum longa spica, variis in locis & provenit, ut inter Urbem Montbelgardum Charmontey, & in sylva le Chesnoy: habui etiam in Horto E. C. a me plantatum, Rapunculum flore purpureo & albo globoso, serè ut in scabiosa, foliis minoribus, quale Geneux etiam vidi, ubi provenit aliud genus cum longa spica plena flosculis albis in monticulo la Bastie. Hoc genus coctum comedi in acetariis Montbelgardi: tale reperit Frater in monte Mutensi Basilienium, Rapunculum spicatum reperi mense Februario in montibus Euganeis Italiz. Rapunculum flore globoso Dalech. vocabat. ni fallor, Aphyllantes genus, eum qui globosum habet florem: Ex vicinis Montbelgardo locis magnam Rapunculum spica longà transtuli in Hortum E. C. Rapunculum flore albo folio maculato observavi florentem Augusto, apud Fontem aridum S. Petri. Minus hæc est Lobelio obuiam multis locis necnisi montosis aut aliosis pratis & conualibus, uti sunt Mindeni & Norbonz Aquitanicæ vicinis pinguibus, etiam Belgii & Angliæ nemorosis. Natales eius, inquit Schvv. montosa & aliosa prata, conuallesque nemorosa. Iunio spica viget.

Radix, ut scribit idem Schvv. priusquam caulem protrudat, elixa cum sale, aceto & oleo macerata, cibi appetentiam parit, stomacho prodest & vias elicit.

RAPVNCVLVS FLORE GLOBOSO purpureo.

Descriptio

Cubitali affurgit altitudine caule satis gracili, parte inferiore purpurascens quodammo-

do, superna viridi cui inhærebant aliquot folia, quatuor uncias longa, in ambitu serrata, dodran-



tal pediculo innixa, & ea quidem quæ infima parvi caulis adnata erant, secundum pediculum, uncia aut pollicem lata, deinde sensim in mucronem desinentia, quæ vero medio cauli, & summa eius parti inhærebant, longè erant angustiora, & breviori petiolo sulta, non minus tamè longa: summum caulis fastigium desine-

bat in breuem & quasi orbiculatam florum spicam, quæ folis staminibus ex purpurâ caeruleis, constare videbatur: quibus deciduis apparebant caliculi pentagoni: radicem non adferebat, qui in riuere observabat, quia eruere non potuerat, inter saxa & confragosis locis nascentem. Tota autem planta lacteo succo abundabat, non secus ac reliqua genera.

Rapunculus Alopecuroides orbiculari penè spica Clus. Hist. post. sine icone.

Geneux collegimus globosum purpureum radice longâ.

Locum

RAPVNCVLVS MINIMVS FOLIO TENUI gramineo.



Descriptio. Omnium Rapunculorum minimus in montibus Rheticis inuenimus, cui radix crassiuscula: caliculus tenuis dudum unciarum comolum gent florum caeruleis. Rapunculi spicati: folia caulem comitantur, ipso penè longiora, filis instar tenuia, numerosa. C. Bauh. phyt. Rapunculus 7. siue umbella-

tus folio gramineo.

Florentem observavi Iunio in Rhætia.

RAPVN-

RAPUNCVLVS ALPINVS
paruus comosus.

Descriptio.



Radice squammis veluti compa-
ctili, ex veteri-
bus foliis resi-
duis, vt in Nar-
do Celtica pe-
nè videre est,
crassiuscula,
sensim attenua-
ta, præditus est:
folia fundente
numerosa, vn-
ciam vnā aut
alteram longa,
culmum lata, ad
Nardum Celti-
cam acceden-
tia, longis nixa
pediculis: inter
quæ *cauliculus*
surgit, duum

vinciarum, non sine foliis quæ angustiora: cuius
cacumini flores insident Rapunculi comosi, qui
cærulei, quantum ex sicca planta colligere licet,
stylis longis recuruis prominentibus: picta secun-
dum eius magnitudinem, sunt tamen nobis plan-
tulæ quædam paulò maiores. Hæc planta vide-
tur habere nonnulla similia cum Rapunculo mō-
tis Baldi, cuius etiam vascula hic pingenda curau-
mus, quia iam sculpta erat eius figura, vt paulò an-
tè dictum.

Locus &
tempus

Habui ex plantis Di. Agerii pro Rapunculo al-
pino Cam. flore cæruleo collecto, in Styriæ mon-
tibus.

RAPUNCVLO COMOSO SPICATO
aliquatenus affinis ex Baldo.

Descriptio



Palmaris est
caulis ad
imum squamma-
tus, foliis intimis
Buttonariz Bel-
lidis cæruleis di-
ctis similibus, su-
perioribus Belli-
dis maioris pro-
fundè serratis, la-
tioribus quàm
inferiora, qualia
etiam in summo
caule radiatim
crebra stors subi-
ciuntur, qui cau-
lis comosus: sin-
gulares flores et-
iam maiusculi,
virem inflatum
referentes, imò
parte laxiores, al-
bescantes, sensim

tenuantur in cernicem violaceam per extremas
oras crenatam, vnde longè florem supereminens,
stors tenue nigricans in tortiles veluti capreolos
desinens emicat.

Hanc eandem plantam nō fallimur collectam
Tom. II.

in Bassauensibus montibus accepimus à D. Age-
rio, in qua folia vndiq; serrata & latiora cum
vasculis ad Rapunculi vulgaris vascula acceden-
tibus, quæ curauimus appingenda in tabella Ra-
punculi parui Alpini comosi, qui nondum erat
sculptus.

De hac planta hæc tradidit Joh. Pona in des-
criptione montis Baldi. Trachelium petræum
minus in ipsius Baldi altioribus summitatibus,
cuiusvis alius plantæ sterilissimis, inter præcipi-
tes illas cautes ab eisdem veluti cadentibus pen-
dens, germinat. Eam fusè describens, ac addens
perennem & adstringentem esse plantam.

C. Bauhino, cum Rapunculum r. siue Alpinum
spicato similem collectum in Baldo D. Guillandi-
no ostendisset, is Rapunculum montanum, ac
Nobiliss. Cortulus Cantabricam alteram Angul-
laræ nominauit. Eundem à Dre. In. Neudorf-
fero accepit, vt apud Matth. scribit, cuius vna ra-
dix, quæ tuberosa, est inæqualis, Rapunculo vul-
gato triplo maior: Ab eodem & duas alias Ra-
punculi species ex monte Sumano, necdum des-
criptas habet.

Icon nostra sicuti & descriptio factæ sunt ad
plantam siccam, quam adhuc habemus, quæ de-
lata fuerat ex monte Baldo per Abrahamum Be-
chium Medicum, quamque Frater C. Bauhinus
Basileâ misit.

RAPUNCVLVS SONCHI FACIE
umbellatus.

Guilland. de Mera Medicus rediens ex pere-
grinatione Italica communicabat Rapun-
culum numquam antè Clusio conspectum, qui
abruptus similis erat, vt Rapunculus flore glo-
boso purpureo, & sine radice, quam eximere non
potuerat. In pedalem autem excreuerat altitudi-
nem, vel etiam breviorē: plura, quàm Primum
habebat folia, breuiore pediculo, eoque plano
subnixa, supernè viridia, infernè exalbida, instar
foliorum Sonchi, quibus valdè forma responde-
bant, erant enim, vt illa, in ambitu dentata, sed
minora, summo *cauli* innitebatur veluti umbella,
longiusculorum calyculorū striatorum, in quin-
que angulos desinentium, in quibus stors, coloris
non compert, quia neque ipse Mera referebat,
neque vllus, in totā plantæ umbellâ, restabat, ex
quo coniecturam facere licuisset.

Considerandum quantum Rapunculus Son-
chi folio Clusii differat à Rapunculo, montis Bal-
di antè dicto.

RAPUNCVLVS CRETICVS PETRO-
marula.

Herbam teneram lacte turgentem floribus
cæruleis visui gratam Imperati, sic des-
cribit Honorius Bellus. Folia profert ci-
choracea, magna, profundè incisa, in orbem dis-
fusa, taturè virentia, infernè splendentia, ad
purpuram aliquando tendentia, vt Cyclaminas,
læua, cum autem semine nata prodit, prima eius
folia Viola nigræ foliis simillima sunt, rotunda, &
aut nihil, aut parum duntaxat serrata: *cauliculus*
autem multos habet, rotundos, striatos,
bicubitales, aut tricubitales: quibus innas-
cuntur stors copiosissimi, purpurei, hyacinthi
Orientis stors æmuli, densè compacti, vt spi-
cam, eamque magnam referre videantur: quibus

Yyy 3

HISTORIAE PLANTARVM.

succedunt semina minutissima : radice firmatur magna alba, in alas diffusa, eduli, sapore rapunculi radicem imitante. Tota planta lacte abundat.

Rapunculus quem Creticum ac in acetariis gratum dicit Imperator, herba est Cretæ siue Candia propria dicta ibi *Pietra Marola*.

Rapunculi speciem à Nobilibus. Cortuso *Petra Marola* nomine accepit C. Bauhinus.

Vocatur vulgò *petruzzola* hoc est, *Pietra Lactuca*, licet [teste Hon. Bello in epist. ad Clus. ex Cydonia Cretæ] cum Lactucis nihil aliud commune habeat, quàm

quod lacte abundat. Et quia radix manducata, tum etiam caulis adhuc tener, Venerem stimulare vulgò dicitur, idèd nomine obsceno *petruzzola* vocatur.

Rapunculi genus videtur Clusio.

Hanc exhibet Io. Pona in descriptione Baldi, nomine *Petromarula*, seu *Lactucæ Petræ Creticæ Belli*.

Cretica planta est, & nusquam alibi quod sciat Hon. Bellus, spontè prouenit, ea reperitur vbique in aruorum marginibus, secus vias lato solo, inter saxa & super parietes. Floret verdè æstatis principio, Maioque & Iunio arescit tota, præter radicem, quæ Octobri folia proferre incipit, & viret tota hyeme.

ERINVS DALECHAMPII.

Descriptio

Locus.



ERINON Equod Dalechampius propè Lugdunum collegit in riuo subterfluente extremos suburbiū versus ponus fornices, quo Rhodanus iungitur, radice est in multas fibras diuisa, capilibus multis, palmatis, angulosis, furculosis, cum franguntur lacte manantibus, gustu valdè acerbis, canā lanugine propè verticem obductis, foliis ocimi, minoribus tamen quàm in primo genere, quod ocimum citratum Serapio vocat, in

ambitu minimè incisiss, nec crenatis, iuxta caulicū fastigia, & arduè immixtis inquit Dioscorides, in longum & angustum veluti fissis pendè instar Pinastri.

Quæ sit Erinus Dalechampii, vt verum cum Fratre C. Bauhino in phyt. p. 427. fatear, nondum mihi constat : hoc mihi valdè, quod Dalechampius flores & semina pingere curant, nec descripsit : figura præterea non videtur respondere descriptioni, vnum enim habet caulem, cum Dalechampius dicat multos habere. Sed & Fabio Columna teste, non est Erinus, quam postremò Dalech. hist. lib. 9. cap. 171. proponit, foliis minimè incisiss. Ac an rectè suprà citata Dioscoridis verba venterit, & vera sit ab ipso depicta planta, quilibet ex supradictis iudicabit.

DIGITALIS PURPUREA.

CAP. II.



EST vbi cubic Descriptio Etos duos superat Digitalis purpurea, caule pollicem crasso, anguloso, hirsuto, subrubente, concavo, ex radice fibrosa, amara: flores in thyrsi longioris morem : frequentes ab vno caulis latere, penduli, breuibz hirsutis pediculis, quorum singulis est appositum foliolum acuminatum, calathi

aut digitalis factorii munimenti effigiatura, colore foris coccineo, excepta inferiore parte quæ propter nonnullam admixtam albedinem carneo est, intus verdè similiter purpurei, inferiore parte (quæ & pilis longis obsita est) versicolore, albis maculis nigro guttatis : floribus basi penitus adnascuntur stamina alba, aut purpurascens, contorta, quæ apices didymos croceos guttatos sustinent : stilus tenuis purpurascens ex hirsuti oblongique pericarpii mucrone protenditur, cui postea inclusum continetur semen minutum. Folia Verbasci opinionem rectè sustineant, oblonga, in acutum desinentia, hirsuta, in ambitu serrata, supernè atroviuentia, infernè incana.

Digitalis purpurea Anguill. Fuchsius, quem mihi Fuchsius non diligentius eam describere.

Hanc pulchrè describit Dodon. Gall. non tamen addit figuram dicens : hæc herba vocatur Digitalis, Campanula sylvestris & Nola sylvestris : est, vt quidam scribunt, species Verbasci, Græcis dicta *λυχνίτις* & *ἀνιδάρις* cum qua magnā habet similitudinem : de flor. autem, satis commodè depingit & describit, dicitque : Fuchsius appositè Latine Digitalem nuncupauit, descriptio autem Lychnitis non conuenit.

Digitalem flore luteo & purpureo vna figura (quæ ad luteam videtur pertinere) & descriptione Tragus comprehendit, non distinguens plantas nisi colore florum, ac ait. Quod ad caules & folia attinet, posset hæc planta Verbasci adungi:

tingi: At si vel florem vel eius facultates spectes, videtur sine ad Galiosin referenda, de qua Diosc. lib. 4. cap. 90. Nos Campanulam seu Nollam silv. nuncupamus.

An Ruell. lib. 3. hist. cap. 37. Baccharis herba, nostrates Officinæ non norunt, rura apud nos Dux Maris Chirothecas appellant.

C. Bauh. phyt. Digitalis 1. seu purpurea. Digitalis, inquit is, dicta à florum similitudine, qui digitale referunt: Sunt qui ad Verbascum, alii ad Alismatis alterum genus apud Plinium referunt.

Digitalis purpurea dactylis Tabern. Germ. fingerkraut / fingerhütt / braun fingerkraut / braun fingerhütt / wald glöcklin & wald schell. B. Vinger boer cruyt. Gal. Digitale, digitz, gaud. nostre Dame. It. ganteili. Angl. foxe glouc. Hung. Vy fuu gyzeu fuu.

Digitalem purpuream habeo in Horto Exc. C. quam plantavi & seminaui, collectam propè Girarmegni ubi fodina argenti, copiose etiam repertæ inter Masmunster & S. Thamarix in monte Rotsberg, ubi etiam collegi semen, mense Octobri florebat adhuc sub arboribus, altitudinis hominis, ni etiam maior, cum foliis latis & valde hirsutis: non longè à Lutea provenit, & in montibus circa Thermas Plumbarias florens Iunio. Genevæ habebam in horto, Bizantii vidi in horto Domini Doctoris Chiffletti, Basileæ in horto Domini Doctoris Fælicis Plateri: Bononiæ in horto S. Salvatoris al burgo di S. Catharina. Montbelgardi in Horto E. C. floret Iulio, Iulio, & Augusto, flore purpureo & panè rubello. Semine maturo Iulio: prope Castellum Passanant Ludrensis diuionis. Flore albo in horto Montbelg.

DIGITALIS FLORE MAGNO CANDIDO

Bleubitalis est planta, cui radix digiti crassitudine, alba: folia Digitalis purpureæ, hirsuta: florum magnitudo par, sed color lacteus, inferna parte intrinsecus purpureis aspersis.

Icon. Plant. p. 572. Digitalis alba. Teut. 674. Digitalem flore albo à se visam Basileæ scribit Fr. Casparus Bauhinus: Eam ego cum pulchro magno flore purpureæ similem habeo Montbelgardi in horto Ill. E. C. florentem Iunio & Iulio.

DIGITALIS LUTEA FLORE MAIORE,

folio latiore.



Minor huic quam Purpureæ magnitudo: nec dissimilis radix: caules angulosi, nonnihil hirsuti: folia angustiora, longa, inferne nervis hirsutis rugosa, superne penitus glabra, attrouirentia, in ambitu crenata, sapore subamaro & acris: flores Digitalis purpureæ pares, foris intusque hirsuti: sed colore, extrâ quidem di-

lute luteo, intus verò croco saturatiore, languidèque luteo versicolores.

Figuram Fuchsi Dodon. Gall. habet, non autem describit: sed tantum colore floris luteo distinguit à purpurea, licet foliis multum differat. Digitalis tertia eadem de flor.

An Digitalis lutea Anguill. Digitalis Fuchsi minor flore maiore, Gesner. hort. Digitalis maior flore grandiusculo pallido, Cæsalp. Digitalis lutea, Geelfingerhütt, Fuchsi. Thal. ac Tabern.

Casp. Bauh. phyt. Digitalis 2. siue lutea magno flore. Sunt qui Calathianam Violam apud Plin. lib. 21. cap. 6. censent. Hæc non solum floris colore à purpurea variat, sed & folius, quæ in illa Verbasco similia, in hac verò ex viridi nigricantia, sed lanuginosa.

Digitalem luteam flore maiori luteo reperi copiosè florentem Iunio inter Montbelgardum & Meruelze, eandem habeo in horto E. C. per me satam, ubi ex luteo pallido & albicante florens Iunio & Iulio: Bononiæ in Italia vidi in horto S. Seruatoris al burgo di S. Catharina: Quum essent Genevæ reperi in monte Thuri mense Iunio cum suis magnis floribus, foliis latis & hirsutis: prope Castellum Passanant in Ludrensi diuione flore ex luteo albicante copiosè florentem Iulio vidi.

DIGITALIS FERRUGINEA FOLIO angustiore.



Três aut quatuor cubitos altus est caulis mediocriter crassus, teres, laevis, cuius scapus summus in alas aliquot scanditur: folia Digitalis subulter angustifolia foliis proxima, longa, angusta, acuminata, attrouirentia, nerubia, aucta parte subhirsuta, leui crenarum vestigio per ambitum incisa, alternatim cauli adna-

scuntur: flores longa serie thysloide dispositi, Digitalis purpureæ, breuior, rigidiores, foris toti hirsuti, ferruginei, intus eodem colore saturatiore & striis variegato picti, labro productiore villosa dependente, in medio ritu hiant latentes sub superioris folii margine apicibus luteis: insidet autem floris recurua basis calyci stellato quinque radiis constante.

Digitalis gilup flore alias ferrugineo, angustiore calathio, foliis attrouirentibus Lob. Obs. Digitalis ferruginea Ic. plant. p. 573. Teut. 675. C. Bauh. phyt. Digitalis 4. siue angustifolia flore ferrugineo.

Anno 1592 primùm à me visa Digitalis quam Ferrugineam existimo vocari: floruit pulchrè in horto Ill. E. C. per me plantata: missa autem fuit planta per Splignem Medicum D. Christopho-

Yyy

Locus
tempus

odore non insuauis. Vnicuique flori succedit semen pulchrum magnum, Ciceris ferè, pentagonum, rugosum, nigrum medullà alba, quod relicto folliculo suo facile excidit.

Et licet nunc aded vulgari sit notitia, vt nulla ferè sit opus acuratori descriptione, Clusii tamen Historiam, vt qui plura notatu digna obseruant assumere libuit. Primum igitur emergit Ocymi quod Cereale nonnulli cognominant, aut Circeæ Lutetianæ ferè modo: deinde caulem promit cubitalem vel etiam interdum ampliozem, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flauescens, frequenter vt Balsaminæ caulis geniculatum, & in multos ramos eodemque similiter nodosos diuisum: qui ex ipsis prodeunt, non bini vtrique, & ex aduerso oppositi, sed singulares duntaxat, alternatim modò in vnâ, modò in alteram partem vergentes, & quem primum seruantur ordinem aut seriem, perpetuò ferè retinentes, hoc est, vt tertius, quintus, & septimus ramus in eandem partem spectent in quam primus: quartus verò, sextus, & octauus [si modò tot primariis ramis planta sit prædita] eodem latere nascantur quo secundus: folia in singulorum ramorum nodis bina aduersis pediculis semper nascentia, Siliquastris foliis penè similia, viridia, satis carnosâ, succulenta, circa pediculum ampla, extremo mucronata, quæ trita, Siliquastris grauem odorem, gustata verò, ingratum saporem, & tandem illius, vel foliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum referunt: flores in extremorum ramulorum alis singuli, longi, concaui, in quinque sinus, antequam aperiantur, complicati, explicati verò Tabaci floribus non valde dissimiles, non tamen in mucronatos angulos, vt illi, desinentes, sed in obtusos, Conuoluuli florum instar, Tabaci etiam floribus ampliores, elegantissimâ interdum purpurâ, siue Kermesino colore nitentes, nonnunquam Lateriti, aliquando flauo, aut pallentes, interdum prorsus albi, vel exalbidi duntaxat, nonnunquam obsoletè rubentes aut flauescens, sepius binis coloribus simul elucescentibus, vel purpureo mediam floris partem occupante, aut radius modò purpureis alternatim totum distinguuntibus, vel interdum magnis, nonnunquam exiguis purpurascens maculis vario situ & mixtura per totum florem, vel flauescens, pallescentemue, aut album, candicante mæ, vel obsoletum, aspersis, odoris satis suauis, & Narcissinum quidpiam referentis, sex oblongis staminibus, stiloque paulò longiore è medio flore emergentibus: valde autem caduci sunt hi flores: nam cum octu explicari incipiunt postridie sub horam octauam antemidianam [per æstus præsertim sese contrahere incipiunt, florum conuoluuli modo: at temperatiore aurâ, integro nonnunquam die expansi permanent, & sub noctem duntaxat contrahuntur: singulis tamen diebus alii recentes aperiantur, qui si integri quotidie decerpantur, & inter chartas reponantur [diu enim colorem retinent] atque deinde inter se conferantur, iisdem quidem coloribus constare deprehenduntur: ac eorumdem situ & mixtione, inter se variare, quisquis diligenter obseruauerit, animaduertet. Quæ sanè insignis varietates, quotquot hitum florem obseruant in summam admirationem, non immeritò rapere debet: etenim diutissime viret, & à Iulio mense ad Octobrem vsque [nisi pruina interueniant] numerosâ florum sobole luxuriare solet: caliculi flores amplectentes, & in quinque mucronatas

lacinias sunt diuisi, virides & quasi membranacei, in quibus vnicum semen, nullâ membrana siue pericarpio inclusû, mucrone, cui flos insedit obtulo, infima verò, quâ caliculo adhæret, parte, tanquam exigua coronâ ornatum pentagonum ferè, bæccæ myrti propè magnitudine, nitidè viride, maturitate fuscum, & quibuldam veluti tuberculis oblitum, spontè, vel tenui vento, vel leuissimâ cômotione decidens, nucleûque continens album, qui tritus in candidissimam, & amyli instar niueam friabilemque pulpa resoluitur: radix satis crassa & pucariâ est, intus alba, foris nigra, aliquot sibiis prædita, gustu nonnihil acro, cui admista sit superficialia quædam dulcedo. Eam licet annosâ initidè censeremus [nam singulis annis nobis erant ferenda, hyeme radicem in horto relictam corrumpente] viuacem tamen esse, ab optimo & peritissimo viro Sebastiano V Volmaro Ill. D. V Virreimb. Pharmacopæo, & horti Medici tum temporis Præfecto, sumus admoniti. Is enim cum sub Autumni exitum aliquot plantas eruillet, & caule præciso, ex illis vnâ, propter formæ elegantiam exiticandam seruasset, initio autem Martii sequentis cuidam amico ostendere vellet, eam succulentam & quasi reuirescentem deprehendens, terrâ in fidili obruit, & paucos post dies folia proferre cæpit, deinde circiter Cal. Iulii etiam flores. Cuius rei postea nos etiam aliquoties periculum fecimus, atque etiam alii nostro exemplo. Sed exigui momenti est compendium illud conferuandam hyeme radicem: nam nouo Vere terræ commissa, forsitan flores proferent quindecim diebus antè quàm illæ plantæ, quæ semine terræ eodem tempore credito, sunt nata. Aliud autem genus habuimus, quod licet à superiore, caulis magnitudine & crassitudine, ramorumque situ & foliorum formâ non differret, color tamen stolonis & florum dissimilis est: nam dum primum terrâ emergit, cauliculi foliorumque pediculi, vt Betæ rubræ iam recens nascentis, purpurascunt, manetque is color in adultæ etiam caule & ramis: flores verò rubente nitidissimâque purpurâ infecti videntur, sex etiam tenuia stamina longiorumque stilum continentes, eiusdem cum superiore odoris. Hi verò non mutantur, sed vniùs perpetuò sunt coloris, & quem primi habuerunt, reliqui deinceps retinent: semina in caliculis singularia, superioribus respondentia: radix non dissimilis. Hoc genus è superioris semine, cui rubri flores insederant, originem trahere non est dubium, qui proximo anno & aliis subsequen-
tibus, vtriusque generis semina leorsim terræ mandauimus, vt diligentius istam varietatem & colorum distinctionem obseruare possemus, & competimus ex rubri floris semine nullas alias stirpes prognatas, quàm eas, quæ rubros flores darent. Idem periculum fecimus de granis flauo flore genitis, è quibus prouenire obseruauimus, quæ nullos alios flores darent, quàm flauos. Simile etiam de alborum florum semine factum periculum, ex quo natæ plantæ, albos quidem initidè flores dederunt: sed qui sub Autumnum primum explicabantur duorum colorum enadebant, commixtis in eodem flore albo & purpureo, minus tamen quàm in versicolore primum descripta. Illud præterea obseruabam in ista distincta satione, ex solis plantis rubræ se nine natis, statim ab exortu initio agnosci posse, quos flores sint daturæ: ex versicolorum autem, flauorum, & alborum semine prouenientibus, nullum certum indicium, si mixtæ sint satæ, sumi

Admirabilis
est 2. rubris
flora

Admirabilis
est flore

Admirabilis
est flore

posse, quæ eisdem omnes sunt coloris in tene-
ra ætate. Aliud porro Rubræ genus mihi Viennæ
natum, semine ex Italia allato *Lasmin rosso*, hoc est
Lasmini rubri, nomine: in fœcilibus quidem na-
ta plantæ, pusillæ & humiles erant, latè nihilo-
minus ramos fundentes: quæ autem in horto
sarz, superiori generi rubros flores gerenti lon-
gè ampliores, & latissimè ramos spargentes, ead-
em serie quâ in suprâ descriptis alternatim na-
scentes, eundemque ordinem seruantes, vt vide-
licet alternis in idem latus semper vergerent, at-
que spectarent, ipsi similiter cum suo caule ad-
modum succulenti, & frequentibus nodis siue
geniculis præditi, atque magna ex parte purpu-
rascentes: folia in hoc genere magis atra, magis
splendentia, interdum maiora, altera parte ma-
gis prominula, & inferiùs suum exortum in ner-
uo habentia, similis tamen cum superioribus &
odori, & saporis: flores aliis forma pares, co-
dèmq; modo ex postremarum alarum sinubus
nascentes, oblongiores tamen, tenuiores, & co-
lore dilutiùs rubente, extremâ etiã parte mi-
nùs ampli, sex similiter staminula cum stilo in
meditullio continentes, suauemque odorem
spirantes: semen in caliculis, rubro alteri simile,
hoc est, angulosum, & tuberculis oblitum, sed
breuius & magis crassum: radix etiam breuior
& crassior alterâ, interdum in binos aut ternos
ramos crassos diuisa. Magis serotina est reliquis,
& nisi Solem valdè apricum habeat, vix ad fru-
gem peruenit in frigidioribus regionibus. Ex ra-
dicibus tamen, per hyemem in fœcili siccâ terrâ
pleno, conseruatis loco calido, plantas Viennæ
habui, quæ maturum semen protulerunt: sed
cùm per meam absentiam, ex horto non essent
erutz (zuâ illa hyeme anni 1586. corruptæ sunt,
& genus illud mihi intercidit: Lugdunî verò ap-
ud Batavos semine peregrinè accepto, denud
natum 1599. sed illud mirum in omnibus his
plantis & obseruatione dignum, quod, cùm sa-
bescere incipiunt, primùm folia, deinde integri
ramorum articuli simul decidant, & circa nudos
iam remanentes nodos, candida quædam efflo-
rescentia interdum adnascatur, quæ temporis
successu concreta, salis gustum referat: cuius pos-
tremæ notæ C. V. D. Ioach. Camer. pro nostra a-
micitiâ primus me admonuit. Cæterum peregrina
& venusta hæc planta, varia pro regionum di-
uersitate obtinuit nomina: Etenim ex Hispaniis
semen primùm missum est, *Marabilla del Peru* ap-
pellatione, propter admirabilem florum in ea-
dem stirpe varietatem: deinde *arreboleras* no-
men inditum: ex Italiâ nunc Indici, nunc Mexi-
cani *Lasmini* nomine, ob suauem videlicet eius
florum odorem: Belgæ *Solanum odoriferum*, à so-
liorum cum Solani foliis similitudine, & florum
odori gratiâ vocarunt: Peruanos, à quibus ini-
tiù semen ad Hispanos peruenit, *hachal indi*,
crassâ & in palato formatâ pronuntiatione, no-
minare intelligo: Mulierculæ Viennenses, apud
quas etiam in deliciis est, *Geschefet Indianis-*
che blumen, id est, versicolore Indicos flores
nuncupant. *hactenus ille*, qui videtur nobis fru-
ctus huius Mexicani floris malè Arbori tristi
quondam appinxisse: eius autem figura melius
placet quàm Plantini.

Gelseminum rubrum nuperrimè visum flori-
bus puniceis putat Cæsalp. Mandragoræ apud
Theophr. vocari. Sed non placet Cæsalpini opi-
nio, quandoquidem comperitur in hac plâta fru-

ctus racematus, vinosusque suo sapore, qualem
requirit Theophr. vires etiam non videntur cõ-
uenire. Melius sentit Camer. de hac plâta in hor-
to-scribēs: Gelseminum siue lasminum Indicum,
sub quo nomine cùm primùm fuerit ex Indiis a-
liis communicatum, semper postea hoc nomen
retinuit, quamuis sit planta sui generis, & pauca
habeat cū Gelseminis communia. Magis propriè
Flos Mexicanus à loco natali: *baupinista* quidam
ex Hispanico Marabillas.

Hist. Lugd. lasminum rubrum Dalechampi,
Flos coccineus.

Habui semina à Fratre C. Bauhino cum hac
inscriptione: semen Indicæ plantæ pulcherrimæ.
Habui à Volmaro insigni Pharmacopæo Ill. Du-
cis Vvrt. A. D. D. Fel. Platero, qui vocauit *Tau-*
manthin Peruanianum & *Flacquetin Indorum*. A
Do. à Pfeffenlap ex semine collectio in Suffz. Ac-
cepi semen Stutgardia quod missum fuerat ab
Hortulano Ducis Florentini cum hac inscriptio-
ne *Merauiglia di Peru maggior*. Item *Merauiglia*
di Peru flore albo. Accepi à Tossano Carolo ex
Burgundia cum hac inscriptione, *Flaculi Indis*. Se-
mina hæc in horto Monibelgardico Ill. Ducis
Vvrt. sæta plantas aliquoties proferebant, quæ
semen maturabant Septembri & Octobri, cuius
plurimùm, vbi nigrescebat, spontè cecidit. Mo-
nitus à D. Camerario ramos in terram deposui
qui apprehenderunt.

Scriptis ad Clusium Patavio amplissimus Vir
Iac. Antonius Cortusius, eius quæ vario est flo-
re radices binas drachmas interdum sumptas egregiè
aquis educere. Quod è sapore iudicare potest
autor H. Lugd. aquosa & humida est quædam
eius portio: ignea verò, calidaque & sicca altera,
quæ discutere valenter possit tumores frigidos.

CAMPANULA SERPYLLI FOLIA

Ioh. Bauhin.



Vitriculas
habet fru-
ticosas Ser-
pylli, longas,
multas, in va-
rios ramulos
tenuiores diui-
sas: in quibus
folia ex aduerso
coniugati po-
sita, Serpylli
æmula, iis ta-
men quædam
maiora, alia mi-
nora, crenata,
nonnihil pilo-
sa, breuissimis
pediculis adne-
nexa. Ex ra-
mulorum ex-
tremitatibus
pediculi orinn-

tur palmares serè, foliis nudi, in quibus flores bi-
ni terniue, deorsum putâtes, Campanularum for-
mâ, minimi digiti vngui magnitudine cedentes,
colore, si rectè recordor, cæruleo.

C Bauh. phyt. Campanula 9 siue Serpyllifolia
Ioh. Bauhin.

LINIFO-

Nomina

Ch/m.

Locus &
Tempus

Vires

Descriptio

Locus & tempus

Hanc in Rhæta florentem æstate invenimus. Frater indidem siccam sine flore misicanno 1592. Gener. Io. Henr. Cherlerus ex monte Gotthardo attulit.

LINIFOLIA CAMPANULA lutea.

CAP. V.

Descriptio



Folia per caules ferè sesquipalmare alterno situ, oblonga, angustaque, Linifolii foliorum æmula, lævis: caules superius in ramos abeunt qui flores gestant insignis magnitudinis, vnciam longiores, croceo colore micantes, calyce in quinque lobas aristas fillo, capitulo sequente Linifolii, sed magis turbinato: vix

dix longa, crassa, lignosa, in plura capitula tuberosa diuisa.

Depingunt & describunt Adv. ac sic determinant: Campanula lutea Linifolia Montis Lupi, flore volubilis. Hæc Lobel. Obs. videtur Viola Calathiana Plinii, flore luteo.

Hist. Lugd. Hyssopus nemorensis & lutea. Sciendum autem nos iconem solum H. Lugdunensis, huc referre, non item descriptionem, quæ non congruit figuræ.

Plant. Icon. pag. 414. Campanula Linifolia, Tent. 500.

C. Bauh. phyt. Campanula 4. siue Linifolia lutea.

Locus & tempus

Cum essem Montepessuli mihi allata ex proximis montibus Linifolia Campanula lutea. Gener. Cherlerus attulit collectam in planitie propter montem Lupi.

SOLDANELLA MONTANA quibusdam.

CAP. VI.

Descriptio

Oblivam agit radicem, nigram, crassiusculam, tuberosam, multas longas fibras quibus terræ heret, demittentem, folia tria, quatuor aut quinque pediculis à radice ortis duum aut trium vnciarum nituntur, vncialia aut paulò maiora, circinate rotunditatis, crassa, solida, atro virore splendentia, in quibus nervi vix nisi siccis apparent obliqui: caulis inter folia surgit vnicus vel plurimum, vel duo, odrantales, nudi, qui superius in ramulos paucos diuisi flores gerunt duos trève, notabundos, nolam imitantes, cæruleos, fimbriatos, stylo longiore prominulo. Succedunt corniculis vnicis brevibus,



strita per supremam oram crenata, semen continentia.

Hæc sic depingit Clus. Sena habet, var octona folia, crassa, in orbem ferè circinata, Brassicæ matinz, quam vulgo Soldanellam vocant, æmula, sed duriora, supernè viridia, infernè dilutiore viriditate splendentia, gultu primum exlicante, deinde

de acri & ingrato: flores gerit in lævi, nudo, gracili, subrubro, palmanque cauliculo binos ternos aut plures, purpureæ vel saturæ, vel dilutæ colore, inodoros, Campanulæ modo efformatos, deorsum spectantes, & propendentes, vnicofolio in quinque profundas crenas (quæ aliquantulum laciniatæ sunt) & totidem alas singulares, diuiso, constantes à medio protuberante veluti quodam umbone in longum stilum desinente, qui in valentiam, vel corniculum potius euadit, oblongum, durum, membranaceum, mucronatum parum, durum, virelens, simul congestum semen continens: radices fibrosæ, candicantes, ex vno veluti capite dependent, quod adnatis se propagat.

Est & aliud genus minore folio, neque circa pediculum, qui breuior graciliorque est, aded circinato, sed sensim ab ipso in latitudinem excrecente.

Inueniebat etiam in ascensu montis Herten-alben in quibusdam umbratis locis quoddam genus amplis foliis, sed tenellis admodum, quæ parte inferiore non virebant, superiorum modo, verum non minùs rubescebant, quàm Cyclamini flore odorato folia. Soldanellam montanam Aduers. sine flore pingunt, licet illi florem Gentianellæ minoris cæruleum assignent. Dalech. apud Hist. Lugd. florum picturam habet, sed malam. Vocat Lunariam minorem & Asclepiadem quorundam. Ic. Plant. p. 602. Soldanella montana. Tent. 715. Camer. apud Matth. Soldanella alpina. Violam alpinam foliis Afari minoribus hanc inscribit Gesner. hort. C. Bauh. Phyt. Soldanella tertia siue alpina rotundifolia. Et altera siue 4. folio minùs rotundo. Variat prior foliis & floribus: alia foliis supernè virentibus, infernè dilutiore virore splendentibus: alia foliis infernè virentibus: flos purpureus, nunc saturatior, nunc dilutior, flore etiam niueo reperitur.

In arduis montibus & celsis Alpibus quæ Insurgum & Ranispurgum ambiunt colligi: ac in quibusdam montibus Auenione non diffusi magna gliscere copia audiunt Aduers. Copiosè nascitur in Austria & Styria Alpibus, perpetuè niue obstitis, nusquam verd latiore, aut vberior rem conspiebam, ait Clusius, quàm in iugo Vvechsel nuncupato, supra Aschpang Magn. vici Gratos & Khamptang in liberi Baronis: vbi

Locus & tempus

anno 1576. vnicam plantam lactei proflus candoris flore inueniebam. Floret illic Iunio, interdum Iulio, & Augusto, nuium maturius aut ferius liquefcentium ratione. In hortos autem translata, etiam Aprili, vel cum Primulâ veris rubrâ floret: difficulter autem cicurari potest. Hanc herbam pulcherrimam florentem vidimus in montibus Rhaticis dictis Chempseche & Albula, Iulio mense 1601. Tunc fuit mihi denominata Cyclaminis species. Habuimus anno

1595. in Horto Il. E. C. Montbelgardî, allatam Argentinâ ex horto D. Friderici Meier.

Ex Theophrastinis illis arulcastoribus nonnullos huius foliis, cuticulâ summâ deglubitis, asciticique abdomini admotis, aquas educere, & vulnera illicò mirificèque carne & cicatrice claudere, tradit Lobelius, quod non vidimus. Folium crassiusculum est, & subadstringens, amaricante sapore, Soldanellæ planè simile.

FINIS LIBRI VIGESIMI





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS PRIMVS.

HERBÆ SILIQVOSE, PLERÆQVE ACRES, INTER
QVAS MVLTÆ CVLINARIÆ.

POST Rapunculos, quid potius subiungi mereatur quam Rapa, ac his consimiles Napi, Brassica, & huiusmodi alia? quas si pleraque in culinas accitas quis dicat, ut rumen impleant, ut ille ait, nulli reluctabimur. Illud potius Herbaria Studio sis offensum volumus, omnes infra dicendas plantas id habere commune, ut semina siliquis inclusa gerant, acris sanè pleraque sicut & ipse planta.

BRASSICA VETERIBVS ET IN GENERE.

CAPVT. I.



Raphanus.
Crispa.
Lentis &
gracilis.

HORTIS & culinæ familiaris Brassica (ραπαρ) quam Theophrast. trisariam diuidit hist. pl. lib. 7. cap. 4. Ac primum quidem in eam, quæ crispa (ραπαρ) deinde in eam quæ laxa (λεως) habet folia: & tertiam agrestem (αγρια).

Videtur autem priorum (duarum) Brassicarum similiter & hæc esse differentia, quod harum quædam nullum, quædam malum semen habent. In vniuersum autem crispa (ραπαρ) & meliore succo, & maioribus foliis est, quam laxa (λεως).

Notandum autem non hic solum Brassicam τὴν ραπαρὶν à Theophrasto nominari, & ita à Theodoro conuerti, sed alius etiam in locis laxissimè, in quibus Scaliger τὴν ραπαρὶν pro Brassica usurpat, & non pro radice neque radícula, quæ ραπαρὶς quoque à Græcis vocatur. Ipse etiam Aristoteles Brassicam interpretatur. Scribit enim lib. 5. cap. 19. hist. Nascuntur Eruce ex virgibus foliis, maximè Raphani, (ραπαρ) quam nonnulli κρημνὶν [Brassicam] vocant.

Raphanus
Crassus.

Adhuc & Athenæus lib. 9. ραπαρὶν Theophrast. κρημνὶν esse dicit, ita siquidem illic ait. Theophr. verò ad hunc modum scribit. [τὴν δὲ ραπαρὶν] (λεως δὲ τὴν κρημνὶν) ἢ μὲν ἐστὶν ῥαπαρὶς, ἢ δὲ λεως: Raphanus, Brassicam dico, altera crispis est foliis, altera siluestris [lewis Dalechampius].

Antiquos Raphanum Brassicam vocasse monstrat Apollodorus Carystius.

Raphanum scio vocare nos: ac hospitibus
Vos Brassicam.

Plinius negligentius legit, imò nec animadvertit quidem, quæ Theophr. ac Aristoteles de-
Tom. II,

Brassica scripserunt, ipse siquidem lib. 19. cap. 7. Raphano radici tribuit, ac rursus eiusdem libri c. 8. ad Brassicam quoque retulit, Catonem, qui illa ex Theophr. transcripsit, his verbis citans. Sed Cato Brassicæ miras canit laudes, quas in medendi loco reddemus. Genera eius facit tria: vnam [latis Cato] extensis foliis, caule magno; alteram crispo folio, quam Papiniam vocat: tertiam minutis caulibus, lenem, teneram minimè probat.

Caton
Brassica.

Idem Plinius eadem tria genera libr. 20. cap. 9. reperit. In tres, inquit, species diuifere Græci antiquissimi. Crispam quam Selinada [legendum videtur Selinoidea, siue Selinoiden, ex Catone c. 157. vocauerunt, à similitudine Apii foliorum, stomacho vtilem, alium modicè mollientem. Alteram leam, latis foliis & caule excurrentibus. Vnde caulodem quidam vocauere, nullus in medicina momenti. Tertia est propriè appellata Crabe, tenuioribus foliis, & simplicibus densissimisque, amarior, sed efficacissima.

Quò verò Catonis sententiam de Brassicæ generibus clariorem reddam, verba eius ex cap. 157. adscribam. Nunc ut cognoscas genera earum, prima est lewis, quæ nominatur λεως, grandibus, & latis foliis, caule magno, validam hæc habet naturam, & vim magnam habet. Altera est crispa, quæ à similitudine Apii κρημνὶν vocatur. Hæc est & aspectu, & natura bona ad curationem, validiorque est quàm suprâ scripta est. Item est tertia, quæ κρημνὶν vocatur, minutis caulibus, tenuioribus foliis, & acerrima, omnium est istarum tenui succo vehementissima.

Lewis.
Crispa.

Crabbe

Atque hæc tria genera Brassicæ agnoscat etiam Eudemus Atheniensis libr. de cleribus apud
Z z

Commemorat Aug. Gall. Brassicam, *Cauli* & *Veri*, *crispi*, *capitata*, *Veri fari*, *Veri rari*, & *capitata* *ferrati*.

De brassica duplici campestri Clusii agemus sub titulo *Perfoliata* siliquosq; Caules siue brassicas, quas Aduersaria tradunt diuersas, sunt hæc:

Alba, sessilis, glomerata, aut capitata, Lactucæ habitu.

Eadem conuoluta & arctè occlusa, apud Belgas, rubro colore, enematibus aptior.

Sabaunda, vulgò *Sauoye*, patula & minus occlusa, foris virens, intus allicans.

Racemosa non globosa, vulgò *Italice Cauli flore*, siue florida Pompeiana.

Laciniosa alba, & Rubra Cumanæ vulgarior.

Nigra, vndantibus, crispis & laciniosis foliis.

Marina multiflora, Sylvestris, monospermos.

Caulorapa, brassica peregrina, medio caule turbinata & rapata.

Obseru. Brassica vulgaris satiuæ, capitata, florida botrytis tenuifolia, laciniosa. Et Leon. Plant. Lactuca satiuæ sessilis, siue capitata: vulgaris satiuæ, alba, sessilis, glomerata, aut capitata, lactucæ habitu: patula crispa Sabaunda æstiuæ: Sabaunda hyberna, florida botrytis, marina sylvestris multiflora monospermos: Rapa Brassica peregrina, caule rapum gerens, tenuifolia, laciniosa, & fimbriata. Dalech. apud Hist. Lugd. Brassicæ tria prima genera facit. Brassicam satiuam, sylvestrem & marinam. Nobis relictis duabus posterioribus de satiuæ hinc tantum sermo sit. Diuidit autem satiuam in albam & rubram. Albæ septem tradit species. Albam vulgarem seu læuem satiuæ: Albam crispam, Capitatam albidam, Capitatam polycephalon, Pompeianam aut Cypriam, Brassicam floridam Dodonæi, Asparagoden, & Raposam. Rubræ agnoscit species 4. Rubræ speciem primam, quam Cumanam vocat, & Brassicam læuem Catonis, eamque primam omnium à Fuchio descriptam esse dicit: secundam, quam Dodon. Brassicam Lacuturtem appellet: Tertiam, Dodonæo *sauiendy* Lat. Apianam dicam: & quartam quam Dodon. nigra. sed Fuch. Crispam & *sauiendy* Apianam à similitudine Apii cognominet. Huic insuper adiungit Crispam Tragi, & Tenuifoliam laciniatam L. belii, cuius gemina varietas Brassicas suas Taberna in duo primum distrahit genera: in domesticum siue satiuum, & sylvestre, de quo post. Satiuæ aliud esse læue, idemque duplex, ex viridi album, & rubrum. Aliud crispum, capitatum aliud: aliud proliferum flondum, Italicè *Cauli fiori* dictum. In specie quidem recenset has. Brassicam 1. foliis *fraut* 1. Brassicam 2. foliis *fraut* 2. Brassicam rubram *Kotter fol*. Brassicam capitatam, *Cappes* *fraut* / *Cappes fol*. Brassicam capitatam rubram *Kotter Cappes*. Brassicam crispam *fraut fol* *fraut* Brassicam proliferam, *Büschel fol* *fraut*. Brassicam crispam proliferam, *Büschel* *fraut fol*. Brassicam proliferam floridam *Blümen fol*. Brassicam Anglicam, *Englisch fol* *fraut*. Brassicam Sabaudam *Sapoych fol* de qua dubitamus an eadem sit cum Brassica capitata rubra: Brassicam Sabaudam crispam, *Sapoych* *fraut fol* *fraut*. Brassicam cophosam, *Büchel fol*. Brassicam Seliniam latifoliam, *Breyt* *fraut fol*. Brassicam Seliniam angustifoliam, *Schmel* *fraut fol*. Caulorapa

Totum 14

pum, siue Rapocaulum, *Rüben fol*, & Caulorapum longum, *Langrüben fol*, quas nos non separamus, & Brassicam rapicaulem inscribimus. De quibus omnibus suo agemus loco, vt & G. Bauhini 26. speciebus, ac etiam Hadriani Iunillex, inter quas & marinam numerat.

Brassica olus est vulgatissimum, atq; Cæsalp. flores pallidi aut candidi, color alius virentior est, aliis candicans: aliis ad purpureum vergens: crispitudo & læuitas tum in genere virenti, quod nigrum vocatur, tum in candido reperiuntur. At purpureum nequaquam crispum adhuc visum est. Omnium crispiss. inter nigra reperitur: Plinio Sabellicum: Theoph. Crispum. In hoc genere Selinida & Apiana Plinio. Candida & purpurea breuiore caule, sed qui magis crescit in caput foliis rotundioribus: Crispa inter candidas crescit in caput oblongum, candida, tenerrima. Læuis non nisi ex iure pingui paratur. De hac Plinius inquit, læuis constat foliis à caule exeuntibus: vnde Caulodis dicta est, nullius in medicina momenti: hinc sumptum vulgare nomen *Cauli* apud nos. Quædam in caput rotundum crescunt *Caputius* vocant. Plinius Cumanum vocat. Quibusdam caulis in caput extuberat Rapi similitudine vulgò *Torturæ* vocant &c.

Kräut (brassica) Græci, quasi *Kräut*, inquit Suidas, quod pupillas oculorum, quas Græci *Kōpē* vocant, hebetet. In qua sententia fuit Columella cum scribit.

Nunc veniat quamvis oculis inimica *Cotambli*.

Et melius *Kräut* quasi *Kräut* dicta est, quod *Kräut* *duch* vel rectius *arric*, id est, quod crapulæ satietatique aduersetur, vt dicitur. Græci veteres etiam (vt dictum) *πάρα* vocarunt, ob mutuam quandam amicitiam & affinitatem vtriusque leminis, vetustioris præsertim, vtramvis plantam generandi. Nicander Colophonius in Glossis apud Bæotos *πάρα* Brassicas nominat ait. Hoc tamen Dalech. non ad alias, quam capitatas, vel eas, ad quarum radices velut Rapum extuberet, refert. Brassica à Latinis appellatur, quasi præfeca, inquit Varro, quod huius scapus minutatim præfecatur: siquidem nunc totum, nunc cymoso caule spectatur. Sunt qui dictam existiment quasi passicam, quod ex caule minutum præfecatur vt passa fiat, vel *am rē* *πάρα*, id est à vorando dictam verisimile est. Estur enim tota à plebecula, tum cruda, tum cocta, vel muria *fraut*: à Germ. fol. Belg. fol. Gall. *Cheux*. Ital. *Cauli*, *Caulo*: *Fol*. *Verca* *Colbos* Angl. *Colz* / *Colwort* res: Hungar. *Dorcs* *kaposta*: Boh. *kaposta* & *Kely*.

Cæterum, Olus hoc Lachrymis Lycurgi à Libero patre vitibus adalligati natum prodidit Nestor, in eo libro qui Alexicepos inscribitur: perniciali forsitan eum ea (Viti) odio flagrare hisce fabularum intolueris innuens. Vitis enim & Brassica tantâ laborant discordia, vt si in agris olus hoc affitum Viti proficiat, vel vitium exilius proferat, vel ipsa confestim marcescat, vel certe sarmenta eius contabescant. Tam pertinax inter has plantas inimicitia, vt si defluxionis impetu vna procidat, aut laxior in fauces decumbat, iniecto capiti Brassicæ crudæ succo in excelsum oris protinus resiliat. Si Brassicæ fuerit vicina Vitis, luxuriantes eius palmites potius repandi curabuntur, quam recti velint propius accedere intestinis non immemores discordiæ. Similiter si quis feruescenti in olla Brassicæ vini paululum iurtatim instillauerit ne amplius quidem excoctetur, sed suis viribus defuncta ad perniciem

Lxx 4

Notanda
linguae

trahetur. Vitem vinam oleris huius odore lugari
Theophr. affirmat, assistamque ad olus diffugere
Vatro tradit. Quin & brassicâ cotrumpitur in
dolio vinum sapore & odore, quod setz foliis
demeritis restituitur. brassicam inter olera, vt le-
gere est apud Athenzum Mantin [vatem] Pri-
sci vocarunt. Non autem solus Menander brassi-
cam appellavit Sacram. Est enim apud Hippona-
ctem in lambis dictum huiusmodi:

*Elapsus ille supplex Brasicam adorabat
Septifoliam, aut eam succosam Pandora
Sacrificabat Thergeliis, antequam Pharmaceum bi-
beret.*

Zones iureiurando post Brassicam suam fidem
adstrinxisse, constat ex sequentibus, Ex multis
nominibus per Brassicam, te maximè diligo, in-
quit Ananius Teleclides in prætioribus, per Bras-
ficas hoc iuro, dixit, Epicharmus in terra & ma-
ri, itidem per Brassicam hoc asseuero. Eupolis in
Baptis, Per Brassicam ita est. Iusiurandum verò
Ionicum hoc videbatur: nec absurdum fuit per
Brassicam delesasse, quidam, cum Zeno Cit-
tensis, qui Stoicam sectam condidit, imitatus
iureiurandum Socratis per canem conceptum,
per Capparim iurauerit, ut Empodus autor est in
suis commentariis.

Local & symptoms.

Brassicae in hortis passim coluntur. Frigidis vero & pluviolis positio earundem optima. Salsis etiam aquis inuari brassicam, & iis rigatam meliorem fieri tradit Theophrast. quare nonnullos nitro aquae permisto aspergere brassicam, ut Aegyptios, atque ita multo dulciorem tenerioremque effici, sicuti & si priusquam coquatur, sale commaceretur, Martialis nitrata aqua viriditatem conservari scribit his versibus.

*Ne tibi pallentes moneant fastidia Caules,
Nitrata viridis Brassica fiet aqua.*

Palladius nitratam aquam, sed nitrum ipsum inspergi iubet his verbis: Celerius coquitur virore seruato, si dum est trium vel quatuor foliorum, nitrum tritum cribello desuper spargas, ut speciem pruinæ candentis imitetur. Brassica autem Plinio ex Columella toto anno feritur, quoriam & toto secatur. Vtilissimè tamen ab æqui noctio Autumni. Transfertur cum quinque foliorum est. Cyma à prima sectione præstat proximo Vere. Hic est quidam ipsorum caulium delicatior teneriorque cauliculus, Apicii luxuria, & per eum [perinde] Druso Cæsare fastiditus [blanditus Vet.] non sine castigatione Tiberii patris. Post Cymam ex eadem Brassica contingunt æstiuæ, autumnalæque cauliculi, mox hybærni, iterumque Cymæ. nullo æquè genere multifero, donec sua fertilitate consumatur. Tertia circa Solstitium, ex qua si humidior locus est, æstate, si siccior, Autumno plantatur. Humor similisque si defuere maior saporis gratia est: si abundantè, latior fertilitas. Fimum asininum maximè conuenit. Est hæc quoque res inter operageneæ, quapropter non pigebit verbosè persequi. Præcipuus sit caulis sapore ac magnitudine, primum omnium si in repastinato seras: dein si terram fugientes cauliculos feces, à terraque proceritate luxuriosa attollentes se, exaggerando altius accumules, ita ne plus quàm cacumen emineat. Tritianum hoc genus vocatur, his computabili impendio rediòque. Cuiuscunque autem generi pruinæ plurimùm suauitatis conferunt: & nisi obliquo vulnere defendatur medulla, plurimùm nocent. Semini destinati non secantur. Est etiam sua gratia nunquam plantæ habuim excellentibus: halmioidia vocant, quo-

niam nisi in maritimis non proveniunt, coniungitione quoque longinquae viridibus adhaerent. Statim desecti ita ne humum attingant, in eadem olei quam proximè siccatos, obturati quoque condantur, omni spiritu excluso. Sues qui plantam in transferendo, alga subdita pediculis, nitro trito, quod tribus digitis capiatur, celeritorem ad maturitatem fieri putent. Sunt qui semine trifolii nitrumque simul tritum aspergant foliis. Nitrum in coquendo etiam viriditatem custodit: aut Apiciana coctura, oleo ac sale, prius quam coquantur maceratis. Est inter herbas genus inferendi, præcis germibus caulis, & in medullam semine ex aliis addito [abditis &c.]

Quid autem sit Cyma in brassica declarat
dem Plinius. Cymas, inquit, à prima sectione
præstat proximo Vere. Hic est quidam ipsorum
caulium delicatior, teneriorque cauliculus.
paulò post. Post Cymam ex eadem brassica con-
tingunt æstivi, autumnalésque cauliculi, mox
hyberni, iterumque Cymæ. Celsus lib. 17. c. 17.
Cymas, inquit, seu cymata præteneros dicimus
in brassica præcipuè coliculos. Vere apparent
progerminantes, velut æstivæ planè sint, id est,
fœtus, ducta translatione à ventrem ferentibus
fœminis ad brassicam, quæ ineunte Vere, cum gen-
succo, & cum plurimum cymosa sobole præstat
coliculos enititur. Cymæ, inquit Ruellius, sunt
quidam scaporum delicatiores teneriorésque co-
liculi, quos à prima sectione præstant. Nec im-
fugit recentes quorundam olerum germinatus
tutionésve, velut Armoraciorum, Sinapi, Napo-
rum, Rapi, Cymas classicis Authoribus appella-
ri. Cyma quoque, licet muliebri sexu frequenter
soleat usurpari, nonnunquam genere neutro
Græcorum imitatione legitur, ut apud Columel-
lam in carmine, quod hortorum cultui nomen
pauit.

Tunc quoque conferitur, soto quæ plurima terra
Orbe virens, pariter conferitur plebi, regique
perbo:

Frigoribus caules, & Veri Cymae a micat.

Et quod Galenus adnotauit καὶ αὐτὸς πρὸς τὸν Παννύχιον, ὅτι
 συναίρειται τὸ δὲ περιττωματικὸν ὅταν καὶ, ἀνὰ τὸν
 κύηματ', &c. i. e. Brassicæ igitur germen, quod
 [brassicæ germen] nōnulli καὶ αὐτὸς nominant, per
 contractionem nominis trissyllabi κύηματ', &c.
 Eadem cymata prototomi caules appellantur à
 Galeno, quo loco etiam corrupta sint vulgaria per
 exemplaria, quæ habent ἀγροτικὰ καὶ ἀγροτικὰ
 καὶ αὐτὸς δὲ τὸν διδωσκὸν ἐν τῇ ἡλικίᾳ τῇ, non dubitamus
 esse quin legendum sit ἀγροτικὰ καὶ τῇ, & cetera.
 Id est, Prototomi caulibus decocti cyathos duos
 ieiuno ad dies nouem exhibitos. Cuius auxilium ab
 Archigene ad renum affectiones præscriptum effi-
 cacia, & prototomorum caulium lectio à Dio-
 scoride confirmatur τὸ δὲ αὐτὸν (ἀρχιγένης) κύημα, in-
 quit, ἀγροτικὸν καὶ τῇ, &c. ἀγροτικὸν δὲ τῇ
 Id est, brassicæ Cyma stomacho commotior: qui-
 dem est, sed acrior, & magis urinam citior.

Eorundem caulium meminit & Martialis.

Et faba fabrorum, puerorumque ludra. Item,

Quem mihi boletii dederint tam nobile no-
men.

Præterea, pueri huiusmodi sunt cæcæ.

Appellatur autem prototomi à prima sectione
ac casura, quando videlicet ad sextam genera-
tionem augelescentes succiduntur, et in ciborum
vsum veniunt. A Mascello tales Haplofiles à
tenacitudine, Græca appellatione, dicti sunt.

Quod autem Plinius ait. Sunt qui semen Tri-
folii aspergant foliis: hoc dudum ex Constanti-
na C.

gata naturaliter ebrietati resistere ait.

Apud Græcos porro aded frequentis fuit in cibo vsus Brassica, maximè quæ *καυχή* dicitur, vt bis coctafastidini coeperit, & apud Apicios in prouerbium abiierit, *sic καυχή* habet, quo etiam hodie vumur, cum rem iterum atque iterum repetam, non sine molestia, significare volumus.

Quid si hæc eadem illa sit, quæ tot exercuit, imò ferè occidit, Grammaticos, illo Satyrnici senariolo vaticinante quantum crucis nostris olim Criticis poneret.

Occidit miseris Cræmbe repetit a magistros

Antequam autem Medicos populus Romanus reciperet Brassicæ sexcentis annis ita vsus est, vt nullus morbus oriretur quem non hoc oleret, Marco Catone id annotante, curaret. Ex quo vires eius persequi par esto.

Brassica omnibus oleribus antè stat. Eam esto, ait Cato, vel coctam, vel crudam. Crudam si edas, in acetum intingito, misticè concoquit, aluum bonam facit, lotiumque promouet, ac ad omnes res salubris est. Si voles in conuiuio multum bibere, cenareque libenter, ante cenam esto, crudam, quantum voles ex aceto. Et item vbi cenaueris, comesto alia quinque folia, reddent te quasi nihil comederis, biberisque, bibesque, quantum voles. Vt aluum deniciat quomodo præparanda & edenda sit docet. Si verò ægri lotium it, Summo Brassicam, inquit, conuicito in aqua feruente, coquito paulisper, vt subcruda fiet, postea aquam defundito non omnem ed addito oleum, & sale, & Cymini paululum inferue facito paulisper, postea inde insculum frigidum sorbere, & ipsam Brassicam esse oportet, vt quamprimum excoquat, quotidie id facito. Quæ, vocatur *καυχή* hæc septem habet bona in comestura. Et primum scito, de omnibus Brassicis nulla est Cræmbe tertia medicamento. Ad omnes tumores, ad omnia vulnera eam contritam imponito. Hæc omnia vlcera purgabit, sanaque faciet sine dolore, tumida concoquet, vulnera putrida cancroque purgabit, sanosque faciet, quod medicamentum aliud facere non potest. Verum priusquam imponas, aqua calida multa lauat. Postea bis in die contritam imponito. Ea omnem putorem adimet. Si cancer ater est, is olet, & sanem spurcam mittit. Si albus, purulentus est. Sed si fistulosus, subtus suppurat sub carne. In ea vulnera huiusmodi tere brassicam, sanum faciet: nam optima est, ad huiusmodi vulnera. Et luxatum si quid est, bis die calida foueto, brassicam tritam apponito, citò sanum faciet. Si bis die apponitur, dolores auferet, & si quid contusum est, erumpet, si brassicam tritam apposueris, & sanum faciet, & si quid in mammis vlcus natum, & carcinoma, brassicam tritam apponito, sanum faciet. Et si vlcus acrimoniam eius ferre non poterit, formam hordeaceam misce, ita apponito. Huiusmodi vlcera omnia hæc sana faciet quod aliud medicamentum facere non potest, nec purgare. Et puero, & puellæ si huiusmodi, farinam hordeaceam addito. Et si voles eam esse, confectam laua siccam, sale ac aceto sparsam esto, salubris nihil erit. Quò libentius edas aceto multo spargito, menthani addens siccam, & rutam, & coriandrum sale sparsam paulò libentius edes. Id bene faciet, & mali nihil linet in corpore consistere, & aluum bonum faciet. Si quid antea mali intus erat, omnia sana faciet. De capite & de oculis om-

nia deducet, & sanum faciet. Hanc manè esse oportet ieiunium. Et si bilis atra est, & si lienes turgent, & si cor dolet, & si iecur, aut pulmores, aut præcordia, vno verbo, omnia sana faciet quæ intus dolent: eodem sulphurum intradito, bonum est. Cum venæ omnes, vbi sufflatæ sunt ex cibo, non possunt perspirare in toto corpore, inde aliqui morbi nascuntur, vbi ex multo cibo alius non it, proportione Brassicæ si vteris (vt ite moneo) nihil istorum vsu veniet ex morbis. Verum morbum articulare nulla res tantum purgat, quantum Brassica ciuda, si eam edes cum ruta, & coriandro concisam. Sic & Lascepium intratum cum Brassica ex aceto oxymelli, & sale sparsa. Hæc si vteris, omnes articulares morbos poteris expellere. Nullus sumptus est, & si sumptus esset, tamen valetudinis causa experiret, quam manè oportet ieiunium esse. Omnis qui infirmus est, hæc eadem curatione sanum facies. Verum assam Brassicam, & vinctam caldam salis paululum dato homini ieiuno. Quam plurimam ederet, tam citissime sanus fiet ex eo morbo. Formina quidem molesta erunt, sic scito. Brassicam macerato bene, postea in ollam conuicito, deferuefacito bene, vbi cocta erit bene, aquam defundito. Ed addito oleum bene, & salis paulum, & cuminum, & pollinem polentæ. Postea bene seruefacito, vbi serbuerit, in cauum indito. Dato edat si poterit sine pane, si non, panis parum ibidem madescat, & si febrem non habebit, dato vt vinum atrum bibat, citò sanus fiet. Et hoc, si quando vsu venerit, vt quis debilis fiet, hæc res sanum facere potest, si brassicam edet ita vt supra scriptum est. Et hoc amplius: Lotium conseruato eius, qui Brassicam essitauerit, id calefacto, citò hominem demittito, citò sanum facies. Hæc cura, exper. um hoc est: item, pueros pusillos si laues eo lotio, nunquam debiles fient: & quibus oculi sunt parum clari, eo lotio inungito, plus videbunt. Si caput aut ceruices dolent, eo lotio calido lauito, desinent dolere. Et si mulier eo lotio locos fouebit, nunquam si virosi fient. Hæc inter alia Cato, quæ malimus formali eius Minerva reddere, ne quid verborum eius deperiret, aut aliquid in dimentum sententiæ omitteretur, aut mutaretur, quod dum nitori orationis consultum volunt, fieri conueit.

Brassicæ laudes, inquit Plinius, longum est exequi, cum & Chrysippus Medicus priuatim volumen ei dicauerit per singula membra hominis digestum, & Diarchus: ante omnes autem Pythagoras & Cato non parca celebrant. Cuius sententiam vel ed diligentiùs persequi par est, vt noscatur qua medicina vsus sit annis DC. Ro. populus. Cato crispam maximè probat, dein leuem grandibus foliis, caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus, oculorum caligini scintillationibusque, vel stomacho, præcordiis, crudam ex aceto & melle, Coriandro, Ruta, Mentha, Lascepi radicali, sumptam, scetabulis duobus matutino: tantamque esse vim, vt qui terat hæc, validiorem fieri se sentiat. Ergo vel cum his tritam, sorbendam, vel ex hoc intratum sumendam. Podagra autem, morbisque articulis illini cum Ruta, Coriandri, & Salis mæca, ac hordei farina. Aqua quoque eius decocta, noua articulibusque mirè iuari. Si foueantur vulnera, & recentia & vetera, etiam carcinoma quæ nullis aliis medicamentis sanari possint. Fou-

ueri

ueni prius aqua calida iuvet, ac bis die tritam im-
poni. Sic etiam fistulae eluxatas, & tumores ego-
tari, quique discuti opus sit. Infomnia etiam in-
guis que tollere decoctam, si ieiuni edant quam-
plurimam ex oleo & sale. Tormina si decocta
iterum decoquantur, addito oleo, sale, cumino,
polenta. Si ita sumatur sine pane, magis profu-
turam. Inter reliqua bilem detrahi per vinum
nigrum potest. Quin & urinam eius qui brassicam
extrahunt, asservari, colesctamque nernis reme-
dio esse. Verba ipsius subiiciam, ad exprimen-
dam sententiam. Pueros pusillos si lanes ex ur-
ina, nunquam debiles fiunt. Auribus quoque ex
vino succum brassicæ tepidam instillari suadet.
Idque etiam tædiant audientium prodesse asse-
runt. Et impostiones eadem sanari sine huiuscere.
Græcorum quoque opiniones iam & Catonis
nulla potest convelli, in his dontaxat quæ ille
præsternit. Biles detrahere non percoctam
potant. Item alium solvere, eandemque bis co-
ctam sistere. Vino aduersari, ut inimicam vi-
bus. Antecedente in cibis cauere ebrietatem po-
tea sumptis apulam discuti. Hinc cibum & o-
culorum claritate conferre multum. Succum vero
trudæ vel angulis tantum adis cum Attico mel-
le, plurimum. Facillime concoqui, ciboque eo
sensu purgari. Eratistrati schola clamat, nihil esse
vilius stomacho, nervisque, ideo & paralyticis,
& tremulis dari debet: & sanguinem excreanti-
bus, Hippocrates colicis & dysentericis bis co-
ctam cum sale. Item ad tensesionem, & renum cau-
sa: lactis quoque vberitatem puerperis. hoc cibo
fieri iudicant, & purgationem feminis. Crudus
quidem caulis si mandatur, partus quoque é-
mortuos pellit. Apollodorus aduersus fungo-
rum venena semen aut succum bibendum cen-
set. Philistion Opisthotonici succum ex lacte
caprino cum sale & melle. Inuenio & à poda-
gra liberato edendo eam, decoctæque ius bi-
bendo. Hoc & cardiacis datum & comitialibus
morbis addito sale. Item Spleneticis in vino albo
per dies 40. Ictericis, nec non & phreneticis ra-
dicis crudæ succum gargare, eandem bibendumq;
demonstrat. Contra vero singulis cum Corian-
dro & Anetho, & melle ac Pipere ex aceto, illi-
tam quoque prodesse inflationibus stomachi. I-
tem serpentium acibus, & sordidis viceribus ac
vetsus, vel ipsam aquam cum melleacea farina:
succum ex aceto vel cum Fæno Græco. Sic aliqui
& articulis podagrisque imponunt. Epinyctidas
aut quicquid aliud serpit in corpore, imposita le-
uat. Item repentinæ caligines: hæc & si man-
ditur ex aceto. Suggillata vero & alios luo-
res pura illita. Lepras & ploras cum alumine
torunda ex aceto. Sic & fluentes capillos reti-
net. Epicharmus testis & genitalium malis hæc
vtilissime imponi assent. Efficacius eandem cum
Paba trita. Item conuulsis cum ruta. Contra ar-
dorem febrium & stomachi vitia cum ruta senti-
at: & ad secundas. Et maris aranei morsus, solip-
pum aridorum farina alterutra parte exinanit.
Et omnibus brassicæ generibus suauissima est
cyne, etsi trauis habetur, efficiens in coquendo,
& renibus contraria. Illud quoque non est o-
mittendum, aquam decoctæ ad tot vsus lauda-
tam ferere humi effusam. Scirpium brassicæ ari-
dum cinis, inter caustica intelligitur. Ad co-
xendæque dolores cum adipe percutitur. At
cum Lactis & aceto in vitem psilopi edulis
mixtos pilæ, vel alios prohibet. Bibula & cum
oleo subferuere, vel per se elixis ad conpul-
sionem totius, & per singulas ex alto. Nulla ergo

sunt crimina brassicæ: imo verò apud eodem a-
nima grauitatem facere, dentibus & gingiuis
nocere: & in Aegypto propter amaritudinem
non estur.

Sed de brassicæ facultatibus differit Galenus
his verbis. Brassicæ succus facultatem habet pur-
gatricem, corpus autem ipsius communi necessi-
tium ratione sistit magis, quam ad deiciendum
incitat. Quam igitur quæ in ventre continen-
tur excernere voluerimus, & propinquo cacabo
in quo cocta cum aqua fuerit, extraham ipsam
propius in vasa, in quibus oleum cum garo pa-
ratum fuerit, conicere conueniet: bibula autem
retulerit, si saltem loco garo sumptis. Quod si
humentem alium siccare voluerimus, priorem
aquam, ubi Brassica mediocriter cocta videbitur,
effundentes, aliam calidam mox iniiciemus: ac
deinde rursum Brassicam, quoad conturbuerit, ei
incoquemus, quod non facimus cum ventris de-
iciendi gratia sumitur: volumus enim hæc case
proprium ipsius succum omnem non depone-
re, sed quoad maxime fieri licet, retinere. Porro ni-
hil quod coquitur proprium succum seruare om-
nino potest: quin potius omnem abicit, si co-
ctum diutius fuerit: brassica paucum habet ali-
mentum, & edulium est non firmum, sed laxum.
Succum habet non probum, sed Lactis sed pra-
uium & graueolentem. Quod verò ad vicia at-
tinet, nihil ipsa, quod sciam, insigniter neque
promorat, neque moratur, nisi sit germen quod
nonnulli aduocant nominant, minus quam brassica
ipsa siccat, tametsi aliorum oleum cuius tempe-
raturæ ut plurimum est quam lassa siccare, per-
tissimum quum iam prope est, ut semen pro-
fundant. Et, brassica esculenta, desiccandi vim
habet, tum eis, tum foris imposita, non carum
etiam admodum aciem. Alioqui & vicia glan-
nat, & maligna vicia sanat: præterea phle-
gmonas iam induratas, & ægæ solubiles, & ad
genus quoque erysipelas. Eadem facultate
pinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam
etiam in se absterfiorum, quo lepras curat. Por-
ro semen eius potum lumbricis interficere, maxi-
mè brassicæ Aegyptiæ: quanto scilicet ea tem-
peratura siccior est. Sanè amara qualis semen
particeps est: sicut videlicet alia omnia medica-
menta, quæ ad lumbricos idonea sunt. Eadem
facultate ephelidas & lentes, & quæcunque
modicam absterfionem possulant adiuuat. Por-
ro caules brassicæ combusti cineres efficiunt ad-
modum desiccantes, ut videlicet iam de causti-
cam vim participant. Hac ratione ei veterem
dipem commiscentes: ad inueteratos lacerum
dolores, & si quid eius fuerit generis, adhiben-
nam valenter digerens medicamentum effi-
cit. *Hæc Galenus.*

Simæon Sedæ: Malum, inquit, & melancholi-
cum succum Brassica procreat, vitum habet, &
somnium per tumultuosa infomnia turbat.
Succus eius aliquatenus purgat: corpus verò
eius ventrem sistit. Quapropter in quibus hu-
mentem alium siccare volumus, ipsam modice
decoquentes, aquamque primam abicientes,
confestim alteri aquæ seruandæ indimus: nihil
enim neque æris, neque frigida aquæ quod bi-
coquitur tangere debet. Aestiva Brassicæ prioris
succi est quam hyberna. Vriam ducit, lum-
bricos interficit, & ut quæ ex vicia apula sub-
stant auxiliatur. Rectus autem ab humiditate ot-
tanti hebetudinem linat. Cocta cum pingui ta-
ne, plurimum horæ æque vtilis amittit. Floris
proprieque viciae succum aditale conuenit.

vero impositus, & mulieres concipere prohibet. Pulmonem laedit. Tradunt quoque si ante alios cibos assumpta fuerit, ebrietatem arcere. Et quod eius succus cum melle sumptus, magnificè deflectiones vocis iuuat. Vulneribus imposita ea conglutinat, & malefica vlcera & induratas inflammationes sanat.

Brassicae semen crassiusculè contusum, inquit Matthiolus, & in carniū iure seruicfactum, potumque vnā cum ipso iure colico dolore laborantes praesentaneo remedio iuuat. Brassica tormina discutit, si his edatur cocta, addito Cymini semine, Sale, Oleo, & hordeaceae farinae polline: praesertim si sine pane deuoretur. Idem facit ius decocta cum vetere gallo. Idem prodest iecinorosis, lienosis, & renum calculo laborantibus. Prodest percocta tabidis, si frequenter edatur. Succus ex melle coctus visum clarificat, angulis tantum oculorum illitus. Datur succus vtiliter potandus aduersus fungorum venena. Cocta, & longo pipere aspersa vnaque enim iure sumpta nutritibus lactis vbertatem praebet. Caulium medulla ex cremore amygdalino decocta, & cum melle in eclegmate parata, datur lambenda magna vtilitate anhelosis.

Brassica, ut scribit Cardanus, triplici nobilitate praestat, nam cibus est & medicina, aded ut Romani non aliam nouerint tam in externis, quam interioribus morbis: Vi tam egregia, ut ingesta vasis in quibus aqua seruere solent, crustas ab illis auferat: paribus enim tenuibus & nitro similibus praedita est. Sapore aded suauis, ut à plenisque nobilioribus edulis praeratur.

Ceterum scribente Dodonzo, Brassica omnis resiccantem & adstringentem facultatem habet: atque vnā nitrosam quandam vehementius abstergentem qualitatem: hanc autem succus aut decoctum eius sibi vendicat: substantia siue brassicae corpus adstringentem & resiccantem retinet. Deponit etenim brassica decoctione nitrosam hanc qualitatem quae succo ac humido eius insidet: quam omnem aqua, in qua primum decoquitur, ad se pertrahit. Quam ob causam decoctum eius aluum mouet: veluti & succus si bibatur. Abiecto autem primo iure in quo decocta est, aluum brassica siccatur & adstringit: alimentum autem corpori praebet exiguum: succum vero ingenerat non probum, ut pote crassum ac melancholicum, minus tamen crassum aut vitiosum, quae albidae sunt: quae idcirco & alius praestant.

De Brassica Baptista Fiera sic cecinit.

Iam veniat folio Chrysippi Brassica crispa,

Vel patulo & leui, vel glomerata coma.

Prima saluifera, & ventrem lenire parata,

Bulliet modico si tamen igne, placeat.

Omnibus ardor inest grauior tum & esca secundis,

Ne capiti nocent vina superba premunt.

Exumidam referant vesicam, agrumque lenem.

Hepar & obstructum fumi cumque samur.

Arida Socraticam pareret ni Brassica bilem,

Iure erat in morbis omnibus illa satis.

BRASSICA CAPITATA ALBA.

Sicuti vlt frequentissima est brassica alba scapitata, ita in hoc genere prima nobis describetur.

Caulē ergo hae producit crassum, albicans, crasso cortice tectum, medulla parum acti &



subdoli: Folia quae primum erumpunt lata habet & ampla, subrotunda, nullis effata dignis laciniis sinuata, longis crassis pediculis harentia, costis verisimiliterque albicantibus intertexta. Quorum inferiora auiola, aut fortè decidua, siccant, relinquunt densa vestigiorum sene rugosam & in-

qualem: Superna verò quae remanent lata quoque & subrotunda, & ex viridi albicantia & cetera, mutuo incubitu in caput maximum durissimum conglobantur: tam arcto complexu, ut difficile separentur. Horum interiora planè albicant. Porro glomer appetente Vere, quo tempore semini ergo transplantari solet, parum dehiscens, è medio caulem erectiorem profert stirpibus luteis aut luteopallidis, quibus delapsis filiqua longae nascuntur teretes, acuminatae: semina parietum medulloforum intersepta claudentes rotunda. Hyemem non durant, nisi contra frigus muniantur. Rei familiari potissimum haec expedita, propter vsum, & quia diutius in cellis adseruari solent. Haec interdum elegantissima naturae varietate ad 50. Capitula minora fert, magni illius glomeris loco, ut inferius specialius tradetur.

Caputium hodie dictum olus, Germ. Caput, brassicae genus est, inquit Cordus, quod Cumanum Plinius vocat: sessile folio & capite paululum, non tamen vbique similiter provenit triticiam, imperialem, & quae dicitur a capite, suspicatur esse H. lun. quam Nicander nomen nominat à tumidi ventris figura.

Fuch. Icon. Brassicae 4. genus: & hist. brassica 4. sessilis, quam vulgus Caputos caules quasi Capitulos appellat. Nonnulli brassicam albam & caules albos.

Dodon. Gall. brassicae prima species alba: & Lat. in fol. brassica 6. inter albidas 1. quam vulgè Capitatum nuncupari ait: & à nonnullis brassicam imperialem, brassicam Triticiam Plinii, quem appositè notat quod eius Caput terrae aggestione, tale fieri affirmet: quod non aggerando vel accommodando terram tale [pedale scilicet interdum] nascitur, sed sua natura, si tempore & loco idoneis transplantetur, capitatum efficitur. Ipse autem Dodon. olim Fuchianam figuram habebat quam nunc ponit pro rubra, & nouam habet pro alba.

Caulē capitatum [quem Germani Capitos vocant] ego [Tragus lib. 2. c. 53.] latius brassicae genus esse existimo, Quibusdam Caulis Imilis Imperialis dicitur. Alii Caputium capitatum, Caulē capitatum, & simpliciter Caulē vocant, Auicenna Cannabari [quam vocem ego ad Betam pertinere suspicor,] Serap. Cormib vocat. Petrus de Crescentiis, Sambusium, Stephanus de Coruo, Carnebum appellat. Apollin. weiffel & fappio fraht vocat, actonfundere vide-

tur brassicam cum beta.

Gesner. hort. Brassica capitata.

Monach. in Mel. Caules Caputii.

Lobel. & Pen. Aduers. Brassica alba sessilis glomerosa. Obs. Brassica capitata. Icon. Plant. p. 243. Teut. 293.

Est Matthiolo in Diosc. capitata conglomerata in orbem solis, Plinio Lacuturris appellata. Brassica capitata, quæ vulgò Capucci dicuntur. Item hist. Germ. Cappel / Brassica capitata, quædam viridis, quædam alba.

Tabern. Icon. & hist. Cappens aut Cappel / Brassica capitata Caulis capitatus.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Brassica i. siue capitata alba, Lacuturris Plinii videtur: aliis Cumana eiusdem alius Tritiana. Brassica, siue pluribus capitibus conglobata. Hæc non videtur separanda à priore, cuius videtur monstrum.

Czsalp. Caputii.

Hist. Lugd. Brassica capitata albida, Tertia alba Brassicæ species: Gal. *Chou capu*, id est Caulis capitatus. Plinio Lacuturris est Brassica ut vult Matth. & Dodon. Brassica Tritiana. Sed verisimilius est Lacuturris nostram esse Brassicam capitatam candidam. Tritianam verò nostram esse Brassicam capitatam viridem. Est & alia Brassica capitata polycephalos. Quidam id tenax, cui semen creditur, ubertati ascribunt, quæ tam copiosum alimentum præbet.

Brassica capitata, Græc. *καυβή κεφαλή*. Germ. Cappel & Cappel / *weiß fôlfrant*. Belg. witte Sluist foelen & Cabuissfoelen. Gall. *Choux cabuz*. Ital. *Cabuzzo*. Caulis Capuccio, Capuzzino. Hisp. *Repollo*, *Colles morrianus*. Angl. Cabbage. Hung. *Feyes Kapozta*.

Copiosè colitur in horto E. C. ac aliis Montebelgardi Brassica capitata: longè maximam vidi Argentinz: Basileæ abundanter colunt etiam in agris & in Alsatia, habent etiam Lugduni: semel vidi Genæ congelatas Ianuario. In Ducatu Wirtembergico ut circa fontem Admirabilem agricæ conferuntur, mense Octobri ostendit mihi DS. Dr. Ronzius in Kircken Brassicam hanc in qua erant ad 50. capita parua magnitudinis Quorum, qualem curauimus depingendam: similem polycephalon dicebat se habere II. Cel. Vvrt. Hortulanus in Gôppingen / tales mihi etiam aliquando in Alsania *hartenschviller* demonstratæ in horto Nobiliss. vini Di. lo. Jac. Vvaldner à freudstein compatriis mei. Hoc genere in plerisque Germ. partibus, Bavaria potissimum autore Fuchsis per integrum anni curriculum quotidie victitant. Albæ & rubræ nusquam maior proventus & fertura quàm apud Belgas, ut testatur Lobel. visitur, qui naues onustas in vicinas Germaniæ, Angliæ & Hispaniæ regiones deuehunt.

Semen Caulis capitulati teres & fuscum, quod non perueritum sit, tempore quadragesimæ Martio mense terræ mediocriter pingui committitur, è qua sexto aut septimo die erumpit, ac nisi frigoribus aut pulcibus terrestribus opprimatur, brevè tempore augetur noua illa eruptio. Quamprimum verò recentes illæ & teneræ plantulæ [Germani *Setzling* appellant] quatuor aut quinque produxerint folia, id quod in Solstitio æstivali circa Festum D. Medardi fieri solet, tum euelluntur, ac in fasciculis colligatæ aliis regionibus in quibus semen aut perinde prouenire solet, communicantur. Deinceps verò rursus plantantur ex plantulæ, in terra pingui & probè fertiliora. Semen huius oleis peculiari quoque

arte Hortulani elicere solent. Nā capita seu caules capitatos vna cum radicibus euellunt, inque cellis vinariis summa cura conseruant in Martium usque mensem, quo tempore capitulatum olus ad collum usque, hoc est, crassus ille ac callosus caulis, humo rursus infertur. Hoc ubi æstatis vim & calorem senserit, nouos emittit colliculos per capita supernè erumpentes, viridibus & augustis foliis vestitos, Aprilique mense cum & arbores florent, copioso, luteo, & violis simili flore comantes. Porro flos in longas tandem abit siliquas, rotundo & fulco semine refertas.

Hoc olere in Germania in cibo, & hominibus & iumentis nihil frequentius est, Quin ita usus eius inualuit in plerisque locis, ut vulgus hominum maximè eorum qui amplam familiam alere necesse habent, vino potius quàm hoc cibi genere catere velit. Non solum enim stomacho satis facit, ac sementes probè alit, meliore sui & interna parte, præsertim eos qui eiusmodi cibo assueuerunt, sed & exteriora eius folia, cæteræque partes pabulo bubus exhibentur non ingrato. Quamobrem quod ad me [Tragum] quidem attinet, quiquid alii dicant, nolim sanè hoc genus oleis planè contemni, neque etiam facile omnibus indifferenter eum cibum interdicerè consuevit velim, maximè iis qui illo assueuerunt, neque alio per inopiam victitare possunt. Consuetudo enim quæ in naturam sæpenuerò transiit, repentinas mutationes omnino non potest ferre, teste Hippocrate. Hæc tenuioris fortunæ hominibus scribimus quibus per vitæ rationes splendidioribus epulis vesci non licet. Meo certe iudicio Caulis capitulatus benè paratus, conditus & coctus, multò salubrior est, condimentis illis peregrinis, & sumptuosis. Oliuæ inquam, Capparis & Citrorum, quæ omnia ad eos potius pertinere videntur, quibus nihil nisi peregrinum placeret, aspernantibus domestica, quæ ut passim obvia sunt, ita dubio procul magis salutaria. Sed ut palato suo isti blandiantur cæterum tamen est apud plerisque Caulem capitulatum ita in cibo expeti & viurpari, ut ab eo se diuelli non patiantur, ut qui utilitates eius, haud obscureprehenderint. Nemo igitur non nouit caulem capitulatum coctum, maximè cum pinguibus carnibus & suillis, stomachum latrantem compescere, quanquam & in medicina usum suum non contemnendum habeat. Brassica capitulata [ut mon est Germanis] in cibo stomacho æstuantiprædest, quare illa eos qui operas exercent veselconuenit. Vtilis est & ipleneticis, cibi appetentiam inducit, sitim sedat. Folia huius inflammationibus & tumoribus utiliter imponuntur, non aliter atque Betæ. Ius conditæ brassicæ sacris ignibus singulari experimento illitum medetur. Quod ad reliqua attinet vide supra.

Vires & Vitis

Tempor

BRASSICA ITALICA TENERRIMA glomerosa flore albo.

Hæc caule & foliis adeoque tota inter albas candidior, teneriorque videtur: Folia quæque quæ ampla sunt atque rotunda per dilutius virentia candicantibus venis intertextæ sunt, quædam etiam eorum modicè crispæ ac vix contortæ nonnihil rugosæ. Foliortum quoque pediculis breuibibus auticulæ quædam foliaceæ adhærent. Flores albi quadrifolii ut cæterorum quos nonnisi tepidiore Sole illustrata profert, quippe algidi frigoris impatiens, minus arcto so-

Descriptio

rum implexu glomerem laxiorem mirentque efformans. Huius semina sunt vix reliquarum Lautior hac, quippe tenerior, delicatioribus expectita, eorum potissimum qui eius norunt gratiam mentis apponitur.



De hac ni fallor Dodon. Alia capitata, albida quam Sabaudam vocant, oblongioribus capitibus, minusque arcte conclusis, quæ si Vere explicentur, caules emittunt ramosos, floribus albidis speciosos.

Dodon. Gal. Brassicæ 2. species, quæ Sabaudica dicitur Plinio Brassica Lacuturna:

Gall. Chou de Sauoye. Belg. Sauoy solen: Lat. in fol. Brassica 7. Brabantis Sabauda brassica. Lobel. & Pena Adu. brassica patula, Sabauda vulg. intus albidis, foris virentibus foliis, floribus albis. Icon. pl. p. 244. Brassica Sabauda hiberna Teut. 294.

An Matth. in Diosc. brassica crispa: Plinius eam Sabellicam appellari tradidit, quæ crispis admodum foliis, La Cucur modo in se concluditur, intus albicans, tenera, subdulcis, & quæ hæc ætate omnium præstantissima habetur. Item Hist. Germ. Brauß Föl frauß/Brassica crispa.

Figura à Camerario posita, aliam brassicam denotare videtur.

Tabern. icon. & hist. brassica crispa frauß Föl frauß. An eadem brassica Sabauda Saffoyß Föl. Figura est Matthioli.

C. Bauh. phy. brassica secunda siue alba capite oblongo, non penitus clauso.

Hist. Lugd. Brassica alba crispa, brassica Sabaudica Chou de Sauoye. Dodon. Lacuturna, Catonis crispa, Plinio Sabellica.

H. Iun. Brassica Lacuturna Plin. B. Sauoyß Föl. Gall. Chou de Sauoye.

Tempus & locus

In horto Montbelgardii Ill. E. C. V. Viri. excolimus, in quo florentem vidimus Septembri & Octobri. Hanc frigoris admodum impatientem tradidit Lobelius. Hyemis vigorem non sustinet, inquit Dodon. neque ad Ver peruenit, nisi admodum clemens hyems fuerit.

BRASSICA SABAVDA RVGOSA.

Descriptio

Huius folia rotunda, rugosa valdè, ac ita quidem rugis inæqualia sunt, ut singula ceu ex vesticis aut valvulis quibusdam consimilibus congesta videantur, subtus extuberantibus atque prominentibus aversa parte, cuius, ex brevibus pediculis hærentia, color foliorum ex luteolo quodam & atro viret, quæ pallidè viridanibus costis quoque intertexta sunt. Eadem etiam in densum globum coguntur, sed parum, & candicantem, dum extremitates interum ob-



scutis virent. Flores luteus, semina vix in reliquis. Hyemem non fert.

An Dodon. Lat. Brassica Sabauda cuius nomine figuram posuit, quæ non videtur responderedescriptioni.

Tabern. Icon. & hist. Saffoyß frauß Föl/Brassica crispa.

Lobel. Icon. p. 224. Brassica patula crispa Sabauda æstiva Teut. 294.

C. Bauh. Phyt. Brassica 9. siue alba crispa, Matthioli crispa, Lobel. Sabauda æstiva. Quibusdam censetur Lacuturna Plinii: alius eiusdem Sabellica, Matth. Gesner. hort. Lac. Brassica crispa Lugd. Brassica alba crispa Lobel. Brassica patula crispa. Sabauda æstiva Dodon. Brassica Sabauda Tabern. In hac magnam colorum varietatem observavimus: est nivea tota: est quæ candidissima, &c. Hæc Frater. Matthioli crispa an sit eadem cum Sabauda rugosa dubito propter descriptionem à Matthiolo positam quæ respondere non videtur, alii diiudicent, nihil affirmo: Præterea varietatem colorum tantam non existimo cadere in brassicam Sabaudam æstivam, sed potius ad brassicam crispam laciniolam referendam.

Est mihi Montbelg. in horto Ill. E. C. hyemem difficulter proferens: observavi quoque Gæpingæ in horto Ill. E. C. V. Viri. & in Nürsensteig in horto Ill. Comitis.

Locus

BRASSICA RVGOSA, LONGIORIBUS FOLIIS.

Folia ampla sesquicubitalia ex longis pediculis, inferiore parte amicta. Hæc quàm Sabaudicæ scriptæ diutius viret candidiorumque Costarum interceptu, candidior apparet, totaque rugosa, ac veluti sacculis referta est. Tenera quoque magis videtur, nec in capita cogi solet, ut Sabauda flore luteo, hiemem vix fert.

Montbelgardii in horto Ill. E. C. V. Virtemberg. Locus

BRASSICA MULTIFLORA.

Descriptio

Præ ampla hæc quoque fert folia, cubitalia, longiora quàm brassicæ capitata alba, nec ita lata, nulla insigni laciniarum diuisorâ, dilata virentia, quædam etiam colore magis glauco, exteriora præsertim, nervis candicantibus conspicua, per ambitum ex longiuscula distantia denticulata, & veluti serrata. In capite glomeratur, sed mollius, minus denso foliorum incubitu formatum. Intra quorum unum flores dentissimo stipatu prodeunt exigui, pallidi aut candicantes, velut in umbella positi, qui cum Cauliculis suis aspara-



asparagorum tenellis tene-ritudine & gratiâ certare videntur, atque ob id lau-rioribus tan-tum patinis expetiti: Et ipsæ quoque Erucæ, huic apprimè con-colores, sæpè eam depascun-tur, vt pro brassica, brassicæ cadaver re-linquant.

Dodô. Gall. brassica 3. siue Pompeiana: Neoterici Cy-

pria: Ital. *Caulisfiori*: Gal. *Chou fleur*, belg. *Bloem Poolen*. Idem hist. Lat. brassica 8. Caulisfloram nonnulli Cypriam vocitant, ea autem cum Plinij Pompeiana conuenire videtur.

Lob. & Pena Adu. brassica florida aut potius racemosa, vel botrytis Pompeiana. Obs. brassica florida botrytis: Icon. Pl. p. 245. Teut. 295.

Camer. Matth. Germ. *Blüm fôl*: Ital. *Caulisfiori* optima adfertur Genuâ, alius brassica Cypria, qui existimant Pompeianam Plinii: esui optima deli-cata, diu potest hieme in cellis reſeruari. Caulis floridus. Idem horti, brassica Cypria, siue Pom-peiana. Tabern. Icon. & hist. *Blûmen fôl*: brassica prolifera florida.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. brassica 7. siue cauliflora, Pompeiana Plinio: I. Theophr. videtur meminisse, dum scribit genus esse quod nullum aut paruum semen producat.

H. Jun. Brassica Pompeiana Plinii. Cypria Rem-berto. B. Bloem fôle. G. *Choux fleur*. Ital. Cauli flores.

Hist. Lugd. Brassicæ albæ quinta species. Bras-sica Pompeiana aut Cypria. An Gesner. hort. brassicæ genus quod è Syria deservit, *Conabis* seu *Comans* vulgò dictum.

Czsalp. Genus capitatæ brassicæ à flore co-gnominatum, Cauli flores. Theophr. videtur nul-lo semine aut paruo.

Locus

Polyflora brassica sæpius nobis prouenit Montbelgardi, in horto Ill. E. C. Vvrit. ex semine peregrino: verum hieme reponenda, & vix se-men maturum profert. Stutgardiz in eiusdem Chorto copiosè excolitur, & editur, vti etiam in E. C. hort. Gæppingæ: Vidi & in horto Ill. C. in Wiesensteig.

BRASSICA ALBA VULGARIS.

Descriptio

Radix tophosa est, ex qua stipes qui foliis ner-uorumque diuisura, atque intertextu, rubræ quodammodò respondet: folia tamen subrotun-da, ex longis crassis pediculis delicatiora viden-tur, in quibus in circuitu præsertim serraturæ quædam apparent. Tota planta albicat, & cæſio quodam colore obducta est, auriculas habet vti prædictæ. Flos albus est.

Huic altera similis si non eadem quam hortu-lanus diuersam putat, vt pote cuius folia magna,



nonnihil crispata, interna verò quæ ad vmbilicum plantæ magis candicante, aut certè maculis albis insi-gnita, quædam etiam per ambitum leui-ter serrata.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. brassica 6. siue al-ba vel viridis. Trag. brassicæ satiuæ maioris spe-cies altera. Alterum genus purpureo affine for-ma foliorum candidorum ad caulem accedit ca-pitulatum, sed quæ in caput minimè extube-rent. Hoc quoque genus hyemem contemni-ti. Caulem fundit admodum procerum, vt qui vni-cus tot folia suppeditare queat quot ad ferculum requiruntur. Tragus Germ. describit cum rubra: Gesner. hort. brassica alba. Monach. in Mes. Cau-les albi. Lob. & Pena Adu. brassica laciniola al-ba, brassica vulgaris & vulgariss. ex albido & pullo albicans. Matth. Germ. brassica lauis alba, *Grûnweiß fôl*. Hist. Lugd. brassica alba vulga-ris, lauis, satiuæ Theophr. Catonis & Plinii: foliis ex viridi cæſio candicantibus, flore tum luteo tum albo. Czsalp. brassica lauis, Plinio caulodes. Hort. Lusit. brassica alba, *weisser fôl*. Sci. Sefada Byle fâal.

Genus brassica alba hyemem ferebat in horto, in fine Nouembris anno 1569. in ea ap-paruerunt adhuc Erucæ. Monspelii brassicam al-bam cum flore albo copiosè in hortis colunt.

Locus & tempus
Flore albæ

BRASSICA ALBA EXPANSA:

Albæ vulgaris in multis adsimilis esse vide-tur. Verum folia hæc fert ampla, ex longis & auritis pediculis, duorum aut trium serè cu-bitorum, lauis, vix vllis laciniis diuisa, sed tan-tum nonnihil complicata aut conuoluta. Tota planta adeò expansa est ac patula, vt amplissimæ tabulæ confecti possit. Italicam putamus, nec existimamus hyemem perferre posse.

In horto Ill. E. C. Montbelgardi colitur: Octo-bris siue nondum caulem, nedum principium eius apparuit.

Locus & tempus

BRASSICA CAULORAPA.

At rarior multò brassicæ illa species, quæ patulis foliis glomerem nullum facit, ve-rum, quo solo signo faciliè ab aliis separetur, bre-uis caulis, quæ foliorum comæ subest, in rapum esculentum extubetat.

Dod. Gall. brassica 4. hodie dicta Rapæcau-lis. Gall. *chou rane*. Belgic. *rapetocien*. Et Lat. in

Descriptio

fol. Brassica 9. Rapocaulis vulgò. Brassica caule rapum gerens. brassica cuius caulis Rapi in morem extuberat, manditurque subinde medulla, pingui iure incocta Raporum modo, non repe-



rit Matth. meminisse Plinium, nec vetustiores alios.

Camer. Germ. Matth. Rüben fol. Caulorapum. Italorum *Tor-zutos* Plinii Lacuturres. Idem hort. brassica rapicaulis.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. brassica 8. siue gongylodes, Rapitius colis, Catoni fortè.

Caulorapicinnum vetus, que naturæ vidit Scaliger, sed brassicæ radix

sub terra condita fuit, Rapum supra terram in stipite turgescerebat

Casalp. vulgò *Tor-zutos*, Plinio Lacuturres, capite prægrandes. Putat Gesner. hort. brassicam hirsutam Monachis in Mesuem esse genus illud cuius Matth. meminit, tanquam Veteribus ignoti, cuius caulis, inquit, Rapi in morem extuberat. Considerandum an Monachi non intelligent aliam.

Lobel. & Pena Aduers. Caulorapa, brassica peregrina, medio caule turbinata & Rapata. Icon. plant. p. 246. Rapa brassica peregrina, caule Rapum gerens.

Hist. Lugd. brassica 7. siue Raposa, Veteribus incognita [nisi sit Rapitius colis Catonis] *ῥαπιτιος* nominari potest.

Tabern. Icon. & Hist. Rüben föll, Caulorapum. Item lang rüben föll/Caulorapum 2. Nos vnam eandemque plantam facimus, ideòque non separamus.

Brassica pulchra quæ ad radicem magnum habet rapum, esui commodum. Non vique adeò crebra est. Basileæ primum vidi in horto Doctissimi mei Præceptoris Cæli Secundi Curionis. Albam hanc Brassicam habui Genevæ in horto pulchrè virentem Ianuario. D. Dalechampio dicebatur Brassica raposa & *ῥαπιτιος*: Montbelgardi facta in Illust. E. C. VVirt. horto provenit. Obseruavi cùm essem apud fontem admirabilem in wisen steig in horto Ill. Comitiss.

BRASSICA MONOSPERMOS ANGLICA.

Descriptio

MVnere Domini Friderici Meyeri ex Anglia vsque adlata semina habeo, brassicæ monospermæ Anglicanæ, alia nuclei Cerasi magnitudine, alia altero tantò maiora, figura utrinque turbinata, & acuminata, & thorulis quibusdam secundum longitudinem donata, vel aliàs tuberculis asperata, colore cinereo.

Locus

De hac Aduers. inquit, locis est oriunda Angliæ maritimis ad Portlandiam Insulam, sed quia inculta, neglecta, hispidior multò, cibo tamen toleranda: cuius semine iamdiu Medicus An-

glus hac parte exercitatissimus Turnerus nos donat, eamque *urbe-caper*, & *florantiquæ*, vocandam à semine singulari volebat.



Sunt enim in florum pallentium alborum congerie elegantissima, & umbellata, multis in ramis filiquæ breuiores crassiusculæ, quibus singulis singularum inest lemeni. Folia eadem ferme quæ brassicæ nigræ, sed crassiora & lætioris aspectu, & sibris undulatis plicis, que admodum artificiosis.

Lob. & Pena in Aduers.

brassica marina siluestris multiflora monospermos. Tabern. icon. & histor. Englisch föllfraus brassica Anglica.

C. Bauh. phyt. brassica 12. siue Angl. Tab. brassica 18. siue silu. maritima. Lobelio marina.

Hist. Lugd. Brassica marina silu. Monospermos Penz.

Provenit mihi in horto Ill. E. C. Montbelg. ex semine misso ex Anglia per D. I. Gargillum Scotum, ubi multis iam annis durat se propagans etiam surculis, folia valde crassa, quæ interdum rubent: sapor non ingratus.

Locus

BRASSICA TOPHOSA.



TAbern. I. Tabern. Icon. & Hist. bäckel föll/ brassica tophosa. Compilatori more suo pessimo sufficit nudam iconem omissa descriptione proponere. Natalem saltem annotasset, ac ita medium eam inuestigandi rei herbariarum studiosis reliquisset, nec se suspectum figurarum fidarum reddidisset.

BRASSICA ANGLICANA MINIMA nuca.

Meminerunt Aduers. Lobel. & Penz, etiam in Anglia horto pusillam brassicellam, totam nucam, præterquam extremas oras laciniosas sibratæque plicis crispantibus, & undulis

Descriptio

rugosis, purpureis aspersis maculis, quas etiam ad corollas & olfactoriola necdenda dum tenebra adhuc est in hortis colunt.

BRASSICA NIGRA DICTA.

Dodon. Gall. brassica s. qui ait, sub brassica alba comprehenditur brassica peregrina valde, quæ dicitur nigra, *chou noir*. Caulis niger. Ital. *Negre canles*, Belg. *Schmoere foolen*. Lat. brassica s. nigra cognominata, de qua dubitat an ad brucianum Plinii referenda sit.

Figuram ponit Fuchianam, quam olim posuerat pro Crispa, idem facit Hist. Lugd. quæ brassicam nigram Dodonæ vocat.

BRASSICA CAPITATA RUBRA.

Descriptio



Quod folia artinet alba similia quodammodo sunt. At colore magnâ varietate ludunt. Quædam enim atropurpurea, quædam atroviorentia, aut etiam dilutius virentia: nonnulla quoque cælio nebula aspersu glauca sunt: At omnes rubris costis ac nervis intertexta. In caput quoque coguntur. Flores lutei.

Hyemem fert.

Dodon. Gall. brassicæ rubræ 2. species: brassica Lacuturtis, Gal. *Chou tabu rouge*. Belg. *Kooffens & Roode Sluyt foolen*. Lat. in fol. brassicæ altera species, Brabant. *Kooffens* vocant: Latine Rosaceam brassicam dixeris. Dodonæus pro hac ponit figuram quam olim habebat ex Fuchianis pro alba.

Lobel. & Pena Adu. brassica convoluta & occlusa apud Belgas rubro colore enematibus aptior.

Math. Germ. Tabern. Icon. & hist. & Hort. Lusit. *Kott Cappel Fraut*, Brassica capitata rubra.

C. Bauh. Phyt. brassica 4. siue capitata rubra.


Hist. Lugd. brassicæ rubræ 2. species.

Brassicam capitatam rubram habui ex Sultz, ex horto D. Claræ à Rinack uxoris præfecti, quæ plantata in horto E. C. Mörbelgardi tulit pulchra capita colore rubro vario tincta, potissimum hieme reposita. Hiemem facile perfert. In Belgio magnus eius proventus teste Lobelio.

BRASSICA RUBRA VULGARIS.

Descriptio

Procerior hæc reliquis esse videtur. Sripire namque veluti arborefcit alto, duorum, trium, aut quatuor pedum, aut etiam cubitorum, Tom. II.



crasso, atropurpureo, ima parte verrucoso: aliàs singulo, aliàs in ramos diuaticato. Quædam folia fortuito posita stipitata, ex vindi rubentia, aliàs sanguineo rubore aut obscuriore etiam tota persula, non sine obductu nebula cuiusdā glauca: crebro crassum venarum discursu rugosa, patula, sinuataque. Flores lutei cauli erecto hæ-

rènt: quos filiquæ excipiunt palmares, in quibus semen rotundum. Huius folia patula manent, ac expansa. Hyemem perfert: ac sæpè præsertim culta, arboream acquirit proceritatem firmitatemque, ac ita in plureis durat annos. Sæpè etiam laterales producit ramulos. Hyeme potissimum culinis expetita, ubi frigus extrinsecus præfenserit. Ramorum extrema adueniente Vere delicatioribus in acetaria expetuntur.

Trago Lat. & Germ. brassica, foel traht, brassica sativa maior, brassicæ sativæ primum genus.

Fuch. Icon. & Hist. brassicæ 1. genus, brassica lævis: sive Germ. breiter aut grosser foel. Gallis *Choux* simpliciter dicta.

H. Lun. brassica Cumana, lævis, rubra, sive *Al. Breiter Kott foel*. B. *Groote roode foel* Sloore. Gal. *Chou rouge*.

Dodon. Gall. Brassica rubra prima Catoni, Græcè *ῥαβδία*, Plinio brassica Cumana: Gall. *Choux rouge & poly*: Germ. *Breiter roter foelen*/Belg. *Groote roode foolen*. Lat. brassica vulgaris sativa siue prior. Theoph. *ῥαβδία*: Plin. vno loco *ῥαβδία*, alio Cumanam cognominat: eandem & caulodem quosdam vocitare ait: Cato hanc lævem appellat, vulgè *Rubra Caulis*. Dodonæus Gal. Fuchianam habebat figuram, quam nunc ponit pro brassica minore: pro rubra verò novam iconem proponit.

Lobel. & Pena Adu. Brassica laciniosa rubra Cumana vulgarior. Obs. & Icon. pl. brassica vulgaris, Anglis *Keale & Cole*: Gal. *Choux verts, ou colers*.

Math. Ger. brassica lævis, Blatt oder Schlecht foel traht rubra.

Hist. Lugd. Brassicæ rubræ primæ species, florem ferens altero anno, sicut & caulis capitatus. Hæc hyemis frigoribus rarissimè dicitur, gustu aliquantulum amara ac salsa, maxime ubi adoleverit hiememque atigerit.

Monach. in Mes. brassica siue caulis rubra, siue nigra.

Gesner. de coll. stirp. brassica. Tabern. Icon. & Hist. Kott foel, brassica rubra.

C. Bauh. Phyt. brassica 5. siue rubra.

Hort. Lusit. brassica rubra, Brûner foel/rotter foel Roemisch foel. Sel. Boly Schald / Wodre Käl.

Copiosè feritur quotannis passim in hortis Locis & vti etiam in horto E. C. Hanc brassicam per ali-
Aaaa

HISTORIAE PLANTARVM.

quot annos ex semine deciduo in muro è regio
ne fenestratum zdiũ in quibus moror duran-
tem vidi.

BRASSICA CRISPA LACINIOSA

Descriptio



Omnium
hæc ele-
gãtissima fert
folia, ex lon-
gis pediculis
auritis, oblon-
ga, cubitalia,
altiora, nervis
albidis elegã-
ter picta, at-
que multipli-
ci eorum dina-
ricatione in-
textata: ambi-
tu quoque suo
multiplicibus
conuolutio-
num spiris si-
nuato, ita cris-
pave strutti anis
plumas, mili-
tibus gloriosis

cristarum loco expetitas quodammodò repræ-
sentent. Cossæ plerumque etiam dilucè purpureæ
sunt, sicut & ipsi caules stros luteus. In cibo rubris
non inferiores.

Fuch. hist. brassica altera crispa, quæ à similiter
dine Apii *crispifolia*, id est, Apiana nuncupatur.
vulgò Crispus caulis: Germ. Fräuser Föl: Gal.
Choux crispé. Icon. p. 224. brassicæ 2. genus.

Dodon. Gall. brassicæ rubræ quattuor species,
brassica Sabellica. Neoter. Brassica crispa, Gal.
Chou crispé, velg. ghecronfelde Fölen. Et Lat.
in fol. Brassica 3. Crispa: Theophr. *crispifolia* nomi-
nat, atque inter brassicas primo loco refert: Ca-
toni 2. est, Plinio Sabellica. Olim figuram Fuchsi
proponerebat quam nunc pro nigra ponit, & no-
uam exhibet iconem pro Crispa.

Lob. & Pena Adu. Brassica nigra vndantibus
crispis & laciniatis foliis: Obs. brassica fimbriata.
Icon. plant. p. 247. Non reperit Matth. meminisse
Plinium, nec eo vetustiores alios, brassicæ quæ
foliis admodum per ambitum laciniatis, minu-
timque intercisus assurgit.

C. Bauh. Phyt. Brassica 13. siue foliis laciniatis
Fuchsi. Lob. fimbriata. Apud Matth. videtur
mihi Frater sub brassica crispa Sabanda tradere
varietatem colorum insignem, nostre brassicæ
crispæ latifoliæ.

Hist. Lugd. Figuram Fuchsi ponit pro nigra
Dodonæ: brassicæ rubræ 4. species: Nigram Do-
don. vocat Fuchsius brassicam crispam: Gal. *Chou
crispé noir*.

Tempus &
locus.

Montbelgardi habemus in horto P. E. C. Wir-
temb. eam obseruari cum essem apud Fontem
admirabilem in Vvisensteig in horto II. Comit..

Brassica crispifolia præstantior est lœui, inquit
Porta ex Theophrast. quia ficior est, ob id sapi-
dior.

BRASSICA LACINIATA RVBRA.

A Vulgaris rubra descripta vixdum magnitu-
dine variat. Folia potissimum faciunt differen-
tiam, quæ profundis laciniis sinuatis nonnihil

variant, iidem modò in latiores, modò in mi-
nores rursus sectis, vt tota penè crispa videatur
idque potissimum propter minorem laciniarum
contortum. Huius quoque stros luteus est. *Vascula
& semen*, vt in reliquis. Hyemem & hæc suffert
Montbelgardi in horto III. Ex. C. Vvitemberg.
haud secus ac vulgaris illa scripta, eoque potis-
simum tempore mensis expectitur.

BRASSICA LACINIATA ALBA.

Descriptio



Rubra la-
ciniata
haud multum
absumilis pro-
portione est,
non penitus
alba, caule in-
terdum pur-
purascens: cui
folia pallide
viridatia, glau-
ca quedam ne-
bula obducta
sunt. Foliorum
quoque laci-
niz profundè
quidem diuise,
minùs tamen
crispæ. Fert &
hæc hyemem
Montbelgardi
in horto E. C.

estque vt illa flore luteo, sed minùs in cibo acce-
pta, vt hortulanus perhibet.

Tabern. Icon & hist. vocatur Föl Fräus 2. bras-
sica 2.

BRASSICA TENVISSIMA LACINIATA.



HAdr. Iun.
Brassica
Apiana Plinii,
Sabellica eidem
crispa Plinio: ad
Nicad. *crispifolia*
Theophr. *crispifolia*
Caton: *crispifolia*
Athe-
neo, *crispifolia* Plin.
Al. Fräuser
Föl. B. Gerouca
felde oft gehac-
felde foel. Gal.
choux crispé.
Tabern. Icon.
& hist. breyt
Fräus Föl, bras-
sica Selinifolia
latifolia. Item,
Schmaß Fräus
Föl, brassica Se-

lenifolia angustifolia.

C. Bauh. phyt. brassica 14. siue Apii folio angu-
stifolia. brassica 15. siue Apii folio latifolia.

Trag. Germ. & Lat. das ander Föl Fräus, cuius
tria aut quatuor genera, Fräus Föl. Plinio Apia-
na aut crispa. brassica crispa seu Alpina, Te qua
brassicæ sativæ species, cui folia crispa & per am-
bitum

tum incisa: in hoc genere quædam frequen-
toribus & profundioribus, aliæ rarioribus &
magis exiguis incisuris dissectæ apparent, ita ut
plura eius fastigia constituere liceat.

Monachan. Met. Coules crispi.

Dodon. Gall. brassica 7. rubra: Græcè *παρα-
σπινθίς*, I. 11. Brassica Apiana: Belg. ghebaefelde foc-
len. Gall. chou à feuille d'araignée. Et Lat. in fol.
Brassica quarta folus filis. Græcis *αἰνιδία*,
Latina Brassica Apiana dicta. Plinius Cris-
pam sic dictam vult à similitudine foliorum
Apii: sunt autem Apii folia haudquaquam cri-
spa, sed in varias partes dissecta. Icon. plant. pag.
146. brassica tenuifolia laciniata: Teut. 197.

Camer. hort. brassica Apiana crispa.

Hist. Lugd. duas habet figuras, vnam sub titu-
lo, brassicæ rubræ 3. species Dodon. *παρασπινθίς*: al-
teram verò sub brassicæ crispæ Tragi, & brassicæ
tenuifoliæ laciniatæ Lobelia.

brassicam habemus Montbelgardi in horto
Ill. EC. VVirttemberg. tenuissimè dissectam, quæ
hyemem perfert.

BRASSICA THYRSOIDES.

E rubræ brassicæ genere est, patulis ex viridi
atro rubentibus foliis, subinde laciniatis, per
quæ passim lupinæ parte noua crispiorum foliolo-
rum loboles confurgit, pulchris lemniscis, naturæ
lusu spectando, hincinde exorientibus, nunc
breuiamento tenuique appensis, nunc latiuscu-
culo petiolo hærentibus, atque etiamnum in alia
deinceps fertula struppisque luxuriantibus, ste-
res, filiquæ, seménque ad brassicam rubram vulga-
torem accedunt.

Taber. Icon. & hist. Buschel fôl frast, brassica
prolifera. Item Buschel fraus fôl/ brassica proli-
fera.

Mira est 6. brassicæ species Hist. Lugdunensis,
quam Asparagodem esse herbarii censent, cuius
mentio fit in Geoponicis Cassiani Constantino
attributis. Caudis & radix eadem quæ in cæteris
brassicæ generibus. Folia nunc sunt laciniata, &
frequentissimis diuisuris incisa, quibus brassicæ,
crispæ, nunc planè lata, & expansa. Eadem non-
nunquam tota virent, nonnunquam venis per
ipla folia dispersis, & media costa rubent. Huic
verò id peculiare est & insigne, quod ex foliis
multi multi breues, torosi, foliosi nascuntur, flo-
rentes suo tempore, & semen edentes, non ali-
ter quàm in reliquis plantis, ex caule, vel stipite,
quorum ramulorum eûm asparagis similitudo
fecit, ut hanc brassicam asparagodem Græci vo-
cauerint. Hi tenelli asparagi in iure aliquo pin-
gui, ut Capi, aut Veruecinæ eduntur.


Casp. Bauhin. phyt. brassica 10. siue ex cu-
ius foliis ramuli nascuntur. Dalechamp. Aspara-
godes. brassica 11. siue Asparagodes crispa. Ta-
bern. crispa prolifera. Vnam tenemus esse
plantam, non duas.

Vidi in horto Admirabilis Fontis, & in Bir-
chen vrbe VVirttembergica in horto D. I. Lutz
Pharmacop. dicebatut Feder fôl/ satis ampla
mihi prouenit Montbelgardi in horto Illust.
EC. VVirttemberg.

BRASSICA RVBRA MINOR.

B Brassica tertia propriè vocatur Crambe à
Fuchsi in hist. minutionibus caulibus & te-

nioribus foliis: flore luteo, Germ. Kleiner fôl/
ut ab aliis discernatur, nominari potest. Gall.
choux ranges. Icon. p. 235. brassicæ tertium go-
nus.



Dodon. Gall.
brassicæ rubræ
quinta species
minor. Germ.
Kleiner fôlen.
Gal. petit chou.
belg. Sloorcen,
Catoni propriè
zeldin. Omnium
minima silue-
stri penè simi-
lis, foliis primæ
rubræ, multo
minoribus, a-
lioqui omnino
similis, scribitur
propter semen,
ex quo oleum
paratur, quod
venditur pro
Napi seminis

oleo. Dod. Gall. figuram non habet, sed eam pro
siluestri posuit ex Fuchsi. Dodo. Lat. brassica
5. minor natura sua siluestris: idcirco nec in cib-
tu desiderata: seminis autem causa præcipuè se-
ritur, ex quo subinde non exiguus quæstus ac-
cedit. Hæc est Veteribus, quæ Plinius propriè
παρασπινθίς dici affirmat. Pro hac in hist. Lat. ponit I-
conem à Fuchsi positam pro brassica 7.

C. Bauh. phyt. brassica 17. siue siluest. Trago;
Sylu. Fuchsi.

Hist. Lugd. Postremum brassicæ rubræ genus
Dodonæi. brassica siluest. Item brassica agrestis
παρασπινθίς, cui planè similis est tertia brassicæ
latius species Fuchsi. Figuræ ambæ sunt valde
similes.

Trago Germ. Crambe vulgaris. Rauschwald
fôlfräus/der 4. fôl. Lat. brassica silu. foliis vulga-
ri satiuæ penè consimilibus, sed magis exiguis &
asperioribus, gustuque amarioribus. Brassicæ
vulgaris seu siluestris.

BRASSICA SILVESTRIS.

B Brassicæ trifariam dari digestionem superius
dictum est. In satiuam quippe, siluestem, &
marinam. Et quia de satiuâ hæcenus actum est,
sequitur ut siluestris tractationem suscipiamus.

Siluestris, insit Theophr. plant. hist. lib. 7. cap. 4.
folium leue, sed paruum atque rotundum. Hæc
ramis folisque permixtis condita est: adhuc
succum asperum & instar medicamenti habet;
quamobrem eo Medici ad aluum purgandam se-
pè vtuntur. Et rursus cap. 6. Nunc de siluestri, seu
ea quam aruensem vocamus, pariter indicare
tentandum est. Hæc aspectu vicina vrbani est,
præterquàm quod foliis minoribus, caulibusque
scabrioribus constat, & succo (quia sicciore) po-
tissimum aciori, vehementiorique conditur:
caules fortitur rotundiores, leuiorésque quàm
satiua: & foliorum appendicem illa lata, hæc ha-
bet rotundior, ut folium ipsum minus angu-
latum: nam cætera quidem scabriorum cauli-
bus, cum foliis constat.

Brassicam siluestem satiuæ similem scribit
quoque Diosc. sed candidiorem, hirsutiorem &
amaram.

Celeberrima & siluestris brassica siue Erratica Plinius. Hanc, inquit, alii Petram [quia in maritimis praeputus nascitur, Diosc.] vocant, inimicissimam vino, quam praecipue Vitis fugiat, aut si non possit fugere, moriatur. Folia habet bina, parua, rotunda, laeua: plantis oleris similior, candidior satius & hirsutior. Sed Plinius hic ut notat Dalech. Marinae & siluestris historiam confundit. Folia rotunda, parua, laeua marinae sunt. Nemo bina esse tradit. Res ipsa salum hoc esse monstrat. Similitudo cum brassica hortensi, folia candidiora, & hirsutiora quam in latina, & (quod ait Diosc.) amara, siluestris brassicae sunt. Videtur tamen Celsus Plinius potius interpretandus, quam confusionis hoc in loco arguendus. Ita namque scribit. Syluestris brassica sponte nascens, gustui ingrata, in maritimis asperis, qualis in scopulis Ilvae nascitur, folius est ex candido purpurascens, similis satinae purpureae, tantum minor, nec hirsuta, ut Dioscoridis. Hanc Plinius Petram vocat, eique folia bina tribuit, per quae binas foliorum appendices rotundas intelligit. Theophrastus, ut ex eius verbis colligere licet, hirsutiem negat. Describit alibi Brassicam silv. Plinius, Theophrastum imitatus. Tertia, inquit, proprie Crambe vocatur, tenuioribus foliis, & simplicibus, densissimisque sed efficacissima. Alibi Raphanum vocat, cum inquit, Graeci tria genera fecere foliorum differentia, crispi, laevis, tertium siluestre: nam sic Theophr. Graece vocat quam Diosc. Cramben, & Latini Brassicam. Sed ut nostram hac de re dicamus sententiam. Theophrastum & Plinium nomine Raphani & Brassicae siluestris, maritimam descripsisse Brassicam existimamus, ut suo dicetur loco.

Brassica siluestris traditur à Matth. in Diosc. folius domesticae similibus, sed Hyoscyami modo hirsutis, amaro ac insuavi gustu.

Syluestris Dioscoridi nuncupata brassica, satinarum minori quinto loco descripta [brassica nostrae rubrae minori] similis esset, ait Dodonaeus, nisi hirsutior, albidior, ac sapore amariore foret. folia siquidem, flores, siliquaeque satis respondent. *quod n. a. z. e. c.* Diosc. graece dicitur à quibusdā Hamitrida: Lat. brassica sylv. & brassica rustica: Gal. *Chou sauvage ou rustique.* Germ. *See Folen* & *Wilde see Folen*: à Neoterici Caultis brassica marina, differens tamen à brassica illa, quam Diosc. hoc nomine inscribit, & Recentiores Soldanellam appellant, de qua suo loco. Assumit autem pro brassica silv. Dioscor. Dodonaeus figuram, quam pro tertia, vel minore exhibuit Fuchsius.

Tabern. Icon. & hist. *Wilde Foel*, brassicam silv. vocat. Nullam autem ponit descriptionem, suspicor factam figuram ad Lobel. in *Adv.* Brassicam monospermon.

Nasci autem hanc in maritimis praeputis Dioscorides tradit: reperitur verò ait Dodon. & in multis Zelandiae altioribus tumulis iuxta mare. In maritimis Senensibus, Argentario promontorio, aliisque tum Tyrreni, tum Adriatici littoribus frequens nascitur. Hanc non longè à Terracina urbe, viā quā itur Neapolim plurimam vidit Matth.

Huius cyma, inquit Diosc. in luxurio cocta ori non est insuavis. Illita verò folia vulnera conglutinandi, ac tumores inflammationesque discutendi vim habent. Brassica, autore Catone, erratica maximam vim habet, eam arefacere, conterereque oportet bene minutim. Si quem voles purgare, pridie ne cernet, & manē ieiuno dato

brassicae trita, decoctaeque aquae cyathos quatuor, nulla res tam bene purgabit, neque helleborum neque scamoneum, & sine periculo, & scito salubrem esse corpori. Quos diffidas sanos facere, facies. Qui hac purgatione purgandus erit, sic eum curato. Sorbitione liquida hoc per dies 7. dato, ubi esse volet, carnem assam dato. Si esse non volet, dato brassicam coctam, & panem, & bibat vinum lene dilutum, lauet raro, utatur vntione: qui sic purgatus erit, diutina valetudine utetur, neque ullus veniet morbus nisi sua culpa. Et si quis huius tetrum, vel recens habebit, hanc brassicam erraticam aqua inspergit, apponito, sanum facies. Et si fistula erit, turundam intro tradito, si turundam non recipit, diluito, succum exprimito, cum in vesicam indito, vesicae calammum alligato & ita premigo, ut in fistulam succus introeat. Eates sanum faciet cito. Et ad omnia vetera ulcera, & noua, contritam cum melle apponito, sanum faciet. Et si polypus in naso introierit, brassicam erraticam aridam tritam in malum coniucito, & ad nasum admoueto. Ita subducito sursum animam quamplurimum poteris, triduo polypus excidet, & ubi exciderit, tunc aliquot dies idem facito, ut radices polypi per sanas facias. Auribus si parum audies, tento cum vino Brassicam, succum exprimito, in aurem intro tepidum instillato, cito intelliges te plus audire. Deinde imprigini parce brassicam apponito, sanam faciet, & vicus non faciet.

Brassica silv. siue erratica, inquit Plinius, immenso plus effectus laudat Cato, adeo ut arida quoque sativam in olfactu collectam, vel odore tantum naribus raptis, vitia earum graueolentiamque sanare affirmet. Hanc inflationibus mederi, melancholicis quoque ac vulneribus recentibus, cum melle ita ne solvantur ante diem stramis, fistulis, in aqua contritam, Chrysippus auctor est. Et alii verò compescere mala corporis quae seipant: nomas vocant. Item excrecentia absumere. Cicatrices ad planum redigere. Oris huius & tonsillas manducatam & coctam succo gargazato cum melle tollere. Item ploras & lepras veteres ipsius tribus partibus cum duabus aluminis in aceto acris illitis. Epicharmus satis esse eam contra canis rabiosi morsum imponi. Melius si cum salere, & aceto acris. Necari quoque canes ea, si detur, ex carne. Semen eius tostum auxiliatur contra serpentes, fungorumque venena, tauri sanguinem. Folia cocta spleneticiis [splenicis e. u.] in cibo data, & cruda illita cum sulphure & nitro prosunt. Item mammiarum duritiae. Radicum cinis vix in faucibus tumentis tactu medetur, & parotidas cum melle illitis repunit: serpentium morsus sanat.

Brassica agrestis, ut notat Galenus, quodammodo calidior, sicciorque est quam domestica: ceu alia propemodum omnia agrestia sui generis domesticis utraque facultate valentiora sunt. Quamobrem neque intra corpus citra noxam sumitur, ut quae longius ab humana recesserit temperatura. Eadem de causa & gustantibus amariore est quam domestica: quanquam domestica quoque acrimoniae non nihil & amaritudinis contineat: sed utramque agrestis habet validam: quare etiam extergit, & digerit, quam domestica valentius.

Est, ait Dodonaeus, brassica siluestris calida, & quia amara, extergens quoque.

ACHANACA INDORVM BRASSICÆ
foliis.

Descriptio

Folius Al.
Ind.
Achan.

Huius folia bifurcata & acuminata sunt, Brassicæ amplioris foliis simillima, sed non ita crassa, & tenuiore costa, in horum medio fructus nascitur cuius magnitudine, colore luteo, quem Alfarid nuncupant, alii Lefach, nomine serpentis concoloris. Fructus is magno apud eos est in pretio. Tota

planta tibiæ hominis crassitudine.

Hist. Lugd. Achanaca Theueti.

C. Bauh. phyt. Brassica 19. siue Brassicæ folia petegrina.

In regnis Mely & Tombotu ad fluvium Senega sitis, Medici, *Bisfrains* appellati, aduersus morbum, qui illis frequentius grassatur, *Boro-zail* nominatus, aut *Zail* Æthiopum lingua, qui ex immodica Venere, cui multum obnoxii sunt, ortum habet, herbe Achanacæ dictæ decocto, ut refert Theuetus, potissimum vtuntur. Morbus autem is genitales partes plurimum occupat, quæ in homine *Asab*, in femina *Assabatas* nominantur.

Brassica folio Nymphææ Caiou-a.

Vidi, inquit Leri hist. Amer. cap. 7. Brassicæ genus, quod siluestres homines vocant *Caiou-a*, quo in iusculis interdum vtuntur: folia sunt ei lata & pæne Nymphææ similia.

BRASSICA SPINOSA.

Descriptio



Tom. II

Est hæc C. Bauh. Phyt. Brassica 16. [apud Matth. 6.] siue spinosa, quam cum integram Patavii in horto Cl. Bembi non viderit, eam vs. que dum integra offeratur, sic describit. Ramulus est sine foliis, aut saltem obscuris prope caulis exortum, in summo caulis fastigio spinæ tenues, cauli concolores digiti articuli longitudine, ita ut videantur folia

in has spinas de fuisse, cum in summitate pulla conspiciantur.

PERFOLIATA SILIQVOSA.



Silquicubitalis & altior est, caule tereti, tenui, & in alas diuiso, ex foliorum sinu prodeuntes: folia non diuisa, oblonga, subrotunda, Napi, colore glauco, rigida, pingua, fragilia, à caule videntur quasi transdigi, sapore oleraceo: flores exalbidis Brassicæ: siliqua perquam longæ, angulosa semen continent, Radix tenuis, alba, gustu Brassicæ.

Trago Germ. & Lat. perfoliata altera, das ander durch trachs. Et hæc, ait 1, haud dubie secundum Dioscor. Cotyledon, seu ut Marcell. vocat, Acetabulum, aut Umbilicus Veneris, [frumen nabel] & quorundam Cymbalion: Sed ego nunquam hanc admiserim cum

Trago pro Umbilico Veneris, Cotyledonere.

Brassicæ agrestis species alia [sic enim propositam à nobis plantam inscribit Cordus, & ex eo H. Lugd.] cubitalem habet caulem, teretem, glabrum, aliquantulum concanum, & in ramulos diuisum: folia ex intervallo singula profert secus ramulorum eruptiones, trium aut quatuor unciarum longitudine, paulò angustiora, subrotunda, glabra, & Brassicæ modo carnosa (in repetitione verborum Cordi in Hist. Lugd. malè scribitur coriosa:) flores Veris exitu candidos & oblongos fert, quibus singula succedunt silicula, digito longiores, angustæ, & quadrangulares, oblongo, nigroque semine plenæ. Radice nititur exigua, lignola, semestri & inutili. Folia Brassicam gustu imitantur: semen verd amari est, & aliquantulum acre. Nascitur pinguibus aruis, lento & glutinoso solo.

Dicitur autem Cordo Brassicæ agrestis species alia, quia iam antè lib. 1. c. 31. alterius meministi, de qua paulò pòst, sub Clastifolia Cichoroide, siue Turriti 2. Clusii.

Descriptio

Hist. Lugd.
nor.
Flos cichor.
dan.

Aaaa 3

Hist. Lugd.
m.

Brassica ca-
pensis.

Locum &
tempus.
Celleum
Hisp.

Et licet conetur Hist. Lugd. Clusii Brassicam campestem i. diuersam facere à Brassicæ agrestis specie alia Cordi, cum ait Clusius aliam pingit & describit: Id tamen contra mentem Clusii tenet, cuius verba hæc sunt, Brassica campestris [addit in post. Hist. flore albo] pedales habet caules, candicantes, rotundos, aliquot ramis præditos: folia ex interuallis, Perfoliatæ foliis non valde dissimilia, albicantia, & colore ferè Brassicæ vidualis: caulem sic amplectentia, vt tenellæ plantæ ad Perfoliatam plurimum accedant, gustu feruido: ramulos è lateribus prodeuntes, sustinentes flores aliquot albos, Brassicæ floribus similes, deinde cornicula longa, quadrangula, in quibus continetur semen Brassicæ semini minus, ex iuso fuscum: ita nuncupauit hanc & sequentem, tum quia in agris & campestribus nascentes cõspiciendam & mense Martio florentes, in Murciano agro, iuxta vias ad Eliocretam urbem vulgò Lortia dictam, vbi Martio florebant: tum quia quid Murciani *Colleion* appellabant, id est Brassiculas. Cordus hanc primam speciem non ignorauit: nam Brassicam Campestem vocat, quam verisimile est apud suos in agris nascentem obseruasse, ac propterea agrestis nomen indidisse: non desunt qui brassicam semine quadrangulo vocent ineptè: à corniculo potius, in quo semen, nam semen quadrangulum non est. Sed & hoc genus spontè crescens obseruabam magna copia in aruis Viennensis agri. Maio florens.

Plant. Icon. p. 396. Perfoliata Napifolia Anglorum siliquosa. Lob. 215. Teut. 482.

Taber. Icon. & hist. Perfoliata napifolia *Syrphachæ mit Stodruden*.

Dodon. Brassica silv. perfoliata, quam alteram campestem Brassicam nominant: nonnulli etiam montanam, vel perfoliatam. Huius etiam meminit Camer. apud Thal. quando inquit: In aruis Thuringiæ non admodum diuersa Brassica silv. folio aeræ Thalii nascitur, quæ cum Brassica campestri descripta à Clusio in Hisp. obseruationibus planè congruit.

Hort. Lusit. Brassica campestris Clusii. H. Perfoliata siliquosa, *wilder Föl*.

A me lata in horto Ill. E. C. quotannis se renouat semine deciduo, eodemque maturo Augusto. Spontaneam magnam obseruavi in legum agris Ducatus Vvirmemb. circa Marbach, vbi Romanorum olim erant limites, mense Iunio florentem cum siliquis longis.

Eius acrimonia proximè ad Brassicæ facultates hanc plantam accedere indicio est, autore Clusio, & illà valentiorē forsitan esse. De huius facultatibus compertum nihil habet Dodonæus, à nemine enim in cibum admittitur.

Perfoliata siliquosa purpurea Clusio.

Flmtioribus est virgis, nec aded ramosis, cuius folia in summo aliquantulum serrata, reliquis notis à Prioris foliis non differunt, & feruido sunt etiam gustu: flores Prioris floribus similes, maiores tamen, Leucos aut Hesperidis floribus magnitudine pares, colore autem Lunariæ grææ flori, purpureo videlicet: cornicula succedentia prioribus similia & simile semen continentia. Radix, licet dura fibrisque quibusdam prædita sit, viuat tamen non est, sed prolato semine perire solet.

Clus. Hispan. & ex eo Hist. Lugd. Brassicæ campestris aliud genus, siue secundum. Hist. verò

post. Brassica campestris a. flore purpureo.

Brassica silv. maior latifolia Thallio.

Radicibus constat inutilibus, lignosis, candidis: caule, selsquipalmari, non admodum recto, rotundo, simplici, nonnunquam etiam brachiato, foliis mollibus, læuibus, sublauiis, integris, sine incisionibus aut sinuosis crispaturis, modè natis, duas vncias longis, vnciam latis. In summitate in exiguis pediculis racemus *florum* candidorum existit, ex oblongis vastolis Brassicarum satiuarum modo prominentium: quibus depeditis siliquæ oblongæ pronascentur, semina Brassicæ satiuæ minora continentes.

C. Bauh. Phyt. Brassica 25. siue silv. maior latifolia Thallio.

Turritis vulgarior.

Nasturtio siluestri adiungitur planta, quæ Turritis vocatur: inquit Taberna, radice fibrosa, vt in Plantagine videre est: ita ipsius folia per terram hinc inde sparsa iacent, saluæ foliis consimilia: ex radice caules aliquot rotundi, exiguis, acuminatisque, & læuibus foliis donati, emergunt, quæ acetolæ foliis comparari possunt, in summitate caulium, multa exigua tenellaque foliola conueniunt, sicuti in [Saubenroth] Hippuride, quæ velut ex aristis composita sunt. In caulis culmine exigui *flosculi* sunt conspicui, quæ si deciderint, tenellæ acuminatæque reliquæ manent capsulæ [râschlin]. Cur autem hæc planta Iberidibus annumerata fuerit planè me fugit, nisi fortè ob aerem ipsius gustum contigerit. Constatinator credidit se hic demonstrare valde industrium, cum tamen ex iconè, malè considerata, malè fingat descriptionem. Ex flosculis enim fingit perulas siue capsulas, ac ex siliquis facit folia quod facile est animaduertere ex sequenti Clusiana descriptione.

Sic autem Clus. de Turrita vulgariori. Draba 2. & tertiz congener videtur planta illa, quæ vulgò apud eos qui stirpium cognitione & studio delectantur Turritæ nomen obtinet, ab extremorum caulium forma, quæ in metæ aut pyramidis effigiem desinunt: habet verò prima, quæ & frequentior & vulgarior, conferta circa radicem folia, binas vncias longa, succulenta, hirta, & aspera, saturatiore colore viuidi prædita: inter quæ pedales, aliquando etiam cubitales promit caules quos inordinata ambiunt folia, circa pediculum latiora, deinde in mucronem desinentia, succulenta & hirtura: summo caule confertim nascuntur multi exigui flores, quatuor foliolis albis constantes: quibus discussis, alii apparent, caulibus fastigio sensim, veluti in metæ formam, sese attollente, vt tandem frequentibus longiusculis corniculis cinctum conspiciatur, quæ pusillitate, rufum, atre semen continent: radix illi alba, multis fibris prædita, quam tamen viuacem esse non puto.

Tabern. Icon. & hist. Gerardo & Icon. pl. p. 210. Turritis. Teuton. 261. Turrita 1. vulgarior.

Spontè prouenit in plerisque Austria: collibus lapideis & salebrosis. Floret Maio, semen maturum est Iulio.

GLASTIFOLIA CICHOROIDES IOH.

Bauhini: & Turritis secunda Clusio.

Radice est annua mediocriter crassa, alba, non-nihil purpurascēte, fibrosa, subacri: folia, germi-

Descriptio

germinatione prima antequam caulem proferat partim laciniata, Cichorei vulgaris instar, vel Hieracii, alia nullo modo incisa, glauca, Isatidis foliis similia, palmo saepe longiora semunciam lata lanuginosa, sapore acri & amaro: adulta & quæ in caulibus sunt integra nulla diuisura incisa, glabra, utrinque glauca, oblonga, ita pinnis alarum coarctata, ut à caule perforari videantur, sapore Brassicæ vulgaris. *Caulis* cubitalis, & bicubitalis, tenuis, colore herbaceo, admixta aliqua purpura, multis ramis longis tenuibusque brachiatus: ex alis & summis ramis flores prodeunt multi simul iuncti ex pediculis semuncialibus, ex luteo in albidum languentes, odore nullo manifesto, quaternis foliis constantes, quæ totidem foris circumstant, sed longè minora & virescentia, mucronataque, cum illa subrotunda sint, in medio crocata stamina multa, cum stilo viridi. Succedunt tandem *Siliqua* longæ, rectæ, graciles, in quibus se-

An Cordo hist. Plant. Brassica silv. virgata: s. Si tamen nostram plantam intelligit, omisit in sua descriptione folia inferiora Cichorio similia.

An Thalia Hærcyn. Brassica sylvestris longifolia?

Huic similis est, ait Camer. in addit. Thalii, si non eadem, quæ in Thuringiæ salubus locis ædiis passim nascitur ab incolis Schoßfraut vocata, quæ tamen voce alibi aliarum plantarum appellantur.

An Clus. Hist. post. Turritus maior siue altera? Rarius, inquit, inuenitur priore, & umbræ magis delectari videtur, quare facilius in cædis silvis quam apertis collibus (quibus prior gaudet) nascitur. Floret Aprilis & Maio. Huic valdè similis [nisi eadè sit] nata Iacobo Plateau, semine nescio unde accepto. Illius ad me iconem etiam cum variis aliis mittebat. Non videtur absimilis Brassicæ virgatæ Cordi. Describit & hanc Hist. Lugd. ac depingit sub inscriptione Sinapi albi. Hæc autem sunt eius verba: In asperis & laxioribus hoc Sinapi adolescit, radice dura & solida, candida, brachiata, & nonnihil fibrosa, foliis proximè radicem in orbem sparsis, multis insectis Cichorii modo, & aucto caule pereuntibus, & exarescentibus, in caule numerosis, læuibus, crassis, in cuspidè mucronatis, quæ caulem attingunt lunatis, caule cubitali, nonnunquam altiore, rotundo, infernè rubente, in ramulos multos supernè diuiso, flosculis multis scatentes, candidis, quibus succedunt graciles & prælongæ siliquæ, multo semine grauiores, acris & feruidi gustus, elegantis specie siliquarum tanquam vallo quodam circa caulem & surculos erectarum. Floret Maio mense. Quidam Thlaspeos, alii Drabæ genus esse uolunt. Placet descriptio Hist. Lugd., quamuis in floris colore nonnihil differat: ac Icon, licet folia inferiora quodammodò Cichorio accedentia habeat, nihilominus melior est nostræ emptitiæ.

An Iacob. Theod. Tabern. hanc intelligit per Vaccariam, suam par. 2. p. 198. Bubblumen/ Ein are Marten Nöslin. Icon Tabern. malè reponitur inter Lychnides, malè etiam dicitur German. Marten rößlin; quandoquidem nihil habet cum iis commune: sunt enim huic siliquæ longæ & flores minimi, ut demonstrat eius icon, an sit autem nostræ plantæ asserere non ausim, folia Cichorii inferiora appicta non habet quæ respondeant nostræ plantæ.

C. Bauh. Phyt. Brassica 20. siue silv. foliis circa radicem Cichorii modo insertis. Cordo Brassica silv. virgata, Sinapi album Lugdun.

Glastiola mea Cichorioides abundat Mont-

belgardi in Horto Ill. E. C. Vvitemb. spontaneè florens Aprilis, & siliquas habens lunio: tota hieme viret cum foliis Cichorii. Gargillus obseruauit circa Basileam in sabulosis ad Rhenum itinere Grentzachiano.

TURRITIS PVLCHRA NOVA.



*C*aulis sur- *Descriptio*
git tricu-
bitali, striato,
hilari virore
persuso, sub-
hirtuto: folio-
rum inferiorum
quædam tres
uncias longa,
angusta, cir-
cumquaque
integra, pedi-
culo longo, alia
longiora, qua-
tuor aut quin-
que uncias
colligentia,
pediculū ver-
sus profundi-
culè incisa: ac
enim quæ per
caulem conspiciuntur la-

tiora & breuiora sunt, Textantalia citatè, caulem pinnulis complexa, Myagri foliis aliquatenus similia, sapore nullo euidente. Color omnium viridis, porro ex folii vniuscuiusque pet caulem, cubitali serie sursum versus, ramulus prodit, ut in Glastifolia Cichorioides nostra, cuius extremum occupant conferti *flosculi* exiles, foliolis oblongis albis constantes, satuo sapore. Succedunt *siliquæ* longæ.

Hanc Argentinx in horto Dj. Friderici Meyeri *Locus & Tempus*
florentem collegimus mense Maio, qui Turritim pulchram nouam denominabat.

BRASSICA SILVESTRIS PROCERA Thalia.

*H*æc radice sulcitur multifida, candida, ligno- *Descriptio*
sa, iuxta cuius caput in terra reclinantur fo-
lia quincunciali saepe longitudine, vnciali latitu-
dine, hispida, integra, caulem erigit vnicum, ple-
rumque saepe etiam in duos trèsvæ aut plures a-
lios iuxta radicem diuisum, bicubitalem, rectum
teretè, flexibilem, iuxta radicem etiam parum
hispidum, deinde tota reliqua parte læuem: cui
folia appenduntur sextantali longitudine, vnciali latitudine, subcinerea, læuia, non hispida,
ut priora, mucronata: quibus cessantibus, po-
stea longo ordine, caule videlicet subinde pro-
cerius exrescente, in singularibus exiguis pedi-
culis *flosculi* parui, candiduli protenduntur, i-
isque euanescentibus subnascuntur *siliquæ* ad la-
tera compressæ, tenues, digiti longitudine, quibus numerosa semina paruaque continentur. Ex
foliorum autem singulis alis non infrequenter
noua adnata progrediuntur, & ipsa copiosos flo-
res ac siliquas proferentia. Nascitur montibus
apricis ac locis cædis, estque sapore amaro.

C. Bauh. phyt. brassica 21. siue silv. foliis circa radicem integris & hispidis, Thalia silv. procera,

Lobel. Turritis. Aliquando & huius folia ad radicem, Cichorii instar, inserta sunt. An Turritis eadem sit cum Thalii brassica, ut vult Frater, adhuc dubius sum, de Turriti secunda dicit Clusius folia nonnihil crispata & sinuosa, non tamen ait Cichorii instar inserta, de prima nihil etiam tale dicit, nec icon demonstrat: tamen, ut verum fatear, Turritim secundam malim referre ad Thalii Brassicam siluestrem longifoliam.

Brassica filv. foliis membranaceis Thalio.

In lenensibus montibus aliquoties, hanc observauit Thalio: iam verò dictis minor est, radice parua, candida, superuacanea, caule breui, geniculato, qui densè ambitur suis foliis, quæ membranaceæ sunt substantiæ, subflaua, splendens, lauia, vncias duas longa, vnam lata.

C. Bauh. Phyt. Brassica 22. siue filv. foliis membranaceis Thalio.

Brassica filv. folio Beta Thalio.

Descriptio

Nascitur hæc, inquit autor noster, copiosè in Hainleitta sylua non procul à Sondersbushio sub faginetis. Radice constat lignola, multida, fibrosa que: folia betæ, rotundioris ambitu in terræ superficie multa disperguntur, plumbei fuscique coloris, lauia, durioris membranæ instar, sextantalia, caules eriguntur teretes, selquipedales, splendentes, fusci, pauca, oblongiuscula, ac mucronata folia continentes, floresque candidos proferentes, exiguos, sed siliquas longiores ceteris speciebus.

Brassica filv. media Thalio.

Descriptio

Betiora continet folia, numerosa circa radicem, vncialia, oblongiuscula, in obtusum mucronem sinientia, mollia, semunciali latitudine: quæ cauli appenduntur dodrantali, ea parte quæ adherent utrinque velut alares pinnulas prominentes habent.

C. Bauh. Phyt. Brassica 23. siue filv. media Thalio.

Brassica filv. minor Thalio.

Foliolis mollioribus, canis, toliculis quadrantalibus, siliculis angustis parvisque, Thal.

C. Bauh. Phyt. Brassica 24. siue siluestris minor Thalio.

RAPVM SATIvvm ROTVNDVM & oblongum.

CAP. II.

Descriptio

Rapis folia per terram sparguntur ampla, ad Brassicæ rubræ folia quodammodo accedentia, atroviuentia, aspera, & ad costam vsque ferè laciniata, saporis holeracei: flores lutei: semen in siliquis rufum, rotundum, Brassicæ proximum: radix sessilis in ventrem amplissimum, capiti humano interdum paulò minorem extuberat, tenuem fibræ alimentum sucturam demittens, alias pugillari par, aut etiam suppar, quibus utrisque caro candida, firma satis, sapore acri, magis minùsue vegeto prædita: est etiam vnum genus longa crassa radice, non in ven-



tem extuberans.

Raporum tam Veteres, quam Recentiores duo prima constituunt genera Sativum & siluestre. Theophrasti quidem verba de Rapo sativo hæc sunt. Rapæ (ῥαπα) alii esse, alii non esse diuersitatem generis putant, sed mare tantum, formæque differre, nasciq; ambas

ex eodè semine: sed ut effeminentur, raras deponere oportere: nam si densè positæ sint, omnes mascullescere. Quod idem futurum sit si in terra vitiosa seratur. Quæ de caula semine satas plantas transferentes deponere. Semen quoque deterius, meliusve visu percipi posse: quod enim probum sit, tenue sentiri, quod vitiosum, crassum. Gaudere & frigoribus Rapam, & sic eam dulcescere putari, simulque incrementum in radicem, non in folia verti. Austrinis atque terris temporibus celeriter caulescere.

Plinius Theophrasti sententiam repetit his verbis. Raporum genera Græci duo prima fecere, masculi & femininumque, & ea serendi modo, ex eodem semine. Densiore enim satum mascullescere, item in terra difficili, semen præstantius quod subtilius. Species verò aut in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari: tertiam speciem siluestrem appellauerunt. Sed de Rapis &c. abundè dixisse poterat videri Plinius, nisi Medici masculini sexus facerent in his rotunda: latiora verò & concava feminini. Per æstatiorem suauitate & ad condiendum faciliora, quæ sæpius lata transeunt in marem.

Quod verò Galenus inter Rapum, quod ῥαπα est, & Napum qui κορυβή, non distinxerit, factum putat Cornarius, quod Theophrastus (ut apud Athenæum habetur) bunias non nominet, marem quidem vocet quoddam Rapum, & fortassis hoc bunias sit. Galeni verba hæc sunt. Siue ῥαπα vocare volueris, siue κορυβή hanc plantam, oleraceum in ipsa est id, quod è terra eminet, quod verò in terra continetur, radix. Rapi porro latini duplex esse genus planum fecit Nicander lib. 2. Georg. apud Athenæum:

Rapi, aduerte animum, genus duplex est, ut & Radicula:

Oblongum alterum, alterum rotundum, in arce hortorum conspicitur.

Dioscorides rectè distinxit Rapum, & nostri, inquit Cornar. adhuc hodie utrumque agnoscunt ac habent, latum & rotundum.

Tragus Rapa depingit & describit, dicens, Rapum vulgare cum oblonga figura masculinum, cum rotunda femininum ex vno & eodem semine gignuntur.

Ex Theophrasto colligere est, inquit Turnerus, Rapum sativum 1. insigniter magnum esse feminam, alterum verò siue longius & arigo-

nos, quod Plinius ait in latum crescere Marem. Rapum maius, orbiculatum seu turbinatum, Aduersariorum variat radice terete atque rotunda, oblongiore, & Napo similiore effigie, sed maiore triplo. Hæc eadem, aut certe simillima Venetis olitoribus vñum fertur in forum. Hyeme purpura nitida & pellucida radice, giffu teneriore, suauiore, in acetatis cruda cum Eruca, Lactuca & aliis illic esitari solita.

Lob. Obl. p. 93. & Icon. plant. p. 197. Teut. 235. figuram habet Matthioli figuræ similem. Item aliam ex Matthiolo cui titulus. Rapum tereti rotunda oblongaque radice, Aduers. p. 66.

Tabern. Icon. & hist. Rapum orbiculatum, Scheibe rübe. Rapum orbiculatum minus, Klein Scheiben Kappen, Klein Scheiben rüben. Rapum longum, lang rüben. Rapum longum minus lang Stoppfel rüblin.

Gerard. 1. Rapum maius Great Turnep. Item Rapum minus, Small Turnep, Icones habet Tabern.

Sic & Celsus inquit, Rapæ quædam sessili rotunditate constant iucundiores: quædam in rotunditate oblongæ sunt: at color omnibus candidus. Theophrasto mas & sæmina. Plinius Græcos secutus duo prima genera fecit masculum & sæminam.

Contra communem sententiam decernit Matth. dicens: Rapum satiuum in triplici differentia, sessile, longum, & rotundum: tamen si Plin. literis mandauerit longum erraticum esse. Quædam colore purpurea. Matthiolum autem tunc non animaduertisse quid astrueret manifestum sit ex eius post. com. cum magnis fig. Lat. & Ital. Item. hist. Germ. quibus in editionibus Rapa duo tantum commemorat, Rapum rotundum siue sessile & Rapum longum.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Rapa 1. siue satiu rotunda seu mas Theoph. & Plinio: variat radice, reperitur vel viridi, vel candido, vel puniceo colore. sic paruitate & magnitudine: communiter tuberosa est, raro globi instar orbiculata: frequentius in latitudinem effusa, quare Tabern. quatuor habet figuras: Habentur nunc quæ foris & intus flavescent: sic & Bernæ quæ obsoletæ nigra, ut plurimum rotunda, rarius oblonga, quæ vulgatis dulciores sunt. Rapa 2. siue satiu 2. oblonga, seu sæmina Theophrast & Plinio. Tabern. duas habet figuras. Hæc Casp. Bauh. Ego quidem Tabern. duas priores figuras refero ad Napum, ac separo à Rapo.

Schyv. Rapum longum vulgare, Rapum oblongius Dodon. Rapum orbiculatum.

Quæ γῆρας & γῆρας item γῆρας & γῆρας Græcis. Latinis Rapum & Rapa dicitur, vnde diminutuum nomen apud Horatium Rapulum. Hebræis [teste nomenclatura Eliaz. Leuitz, Trag.] Laphet, Arab. selsem, Selgem, Selgiem, siue Alsegiem. Germ. Rüben. Belg. Rapen. Gall. Rave & Raveau. It. Rapa. Hisp. Nabo: Angl. Turnep. Hung. Kapa. Bohem. Kzipa.

Græci quidē γῆρας aut γῆρας vocabulum à figura quæ plerumque rotunda esse solet, deorsum ferunt: nam quod in rotunditatem circumactum est γῆρας, hoc est γῆρας dixerunt. Et Hippocrates gongyli vocabulum pro globulis orbiculisue, qui deuorantur ut catapotia, usurpauit. Rapa verò quoddam ex terræ rure, quasi ruapa, Varro teste, nominata est. Alii quoddam passim rapiatur, rapī nomen inditum esse putant. A Græcis tamen manasse id nomen facile videri potest, qui raphyn & rapyn auctore Athenæo dicunt. Ra-

pas Lacedæmonios γῆρας id est, ventres vocare Apollas apud eundem Athenæum tradidit. Sed Nicander Colophonius rapas Zaceludas appellari voluit. Amerias & Timachides non Rapas, sed Cucurbitas ita dici arbitrantur. A rapo rapina, Gallis Rabiere & Rapitum desleatur, vnde rapitios caules dixit Cato.

Rapum in hortis & aruis cultis potissimum æstate, Iunio ac Iulio mensibus, copiosissime Genæ ferunt pro alimento quoniam hominum, tum pecudum, Basileæ maxima habent & abundanter vescuntur. Conferuntur etiam agri rapis Month. & in Horto Il. E. C. Vidi Gœppingæ Rapas allatas Vlmâ venales, quæ parte superiore rubebant mense Augusto. Sed & Octobri fine nactus sum alias ex Horto Il. E. C. Gœppingâ allatas, longitudinis cubiti & semis, ad palmum rubentes, quam partem dicebant supra terrâ extare. In Italia notissima præsertim apud Insubres, ubi statim post mettem æstate Iunio ac Iulio [teste Matth.] mensibus in aruis secundo feritur: deinde mense Octobri è terra eruntur: radix in aliquibus locis tam magna gignitur, ut plus quam centenas libras pendeat. Ad libratum triginta pondus nos sæpius innumera Rapa vidimus in Ananienfi agro, longa, & colore purpurea.

Rapa quamuis in vniuersum in omni aëre habitabili proueniant, attamen solum putre & solutum pluribus iterationibus aratri, vel rastri, largoque stercore satiatum postulant. Nam id plurimum refert, non solum quiddam melius ea proueniunt, sed quiddam etiam post fructum eorum sic tractum solum legetes optimas facit, desiderant, nec densa nascuntur humo, sed campis & locis humidis latantur. Loci proprietates horum semina commutat. Namque in alio solo Rapa biennio lata conuertitur in Napum, & vicissim ex Napo fit Rapum. Semen Raparum trium annorum producit Brassicam, & contra Brassicæ Rapas. Rignis locis rectè à Solstitio feruntur: siccis ultima parte mensis Augusti, vel prima Septembris. Iugerum agri non amplius quatuor sextarius Raparum seminibus obserendum est. Rapa igitur duas sationes habent, sed meliorem mensis Augusti. Si æstate ferantur ne Culex tenera adhuc præpetia folia consumat, pulvis etiam, qui supra Cameram inuenitur, vel etiam fuligo quæ supra focos rectis inhæret, colligi debet: deinde pridie quam satio fiat, commisceri cum seminibus, & aquâ conspergi, ut tota nocte succum trahant. Nam sic macerata postero die rectè feruntur. Veteres quidem auctores, ut Democritus, præcipiunt semina omnia succo herbarum, quæ sedum appellatur, medicare, eodemque remedio aduersus bestiolas vii, quod verum esse nos experientia docuit. Sed frequentius tamen, quoniam eius herbarum minus larga est facultas fuligine: & prædicto pulvere vitumur, satisque commodè tuemur his incolumitatem plantarum. Rapæ semina Higinius potat post trituram iacentibus adhuc in arca paleis inspergi debere, quoniam sunt vastiora capita, cum subiacens soli duritia non patitur in altum descendere. Nos istud sæpè frustra tentauimus, itaque Rapum, & Raphanum, & Napum melius existimamus subacta terra obrui. Locis frigidis, ubi timor est ne Autumnalis satio hyemis gelicidii peruratur, arundinibus humiles cantherii fiunt, utque virgæ transuerse imponuntur, & virgis stramenta supra iaciuntur, & sic à pruinis semina defenduntur. Vbi verò apricis regionibus post pluias noxia inceserunt animalia, quæ à nobis appellantur kruca, græcè autē γῆρας nominantur.

Locat
comp

Colem

stat

tur, vel manu colligi debent, vel matutinis temporibus frutices oleum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius in superiorem partem prorepunt. Id tamen superuacaneum est facere, si ante satiorem semina, ut iam prædixi, succo herbarum sedi macerata sunt: nihil enim sic medicatis nocent Erucæ. Sed Democritus in eo libro, qui græcè inscribitur *περί αἰσθητικῆς* affirmat has ipsas bestio- las enecari, si mulier, quæ in menstruis est, solutis crinibus & nudo pede unquamq; aream ter circumbeat, post hoc enim decidere omnes vermiculos, & ita emori. *Hæstennus Columella.*

Rapæ si serantur diebus calidis, autore Theophr. celerius caulescunt, semenque ocyus reddunt. Item, si rarè serantur, magis grandescunt, ideoque ubi nimis spissæ eius plantulæ natæ fuerint, cum aliquod robur acceperint, euelluntur aliquæ, ut cæteræ roborentur. Naporum medicina est, inquit Plinius, siliquas unà seri, sicut Olerum Cicer: arcet enim Erucas. Quo si omisso iam natæ sint, remedium est absynthii inspersus, & aizouū &c. Nebulis & pruinis, inquit idem, ac frigore vltro aluntur amplitudine admirabili. Quare non sunt in Gallia quàm in Lemouicis copiosiora, suavioraque, affatim suppeditante eius regionis celo nebulas, frigora, pruinaeque. Frigore enim dulciora fieri existimantur, & grandiora. Folia quò plura adimuntur, eò maiores manent radices: Rapæ maledictio, ut in his agris quibus sanè nunquam proveniat bonum frumentum, etiam si limo multo emendetur. Colliguntur mense Octobri, cum radix luminopere extuberaverit: quod Nicander in Georg. hisce testari videtur:

*Rapæ collige Boreæ frigidibus iam domus,
Hyemi gratæ famulisque, cum domi otiosis.*

Rapæ demum quia tenui & diluto cortice integuntur, facili exsiccantur, imbecillesque ad perdurandum penitus sunt, idèd si terra coopantur, usque ad æstatem, ut vult Theophr. durare & crescere possunt. Quæ verò corruptæ & marcidæ videntur calente aqua madefactæ reuiuiscunt, & ad usum aptæ redduntur. Rapi coctæ radix, inquit Dioscorides, alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, Venereim stimulat. Decocto podagrarum permionesque fouentur: contritoque Rapo atque imposito iuuantur. Si excuatur radici rosaceum ceratum adigatur, & feruente cinere eliquefeat, exulceratis pernionibus proficiet. Cymarum eius decoctæ manduntur, & vinnam ciunt. [Græcè habetur, *ὅτι ἡ ἀνὰ ἀσπαραγῶν* *ἡ δὲ ἀνὰ ἀσπαραγῶν* *ἡ δὲ ἀνὰ ἀσπαραγῶν* Id est, ipsius Asparagus, &c. Plinius cymas dixit, uterque autem tumores siue thyrsos caulis inter folia ex summo Rapo emicantes intelligit.] Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est, [*ὅτι ἡ ἀνὰ ἀσπαραγῶν* *ἡ δὲ ἀνὰ ἀσπαραγῶν* *ἡ δὲ ἀνὰ ἀσπαραγῶν* Id est, semen antidotis & theriacis, quæ dolores leniendi vim habent admodum vtile est. Quare Ruellius minus rectè *ἀνὰ ἀσπαραγῶν* quæ sensum doloris auferunt, interpretatus est: sunt enim ea *ἡ δὲ ἀνὰ ἀσπαραγῶν*, id est, stupefacientia, quæ sensum, non propriè dolorem, tollunt eximia sua frigidityte. Anodyna verò quæ non extinguendo sensum aut stupefaciendo, sed partes relaxando, & demulcendo dolorem leniunt & mitigant.] potum contra venena salutare est: Venereim concitat. Rapum muria conditum minus alimenti sufficit, sed multò magis appetentiam recreat. Diphilus Silphius Medicus, Rapum, inquit apud

Athenazum, extenuat, acre est, ægrè coquitur, statulque gignit. Assum verò facilius coquitur, & valentius extenuat. Huius meminit Eubulus in Ancylone hoc pacto: Assandum hoc Rapum alitero: Item Alexis in Fanatico: Alloquor Ptolomæum dum frustra Raporum asso.

Rapum sale conditum magis extenuat, quàm elixum, ac præcipuè si addatur Sinapi, ut ait Diphilus. Veteres autem, ut auidiores cibi forent vlos Rapis iussit aceto & Sinapi conditis, planum facit Nicander libro 2. Georg. his verbis:

*Ἀπὸ τῶν ῥαπῶν ὅτι τὸν ῥαπὸν ἄσσο
ἐκκεῖται,*

*Ἢ λαγὺν πύργου ἀνὰ τὴν σέβαν, ὅτι ἡ σέβαν
ἐκκεῖται, ὅτι ἡ σέβαν ἐκκεῖται, ὅτι ἡ σέβαν*

*Ἀquam, ὅτι ἡ σέβαν, ὅτι ἡ σέβαν, ὅτι ἡ σέβαν
Ἢ μὴν ἄσσο, ὅτι ἡ σέβαν, ὅτι ἡ σέβαν, ὅτι ἡ σέβαν*

*Par pari, ὅτι ἡ σέβαν, ὅτι ἡ σέβαν, ὅτι ἡ σέβαν
Ἢ μὴν ἄσσο, ὅτι ἡ σέβαν, ὅτι ἡ σέβαν, ὅτι ἡ σέβαν*

*Sinapi mordax semen additur, cui si accedat
Aceti fœx, balneum caput tentabit et robustius
erit.*

*Sic condita Rapæ muria tu hauries, & cum
tempestiuum eris, præbebis tibi indigentibus.*

Porro eundem serè Rapi usum cum Diosc. tradit Plinius. Est & Rapo, inquit, vis medica. Perniones feruens impositum sanat. Item singus vellit ex pedibus aqua decoctum. Et ius seruens podagris etiam frigidis medetur. Et crudum salura cum sale cuiusque vitio pedum. Semen illitum & potum in vino, contra serpentes & toxica salutare esse proditur. A multis verò antidoti vim habere in vino & oleo. Democritus in totum ea abdicauit in e his propter inflationes. Dioscles magnis laudibus tulit, etiam Venereim ebriis stimulat profellus: item Dyonisius, magisque si Erucæ condirentur. Totum quoque articulorum dolori cum adipe prædesse. De Rapis verò ut cibus identita scribit. Alius ipsas præstantior quàm his non est. Ante omnia namque cunctis animalibus nascuntur, nec in nouissimis satiantur suris alitum quoque genera, magisque si decoquantur in aqua. Quadrupedes & fronde eorum gaudent. Et homini non minor rapaciorum (melius ex vetere codice legas Rapiorum) suis horis gratia, quàm Cymarum: staccidorum quoque, & in horreis exsiccatorum, vel maior quàm virentium. Ipsa verò durat & in sua terra seruata: & postea passa penè ad alium prouentum, samentique sentiri prohibent. A vino atque melle tertius hic Transpadanis fructus.

De indem sic Galenus. Huius plantæ oleraceum quidem est quod terra extat, radix autem quæ terra continetur, dura quidem est nisi coquatur, & non esculenta: aquæ autem incoctæ nulla plantarum congenerum minis nutrit. Hanc quoque variè vulgè apparant, aded ut aceto vel muria condientes, in totum annum ipsa vtantur. Succum autem in corpus distribuit mediocri crassiore. Proinde si quis ipsa liberalius vescatur, succum crudum asseruabit, potissimum. si ipsam minus iusto in ventriculo consecerit. Quod verò ad ventrem atuner, nemo ipsam, neque deicere, neque sistere dixerit, præsertim cum cocta bellè fuerit. Coddionem enim diuturniorem postulat: eaque est laudatissima, quæ cocta bis fuerit, Quod si sumptu crudior fuerit, concoctu est difficilior, ac ac statulecta, stomachoque noxia. Nonnunquam

quàm autem & ventrem mordicat. Præterea scribit Galenus Rapi semen Venerem excitare, ut pote spiritum flatulentum procreans. Sic & radicem coctum difficilem esse, inflare, & semen generare.

His adiungenda Symeonis Sethi de iisdem sententia. Rapa admodum nutriunt, inquit, vrinam ciunt, infant; genitale semen gignunt, fauces leniunt atque thoracem. Crebrior illarum usus crassum humorem generat, & obstructions iecoris parit. Ventrem nec sistunt, nec mouent. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum, & haustum magna copia Venerem suscitatur. Aiunt enim qui hoc ipsum semen cum calamintha & lemnia terra sumplerit, eo die neque veneno, neque venenati animalis mortu lædi. Appensum inguinum morbis peculiari quadam proprietate medetur.

Rapi domestici, auctore Matthiolo, radix exaltat & humectat. Semen verò calidum est, & siccum: cum autem etiam sit amarum, abstergit, aperit, digerit, atque flatus gignit. Constat experimento, semen valere ad varicolas & morbillos: nam potum semidrachmæ pondere, morbillos latentes ad cutim expellit.

Valeat, inquit Schv. semen Rapi longi ad faciliorem Scabiei, Morbillorum & variolarum eruptionem. Nam humores ad cutim propellit 3. pondere potum. Rapi orbiculati sub cinere calente assi infimus orbiculus calidissimus, post aures applicitus magnâ efficacîa reuellit, capituli- que & dentium dolores citissimè sedat magno secreto. Raporum longorum assatorum succus cum Saccharo ad tussim infantium usus non contemnendi.

Rapæ non solum omnis status hominibus cibo & alimento, sed & quadrupedibus & cunctis animalibus pabulo nascuntur. Quid? quod & Anseres, Anatesque fronde eorum gaudent. Decocta per se radix satiat, inflationem parit, flatusque, humentem ac fluxam carnem creat, modicumque alit. Quamobrem ut id vitii emendetur, solent nonnulli eam cum lacte decoquere, ut palato magis arideant, & efficacius nutrant. Nec desunt qui Rapa condiant, sicuti & Brassicas capitulatas.

Baptista Fiera de Rapis, & Napis ita cepit.

Sunt calida & rigido gaudentia frigore Rapa,

Humidus hinc illis turgidulisque liquor.

Gloria Nursinus, sitientes cedite Napi

Educet ipse licet vos Amisernus ager.

Cum sapiant Veneri magis hac si crassa & obesa

Cana ea postremo lenta sub orbe serat.

Ex Rapis, apud Crescentium fiunt composita cum aqua, ut pro coquina tempore hyemis & quadragesimæ habeantur: ut etiam alia cum Aceto & Raphano, Sinapi, foniculis & sale: quæ apud ipsum videri possunt.

RAPVM SILVESTRE *ῥαπὺν ἀγρίαν* Veteribus.

CAP. III.

Rapum silvestre [*ῥαπὺν ἀγρίαν*] in aruis nascitur, inquit Dioscorides, frutex altitudine cubitalis, ramosus, in summa parte lauis: folia habens læuia, digiti latitudine, aut etiam maiora: fructum in siliquis [*ἀρσίν*] verum apertis seminum inuolutis [*ἀρσίν*, alia intus siliqua capitis species est [*καρπὸν τοῦ ῥαπί*], in qua sunt semina nigra, sed intus alba. Ammiscentur in smegmata faciei & reliqui corporis, quæ ex farina Lupini, aut Tritici, [*ῥαπί*] aut Lotii, aut Erui fiunt. Hanc autem Dioscoridis descriptionem

corruptam esse scribit Dodonæus; siquidem ea quæ de leuitate caulium ac foliorum, & seminis nigredine, ac interiore eius medulla candida traduntur, aliud pertinere dicit. Ast ego cur sententiam Dodonæi probem non video.

Sylvestre Rapum siue Raporum, species, auctore Plinio, in aruis maximè nascitur, fruticosum in longitudinem radice procurrente, Raphani similitudine, folio anguloso, scabroque, semine candido, duplò maiore quàm papaueris, succo acris: qui circa messem exceptus oculos purget, medeaturque caligini admisto lacte mulierum. Hoc ad læuigandam cutem in facie, totoque corpore vtuntur, mista vrina pari mensura. Erui, hordei, Tritici, & Lupini radix ad omnia inutilis. Quæ postrema in publicis exemplaribus depræuissima sunt: ea enim verba, mista vrina pari mensura & cætera, ad ea de quibus hic agitur nihil prorsus faciunt. Quare ex Dioscoride sic corrigenda. Hoc ad læuigandam cutem in facie totoque corpore vtuntur, admixto in smegmata, quæ ex Erui, Lotii, Tritici, aut Lupini farina fiunt.

Placent quæ Cæsalp. de Rapo sylu. prodidit his verbis: Plinius tertiam inquit esse Rapi speciem, quod idem Theophr. innuit. At Diosc. longè aliter describit Rapam silu. quam in hoc genere nequaquam adhuc vidi. Nec vllam adhuc Turn. comperit plantam, quæ per omnia Rapi silu. descriptionem expleret. Etli enim Præceptores secutus, Rapunculum vulgatum esse, Rapistrum, seu Rapum silu. Dioscoridis putant, penitus tamen perpensâ descriptione, in multis non conuenire deprehendit, Quocirca cogitur & Matthiolus Fuchsii sententiæ refragari, qui manifesto errore putat Rapum silu. esse Rapunculum vulgè dictum: quippe quod illi minimè respondeat. Nondum noui, ait Anguill. Rapum silu. licet sit, qui dicat se scire in Italia provenire, ego nunquam vidi.

Quod autem Matth. asserit silu. Rapis scaterè ubique Hetruriam, nullis reclamantibus notis. Cur obsecro eas notas non clariùs ostendit? Cur in post. com. non patefecit: cur aliud Rapum silu. tradidit. Sed hæc Rapa siluestria qualia sint, videamus.

RAPVM SILV. MATTHIOLI

CAP. IIII.



Rapi silu. i. imaginem, quam hic (ait Matth. in post. com. Italic. cum mag. figuris, vbi *Rapo Saluatico*: & Lat. ac Epit. vbi Rapum silu. Sed non Diosc. Et H. Germ. vbi *waldruben* vocat) appingi curauimus, etli syluest. Diosc. Rapum non referat, refert tamè plurimùm domesticum. Rapum sylu. nostrum, frequens in Bohemia in agrorum

Descriptio & Synon.

Rapum silu. non Diosc. Et Locum

Plin. Diosc. la. 31. in post.

marginibus nascitur: exit folio, caule, flore, semine, domestico simile, sed agrestioribus foliis. Radix illi inest Raphani modo longa, crassaque, sed sapore per omnia domesticum refert. Legitimum nasci copiosum in Hetruria diximus non quodd ipsum vquam à nobis visum sit, sed quodd id ex aliorum relatione intelleximus. Nostri semen cum insigniter amarum habeatur & absterforia sit facultate præditum, alterius loco securius illini poterit, vbi cetera detergere fuerit opus: quin etiam necandis vermibus vtile quoque fuerit. *Uacille*. Sed quantum fidendum sit picturis, assertionibus & descriptionibus Matthioli, vel vnicus hic locus satis demonstrat, non vilam plantam dicit nullis reclamare notis à Dioscoride: quæ occasio, vt suspicor, eius Rapum non differre ab eius Lampfana, ac etiam ab Eryfimo (per quæ intellige Rapistrum nostrum) ei non bene notis: quam opinionem augent, quodd Glossatores, Patrocinatores & Similes Matthioli verbotenus eius duntaxat meminerint, nec demonstrant veras notas quibus possit discerni à Rapistro. Vix etiam puto Lacunam scire quod scribat, quando dicit, *Nabo siluestre* sunt crassi & corpulenti, non tantum quantum sativi.

Label. & Pena Adu. Rapum sylu. non bulbosum. Est frequentissimum præsertim apud Flandros, Germanos, qui ferunt hoc, quodd sola bobus pabulo cedant. Luxuriat enim tanto foliorum numero, vt radix iam non tuberosa aut Rapola, sed exilis nec ventriosa, vsquam sit, alioqui sativæ rotundæ turbinatæ non dissimilis, sed discretu facilis, crispior, rugosiorque folio & c.

Label. Obl. Rapum silu. non bulbosum, Hisp. *Nabofaluage*. Adu. p. 66. & Icon. 198. Teut. 116. Licet Lobelius assumat figuram Matthioli Rapi sylu. aliter paulò tamen syluestre aut aruorum Rapistru describit: quæ tamè de Rapo sylu. scribit possunt convenire Rapistro, quodd an ei bene notum reuocauimus antè in dubium.

Tabern. Icon. & hist. Rapum silu. Wild. Rüben: Figuram habet Matthioli nonnihil mutata, & nihil præterea particulare.

Gerard. Angl. l. 2. c. 1. Rapum silu. Wilde Turnepes. Tabernaconem habet Gerardus.

C. Bauh. in phyt. Rapa 3. silu. & apud Match. Rapum tertium, Rapa silu. non bulbosa, Rapum silu. Match. Rapa silu. Cæsalpino. Ego igitur aliò refero Cæsalpini Rapum silu. nempe ad Sinapi Echinatura.

NAPVS.

CAP. V.

Descriptio **N**apus sativus caule assurgit cubitali & altiore, multis alis concauo: folia parte infima pinis caulem ramisque amplectuntur, pediculis destituta, aut iis membrancis hærentia: & inferiora quidem sinuata, superiora verò non item in acumen desinunt: flores lutei Brassicæ: semen quoque simile aliquatenus in siliquis longis, at radix rapita est, minus tamen in ventrem exuberans, altiusque demissa, sapore carnis comparioris candidæ acriusculo.

Napum Buniadem Græci nominant, omnibus olim cognitam, nunc Medici, pace tamen eruditorum dixerit Ruellius, prorsus ignorant: Sed mirum cur Ruell non describat, & plantam, vt dicit, prorsus ignotam, notis suis non manifestet.



Apud Athenæum habetur, Theophrastum *Canis* quidem non nominasse, cum Nicander eo antiquior eius mentionem fecerit, sed quoddam Rapum marè vocasse, quodd foras Buntas sit.

Nusquã porò, quodd legem, Napum descripsit Dioscorides, neque Plinius, licet hic ex Theophr. generis eius quinque faciat, de quibus sub Raphano.

Raphanidas enim Theophr. Plinius Napor esse putauit, atque ita transtulit. Plinius porò velut horum quinque Naporum generum oblitus, duas rursus differentias facit, vt alter *Canis* de quo lib. 27. agemus, alter *Canis* appelletur, verum quæ confundens. De hoc inquit: Naporum alterum genus Buniada appellant, & Raphano Rapo simile, seminis præclari contra venena. Ob id in Anudotis vtuntur ipso.

Quia autem Napi in Raporum genere videntur esse, & Rapo similes (foliis enim & radice Raphanos referunt, caule verò floribus & semine Rapum æmulantur, idè opinor Galenum, inter Rapu quæ *γερνυλιν* vocatur, & Napum quæ *βουνιάδιν* nullum statuisse discrimen, vt fusi iam supra dictum.

Huc accedit autoritas Turneri, dicentis. Galenus Napor sub Rapis videtur comprehendere, nusquam enim in lib. de simpl. facult. factam inuenio mentionem, Præterea Paulus Rapum & Napum coniungit. Et hinc foras Cordus Napor Rapis congeneres esse scribit, densiores tamen, aciores, & minores. Inueniri etiam luteo & croceo colore Napor in Bordueldiano Brunsvicensis Ducatus agro, quibus præcipua laus & autoritas attribuitur.

Trag. Alterum sativi Rapi genus, plantæ à vulgari diuersum, Rapum sativum alterum oblongum (prælongum dixisset, si memoria labi non voluisset) siue Napus, *Stechrüben*, *Baumholder Rüben*, *Stickelrüben*, *Brorfeldische Rüben* (malè, ab oppidulo enim *Borfeld* / vbi nascuntur, Brunsvicenses *Borfeldische* nominant:) Verus Napus Veteru, Græcè *Canis*, Serap. *Selen* dictus.

Matthiolo & Fuchsio genera duo sunt, variè interim diuidunt. Fuchsius enim in sativum & syluestre distrahit. Napi, inquit, siue Buniadis, quem Galenus & alii Veteres in Raporum centum reponunt, duo sunt genera, syluestre & sativum. Sativum quodd forma proximè ad Brassicam tertie speciei accedit, radicemque longiorem obtinet. Germani huius generis Napor *Trüben*, *Stechrüben*, nominarunt. De sylvestri mox agemus. Matthioli in album & flauum his verbis: Napi Theophrasto (vt somniat Matth. non enim recordatur Naporum Theophr.) & Plinio plura produntur genera, quanquam ego mea tempestate duo tantum repererim, nempe album & flauum.

Flauus

Mani tamen albos crassitudine superent, magisque colore placeant: sunt tamen insipidiore, & gustus odid minus grati.

Matthiolum sequitur Lacuna, qui duas quoque tradit species, albam, quam praefert in Italia, & lutea, quam in Hispania, ut teneriorem, qualis est ea quae provenit in Somossiera.

Dodon. Gall. Napis hortensis, siue domestica, Lat. Napis.

Napus quem *Nanonem* vocant, inquit Celsus, radix est in longitudinem extuberans, acris rapa, amarior raphano: color alius candidus, alius buxeus.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Napis i. siue sagua. Napum radice nigra legimus in horto Montbelg. Ill. D. V. Vitemb. quem colit Frater Io. Bauhinus.

Gerard. Iconem Rapi rotundi Tabern. posuit pro Bunade. Iconem autem alteram Tabern. Rapi minoris, ille posuit pro Radicula sagua minore.

Graecis, *Bunias*, non *Bunier*, Lat. *Napus*, Germ. *Endrübén* / *Endelrübén* / Saxon. & Brunf. *Bordfeldische rübén*. Belgis, *Parúsche rübén*. Gall. *nanet* & *nanet*, Ital. *nanoni* & *napo*. Hisp. *nabica* *naboltengo* *d del gad*. Angl. *Nanero*. Hung. *Baro repa*. *Bunias* appellationem à tumente figura, quam praefert hae planta, Graeci deslexerunt: namque radix eius in amplitudinem excrescit, & in rotundum extuberat. Chuos, colles, verrucosaeque loca *Bunias* dominant.

Napus de uxam amat, & succam, tenuique propriam terram. Itaque glareosis sabulosisque arvis melior exit. Plinius pro Rapa de Napis hae meo iudicio scripsit. Napi vero Amiterni, quorum eadem ferè natura, gaudens æque frigidis. Et alio in loco. Palma Roma Amiternis datur, inde Nursinis, terna nostratibus. Et Martialis Nursinas pulas appellat his versibus:

Nos Amiternus ager salicibus educat hortus:

Nursinas poteris parcius esse pilas

Seritur, transfertur, semenque perfruit, eodem quo Rapum tempore. Rapum etenim transferri, & in alium locum deligi debere ex cuius semine nasciturum expectatur Rapum, certum est: eodem modo & Napis translationem desiderat. Nota tamen [ut cap. de Rapis iam annotatum] ex Plinio, quod Naporum medicina sit, siliquas una ferere. Quo si omisso iam nate Erucæ sint, remedium est Absinthii usus, decocti inspersus, & Sedi quod Aizoum vocant. In horto satis celerrimè nascitur: tertio enim die erumpit. De Napis vide plura capite de Rapis, ubi quæ ex Columella citantur, his omnia conveniunt.

Bunadem habemus in Horto E. C. nec frequens aliis est Montbelgardi. Montpelli copiosum vidi florentem Vere: Lugdani & Genevæ Aprilis copiosè in cibis utuntur, uti & Patau ubi *Nanonem* vocant.

Cocta Napi radix inflat, ut rectè scripsit Dioscorides, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, ob id & antidotis admiscetur. Conditur muria radix. Galenus medicamenta simplicia, quæ in theriacam adduntur expendens, silvestris Napi semen ex Creta sumendum esse ait. Cui omnino ad stipulandum esse censet Matthiolus, quoniam Andromachus, nec Iasius, nec silvestris meminit, sed dulcis seminis Napi, quod de Iasii semine potius intelligendum videtur, quia in agresti nulla dulcedo inest, sed potius acris quædam amaritudo: in Iasio vero contra. Praeterea Iunior Andromachus, item Democritus

Tom. II.

Napi tantum semen requirunt. Quibus accedit Dioscoridis autoritas, scribens Napi semen & praebatur, lethalia venena inefficacia reddere, & antidotis admisceri. At fortasse Galeno comperitum erat silvestris ex Creta semen peculiari quadam virtute adversus venena pollere, atque ob id in theriacam addendum, quo tamen si destituamur Iasii semine utendum in antidotis esse censet Matthiolus. Id semen etiam, eodem Matthiolo auctore, necat interaneorum animalia ex limonum aut arantiorum succo potum: ex adianthi siue lentium decocto cum alia exanthemata, tum sublimia illa, quæ vulgò Morbillos vocant, ad eum pellit, tum quoddam imis corporis partibus ad extimas partes morbosam materiam ducit, tum quoddam propria vi morbi malignitati resistit. Datur vulter cochlearis mensura ex vino, addita seminis lini drachma, ad ciendam urinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit, si ex oxymelite & tepè æqua hauriatur. Summo perè etiam prodest multis diebus eius seminis drachmam ex marrubii decocto propinare ictericis, & aquæ intercuti incipienti. Externè Naporum idem usus, qui Raparum. Napis in secundo ordine calidus est, & in primo humidus.

NAPVS SILVESTRIS.

CAP. VI.



Florès, siliquæ, *Defensio*
semina. Sati-
uè proxima sūt:
folia crebrius
dilectis, lacinia-
taque, nullis in-
dem pediculis
cauli annexa.
Verum radice
sylvestrem na-
turam sapit, mi-
nor, & pollicis
articulum pa-
rum superans,
turbinata, sapo-
ris acis.

De Napo silv. *Rapi silv. ju-
men pro Bu-
niade Graeci
paler
Nanonem*
hæc Ruellius.
Medici nunc
suspecto quod
sylvestris Rapi
seminio, Bunia-

dis vice abutuntur. A rutibus tamen quædam herba colitur Rapa, radicique similis, quam *Nanonem* appellant, foliis Rapi, laevioribus, post adolescentiam fructu modo laciniosis, cubitali scapo aut interdum altiore, radice minuscule, floribus eidem proximis. Rapiatio caule cubitali vel altiore, cuius foliis non secus atque rapaceis vescuntur agri, praesertim cum rustico: olerum inopia premit. Ea tum cocta tum cruda aceto & sale condita deuorant. Nec tam crebro frondium auius coërent, quominus in eadem erigatur, quod in Rapis fieri certum est, ut in radicem incrementa capessant, sed in scapum attolli patiuntur: nam ubi nore seminis proventu non mediocre questum faciunt. Semen huius calfactum trisulibus, que molis pressum magnam olei vim re mittit, quod non ad obsonia modò, sed ad lumina quoque lucernarum utuntur. Auiculas caueis reclusas, Carducales, Miliarias, Frigillas & id genus similes, semine huius apud nos aucupes alunt.

Bbb

Fuchf. Napi alterum genus siluestre, Germ. Raß
Feldrüben, foliis suis Erucæ non dissimile est, radi-
ce ampliore & rotundiore.

Tragus Rapum, siue siluestre, Wild rüben / &
Feld rüben / sine iconē, cui eadem tribuit, quæ
Ruellius Nauet. Tertium, inquit, Rapum vul-
garis sativæ sylvestris est species, quæ cibo non v-
satur. Seritur illa quibuldam locis, maximè
apud Mediomatrices [his enim naves è quibus
nostris regionibus oleum conficitur, non in ma-
gnacopia nascuntur,] seminis è quo oleum isti
conficiunt gratia. Quod ad formam attinet, æquat
hoc Rapi genus sylvestrium Pyedrum magnitu-
dinem, gustu amarum. Hortulani nostri in Au-
tumno serunt, Aprili deinde mense, veluti & sa-
tivum Raporum genus, caules illius longi profi-
liunt, flore comantes violis simili, luteo, copioso,
Sinapis instar. Folia eius antequam excaulescit sa-
tis molliora sativo genere, & vindiora, qui fit vt
Martio mense inter cetera olera decoquantur.
Semen habet nigro Sinapi persimile.

Dodon. Gall. qui depingit, Napus silvestris. Lat.
qui iconem omittit, Napi silu. species, Gallie ruri-
bus Nautæ, Ruellio teste, appellata. Quæ ex non
transplantari semine nascitur & foliis & caule, re-
liquique Napum æmuletur, sed radice non cras-
sa, oblonga quidem, & haud magna.

Aduers. Lobel. & Penz fuerit fortè Bunias siue
Napus silu. quæ conquerantur deceptos Plinium
ac Matth. quasi cum Bunio confuderint. Plant.
Icon. 206. Bunias silu. Napus flore luteo T. 238.

Gerard. Bunias silu. Lobelii Wilde Naueu.
Icon posita à Gerardo est apud Tabern. iconum
p. 406. pro Rapo longo minore Lang Stopffel
rublin.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Napus, siue silu.
ex non transplantatorum semine etiam nascitur.

Camer. apud Matth. Si Napi non transplantan-
tur, vt Rapæ silvestres fiunt, & possunt vocari silu.
Napi. Hactenus non obseruauit lectione vel audi-
tu Napos transplantari.

Rapum silu. Schvv. Rapum silu. Rapaceum semen, Ori-
famen. Autumno seritur seminis causa. Aprili flo-
ret succrescente semine copiosius. Ex semine oleum
extunditur pauperum culinis inferuiens. Auicula
eo pascuntur etiam. Ego suspicor intelligi Na-
pum.

Tempus
Vita.
Locus.
Seritur in agris ad oleum, habemus etiam in
horto E.C. In agris Montibelg. & vicinis pulchre
florere conspicitur mense Aprili & Maio: radices
subrotundæ sunt, modò longiores, quæ non so-
lent ad cibum assumi, sapore Rapi. Folio autem
magis accedit ad Napos vel Brassicas.

RAPISTRVM FLORE LVTEO.

CAP. VII.

Descriptio

Tanta Rapistri lutei, vbi adoleuit, cum Sina-
pi affinitas vt obiter intuentem fallat: ra-
dis alba lignosa: caulis cubitalis & bicubitalis, in
ramos crebros diuisus: folia Rapistia, sed quæ
attrita non acri illo Sinapis odore nases feriant,
sed oleraceo penitus: flor luteus, minimè diuer-
sus: arin siliquis longè maximum discrimen: si-
quidem ex in Rapistro duplè longiores conspi-
ciuntur, quàm in Sinapi, nec vt illa quadran-
gulæ compressæ, sed multangulæ & turgidulæ:
quibus dehiscenibus semina comparent similiter
membranulæ mediæ adhaerentia, sed numero



plata, eaque
lucida & nigres-
cunt Sinapios
sint rufa nec
villo nitore
perpolita, qui-
bus tamen a-
crimonia pa-
rum admodum
cedunt. No-
stra figura Fu-
chianan non in
omnibus pla-
cet, priora fo-
lia sinuata non
benè demon-
strat.

Ex Plinio &
Theophr. ipse
que aded qua-
licunque Dios-
coridis descrip-
tione colligit

Cornar. Irionem non esse aliam herbam, quàm
eam quæ inter segetes, Hordei maximè & Auenæ,
nascitur, & à nostris Bederich vocatur, respon-
dens descriptioni Erysimi (Irionis) Dioscor. vt
patebit conferenti cum ea quam ponemus por-
thea post Erucas. Lamplana à Diosc. nullis notis
describitur, inquit Matthioli, quare dixerim
cum Plinio inter silv. Brassicas Lamplanam esse,
pedalis altitudinis, hirsutus foliis, Napi simillimis,
nisi candidior esset flore. Nascitur hæc frequen-
tissima in Hetruria, Apulia, atque plerisque Italia
locis, iis præsertim campis, qui aratur eo anno
minimè sensere, tamen nobis hac tempestate
non fuerit, nisi urgente annonæ penuria multi-
mentorum vltim recepta. In Hist. Germ. Wilde
F&L Lamplana floribus pallidis quales Brassica
aut Rapæ. Egregia interpretis Dioscor. officio
fungitur Commentator qui ait Diosc. non des-
cribere Lamplanam: ipse etiam nullam descrip-
tionem exhibet contentus figurâ, de qua dubi-
tant Glossatores & Patrocinatores nec quic-
quam certi proponunt, quod non mirum. In
Com. dicit Matth. flore esse Napi candidiore ex
Plinio: In hist. Germ. flore pallido: Glossator
appingere videtur flores & siliquas Rapistri flore
albo, idem facit Patrocinator, non tamen intelli-
git plantam, sed eandem nobiscum nempe Rapi-
strum flore luteo. Matthioli præterea videtur
capite de Irione seu Erysimi eandem plantam
confundere in iconē, folia enim & flores ac no-
men Germanicum videntur cōpetere Rapistro:
ac tale fuisse opinionem Glossatoris satis appa-
ret: diuersa Patrocinatoris vt dicitur sub Ery-
simo.

Camer. ad hist. Matth. Germ. Bederich. Ery-
simum vel Irionem. Figura ex Fuchfio non competit
descriptioni Matthioli.

Lonic. Bederich / Bederich, wilder
Senff. Armoracia, Raphanus silv. officin. Rapi-
strum, rapum, Cheria, Ponticis Arinon, Leucon:
flore luteo interdum albo. Meminit idem c. 195.
lib. 5. des gelben wilden senff [Sinapi silv. lutei].
quod quò referamus non videmus, nisi sit Ra-
pistrum hoc luteum, figura tamen non placet
pro Rapistro.

Gesner. hort. Rapistrum passim in aruis nasci-
tur, idem quod Lamplana, vel cognatum agreffe
olus. Item in cat. Erysimum. Raphanus silv. Græ-
cus Cheria, Launis Armoracia, alius Leucon, offi-
cina

Matth.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

C. Bauh.

etnis hodie Rapistrum, *si alia* apud Theophr.

Sunt autem Celsi. Armoracia radices silvestres parum ac praeura floribus luteis, ceteris iisdem cum Radice siue Raphanide.

An Anguill. Erysimum vulgare? An eadem Lampfana notissima nomine: apud Mediolanenses *di Landri*, & Abruzzos *di Lafana*, & in Graecia maxime in Creta vocatur Lampfagida.

Dodon. Gall. Rapistrum Neoteris, quibusdam Sinapi silvestre. Gall. *Velar* aut *Tortelle*, Germ. *Hederich*: Belg. *Hederich*. Videntur Erysimum Theophrasti, quod Gaza vertit Trionum: non autem Erysimum aut Irio Dioscoridis. Lac. in fol. Rapistrum, nonnullis Sinapi silv. Germ. *Hederich*. Figuram Fuchianam retinet, nec amplius Erysimum Theophrasti dicit.

Rapistrum (aut in Aduers. p. 66. Lobel. & Pena) aruorum vulgo vocatum e Raporum censu est, passim viarum margines & segetes ornans, ubique praesertim Septentrionalium, floribus luteis numerosis Brassicae aut Rapae, in caulibus sesquicubitalibus folia insunt Lampfanae aut Rapae silv. Brassicae virore & laeure non erant, videntur Irii Diosc. radice tenui, neuiquam fibrosa, gustu item Rapi silvestris, cuius facultates prope sortita est, sed vehementiores, tamen vsus neglecti aut ignoti. Neuiquam est Erysimum Diosc. certe admodum affinis est Napis & Sinapi: tunc namque semen Sinapi ementitur & vsus explet rusticis. Item pag. 69. Item p. 70. *Ray-Jard* [Italis *di Landri* & *di Lafana*: Galis *Sauces blanches*, quasi Sinapistrum album] Napum silvestrem vocant olim. Oulus silvestre Plinii quo vixerunt Iulij Caesaris milites, perpetam Theophrasti Erysimum putatum a Dodonzo. Columella hanc intellexit Lampfanam. Senensis inferius alienis plumis ambigenus enolat: *Miramus Nos* Aduersaria dicere Rapistrum folia habere Lampfanae, cum ipsis autoribus sit Lampfana: Praeterea ea dicere folia non esse Erucae, cum dixerint Rapum habere folia laciniola Erucae: Nescimus etiam cur scribant habere folia Brassicae virore & laeure, considerent quibus nota planta, an talia sint folia: Hinc nobis oritur dubium, an Rapistrum diuersum sit ab eorum Rapo silv. non bulboso.

Histor. Lugdunens. Lampfana Matthioli. Et Lampfana vera, falso Theophrasti Erysimum Dodonzo. Item Irio Matthioli. Tres figurae vnius plantae, prior inepta ex Matthiolo, & tertia ex eodem, quae videtur composita ex Rapistro.

Tabern. Icon. & Hist. Lampfana flore melino: *Ader fol mit bleich geelen blumen*. Tabernamontani Compilator non demonstrat quae in re differat Lampfana eius ab Armoracia siue *heiden* retrig.

Icon. Armoracia Tabern. per Gerardum Anglum posita est pro Raphano silv. *wilde radisch*: flores ferens luteos, verum, ut postea dicemus, Tabern. dicit de sua Armoracia vocari Rapistrum album: Gerardus praeterea pro Lampfana & *Dode* cresces ponit iconem Lampfanae Tabern. verum ille satis indicat se ignorare quod scribat. In descriptione tradit flores esse Hieracii, in Icone vero & in planta quam repraesentat flores non sunt similes Hieracii: hoc etiam annotandum, Lampfanam quorundam flore Hieracii non esse referendam ad Nasturtium siue Cresces Anglorum, ut ipse facit.

Tom. II.

C. Bauh. Phyt. Rapistrum siue luteum: Matth. Lampfana: variat foliis, aliquando habet sinuata, aliquando non incisa, unde quidam duas species constitutere volunt. Apud Matth. Quae pro Lampfana a Matthiolo pingitur, Rapistrum esse aruorum ex eius epistolis satis liquet. Hoc Rapistrum a similitudine cum foliis Rapae dictum videtur: est flore luteo, est albo, aliquando etiam purpureo: i. Rapistrum luteum, Lampfana Matthioli. Frater ponit figuram Matth. a Camerario auctam siliquis & floribus ut multi per suadeo Rapistri flore albo.

Schvv. Rapistrum luteum: E. *Urtica* Cordo & Raphanus silv. Lampfana Matth. Lampfana Dioscor. Tabern. Geelhederich *Heidenreitag* / *Schneidens* / *wildsens* / *E* Raporum silv. censu est: An huc referenda sit Armoracia Schvv. *Urtica* dubitamus, (quamvis icon Tabernamontani possit conuenire,) quia Tabern. dicit vocari Rapistrum album.

Rapistrum flore luteo, Lugduni obseruamus, florens mense Maio, Genex Decembri, Basilae cum flore & siliquis mense Octobri, in vineis ad montem Mouters. Montbelgardi abundat in segetibus florens Iunio & Iulio, Augusto cum flore & semine maturo, prouenit etiam in horto sil. E. C. Plurimum, inquit Schvv. *Urtica*, inter segetes hordeaceas & Rapaceas inuitus Agriculis luxuriat, ut interdum totos agros cooperiat Iunio & Iulio.

Relicantem autem ac extergentem, non nihilque digerentem facultatem obtinet, Galenus apud Dodonzum hanc etiam malos succos procreare scribit: Dioscorides vero plus alere atque quam Rumicem, & stomacho vtiliorem. Coquantur autem, eodem auctore, caules folisque, & in cibum recipiuntur. Acrimonia pollet ut & Nasturtium. Semen feruens & acre gusto, urinam prouocat.

RAPISTRUM MONOSPERMON.



Rapistri monospermi ramum a D. Rychnero Medico Basiliensi habemus cui flores lutei. Frater Casparus eandem apud Matth. & Phyt. talibus describit: Rapistro Monospermo ex radice longiuscula albicante, parum fibrosa, caules pedales, quandoque altiores, rotundi, tenues, ramosi, eleganter virides, leuiterque hirsuti exurgunt: folia humi sparsa crassa sunt, Rapi foliis similia, ad principium laciniata, dein subrotunda, leuiter sinuata & subhirsuta: flores secundum cauliculos palmares & tenues, velut in spica dispositi: quadrifolii, eleganter lutei aut rubri, quibus siliquae succedunt rotundae eleganter propter strom, per eas quemadmo-

bbb

dicto in semine Coriandri discurrentes | in fila-
mentum oblongum abeuntes: quæ quasi geminæ
sibi insident, parte tamen superiore maiore, cum
in ea semen parvum, oblongiusculum, sed uni-
cum [vnde ei nomen] contineatur.

C. Bauli, apud Marti. Rapistrum 2. Phyt.
quatum sine Monospermon. Huius semen no-
mine Lampiran monospermi D. Doldius misit,
et hic Balilex in horto D. Zuingeri Maio mente
floruit.

Hoc ipsum postmodum, sed multo strigosius [illud enim cultura elegantius] in agris quæ Augustam Rauracorum iungit, ad iubarum domum observauimus: idem sed humiliter & valdè ramosum, folijs parvis, eleganter virentibus, in agris circa Lutingen ad syluam inuenimus: & simile Monspelio ubique spontè creuit habemus.

RAPISTRI GENVS AVSTRIACVM

Folia à radice spargit, hirtis pilis vndique ob-
ta, sed potissimum & vel magis in aucta par-
te, profundis segmentis laciniata, quæ & ipsa
crebris denticulis serrata sunt. *Caulis* verd om-
ni hirsutie caret. *Folia* item superiora quæ ad
ramorum exorumbrent tota glabra sunt, non
tamen tam profundis segmentis dissecta, infe-
rioris quoque multo minora. *Floris* in ramorum
extremis umbellati, lutei, Rapistræ vulgaris, sed mi-
nores: Quos siliquæ excipiunt. Hanc siccam nobis
communicavit Agerius collectam in Austria
inter segetes, non curauimus pingentiam, quia
non integra plasmata & quia nobis non bene no-
tum Radum sily. Matthioli, cuius figuræ non ma-
le conuenire videtur.

RAPHANVS.

CAP. VIII.

Descriptio



Folia proxi-
mè ad Ra-
pi folia acce-
dunt, sic vti-
cile veratissi-
mis imponere
possint: paulò
tamen magis
sunt sinuata:
cetera eua mi-
nùs conue-
niunt, Rapha-
no enim *fls*
purpurascens,
quadrisolius, a-
piatibus luteis:
siliqua crassio-
res, pulposi, in
luculos tubi-
culos, conuall-
bus interce-
ptos, distincti.

in quibus semen rubrum, acro: Radix crassa, longa, magnitudine varia, alba, vel rubra, gustu acri & mordaci, recto vix surgit cause, cubitum vnum aut alterum alto.

Dioscor. duo Raphani genera facit siluestre
latintum. Hoc ali Polydes Eryngium, Roma-
ni Radicem nostratem, Aphri Thorpach appel-
lant.



Theophr. in *Raphanum*
plura genera *Raphanus*.
Raphanum di- *Radicis*
tribuit. *terrebus*
Distingunt hæc,
inquit, foliis,
radicibus, colo-
ribus, saporibus,
reliquis-
que eiusmodi.
Vt Radicis ge-
nera Corin-
thium, Cleo-
nazam, Liotha-
lassiam, Ræo-
tium. Amplissi-
mè Corinthia
adolest, quæ
vel stirpe con-
stat delectæ:
hæc enim sur-
sum versus pro-
truditur, nec ut
cetera in ter-

ram ampliari solita est. Liothassia, quam Thraciam vocant, validissima adversus frigora traditur. Berotia dulcissima est, & figura rotunda, nec ut Cleoniza, praelonga. Quibus folia laevia, dulciores suaviorésque sunt, quibus autem scabra, acriores. Genus præterea redditur, quod foliis Erucae simile constet. Radicis generis hæc notaerunt.

Athenæus Theophrasti locum hunc citat his verbis : Theophr. lib. de plantis quinque Radicularum (*parvidor*) genera esse tradidit: Corinthiam, Lithosiam, Cleorgan, Amurbeam, Berotiam. Dicitur verò à quibusdam Lithosiam Thraciam esse : Berotiam dulcissimam omnium rotundam figurâ : in uniuersum dulciores esse, quarum leuia sunt folia.

Cæterum, quoniam quæ Atheniensibus præcipue
dicitur, aliis nonnullis, ut & Callia apud Athe-
nazium præcipue (quod autem Raphanum Radicu-
lam dixerit ex Aristophane peripicuum est) ap-
pellatur: id obiter admonitum Lectorem velim,
ut vocem plerosque antiquiores Græcos, ut
ex Apollodoro Carystio docet idem Athenæus,
libro i pro brassica usurpasset: unde Plinio erro-
ris causa, qui variis locis Raphanum cum brassica
confundit, Raphano tribuens quæ Veteres illi
de brassica prodidère, quemadmodum & lib. 19.
cap. 15. napsi tribuit, quæ Theophrastus lib. 7. hist.
cap. 4. sic præcipue docet, hoc est de Raphanis, tradidit
his verbis: Idem (Græci) Naporum quinque
genera fecere, Corinthium, Cleonazum, Liotha-
sium (non Lothalsium, ut in vulgatis Theo-
phraستي exemplaribus exaratum est) Bœontium, &
quod per se viride dixerunt. Ex his in amplitudi-
nem adolescit Corinthium, nuda serè radice. So-
lum enim hoc genus supernè tendit, non ut cæ-
tera in terram. Liothassium quidam Thracium
appellant, frigorumpotentissimum. Ab eo Bœo-
tium dulce est, rotunditate etiam brevius notabi-
le, neque ut Cleonazum prælongum. In totum
quidem quorum tenuiora folia ipsi quoque dul-
ciores: quorum scabra & angulosa, & horridiora:
amariores. Est præterea genus silvestre, cuius folia
sunt Erucæ similia.

Ceterum, Raphani radix (autore Theophr.) quali ex carne & cortice constat. Contrà Plinius ait: Cortice & cartilagine constant Raphani: multisque eorum cortex crassior etiam, quam quibus-

dam arborum. Amaritudo plurima illi est pro-
pius crassitudine. Cetera quoque aliquando li-
gnosa. Scripsit Moschio Græcus vñū volumen de
Raphano.

Vulgare & rotundum Raphani genus no-
bis esse videtur, inquit Tragus, quod Theo-
phrastus Corinthium, Plinius Syriacum, voca-
uit. Quanquam & Beroius Raphanus rotundus
sit, teste Theophr. gustūque dulcior. At Rapha-
nus prælongus quem Metensis ager fundit, Theo-
phraſti nostrā sententiā radix est Cleonza, Plinio
Algidenſis appellata.

Fuchſ. Raphanus satius, Raphanus minor Of-
ficinarum.

Lonic. Raphanus, alius longus, alius rotundus.
Matth. Radix illi variis, nam nonnullis longa,
alba, teres, tenera, fragilis, nec admodum acris,
quæ cæteris in Hetruria præstantior habetur: ali-
quibus crassa, Napi penè figura, altera longè du-
rior, acrior, & gustui ingrator. Differunt quoque
colore. Namque & alba & nigra, vbiq̃ue serè
habetur. Sed hæc altera minus frequens. Rapha-
nus 1. Raphanus 2. Icones dux apud Matth. vix
mihi discrimen monstrare videntur.

Habet Camer. horti præter vulgarem Rapha-
num alium radice nigra, qualis frequens est Ar-
gentinæ. Et alium radice lutea.

Dux sunt Raphani species ait Lacuna: Dome-
ſtici, teneri, delicati, quibus vulgò vescimur. Silue-
ſtres, duri & asperi, Plinio Armoracia, Romæ di-
cti Ratoracii.

Ofſcitantè sanè ac turpi errore Geſner. horti,
cum Bern. Deſſenio Plinium ſecutus tria Rapha-
ni genera, crispum, læue, & campeſtre ſtatuit:
ſtriſſicæ hæc Theophrastus assignauit. Sed quod
à Plinio Algidenſe dicitur, longum, succolum, ac
translucidum rectè in Raphanorum numero re-
cenſuit & eſſe ſcribit, in hortis inferioris Germa-
niæ tam frequens, vt nullum ſerè aliud norint:
hoc apud Batavo-Phryſios in eam magnitudinem
creſcit: vt viderit quod triginta libras penderet.
Quamobrem minimè mirandum, in Germania
infantium puerorum magnitudinem æquare, Plin-
ium ſcripſiſſe. Vulgaris eſt Raphanus, qui virilis
brachii amplitudinem non excedit. Sunt autem
hi translucidi: & aded fragiles, vt in taleolas abſ-
que ferro conſtingi queant. Multùm ab acredine
illa ac ſaporis vehementia, quæ ſecundum genus
pollet, recedunt: & ſanguine imbuti, linguam vlti-
que aded non vellicant. Alterum genus Rapi ſi-
guræ Syriacum appellatum, in ſuperiori ſolum
Germania prouenit: vehementiſſimum & teneri-
ſſimum, nec multà humiditate redundans: qua-
propter parciùs editur. Nam qui ſtatim inge-
runt, præter frequentes ruſtus, roſionis quendam
ſenſum in ſtomacho experiuntur.

Raphanum, inquit Amatus, Columella Radicu-
lam appellat oleris vulgaſiſſimum genus, herba
caule vno arboreo ſerè vt in Ruta conſpicitur, al-
ſurgens: quare multorum Græci, *ῥαβδαν*,
quaſi olus arborum nominant. Nec Gaza Theo-
phraſti interpres aliter vertit. Huius tria Plinius
memorauit genera, læue, crispum & campeſtre.
Dioſc. quoque trium mentionem facit, hortulani,
ſilueſtris, atque alterius Apios dicti. Amatus præ-
liceatè in Raphani hiſtoria hinc inde oberrans
diuagatur. Nunc enim falſiſſimis tribus Raphani
Plinii generibus talpæ inſtar cæcus incedit: oculo
mentis aperire debuifſet, & conſideraſſe hæc
Theophrastum à quo Plinius ſua mutuatur, Braſſi-
cæ tribuifſe. Præterea Dioſcorides non tria, ſed
duo Raphani genera ſecit, quod per ſe clariùs eſt
Tom. II.

quàm vt offendi debeat. Dioſcor. enim lib. 4. Ra-
pium, montanum aut ſilueſtrem Raphanum, ab
aliis ſolum ita vocari, tradit. Quæ occaſio vt etiam
ipſe tanquam de toto genere diuerſis, non tantùm
capitibus, ſed libris egerit diuerſis.

Cæterùm non minus turpi cæcitatis notā cor-
rector eius, ſeu cenſor tenerus Rob. Conſt. inu-
rendus eſt, vt qui errores hos non annotarit.

Cæſalpin. Radix vulgò à quibuſdam Radicula
Græcis, quaſi radix perſpicua: eſt enim tenella ac
fragilis, candida, ſerme translucida, flores purpu-
rei aut candidi. Radicis plures differentiz: nam
quædam in longitudinem creſcit, quædam in ro-
tunditatem, hæc vulgò *Rauanellas* vocant, quorum
alii cortice nigro conſtant, alii candido. Longa-
rum quædam vaſto cortice craſſo, qui gravior eſt
interno corpore: Hæc Armoracia vocamus, om-
nes ſatijs. Theophrastus Raphanida vocat, Theo-
dorus Radicem vocat. Plinius, Raphanos vocat.

Turner. Genera ſatijs Raphani duo, *Radice lon-
ga*, paſſim in Angliæ & Belgio, quibuſdam
Radice rotunda, Rapo non abſimili, frequentior
circa Argentinam, non nullis Rad. & Beroia, alijs
radix Syriaca, Angl. *Rounde radice* / *Rape radice* /
rare in Angliæ conſpicitur.

Theoſ. Dorſt. Raphanus minor vel communis
radice interdum magna & oblonga, interdum
verd rotunda & nodola, flores ſerè candidos.

Aduerſ. Raphanus magnus & parvus purpu-
reus. Lobel. Obſ. duas habet figuras ex Ma-
thiolo, vna hoc titulo Raphanus magnus Aduerſ.
p. 67. primus Matthioli: alteri Raphanus minor
purpureus Aduerſ. p. 67. ſecundus Matth. Figura
mihi apud Lobelium videntur tranſpoſita.

Tabern. Icon. & hiſt. Raphanus rotundus,
Runder rettig / Raphanus orbiculatus, *Scheibel
rettig*. Duas icones ponit non indicans discrimen:
Rapum referunt, poſſimam ſecunda orbi-
culatā radice.

Gerard. Pro Raphano orbiculato, *Rondra-
diſch* ponit Iconem Tabernamontani: eandem
& iconi Raphani rotundi inſcripſit, Raphanus
pyriſormis, *peere faſſion Radifch*: Præterea pro
Raphano ſatijs. *Garden radifch* ponit iconem
Tabern. Rapi longi pro Radicula ſatijs minore
Schmal garden Radifch. Icon. Tabern. Rapi ro-
tundi minoris ſive *Ründt Klappen* ei dicti.

Brunſel. Matth. in prior. comment. Ryſſio, Ca-
mer. hort. Anguill. Geſner. de coll. ſtrep. & cat. Ra-
phanus. Dodon. *Raphanis*, ſive Radicula ſatijs,
Radicula ſatijs minor. Hiſt. Lugd. Raphanus ſa-
tius: Raphanus 2. Matth. Raphanus purpureus
minor Lobelli.

C. Bauh. Phyt. Raphanus 1. ſive maior, floribus
purpureis aut candidis. Raphanus 2. ſive oblon-
gus: colore variat, noſter albo eſt cortice: Italis
rubello, cuiuſmodi eſt etiam Montbelgardi. Ra-
phanus 3. ſive niger. Raphanus 4. ſive lat. Rapha-
nus 5. ſive Byzantinus. Apud Matth. Raphanus præ-
cox, alius ſerotinus: hicque albus & niger & ru-
bens: albus, oblongus: ruber oblongus: qui fibras
rubentes per ſubſtantiam diſcurrentes obtinet,
habetur & radice lutea. Raphanus 1. Raphanus 2.
Hæc Frater, cuius icones non mihi videntur mon-
ſtrare differentiam.

Nicol. Abr. à Framboiſ. Raphanum, *raiſers*,
& Rapum, *raue*.

Theophrasto, Dioſcoridi, ac Galeno, aliſque
Veterum. Græcè *ραβαν* dicitur: poſteriores *ῥα-
βαν* appellane: Antiquiores autem & Attici,
Braſſicam *ῥαβαν* vocarunt. Latinis autem *ραβαν*
Radix & Radicula dicitur: Offic. verd Rapha-
bbbb

aus. Serapieni, annotante Trago, Fugul, sine Fugul, Auerthoi alphasel, Hebr. Zenon, Rabinis & Thalmudistis Fugla, & conuersis literis Pilga. Germ. Restig, Belg. Radys. Gall. Radi, Raifort: It. Raphano & Radice: Hisp. Ranano & Rananillo, Angl. Radisch: Boh. Rzerfeto. Radiculæ semen Cxlius à Marcello Empirico Bacanon dici affirmat: similiter ab Aetio. Cornarius tamen Cacanone legit. Raphanus quidem *ἀνὸ τῆ παλαιῆς αὐθιγῆς* authore Athenæo, id est, quoddam facili appareat, sibi nomen ostendit: nam tertio à saty die profilit. Radicis vocabulum, ut author est Varro, à Græcia venit in Latium, cum Veteres Græci radicem dixerint, quam nunc Rhabbanum. Nisi quis forsitan arbitretur nomen accepisse, quoddam exteras amplitudine superet, vel quàm paucissimis magnitudine cedat.

Satio

Seri vult Raphanus, qualiter videre est apud Plinium, terra soluta, humida. Fimur odit, palea contentus. Frigore adeo gaudet, ut in Germania infantum puerorum magnitudinem æquet. Scitur post Idus Febr. ut vernus sit: iterumque circa Vulcanalia, (Aliis circa ortum Caniculæ, aliis Calendis Augusti,) quæ satio melior. Multi & Martio & Aprili serunt & Septembri. Incipiente incremento, confert alterna folia circumobruere, ipsos verò accumulare. Nam qui extra terram emerit, durus sit atque fungosus. Aristomachus detrahi folia per hyemem iubet, & ne lacunæ stagnet accumulare: ita in æstatem grandescere. Quidam prodidit, si palo adacto cauerna palea infernatur sex digitorum altitudine, deinde in semen simumque & terra congeratur, ad magnitudinem scrobis crescere. Præcipue tamen salis [De asslica hoc Theophr. cap. 7. lib. 2. Causis.] aluntur. Itaque etiam talibus aquis irrigantur, & in Ægypto nitro sparguntur, ubi sunt suauitate præcipui. In totum quoque salugine amaritudo eorum eximitur, suntque coctis similes. Ægypto muè celebratur propter olei fertilitatem, quod è semine eius faciunt. Hoc maxime cupiunt scire, si liceat: quoniam & quæstus plus quàm à frumento, & minus tributi est, nullumque copiosius oleum.

Gaudet autem [authore Theophrasto] frigidibus Radix [pæanis] & sic eam dulcescere putant, simulque incrementum in radicem non in folia verti. Austrinis atque serenis temporibus celeriter caulescit. Hyeme cum maxime viget radix terà obruta, ut nullum imbrem admittat, ac directis quibusdam foliis mira crassitudine distenditur. Sed Raphanus quia nullam vim germinandi ab imis obtinet, alimentumque capit, quod non sursum transmittere apta sit: idcirco subtus crassatur, amplissimaque efficitur. Causa verò, ut nulla putredo, nulla corruptio accederet, humo congestitæ datur, quæ aquam arceat, & in totum, omne quod alienum est, admitti non patitur. Post æstatis Solstitium Iunio ac Iulio commodissime feritur.

Tempus & locus

Raphanum vidi florentem Aprili flore cæruleo: Genesii Nouembri, flore cæruleo & albo, ibidemque cum pauca cærulei parte Maio. Basilex Raphanus est in vigore Augusto & Septembri. Lugduni principio Maii habent edules. In pago Iomps (inter Basileam & Omersheim ad Rhenum ferè sito) vidi Raphanum radice rotunda Rapi instar: ita ut non facile quilibet distinguere possit, nisi gustu, quem cum mense Septembri degustarem, non videbatur differre à longo allato Argentina, ubi cum Raphanum quoque obseruavi: talem quoque vidi in Malmunster,

qui loco humido creuerat, non poterat manu amplecti, ac sapore erat non admodum acris. Patuli habent rotundum, breue, album, non vique adeo acrem & rubrum, sicut & nigricantem oblongum, satis magnum, valde acrem. In Passauant Abbas Lutrensis in horto Domini V Valtherab Andlavv, vidi crassissimum & maximum ad magnitudinem cruris excresecens: talem habemus in horto Ex. C. Hortulanus hyeme reponendum seminat, huius radix sub terra totalatet, ac tota hyeme ad cibum adaptari potest vique ad Ver: ut & alterum longum, tenerum, album, extra terram eminentem: cuius radices habentur edules Iunio. Et hic potest dici longissimus & præcedens crassissimus. Longissimi habemus genus cuius pars extra terram eminens rubet. Raphanum nigrum attulit mihi hortulanus Ill. E. C. ex horto Gæpping. duplicem, vnum paruum qualem aliquando vidi Argentinâ missum, & qui Montbelgardi etiam prouenit in horto Ill. Ex. C. magnus crassus est. Viderentur diligentius non indaganti duo genera, verum tempus sationis tantum differentiam facit in radicis forma: uterque mense Octobri datus. In omnibus autem probandis, Plinius maxime spectat caules. Immitium enim rotundiores, crassioresque: folia verò tristiora & angulis horrida.

Raphani siue radiculæ vires, Diosc. declarat his verbis: Flatus gignit & exalfacit: ori quidem grata, at stomacho minime commodat: ructus præterea mouet, atque vrinas ei: aluum quoque bonam facit, si quis ipsam summo cibo sumpsit, quippe quæ tum distributionem magis adiuuet: præsumpta verò cibum suspendat: quare & ante cibum vomitus conuenit: quin & sensum aciem excitat. Elixæ verò si sumatur, valet ad eos qui tussi diuturnâ infestantur, quique crassiores succos in pectore cumulant. At cortex ipsius ex aceto mulso sumptus, vomitiones potens mouet, hydropicis accommodatus: impositus etiam tum lienosis est utilis. Cum melle verò nomas sistit, & sub oculis fugillata tollit. Auxiliatur & à Vipera commorsis, necnon & Alopecias densas atque lentigines cum Loliacea farina extert. Est & auxilio tam cibo quàm potui is qui à fungis strangulantur, menstruaque pellit. Semen vomitiones excitat, vrinas eiicit, & lienem ex aceto potum extenuat. Decoctum anginosi cum aceto mulso calente gargarizatum prodest, & contra Cerastæ morsum ex vino potum auxiliatur. Cæterum ex aceto illitum gangrenas etiam valenter emarginat.

Raphani vis mira [rectè hæc Plinius de aspharaco tradit] colligendi spiritum, laxandique tutum. Ob id cibis illiberalis, vti que si proximè olus mandatur, si verò cum Oliui drupis, rarior suus sit, minusque sordidus. Cocti dulcescant & in Naporum vicem transeunt. Crudos medici suadent ad colligenda acris viscerum dandos cum tale ieiunio esse, atque ita vomitionibus præparant meatum. Tradunt & præcordiis necessarium hunc succum: quando phthisin cordi intus inhaerentem, non alio potuisse depelli compertum sit in Ægypto, regibus corpora mortuorum ad scrutandos morbos insecantibus: Atque ut est Græca vanitas, fertur in templo Apollinis Delphis adeo cæteris cibis prælatus raphanus, ut ex auro dicaretur, beta ex argento, & pomum è plumbo. Scires non ibi genitum M. Cæcium Imperatorem, quem Samnitum Legatis auxum repudiaturum offerentibus, rapum terrenum in foco inuentum Annales nostri prodide-

re. Scripsit & Moschion Græcis vnum de Rhabphano volumen. Viliſſimi in cibis hyberno tempore exiſtuntur: iſdemque dentibus ſemper inimici, quoniam atterant. Ehora certè poliunt. Satini decocti manè poti ad ternos cyathos, comminunt & eiciunt calculos. Iidem in poſtea decocti contra ſerpentium morſus illi nuntur. Ad tuſſim etiam manè ieiunis rhabphanus prodeſt cum melle: Semen eorum toſtum ipſumque commanducatum ad Lagonoponon [illius cruciatus è ſtatu, & calculo:] Aquam foliis eius decoctis bibere, vel ſuccum ipſius, cyathis binis contra phthiſaſes, phlemoni ipſos illinire tuſos, liuori verò recenti corticem cum melle, veterneſis [Veternum, ſiue animi, ſiue corporis ſtupiditatem & ignauiam vocant: ſtolidum Catullus, grane ac ſuneſtum notat, appellat: Catullus.

*Nunc cum volo de tuo ponte mittere prunum,
Si pote ſolidum repente excitare veternum.]*

autem quam acerrimos mandere, ſemenque toſtum dein contritum cum melle ſuſpirioſis. Iidem & contra venena proſunt. Cæterò & ſcorpionibus aduerſatur: vel ipſo, vel ſemine infectus manibus impundè tractabis: impoſitoque Rhabphano Scorpiones moriuntur. Salutares & contra fungorum aut hyoſcyami venena æquè, vt Nicander tradit. Et contra viſcum quoque dari Apollodori duo iubent. Sed Citicus ſemen ex aqua tritum. Tarentinus ſuccum. Lienem item extenuant: iocinori proſunt, & lumborum doloribus. Hydropicis quoque ex aceto aut ſinapi ſumpti & lethargicis. Praxagoras & ilioſis dandos cenſet: Piſtonicus, & cœliaci (ſtomacho tamen aduerſari Dioſcorides teſtatur. Verùm cœliaci prodeſt, quoniam vrinas ciet.) Inteſtinorum vlcera [illa detergendo, alioquin irritant:] ſanant: purulenta præcordiorum, ſi cum melle eduntur. Quidam adhuc coquere eos in luto illicito malunt: ſic & ſeminas purgari. Ex aceto & melle ſumpti, inteſtinorum animalia detrahunt. Item ad tertias decocto eorum potu cum vino, enterocelis proſunt, ſanguinem quoque inutilem [In veſica concretum, & inteſtiniſ: ex maricis, & vtero,] ſic extrahunt. Medius adhuc & ſanguinem excreantibus coctos dari iubet: & puerperis ad lactis copiam augendam. Hippocrates capitis mulierum deſluuia deſtrictari rhabphanis, & ſuper umbilicum imponi, contra tormenta vuluæ. Reducunt & cicatricem ad colorem. Semen quoque ex aqua impoſitum, ſiſtit hulcera quæ phagedænas vocant. Democritus Venetem hoc cibo ſtimulari putat: ob id fortaliſis voci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ in oblongis duntaxat naſcuntur, excitare aciem oculorum dicuntur. Vbi verò acrior Rhabphanus medicina adnota ſit, hyſſopum dari protinus imperant. Hæc antipathia eſt. At aurium grauitati ſuccum Rhabphani inſtillant. Nam vomituris ſummo cibo eſſe eos, viliſſimum eſt: (Dioſcorides vomituris dat ante cibum: à cibo verò vt roborer ventriculum & cibi diſtributionem adinquet: hic itaque obliuiosè Plinius vomituris ſummo imperat cibo.)

Sed Galenum audiamus de Rhabphano tum vt cibo, tum vt medicamento, loquentè. Urbani inquit, homines ſolam radiculi crudâ vt plurimum ante alios cibos cum garo alui deſiciendæ gratia mandunt, quidam autem aceti quidpiam admittent. Ruſtici verò cum pane ſæpenuerò veſcantur, vt alii obſonius quæ ſua ſpontè proue-

niant. Radicula autem caulem etiam ac folia mandunt, ſed coacti potius quàm voluntarij. Radix aurem ex uſu eſt quibus aſſidue veſcimur, eſtque obſonium magis quàm alimentum: nimirum quæ & ipſa cum manifeſta calfactione attenuandi habet facultatem. Nam qualitas aeris in ipſa ſuperat. Vere autem caulem quendam, qui in altum aſurgit, gignere conſuevit, quemadmodum & alia omnia quæ caulem ſunt productura: quem caulem elixantes mandunt cum oleo & garo & cum aceto, vt Rapa caulem, ac ſinapi, & lactuæ, nutritque magis caulis iſte, quàm cruda radícula, vt qui in aqua acrimoniam omnem ponat: pauciſſimum tamen & ipſe habet alimētum. Quidam autem non caulem modo, ſed & radículas ipſas elixantes mandunt, non aliter ac Rapa. Et alio in loco, Rhabphanus, excaſſat quidem ordine tertio, deſiccat verò ſecundo. Quin & ſemen ipſum plantâ efficacius eſt, facultas ei ineſt digerendi. Itaque ad ſugillata, & alia id genus liuida, ob talem facultatem accommodum exiſtit. Cæterum, cum Medicos, tum idiotas illos mirari ſubit, qui à cœna crudos eos concoctionis iuuandæ gratia edunt. Ipſi quidem ſe experientia id abundè comperſum habere dicunt, nullus tamen exemplum illorum ſine damno poſuimiri. *Haſſenii Galenus.* Cuius equidem verba è Dioſc. Medicorū errore lepidè notare videatur, qui crudas Radículas à cœna eſitabant, iuuandæ concoctionis gratia: quibus quidem verbis Dioſcoridem obiter carpere videtur, quippe qui hoc loco ita ſeſſiſſe videatur, idque tum roborandi ventriculi tum cibi diſtributionis adiuuandæ gratia.

* Simeon Sethi diſcrepantes hæc ſententias adhibita diſtinctione componere nititur: dum quibus alius facilè ſubducitur, quique ſtatibus carèt, iſis vult exhibendas ante cibum Radículas: contra verò à cibo, iſis qui ſtatibus laborant, quibusque cibo in ventriculo ſupernatat, ac etiamnum diſſicilis eſt alius. Verumtamen neque hoc ipſum quenquam citra damnum expetiri poſſe, cum Galeno crediderim.

Rhabphani recens minutim incifa radix (vt ſcribit Matth.) albo meraco inſperſa, & in ſartagine calſacta, pubique adnota, remorant vrinam pellit. Idem præſtat eiufdem ſuccus duarum vnciarum pondere ex vino Cretico hauſtus. Corticis vncia cum mercurialis pari pondere, croci granis quatuor, pulueris caſſiæ odoratæ drachma, ſucci ſabinæ drachmis duabus, omnibus ſimul in mortario contuſis tenuiſſimo linteolo exceptis, vetricque ceruici admotis, ægrè parturientibus mirificè ſubuenit. Euiſdem radicis ſuccus cum oleo dulcium aut amararum amygdalarum, & vini albi & colocynthidis momento aurum ſonitus collu, ſic alidus inſtilletur.

Raphano autem comesto lacticia eſſe vitanda, quòd corrumpantur & vitium inde contrahant, monent: Rhabphanus à cœna manducatu grauem reddit anhelitum, ſi quis ſtatim ab ea ſumpta ſomnum experit. Grauidis vt apud Doſiſthenium legimus, non conducit, expellit enim ſectum, trahit menſes, educitque ſecundas. Succus eius inueteratis vlceribus illitus, ea renouat gangrenamque in eis erodit. Idem præſtat puluis eius. Succus Rhabphani cum melle decoctus, atque modico aceti admiſſo, percolatus, prodeſt contra febrem quartanam, & contra oppilationem lienis, ſi in potu ſumatur. Catem ſubeuntibus

*Dioſc. Medicorū
errore lepidè
notare videatur,*

quis, lienosique vilius Raphanus emplastrum modo imponitur, ut Dioscorides testatur.

Raphanus domesticus esculentus, ait Fernelius, sine offensione vili vomitione purgat, atque ventriculum blandè exinanit: quæcunque nimirum in eo crassa sunt attenuat, quæ lenta sunt detergit, ac demum stimulat expultrice vi sursum extollit, nulli ætati neque pregnantibus insensibilis. Teruntur autem radices eius concisæ vnicuique, affusaque multa succus exprimitur tepidus offerendus. Seminis [quod efficacius sit] semuncia vel trii similiter teruntur addita multa aut sero lactis aut aqua hordei.

Radice cum sale tritam in malignis febribus sub pedibus ligari testatur Schvvenckfeldius. Scribit Camer. apud Matthiolum Germ. si in excavatum Raphanum aqua Maioranz immittatur, & per aliquot dies sub terra defossus detineatur, aquam illam visus debilitati mederi. Si in Raphanum cauatum veretrum immittatur, lapidem [teste Font.] ni magnitudo obster, trahet. Quidam in Raphano cauito crocum adiiciunt. Nec solum calculi causa hoc fit: sed etiam in difficultate urinae ob crassum viscidum & glutinosum humorem, aut sanguinis trombum mæstum obstruentem. Aqua Raphani [radicis, hæc enim minutum conciditur, ac distillatur] per triginta dies mane ac vespertini singulis vicibus tribus aut quatuor vnciis pota medetur calculo, facitque ad aquam intercutem, modò ægratus à nimio potu absteineat. De cætero vili ad omnes hæcenus recensitos affectus. Fit & ex succo Raphani expresso cum Saccharo aut melle Symplicis, apprimè idoneus calculosis lienosisque. Oleum quoque ex hoc parant ad dolores aurium, spinæ dorsii, atque renum, à frigiditate ortos.

RAPHANVS BYZANTINVS.

Descriptio

Raphani Byzantini semen habuit Camerarius horum Constantinopolitanum, qui postea tamen degeneravit in communem, ac solos flores ac semina protulit radice penitus lignescente.

RAPHANVS RAMVLA CRETENSIBVS dicta.

Descriptio

Raphani vulgati seu nostratis modo scapum erigit cubitalem aut sesquicubitalem, itidem brachiatum. Folia posita & ordine ut in prædicto, sed lævia, tenera, & præ glabritie non nihil splendens, figurâ ut in illa varia. Quædamque dissoluta magis, quædam magis integra & subrotunda: suprema ad Lappanæ quodammodo accedunt. Ramorum supremis alternato posito ex vnicuique ferè pediculo flores dilutè purpurei emicant, raphani nostratis similes. Succedunt vascula, aliàs univerticillata, aliàs gemina, aliàs longa teretiaque, sed omnia in excavatum mucronem fastigiata, semina continentia Raphani, rotundum, in pulpa fungosa delitescenna, sapore grato, minimùm, aut etiam nihil, acri, ita ut ad auellandarum nucleorum etiam saporem quodammodò accedere videatur, quatenus ex sicco depræhendere licuit. Radix tenuis, fibrosa, candicans, qualis quidem hæcenus nobis observata.

Ramula Cretensis nomine à fratre C. Bauhino semen accepimus quod satum in horto Ill. Ex

C. VVitem. Montbelgardi non provenit: postea Daniel du Vernois Medicinæ candidatus attulit nobis sine nomine plantam collectam Basileæ in horto clariss. viri Domini Iacobi Zvvingeri pro Raphani specie rara: Nobis quoque siliquæ cum seminibus nomine etiam Ramula Cretensis Basileæ in prædicto horto collectas, communicavit Doctus Vir Conradus Philtherus Basili.

RAPHANVS SILVESTRIS VETERVM.

De hac seorsim agendum duximus, eâ potissimum de causâ, quod qualis sit, hodie non constat. Radicula igitur silvestris [japani a'yeia] quam Romani apud Diosc. Armoraciam vocant: Folia habet satia [Eruca Theophr. qui Raphani quintum genus facit & silvestre vocat] similia, sed quæ ad Lampsanam propius accedant. Radix est gracilis, longa, subacris. Est [inquit Pinus lib. 19. c. 5.] etiamnum vnum silvestre [Raphani genus], Græci Agrion vocant, Pontici Armon, alii Leucon, nostri Armoraciam, fronde copiosius, quam corpore. Idem lib. 10. c. 4. Raphanum silvestrem esse diximus. Laudatissimum in Arcadia quanquam & alibi nascitur.

Porro tam folia, quam radix, auctore Diosc. olerum vice decoquuntur. Excalfacit autem, urinam ciet, æstusque est. Vilior, tradente Plinio, Raphanus silu. vni duntaxat ciendæ. Cæterò, bilen. detrahunt cortices in vino. Præter ea, quæ circa eos dicta sunt, stomachum purgant, pituitam extenuant, urinam concitant. Est & satui [legendum silvestris] vsus in Italia, & Armoraciam vocant.

Agrestis Raphanus, teste Galeno, in tertio ordine calesciendi, & in secundo desiccandi satius efficacior est.

RAPHANVS SILV. MATTHIOLI.

Matthiolus, ut præ cæteris se, non dico Rhizotomum, sed quarumlibet stirpiura Rhizorichum [eradicatorem] ac Numen quasi omnificum ostenderet, ita de Raphano silu. in suis in Diosc. com. differt. Romani suam antiquam Raphani silu. appellationem retinent, qui ipsam primæ literæ Metathesi Ramoraciam appellant. Cæterum, cum silvestris satia longè durior, acriorque deprehendatur, Diosc. codex hic etiam mendis suspitione non vacat, ut pote qui Armoraciam radicem reddat teneram, mollèmu & subacrem. Fuch. eam esse stirpem putat quam Raphanum rusticum nonnulli vocauerunt. Si is Romam nunquam profectus esset, nunquam [ut arbitror] in errorem incidisset, spontè namque [ait in Epit.] provenit in campestribus in agro Romano. Anguill. Raphanus silu. vocatur Romæ Aramoriaci & Remolaci & Mazorchi. Per Ramanos [Raphanos] silvestres Lacuna intelligit duos asperos qui Plinio dicuntur Armoracia, & nomen antiquum conservant, ac Romæ dicuntur Ramoraci.

Lat. Armoracia: Castil. Xaramago. Ital. Ramolacci: Matthiolus qui temerè nimis Diosc. codicem mendo laborare scribit, non demonstrat quam plantam intelligat, nec eius Glossatores patroni & Simii: melius sibi consulissent, si iconem, aut saltem

Raphanus silu.

Eruca folio

Lampsanæ folio

Radix

Agrion

Leucon

Armoracia

Vitis

Descriptio

Altem descriptione, quam plantam intelligerent, indicassent. Lacuna quidem videtur intelligere Raphanum sativum longum, crassum, durior, qui per hiemem reservari potest.

RAPISTRUM FLORE ALBO STRIATO. Sinapi agreste album Trago.

Descriptio



Rapistrum flore albo striato folia habet Sinapi Erucae diuisura simili, hirsuta, sapore oleraceo: caules ramosos, hirtos: flores albos; Erucae maioris, stris exuleis variegatos, apicibus luteis, siliquas pulchras, longitudine fere digitali, ubi maturuere nodis instar caudae Scorpionis distinctas, striatas: in quibus pro

nodorum numero semina: radix satis tenuis, alba, alia simplex, alia multifida.

An Trago sinapi sylvestre ad aquas proueniens flore albo?

An Dod. Gall. Sinapi sylvestre [sinapi agreste?] quod idem cum Tragi Sinapi suspicor esse, quamvis figura ad Erucae maiorem pertineat.

An Turn. planta VVeissenburgi weisshederich, & quibuldam wildrettig dicta: Is quidem existimat esse Radicem siluestrem Dioscoridis. Hae ed loci semper inter Rapas nascitur, Rapistro similima, breuior, flore albo, radice exili, sapore aliquatenus & forma Raphani longi: folia incisa seu laciniata Raphani satiu modo, leuiora nonnihil quam Rapistri. Videtur Plinius hanc pro Lampfana sumere lib. 20. cap. 9. & falso inter Brassicarum genera reponere: cum inter Raphanos collocare debuerit. Siquidem Plinius multis locis Radicem appellat, Brassicam appellandam, ut lib. 11. c. 23. & lib. 27. cap. 24. atque ita veramque plantam videtur confundere. Eius verba, quae huc me inducunt, sunt ista, inter Brassicas sylu. & Lampfana &c.

Catalp. Lampfana, flore candido, Dioscor. sylu. Plinio inter sylvestres Brassicas Lampfana, quae Iulius vixit apud Dyrrachium. Lonic. Helber wilder Senff [Sinapi luteum silu.] cuius figura, qui suo more nescit quid scribat, videtur demonstrare Rapistrum, de quo hoc capite agimus. Plant. Icon. pag. 199. Rapistrum flore albo. Erucae folius Teul. 237. Tabern. Icon. & hist. Armoracia Weidnerich, quod quidam volunt Lampfanam, alii Raphanum silu. alii nominant Rapistrum album, quidam Armoraciam. Et alibi, Rapistrum purpureum, Brasin hederich. An Rapistrum flore albo fuerit bene notum Compil. Tabern. nos latet, quia album non describitur apud eum nec an colore floris tantum differat purpureum, an notatur ille alioqui pro sua insigni prudentia so-

let icones diuersas exhibere plantarum solo colore differentium: Lectores tamen considerent, an extet purpureum & diuersum ab albo, aliis notis quam colore. Schvvenck. Armoraciam Tabernae ad Rapistrum flore luteo refert, quod non improbamus, si consideretur icon: verum nomen Rapistri albi non videtur conuenire, ut antè dictum, Item Rapistrum album, Raphanus silu. Lampfana seu Brassica silu. Matth. weisshederich. Ad iconem purpurei Rapistri Tabern. scribit Gerardus, Rapistrum aruorum Charlock aut Chardick, quam plantam intelligat perpendendum. C. Bauh. phyt. Rapistrum 2. siue album hinc flore purpurascens etiam reperitur.

Floret passim in agris Iulio & Augusto, obseruatur etiam Montpelii, Geneae, Basileae, Montbel. Locum gardi passim in agris. Campis rapaceis cultis & incultis, sed rarius occurrat Schvvenckfeldio.

Semen, autore eodem, excelsi facienti, sicandi, abstergendi, & digerendi vi pollet.

Vires

ALSINE NODOSA DALECHAMPII.

Descriptio



In agro Montpelienii plurima gignitur, radice simplici, longa, patum capillata, ex candido flauescens: foliis prope terram multis longiusculis, angustis, Alsinas hand multum dissimilibus: caulibus multis, pedalis, flore albo, ex quinque foliolis composito: semine in nodosis striatisque globulis multis, seledine consequentibus, & quasi verucula transfixis, peculiari omnino figura.

Hist. Lugd. Alsine nodosa. C. Bauh. phyt. Alsine 23. siue semine globoso.

RAPHANVS SYLVESTRIS, SIVE ARMORACIA multis.

Radix crassa, furculosa, repens, sapore feruidissimo: caules singulares bicubitales, concavi, striati, recti & rigidi: folia inferiora, antequam caulem proferat ampla, Lapathi, rugosa, ubi caulem autem profert, in eo folia palmum longa, vnciali latitudine aut paulo maiore in ambitu profunde satis serrata, gustu minus, feruido quam radix: ex quorum alis furculis tenues prodeuntes flores sustinent positu & forma Nasturtii palustris cum apicibus luteis.

Habent (inquit Turner.) Dioscor. & Plinius Raphani genus, quod Graecis dicitur *ραφανιον*, Lat. *Armoracia*. Ital. *Ramoracia*, teste Matthiolo. Tradit Dioscor. Radiculam silu. folia habere Raphani hortensis, nisi quod ad Lampfanae folia

Descriptio



crem, ut vulgati Codices Graeci habent, quamquam emendatiores legant *μαρρα* pro *μαραρ*. At Germ. *Meerrettich*, radicem habet admodum acrem & mordacem. Quare nequit esse Radix silu. Dioscoridis.

Thlaspi maius, inquit Cordus in Dioscor. sine dubio est ea herba quam ego *Meerrettich* appello & Arabes *Nasturtium album*.

Brunfelsio: *Armoracia* aut *Raphanus maior*. Matth. passim in suis Commentariis. *Thlaspi Crateux*, *Raphanus vulgaris*, *Raphanus rusticus*, *Raphanus rusticus* siue maior, ut vulgò. Cam. apud Matthiolum *Raphanus sylu.* *Raphanus montanus*, raro reperitur semen, unde Petrus Crescentius scribit semine omnino catere: docti vocant *Thlaspi Crateux*, & multi vocant *Thlaspi magnum*. In horto, *Raphanus rusticus*, vulgò *Armoracia*.

Gesner. in cat. plant. *Armoracia*, vulgò *Rapistrum* *μαραρ* *αμαρ* Theophr. sylu. *Brassica*, quibusdam *Lampis*. na. *Raphanus sylu.* Ponticis *Armon*, alius *Leucon*: Officinus hodie *Rapistrum* ut quidam volunt, ego autem existimo *Meerrettich* esse *Thlaspi* alterum.

Taberna. Icon. & hist. *Raphanus marinus* *meerrettich*, *Thlaspi* alterum Diosc. *Sinapi Persicum*, *Raphanus maior*, *Raphanus condimentarius*, *Raphanus obsoniorum* Arab. *Nasturtium album*.

C. Bauh. phyt. *Raphanus* 6. seu *Thlaspi* alterum Dioscor. Apud Matth. *Raphanus rusticus* siue silu.

Gerard. *Raphanus rusticus*.

Schrv. *Raphanus rusticus*, *Raphanus magnus*, & *μαραρ* *αμαρ* Dodon. *Armoracia* Plinii. *Raphanus rusticus*, *Lapathi folio*, videtur Lobelio & Penz in Aduers. capite proprio *Molydona* Plinii. *Sinapi Persicum*. Potest dici *hydropiper* etiam hec, quam nonnulli *Lepidium Pauli* & Plinii dixerunt. *Raphanus rusticus* plebeculz.

Lobel. Obs. figuram habet ac scribit, *Raphanus rusticus* *Thlaspi* & *Sinapi Persicum*, *Armoracia* Tragi, *Thlaspi Crateux* Diosc. Lobel. in Obs. in Append. p. 495. Crassa radice *Raphanus rusticus* florens, Aduers. pag. 135. & Obs. 173. Plant. L. con. p. 120. *Raphanus rusticus*, crassa radice, *Lapathi folio*, Lobel. 173. Lobel. in Append. Teut.

Nomina. *Raphanus sylvestris*, siue *Armoracia* multorum vocatur Hipp. de morb. mulier. *μαραρ* *αμαρ*.

propolis accedant. Quod si verum est, errant quicunque plantam illam folio Rumicis, radice acerrima, Germ. *Meerrettich* & Angl. *Redcole* d. Stam, *Armoracia* aut *Radice siluestre* putant. Nihil enim simile habent, Rumicis & *Raphani domestici* foliis. Scribit idē Dioscor. *Raphani sylu. radicem esse gracilem, teneram*, suba-

qui. Gesner in Cat. *μαραρ* *αμαρ* Theophr. Germ. *Meerrettich*: Gall. *Raisfort sauvage*. Angl. *Gorse Radish*, *Moinsaine Radish* *Grease Radish*: Redcole Gerardo.

Copiose alimus in horto E. C. ob eius multum usum in coquina hyberno tempore abundat prope Lure sponte in agrorum quorundam marginibus, abundat extra portam Helvetianam iuxta agros Canabinos, quā itur ad ardes carnificis: odiosus in hortis suo reperiatur. Geneve in hortis floret Maio, Basilex abundat in multis hortis, idem Lugduni: vidi Patavii & Veronæ in hortis: passim humidis & viubrosis hortorum locis, Schvvencck.

Extremæ plantæ est acridinis, annotante Schvvencckfeldic: Aperit, pellit, incidit, prouocat, attenuat, abstergit. Tenetur cum vino, aceto & melle condimentis. Appetentiam facit. Verum caput lædit, & ridosas eructationes mouet. Biliosis & caput dolentibus noxius. Viscum & arenas valenter pellit, Menstrua prouocat. Io. de Monte Exper. Senex Monachus cum leuaret se calculis vexari *Raphanum rusticum* *Meerrettich* tenuiter infecabat, in lioteolum reponerat, & in vino macerabat, & mane & vespere cum vellet ire cubitum poculum ebibebat per triduum, hoc solo remedio vsus non vexatus amplius fuit à doloribus ob calculos & arenas.

SINAPI VETERIEVS ET IN GENERE

CAP. IX.

Sinapi licet nec à Theoph. nec à Diosc. in genera diuidatur, aut describatur, Plin. tamen triū generum esse dicit. Vnum gracile: alterum *Rapi* foliis simile: tertium *Eruca*. Sed alia adhuc potest ex semine desumi diuisio, quod colore vel est albo, vel atropurpureo, vel rubro.

Ceterum, tria se obseruare genera scribit Ruellius, & ex eo Carolus Stephanus, quem sequitur Gesner. hort. Siluestre vbiq; sponte nascens, exilius, quod vulgus gallicum minori proceritate *sanclam* vocet. Alia autem duo numerosioribus, altioribusque ramulis brachiari, *Rapo* similia, sed folio minori & asperiore. Verum semen variare, in vno rufescere, in altero candicare ex toto. Hanc *sanclam* Monstardam, illam *nigram* rusticos vocare, vtramque verò communiter *Senne*.

Tragus capite de *Sinapi sativum* [cuius alterum fusco seu pullo, alterum verò albicāte prægnat semine] & syluestre recipit, ibidemque plures plantas confusè tradit.

Fuchsius quoque & post eum Ryffius, genera duo agnunt, non semine tantum, sed & foliis & floribus distantia. Primum siquidem *Rapiam* frondem exprimere videtur, floremque luteum obtinere, ac semen album proferre: Alterum verò in *Eruca* folium laciniari, floremque albicāte, & semine vesco pulloque constare, scribit.

Trium Plinii *Sinapis* generum meminit Matthioli, eaque in Italia obseruari scribit. Horum autem vnum [*Sinapi* eius tertium] quod tum folio, tum etiam semine tenui dicit, *eraticum* [H. Lugd. quz Matthioli genera & figuras recepit, *Sinapi* silu.] facit. Videtur hoc nobis *Sinapi Ery* simi folio. Alterum verò [secundum] quod *Rapi* fronde constat, ceteris maius hortense [sativum H. Lugd.] vocat. De hoc dicetur sub *Sinapi* siquā

hirsuta albo, non respondente descriptioni. Tertium [in inscriptione primum] & ipsum sativum [hortense H. Lugd.] statuit, semine albo, minutiusque acuti. Dicimus & hoc Erucam maiorem.

C. Bauhinus ut & Camer. apud Matth. Germ. eandem Sinapis exhibuit species, nisi quod hic pro silvestri, aliam plantam dederit, quæ nobis videtur Eruca quorundam silu. repens.

Lonicerus aliter distinguit: in Luteum enim & album à flore sumpta varietate diuidit. Illud duplex rursum tradit, hortense & silvestre, ambo seminibus albis. Exhibet autem pro hortensi luteo, Sinapi album. Sylvestre existimamus esse Rapistrum flore albo striato. Sinapi album, quod Græcè Euzomon, Latine Erica vocari scribit, similiter in sativum & agreste dirimit. Sativum album satiuo luteo: agreste album, agresti luteo, inquit præter flores in omnibus respondent. Pro Sinapi silu. albo ponit iconem Erucæ sativæ.

Brunfel. duo Sinapis genera agnoscere videtur. Album & nigrum. Ita namque scribit. Eruca album Sinapi est, nigro virtute caloricâ similis, addet ut sine damno in vsum venire vix possit, ni lactuca addatur, à cuius frigore ad temperamentum adducatur.

Dodon. Sinapios tria genera esse tradit: sativum duo, & silvestre tertium. Sativum priori flores esse dicit cum semine luteos: alteri flores quidem luteos, sed semen è nigro subruffum, interiore medulla è luteo virefcens. Sinapi sativum Dodonæ prius, quoad figuram, Erucam maiorem sativam flore albo demonstrat: Alterum Sinapi album exprimit. Silvestre, cum Sinapi Eryfimo Tragi cognatum credimus.

Lobel. & Pena in Adu. præter duplex Sinapi sativum, Erucæ & Rapi folium, duplex quoque Agreste constituunt. Primum Apii, aut potius Laveris folio, quod quale sit, fatemur ingenuè, nos adhuc ignorare. Et alterum Sinapi silu. minus, Irionis veri folio, aut Bursa pastoris. Hoc si ex figura Lobelii Obsl. & Icon. Pl. comestari liceat, Sinapi Eryfimo simile fuerit. Lob. Obsl. & Ic. plât. sub titulo, Sinapi sativum Erucæ aut Rapi folio Adu. p. 67. iconem falsam exhibet, Erucam enim maiorem potius ex Matth. exprimit. Sub Sinapi etiam agreste Apii aut potius Laveris folio Adu. p. 68. malè adaptat figuram Sinapi albi, ut dicitur sub Sinapi siliqua hirsuta, albo.

Cæsalp. Sinapis triplicem differentiam assignat. Rapa folio, flosculis luteis, semine sulco, sativam & silvestrem. Tertiam, folio laciniato, floribus quidem etiam luteis, aut semine ex flavo candicante. Est hoc nobis Sinapi album illud vulgate, semine ruffo.

Atque has Sinapi differentias, ut & eas, quas C. Bauhinus in Phyt. inter Erucas recenset, cum nostris mox seorsim distinctius trademus. Plurimæ sanè præterea extant plantæ, quæ passim apud Autores Sinapis nomen sibi vendicarunt, ut Sinapi Persicum, Alliaria, Capparis, Lepidium, Erucæ, & alia plura, de quibus singulis suo quoque pertractatur loco.

Apud Athenæum dictione Sinapi usus est Nicander Colophonius in theriacis:

Est vel Cucurbitulam enecat, vel Sinapi.

Idem in Georg.

Mordaxque semen Sinapi.

Et alibi.

Nasturtium verum. foliis nigrisque Sinapi.

Græci plerique etiam & alia, Atque verò, ut apud Athenæum legitur, non dixerunt, sic Galenus appellat Paulus & Aetius. Dioscorides utroque modo vocat, Latini Sinapis & Sinapi. Arabes

Cardel: Hebr. Chardal, quemadmodum in Cant. cap. 7. Rabi Salomon testatur. Germ. Senff Belg. Mostacci: Gall. Moutarde, Senave. Ital. Senape, Hesp. Mostaza: Castal. Mostalla: Port. Mostarda. Angl. Mustard & Seuberye. Boh. Horace Hung. Mustar.

Notandum autem his nominibus & condimentum, quod ex huius plantæ semine conficitur appellari. Plinius Sinapi etiam à quibusdam Thapfi: ab aliis Saurion dæi refert. Est autem tam Sinapi, quam Napy sua ratio ac interpretatio. Nam etenim dicitur, autpore Athenæo, quasi vax, quia quædam est, sine natura sit: velint Aphia, quia ob parvitatem natura privatum sit. Quod ob pusillam molem non esse, aut vix esse credatur. Alii Napi per privationem, videlicet Nimon, quasi immitte dici volunt, quoniam acrimonie vehementis particeps sit. Sæpius verò, in dicitur tunc dicitur tunc dicitur, quia olfactu oculos lædat. Et hinc fortè meritis à Poëtis, ætæum sacrum lachrymosa & tristis cognominatur, apud Athenæum Crates Cleonem ira percitum, contracta fronte, & indignabundum, excandescensque innuens dixit:

Sinapi conspexit, & frontem contraxit.

Quod verò Gallis Moutarde vocatur, ex eo constat videtur, quod cum musto Sinapi ad inunctus conteri soleat. Camerario tamen apud Matth. germ. Mustarda dicta placet quasi Mustum ardens, quod ignea vi semen nares & cerebrum apprehendat, lachrymas excutendo, nullo aspernari saporis prævio odore. Vnde natum apud Francos diuerbium, quo, cum insignem veteratoris astutiam indicare volunt, inquirunt, Callidiorem esse Sinapi.

Terram, ut inquit Palladius, diligit aratam, & si fieri potest, congestam, quoniam ubique nascatur: sarculari debet assidue, ut respergatur pulvere, quo sonetur: non minus gaudet humore: de quo semen legere disponis, suo loco esse patieris: quod ad escam parabis, robustius facies transferendo. In Sinapi vetus semen inutile est, sativum, vel vlti: quod denubus fractum, si intus viride videbitur, novum est, si album fuerit, vetustatem fatetur.

Sinapis lementem auspiciantur Autumno, Vere perficiunt, quinto die post satum comparent. Acerrimum, inquit Plinius, sapore, ignei effectus ac saluberrimum corpori Sinapi, nullâ culturâ provenit, melius tamen planta tratata. Quin è diuerso vix est satum semel eo liberare locum, quoniam semen cadens protinus viret. Eligere præcipit Diosc. quod non obaridum sit, & sulcum, & adultum: sed quod fractum intrinsecus viride, & velut succulentum sit ac casium colore. Tale enim recens esse & in vigore constitutum. Porro Antiphanes excellere putat Sinapi Cyrium: optimum commendat Egyptium Plinius, probat Alexandrinum Galenus, Pythagoras principatum habere ex his quorum in sublime vis feratur, iudicavit: quoniam non aliud magis in nares & cerebrum penetret.

Sinapi in medicina multæ & magnæ vires. Nam, autore Dioscoride ad calfaciendum, attenuandum, attrahendumque efficax est. Comanducatum autem valet ad pituitam capitis eliciendam. At succus ex aqua mulla, contra consilium præduros tumores, veteresque & callosas arterie scabritias gargarizatu prodest. Ipsum verò Sinapi tritum & naribus ad morum sternutamentum ciet. Comitialibus quoque auxiliatur, & vulnibus strangulatu oppressas excitat. Quin & lachrymas

Lobel. ap.

Nomina
Magnum

theriacum tepidi deterso illinitur. Ficus autem admixtum & impositum donec rubescat locum, valet ad coxendium cruciatus: lienes ac in vniuersum ad quoniam diuinum dolorem, cum ex alto in summam cutem quidpiam extrahere est in animo, trāsato scilicet in alteram partem affectu. Aiopexis etiam illitum medetur, faciem purgat, & oculorum fugillata tollit, cum melle, adipe, aut cerato. Cum aceto verò, lepræ & fere impetigines eo perunguntur. Sed & contra febiles circuitus aridum bibitur, polenta modo potui inspersum. Emyplastris quoque extrahendi vi præditis, utque quæ ad plorant faciem, vtiliter ammiscetur. Succurrit & auditus grauitati incertis, quæ sonitibus cum fico tritum, auribusque inditum. Ipsius verò succus cum melle ad oculorum hebetudines genarumque scabritias conuenienter iungitur. Cæterum exprimitur rocenti adhuc semine succus, atque ita in Sole siccat. Vnus eius, ut scribit Plinius, etiam pro pulmentario in patillis decocto, ultra intellectum acrimoniæ. Coquuntur & folia sicut reliquorum olerum. Ad serpentium ictus & scorpionum triena cum aceto illinitur. Fungorum venena discutit. Contra pituitam tenetur in ore mansum capitis pituitam elicit, *Empystron*, Diosc.] donec liqueat, aut gargarizatur cum aqua mulsa. Ad dentium dolorem manditur. Ad vnam (ad tonsillas, diuturnasque & callosas arteriæ scabritias succus mixtus cum mulsa gargarizatur,] gargarizatur cum aceto & melle. Stomacho venissimum contra omnia vitia, pulmonibusque. Excreationes facili facit in cibo sumptum: datur & suspensio. Item comitialibus tepidum cum succo cucumerum. Sternumentis caput purgat, aluum molli, mensuris & urinam ciet. Hydropticis imponitur: Cum fico & Cumino tusum ternis partibus comitiali morbo. Et vulvarum conuersione (strangulatu Diosc.) suffocatas excitat odore, aceto misto: item lethargicos.

Calefaci & siccari ordine quarto, Galeno asserente.

Plinius cap.
viii.

Vox (inquit Cornar.) lithanicos, falsò pro tetanicos apud Plinium supposita. Nulli enim sunt lithanici, sed tetanicorum affectio media est inter Opisthotonicorum & Emprosthotonicorum affectionem, utramque complectens: quando distentio aut rigor nervorum, antè & retrorsum contingit.

Symeon Sethi scribit Sinapi vim habere dissolventi, & discutiendi humiditates quæ in capite & stomacho sunt. Conferre etiam lienis affectibus ab humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex adusta pituita contracti sunt. Adhuc & podagris à pituita factis. Officere verò vitiis, & calido capiti, & iecori. Adiuuare concoctionem & distributionem ciborum crassarum partium. Minuere quæ in ventriculo sunt humiditates. Illitum lepris eas in melius mutare. Linguae etiam humiditate grauatas siccare. Sic cum melle sumatur, tosses resoluit. Cum caricis verò, ichiadicis illitum, & lienosis utile esse: trahere enim quæ intus sunt ad corporis superficiem. Sufficere verò & incensum serpentes fugare.

Sinapi in scorbuto, inquit Marcel. Kirich. Transylu. vtilissimum est. Hinc nautæ in magnis navigationibus copiâ Sinapi sese munire solent, eo tanquam præsentissimo prophylactico Theriacæ virescentes. Habet enim vim calfaciendi, extenuandi, dissolventi & discutiendi humiditates in ventriculo & lienis affectibus: adiuuat concoctio-

nem & distributionem ciborum crassarum partium.

Qui ex Tridentino agro in Germania mustum comportant, authore Matthiolo, Sinapi albo cada imposito, dulcedinem auulsi, conferunt. Folia (de vulgari Lope loquitur) tenera Sinapi acetaria veniunt.

Quomodo porro Sinapi ad conditura, & morum & ad Embammata preparari debeat docet Columella, in hunc modum. Semen sinapi diligenter purgato, & cribrato, deinde aqua frigida eluito, & cum fuerit bene lotum, diffusum in aqua finito, postea tollito, & manibus expressum in mortarium nouum, aut bene emundatum conuicito, & pistillis conterito, donec contritum fuerit, totam intritam ad medium mortarium contrahito, & comprimito manu plana, deinde cum compreseris, sacroscato, & compositis paucis carbonibus viuis aquam nitram affundito, ut omnem amaritudinem eius, & caliditatem exaniet: deinde statim mortarium emptum, & omnis humor eliquetur. Post hoc albam adiacitum aduicito, & pistillo permisceto, coloraque. Hoc ius ad Rapa condienda optime facit. Cæterum si velis ad vsum conuiuiorum præparare, cum exanieris Sinapi, nucleos pineos quatuorcentissimos, & amyllum aduicito, diligenterque conterito infuso aceto. Cætera, ut supra dixi, aduicito. Hoc Sinapi ad embammata non solum idoneo, sed etiam specioso vteris: nam est condordia eximii, si sit curiose factum. Hac ille.

Nostri autem mustum semen nocte macerant aqua, deinde manibus expressum aduicito aceto pilâ terunt, acerrimo ciborum condimento. Alii per vindemias cum musto maduerunt, & conterunt, ita magnam acrimoniæ vim erant, totoque anno seruant. Nec hodie quicquam huiusmodi ad intinctus ubique cibis frequentius aduicetur, gratissimo obsoniorum condimento. Nihil quoque frigidis diebus magis epulas videtur commendare. Quod si vel assidua consuetudine, vel esu, gratia ciborum emoleat, huius acrimoniæ fastidiosis gustum reuocant, & hoc velut stimulo elanguescentem appetentiam incitant, quo velut igniculo morosis palatum titillante, vorandi moluntur aviditatem. Sed huius vis confestim in sublime fertur, ut ex Plinio diximus, nec aliud magis in nares ac cerebrum penetrat. Quare si modus abfuerit, huius odor naribus captus, statim sternumenta ciet, & vellicans sensum lachrymas elicit, quod & testatur Columella canens:

Sæpe lacessenti sterum factura Sinapi.


Ad dolorem capitis sæpe recurrentem, caput & tempora, cum oleo & Sinapi parato pluries illinit VVirt. Empiricus. Sed aboleuit oleum Sinapium, et si ubi ad summum excalefacere opus fuerit, maximam opem præstare valeat. Hoc autem non nisi collachrymantibus oculis exprimi potest: tanta enim est vaporis acrimoniæ, ut concepto vapore illico prodeant lachrymæ. Mifertur quandoque cum eo, quod è pistaceis natibus elicitur: perungunturque ed genitalia in frigida, ut felicius coeant, addito Lactere, & Musto. Quia Sinapis ex herba flore luntii principio destillata, pellit vlcera gingivarum, ore sapiens ex ea colluto: Conducit ad membrorum Rheumatismum, si sapiens inde fricentur, inde enim vigorem, & carnem recuperant. Medullam ossium calefacta, si in pius ex ea fricentur, & per se item si perungant. Prodest contra frigidum morbum aguciorum.

6 inde

si inde siccantur & iterum per se siccant.

SINAPI SILIQUA LATIVSCULA GLABRA
sem. ruffo, sine vulgare.

Descriptio **A**d cubitos aliquot excreta, caule inā parte hirsuto, superiore glabro, frequentibus ramis brachiato,



coque tereti & fungosa medulla pleno: folia, inferiora quidem lata, dissecta tamen, Rapi-
tis similia, hirsuta, superiora vero tenuiora & glabra, odore si-
terantur eodem qui in semine percipi solet: flores Erucæ mi-
nores, & Rapi-
stri lutei, ex qua-
tuor foliolis api-
cibusque mediū
occupantibus
compositi, quos
quatuor foliola
pallido herba-

ceo colore prædita obvallant, odore suavi: hos excipiunt siliquæ glabræ, latis breues, Erucæ maioris similes, sed minores, ex breui pediculo, quæ commissuræ ratione, ut in illa, dehiscunt, semina claudentes plura minus octo. cum in Erucâ multo sint plura, colore minus obscuro, & paulo maiora, in hoc à Rapistræ seminibus differentia, quod ruffa sint nec lucida, cum illa nigra sint & nitida, cæterum Sinapios huius semina tenui membrana separantur, cui ordine adherent, sapore acri: radix candida, lignosa, fragilis, fibrata. Nullus, quod sciam, bonam iconem exhibuit Sinapi de quo hic agitur, vixque ab aliquo ritè descriptum videtur: propterea placuit id, & de nouo describere, & depingere.

Brunfel. Sinapi. Cord. in Diosc. Sinapi hortense, herba cum semine suo omnibus nota. Notat ibidem Gesner. latium à siluestri culturâ solum differre. Fuchl. Sinapi vulgare omisit.

Tragus Sinapi latium, Gemein Senff sam. vnde garten Senff mit braunen samen. Miror Tragam alioqui Botanicum diligentem nec figura nec descriptione hoc Sinapi ritè descripsisse aut distinxisse à Sinapi albo. Ait quidem Sinapi sativi duo genera, quorum vnum sit semine pullo seu tulco, de hoc loquens.

Lacuna proponit plantam Erucæ facie pro Sinapi primo, & descriptionem, quæ mihi non videtur competere Sinapi vulgari, sed potius Erucæ.

Dod. Sinapi hortensis secunda species. Neoterici Sinapi commune, Gallicè *Senene de jardin*, *de Moutarde*: Germ. *Zamer senff*. Belg. *Gemeen Mostaert*: Item Sinapi silvestre. Lat. in fol. Sinapi alterum satium ex quo condimentum conficitur, quo ad ciborum intinctus vtuntur *sinapi satium*. Item silvestre. Non est Dodonæo in hist. Gallic. figura pro Sinapi secundo siue vulgari, in Lat. habet figuram Sinapi albi. Quid per Sinapi silvestr. intelligat nescimus, nisi tradat spontaneum: Is enim sibi non constat: in histor. **Quæ** proponit figuram Erucæ sub titulo Sinapi

Tom. II.

silu. in Latina verò appingit Iconem silu. Matthioli, figuræ sanè duæ non parum differentes.

Aduers. Lob. & Penz, Sinapi satium Erucæ, aut Rapisolium, Gall. *Senene domestique*, Germ. *Senff*. Angl. *Mustard* & *Sembrye*. Magis abest Sinapi à Napo virium acrimoniâ, quàm specie, sacre, vel nomine. Napi enim immitte aut vehemens interpretantur, siliqua rapacea, semine minore, acerrimo, oleoso. Item p. 68. Sinapi agreste Apii, aut potius Laueris folio, Gall. *Senene sauvage*, Germ. *wilder Senff* Belg. *wilden Mostaert*, rutibus semen nigrum penuriam satui resarcit, quod ostendit flores & siliquas, ad satorum viarumque riuulos & depletas fossas luxuriare solitum.

Hist. Lugd. Sinapi hortense cæteris maius & vulgatus nigrum Galli dicunt, siliquæ hirsutæ plenz semine ruffo, nigrescente, calido & acrim. Malè dicit siliquas hirsutas, malè etiam Erucam representantem figuram ponit.

C. Bauh. phyt. Erucæ 8. Sinapi Apii folio: Sinapi gracile Plinio: Sinapi Brunfelsio: Sinapi luteum satium alterum pullo seu fuscò semine Trago. Sinapi agreste Apii aut potius Laueris folio Lobelii. In semine differentia apparet, aliud enim subruffo aliud albo est. Item apud Matth. Sinapi 2. Apii folio, gracile Plinio: Sinapi Brunf. Sinapi sat. luteum Trago: Sinapi alterum Matthioli, Lac. Cæsalp. Sinapi primum Cast. Sinapi hortense Fuchsi: Dodon. Gall. & eidem in folio. Sinapi 2. satium: Sinapi satium Lugdun. Sinapi silu. luteum Lonic. Si Frater non tradit locis citatis, Sinapi vulgare semine ruffo, nescimus ubi eius meminerit aut quale intelligat, Brunfelsius sanè de vulgari scripsit: Tragus meminit eius in descriptione, nomine seminis pulli seu sativi, non item cum in titulo iconis posuit, Sinapi luteum satium Gæler senff, titulus enim hic & icon sunt Sinapi albo semine. Lobelii Sinapi agreste Apii folio descriptum in Aduers. an huic iungendum nescimus, nisi dicamus eum intelligere vulgare Sinapi non cultum: figura quam Lob. eo titulo posuit est Sinapi semine albo. Vulgare autem Sinapi semine albo reperiri non existimamus, quod semine est albo, flauo ve diuersa est species à ruffo, non colore tantum, verum etiam figura. Sinapi luteum Tragi cum vulgari non confundendum. Matthioli figura posita pro Sinapi 2. non conuenit cum vulgari: Cæsalpini primum est vulgare: Lacuna per suum Sinapi 2. non intelligit vulgare, nec descriptione, nec figura. Fuchsius non tradit Sinapi vulgare: Dodonæo in hist. Gall. Sinapi hortense est album, diuersum à vulgari, in hist. Latina Sinapi vulgare dicitur ei secundum, sed figura non conuenit. Lugdun. hist. satium Sinapi est album. Loniceri sylu. luteum non est vulgare, nec descriptio nec figura conueniunt, Lonicerus suo more omnia confundit. Figuram Sinapi vulgari conuenientem apud nullum Matthiolum, nec per C. Bauhinum auctum, nec in cæteris editionibus video.


Considerent Lectores an Gerard. lib. 2. c. 9. per Sinapi silv. wilde Mostard intelligat Sinapi vulgare: quamvis icon non respondeat, quam Tabern. posuerat pro Erucâ palustri minori, quæ alioqui parum conuenit cum Sinapi.

Hoc Sinapi obseruari Genenz, florens Maiæ & Iunio, Augusto, Montpelii, Lugduni, Basilee, & aliis locis. Montbelgardi semine maturo Iulio, proueniens etiam in Horto Il. E. C. ac alibi loco non satum: sed ex semine variis locis ex impro-

Scip

SINAPI ALBUM SILIQVA HIRSVTA
semine albo & ruffo.

Descriptio



Radix candida digitali est crassitudine, longitudine palmari, & sesquipalmari, multas longas à lateribus fibras obliquas emittens: ex qua caule surgunt aliquot, duos aut tres cubitos alti, crassitudine pollicari, multis alis concavi, hispidi, inanes: folia Rapa profundè sinuata, pilis spinulisue

suprà infràque donata: flores, suaveolentes, Bractice, colore luteo: siliqua ex pediculo vncia longiores, asperæ, hirsutæ, in hoc ab Eruca differentes, cui glabræ, in latam cuspidem desinentes, qui exidentibus duabus siliquæ partibus remanet appensus, cum interiecta membrana lucida, quæ solet separare semina pauca, rotunda, alba vel flavescentia, maiora quàm Erucæ, & Sinapi vulgaris, nec ita acris ut Sinapi vulgare: Sinapi iam descriptum reperitur etiam semine ruffo.

Plant. Icon. p. 101. Sinapi agreste Apii aut potius Laueris folio, Lobel. 100. Teut. 241. Figura aliquomodo respondet non item titulus.

Brunf. Eruca, weisser senff/ malè nostro iudicio.

Cord. in Diosc. *ἰζουμ*, Latini Erucam: Germani *weissen senff* vocant, quoniam simile per omnia Sinapi sit præterquam semine candido: Gesnerus ibidem ait: Errat Cordus nam quod Sinapi album Germani vocant, omnino Sinapi species est: Huic ad stipulatur Theop. Par. in Anato. viuo. Sinapium pro Eruca hætenus, sed falsè, accepisti.

Fuchl. Hist. Sinapi primum genus capitatum frondem exprimens, flore luteo, semine albo, quod Germ. *geelen garten senff* nominant, Ic. Sinapi hortense, Zamer senff.

Trag. Sinapi luteum sativum, *Gäler senff*, Zamb. *und garten senff mit weissen Samen*. Sinapi albicante semine. Hoc, inquit, quibusdam Erucæ est, Dioscoridi *ἰζουμ*. Atqui ut ingenuè dicam, inquit is, quod sentio, ego Erucæ nomen vbiçumque offendo, de Rucula, Germ. *Raaden*, & non de albo Sinapi intelligo, neque quid hac in re Septisarii & Doctores ipsorum pronuncient, magnoperè sollicitus sum.

Lacuna. Sinapi secundum, foliis Raphani paulò minoribus, floribus luteis, siliquis hirsutis, semine albo, pharmacopœi interdum confundunt hoc Sinapi cum Eruca. Quod in Pharmacopœis culpat Lacuna, ei euenit, confundat Sinapi cum Eruca, ut suis dicetur locis. Figura quam ponit quadrat descriptioni, & in eo meliùs quàm Matthiolum docuit.

Matth. Sinapi tertium & ipsum sativum est, se-

mine albo, minusque acti. In post. com. Ital. idem tradit, addens hoc semen dici *Rocheta*. Figura Sinapi albi est apud Matthiolum posita pro Sinapi 2. is non videtur agnouisse discrimen inter Sinapi & Erucam. In hist. Germ. in descriptionibus omnia confundit, in descriptione primi Sinapi, meminit siliquarum hirsutarum quod nostro Sinapi albo competit, verùm eiusmodi siliquæ hirsutæ sunt in figura Sinapi eius secundi. Descriptio ibi nulla quæ in omnibus conveniat cum Sinapi vulgari semine ruffo, nec figura posita pro Sinapi tertio respondet Sinapi semine albo.

Idem in Epit. cum addit. Cam. Sinapi alterum Græcis *ἰζουμ ἰνερν*. Italis *Senape*, siue *Senapero sal-natico*: Germ. *Gelber Senff*. Cornicula ei hirsuta. Item Sinapi tertium. Italis *Sinape bianca* siue *Rocheta*: Gallis *Moutarde blanche*. Semine est albo: Ex epitome Matthioli apparet, eum confundere *Camerarius*.

Sinapi genera & eorum nomina: Camerarius omnia figura Matthioli aliam ponit pro tertio Sinapi huc non pertinentem, est enim Erucæ syl. repentis. Effigies à Camerario ad hist. Germ. posita quæ mutata, pro secundo cum siliqua hirsuta non displicet pro Sinapi albo, ac meliùs placet quàm Patrocinatoris, qui glabram appinxit. Sinapi illud, ait idem Matth. quod tum folio, tum etiam semine tenui nascitur, erraticum est. Item in post. edit. cum Additamentis C. Bauhini. Erraticum folia habet tenuiora plura ex vno ramusculo prodeuntia, caulem rectum, firmum, asperum, hirsutumque, à medio ramosum: corniculis numerosis atque hirsutis. Nascitur locis incultis, in campëstrihus & inter rudera. Possit quis existimare Matthiolum per Erraticum Sinapi intelligere non cultum, si non diceret corniculis hirsutis, præterea figura posita pro Sinapi primo Erucam potius denotat, præferenda tamen figuris novis Glossatoris & Patrocinatoris Matthioli, qui siliquas hirsutas appinxere quæ non sunt hirsutæ, nec in Eruca, nec in Sinapi vulgari semine subruffo. Icon à Matthiolo posita pro Sinapi 2. non convenit cum vulgari, sed est Sinapi semine luteo siue albo, eadè cum Tragi & Fuchli figura. Matth. in Hist. Germ. Sinapi primum, *Gartenssenff*. Rapis simile, flore luteo, siliquæ hirsutæ in quo semen Schwartz rotid est subruffum, Raporum semini simile. Secundum Sinapi hortense, non ita altè crescit, foliis Sinapi similibus, flores interdum albi interdum lutei, semen rorleechter/ id est, rubellum. Sinapi silu. provenit in agris flore luteo, sativum simile nisi minus semen Rorschwartz subruffum, Matthiolum in sua hist. Germ. omnia obscuriora reddit: mutato ordine in descriptione & non in figuris, prima enim est quæ Erucæ similis, cui Camerarius in histor. German. & Epit. & C. Bauhinus addiderunt siliquas hirsutas: prius Sinapi convenit cum vulgari si non diceret siliquis hirsutis: posset & siluestre aliquomodo quadrare cum non culto Sinapi. Secundum Sinapi sativum quod referendum non videmus, confusa descriptio videtur: Figura respondet Sinapi albo.

Aduers. Lobel. & Penz Sinapi alterum sativum: Gallis *Senape blanc*: Belgis *Wyt mostaert*: Germ. *Weisser senff*. Existimo Lobelio non fuisse notas differentias Sinapi, nec sciuisse quid esset Sinapi album: figura quam exhibet Obs. & Ic. pl. pro Sinapi agresti, Apii aut potius Laueris folio Add. p. 61. aliquatenus convenit nostro Sinapi albo, non item titulus. Cesalp. Sinapi 1. folio Rapa, folculis luteis, siliqua brevis, semine fulvo, Sinapi 2.

folio

folio Erucæ. floribus luteis, siliquis in latera inclina-
tis, seminibus ex flauo candicansibus maiuscu-
lis, vulgò Rucum vocant.

Lonicer. Sinapi. *Geiber Garten senff.* Item
Weiß garten senff/oder Same Kantien: Euzo-
mos. Lat. Eruca. Confundit Lonicerus suo more
Sinapi album cum Eruca: ac Sinapi albi duas pro-
ponit figuras ignorans quid scribat.

Dodon. Gall. Sinapi hortense. Sinapi album,
In Officiis Belgicis Eruca. Gall. *Sene-
ne blanc.* Germ. *Weisser senff/Belg.* Wit Mostaert.
Item hist. in fol. Sinapi satium prius in descrip-
tione, in figura Sinapi Satium alterum, Sinapi
satiui semē quod luteum & maius Belgii Officiæ
pro Erucæ semine exponunt: vulgò tamen Wit
mostaert sāt nominatur. Melius Dod. in hist. Gall.
posuit iconem, quā in Latina, vbi pro hoc Sina-
pi ponit figuram demonstrantem potius Erucam,
& ea Icon quæ huic Sinapi conueniebat ma-
lè ponitur pro Sinapi satiuo altero.

C. Bauh. Phyt. Eruca 7. Sinapi rapi folio, luteo
semine, fortè Diosc. & Theophr. alterum Plinii:
Sinapi primum Matthioli lib. 2. cap. 148. Sinapi sa-
tium Erucæ aut Rapi folio Lobel. Obs. p. 100. &
Icon. p. 202. Item apud Matth. Sinapi Rapi folio,
luteo semine, & Sinapi alterum Plinii. Sinapi 1.
Matth. Lacun. Cæsalp. Sinapi Matth. in Ic. Gesn.
hort. Cast. Sinapi 2. species Dodon. Gall. Sinapi sa-
tiuū. 1. fol. Sinapi hortense luteum Lonic. Sinapi
hortense Cordo in Diosc. Lugd. Sinapi satium
Erucæ aut Rapi folio Lob. *Dioscorides dicit Sinapi*
eligendum valdè rufum, is ergo album vel luteum
non intelligit: cur hoc potius sit Theophrasti non
videmus: nec etiam cur Plinii alterum Rapii
fronde, id enim magis conuenit vulgari: Cur
Matthioli primum dicatur non animaduertimus,
quod Matthioli tradit primo loco non dicitur
semine luteo vel albo: figura etiam posita pro Si-
napi primo potius Erucam demonstrat. Nostrum
verò album in descriptione est tertium, & inter
figuras Sinapi. 2. Lacunæ quoque non est pri-
imum: pro eo enim posuit figuram Erucam refe-
rentem, descriptione autem quid tradat nescio,
puto eum confundere Sinapi cum Eruca. Sinapi
verò semine luteo vel albo proponitur à Lacuna
pro secundo. Cæsalpino non est primum sed ter-
tium semine ex flauo candicante, eius enim pri-
imum est nostrum vulgare. Apud Gesnerum non
primum putat, sed illud Sinapi quod candicat.
Dodonæo in hist. Gall. non est secundum sed pri-
imum. In hist. Lat. Quidem est primum quoad
descriptionem: quoad figuram verò alterum. Icon
que posita pro primo, potius Erucam refert, quā
Sinapi nostrum luteum siue album. Loniceri
luteum esse concedimus. Cordum per Sinapi
existimamus intelligere vulgare, non hoc de quo
hic agimus. Lugdunensium Sinapi hortense est
semine rufo nigrescente: ergo non huic conuenit
descriptio, nec etiam figura quæ Erucam imita-
tur. Sinapi verò nostrum album exhibet pro Si-
napi satiuo semine. Quod Lobelius ponit in Obs.
pro Sinapi satiuo, non potest esse hoc, id constat
ex Adu. p. 67. & 68. vbi describit vulgare: figura
etiam à Lobelio posita non conuenit, quæ prius
Erucæ similis.

Gerard. Sinapi satium Garden Mustard.
Malè pro Sinapi albo ponit iconem Barbæz
anaris. Tabern.

Sinapi album siliquā hirsutā habebam Gene-
ra in horto semine maturo Iulio, hoc etiam colo
Montbelgardi in horto Ill. E. C. V. V. vbi ex se-
mine deciduo iterum vires Augusto. Semine

Tom. II

ruffo semel tantum obseruavi, nempe Anno
1600. in horto prædicto, vnde nactus fuerim non
recoror.

SINAPI ERYSIMO TRAGI COGNATVM siue simile.

Cvbitalis est planta, radice nixæ, crassiusculā
candida, paucis fibris dñata. Cauliculos sur-
rigit pedales, cubitales, altiores, teretes: cana &
mollicella lanugine pubescentes, in ramos lon-
gos diuaticatos: Folia inferna Erysimi Tragi, pro-
fundis laciniis diuisa: superna angustiora, sagittæ



minoris instar
alata, paucis
aut nullis laci-
nis dillecta.
Per cauliculo-
rum extrema
ex pediculis
flores prodeunt
lutei quadri-
folii, Erysimi
prædicti flori-
bus maiores.
Quibus siliquæ
etiam longio-
res succedunt
tridentales serè,
angustæ, tere-
tes, caulibus
non appressæ:
semen conti-
nentes exi-
gum, sulcum
acre.

In Austria secus vias obseruata & lecta à D. A-
gerio Botanico egregio & medico insigni Ar-
gentinæ.

Matth. Sinapi 3. Idem in com. cum magnis fig.
& editione vltima cum addit. C. Bauhini. In hist.
Germ. wilder senff. Sinapi silu. Mihi non bene
constat quam plantam exprimat Matth. iconē
proposita, pro Sinapi tertio: quia eius tertium
in com. quoad descriptionem attinet, est no-
strum Sinapi semine luteo siue albo.

An Lobel. & Pena Aduert. Sinapi silu. minus I-
rionis veri folio aut Bursæ pastoris, aridis locis
iuxta margines & rudera, prope vrbes nascitur,
foliis laciniosis, admodum Bursæ pastoris simili-
bus, sed acutioribus, minutionibusque laciniis.
Umbellofi flores & siliquæ secundum summita-
tes Irionis Dioscor. caulibus pedalis, sed tota planta
gustū Sinapi feruidissima.

An Lobel. Obs. & Icon. Pl. Teur. 244. Sinapi
siluestre minus Bursæ pastoris folio, Hisp. *Mosta-
za saluage.* Aduert. pag. 68. Lobelius assumpsit fi-
guram Matthioli.

C. Bauh. phyt. Eruca 9. Sinapi bursæ folio, Er-
uca siue Rucula marina minor, & Sinapi 9. Tra-
go p. 103. lib. 1. cap. 32. Sinapi silu. minus Bursæ pa-
storis folio, Lob. Obs. p. 101. & Icon. p. 203. Luteo
& albo flore est. Item Erysimum 2. siue siliqua E-
rucæ: Cur Erucam Tragi hic ponat nescio, ea enim
eadem est cum sua Eruca 3. siue luteo flore, quæ
non respondet Lobelio Sinapi, vnde colligit luteo
& albo flore.

Hist. Lugd. Sinapi silu. Sinapi tertium Matthio-
li erraticum quod Lob. & Pena appellant Sinapi
siluestre minus Bursæ pastoris folio.

Dodon. in fol. Sinapi siluestre. Figura est Mat-
thioli, an respondeat eius descriptioni nescio.

Ecce 2

HISTORIAE PLANTARVM.

am in semine Coriandri discurrentes; in filamentum oblongum abeuntes: quæ quæsi gemine sibi insident, parte tamen superiore maiore, cum in ea semen paruum, oblongiusculum, sed vnicum [vnde et nomen] continetur.

C. Bauh. apud Matth. Rapistrum 2. Phyt. quartum siue Monospermon. Huius semen nomine Lampsanæ monospermi D. Doldius misit, & h. Balisez in horto D. Zuingeri Maio mente floruit.

Hoc ipsum postmodum, sed multo strigosius [illud enim cultura elegantius] in agris quæ Augustam Rauracorum dicitur, ad iuram domum obferuimus: idem sed humilior & valde ramosum, foliis parvis, eleganter virentibus, in agris circa Huringen ad sylvam inuenimus: & simile Monspelio ubiqueque sponte creuit habemus.

Locus & tempus.

RAPISTRI GENVS AVSTRIACVM

Folia à radice spargit, hirtis pilis vndique obfita, sed potissimum & vel magis in aucta parte, profundis segmentis laciniata, quæ & ipsa crebris denticulis serrata sunt. Caules vero omni hirsutie carent. Folia item superiora quæ ad ramorum exoritur hærent tota glabra sunt, non tot nec tam profundis segmentis dissecta, inferioris quoque multo minora. Flores in ramorum extremis umbellati, lutei, Rapistris vulgaris, sed minores: Quos siliqua excipiunt. Hanc siliquam nobis communicauit Agenus collectam in Austria inter segetes, non curauimus pingentiam, quia non integra planta & quia nobis non bene notum Rapum sive Matthioli, cuius figuræ non male conuenire videtur.

RAPHANVS.

CAP. VIII.

Descriptio



Folia proxime ad Rapi folia accedunt, sic ut facile versatissimis imponere possint: paulo tamen magis sunt sinuata: cetera eua minus conueniunt. Raphano enim folia purpurascens, quadrifolius, apicibus luteis: siliqua crassiores, pulposæ, in lucas tuberosos, conuallibus intercepitos, distinctos.

in quibus semina rubrum, acro: Radix crassa, longa, magnitudine varia, alba, vel rubra, gustu acri & mordaci, recto vix surgit caule, cubitum vnum aut alterum alto.

Dioscor. duo Raphani genera facit siluestre & satiuum. Hoc alii Polydes Eryngium, Romani Radicem nostratam, Aphri Thorpari appellant.



Theophr. in Raphani
plura genera
Raphanum di-
tribuit. Di-
stinguunt hæc,
inquit, foliis,
radicibus, colo-
ribus, saporibus,
reliquisque eiusmodi.
Vt Radicis genera
Corinthium, Cleon-
zum, Liothasium, Ber-
otium. Amphissimè
Corinthia adolescit,
quæ vel stirpe constat
deiecta: hæc enim sur-
sum versus protrahitur,
nec ex-
terea in ter-

ram ampliari solita est. Liothasium, quam Thraciam vocant, validissima aduersus frigora traditur. Berotia dulcissima est, & figura rotunda, nec ut Cleonza, prælonga. Quibus folia læuia, dulciores suauioresque sunt, quibus autem scabra, acriores. Genus præterea reddidit, quod foliis Eruce simile constet. Radicis genera hæc notauerunt.

Athenæus Theophrasti locum hunc citat his verbis: Theophr. lib. de plantis quinque Radicularum (Raphanum) genera esse tradidit: Corinthiam, Liothasiam, Cleonzam, Amorphicam, Berotiam. Dicitur vero à quibusdam Liothasiam Thraciam esse. Berotiam dulcissimam omnium, rotundam figuram: in vniuersum dulciores esse, quarum læuia sunt folia.

Ceterum, quoniam quæ Atheniensibus siliqua dicitur, aliis nonnullis, ut & Cillæ apud Athenæum pædæ (quod autem Raphanum Radicularum dixerit ex Aristophane peripicuum est) appellatur: id obiter admonitum Lescoræ velim, quæ a voce plerisque antiquiores Græcos, ut ex Apollodoro Carystii docet idem Athenæus, libro 1 pro brassica usurpasset: vnde Plinio erroris ansa, qui variis locis Raphanum cum brassica confundit, Raphano tribuens quæ Veteres illi de brassica prodidit, quemadmodum & lib. 19. cap. 15. napi tribuit, quæ Theophrastus lib. 7. hist. cap. 4. de radice dicit, hoc est de Raphanis, tradidit his verbis: Idem (Græci) Naporum quinque genera fecere, Corinthium, Cleonzum, Liothasium (non Liothasium, ut in vulgaris Theophrasti exemplaribus exaratum est) Berotium, & quod per se viride dixerunt. Ex his in amplitudinem adolescit Corinthium, nuda ferè radice. Solum enim hoc genus superne tendit, non ut cetera in terram. Liothasium quidam Thraciam appellant, frigoris patientissimum. Ab eo Berotium dulce est, rotunditate etiam breui notabile, neque ut Cleonzum prælongum. In totum quidem quorum tenuiora folia ipsi quoque dulciores: quorum scabra & angulosa, & horridiora: mariores. Est præterea genus siluestre, cuius folia sunt Eruce similia.

Ceterum, Raphani radix (autore Theophr.) quasi ex carne & cortice constat. Contra Plinius ait: Cortice & cartilagine constant Raphani: multique eorum cortex crassior etiam, quam quibus-

dam

dam arborum. Amantudo plurima illi est pro eius crassitudine. Cetera quoque aliquando lignosa. Scripsit Moschio Græcus unū volumen de Raphano.

Vulgate & rotundum Raphani genus nobis esse videtur, inquit Tragus, quod Theophrastus Cotinidium, Plinius Syriacum, vocavit. Quamquam & Bœotius Raphanus rotundus sit, teste Theophrasto, gustique dulcior. At Raphanus prælongus quem Metensis ager fundit, Theophrasti nostræ sententiæ radix est Cleonæa, Plinio Algidenfis appellata.

Fuchs. Raphanus sativa, Raphanus minor Officinatum.

Lonic. Raphanus, alius longus, alius rotundus. Math. Radix illi varia, nam nonnullis longa, alba, teres, tenera, fragilis, nec admodum acris, quæ ceteris in Hetruria præstantior habetur: aliis quibus crassa, Napi penè figura, altera longè durior, acrior, & gustui ingrator. Differunt quoque colore. Namque & alba & nigra, ubique ferè habetur. Sed hæc altera minùs frequens. Raphanus 1. Raphanus 2. Icones dux apud Matth. vix mihi discrimen monstrare videntur.

Habet Camer. horti præter vulgarem Raphanum alium radice nigra, qualis frequens est Argentinz. Et alium radice lutea.

Dux sunt Raphani species ait Lacuna: Domestici, teneri, delicati, quibus vulgè vescimur. Silvestres, duri & asperi, Plinio Armoracia, Romæ dicti Ramoracii.

Gesner. m.

Occurrant tanè ac turpi errore Gesner. horti, cum Bern. De Senio Plinium secutus tria Raphani genera, crispum, læve, & campestre statuit: Brassicæ hæc Theophrastus assignavit. Sed quod à Plinio Algidenfis dicitur, longum, succolum, ac translucidum rectè in Raphanorum numero recensuit & esse scribit, in hortis inferioris Germaniæ tam frequens, ut nullum ferè aliud notint: hoc apud Batauo-Phrysiis in eam magnitudinem crescit: vix viderit quod triginta libras penderet. Quamobrem minimè mirandum, in Germania infantium puerorum magnitudinem æquare, Plinium scripsisse. Vulgans est Raphanus, qui virilis brachii amplitudinem non excedit. Sunt autem hi translucidi: & aded fragiles, ut in taleolas absque ferro confringi queant. Multùm ab acredine illa ac saporis vehementia, quæ secundum genus pollet, recedunt: & salugine imbuti, linguam vique aded non vellicant. Alterum genus Rapi figuræ Syriacum appellatum, in superiori solum Germania provenit: vehementissimum & tenerimum, nec multà humiditate redundans: quapropter parcius editur. Nam qui statim ingerunt, præter frequentes ructus, rosionis quendam sensum in stomacho experiuntur.

Raphanum, inquit Amatus, Columella Radiculam appellat oleris vulgatissimum genus, herba caule vno arboreo ferè ut in Ruta conspicitur, asurgens: quare multorum Græci, *ἀνδράκων*, quasi olus arborum nominant. Nec Goza Theophrasti interpretis aliter vertit. Huius tria Plinius memoravit genera, læve, crispum & campestre. Diosc. quoque trium mentionem facit, hortulani, silvestris, atque alterius Apios dicti. Amatus prælicenter in Raphani historia hinc inde oberrans diutagatur. Nunc enim falsis illis tribus Raphani Plinii generibus talpæ instar cæcus incedit: oculos mentis aperire debuisse, & considerasse hæc Theophrastum à quo Plinius sua mutuatur, Brassicæ tribuisse. Præterea Dioscorides non tria, sed duo Raphani genera fecit, quod per se clariùs est.

Tom. II.

quàm ut ostendi debeat. Dioscor. enim lib. 4. Apium, montanum aut silvestrem Raphanum, ab aliis solum ita vocari, tradit. Quæ occasio ut etiam ipse tanquam de toto genere diversis, non tantùm capitibus, sed libris egerit diversis.

Ceterùm non minùs torpi cæcitatis notæ corrector eius, seu censor severus Rob. Const. innotendus est, ut qui errores hos non annotavit.

Cæsalpin. Radix vulgè à quibusdam Radicula Græcis, quasi radix perspicua: est enim tenella ac fragilis, candida, ferè translucida, flores purpurei aut candidi. Radicis plures differentiz: nam quædam in longitudinem crescit, quædam in rotunditatem, hæc vulgè *Rauanellus* vocat: quorum alii cortice nigro constant, alii candido. Longarum quædam vasto cortice crasso, qui gravior est interno corpore: Hæc Armoracia vocamus, omnes sativa. Theophrastus Raphanida vocat, Theodorus Radicem vocat Plinius, Raphanos vocat.

Turner. Genera latini Raphani duo, *Radice longa*, passim in Angliæ & Belgio, quibusdam: *Radice rotunda*, Rapi non absimili, frequentior circa Argentinat, nonnullis Radix Bœotia, aliis radix Syriaca, Angl. *Rounde radice*, *Rape radice*, rarè in Angliæ conspicitur.

Theo l. Dorst. Raphanus minor vel communis radice interdum magna & oblonga, interdum verò rotunda & nodosa, flores ferè candidos.

Aduers. Raphanus magnus & parvus purpureus. Lobel. Obs. duas habet figuras ex Matthiolo, una hoc titulo Raphanus magnus Aduers. p. 67. primus Matthioli: alteri Raphanus minor purpureus Aduers. p. 67. secundus Matth. Figuræ mihi apud Lobelium videntur transpositæ.

Tabern. Icon. & hist. Raphanus rotundus, Runder rettig / Raphanus orbiculatus, Scheibel rettig. Duas icones ponit non indicans discrimen: Rapium referunt, potissimum secunda orbiculatà radice.

Gerard. Pro Raphano orbiculato, *Rondras disch* ponit Iconem Tabernamontani: eandem & iconi Raphani rotundi inscripsit, Raphanus pyrisomus, peere fassion Kadisch: Præterea pro Raphano latino, *Garden radisch* ponit iconem Tabern. Rapi longi: pro Radicula latius minore *Schmal garden Kadisch*. Icon. Tabern. Rapi rotundi minoris siue *Ründt Klappen* ei dicti.

Brunfel. Matth. in prior. comment. Ryffo, Camer. hort. Anguill. Gesner. de coll. stirp. & cat. Raphanus. Dodon. *Raphanis*, siue Radicula latius, Radicula sativa minor. Hist. Lugd. Raphanus sativus: Raphanus 2. Matth. Raphanus purpureus minor Lobellii.

C. Bauh. Phyt. Raphanus 1. siue maior, floribus purpureis aut candidis. Raphanus 2. siue oblongus: colore variat, nostre albo est cortice: Italis tubello, cuiusmodi est etiam Montbelgardi. Raphanus 3. siue niger. Raphanus 4. siue lat. Raphanus 5. siue Byzantinus. Apud Matth. Raphanus præcox, alius serotinus: hicque albus & niger & rubens: albus, oblongus: ruber oblongus, qui fibras rubentes per substantiam discurrentes obtinet, habetur & radice lutea. Raphanus 1. Raphanus 2. Hæc *Frater*, cuius icones non mihi videntur monstrare differentiam.

C. Bauh.

Nicol. Abr. à Frambois. Raphanum, *raisure*, & Rapium, *raue*.

Theophrasto, Dioscoridi, ac Galeno, aliisque Veterum. Græcè *ραφαν* dicitur: posteriores *ραφαν* appellant: Antiquiores autem & Attici, Brassicam *ραφαν* vocarunt. Latinis autem *ραφαν* Radix & Radicula dicitur: Offic. verò *Raphanus*.

bbbb

aus. Serapieni, annotante Trago, *Fugal*, sine *Fugiel*, *Auerthoi alphages*, Hebr. *Zenon*, Rabinis & Thalmudistis *Figla*, & conuersis literis *Pilga*. Germ. *Ketng*, Belg. *Kadya*. Gall. *Radi*, *Raisfort*: It. *Raphano* & *Radice*: Hesp. *Rakano* & *Ramanillo*, Angl. *Radisph*: Boh. *Rzetsfem*. *Radiculæ semen* Celsus à Marcello Empirico Bacanon dici affirmat: similiter ab Aëtio. Cornarius tamen Cacanone legit. *Raphanus* quidem ante *radicem* auctor Athenæo, id est, quod facile appareat, sibi nomen pœnit: nam tertio à saty die profilit. Radicis vocabulum, ut author est Varro, à Græcia venit in Latium, cum Veteres Græci radicem dixerint, quam nunc *Rhaphanum*. Nisi quis forsitan arbitretur nomen accepisse, quod ceteras amplitudine superet, vel quàm paucissimis magnitudine cedat.

Satio

Seri vult *Raphanus*, qualiter videre est apud Plinium, terra soluta, humida. Fimur odit, palea contentus. Fngore adeo gaudet, ut in Germania infantium puerorum magnitudinem æquet. Seritur post Idus Febr. ut vernus sit: iterumque circa Vulcanalia, (Aliis circa ortum Caniculæ, aliis Calendis Augusti,) quæ satio melior. Multi & Martio & Aprili serunt & Septembri. Incipiente incremento, confert alterna folia circumobruere, ipsos vero accumulare. Nam qui extra terram emeritis, durus sit atque fungosus. Aristomachus detrahi folia per hyemem iubet, & ne lacunæ stagnent accumulare: ita in æstatem grandescere. Quidam prodidisse, si palo adacto cauerna palea internatur sex digitorum altitudine, deinde in semine fimurque & terra congeratur, ad magnitudinem scrobis crescere. Præcipue tamen salis [De crassifica hoc Theophr. cap. 7. lib. 2. Causs.] aluntur. Itaque etiam talibus aquis irrigantur, & in Ægypto nitro sparguntur, ubi sunt suauitate præcipui. In totum quoque salugine amaritudo eorum eximitur, fiuntque coctis similes. Ægypto mirè celebratur propter olei fertilitatem, quod è semine eius faciunt. Hoc maxime cupiunt letere, si liceat: quoniam & quæstus plus quàm à frumento, & munus tributis est, nullumque copiosius oleum.

Gaudet autem [auctor Theophrasto] frigidibus Radix [paratis], & sic eam dulcescere putant, simulque incrementum in radicem non in folia verti. Austrinis atque serenis temporibus celeriter caulecit. Hyeme cum maxime viget radix teri obrui, ut nullum imbrem admittat, ac direptis quibusdam foliis mira crassitudine distenditur. Sed *Raphanus* quia nullam vim germinandi ab imis obtinet, alimentumque capit, quod non sursum transmittere apta sit: idcirco subtus crassatur, amplissimaque efficitur. Causa vero, ut nulla putredo, nulla corruptio accederet, humo congestitæ datur, quæ aquam accet, & in totum, omne quod alienum est, admitti non patitur. Post ætatis Solstitium Iunio ac Iulio commodissime seritur.

Tempus & locus;

Raphanum vidi florentem Aprili flore cæruleo: Genesæ Nouembri, flore cæruleo & albo, ibidemque cum pauca cærulei parte Maio. Basileæ *Raphanus* est in vigore Augusto & Septembri. Lugduni principio Maii habent edules. In pago tempo (inter Basileam & Ottersheim ad Rhenum ferè sito) vidi *Raphanum* radice rotunda Rapi instar: ita ut non facile quilibet distinguere possit, nisi gustu, quem cum mense Septembri degustarem, non videbatur differre à longo allato Argentina, ubi cum *Raphanum* quoque obseruavi: talem quoque vidi in Malsburg,

qui loco humido creuerat, non poterat manu amplecti, ac sapore erat non admodum acris. Patui habent rotundum, breue, album, non vique adeo acrem & rubrum, sicut & nigricantem oblongum, satis magnum, valde acrem. In Passauant Abbatis Lutrensis in horto Domini V Valtherab Andlarv, vidi crassissimum & maximum ad magnitudinem cruris excresecens: talem habemus in horto Ex. C. Hortulanus hyeme reponendum seminat, huius radix sub terra totalatet, ac tota hyeme ad cibum adaptari potest vique ad Ver: ut & alterum longum, tenerum, album, extra terram eminentem: cuius radices habentur edules Iunio. Et hic potest dici longissimus & præcedens crassissimus. Longissimi habemus genus cuius pars extra terram eminens rubet. *Raphanum* nigrum attulit mihi hortulanus Ill. E. C. ex horto Gæpping. duplicem, vnum paruum qualem aliquando vidi Argentinâ missum, & qui Montbelgardi etiam prouenit in horto Ill. Ex. C. magnus crassus est. Viderentur diligentius non indaganti duo genera, verum tempus stationis tantum differentiam facit in radicis forma: uterque mense Octobri datus. In omnibus autem probandis, Plinius maxime spectat caules. Immitium enim rotundiores, crassioresque: folia vero tristiora & angulis horrida.

Raphani siue radiculæ vires, Diosc. declarat his verbis: Flatus gignit & excoarctat: non quidem grata, ac stomacho minime comoda: ructus præterea mouet, atque vrinas citat: aluum quoque bonam facit, si quis ipsam summo cibo sumptum, quippe quæ tum distributionem magis adiuet: præsumpta vero cibum suspendat: quare & ante cibum vomituris conuenit, quin & sensum aciem excitat. Eliza vero si sumatur, valet ad eos qui tussi diuturna instantur, quique crassiores luccos in pectore cumulant. At cortex ipsius ex aceto mulso sumptus, vomitiones potentius mouet, hydropicis accommodatus: impositus etiam tum lienosis est utilis. Cum melle vero nomas sistit, & sub oculis sugillata tollit. Auxiliatur & à Vipera commorsus, necnon & Alopecias densas atque lentigines cum foliaceæ farina extertit. Est & auxilio tam cibo quàm potuiis qui à fungis strangulantur, menstruaque pellit. Semen vomitiones excitat, vrinas citat, & lienem ex aceto potum extenuat. Decoctum anginosi cum aceto mulso calente gargarizatu prodest, & contra Cerastræ morsum ex vino potum auxiliatur. Cæterum ex aceto illicum gangranas etiam valenter emarginat.

Raphani vis mira [rectè hæc Plinius de *Raphano* tradit] colligendi spiritum, laxandique ructum. Ob id cibis illiberalis, utique si proximè olus mandatur, si vero cum Oliuæ drupis, rarior ructus sit, mirusque fortidus. Cocti dulcescunt & in Naporum vicem transeunt. Crudos medici suadent ad colligenda acris viscerum dandos cum sale ieiunis esse, atque ita vomitionibus præparant meatum. Tradunt & præcordiis necessarium hunc succum: quando phthisin cordiuntus inhaerentem, non alio potuisse depelli competum sit in Ægypto, regibus corpora mortuorum ad scrutandos morbos infecantibus: Atque ut est Græca vanitas, fertur in templo Apollinis Delphis adeo cæteris cibis prælatus *Raphanus*, ut ex auro dicaretur, beta ex argento, rumpum à plumbo. Scires non ibi genitum M. Curium Imperatorem, quem Samnitum Legatis auxum repudiaturum afferentibus, rapum terrenum in loco inuentum Annales nostri prodiderunt.

Locum & Tempus

Vitis & Vitis

re. Scripsit & Moschion Græcus vnum de Rhabphano volumen. Vilissimum in cibis hyberno tempore existimantur: iisdemque dentibus semper animici, quoniam atterant. Ehora certè poliunt. Satius decocti manè poti ad ternos cyathos, comminuunt & eiciunt calculos. Iidem in posca decocti contra serpentium morsus illi nuntur. Ad tussim etiam manè ieiunis rhabphanus prodest cum melle: Semen eorum tostum ipsūque commanducatum ad Lagonoponon [illam cruciatus è flatu, & calculo:] Aquam foliis eius decoctis bibere, vel succum ipsius, cyathis binis contra phthirias, phlemoni ipsos illinire tusos, litori verò recentem corticem cum melle, veterenis [Veterum, siue animi, siue corporis stupiditatem & ignauiam vocant: stolidum Catullus, grane ac furem horat. appellat: Catullus.]

Nunc cum volo de tuo ponte mittere pronum,

Si pote solidum repente excitare veterem.]

autem quam acerrimos mandere, semenque tostum dein contritum cum melle suspiriosis. Iidem & contra venena prosunt. Ceterò & scorpionibus aduersatur: vel ipso, vel semine infectis manibus impunè tractabis: impositoque Rhabphano Scorpiones moriuntur. Salutares & contra fungorum aut hyoscyami venena & quæ, ut Nicander tradit. Et contra viscum quoque dari Apollodori duo iubent. Sed Citicus semen ex aqua tritum. Tarentinus succum. Lienem item extendant: iocinori prosunt, & lumborum doloribus. Hydropicis quoque ex aceto aut sinapi sumpti & lethargicis. Praxagoras & iliosis dandos censet: Plistonius, & cœliacis (stomacho tamen aduersari Dioscorides testatur. Verum cœliacis prodest, quoniam vrinas ciet.) Intestinorum vlcera [illa detergendo, alioquin irritant:] sanant: purulenta præcordiorum, si cum melle eduntur. Quidam adhuc coquere eos in luto illitos malunt: sic & feminas purgari. Ex aceto & melle sumpti, intestinorum animalia detrahunt. Item ad tertias decocto eorum potio cum vino, enterocelis prosunt, sanguinem quoque inutilem [In vesica concretum & intestinis: ex matricis, & utero,] sic extrahunt. Medius adhuc & sanguinem extremitatibus coctos dari iubet: & puerperis ad lactis copiam augendam. Hippocrates capitis mulierum defluvia defricari rhabphanis, & super umbilicum imponi, contra tormenta vuluæ. Reducunt & cicatricem ad colorem. Semen quoque ex aqua impositum, sistit hulecera quæ phagedænas vocant. Democritus Venetem hoc cibo stimulari putat: ob id fortassis voci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ in oblongis duntaxat nascuntur, excitare aciem oculorum dicuntur. Vbi verò acrior Rhabphanus medicina admota sit, hyssopum dari protinus imperant. Hæc antipathia est. At aurium grauitati succum Rhabphani instillant. Nam vomituris summo cibo esse eos, vtilissimum est: (Dioscorides vomituris dat ante cibum: à cibo verò ut roborer ventriculum & cibi distributionem adiunget: hic itaque obliuio Plinius vomituris summo imperat cibo.)

Sed Galenum audiamus de Rhabphano tum ut cibo, tum ut medicamento, loquentē. Vrbani inquit, homines solam radicula crudā ut plurimum ante alios cibos cum garo alui deliciendæ gratia mandunt, quidam autem aceti quidpiam admiscet. Rustici verò cum pane saepentimè vescuntur, vtilis obsonus quæ sua sponte proue-

niunt. Radiculæ autem crudæ etiam ac folia mandunt, sed coacti potius quàm voluntarii. Radix aurem exus est quibus assidue vescimur, estque obsonium magis quàm alimentum: nimirum quæ & ipsa cum manifesta calfactione attenuandi habet facultatem. Nam qualitas aeris in ipsa superat. Vere autem caulem quendam, qui in altum assurgit, gignere consuevit, quemadmodum & alia omnia quæ caulem sunt productura: quem caulem elixantes mandunt cum oleo & garo & cum aceto, ut Rapa caulem, ac sinapi, & lactuæ, nutrique magis caulis iste, quàm cruda radícula, ut qui in aqua acrimoniam omnem ponat: paucissimum tamen & ipse habet alimentum. Quidam autem non caulem sed, & radicles ipsas elixantes mandunt, non aliter ac Rapa. Et in loco, Raphanus, ex calfacit quidem ordine tertio, desiccatur verò secundo. Quin & semen ipsum plantæ efficacius est, facultas ei inest digerendi. Itaque ad sugillata, & alia id genus liuida, ob talem facultatem accommodum existit. Ceterum, cum Medicos, tum idiotas illos mirari subit, qui à cœna crudos eos concoctionis iuuandæ gratia edunt. Ipsi quidem se experientia id abundè compertum habere dicunt, nullus tamen exemplum illorum sine damno potuit imitari. *Hasenus Galenus.* Cuius equidem verba edibentis recitauimus, quod non solum vulgi, sed etiam Medicorum errorem lepidè notare videatur, qui crudas Radiculas à cœna esitabant, iuuandæ concoctionis gratia: quibus quidem verbis Dioscoridem obiter carpere videtur, quippe qui hoc loco ita sensisse videatur, idque tum roborandi ventriculi tum cibi distributionis adiuuandæ gratia.

* Simeon Sethi discrepantes hæc sententias adhibita disunctione componere nititur: dum quibus alius faciliè subducitur, quique flatibus carèt, ut vult exhibendas ante cibum Radiculas: contra verò à cibo, iis qui flatibus laborant, quibusque cibis in ventriculo supernat, ac etiamnum difficilis est alius. Verumtamen neque hoc ipsum quenquam citra damnum experiri posse, cum Galeno crediderim.

Rhabphani recens minutim incisa radix (ut scribit Marth.) albo meraco inspersa, & in tartagine calfacta, pubique admota, remorata utinam pellit. Idem præstat eiusdem succus duarum vnciarum pondere ex vino Cretico haustus. Corticis vncia cum mercurialis pari pondere, croci granis quatuor, pulueris cassiæ odoratz drachma, succi fabinæ drachmis duabus, omnibus simul in mortario contusis tenuissimo linteolo exceptis, veterique ceruici admotis, agrè parturientibus mirificè subuenit. Eiusdem radicis succus cum oleo dulcium aut amararum amygdalarum, & vini albi & colocynthidis momento aurium sonitus tollit, si calidus instilletur.

Raphano autem comesto lacticiuia esse vitanda, quod corruptoratur & vitium inde contrahant, monent: Raphanus à cœna manducatu gratiam reddit anhelitum, si quis statim ab ea sumpta somnum caperit. Grauidis ut apud Dorsthenium legimus, non conducit, expellit enim foetum, trahit menses, educitque secundas. Succus eius inueteratis vlceribus illitus, ea renouat gangrenamque in eis erodit. Idem præstat puluis eius. Succus Raphani cum melle decoctus, atque modico aceti admisso, percolatus, prodest contra febrem quartanam, & contra oppilationem lienis, si in potu sumatur. Catem subeuntibus &

Diosc. Medicor. Galenus not.

quis, lienosisque vilius Raphanus emplastri modo imponitur, vt Dioscorides testatur.

Raphanus domesticus esculentus, ait Fernelius, sine offensione vlla vomitione purgat, atque ventriculum blandè exinanit: quæcunque nimium in eo crassa sunt attenuat, quæ lenta sunt detergit, ac demum stimulat expultrice vi sursum extollit, nulli ætati neque pregnantibus infensus. Terruntur autem radices eius concisæ vnicuique, affusæque mulla succus exprimitur tepidus offerendus. Seminis [quod efficacius sit] semuncia vel ziii similiter teruntur addita mulla aut sero lactis aut aqua hordei.

Radicem cum sale tritam in malignis febribus sub pedibus ligat testatur Schvvenckfeldius. Scribit Camer. apud Matthiolum Germ. si in excavatum Raphanum aqua Maioranz immittatur, & per aliquot dies sub terra defossus detineatur, aquam illam visus debilitati mederi. Si in Raphanum cauatum veretrum immittatur, lapidem [teste Font.] in magnitudo obster, trahet. Quidam in Raphano cauato crocum adiciunt. Nec solum calculi causa hoc fit: sed etiam in difficultate vrinæ ob crassum viscidum & glutinosum humorem, aut sanguinis trombum meum obstruentem. Aqua Raphani [radicis, hæc enim minutim conciditur, ac distillatur] per triginta dies mane ac vespere singulis vicibus tribus aut quatuor vnciis pota medetur calculo, facitque ad aquam intercutem, modò ægrotus à nimio potu absteineat. De cætero vilius ad omnes hætenus recensitos affectus. Fit & ex succo Raphani expresso cum Saccharo aut melle *Syrupus*, apprime idoneus calculosis lienosisque. *Olerum* quoque ex hoc parant ad dolores aurium, spinæ dorsii, atque renum, à frigidityte ortos.

RAPHANVS BYZANTINVS.

Descriptio

Raphani Byzantini semen habuit Camerar. horti Constantinopolitani, qui postea tamen degenerauit in communem, ac solos flores ac semina protulit radice penitus lignescente.

RAPHANVS RAMVLA CRETENSIBVS dicta.

Descriptio

Raphani vulgati seu nostratis modo *scapum* erigit cubitalem aut sesquicubitalem, itidem brachiatum. *Folia* posita & ordine vt in prædicto, sed læuia, tenera, & præ glabritie non nihil splendicantia, figurâ vt in illa varia. Quædâ namq; dissecta magis, quædâ magis integra & subrotunda: suprema ad Lâplanz quodammodò accedentia. E ramorum supremis alternato positu ex vnciali setè pediculo flores dilutè purpurei emicant, raphani nostratis similes. Succedunt *vascula*, aliâs *perizonia*, aliâs gemina, aliâs longa teretiaque, sed omnia in excavatum mucronem fastigiata, *semen* continentia Raphani, rotundum, in pulpa suagosa delitescens, sapore grato, minimum, aut etiam nihil, æri, ita vt ad auellanarum nucleorum etiam saporem quodammodò accedere videatur, quatenus ex sicco deprehendere licuit. *Radix* tenuis, fibrosa, candicans, qualis quidem hætenus nobis obseruata.

Ramulæ Cretensis nomine à fratre C. Banhi. no semen accepimus quod satum in horto Ill. Ex

C. VVitem. Montbelgardi non prorexit: postea Daniel du Vernois Medicinæ candidatus attulit nobis sine nomine plantam collectam Basileæ in horto clariss. viti Domini Iacobi Zvingeri pro Raphani specie rara: Nobis quoque siliqua cum seminibus nomine etiam Ramulæ Cretensis Basileæ in prædicto horto collectas, communicauit Doctus Vir Conradus Pfisterus Basile.

RAPHANVS SILVESTRIS VETERVM.

De hac seorsim agendum duximus, eâ potissimum de causâ, quòd qualis sit, hodie non constat. Radicula igitur siluestris [paruit à yeia] quam Romani apud Diosc. Armoraciam vocant: *Folia* habet satiax [Eruce Theophr. qui Raphani quintum genus facit & siluestre vocat] similia, sed quæ ad Lampfanam propius accedant. *Radix* est gracilis, longa, subacris. Est [inquit Panius lib. 19. c. 5.] etiamnum vnum siluestre [Raphani genus,] Græci Agtion vocant, Pontici Armon, alii Leucon, nostri Armoraciam, fronde copiosius, quàm corpore. Idem lib. 20. c. 4. Raphanum siluestrem esse diximus. Laudatissimum in Arcadia quanquam & alibi nascitur.

Potè tam solia, quàm radix, auctore Diosc. olerum vice decoquantur. Excalfacit autem, vrinam citet, æstuosaque est. Vilius, tradente Plinio, Raphanus silu. vinx duntaxat ciendæ. Cæterò, bilen. detrahunt cortices in vino. Præter ea, quæ circa eos dicta sunt, stomachum purgant, pituitam extenuant, vrinam concitant. Est & satiax [legendum siluestris] vñs in Italia, & Armoraciam vocant.

Agrestis Raphanus, teste Galeno, in tertio ordine caletaciendi, & in secundo desiccandi satius efficacior est.

RAPHANVS SILV. MATTHIOLI.

Matthiolus, vt præ cæteris se, non dico Rhizotomum, sed quarumlibet stirpiura Rhizorichum [eradicatorem] ac Numen quasi omniscium ostenderet, ita de Raphano silu. in suis in Diosc. com. differit. Romani suam antiquam Raphani silu. appellationem retinent, qui ipsam primæ literæ Metathesi Ramoraciam appellant. Cæterò, cum syluestris satiax longè durior, acriorque deprehendatur, Diosc. codex hic etiam mendisuspicionem non vacat, vt pote qui Armoraciam radicem reddat teneram, mollè mæ & subacrem. Fuch. eam esse stirpem putat quam Raphanum rusticum nonnulli vocauere. Si is Romam vñquam profectus esset, nunquam [vt arbitror] in errorem incidisset, spontè namque [ait in Epit.] provenit in campestribus in agro Romano. Anguill. Raphanus silu. vocatur Romæ Aramoraci & Remolaci è Mazorchi. Per *Raphanos* [Raphanos] siluestres Lacuna intelligit duos asperos, qui Plinio dicuntur Armoracia, & nomen antiquum conseruant, ac Romæ dicuntur *Ramoraci*.

Lat. Armoracia: Castil. *Xaramago*. Ital. *Ramolacci*. Matthiolus qui temerè nimis Diosc. codicem mendo laborare scribit, non demonstrat quam plantam intelligat, nec eius Glossatores patroni & Simuz: melius sibi consuluissent, si iconem aut

Raphanus silu.

Brucia folio

Lampfan folio.

Radix.

Agria.

Leucon.

Armoracia.

Vitis

Descriptio

altem descriptione, quam plantam intelligerent, indicassent. Lacuna quidem videtur intelligere Raphanum sativum longum, crassum, duriorum, qui per hiemem reservari potest.

RAPISTRUM FLORE ALBO STRIATO, Sinapi agreste album Trago.

Descriptio



Rapistrum flore albo striato folia habet Sinapi Erucae diversura simili, hirsuta, sapore oleraceo: caules ramosos, hirtos: flores albos: Erucae maioris, stris exuleis variegatos, apicibus luteis, filiquis pulchras, longitudine fere digitali, ubi maturare nodis instar caudæ Scorpionis distinctas, striatas: in quibus pro-

nodorum numero semina: radix satis tenuis, alba, aliàs simplex, aliàs multifida.

An Trago sinapi sylvestre ad aquas proveniens flore albo?

An Dod. Gall. Sinapi sylvestre [sinapi agreste?] quod idem cum Tragi Sinapi suspicor esse, quamvis figura ad Erucae maiorem pertineat.

An Turn. planta V Veissenburgi weisshederich, & quibuldam wildrettig dicta: Is quidem existimat esse Radicem silvestrem Dioscoridis. Hæc ed loci semper inter Rapas nascitur, Rapistro similima, brevior, flore albo, radice exili, sapore aliquatenus & forma Raphani longi: folia incisa seu laciniata Raphani sativi modo, leviora nonnihil quam Rapistri. Videtur Plinius hanc pro Lampfana sumere lib. 20. cap. 9. & falsò inter Brassicarum genera reponere: cum inter Raphanos collocare debuerit. Siquidem Plinius multis locis Radicem appellat, Brassicam appellandam, ut lib. 11. c. 23. & lib. 27. cap. 24. atque ita utramque plantam videtur confundere. Eius verba, quæ huic me inducunt, sunt ista, inter Brassicas sylu. & Lampfana &c.

Catasp. Lampfana, flore candido, Dioscor. sylu. Plinio inter sylvestres Brassicas Lampfana, quæ Iulius vixit apud Dyrrachium. Lonic. Selber wilder Senff [Sinapi luteum silu.] cuius figura, qui suo more nescit quid scribat, videtur demonstrare Rapistrum, de quo hoc capite agimus. Plant. Icon. pag. 199. Rapistrum flore albo. Erucae folius Teut. 237. Tabern. Icon. & hist. Armoracia Beiderettich, quod quidam volunt Lampfanam, alii Raphanum silu. alii nominant Rapistrum album, quidam Armoraciam. Et alibi, Rapistrum purpureum, Brassia hederich. An Rapistrum flore albo fuerit bene notum Compil. Tabern. nos latet, quia album non describitur apud eum nec an colore floristandem differat purpureum, annotatur ille alioqui pro sua insigni prudentia fo-

let icones diversas exhibere plantarum solo colore differentium: Lectores tamen considerent, an extet purpureum & diversum ab albo, aliis notis quam colore. Schvvenck. Armoraciam Tabernæ ad Rapistrum flore luteo refert, quod non improbamus, si consideretur icon: verum nomen Rapistri albi non videtur convenire, ut antè dictum, Item Rapistrum album, Raphanus silu. Lampfana seu Brassica silu. Matth. weisshederich. Ad iconem purpurei Rapistri Tabernæ scribit Gerardus, Rapistrum aruorum Charlock aut Chardick, quam plantam intelligat perpendendum. C. Bauh. phyt. Rapistrum 2. siue album hoc flore purpurascens etiam reperitur.

Floret passim in agris Iulio & Augusto, observatur etiam Montpelii, Genevæ, Basileæ, Montbelgardi passim in agris. Campis rapaceis cultis & incultis, sed rariùs occurrat Schvvenckfeldto.

Semen, autore eodem, exalfaciendi, siccandi, abstergerendi, & digerendi vi pollet.

Vires

ALSINE NODOSA DALECHAMPII.



Descriptio

In agro Montpelienli plurima gignitur, radice simplici, longa, patum capillata, ex cædido quæscente: foliis prope terram multis longiusculis, angustis, Alsinæ hand multum dissimilibus: caulibus multis, pedibus, flore albo, ex quinque foliolis composito: semine in nodosis stris, usque globulis multis, sese ordine consequen-

tibus, & quasi veruculâ transfixis, peculiari ordine figurâ.

Hist. Lugd. Alsine nodosa. C. Bauh. phyt. Alsine 23. siue semine globoso.

RAPHANVS SYLVESTRIS, SIVE ARMORACIA multis.

Radix crassa, furculosa, repens, sapore feruidissimo: caules singulares bicubitales, concaui, striati, recti & rigidi: folia inferiora, antequam caulem proferat ampla, Lapathi, rugosa, ubi caulem autem profert, in eo folia palmum longa, vnciali latitudine aut paulò maiore in ambitu profundè satis serrata, gustu minds, feruido quam radix: ex quorum alis furculi tenues prodeuntes flores sustinent positi & formâ Nasturtii palustris cum apicibus luteis.

Habent (inquit Turnet.) Dioscor. & Plinius Raphani genus, quod Græcis dicitur *ῥαφαν*, Lat. *Armoracia*. Ital. *Ramoracia*, teste Matthiolo. Tradit Dioscor. Radiculam silu. folia habere Raphani hortensis, nisi quod ad Lampfanæ folia

Descriptio



propolis accedant. Quod si verum est, exarunt quicunque plantam illam folio. Rumicis, radice acerima, Germ. Meerrettich & Angl. Redcole d. Nam, Armoracia aut Radicem siluestre putant. Nihil enim simile habent, Rumicis & Raphani domestici folia. Scribit idē Dioscor. Raphani sylu. radicem esse gracilem, teneram, suba-

crem, ut vulgati Codices Graeci habent, quam emendatōres legant, *parpa pro paradi.* At Germ. Meerrettich, radicem habet admodum acrem & mordacem. Quare nequit esse Radix filu. Dioscoridis.

Thlaspi maius, inquit Cordus in Dioscor. sine dubio est ea herba quam ego Meerrettich appello & Arabes Nasturtium album.

Brunfelsio: Armoracia aut Raphanus maior. Matth. passim in suis Commentariis, Thlaspi Crateux, Raphanus vulgaris, Raphanus rusticus, Raphanus rusticus siue maior, ut vulgō. Cam. apud Matthiolum Raphanus sylu. Raphanus montanus, rarō reperitur semen, unde Petrus Crescentinus scribit semine omnino carere: docti vocant Thlaspi Crateux, & multi vocant Thlaspi magnum. In horto, Raphanus rusticus, vulgō Armoracia.

Gesner. in cat. plant. Armoracia vulgō rapistrum *γρια* & *γρια* Theophr. sylu. Brassica, quibusdam Lamp. na. Raphanus sylu. Ponticis Armon, alius Leucon: Officinis hodie rapistrum ut quidam volunt, ego autem existimo Meerrettich esse Thlaspi alterum.

Taberna. Icon. & hist. Raphanus marinus meerrettich, Thlaspi alterum Diosc. Sinapi Persicum, Raphanus maior, Raphanus condimentarius, Raphanus oblongiorum Arab. Nasturtium album.

C. Bauh. phyt. Raphanus s. seu Thlaspi alterum Dioscor. Apud Matth. Raphanus rusticus siue filu.

Gerard. Raphanus rusticus.

Schv. Raphanus rusticus, Raphanus magnus, & *παρaris* & *γρια* Dodon. Armoracia Plinii. Raphanus rusticus, Lapathi folio, videtur Lobelio & Penz in Aduers. capite proprio Molydæa Plinii. Sinapi Persicum. Potest dici hydropper etiam hæc, quam nonnulli Lepidium Pauli & Plinii dixerunt. Raphanus rusticus plebeculæ.

Lobel. Obs. figuram habet ac scribit, Raphanus rusticus Thlaspi & Sinapi Persicum, Armoracia Tragi, Thlaspi Crateux Diosc. Lobel. in Obs. in Append. p. 495. Crassa radice Raphanus rusticus florens, Aduers. pag. 135. & Obs. 173. Plant. L. con. p. 120. Raphanus rusticus, crassa radice, Lapathi folio, Lobel. 173. Lobel. in Append. Teut.

304

Nomina. Raphanus sylvestris, siue Armoracia multo- rum vocatur Hipp. de morb. mulier. *γρια* & *γρια*.

Gesner in Cat. *γρια* & *γρια* Theophr. Germ. Meerrettich: Gall. Raifort sauvage. Angl. Horse Radish, Moinsaine Radish Great Raifort/ Redcole Gerardo.

Copiosè alimus in horto E. C. ob eius multum usum in coquina hyberno tempore abundat prope Lure spontè in agrorum quorundam marginibus, abundat extra portam Helicentianam iuxta agros Canabinos, quā itur ad edes carnicis: odiosus in hortis suo repectu. Geneux in hortis floret Maio, Basileæ abundat in multis hortis, iudem Lugduni: vidi Patavii & Vetonæ in hortis: passim humidis & vimbrosis hortorum locis, Schyvenckel.

Extremè plantæ est acridinis, annorante Schyvenckellic: Aperit, pellit, incidit, prouocat, attenuat, abstergit. Teritur cum vino, aceto & melle condiminetur vice. Appetentiam facit. Verum caput lædit, & nidorosas eructationes mouet. Biliosis & caput dolentibus noxiis. Vini & arenas valenter pellit, Menstrua prouocat. Io. de Monte Expet. Senex Monachus cum leniret se calculis vexari Raphanum rusticum (Meerrettich tenuiter infecabat, in lintecolum reponerat, & in vino macerabat, & mane & vespere cum vellet ire cubitum poculum ebibeat per triduum, hoc solo remedio vsus non vexatus amplius fuit à doloribus ob calculos & arenas.

SINAPI VETERIEVS ET IN GENERE

CAP. IX.

Sinapi licet nec à Theoph. nec à Diosc. in genera diuidatur, aut describatur, Plin. tamen triū generum esse dicit. Vnum gracile: alterum Rapi folis simile: tertium Erucæ. Sed alia adhuc potest ex semine defumi diuisio, quod colore vel est albo, vel atro purpureo, vel rubro.

Ceterum, tria se obseruare genera scribit Ruellius, & ex eo Carolus Stephanus, quem sequitur Gesner. hort. Siluestre ubique spontè nascens, exilius, quod vulgus gallicum à minori proceritate *Samelam* vocet. Alia autem duo numerosioribus, altioribusque ramulis brachiari, Rapo similia, sed folio minori & asperiore. Verum semen variare, in viro rufescere, in altero candicare ex toto. Hanc *Nancham* Mousardam, illam *nigram* rusticos vocare, utramque verò communiter *Senecæ*.

Tragus capite de Sinapi satium [cuius alterum fusco seu pullo, alterum verò albicantè prægnat semine] & sylvestre recipit, ibidemque plures plantas confusè tradit.

Fuchsius quoque & post eum Ryffius, genera duo agnoscit, non semine tantum, sed & foliis & floribus distantia. Primum siquidem rapitiam frondem exprimere videtur, floremque luteum obtinere, ac semen album proferre: Alterum verò in Erucæ folium laciniari, floreque albicante, & semine vesco pulloque constare, scribit.

Trium Plinii Sinapis generum meminit Matthiolum, eaque in Italia obseruari scribit. Horum autem vnum [Sinapi eius tertium] quod cum folio, tum etiam semine tenui dicit, erratum [H. Lugd. quæ Matthioli genera & figuras recepit, Sinapi filu.] facit. Videtur hoc nobis Sinapi Erysimi folio. Alterum verò [secundum] quod Rapi fronde constat, ceteris maius hortense [satium H. Lugd.] vocat. De hoc dicetur sub Sinapi si qua hirtula

LIBER XXI

hirsuta albo, non respondente descriptioni. Tertium [in inscriptione primum] & ipsum sativum [hortense H. Lugd.] statuit, semine albo, minutiusque acuti. Dicimus & hoc Erucam maiorem.

C. Bauhinus ut & Camer. apud Matth. Germ. easdem Sinapis exhibuit species, nisi quod hic pro silvestri, aliam plantam dedit, quæ nobis videtur Eruca quorundam silu. repens.

Lonicerus aliter distinguit: in Luteum enim & album à flore sumpta varietate dividit. Illud duplex rursus tradit, hortense & silvestre, ambo seminibus albis. Exhibet autem pro hortensi luteo, Sinapi album. Sylvestre existimamus esse Rapistrum flore albo striato. Sinapi album, quod Græcè Euzomion, Latine Erucā vocari scribit, similiter in sativum & agreste dirimit. Sativum album sativum luteo: agreste album, agreste luteo, inquit præter flores in omnibus respondent. Pro Sinapi silu. albo ponit iconem Erucæ sativæ.

Brunfel. duo Sinapis genera agnoscere videtur. Album & nigrum. Ita namque scribit. Eruca album Sinapi est, nigro virtute caloricā similis, addit ut sine damno in vltum venite vsu possit, ni lactuca addatur, à cuius frigore ad temperamentum adducatur.

Dodon. Sinapios tria genera esse tradit: sativum duo, & silvestre tertium. Sativum priori flores esse dicit cum semine luteos: alteri flores quidem luteos, sed semen è nigro subruffum, interiore medullā è luteo virefcens. Sinapi sativum Dodonæ prius, quoad figuram, Erucam maiorem sativum flore albo demonstrat: Alterum Sinapi album exprimit. Silvestre, cum Sinapi Eryfimo Tragi cognatum credimus.

Lobel. & Pona in Adu. præter duplex Sinapi sativum, Erucæ & Rapi folium, duplex quoque Agreste constituunt. Primum Apii, aut potius Laveris folio, quod quale sit, fatemur ingenuè, nos adhuc ignorare. Et alterum Sinapi silu. minus, Irionis veri folio, aut Bursæ pastoris. Hoc si ex figura Lobelii Obs. & Icon. Pl. coniectari liceat, Sinapi Eryfimo simile fuerit. Lob. Obs. & Ic. plāt. sub titulo. Sinapi sativum Erucæ aut Rapi folio Adu. p. 67. iconem falsam exhibet, Erucam enim maiorem potius ex Matth. exprimit. Sub Sinapi etiam agreste Apii aut potius Laveris folio Adu. p. 68. malè adaptat figuram Sinapi albi, ut diceretur sub Sinapi siliqua hirsuta, albo.

Cæsalp. Sinapis triplicem differentiam assignat. Rapæ folio, flosculis luteis semine fulvo, sativam & silvestrem. Tertiam, folio laciniato, floribus quidem etiam luteis, aut semine ex flavo candicante. Est hoc nobis Sinapi album illud vulgate, semine ruffo.

Atque has Sinapi differentias, ut & eas, quas C. Bauhinus in Phyt. inter Erucas recenset, cum nostris mox seorsim distinctis trademus. Plurimæ sanè præterea extant plantæ, quæ passim apud Autores Sinapis nomen sibi vendicarunt, ut Sinapi Persicum, Alliaria, Capparis, Lepidium, Erucæ, & alia plura, de quibus singulis suo quoque pertractatur loco.

Apud Athenæum dictione Sinapi usus est Nicander Colophonius in theriacis:

Est vel Cucurbitulam aneam, vel Sinapi.

Idem in Georg.

Mordaxque semen Sinapi.

Et alibi.

Nasturtium vernum, silvæ nigræque Sinapi.

Græci plerique rimum & rimum, Attici verò, ut apud Athenæum legitur rimum dixerunt, sic Galenus appellat Paulus & Aetius. Dioscorides utroque modo vocat, Latini Sinapis & Sinapi. Arabes

Cardel: Hebr. Chardal, quemadmodum in Cant. cap. 7. Rabi Salomon testatur. Germ. Senff. Belg. Mostaert: Gall. Moustarde, Senene. Ital. Senape, Hisp. Mostaza: Castal. Mostalla: Port. Mostarda. Angl. Mustard & Stuberger. Boh. Horace Hung. Mustar.

Notandum autem his nominibus & condimentum, quod ex huius plantæ semine conficitur appellari. Plinius Sinapi etiam à quibusdā Thaphi: ab aliis Saurion dicit refert. Est autem tam Sinapi, quam Napy sua ratio ac interpretatio. Nam etenim dicitur, autpre Athenæo, quasi vltio, quia quædam est, sine natura sit: velut Aphia, quia ob parvitatem natura priuatum sit. Quod ob pusillam molem non esse, aut vix esse credatur. Alii Napi per priuationem, videlicet Napi, quasi immite dici voluit, quoniam acrimonie vehementis particeps sit. Eryfimo verò, in olivæ rucæ dicitur, quia olfactu oculos lædat. Et hinc fortè mentio à Poëtis, sletum factura, lachrymosa & tristis cognominatur, apud Athenæum Crates Cleonem ira percitum, contracta fronte, & indignabundum, excandescensque innuens dixit:

Sinapi conspexit, & frontem contraxit.

Quod verò Gallis Moustarde vocatur, ex eo factum videtur, quod cum musto Sinapi ad intinctus conteritur soleat. Camerario tamen apud Matth. germ. Mustarda dicta placet quasi Mustum ardens, quod ignea vi semen nates & cerebrum apprehendat, lachrymas excutiendo, nullo asperitimi saporis prævio odore. Vnde natum apud Francos diuersium, quo, cum insignem veteratoris astutiam indicare voluit, inquit, Callidiorem esse Sinapi.

Terram, ut inquit Palladius, diligit aratam, & si fieri potest, congestiam, quamvis ubicunque nascatur: sarculari debet assidue, ut respergatur pulvere, quo fouetur: non minus gaudet humore: de quo semen legere disponis, suo loco esse patieris: quod ad escam parabis, robustius facies transferendo. In Sinapi vetus semen inutile est, sationi, vel vsui: quod denubus fractum, si in eis viride videbitur, novum est, si album fuerit, vetustatem fatetur.

Sinapis sementem auspiciantur Autumno, Vere perficiunt, quinto die post satum comparet. Aceritimum, inquit Plinius, sapore, ignei effectus ac saluberrimum corpori Sinapi, nullā culturā prouenit, melius tamen planta tratata. Quin è diuerso vix est satum semel eo liberare locum, quoniam semen cadens protinus viret. Eligere præcipit Diosc. quod non obaridum sit, & fuluum, & adultum: sed quod fractum intrinsecus viride, & velut succulentum sit ac cæsum colore. Tale enim recens esse & in vigore constitutum. Porro Antiphanes excellere putat Sinapi Cyrium: optimum commendat Egyptium Plinius, probat Alexandrinum Galenus, Pythagoras principatum habere ex his quorum in sublime vis feratur, iudicauit: quoniam non aliud magis in nares & cerebrum penetret.

Sinapi in medicina multæ & magnæ vires. Nam, autore Dioscoride ad calfaciendum, attenuandum, attrahendumque efficax est. Communducatum autem valet ad pituitam capitis eliciendam. At succus ex aqua mulla, contra tñsillarum præduros tumores, veteresque & callosas arterie scabritias gargarizatu prodest. Ipsum verò Sinapi tritum & nabus admotum iterum tamen ta ciet. Comitialibus quoque auxiliatur, & vulnus strangulatu oppressas excitat. Quin & l

HISTORIAE PLANTARVM

charactere capiti deraso illinitur. Pico autem admixtum & impositum donec rubescat locos, vel ad coquendum cruciatus; tenet ac in vniuersum ad quoniam diuturnum dolorem, cum ex alto in summam cutem quidpiam extrahere est in animo, trāsato scilicet in alteram partem affectu. Aiopetis etiam illitum medetur, faciem purgat, & oculorum fugiata tollit, cum melle, adipe, aut cerato. Cum aceto verò, lepra & fere imperigines eo perunguntur. Sed & contra febres circuitus aridum bibitur, polentæ modo potui inspersum. Elyplastris quoque extrahendi vi præditus, utque quæ ad psoam faciunt, vtiliter ammiscetur. Succurrit & audientis gravitati in eertisque sonitibus cum fico tritum, auribusque inditum. Ipsius verò succus cum melle ad oculorum hebetudines genarumque scabritias conuenienter iungitur. Cæterum exprimitur recenti adhuc semine succus, atque ita in Sole siccat. Vfus eius, ut scribit Plinius, etiam præ pulmentario in patillis decocto, ultra intellectum acrimoniæ. Coquantur & folia sicut reliquorum olerum. Ad serpentium ictus & scorpionum tritum, cum aceto illinitur. Fungorum venena discutit. Contra pituitam tenetur in ore [mansum] capitis pituitam elicit, *ἐμπληυσίῳ*, Diosc.] donec liqueat, aut gargarizatur cum aqua multa. Ad dentium dolorem manditur. Ad vuam (ad tonsillas, diuturnasque & callosas arteriæ scabritias succus mixtus cum multa gargarizatur,] gargarizatur cum aceto & melle. Stomacho vtilissimum contra omnia vitia, pulmonibusque. Excreationes facili facit in cibo sumptum: datur & suspensio. Item comitialibus tepidum cum lacte cucumerum. Sternutamentis caput purgat, aluum molit, mensura & urinam ciet. Hydropticis imponitur: Cum fico & Cumino tusum ternis partibus comitali morbo. Et vuluarum conductione [strangulatu Diosc.] suffocatas excitat odore, aceto misto: item lethargicos.

Calefacit & siccit ordine quarto, Galeno asserente.

Plinius cap.
viii.

Vox (inquit Cornar.) lithanicos, falso protanicos apud Plinium supposita. Nulli enim sunt lithanici, sed tetanicorum affectio media est inter Opisthotonicorum & Emprosthotonicorum affectionem, utramque complectens: quando distentio aut rigor nervorum, antè & retrorsum contingit.

Symeon Sethi scribit Sinapi vim habere dissolventi, & discutiendi humiditates quæ in capite & stomacho sunt. Conferre etiam lienis affectibus ab humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex adusta pituita contracti sunt. Adhuc & podagris à pituita factis. Officere verò vili, & calido capiti, & iecori. Adiuuare emenationem & distributionem ciborum crassum partem. Minuere quæ in ventriculo sunt humiditates. Illitum lepris eas in melius mutare. Linguas etiam humiditate granatas siccare. Si cum melle sumatur, tussis resoluere. Cum caricis verò & iudicis illitum, & lienotis vtile esse: trahere enim quæ intus sunt ad corporis superficiem. Suffitum verò & incensum feroces fugare.

Sinapi in scorbuto, inquit Marcel. Kirich. Transylv. vtilissimum est. Hinc nauez in magnis navigationibus copiâ Sinapi sese munire solent, eoque tanquam præsentissimo prophylactico Theriacales vires. Habet enim vim calefaciendi, extenuandi, dissolventi & discutiendi humiditates in ventriculo & lienis affectibus, adiuuat concoctionem

nam & distributionem ciborum crassam partem.

Qui ex Tridentino agro in Germaniam multum comportant, auctore Matthiolo, Sinapi in cibo cadis imposito, dulcedinem multum, conferunt. Folia (de vulgari Libel. loquitur) ceterum Sinapi in acetaria veniunt.

Quomodo porro Sinapi ad conditura Saltemorum & ad Embammata præparari debent docet Columella, in hunc modum. Semen Sinapi diligenter purgato, & cribrato, deinde aqua rigida eluito, & cum fuerit bene lotum, de aqua huius in aqua finito, postea tollito, & manibus expressum in mortarium nouum, aut bene emundatum conicito, & pistillis conterito, cum contritum fuerit, totam intritam ad medium mortarium contrahito, & comprimito manu, deinde cum compresseris, sacrocatato, & compositis paucis carbonibus viuis aquam nitream infundito, ut omnem amaritudinem eius, & pallorem exaniet: deinde statim mortarium elapsum omnis humor eliquetur. Post hoc album acrum aduicito, & pistillo permisceto, colasque. Hoc ius ad Rapa condienda optimè facit. Cæterum si velis ad usum conuiuiorum præparare, cum exanieris Sinapi, nucleos pineos quam recentissimos, & amyllum aduicito, diligenterque contento infuso aceto. Cætera, ut supra, conicito. Hoc Sinapi ad embammata non solum bene, sed etiam specioso vteris: non est enim eximii, si sit curiosè factum. Hac ille.

Nostri autem musteum semen nocte macerant aqua, deinde manibus expressum ad acetum pilâ cetant, acerrimo ciborum condimento. Alii per vindemias cum musto maduere conterunt, ita magnam acrimoniæ vim exant, totaque anno seruant. Nec hodie quiescent, me ad intinctus ubique obis frequentius immiscetur, gratissimo obsoniorum condimento, multum quoque frigidis diebus magis epulas commendare. Quod si vel assidua confectio, vel esu, gratia ciborum exoleat, huius acrimoniæ falsidionis gustum reuocant, & hoc velut medicamento elanguescentem appetentiam reuocant, quo velut igniculo morosis palatibus utantur, vorandi moliantur aviditatem. Sed huius vis confestim in sublime fertur, ut ex Plinio diuinitus, nec aliud magis in nates ac cerebrum penetrat. Quare si modus abstulerit, huius odor narium capitis, statim sternutamenta ciet, & vellicat, lacrymas elicit, quod & testatur Cornar. canens:

Siquæ laceranti fletum salura Sinapis.

Ad dolorem capitis sæpe recurrentem, nonnulla tempora, cum oleo & Sinapi parato plumbum nit VVier. Empiricus. Sed aboleuit oleum Sinapi, ut si ubi ad summum excalefactum fuerit, maximam opem præstare valeat. Nonnulli nonnulli collachrymantibus oralis, nonnulli potest: tanta enim est vaporis acrimoniæ, & recepto vapore illico prædeant lacrymæ. Hæc tur quandoque cum eo, quod est pistacis, elicitur: perungunturque eo genitalia in, ut felici coeant, addito balsamo, & Musto. Sinapis ex herba florente in principio distillata, pellit vlcera gingivarum, ore sepius ex ea colluto: Conducit ad membrorum Phthisim, sepius inde fricentur, inde enim vigorem, & carnem recuperant. Medullam ossium calefacit, si sepius ex ea fricentur, & per se iterum siccant. Prodest contra frigidum morbum articulorum.

si inde

si inde fricentur & iterum per se succescant.

SINAPI SILIQVA LATIVSCVLA GLABRA sem. ruffo; sine vulgare.

Descriptio



Ad cubitos aliquot excrecit, caule inā parte hirsuto, superiore glabro, frequentibus ramis brachiato, eoque tereti & fungosa medulla pleno: folia, inferiora quidem lata, dissecta tamen, Rapi-
tius similia, hirsuta, superiora vero tenuiora & glabra, odore si terantur eodem qui in semine percipi solet: flores Erucæ minores, & Rapi-
stri lutei, ex quatuor foliolis apicibusque mediū occupantibus compositi, quos quatuor foliola pallido herba-
ceo colore prædita obvallant, odore suavi: non excipiunt siliquæ glabræ, satis breves, Erucæ maioris similes, sed minores, ex breui pediculo, quæ commissuræ ratione, ut in illa, dehiscunt, semina claudentes plūs minūs octo. cum in Erucā multò sint plura, colore minūs obscuro, & paulò maiora, in hoc à Rapistri seminibus differentia, quod rufæ sint nec lucida, cum illa nigra sint & nitida, ceterum Sinapios huius semina tenui membrana separantur, cui ordine adherent, sapore acri: radix candida, lignosa, fragilis, fibrata. Nullus, quod sciam, bonam iconem exhibuit Sinapi de quo hic agitur, vixque ab aliquo ritè descriptum videtur: propterea placuit id, & de nouo describere, & depingere.

Brunfel. Sinapi. Cord. in Diosc. Sinapi hortense, herba cum semine suo omnibus nota. Notat ibidem Gesner. sativum à silvestri cultura solum differre. Fuchsi. Sinapi vulgare omisit.

Tragus Sinapi sativum, Gemein Senff sam. unde garten Senff mit braunen samen. Miror Tragum alioqui Botanicum diligentem nec figura nec descriptione hoc Sinapi ritè descripsisse aut distinxisse à Sinapi albo. Ait quidem Sinapi sativi duo genera, quorum vnum sit semine pullo seu fusco, de hoc loquens.

Lacuna proponit plantam Erucæ facie pro Sinapi primo, & descriptionem, quæ mihi non videtur competere Sinapi vulgari, sed potius Erucæ.

Dod. Sinapi hortensis secunda species. Neoterici Sinapi commune, Gallicè Senene de iardin, in Monslarde: Germ. Zamer senff. Belg. gemein Mostaert: Item Sinapi silvestre. Lat. in fol. Sinapi alterum sativum ex quo condimentum conficitur, quo ad ciborum intinctus vtuntur cum uinū. Item silvestre. Non est Dodonæo in hist. Gallic. figura pro Sinapi secundo siue vulgari, in Lat. habet figuram Sinapi albi. Quid per Sinapi silvestr. intelligat nescimus, nisi tradat spontaneum: Is enim sibi non constat: in histor. Gal. proponit figuram Erucæ sub titulo Sinapi Tom. II.

filu. in Latina verò appingit Iconem Glu. Matthioli, figuræ sanè duæ non parum differentes.

Aduers. Lob. & Penz, Sinapi sativum Erucæ aut Rapisolium, Gall. Senene d'herbique, Germ. Senff. Angl. Mustdier & Senbrye. Magis abest Sinapi à Napo vitium acrimoniæ, quam specie, sacre, vel nomine. Napi enim immitte aut vehemens interpretantur, siliqua rapacea, semine minore, acrimo, oleoso. Item p. 68. Sinapi agreste Apii, aut potius Laueris folio, Gall. Senne sauvage, Germ. wilder Senff/ Belg. wilden Mostaert, turibus semen nigrum penuriam sativi refert, quod ostendit flores & siliquas, ad sativum viarumque rivulos & depletas fossas luxuriare solitum.

Hist. Lugd. Sinapi hortense ceteris maius & vulgatius nigrum Galli dicunt, siliquæ hirsutæ plenæ semine ruffo, nigrescente, calido & acrimo. Malè dicit siliquas hirsutas, malè etiam Erucam representantem figuram ponit.

C. Bauh. phyt. Erucæ & Sinapi Apii folio: Sinapi gracile Plinio: Sinapi Brunfelsio: Sinapi luteum sativum alterum pullo seu fusco semine Trago. Sinapi agreste Apii aut potius Laueris folio Lobelii. In semine differentia apparet, aliud enim subruffo aliud albo est. Item apud Mart. Sinapi 2. Apii folio, gracile Plinio: Sinapi Brunf. Sinapi sat. luteum Trago: Sinapi alterum Matthioli, Lac. Cæalp. Sinapi primum Cast. Sinapi hortense Fuchsi: Dodon. Gall. & eidem in folio. Sinapi 2. sativum: Sinapi sativum Lugdun. Sinapi Glu. luteum Lonic. Si Frater non tradit locis citatis, Sinapi vulgare semine ruffo, nescimus ubi eius meminerit aut quale intelligat, Brunfelsius sanè de vulgari scripsit: Tragus nescit eius in descriptione, nomine seminis pulli seu sativi, non item cum in titulo iconis posuit, Sinapi luteum sativum Cæler senff, titulus enim hic & icon sunt Sinapi albo semine. Lobelii Sinapi agreste Apii folio descriptum in Aduers. an huic iungendum nescimus, nisi dicamus eum intelligere vulgare Sinapi non cultum: figura quam Lob. eo titulo posuit est Sinapi semine albo. Vulgare autem Sinapi semine albo reperiri non existimamus, quod semine est albo, flavo ve diversa est species à ruffo, non colore tantum, verum etiam figura. Sinapi luteum Tragi cum vulgari non confundendum. Matthioli figura posita pro Sinapi 2. non convenit cum vulgari: Cæalpini primum est vulgare: Lacuna per suum Sinapi 2. non intelligit vulgare, nec descriptione, nec figura. Fuchsius non tradit Sinapi vulgare: Dodonæo in hist. Gall. Sinapi hortense est album, diversum à vulgari, in hist. Latina Sinapi vulgare dicitur ei secundum, sed figura non convenit. Lugdun. hist. sativum Sinapi est album. Loniceri sylv. luteum non est vulgare, nec descriptio nec figura conveniunt, Lonicerus suo more omnia confundit. Figuram Sinapi vulgari convenientem apud nullum Matthiolum, nec per C. Bauhinum auctum, nec in ceteris editionibus video.

Considerent Lectores an Gerard. lib. 2. c. 9. per Sinapi silv. wilde Mostard intelligat Sinapi vulgare: quamvis icon non respondeat, quam Tabern. posuerat pro Erucæ palustri mitioni, quæ alioqui partim convenit cum Sinapi.

Hoc Sinapi observari Geneva, florentis Maiæ & Iunio, Augusto, Monspelii, Lugduni, Basilee, & aliis locis. Montbelgardi semine maturo Iulio, proveniens etiam in Horto II. E. C. ac alibi non satum sed ex semine variis locis ex impro-

Geri

Sinapi hor-
tense.
folio Erucæ. floribus luteis, siliquis in latera incli-
natis, seminibus ex flauo candicantibus maiuscu-
lis, vulgò Rucum vocant.

Lonicer. Sinapi. Gelber Garten senff. Item
Weiß garten senff/oder Zame Kanthen: Euzo-
mos. Lat. Eruca. Confundit Lonicerus suo more
Sinapi album cum Eruca: ac Sinapi albi duas pro-
ponit figuras ignorans quid scribat.

Dodon. Gall. Sinapi hortense. Sinapi album,
sinapi hortenfe. In Officiis Belgicis Eruca. Gall. Sene-
ne blanc, Germ. Weißer senff/Belg. Wit Mostaert.
Item hist. in fol. Sinapi satium prius in descrip-
tione, in figura Sinapi Satium alterum, Sinapi
satiui semē quod luteum & maius Belgii Officiis
pro Erucæ semine exponunt: vulgò tamen Wit
mostaert sāt nominatur. Melius Dod. in hist. Gall.
posuit iconem, quā in Latina, vbi pro hoc Sina-
pi ponit figuram demonstrantem potius Erucam,
& ea Icon quæ huic Sinapi conueniebat ma-
lè ponitur pro Sinapi satiuo altero.

C. Bauh. Phyt. Eruca 7. Sinapi rapi folio, luteo
semine, fortè Diosc. & Theophr. alterum Plinii:
Sinapi primum Matthioli lib. 2. cap. 143. Sinapi sa-
tium Erucæ aut Rapi folio Lobel. Obs. p. 100. &
Icon. p. 202. Item apud Matth. Sinapi Rapi folio,
luteo semine, & Sinapi alterum Plinii. Sinapi 1.
Matth. Lacun. Cæsalp. Sinapi Matth. in Ic. Gesn.
hort. Cast. Sinapi 2. species Dodon. Gal. Sinapi sa-
tiuū. 1. fol. Sinapi hortense luteum Lonic. Sinapi
hortense Cordo in Diosc. Lugd. Sinapi satium
Erucæ aut Rapi folio Lob. *Dioscorides dicit Sinapi*
eligendum valdè rufum, is ergo album vel luteum
non intelligit: cur hoc potius sit Theophrasti non
videmus: nec etiam cur Plinius alterum Rapii
fronde, id enim magis conuenit vulgari: Cur
Matthioli primum dicatur non animaduertimus,
quod Matthiolus tradit primo loco non dicitur
semine luteo vel albo: figura etiam posita pro Si-
napi primo potius Erucam demonstrat. Nostrium
verò album in descriptione est tertium, & inter
figuras Sinapi. 1. Lacunæ quoque non est pri-
imum: pro eo enim posuit figuram Erucam refe-
rentem, descriptione autem quid tradat nescio,
puto eum confundere Sinapi cum Eruca. Sinapi
verò semine luteo vel albo proponitur à Lacuna
pro secundo. Cæsalpino non est primum sed ter-
tium semine ex flauo candicante, eius enim pri-
imum est nostrum vulgare. Apud Gesnerum non
primum putat, sed illud Sinapi quod candicat.
Dodonæo in hist. Gal. non est secundum sed pri-
imum. In hist. Lat. Quidem est primum quoad
descriptionem: quoad figuram verò alterum. Icon
quæ posita pro primo, potius Erucam refert, quā
Sinapi nostrum luteum siue album. Loniceri
luteum esse concedimus. Cordum per Sinapi
existimamus intelligere vulgare, non hoc de quo
hic agimus. Lugdunensium Sinapi hortense est
semine rufo nigrescente: ergo non huic conuenit
descriptio, nec etiam figura quæ Erucam imita-
tur. Sinapi verò nostrum album exhibet pro Si-
napi satiuo semine. Quod Lobelius ponit in Obs.
pro Sinapi satiuo, non potest esse hoc, id constat
ex Adu. p. 67. & 68. vbi describit vulgare: figura
etiam à Lobelio posita non conuenit, quæ prius
Erucæ similis.

Gerard. Sinapi satium Garden Mustard.
Malè pro Sinapi albo ponit iconem Barbarex
maris Tabern.

Sinapi album siliquā hirsutā habebam Gene-
æ in horto semine maturo Iulio, hoc etiam colo
Montbelgardii in horto Ill. E. C. VVitz. vbi ex se-
mine deciduo iterum vixit Augusto. Semine
Tom. II.

ruffo semel tantum obseruavi, nempe Anno
1600. in horto prædicto, vnde nactus fuero non
recordor.

SINAPI ERYSIMO TRAGI COGNATVM siue simile.

Cvitalis est planta, radice nixa, crassiusculā
candida, paucis fibris donata. Cauliculus sur-
git pedales, cubitales, altiores, teretes, cana &
mollicella lanugine pubescentes, in ramos lon-
gos diuaticatos: Folia inferna Erysimi Tragi, pro-
fundis laciniis diuisa: superna angustiora, ligitz
minoria instar
alata, paucis
aut nullis laci-
niis dissecta.
Per cauliculo-
rum extrema
ex pediculis
flores prodeunt
lutei quadri-
folii, Erysimi
prædicti flori-
bus maiores.
Quibus siliquæ
etiam longio-
res succedunt
triantales serē,
angustæ, tere-
tes, caulibus
non appressæ:
semē conti-
nentes exi-
guum, fuscum,
acre.



In Austria secus vias obseruata & lecta à D. A-
geno Botanico egregio & medico insigni Ar-
gentinæ.

Matth. Sinapi 1. Idem in com. cum magnis fig.
& editione vltima cum addit. C. Bauhini. In hist.
Germ. wilder senff. Sinapi silu. Mihi non bene
constat quam plantam exprimat Matth. iconē
proposita, pro Sinapi tertio: quia eius tertium
in com. quoad descriptionem atinet, est no-
strum Sinapi semine luteo siue albo.

An Lobel. & Pena Aduers. Sinapi silu. minus I-
rionis veri folio aut Bursæ pastoris, aridis locis
iuxta margines & rudera, prope vrbes nascitur,
foliis laciniosis, admodum Bursæ pastoris simili-
bus, sed acutioribus, minorioribusque laciniis.
Vmbellofi flores & siliquæ secundum summita-
tes Irionis Dioscor. caulibus pedalis, sed tota planta
gustu Sinapi feruidissima.

An Lobel. Obs. & Icon. Pl. Teut. 244. Sinapi
siluestre minus Bursæ pastoris folio, Hisp. Mosta-
za saluage. Aduers. pag. 68. Lobelus assumpsit fi-
guram Matthioli.

C. Bauh. phyt. Eruca 9. Sinapi bursæ folio, Eru-
ca siue Rucula marina minor, & Sinapi 9. Tra-
go p. 103. lib. 1. cap. 32. Sinapi silu. minus Bursæ pa-
storis folio, Lob. Obs. p. 101. & Icon. p. 203. Luteo
& albo flore est. Item Erysimum 2. siue siliqua E-
rucæ? *Cui Erucam Tragi hic ponat nescio, ea enim*
eadem est cum sua Eruca 3. siue luteo flore, quæ
non respondet Lobelii Sinapi, vnde colligit luteo
& albo flore.

Hist. Lugd. Sinapi silu. Sinapi tertium Matthio-
li erraticum quod Lob. & Pena appellant Sinapi
siluestre minus Bursæ pastoris folio.

Dodon. in fol. Sinapi siluestre. Figura est Mat-
thioli, an respondeat eius descriptioni nescio.

See

Descriptio

Locus

HISTORIAE PLANTARVM.

Tabern. hist. & Icon. wegsenff. 2. Erysimon 2.
Gerard. Angl. Erucæ sativæ nomine proponit
Iconem Tabern. sed malè.

SINAPI SYLVESTRE MONSPESSVLANUM lato folio, flosculo luteo minimo, siliqua longissima

Descriptio Per huius caules sesquicubitales, non nihil stris-
tos, teretes serè, & solidos, folia conspiciun-
tur Dens Leonis foliis respondentia tum ma-
gnitudine tum laciniatâ diuisurâ, glabra aut nul-
liscentè effatu digitis pilis donata, odore & sapo-
re acutè prædita: flores lutei, parui: siliquæ dein o-

riuntur densis-
simæ & longis-
simæ, admo-
dum acri semine
refectæ.

An Cæsalp. I-
rionis species
altera amplior.

Hanc eandem
plantam aut sal-
tem valdè simi-
lem attulit mihi
Fratres ex horto
Patauino no-
mine Erysimi.
Floret & sili-
quas fert circa
Monspelium
mense Martio
locis siccis.

Locus &
Tempus.



SINAPI MONSPESSVLANVM SILIQUA asperâ hirsutâ.

Statim è ra. Descriptio

Sauce lignosa
folia exerunt ste-
quentia, similia
serè Erucæ mi-
noris foliis, æ-
cria: interque
hæc caules ali-
quot palmares
aut etiam cubi-
tales, in ramu-
los aliquot di-
uisi: floribus Si-
napcos luteis,
paruis, deciden-
tibus siliqua
succedunt, cre-
bræ, vnciam lō-
gæ, teretes, as-
peræ, aliquæ
secundum cau-
les ramisve as-



cendentes, alix longè ab iis abscedentes & velu-
ti rectâ foras protenit, semen claudentes minutis-
simum, saturatè rufum.

C. Bauh. Phyt. Erucæ 13. siue Sinapi paruum si-
liqua aspera Fratr. lo. Bauhini.

Mense Autumno inueni inter Monspelium
& Montem Isperon: nos paruum obseruauimus,
magnum obseruauit Gener Cherlerus in vdis
sossulis inter Monspelium & Thermas Bellelu-
canas.

Locus &
Tempus.

SINAPI GENEVENSE SYLVESTRE

Descriptio



Ita appello
spontanæum
quoddam Sina-
pi Genevæ d
me obseruatū,
cui ex radice
simplici alba,
lignescente,
multi statim e-
xonuntur cau-
les propter ter-
ram nonnihil
hirsuti, ramosi:
per quos folia
Erucæ similia,
diuisurâ non
minis frequen-
ti dissecta, ve-
rùm latitudine
Monspeessulano
maiori ceden-
tia, diuisurâ e-


tiam diuersa: licet flores Monspeessulani floribus
sint maiores: siliquæ ex pediculo mediocriter
longo graciles, tres vncias longæ, semen bipaten-
tibus valuis claudunt tenuissimum rufum.

Idem fortè est quod vidi apud Dominum Ia-
cobum Zvingerum in horto flore luteo, foliis
tamen multò maioribus, culturâ fortè id cau-
sante.

SINAPI ECHINATVM

Descriptio

Segetibus
circa Mons-
pelium fami-
liare est Sinapi
Echinatum, cui
caulis sesqui-
cubitalis, teres
asper & pilis
rubris hirsu-
tus, cuius alix
concauus: folia
ad Cichoreæ
sylvestris folia
accedunt, siue
Hedypnoidis,
vel Hietacit,
interdum eiu-
dem magnitu-
dinis, alias ma-
iora: flores per
ramos copiosi,
Erucæ floribus



similes, lutei, è quatuor foliolis compositi: quos
excipiunt siliqua brevissimæ, orientem pollicis vix
æquantes, sed crassæ, & quatuor costis cristatis,
in medio lacuna donatis pinnatæ, semen continen-
tes. Hæc herba acrimoniâ non caret.

C. Bauh. Erucæ 15. siue echinata siliqua.

Hist. Lugd. Sinapi echinatum.

An Cæsalp. Sylvestris Rapa, de qua scribit
spontè in aruis nascitur: radice non crassa, nec
rotunda.

rotunda, sed tenui, & longa, vt Raphani syluestris: foliis Rapæ minoribus, hirsutionibus, similiter angulosis: caule breui, ramoso: floribus aureis, capitulis Fabæ magnitudine, angulosis: intus osseum quid continetur: vnico semine ob siliquæ breuitatem. Mihi omnia videntur conuenire cum Sinapi Echinato, quamuis Frater ex silu. Czfalp. Rapa faciat Matth. Rapum silu. verum descriptio capitulorum sem. Czfalp. non conuenit cum siliquis egregiè à Matthiolo pictis.

Floret in segetibus circa Mohsßessulum, mense Martio, Aprili & Septembri.

ERVCA MAIOR SATIVA ANNVA
flore albo striato.

CAP. X.

Descriptio **A**lba, lignosa, tenui radice est donata, sapore acri: caule subhirsuti cubitales & sesquicubitales: folia Sinapi albi, minora, tenera, glabra, eiusdem cum radice saporis: flores quadrifoli, & cæruleo albidi, strobis nigricantibus picti, quales Sinapi albo agresti Trago, ex calycibus hirsutus, siliqua ex breuib. pediculis glabræ, quales in Sinapi siliquæ glabræ, sed longiores à lateribus se apertientes: per membranam distinctæ, cui adherent multa semina flaua, maiora quàm Sinapi iam dicto, minùs etiã rotunda.



Theophr. Erucæ meminit satiuæ inter olera, cui tribuit radicem lignosam.

Dioscorides Erucæ [ita enim Erucæ græcè vocatur] domesticum non describit.

Plinius de Eruca inquit, tantam inesse in contulendis obsoniis suscitatem, vt Græci iocundè appellauerint.

Cord. Hist. Erucula

maior, cuius commoda descriptio. Gesnerus addidit figuram ex Trago. Trag. Eruca siue Rucula marina maior, *Grasbruden*, Sinapi 8. Fuchsius huius figuram habet pro Sinapi altero genere, cuius etiã descriptio non malè quadrat: vocat Germanicè *weissen garten senff*, ait etiã eo loco perperam eos agere qui altero genere Sinapi pro Eruca vtuntur. Considerent autem Lectores an ritè distinguat Erucam à Sinapi. In enim cap. 100. huius iconem iterum habet nomine Erucæ silu. & *wilder weisser, senff* vt etiã in Iconum libro. Bius tamen descriptio Erucæ silu. nullo modo conuenit.

Apollin. *Weiss senff*. Pro eo pingere videtur Erucam satiuam, an eam intelligat nescio. Anguill. Eruca Dioscoridi Iberiæ dicta syluestris.

Matthiol. in Dioscorid. pingit titulo Erucæ satiuæ, cuius in com. Ital. post. aliam habet figuram, ac eadem tradit. Idem rursus eandem Tom. II.

habet figuram sub titulo Sinapi primi: quod in textu vocat Sinapi satiuum tertium. In post. quoque tom. Italicis cap. 142. eandem retinet figuram quam olim habebat pro Sinapi primo, ac addit Sinapi tertium vocant Erucam. Item in hist. Germ. *Weisser garten senff* oder *Rauden*. Eruca satiuæ. Idem etiã Erucæ figuram habet hoc titulo *Gelber aut Roter Senff* Sinapi. *Matthiolus* mirè confunde historiam Sinapi albi cum Eruca maiore, vt & aliorum Sinapi generum cum Erucis, vt nullus se ex eo extricare possit.

Si apud Matth. in Epir. & addit. Camer. semen minus pingeretur, & nihil hirsuti in siliqua, figura benè placeret: præterea figura posita pro Sinapi. Erucam melius refert quàm Sinapi. Glossator & Patrocinator Matthioli pro Sinapi primo Matthioli figuram ponunt accedentem ad Erucam, sed non conuenit siliqua hirsuta apposita, neque Sinapi neque Erucæ.

Lonic. *Weiss wilder Senff* oder *Wilde Rane* den. Sinapi silu. album, siue Eruca syluestris. *Stirpium* imperitus Lonicerus Erucam à Sinapi non nouit distinguere.

Dodon. Gall. Sinapi silu. *Senne sauvage*. Item alibi Eruca Romana, *Roquette Romaine*, *Boomsche Ralsten*. Lat. in fol. Erucæ satiuæ, strobis tubul. *Non existimo* Dodonæo notam Erucam satiuam, quia eius figuram posuit in hist. Gall. pro Sinapi silu. licet non respondeat descriptioni eius Sinapi silu. Erucam Romanam non absolute describit, nec figuram apponit. In hist. Lat. Laudabilem figuram habet: sed non benè tribuit flores luteos: Præterea p. 694. pro Sinapi satiuo priorè figuram habet multum accedentem ad Erucam satiuam flore albo, quæ non responderet descriptioni quam ibi ponit Sinapi satiuo prioris.

Lacun. Eruca satiuæ, flores lutei. *Quamuis* Lacuna ponat figuram Erucæ, existimo nihilominus ei incognitam, quia tribuit flores luteos: præterea similem ferè figuram ponit pro Sinapi primo: in descriptione dicit Sinapi habere flores albicantes cum forma crucis, quæ Erucæ videtur competere: vt verum fatear, puto illum confundere Erucam cum Sinapi.

Gesnero passim Eruca, Eruca flore albo, Eruca hortensis.

Dorsth. Eruca satiuæ ferè similis vero Sinapi Camer. hort. Eruca maior.

Brunfels. & Czfalp. Eruca.

Lobel. & Pena Adu. Erucæ satiuæ duplicis meminunt, quæque illis Erucæ nostras dicitur vulgaris notissima, eam cum Hispanica comparant, tanquam ex qua hæc facillimè percipiatur. Lob. Obs. Eruca satiuæ; Erysimum Gesneri. *Miror*. si nota fuerit vulgaris cur non demonstrat discriminem in colore strobis insignit: tribuunt enim Hispanicæ colorem luteum: nec video cur in Obs. posita huius Erucæ figura ex Matthiolo desumpta sub titulo Sinapi satiuæ Erucæ aut Rapi folio. Adu. pag. 67. Hisp. Mostaza. Figura posita pro Eruca satiuæ demonstrat nostram vulgarem: apud Gesnerum per Erysimum, intelligo Erucam perennem flore luteo culcam. Plant. Icon. satiuæ Lob. 101. Tent. 242. Apud Plantinum p. 102. est etiã alia figura ex Matthiolo malè posita pro Sinapi satiuo Erucæ aut Rapi folio Lobel. 100. Tent. 241.

Hist. Lugd. Eruca satiuæ. Similem figuram Erucæ habet Hist. Lugd. sub titulo Sinapi Hortensis, quæ non respondet descriptioni.

Nec placeat Gerardum iconem alterius plantæ assumere ex Tabern. pro Eruca satiuæ.

C. Bauh. phyt. Eruca 1. Eruca latifolia alba latina Diof. Idem apud Matth. Eruca Cordo Diof. Cor. Caxalpino Eruca. Cordus olim apud Diof. per Erucam intelligere videbatur Sinapi album, quemadmodum etiam vult ibidem Gesnerus.

Nomina
linguarum.

Erucæ Græcis: Eruca Romanis: Aegyptiis Echreice: Afis Afuris nominatur: Arab. Iergir, Ergir, Iergir, Germ. Kaüden, Belg. Roefet/ Roefete, Gall. Roquette, Ital. Rucifera & Rucula: Hisp. Oruga & Aruga. Hæc autem nostras Germ. Groß Kaüden: Trago weiß senff, Belg. Koo- mische Roefeten/ Angl. Great Roefet. Boh. By- lir horcice.

Erucæ dictum volunt, quoddam iura commen- det, habeatque peculiarem in eis gratiam: quod dixit Plinius, in condiendis obsoniis tanta est Erucæ suauitas, ut Græci *Erucæ* appellauerint: Erucam verò, quod erodat: nam si degustaueris, os & linguam satis acriter vellicabit: Alii sic appellatam putant, quod vrendi licentiam nanci- scatur, quasi dicas Vrucam, u. in e. versâ litera. Est etiam Eruca apud Latinos bestiola, quæ Græcis Campe dicitur. Weiß senff vocant nostri (ait Cornar. quasi dicas Sinapi album; ed quoddam silu. maximè Erucæ semine, Hispani pro Sinapi vtan- tur. Quibus emconis Poëtæ hanc adornarint, in- frâ de viribus patebit. Theophr. meminit Erucam satiuam celerimè provenire, Columella:

Itemque Eruca salax facundo provenit horro.

Plinius Estate & Hyeme facillimè nasci, frigo- rum præcipuè contempricem esse.

Frigorem
contem-
prie
Locus &
tempus.

Erucam maiorem satiuam vidit Monspessuli, Lugduni, Basileæ, & Genevæ in hortis floren- tem Nouembri, & tota hyeme virentem. Mont- belgardi in horto E.C. ubi à me sata ex semine de- ciduo se renouat. Veronæ, florentem Martio ob- seruavi. Nemaufis studiosè colit à quibusdam ob- seruauit Gener I. Henr. Cheslerus, qui memores (ut illimet referunt) versus illius:

Excitat ad Venerem, tardus Eruca maritos.

Vires.

Cruda Eruca, ut scribit Diof. coitum largiore tibo concitat: ac ipsius quoque semen eiusdem est effectus. Urinas mouet, concoctionem iuuat, aluôque est accommodata. Semine in condi-endis obsoniis vtuntur: quod uti diutius perennet, aceto lacteue subactum in pastillos digerunt, at- que ita reponunt. Erucæ facultatem & vsum me- dicum, Plinius explicat his verbis. Diversa est quàm Lactuca naturæ, conciliatrix Veneris: id- circò iungitur illi serè in cibis, ut nimio frigori par feruor immixtus temperamentum æquet. Et alio in loco. Erucæ semen Scorpionum venenis & muris aranei medetur. Bestiolas omnes inna- scentes corpori atcet, Vicia cutis in facie cum mel- le illitum: lentigines ex aceto. Cicatrices nigras reducit ad candorem cum felle bubulo. Aunt verbera subituri potum in cibo, duritiam quan- dam contra sensum inducere. Putant subtrita E- rucâ si fricentur oculi, claritatem restitui. Tussim infantum sedari. Radix eius in aqua decocta fracta ossa extrahit: Tria folia siluestris Erucæ si- nistra manu decerpta, & tuta in aqua mulsâ si bi- bantur, regio morbo medentur. Galenus quo- que scribit hoc olus manifestissimè calefacere: quare solum ipsum mandere, nisi Lactucæ foliis misceatur, non esse facili. Semen autem genera- re, & coquendi appetentiam excitare. Capiti etiam dolorem inferre, præsertim si quis ipso solo vel- catur. Non solum autem supradictorum autho- rum, sed Poetarum etiam testimonio Eruca sti- mulandæ Veneri nata videtur. Martialis.

Et Venerem venorans Eruca motu alit:

Columella:

*Es qua frugifero seritur vicina Priapo,
Excites ut Veneri cardos Eruca maritos.*

Salacem Ouidius nominauit:

Nec minus Erucam inbeco vitare salaces

Item Laur. Lyppius 2.

Denorat Erucam, qui cupit esse salax.

Folius, ut author est Matthiolus, coctis, additòque Saccharo, tussientibus pueris propinatur iuscu- lum, quod tussim sedat, semen contusum ex vino potum, lumbricos interimit, tumentem lienem minuit. Folia contusa palpebris imposita, visum acunt: semen cum melle mistum, maculas om- nes & natus faciei illitu tollit, efficacius verò ad- dito felle vaccino aut bouino. Ossium fragmen- ta extrahit radix in aqua decocta & imposita. E- go præfero folia radici quicquid scribat Matthio- lus. Sunt qui pro certo, inquit Camerarius, asse- rant multos se annos ab apoplexia & eiusmodi affe-ctibus immunes præstitisse puluere ex Erucæ & Cymini paribus æqualibus.

ERVCA ROMANA SEV GENTILIS SILI- quâ angustâ, folio lato.

Norimberga à Domino Doldio pro Eruca Romana seu gentili quorundam accepi her- bam nostrâ E-



ruce, flore albò similem, foliis latis, caulibus hirsutis, siliqua diuersæ admo- dom, tunc enim tenues valdè & longæ, flores in sicca albescant. De ea scribit Doldius: Est & Eruca alia ab Anglicana in horto Camerarii, latiore folio rugosiorque, Verbenæ supi- næ quoad infe- riora similior, sed floribus al- bis, annua, quam Roma-

nâ vocant, an sit dubito: facerem hanc eandem cum Hispanica Lobelii si siliquæ non impedi- rent.

ERVCA SATIVA HISPANICA MAIOR flore luteo.

Satiuz dux cibus gratiores & nobiliores: Ma- ior Hispanica vocata, à nostrati maioribus fo- lis Silymbrii & semine nigro, floribus luteis, corniculo Sinapi maiore distat: hæc quia in con- dimentis lauior, vel ad Venerem vegetior erat, Gentilis vulgò vocata fuit: quo vocabulo Hispanica & Itala gens designat quamlibet rem aptam reddere hominem lætum. Monachi in Magalonæ insula maris Narbonensis, huius Gentilis Erucæ semine à Fratre quodam Hispano donati, quot- annis hocce ferebant & in mensis cuiuslibet vel maximo gulæ iustamento vel blandimento præ- fecto.

Descriptio

ferabant. Non eget vtriusq; fustoris descriptionis, quum vulgaris sit notissima, & ex illa facillime percipiat Hispanica, Lobelius.

Lobel. & Pena Adn. Eruca maior siue Hispanica & Gentilis. Miror non demonstrari discrimen in signis in floribus: qui vulgari non lutei, seminum etiam color diuersus: eandem hanc facerem Erucam cum Romana descripta si siliquae non impedirent: Monspelienses Monachi hanc non habebant in hortis, quod animaduertent: sed vulgarem praecedentem flore albo striato.

Magalonæ in monasterio nostro tempore, inquit Lobelius, supererat copiosissima Eruca.

ERVCA ANGLICA FOLIIS LATIS, FLO- ribus minutis luteis siliquis strictis.

Eruca Anglica foliis latis, similibus Verbena-
ez vulgò dictæ, sed latius virentibus: floribus
minutis luteis & paruum relinquentibus post se
semen in strictissimis siliquis, Camerarius.

Camer. hort. Eruca tertia Anglica.

C. Bauh. phyt. Eruca 2. siue latifolia Anglica.

ERVCA TENNIFOLIA PERENNIS flore luteo.

Descriptio



Sylvestris E-
ruca radice
alba, crassa, sa-
tis longa, ex
qua multi pro-
deunt caules,
crebris alis, cō-
caui, striati, pa-
rum hirsuti: fo-
lia crebris inci-
suris Dentis
Leonis, aut ar-
gutioribus hier-
racii minoris
diuisa, aliàs Na-
sturtii, cuius et-
iam folia colo-
re atroviuente
& glabro imi-
tantur, sapore
seruido Sativæ:
eius & flores,

sed colore præditi luteo, serie simili dispositos gerit odoratos: siliquis succedentibus longis, angulosis.

Icon nostra quæ ex Fuchio, in quibusdam non placet: & multò minus Lobelii & Camerarii Erucæ sylvestris quæ videtur potius convenire cum Eruca nostra inodora.

Diosc. *ἡ ἔρκα ἀγρία* [Eruca silu.] nominat, dicitque maximè in Iberia, quæ Occidentem spectet, nasci. Sed de silu. Eruca tam ex Diosc. quam ex Plinio vide plura inter vires.

Fuch. Hist. Eruca hortensis seu sativa: In Iconibus vocat etiam Erucam sativam Camer. weiff. senff.

Dodon. Eruca sativa & hortensis, Belgicè Wilde Ruckere. Lat. in fol. Eruca silu. Eruca siue Rucula marina minor, Klein raucken. Sinapi nonum.

Matth. (qui figuram solam sine descriptione proponit) Camer. in eiusdem Epit. Lob. & Penz Adn. Obs. Ic. Plant. Teut. p. 144. & Lacunæ, Eruca sylvestris.

Anguill. Eruca in Italia Rucola & Ruchetta.

Gesner. hort. Eruca flore luteo, Erysimon hortense puto. Sylvestris Eruca ab hoc Erysimone genere differre non videtur, Eruca sylvestris Carolus Stephano. Item in cat. plant. Erysimum, apud Italos Nobilis Eruca: *ἡ ἔρκα* Eruca generatua.

Hist. Lugd. Eruca silu. Et alibi Erysimum verum. Lugd. Hist. duas figuras vnius herbari mihi videtur habere, prior est ex Matthiolo sine descriptione, altera est noua.

Casalp. Eruca altera fruticosa.

Lonic. Wasser senff/Sinapi aquaticum. Figura quæ apud Lonicetum est, convenit cum Tragi Eruca, verum non nouum Lonicero sine iudicio de plantis scribere.

Tabern. Icon. & hist. Eruca silu. Wilde Raus Tabern. senff/Wilder Weiff. senff. Si Compilator intellexit vulgò dictam Erucam sylu. ut omnia indicare videntur, indistinctè dicitur prior valdè simile nulla facta coloris mentione, in primo enim dixit coloris esse albi, vulgaris autem est lutei: figura præterea non placet, quæ potius convenit Erucæ nostræ inodora.

Gerard. Iconem habet Tabern. dicens, Eruca silu. flore luteo.

C. Bauh. Phyt. Eruca. 1. siue flore luteo maior sylu. an Dioscor. sylvestris: Item apud Matth. Eruca maior sylvestris Matthioli, Eruca sylu. Cur Erucam Tragi minorem siue eius Sinapi nonum ab hac separet & ponat nono loco sub Sinapi Bursa folio, nescio. Non placet eum assumpsisse figuram Tabernamontani.

Eruca tenuifolia perennis flore luteo, siue sylvestris Græcè *ἡ ἔρκα ἀγρία*, Germ. Wild senff/wilde randen/klein Raucken, Wilde Ruckere. Gall. petite Roquette & Roquette sauvage. Ital. Ruchetta gentile & Rucola saluatica. Hisp. Oruga sylu. Angl. Wilde Ruckere.

Passim provenit circa muros & in muris ac rudibus, florens Genevæ adhuc copiosè mense Novembri: Lurdunæ & Monspessuli Martio & Febuario. Basileæ in hortis Iulio & Augusto. Montbelgardi à me facta in hortulo meo, ac etiam in Horto E. C. muros occupavit, in quibus durat, & præterea semine deciduo se multiplicat, hiememque patitur, floret Iulio & Augusto.

Sylvestris Erucæ semine tradit Dioscor. Ibericæ incolæ, maximè qui Occidentem spectent, pro Sinapi vti, Esse porro, quàm sativa, ad movendam urinam efficacior, & multò acrior, quod facile crediderim, siquidem seruido magis est sapore. Sed hæc contra mentem Dioscoridis sentire videtur Matth. ut qui omnia ea, quæ de sativa, siue priore Eruca à nobis tradita sunt, efficacius præstare scripserit. Magis, inquit, exasciat, siccatur, atenuatur, aperit, incidit, extrahit, extergit, provocat, quàm sativa, valentiùs tamen. Cocta & deuorata infantium tussi medetur, addito saccharo: Proditum adhuc tria silu. Erucæ folia, sinistra manu decerpta, illicoque deuorata, auriginosos sanare, quo nolim vti remedio, quia superstitiosum & vanum existimo.

ERVCA SYLV. ANGVSTIFOLIA flore luteo.

Promit inflexis cubitalibus cauleculis flores luteos Erucæ sylvestris. Cornicula siliquarum Sinapi sunt aut Nasturtii sylvestris, ubi semen acre, vti folia angustiora, Erucæ sylvestris con-
Cccc 4

H. Lugd.

Lonic. senff.

Tabern. senff.

C. Bauh.

Nomina
linguarum.

Locus &
tempus.

Vires

Descriptio



Eruca silvestris angustifolia.

loris, sed minime drusa, Taraconis ferè patria, quæ Erucam aut Trionem sapiunt, quibus idcirco affinis natura putatur. In horto Goldembergii nostri (inquit Lobel. Obs.) non vulgaris peritæ vitæ oritur.

Lobel. Obs. & Icon. Pl. Eruca silv. angustifolia.

C. Bauhin. Phyt. Eruca 14. sine angustifolia.

Hist. Lugd.

ERVCA MINIMO FLORE Montpel.



Hanc nos Montpelii florentem circa Aestatem in quibusdam muris observamus: foliis accedit ad Erucam luteam silvestrem, quæ in nostra icone non bene in acumen desinunt: Flores sunt minimi lutei: siliquis viciis longis.

ERVCA INODORA.



Descriptio

Eruca inodora mihi dicta, longâ nititur radice, simplice, cum paucis fibris lignescente, satis gracili: caulis cubitum æquat ramosus: folia dodrantalia ferè. Erucæ luteæ silv. cultæ. quodammodò diuturnâ, quam inferiora Iacobæz penè modò latebant: flores ex luteo, pal-

lidi, quatuor foliolis constant: siliquis, viciis duas longæ graciles. Nullum ego in hac planta siue odorem siue saporem insignem animadverti.

Tabern. hist. & Icon. Eruca silv. Wild. Rauschen; wälder weißer senff. Figura Tabern. exprimit nostram Erucam inodoram, sed descriptio Tabern. & nomina cætera non conveniunt nostræ Erucæ inodoræ. Sed hoc non novum Compilatori figuras non ponere suis locis, quanquam icon etiam Lobelii & Camerarii pro Eruca silvestri posita, hanc nobis melius exprimere videtur quàm Erucam silvestrem ab iis traditam.

Erucam inodoram voco herbam à me repetitam florentem Julio in terra argillosa vicium quæ sunt vltra Rhenum ad Burckheim generosi Baronis à Schvvende, vno milliari ab urbe Brunsaco.

Erysmo similis herba S. Alberti.

Herba Sancti Alberti (inquit Casalp. c. 65. lib. 8.) vulgò appellatur quædam Irioni similis: caule striato, recto, cubitali, altiorique: foliis magis laciniatis, laevibus: siliquis luteis, in summis ramulis rectis: siliquis ferè grandiores, ac firmas in quibus semen simile prædictis: eo utuntur ad fistulas.

C. Bauh. Phyt. Erysimum 4. siue Erysmo similis, laevis, laciniata, floribus luteis, Herba S. Alberti Casalp. Casalpini descriptio videtur convenire in multis cum nostræ Erucæ inodoræ, eandem tamen asserere non aulam.

Eruca Vrbœnetana floribus albis, siliquis hirsutis.

Foliis donatur maioris Erucæ, sed hirsutis: caulibus dodrantalibus: floribus albis: siliquis Rapi similibus, hirsutis: tota planta à tertio genere Sinapis (Sinapi albo) distat solum parum, & florum albedine, Casalp.

Genus hoc Erucæ, inquit noster autor, spontè nascitur in parietibus, & rudibus, frequens in agro Vrbœnetano.

ERYSIMVM

IRIO, SIVE ERYSIMVM
Veteribus.

C. XI.

DE Erysmo [quod aliqui Chamæpion, Magd. Herculis Alphita, h. e. polentam, Egypti & rithmum, Romani Irionem vocant] Dioscorides satis clarè scribat, dicatque hoc esse solius Erucæ sylvestris: cauliculis in lori modum lequacibus, & flexilibus, floribus luteis, siliquis in cacumine corniculorum figura & gracilibus, ut Fænogracæ, quibus exigua concludantur semina, Nasturtii similia, seruidoque gustu. Attamen Plinius Erysimum, herbam iariam à Dioscor. descriptam, & inter plantas acres ab eodem recensitam, folio Erucæ silvestris, cum Irione, quam à Græcis Erysimon vocari dicit, & Theophrastus inter legumina connumerat, & Selamio similem facit, Trionemque Gaza vertit, admodum inconsideratè confundit. Irionem, inquit, inter fruges Selamio similem esse diximus & à Græcis Erysimon vocari. Galli Velarum [vetus codex Cornarii Velum habet], appellant. Et addit: Est autem fruticulosus, foliis Erucæ angustioribus paulò, semine Nasturtii.

Quæ

Quia porro, Galenus quoque & inter simpli-
cia Iriionis semen facultate seruida ac calida Na-
sturtio acrimonia & ignea facultate praedito com-
parat: & inter alimenta Iriionem corporis essentia
ferè eiusdem generis cum Sesamo esse dicit, sed
esui iucundior, minus etiam alimenti corpori
præbere, & omnino deteriore esse: Perspicuum
fit, hæc Erysimum inter se multum differre, etsi Pli-
nius ea non distinxisse, sed pro eadem planta ac-
cepisse, videatur, quamvis idem medicamentis an-
numerandum potius, quam frugibus lib. 22. con-
tendat.

Eruca silvestris angustifolia Lobelii, ut apud
Hist. Lugd. videre est, Lugdunensibus Erysimum
verum videtur, sed malè. Est & suum Erysimon
cum aliis Trago, quod Verbenam feminam vo-
cat. Hermolaus & Ruellius silvestrem illam E-
rucam, quam Nobilem vocant Itali, Erysimum
esse dixere: quorum sententiam Matthiolus im-
probat, & duo alia Erysimi genera, attamen fal-
sa, proposuit. Priori notas ferè omnes à Dio-
scoride traditas competere putat. Alterum,
cui folia sunt minora, cornicula paulò vegetiora,
magis genuinum esse censet. At Matthiolum re-
prehendunt Pena & Lobelius, quod Rapistrum
vulgè à Rapi sapore & aliqua foliorum simili-
tudo sic dictum, loco Erysimi prioris acceperit,
quod neque Dioscoridis Erysimum respondet, ne-
que cum Matthioli Erucæ silvestris foliis simili-
tudinem habet. Tū odor, & sapor rapi non aded
ut in Erysimum acris reclamant: præterea Erysimi
vires, de quibus mox dicemus. Est & Erysimum
Theophrasti quorundam, quod nos Fagotri-
cum lib. 22. describimus.

Erysimum Græcis dicitur, quod Lat. Erysimum &
Irio, German. hederich wilder senff, Belg. witte
Mossaere. Gall. Veler de la rosette, Ital. Iriome.
Hisp. Kitchaon. Hung. Besereu suu, hoc est, ama-
ra herba.

Erysimum quidem à radice ipsius, id est à multi-
plici foliorum sectione: nam Erucæ modo laci-
niata conspiciuntur. Alii ab oleris præstantia di-
ctum volunt, quasi *erisimor*, quod est pretiosum &
notabile. Nonnulli à radice ipsius, quod ob suam
caliditatem maxima trahendi facultate præditum
sit. Iriionem autem Latini ab irruendo nuncupa-
runt, quod ignea vi & seruido sapore irruat in
gustum.

Erysimum circa vrbes, domorum areas, autho-
re Diosc. hortis quoque nascitur. Erysimi semina si
cum melle delingantur, tradente eodem, contra
thoracis fluxiones, putulentas excreationes ac
tusses, morbum regium, & ischiadem, efficacia
sunt. Bibitur & semen contra venena. Ex aqua
verd aut melle illitum, prodest carcinomatis oc-
cultis, duritiis, parotidibus, ac testium mamma-
rumque inflammationibus. In summa attenuat
& calfacit. Cæterum ad eclegmata redditur mi-
tius & accommodatius, si aqua maceratum tor-
reatur, aut linteis illigatum subactaque farina
oblutum inassetur.

De Erysimi viribus Galenus sic scribit. Erysimi
semen sicut gustu Nasturtio apparet simile, ita fa-
cultate igneum est & calfaciens. Porro ubi in ec-
legmate ut ex usu est, præstat aqua maceratum
refrigerare, aut linteolo inuolutum, & cruste pi-
stonæ circumlitum torrere. Vile est cum ecleg-
mate ad promouendas crassorum lentorumque
pectoris pulmonisque humorum expunctiones.
Quin & parotidas induratas, & duritias anti-
quas vberum & testiculorum iuuat. Refert Dio-
scorides quod cum aqua & melle cataplasmati

modo illitum oculis prodest cancris. Eadem tra-
didit Plinius, & præter ea quædam alia habet. E-
rysimum vtilissimum iussientibus cum melle, &
in thoracis purulentis excreationibus. Datur &
regio morbo, & lumborum vitis, pleuriticis, cor-
minibus, coliciis. Illinitur verò parotidibus &
carcinomatibus malis. Testium ardoribus ex aqua,
aliis cum melle. Infantibus quoque vtilissimum.
Item sedis vitis & articularis morbis cum melle
& fico. Contra venena etiam efficax potum me-
detur, & suspensio item fistulis cum axungia ve-
teta, ita ne intus addatur.

ERYSIMUM TRAGI, FLOSCVLIS LY- ceis iuxta muros proueniens.

Radix minimi digiti est crassitudine, lignosa, Descrip-
alba, acris, & Rapi sapore: caulis tuberculis,
hirsutus, sesquicubitem altus, foliorum ortu al-
terno stipatus, quorum forma ad Erucas aut Bur-
sas accedit: sunt enim alie si-
nuata, hirsuta,
& Bursa foliis
non paulò ma-
iora, sapore ole-
raceo: flosculi
pusilli, luteoli,
quatuor foliis
constant: semen
in siliquis lon-
gis atque re-
ctis continetur
pusillum, serui-
dum.



Cordo in
Diosc. ipsius & Erysimum
Irio: Germanis
schnödsenff, a-
lias schistsenff/
scienff. & im-
petius, Irio, qui
à Dioscoride

hoc loco describitur & femina Verbenæ etiam,
verum, & ait, magno errore. Nam Irio. Sinapi co-
gnata est herba.

Tragus Germ. Eisenkraut daß weiblin/das
Sibent senffkraut. Ei quidem non placet nomen
Eisenkraut, existimat enim esse Dioscor. & Seta-
pionis Erysimon aut Iriionem. Quare conside-
randum proponit, an non Irioni melius conue-
niat quàm Verbenæ lupina.

Fuchsius præsentem hanc nostram plantam
exhibet titulo Verbenæ rectæ siue Matris, quam
in contextu alio nomine Cristam Galli vocari
scribit. Eisenkraut das mennle. Item Sinapis al-
terum genus syu. Großer wilder senff.

Dodon. Gall. Erysimon Dioscoridis & non
Theophrasti, Latine Irio, quibuldam
Lonic. Eisenkraut weiblin/numeratum inter
Sinapi genera: Lat. Verbenæ femina. Item Irio &
Erysimon.

Gesner. hort. Erysimum Tragi vel Dodonæ,
Verbenæ femina non rectè dicta à quibuldam
cū Sinapis sylvestris potius genus sit.

Brunfels. Verbenæ femina. Hierobotane se-
mina.

Matth. passim in com. Erysimon, Irio. Et hist.
Germ. Irio, s. Hederich. Fuchsiū aperte errasse
existimat, qui Verbenæ rectæ florem luteum tri-
buat: Errorem autem Fuchsi Brunfelsium forte pro-

Equiuoca
& Lycop.

Nomina
negarum

Ysa.

Verbenæ
femina
male
Sinapi et
Ysa

Verbenæ
femina
rectæ

Verbenæ
femina
rectæ

Verbenæ
femina

Fuchsius
Brunfels

Securi facile deprehendi posse putat, quod in suis comp. pl. primò editis pro Verbenacæ sœmina eam plantam depinxerit, quæ à Diosc. cæterisque antiquis Scriptoribus Erigeron siue Senecio nuncupatur, tamen si mutata sententia lib. 1. de comp. med. Verbenacam perperam Sinapi alteram speciem esse contendat. *Matthiolus* suo more proponit figuram plantæ sibi incognitæ, quam puto compositam ex duabus plantis: priora folia & flores videntur facti ad Rapistrum, hinc sit ut *Camer.* proponat pro eo iconem Fuchsiænam, quæ Rapistri flore luteo: nomen *Germ. Bederich* eam etiam plantam notat: verum siquæ non conueniunt quæ *Erysimi* Tragi videntur: interea egregius Commentator eam figuram proposuit line descriptione, in com. anni 1559. & anni 1583. quæ verò dixit in comm. Ital. cum mag. fig. & in histor. *Germ.* quadrant *Erysimi* Tragi, cuius figuram *C. Bauh.* apposit. *Matthioli*, [ea in parte multum dissidens à *Camerarii* sententia.] Non video quomodo Verbenacæ flore luteo *Brunfelsii* & Fuchsi possit esse Senecio siue Erigeron, ut vult *Matthiolus*, ego mihi persuadeo [quod ei conclusum] non intellexisse quid scriberet.

Lob. & Pena Aduers. Irio, siue *Erysimum* Dioscor. Angl. *Castor* & *Edlo*. Hi dicunt esse Iri- nem quem Medici docti notis & experimentis commendat his verbis: Dum postremò in Iri- nes commentabatur Senensis Dictator, augurabatur non defuturos canes [sic se doctores solitus nuncupat] qui se suæ imperitiæ allatarent, Utinam habuisset ille canes similes non ad latrandum, sed vestigandum *Erysimum*, quod vel Pharmacopœorum *Monspeliensium* lixæ possint illi hodie in trinitis & rudibus passim indigere: est enim ibi illoctis & indoctis ut usu frequentiss. ita multiplici & felici successu notissimum, sed in Anglia non item, quamvis non minus obuia. Nam ne Medicis quidem aut Pharmacopœis peritioribus certum sit, quænam sit Irio: hoc factum, aut quia in usum Medicum nondum fuit hic deductus, aut quia à *Matthiolo*, cuius commentaria plerisque sunt veluti Sybilæ folia, Rapistrum vulgi à sapore Rapæ, & nonnulla foliorum similitudine loco Irionis acceperunt.

Tabernacon. & histor. Erysimum, Irio 1. meg- senff/ bederich.

Gerard. Erysimum Dioscor. Lobelii, Bauhen & Lesc.

C. Bauh. phyt. Erysimum 1. siue Irio vulgatum. Item apud Matthiol. Irionis nomine Matthio- lum Rapistrum proponere, sunt qui statuunt, verum ex verbis, quæ ex secunda editione adieci- mus, colligere est eum intellexisse id quod vocamus 1. Erysimum, siue Irio, vulgatum: Irio Lacunæ, Castori, Cæsalp. [Lacunæ etiam Erucæ sal- lax.]

Erysimum Tragi obseruavi Genevæ cum flore mense Maio: *Monspeli*, *Lugduni*, *Basilæ*, *Mont- belgardi* passim & circa cancellariam in castello. in compis, sepulchretis, & ruinosis, ut *Aduers.* perhibent, locus frequens, multis Galliæ regionibus notissimum, sed in Anglia non item quamvis non minus obuium.

Lobel. & Pena, tantas attribuant ei dotes, quæ asthmaticis & sæpius pulmonum, vocique rauræ etiam diuturnæ & propè inuictæ, sunt ad præ- senti præsidio, ut idem sèrmè superent. Est enim inquit, moderata quædam tenuis substantiæ & incidentis, cum humidis abstergentibus parti- bus, permixtio, cuius beneficio crassi pituitæ ci- tæ exiccationem nimiam inciduntur, & incitæ

propter statum nonnihil commixtum non in- gno conatu expectorantur & absterguuntur: as- teriacum igitur est laudatissimum, nempe vnum & idem præparans & educens: exempla succur- runt quamplurima, quæ secundissimè tum præ- ceptionibus, tum nobis postea successerunt. *Pho- naseos* memini tum iuuenes, tum ætatis proue- ctæ, quibus sèrmè iam amissa voce & spiritu, lim- pida sonoraque vox pauculis diebus restituta fuit. Vno *Erysimi* & opera eximii præceptotis *Rondeletii*, qui primus usum monuit. *Syr. de Ery- simo efficacissimus*: cuius beneficio iuuentutis decen- tio rauce digne laborantes, percurat. 2. *Erysimi* totius recetis *M. s. Radicum Helenii*, *Tussilaginis* succo adhuc prægnantium, *glycyrrhizæ an. vnc. ii.* *Borraginis*, *Cichorii Capillosum Veneris an. M. s. s. florum cordialium*, *Anthos*, *Stoechadis* vel *Betonice an. M. s. an. s. j.* passularum mundata- rum *3 j.* incisis & contusis fiat omnium decoctio ex arte in sufficienti q. aquæ hordei, hydromelitis, & *3 j.* succi Irionis, ad lib. duas vel tres: expressio- ni dissolue Sacchari q. s. fiat Syrupus: quo diu & continuò utendum purgato corpore.

ERYSIMON ALTERVM MATTHIOLI AL- liquis parvis quibusdam Den- tana.



Lentæ cu- bitoque lo- giores tortuo- las virgas pro- fert: siliæ for- tiora quidem Irionis Tragi foliis aliquo- modò similia, profundè ad neruum usque propemodum dissecta: reli- quæ verò, quæ per ramos cre- bra, leuiter la- ciniata, vnciam plûs minus lôn- ga: ex quorum alis siliis lutei emicant quibus delapsis

succrescunt siliqua crebra, modicè in arcum cur- uata, semuncia longiores, plures ex eodem puto- cloriundæ, bifores: semen continent copiosum, perparuum, rufum: radix alba lignescit, patens fibris donata.

Pictor & Sculptor non bene imitati sunt iconem quam imitandam proposueramus.

Matth. in Diosc. Irio alter, siue *Erysimum* aliud omnibus Irionis notis præditum. In *Hist. Germ.* Irio 2. *Bederich*, qui ipsi videtur melius conuenire cum descriptione Irionis. Sed Irionem hunc, si benè notus fuisset *Matthiolo*, meo iudicio descriptisset.

Camer. ad Matth. Germ. scribit abundatè præ- pè mare Venerotum: existimasse quæ primò *An- guillaram* Iriodem esse Veterum. *Gesner. hort.* *Dentelaria* alia Irio quibusdam seu *Erysimum* pu- tata in Italia sic dicta, quod siliquulas sèrè denti- bus similes toto caule emittat. *An. Anguill. Erysi- mum* siue Irio.

Matthioli

Matthioli æquanimitas, aut Aduersaria quasi
sua imbecillitatis conscia, primo suo Irioni sub-
didit alium in postremo auctario, quem potiorē
primo putat, quia folia minora, & cornicula pau-
lō vegetiora sint, ut ex iconibus, inquit Commē-
tator, patet. Sic nos auidos discendi huius mu-
tate sententię causam aliquā, ut solitus est, in sicco
deserit. Quid hęc folia minora, & cornicula vege-
tiora agant nescimus: ut ut sit nos benignē omnia
interpretamur, nempe tantum Virum [ut con-
stantis animi opinionem, quam de se doctis viris
suis Commentariis excitauit, retineret & foueret]
noluisse quicquam demere, aut demendum esse
suspicionem dare, sed humano more & prudentiā
tacitē meliora, quæ à meliore tum suo, tum alio-
rum iudicio profecta essent, deterioribus subde-
re, quasque vniuersum opus de integro recoque-
re: Magni Ciceronis exemplo, qui se dedit reco-
quendum Moloni Rhodio oratori. *Hæc Aduers.* ex
quibus apparet nondum fuisse illis notum illud
Erysimum.

Plant. au.

Hist. Lugd. Irion altera Matthioli. An eidem
præterea Saxifraga aurea Lobelii. Cæsalp. Irionis
species tertia parua.

C. Bauh. Erysimum 3. siue plurima cornicula
iuncta habens. Apud Matth. Erysimum 2. siue plu-
rimis corniculis iunctis. Videtur H. Lugd. Saxi-
fragæ Romanæ nomine proponere.

*Locus &
Tempus*

Irionem D. Cortusio dictum vidi in horto Di.
Gesneri, qui dicebat ab Italis vocari Dentelariam.
Genevæ & Montbelgardi habui in horto: fortē
Dentelaria dicta eo modo quo Dens Leonis, à so-
lis, cui similia vel Burse pastoris, aut Cichorio
siluestri, ita enim sunt denticulata, maximē prima,
sed multo minora, Floret & semen profert Iunio
& Iulio. Frater C. Bauhinus habuit Basileæ in hor-
to patris. D. Cortusius misit mihi semen quod in
Horto E. C. latum hanc habebat inscriptionem:
Irion seu Erysimum. Gener Jo. Henr. Cherlerus
afferit crescere circa Monspelium copiosè.

DELPHINIUM MINVS CÆSALP. FLORE
albo, siliquis longissimis.

Descriptio

Cauliculo simplici constat [inquit Cæsalp. libr.
8. cap. 67.] ultra dodrantem, in quo folia vs-
que ad medium sine pediculo hærentia, non laci-
niata, ut reliquis, sed tantum in ambitu serrata,
dorso incuruo, ut Delphinium ob id dici possit,
subhirsuta: in cacumine flosculi insunt candidi,
& siliquæ longissimæ, numerosæ, rectæ, tenues: in
quibus minuta semina: oritur in asperis, sed ta-
men riguis. Idem lib. 6. in fine c. 69. Parua plan-
ta, foliis Delphini effigie, curuo dorso. Fortē mi-
nus Delphinium inter affines Irioni descriptum.

ERVCA PURPUREA, ALIIS CERVLEA,
siue viola Petrea.

Descriptio

Radice nititur Eruca cærulea mihi dicta recta,
palmaris, alba vel subrubra, tenui, subacri, fi-
bris aliquot capillata, matrice lignosa: folia per
terram spargit plurima oblonga, hirsuta, Burse
pastoris diuisurâ profundâ, crebrâ, sapore olera-
ceo quodammodo, colore viridi, aliquando in-
ferna parte rubente: caules modò singularis, mo-
do terni, quaterni, seni & plures, pal-
marum nonnunquam superantes, interdum
capitales, hirsuti, striati, propter humum

purpurantes; supernè virentes; concavi,
brachiati: in quibus ex interuallis folia, infimis a-



lis breviora, la-
titudine iis
parum ceden-
tia nec tam al-
tè ut pluri-
mum laciniata:
flores ex ramo-
rum lateribus
& summo fa-
stigio alterno
situmuli infi-
dent pedicu-
lis semunciali-
bus tenuibus.
tantillâ lapi-
gine oblitis,
odorati suavi-
ter, cærulei aut
purpurei, vel
purpuroviola-
cei, albive, su-
uolentes, qua-
ternis foliolis
latiusculis con-

stâtes, staminula lutea cū stilo continentes: quib-
decidentib. suboriuntur siliquæ oblongæ, glabræ,
in quibus semen minutum, acre. Variat hæc ætatis
ratione, nec non loci, prout lato solo surgit, vel
squallido & sabuloso nascitur, ac sæpè iisdem
in muris modò maior modò minor, foliis valdè
variis. A plurimis annis hanc plantam Erucam
denominauimus purpuream, propter aliquam si-
militudinem foliorum cum Eruca, & quia in mu-
ris primò inueheramus. Inter plantas siccas Do-
mini Agerii comperi dici Violam Petream Dom. *Viola p.*
Hardero.

C. Bauh. Phyt. Eruca 6. siue palustris cærulea *Locus &
maior & minor. Apud Matth. Eruca tertia siue
cærulea.*

Obseruavi hanc Erucam verno tempore, ut
Martio, florentem in muris circa templum & Ca-
stellum Bessfordiense, item Bilanti in muris. Ite-
rum circa S. Susannam pagum Ill. mei Principis circa
rupes. Septembri florentem vidi Bessfordiæ, &
Clarevallis muris: In *istis* abundat in Vineis;
in Sancti Hippoliti oppidi muris. Frater C. Bau-
hinus misit repertam Basileæ propè S. Iacobum
atque Mûnchstein. Vidi etiam flore rubescente
& albo.

VELLA ERVCE FOLIIS FLORE
violaceo.

Ignota hodie Vella, quæ in lib. simpl. med. ad
Paterniacum Galeno attributo sequentibus *Viola*
describitur: Vella herba est foliis quidem minor,
quàm Eruca, sed non dissimilis, flore violaceo: se-
men habet velut in folliculis oblongis, ordinis sti-
pati, prout Nasturtii: & gustu calefactoria est,
submordens, & viribus relaxans, vnde ad cussena
veterem, & ad regium morbum cum melle opti-
mè facit. Ex his autem manifestum sit hanc nec
Plinii Gallorum Velarum (aut Velam, ut vetus
Cornarii codex habet) quod Irionem inter fru-
ges & quidem Sesamæ, similem esse, ac à Græcis
Erysimon vocari dixit, esse posse. Nec (quod
Nasturtium aquaticum Anguil. vult,) Sisymbrium
secundum à Fuchio pictum. Vella siquidem flos

*Sisymbrium
cardamines
species qua-
dam in sy-
ria.*

se violaceo esse dicitur. Irio autem flore luteo, ut & Nasturtium aquaticum albo. Nec, quam Vella Galeni Guilandino aliquando nomine exhibuit nobis Frater C. Bauhinus. Hæc enim nobis videtur *Sisymbrium Cardamines* species quædam insipida.

SINAPI AGRESTE FLORE PURPUREO.

Descriptio

Radice firmatur parua, tenui, fibrosa, parum sub terram descendente, albidâ, ex qua folia exeunt Chelidoni maioris incisurâ, distant quodd nec succum luteum edunt, nec casta, sed viridia, sunt, aspera hirsutie obrita, atque extremum folium non retusum, ut Chelidonium, sed acutum habent, atque minora sunt: *caulis* angulosus est atque alis foliis dividitur: *flores* edit purpureos, umbellatos, serè quatuor foliolis constructos, Chelidonio pares: *siliqua* postea alternatim, frequentèrque hærentes, rectas, quarum extremæ partes corium versus tendunt, quibus spica confici videtur siliquarum duorum digitorum, quæ cum exiccati incipiunt, flauescunt, atque vento flante, vel aliquo illas tangente, disrumpuntur ab imo, atque semina iaculantur flaua Cardaminæ modo, parua, gustu acri: sicuti etiam folia.

Fab. Col. Sinapi agreste, Sinapi alterum agreste nostras.

Casp. Bauh. phyt. Erucæ 10. siue Sinapi flore purpureo umbellato.

In valle supra eadem Diuiz Mariz vitæ, inter Rubos, Cynoramben, Leonis dentes, & Ranunculus, ontur noua hæc, & elegans planta, nec alibi orti scit, nec se in Herbariis hanc vidisse ait

Fab. Columna. Floret Martio, & Aprilis mense perficitur: nisi diligens sit cultor, huius semina non colliget.

ERVCA QVIBVSDAM SILVESTRIS REPENS flosculo purpureo luteo.

Descriptio

Sithamam vnam aut duas altos habet caules, striatos, modicè pertusos interdum rubentes: quibus folia adnascuntur Nasturtio vel Erucæ paria, consimilitèrque crebris diuisuris incisa, lauiora in inferioribus partibus, gustu oleraceo, colore atrouirente: *flores* parui lutei, quadrifolii, acri sapore: quibus succedunt *siliqua* cylindraceæ, breuiiores quàm in Erucæ, longiores quàm in Radicula sylu. Dodon. cum qua magnam habet affinitatem: *semen* continentes minutum. Radix insigniter repens, albet, sapore magis ignauo quàm Raphanus.

Fuch. Icon. Sinapi primum genus sylu. fleiner

wilder senff. In hist. Erucæ sylu. In histor. Fuchsi descriptio conuenire videtur, sed figura eo loco



posita longè diuersa à descriptione. Thal. Marc. Iberis Nasturtii folio altera floribus luteis. An Gesn. de hortis, Nasturtium aliud palustre floribus luteis Sinapi! sortè adnumerandum?

Dodon. qui Erucam siluest. vocat, eandem cum Fuchsi figuram habet.

Camer. in epit. Matth. Sinapi tertium. Ad Hist. Germ. wilder senff.

Sinapi sylvestre. Cur Glossator relicta figura Matthioli aliam proponat valde differentem nescio.

Tabern. Hist. Klein wasser Radten. Erucæ palustris minor. An Taberna intelligat Erucam nostram repentem asserere non ausim, quia Compilator non indicat cuius coloris sit flos: me etiam latet quæ sit eius maior cui tribuit flores albos.

Gerard. Iconem Tabern. ponit pro siluestri Sinapi, wilde Mustard, an bene inquirent alii.

C. Bauh. phyt. Erucæ 4. siue flore luteo minor sylu. Erucæ 5. siue palustris luteo flore: Erucæ palustris minor Tabern.

Hæc copiosè ptouenit Genevæ in plain palat. Montbelgardi ad ripam fluminis quæ itur Courcelle, & ad pontem, etiam in horto Ill. E. C. spontè, ad ipsa suo reposito hortulano. Inueni etiam prope Porentruum loco arenoso ad fontem mirabilem dictum *Crusenot*, qui velut è puteo proueniens profundo, ubi interdum parum aquæ, ita interdum fons effluens, ut torrentem magnum constituat, qui Porentruum fertur, fons visu dignus. Obseruavi Erucam hanc Basileæ, quæ itur Neuvhaus, Lugduni in prato *Belcourt*. Circa Bessfordiam copiosè florens Iulio: Erucæ syluest. Fuchsi copiosè proueniens & florens in horto Ill. E. C. Iunio 1608. prope hortum arborum peregrinarum spontè Sturgardiz.

Locus & tempus

Locus & tempus

RADICULA SYLV. SIVE palustris.

Erucæ syluestri aliquatenus similis locis non aquosis prouenienti: pro diuersitate loci multum foliis ludit, quædam enim lata & serrata tantum, caule unico, subinde rubente, modò cubitali, modò tricubitali crassiore, in ramos diuiso, maiore quàm Erucæ syluestris: foliis etiam latoribus, longioribus, quinquam nonnquam satis tenuiter dissectis, sapore Raphani, sed leuiori: *flores* lutei, minimi, multis numeris minores quàm Erucæ syluestris, *siliqua* itidem breuiiores & crassiores, teretes: *radix* interdum vnica cum suis fibris. Hæc planta affinis est Sinapi meo aquatico Patavino.

Tabern.

Rapi-
strum
aquaticumTabern.
Icon. & Hist.
Rapi-
strum a-
quaticum.C. Bauh. in
Phyt. Rapi-
strum 3. Ge-
rard. Rapi-
strum
aquaticum.Dodon. hanc
depingit & de-
scribit: ei dicitur
Raphani se-
cunda species.Radicula syl-
vestris, quibus-
dam Radicula
palustris. Gall.Raisort sauvage,
ou Raisort

d'eau, Germ.

Wilder Rätig. Belg. wilder Radice/ & wasser
radice.Locu-
TempusHanc observavi florentem Maio Genevæ: Mör-
belgardi in pago Courcelle cum flore Iulio & Au-
gusto: circa pontem Vauiaucourt, nec non in Hor-
to E.C. Aquatica est planta. Frater C. Bauhinus
vidit Basileæ in silvis. Ex semine de quo multum
se propagat.

RAPHANVS AQUATICVS

Tabern.

Raphanus
aquaticus,
wasser rätig/
Tabern. icon. &
Hist. fulem dif-
fert a Raphano
vulgari sua radi-
ce rotunda, lon-
ga, incurva, &
folius acutus pro-
fundè incisis, Ra-
phani tamen ge-
neri assignatur
propter acrem
sapore.Gerard. Ra-
phanus aquati-
cus, wasser Ra-
disch / flore lu-
teo.Consideran-
dum quæ plantahec, & an ab alio aliquo autore tradita sub alio
nomine.

ERVCA PALVSTRIS MAIOR

flore albo.

Descriptio

Radice nititur crassa, lignosa, aspera: can-
ticulis donata pluribus, magnis, rotun-
dis, mediocriter altis: quibus insident flores
multi, exigui, candidi, quatuor foliolis con-
stantes: his decidentibus succedunt siliquæ o-
blongæ, tenues: semen acris saporis includentes.
Tom. II.folia eius magna,
profundè terra-
ta, acumina-
ta.Tabern. Icon.
& Hist. Eruca
palustris maior,
Groß wasser
rätig.Gerardus per-
petam iconem
Tabern. ponit
pro Sinapi lati-
no altero.Gerardus
per.

SINAPI AQUATICVM

Pataunum.



QVod in Descriptio

aquis &
propter aquas
invenitur Sina-
pi referat, ita
indigitavimus:
folia quidem
mirum disce-
ta, divisura
Chondryllæ à
Matthiolo ex-
hibita: quæ au-
tem iuxta radi-
cem sunt, latiora
minùsque dissi-
da exsiliunt, per
segmentorum
oras serrata: re-
duces parvi serè
digiti crassitudi-
ne, sesquipalmū
longæ, teneræ,
albæ, paucis fi-bris donatæ, sapore acris & amaro, quo & folia
sunt prædita.Talem observavi Pataunii repertam ad Portam Locu-
Linianam in aqua & iuxta aquam, mense Februa-
rio: eius caules, ni multum fallor, attulit postea Fr.
C. Bauh. nomine Sisymbrii aquatici D. Cortuso
cauos, in varios ramos divisos, cubitales, crassos,
in quibus secundum diuicationes folia simpli-
cia, longa, angusta: in extremitatibus flores multi
lutei non magni, quibus videntur succedere sili-
quæ. Cum Radicula sylvestri Dodonæi aliquid
similitudinis habere videtur, potissimum quod
folia inferiora attinet, non tamen eadem est.

CAKILE QVIBVSDAM, ALIIS

eruca marina, & Raphanus
marinus.QVamvis tenuis, longa tamen satis est huius Descriptio
radix: numerosos caules proferens dodrante
p d d d



Cakile Scapularis
in folio.
Lupulifera.
Lupulifera.
Lugd.
m.

altiores folia Re-
sedē, minora,
pinguiora, gu-
sta acri, subtili-
to: flores pecu-
liatibus luteis
lateralibus insi-
dent. Erucæ aut
Brassicæ positi-
æ & forma, co-
lore purpureo:
siliqua crassius-
culæ, breues, bi-
na semina sin-
gulari conclu-
dunt.

Anguill. &
Lobel. Obs.
Cakile Sera-
pionis. Adv. &
Icon. Plant. Ca-
kile Serapio-
nis.

nis, Erucæ folio, Napi flore, vulgò Erucæ marina.


Hist. Lugd. tres figuras ynius plantæ habet.
Primæ quidem titulum fecit, Nasturtium mari-
num. Alteram inscripsit Erucam marinam.
Hanc autem Myconum ita vocasse dicit
quod sapore Erucam æmuletur, & non nisi in
maritimis nascatur: Catalanos Ritas de Mar ap-
pellare. Tertiā, Cakile Serapionis Synonymon
fecit. Et quia hanc eandem plantā, vel certē si-
milem dixit cum Erucæ marinæ Myconi, magis
mirari subit, cur frustra tam suū, quāle emptoris
impensu tot icones proposuerit.

C. Bauh. Phyt. Erucæ 16. siue marina, siliqua tri-
stis cuspidi simili. Cakile herbæ, quam olim ho-
minum Raphanum marinum, propter odorem
sapore, & acrimoniam, quamcum hoc omnes
ferē partes communem habent.

Apud mare olim effem Monspelli florentem
vidi, & siliquas ferentem mense Augusto. Ge-
neux in horto meo floruit Maio. Monbelgar-
di prouenit mihi in Horto E. C. Vidi Heidelbergæ
in horto D. Sprengerii florentem Iunio.

Myconius frequenter se experimento obtrial-
se & compertum habere scribit, aquam huius
[Cakiles] stillatiam tepidam, quatuor vnciarum
pondere mane potam, colicis doloribus, neph-
riticis, & calculosis, mirè conferre.

CAKILE SIVE ERUCA MARINA
Lanifolia.



Nobis de-
dit D. A-
gerius nomine
Erucæ marinæ
foliis non inci-
sis collectæ iux-
ta alteram apud
mare Adriati-
cum, folia huic
laciniata quæ-
dam, sed non in
partes paruas
diuisa, ut in vul-
gari sunt omni-
lata, & plera-
que tantum si-
nuata.

SCOPA REGIA VETERVM.

CAP. XI.

Scopæ regis, Plinius de Violis verba faciens, *Serpa regia*
Sgrautem odorem affligat, non leuiorem ei, *Odor Cal-*
quam Calatham appellat. quāquam folia eius *tha.*
oleant, non flores. Idem ubi de Siderite sermo- *Folia odori.*
nem habet, ait: Nocturam, quæ latissimo (latissi- *Siderum.*
mo vet.) est folio, Scopæ regis vocant. *Vfus*
anginis suum. Hæc Plinius de Scopis regis, quæ *Angina*
non regis, sed potius *inueni.*
dixerim. Quod enim genus ea sit inter Violas *Plin. obse-*
Scopa regia, parum liquet. Est quidem Scopæ *ras.*
gia, secundum Hieronol. in Coroll. Sideritis prima *Vulva.*
Diosc. de qua H. n. lib. 28. *Sideritis l.*
Diosc.

Scopam regiam, faciunt Dioscoridis Batium, *Ranum.*
Ruellius, Gesnerus ex æsclepi. Diosc. & Brunfels. *Tagetes in-*
in Onomastico. De Bario agitur lib. 27. *dicatum.*

Scopa regia dicitur de Tagete siue Garyophyl- *Hypericum.*
lo Indicano autore Gesnero in cat. de hochb. &

Scopam regiam Plinio Sideritum latissimum di-
ctam eam esse Ruellius crediderit, quæ Herba
Carpentaria vulgò dicitur: Et hæc est Barbaræ
nostra, de qua mox dicemus.

Scopæ regia Pand. est herba S. Iohannis quæ
Hypericum lib. 29. inscripsimus.

Scopæ regis, quæ apud Plinium demonstratur,
ramis oblongis, foliis ex intervallo, laciniis, sed
rigentibus & lanuginosis: flore luteo, radice
promissa, tenui, iuxta Gesneri opinionem, fortè
Pulmonaria Gallica fuerit, ac etiam Sideritis illa *Pulmonaria*
Plin. Scopæ regia appellata. *Gallica.*

Scopam regiam Sideritum quidem esse putat
Dalech. apud Plinium, sed Achilleam cuius folia
odorem multum spirant, non insipiam, verum
medicatum, autore Dioscoride, ut pro latissimo
folio cap. 5. l. 25. legendum sit tenuissimo, vel quod
magis placet. latissimum folium intelligamus to-
tius plantæ comam latissimè se spargentem. Nam
multis virgis multumque spatii occupantibus ea
planta surgitur. Coronis autem expetitur flos *Flos ex al-*
ex albo aureus. Quamobrem inter luteos flores *bo aureus.*
hic à Plinio retinetur.

Scopam regiam quam Plinius inter Sideriti-
des connumerat, Casalp. Solaream vulgi esse
contendit. Videtur hæc nobis Gallitrichum sa-
tumum de quo lib. 28. Hist. n. Sed quod nos in tan- *Gallitrichum*
ta Veterum & Iuniorum diuersitate nihil habet *far*
mus, quod certò concludamus, nullus equidem *Silene.*
mirabitur, siquidem ab his nulla facta certà histo-
ria sit descripta.

BARBAREA.

CAP. XII.

Radicis albæ donata est, mediocriter crassa & o- *Descriptio*
blonga, sapore aciore: caules dodrantales &
altiores, striati, multis alis concaui: in quibus
folia Raphanis minora, laciniis extremis Na-
sturtii folium extremum æmulante, atro virore
splendentia, sapore minus vegeto quàm radix:
flores parui, lutei: siliqua confimilis, multa, &
nues, teretes, in quibus Dodonæo autore, exi- *Carpenta-*
guum & colore rufum semen. *nium bar-*

Hanc vocauit Ruellius Carpentariorum her-
bam, & Gallorum Carpentariam, existimans Plin-
ni Sideritum, folio latissimo, siue Scopam regiam *Sideritis*
Fuch. *folio latiss.*
Scopa regia

mea Barbarea murali, vocetque eam in phyt. Barbaram 1. siue minorem, quam iconis expressam nondum viderit, meo tamen iudicio, est vna eademque planta, idem minime separanda.

Floret Vere Montepelluli: Genevæ major in horto meo virebat tota hieme; nec primo anno caulem aut flores ferebat: at post semina proferebat Iunio: Copiosum inveni mense Iulio in monte Thuigi cum siliquis plurimis longis in caulis rectis. In l'Isle Burgundiae omnium maximum vidi in muris quibusdā & radicibus castelli, vitens Ianuario & Februario: Montbelgardi in muris quibusdā Castelli inveni, nunc lata in Horto Ill. E. C. occupavit novos muros & seipsam in illis propagat. Fr. C. Bauhinus observavit nascentem in muris mœniorum: attulit mihi Patavio.

DRABA LVTEA QVIRVSDAM.

Descriptio Ignola est radix, alba, minimo digito minor, sapore Raphani rusticani, minis seruido: ex qua caeteri aliquot attolluntur, recti, rigidi, cubitales & maiores, ramosi: quibus folia ab imo ad summum crebra alternatim adnascuntur, omnia vniiformia, longitudine quadrantalī & maiore, latitudine circiter vnciali, acuminata ex angusto principio, quā pedicello brevi adnectuntur, hirsuta, serrata, sapore remissiore quā n. radix: flosculi Erysimi, luteoli, quadripartiti: quibus succedunt siliquæ: quæ in sicca illa (quam Pat. Turn. Angl. Heidelbergæ ad Nectarum collectam mihi attulit) semen claudebant tenue, longum, striatum, rufum.

Solidago

Camer. apud Matth. Germ. & in horto dicitur Arabis quorundam floribus luteis, quam commodè referri posse putat ad Solidagine, quo nomine aliquando ex Anglia missa fuit.

C. Bauh. phyt. Draba 5. lutea strictissima longisque siliquis.

Locus & tempus

Viridem vidi in montibus Rhæticis: Burmi Iunio mense florentem altitudine duorum cubitorum cum dimidio: quæ quia videbatur odorem habere Raphani, tunc nominavi Raphani odorem habentem plantam: Stutgardie in horto Ill. E. C. floret Iunio, unde attuli plantandam in hortum eiusdem Cell. Montbelg.

DRABÆ LVTEÆ ALIQVATENVS SIMILIS PRO SPIRÆA MISSA EX LUSATIA.

Planta isthæc pro Spiræa Theophrasti fortè Clusio (lib. 1. plant. hist. cap. 53.) missa fuit Basileam C. Bauhino, inde ex Lusatia: cui iam siccata, caulis tenuis erat, furgosus, fractilique facilis non ligneus, vthac quoque ratione censuimus, non fruticem esse vllum, sed ex plantarum genere habendum. Drabæ iam dictæ luteæ aliquatenus similem, formā porro caulis rotunda, nervi secundum eius longitudinem decurrentibus inæqualior reddita, modò albido, modò verò puniceo aspersus colore: folia per continuum caulis ductum, nullo ordine sparsa, duas vncias longa, in ambitu alutifecus serræ in morem asperata, supernâ parte paulò saturatiore virore, vt infernâ d. luteiore, tincta: nervique subpuniceo per folii medium spatium conspicuo luteis donata, tenera siue admodum fragilia, ramus definit veluti in spicam, aut vnam flosculorum exiliom multosam, angustam, duas circiter vncias longam, albidam, gustu amaritulem: Si spica siue vnam ramo quem habuimus latè esset, non malè exprimeretur per iconem Spirææ Theophrasti fortè Clusio: Lectorum enim rem diligentius examinare: ramum quem habemus dedit nobis Ba-

silex 1608. diligentissimus Botanicus Gillerius Hassicus Medicinæ D. cui dono dederat Frater C. Bauhinus. Historiam autem & Iconem Spirææ Clusii posuimus Promptuarii nostri siue Histor. gen. lib. 5.

SINAPI PVMILVM ALPINVM FOLIO Bellidis Clusio.

Sena aut septena, humi secundum radicem expansa, habet illa foliola, Bellidis foliolis non dissimilia, teneriora tamen, & leui acrimonia prædita: è quorum medio, tenellæ & graciles prodit canticulus, raris foliolis septens, palmatis, aut paulò altior, in cuius summo semi aut septem erant flosculi, quatuor albis foliolis constantes, in quibusdam plantulis totidem sine flore siliquæ siue cornicula latis magna p. plantule ratione, duplici serie, quemadmodum in Cardamine alterius & similibus corniculis: semen conti-

nentia exigua, planum, rufescens, nonnulla acrimonia prædita: radix in terra tellure serpens, noua germina subinde profert.

Plantulam Cardamine simulam, Sinapi pumilum alpinum, an ad Cardamine, an ad Sinapi genere referre debeat, nondum apud se constitit Clusio.

Casp. Bauh. phyt. Sinapi 12. siue alpinum

marinum.

Observabat eam Clusius in Etcheriano in scopulis inhzrentem.

BURSA PASTORIA, SIVE PILOSELLA siliquosa.



Affinis est hæc Bursa pastoriae minimæ: radix, vtilius, tenuis, & fibrosa, vbi minima non fibrosa: folia similiter per terram sparsa, non nihil hirsuta, viridia, interdum nonnihil rubra, in minima minora, quàm Alfinæ minor. in aliis vulgaris Alfinæ magnitudinis, vel maiora, sunt etiam nonnunquam maxima Bursa pasto-

pastoris non laciniata: *caulis* interdum adeo exiguus ut viciam non excedat, aliis etiam dodrantalis & maior, iuxta terram nonnihil hirsutus & ruber, superius glaber & viridis, & nonnunquam foliis nudus, aliquando vno aut altero donatus, ramosus vel non ramosus: *stipuli* aliquot albi ordine nullo. *Bursa vulgaris*: *siliqua* longæ, teretes & tenues, ex satis longis pediculis.

Ad Myagros referendam censebat Gesnerus, ut patet ex annotatione ad plantam meam siccam. Existimo dictam fuisse Dalechampio *Aizoon thelyphonum*.

[An Thalia, Pilosella siliquata maior & minor? Aprém habet (ait Camer. ad Thalii hist.) hæc plantula saporem instar Nasturtii, eam Gesnerus inter Myagri species retulit. Hæcille, qui eius iconem habet in fine horti, sub titulo Pilosellæ siliquata. Ea facta est ad plantam siccam meam quam rediens Monspelio Gesnero miseram. Eiusmodi icones & descriptiones passim Camer. habet, quæ Gesnero præceptoris meo communicaram, mei tamen non meminit.

C. Bauh. phyt. *Bursa pastoris* 7. sine *Bursæ pastoris* similis siliquola. *Pilosella minor Thalia* & *Icon. Camerarii*.

Schvv. *Bursa pastoris Myagri folio*, *Nagels Traut*.

Locus & tempus

Monspelii in agris viridioribus florentem observavi Vere: Genevæ mense Martio & Aprili: Bononiæ in muris palatii atque in iis locis mediocris magnitudinis, ut pingitur à Camerario. Montbelgardi mediocrem & ad muros horti ferarum maximam; inter S. Thamarim, urbem & Than ad Alsatiæ, in agris mediocrem. Bessfordiz in arce supra murum observavi omnium minimam, ita ut describerem aliquando pro planta particulari.

DE LEUCOIO EX VETERVM SENTENTIA.

CAP. XIII.

Leucoium (*λευκοίον*) notum est, siquidem Dioscoridi fides habenda est, sed est in flore differentia. Namque aut albus, aut luteus, aut cæruleus, aut purpureus reperitur. *Hermolaus & Marcellus* in hoc Dioscor. contextu ista verba, aut cæruleus, in Leucoio abundare existimant, putantque asciutia esse, ideoque extirpanda. *his* adstimulatur Fuchsius, ac Plinii autoritatem adducit, qui lib. 21. cap. 6. *Violæ* plura genera enumerans, purpureæ, luteæ & albæ duntaxat meminerit. Marcello (inquit Matthioli) Dioscoridis interpreti subscribendum puto, qui Leucoium cæruleum hoc loco accreuisse suspicatur, vetustiss. Dioscoridis Longobardis literis scripti testimonio nixus, in quo nullum planè de cæruleo Leucoii colore verbum legebatur. Suspicionem hanc augent, eamque comprobant Onbasius & Serapio, quos item id verbum hoc loco non habere comperit in simplicium censu, cum alioquin reliqua Dioscoridis referant. Cæruleum Leucoion (repetit Cæsalp.) in hoc genere non visum, à solo Dioscor. positum, nisi superfluum fuerit id verbum, vel fortè Cyanus flos intelligendus. Cæterum, dum (*ρίζαν τῆς μέλανος λευκοῦ*) radicem Leucoii nigri in lib. de nat. mul. in vino bibendam præcipit Hippocrates, *μέλανος* nomine purpureum haud dubiè designat, nam hic color proxime ad nigrum accedit. Sic & *ῥιζὴν λευκὴν* Theo-

Tom. II

phrasto dicitur, *Viola marta*, à nigricantis purpureæ flore. Sic & cæruleus non alius indicatus à Diosc. esse videtur Cornario, quàm albus, qui leui rubore amixto cæli colorem refert. Superest ut quod nostrum hac de se sit iudicium, liberè dicamus. Verba igitur illa, aut cæruleus, nullo modo penitus asciutia credimus, eam vel solùm ob causam, quòd in cunctis Dioscoridis Græcis codicibus legantur. Ad autoritatem Plinii respondetur Fuchsius, Plinium non loqui de Leucoio loco citato, aut si loquatur, Leucoia à Violis non bene distinguere, & per purpuream Violam Martiam tantùm intelligere: per albam verò, Leucoium bulbosum Theophrast. florum primum dictum. Quod verò Matth. in Italia nasci non sciat, ac idèd Marcello subscribat, ineptè facit, non enim vna fert omnia tellus. Latè siquidem patet naturæ vis, & admirabilis eius Maiestas quâ potest multa quodocunque & ubique variare & quæ nobis, nostro orbi, & sæculo negant, aliis dedisse. Onbasium & Serapionem in depravatam exemplar incidisse potius dixerim. Dioscoridem porro per cæruleum Leucoion Cyanum non intellexisse, quod Cæsalp. post Hermolaum & Marcellum somniat, tum utrorumque florum differentia, tum folia, tum caulis, tum tota denique plantæ facies, clarè demonstrat. Cur denique Dioscorides voce disiunctivâ usus esset, si, quod Cornario videtur, per cæruleum album indicare voluisset.

Matth. non

Corn. non

Stat igitur quatuor esse Dioscoridi genera, solâ florum colore discrepantiâ. Nec hoc mirum videri debet, cum & apud Tragum recentiorum, quinque diversa Leucoii genera extant, à diversitate colorum apud Germanos sortita nomina, luteum (c. album), purpureum [braun] roseum, [leibfarb] & rubrum. Sed de his Iuniorum & nostris observatis differentiis seorsim tractabimus.

Leucoii (*τὸ λευκοῖον*) nomen quamvis propriè Violam albam significet, si eius græcam vocabuli compositionem spectes, attamè quotquot de his scripserunt, omnia Violarum genera cuiuscunque tandem sint coloris vnica hac Leucoii appellatione designarunt. Non est tamen quod per purpuream hic intelligas eam, quæ Græcis *ῥοζέ* & Latinis propriè Viola dicitur: nam earum alia ab his de quibus hic agimus familia est, hincque tum qualitate tum facultate, adde etiam forma contrariè. Homines enim illorum florum capti venustate & fragrantia, inquit Pena, ut usum ad coronamenta sic nomen commune sanxere, posteaque magis consuetudinem, aut florum similitudinem quàm rationem secuti, multos & varios flores violæ nuncuparunt, idem nomen variis atque longè diversis plantis quales sunt Violæ & Leucoia imponentes. Est & Leucoium bulbosum. Quæ omnia suis locis declarantur.

Hoc porro Violarum genus, ait Diosc. alii Regium siue basilion, Romani Violam albam, alii Augusteam, nonnulli Violam matronalem, aut Passerinam, aut Polyphuram vocant.

Hermolaus barbarus testimonio fretus Columellæ, Ligustriam Romanis hanc Violam vocatam tradit.

Dicitur Arab. nunc *Cheiri*, nunc *Alcheiri*, præposito articulo: Germ. *Veichen*. Belg. *Violeren*. Gall. *Violettes*. It. *Viola*. Hisp. *Violetas*. Quidam verò Violam albam [Leucoium] appellant, à foliorum canicie, non à florum colore, qui, ut dictum, aut albus est, aut purpureus aut luteus, aut, quod cum nonnullis Adrian. Spieg. negat, cæruleus.

Nomina linguarum.

De d d ;

HISTORIAE PLANTARVM.

Tarentinus apud Ruellium Violam purpuream post Idus Martias, item Calendas Maias feri iubet: sed violam qui saturus est terram stercorata & repastinam pedis altitudine in pulvinos redigat, atque ita plantas hornotinas, scrobiculis pedibus factis ante Calendas Martias, dispositas habeat. Semen autem Violæ, sicut oleum, duobus temporibus in areis feritur, Vere vel Autumno. Colitur eodem modo quo & cetera olera, ut tuncetur, ut sariatur, ut interdum etiam rigetur. Nascitur vitis modo è supernis quasi è puppi dicas non prorâ.

Vires & Vfus.

Leucoium medicum.

Semen.

Ad secundas educendas, & sanguinem ex veteris pellendum, Leucoii semen tritum, cum vino bibendum exhibet Hipp. de nat. mul. & ad eadem eodem modo radicem sumendam tradit. Est autem Diof. ex Leucoiis commodum ad medicum vsum cui color melius, huius flores aridi decocti ad infusus, ad vteri inflammationes, & ad ducendos menses faciunt. Excepti vero cerato, rimas in sede faciunt: cum melle feruida oris vlcera. At semen ipsius duarum drachmarum pondere cum vino potum: aut cum melle appositum menses, secundas, & scetus ducit. Radices cum aceto impositæ, lienem reprimunt & podagricis profunt. Leucoium frutex vniuersus extergentem facultatem possidet, plus tamen flores, & inter hos qui sint sicciores magis etiam quam virides, aded ut oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum menses quoque eorum decoctum mouet, & lochia, partumque emortuum elicit: ac si bibatur abortum facit. Est ergo id medicamentum, ut si quod aliud, amarum. At si quis vitium eius vehementia multâ aquâ admixta retundat ac mitiget, aut certe id genus aliquo, habebit & ad phlegmonem non malum medicamen. Sic decoctum eius si non merum fuerit vteri phlegmonas, identidem persufum sanat, potissimum quæ diutino tempore ad scirrhii modum induruerit. Sic cum Cerato vlcera ægrè ad cicatricem prouenientia curat. Sunt verò etiam qui cum melle & ad Aphthas adhibeant, semen cum eiusdem sit facultatis aptissimum est duarum drachmarum mensurâ potum, tum mensibus ciendis impositum conuenire creditur partumque viuentem interficere ac mortuum eicere. Radices similis quoque facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrenæ: cum aceto lienes induratos sanant. Nonnulli verò & phlegmonas induratas iis curant. Extenuant, menstrua & vrinam ciunt. Sed, teste Plinio, minor vis est recentibus, ideoque aridis post annum vtendum. Lutea dimidio Cyatho in aquâ tribus, menses trahit. Radices eius cum aceto illitæ sedant lienem. Item Podagrâ & oculorum inflammationes, cum myrrha & Croco. Folia cum melle purgant capitis vlcera, cum cera rimas sedis, & quæ in humidis sunt. Ex aceto verò collectiones sanant.

Inter omnia Violarum genera, luteas calido ferè temperamento præditas esse, præsertim aridas, testatur Tragus. Flosculi harum recentes in aqua decocti & poti, contra vuluæ inflammationes valent. Succus oculis inditus purgat illos, omnesque maculas & caligines discutit. Idem si è vino bibatur, non solum menses, sed & secundas, & emortuos partus extrahit. Neque debet exhiberi, nisi summa in necessitate constitutis. Aqua distillata, per diem bis pota, quatuor aut quinque cochlearium mensura, vitis hepatis & renum apprime conducit, & Venerem stimulat. Per aliquot dies continuè vsurpata, omnia interna

membra roborat, sanguinem & mentem exhilarat, dolorem sedat & quietem inducit. Cum melle oris vlcera sanat. Conserua huius cum aqua eius stillatitia crebro sumpta (ut rei huius testis est Camer. horti) præseruat ab apoplexia & iuuat paraliticos. Mesues Oloum de Keiri, ex floribus Lutei Leucoii conficit, ut Chamæmelind, ac quod tenuet, digerit, ob id dolores thoracis, renum, neruorum sedet.

LEUCOIVM LVTEVM VVLGO Cheiri flore simplici.



Notissimū Descriptio
parietinis quod Cheiri cum Arabibus vocant Officinæ, radicibus, siccis, seu ramulis vberim fruticantibus, lignosis, quos obsident folia nullis appenda pediculis, crebra, vnciali & ampliore longitudine, ex angusto principio sensim dilata ta, virentia, aut canescentia, idque maxime prona parte, sa-

pore subacri: flores crebri, lutei, valde odorati, sapore mihi ingrato, quatuor foliis constantes, staminibus sentis stiloque chloris in medio penitus ferè latentibus. Succedunt filiquæ longæ in quibus semen latum, rufum, gustu acri & amaro.

Matthiolo in prior. com. Leucoium: in com. cum mag. fig. ut & apud Bauh. Leucoium aureum: in hist. Germ. Leucoium luteum, Gelb negel vieln / Cheiri Arabum. Trago. Fuchl. hist. Gerard. Viola lutea Dodon. de flor. & in fol. Lob. Adu. Icon. M. Schvv. Leucoium luteum. Obs. Leucoium floribus luteis.

Gesner. in cat. pl. Hesperia, Viola lutea, Barba- ris Cheri, nonnullis Herba Gallica, Leucoion. Viola alba & Leucoium Diof.

H. st. Lugd. Leucoium aureum Matthioli, Plinio Viola lutea: verius dici ius Theophrasti periti Herbarii autumant.

Clus. Pann. Leucoium luteum satium.

Camer. horti. Leucoium flore luteo simplici.

Tabern. Icon. & Hist. Viola petra lutea.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 10. siue luteum foliis virentibus, Brunfelsio in 4. p. 49. Leucoium. Quibusdam Theophr. quod lotus nos summei, id est, lutei sit coloris.

Ad. in unum, Leucoium luteum, Leucoium Nomina luteum flore simplici, Arab. & Offic. vulgo Cheiri, siue Keiri. Germ. Geel Veyelen / Geel Negel Veilichen. Belg. Geel violieren Stein violieren / parietinas, aut saxatiles Violas dixerit Dodon. Gall. Violettes iantes: Montb. Violettes de S. George It. Viola giarra. Hsp. Violetta amarillha & Albelia. Angl. Wallc Gyslofer, wallc loier & Grod gelyer. Hung. Sarga Viola.

Leuco-

Locus & Tempus Leucoium luteum floret Monspelii tota hyeme. Passim, vt Basilez & Montbelgardi in muris copiose prouenit, florens Aprili, Maio, Iunio, & Iulio, & Augusto vidi etiam in Horto E. C. Clauallz Septembri.

LEVCOIVM LVTEVM PLENO FLORE.

Descriptio



Non vide. tur differre ab eo cui flos simplex, nisi quodd diutius durat, & magis arborefcit, quod cultura facimonia florum luxuries ei non permittenda, alioqui facile periret, vti solet Leucoium simplex, postquam filiquas pertulit, quæ in hoc interdum leuiter apparent, sed ad frugem non perueniunt, quod hæcenus

obseruauerim, licet Pictor noster non visas filiquas nostræ iconi appinxerit.

Viola lutea multiplex vel polyanthos quam H. Lugd. spectandam proponit, est flore densiss. foliis stipato & congesto, suauissimi odoris, nullis filiquis, nullo semine, abeunte in floris amplitudinem eo succo quem filiquarum & seminis esse oportebat, cultu & mangonio talem euadere a iunt, præsertim si tenellæ plantæ antequam floruerint sæpius transferantur.

Dodon. de flor. Leucoium flore multiplicante.

Lobel. & Pena Adu. Leucoium luteum duplis floribus.

Icon. Pl. & Schevenck. Leucoium siue Keiri duplici flore multiplex Gefôlt geel Veiel.

Gerard. Viola lutea multiplex: Double Wall flower.

Camer. hort. Leucoium flore luteo pleno.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 11. luteum pleno flore.

Locus & Tempus

Leucoium luteum flore pleno, Vidi nisanui in variis hortis, vt in horto Di. Abbatis de Van Prioris in Telpach. Sturgardiz in horto Ill. Ducis, plantauit in horto E. C. Montbelgardi. Basilez obseruauit in horto Di. Dis. Felicis Plateri, & D. Iacobi Hele, vnde Montbelgardum attuli, floret Aprili & Maio: ramulis depactis in terram propagatæ.

Leucoium luteum arborefcens

Leucoium accepimus Sturgardiz ab Illustriss. Nostra Ducissa Sybilla Anhaltina vxore Ill. Ducis Wirtemb. Principis mei Clementissimi, antehac non visum scribunt, ac florem simplicem interdum, peruenire ad amplitudinem monetæ quam Iuliam vocant: nos adhuc tantæ magnitudinis non vidimus, licet plantæ nostræ Montbelgardi floreat & filiquas ferant. Quamuis ex semine proueniant, propagatur etiam ex luctulis, vt quod flore pleno est.

LEVCOIVM LVTEVM SYLVESTRE Clusii.



Sylvestre autem Sten. caules fundit multos dodrantes & serè cubitales, angulosos, striatos, multis alis concauos: folia, alia quidem sinuata, semunciatata & angustiora, vnciam & semunciam longa, angusta, nullòque modo incisa, viridantia, in hortis cultu multò magis luxuriant dupla latitudine longitudineque: flores multi coacervati leucii lutei satini, colore item luteo præditi, minores quatuor constantes foliis, odore grato: postmodum filiquæ nascuntur tennes Clusio, plano semine plenz.

An Lobel. Obs. Keiri siue Leucoium maritimum flore luteo, facie Keiri vulgò lutei: folia item viridia: sed maiora, latiora & flauentia ex viridi, in Belgii hortos translata.

Clus. Pann. Leucoium silv. Rhizoromæ mulierculæ, Wild gelbe Veyl vocant.

An Camer. Hort. & apud Matth. Germ. Leucoium silu. quod Nonimbergæ passim in locis montanis prouenit, cuius pulchram & raram speciem reperit Bononiæ? Thal. Hæc Leucii lutei silu. species, foliis dodrantalibus tenuioribus hortensi, &c.

Tabern. Icon. & Hist. sicut & Gerard. Leucoium silu. 4.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 12. luteum silu. angustifolium.

Leucoium luteum silu. satum in Horto E. C. ex semine collecto in Gallia feliciter prouenit: florens Maio, Iunio, Iulio, & Augusto. Tale etiam collectum à Genero Cherlero in Lio Venetorsu, & horto Patuino: D. Agerius attulit Bononiæ Leucoium sylvestre folio valdè angusto. Inuenit Clusius in montibus supra Badenses thermas & in Leytenberg, locis Meridiei obuersis & salubrosus florens Maio.

Locus & Tempus

LEVCOIVM LVTEVM SILV. PANNON. serrato folio, obtuso & acuto.

Leucoium luteum silu. ex Pannonia per D. Agerium delatum caules habuit serè similes præcedenti: folia in obtusum desinunt, in extremitate ramulorum flores multi glomerati lutei, quales in præcedend: An huius sit alia species vel varietas tantum asserere non audemus, Quum iconem nostram curauimus parandam nò erat nobis iam descripta planta: sed tantum ramus iam depictus, in præcedenti tabella.

Descriptio

LEVCOIVM HYEMALE ET DIV DV-
rans purpureum & roseum, ac
etiam album.

Descriptio

Non tam florum, quam caulis & foliorum color Leucoio nomen fecit: siquidem *folia* incondita semunciam aut vnciam lata, palmum vnum aut duos longa, tota albent, obsusco mucrone, incana mollique lanugine pubent: *caulis* cubitalis & sesquicubitalis, lignosus, in ramos multos fissus, incanus similiter & tomentosus:



flores extremis ramulis herent, ex oblongo calyce piloso erumpentes, & quatuor foliis compositi, colore vel albo, vel coccineo, vel saturatiore viola eo prae-
diti: unde *siliqua* nascuntur palmum circiter longa, quae duos continent *seminum* versus, quae compressa, orbiculata, rufescentia, sapore praedita sunt acris-
culo: *radix* lignosa, alba. Por-

ro ex eo genere, quod florem gerit purpurascen-tem, specimen habeo quod flore multiplici insi-gne.

Figura nostra Fuchsiana non vndique placet, quia non arborecens picta.

Dioscor. 2. *Leucoium*, flore purpureo & albo. Plin. *Viola* purpurea & alba. Tragus Germ. winter *Violen*, 4. Matronalis, *weiss persilgen braun*. *Viola* hyemales 4. alba, incarnata, rubra, purpurea. Lat. *Leucoium* siue *Viola* purpurea, caerulea, rosea, candida, *Braun/rot, leibfarb* *Viola* ten, quae altero demum anno florent.

Dodon. de flor. & Hist. in fol. *Leucoii* genus candidum maius a foliorum non florum colore nuncupatum, Belg. *Stodtviolen* nominat, flore rubenti, candido, aut ex purpureo puniceo, aut cineri candidiori proximo, subinde vario.

An *Viola* matronales Veteribus Graecis & Latinis cognitae fuerint necne nondum compertum habet Fuchsius, Germ. dicitur *welsch veiel*, Gall. *gyroflées*. Tria sunt genera, candida, punicea, & purpurea, nec differre admodum nisi solis floribus videntur. Ibidem apud Fuchsium Lugduni exculum quidam addidit. *Viola* matronales ibi dictae, nobis *Baccharis* videntur. Fuchsius qui tres figuras posuit, non annotavit vllum discrimen inter hyemalia & aestiva *Leucoia*, ponit tres icones quae potius demonstrare videntur aestiva quam hyberna, quas frustra forte curavit pingendas si colore tantum differant: nos eam quam proponit pro *Viola* matronali purpurea huic capiti preposuimus, quia iam erat inter eas quas e-minimus & paulo melius accedit ad hyemalem quam alia dux quae ad aestivas relegauimus. Quam hic posuimus Hist. Lugd. non bene ponit pag. 804. errore forte typographi pro *Viola* matronali alba, quam nos *Heister* eadem vocamus.

Viola *amara* *Leucoium*, non a florum albedine, sed foliorum canitie, cinereo colore dictum album Lobel. & Penz in Aduert. videtur. Etiamnum hodie, uti Diosc. a quo vulgatiss. cognitionis illa triplex est florum varietas: vbiuis prope modum Gentium: sed alba & purpurea caerulea non nisi sat. Obs. *Leucoium* purpureum & album, *Leucoia* Dioscoridis. Icon. Plant. *Viola* alba & purpurea Teut. 329.

Tabern. Icon. & Hist. *Leucoium* album. 1. purpureum 2. violaceum 3. welsche *Violen* / *weiss* / *Braun* / *weyl braun*. Tres potest icones, nec demonstrat in quibus differant, indistincte de necessitate scribens, Compiler Tabern. Hae praeterea *Leucoia* potuisset relinquere iuxta *Leucoium* luteum.

Camer. hort. *Leucoium* album hortense fruti-
cosum. Item rubrum & purpureum nec non ver-
ficolor. Discrepant etiam quod aetatem vni-
cam durent quaedam plantae, quaedam aliquot annos. Atque insunt etiam purpureo ob colo-
rem dilutiorem & saturatiorem aliquot differ-
rentiae.

Gesner. in cat. pl. *Viola* alba, *Leucoion* Diosc. purpureum & caeruleum.

Corn. *Leucoium* nigrum Hippocratis. Matth. in com. cum mag. fig. *Leucoium* album & purpureum. In hist. Germ. *weiss* / *rot* / *braun* *weyl* / *Leucoium* album, rubrum & purpureum.

Histor. Lugd. *Leucoium* album & purpureum Marth.

C. Bauh. Phyt. *Leucoium* 1. folio incano maius flore albo, cinereo, purpureo, rubro, luteo, versicolore. In hoc genere non puto extare luteum.

Gerard. *Leucoium* album, purpureum, violaceum, white purple violet colour *Stodt flower*.

Leucoium hiemale & diu durans flore roseo, Montbelg. in horto E. C. quod hieme repone-re oportet. Monspelii habent *Leucoia* mixta ex albo & purpureo, alba & purpurea quae in herbis tota hyeme florent, uti & mense Martio & Maio. Geneve in hortis vidi florentia Octobri & Nouembri alba *Leucoia* & purpurea, & interdum in hortis hyemem perferentia, Maiorq; florentia: Lugduni varia habent genera, vbi etiam variegatum vidi. Bononiae flore purpureo, in horto di S. Saluator al burgo di S. Catharina, *Leucoium* provenit Montbelgardii in hortis, folio cineritio cum quibusdam laciniis, ut in marino Monspeliano spontaneo, Junio & Iulio flores albos odoratos & siliquas proferens.

Locus & Tempus

LEVCOIVM PURPUREVM FLORE
pleno.

Speciosus est admodum *flor* *Leucoii* purpurei siue violacei pleni, in ceteris non differentis a precedenti hyemali purpureo simplici, de quo Aduert. Lobel. & Penz: Mangonio hortitorio, re-
petitaque crebriore transplantatione *Leucoii* purpurei, flores magnitudinem luculentam assequuntur: multiplici singuli praequantur *foliorum* *structura*, *Rosam* *moschatam* *aquante*: sed *semine* orba fit.

Icon. Plant. *Leucoium* siue *Viola* purpurea *Viola* *pur-*
flore pleno. Rubrum *Leucoium* flore pleno, ma-
gno, pulchro, admodum iucundi odoris colitur, teste Camer. apud Matth. Germ. in Belgii Valen-
tiana & Monte Henaut: inde in alia loca trans-
fertur, difficulter hyemem perfert, ac ex turculis propagatur.

Vidimus

Locus &
Tempus

Vidimus Lutetiz mense Augusto florens in culti-
tiff. horto Robini hortulani regii. Nobis praeue-
nit Montbelgardi Leucoium purpureum flore
pleno ex semine misso Argentina per D. Fri-
dericum Meierum, crevit etiam ex surculis, is etia
siccam plantam miserat.

LEVCOIVM AESTIVVM FLORE purpureo & roseo ac albo.

Descriptio



B Inis foliis
Emergunt,
hyemalibus
Leucois simi-
libus, minori-
bus, teneriori-
bus, flore nunc
purpureo, &
roseo, nunc al-
bo. Leucoii ca-
didum genus
minus quodd
Belgæ hette
violæm vo-
cant, à maiore
non forma, sed
magnitudine
sola differt: cau-
les foliaque ha-
bet similia, sed
minora: flores
etiam non v-

nius coloris: sed vel candidos vel rubentes, vel
punicantes, uti maioris: siliquis etiam & semina
similia. Vocatur autem & hoc candidum à so-
lorum canitie, uti dictum.

Tragus Germ. Sommer violen/ Viola æstiva-
les, Violarum tertium genus. Leibfarb/rot/bräun
purpurfarb/weiß: Lat. Viola diversicoloris al-
bifloræ flore alba, alia roseo, nonnulla rubro,
quidam purpureo.

Lobel. & pena Adv. Viola annotina, flores
exoleti coloris in cœruleum vinaceum languel-
centis ferens.

C. Bauh.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 2. sine folio incano
minus, floribus candidis, rubentibus, punicanti-
bus, uti maius, à quo sola magnitudine differt.
Sed quod Prater ex Dodon. hæc duo genera sola
magnitudine differre scribit, id approbare non
possum. Differunt enim etiam in eo quod non ar-
borescat: folia etiam prima differentiam aliquam
ni fallor habent.

Alteram ex Fuchsi Iconibus ponimus, quæ
pro ambabus esse possit cum etiam eas nonnisi
colore differre tradat.


Hist. Lugd. Leucoium album & postea Leu-
toium puniceum Fuchsi rebus sic appellatum
quam Viola matronalis punicea, quo nomine Fu-
chsi pinxit.

Leucoium æstivum flore purpureo & roseo in
multis hortis feritur, uti etiam in E. C. Horto. ex
semine variis ex locis conquisito: Stutgardia no-
mine Viola Lombardica: Vere satum floret Ju-
lio, Augusto, Septembri: Autumnio perit, nec hic-
tem perfert etiam repositum; quod flore albo
marcescendo acquirit aliquid purpurascens.
Floret hoc genus, non quidem Vere apud Dodo-
næum, sed Junio, Julio, aut Augusto, & eodem
quod satum est anno: hyeme perit.

Violam matronalem albam, puniceam & pur-
puream admodum eadem esse sapor foliorum &

radicis, qui acris est, abunde docet Fuchsi-
um. Humiditatem autem multam, Galeno lib. 4. cap.
18. de simpl. medic. facult. teste, ed quod amare
non sint, admistam habent. Incidendi & digeren-
di per habitum vim obtinent. Ideoque radix ut &
folia decocta in aqua, convulsis, difficultate spi-
randi laborantibus, & veteri tussi auxiliantur. Vi-
rinam & menses ducunt, sudoresque ciendi fa-
cultatem habent.

LEVCOIVM HIEMALE DIV DVANS. flore albo, folio viridi & lini- do glabro.



P Ari cū Leu-
coio, cui
folium inca-
num, magni-
tudine est, siue
caules, siue ra-
mos, seu folia
spectes: huic
tamen folia gla-
bra, atro virore
splendent: flores
suaveolentes al-
bent, Leucoii
iam dicti formæ:
nec dissimiles
bipatentes sili-
qua seminibus
plena.

An Lobel.
Obs. Leucoii
maritimi species
albi floris colo-
re duntaxat va-
rians, & foliis

Descriptio

exilitate à Leucoio marino luteo, cui folia viridia
in Belgii hortos translata.

An eadem Icon. Plant. Keiri marinum flore
candido: Id enim non malè convenire videtur.

Dodon. in fol. Leucoia nonnulla, quorum her-
bz folia haudquaquam candida, mollia aut lanu-
ginosa; sed virentiora, ad lutei Leucoii foliorum
læuitatem & colorem accedentia.

Camer. hort. Leucoium rarius, folio planè viri-
di, flore albo admodum odorato, quod per ali-
quot annos durat, sed hyeme est in cella asser-
uandum. Item apud Matth. hist. Germ.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 9. sine maritimum can-
didum.

Geraid. Leucoium marinum flore candido Lo-
belii.

Leucoium folio viridi, glabro, flore albo in
horto Felicis Plateri, quod plantavi in horto Il.
E. C. Montbelgardi, primo à satione anno raro
caulem profert: apud nos hyeme sub testum re-
ducendum: quasdam plantas observavi eodem
anno satas Montbelgardi florentes Augusto: sed
flore minori & minus specioso: Basileæ 1609. in
horto fratris C. Bauhini hiemem pertulit, plantas
atque Montbelgardum.

LEVCOIVM MARITIVM MAGNVM Latifolium.

L Eucoti maritimi radix priusquam caulescat, Descriptio
mollis, tenera, longa, crassa, alba, gustu acri
non ingrato, Raphanum æmulante: folia la-
ta multa à radicis capite funduntur, foliis leucoii

Tempus
Locus



latius hortenſis, paria, longa, laci-
niata, vnciam pe-
nè lata, caulis
crassiſculus :
quinque vel 6.
vñ arum : flores
quadrifolii pur-
purei.

Tale Leucoiũ
obſervatũ Mon-
ſpeluſidem eti-
am attulit mihi
Frater caule cu-
bitum exceden-
te, crasso, cum ſi-
liquis longis &
latiſculis villo-
ſis, omnium pri-
ma folia (vñ in
ſatis obſervauit
ſunt anguſti, nò

laciſiata, talia etiam ſuperiora, ſed breuiora Clu-
ſio, flores odorati, coloris dilutionis purpuræ, ſed
quodammodò obſoleta, in ſiliquis duplex ordo
ſeminum planorum, ſubruſorum, intercurrente
membrana : radix multiſida, non perennis, ſed
poſtquam planta floruit & ſemen protulit [quod
ſecundo plerumque anno, interdum & tertio
ſeu ſolet,] perit.

Lobel. & Pena Adu. & Icon. Pl. Leucoium ma-
ritimum maius.

Cluſ. qui in Hiſp. & Hiſt. poſt. in fol. Leuco-
ium maritimum maius vocat : Adampſic iconem
Lobeli, cui ille Icon. Pl. p. 12. mulum ſicut Keyri
maritimum flore candido : verum ea icon diſtinetur
ſolis diuiſis qualia ſuo Leucoio in deſcriptione
Cluſius tribuit.

Camer. hort. Leucoium maritimum Cluſii maius.
Et apud Matth. germin. Leucoia iuxta mare re-
perta.

Pictura Hiſt. Lugd. quæ Leucoium maritimum
maius vocat, facta eſt ad plantam ſiccam & ag-
glutinatam, quam habemus ex Valerandi Dourez
ſtirpibus : inferior pars plantæ erat acaulos Leu-
coi (vt nobis videtur) maioris, rami autem cum
floribus & ſiliquis adiuncti ex minori Leucoio
marino.

C. Bauh. Phyt. Leucoium. 5. maritimum purpu-
reum ſinuato folio. Tabern. Icon. & hiſt. Leu-
coium maritimum, maius purpureum. 5. Groß
braun Meer weyl. Gerard. Leucoium maritimum
purpureum Lobeli, perle Sea ſtock giſſes
flowers.

Locus &
tempus

Obſervauimus ad mare Mediterraneum pro-
pe Monſpelium flores Aprilis, vbi etiam Frater
vidit flores Maio & Junio. Gener Cherlerus an-
notauit in toto Narbonenſi litorale tractu ob-
uium : In Sturgardiano Ill. E. C. Vvitt. horto, ob-
ſervauit flores adhuc Nouembri. Baſileæ in hor-
to Di. Zvvingeri cum ſiliquis & flore Septembri.
Ex ſemine provenit Montbelg. in horto quod
excolimus pro Ill. E. C. VV. quod anno 1597. non
tectum hiemem pertulit, ac ſaporis erat acris ac-
cedentis ad Raphanum. flore purpureſcente va-
rio, id etiam reponimus hyeme.

LEVCOIIS AFFINE TRIPOLIUM AN-
guillara, & Leucoium maritimum

Camerarii.

Deſcriptio.

Provenit Tripolium inter Scillam & Carib-
dim circa S. Georgium. Folia ſimilia Planta-



Camer. hort. Leucoium maritimum aliud, Teu-
polium Aloſii ſive Crucigera. Icon. p. 24. Leu-
coium maritimum.

Icon Leucoi marini Camerarii non mihi vi-
detur reſpondere deſcriptioni Anguillara, non
enim ſunt folia Plantagin. ſimilia.

LEVCOIUM MARITIMUM anguit folium.



Eradice cras-
ſa, lignoſa, deſcrip-
ta, cu pluri-
bus crasſis fibre
& plura capita
eſſe ſolent,
multi caules a-
xorum ſin-
gulares vel ra-
moſi, miſco
tiores &
candidiores
quàm præce-
dentis, palmar-
es, dodrantæ
læſe: ſolia bre-
uia, parua, can-
dida, nullo aut
obſcuro laci-
niarum veſti-
gio incifa, quæ
vt ait Cluſius,

mollia & incana, neque adeò crasſa aut diuiſa
flores in ramulis ſuperiori [ſive maiori] minores,
coloris pulcherrimè rubentis, & dum ſtaccete-
re incipiunt ſaturatiore, quales Leucoi vulgaris
rubri flores, & odorati quidem illi, verum minus
ſuperiore : ſiliquis ſuccedunt tenuiores multo,
& breuiores quàm in præcedenti, teretes : ſemina
copioſo miniuſſimo ruſſo reſerta.

Lobel. & Pena Adu. Leucoium maritimum mi-
nus, vehementius accedine linguâ vellicans quàm
maius. Obſervat. Leucoium maritimum minus
flore purpurante. Helſperis Theophr. quorun-
dam. Icon. Leucoium maritimum minus an-
guſtiſol. Teut. 400. Cluſ. Hiſp. & hiſt. in fol. Leu-
coium maritimum minus, quod ob coloris in flore
mutationem nonnulli Mompeliani, dum illic ef-
ſem Tripolium vocare ſolebant.

Hiſt. Lugd. Leucoium maritimum minus, ra-
dice

Tripolium

dice parva, brevis, candida, foliis multis. Leucoium maritimum minus Hist. Lugd. facile nobis persuademus idem esse cum minori de quo hoc capite agimus, quamvis figura multum differat. quæ forte facta ad plantam primò florere incipientem, prima enim folia non videmus, nec scimus an à quoquam picta: quæ occasio ut ad nostram iconem addiderimus separamus, folia ex Hist. Lugd. Hòc præterea notandum Leucoii huius minoris superiores ramos pictos sub figura Leucoii maioris, ut antè dictum.

Tabern. Icon. & Hist. Leucoium maritimum 1. Neine rötliche Meer Vötel. Item Leucoium maritimum minus Interim: 5. Klein geel Meer Vötel: primò Leucoio simile, excepto colore luteo. Compilator pro Leucoio luteo marino minore ponit iconem propositam à Clusio & Lobelio, qui colorem non tribuunt luteum: præterea Compilator vidit luteum, quod alii alio colore viderunt: oportebat annotare locum ubi viderit, ac cor duas ponit figuras cum colore tantum differre dicit.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 5. maritimum latifolium: Lugd. Hist. maritimum minus. Leucoium 8. maritimum angustifolium, Clusio & Lobelio maritimum minus, flore dilute purpureo, quandoque rubro & luteo. Cur non separemus Leucoium maritimum Hist. Lugd. à maritimo angustifolio antè diximus.

Gerard. Leucoium maritimum flore candido Lobelii, White Sea stocke gilliflowers / & postea Leucoium maritimum minus, Lob. & Clus. Small yellow sea stocke Gilliflower. Gerard. cones Tab. habet: verum per priorem intelligit fortè Keim maritimum flore albi Lob. Icon. Pl. p. 332.

Dodon. de sicc. Sylvestre quoddam Leucoium humile & parvum, quod in Zelandia locis eximantimis, ac iuxta Montpelium quoque uti Gelenus scribit. Lat. in sol. Leucoium sylv. angustifolium, quod sub noctem odoratus est, & Hesperis esse creditur: quæ Plinio autore, nocte odoratiór. Camer. hort. Leucoium maritimum minus.

Monsp. cum vidimus essemus iuxta mare Mediterraneum florens Augusti, frater C. Bauh. Maio & Junio. Floret, auctore Clusio, Julio & Augusto eodem quo latum est anno, deinde petit: Nascentur Mediterranei maris littoribus per Hispanias & Narbonensem Galliam multò frequentius. Non modò Zelandia maritimis spontè nasci tradit Dodon. verum & in Narbonensi Gallia, ac pluribus per Hispanias locis maritimis Mediterraneis, cuius odor apud Hispanos sub noctem Occidente Sole intenditur, qui alias per diem exiguus.

LEVCOIVM MARINVM PARVVM folio virente crassifolulo.

Descriptio

Parvum sanè est Leucoium mihi maritimum denominatum à D. Endorico Meyer stirpistudiosissimo: cuius caules observavi tenues, palmates, folia per illos rara, quædam vincta digiti paulò longiora, nonnihil sinuosa, succulenta, & crassiuscula, glabra, virentia: flores latius magni pro herbe proportionem, purpurascens, suc-



LEVCOIVM MARINVM CRETICVM
duplex.

cedunt tenues
silique: florens
vidi Argentinz
in horto præ-
dicti mense Ju-
lio, & mense
Octobri. A.
Thoma Plate-
ro Medico et-
iam datum
est.

Iosephus Galabonus, ex peregrinatione Cretica rediit, semen ad Clusium mittebat Leucoii marini appellatione, & quo tres diversæ plantæ ortæ Earum maxima & prima, caules habuit procumbentes, rotundos, durissimos, multis ramis donatos, in quibus flosculi quatuor foliis constantes, initio rubentes, deinde ex cæruleo purpurascens, extremo bifidis, & cordatis, ut vulgò pingitur, effigiem propemodum referentibus, quali ex umbellâ, Trionis vulgaris instar, sensim prodeuntes, qui ubi floris folia coniungebantur, radiantem imitabantur flauam stellam: floribus successerunt duarum serè vnciarum silique hæc cornicula teretia, in quibus semen oblongiusculum castanei coloris. Ipsius verò plantæ folia longiuscula fuerunt, à Thlaspi foliis non valde differentia, nullis [in caule præsertim] evidenter crenis donata, crassiuscula, & aliquantulum amara. Altera priori similis erat, nisi flosculos habuisset dimidio minores, & initio prorsus albos, deinde tamen paulatim purpureum quidpiam contrahentes, sed nihilominus magis ad albedinem inclinantes. Floruit utraque Iulio, medio Vere, hoc est, Aprilis satâ. Tertia promebat initio præcedentibus duabus longiora folia, eidentibus & conspicuis crenis secundum oras donata, Leucoii Dioscoridis Lobeliani instar, & quorum medio exiit cauliculus rectus palmari altitudine minor: quum florere incipit, nempe Augusto, à latere verò plures fundebat ramulos, in quibus flores, secundo generi ampliendine pares, colore tamen differentes. Nam propius accedebant ad Leucoii marini Lobeliani latifoli colorum, magisque purpurascens erat, quam in primo genere.

HESPERIDES FLORE PURPUREO, AL- bo & vario.

CAP. XIV.

Radibus aliquot parvis, lignosis, & albis nititur: caules erigens cubitum & plusquam sesquicubitum altos, hirsutos: in quibus alternatim folia Eruce, sed non ita laciniata, in ambitu serrata, acuminata, hirsuta, in virore nigricantia,

Descriptio


lapore acrisculo : ex foliorum alis erumpunt ramuli, in quibus flores, formā ad Leucoium luteum accedentes, odoris suauissimi, colore nunc albo, nunc purpureo, aliās confusus cum albedine maculis purpureis variato : *semen* in siliquis longis continetur, ipsam oblongum, rufum, acre.

Fuchsi. *anazio*, Viola alba, *Cheiri*, *Reiri*: Germ. *Deiel*, Gall. *violier*, Leucoium Dioscoridis. Hæc ille, qui duas figuras habet, alteram nomine *Viola purpurea*. Frustra duæ figuræ : præterea mitum eum has vique aded dissimiles plantas à Leucoio luteo, Leucoia facere.

Trag. Germ. & Lat. vocat Germ. lingua *Winter Violen*, eò quod hyemem ferre possint, aut ad discrimen aliatum, *Groß Violen* : scribitque *Hermol. Perficam*, *Parthicam* & *Pesegrinam* vocare. Quod si præterea hæc Viola radicem haberet nigram & instar cornu duram, facile dixerit *Æthiopida* Dioscor. Verùm cum & in Arcadia *Æthiopis* nascatur tanquam peregrina plantæ, nihil statuere potest. Insignis sanè error Tragi existimantis Violam *Perficam* *Hermolai*, quandoquidem is ibi *Gelleminum* tradit.

Gesner. hort. meminit nomine *Viola matronalis* *Fuchsi* [sed ficto ab eo nomine,] *Viola hyemalis*, *Brabantorum* *mostibloemen*, *Tigurentium* *vinifst* *Negle*, & *Viola Hispanica* *Solerii*. Aliquos interpretari *Hesperidem* *Vetorum* : flores ferre anno secundo, albo, interdum roseo, aut quod rarius subrubentes.

Gesner. hort. meminit nomine *Viola matronalis* *Fuchsi* [sed ficto ab eo nomine,] *Viola hyemalis*, *Brabantorum* *mostibloemen*, *Tigurentium* *vinifst* *Negle*, & *Viola Hispanica* *Solerii*. Aliquos interpretari *Hesperidem* *Vetorum* : flores ferre anno secundo, albo, interdum roseo, aut quod rarius subrubentes.



Dodon. de flor. *Viola matronalis*, coloris candidi aut rubentis, dilutæ purpurea, *Erucæ* species videtur.

Camer. hort. *Hesperis* nostras. *Lobelio* non placet dici *Violam marinam*.

Consulte, inquit *Lobelius*, non faciunt, qui istam plantam *Marinam* *Violam* *Damascenam* & *Exoticam* vocitant, cum in *Nitiobrigum* montosis & siluosis locis, etiamque in *Anglia* pratis fruticet. Obs. *Viola matronalis* & *Damascena*, *Viola alba* *Tragi*. Et alia, quam suauiss. odoris totamque minorem & floribus albis alia in horto *Joh. Muttonis*. Icon. plant. *Viola matronalis* siue *Damascena* *Feut.* 498

Clusius in *Pann.* & *Histor.* in fol. eandem cum *Lobelio* iconem habet pro *Hesperide inodora* *Pannonica* silu. De odorata autem alibi in lib. citatis ait : *Hesperidi* nomen inditam ab *ethore* *Theophr.* lib. 6. de causis plant. cap. 25. quod non de plus redoleat, quam interdum, cui suffragatur *Plinius* lib. 21. cap. 7. Communis opinio obtinuit, ut ea quam nonnulli *matronalem* *Violam* vocant, & quæ inter *Leucoii* genera referti debere videtur, *Hesperidis* nomen sibi proprium adstriceret : quoniam eius flos, sub *vesperam* præsertim gra-

to odore feriat, interdum aut nullum aut lenissimum spiraret. *Matronalis* *Viola* dicitur quod *matronis* atque *virginibus* sit in deliciis.

Violam *matronalem* vel *Violam* *Damascenam* & *marinam*, quorundam *Violam* *moschatellam* vocatam, albam & purpuream *Erucam*, *Thlaspi* aut *Rapunculum* gustu sapere scribit *H. Lugd.* quibus idcirco affinem naturæ & facultatibus proximam putat : cum tamen cum *Rapunculo* nihil commune habere videatur. Non bene præterea sub titulo *Viola Matronalis alba* posita con *Leucoii* purpurei *Fuchsi*, ut ante de *Leucoio* affino monuimus.

Calp. Bauhin. phyt. *Viola matronalis* sua *Hesperis* prima hortensis : variat colore floris, modò candido, modò dilutè purpureo, modò rubro, habetur & minor floribus albis.

Schv. *Hesperis alba*, *Hesperis purpurea*.

Prouenit spontè in *Sequanorum* vallibus quæ *Rhenus* fluit sub sepibus, floret *Aprilis*, *Mai* & *Iunio* mensibus. *Hesperides* ubique in hortis, *Tiguri*, *Basileæ*, *Ferrariæ* obseruati : *Lugduni* & *Montibeldardi* copiosè, florescentes adhuc *Septembri*, ubi hyemem solent perferre : *Patau* videntes *Decembri* & *Ianuario* : *Februario* florescentes flore purpureo. *Genève* videntes *Ianuario*. Notatu dignum *Hesperidem* purpuream senescens interdum mutare colorem, & variam pulcherrimum acquirere ex albo & purpureo striatum.

In *Syrupo Magistrali Comitissæ*, præscribit *Wier.* de *Scorbuto*, succum è floribus *Hesperidis* expressum, cum aliis vocans *Damastiblamen*. Sunt autem harum *Violarum* folia, gustu quidem acris & calida, *Erucæ*, cuius species videntur *Dodonæo* sapore & facultate proxima. *Matronalem* parò *Violam*, tussis, conuulsis, & difficulter spirantibus inderi traditur apud *Clusium* : vrinæ insuper & sudores propellere, incidere abstergere, & digerere. *Semen* acre, fuscum aut rufescens, *Erucam*, *Thlaspi* aut *Rapuncium* [*Rapunculum* *H. Lugd.*] gustu tota sapit, inquit *Lobelius*, quibus idcirco affinis natura putatur.

HESPERIS PANNONICA INODORA

Sylvestre hoc *Hesperidis* genus, cubitan altitudinis, dum generum silis donatum,

infima ex angusta ceruice mox dilatatur, tandemque in scumem desinunt, sinuatis nervis præditæ alia lara, sessilibus que basi sæpius adnascuntur, utraque serrati, hirsuta, candidiora, molliora, que quam in *Hesperide* nostra vulgari : flos ex quatuor compoliti foliis, colore exhibente, vel purpureo, forma tamen vna cum subse-



quonibus longis torosis siliquis, *femineque* ruffo, cum vulgari *Hesperide* conveniunt.

De hac Clusius: Vulgari Matronali *Viola* aded similis est, ut ex utriusque collatione vix discrimen conspici possit. Flores in extremis ramulis copiosi exalbidu, qui ætatis successu purpurascunt: cornicula, semina, radix etiam ipsa cum vulgari omnino conveniunt: solo floris odore, cuius in hac nullam gratiam percipere potui, differunt.

Camer. hort. & Icon. *Hesperis* Pannon. à Clusio exhibitæ. An Gætn. hort. *Viola* matronalis siluestris: Clus. Pann. *Hesperis* altera Pannonica inodora sylu. hist. in fol. *Hesperis* tertia, *Hesperis* silu. Clusio icon est eadem cum Lobeli icon. Obs. quam pro *Viola* matronali posuit.

C. Bauh. phyt. *Viola* matronalis, siue *Hesperis* 2. silu. inodora.

Argenturæ Dominus Vldaricus Chelius dedit plantam ex Ageri stirpibus siccis, cuius inscriptio erat, *Viola* matronalis seu Damascena Austriaca. Solet altero plerumque à germinatione anno, & à maturo semine, perire. Crescit passim Viennensi agro ad montium radices, & vineorum in collibus sitorum margines. Floret cum vulgari, nempe Maio & Iunio.

HESPERIS FLORE VIRIDI.

Descriptio IN horto quodam Basileæ legit Frater C. Bauh. *Hesperidem*, quæ magnitudine quoad omnes sui partes à vulgata differt, dein floris colore qui viridis est, & sine odore. Inscribitur idem ab ipso in Phyt. *Hesperis* siue hortensis flore viridi.

An Schv. *Hesperis* viridi flore, *Viola* matronalis viridi flore, Grün vinter *Violen*, Iunio & Iulio florens.

HESPERIS COLORE INELEGANTI

Descriptio



Basileæ in horto D. Chmelii collegi *Hesperidem* quam Clusius Alpinam primam denominabat. Folia serè sesquipalmum longa, duarum unciarum & semis latitudine, nonnihil sinuata, mucrone obtuso, hirsuta & aspera: flores quales in *Hesperide* vulgari, sed non expansi, coloris minimè hilaris sed pallidi, multis venulis distincti.

Sic describit Clusius, cubitali excrevit altitudine, multisque ramis prædita est, quos confuso ordine ambiunt folia, Matronali *Viola* similia, paullo tamen latiora, & crassiora, aridiusculo primum gustu, postea acri & saluam efferente, extremis ramis in oblongis pediculis insident flores similes, quatuor foliis, vix illi, constantes, coloris

Tom. II,

admodum inelegantis & obsoleti, & fulvi, infinitis venulis ex atro purpureis intercurrentibus, odore interdum nullo, aut aded tenui, ut vix naribus percipi possit, sed sub vesperam gratissimo & suavissimo: flori succedunt oblonga, torosaque cornicula quadrangula, in quibus duplici ordine semen continetur, vulgari *Hesperidi* simile, sub-rufum: radix fibrata.

C. Bauh. Phyt. *Viola* matronalis siue *Hesperis* 4. montana pallida odoratissima.

Hesperis colore ineleganti provenit in Horto Il. E. C. Montbelgardi Anno 1588. ex semine quod collegeram Stutgardia in horto Ducis: florem protulit Augusto eodem anno quo lata: & Septembri. D. Iacob. Mieg Medicinæ candidatus Basileæ nomine Keyri marini: Basileæ etiam observavi florens Septembri, in horto D. Dris Martini Chemeleci Poloni.

Radix vix plurimum biennium non superat, sed postquam defloruit & semen tulit, perire solet, si tamen præcis caulis ad frugem pervenire non sinatur, nova germina interdum producit. Spontè nascentem & semine prægnantem primum inveniēbat Clusius in Prellenberg Hamburgensi monti vicino, Ungariæque extremo, quæ Austriam spectat, mense Iunio anni 1586. Eius deinde semen terræ commixtum subsequente Vere, plantæ protulit, quæ altero anno duntaxat floruerunt Maio, & sequente hieme perierunt. Solent verò quæ semine nascuntur plantæ, floris colore multum variare, nonnullis maternum colorem retinentibus, aliis aut dilutius pallescentibus aut magis obsoletum adquirentibus, omnia tamen folia crebris venis ex atro purpurascensibus distincta habentibus.

HESPERIS SYRIACA.



Descriptio *Odranta* filia, aut minora, palmum lata, valde aspera & hirsuta longis nixæ pediculis, obtuso mucrone nonnihil in ambitu sinuata: Flores in brevibus caulis figuræ quidem nostratæ & vulgaris *Hesperidis*, sed colore fusco & lorigo, multis venulis per eorum folia discurrentibus. Siliqua insignis longitudinis sequuntur recurvæ, torosæ, semen duplici serie continentes.

Clusius dicit *Hesperide* iam descripta [quam nos flore ineleganti diximus] multo vegetiorem, ampliora habentem folia, crassiores caules maioreque flores, quatuor tamen foliis etiam constantes, eiusdem planè coloris, sub noctem valde odoratos, interdum adoris expertes: Cornicula multo crassiora, semen paullo crassius: Radicem non multum absimilem.

Camer. hort. *Hesperis* Syriaca, quam alio no-

See



ior erit *caulis*, gracilis, quem per intervalla ambiunt & amplectuntur *folia* superioribus minora & ad petiolum latiora: *flores* spicæ instar supremum caulem ambiunt, ut in Priore, & quatuor albis foliolis constant: quibus succedunt teretia & oblonga *cornicula*, duplici ordine, rufum, pusillum, & plantam *semen* continentia: *radix* tenuis & repens lætè se se diffundit, & novas plantas singulis annis producit, viua, & tota hyeme vivens.

Clusius & Lobelius eandem habent iconem, verum an de eadem planta scribant asserere non audemus, diximus autem iconem Clusii & Lobelii non malè exprimere nostram *Hesperidem* alpinam sine murariam, verum Clusii descriptionem non respondere *hist. Lugd.*

Arabis seu *Draba* altera *Penz* & *Lobelii*.

Clus. Pann. & hist. Draba tertia succulento folio.

Crescit, inquit Clusius, in declivi montis *Herrnshofen*, supra *Zeehof*, villam *Cornobii* *Gamingensis*, ubi sæpe floret: at in hortos translata, maturis, cum præcedente, nonnunquam etiam ante hiemem. *Luxuriat* in hortis ubi semel sata. *Lobel.*

MESPERIDI ALPINE, MURIARLEVE similis turreta & magna.

Descriptio



Tom. II

IN montibus inter *S. Hippolytum* & *Mescha* mensis Aprilis sine observari plantam trium penè cubitorum, ex radice crassiuscula fibrosa, sapore aliquantulum acri, exoriuntur aliquot caules crassi, hirsuti, recti, superne ramulos rectos alternatim inter folia proferentes: *folia* iuxta terram ex crasso pedi-

culo dodrantalia ad *Hesperidem* vulgarem ac etiam murariam accedentia, sinuata, & nonnihil laciniata, *Drabæ* modò vtrinque hirsuta, alternatim lato principio caulem penè amplectentia; breviora præcedentibus, odore accedente ad *Lepidium* *Pauli*, sapore amaricante: in extremis ramulis multi *flores* cum quatuor foliolis albis ad luteum nonnihil vergentes, in medio apicibus, externe minimis foliis viridibus ambientibus, *siliquis* succedentibus duabus viciis longioribus, nondum maturis.

Hæc eadem est fortè cum *Hesperide* alpina maiore aut valdè similis, quæ *Lugduni* & *Genève* nobis provenit in hortis nostris, in qua *siliquæ* plurimæ *Leucolorum* ac *Hesperidum*, sex septemque viciis longæ, latiusculæ, compressæ, glabræ, semine compresso, laxiusculo & penè quadrato.

In *Icone* nostra *folia* prima nimis angusta & acuta depicta sunt.

De hæc fortè hæc tradit *Lobel.* *Communes* inter *Sinapi*, *Buniadem* & *Thlaspi* figuram & viream habet. Provenit ea non procul *Magdalenz* sano, & caulibus illis celsissimis *Gallo* provincie, floresque Augusto promit luteos, *Erysimi*, nec *siliquas* dispares: in gracilibus ramis ad summum & imum unà è radice, digitum crassa, fibrosa, pedem longa *Rapistræ* folia, *Thlaspi* aut *Drabæ*, leniter laciniata, albida & hirsuta, sapore *Erysimi*, aut *Buniadis* *Barbareæ*.

An *Lob. & Pena* *Adu. Icon. Plant. & Hist. Lugd. Sinapi & Thlaspi media* *Provincialis* *plan-*

C. Bauh. Phyt. Draba 4. Erysimi flore & siliquis *Aduers. Sinapi & Thlaspi media. Fratri I. Bauhino* *Hesperis alpina:*

LVNARIA MAIOR SILIQVA ROTUNDIORE.

Vibonæ caule assurgit bicubitali & tricubitali, in ramos diviso, latis crasso, colore glauco aut rubente, hirsuto: *folia* *Viticæ*, maiora aliquando duplò & triplò, hirsuta, serrata, opposita interdum, aliàs ad ramulorum propagationes singularia, sapore oleraceo: ramis insident *flores* multi simul iuncti, ut in *Brassica* vulgari, pulchrè rubentes aut carneo colore præditi, striati, odore debili, vngue intus conspicuo & albicante, extri enim flos totus rubens, sine villo vnguis vestigio: *stamina* quatuor viscentia apicibus luteis seu chloris: hæc omnia excipit *calyculus* oblongus phœniceus è quatuor foliolis, duobus maioribus, totidem minoribus compositus: *siliquæ* oblongæ, latæ, figura suavi, compressæ, filum summa parte emittentes argenteæ bracteolæ exteriores vtrinque laminas intercedente: *semina* tria aut quatuor orbiculata, compressa: *radix* strumosa seu glandulosa.

An *Cordo Obs. Sylva. herba hederaceis* aut *Cameraceis* foliis. Ibi annotatum, *Lunaria Græca* fortè.

Gesner. hort. Lunaria Græca rotunda & longa *Ollingeri*. Rotundam, inquit, intelligo, cuius *siliquæ* sunt rotundæ: longam verò *siliquis* longis. Nasceitur in montibus quibusdam, cum alibetum *Helvetiorum* circa *Glaronam* & *Curiam*: species dux sunt, una floribus inodoris: altera odoratis: & hæc quidem editionibus tantum locis, nullo alio discrimine. Facile semine prodit, duratque in hortis postis: & folia [*Viola* nigra

hinc vocant *Leucoium Syriacum*, Pannonica si-
milis, sed crassior & minus procera, siliquis rotun-
dis, & quasi geniculatis. Item *Leucoium Syriacum*,
rectius *Hesperis Syriaca*.

Clus. Hist. in fol. *Hesperis Syriaca*.

t. 1. 2.

C. Bauh. Phyt. *Viola matronalis* siue *Hesperis*
peregrina siliquis geniculatis. Camer. *Hesperis*
Synaca. Huius iconem proponit, & aliam etiam
Hesperidis Syriacae nomine *Tripoli* sponte pro-
uenientis addidit: verum non videntur diuersae,
ut & ipsemet Camerarius innuere videtur. In hor-
to Cl. D. D. Felicis Plateri legimus.

Locus &
Tempus

Mense Iulio florentem vidimus & siliquas ha-
bentem *Pfotzhemia Marchionatus* in horto D.
Grieningeri *Pharmacopaei* insignis. Obseruaui-
mus etiam in Ducatus *Virtemb. Grentzen* in
horto D. Braun praefecti pagi. In *Syria* maritima
crescit, teste Clusio, cuius semen in *Italiam* alla-
tum deinde *Viennam* missum plantas produxit.
Semen maturescere non potuit, quia serius flo-
ruerunt. Altero etiā anno perire solet eius radix.

HESPERIS SYRIACA ALIA

Descriptio

Hanc *Tripoli* spontaneam iuuenit *Rauuol-*
fius, & *Camerarius* quoque aridae plantae
fecit participem. Videtur autem ob locos natales
& exiccationem nonnihil strigosius praecedente,
alioquin parum diuersa.

Camer. Icon. *Hesperis Syriaca*, siue *Leucoium*
marinum D. *Rauuolfii*. C. Bauh. Phyt. Non vi-
detur diuersa à praecedenti *Syriaca*.

LEUCOIVM MARITIVM latifolium flore caeruleo purpurante.

Descriptio



Alterum
Leucoium
maritū quod
alunt horti
quidam *Belgii*
natis mari-
mis natalitia,
non ita diuer-
sis est foliis, sed
lacionibus, hur-
sutionibus: flo-
res caeruleo-pur-
pureos in pal-
maribus & tes-
quipalmaribus
coliculis: semen
in siliquis mi-
noribus muled
Leucoii lutei.

Lobel. Obs.
[cuius & de-
scriptio est]

Leucoium maritimum alterum latifolium, Icon.
Plant. Purpureo-violaceum.

Hist. Lugd. *Leucoium maritimum* alterum lati-
folium Lobelii.

C. Bauh. Phyt. *Leucoium* 6, siue *maritimum* la-
tifolium alterum.

Tabern. Hist. & Icon. *Leucoium maritimum* ce-
ruleo-purpureum, *Blau purpur braun / Gros*
Meer veulen.

Gerard. *Leucoium maritimum latifolium*, *Broad*
loafed Sea stock Giloflower.

HESPERIS ALPINA SIVE MYRALIS minor repens

Radix Alpinae *Hesperidis* serpit oblique, sum-
mo fere caespite harena, fibras crebras lu-
binde demittens, capita etiam plura habet: folia
in orbem multa per humum sparguntur, ex an-
gusto principio sensim latescencia, sinuata, &
lerrata, candicantia, & hieme quaedam rubentia,

Descriptio



pilosa, *Barba-*
rae muraria
foliis acceden-
tia, sapore acri-
pradita, at quae
per caules cer-
nuntur, lata ba-
si eos comple-
duntur, non
minus iam di-
ctis dentata:
ceterum flores
in dodrantalis
caulis ramulo-
rumque fasti-
gio multi co-
ceruati albican-
tes, quatuor
foliis constat,
quos longa se-
rie sequuntur
siliqua, duas
trifue uncias

longae, aliis fere sesquipalmates, angustae, com-
pressae, in quibus duplex, interuentu membranae,
versus seminum foliaceorum ruforum, saporis
actis.

Noster pictor non expressit pro arbitrio ico-
nem nostram potissimum radicem repentem.

Clus. Pann. & Hist. in fol. *Draba altera*, siue
1. nulla ab *Alphonso Pancio* *Leucoii montani*
nomine. *Draba* foliis foliorum formā & colore
similis, sed cito sapore inuid, deinde acri: ramu-
lis serpentibus.

C. Bauh. Phyt. *Draba* 1. siue alba siliquosa. *Draba*
1. Clusii. *Draba* 3. siue alba siliquosa repens
Lob. Obs. app. 461. & Icon. p. 261. tom. 1. Fratell.
Ioh. Bauhino *Hesperis alpina minor*.

Hist. Lugd. *Eruca muralis* *Herbariorum*, sapore
primo satuo, tandem subacri & mordaci.

Hesperidem alpinam collegi Septembri in-
cipibus inter *Clarauallim* & *Ran*: Semen etiam ma-
tutum in muris horti *Castelli Clarauallii*:
vidi etiam *Salinis* in muris horti *Nobilis*
Vanferrant minorem florentem Aprilis. *Frans*
Casparus Bauhinus misit *Basileā* repentem in
monte *Blaumen*. *Legduni* nobis prouenit in
horto nostro, *Gentuz* etiam florbat Ianuario &
Aprilis ac Nouembri. Florens *Maio* copiose in
muris *S. Ursanz*, vnde transtuli in hortum *III. B.*
C. & floruit Martio. In parietinis, murorumque
rimis & inter saxa nasci tradit Hist. Lugd. Inue-
nit in *Tauro monte* *Clusius*: meminit & *Ferrariā*
in *Belgicam* ei missam: Floret Aprilis.

Locus &
Tempus

HESPERIDI ALPINE SIVE MYRALIS affinis *Draba succulenta*.

Frequenter etiam ramis constat, ex quo
dem rariis predonantibus, quibus deinde in
caput

Descriptio



capus extuberantibus: ex quo aliquot folia quasi in orbem disposita prodeunt, crassa, succi plena, atrā viriditate splendentia, Auriculæ vili flore carnei coloris & folii magnitudine ac forma ferme respondentia, sed nonnihil in lateribus dentata, acris gustu, & illicd lingua vellicante: ex horum medio pedalis aut ma-

ior exteant, gracilis, quem per intervalla ambiunt & amplectuntur folia superioribus minora & ad petiolum latiora: flores spicæ instar supremum caulem ambiunt, ut in Priore, & quatuor albis foliolis constant quibus succedunt teretia & oblonga cornicula, duplici ordine, rufum, pusillum, & planum semen continentia: radix tenuis & repens latè sese diffundit, & novas plantas singulis annis producit, vivax, & totā hyeme vivens.

Clusius & Lobelius eandem habent iconem, verū an de eadem planta scribant asserere non audemus, diximus autem iconem Clusii & Lobelii non malè exprimere nostram Hesperidem alpinam siue murariam, verū Clusii descriptionem non respondere hist. Lugd.

Arabis seu Draba altera Penæ & Lobelii.

Clus. Pann. & hist. Draba tertia succulento folio.

Crescit, inquit Clusius, in declivi montis Hernalben, supra Zeehof, villam Cœnobii Gamin-genfis, ubi serò floret: at in hortos translata, maturius, cum præcedente, nonnunquam etiam ante hiemem. Luxuriat in hortis ubi semel sata. Lobel.

HESPERIDI ALPINÆ, MURIARIÆVE similis surrecta & magna.



Tom. II

IN montibus Inter S. Hippolytum & Mesche mensis Aprilis sine observavi plantam trium pedum cubitorum, ex radice crassiuscula fibrosa, sapore aliquantulum acris, exornantur aliquot caules crassi, hirsuti, recti, superne ramulos rectos alternatim inter folia proferentes: folia iuxta terram ex crasso pedi-

culo dodrantalia ad Hesperidem vulgarem ac etiam murariam accedentia, sinuata, & nonnihil laciniata, Drabæ modò utrinque hirsuta, alternatim lato principio caulem penè amplectentia: breviora præcedentibus, odore accedente ad Lepidium Pauli, sapore amaricante: in extremis ramulis multi flores cum quatuor foliolis albis ad luteum nonnihil vergentes, in medio apicibus, externe minimis foliis viridibus ambientibus, siliquis succedentibus duabus uncias longioribus, nondum maturis.

Hæc eadem est fortè cum Hesperide alpina maiore aut valdè similis, quæ Lugduni & Genæv nobis provenit in hortis nostris, in qua siliquæ plurimæ Leucoiorum ac Hesperidum, sex septemque uncias longæ, latiusculæ, compressæ, glabræ, semine compresso, latiusculo & penè quadrato.

In Icone nostra folia prima nimis angusta & acuta depicta sunt.

De hac fortè hæc tradit Lobel. Communes inter Sinapi, Buniadem & Thlaspi figuram & vices habet. Provenit ea non procul Magdalenz sano, & caulibus illis celsissimis Galloprovinciæ, floresque Augusto promit luteos, Erysimi, nec siliquas dispares: in gracilibus ramis ad summum & imum unâ è radice, digitum crassa, fibrosa, pedem longa Rapistrii folia, Thlaspi aut Drabæ, leuiter laciniata, albida & hirsuta, sapore Erysimi, aut Buniadis Barbareæ.

An Lob. & Penæ Adv. Icon. Plant. & Histor. Lugd. Sinapi & Thlaspi media Provincialis plan-

ta. C. Bauh. Phyt. Draba 4. Erysimi flore & siliquis Aduerf. Sinapi & Thlaspi media. Fratri Io. Bauhino Hesperis alpina:

LVNARIA MAIOR SILIQVA ROTUNDIORE.

VLbonac caule assurgit bicubitali & tricubitali, in ramos diviso, latis crasso, colore glauco aut rubente, hirsuto: folia Vrticæ, maiora aliquando duplò & triplò, hirsuta, serrata, opposita interdum, aliàs ad ramulorum propagationes singularia, sapore oleraceo: ramis insident flores multi simul iuncti, ut in Brassica vulgari, pulchrè rubentes aut carneo colore præditi, striati, odore debili, vngue intus conspicuo & albicante, extrinsecus enim flos totus rubens, sine villo vnguis vestigio: stamina quatuor virescentia apicibus luteis seu chloris: hæc omnia excipit calyculus oblongus phœniceus è quatuor foliolis, duobus maioribus, totidem minoribus compositus: siliquæ oblongæ, latæ, figura suavi, compressæ, flumina summa parte emittentes argentea bracteolâ exteriores utrinque lammas intercedente: semina tria aut quatuor orbiculata, compressa: radix strumosa seu glandulosa.

An Cordo Obs. sylv. herba hederaceis aut Cucumeraceis foliis. Ibi annotatum, Lunaria Græca fortè.

Gesner. hort. Lunaria Græca rotunda & longa Ollingeri. Rotundam, inquit, intelligo, cuius siliquæ sunt rotundæ: longam verò siliquis longis. Nascitur in montibus quibusdam, cum alibetum Helvetiorum circa Glaronam & Curiam: species duæ sunt, una floribus inodoris: altera odoratis: & hæc quidem editionibus tantum locis, nullo alio discrimine. Facile semine prodit, duratque in hortis nostris: & folia [Viola nigra]

fecit similia maiora] per hyemem retinet. Anno secundo caulem fundit (& circumquaque fruticans latiore solo ad tres cubitos aurgit) cum floribus & siliquis latis, argentei nitoris cum maturerint. In ea laetate Luna faciem noctu representari aiunt : inde nomen. Quo Veteres nomine plantam hanc dixerint, nondum constat, herbarii quidam *Bolbonac*, alii *Bulbonach* nuncupant, nescio quâ dialectico aut significatione, Helli *flitteren* vocant. Græca vnde sit cognominata nescio, nisi aut nomen aut res è Græcia in Italiam fortè primùm illata sit. Semen latum, compressum, rufum, & cum aliqua amaritudine acerrimum est: vnde Thlaspi generibus adnumeratum, & Thlaspi montanum appellatum: ad indicandum simul formam, siliquæ præsertim ac seminis, facultates & natales, poterit

Thlaspi
montanum



& Lunare cognominati. Accedit sententia mea Dodon. qui Thlaspi, præsertim Crateuz, hoc esse putat.

Thlaspium

Non esse Thlaspi Crateuz contendunt in Aduers. Pena & Lobel. his verbis : Lunaria vulgò nuncupata Raphanitis à nonnullis Crateuz Thlaspi credebatur, sed eius acrimonia ad ischiadicos multò inefficacior : Et rursus alibi : Bulbosa Ioliata, Officinarum Bolbonac, Lunaria Græca Recentiorum, non est Armoracia, siue sylu. Raphanus Diofca. aut Thlaspi latifolium Crateuz.

Lunaria maior, inquit Camer. hort. Bolbonac aliorum, flore cæruleo vel purpureo, Thlaspi Crateuz Dodonzi.

Tabern. Icon. Viola Lunaris. 1. Monneyel. Schv. Lunaria Græca Recentiorum, Silber blumen/flitteren.

Hesperis.
Viola Bul.
bonac.
Lunaria
Raphan.

Hist. Lugd. Viola latifolia. Hesperidibus affinis est (inquit Adr. Spieg.) ea quam Violam latifoliam, alio nomine Bulbonacam, & Lunariam Raphanitim vocant : item quam Lunariam odoratam & regiam & Græcam. Vtrique folia lata sunt : sed Bulbonacæ asperiora Raphani modo, & crenata. Græcæ verò molliora & per ambitum serrata. Vtrique flos quoque Leucoli quadrisolius, purpureus, aut subcæruleus : sed fructus latus, foliaceus, serèque rotundus.

C. Bauh. phyt. Lunaria 1. siue maior siliquâ rotundâ : varians floribus purpureis & subcæruleis. Lunaria 2. siue maior altera Dodon. Lat. minor præcedenti & flore albo.

Ignota.

Crescere copiosè in saltibus Thuringiæ siluæ testis est Camerac. hort. In Silesiæ autem hortis Mâio & Iunio florere, Schvvenckfeldius. Lunariam maiorem in Asia VVarvillæ in orto vidit cum siliquis rotundis, semine maturo : Patam in orto Triuesani. Veronæ in orto Domini Alexandri Serrati Medici : Ferrariæ in Mona-

stero S. Dominici à P. Angeli Borentem Martini Bononiæ in orto di S. Sator al burgo S. Catharina. Lunariam maiorem flore purpureo cum quibusdam stius albis. Batilæ in hortis, Florentiæ in orto Nicolai Ferrarientis florentem Aprilis : Lugduni habui in orto Mâio mense florentem & siliquas præfurentem : Montbelgardi in orto Illæus Cellabundat & seipsam suo semine propagat, primo anno non fert caules nec flores : secundo vbi semen maturuit perit.

Calido acrisque & amaro, vt tradit Lobel. gustu est, præsertim semina. sed tamen radices acerrimas, vt Rapuntia, manduntur, nec perinde sunt acres, vt Crateuz Thlaspi radices traduntur. Absorbet modicè, calidè, vnam et, vt Rapunculus. Semen Tritum cum aquis appropriatis exhiberi Epilepticis scribit Schvvenckfeldius.

Vires.

LVNARIA MAIOR SILIQUA LONGIORE.

Atis hæc est Lunaria præcedentis foliis, serratis, acuminatisque : flos consimilis purpureus : at quæ cum excipit siliqua, oblonga est, & quæ prædictæ Lunariæ siliquis latitudine multum cedit, binis vtrunque membranis mediam argenteam spontè per seminis maturitatem relinquentibus.

Delicatis



Huius speciem cum siliquis longis ostendit Dominus Agerius cum hac inscriptione. Viola latifolia odorata foliis exquisitè rotundis. Vlmæ proueniens Viola Lunaris seu latifolia 1. Tabern. Hæc sanè videtur differre à præcedenti, folia Tiliam maiorem expriment, ac mihi laxiora videntur quam cæterarum.

Lunaria folio rotundiore siliqua longiore

etiam demonstravit aliam titulo Violæ latifolia non exquisitè rotundæ sed oblongæ : illi sanè folium multò longius Lunæ modo, qualis autem siliqua sit mihi non constat, videtur tamen diuersa ab ea cui nomen indidit à siliqua rotundiore.

Lunaria folio longiore

Lob. Icon. Lunaria Raphanitis, siue Bolbonac radice rediuita p. 396.

C. Bauh. phyt. Lunaria 3. siue maior siliqua oblonga.

Tabern. Icon. & Hist. Viola Lunaris. 2. Monneyel 2. Violæ Lunariæ. 1. radix.

Gesner. hort. & de Lunariis, Lunaria longa siliquis longis. Existimo ea quæ ex Gesnero capite de Lunaria maiore siliqua rotundiore exactissimè huc referenda esse.

Schv. Lunaria Græca perenni radice, waldes vefelen, Sile.

Clusii fol. Viola latifolia. Lunaria odorata. Camer. hort. Lunaria maior alia flore albicante odorato, perennis Hgluensis, vbi quoque copiosè prouenit.

Thal.

Thal. Marc. Lunaria Græca, Viola latifolia filiquis non orbiculari ambitu circumscriptis, sed oblongioribus: scribit apud eundem Camerar. perenni esse radice, & floribus albicantibus, odoratis.

Locus & tempus

In monte Salenz, non longè à Geneua abundat cum longis filiquis: translata in hortos hinc in peterebat, & virens Ianuario, florebat Maio. In monte circa Lacum Sehen Abbatia insignis nobilium Dominarum quarum sum Medicus, reperi cum filiquis Augusto. Spitz anno 1595. Iunii 2. D. Teugenagel mihi denominavit & demonstravit Lunariam, quam vocat perpetuam radice, floribus caeruleis, filiquis longis. Argentinx in horto Friderici Meier vidi filiqua longa Octobri. Basilex in horto Dam. Zvvingeri Septembri eandem oblectauit. In montanis siluis Austriæ & Styriæ vicinarumque siluosis locis, atque etiam in Pannonia interamni, autore Clusio, spontè magna copia provenit.

Vires.

Semen abstergit & urinas prouocat. Quidam in Heluetis Chirurgus ex Lunariæ perennis contusis foliis & Siniculis parabat vnguentum Venerarum non contemnendum. Pulvis seminis amarissimi, cum aqua appropriata exhibetur in Epilepsia, Camer.

ALLIARIA.

CAP. XV.

Descriptio



EX radica tenui, lignosa, alba, Allium obulente, caules promit cubitales & scilicet cubitales, tenues, subhirsuti: folia primùm rotunda, Hederæ torrens modo: mox nonnullum acumen assequuntur, serrata, sapore & odore Allii, mitiore: ex foliorum alis ramuli erumpunt, in quibus stoculi multi albi.

di, quatuor foliolis constantes, in quorum medio apices ex viridi flauescetes: semen in filiquis longis angulosis, nigrum, oblongum.

Ruell. & Fuch. Alliaris & Alliaria. Sunt inquit qui putent Scordotum hanc esse, falsi quodam odoris cognatione: siquidem Scordotis foliis est similitudine Quercus. Alliaria verò frondibus Vitis modo simbriatis: Illa quadrangulo caule, hæc rotundo: illa flore subrubro, hæc luteo: Illa tantum subolet Allium, hæc ita repræsentat, ut iusto Allii odore nares impleat.

Trago. pingenti & describenti dicitur Thlaspidium secundum Crateuz, videtur posse dici Cornuta Thlaspi species.

Autor Pandectarum Ranam marinam, Alliarium, & Pedem Asinorum vocat.

Anguill. Rima Maria.

Lonic. vulgò Alliaria, Alliaris, Thlaspi Cornutum.

Gesner. hort. Alliastrum vel Alliastris Recentiorum.

Dodon. Gal. & Lat. Alliaria quorundam Scordotis, non tamen vera, quæ etiam Scordium dicitur. Quærun Adu. Lobel. & Penz. Num Cista Galli Herbariorum sit *Arab. Scordotum*? an num potius Alliaria Recentiorum? & postea Alliaris, Pes Asini Pandectarum, an Alektorolophos Plinii?

Matth. Lacun. Lob. Obf. & Icon. Plant. Camer. hort. & Epit. Matth. Tabern. Cast. Hort. Lusit. Alliaria. C. Bauh. Phyt. foliolatissimo & subrotundo. Camer. apud Matth. Germ. Alliaris.

Alliaria Lat. Germ. knoblauch fräut / leuchel, leuchel fräut / Salzfräut. Belg. loock / Sonder loock / Gall. L'herbe des aux, Alliaire: It. Alliaria. Boh. Gesnerfoma bylina. Alliaria autem dubio procul dicta, quod folia digitis comminuta Allium redolent, seu Porrum sectium cum Nasturtio.

Alliarium copiosè florentem vidi Monsp. mensis Martio & Basilex. Genevæ virentem Decembris versus Coloniæ, & Februarii principio, quæ utur Saluz, florentem mensis Martio in colle iuxta Rhodanum, & Maio filiquas ferentem Iunio cum semine maturo. Montbelgardi passim spontè provenit etiam in horto E. C. virens Februarii. Obseruavi Bononiæ & Patavii mensis Martio. In Ducatu Vvitemb. non longè à fonte & Balneo mirabili circa pagum Boll & Eychelberg / semine maturo Augusto.

Urinam cit, teste Ruellio, si recens in potu teratur. Sicca in vino coquitur, ad serpentium mortus, & venena omnia efficax. In rofionibus stomachi, dysenteria, contumacibus urinis, ex multa duobus denatis datur bibenda. Lentam pectoris crassitiem digerit. Contra veterè tussim ex resina & melle sicca lingitur. Longis præcordiorum inflammationibus cerato collecta prodest. Podagras acri aceto circumlitæ mulcet. Imposita mentes excit. Vetera vlcera purgat & ad cicatricem ex melle perducit. Recentia quoque vulnera cogit farinx conspersus. Excrefcentia in corpore compellit. Alliaria commodè totius succis, quæ enibamata seu intinctus vocant, adiungitur: debet autem aceto, sale, & gingibere condiri. Eiusmodi certè enibamata, quæ hoc pacto ut diximus ex Alliaria conficiuntur, non sunt nimis feruentia, & Tragi quidem iudicio gratiora ac etiam utiliora his quæ ex Sinapi fiunt, multò tamen illis mitior & usu commodior existit. Vis plantæ huic à Matth. assignatur calfactoria & delicatoria, verum non adeo vehemens, ut in Allio. Attamen hinc certè colligi potest, quod ea crassos humores extenuare, & lentos incidere valet. Semen emplastri modo impositum, vulæque admotum mulieres vteri strangulatu oppressas liberat, & excitat. Semen tritum, naribusque impositum sternutamenta excitare cerebrumque purgare Tab. prodit. Herbam in oleo & aqua decoctam potè Asthmaticis subuenire scribit Cam. Sunt, Dod. testimonio, qui folia enematis incoquant, quæ vel ad coli, vel nephriticos dolores iniiciuntur: in quibus non modò flatus insigniter discutere, sed ex calculo dolores mitigare ac lopi- re feruntur. Excalfacit autem & resiccat secundo ordine intenso aut tertio remisso. Alliaria singularem vim ac proprietatem, quæ putredini aduersatur, habet. Eademque vlcera putrida ac sordida abstergit & mundificat, minori tamen cum efficacia quàm verum Scordium, Mirum igitur nemini videri debet, si nonnulli antiquorum Arabum præcipuè pro Scordio vero Alliarium sub-

Alliastrum.
Scordotum.
Cista Galli.
Pes Asini.
Alektorolophos.

Nomina
linguarum

Locus &
Tempus.

Vires &
usus.

Thlaspi-
dium Cra-
teuz
Rima ma-
rina
Pes Asini
Rima Ma-
rina

Locus.

Colligenda
tempus.Succi pre-
paratio &
reservatio

Sal ex ea

Vfus

stiterint. Causa fortè fuerit quodd Scordium in illis regionibus minimè creuerit, neque nisi sic- cum & vt plurimum obsoletum haberi potuerit, & Allaria apud ipsos prodierit. Sed quia in exi- cata herba parum facultatis & virium remanet, ideo ipsi in fine Aprilis aut ineunte Maio col- ligi, & postquam per diem vnum in umbra exi- cata fuerit, minutim incidi contundique in mor- tario, & prælo succus exprimi solet, qui in vitreis ampullis, superinfuso pauco Oleo, etiam ad tres vsque annos reservatur. Idem quoque lartagini succus insulus lento igne inspissari potest & ad eundem vsum in multos annos reservari. Magma deinde exiccatum & in cinerem reductum, aut ex eo Sal extractum maximo cum fructu mundi- ficatus admiscetur. Succus verò sine simplex ins- pissatus vnguents cataplasmatibusque inditur ad Gangranam aliaque vlcera, putrida, sordida ac maligna, vt in tractatu Fabricii Hildani de Gāgrana & Spacelo videre est: Abstergit enim, vt antea monitum, mundificat & putredini resistit, parumque à vero Scordio discrepat.

SISYMBRIUM CARDAMINE, SIVE NA- sturtium aquaticum.

Descriptio

Eruca facie folia profert viridia & atroviren- tia, sapore hortensis Nasturtii, mitiore: cau- tes prociui ferè, striati, concavi, ex vi- ridi rubentes nonnihil: flo- res quadrifoli, albi, apicibus lateis: siliqua oblonga, be- ne habitæ: in quibus exigua semina, sulua, gustu acris: radicis vicem suppleat, ca- pillares fibræ candidæ, quas à caulibus in- nam demittit.

Nasturtium

Senecio



Variat. in- quis C. Bauh. hæc prout hu- midioribus, a-

ridioribusque locis enascitur: illud foliis ferè Terebinthini magnitudine: hoc triplo minori- bus, quamuis viribus non discrepent: sic & te- nuioribus foliis & simplicibus cauliculis locis siccis reperitur.

Scordium in 1727, teste Dioscoride, sunt qui Car- daminen, alii Sion etiam appellant. Est v. her- ba aquatica, quæ in iisdem quibus Sion locis pro- uenit, Cardamine ideo nonnullis dicta, quodd gu- stu Cardamum, id est Nasturtium, repræsentet. Folia primum rotunda ptodeunt: augeſcentia verò Erucæ modo finduntur.

Plinio (qui cum Sisymbrio priore Dioscori- confundit, vt videre est u. n. g. lib. 28.) vocatur Si- symbrium in riguis natum, simile Nasturtio. Pas- sim verò ab omnibus hæc planta traditur.

Ruellius magnâ confidentiâ scribit neminem negaturum fore Sisymbrium Dioscoridis, esse Nasturtium aquaticum Officinarum & vulgi Crescionem.

Cordus tradit Sisymbrium hoc alterum Dio- scoridis solo nomine priori simile. Nam Nastur-

ti) potius quàm illius speciem esse. Quapropter etiam à Græcis *κρησίων* Nasturtiarum & à Ger- man. *Brün fress* vocari, monèque Recentiores maximo errore Senecionem appellare.

Nasturtium aquaticum (referente Trago, Germ. & Lat. lib. 1. cap. 26.) *κρησίων* quidam appellant, quamuis ad pratense videatur hæc ap- pellatio referenda. Iacob. Manlius Nasturtium agreste, Saturagi, Senation, & Lepidion vnius & eundem plantæ nomenclaturas esse censet. Non defunt (inter quos Simon Ianuens is est) qui Na- sturtium hoc Thipsiam Indam, Scellabram, Ozi- mū, Carmenū, Hoalmara, nūcupatā velint. Lom- bardi (teste Mālio) Crisonū nomināt. Mesue Scif- labram, Ozimum maius, Serapioni cap. 73. Ozi- mum carmenum dicitur. Sunt qui Nasturtium a- quaticum, Nasturtiarum Cardaminem, Silym- brium, Sium & Lauer appellent. Tragus autem eorum sententiæ subscribit, qui Silymbrium alte- rum Dioscoridis, Nasturtium aquaticum aut cer- tē eam plantam esse affirmant, quam is Sion non odoratum, Cratenas autem *κρησίων*, & Plinius Thym- brum appellauit, quæ sit vt Sion existimet. Sed malè. Est enim Sion ipsius non odoratum, Ana- gallis aquatica, de qua suo agemus loco.

Authoribus Monachis, alterum Sisymbrium à Dioscoride descriptum quod est aquaticum, quoddque vulgè *Crescionem* & *Cressi-nem*, & Na- sturtium aquaticum nominant, alii qui Cardami- nem quasi Nasturtiarum statuunt. Nonnul- li etiam [vt Dioscorides tradit] Sion.

Auicenna vocat illud Pupillam oculi, & Eruc- cam aquæ, & Apium aquæ, & facit de eo caput quodd est de pupilla oculi. Sed existimauit idem esse cum Sio: quia fecit aliud caput, quodd in- g- bitur de Summo, vbi *κρησίων* pro Summo ver- ut Sium, & pro pupilla oculi *Ch. realhain*: vbi- pea quodd est pupilla oculi: Et sequitur: existens in aquis stantibus, & in ipso est bonus odor, & dicitur in cap. de Cif. & c. In cap. de Cif. autem scribendum *Ch. realhain* præfatum, quodd est Pupilla oculi. Ergo ipsa duo capita sunt vnum & idem, vt legenti non est dubium.

Quibusdam hoc Sisymbrium aquaticum Eul- sò Lauer dicitur.

Errant Simon Ianuens is & Pandeſtarius scri- bentes Crescionem esse Diosc. Senecionem.

Ioubert. in Pract. sua vocat Senecionem aqua- ticam.

Fallit dicit eos Matth. qui pro Sio herbam *cref- cione*, vulgè vocatam, tam scilicet dulcem, quàm acrem, ac subamaram, in medicamentis vsur- pant. Quippe quodd ea non alia sit planta quàm Sisymbrium aquaticum, quodd, Dioscoride teste, alii Cardaminum, alii Sium appellent. Picu- ram huius Sisymbrii, vel Nasturtii aquatici habet Matth. sine floribus & siliquis, huiusque summi- tates videtur appinxisse suo Sio. Camerarius ad histor. Germ. aliam posuit figuram cum siliquis & floribus.

Anguill. dicitur Vella (cuius mentio fit in lib. *Vella* *Gall.* *simpl.* *Gal.* attributis) nihil aliud esse, quàm Si- symbrium 2. à Fuchsio pictum, quodd est 2. Mat- thiohi, Sium Crateuz, Sisymbrium 2. Dioscoridis, quodd notum sit in Italia sub nomine Crescione) & Senecion Serapionis. Considerandum tamen in Nasturtio aquatico florem esse album, Vellæ verò tribui florem violaceum, vt monuimus cap. de Vella.

Dodon. Gall. *κρησίων*, Sium, Lauer, Gall. *Cresson* *a-* *quatique*. Lat. in fol. Nasturtium aquaticum. Sion Crateuz. Lonic. Sisymbrium, Cardamine Græco- rum

Tragus

Creso

Sion

Pupilla oculi

Senecio
quatica

Sium

Crescione
dulcis
ac sub-
amaraVella
Gall.
Sisymbrium
2. Diosc.

rum, Nasturtium aquaticum, Offic. Lacun. Sifymbrium tertium, Sifymbrium Cardaminon: Cronemb. de comp. med. Alterum Sifymbrii genus, Cardamina. Io. VVeyer. Nasturtium aquaticum maius. Marc. Hirsch. Nasturtium aquaticum minus, Græc. *σινυμβριον καρδαμινον*, dictum Scorbuto *ἀντισφοδρον*: Euch. Roessl. Nasturtium aquaticum, Senecion. Cæsalp. Sifymbrium aquaticum.

Hist. Lugd. Sifymbrium Cardamine 1. Cressio vulgaris Matthioli.

Nasturtium aquaticum.
Cræteuz Sion Erucæ folium, Nasturtium vulgi [sic enim Adu. Lob. & Penz inscribunt,] quia non perinde odorato est gustu, vt Dioscoridis Sion, minisque medicato & acri sapore, idcirco Plebecula Nasturtium aquaticum, Cræteuz etiam *σινυμβριον*, id est, parafaciendam dicit. Huius varietas duplex, vna minor æqualis fere Dioscoridis Sioni siue Laueri, cui conuictor, & similis cætenus, vt non raro rustici vitamus pro vtralibet accipiant. Hoc Sifymbrium ni fallor vocant alibi Adv. Cardaminem aquaticam & Betulam. Icon. Plant. p. 209. Tent. 150. Tabern. Hist. & Icon. Sifymbrium aquaticum, Græc. *σινυμβριον*. Lat. Sion aquaticum, Nasturtium aquaticum, Anagallis aquatica, Sifymbrium Cardamine, Lauer: Ital. *Gorgolestro*, Gall. *La Berle*. Hisp. *Rabacas*. Mirum lac. Theod. tot miscere nomina diuersarum plantarum: confundit cum Nasturtio aquatico nomina eius plantæ, quæ à plerisque Anagallis aquatica dicitur, quæ Germ. *Bachpungen*: & Gall. *la Berle* dicitur.

Gerardi cr.
Gerard. Sium minus, Smal water Cresse. Græc. *σινυμβριον*. Lat. Sium alterum & Sifymbrium, saporis est Nasturtii latui. Nesimus quid venerit in mentem Getardo vt poneret iconem Sifymbrii aquatici. 1. Tabern. cum dictis nominibus Tabern. quod deterius, cum mox tribuere nomina Nasturtii aquatici Sio medio siue Pastinacæ palustri Tabern. ac id denominare malè Nasturtium & Sifymbrium aquaticum.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium aquaticum primum *σινυμβριον* aut *σινυμβριον* Diosc. & Plinii forte lib. 20. cap. 21.

Nomina in quatuor.
σινυμβριον Græc. seu *σινυμβριον* Diosc. Sifymbrium, Cardamine, siue Nasturtium aquaticum: Germ. *Bruntfress* oder *wasser fress*: Belg. *waterkerse*: Gal. *Cressin*. Ital. *Sifenbro aquatico* & *Cressin*. Hisp. *Berros*, aut *Agriris*. Angl. *Water cress*. Boh. *Kiericha potocuy*.

Locus & tempus.
Sifymbrio montes plerique scatent, inquit Plinius, sicut in Thracia, vbi aquæ deserunt ex iis auulso ramis, feruntque. Item Sicyone ex iuis montibus, & Athenis ex Hymetro. Simili modo & Sifymbrium ferunt. Læssimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. In fontibus calidioribus aquæ supernatare, ac Maio mense ingruente, sterculos admodum exiguos & candidos proferre, testatur Tragus. Sifymbrium Cardamine siue Nasturtium aquaticum abundat circa Geneuam, vt in *plain palais*, vbi tota hieme vires iuxta fontem, ac eo in acetarius vritur. Obseruauit in Italia inter Veronam & Castelfranc. Montipeli vidi cum flore Martio mense. Montibelgardi multis in locis provenit ac tota hieme vires, floret Iulio & Augusto.

Virga.
Excalefacit, autore. Diosc. vrinas mouet, accrudum etiam efficit. Purgat etiam lentigines ac vitia cutis in facie à solis ardore contracta, nocte tota impositum & in utroque detractum. Efficax est teste Plinio, aduersus aculeata animalia, vt sunt crabrones & similia. Sedat capitis dolorem:

Item Epiphoras. Alii panem addunt, alii per se decoquant in vino. Sanat & epinyctidas, cutisque vitia in facie mulierum intra quartum diem, nobis impositum, diebusque detractum. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cohibet, siue in cibo sumptum, siue in succo potum. Non edendum grauidis, nisi mortuo conceptu. Quippe etiam impositum euicit. Mouet vrinam cum vino potam. Quos vigilare opus sit, excitat infusum capiti cum aceto.

Galenus Sifymbrium Cardaminem dictum, sic cum quidem, tertii ordinis calefacientium ac siccantium esse dicit: humidum verò & viride secundi.

Cum Raphano & Petroselini radicibus ferto, ex albo meraco & butyro calefacto, calidoque pubi admoto, vrinas educit ac trahit. Matth. Sincipiti illito veterinosos iuuat & præsertim foliorum succo. Quod Plinius scripsit: quos vigilare opus sit excitat infusum capiti, cum aceto: Matthiolus ait succum cum aceto naribus impositum id facere: dicit ex sententia Plinii vitandum grauidis, quia nimidum pellat. Plebecula vt tradit Lobelius in quadragesimo veris ieiunio multum in acetario vorat, ac potionibus ad calculum accipit, nec malè cedit. Hæc herba ait Camer. in hist. Matth. est ex us, quatum vitis ius est in obstructionibus & putredine hepatis & lienis, idèd non solum hydopicis valde utilis, sed multo magis illi qui laborant Scorbuto morbo vulgari Saxonibus & Septentrionalibus, si per aliquot dies in potu detur.

SISYMBRIUM CARDAMINE, SIVE
Nasturtium aquaticum flore
maiore clatius.



Nasturtium Descriptio
hoc aquaticum caule habet infirmos graciles, canaliculatos & veluti tortos, cubitales & bicubitales, in ramulos aliquot circa summitatem diuisos: in quorum extremis flores simul multi vt in Nasturtio pratensi, eademque fere magnitudine, pediculis semuncialibus & longioribus,

inodori, albi, quatuor foliis constantes, apicibus purpurantibus, stilo viridi: quibus succedunt filique longæ, in quibus semen: folia ex intervalis alternatim in caule & ramulis disposita odore & sapore Nasturtii vulgaris, nonnihil amaricante, alata, quorum singularia segmenta intervallo distantia, oblonga sunt & sinuata, Atriplicis sylvestris fere modo, infima verò vbi primum prodeunt, rotundiora, vt in Iberide Fuchsi. Radix repit, hinc inde demissis fibris tenuibus.

Figura nisi iam facta fuisset meliorem curassemus parandam: Hanc autem plantam propter

HISTORIAE PLANTARVM.

magnam similitudinem cum Sifymbrio, Sifymbrium & Nasturtium aquaticum vocamus. De hac fortè Thalin Harc. sequentibus agit: Sifymbrii alterius secunda species, seu Nasturtii aquaticum, amarum, priori omnino simile est: nisi quod grandius paulò assurgat, ac folia magis acuminata, longioraque habeat, & nigriora: saporis v. hementer amari, ita vt prioris modo in mensas recipi non possit, nisi decoctum, iunbus tamen prioribus abiectis tamdiu donec amaritudinem omnem deponat. Hoc autem antequam caulescat folia exhibet rotunda, ampla admodum, duarum ferè vnciarum. Ac utraque species non raro iisdem in locis simul & semel reperitur.

Sion alterum [sic vocante & scribente Camer. ad Histor. Geim. Matth.] abundat iuxta riuulos & locis humidis, potissimum in siluis, vbi vt plurimum reperit, caule tenero, laco, Nasturtii fontani tenuiore & delicatiore. Item in lib. Icon. siue Epit. Matth. Sium vulgare. Italis *Sio falso*. An Matth. intellexerit per Sion quod olim pro vero exhibebat & postea pro falso, eandem plantam quam Cameranus, consideratione opus habet. In icon. Matthioli flores minui, folia Apiorum modo diuisa. In icon. autem Camer. (quæ quoad folia potissimum, minus placet) non ita diuisa, flores etiam maiores: nos igitur quod antè diximus, Iconem Matth. figmentum ex diuersis plantis censemus. Hoc etiam hic notandum, descriptionem Camerarii posse conuenire cum Sifymbrio Cardamine minore.

An Trago Nasturtii aquatici genus. Sinapi sextum flore albo in lictoribus & ad fossam gustu subamaro.

An Gesner. hort. Nasturtium aliud rinale circa faxa ruorum Stein freysch. Alterum Nasturtii aquatici genus licetis diuulque & actius. Item in cat. Nasturtium sylu. *ed. de ar. z. c. m.*, Stein freysch.

An Lacunæ Sifymbrii aquatici alia species maior, vulgò dicta Borrazas, quæ reformidanda, quia aliquoties esu mortuæ.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium aquaticum flore maiore. Sium vulgare Matth. Sion Matthioli & Italarum Lobeli.

C. Bauh. apud Matth. Nasturtium aquaticum alterum, quod amarum est & vitæ cubiti altitudinem assurgit, foliis magis acuminatis, de quo Thalys.

Nasturtium prædictum obseruari copiosè ad riuos vallis Grimbachianæ, vbi fontes acidi, & apud fontem acidum Bibelschaw, aliquid amaritudinis & hirsutiei ibi obseruari. Vidi præterea inter Röslingam & Pfulingen in Ducatu Wirtembergico: inter Malsmünster & Raupack: inter Bessfordia & Daniutin ad ripam fluminis, florens Aprilis & Maio. Frater Casparus misit aliquando collectum Basileæ ad riuos: Semel etiam vidimus non longè à Molendino Montbelgardi iuxta flumen.

SISYMBRII CARDAMINES SPECIES quædam insipida.

Descriptio

Caulis multi cubitales ac maiores, striati, glabri, caui: folia dodrantalia alternata, foliolis constant in alæ propemodum formam digestis, alis aduersis, alis alternatis, ad communem costam geminà pinnà caules complexâ annexis, vncialibus, ad Sifymbrii Cardamines flore maiore fo-



lis accedentibus, sed Apiorum modo incisus, sapore nullo manifestus: *sistuli* per summos ramos conferti, parui, albi, apiculorum numero mucosi vili: quos *sistula* excipunt longæ, vna cum floribus insipida.

Hanc plantam C. Bauhinus collectam Patavii in monte Castelli, dedit nomine Velle Galeni Guilandino, fortè apud

Velle Galeni


Matthiolum hanc intelligit per Velum Anguill.

An Cæsalpino Accipitina altera similis primæ (sive Seriphio Germanico): foliis crassius diuisis, ad Nasturtium accedentibus, minoribus: rosculis candidis, siliquis prælongis & tenuibus. Descriptio Cæsalpini in quibusdam conuenit cum nostra planta.

Vidi in horto D. Friderici Meyer Argentiniæ, vbi pluribus annis ad verum durat, florens Maio, vt Montbelgardi in horto Il. E. C. vbi plantæ ui.

Locus & tempus

SERIPHIVM GERMANICVM SIVE SOPHIA quibusdam.



Alta est acubitus aut sesquicubitus, compluribus ramis fruticans, duris, lignosis, in alas multas dimisis, teretibus, subhirsutis: folia tenuiter incisa, Absinthii Pontici officinis dicti, sapore oleaceo, leui acrimonia prædita: *sistuli* crebri, parui luteoli, quadripartiti: quibus succedunt *sistula* vnciam circiter

Descriptio

longæ, sili inftar tenues, *seminum* loculos foris ostendentes: ipsum verò semen minutum, rufum: Radix alba.

De hoc Tragus. Nihil refert, inquit, siue species Absinthii sit, siue Abrotoni. Si Diosc. non diceret Seriphium in Egypto prouenire, existimarem esse nostram Wormfrast, ac hoc pro eo vterer, vocabo Seriphium Germanicum, & Lumbricorum herbam. In Bauaria & Hassia semen hoc Wollfamen appellant.

Gesner. hort. Nasturtii genus sylu. quod Wollfamen vocant.

C. Bauh.

C. Bauh. phyt. Nasturtium sylu. Monophyl-
lon latiore & angustiore folio reperitur, quare
duas figuras habet Tabern. Thaliætri nomine, sed
Diosc. non est: nec etiam Seriphium Absinthium
ut aliqui volunt.

Tabern. Icon. & Hist. Thaliætrum, Herba So-
phia latifolia, Sophienfrucht Mânlein. Thali-
ætrum, Herba Sophia angustifolia, Sophien-
frucht weiblîn. Hactenus aliqui Sophiam existi-
marunt verum Seriphium, aut Absinthium mari-
num, sed errarunt. Est verum Thaliætrum aut
Thaliætrum Antiquorum, herba Sophia quibus-
dam dicitur Eruca geratina.

A Dodon. Gall. Thaliætron, Thaliætron & So-
phia.

Aduers. describunt ac dicunt, siene Sophia
Chirurgorum Thaliætrum Diosc.: Sophia vulne-
raria apud Septentrionales. Paracelsus nullum
non vides, se ea percuraturos pollicetur, q. didi-
cerunt à Chirurgis practicis, qui ætate Guidonis
& Petri Argelate vixerunt. Quærit & Lob. Obl.
Eruca Geratina dicta Itælorum an Sophia Belga-
rum: an num potius Matthioli Erysimum? Idem
alibi figuram habet hæc scribens, Sophia Chirur-
gorum siene Thaliætrum Dioscor. Aduers. p. 329.
Thaliætrum Dodon. vel num sit Eruca gerati-
na Itælorum? Perperam Seriphium germanicum
Tragi, Fuchsi, & Cordi, Icon. plant. p. 735. Teut.
901.

Apud Fuchsin Hist. Lugd. impressa pictura est
sine descriptione cap. 123. hoc titulo: Nasturtium
sylvestre. Oportebat apud Fuchsin relinquere
figuram cap. de Absinthio, existimabat enim esse
Absinthium Seriphium quod apparet ex siliquis,
quas attribuit Seriphio, qua in re meritis repre-
hensus Matthiolo. Lonic. marm. fruct. welsa-
men / habichs fruct. Seriphium, vulgè Accipitri-
na, Officinis Santonicum, Ital. *Seme santo*, Gall.
more des vers, Hisp. *Semiente lumbrices*. Sophiam
describit & depingit si contulisset Santonicum
Officinatum, siue semen Gal. & Hispanicè ab hoc
denominatum, vidisset se confundere duas plan-
tas.

Hist. Lugd. huius figuram habet sub titulo
Thaliætri Dodonæi, confundens hoc cum Tha-
liætro Antiquorum. Casalp. Accipitrina vulgi.

Seriphium germanicum, quibusdam, siue So-
phiam copiosam, obseruauit Tubingæ & Stut-
gardie Ducatus VVirtembergici, vbi præceptor
meus Fuchsius vocabat Nasturtium sylu. Basileæ
etiam florens Iunio, propè S. Iacobum ptoueni-
re annotauit Frater C. Bauhinus: Semine matu-
ro Octobri abundè vidi iuxta Castellum Flori-
mont siue Flûmberg. Genæ multam & ex se-
mine decido videntem mense Martio. Mont-
belgardi est mihi sata in horto Ill. E. C. florens Iu-
lio. In Sabaudia frequens circa muros & rudera
vidit Gesnerus. In veteribus maceris, locis ru-
deratis, lapidosis, ac non raro arenosis, ac aliis
in multis exit, vbi semel nata singulis faciliè recur-
rit annis. A Iunio in Autumnum vsque, & qui-
dem particulatim, floret: semen interea perfici-
ens.

Facultate, eodem tradente, Sophia resiccans &
adstringens est, & particeps alicuius frigiditatis.
Semen huius assumptum ventris flares sistit:
aduersus dysenterias commendatur: sanguinis
profluvia reprimat. Casalp. ait: Semina laudas
ad lumbricos necandos, ab us puto, qui ad Seri-
phium referebant.

SIVM SEV LAVER MATTHIOLQ siliquosum.

CAP. XVII.

QVandoquidem Matthiolus videtur habere
Sium, quod fictitium, lubet particulatim om-
nia recensere quæ in suis in Diosc. Commentariis
annotauit.

Sium legitimum Diosc. in scaturientium fon-
tium riuis, quorum aquæ hyeme calent, æstate
verd frigesunt, plerumque nascitur, à nostrati-
bus Senensibus vulgè vocatur Gorgolestro, pin-
guis est planta, caule recto, foliis latis, in ambitu
serratis, Olusatro similibus, sed minorib' & odo-
ratis, florib' candidis, semine corniculis incluso.
Rari admodum sunt fontium riui, quib' aquaticum
Silymbrium innatet, qui Sium etiâ non habeant.
Plin. Sium cum aquatico Silymbrio confudisse vi-
detur: quod Sio Silymbrii aquatici vires assigna-
uerit, nominis fortasse communitate deceptus.
Nam Dioscor. testimonio Silymbrium hoc, quod
aliqui Cardaminam vocant, nonnullæ etiam Sium
vocant, vnde, quod fortè existimauerit Plinius
Sium & Cardaminam vnâ & eandem plantam
esse, vni tantum Sio vtriusque facultates reddidit.
Serapio Sium Senacion vocat: Græcis *σιον*: Lat.
Sium, Mauritan *Rot cathalmi* & *Isahamehanella*,
seu *Hamehanella*. Germ. *Wassermersch*: Hispani
Rabacas, Galli, Berle. Item in Epit. Lat. edita
anno 1571. eadem Icon cum sequenti titulo &
descriptione. Sium vulgare, Italis *Sio falso*, caulem
edit striatum, ramosum, inanem, tenerum, fragi-
lemque: folia gerit Apii, non insuauia, flosculos
in summitate albos, semine corniculis incluso,
paruo, minutoque: radice superuacanea. Pro-
uenit tantum in aquis decurrentibus, atque, ut
Sion verum exalfacientis est facultatis, quæ ta-
men imbecillior illi est, quàm legitimo Sio.

Matthiolus præter modè dictum Sium sili-
quosum, in sua Epitome iam dicta aliud proponit
vmbelliferum, cui tribuit nonnulla, quæ Siliquoso
Sio tribuebat. De vmbellifero autem suo capite
agemus: Sium siliquosum cum descriptione reti-
net Matthiolus anno 1583. in com. cum magn. fig.
quæquam icon sit nonnihil mutata, folia mi-
nùs rotunda, nec ita ordine serrata, præterea non
addit Sium vmbelliferum: in com. Ital. cum magn.
figuris 1568. icon est Sii siliquosi, sub titulo Sii
vulgaris: mutauit nonnihil descriptionem, omi-
sit enim quæ scripserat de corniculis, & aliam
præterea posuit iconem Sii vmbelliferi sub titulo
Sii veri. In Hist. Germ. 1563. cum magnis figuris,
Sii siliquosi iconem nonnihil mutatam habet, de
qua modè dictum, additis his nominibus *Bachp-
pungen/wasser merch*: Sium. Ital. *Sio & Gorgole-
stro*. Gall. Berle. Boh. *patoc vilt*. Descriptio eius
non conuenit cum iconem, tribuit enim in ea vmbel-
las. Nomen *Bachpungen* solet attribui Ana-
gallidi aquaticæ siue *Boccapungæ* quorundam:
Siliceat nobis candidè dicere quod sentimus, Ico-
nem cum corniculis ac siliquis saltam censemus,
& tres plantas per Matthiolum confundi, & Mat-
thiolo euenire quod reprehendit in Plinio &
aliis, & confundere Nasturtium aquaticum cum
Beccapungo & Sio vmbellifero.

Camer. ad epit. Matth. pro Sio vulgari Mat-
thioli ponit iconem nostri Silymbrii Cardamine
dicti floribus maioribus, & in Hist. Germ. pro

Locus &
tempus

Vires

Matthioli
errores plu-
res.

Camer. in Hist. Germ. pro Sio & wassermerck [omisso nomine Bachpungen.] & in *Epit.* pro Sio vero posuit Sium umbelliferum, de quo inter umbelliferas.

C. Bauh. apud Matth. pro Sio vulgari siue secundo, ponit iconem Tabern. quæ Matthioli iconem imitatur, verum eam plantam dicit esse Vel-lam Galeni, Anguillara, quæ nihil aliud est quam Nasturtium aquaticum vulgare, de quo ante egimus & postea agemus. Is præterea pro Sio vero iconem ex Tabernam. posuit quæ Sii umbelliferi, de quo dicto loco. Ad hæc quid Lobelius dicat, videamus: Sion Matthioli & Italorum, inquit in *Obs.* provenit riguis & rivulis, ubi Cardamine folio ad Nasturtium hortense & Cardamine accedente. Cauliculi pedales & interdum cubitales. Flores albi, & Cornicula Sii Cratæ, gustantur acres: Plurima hæc Taurinis Pedemontanis collum & montium rivulis, ubi collegimus cum Peto Rapalino pharmacopæo Triuerensi simplicium peritissimo. Hæc Lobelius. Sed quam plantam intelligat, nescimus, is habet iconem Matthioli, quam nos si citiam censemus, ut antehac dictum à nobis, nullam sanè nouimus plantam affinem Cardamine, cui folia sint Apii modo, qualia demonstrantur in iconem Sii siliquosi Matthioli. Nostri Sisymbrii Cardamines species insipida accedit quidem ad iconem Matthioli, si folia Apiorum essent diuisa: præterea destituitur sapore aliquo insigni aut manifesto.

SISYMBRIUM CARDAMINE HIRSVTUM
minus flore purpureo.

Descriptio



Radices proferunt multas capillatas, tenues, folia terè similia Nasturtio aquatico, mollia, pilis ornata, sapore Nasturtii: caules multos didrantes ac etiam minores, in principio nonnihil hirsutos, strobili paruos albos, quibus superueniunt siliquæ multæ longæ, tenues, in quibus tenue semen fuscum:

Reperi: etiam, ni fallor cum cubitalibus caulis, inferius rubentibus, striatis, hirsutis, maioribus etiam foliis videtur in humidioribus locis variare.

Nasturtium aquaticum
terre spec.
Considerandum an Thalius de hac scribat. Sisymbrii alterius seu Nasturtii aquatici tertia species, nullam habet figuram: offendi extra aquas, loco opaco, vltra Vualkenridam, radice candida, lignosa, crens plurimis oblecta: circa quam in terræ superficie densa, foliorum rotund. usulo-rum, nigro-umque prioris speciei paulo minorum, congeries late dispersitur, ex quorum medio caules oriuntur plures, cubitales sermè, folia oblongiucula conuinentes, ac flores frequentes,

candidos. Semina huic siliua sunt in oblongis gniculis strictisque siliulis. Hæc ille.

In peregrinatione Rhætica collegi plantulam quam nominabam Nasturtiolum, longa siliqua, folio rutaceo, florebat & siliquas longiusculas incipiebat proferre Iulio, duas uncias circiter alta, radicibus tenuibus fibrosis: quæ sanè planta an sit diuersa vel eadem cum præcedenti asserere non ausim. De ea autem hæc Frater Phyt. Nasturtium 8. siue alpinum maritimum 2. siliqua longa obseruauit inter plantas Fratris Io. Bauhini. Doctor. Theod. Collado Lautannensis Medicus ex Rhætia attulit quod palmi altitudinem æquat, foliis Rhefedæ vulgaris. Nasturtium 3. aquaticum minimum. Cardamine 49. Dalech. variat magnitudine fortè ratione loci, nam in aquaticis maior est, in Vinetis verò Wilensibus riguis, ubi copiosè obseruauimus, minor multò, vt & Patauino.

C. Bauhinus apud Matth. in Diosc. addita noua
icone sub titulo Nasturtii aquatici minimi, diuersum facit à Sisymbrio aquatico altero Matthioli, ac mutatà, ni fallimur sententia, quæ erat in suo Phyt. ubi tradebat Nasturtium 8. alpinum minimum secundum siliqua oblonga, pro duabus plantis: vnam tantum nupc facit, ac sic de eâ tradit. Nasturtium minimum siliqua longa, quod ex radice tenui, fibrosa, caules rariis palmatis, sed minores, tenues, striatos emittit, circa quos folia oblongis pediculis donata, pleraque tripartitè diuisa, quædam tamen in partes quinque, vel Reledæ vulgaris modo diuiduntur. Flores ob-
trinet albos, tenues, in summo comantes, quibus succedunt siliquæ longæ, angustæ, exiguo & subacti semine refertæ. Variat ratione loci in aquaticis namque planis maius, in Vinetis riguis Wilensibus militari Basileâ, longè minus reperitur, cuiusmodi & Patauini obseruauimus. Prouenit etiam in albis locis humidis. Dicitur Cardamine quarta Dalechampio, Sisymbrium aquaticum minus, Camer. apud Matth.

Matth. in Diosc. edit. anni 1554. Sisymbrium aquaticum alterum: ubi icon sine descriptione. Epit. Sisymbrium aquaticum minus, Ital. Crescione minore, folia & caules edit longè minores ramulis numerosis: floribus pusillis, tenuibus, albicantibus, in cacumine tantum comantibus, non solum in riguis & aquosis prouenit, sed etiam in hortis & secus vias. Imbecillius est altero: namque minus calfacit & siccit: ubi verò alterum non sit ad manus, hoc vti præstabit. In com. cum magn. fig. addit esse sapore acuto. Idem in Ital. cum magnis Icon. In Hist. Germ. Nasturtium aquaticum 2. brun fres 2. Si Matth. eandem plantam nobiscum intelligit summitates in pictura non placent, & denique tota icon.

Camer. in hist. Germ. Matth. & in Epit. omittit Matthioli iconem aliam substituit pro Nasturtio 2. aquatico. Placet autem hæc Camerarii melius quam Historiæ Generalis idem, assumpsimus.

C. Bauhinus, vt pòst dicitur, Matthioli Sisymbrium aquaticum hoc alterum idem facit cum Iberide Fuchsiana, quod nobis non satisfacit.

An Lobel. & Pena Aduers. Cardamine siue alterum Sisymbrium Dioscoridis. A Cardamo, cuius acrimoniam vellecentibus refert, dicta Cardamine fuit, veluti Helleborine ab Helleboro, tametsi propolis accedit Cratæ Laueri, siue Nasturtio vulgari aut vero, quàm Dioscoridis Sio, aut etiam quàm Sisymbrio: etsi Dioscorides Sisymbrii fecerit speciem tribueritque idem nominis plantæ mentha hortensii simillimæ, atque

*Planta cuius
fides Lauer
cum her.*

huic aquatica; insamque Plinio confundendi vires Laueris atque huius Sisymbrii, quod Sion etiam vocant. Est enim fontium limpidorumque rivulorum sectatrix hæc ubi Sion, sed tota tenella, gracilisque: folia promens ima, strata latius, in nervis cauliculis rotunda: Erucæ, aut aquatici Nasturtii vulgaris: quæ autem in caule sesquipalmari vel pedali angustiora multo sunt, etiamque hortensis Nasturtii divisa: floribus summis albidis, acris gustu, ac in acetariis tamen minoris commendationis. *Dubii sumus quam plantam intelligat Lobelius: apud Matthiolum quem citat, est icon Sisymbrii aquatici alterius cum flore minuto & copiosiss. umbellam penè referente, verum Lobelius in observat. icones longè diversas proponit floribus paucis & magnis, quæ Iberidem Fuchsi expriment de qua paulò post.*

Gerard. Cardamine latifolia, Great ladic smock. An Gesner. Nasturtium in vineis nascens quod Kabbressch appellat, foliosum, acre, Februario florens.

Lacur. in Diosc. figuram habet Matthioli sub hoc titulo, Sisymbrium Cardaminon.

Hist. Lugd. Sisymbrium Cardamine 2. Matthioli. Item paulò post: Cardamine 4. Dalechampi, Cardamine minima aquatica. Figura Cardamines Dalechampi quodam modo placet, & melius quam Matthioli, verum melior Camerarii quam exhibemus.

An Jacob. Theod. Icon. & Hist. Sisymbrium aquaticum 2. Brun. Fress. 2. Figura est Matthioli in qua summitates non placent, ut dictum, si eadem sit cum nostra.

An Gerard. qui iconem habet Matth. ex Tabern. Cardamine latifolia, Great ladic smock.

Passim Monspelit provenit, ubi flores & siliquas profert mense Februario & Martio. Patavii quoque copiosè proveniens observari, & Genævæ [ubi in acetariis videntur,] passim & maximè inter pontem Arue & Lauer florens Aprili: Plantas similes siccas habui à D. Tho. Platero Med. Basileæ collectas. Hanc quoque Cardaminem reperi, aut saltem simillimam maiorem prope Malmunster loco umbrato iuxta aquam ad muros, & in propinquis montibus secus torrentes, ut in monte Rolsberg virentem mense Octobri: Fuit eadem, ni fallor, reperta Iulio cum siliquis in peregrinatione mea Rhætica redeundo Burmio, & in monte Wvfen Helvetiæ, cuius odor tunc mihi videbatur esse Alii.

IBERIS FUCHSII, SIVE NASTURTIVM
pratense silvestre & flore pleno.

CAP. XVIII.

Descriptio

Eradice tenui & alba multisque fibris capillata, caulem profert singularem dodrantalem, rectum, teretem, glabrum, & quasi contortum, iuxta terram rubentem, qui in ramos dividitur, in quorum summitate flores simul multi vel albidipurpurascens, quatuor foliis obtusis venosis constantes, in quorum medio stamina lutea sena cum stilo: quibus succedunt siliqua oblonga, atropurpureæ, semen continentes: folia duum generum, inferiora enim per terram sparguntur, rotunda, ex longis & tenuibus pediculis, in quatuor quinque aut sex foliola rotunda divisa, ad costam per intervalla adhaerentia: superiora verò quæ in caule sunt, quaterna aut quina, sine



pediculis cauli adnexa, in tenues portunculæ quinque, septenas, & terdenas ad costam usque dissectæ. Sapore est cocta Nasturtii aquatici.

Trago inscribitur Nasturtium pratense, Gaudichblum, Nasturtium. Aut porro posse vocari Agriocardamon & Nasturtium agreste: non autem quod Drabam suspicatur, multò minus quod sibi persuadet ex Nasturtio aquatico sine Sisymbrio præcreari, ubi semen eius per inundationes in prata reicitur: quot sunt obsecro prata & viridaria quæ non aluntur fluminibus, & tamen ea plantâ abundant.

Fuchsius asserit, quod vocetur Gr. Iberis.

καρδ. aquatica, & καρδ. πραν. Galeno & Paulo alio nomine Lepidion: Hiberis, Nasturtium agreste Latinis, Germ. Gaudichblum, Gall. passe rage aut Nastur sauvage: non aliâ ratione quam quod pleurosque, qui in illius notitiam nondum pervenerunt insatiet: posse etiam commodè Germ. dici, wilder fress: Dicit præterea manifestum fieri ex flore lacteo, hoc est, ex albo purpurascens, herbam cuius picturam exhibeat esse Iberidæ. Fuchsius autem falli facile cognoscent, quibus nota erit vera Iberis, & qui hanc confulerint cum Vetterum Iberide.

Dodon. Gall. figuram habet ac describit: dicens, *καρδ. β. καρδ. aquatica*. Lat. Sisymbrium Cardamine, quibusdam etiam Sium, Gall. passe rage sauvage, aut petit cresson aquatique: Germ. Gaudichblum/wilder fress, & wiserfress/ Belg. Coetsoexbloemet & Eley water fress. Herbariis quibusdam flos Cuculi. Nasturtium aquaticum, non est Iberis, ut quidam existimant.

Gesner. hort. Dodonæi Iberis, Nasturtium pratense quoddam syl. Item in cat. plant. Hiberis: Agriocardamon *καρδ. aquatica*, fortè Scrin fress sic.

Gualtero Ryffio est Iberis, sed planta quam icon exhibet, non placet, nec nomen addidit Scrin fress.

Cardamine
Apulei.

Flos Luculi.

Lobel. Obs. duas habet parum differentes icones: Vni haec ascribit: Cardamine siue Silymbrium alterum Dioscoridis, Adu. p. 71. perperam Nasturtium agreste siue Iberis Fuchsi, Cardamum Apulei & Nasturtium Italicum, Nasturtium sylvestre Cordi, & pratense Tragi, German. Gänchblum: Alteri autem iconi, Cardamine altera, siue Silymbrium Cardamine secundum, Iberis & Agriocardamum Fuchsi, Gänchblum & wilder fress. Flos Cuculi Dodon. Belg. Wein wasser kresse, & Coescoe bloewe, Gall. pesserage sauvage: à coloris acrimonia. Exit hac altera Cardamine pratis vdis Angliæ, Belgii, Germaniæ & frigidarum regionum, ubi Cardamine, quam solis imis refert. In pedali caule vtplurimum angularia folia exiliora Nasturtii hortensis siue Cardami similia. Flores lactei purpurantes Erucæ aut Napi, Cardamines prioris maiores, gustu ut vniuersa planta, & viribus Silymbrium referentes elyteribus & cataplasmatibus, Lepidii, Nasturtii, Sinapi, & congenerum herbarum ritu, coxendicorum commodè miscetur. Obscurus nobis videtur Lobelius valdè, non demonstrat quæ in re differant duæ suæ icones: præterea in titulo secundæ iconis remittit ad pag. 71. Aduers. ubi non fit mentio Iberidis Fuchsi, quinimò fit ibi mentio Iconis Matthioli plurimum differentis ab iconè Fuchsi: apud Fuchsum præterea vnica icon & descriptio Iberidis: Lobellus nihilominus hic in Obs. sub duobus titulis diuersis Iberibus meminit Fuchsi, quasi duarum meminerit, videlicet minoris & maioris. Eadem iam dictæ binæ icones proponuntur in Icon. Pl. cum his inscriptionibus, Cardamine siue Silymbrium alterum Diosc. Lob. 106. Teut. 252. Item Cardamine altera siue Silymbrium Cardamine secundum Lob. 106. Teut. 252.

Hist. Lugd. vnius plantæ duas ponit & figuras & descriptiones, sub titulis: Silymbrium Cardamine 3. Dodonæi. Cardamine altera, siue Silymbrium Lobelii.

Tabern. Icon. Cardamine 1. Silymbrium alterum Diosc. Gänchblum/Wilder fress 1. Cardamine 2. Gänchblum/Wilder fress 2. Cardamine 3. species altera floribus lacteis, Weiß gänchblum. Figuræ duæ priores iuxta Lobelium, 3^a addita, sufficiebat fortè vna. Figura Tabern. 1. Lob. 2. & quæ Lobel. 1. Tab. 2. Discrimen harum figurarum ostendit in Hist. quod primæ flores albicantes. Secundæ folia paulò maiora, nonnihil curuata, & quasi cochleata. Tertiæ flores nonnihil carnei coloris adscribit.

Gerardus
quædam.

Gerard. l. 2. c. 17. Cardamine 1. Cock ome flowers (Lob. 1.). Cardamine altera, ladies smocks [Lob. 2.] Cardamine 3^a. lactea Milke White ladies smocks. Cur Gerardus quinto loco ponat plantam quam alii tertio loco posuere, nescimus, nec etiam placet, cum colore differat tantum: fortè etiam ei hæc plantæ incognitæ.

Tabern. nat.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium 4. siue pratense vulgatus, variat flore qui communiter ex candido leuiter purpurascit, aliquando prorsus albus est. Figura Tragi, Fuchsi & Matthioli in quarto, cum ea, quæ apud nos prouenit melius quam Lobelii & Dodonæi conuenit: Non tamen differentia inter Tragi seu Matthioli & Lobelii constituenda, ut fecit Tabern. Flore etiam pleno habetur. Item Nasturtium 5. siue pratense alterum, Cardamine, siue Silymbrium alterum Diosc. Lobel. Et hæc florum colore variat: cuius nomine Tabern. duas icones nomine Cardamine 2. posuit. Item apud Matth. Nasturtium pratense vulgatus: Fuchsi

Hiberis. Silymbrium aquaticum alietum Matthioli: Cardamine altera Lobelii, Lugdunensi, qui huius tres proponit, licet vnius sint plantæ. Quamuis folia in Icone Matthioli respondere videantur Iberidi Fuchsi non tamen melius conuenire dicemus cum planta Iconem Matthioli, quam Lob. & Dodonæi, nec etiam eandem dicemus Matthioli plantam cum planta Tragi vel Fuchsi, nisi dicamus ineptam admodum & falsam tum iconem Matth. tum descriptionem: scribit enim epit. p. à C. Bauhino citata, quod etiam demonstrat icon, flores tenues pusillos: Considerandum etiam an Iberis Fuchsi proueniat eo loco ubi suum Silymbrium aquaticum minus prouenire ait quæ antè ex eo recensuimus.

Locus &
tempus

Nasci tradit Fuchsi, Iberis incultis locis circa itinera & prata: Verno tempore apparere, Aprilis potissimum mense & Maio, durareque ad æstatis initia, quo potissimum tempore lacteum florem fundit: initio enim purpureo colore maculatus videtur, efficaciorque usum obtinet, quoddam semen etiam in siliquulis proferat.

Iberidem Fuchsi, siue Nasturtium pratense obseruavi Basileæ in multis locis: frater C. Bauhinus extra portam S. Albani ad Birsam: in Masinunster: Genevæ inter Lancy & Pont d'Arne in scipibus mense Aprilis. Montbelgardi abundat etiam in Horto Ill. E. C. spontè. Anno 1595. Iulio 8. D. Fridericus Meier dedit Argentorati in suo horto Iberidem Fuchsi, quam dixit pleno flore, missam Biantio per D. à Belle fontaine, qui Nasturtii aquatici speciem faciebat, plantata Montbelgardi in horto Ill. E. C. pulchre floruit æpius.

IBERIDI FUCHSI AFFINIS TRIFOLIA Cardamine.



Cardamine Descriptio
Calpina trifolia nigricantibus ex purpurea ramulis per terram serpit, in quibus oblongo eiusdem coloris pediculo terna perpetuè folia mittuntur, circa pediculum angustiora, per oras latiora & quasi orbiculata, in ambitu nonnihil crenata, initio tenella & viridia, deinde dura, nigricantia, acidulo pri-

mum gustu, postea acri: cauliculi teretes inter folia erumpunt ex purpurea nigricantes, palmares, nullis aut rarissimis (quæ terna etiam eidem inhærent) foliis præditi: flores extremis ramis insident, candidi, quatuor foliolis constantes, Cardamine pratensis, quam Fuchsi Iberidem nuncupauit, persimiles: his succedunt torose & oblongæ siliquæ Dentariarum Corniculis scilicet similes, sed minores: semine etiam minore, licet simili, plenæ: radix summa tellure serpit, & subinde paruas candidasque fibras agit, sic ut faciliè ramulis terrâ obrutis pangi possit.

Card-

Ad Cardamines siue Sisymbrii alterius genera referendam meminit Clusius ante multos annos ab Alfonso Pancio missam Machliniam *Saintula folia* nomine.

Eam commodius Lobelius inter Cardamines recensuit, trifoliamque cognominavit, de qua in Obs. hzc scribit: Cardamine trifolia, quibusdam hortis cultionib. repertu facilis, Nasturtii Cardamines gustu & facie plantula palmaris Sisymbrii Carda. sed posito terno, Oxy. Plinianę ritu, humi procumbente. Flos in pediculis albus Isopyri vulgaris aut Cardamines. Radix multum fibrosa.

Inscribitur à Clusio Cardamine alpina 1. trifolia: à Lobel. Hist. Lugd. & Gerard. Cardamine trifolia: Tabern. Icon. & Hist. 3. C. Bauh. Phyt. Nasturtium alpinum trifolium.

Locus & tempus

Inuenit Clusius in siluosis montibus, nudo solo potius quàm herbosos, ad Abietum & præaltorum arborum radices, tota hyeme etiam virentem. Floret Iunii, in cultis verò etiam Aprili.

Anno 1571. Iulii 7. inter plantas siccas Aggerii Argentinz reperi plantam [nullo tamen ascripto nomine] quæ optimè respondet figuræ Clusii posite inter Pannonicas pro Cardamine alpina trifolia.

IBERIDI FVCHSII ALIQVATENVIS SIMILIS Cardamine Dalechampii odorata.

Descriptio

Cardamine odorata radice est, crassiuscula, tenuis gracilescente, dodrantali, granulis plurimis candidis, & Coriandri semine non maioribus, tuberosa, alba Saxifagæ modo, multum fibrosa, foliis Sisymbrii Cardamines Dodonzi, humi striatis, amplioribus, nigricantibus, gustu acerbis, sed odore cum manduntur tam suavi, ut ad Cinamomum accedat: flore ac fructu est Nasturtii.



Hist. Lugd.

Cardamine odorata 5. Dalechampii: seu Nasturtium odoratum, quidam Callitrichon Plinii lib. 25. cap. 11. esse putant.

Locus & tempus

In Sequanorum silvis, Abietibus & Piceis coniferis, Cardaminem odoratam vidit Dalechampius muscoso solo.

IBERIDI FVCHSII VEL NASTURTIO aquatico affinis Cardamine alpina media Clusii.

Descriptio

Cardamine alpina media, siue 2. Clusii sine figura, habet folia in orbem disposita, duorum digitorum transversorum longitudine, profundioribus crenis incisa, & laciniata, uti in Sisymbrio cardamine, siue Nasturtio aquatico

Tom. II.

vulgò nuncupato, hirsuta & aspera, superne velut cinereo colore asperla, inferne verò viridiora, sapore primum acido aliquantulum, deinde calidiusculo: ex quorum medio prodit canticulus dodrantalis aut amplior, tenuis, albos flosculos in in summis ramulis serens: deinde siliquis teretes, parvas: semen observare non licuit: radix longiuscula est, alba, quibusdam fibris capillata.

Nascitur in Styriæ inferioris scopulis ad Monasterium Neuberg [quod Alpium iugo illi imminenti nomen impoluit] in Styria inferiore. Florebat Augusto.

MYAGRVM VETERIBVS.

CAP. XIX.

MYAGROS, quem aliqui, Dioscoride dictante, Melampyron vocant, herba est serulacea. (serulacea, è cremiorum genere Sarrac. legit. Plin. serulacea serulacea) bicubitalis, foliis Rubiæ similibus, pallidis: semen verò gerit Fœnogræco [sic Ruell. & Sarrac. in vers. Lat. Sed hic in Græca pro Fœnogræco, malè σαρρακωνίδης, collo simile, retinet,] simile, pingue.

Herba serulacea. Dioscoridi lo. Dio. Folia Rubiæ. Semen Fœnogræci. Sarrac. er. var. Herba serulacea.

Non eadem omnino Plinius tradit: Myagros herba serulacea est, foliis similis Rubiæ, tripedanea, semen oleosum, quod sit ex eo.

Paulus Ægin. lib. 7. locis duobus diversis de hac eadem planta egit: ac priore quidem Myagron [quasi Mulcupulam diceret, siue Muscariam, quæ insidentes, siue præteruolantes muscas glutine suo implicet] appellat: posteriore verò Myagron (quod impurum significat & sordidum, cuiusmodi Melampyrum est) nominat: hic quidem Dioscoridis, illic verò Galeni ipsissima verba referens. Quare Cornarius hoc Pauli loco Myagron ubique merito legendum censet, & non Miaron, quod alia non sit herba à Myagro, ordinemque sectionis hic perturbatum esse, ut primum habeatur Myagri semen, deinde interpositis quibusdam sequatur Miaros, quæ eadem sit cum Myagro, & sic restituendum esse ordinem.

Paulus Ægin. Myagron & Miaron.

Ceterum Melampyri nomen dubium puto, ac ei euenire, quod multis aliis nominibus, ut vnum de pluribus plantis dicatur:

Præterea hoc loco fortè etiam legendum, ut admonet Cornarius, μελαμύρον, ut etiam habet Paulus Ægineta lib. 7. cap. 3. Vel dicendum Melampyrum aliud Diosc. aliud Galeni, cuius meminit lib. 1. de alim. & Theophrast. quod vocatur à Cornar. brandweigen, Triticum nigrum. Incertum est, quid intelligat Diosc. lib. 3. cap. de Cræzogono, περ μελαμύρον, ubi Plin. habet lib. 7. c. 8. spicæ Tritici, & Theophr. λίαν πύρον, quod Ruellius lib. 3. cap. 64. suspicatur corruptum, Cornario idè asserere, reponuntq; Melampyron. Fortè non intelligit de Myagro, quod mihi videtur verisimile, communius enim, ut puto, nomen apposuisset, videlicet Myagri, sed de Melampyro Theophr. & Galeni; quam meam opinionem augent Plinij verba cum dicit. Cræzogonum spicæ Tritici simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumque geniculorum.

Melampyrum non dubium. Melampyrum.

Cræzogonum. Linum sp. rimum.

Myagri semine, inquit Diosc. torrefacto & m- so, virgas oblinunt, iisque Lucernarum vice v- tuntur. Ceterum, hoc pingui (oleo) corporis scabritias expoliri, læuigarique constat. Galenus scribit Myagri semen pingue esse: nam, si tundatur, oleosum quid effundere, quod emplastici vim habeat. Diversam ab his facultatem tribuit

Vitis

F 555

his vocari Camelina & Camamina, se tamen non audere Ruellio subscribere, quia haecenus non viderit Myagrum in Italia. Ceterum eos haud dubie falli crediderit, qui putant vulgare illud aurei coloris semen, quod aliqui Drodam, Drodellam alii, nonnulli vetò Dorellam dicunt, legitimum referre Myagrum. Is figuram ex prioribus com. ademptam huc reponit, ac prater iam dicta subdit. Non desunt praeterea qui plantam, quam Pseudomyagrum appellauimus, legitimum esse contendunt. Verum haec Rubiz folia non gerit, sed Glasti, & semen Nasturtii. Figura titulus, Myagro falso. Idem in Hist. Germ. dicit: Quidam existimant Sesamum esse *Lein Doster* aut *flachs Doster*, quod mihi non placet, quia existimo *lein Doster* esse verum Myagron, de quo in in 40 libro. Idem in eadem Hist. Germ. figuram praedictam habet, ac dicit, *lein Doster* aut *flachs Doster* sumunt aliqui pro Sesamo, sed malè, ut diximus, melius cum Myagro conuenit, de quo Diosc. lib. 4. cap. 112. Vocatur etiam Pseudolinum. Me silent ex allegatis locis apparet Matthiolum non nouisse Camelina Ruellii. Drodellam suam & suum Sesamum quorundam, vnam & eandem plantam esse, ac eum ea figura malè picta dixisse habere folia Isatidis, at hinc putasse Aduersaria Matthiolum Vaccariam intellexisse ea figura, quod tamen ex praedictis non sit verisimile: Figura etiam Matthioli, quam in re accedit ad Linum ut mereatur dici Pseudolinum?

Camer. apud Matth. Germ. Myagrum quorundam: in Epit. Matth. Pseudo-Myagrum.

C. Bauh. apud Matth. Myagrum 1. siue satium, Myagrum 2. siue syluestre, aut Pseudo-Myagrum. Idem in Phys. horum meminit his verbis: *Nudus* Diosc. lib. 4. cap. 112. meminit, quod aliqui volunt idem cum Myagro vulgò dicto, at Rubiz folia suo tribuit Dioscorides: & Plinius lib. 27. cap. 12. cui Myagros dicitur. Quibusdam tamen nostrum secundum Myagrum est Theophrasti & Galeni Erysimum: alius Sesamum ob seminis similitudinem & olei vbertatem. Myagrum 2. hortense: Myagrum Dodonzi, Cameline Myagrum Lob. icon. p. 124. Item: Myagrum tertium siue Myagrum syluestre. Sesama Trago, Pseudo myagrum Matth. Hoc satum tantum à superiore differre volunt, cum tamen illud foliis sit sinuatis, hoc verò Glasti folio non sinuato. Qui considerabis varietatem foliorum Camelinae, & aliqua conferas cum Rubiz foliis, aliquam similitudinem inueniet. Paruam inuenio affinitatem seminis Camelinae cum vero Sesamo. Ex figura malè picta Matthioli & ex eius verbis de Glasti foliis in ea iudicare non possum diuersitatem. Si statuendum propter figuram diuersum genus separandum etiam erit Tragi Sesamum, in quo folia non Glasti, sed ad Linum potius accedentia, & ut ipse ait, Lino adeò similia, ut ab illo vix separari possint. Ego igitur non separo: sed figuram Matthioli non placere dico ac esse plantae ei non bene perspectae & cognitae. Tragi autem Sesamum factum ad strigosam aliquam plantam spontaneam & sicco loco natam: non propterea aliam.

H. Lugd. vnius plantae duas habet figuras. Vni titulus est, Myagrum Dodon. Hoc, inquit, Ruell. & eum sequutus Dodonaeus, atque alii Dioscoridis Myagrum, quod & Melampyron vocari tradit, esse putant. Altera inscribitur, Pseudo-myagrum Matthioli. Nec hoc, ait, Matthiolus sine ratione intrusit. Sunt enim, qui legitimum Myagrum esse contendunt, aut cum folia Rubiz non

Tom. II.

habeat, sed Glasti potius, & semen ei sit Nasturtii, non Foenugreci, ab eis differt Matth. & non Myagrum, sed Pseudo-myagrum appellat.

Taber. Icon. Myagrum 1. Hist. Myagron, Camelinum.

Gerard. myagrum Golde of pleasure.

Primum vidi Tiguri in horto Di. Gesneri: vidi ^{Locus & tempus} Basileae constitum agrum ante 30. annos in quo florebat & siliquas habebat Maio. Geneta in horto meo pulchrè virebat & adhuc florebat Nouembri ex semine deciduo, hiememque perferebat. In Italia copiosè vidi, ut Patavii in horto publico: florens Martio & virens Febuario & inter Vicentiam & Villanouam: Monspelii abundat in agris. Circa Montbelgardum Myagro confitos agros habent ad oleum, quod dicunt caput granare, vidi prope *Granges* quod quotannis semine deciduo se renouat, quodque maturum Iuniprincipio. Agros benè subactos (inquit Ruellius) stercoreatosque hoc semine perinde quasi Napis serunt. In tanta est apud nos [Gallos] nobilitate, ut ruri nemo non conspiciat: Et iam suae spontis inter segetes inuehitur. Affatim inter segetes Lini ubique locorum, maxime verò in Alsatia, & tractu Rheni, Tragus.

Rusticis nostris (inquit Ruell.) Camelina aut Camamina, oleo distringendo, quam optimè cognita. Eius semen in arsis pauis rura flagris decutunt, & vannis in auram vento silentem iactant, dum siliquarum recrementa vanescant: tum trusculibus molis subiiciunt versandòque subinde oleum exprimunt, quo non ad lumina tantum Lucernarum, sed & ciborum quoque condimentis pauperes vtuntur, magno huius olei prouentu. Vix quicquam aliud adeò ab auiculis inuaditur, atque hoc semen, quod animaduertentes quidam, id colligere ac alendis auiculis referre studuerunt. Oleum ex hoc semine conficitur longè praestantissimum, estque Tragi iudicio gratius & iucundius Oleo Oliuæ. Sed non video eò quomodo preferri debeat, huius Sesami oleum, Oleo Oliuarum, ut Tragus praefert, dum sibi persuadet verum Sesamum, ac vires Sesami attribuit. Audio hoc oleum frigore non concre-scere. Modicè, ut Matth. annotauit, calefacit atque humectat. Accedit omnino ad Sesami vires semen auiculis gratissimum. Paratur & ex eo oleum similis facultatis.

MYAGRUM TVRCICVM.



Hoc longè ^{Descriptio} tenerioribus virgulis, quam praecedens, nascitur, sed cultura fructuosior sit [ait Camer.] semen minus in vasculis vegetioribus profert. Herba eiusdem est serè naturæ cum Myagro.

Camer. ad hist. Germ. & Epit. Matthioli. Pseudo-Myagrum alterum, species prima Myagri puri, quæ quia sarior est Mya-

gi Turci nomen sortitur ab hortulanis. Turcise
her leindotter tenuis. C. Bauh. phyt. Myagrum
4. siue sylvestre alterum.

CAMELINA MYAGRVM ALDROANDO.

Est hanc ex seminibus, quae ab Excellentissimo
Aldroando ex Italia nobis attulit illustr. Dux
Virtemb. Creuit in horto Montbelgardensi sata:
folia numerosa à radice exeunt, longo pediculo
trentia, repanda, principio subangusto, oblon-
ga laciniata, qualia ferè sunt Barbareae, costa insi-
gni pallidè virenti donata, à qua nervi saturatio-
ni colore exeunt. Caules inter hanc prodeunt
multi, pedales, teretes, ac crassi satis, lentique,
quibus folia praecedentibus ferè similia, sed super-
ius nullo pediculo haeret. Summitatibus flosculi
insident candidissimi tetraphylli, quales Scor-
dothlaspi velut in umbella dispositi. Succedunt
vascula sublonga. Radix alba est, simplex, fibris
tenuibus capillata. Odor foliorum herboidis, sicut
& sapor, gratus tamen satis: Radicis verò ad Na-
sturtii saporem quodammodò accedit, sed minùs
acris, ac mitius palatum & linguam vellicat.

Nemini haecenus quod constet cognita aut
descripta planta nomine *Cameline Myagro*, à D.
Aldroando donata, si Amanuensis vel hortula-
nus bene scripsit.

Locus &
Tempus.

Sata in horto Ill. C. Virtemb. Montbelg. A-
prili, floruit Iulio.

MYAGRO AFFINIS PLANTA, SILI- quis longis.

Descriptio

Huius plantae radix, lignosa, alba, simplex, fi-
bris aliquot donatur, caulis plurimùm va-
riat: est ubi vn-
ciam parum ex-
cedit, frequen-
tius altior, cubi-
talis vel bicubi-
talis, singularis,
firmus, striatus,
subhirtutus &
nonnihil rube-
scens, medullâ
Salmucinae ple-
nus, in sulculos
aliquot diuisus.
folia, *Cameline*
similia, alterna-
tim posita, vn-
ciam lata, tres
quatuorve lon-
ga, ex angusto
principio sen-
sim dilatata,
sensim dein-
ceps in mucro-

nem desinunt, tactu aspera, viridia, sapore amaro
praedita: flores parui, multi, conferti, lutei, qua-
tuor foliolis constantes, apicibus rident luteis,
breuib. pediculis insident: quibus delapsis,
alternatim succrescunt siliquae tenues, vnciam lon-
giores, quadratae, semen copiosum, tenue, ob-
longum, amarum, claudentes.

Icon. pl. *Cameline*, *Myagrum* alterum *Thlaspi*
effigie.

Hist. Lugd. sunt duae figurae vnius plantae. Pri-
ma, *Sinapi* amarum *Dalechampii* vocata. Altera,



Myagron aliud *Thlaspi* effigie *Lobelii*: nec tres
nobis videntur stirpes.

C. Bauh. phyt. *Sinapi* 11. siue *Histio* folio, *Sin-* C. Bauh.
napi amarum *Dalecham.* *Myagron* 1. siue siliqua
longa: Et *Leucoium* 13. siue luteum sylu. exiguis
flosculis. *Viola* lutea sylu. *Tragi*, sed vna. Sed sic
boni viri sua dicant opera.

Tragus Lat. & Germ. *Siluestris Viola* Lutea.
An *Geiner*. hort. *Leucoi* sylu. genus minus?

Myagrum alterum *Thlaspi* effigie *Lobelii*
Obleru. & Icon. Plant.

Compiler Tabern. duas quoque vnius plan-
tae sub diuersis titulis icones proposuit. Ac pri-
mam quidem Hist. lib. 2. & Icon. plant. 449. *Ery-*
simon 4. *wegsenff* 1. Huius iconem *Gerardus*
ponit pro *Eruca* syluest. angustifolia *Narrow* *Erysimon* 5.
leafed/wilde Roes. Alteram verò Icon. p. 366.
Hist. 338. *Myagron* 2. *leindotter.* Addit & se-
cundam *Gerard.* quam *Camelinam* vocat *Eruca* *Camelina*
act wormseed, *Erysimum* *Galeno* & *Theo-* *Compila*
phrast. Hanc plantam non obseruauimus à *erucis*
quoquam dictam *Camelinam*. *Gerardus* *Camelina*
nem ex *Tabern.* habet, ac euenit, ni fallimur, *Erysimum*
quod illi, vt duabus iconibus vnius plantae, diuer-
sos tribuat titulos & diuersas descriptiones. Ast
horum saltem in sursum ignorantia meretur ve-
niam.

Floret Iulio & Augusto, inueni propè *Cha-*
stenoy ad ripam aquae propè *Molendinum* quâ-
tur *Montbelgardo* *Besfordiam*, postea alibi locis
siccioribus, transiit in hortum, ubi quotannis
ex semine deciduo seipsam propagat. Inueni co-
piose in pago *Courchaton* florente mense Octo-
bri. Sata in horto Ill. E. Cell. semine deciduo se
propagat quotannis.

MYAGRON MONOSPERMON.

Crassa & alba est radix: quae caules proferit a-
liquot, cubitum aut sesquicubitum altos, Descriptio

glaucos, tere-
tes, laues, so-
lidos, medullâ
candidâ far-
ctos, multis a-
lis concavos:
folia *Glasti* sa-
tius superiori-
bus foliis non-
nihil similia,
nonnunquam
laciniata ta-
men, praesertim
inferiora, simi-
literque illis
caesia, nullo
pediculo, pin-
nis suis caules
amplectentia,
sapore olera-
ceo: flores lu-
tei, quadrifolii,
minores mul-
to quam *Brassicae*, paulatim nec eodem tempore
se se explicant, aliis primulùm à calyce erumpen-
tibus, aliis in semen abeuntibus, quod singulare in
singulis spiculatis burulis, sursum spectantibus,
& caulibus, ramulisque appressis.

Casp. Bauh. Phyt. *Myagrum* 5. siue monosper-
mon.

Apud Fratrem C. Bauhinum vidi plantam no-
mine



mine Myagri monolpermi quam descripsit. Basileæ anno 1595. mense Augusto observavi brachiatam cubitalem totam siccam seminibus onustam in horto Domini Doctoris Fœlicis Plateri, vnde accepi semina serenda in Hortum Ill. E. C. Montbelgardi. Spontè observavi spontaneam in agro inter Dampierre & S. Mauritium.

MYAGRO AFFINIS HERBA, CAPITULIS ROTUNDIS.

Descriptio



que porriguntur: in singulis capitulis semen inest unicum, flavum, oleaginosum, nullo sapore manifesto: folia Myagro similia, minora, hirsuta, aspera, nonnihil succulenta: quæ per caules & ramos disposita, nullo pediculo, amplexicaulia, alas utrinque pinnatas proferunt, sapore viscido, & nisi obstat leuiscula acrimonia, fatuo, infima ex longis pediculis leviter sinuata sunt.

Sunt autem plurimi anni, ex quo hanc plantam vocavi Myagro affinem cum capitulis rotundis. Semen huius missum à Domino Doctore Schwartzio Myagri nomine.

C. Bauh. Phyt. Myagrum 6. siue Myagro similis siliqua rotunda, quæ Io. Bauhino crevit.

Camer. ad Matth. Germ. Myagri species cum rotundis capitulis, serè eiusdem naturæ cum Myagro. Et Epit. Pseudo-Myagrum 3. species 1. Myagri putati, exilior, vasculis rotundioribus, alibi in arvis spontè nascens.

Locus & tempus

Annua planta flores & semina fert matura cum Myagro, Iulio, & Augusto, ac quotannis ipsam seminat. Myagro affinis cum capsulis rotundis & flore luteo in Ill. Princip. horto florens & virens cum suis capsulis Iunio 1608. Stutgardiz.

MYAGRO SIMILIS FLORE ALBO.

Descriptio

Numerosa statim à radice fundit folia, glabra, vncias tres longa ad Iberidis folia accedentia, laciniata nonnihil: Inter quæ caules surgunt, medullâ facti, alis concavi: Quorum exortum, folia ambiunt alata, & veluti denticulis laciniata. Flores in fastigiis candidi, exigui, quos vascula

Tom. II.



SESAMVM VETERIBVS.

C. P. XX.

Sesamum, ut Theophr. sparsim habet, pingue Sest. radice singulari coheret, numerosiore tamen, quam Milium: stirpe assurgit simplici, altâ, sursum vires suas omnes intendente: caule ferulaceo, multiplici quoque magis, & crassiore, quam Milium, calamo consistat, vnde omnium, quæ ex æstivis sementibus ager recipit, Sesamum terræ molestissimum esse, plurimumque posse emaciare putatur. Flos etiam solus consistat. Tota quadraginta diebus à satû consummat. Sua proprietate ceratur: nam semen gerit in siliqua magnopere circumscriptum, modo peculiari quam legumina. Sesamum viride nullum animal mandit, propter amaritudinem & gravitatem saporis, sed siccatum acceptus evadit, fructusque eius inavis efficitur, candidus dulcedine præstat, nam geris quoddam candidum.

Plinius tribuit folia sanguinea, caulem ferulaceum: semen in vasculis, ab Indis venire ait, ex eo oleum confici, colorem eius candidum: Simile hinc esse in Asia Græciaque Erysimum, idemque fore, nisi pinguius esset quod Icio vocetur, medicaminibus annumerandum potius, quam frugibus. Et paulò inferius, Sesamam in calida maceratam exportari iubet, deinde conficari, frigida immergi, ut palca stant, iterumque exportari in Sole super Linthea. Quod nisi festinat peragatur, lurido colore murescere. Dioscorides omittit descriptionem, vires eius inter fruges ita persequitur. Sesamon stomacho nocet, & animæ gravitatem facit, si quando commanducata dentium commissuris inhaerit. Admotâ verò nervorum crassitiem discutit, aurium fractum & inflammationibus, ambustis item, & coli doloribus ac Cerastræ morsui medetur. Capitis autem dolores ex ardore contractos cum rosaceo lenit. Sed & herba in vino decocta eadem præstat, sed maxime oculorum inflammationibus doloribusque prodest. Ex ipso quoque semine fit oleum, quo Egyptii utuntur. Sententiam verò verborum Dioscoridis serè explicat, inquit Cornarius, Plinius lib. 22. c. 25. his verbis, Sesama trita in Ovo sumpta, inhibet vomitiones, Aurium inflamma-

sequuntur subrotunda, acuminata, longo pediculo hærentia, ad Myagrum cum rotundis seminibus accedentia. Radicula longa, alba, simplex, vel cum paucis fibris.

Inter Bononiam & Florentiam reperi cum floribus & capitulis. Dominus Aggerius quoque Bononia delatam communicaui.

Locus

Radix

Caules

Caules

Flos

Semen

Sapor

Genus cap-

didum. Pa-

lia. Semen

Color

ra

Sesamum

Virtus

F. 155

tioni illinitur, & ambustia. Eadem efficit & dum in herba est. Hæc amplius oculis imponitur decocta in vino. Stomacho inutilis cibus, & animæ gravitatem facit. Stellionum moribus resistit. Item ulceribus quæ caecæ vocant. Hoc Plinius loco vulgata exemplaria vino, pro Ouo habent quod verisimilius vetus Codex noster legit. Deinde in vulgata est, amplius hoc, quod vetus habet, Hæc amplius, ut de herba accipiamus. Quod autem Stellionum moribus resistere dicit, Diosc. non habet, nisi Cerasten Stellionem reddidit. Actius certè lib. 11. cap. 12. ad Stellionis morbum, Sesamum utiliter imponi tradit. Ita etiam Paulus lib. 5. cap. 10. Sed & artuum doloribus convenienter imponi posse apparet, *ut* enim per *o* legi debet non *ut* per *o*, quod intestinum crassum significat.

Galen. lib. 7. Simpl. Pharm. Sesamum, inquit, non parum viscosi ac pinguis in se habet. Unde meatus obducit simulque mollit, & moderatè calidum est. Eandem vim habet & Oleum ex ipso. Sed lib. 11. De aliment. ait, Pingue est Sesamorum semen. Quapropter etiam repositum citissimè oleosum fit. Ob id igitur citò replet eos qui ipsum edunt, evertitque stomachum, & tardè concoquitur & pingue alimentum corpori præbet. Hinc clarum sit vigorem & robur ventris partibus addere non posse: quemadmodum neque aliud quid de pinguibus. Est autem & crassi succi & ob id neque citò transit. Edunt autem ipsum solum non ita valdè, sed cum melle cocto in placentas efformant, quas Sesamidas plerique vocant. Inspurgunt etiam ipsum panibus.

Oleum Sesaminum, ut tradit Mesues, impinguat, semen auget, asperam arteriam lenit, & vocem ob id claram reddit.

Cæterum, vires, quas Sesamoidi Diosc. ascripsit. Plinius, dictatore Cordo, Sesamo assignavit, malè Sesamum pro Sesamoide in hoc auctore legens. Plinium autem, quod idem miratur, secutus est Ruellius.

Memorable illud est, quod Q. Curtius refert, militem, qui cum Alexandro Caucasum transiret, ac inopiâ frumenti, cuius nihil, aut admodum exiguum reperiebatur, propè ad famem veniret, succo ex Silama expresso haud secus, quam Oleo artus perunxisse.

Sesamum quoniam à Diosc. non describitur, sit ut in eo demonstrando plurimum erraret. Si quis loca expendat de Sesamo apud Theophr. Dioscor. & Plinium, colligere est, nullam earum plantarum, quæ pro Sesamo passim ab Authoribus accipiuntur, esse verum Sesamum. Prior quidem Sesami nomine vulgò recepta, de qua hoc capite agimus vera videtur, sed vera certò affirmari non potest. Sesamum, qui arbitrantur Myagrum Dioscoridis non agniti decipiuntur. In Sesami & Myagri explicatione, ait Gualandinus, mirum quàm Matth. excutiat, quando Myagrum esse, Sesamum primò à se loco locatum, nescit. Sesamum Cordi & Tragi, Sesamum Matthioli quorundam, dicitur nobis Myagrum Cameline. Non solum Officinis notum est hodie Sesamum, sed etiam quibusdam locis apud nostros (inquit Cornar.) nascitur, & in cibi vltim venit, Lenus modo coctum: Appellat autem Schwaden. Sed decipiuntur, aiunt Cordi in Diosc. & Gein. hort. qui Sesami loco accipiunt Schwaden. Multum rei herbariæ consuluissent, si, quod decuisset, indicassent quid per Schwaden intelligerent. Dicere quis posset eos ignorasse quid scriberent, aut saltem in se scribendum dor-

minisse. Sesamines flores [Itali *tesemini* vocant] Sunt qui à Sesamino semine distinguere non valeant, Cordus. De hoc lib. 15. sub Gelsemino. Sesaminum cum Sesamoide confundit Plinius, ut dictum, & cum secutus Ruellius.

Quale porro sit illud oleum de Sefyma (cuius meminit M. Paulus Venetus) parvulos nigros faciens, considerandum aliis relinquimus, nos nihil tale de oleo Sesami annotatum invenimus, fortè oleum Sesami miscebatur cum aliis.

Officinæ pleraque Myagrum [flachadotter] Sesamum appellant, ac malè eo, cuiusque oleo, pro Sesamo utuntur, nobis attestantibus Matth. & Dodonæo. Sesami olei vire, quod exhibebat.

Haly pueris quamprimum erant nati, nos feliciter uti consuevit oleo huius, quod etiam faciebat Valembertus. Sesamo deficiente substituit Tract. qui pro quo, Semen Lini.

SESAMVM



Sesamum per Descriptio
Sesamum cubitalem folia habet feminalibus pediculis hærentia, crassiuscula, ex auro virore nuda, nihil rubentia, oblonga, acuminata, tubin de quoque sinuata; ex quorum alis flores emittant, calathii formæ, oblongi, albi, hinc nascuntur filique rectè secundum caulem ascendentes, quatuor

costis donatæ: in quibus semen dulci albâ medullâ prædictum.

Accepi à Cl. Paludino Sesami Indiæ Orientalis nomen, semina, alba, oblonga atque compressa, modicè acuminata, qualia præcedentis, quæ vix diuersa existimant. Quædam eorum pullosunt colore, quædam fusco, sapore dulci.

Tanetli Sesami semen, à quo copiosum exprimitur oleum, Officinis notissimum sit: pauci tamen reperiuntur Sepalsarii, qui Sesami plantas viderint vquam, cum nullum, vel rarissimum, quod agros steriles reddat, feratur in Italia. Si quidem quod in Myropolis habetur, ex Græcia & Peloponneso ad nos conuehitur. Hæc Matthioli, qui in prioribus com. figuram exhibet hoc titulo, Sesamum aliorum, in post. verò hoc, Sesamum. Ait autem is: Mihi planta, quam pro Sesamo hic depingi curavi, quamque misit ad me Pils Lucas Ghinus, si verum fateri debeam, non placet, quod Historiæ refragetur, quam de Sesamo Theophrastus & Plinius tradiderunt. Quare non ausum ego affirmare hanc geminam esse Sesamum, quod in primis culmum non gerat nilio crassior, altior, numerosiorque, nec radices longè plures, sed scapum fabæ æmulum, in quo fabarum more filique gradatim exeunt triquetri, aut quadriquetri, in quibus semen: Deinde quod eius folia non rubescant, nec flos herbaceo

Plinius de
Sesamo.

Plinius.

Plinius error

Ruellius
Sesamo

Aquinoca.

Sesamum
Myagrum

Myagrum
Cameline

Corn Cord.
& Gelsinus
Sesamum.

Gelsinus
Sesamum.

Sesamo
Sesamum.

Substituta
Myagrum
Oleum d.
myd.

Sesamum
Sesamum.

Sesamum
Sesamum.

herbaceo sit colore. Hanc autem plantam depingi curavi, ea saltem ratione, ut illud lectores admonerem, quod ea, meo iudicio, notis veri Sefami non respondeat: quodque in manifesto errore versentur, qui secus opinantur. Non ausim inquit idem in Hist. Germ.] dicere herbam hic pictam esse verum Antiquorum Sefamum, ut quidam existimant, potest verò merito dici Pseudo-sesamum.

Pseudo-sesamum. At dixit sententiam istam Matth. videamus nunc alios, an hac planta pro legitimo Sefamo sit recipienda. Semen Sefami officinarum [ordinatur in Adv. Lob. & pena] perpetuo nomine & usu Sefamum fuit, quod satum vidimus adustum. Si ruborem desiderat in Sefamo Senensis, docti in illo pudorem, ut qui vnius plantulæ fortè arida animadversione, de Sefamo aduersus omnium iudicia statuerit. Sefamum vocatur Dodonzi hist. frugum, & in Ital. Camer. in Hist. & Epit. Matth. Lob. Icon. Pl. Tabern. & Anguil. cui & *Susfiani*, & in Sicilia *Gingulena*. Quam benè verò *Wirsung*, in ind. suæ med. vocat, *Leindotter* semen Isaminum, Sessaminum, perpendant lectores.

Prosper. Alpin. (*Sempfen*, *Sempsem* & *Sesamum* dicitur) Hist. Lugd. ut & Camer. horto Sefamum verum. An Tragus de hac (sibi fortè non ritè cognita) Sefamus peregrina & ipsa iam pridem ad nos adportata est, nostrati per omnia ferè similis.

Nomina linguarum Sefamum & Sisamum, Sefama Latin. *Sesamum* Græc. *Leindotter* / *flachdotter*. Germ. Gall. *Ingoline*. Ital. *Sesamo*. Hisp. *Argilum* & *Alegria*. Arab. *Sempfeni*, siue *Sensera*. Offic. vulgò *gingulena*, Camer. Epit.

Locus. Sefami semen acceptum Lutetiâ à Chirurgo insigni Rasso, seminavi in Horto E. C. Habui etiam semen à Fratre Casparo Bauhino & à D. Dorotheo lo. Schvartz. Vidi etiam Venetiis. Basileæ in horto Di. Dis Jacobi Zvingeri, à quo etiam semen habui.

Temperam & Vires. Oleum quod Egyptii *Siris* appellant, ad cibos in frequentissimo est usu. Plantæ decocto vtuntur in totu ad Ophthalmias, ad tussim, anhelitumque difficultatem, pleuritidem, perimeumoniam & tumores duros scirrholos: mulieres pro vteri duritie inflexiones faciunt, & vtuntur ad capitis furfures, liuorèque faciei: & ad tumores scirrholos: planta & seminibus coctis cum melle, ad excoriatos nervos, ad combussas partes, ad calidas inflammationes: Decocto in clysteribus ad colicos dolores, & ad emolliendam aluum: Ad mouendas menstruas purgationes. Seminibus ad cibum usus est antiquus, pauci est nutrimenti.

Ad singula ad curam. Oleum ferè inque eius bibere, ut impinguescant mulieres in balneis familiarissimum habent. Olen etiam ad multa alia Egyptii uti consueverunt quippe ad cutis pustulas, asperitatem, atque omnem descordationem ex humore melancholico comitatam tum epoto, tum in cibis frequentato, vel ipsis affectis partibus inunctis. *Secretum* apud quosdam ad cutis pruritus, eius quatuor vncias multis diebus bibendam exhiberi, ad anhelitus difficultatem, pleuritum desperatam, perimeumoniam, ad mouendos menses, atque ad vehementes stomachi, intestinorum, vterique dolorum cruciatus demulcendos, intus & extra. Non solum hæc Egyptiis manifesta fuerunt, sed multi alii ferè eadem memorie prodiderunt, ut est Rhafis, Auicennas, Haly, Serapio, atque alii. Sefami vires ex Antiquis antè sunt scriptæ.

TELEPHIVM VETERIBVS.

CAP. XXI.

Telephium, inquit Dioscorides Portulacæ simile est & foliis & caule: alas verò binas habet singulis foliorum geniculis inherentes. A radice ramuli [addit Matth. Codex *cod.*, *αἰών*, id est, angusti, tenues,] seni, septenive prodeunt, foliis reperi cœruleis (*κυανέων*, quam vocem Plinius non expresse, crassis, lentis, atque carnosus: flores denique lutei, aut candidi (Ver. tantum *λευκά*). Sed vulgatam lectionem rectiorem vult esse Goupylus, quoddam Telephio flores lutei spectentur, Sarrac.) Nasitur in vineis & locis cultis Vere.

Dioscoridis Notha tradunt, quibusdam sempervivum sylvæ dici, Esse & qui Portulacam sylvæ appellent, Romanos illecebram, Aegyptios Anoth, Aphricos Autopurin.

Telephium ita describit Plinius, ut ex Dioscori transkulisse videatur. Verba eius hæc sunt: Telephium Portulacæ simile & caule & foliis. Rami à radice septeni, octonive fruticant, foliis crassis, carnosus. Nasitur in cultis & maxime inter vites.

Folia, authore Diosc. ad sex horas imposita, vitiliginem albam sanant: verum postea hordeaceam farinam adhibere oportet. Tollunt & vitilignes, ex aceto in Sole illita: sed ubi inaruerint, abstergi ea oportet. Eadem & Plinius, nisi quod in usu ad vitiliginem dissentit, & hac parte rectius Cornarii iudicio videtur hoc quod Plinius trahit: Illinitur lentigini, & quum inaruit, deteritur. Illinitur & vitiligini ternis ferè mensibus lenis horis noctis, aut diei. Postea farina hordeacea illinitur. Medetur & vulneribus & fistulis.

Telephio siccantem & extergentem facultatem adscribit Galenus, non tamen manifestè calidam, ita ut primo quidem ordine calefaciat, siccet autem secundo intento, aut tertii initio: proinde ad putrida vlcera convenit, & leucas, & aliphos cum aceto sanat.

Veniunt autem nomine Telephii plures plantæ: Ac primum quidem Telephium Guilandini, quod nobis placet & Telephium Scorpioides vocamus, de quo mox. Est & Telephii genus fruticosum peregrinum. An hæc Hist. g. lib. ii. Colutea Scorpioides minor. Nec est Telephium, Fabaria siue Faba pinguis, ut quidam volunt apud Matthiolum. Est enim hæc Anacampteros, de qua dicemus Hist. nost. lib. 35. Telephium Galin Glossii Hippocr. diversum puto à Dioscoridis Telephio propriè dicto, & idem cum Semperui siue Aizoi tertia specie lib. 4. Dioscor. quæ etiam Telephium dicitur: nos igitur non dicimus cum Cornario simpliciter Telephium esse *fa-genrüblein*, ut dicemus capite de Sedo paruo ex flore luteo.

TELEPHIVM SCORPIOIDES.

Ex gracili radice aliquot emittit ramulos, palmares & sesquipalmares, tenues, teretes. folia rara, breui pediculo annexa, Portulacæ minus succulenta, laxa, indivisa, candicante Cœsalp. quibus subsunt bina exigua, circinata, Coluteæ Scorpioidis, forma & magnitudine. Mihi

Folia Portulacæ

Vites

Telephium
equinaria
tionis.
Teleph.
Scorpioides
Colutea
Scorpioides
minor.
Anacampteros
siue.

Sedo
frut.
sempervivum
paruum
et
cro.

Descriptio

Fff 4

Scorpioides
Scorpioides
herba Pl.
me.



imitate, tuber-
culis semensal-
cata Lunæ ef-
figie continen-
tibus, gibbo-
sa.

Dodon. Gall.
Scorpioides.
Belg. Scorp-
ion fruyt,
quibusdam he-
senoore. Gall.
Aurille de Lie-
vre, Lat. n. fol.
Scorpioides
prior: ad Scorp-
ioides accedit
ac legitima
Dioscoridis ap-
paret: à Plinio
Latine Scorp-
ius herba ap-
pellatur. Lob.

Adv. Obs. & Icon. Pl. Scorpioides repens Bupleu-
ri folio Dodon. effig. 48.

Tabern. Ic. & Hist. Scorpioides Bupleuri folio,
Raupefrucht. C. Bauh. Phyt. Scorpioides. i. siue
Bupleuri folio. Est hoc quibusdam Clymenum
Diosc. & Clymenum alterum Plinii, alius Cata-
nance.

locus &
tempus.

Scorpioidem siliqua simili Erucæ primò reper-
tam Montpelu prope patibulum & Castelnau, in
colle iuxta viam ad ripam fluvii: Folia videntur
habere aliquam acrimoniam: siliquas fert cum
floribus mense Aprili: hanc denominavi Scorp-
ioidem, non quidem Diosc. priusquam vidissem
à Dodonzo depictam, postea observavi Tiguri
in horto Petri Trigulacii Chirurghi insignis. Ge-
neuz provenit in horto, floruit & semen pro-
tulit, quod Autumno germinans hiemem pertu-
lit, virens adhuc mense Januarii, postea emor-
tuum novo frigore superueniente. Basileæ in
horto D. Felici Plateni florens & siliquas habens
Junio mense, in horto Patris à Fratre satum Basi-
lex. Patavi in horto Cortusii pulchrè virens
mensis Martii principio. Montbelgardi satum faci-
le provenit sed hiemem vix perfert, multò maius
quàm Montpel. evadit: habeo in Horto E. C. ubi
etiam in maiorem provenit altitudinem quàm
Montpelu. In Olivetis & aridis montosis Mons-
pelio vicinis, frequens Lobelio occurrit hæc, ali-
bi rara planta, nec nisi in hortis vitatur.

SCORPIOIDES MONTA- NUM.

Descriptio

Scorpioides montanum Herbariis quibusdam
dictum in alvis & asperis montibus nascitur,
radice crassiuscula, nigra, in fibras multas &
breves se diducente: foliis, multis, longis,
angustis, lanuginosis, Leucoio purpureo si-
milibus, sed margine non incisis: caule palmum
alto, foliola pauca mittente: flosculis tribus
vel quatuor, cæruleis, in exiguum, rotun-
dumque caputulum, siue Corymbum
conglobatis. Rara hæc planta est, montium-
que solitudinibus inaccessis tantum familia-
ris.



Quum rara
sit planta oport-
ebat annotare
locum particu-
larem ubi pro-
venit.

C. Bauhinus
Phyt. Scorpioi-
des 2. siue mon-
tanum Hist.
Lugd. quid?

HYPECOON VETERIBVS. CAP. XXIII.

Hypocoon Diosc. autore, aliqui Hypopheon
vocat. Nascitur in frumento & arvis. Fo-
lium habet Rutæ simile: ramos paruos. Vim ha-
bet respondentem Papaveris succo, Scribit Pli-
nius Hypocoon in legetibus nasci, solus Rutæ.
Naturam eius eandem quæ Papaveris succo.

Hypocoon
Rutæ folio

Galenus: Hypocoon, inquit, frigefacientem
vim habet, ex tertio ordine frigefacientium, ut à
Papavere parum absit: Ita etiam Paulus. Non
satis inquit Cornarius, notum est hodie quæ her-
ba sit, de qua hic scribunt prædicti.

Temperat
montanum

Hypocoon Dodonzi, quod in purg. exhibet,
cuiusque historiam Hypocoi Dioscoridis ascribit;
Hypocoon siliquosum dicimus. Plantam verò
Hist. Lugd. titulo Hypocoi demonstrat, eamque
falsò Dodonzum in purg. Hypocoon Dioscori-
dis facere scribit. Thalictrum paruum esse dice-
tur lib. 30. Nihil tamen minus est quàm Hype-
coun Dioscoridis, quod Matth. in com. Ital. &
Lat. cum magn. fig. & ex eo Camer. ad Hist. Germ.
& Epit. Matth. Hypocoi nomine pingit. Alcea
hæc est, ut videre licet Hist. nost. gen. lib. 23.

Hypocoi
quiuoca.
Hypocoon
siliquosum.
Thalictrum

Alcea?

HYPECOVM SILIQVOSVM.

Descriptio



Plurimos
ex radice
simplici, Ge-
ranni Robert-
ni vel potius
moschati æ-
mula, rubel-
cente, caules
emittit laeves,
pedales, in alas
frequentes, cir-
ca summum di-
stilos: folia ma-
iore ex parte
fundit quoque
radix, Rutæ
sylvestr. tenui-
folia aut Fa-
marie similia;
flores lutei &
senis compo-
nuntur folijs.

duobus aduersis magnis, neruo viridi donatis, ex sublongo quadrangulis, quatuor reliquis interiectis multo minoribus, in quorum medio apices. Semen oblongum fert, siliquis inclusum articulatis, tres, quatuorue vncias longis, rotundis, multumque falcatis.

Matth. in post. com. Ital. picturam habet nomine Cumini silu. alterius sine descriptione.

Aduers. quæ describunt & depingunt, Cuminum alterum Dioscoridis siliquosum vocant.

Aduersariorū figuram & situlum retinent Icon. Plant. & adhuc exhibent alteram, quam Cuminum silu. alterum siliquosum Lobeli inscribunt. Is autem Obl. eandem cum Clusio figuram habet, cui titulum facit. Cuminum silu. alterum Dioscoridis: Italorum Hypocoum Clusii & Dodonæi. Clusius porro, qui melius descripsit quam alii, potissimum florem, ait. Cum primum hanc plantam obseruarem, illico mihi visa est plurimum ad Hypocoum Historiam accedere, quod Græcis *ὑποκώων* & *ὑποκώων* dicitur. Non desunt tamen qui ad Cuminum sylvestre alterum Dioscoridis referre malint, licet facultates sint dissimiles. Vocatur hæc Granatensis & Murciana Adonia. Cur tandem planta, quæ Græcis *ὑποκώων* & à nonnullis *ὑποκώων* teste Dioscoride, dicitur, pro Cumino sylvestri sit habenda, nulla occurrit ratio: pro hac tamen ad se missam Matthiolus refert, si Dodonæum non fallit pictura.

Camer. hort. Cyminum sylvestre alterum Matthioli vel potius Hypocoum Clusii. Camer. in Hist. Germ. & Epit. Matth. Cuminum sylvestre alterum, Græcis, *ὑποκώων ἄγριον* i. nigr. Ital. *Cimino saluatico secundo*. Huius effigiem Camerarius ex nostra planta sicca, olim Gesnero cum aliis plurimis communicata, depinxit.

Tabern. Icon. Cuminum silu. 2. Hypocoum Diosc. Groffer horn funnel. Item Cyminum siliquosum minus, Klein horn funnel.

Locus & tempus.

Securidaca

Hypocoum Cauda

Hypocoum Clusii, Monspelii cum essem reperi cum flore & siliquis prope Lacum, non longè à Balneo, quod à Baleruch cognominatur: quod non magnum: aqua fusa & ita calida ut vix quis calorem pati possit. D. Dalechampius cum ei demonstrassem transeundo Lugduno ex planta mea sicca curauit depingendum: Gesnerus ad meam descriptionem adscripsit. Securidacis aliquos male adnumerare. Florens Iunio vidi Basileæ in horto Domini Doctoris Felici Plateri. Inter semina quæ hortulanus Ducis Florentini Stutgardiam misit accepi nomine Hypocou Caudæ: quod seminavi in Horto Illustr. Exc. C. Montbelgardi.

DENTARIA QVINQUEFOLIA.

CAP. XXIV.

Descriptio

Radicem habet Coralloides prima, è squamatis denticulis compactam, albam, nitidam: caules cubitum alti, tenues: folia quina in idem punctum coeunt, Pentaphylli modo, oblonga, acuminata, circumcirca serrata, paucis neruo medio obliquis in marginem expositis venis: flores summo caule herent Hesperidum ex albo purpurascens colore, quibus & non abimiles superueniunt semen continentes siliquis.

Hanc sic describit Clusius. Est dentata radix, siue inæqualis & pluribus crassis squamis exaspe-

rata, & raris fibræ inter illas nascentibus, prædita, ex qua prodeunt caules rotundi, pedalis, in quo per intervalla quina folia longiusculo pediculo



subnixa, longa, in ambitu serrata, molliora quam in superiore, neque adeo saturata viriditate prædita: flores in summo fastigio iam dictæ floribus per similes, quatuor videlicet foliis, Leucoii florum instar, constantes, colore dispari.

Dodon. de purg. in append. Violam appellat propter florum cum Leucois similitudinem.

Camer. ad Hist. Germ. Matth. Dentaria dicitur in Epit. Dentaria minor, siue Sanicula quinquefolia. Ital. *Dentaria minore*. Germ. *Zanfraut*. Eadem in hort. Dentaria bulbifera Pentaphyllos. Clusio Dentaria 7. siue pentaphyllos 2. à foliorum vni pediculo inhzrentium numero, non ineptè fortasse dici posse videtur.

Huius meminit Iosias Simlerus ad finem Commentarii de Alpibus his verbis, *wilder senff* herba eius nominis prior vno pediculo septena habet folia, supremo caule multos flores purpureos, & partim albos [albos ego, inquit Clusius, duntaxat conspexi] post quos cornicula subnascuntur semen continentia minutum [non satis exactè obseruasse videtur, nam Hesperidis semini dispar non est] compressum: radix subest alba alabastris modo splendens, squamea. Nos Dentariam vulgè nominamus à forma radicum, quod ex pluribus squammis, quasi dentibus componatur. Dodonæus ad Leucoium referre posse putat.

Macklinæ nascentem conspiciebat Clusius in cultis horto Ill. V. lo. de Brancion ex Allobrogibus & Italia acceptam. Ad cubiti altitudinem crescit cum Coralloide altera septifolia, umbrosa loca amat, & latet, primo Vere statim emergit. Simlerus.

Locus & tempus

CORALLOIDES PRIMA, QVINQUEFOLIA.

CAP. XXV.

A radice nodosa, & in plurimos articulos distincta, tenuibusque aliquot fibræ, ex articulorum distinctorum prodeuntibus donata, exeunt aliquot folia, longis pediculis nixa, in quinque profundas & ad pediculum vsque sectas lacinias, in ambitu crenatas, diuisa, scabra, & tactu aspera, saturè virentia: caulis pedalis aut amplior, rotundus, summo fastigio, quinos aut senos flores, bulbifera floribus similes gerens, colore tamen paulò magis saturatè purpurascens, qualis fere in floribus Violæ latifoliz non viuacis, quam nonnulli Lunariam Gram appellat: succedunt capitula longiora semine plena.

Gesner.

Gelnerin Hist. Cordi, figuram ponit à Kentmanno acceptam, dicens: Aliqui, ni fallor, Coralloidem Cordi, Saniculam albam vocant, alii tamen Aconitis adnumerant. Hæc ille, qui si plantam hanc nostram intelligit, figura non placet. Cordonem etiam aliam intellexisse existimari. Idem de hort. scribit esse Saxifragæ montanæ speciem, ac rursus eandem nomine Saniculæ foliis Pentaphylli maioris ex Matthiolo indigitat. Ibidem quoque Saniculam albam appellat, & Hestiacam ac Italorum Dentariam.



Matth. in Diosc. lib. 4. cap. de Symphito, hanc describit dicens: Recensetur à Germanis inter Symphiti genera quædam foliis Pentaphylli maioribus. In post. com. Ital. non solum describit, sed depingit quoque, titulo, Dentariæ alterius.

Aduers. picturam habent non vsque adeo commodam, hoc titulo: Nemoralis alpina herbariorum Alabastrites, Coralloides Cordi: Meliorem hoc nomine habet Lob. Icon. Plant.

Clusius in Pann. hanc ita inscribit: Dentaria Matthioli, Pentaphyllos 4. Est hæc inibi sine descriptione. Eandem exhibet Hist. post. cum descriptione, quam hoc in loco posuimus, sub hoc titulo: Dentaria 6. Pentaphyllos 1. Sextam, inquit, Coralloidem alteram dixisse Cordonem, nonnulli arbitrantur. Matthiolum Dentariam minorem: mihi Dentaria *pentaphylla* prima à foliorum vni pediculo inhaerentium numero, non ineptè fortasse dici posse videtur: quemadmodum nec Dentaria *pentaphylla* altera.

C. Bauh. phyt. Dentaria 1. siue Pentaphyllos: Dentaria minor Matthioli.

Tabern. la-
gum variis

Ni impetior Taberna foret, grauem sanè censuram mereretur. Tres quandoquidem vnius plantæ figuras proponit Quatum, quam 1 in Hist. facit, in ic. Dentariam quinquefoliam, & Consolidam Dentariam vocat. Cui in Hist. 2. titulum tribuit in ic. Dentariam alteram Matthioli appellat. Cuius in Hist. tertio loco meminit, ea ab ipso in Icon. Dentaria corallina altera nuncupatur. Egregius, mehercle, Botanicus!

Qui variis titulis lectores ludere vult.

Ceterum, hæc & alix: quia radices habent Coralliæ æmulas, idè Coralloides & Alabastrites cognominantur. Sunt autem qui has ad solidagineos referant & Symphita, alii inter Saxifragas, alii inter Saniculas recenseant. Nobis in hac controuersia, huc collocare integrum esto, donec vel tu, vel alius aptiorem perquirat locum.

Ad Allobrogicarum Alpium radices supra Lemanium lacum, cum sequente spontè nascentem, obseruare memini (inquit Clusius) ante quadraginta annos, dum per Helueticos, è Gallia Narbonensi, in patriam redirem, præclusa per reli-

quam Galliam viâ, feruente bello inter Imp. Cæsarum V. & Galliarum Regem Henricum II.

CORALLOIDES ALTERA SIVE SEP- tifolia.



Descriptio

A Altera Coralli aut alabastrites marmoris politæ æmulam habet radicem obliquam, ruberibus inæqualem: caules cubitales: ex quibus orti pediculi foliorum sustinent duas aut tres coniugationes, quibus superadditur semper extremum instar: singulariâ verò folia oblonga, serrata, Coralloidis

præcedentis foliis sunt proxima, paullo maiora: flores similiter extremo cauli ex longis pediculis hærent magni, Leuconi aut prædictæ Coralloidis similes, è quatuor foliis compositi, colore niueo vel purpurascens, hosce sequuntur in longis siliquis semina compressa.

Clusi descriptione hæc est. Huic aliquot è radice exeunt folia, quina interdum, sed maximè ex parte septena, longæ costæ inhaerentia, foliorum Fraxini instar digesta, hoc est, vt ex aduerso bina semper respondeant, folium impar extremam alam occupet, omnia in ambitu serrata, dilutius virentia quàm Sextæ [Dentariæ] quinquefoliæ folia, & subitis candicantia: caulem etiam pedalem, rotundum, binæ aut ternæ foliorum alæ, iis quæ à radice prodeunt non dissimiles, ornant: eius autem summum, flores superioris floribus pares, quatuor videlicet foliis constantes, candidi tamen coloris: cornicula quæ succedunt, etiam paria, simile semen continens: radix minus squamata, quàm præcedentis, Quintæ (Coralloidis Enneaphylli) radici ferè respondens, & paucis crassioribus fibris firmata.

De Coralloide hac & minore bulbifera hæc Cæsalpinus tradit: Dux in montibus nascuntur frequentes in sylvis, quas vulgò Dentarias vocant, distant inter se magnitudine: nam maior Folia fert ab radice diuisa in septem vt plurimum partes, Ellebori nigri modo, molli a, angulosa, Cichori modo, inferius subcandida: caulem simplicem, cubitalem aut paulò breuiorem, in cuius cacumine vnicum folium, similiter diuisum sustinet, è cuius sinu ramulus attollitur, in quo flores candidi, vt Leuconi, & siliquæ simplices, quod in hoc genere paucis contingit: radicem digiti crassitudine summâ tellure obliquè tendentem, frequenubus geniculis pulchrè dearticulatam, colore candido, splendentem alabastri modo, quasi dentes, vnde nomen assumpsit, quæ tamen vetustate nigrescit, sobolom à lateribus candidam ferens: hæc tantum in altissimis nascitur. Minor ad decliuora etiam loca descendit,

Descriptio

Alabastrites

Locum

floribus, cuiusmodi sunt precedentium, purpura (quam magna ex parte sicci amittunt) dilutiore nitentes: *semen & filiqua* vt heptaphylla. Verum & præter hæc omnia ad foliorum alas bulbi quidam, veluti in Lilio croceo bulbiferis, adnascuntur, per maturitatem nigricantes, ex quibus non secus ac ex semine propagatur.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. Dentaria Bulbifera. Clusius Pann. Dentaria 1. Hist. post. 4. siue baccifera. Czfalpin. Dentaria minor Lycoctoni Pontici Diosc. & Theophrasti Aconiti genus. Vide ante verba Czfalpi. capite de Coralloide sepiifolia.

Tabern. Hist. Dentaria 4. Icon. Dentaria sepiifolia. Ecce vocat Septifoliam, cum plerumque quina proferat, vt pictura eius & aliorum demonstrat.

C. Bauh. Phyt. Dentaria 3. siue baccifera.

Coralloidis pulchram speciem attulit Frater colle&am in monte Castello Patavii. Anno 1595. Junii 6. eandem ni fallor vidi Heidelbergæ in Horto Di. Sprengeri cum bulbis in caule, quos accepi plantandos Montbelgardi in Horto Il. E. C. Misi etiam nomine Dentariz bulbiferæ: Habui etiam Argentina à Friderico Meyer.

Cæterum, nullas harum plantarum facultates Clusius comperit.

ACONITVM LYCOCTONVM DODONÆI siliquosum, ad Coralloides forte referendum.

Descriptio
Lyncei.

Elus icon in peruetusto manuscripto Græco codice reperitur qui Viennæ Pannoniæ in Bibliotheca à D. Maximiliano 1. Imp. Aug. instituta asseruatur. Folia ei sunt non omnino vt Platani, sed lata: *caulis* tenuis & levis: *siliqua* tenues & oblongæ: *radices* non modò cirros, verum ipsas Squillas marinas referre videntur. Lycoctonum tertium Ponticum cognominatum Dioscoridi esse potest Dodon. Hist. Lat. in fol. 436. Mihi videtur figura à Dodonæo ficta aut pessimè expressa: ac existimo à Barbaris ita effictam plantam partim ad descriptionem, partim ex aliqua planta ineptè, vt solebant Barbari: si considerentur siliquæ & flores, fortè videbitur habere aliquid commune cum Coralloide: Dodonæi descriptio est fortassis ex figura. C. Bauh. Phyt. 332. Aconitum 3. siue Lycoctonum foliis serratis, siliquis oblongis: an tertium Dioscoridis?

LYSIMACHION VETERIBVS.

CAP. XXVI.

Lyfimachia, quam aliqui Lytron appellant, insit Dioscorides, *caules* emittit cubitales, aut etiam altiores, tenues, fruticulosos, à quorum geniculis *folia* prodeunt salignis similia, gustu astringentia: *stipes* est fulvus aut eius. Nascitur in palustribus & lectus aquas.

Inuenit & Lyfimachus herbam Lyfimachiam quæ ab eo nomen, teste Plinio, accepit, celebrata Erasistrato. Folia habet Salicis, viridia, stitem purpureum, fruticosa, ramulis erectis, odore grati. Gignitur in aquosis.

Hæc Græcis *Λυσιμάχη* & *Λυσιμάχη* dicitur, Latinis Lyfimachia, à Lyfimacho Rege inuentore: vel à pugna diuimenda: id enim est *λύσις* *μάχη* certamen diuimere. Est enim ei vis etiam

Tom. II

belluarum amicos feroces, & mutuos hostiles congressus placandi.

Foliorum succus quæ pollet adstringendi vi, vt refert Dioscorides, sanguinis reiectiones supprimit: valet etiam ad dysenteriam, seu potui datus, seu etiam clystere infusus: stitem quoque muliebrem sistit, subditus in pectore. Sed & herba sanguinis à naribus proflutio subuenit, iisdem indita. Est & vulneraria, sanguinemque supprimit. Acertunum verò nidorem suffragia reddit, addit vt & serpentes abigar, & muscas enecet.

Vim & vsum medicum sparsim proponit Plinius: Vis eius tanta est vt iumentis discordantibus in quo imposita, asperitatem cohibeat. Lyfimachia odorem fugiunt serpentes: Si ore sanguis reiciatur, siue feminarum vtero, Lyfimachia pota, vel illita, vel naribus indita, sistit: atque etiam recentibus plagis medetur. Capillum Lyfimachia flauum facit.

Galenus. Lyfimachia, inquit, adstringentem qualitatem predominantem habet, ob quam & vulnera glutinat, & sanguinis à naribus eruptiones sistit, si nares ea obturentur, & medicamentum est quod etiam alias sanguinis eruptiones cohibet, tum ipsa, tum adhuc magis succus ipsius. Quin & pota, & per clysterem infusa, dysenterias & sanguinis reiectiones & fluxum muliebrem sanat.

LYSIMACHIA LUTEA.



SVbrubente radice repultrice, lampo cespitè hærente nititur: caules autem proferit scilicet cubitales & bi-cubitales, striatos, hirsutos: quibus ad genicula adnascuntur *folia* ternaria aut quaternaria, rarius bina, Salicis bifolia, acuminate, superne atro-virentia, inferne magis candicantia, lanuginosa: *flo-*

res in extremis ramorum fastigiis lutei, Hyperici acidi saporis, ex quinque foliis componuntur, totidem staminibus medium occupantibus, odore nullo. Semen Coriandro par, sapore haud segnetè adstringente.

Fuchsio, Tabern. Turn. & Camer. ad Hist. Germ. Matth. pingentibus, Lyfimachia lutea. Dodon. Gall. Lyfimachium verum, seu luteum: Lat. fol. Lyfimachium legitimum. Matth. Lacun. Czfalpin. Anguill. Camer. in Epit. Lyfimachia. Gesn. hort. & Thallio Lyfimachium luteum. Lonic. Geel Weid. dertch, Salicaria, Lyfimachium Græcè.

Agnoscere officinas & herbarios duo Lyfimachiz genera, purpureum & melinum scribit Corn. sed à Salicis foliis Salicariam appellare. Contra Anguill. negat esse duas Lyfimachias diversorum colorum.

688

forte Pliniana. *Lysimachia altera* Matthioli. Hist. Lugd. *Lysimachia altera* Matthioli. C. Bauh. Phyt. *Lysimachia* 13. siue *Rata purpurea*, forte Plinii.

Locus & Tempus.

Lysimachia purpuream quibusdam flore spicato vidi Montpelu & Genevæ ac Basileæ florentem ad Birsam mense Iunio & Iulio. Montbelgardi abundat propè Adincourt & iuxta viam quæ itur *Souslaure*.

LYSIMACHIA PURPUREA Pannonica.

Descriptio



Nostre *Lysimachia* purpureæ spicata affinis Pannonica *Lysimachia*, caule quadrato, in oppositos ramos diviso, sed tenuiores: in his folia angusta acuminata, ex aduerso sita, nervo secundum longitudinem decurrente: in summo caule flores in longa spica coherere, quaterni serè, aut singuli etiam alternati.

nam è graminis folioli sinu prodeuntes, colore purpureo præditi, suis senis contexti, è calyce oblongo minore quàm in purpurea spicata nostra, striato, ad Calamentis calyces accedente. Rarè cubitalem altitudinem hanc *Lysimachia* superare testatur reliquit Clusius, foliaque si mordeantur gummosa, deinde nonnihil acrimoniae & amaritudinis exerere: radicem duram lignosam, multos caules singulis annis proferre, & subinde lateribus se propagare & multis fibris inhaerere.

Clus. Pann. *Lysimachia* 1. *Lysimachia* minor rubro flore. Calp. Bauh. Phyt. *Lysimachia* 4. siue rubra non siliquosa.

Locus & Tempus

Accepi plantam ex Agerii fidei Argentine 1595. quæ colore florum valdè placet, qui mihi cruleus serè videtur, incipitio erat, *Lysimachia* purpurea Pannonica Clusii.

EPHEMERON MATTHIOLI.

Descriptio

Prodit foliis oblongis, latis, duriusculis, veluti Isatidis, sed tamen minoribus, cauliculis compluribus rotundis, cubito altioribus, non absque adnatis: quos superius quinquefolii candidi conuestiunt flosculi, haud magni, succelluè prodeuntes, semen succedit in rotundis capis exiguum, crassis & multis fibris capillata radice.

Ephemerum quod silv. Irin appellant in Ananienfibus montibus tam in pratis, quàm in silvis copiosè nascitur, ubi Indigenis vocatur vulgò *Giglio Marro*, hoc est, *Lilium stultum*. Huic certè, nisi me fallit iudicium [inquit Matth.] omnes prorsus notæ conveniunt, quæ alteri *Ephemerum* & *Dioscori* tribuuntur, & Gal. lib. 6. *Ephemerum* non

Tom. II.



lethale siue alterum, & Irin agrestem cognominat. Idè Hist. Germ. vocat *Ephemerum* non lethale flom albo *Dioscori*. Plinii verò cruleos. *Quandocumque* autem *Matthioli* suam *Ephemerum* non describit: nec planta *Cammario* occurrit eius figuræ respondens, omisit donec aliquid certi resciscatur. *Mirum*

Matthiolum non descripsisse plantam vulgò non notam, si eam benè agnouit.

Plant. Icon. Lob. & Obs. *Ephemerum* Matth. vel potius *Ephemerum spurium*. H. Lugd. *Ephemerum* non lethale. Matth.

Tabern. Icon. *Ephemerum* Matth. *Wissen* *Zeitlosen*, *vechtblumen*.

Matthiolum aliud *Ephemerum* exhibet, quod in hortis Belgii aliter, quàm ab eo depingitur enatum est: verum illud cum *Ephemerum* *Dioscori* parum, immò nihil convenit: *Dioscori* des *Ephemerum* ait à nonnullis appellari *Irini*. Ast mauult *Dodon.* de purg. legere *Irini*. Nam si folium caulesque *Lili*, cuius *Lilium* silv. quàm siue *Irini* *Iris* videtur nuncupandum *Ephemerum* *Matthioli*.

C. Bauh. Phyt. in app. *Ephemerum* 1. siue *Matthioli*, *Ephemerum* 2. siue *Matthioli*, vel potius *spurium* *Lobeli*. Vix credimus easdem esse, cum illi folia *Lili* & radix vnica digitalis tribuatur: huic verò folia & radix Isatidis ascribantur: imò figurarum nulla similitudo: verum cum neutram viderimus nihil statuere licet. Idem tradit apud *Matth.*

LYSIMACHIA SILIQVOSA HIRSVTA, maiore flore purpureo.



Multis si-
bris capillata radice nititur, caules emittens tenues, teretes, rubentes, subhirsutos: foliis saepe bina, non exactè aduersa, salicis, crenis rubentibus incisâ, glabra, gustu viscido, aliquod coloris vestigium relinquente: strobis longis, quadratis, hirsutis rubentibus siliquis in qua-

688

tuor foliola fatifcentibus infident; dilute purpurei, ex quatuor foliis cordatis striatis compoliti, in quorum medio fibræ ex luteolo herbida: filiqua præproprio ortu flores anteueritentes semen continent pusillum, lanugine candida inuolutum.

Trago Salicaria altera purpureas ferens Violas Andere wederich mit bi. aünen Violen.

Fuchs. *Lysimachia purpurea*.

Meminit huius Gesnerian sine Hist. Cordi cap. de Chamænerio, dum Chamænerii speciem describit, quam Delphinium esse putat: Herbarii quidam [inquit] putant esse quam *Filium ante patrem* appellant, quod siliquam & intus semen ante floris exitum ostendat, rectius si *Partus ante conceptum* ab eis appellaretur. Iam aptius à teretibus siliquis per extremum in expansum florem exeunte, Buccinariam dici audio. Ruelhus Belium cum Antipatre confundit, Delphinium non existimo. Filius ante patrem vocatur, ab aliis (in Germania inferiori præsertim) Antoniana vel *S. Antonii herba*: Nostri Schoßkraut appellant: Dodonæus inter *Lysimachias* describit. Appellatur, si lubet Epilobium. Idem de hort. scribit Antonianam vel *S. Antonii herbam*, ab aliquibus *Filium ante patrem*, & alius *Lychnidem maiorem* & *hirsutam* appellari.

Dodon. Gall. *Lysimachia* 2^a. Filius ante patrem, *Lysimachium purpureum primum*. Lat. in fol. *Pseudolysimachium purpureum*. Quæ porro de hoc tradit, cum ad intelligentiam verborum Gesneri iam dictorum conferre videantur, ea adscribere placuit. *Lysimachia* species habetur. & à Fuchsio ante nos, inquit, pro *Lysimachio purpureo* descripta: non est tamen legitimum *Lysimachium*, sed spurium ac *Pseudo-Lysimachium*. Quæ de causâ & aliis maluit ipsum nominibus Gesnerius compellere, & Epilobion, aut Chamænerion vocitare: *Chamænerion* quidem, quoddam flos sit Leucoio similis super siliquam natus, *Chamænerion* verò à similitudine aliqua cum Nerio siue Rhodendro, præsertim aliis assurgens, cuiusque flos è latioribus foliis compolitus exiguum totam æmulatur. Idem verò & Antonianam dici à nonnullis refert: sed tamen & aliam aut Antonianam esse, quæ dentium dolori medeatur. Nominatur verò & passim *Filius ante patrem*, propterea quoddam siliquæ appareant prius quàm flos. Censetur etiam à quibusdam Onagra Veicium, quæ & Oenothera siue Onuris. Dioscorides verò hanc ait esse fruccem prægrandem arboris instar: *Lysimachium* verò istud purpureum non nisi herba est, hyeme etiam inarescens tantum abest ut frutex sit, aut arborem æmulari queat.

Aduert. Lob. & Peñæ *Lysimachia filiquosa*, Filius ante patrem. Lobel. Obl. & Icon. Plant. *Lysimachia filiquosa*, Delphinium Dioscoridis Dalechampio. H. Lugd. *Lysimachia purpurea* 1. Dodonæi. Tabern. Hist. & Icon. *Lysimachia filiquosa* 1. C. Bauh. phyt. *Lysimachia* 5. siue *filiquosa hirsuta* magno flore.

Nomina

Lysimachia filiquosa hirsuta maiore flore purpureo. Germ. Ross & Brasin *wederich*. Gesn. Schoßkraut. Eidem Epilodium, Filius ante patrem, Antoniana, vel *S. Antonii herba*, *Lychnis maior* & *hirsuta* aliquibus, Gal. *Lysimachia* 1. Dodon.

Locus & tempus

Filius ante patrem maior folio hirsuto, variis locis prouenit, circa Montbelgardum mense Augusto florentem vidi inter Dale & Andincourt; paludoso loco, ac etiam in Horto E. Cel. Prouenit

Montpelii: Basileæ propè Moutets, & propè Birsam intra urbem & extra portam S. Albani ad Birsam eandem florentem vidi Junio, Iulio & Octobri: Frater obseruauit ad Rhenum extra portam Rhen. Ferrariz in Cænobio S. Dominei à l'Angeli vidi. Guilandinum vocare Delphinium mihi indicatum. Iuxta scrobium, fossarum, fluuiorum, riuiulorumque margines, aliisque humidis locis reperitur: quandoque tamen & in siccioribus ext. præsertim quod latioris folii florem gignit. Tota serè æstate floret. Dodon.

Ceterum, vsum in Medicina [eodem refert. Vires] cum nullum habeat, vires quoque eius ac temperamentum cognoscere non contigit: Gesnerus tamen calidam & siccam secundo gradu iudicauit esse, atque ex diuersis constare partibus, nonnullis euidenter adstringentibus, aliis verò modicè abstergentibus.

LYSIMACHIA SILIQVOSA HIRSVTA flore minore.



hirsuta, coloris ex rubro pallentis, vel albidus: radix multis fibris est capillata.

Dod. Lat. fol. *Pseudolysimachium purpureum minus*.

Tabern. Hist. & Icon. *Lysimachia filiquosa* 2. C. Bauh. phyt. *Lysimachia* 6. siue *filiquosa hirsuta* paruo flore.

Lysimachia hirsuta filiquosa flore minore, prouenit Montbelgardii, vti in Horto E. C. sponte.

Locus

LYSIMACHIA SPECIOSA QVIBVSDAM Onagra dicta, filiquosa.

Descriptio

Lysimachia species reliquis proceritate superat hæc quibusdam putata Onagra, tres, quatuorve aut plures cubitos alta, caule glabro, canaliculato, subrubente, copiosa medulla alba fungosa pleno, foliis multis ab imo ad summum, sicut & in ramis, donato, ad Salicis aut Nerii folia accedentibus, oblongis, mediocriter angustis, acuminatis, utrinque glabris, raris quædam per ambitum crenatis vestigia ostendentibus, obliquis ad latera venis, à nervo medio secundum longitudinem decurrente deductis, sapore subadstringente & glutinoso, non sine aliqua obstruæ achimonia: in ramis tubentibus longa serie nascit.



nascentur fili-
qua longæ, qua-
dratæ, (cui in
Lysimachia cui
Filius ante pa-
trem nomen)
rubentes aut
ex rubore in ci-
nereum deci-
hantes, lubris-
sæ, bisulcæ,
in quibus se-
men papposo
tomento deli-
catissimo in-
voluitur, per-
pusillum, ob-
longum cinc-
teum, siliqua-
rum porro sa-
stigia in qua-
terna folia an-

gusta explicantur, flores sustinentia speciosos
Leucon, purpurascens, quorum medium occu-
pant flamina candida, apicibus rubentibus aut
luridis, pistillo longiore, in quatuor crura desinente. Radix alba, longè latèque repit, gustu
insipido viscosoque.

De hac Hist. Lugd. *οἰζύρα, οἰζύρα, οἰζύρα* Dio-
scoridi, *οἰζύρα* Theophrasto, *οἰζύρα*, *οἰζύρα* Gale-
no, Latine similiter Onagra, siue potius Oena-
gra & Oenotheris, *Οἰζύρα* à vino dicta. Fru-
tex est arboris specie, ita deserviente Dio-
sc. ad medium magnus, folia habens amygdalæ similia,
sed latiora, & lili foliis similia, flores rosarum
specie, magnos, radicem albam, longam, quæ sic-
cata vini odorem reddit. Nascentur in montanis
locis. Eadem Plinius tradit.

Franc. Calzol. insignis Pharmacop. dicit in sua
montis Baldi descriptione, provenire ibi Ona-
gram, hanc fortè intelligens. Onagram quidem
siue Mulcibrutam in Veronensi Baldo Lobel. &
Pena sciscitavit sunt: sed id responsi tulerunt, nul-
lam repertam plantam quæ quadret Onagræ.

Nullum inquit Matth. in Dio-
sc. sicut repetit
qui mihi Onagram, siue Oenotheram, aut Onu-
rio Dio-
scoridis, siue Oenotheram Theophrasti
ostenderet. Ad me scripsit Lucas Ghinus, sepi-
dæ à se ex Apennino translata, foliis Amygdalæ.
Quæ sanè omni ex parte Onagram referre vide-
tur, nisi ipse quoque pro certo non ausit asserere
hanc legitimam esse Onagram.

Descriptio Gesner. in sine Hist. Cordi, depingens & des-
cribens vocat Elobii quintam speciem, quam pri-
uatim Chamænerion nuncupat. Aliqui verò
seu fructus igniarum. Nec assentitur illis qui Ly-
simachii speciem hanc esse suspicantur. Idem ta-
men rursus de hort. Antonianam herbam, S. An-
tonii, Filii ante patrem, speciem maximam facit.

C. Bauh. phyt. Lysimachia 10. siue Chamæ-
nerion dicta, latifolia, flore caruleo & albo, sed ra-
ridus.

Locus & tempus Lysimachiam speciosam siliquosam, Dale-
champhio Onagram dictam, vidi Basileæ spontè
& in hortis cum flore junio. Frater C. Bauhinus
observavit in monte Mourets. Men-
se Octobri reperi in monte Balon, florentem Augusto. A-
bundat circa Montbelgardum quæ itur Adin-
court, unde transtuli in Hortum Ill. E. C.
Aqua in qua radix maduerit in potu data, àuctore
Dio-
sc. scias mitigat & cicures reddit: illita quoque
maligna ulcera muleet. Adiecit Crateus, inquit
Tom. II.

Plinius, Oenotheridæ, cuius aspersio à vino feritas
omnium animalium mitigaretur. Et per se Oeno-
thera effertantia sepe ulcera sanat, ita *Oenothera* in
Dioscoridis exponens. Huius radix, inquit Ga-
lenus, arfacta vinisum quiddam sedolet: Sed &
facultatis vini est maximè.

LYSIMACHIA LEVIS.



Lenis non Descriptio

Lenis me-
sunt, & quidd
nullis penitus
pilis sit & bilita
sed quæd viq;
ad d. r. vibus
tam in casti-
bus bicubitali-
bus, altiori-
bulque tereti-
bus, rubenti-
bus, ramosis,
quàm in foliis
(quæ bina op-
posita, ex in-
ternodiis latius-
cula serrata)
donata sit, ut
oculorum aciem
sepe fugiant.

Sunt autem

lubadstringente sapore folia: flores siliquis lon-
gis Lysimachia siliquosa huiusmodi similes, sed fo-
lorum instar laticibus, quibus flores insident mi-
nores diluioresque, quàm in iam dicta Lysima-
chia: semen simile: radix multis fibris intertextis,
quamvis stolonibus se propagat.

An Aduerl. Lysimachia siliquosa altera spe-
cies?

An Dodon. Gall. Lysimachia secunda alia spe-
ciem minima.

Lysimachia, siue Filius ante patrem, lenis, flo-
ret mense junio. Eadem nomina à Gesnero hinc,
ni fallor, attribuuntur, quæ alteri hirsuta quam
lenem maiorem vocat. Basileæ in sylvis obserua-
uit Frater Montbelgarda florens & semine matu-
ro Augusto.

Locus & tempus

LYSIMACHIA SILIQVOSA

speciosa, angustifolia.



Superiori to-
Sta quidem Descriptio

facie similis, fo-
liis est confra-
tum multis si-
mul coarctus-
tis, Linariæ fo-
liis & longitu-
dine & latitu-
dine paribus:
flores consim-
iles purpura-
tes, longis in-
canis iam dictæ
corniculis insi-
dent, minores:
radix repens
cum præceden-
tis radice con-
uenit.

Planta hæc
ut refert Hist.

Lugd. quæ Linariam rubram vocat, Herbariorum quorundam iudicio Therionarca est Plinii, fruticosa, foliis subviridibus, flore roseo. A plerisque etiam an Delphinium sit Græcorum non sine causa ambigitur, quod huius folia incisa non videantur, qualia Delphini à Dioscoride describuntur. At si diligenter notas à Dioscoride memoratas expendamus, à Delphini historia parum distat.

Lobel. Obs. & Icon. Pl. Chamænerion Gelsneri,
Delphinium Buccinum Dioscor. Lythmachia fili-
quosa varietas.

An Gelfner, hort. Antoniana, Filius ante pa-
trem minor, Schoß fraß.

C. Bauh. Phyt. *Lythymachia n. sine Chamæne-*
rión dicta angustifolia. Epilobium [ἑπὶ ὅτ' ἀσπρῶν,
Viola super aliqua] sextum Gesner. ad Cor-
 dum.

Lythmachiam siliquosam speciosam angustifolia reperi Geneuz iuxta fluvium *Arue*: D. Dalechampsius vocabat *Therionarcam* Plinii lib. 25. cap. 9. & aliorum *Delphinium*. Frater Casp. Bauhinus attulit ex Italia nomine *Herbae nove* Cottuso, & *Chamaenerii* Gesneri.

Et quia dubitatur an sit Therionarca Plinii & Delphinium Dioscoridis, idem vires etiam adscribendæ earum plantarum veniunt. Therionarca Magiæ omnes feræ torpescere, nec nisi Hyænz urinz aspersu recreari auctor est Plinius. Et alio in loco, Serpentes necat, inquit, & cuicunque admota feræ torporem adfert. At cum Therionarca dicatur, quod sit τὴν θηρίων τάραν, hac admota non feræ omnes torpescere & serpentes necari sed venenatas tantum bestias, & morsu ictu venoxias, melius fortasse dixisset Plinius. De Delphinio verò scripsit Dioscorides, semine nihil vilius bibi posse à Scorpione percussis. Aiuntque obiectâ herbâ Scorpiones resolui, atque ignavos torpescere: se notâ verò eâ sese recolligere.

NOLI ME TANGERE

С. П. XXVII.

Description:



ta, in ambitu serrata, mollicella: ex quorum alii
pedicelli tenent, in quibus ex duobus foliolis tesc

Summo cel-
spite radices
figit fibrosas : à
quibus cauli
turrigitur cu-
bitalis, dilutis-
simè, virens,
inanis & dia-
phanes, copio-
sum succum
insipidum
pressu remit-
tens, per inter-
ualla genicu-
lis, ad quæ to-
phorum poda-
gricorù emu-
la subinde tu-
bera, intercep-
tus : sola Cy-
nocrambes, la-
tiora, obtusio-

explicat flores, Nasturtii Indici floribus affimiles,
minores, corniculo intorto, ex flavo rubentes
punctulis rubris saturatioribus guttati, in quo-
rum medio exalbida flamina: his succedunt filiqua
oblonga Chelidonii majoris, angulosa, quæ ma-
turescente semine levis contactu semine excusso
diffiliunt, multis terrorem incutientes, Vermicu-
lorumque instar convolvuntur: Vnde Noli me
tangere nomen inditum. Non in omnibus placet
figura nostra Guariniana.

Trag. qui in Hist. Germ. *Springfals*, et
vulgo Ringelstrauch & wolffstrauch vocat, ac in
Lat. *Mercurialem* 4. sine filicestrem altera, & *Estra-*
lam 7. seu *dulcem* statuit, *Leptophyllum Tithy-*
malum appellat. Verum hæc opinio penitus dam-
nanda est, cum vis quicquam commutæ habeat
cum *Tithymalis*: nec enim folia, nec flores, nec
semina respondet, quod necum *Gesner* pluribus
in locis sentit: *Apocynon* eminus appellans.

Lob. & Pena Adu. Perficarum filios quosdam vo-
cant, cauendumque etiam precipiunt, de quibus
Mercurialem putet, tamque in eos usus legat,
vt nonnulli hallucinati fuerunt. Negantque esse
Senensis Phyllon : Statuentes potius esse alie-
ram Esulam syluest. Tragi: nec agnoscetes in
Esulam istam Tragi tradidisse pro Perficaris fili-
quos.

Hist. Lugd. Persicaria siliquata: An eadem
Chryzanthemum centèi? Chryzanthemum Hist. Lugd. non est
Nolui tangere, est ei valde affinis.

Recordor à me hanc herbam primò visam in
valle Leborana, inter Hapelsheim & S. Mariam,
vbi fodina argenti, cum essem adhuc puer, cuius
semen subito suo salu horrorem mouit. Inueni
in monte propè Eschbach illius Principis, ac transtuli
in hortum E. C. Tubingæ cum essem Fuchsii
præceptor meus Mercurialis speciem faciebat.
Basileæ vidi ad Pontis finem quâ itur Galina
guen, in itinere ex Morat Basileam copiosè repe-
ri inter Bâlsân & Wallburg/ loco humido flo-
rentem mense Septembri cum seminibus matu-
ris: Basileæ in horto D. Theodori Zvinckert
obseruavi florentem Iunio. Frater Casp. Bauhi-
nus annotauit provenire in Münchstein. Tiguri
in horto Gelsneri vidi. Inueni florentem cum se-
mine maturo Augusto mense in ascensu montis
Ballen. Dn. Melchior Sibitzius Medicus Argen-
tinâ mihi scripsit quosdam vocare Hydropicam
à turgentibus folliculis. Viennæ Austriæ in siluula
Wolff dicta reperitur.

Distillatam aquam ex herba Springstræte
vel hirschemelden dictam Vraßilauiz in calculo-
renum mitificè prædicant: Noli me tangere, arti-
culi turgiduli visuntur, ceu demonstrante natura
in promouenda vrina eius vsum plurimum vale-
re. Hanc quoque in Oleo Liliorum aut alio de-
coctam applicari Gesnerus non putat inutile.
Folia eius aliquot viro stranguriâ laboranti vtili-
ter imposuit, ac miram etiam vim habere dicit in-
cienda vrina, ac aquam distillatam præfer-
tim: quæ si copiosius hauriatur vel diabetem
inducit. Folia quinque in poculum vini nu-
per imposuit mulieri *spazzurica*, & vino epo-
to melius habuit. Canis, cum dedisset iuleu-
lum in quo manipulus eius decoctus erat, per
se sequi horam postea copiosissimam reddidit vri-
nam, pluribus verd horis post eam alius co-
piorè mota est: cuti imposita *varium*. Impatiens
herba faculrate fertur perniciosâ ac inter deleto-
teria habenda Dodon.

BALSAMINA

BALSAMINA FOEMINA PERSICI
folia, vel Saticis folio.

CAP. XXVIII.

Descriptio. Balsamina, quam Foeminam vocant, radice fibrosa & candida nititur: caulem autem habet enormis crassitie, cum altitudo cubitum saepe vix aequet, raro autem & parum superet: est is vero cortice aut rufus aut rubescens, aut herbido tectus, succo satuo praeignans, glaber ferè, cum interim rami, quos nullo ordine emittit, tomento leui vestiantur, foliis densè stipati, Salignis aut Petficis, acuminatis, per ambitum serratis, succulentis, sapore amaricantis praeditis: è quorum alii flores simul plures, Impatiens herbae Dodonaei [a. d. 1585] profiliunt, calcari longo ex carneo colore herbaceo, reliquis vero flos rubescit: fructus qualis Balsaminae mari, acuminatus, verrucosus, in quo semen clauditur.

Matth. in post. com. Lat. & Ital. cum mag. fig. Camer. in Eoit. Balsamina altera. Ital. Balsamina *magiore* sive foemina. Germ. Balsam fraur weiblic. Balsamina foemina Persici folia, Persicaria nonnullorum, Aduerf. Lob. & Penz. Anguill. Balsamine altera, Italorum herba di Santa Catharina.

Gesner. hort. Balsaminem vulgò dictam, Herbae nolite tangere cognatam suspicatur.

Trag. Balsaminae alterum genus.

Cord. Hist. Balsamella: cui Gesnerus addit figuram, vocans Balsaminem peregrinam, alteram Fuchsii, Dodonaei foeminam.

Dodon. in fol. qui describit & depingit sub titulo Balsamina, ait, vulgò Balsaminam nuncupat: & quandoque neutro genere Balsaminum.

Plant. Icon. Balsamina foemina Persici folia.

Tabern. Iconib. & Hist. Cam. apud Matth. Germ. & Hort. C. Bauh. Phyt. Balsamina foemina. Hist. Lugd. Balsaminum, seu Balsamina Matth. Balsamina Fuchsii: duas proponit Icones.

Locus. Balsamine foemina folio Salicis Montebolgardi facile provenit in Horto E. C. non maturefcit quotannis semen, licet saepe. Basileae habui in Horto Patris, apud D. Doctorem Felicem Plateum vidi florentem Iunio: observavi Eslingae & Patavii.

Purant quidam [id quod etiam scribunt] & hanc iidem esse enim altera Momordica viribus. Verum Matth. nullam eius experientiam habet.

ISATIS, SIVE GLASTRUM SATIVA ET
spontanea.

CAP. XXIX.

Pollicarist huius radix albida, & lignola ad cubitum aut sesquicubitum descendit: caules tenues, rigidisque surgit, ramosos: flores in ramulis lutei, crebri, exigui, ex foliis octo, maioribus, alternante sicut cum minoribus positis: flamina lutea: capsulae seminum nigricantes, linguarum similes, sed multò breviores, angustioresque, costà longitudinem percurrente, secundum quam etiam aperiuntur. Folia ad Cynoglossum accedentia, nonnihil glauca, longa, ad cubitum etiam, glabra, quaedam ex prioribus interdum hirsuta, & etiam nonnunquam sinuata ad Hel-



pendis folia accedentia, quaeque in caulibus & ramis sunt, nullo pediculo interveniente adnascuntur, pinnatis barbulis ad basin donata, glabra.

Duo Isatidis genera traduntur à Dioscoride: *indica* & *europaea*. Glastum domesticum, *indica* & *europaea*, Glastum sylvestre. De domestico inquit: Isatis sativa [quae caret Vet.] quae Linnarum. Insectorum utuntur, solum habet Plantagini simile, verum pinguis nigraque: caulem altitudine duos cubitos excedentem.

Siluestris iam dicta similis, sed folia habet maiora, ad Lactucam proximè accedentia: caules vero tenuiores, multifidos quadratenus rubentes, è quorum cacumine

folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen: florem molinum & tenuem.

Sciendum autem, quod secundum Dioscoridis descriptionem, quae hodie apud nos domestica est, siluestris sit apud Dioscoridem: & e contra, quae in arvis nascitur, domestica, angustioribus enim foliis constat, & paucioribus ramis, non tamen ea in usu est apud Insectores nostri temporis, neque caulem adeo altum gerit.

Verum, praedictas descriptiones erroneas esse & mendosas attestatur Cornarius. Ait enim molinum florem, & tenuiores ac multifidos caules, & in cacumine folliculos illos linguarum quandam effigiem representantes Isatim habere sativam, non siluestris. Contineri autem in his semen nigrum Melanthio (ait Celsus) simile. Sed & caulem duos cubitos excedentem, & non, ut quidam dixerunt, unum solum cubitum superantem producere. At siluestris Isatim nigriora ferre folia, cauliculum minorem & crassioris, florem purpureum, aut caeruleum: fructum asperum, cruciformem, semen includentem foliis parvis, & assidue per intervalla quinis distinctum.

Hoc modo legentibus, ut Hermolaus legit, nostrum Glastum, teste Celsopino, sativae Isatis ad summum quadrabit: siluestris autem Isatis, &

Herb S
Austin

Chlorophyll

Glasgow

2nd. 1847.

1


Troguis
differe

metica

In D
ex vid

Сэт
copio

**Illegitima
discussio**



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS SECVNDVS.

CAPSVLAS, SEV VASCVLA FERENTES HERBÆ, ACRES
& calidæ ferē omnes, vt Nasturtia, Thlaspi & similes.

A Siliquosis herbis haud ita longè recedunt, quæ minuta quadam vascula ferunt pro seminibus theca seu bursa: quarum multæ in superiori libro dici poterant, nisi hæc ipsa seminum receptacula non à manibus distincta fuissent. Proinde peculiari libro illas comprehendere libuit, quem tamen si quis vult appendicem facere prioris, ut omnium sit una Classis, & illam rationem adducere possit, quod & haecque pleraque acres ac calidæ sint.

NASTURTIVM VETERIBVS.

CAPVT. I.



Oc tanquam notum non describunt Authores: tantum ex attributis colligere licet aliquas notas. Dioscorides Ibericæ foliis & radicibus duabus (odore) Nasturtio comparat: Erysimum semine flavo:

Sisymbrium aquaticum sapore acri. Galenus viride inquit venire in obsonia cum pane, quoniam eius mordacitas humiditatis admixtione moderata sit, non exurens, ut si siccum esset; semen quoque, adurens, ut Sinapis. Theophrastus inquit lacium esse, quando ait: mense Iulio Nasturtium ferere assolent: exit à satù die quinto: semen autem vetus celerius provenit: constat acris succo. Genera huic minime plura: diversitatem enim generis ei deesse omnino volunt: Sed & Dioscorides vnus tantum meminit. Plinius duo tradit, ac alterum album, & alterum nigrius facit, sed nequaquam describit; meminit & silvestris, cui effectum maiorem ad omnia tribuit.

Nomina linguarum Καρδαμύνη Dioscoridis spuria, nunc Cynocardamum, nunc Ibericum, nunc Cardaminaceum seu Cardamanticum vocant; Aegyptii Σαμάθη: Romani & officinae Nasturtium; Barbari quidam Herbarii Cressionem h. r. t. e. n. s. e. m, Apuleius Cardaminam, Serapio Νορφή, Αλχηφ, Μανθιρά: Auerhoe Alcharf: Mauritanii Νάσ, Αλχηφ, seu Νάσ. Germ. fress/ Gartenfress: Belg. Fers/haiff fers. Gall. Cresson, Cresson de jardin, Cresson alen is our Nasturt Dodon. Ital. Nasturtio, & Agretto: Hisp. Nasturcyo & Malpica. Angl. Gerdin Cressyo, & Tomre Cressyo. Boh. Kzericha.

Nonnulli καρδαμύνη Græcis dictum putant, quasi καρδάμω, quod caput domet: nam arcem mentis.

Tom. II.

tis obsidens sua ferit acrimonia, & ignea vi præditum caput tentat. Aliis ὀξύτης ὀξύτης, id est, quod pupillas coëuntibus oculorum palpebris abscondat, ita dici aiunt: nam luminibus ad motum subinde cogit conuicere. A quo ὀξύτης verbum declinarunt, quod conuicere dicimus. Nec desunt qui dictum arbitrentur ἀνὰ τὴν καρδίαν, quod cor foueat, & in syncope cardiaca plurimum valeat. Id innuere videtur Aristophanes, cum ait, ἔχθρις ἵσχυρος ὀξύτης, ἢ ὀξύτης ὀξύτης; Editheri Nasturtia. Quid Nasturtiat is? Εὐχὴ καὶ ἡμῶν ὀξύτης, ἢ ὀξύτης ὀξύτης, id est, qui acris sunt animo, iustique, quique Nasturtia tuentur, id est, acutè cernunt. Nasturtium verò Plinio auctore nomen accepit à narium tormento. Et inde vigoris significatione Prouerbum id vocabulum usurpauit, veluti torporem excitantis. Quæ vulgatum Plinii codicum lectio cum vix tolerari possit, voce excitantis ad præcedentem gignendi casum non rectè relata, cum potius excitans scilicet significatio, siue prouerbum, legi debere videatur, Cornarius multò emendatius locum hunc legisse videtur, hoc modo. Et inde vigoris significatio prouerbio eius esum usurpauit, veluti torporem excitantis. Est enim reuera prouerbum, ἔσθι καρδαμύνη, Ede Nasturtium; quod in socordem, ignauum, & heberem dicebatur, propterea quod vim Nasturtio inesse credebant animi vigorem excitandi, ut ex Plinio dicemus. Cresson fortè dicitur, quia perenni sobole, summis fetuoribus, vel etiam Brumæ rigoribus spreto, crescit. Francigenæ etiam Cresson d'Alenois ab alendo fortè vocant.

Omnis est tēporis, loci, & cæli, teste Palladio; finem non desiderat: humorem, quamvis diligat, tamen deesse non curat. Si cum Lactuca

H h h h

ſeratur, naſci fertur egregiè. Semen per quin-
que annos ſeruat.

Locus

Nasturtium, inquit Plinius, in Arabia miræ
amplitudinis dicitur gigni. Idem cum Dioscor.
optimum esse dicit Babylonicum. Aristophanes
apud Athenienses Milesium excellere putat.

Virus & Tempus.

Omnium semen Dioscoride autore est acre, excalfacit, itomacho aduersatur, aluum turbat, tineas excutit, lienē imminuit, partus exanimat, menses cit, venerem stimulat, Sinapis & Erucæ simile intelligitur: lepras & impetigines absterget. Illud cum melle lienem extenuat, fauos expurgat: pulmonum vicia extrahit, sorbitionibus incoctum: serpentium venenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluvia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit: coxendicibus cum potentia commodè ex aceto illinitur: tumores collectionesque discutit: ad suppurationem perducit furunculos, illitum cum muria. Herbx ad omnia eadem effectus, licet minor.

Plinius diffusius Nasturtii vires declarat, & in quibusdà à Dioscoride differat. Nasturtium, inquit, venereum inhibet, animum exacuit. Aluum purgat, bilem detrabit porum ex aqua decem denarium pondo. Cum lo nento strumis illicum oportumque Brassica praelare medetur. Nigrius capitis vitia purgat. Vifum compurgat, comino- ras mentes sedat ex aceto sumptum, lienem ex vi- no porum, vel cum fico. Tussis ex melle, si quo- tidie ieiuni fumant. Semen ex vino omnia inre- stinorum animalia pellit, efficacius adhibito mē- taistro. Prodest & contra suspicia, & tussim cum origano, & vino dulci. Pectoris doloribus deco- ctum in lacte caprino. Panos discutit cum pice, extrahitque corpore aculos. Et maculas illi- tum ex aceto. Contra carcinomata adijcitur O- uorum album. Et lienibus illinitur ex aceto. In- fantibus verdè melle utilissimè. Sextius adijcit vftum serpentes fugare, Scorpionibus resistere. Capitis dolores contrito, & alopecias emendari addito Sinapi, grauitatem aurium triro imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in au- res succo. Porriginem & vlcera capitis cum a- dipe asferino. Furunculos concoquit cum fer- mento. Carbunculos ad suppurationem perdu- cit & rumpit. Phagedenas vlcera expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis cum polētra ex a- ceto illinitur: item Licheni: item vnguibus sca- bris: quippe natura eius caustica est. Siluestri verdè ad omnia ea effectus maior. *Hec Plinius.*

Dioscorides tradidit Nasturtii semen *amarum* et *periculosum*, id est, Venerem stimulare. Plinius contra Venerem inhibere. Cui assentitur Florentinus in Geponicis Constantino attributis, *caus. 3.* inquit, *res est huiusmodi, quod si quis illud sumpserit, periculosum est.* Et addit *et ceterum, et ceterum, et ceterum.* Sed quoniam hæc cum Dioscoridi, cum experientie repugnent, dicendum aut eos Nasturtii virtutes non recte intellexisse, aut Codices eo in loco depravatos esse.

Plants &
Constants.
nos à Dis-
cor. dissen-
sions.

Galenus perspicuè eius vires & facultates explicat. Naturam semen, inquit, adurentis seu causticæ facultatis particeps est, velut Napy. Proinde coxendicis & capitis dolores leuat, atque aded rubrificationem efficit & exalfacit sicut Napy. Miscetur quoque remediis iis, quæ exhibentur asthmaticis, tanquam scilicet id, quod crassos succos valenter incidere valeat, velut & Napy. Nam per omnia ei simile est. Porro & herba arefacta similem semini vim possidet. Humida verò adhuc ac viridis, pro-


NASTVRTIVM VVLGARE.

Cracilis est *radix* panicisq[ue] donata fibris: ex qua primulū enata *folia* minutis incisuris dissecta, Erucæ minoribus, adulta vel Erucæ inodo diuiduntur, vel integra in marginē duntaxat serrata crenatæue conspiciuntur, sapore acriter acerariis experita: *caulis* singularis in alas multas diuisus, colore est glauco, rotundus, pede altior, ac etiam cubitalis: *siliqua* albi vel purpureascentes quatuor foliolis constant: *Semen* fuluum, vel, vt ait Dodon. ruffo colore rubens, feruido gustu in *siliquis* vel *valvulis* paruis rotundiusculis, Thlapi vulgatissimi, compressis.

Theod. Dorst. cap. de Nasturtio, tantum de
hortensi scribit, Nasturtii licet aquatici iconem

Descriptores

Dorland's
Lange



(sub his nomi-
nibus habeat :
 Nasturtium, *Car-*
daminum, *Nas-*
turtium agre-
ste, *Nasturtium*
aquaticum, *Se-*
nacion, *Presse*/
Garten Presse
/ wild Presse
/ Brunkresse
/ Canendum
igitur impe-
ritioribus ne
vires, quas ibi
tradit Dorstl.
Nasturtio a-
quatico, quod
inibi pingit,
ascendant. *Is*
praeterea di-
versarum plan-

Simili modo Dominus rust. Car. Stephani & I. Liebault confusé de Nasturtio ait: *Cresson de cailler & alyon & la Berle*, amant loca humida & fontium ripas & rivulos, nullam requirunt culturam in hortis præter continuam rigationem & aquam ad radicem: utrique magna virtus. Quid sit *cailler* nescimus, videtur tamen intelligere Nasturtium aquaticum: Quid etiam ei *Berle* dubiū. Nasturtium aquaticum non alitur. Nasturtium hortenſe non requirit multam aquam & continuam: Ut paucis dicamus Liebaultius nobis videtur non intelligere nominatarum plantarum differentiam & culturam.

Gelner. hort. Nasturtium majus album & minus nigrum. Sylvestre perfimile hortensi putamus in altis quibusdam montibus olim reperisse. Item in append. Nasturtium hortense, foliis valde diuisis: hoc duplex ni fallor: minus scilicet ac maius, quod ad Ranunculi pratensis foliorum formam, tum magnitudine accedit. Nasturtium alpinum hortensi minori perfimile: minus iam altero anno mihi durat & semina protulit.

Nasturtium antequam caulescat, folia habere modicè lara, diuisque Marantha tradit : at cum caulem ediderit folia murare, esse enim tunc oblonga, tenuia, digiti longitudinem æquantia.

Suspicion

Suspice Maranthæ non notum Nasturtium latifolium, quæ nobrem considerandum quam liberum intelligat de qua agit p. vi. quæm Diosc. dicit Nasturtium tolium.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium n. siue hortense commune: Nasturtium album Plinio. Aliud est foliis simplicibus, quod læue & albius, vel subhirsutum minus quæ album: aliud foliis valde diffusis, hoc maius & minus, aliud crispum & non crispum. *Subhirsutum* Nasturtium, hactenus non vidimus: Meminit olim Gesnerus Nasturtii subhirsuti, ut videre est ex eius verbis postea politis sub Nasturtio latifolio.

Ruell. Cord. in Dioscorid. Corn. Brunsch. Matth. Lacun. Lonit. Ryff. Amar. Anguill. Euch. Roessl. Bruchfeld. Carol. Steph. Gesner. coll. stirp. Gerard. Dodon. Gall. Lob. Obs. Tabern. Cæsalp. Apollin. Camer. ad Hist. Matth. Gern. & Epit. Nasturtium. Camer. hort. Nasturtium n. stras. Trago, Fuchs. Dodon. Lat. Hist. Lugd. Nasturtium horten. Lobel. Icon. Plant. Cardamon, Nasturtium horten.

Locus & Tempus.

Nomina & Synonyma linguarum, vide antè. Nasturtium vulgare vidi Montpelii florens Martio, Patavii virens Februario: Genevæ tota hyeme virens. Lugduni semine maturo Iunio, Basileæ florens Octobri. Montbelgardi abundat etiam in hortis, ut in Horto E. C. tota hieme viret: vere tamē feritur ad acetaria quod tenerius multo.

Vires

Duo Nasturtia quæ recensimus postea ab hoc vix differre viribus existimamus: facile patiemur etiam nobis persuadere huic ac eis continere vires à Diosc. & Galeno attributas, quas antè tradidimus. Vtupatur passim ad ciborum condimenta & intinctus, & venit quoque per altarem cum Lactuca atque aliis herbis oleo, aceto, & sale in mensis. Attenuat, inquit Matth. mundat, aperit, provocat, incidit, vrit & resolvit. Nasturtium hortense in cataplasmate resolvit carbunculos, arthritidem, ischia dicam, fistunculos, & omnis generis apostemata, potissimum si admisceatur fermentum. Succus Nasturtii instillatus auri, curat dolorem dentium à causa frigida. Semen masticatum & retentum in ore utile ad paralytum lingue: in paralyti aliorum membrorum applicantur cum sacculis semina in vino cocta: idem remedium confert, colica laborantibus. Honestus quidam Mercator bibliopola Lugdunensis ætate consistente cum crudeli dentium dolore cruciaretur, & in somnis esset à triduo, lecto remedio modo scripto: succum Nasturtii calidum curavit in aurem instillandum: inde sentit magnum susurrum, sine dolore obdormiuit, à longo somno excitatus nullum amplius sensit dolorem: licet hoc medicamentum successerit, nolimus tamen temere cuiquam præscribere, veriti, ne dum pellere vellemus dolorem hunc, alium deteriores excitaremus, nempe inflammationem aliquam in aure & potissimum membrana extensa supra caecum quæ est in tympano, vereremur etiam attractionem humorum in eas partes sine inflammatione: in causa tamen frigida non improbaremus sacculos semine calidos, vel ex ipsa herba, ac etiam masticatoria & collutiones. Belgæ Nasturtio cum pane & butyro mensè Maio frequenter vescuntur. Facit ad graue illud malum, quod Scorbutum appellant: nec minor est huius, quam vel Cochleariæ, aut Nasturtii aquatici in hoc morbo vis & facultas. Ex alto delapsis aut præcipitatis datum confert: sanguinem coagu-

Tom. II.

latum dissolvit, & ne alicubi in corpore coeat aut coaguletur præcauet: sudorem etiam movet, ut Recentiorum experientia inveniunt ac comprobatur. Cardamomi loco ponit Nasturtium Colleg. Forentinum. Aqua in sine Mari distillata, cum melle permista, lineis pannis ista inmeritis variolis imponitur. In quem vium etiam manè ac vespere cum aqua Fragorum permista bibitur. Eadem quatuor vitiis pota dicitur tumorem, pollicum lumbrosos ventris, Vlcera & tumores reprimat, si sæpius inde fricetur.

NASTURTIVM CRISPVM IOH.

Bauhini.

Descriptio.



Facies reliqua, siue caulium, siue florum alborum seminumque, cum Nasturtio vulgari convenit: ac folia plurimum differunt, miris modis laciniata, & crispis, oris fissurata; sapore & odore vulgarioris Nasturtii.


C. B. Phyt. Nasturtium n. siue hortense crispum in fratribus Io. Bauhini hortu collectum.

Tempus.

Nasturtium crispum primo vidimus in pago Tremoli, in hortu tuncionatoris I. Aran, qui dicebat ex Belgio allatum, à quo etiam habuerat Nobilis Vir Dr. Michael a Franckmont, ex iis hortis attuli plantandum in Hortum Ill. E. C. ubi viret Montbelgardi, semine turgens Augusto, floret, Iunio, se multiplicat semine deciduo.

NASTURTIVM LATIFOLIUM

Dioscorideum Io. Bauhino.



Si napi crassitudinis radice habet, albam, lignosam, quam plurimas rigidas à latetibus fibras emittentem: caulem erigit crassitudine digitali, cubitale, statim à radice in crebros ramos diffusum, densèque fructicentem: folia infima per terram sparguntur, quinque viciis longa, sessuicincta circiter lata: crenata, subinde circa pediculum nonnihil sinuata, & auriculata, quanquam hoc

Descriptio.

Ilh h h

HISTORIÆ PLANTARVM

rida, superiora folia angustiora existunt, aliquando tamen infimis longiora: flos, siliqua, semen, sapor, odor, cuiusmodi in Nasturtio vulgari: flos interim suauem odorem spirat, cum nimirum quem Sinapios.

An Gesner. hort. in apped. Nasturtium Hispanicum. Item pauld post: Nasturtium hortense aliud est foliis simplicibus, pollicem latis, tres longis, idque vel laue, vel albius, vel subhirtum, minisque album.

Camer. apud Matth. Germ. folium depictum habet nomine Nasturtii latifolii, qualiter & in hortivocat.


An Jac. Theod. Tabern. Icon. Nasturtium Hispanicum, & Hist. vbi figura transpolita, quæ nō multum placet si nostrum Nasturtium latifolium intelligit vt suspicor.

C. Bauhin. Phyt. Nasturtium 10. hortense latifolium. Nasturtii Dioscoridei nomine à Joh. Bauhino missum. Fortè hoc Nasturtii Hispanici nomine Tabern. exprimere voluit: at figura non conuenit.

Nasturtium latifolium simile formâ & gustu vulgari, demptis foliis inferioribus, quæ lata vt in Iberide vera Montepeli prouenire, primò habui Lugduni in hortis, deinde Geneæ: postremò introdaxi in Hortum Ill. E. C. vbi nunc viret totâ hieme foliis latissimis, neminem scio qui deseripserit: nec recordor vnde semen habuerim, à triginta annis in hortis colo: hientem facillè proferit.

THLASPI ANGUSTIFOLIUM FUCHSII, Nasturtium sylvestre Joh. Bauh.

Descriptio



Quod Nasturtium sylvestre voco, dodrâte maius est satiuo, simile forma, & odore, & sapore, ni minore esset radice satis crassa, lignosa, fibris donata, alba, saporis feruidi: ex qua caules emittuntur plures, crassitudine radici supares, perquam ramosi, duri: folia infima, caduca, Na-

sturtii vulgaris foliis similia, laciniata, multò tamen minora: ab Iberide huic absumili differunt, vt pote cui folia infima per extremam oram serrata duntaxat aut crenata existunt & laciòra: nā superiora, tenuia, angusta, Iberidis parè sunt & odore & sapore vehementer acri: flosculi minimi albi, visum ferè fugiunt, ad Iberidis flores accedentes: quos nec dum delapsos siliqua numerosissime excipiunt ex longiusculis pediculis, parvula, rotunda, compressa, & supremo margine fissa: quibus dehiscensibus duo semina tassa oblonga cum valvulis excedunt, relicta membrana alba dissipiente: Dodonæus acre & feruens

semen dicit. In figura Fuchsiana hic posita desunt folia inferiora.

Brunfels. Barla pastoris minor, sicut Desfont. fraus / Germ. communiter Setzel abschnitten dicta, qui ex ea iudicium faciunt.

Fuchs. Icon. & Hist. Iconem tantum proponit, sine descriptione, titulo, Thlaspi angustifolium.

Trago pingenti Thlaspidii genus, describens Nasturtii quincum genus.

An Brallau. in exam. pil. aggreg. Iberidis species: Cornar. in Dioscor. Thlaspi alterum genus.

Matthiol. in post. Ital. dom. in Dioscor. figuram habet Iberidis nomine, quam suspicor esse hoc Thlaspi angustifolium, quam opinionem confirmat nomen wilden treß in Hist. Germ. positum, vbi eadem figura, & præterea descriptio quadrans potius Thlaspi, quam verè Iberidi.

Retinuit idem nomen Germ. & eandem figuram Camer. in Hist. Matthioli: Germ. Iberidis nomine, vt & in eiusdem Epit. quam postea in Epit. malè iterum exhibet pro Lepidio.

Dodon. Gall. cuius descriptio valde ieiuna figuram Fuchsi habet, vocatque Thlaspi, Thlaspi angustifolium, & Thlaspi minus. Lat. in fol. Thlaspi minimum. Foliola inferiora non pingit Dodonæus, nec etiam habet figura nostra, quæ iam facta erat. Non placet quoque eum dicere semen valde exiguum, non tamen minus quàm superiorum: Thlaspi eius antè dictum latius semina habet rotunda multò maiora, sicuti eius alterum, oblongum etiam maius.

Osyridis folio Thlaspi minus hortense vulgare acerrimum vocant Adu. Lob. & Penz. & luteum ac album tradunt etiam in Icon. Plant. aruntque: Pauld diligentiores Pharmocopœ & Herbarii Angliæ & Germaniæ minorem speciem Thlaspi vocant & alunt in hortis ad medicum vsum, quia sit feruidioris gustus. Eius exterioquin tota facies, ramulis multis, floribus, & foliolis Thlaspi fateretur, catenisque differre videtur, quia tota minor & tantoperè sarmentosa, vltimatum vice sit ad verrendum non secus ac Iberis, cuius etiam floribus albidis, crebris, parvis. Eadem in horto Morgani nostri, etiam luteis floribus viscebatur mense Iunio. Item Hist. lib. 2. cap. 57. Iberis 2. Item cap. 38. Thlaspi minus Germ. sive 16.

Apud Tabern. tam in Icon. quàm in Hist. sunt quæ icones vnius plantæ: vna Iberidis nomine, altera Thlaspi minoris Germanici titulo. Nulla autem perfecta, nec descriptio alicuius momenti: cur etiam Iberidem Germanicè groß Besenfraut vocet, nulla est ratio.

C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 29. sive Osyridis folio. Barla pastoris minor Brunfels. Minus hortense vulgare Lobelio pag. 214. luteum est & album. Icon Lobel. apud Plant. videtur repræsentare Thlaspi Fuchsi de quo hic agimus: verum non intelligimus cur Lobelius dicat Osyridis folio, flore etiam luteo non vidimus.

Schv. Thlaspi minus Osyridis folio, Lobel. Thlaspi Osyridis folio acerrimum & album, Chus. Alyssum minimum, Thlaspi minus Germ. Ercinfrant / wegfresse / Flein Besenfraut. Mihi viderar Schvvenck. eam plantam intelligere, quam nos hoc capite tradimus: verum non cōuenit cum Alyssò minimo Clusii, diuersa admodum planta figurâ & temperamento, subacidum habere saporem dicit Clusius: dubitamus an bene notum ei fuerit nostrum Nasturtium sylvestre. Thlaspi angustifolium Fuchsi, quod Nasturtium

sturtium silu. voco. Brunfels. Burlam pastoris
minorem, Klein Gesehelfrant / Germ. commutier
Seitel abschneiden. Fuch. Trag. Besem
frant Dodon.

Basilez copiosum obseruavi cum silquis mense
Octobri & Nouembri ad horarum Nosodochii
& versus papyracea molendina, ad fontem prope
textorum panni fossas, & aliis locis, mense
Iunio florentem & siliquas habentem. Geneur
versus Nosodochium & S. Geruasium, folia pri-
ma omnino vulgare Nasturtium imitantur, su-
periora ad Iberidem accedunt: florebat & ca-
pulas proferbat Maio. Et in Buren ad mu-
ros spontaneum me Verolatum in Horto Ill.
E.C. floruit Augusto eodem anno: Ioueni prope
Bessfordiam cum flosculis & semine maturo
Septembri, Stutgardia sponte iuxta muros Ill.
E.C. horri florens ex valvulis Maio mense. In
Alfaria in hospitio prope Bercken semine inap-
tulo Iulio.

Non placet Brunfelsium huic plantae easdem
tribuere vires quas Burlam pastoris vulgari, huic
enim plantae sapor insigniter acris. Caleface-
re & siccare quarto gradu semen, scribit Schvv.
& caustice facultatis, esse, & ad calculum laudari.

IBERIS ET LEPIDIUM.

Veteribus & in genere.

CAP. II.

Quoniam in dubium magna verborum con-
fensione reuocatur, an Iberis & Lepidium
Veteribus sit vna eademque herba, ideo hac de
re vno capite ambas hasce plantas complecten-
tibus problematice agere libuit. Ac primum
quidem, eorum opinionem, qui a nobis reced-
unt & affirmatiuam tenent, adducere visum
fuit.

Herbam igitur, inquit, quae a Graecis Iberis
dicitur, Paulus Lepidium, & ἀγριόκαρδον, id est,
siluestre Nasturtium appellari scripsit. Aërius
Cardaminem, quia odorem, saporem, & figuram
Cardami, hoc est, Nasturtii habet, & Galenus
odore & viribus Cardamo simile Lepidium esse
dicit. Quare in Dioscoride *iberis huiusmodi*
pro *agrio* falso legi Cornarius existimat.
Galenus etiam Lepidium eandem esse herbam
cum Iberide, declarat his verbis. Damocratis
extat libellus Clinicus inscriptus, in quo versibus
Iambicis de tribus differit medicamentis.
Ac primo quidem eo, quod ex herba, quam ipse
Iberidem appellat, constat. Mox subiungit Ga-
lenus. In Iberide medicum quendam amicum
suum hac herba curatum esse, quam ipse Damo-
crates Iberidem appellat, ut qui ipso visu her-
bam cognovit, nomen autem eius nullum audie-
rit, quin etiam id ipsum ignoravit is, qui cum v-
sum eius docuit. Verum ex signis quae scribit,
videtur Iberidem appellare, quae a Graecis Lepi-
dium appellatur, a regione in qua amicus eius
curatus est, appellatione ducta. Damocratis
autem versus Iambici quibus eius effigiem de-
pinxit, hic Galenus subiicit.

Herba hac ubique multaque frequens nascitur,
Monumenta iuxta antiqua, muros & veteres,
Tritasque quondam publice pedibus vias,
Quae iuxta aratrum duxit haud quis agricola.
Semper virescens, foliis Nasturtii.

Florentibus vere, aut tamen maioribus:
Caulum cubitalis longitudinis gerit,
Paulo minorem, aut rursus ampliore, ab hac
Aestare pendens folia, donec multa hyems
Sarmenitum deducat hac ad imaginem
Deiecta & exsiccata, deperant gelu.
Adnata radici ramos cernes alia.
Aestare florem fert colore lacteo
Malum, renuem, variumque valde cauliculis.
Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,
Visum fere ut fallens, oculos quoque effugiat.
Odorem habet radix inde acerrimum,
Vero similem quam maxime Nasturtio.

Addit rursus his Galenus. De hac Iberide etiam
Archigenes scribit, Lepidium ipsam appel-
lans. Dicit autem & splenicis, & ischiadi-
cis ipsam conuenire. Ad ischiades & perfrige-
rationes Hygieni Hipparchi authorita-
te Herbam Iberidem quam aliqui Lepidium vo-
cant aut Agriocardamum (Nasturtium sylvestre)
colligito &c. Cum igitur Iberis & Lepidium ea-
dem sit herba, perspicuum est Iberidis caput cal-
ci primi libri Diosc. a nimis curiosis Librariis
vel Medicis, non a Dioscoride adiectum fuisse,
cum is Iberidi locus non recte assignetur, sed li-
bro secundo, in quo cum permixtis plantis quae
acri facultate praeditae sunt, de Lepidio tractat.
Neque enim duobus locis de eadem herba dice-
re potuit Dioscorides. Adhuc in eius descri-
ptione corruptus est locus, *καὶ τὸν τρυφάνην*,
ἢ ἰατρίαν, id est, caulem cubitalem aut minorem:
Deest enim vox *καὶ τὸν* & *ἰατρίαν*, ut sic legatur *καὶ τὸν*
ἢ κατὰ τὴν τρυφάνην ἢ κατὰ τὴν ἰατρίαν, id est, caulem
longitudine cubitalem, maiorem aut minorem,
sic enim Damocrates habet. Sic & Aërius
versum Damocratis, sed lege carminis solum
recitans, & Archigenes in Epitola ad Aristonem
referente Aëtio, in qua iisdem plane verbis
Iberidem describit, ut vel ex Dioscoride extri-
psisse videatur, vel ex ipso Archigene ad finem li-
bri primi Dioscoridis caput de Iberide aliquis
attexuerit. Vidimus (ait etiam Matthiolus) pri-
mum Iberidem extra ciuitatem Tridenti, ubi
vulgò dicitur *alle Lisse*, effigie mimum, qua des-
bitur a Diosc. ac aliis pluribus Graecis autoribus.
Huius Gal. in simpl. censu nusquam separatim
meminit, sed hanc & Lepidium non nisi nomi-
ne differre prodidit. Quod idem etiam ex Da-
mocrate & Hygieni Hipparchi autoritate lib. 9.
de comp. med. secund. locos, circa finem, ubi de
coxendidi curatione agit, testatur his verbis: Si
coxendicum dolores leuare est animus, herbam
Iberidem quam aliqui Lepidium vocant, aut Na-
sturtium siluest. colligito: Ex eius certe sen-
tentia asserere non dubitauerim, Iberidem a-
pud Graecos eandem esse cum Lepidio. Vnde per-
spicuum est, hoc Iberis caput huiusce primi vo-
luminis calci accreuisse nimis vel librariorum,
vel medicorum curiositate. In quam sententiam
cum antedictis caulis, ea ratio me potissimum
deducit, quod constet, huius primi voluminis
calcem, non esse legitimum locum, in quo Iberi-
dis historia fuerit collocanda: quandoquidem
eiusmodi herbas Dioscorides lib. 2. ordinate dis-
posuit, ac de eis distinxit, ubi priuatim Lepidio,
quod Damocrati Iberidem existimamus, pro-
priam assignauit sedem. Quare aperte hallucinari
deprehenduntur Monachi illi venerandi, qui in
McL. comm. scribere, cum expresse contra Gale-
n.

H h h h 3

Barbari
et Ruell.
Lepid.

leni & Pauli auctoritatem, & contra rationes, quas superius adduximus, aliud à Lepidio Iberidem esse contendunt. Manifeste etiam aberrant Barbarus & Ruellius, cum Lepidium illud esse putauerunt, quod vulgus Herbariorum Raphanum rusticorum appellat.

Et hæc illi qui affirmatiuam tenent: Sed antequam negatiuam, quam amplectimur, & veriore adducamus, paucis de his duabus plantis Veterum placita examinemus. Iberis igitur, siue Cardamine Dioscoridis (Cardamantica alijs,) folia habet Nasturtii, Vere virentiora. Caulis longitudo cubitalis est, plus minusue: locis incultis nascitur. Aestate porro lacteum florem promit, ac tum quoque efficacior est. Radices binas habet Nasturtio similes. Lepidium verò, quod aliqui Gingidium vocant, herba nota est, quæ muria cum lacte conditur: folia habet notam mollia & candida ut Draba. Plinius de Iberide hæc habet. Inuenit nuper, & Seru. Democritus primis medentium, quam appellauit Iberidem: quanquam ficto nomine inuentioni eius assignato carmine. Nascitur circa vetera maxime monumenta, parietinæque & inculta iuniorum. Floret semper folio Nasturtii, caule cubitali, semine tam paruo, ut vix aspici possit. Radici odor Nasturtii. De Lepidio ait. Peregrinum fuit Lepidium. Scribitur à Fauonio. Deinde quum fruticauerit, iuxta terram præciditur. Tunc runcatur stercoreaturque. Per biennium hæc. Postea iisdem fruticibus vtuntur, si non siccitia hyemis ingruat, quædo impatientissimum est frigorum. Exit & in cubitalem altitudinem, folijs laurinis, sed mollibus. Apud Galenum in curatione doloris Ischiadici legitur supra posita elegans descriptio ex Damocrate carmine conscripta in hæc sententiam. Iberis dicta à regione, in qua sanatus Medicus, herba frequens vbique iuxta muros & vetera monumenta, ac vias, semper virens: sed vere folijs Nasturtii minoribus: caulibus cubitalis, paulo maior, vel minor: à quoestate pendent folia vsque ad multam hyemem, donec gelu pereant: flos æstate lacteus: semen exiguum, ut vix cerni possit: radix odore acerrimo, ut Nasturtium.

Iberis.
Locus
Vitis

Lepidium.
Cultura.

Laurina
folia

Recensitis ita Veterum placitis, Lepidum idem esse, cum Iberide non concessimus Cornario & alijs: Ex Plinio enim Dioscoridis fortè contrarium apparet magnum discrimen. Iberis inculta, Lepidium verò peregrinum colitur: Iberidis folium Nasturtii, Lepidio folia Laurina: Iberidis radix tunditur difficulter Plinio, Lepidio conditur Dioscor. Et quamuis dicat Galenus Iberidem Lepidium etiam vocari, non sequitur propterea esse vnam & eandem plantam, nec legimus quenquam ex Veteribus id asseruisse. Idem nobis cuenire videtur in Iberide quod in Crisanthemo, quod cõpetit Elichryso & verò Crisanthemo, quod deinde vocatur Bupthalmum, nomine alterius plantæ dictæ Bupthalmum. Cur remouendum sit vnum caput ex Dioscor. ut vult Cornarius, non video, nisi remoueat etiam ex Plinio & Paulo: Quam plantam intelligat per wildfres inuestigandum: Si Iberis eadem cum Lepidio Dioscor. ut vult Matthiolus: Draba quam pingit Matthiol. non potest esse Draba, ut bene annotauit Anguillara & Guiland. cum dicat Dioscor. ὅμοια ὡς τὸν ἀνδρόν, ἀνδρογῆνα ἢ ἀνδρῆνα, Maluimus igitur existimare Lepidium Pauli, Plinii, & Dioscoridis & Galeni idem esse.

Iberidem autem apud Diosc. Plinium, & ex Damocrate Gal. & Paulum & alios, eandem plantam, quæ dicatur etiam Lepidium, diuersam à Lepidio modò dicto. Putat Galenus Iberidem eandem cum Lepidio esse, ait Celsus, quod & Agriocardamon [silvestre Nasturtium] appellatum est, sed apud Dioscor. diuersa eorum mentio reperitur. Lepidium fortè appellatur, quia Lepidas (squamas leproforum) auferat. Pater autem ex Dioscor. Lepidium diuersum esse ab ea quam Iberidem vocauit: nam Iberidi vires in radicibus: Lepidio in folijs: huius præterea vsus in cibus: Iberidis nequaquam. Error autem putatum eandem esse fluxit ex communitate nominis, & virium. Paulus Aegineta rem aperuit inueniens. Ichiadicos in totum restituit sanitati: Iberidis herba vsus, quam Lepidion quoque, alij Nasturtium appellant. Quæ verò apud nos fruticosa nascitur: folijs Lauri similibus, & multo amplioribus respondere, multa experientia restantur, non solum in coxarum, sed in alijs quoque diuturnis affectibus, & quæ sequuntur. Columella Lepidii duo genera facit, sylvestre, & satium, fortè Iberidem pro sylvestri accipiens. Solum ansam dubitandi præbet, quod Dioscorides Lepidium herbulam dixit esse, quod Iberidi magis quam Lepidio conuenit. Sed tamen Dioscoridis Lepidium idem esse cum Plinii & Pauli Lepidio, ac longè differre ab Iberide colligi potest ex Draba, cuius folia Lepidio comparantur à Dioscoride. Iberida qui cum Lepidio eandem esse existimant, caputque de Iberide tanquam superfluum à Dioscor. volumine rescandū esse asseuerant: non ita fortasse licenter (autore Marantha) hoc pronuntiasent, si quæ cap. de Draba habentur, animaduertissent. Hanc enim vult Dioscorides folia habere Lepidii, sed molliora & candidiora, sed nulla est conuenientia in folijs inter Iberidem & Drabam: huic enim lata sunt, illi satis angusta, & Nasturtii more incisa: si veram Drabam existimemus [ut certè vera est] plantam illam quæ ab omnibus ipsa existimatur, & ab Andrea Matthiol. perbelle depingitur. In Iberide folia in prima germinatione eorum videtur descripsisse Dioscor. cum Nasturtii folijs similia esse dicit: nam postquam caulē edidit, nullam cum Nasturtio retinere similitudinem videntur: ita ut hanc solum ob causam multis diu incognita fuerit, & [ut verum fatear] mihi etiam non propter id solum incomperita diutius fuit, sed etiam quod folio in eadem ætate variare ita solent, ut vna eiusdem speciei plânta alteri dissimilis penitus videatur. Scribit Diosc. Iberida duas radices habere, sed pluribus inueniri, non solum à nobis obseruatum est, sed à Damocrate scriptum, cum inquit:

Iberis.
Lepidium
damocrate.

Draba

Adnatæ radices tamen ternes alia.

Et hæc passim Marantha, qui quam plantam per Iberidem, cum ait: nam postquam caulē edidit &c. intelligat, mihi nondum constat. Lepidium Serapioni Serragi, ex Dioscor. herbulæ est vulgò nota, Damocrati Iberis appellata, ex Gal. ut etiam ab Archigene, in Epist. ad Aristonem, ex Aëtio. Quæ verò solâ nominis appellatione differre credantur Lepidium & Iberis, idem vel Libratorum, vel Medicorum curiositate, quod in fine primi voluminis legitur, Dioscoridi ac creuisse putauerint Ruell. Manard. Marcell. ac Matthiolus. Cardanus tamen, contradicentiâ ita arguit: Lepidium tanquam Iberida descriptum Galenus, ergo &c. qualem autem sit asserunt,

Lepidium
Serragi
Iberis
Iberidis
caput apud
Diosc.

rum, nullâ liuoris leuitigine, suis diiudicandum scholasticis relinquit Apollo.

Quum autem Lepidium ex Dioscoride herbulâ sit, Iberis autem cubitalis (siquidē, veritati magis, quâm autoritatibus credendum sit) nec possunt, nec debent. Autores probi & et idia Apollinis opinionem non candidè amplecti, videlicet Lepidium, ab Iberide diuersum ex Aërio, olus esse in Syria folia habens Seridis angustifolia. Nullâ propterea fuleiuntur ratione, quâ Iberidis caput imprudenter arborum æceruo Dioscoridi irrepsisse tueri credunt, & quod dissimili infusione eum his societate n, confortiūque inierit, propterea vel expungendum, aut quo dissiliat restitutum. Quod verò Galenus, atque Aegineta, priuatum hanc Iberidi caput aliquod nō dicant a Lepidio separata n, sciendum, quod Galenus Dioscoridi in simplicibus ubique non responder.

Est autem ab hoc Lepidium Plinii dissimile, in cubitalem exiens altitudinem, foliis Laurinis, non autem Nasturtii.

Plantæ, quæ in Syria, Arabiâ, & Ægypto a Græcis dicitur; nomen Latinum est Iberis, & Lepidium: Arab. *Sieraragi*, *Afietaragi*, seu *Sirharagi*, & *Hanfab*: Ital. *Iberide*, & *Lepidis*: Germ. *wilder fress*: Hispan. *Nasturtio montesino*, Gallic. *Chasse rage*, *passé rage*, & *Nasturtium sauvage*.

De viribus Iberidis & Lepidii dicamus. Radices Iberidis binas Nasturtio odore similes, calefaciendi & adurendi vi præditas, sed æstate cum caulibus lacteum florem promat, efficaciores esse, prodit Dioscorides. Et hinc Ischiadicis viles, si cum axungia suilla salsa emplastri modo, quaternis horis impositæ fuerint: deinde verò in balneum descendant, ac postea oleo ac vino cum lana locum affectum perungant. Idem hoc auxilium de Iberis radice præscribit Damocrates hoc lambo.

Hanc erantula largi satis cape copia
Æstare, nam tunc optima & fortissima est
Adhuc recens: siccata sit, sed debilior.
Tusam hinc probe (nam difficulter cunditur)
Pancus subaltamque excipies axungia.
Crurique tori, & maxime coxendici
Adhibebis, & ligabis, & fines duas
Horas mulieribus, viris sed quatuor.
Hinc balneo indutas, nec ulla ex vnguine
Nec fœgmate ulla pinguiora collines.
Sudore sed modico exiliens, in solium
Merges, subens perferre: nam mordacitas
Ingens, calor sensus atque exoritur.
Verum hinc rigatos leniter perducito.
Illati enim quamuis manibus sint plurimum,
Exibit artamen pedibus suis volens.
Quicumque consilium hoc bonum susceperit,
Ad multum oleum miscebis hinc vinum modicum,
Et concuries, & illines lotos eo,
Ac mox madore terfo & pinguedine
Totum teges crus mollibus tu velleribus.

Hos versus apertè declarat Plinius his verbis: Radici Iberidis odor Nasturtii. Vfus æstate efficacior, & recent tantum. Tunditur difficulter: coxendicibus, & articulis omnibus cum axungia vtilissima, viris plurimum quaternis horis, foeminis minus dimidio adalligata, vt deinde in balneis descendatur in calidam, & postea oleo ac vino corpus perungatur: diebusque vicinis inter-

positis idem fiat, si qua admonitio doloris super sit. Hoc modo rheumatismos omnes sanat occultos. Imponitur non in ipsa inflammatione, sed imminuta.

Galenus eadem ex Damocrate refert. Radix Iberidis, inquit, odore acerrimo est, vt Nasturtium, hæc intusa in magna copia (difficulter autem tunditur, æstate & recens, nam tunc fortissima) cum modica axungia adhibetur toti cruri & maxime coxendici, finitur per quatuor horas in viris, minus in mulieribus, deinde aufertur, & crus in balneo ponitur, post inungendum ex oleo & vino, ac demum terfo pinguedine, & sudore, tegendum molli lana, vt æger ambulet, & suis pedibus obeat munia: si opus fuerit, repetendum post dies viginti.

Hoc sanè vtendi modo, & indeteratos capitis dolores, & alias omnes quacunque corporis parte inueteratas & ægrè solubiles affectiones ac resolutiones se curasse Damocrates, & omnino vitia in quibus alii remedio ex Thaplia vtuntur se hac herba perianasse ait. Idem omnino ad Ischiadas remedium Aërius bis habet. Lepidium, inquit idem Galenus, ex quarto est ordine excalefacientium, simile Nasturtio, tum odore, tum gustu, tum viribus: sed minus eo desiccatur. Cæterum apud Dioscoridem legit Cornarius, *Radix Iberidis si chondria noster*, & postea oleo cum lana locus perungatur, pro *Radix Iberidis si chondria noster*, hoc est, oleum cum vino locus illinatur: sic enim habent Damocrates & Plinius, vt ex superioribus intelligitur. Sic & Aërius: *Radix Iberidis si chondria noster*, & *Radix Iberidis si chondria noster*. Egressus autem vino & oleo multo perfusus æterius, coxendicem lanis puris rege. Et alio in loco. A balneo ad oleum multum paucum ad hydum vinum admisceto, & illinito.

Iberidem porro & Lepidio diuersam esse plantam, vel vsus ambarum clarè demonstrat. Auctores enim locis iam adductis Iberidis radices solum præscribunt, ceu folia Lepidii duntaxat. Vis foliorum acris & excalefaciens, inquit Dioscorides, quapropter trita ischiadicis præsentissimum est auxilium, si cum Helenii radice, quartâ parte horæ illinatur: lienosis simili modo prædest: lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur. In quibus verba illa, si quartâ parte horæ illinatur, quæ Græcè leguntur *Radix Iberidis si chondria noster*, mēdo nō carere suspicatur Cornarius. Cum enim cæteri omnes Auctores, vt diximus, emplastrum ex Lepidio impositum, quatuor horas linendum præscribant, credibile non est rectè hic legi, vt quartam horæ partem imponatur: neque enim tam breui tempore vires suas exerere potest: & fieri potuit, vt *Radix Iberidis si chondria noster* sit suppositum, quod facillè euenire potuit, si quaternarii numeri nota interpreti fuit exprimenda.

Porro reliquum Lepidii in medicina vsum, & ex eius radice amuletum, Plinius aliter quâm Dioscorides refert his verbis, Vfus eius non sine lacte. Lepidium inter vtrientia intelligitur. Sic & in facie cutem emendat exulcerando, vt tamen cera & rosaceo facillè sanetur. Sic & lepras & ploras tollit semper facillè, & cicatricum vlcera. Tradunt in dolore dentium adalligatam brachio quæ doleat, compescere dolorem.

IBERIS.
CAP. III.

Descriptio Statim è radice alba, lignosa, mediocriter crassa, paucis fibris donata, crebros profert caules dodrantales & altiōres, duos, frequentibus alis concavos: folia quidem prima longis pediculis appensa, semper latiora, duas tresue uncias longa, per extremum serrata: superiora verò & quæ in caulibus ramisque, Linariæ foliis paria, angusta, acuta, nullo pediculo donata, nec crenata vlla incisura: sapor omnibus feruidus Nasturtii: flores extremis ramulis coarctati hærent, candidi, Nasturtii floribus similes: semen continetur minutum in parvis thecis oblongis, quarum valvulas dissepit membranula.

Quam Fuchsi. & ex eo Amatus, hoc titulo

exhibet, non simpliciter, Iberis, ut præsens, sed Iberis Fuchsi a nobis cognominatur. Hæc Matthiol. in Dioscor. neglectæ descriptione picturâ exprimit priore, Iberidis nomine: posteriore Lepidii Dioscoridis, ac Diosc. & Galeni Iberidem dicit, ut & Lepidium. Lacun. figurâ Matthiol. Iberidis nomine retinet. Idem



Matthiol.
Lapsum.

in post. com. Ital. & Lat. cum magn. fig. eadem scribit. Figuram tamen aliam habet, quæ fortè non Iberidis: sed Nasturtii nostri sylvestris siue Thlaspi tenuifolii Fuchsi. Plantæ illius iconem esse magis adhuc indicat Histor. Germanic. eius, ubi descriptio videtur esse Thlaspi tenuifolii & non Iberidis, præstiterit Matthiolus retinuisse figuram priorem licet non exactam.

Gesner. Iberis (sic scribendum siue aspiratio- ne) à Matthiolo depicta.

Dodon. Gall. figuram Iberidis titulo exhibet non aded commodam, potissimum quod inferiora folia concernit: quare meritò Lat. in fol. meliorem pauld' restituit. At autem Galenus à Plinio lat. Hiberin, Nasturtium silu. & similiter etiam Lepidium vocari. Existimari etiam herbam esse Græcis dictam, de qua Apul. cuius ad Ichiadicus usus quoque commendatur.

Aduers. Lepidium herbula Dioscoridis, Damocratis & Galeni. Iberis Cardamantice Nasturticifolia: quæ itreptit alienissimo loco Dioscoridis codici lib. 1. cap. ultimo. Paulus 1.3. cap. de coxendieg eam Iberidem, Lepidium, vel Nasturtium agresse nuncupari scribit. Lobel. Obs. Iberis Cardamantica: Gal. Cress. sauvage & Passerage sauvage: Anglis Scianica: fresse & wilde fresse. Germ. wilde kress. Hisp. mostaza siluagica. Ital. Nasturtium siluagico. Icon. Pl. Iberis Cardamantica, Lepidium, Iberis Plinii.

Histor. Lugd. pingenti. Iberis siue Lepidium Matthioli, quod in contextu, doctissimorum, ut

ait, Herbariorum iudicio, Iberin veterum Græcorum, siue Lepidium esse dicit, Nasturtio siluagico Italorum: Passerage sauvage, & Cresson sauvage Gallorum.

Iberidis nomine pingit Camer. in Hist. Matth. Germ. & Epit. Thlaspi angustifolium Fuchsi, siue Nasturtium silvestre nostrum.

Taber. Icon. & Hist. Iberis: cuius figura mala. C. Bauh. Phyt. Iberis.


Iuxta veteres muros & inculta itinerum in Italia alibi que prouenit: apud Belgas non nisi hortensis est. Ab Herbariis colitur in hortis. In Italia tamen & Gallia Narbonensi locis incultis sponte nascitur, Hist. Lugd. Iberidem obseruavi secus vias in muris & marginibus agrorum Montpelii: Arelatæ & Florentiæ in Autumno florere & semen ferre, toto anno durare. Lugduni sponte proueniens abundat, virens adhuc & florens mense Septembri & Octobri. Tiguri in horto Gesneri satam vidi. Heidelbergæ mihi attulit Petrus Turnerus Anglus Medicus: ibidem etiam spontaneam obseruavi: Patavii passim circa mœnia virentem adhuc Decembri obseruavi.

Tab. nat.
Locus

Tempus

NASTURTIOLOVM ALPINVM CAPS.

Nasturtii vulgaris Joh. Bauhin.



Vix tres uncias altum est mihi dictum Nasturtiolum, radice lignosa, paucis fibris donata: Caliculi duo aut tres, per quorum summam capsula Nasturtii vulgaris, non dissimili ordine posita: folia parua, simplicia, crassa, angusta, uncia, quantum animaduerti, bre-

Descriptio

miora: flosculi parui, albi, ut existimo.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium 9. siue alpinum minimum 3, capsula Nasturtii hortensis, quod habet Joh. Bauhinus.

Nasturtiolum mihi dictum inueni in Rhætiæ monte Nomsre, propè Balnea nouimbs: æstare florebat & siliquas habebat. Ex herba sicca descripti.

NASTURTIOLOVM ALPINVM
tenuissime diuisum.

Nasturtiolum tenuissime diuisum, aliàs trinim vnciarum plantula, aliàs ferè dodrantalis (Clus. vncialis, foliola habet minutissima, terna, quina, septena ad costam annexa) Clusio viridia, gustu acri & feruido, sic ut tota interim ala semina interdum non sit longior, aliàs uncias duas excedat, sapore feruido Nasturtii: caliculos habet plures, nonnunquam vnicum: in cuius fastigio flores multi sunt coarctati, candidi pro plantæ

Descriptio



plantæ proportione magni, è quatuor foliis pastoriz minimis: radix alba, crassiuscula, longa, fibris longis donata.

Clus. Pann. & Hist. post. Cardamine: sine alpina minima, quæ Gesnerus in Epistolis Nasturtium appellat. Hist. Gen. plant. p. 180. Echlaspi mou-

tanum minimum Dalech:

C. Bauh. Phyt. Nasturtium 7. siue alpinum minimum primum.

Tabern. Icon. Cardamine alpina Asp. Gaudich. blum.

In ipsis scopis summi iugi Schneberg, dum per niuem glacioli duritie constrictam ferreis vncis ad pedes alligatis Clus. delaberetur invenit mense Augusto florentem, ubi niues iam primum dissolui incipiebant. Invenitur autem & in Tirolensibus atque Salisburgensibus montibus teste D. Joach. Camer. Ex Gesneri epistolis apparet etiam in Helveticis alpidibus nasci.

CORONOPUS RUELLII, SIVE Nasturtium verrucosum.



Terre ap-
primi
caules, nun-
quam surgen-
tes, spitha-
mos, ramo-
sos, rigidulos;
per quos folia
laciniata, cer-
tera foliorum
Nasturtii, nec
ita dissimili
aut odore aut
sapore: si folia
secundu cau-
les minuti, al-
bi; seminem
loculi scabri,
inequales, lap-
pulas imutati,
quali echini
parvi murica-

ti, quorum singulis gratum vnicum nigrum gi-
gato vigineo ferè pat: radix longiuscula, latis
crassa.

Math. in post. con. it. & Lat. cum mag. fig. as-
serit, Ambrosia hanc non describit, quasi non ti-
te vitam, a Cortulo missam genuinam aded refer-
re, ut nihil in ea desiderari possit: aut decipitur.
Cum enim Bononiæ D. Vlyses Aldroand. deno-
minabat Holostium Dioscoridis, Herbam Ca-
nocam, eiusdem etiam opinionis erat Robertus
Constantinus.

Camer. in Matth. Germ. Ambrosia falso dicta

martensfress. Ambrosia à Matthiolo in com.
Lat. picta, quæ à Cortulo missa, non potest
bene agnoscere ex figura: pro Ambrosia prima
Matthioli missa est ex Italia planta quæ ni-
hil aliud est, quàm Nasturtii sylvest. genus:
fieri potest Matthiolum suam ex hac planta adul-
ta, & feminibus abundante curasse depingen-
dam. Bident Epit. Ambrosia: hort. Coronopus
repens Ruellii: Cornu ceruinum vulgò dicta
herbula, quænam apud Veteres haberetur
non audeo asserere, nisi forsitan, Pes. sit mil-
limum, cuius Columella meminit, cuius senten-
tia & Dalech. est, ita enim nobis præsentibus
vocavit. Nasturtium autem nostrum verrucosum,
de quo Ruellius hoc loco agit non posse esse Co-
ronopum Veterum sic probamus: Primum vi-
dentur non posse dici folia oblonga, cum sint
multum dissecta & similia Nasturtio. Secundo
non audeo eius usum esse in oleribus [quamvis
forte posset esse cum sit herba mollis.] Ter-
tid non asstringit huius radix, sed est odor & sa-
poris Nasturtii. Quarto nihil habet simile
cum Phyllo. Quinto folia non sunt similia
Holostio [si verum est Holostium quod exhibet
Ruellius] nec gratum. Sexto nihil simile habet
cum spinis. Septimo longa melius possunt dici fo-
lia Cornu Cerui quàm Nasturtii verrucosum, longa
autem esse dicit Dioscor. cap. de Eucatanace.

Lobel. & Penz. Adit. Coronopus Ruellii, mul-
to melius Coronopi species habita, quàm illa
Serpentina Matthioli. Item Cornu cerui al-
terum vulgè, Coronopus repens Ruellii, echinato
seminibus involuero, de quo dubitant an Co-
ronopus Theophrasti? Sed iam claram quid res-
pondendum Lob. Obi. roganti, Coronopus re-
pens, an Pes millimum Columellæ Ruellio? Ic.
Pl. Coronopus repens Ruellii, & Cornu cerui al-
terum vulgè. Ex postea Obi. & Icon. Pl. Ambrosia
spontanea strigosior, aut effi diuersas faciat
Lob. nos tamen cum C. Bauh. vnam esse cense-
mus. Quamvis & ipse in Phyt. duobus diuersis
in locis eandem proponit; nunc enim Coronopum
3. silu. repentem Nasturtii folio vocat: nunc
Ambrosiam 2. sylvestre: Præterea non video cur
Ruellii Coronopus, quæ ad Nasturtium accedit
melius habenda sit Coronopi species, quàm Ser-
pentina, ut vult Lobelius; quam quæso similitu-
dinem cum Coronopo maiorem habet quàm
Serpentina. Idemum assumit figuram Matthioli,
& titulum ei facit Ambrosia, quæ in re inter
nos non convenit: est enim nobis illa Icon Co-
ronopi Ruellii.

Secundam speciem Pedis cerui facit Do-
don. Gall. asseritque proximè accedere descri-
ptioni Coronopi Dioscoridis, quamvis Ruell.
non possit induci, ut credat verum Coronopum:
Et quia pulchre hanc plantam descripsit Ruel-
lius, nominavit Coronopum Ruellii, Belg. Cra-
yen Doct. aut Raven Doct. Gall. Pied de Cornu-
le de Ruel. Idem hanc suam opinionem tanquam erro-
rem retractat in Hist. Lat. his verbis: Cornu cer-
ui alterum repens: Ruellius qui hanc ante nos
lib. 2. cap. 64. & cap. 134. descripsit, Cornu cerui
quoque appellari ait, & Pedem Millimum Colu-
mellæ esse suspicatur: ad Coronopi descriptio-
nem aliquo modo accedere videretur, nisi quem
Codex Cæsareus exhibet differens multum ab
hoc Cornu ceruino esset, ac manifestè ostenderet
legitimum Coronopum hæcenus fuisse incogni-
tum. Quam ob causam Coronopus dici non
debet, sed Cornu cerui alterum ac repens nomi-

Lob. lapsus

Descriptio

nandum : posset verò & Pseudocoronopus dici,
si modo hæc appellatio retinenda.

Hist. Lugd. quinque plantas tres figuras habet.
Primam titulo, Ambrosia prunæ Matthioli; alteram
Coronopi Ruellii ex Dodonæo : tertiam
Coronopi repentis Lobel.

Tabern. *Coronopus repens*, *Coronopus aru-*
fus, friedender / Frähenfuß / feldr hürghorn / M-
 der hürghorn. Posteriora hæc Tab. nomina Ger-
 manica non placent.


Montbelgardi spontè copiosè prouenit circa
vrbem, vti etiam in Horto Ill. E. C. semine dect
duo quorundam se renouat : vidi in Alsatia in Ca-
stello Eisenheim spontè, vbi Floret Iunio & Iu-
lio, audio copiosè prouenire inter Basileam &
Argentinam, & Batilex in hortu D. Dis Felicis
Plateri. Lugduni habui in hortu. Horbugi in Il.
E. C. in Alsatia arce obseruari. Genèux copio-
sè.

Loeb &
Campus.

• NASTVRTIVM SYLV. VALEN-
tinum Clulio.

Descriptive

VNico hæc planta allurgit caule, sed statim à radice, supra solum, multis alis diuiso, hirsuto & aspero, vsciente, rotundo, pedalis longitudinis: inferna folia qualia sint pronuntiare non possum, quia iam in semen magna ex parte euaferat planta cùm obseruabam, inquit Clusius, quæ tamen sub alis cauli inhærebant, tenuia erant & multifida. Nasturtii vulgaris, & legitimi, foliorum pæne æmula, tenuiora tamen & viridia, acti gustu, vt Nasturtium: extremis ramis fert multos,



omnes illarum notas & reliqua necessaria matu-
re perpendo, ante quam aliqui stirpem certo no-
mine donare aggrediar, ut facile animadvertent,
quotquot meas lucubrationes diligenter & sedu-
to animo legent: malo enim interdum ipsas plā-
tas ~~quasque~~ relinquere, ut mihi adhuc usu vent
in his commentariis, cum incommodò nomine
applicando mihi ipse non satisfacto, quam tene-
re nomen aliquod, naturæ plantæ non satis re-
spondens, donare. Sed quam quæso maiorem
affinitatē habet hæc plantæ cum Eruca, quam
cum Nasturtio? Si quis utramque stirpem sano
iudicio conferet, inueniet profectò me, non sine
probabili causa, Nasturtii siluestris nomen huic
plantæ dedisse,

Clus. Hist. & Hist. post. Nasturtium silv. Val-
entinum.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Eruca Nasturtio cognata tenuifolia.

Casp. Bauhin. Phyt. Nasturtium filu. Erucæ af-
finc.

Nasturtium Peruvianum foliis Lensicula.

Herbam habet Monardes ex Peru allatam Nas-
turtium appellatam, exiguam, foliisque haben-
tem rotunda, Lenticulæ foliis paullo maiora.
• Huius tritæ succus recentibus vulneribus in-
stillatus, ipsaque herba superimpōita, ea curat,
& ad cicatricem perducit, haud lecius quàm Ta-
bacum. Nasturtii est sapor, & valdè calidæ tem-
peraturæ esse videtur.

Descriptio
et Symptoma.
Nascentis
Periculis
foetibus;

THLAPSI VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. IV.

Sisymbrium, herbula est, referente Dioscor. angustius foliis, digitali longitudine, ad terram conuersis, in summo filis (*anagyridon* Marthioli ait, suspicor in Diosc. mendam subesse & hanc notam de folliculis legendam) subpinguibus: caulem autem remittit tenuem, duorum palmarum altitudinis, qui propagines paucas habet, & circa totum ipsum fructus est sublatus e summa parte (diuisis Marth.) in quo semen est simile Nasturtio (*rapistrum*) disci figura (*diocoridis* Ruellius legisse videtur *quaxidis* quod vertit Lenticulae effigie) velut compressum (*iraxidis*), Tex qua re nomen habet. Florem vero habet subalbidum & in viis ac parietibus & sepibus nascitur. Semen eius acre (*Peris*) est, & calefacit, bilemque sursum ac deorsum purgat, acetabuli mensura posum. Infunditur etiam per Clysterem in coxendico morbo. Ducit etiam sanguinem potui & internos abscessus rumpit. Mouet item menses & fetus perdit. Crataeas etiam aliud Thiapli recenset quod aliqui Sinapi Perlicum (*sinapi perlicum*) vocant. Habet hoc folia lata & magnas radices: sed & hoc insolis ad coxendicum morbum ammisceatur.

Focus
Vires

Thlaspi
lud.
Succisa
Persicaria.

Cornelius in suis in Diosc. suppositi refert hoc
 alios Thlaspidium (*Thlaspidium*) alios Sinapi Per-
 ficum (*Sinapi Perficum*) alios Sinapi sylvestre (*Sinapi sylvestre*)
 alios Myrica (*Myrica*) alios Myopiron (*Myopiron*)
 alios Dasiphon (*Dasiphon*) alios Bittum (*Bittum*)
 Aegyptios Suetempson (*Suetempson*) Romanos scandulacion (*scandulacion*) alios
 Capsellam alios Pedem gallinaceum vocare.

Plin. Thlaspi duo genera facit: Vnum angu-
stis foliis digitali longitudine, in terram veris, in
cacumine diuisis, cauliculo semipedali, non sine

ramis peltatarum specie, semine incluso [fructu, forte deest Corn.] Lenticulæ effigie [Cornar. videtur Plinius legisse *gaxondæ*, nisi quod infringitur [*τὸ κολληακέρυ*] vnde nomen. Flos aloicat. Nascitur in semitis & sapibus. Semen asperi gustus, bilem & pituitam utrinque extrahit. Modus sumendi, acerabuli. Prodest & ischiadicis infusum, donec sanguinem trahat : menses quoque ciet, sed partus necat. Alterum Thlaspi aliqui Persicum Napy vocant, latis foliis, radicibus magnis, & ipsum utile ischiadicorum infusioni. Thlaspi ferè omnes in Theriacam immittunt, inquit Galenus, id quod ex Creta affertur & quod ubique nascitur, colore ex pallido flauum, figura rotundum, admodum paruum, ut Milio multoties cedat. Melius autem est quod à Cappadocia affertur immittere, quod colore ad nigredinè multum discedit, figurà autem non exactè rotundum est, & magnitudine multò maius quàm prædictum, habetque quadam sui parte, velut parvam quandam compressionem [*ῥιζάκου*] à qua etiam Thlaspi nominatum est. Nascitur autè, ut hoc, ita etiam alterum in Cappadocia plurimum. Quare non simpliciter id quod à Cappadocia affertur optimum est, sed quod peculiariter in Sauro nascitur, dissimileque est Cretico & passim nascenti.

Thlaspi semen [ait idem de simpl. med. facult.] habet & ipsum facultatem acrem, aded vt internos [intestinos Paul.] abscessus potum di-
frumpat, menses prouocet, & (quod Paul. omi-
sit) scetum necet: ab inferioribus partibus inie-
ctum ischiadicos dolores finit, sanguinolenta e-
uacuans: Est alioquin & supernè & infernè bi-
liolorum humorum oxybaphi mensurâ (acerabu-
li instar, Paul.) potum, euacuatorium.

Colligi scribit Corn. ex Galeno duplex esse prius Thlaspeos genus. & tertium esse quod Diosc. & Plin. alterum fecerunt. Cæterum quod Plinius semen lenticulæ effigie dixit, tum de lenticula legumine, tum de vale fictili ad lenticulæ similitudinem efformato, accipi potest: hoc & *φασνός* & *φασνός*, & *πυλαίτην φασνός* Græcis appellatur, & fomenti gratia adhibetur, velut lib. 9. c. 1. comm. medicorum ostensū. Diosc. *δισκονδρίς* dixit, quod Plinius videretur *φασνός* legisse. Thlaspi etiam à Lacertis, quæ iisdem incultis locis quibus hoc nascitur frequentes inveniuntur, Saurion præter alias ab hoc numeratas appellationes posteriores Græcos nominasse apud M. Virgilium legimus, quasi non satis à seminis figura, quod infractum & veluti contusum videtur. indicasse id fuerit: nisi à notissimo insecto quod frequens in hac herba inuenitur adhuc indicaretur. Thlaspion Galeni & Thlasposis secundum Hipp. Robert. Const. in lex. græco distinguit *θλάσμιον* & *θλάσμιον*, Sinapi Periticum vocat, & Pedē gallinaceum; *θλάσμιον* autem *θλάσμιον*, Thlaspi, genus herbæ Diosc. Sunt, inquit, qui vocent eam herbam, Thlaspidion, forma diminutiva. Gal. genere scem. *θλάσμιον* Hipp. etiam *θλάσμιον* vocat. Apud Gortzum, cui herbula est semine Nasturtii, acris, quod mansum Sinapis modo linguam & os vellicet, Sinapi rusticum dictum fuit à plerisque, ab herbariis autem Nasturtium rectorum. Guill. Rhegin. Nasturtium erraticum appellat, ac Synapi sylv. esse negat, carpitque Manardum adiciens: ignotum adhuc nobis existimat Manardus, quod passim quidem in seminis frequens, vt aperte Dioscorides docet, quale nostrum reperitur: vulgarissimumque quibusvis colligitur, acce-

ac mordax semen est, & vires habet causticas:
misceturque in Theriacis veneno quouis profligando idoneis.

Thlaspi nomine tandem venit Tlaspi vulgarius, de quo mox dicemus. Thlaspi etiam aliud genus faciunt eam plantam quam Germ. apud Corn. Besensfraue vocant. Et in hoc etiam si ambigua res sit, tolerari possunt, quâ de re vide antè. Thlaspi alterum Crateuas tradit, quod aliqui Persiconapy vocant, latis foliis, alii Pastoris Bursam vulgò dictam. Sunt & qui Thlaspi tertium genus, Sinapi Persicum dictum, Raphanum maiorem, Sylvestrem, & priuatim Armoration vocatum, esse volunt. Sed in eo palàm falli videntur. Neque enim Dioscorides & Plinius de hoc siluissent.

THLASPI VULGATIVS.



EX *radice*
latis cras- **Descriptio**
 sa & fibrosa,
 lignosa, alba,
 subacri, *caules*
 exsurgunt hir-
 suti, teretes, ri-
 gidi, brachiati;
 quibus *folia* si-
 ne pediculo
 adherent, lon-
 ga, sensim an-
 guitiora red-
 dita, serrata, si-
 ue crenata, ge-
 mina pinnula
 caulem ample-
 ctentia, sapore
 cum mortu a-
 cri: *st. sculi* mi-
 nuti, albi, mul-
 ti, ut in Bursa
 pastoria dispo-
 siti, quatuor fo-
 liolis, constan-
 tes. totidem vi-
 tescentibus ea
 sustinentibus;
 apicibus can-
 didis: *capsella*
 prematuro or-
 tu flores occu-
 pant, foliaceae,
 subrotundae, in-
 fractae in sum-
 mo, filiz; in
 quibus *semen*
 acre, Sinapi
 aut Nasturtii,
 inquit Lobel.
 Ruell. ita de-
 scribit: Thlas-
 pi, siue ut aliis
 placet, Thlas-
 pidion, quod

Diosc. & Plinius tradunt, esse nemo inficiabitur
eam plantam quam vocant Herbarii Nasturtium
rectorum, quod subinde nascatur in parietinis:
alii sylvestre; vulgus nostrum Sinapi rusticum ap-
pellat, quoniam digitis friarum Sinapi subolet.
Hæc in scrobibus, semitis & sepibus inuenitur;

**Local
Vires**

**Noty per-
fume.**

Thlappi
Cappadoc.
Thlappi
de d'istum.
Cappadoc.

**Thampi &
Associates,
INC.**

Barja (p)
Barja

Zielvorgabe:

References

foliis in terram se conuertentibus, digitum longis, angustis, & quadantenus pinguibus, per extrema leniter incis, caule sesquipodem alto, agnatis in eo paucis calycibus capitulatis, breui pediculo nitentibus, quadam ligularum vel Cochlearium effigie, in quibus semen continetur Nasturtio simile, sed latius & velut infractum, Lunata plantarum specie. Calyx cum pericolo ligulæ formam exprimit, quæ tumidior vna parte sit, & altera pressior. Id quod in summo fructum in latus pandi designauit Dioscorides. Inò is repando dorso prominulus extuberat, aduersa parte funditur in latum. Folia colis decumbunt in radicein. Semen acerrimi gustus deprehenditur, ita vt mansum Sinapis modo linguam & os velli- cet. (Quare vt Galenus scriptum reliquit, potum rumpit, hærentes menses citet, partus enecat. Ifchiadicis auxiliatur, subter per sedem aluo dimis- sum, vt pote cruenta deiciens strigmenta, quip- pe cum eximie purget, bilem vtrunque detrahit. Modus sumendi acetabuli mensura.)

E. Steph.
not.

Eadem quæ Ruellius Car. Steph. tradit, quem tamen nominare non dignatur, sed pro suis ven- ditat.

Cordus in Dioscor. Thlaspi minus, Deschels- fressen / vel groß Deschenfraut / & megfresse vocat. De hoc aut in Hist. Thlaspi Cardamoi- des, siue Nasturtium semen habet copiosum, totis ramulis adnascens in singulis pericarpis, hisque interioribus connexis, superius aliquan- tulum concavis & compressis, geminum: figurâ & quantitate Nasturtii, colore rufum. Folia gu- stu vehementer acia sunt & Nasturtium amu- lantur. Semina autem glutinosum lentorem acrimoniae commixtum habent.

Gesn. not.

Cordo per Gesnerum adaptata est icon ex Trago qui aliud tradit, Thlaspi nempe latâ si- liqua.

Fuchf. not.

Fuchsius qui Thlaspi latifolium cognominat, non satis demonstrat quam plantam per Thlaspi, vt vocat, Thlaspidiû, Sinapi agreste, Capsellam, Scandulaceum, Gall. *Senene Sauvage*, quod quidam Nasturtium tectorum, Sinapi rusticum & Bursam pastoris nomen, intelligat. Eius de- scriptio est repetitio penè descriptionis Dioscor.

Ruellius vt Cornario placet, primus eâ her- bam quæ ab Herbariis Nasturtium tectorum ap- pellatur, Thlaspi esse censuit, & à vulgo Gallico Sinapi rusticum vocari dixit. Hoc ex Germanis nonnulli secuti, eam herbam Bauren senff (Sina- pi rusticorum) appellant.

Thlaspi tertium descriptum à Dioscoride ex Cræua videtur Anguillare, optimè dici posse illud, quod depictum à Fuchio & Matthiolo, notissima in Italia planta.

Quæ Herba *δάδαρι* Græcis, Thlaspi quoque Latinis dicitur Matthiol. pingenti, Barbaris Na- sturtium tectorum: Italis *Thlaspi*: Germ. *Besem- frant*: Hisp. *Puniqueso de flor blanca*: Gall. *Senene Sauvage*.

Scandula-
ceum
Sinapi.

Lacum in Diosc. qui Græcè *δάδαρι* & *Σινάπι* α- γειν, Lat. Scandulaceû & Sinapi syluestre: Cast. *Mostaza Sauvage*. Franc. *Monstarde* aut *Senene Sauvage* vocat, per totam Italiâ legitimum Thla- spi censeri scribit.

Dodon. not.

Dodon. Gall. & Lat. Thlaspi alterum, Neotori- corum Nasturtium tectorum, & Sinapi rusticum: Germ. *Baure senff* aut *Baurenfisch*: Belg. *Bee- ren mostaert* aut *Boerrenfische*. Hæc ille, qui vi- detur Thlaspi verum intelligere, quamuis ieiuna descriptio & figura.

Gesner. hort. Thlaspi verum.

Lobel. & Pena Adu. Obs. & Ic. Pl. Thlaspi vul- gatissimum Vaccariz folio aut Myagri pinnato, omnibus Thlaspi vocatum & receptum. In of- ficinis in usu est, & ad antidota pro vero accipi- tur Thlaspi.

Digna sanè Cæsalpini verba, quæ adscriban- tur. Folia fert ab radice Iberidi similia, longiora, ac similiter diuisa, in caule autem solum angulo- sa, pollicis latitudinis, caulis propè cubitalis, ra- mis in summis tenuibus, patulis: flosculi candidi in cacuminibus: fructus specie & magnitudine Nasturtii, in extremo diuisi: semina intus subro- tunda, nigricantia, acia: &c.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 2. siue folio acuro. Hoc Matth. Lob. Dod. edit. Latina, pingunt foliis non crenatis: At Tragus, Fuchsius, Lonc. Dod. e- dit. Gall. Tabern. foliis serratis, quemadmodum apud nos prouenit, nec licuit hætenus figure Lob. similem videre.

Schvv. Thlaspi latifolium, Thlaspi officinarû *Groß seckelfraut* / *Groß Teschelfraut*.

Locus &
tempus

Thlaspi vulgare circa pontem d'Arue Geneuz habebam in orto cum semine & siliquis Maio, semine maturo Iunio. Basileæ in orto D. Plateri, Patavii in orto Triuesani, & alibi obseruau.

Montbelgardi multis in locis spontè, ceu etiâ in orto Ill. E. C. ex semine deciduo se propagat. In Alsatiæ agris inter Basileam & Mulhusam a- bundat florens Iunio. In fossis, semitis & sepi- bus prouenire scribit Fuchsius, Maio & Iunio mensibus, floribus & semine prægnans. Thlaspi Cardamoidi tribuit Cordus radicem semestrem. Nascitur lutois & pinguibus aruis, secus vias inter segetes, copiosissimumque inter Goslariam & Hildesheimium in Saxonia legitimum reperi- ri in Italia certum est ex Matthiolo, siquidem eo maxime abundant & Gotitiensis ager & Coradif- cæ mœnia in parte quâ Sontius alluit. Nascitur & frequentiss. & acerrimum Pago S. Petri non longè à Gotitia, aliisque circumstantibus locis semine perquam acri. Multò vberimè proue- nit cultis & incultis aruis Italiæ, Germaniæ & Angliæ: sub æstate florens, ait Lobelius.

Vires à Fuchio attributz huic Thlaspi ex Dio- scor. Paulo, Galeno & Plinio antè sunt à nobis scriptæ: Is autem scribit semen huius calefacere & exsiccare in quarto gradu: semen acie est, calefacit, siccantis est nature, attenuat, prouocat, in- cidit, vrit perinde vt Nasturtii semen, Schvv. enkf.

Tempus
& Vires

THLASPI CAPSVLIS HIRSVTIS.



FRequentes statim à ra- dice simplice lignosa fundit caules humi sparsos, tere- tes, hirsutos, dodrantales, aut etiam cu- bito maiores, in alas aliquot filios: folia in- fima quidem longis appen- duntur pedi- culis, Erucæ latifolia diui- surâ, superiora verò per cau- les crebra, nul- lo interueni-
te

Descriptio

te pediculo lata basi haerent, Thlaspi vulgaris formā, cui & flores albi similes, ideoque adeo est ordo numerorum capsularum infractarum, per summa fissarum, nisi quod paullo videntur maiores, pilis densis incanis oblitz, singulae bina semina continentes ruffa, quae liquore imbuta mucū lentum viscidumque saluant: quod à vulgari Thlaspi quomodo distinguam non video.

Camer. hort. ni fallimur, Thlaspi secundum supinum hirsutum.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi .g. siue villosum, Thlaspi pilosum Guilandini, cuius semen referente Cortuso, olim in Italia pro veri Thlaspeos semine usurpatum fuit.

Anguil. Thlaspi Diosc. & Creticum Galeni.

An Lobel. & Pen. Adu. Thlaspi Syriacum, vel Graecum alterum, anguloso bifori pericarpio lentifolio, quod habuerunt Venetis & c. nescientes sit ne illud tertium Matthioli, quod ille nulla apta descriptione genera distinxerit, sed in chartas tantum negligenter picturas congerierit.

Thlaspi cum capsulis hirsutis in horto meo Mörbelgardi satum se propagabat ex semine deciduo itidem translatum in Hortum H.E.C. Frater C. Bauhinus attulit ex Italia pro Thlaspi piloso Guilandini.

THLASPI CVM SILIQVIS LATIS.

Vulgaris
notitia

est hoc Thlaspi, radice obliqua alba, lignosa, sapore ulceraceo, tandem subamaro: caulibus sesquipalmatis & cubito altioribus, angulosis, striatis, alatisque; folia, sine pediculo adnascuntur sinuata, pinnulis acutis, productionibus in atro virentia, sapore inter Brassicā

& Cepas, odore ad Allium accedente: flores pusilli, Bursae pastoris, albi, quatuor constant foliolis: quibus succedunt siliquae latae, rotundae, compressae, seu foliaceae, glabrae, supremā orā fissae, in medio magis eminentes propter semina contenta, rotunda, cum striis circularibus. Dodonzo auctore nigricans, acris & feruens gustu, Milium etiam simul nonnihil resipiens.

Est hoc Trago pingenti Thlaspi, describenti autem, vulgaris Thlaspidia, & inter nomenclatas, Thlaspi alterum, siue verum, quod ait Dioscoridem, & c. Bauh. Phyt. Thlaspi .g. siue villosum, Thlaspi pilosum Guilandini, cuius semen referente Cortuso, olim in Italia pro veri Thlaspeos semine usurpatum fuit. Anguil. Thlaspi Diosc. & Creticum Galeni. An Lobel. & Pen. Adu. Thlaspi Syriacum, vel Graecum alterum, anguloso bifori pericarpio lentifolio, quod habuerunt Venetis & c. nescientes sit ne illud tertium Matthioli, quod ille nulla apta descriptione genera distinxerit, sed in chartas tantum negligenter picturas congerierit. Thlaspi cum capsulis hirsutis in horto meo Mörbelgardi satum se propagabat ex semine deciduo itidem translatum in Hortum H.E.C. Frater C. Bauhinus attulit ex Italia pro Thlaspi piloso Guilandini.



Descriptio

multum à Nasturtio distantia. Non placent quae dicit de forma seminibus, quandoquidem multum differt à Nasturtii semine: Tragi icon adaptata est Thlaspi Cardamoidi Cordi, licet diuersum sit illud Cordi Thlaspi: ut verum fateatur icon Tragi non vndique placet, si is, ut nobis videtur, intelligit Thlaspi nostrum latis siliquis: is forte tunc ignorabat differre à Thlaspi vulgati ac cum eo confundit iconem & descriptionem.

Dodon. Gall. Thlaspi à Cardamoides, & c. Thlaspi. Lat. Thlaspi, Capsella, & Scandulaceum, quibusdam Myrtis, Bytron, Dasmophon & Myoptron. Germ. wilder fresse & wisselcrust: quibusdam Scorodithlaspi verum Dioscoridis, Lat. Thlaspi latus & primum; Graecis Thlaspi à fructu, qui securum exiguum infarctum retinet: Recentioribus Nasturtium tectorum, & Sinapi rusticum dicitur, Germ. Baurseuff, Baurseuff.

Marth. post comment. Thlaspi alterum vocauit, quod eius semen Thlaspi haud ab simile videatur, nascique tradit in agro Pragensi, locis saxosis & asperis, ac florere medio Vere & Iunio mense. Figura quidem Matthioli mihi satis probatur: semen minus simile Thlaspi est: non facile in saxosis & asperis obseruui, sed in agris & cultis locis. Is in Hist. Germ. non posuit figuram nec eius meminisse.

Camerad Marth. Hist. Germ. & Epit. nonam posuit figuram pro Thlaspi 2. quod ait habere latissimas siliquas.

Lobel. & Pen. in Aduer. dicitur Thlaspi, siue Nasturtium tectorum, Nasturtium sylvestre, Scandulacea, Capsella, & c. Germ. Baurseuff & fress / Baurseuff: Ital. Thlaspi: Gall. Senou sauvage, Belg. boeren fersc.

Lobel. Obs. Thlaspi Draba folio, Icon. Plant. Thlaspi Draba & Chamelina folio. Aduer. faria quoniam dicebant suum Thlaspi Draba folio habere semen oblongum, nigrum Nasturtii, ego de alio Thlaspi intelligebam, donec Lobel. figurā demonstrauit plantam quam intelligit: quae profecto non habet semen vlla ratione simile Nasturtio, nec oblongum, sed rotundum cum striis circularibus: ut verum fatear suspicor Lobelium confundere duas plantas, nec ei assentimur, Thlaspi quod exhibet siliqua lata melius continere cum Antiquorum Thlaspi quam vulgare, quod postea vocat Thlaspi vulgatissimū.

C. B. Phyt. Thlaspi 2. siue foliis & siliquis latis. Schvv. Thlaspi latus maius, & c. Thlaspi Diosc. Aduer. Thlaspi Cardamoides Cord. Nasturtium siluest. Scandulaceum, & c. Desch. fraut / Zeschelfresse / Baurseuff. Si Schvv. melius contemplatus fuisset Cordi Thlaspi Cardamoides, dubio, procul aliter sensisset.

Thlaspi cum latis siliquis rotundis, foliis mollioribus, glabris, obseruauit Batilex in agris, quae itur Moutets cum floribus mense Octobri. Geneux cum siliquis & flore Nouembri, semine maturo Iulio. Hoc Thlaspi Allium olere videtur. Lugduni habebam in horto, Montbelgardi in Horto H.E.C. ubi seminavi, se conseruat semine deciduo, prouenit etiam in agris. Maio, Iunio & Iulio cum semine in aruis Sileciae vigere tradit Schvvencckf.

Vtrum Schvvencckf. vires obseruauit quae scribit nescimus, dicit semen acre esse, bilem extrahere, potum internas suppurationes rumperet.

Tragi.

Nasturtium.
tectorum.
Sinapi
rusticum.

Locus.
Marth. not.

Lobel. not.

Schvv. not.

Locus &
tempus.

DRYOPHONON PLINII.

A Vitis nomen merito sibi vendicat, ut qui id primo his verbis depinxerit. Dryophonon similis herba est (Dryopteris) cauliculis tenuibus, cubitalibus, circudatis utrinque; foliis, pollicari amplitudine (vel latitudine, & longitudine. Latitudine potius intelligit Dal.) qualia Oxymyrtines, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido Sambuci. Edunt cauliculos decoctos. Semine vero eius pro Piperis utuntur.

Hæc paucis immutatis ita reddit Ruellius: Dryophonon olus sylvestre Filiculam specie æmulatur, ramulis sequepedalibus, quos circundant utrinque folia, pollicari amplitudine, Rusco similia, nisi quod teneriora sunt, & candidiora, flore Sambuci lacteo, semine gustu mordaci, unde eo vice Piperis utuntur, conquassatque cauliculos in cibis admodum gratos. Dryophonon Plinius Dryopteris similem fecit.

Myrtus
memoralis.
Vitis Idæa
angulosa.

Idem Officinis Gallorem Myrtum memorale appellari scribit, sed nullo modo cum Dryophonon convenit Myrtus memorialis. Nos de hac egimus lib. 15. hoc titulo: Vitis Idæa angulosa.

Thlaspi
creticum.

Cordus Creticum Thlaspi putat, quod pro Draba Dioscoridis quidam monstrat, ut etiam annotat Dalech. apud Plinium. Verba Cordi hæc sunt.

Dryopho-
ni siue
Dryopha-
ni æqui-
uoc.

Quædam exemplaria Arabum, alia Drabam, quædam etiam Arabidam appellant. Cæterum non male ait Virg. Marc. nullam esse apud alios Authores herbam hoc nomine. Plinius tamen eius mentionem facit sub nomine Dryophani. Arabis siue Draba secundum Dodonæi opinionem est Dryophonon Plinii: Thlaspi Candia vulgi. Est nobis Arabis Dodonæi Thlaspi Creticum quorundam, de quo mox dicemus. Dryophonon Plinii peritiores arbitrantur Rhus Plinii nonnullorum: Clusius: qua de re vide H. n. lib. 5. Authore Guilandino ut testatur, Casp. Bauhin. Barbarea muralis, de qua priori libro dictum, erat Dryophonon Plinii. Pro Dryophono tandem Plinii quidam [ait Dal. in annot. ad Plin.] Filicem florescentem monstrant. Consule lib. 37. H. n. generalis.

Thlaspi
creticum
siue Can-
dia quæ-
dam.
Rhus Pl-
inii quorundam
Barbarea
muralis
Folia flori-
da.

THLASPI CRETICVM QVIBVSAM
flore rubente & albo.

Descriptio



Certe quædam pedalis altitudinis aut prociore unico adest, sed crebro alarum stipatu ubertim fruticæ, duro, lignoso, glabro, viridante: foliis tum caulis tum rami amictuntur longis angustis, ex angusto principio sequim dilatatis, Iberidis folia æquantibus, nonnihil in-

terdum cænaris, potissimum inferioribus sapore feruido & subamaro: flores umbellatim coherent dilute rubentes, vel, ut ait Dodon. & cæruleo rubroque permixtis, utrisque distitis, eleganter purpurascens, foliis quaternis, duobus maioribus, totidem minoribus, constantes: quos si aliqua vel theca excipiant Thlaspios bifida, infraacta, & fissura stilum proferentes, quibus semen continetur, Dod. acre veluti Nasturtii. Radices plures, crassiusculæ, duræ, albæ.

An Anguill. Thlaspi Cappadocicum Galeni: Matthiol. in post. com. Ital. & pingit sine descriptione, sub titulo, Thlaspi 4. figurâ non admodum probandâ. Dod. gall. 2. 23. Lat. Arabis & Draba, Plinii secundum quorundam opinionem, Dryophonon, Neotorkorum Thlaspi Candia, vocari etiam addit Δράκη, vel Ἀγρίον, lapsu facili ex & in a.

Thlaspi
Cappadocicum

Thlaspi Creticum siue Cappadocicum quorundam, si bene meminit Gesn. epist. quadam ad Occo. lacius amariolusque est cæteris, siue Nasturtii, siue Thlaspios generibus. Is in horto habet herbam floribus & seminibus eisdem [flores utriusque quaternis constant foliolis: quorum duo semper latiora sunt, & alia duo minora,] foliis vero multifidis, quam Sesamoidis nomine accepit: Ac dicit Dodonæum Thlaspi Creticum Arabam vel Arabin facere.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Thlaspi Candia umbellatum Iberidis folio

Camer. ad Matth. Germ. Thlaspi 4. Hort. Thlaspi Creticum flore purpureo & subalbido, amarissimo folio.

Casp. Bauhin. Phyt. Thlaspi 12. siue umbellatum Creticum Iberidis folio, quorundam Dryophonon Plinii, aliorum Draba Dioscor. Et sane, inquit, descriptio in multis convenit, flore est purpureo, aliquando subalbo & luteo: habetur in horto Bombiano.

Thlaspi
creticum
Dryophani
Draba

Schvvenckf. Thlaspi Creticum.

Propagatur, inquit Camer. non solum semine, verum etiam ramulis depactis in terram: Tene- & plantæ prius quam flores produxerint, in cella asseruat, altero anno florent egregie.

Propaga-
tio.
Repositio

Idio & Augusto mensibus florem ac semen profert, Dodon. In Silesia hortis semen Augusto & Septembri maturum, Schvvenckf. Thlaspi Creticum vulgè dictum vidi florens Basilea in horto Theodori Zvingeri & alius, florens Iulio mense & adhuc Septembri. Genevæ satum in horto meo ex semine misso per Zvingerum, florebat Iunio. Sturgardiz copiosum vidi: Satum Montbelgardi in Horto Ill. E. C. facile provenit, floret Augusto, Anno 1608. Iulio in horto Il. Ducissæ florebat Thlaspi Creticum flore rubente, quod vulgare, & albo, quod nondum videramus, dicebat se habere flore mixto.

Locum &
tempus.

Feruentis gustus: ac potenter, idcirco exaltans huius non minus quam Thlaspios semen, autore Dodon. qui præterea vires tribuit Drabæ, quæ postea recensentur ex Veteribus cap. de Draba.

Flore albo
& rubro
vires

Thlaspi Creticum foliis indivisis seu Lini amarum.

Thlaspi Creticum appellatur herba, quæ etiam apud nos reperitur locis asperis in monte S. Iuliani: furculis dodrantalibus: foliis angustis, indivisis, seu Lini: capitula serotacuminibus: in quibus flores stipati, subrubentes: & fructus in eodem capitulo stipatos, profundiori sectione, quam Thlaspi nigrum: seminibus intrus flavis, amaris

maris & acubus : herba quodque amara est. Galenus meminit Cretici Thlaspios.

THLASPI VMBELLATVM
arvense amarum.

Descriptio

Sesquipedalis est & aliorum plura, tolicali: pluribus, canosis, striatis, subhirsutis; quibus folia adnascuntur oblonga, lberidis, ex angulo principio sensim dilatata, & circa extremitatem crecata, crassiuscula, subhirsuta, sapore perquam amaro, sub-



cri: flores tanquam in umbella dispositi, quanquam inaequali ortu, ex albo purpurascen- ter, aut etiam penitus albi, quatuor com- stant foliis, quorum duo maiora lon- giora, ita ut ex his vnum, si- mul utranque inferi equet, aut etiam su- peret, capsula hirsuta, intacta. Nasturii vel- garis semen co- nent minutum, acie, C. Bauh.

Radix lignosa, alba, fibrosa. Haec planta accedit ad Thlaspi Creticum vulgo dictum.

Est Frago Thlaspidi aliud genus sine icone.

Tabern. Hist. & Icon. Thlaspi amarum siue 10. Biterbarrensenff / caule tenui, sed robusto, flore albo instar Coronae.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 14. siue umbellatum arvense lberidis folio.

Locis & tempus Bassia in agris, mense etiam Octobri, & mense Iunio. Cum essem Geneuz inueni circa Thuri copiose florentem Iunio, idque inter segetes. Montbelgardii variis in arvis, ut eundo ex Arbois Audincourt, & in agris circa la Chaux: transili in Hortum II. E. C. floret Augusto, Stutgardia colunt in hortu III. E. C. Iunio & Iulio copiosum obseruavi inter segetes flore albo & purpurascen- te in agris inter pagum Longenelle & celebrem Sanum siue Salubrem fontem II. E. C. Wirtemb. in comitatu Montbelgardensi.

THLASPI PARVVM VMBELLATO
flore niueo odorato.

Thlaspi 4. (lege 5.) paruum odorato flore; quod Iacobus Plateau mittebat, inquit Clu- sius Hist. post. humile est, ex semine natum, sin- gularibus virgis assurgit, rotundis, in plures ra- mos diuisis, per quos ut per caulem, sparsa e- rant angusta & extremo mucrone serrata folia, Cretici foliorum amula, acri gustu praedita: summo caule & extremis ramis, nascebantur ve- luti quaedam in vnum caput congesta umbellae florum minorum, odoratorum, quibus successe- runt theca Cretici Thlaspi vasculis similes, in



quibus semine: r- der etiam Cretici Descriptio instar, non viux. Thlaspi hoc ab eiusdem Clasi Thlaspi in Allo- brogibus inuen- to, flore niueo, quantum fac cogitandum.

THLASPI VMBELLATVM TENVITER
diuiso folio amarum Narbonense.

Thlaspi speciem, vel ut voluit Nastur- tium sylvestre, quod cum Thlaspi umbellato arueni amaro pictum est, Anno 1561. & 1562. in- ueniebam Monspelio eundo ad montem Espe- ran, & verius oppidum Gangen, florentem in- ter taxa mense Octobri, & propè Assethen inter Perous & Monspelium in marginibus agrorum mense Maio, & veniendo Lugdunum mense Iu- nio, si bene recorder: Planta autem est multum accedens Thlaspi umbellato arueni amaro: fo- liis crassiusculis cum aliquot paruis laciniis siue portunculis, ferè floribus uideam sed paulò mi- noribus. Est semispithamea: cauliculi aliquot firmiusculi in ramulos diuisi: radix singula- ris crassiuscula, in fibras distributa: haec verba ascripsit Gesnerus: Sesamoidis spe- cies minima, quæ in meo hortu mihi nata: ve- rum in eo fallitur: Est mihi alia planta inter meas agglutinatæ stirpes, pedalis, cum pluribus catul- bus ramulosis, cui in summitate ramulorum flores copiosi, radix crassior. Scribit Gesnerus iuxta eam; quæ sequitur Thlaspidium quoddam videtur, inest semen tenue, latiusculum, rufum, subamarum. Est mihi adhuc hoc anno inter sic- cas cum praedictis alia plantula monoclonos, al- titudinis quatuor: vnciarum, per totum caulicu- lum foliola, in quatuor ramulos diuisa, tum co- piose umbellato flore: eam Monspelio detulit Irater C. Bauhinus ac misit cum hac inscrip- tione, Thlaspi Candia umbellatum lberidis flore ex monte Ceti, florens Maio & Iunio: Haec au- tem tres planta sunt tantum vnus, sed varie- tatis occasionis loco. Hoc verò Thlaspi noli mihi amplius v tum nisi inter meas plantas sic- cas, donec hoc anno 1407. conspectum, sed non agnatum ante florem emissum, in hortu Theo- baldi Noblot generi mei Phatniacop. II. E. C. quod prouenit ex semine Monspelio misso Do- ctissimo Medico, D. D. Danieli du Vernoy, nomi- ne Thlaspi umbellati, quod praecedenti anno terræ commissum (multum euarians, ut solent plantæ quæ ex calidioribus locis in frigidiore trans- feruntur) per hyemem eduxit, & hos sequenti ineunte Aprili mense cauliculos primùm pro- tudere cepit ex vna radice plurimos, striatos;

Descriptio
Sesamoidis
speciei.
Thlaspidi
quoddam.

Thlaspi
umbellatum

Locis

HISTORIÆ PLANTARVM.

longa serie foliorum ad extimam vsque promi-
nentia caulis donatos, folia autem ima sustinen-
tur petiolo vnciali, superne in quatuor portiones
crassiusculas, latusculas, mediagque parte sulca-
tas desinente, media porro folia summiq; petiolo
duas circiter vncias plus minusve longo produ-
cuntur, crenarumque impari numero pro pe-
tioli longitudine breuitateque diffusi, ita quide
ut longiores pediculi 4. vel quinq; portionib. a
se inuicem impari intervallo & regione colloca-
tis distictisque constent: breuiores verb modò
duobus, sed rarissime, modò tribus, trifolii in mo-
dum, modò quatuor, modò quinque quoque, sed
rarius, disparique longitudine dotantur. Flore
porro cœpit iam declinante Maio, erant verò
flosculi in umbellæ circinnatæ morem numero-
siores dispositi, vel intra caliculos adhuc condi-
gi latentesque, vel iam sese in apertum florem
pandentes explicantesque, albidî, quaternis con-
stantes foliolis, quorum externi ad instar amari
Nasturtii duobus aliis longioribus foliis in am-
bitum sparsis, duobus verò aliis interioribus bre-
uioribus absoluntur, in media verò regione
flaminibus aliquot croceis decorantur. Folia de-
gustata saporem anarum acremque sensui offe-
cebant, ut & flos mansus, remissiori tamen gra-
dia. Superueniunt capsulæ & semen.

Pena & Lobel. Aduers. & Icon. Plant. Thlaspi
hoc, Thlaspi alterum umbellatum Nasturtii ho-
tensis folio, Narbonense, inscribunt. Lobeli
autem descriptio: ut & eius icon non in omni-
bus placet.

lc. Dalechamp. videtur paulò melior, de de-
scriptione taceo, quæ sic habet: Nasturtium sylue-
stre Dalechampii radice est longa, tenui, candi-
da, fibrata: caulibus multis fruticat dodranta-
libus, & si pinguius solum fuerit pedalibus, folio
est satiuu, copioso, densius per annos congesto:
flore in umbella ex albo purpurascens: semine
in latis vaginis, Thlaspeos modo bifidis, gustu a-
cri, & satiuum Nasturtium odore imitante. In
agris frumentariis prouenit, & lapidosis ma-
crisque.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 1. siue Nasturtii folio pe-
regnum. Thlaspi alterum minus umbellatū
Nasturtii hortenſis folio Narbonense Adu. Car
primū Thlaspi dicatur nescio, mihi potius vi-
detur locandum post Thlaspi umbellatum aruen-
se quod ego anatum cognomino: quibus bene
cognita fuerit hæc planta considerent quantum
similitudinis habeat cum Nasturtio hortenſi.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi Narbonense um-
bellatum, Thlaspe von Langedoch nur vielen
geharrff blümlein.

nen confertos sustinet flores, Iberidis Fuchſii de
norem, nec ita dissimiles, maiusculos, singulos
quatuor foliis coloris lactei constantes, pluscu-
lis etiam apicibus in calyce viridante latentibus.
Quibus succedunt siliquæ latusculæ compressæ,
bulbulatum pastoriarum æmule, ex sinu suo api-
culas exiguas emittentes. Semen complectentes
sebrustum, exiguum, acrisculum, & subamarum.

Clusius Pann. & Hist. post. Thlaspi montanum
& siue Thlaspi Badense.

Vila planta florens, nisi iam ex Clusio figuræ
habereim sculptam me absente, aliam propone-
rem, quandoquidem ipsimet, Clusio non placet
nec nobis.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 1. siue Bellidis cœuleæ
folio.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi album supinum.



illegent weiff
Bauren freß.

D. Dr. Mar-
tinus Chem-
nitius dedie
Baileæ colle-
ctum in mon-
tibus prope
Selsburg:
florentem vi-
di Martio in
horto Ioan.
Heitzman
Pharm. Menſe
verò Maio re-
peri prope S.
Vrsam lapido-
sis locis cum
flore & sili-
quis penè ma-
turis. Clusius
obseruauit in
decliu mon-

ris illius glabri, qui vrbi Badensi imminet, quan-
to à Vienna miliari, florens Aprili, semineq; pro-
ferens Maio & Iunio.

Thlaspi folio rotundo.

Quod à Camer. hort. Thlaspi 7. rotundifolium
Thuringiæ: & C. Bauh. Phyt. Thlaspi 7. folio ro-
tundo nuncupatur: eius nullam adhuc reperi de-
scriptionem: considerandum an sit Thlaspi no-
strum foliis Globulariæ.

THLASPI FOLIIS GLOBULARIÆ AFFI-
ne siue Allinesolia cum Myagris foliis.

AD Thlaspi Globulariæ foliis nobis dictum
nonnihil accedere videtur, sed hoc quàm il-
la exilius. Nam & radix longa, crassa, in plura
capita diuisa, & siliola numerosissima quibus-
dam albidis pilis obsita, quædam interdum sinua-
ta, succulenta, crassiuscula, & oblongiuscula,
humis sparsa, atrouirentia: quibus præteritorum
foliorum filamenta substrata. Ex quibus surculi
emergunt palmates aut altiores, teretes, alterno
foliorum angustiorum subpinguium atrouiren-
tium quoque ex ima parte colicolum amplecten-
tium positu donati. In surculorum diuisorum ca-
cuminibus, stentibus quoque plurimi, lactei, qua-
drifolii, dictæ plantule foliis similes. Sapore est
agri.

Huic

Thlaspi
umbellatū
minus.
Lobel.

Dalech.

Thlaspi
Nasturtii
folio.

C. Bauh.

Descriptio

THLASPI FOLIIS GLOBULARIÆ.

Longè latèque serpit radiculis longis crassius-
culis in aliquot capita diuisis nixum, quæ
subinde reprimendo demissis fibris denuò radican-
tur: folia per terram sparsa, aut in eam rechina-
ta, satis crebra, Globulariæ foliis quodammo-
dò similia, pediculo vnius aut duarum etiam vn-
ciarum, ad exortum rubente nitentia, vix totam
vnciam longa, subrotunda, crassiuscula, atroui-
rentia, potius hyberna, sapore amaro: cau-
tes palmates aut etiam longiores, teretes, glabri,
per quos alternatim nascuntur folia coloris ferè
glauci, pediculorum expertia, ima parte caulem
copleta, quo ferè modo folia Bursa pastoris Per-
foliatæ folio acuminata. Summum caulis cacu-

Descriptio

Huius plantae accedit multum si non idem Thlaspi petrum, Myagodes Ponz.

Quodnam sit Matthiolo Thlaspi tertium, non possum [inquit Camer. ad Hist. Matth. Ger. n.] diuinare, nisi illud sit, cuius semen nostris Officinis in usum venit. Similia enim habet folia & radicem, quemadmodum ab eo pingitur caules vero frequentioribus foliis sunt stipati, ramulis vero in orbem pulchre digesti flosculi insident, neque etiam saxosa amat, quod de tuo Matthiolo scribit, sed pingui solo nascitur. Quod & Pennus Londinensis Medicus in monte Salerni prope Genueam in saxorum crepedinibus reperit: foliola habet longiora, minora, iuxta radicem paulum crenata & aspera, atrouirentia. Semen rufum quemadmodum Nasturtii vasculis clauditur. Prouenit etiam in monte Aminam Helueticorum. Idem in Harc. Omissa Matthioli saxatilis Thlaspeos iconem aliam substituiamus ex ipsa plantula depictam, quam antehac nemo arbitror exhibuit, donec Matthioli illud Thlaspi [tertium] nobis quoque innotesceret. Idem in Epit. Thlaspi tertium inscripsit. Sed nescio cur Thlaspi Officinari non potius referatur ad primum Matthioli quam ad tertium: nec etiam inuenio Matthiolum dicere tertium saxosa amare, pro tertio placet: nec illa planta Camer. responderet tertio Matth. cum mutabas iconem, oportebat etiam descriptionem Matth. in Epit. mutare.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi tertium laxatile Camer. in Epit. Matth. Quod enim Matthiolum 166. pro Thlaspi tertio pingit, non recte exprimit folia, quae nimis longa & acuta: Quare Camerarii figura nobis probatur ex plantae viridis cum figura collatione. Nos eius imaginem exhibemus in tabula Alines-foliz cum Myagri capitulis.

In peregrinatione Rhætica cum D. Gesnero, anno 1561. Burmii cum essemus in monte Nombro reperi cum vasculis mense Iunio. Anno 1591. Frater C. Bauh. sine nomine ad me misit, qui scribit, se in monte masserfall copiose collegisse. In altissimo monte trans Sanctum Ursinum ex praeceptis rupibus, quas Rupes Sambrae vulgo vocant, loco ceterum aprico Maio florens, nec dum semen proferens, ex quo nostra descriptio.

THLASPI CAPSVLA cordata peregrinum.



Tam. II.

PUlcherimum Thlaspeos genus hocce, primum Henr. Cherlero in Clariss. Zvingeri observatum, pedalem altitudinem adsequitur. Caulis in aliquot ramulos diuisus, foliis stipatur lini facie, in summo obtusis, glaucis, temere oppositis. Cuius ut & ramulorum eius extrema flosculi ornant, exigui purpurei, quos

excipiunt siliquae foliaceae, cordatae, eleganti virore conspicuae, minimi digiti vnguem latae, lineae quadam bipartitae, & ut vno verbo dicam siliquis Thlaspeos laxissima siliqua dicto figurae persimiles. Radix duriuscula est & alba. Plantae sapor subamarus non sine acrimonia quadam. Semen eius paruum, oblongum, luteolum, acriculo est sapore, minime ingrato.

De loco in descriptione. Floruit ibidem Iulio & Augusto quo iam siliquae & semina maturata Cherlero in hortum Mompelgardensem conicienda collecta.

Locus
tempus.

NASTURTIVM VEL THLASPI maritimum.



IN sesquipedalem & ferè cubicalem plantam fruticat, lignosis, satis fragilibus, hirsutis subrubentibus ramulis, per terram sparsis: per quos folia vncialia, perangusta, incana hirsutie oblita, sapore Nasturtii: flosculi extremis ramulis congesti, albi, cum partibus quibusdam cyanicis, odorati,

Descriptio.

Nasturtii similes: quibus, succedunt capsella parua, oblonga, utrinque acuminata: in quibus semen pusillum rufum: radix maiuscula, crassa, alba.

Et hoc illud est, quod Lobel. & Pena in Advers. & Icon. Plant. Thlaspi Narbonensis, Cerniculi angustifolii, & Alyssi Italicorum nomine proponunt, de quo ariunt. Fecerant iamdiu Itali Alysson quoddam, eosque Commentator sequitur, lubenter, inquit, posuissim si habuissim: igitur factum bene, quod non habuerit, quippe doctiorum omnium Monspeliensium suffragio Thlaspi hanc annumeranda non Alyssis. Suspicio Nasturtium nostrum maritimum non pet Lobelium disiectum ab Alyssis siue Thlaspi multorum. Icon & quaedam in descriptione Lobelii conveniunt cum Nostro Nasturtio vero, quaedam cum nostro Alyssis minore quorundam, Monspelienses id diligentius perpendant.

Thlaspi maritimum Dalechampi sic describit hist. Lugd. Thlaspi maritimum idque minimum in maritimis prosilit, radice lignosa, longiuscula, in surculos diuisa, candida: caulibus multis, dodrantalibus, simplicibus, foliis multis, exiguis, angustis, longis: flore in summis caulibus copioso: semine flavo, lato, Thlaspi simili, acriculo, in loculis turbinatis concluso. Idem hoc Thlaspi alibi habet hoc titulo. Thlaspi Narbonense Pena. Eadem etiam sub Alyssis Matth. ita scribit: Hanc Plantam Itali fecerunt Alyssum, vel Alyssi genus, quos secutus Matthiolum lib. 3. Ar doctiorum omnium Monspeliensium sententia Thlaspios generibus adnumeranda est, non

Tab. Lugd. Alyssi. **sed Hist. Lugd.** illo cap. Narbonense Thlaspi idem facit cum Matthioli Alyssis à quo non parum diuersum: capite autem 45. pro Thlaspi Narbonensi ex Adu. Lobelii & Pena transcribit quæ scripsit, & iconem illorum ponit, hac ratione diuersas confundens plantas: culpa Compilatoris ignati stirpium.

C. Bauhin. Phyt. vocat Thlaspi 22. siue Alysson, dictum alterum & maritimum, atque: etsi Lobelius velit Thlaspi Narbonense Centunculi angustifolio idem esse cum Italorum Alyssis, variat tamen. Hoc enim ab Italico differt foliis angustioribus, rarioribus, siliquis minoribus, longioribus, quod optime exprimitur ab auctore Herb. Lugdunensis.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi Narbonense Centunculi angustifolio: Alysson Italorum.

Locus & tempus.

Toto auno videtur florere. Vidi florentem apud mare & locis arenosis & salugine abundantibus, vt vno miliari à Monspelio mense Augusto & Aprili, & iuxta aquas mortuas mense octobri. Frater C. Bauhin. attulit mihi Monspelio cum hac inscriptione Thlaspi maritimum florens Maio & Iunio.

THLASPI MINVS QVIBVS DAM, ALIIS Alysson minus

Descriptio



Non vna se-
per facie
occurrit hæc plā-
ta, aliàs pusilla
admodum, aliàs
dodrante maior,
crebris virgultis
duris fruticans,
asperis & incanis,
in ramos fissis, &
in terram aliquā-
do reclinatis: fo-
lia infima, cum
caulem non fert,
oblonga, vncialia
aut sciscuncialia,
culmo latiora, ad-
mixtis sæpè aliis
latitudine & lon-
gitudine iis ce-
dentibus, quæ v-

traque caulescēte plantā ferè decidunt: superiora
autem, quæ in caulibus & ramis satis sunt fre-
quentia, admodum sunt angusta: omnibus
porro communis color incanus, magis tamen
parte inferiore, ad tactum asperitas, nervus v-
nicus folium bisecans, sapor fatuus: flores cre-
berrimi, Thlaspeos montani lutei, multo mino-
res: colore aliàs luteo, quam varietatem est vbi
in eadem planta obseruare liceat: quibus serie
longa, vt in hoc genere fieri adsolet, capsulæ suc-
cedunt lenticulæ grano formæ & magnitudine
pares, circumactæ sulco in medio protuberantes,
vbi semina subsunt pusilla, quaternis, singulis lo-
cellis membranulâ discclusis bina, ruffa, quæ hu-
more madida mucaginein reddunt, radix demis-
situr lignosa, alba, plerumque simplex: annua
stirps.

An Trago Nasturtii genus quartum Germanis
dictum Klein Seckelkraut vel Teschelkraut, quod
aliter describit, atque sub Thlaspidio compre-
hendi?

An Dodon. Gal. Thlaspi 4. cui folia longa, an-

gusta, aspera, caules lignosos, rotundos, flexiles,
stoculos paruos, albos, siliquas laticas, semina fus-
ca, gustu valde calido, Nasturtii instar, adscribit
Hoc Thlaspi cur Dod. Lat. omiserit miror.

Hist. Lugd. Alyssum minus Dalechampi vocat,
de quo ait: In sabulosis crescit radice candida,
parum fibrata, satis longa, cauliculis multis, ro-
tundis, lanuginosis super terram parum extanti-
bus: foliis multis albicantibus & tanquam cinere
conspersis, Aizoo minoribus, similibus, & non
lata forent, gustu fatuus cum pauca adstrictio-
ne: flore in summis virgis copioso, luteo, semine
Lini, minuto, ruffo, in loculis scuto similibus,
duplicatis, membrana tenui & pellacida distin-
ctis. Si Dalechampi Alyssum idem est cum no-
stro Thlaspi minore quorundam, icon in Hist. oc-
posita non placet.

Thlaspi generibus quodammodo congener ef-
se videtur Clusio Alyssum minimum, foliolo go-
sis subacidi, sed saluam quodammodo ciceris,
stoculis luteis quinque foliolis constantibus. An
verò nomen aliquod vulgare obtineat apud eos
populos vbi nascitur non intellexit, affinitatem
autem habere videri scribit cum ea planta, quæ à
vulgo Dioscoridis Alysson esse creditur. Nos su-
spicamur Alyssum minus, siue Thlaspi minus de
quo agimus à Pena & Lob. in Adu. non distinctum
à nostro Nasturtio, siue Thlaspi maritimo.

Thlaspi inquit Camer. & Matthiol. Germ. Jf-
milis est plantula quæ quibusdam Alyssum dicitur,
flore albo, in summitate luteo, hirsuta, &c.
Idem ad Epit. Matthiol. ait. An veterum auctori
hoc sit Alysson, cum aliis adhuc subdubito. Hæc
ille. Proponit autem iconem ex Gesneri Iconibus,
quam eandem esse plantam quam Matthiolus
exhibet nondum concedo.

C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 23. siue Alyssum dictum
tertium luteum.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi minus clypeatū
2. Klein Schild Besenfraut. Figura Thlaspi seu
Alyssi quorundam minoris malè ponitur à Tab.
pro Thlaspi clypeato minore Lobelii, quæ nobis
dicitur Lunaria biscutata minima.

Confundit Schvv. hoc Alyssum minus cum
Thlaspi angustifolio Fuchsi, quod nos Nasturtii
sylvestre esse dicimus. Alyssum Matthioli, & mi-
nimum Clusii, Steinfrant, Flore. Lusc. idem fa-
cit, at malè.

Locus & tempus.

Geneuz & Lugduni abundat floretque men-
se Maio: in Ducatu V Wirtembergico propè fon-
tem Admirabilem in monte Eichelberg flore
luteolo albescente, vbi marcescit Septembri. Mör-
belgardi copiosè in mea vinea, flore albo. Nus-
quam non crescit Viennensi agro ad auiorum,
vinetorumque margines quibus à publica via se-
parantur, quin etiam siccis & gramineis agris nō
modò Austriæ, sed etiam Morauia, & Pannonia.
Floret toto Aprili, interdum etiam Maio.

THLASPI MONTANVM LVTEVM.

Non pauca huic cum Thlaspi quarto Dodo-
næi communia, potissimum verò *folia ob-*
longa, incana, maximè infernâ parte, aspera,
ad oleæ formam nonnunquam accedentia:
radix longa, lignosa, multifida, numerosa, humi
fusos, lignosos caules profert, cinericeos, dodran-
tales & longiores: ac flores copiosi eo ordine di-
gesti quo in iam dicto Thlaspi, multo maiores &
& saturate lutei: capsella quoque non dissimiles,
stilum è capite proferentes ymbilico prominulo
semen



Thlaspi.

Locus & Tempus.

semen claudentes. In planta sicca nullus sapor insignis apparet, aliquando masticata, postea tamen habere videtur aliquam acrimoniā linguam siccans.

Lob. Icon. Pl. Thlaspi 10. siue montanum luteum.

Shyv. Thlaspi luteum repens Lobel. Thlaspi luteum supinum montanum / Flom

Friedberg Thlaspi / Arenosa prorepat loca.

Thlaspi montanum flore luteo voco herbam, quam fr. C. Bauh. scribit se inuenisse prope Basileam circa Birsfecken super rudera in monte. Hanc eandem plantam mihi misit cum flore Iulio mense ex Champignole Burgundiæ insignis Pharmacopœus Tostanus Carolus, quam curauit plantandam in horro ill. mei Principis, sed folio multo maiore ad Oleam accedente, de qua planta scribebat floribus esse Ketri siue Leucii lutei, eiusdemque odoris, florere vere. Floruit Montbelgardi toto Iunio & Iulii principio, quo tempore liquis apparuerunt.

THLASPI MONTANVM MINIMVM Mompeliensium folio laciniato.

Lignosis, albis, prolixis, multifidis radiculis emittitur, ex quarum capite surculi emergunt numerosi, interdū vix vnciales, aliastrum quatuorue vnciarum altitudine, ramoli, congesti, exiles, albi: quibus paullatim delabentibus sensim succedunt longiore intervallo distitæ filiquæ. Milii grano æquales, ex rotundo oblongæ, in duos loculos interueniente candida membranula diuise, ex pediculis longiutculis pendentes: semina minuta, rufa: folia tum ex radice statim, tum ad caulum, ramorumque diuisiones, vncialia vel semuncialia, in profundas angustissimas laciniās ad costam vsque incisa. Sapor acer.

In Bodronet iuxta Mompeliū, à Genere Cherlero collectum.

Leucium luteum montanum supinum Pona.

Plantam nobis misit diligentissimus Pona, Anno 1609. cui inscriptio Leucii lutei montani supini, ea sanè habet similitudinem quandam cum Thlaspi nostro montano, siue Thlaspi supino luteo Lobelii, folia tamen omnia rotundiora: iuuenis est planta quam misit, in qua pauci rami, vix duas vncias longi, radix crassiuscula qualis in prædicto Thlaspi, cum fibris quibusdam.

THLASPI CAPSVLIS SVBLONGIS incanum.

Ex radice satis crassa: cubitum longos ac etiam longiores, lentosque ramos, & planè li-



gnos, rubentes, erectos produci, in ramulos aliquot diuisos: folia priora longa quatuor vncias, & vnam lata, superiora Leucii lutei, incana aut in nigro virentia, subhirsuta, sapore oleraceo, subacti; flores inæquali licet pediculorum tenuissimorum ortu in umbellula dispositi, albi, quatuor fo-

Descriptio

lis cordatis constantes, itaminibus in medio luteolis: capsula succedunt sublongæ, hirsutæ.

An Matthian post com Lat. & Ital. cum magn. fig. Thlaspi tertium: Figura sola sine descriptione.

Thal. in Hærcyn. Thlaspi Matthioli tertium. Camer. ad descriptionem Thalii addit: Passim quoque nascitur apud nos hoc Thlaspi, sed videtur parum congruere cum Matthioli picturæ. Thlaspeos, quod in saxosis nasci ipsemet asserit: hoc verò nunquam eiusmodi locis inueni, sed potius circa sepes & alibi strigoso gramine obductis arcis: idem in nostra editione, ommissa Matthioli saxatilis Thlaspeos iconem, aliam substituiimus ex ipsa plantula depictam, quæ antehac nemo, ut arbitror, exhibuit, donec Matthiolum illud Thlaspi nobis quoque in præfaceret. Hæc Thalij descriptio bene conuenit cum Thlaspi nostro incano: an idem Matthioli, asserere non ausim, siquæ etiam non vndique placeat: præterea Matthiolum ponit tantum titulum Thlaspi tertij cum figura: nec video cum eius meminisse in contextu, aut dicere in saxosis nasci: de suo Thlaspi altero id dixit, quàm bene, dicitur sub historia Thlaspi cum lara siliqua: de Thlaspi saxatili Camerarij sub nomine Allinefoliæ cum Myagri capitulis.

An Camer. hort. Thlaspi 6. incanum fruticosum Franconiæ?

An Lobel. Icon. Thlaspi album supinum. Icon. Lobelij mihi videtur non vndique vera.

Lobel. Obs. & Icon. pl. Thlaspi incanum Mechliniense, finitimo Mechliniæ ruri fruticat Oleræ foliis, multisque summo diuisis hirtis ramulis, pedem & sesquipedem longis, flos albus & in pericarpis rotundiusculis summum caulem ambientibus exiguum semen minus exteris.

Clusius in Pann. & hist. post. Thlaspi incanum Machliniense, Thlaspi genus à nonnullis Machliniense cognominatum, folia habens vnciam longa, dimidiam lata (inæqualiter & inordinatè amplectentia caulem pedalem aut ampliorē,) cineracei coloris & aeris saporis: caules in ramulos diuisi, extremis albos flores proferunt, quatuor bifidis foliis constantes, in caput cōgestos & quasi umbellatim nascentes, quibus decussis, paulatim illa capita succrescunt & producuntur, vasculaque ostendunt mucronata, breuia, semen continentia: radix albicans, fibris, quibus prædita est, sub terrâ latè serpit, Dracæ instar.

Tab. 1c. & Hist. Thlaspi duodecimū, siue album
Lob. 1c. 2c.

Tab. 1c. & Hist. Thlaspi duodecimū, siue album
supinum 1. ligendi weisbaeren senff. Icon Ta-
bernæ ferè eadem quæ Lob. apud Pl. cui nomē re-
spondere non videtur: pingit enim plantam sur-
rectam non supinam. Compilerator mihi videtur
descripsisse secundum iconem.

Locus
Vicus
Schwaben-
mer.

An Schvv. Thlaspi album supinum: Tab. Thla-
spi album 1. & 2. Lob. Thlaspi album supinum,
weisser weg aut Bauren Senff / Vrazisl. weisse
weg tresse / vbi secus vias extra pagos passim pro-
venit: Aestate florescit & semen fert. Calefaciē-
tis & siccantis naturæ. Herba incensâ pestis tē-
pore aëris vitia corrigere vulgus credit. Miror
cur dicat primum & secundum Tabernæ primum
enim album, est montanum vt annotauit Clusius,
ac nos etiam obseruauimus, parua planta, non su-
pina, nec apta igni, vt est secundum: si Tabern.
eandem intellexit [quod nos suspicamur esse]
is habet iconem Lobelii mutatam nonnihil: ti-
tulus quo supinum dicit non placet, id non de-
monstrat icon. C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 9. siue al-
bum supinum Lobelii. A Fratre non scribitur an-
notum. Considerandum an eius 17. folio in-
cano, flore albo, sit idem cum nostro Thlaspi
capsulis oblongis.

Locus &
tempus

A D. Sprengero habui Heidelbergâ semen pro
Thlaspi incognito, satum Montb. in horto Ill. E.
C. primo anno floruit ac hieme petiit, quod in
cista repositum sequenti anno floruit per plures
menses, ac secundo anno durauit. Hoc idem re-
peri spontaneum iuxta Gemersheim cum flore
& siliquis Iulio, vbi in quibusdâ plantis in multos
caules, in aliis in pauciores excreuit, ad tres cu-
bitos eandem etiam reperi. Nascitur plerisque
Austriæ & Morauie locis, secus vias, & agrorum
margines, graminis que incultis locis non minùs
quam in Belgica Thlaspi genus illud, quod non-
nulli Machliniense cognominant, quia iuxta Ma-
chliniam Belgicæ celebrem urbem plurimum na-
scatur publica via quâ Antuerpiam itur.

Thlaspi arborescens folio viridi.

Spitz vbi Camera Imperialis, in horto cultiss. ra-
ris plantis D. Tegnagel Adfessoris, Thlaspi vidi-
mus anno 1595. mense Iunio arborescens, frutico-
sum, folio Linariæ, verum non acuminato, sed in
extremitate obtuso, succulento, crassiusculo, gla-
bro: sapore acri, flosculi coloris non recordamur.

THLASPI SEMPER VIRENTIS Species candida.

Descriptio



Misi mihi
insignis
Medic. Christ.
Schwarz an-
no 1591. mense
Aprili plantâ
ex horto Ill. D.
V. Virentis. cui
præest, quam
vocat speciem
Thlaspeos se-
per virentis,
quam plantam
Montbelg. Ea
erat ramosa cū
multis foliis
oblongis, inca-
nis siue candi-
dis, flores in
vimbellis albi,
siliquis paruis
subrotundis.

An Camer. hort. Thlaspi 4. semper virens bi-
florum, folio Leucoli.

Hist. Lugd. Thlaspi montanum candidum Da-
lechamp. alterum. C. Bauh. Phyt. Thlaspi 16. siue
Leucoli folio incano, quod inter fratris Lob.
Bauhini plantas tantum obseruauimus.

THLASPI FRUTICOSUM ALTERUM LOB.



Qum esse-
mus cum
Ill. nostro Prin-
cipe Duce
V. Virentis. Hei-
delbergæ anno
1595. insignis &
diligentissimus
stirpium inda-
gator & Phar-
macopæus D.
Sprengerus de-
dit nobis ramū
plantæ pro
Thlaspi fruti-
coso Lobelii
altero, palmo
longiorem, te-
nuem, cuius fo-
lia alternatim
disposita, vnciâ
breuiora, vix

Descriptio

culmum lata, in acutum desinentia, & albida siue
cinerea, in superiore caula parte ex longiusculis
pediculis alternatim capsula sublonga, in
quorum extremitate cuspis, in extremitate
flores plurimi vimbellam repræsentan-
tes: vascula similia Thlaspi quod vocamus sili-
quis sublongis incanum, similes flores, eadem
vtrorunque dispositio: folia autem diuersa.
Nos curauimus pingendum nostrum ramum iux-
ta Lobelii iconem, qui suum sic tradit: Folio est
Thymbræ hirsuto: cauliculos emittit plures pe-
dales fruticis specie, è quorum summis flores al-
bi & semina in compressis folliculis.

Clusius iam dictum vel valdè simile
sic describit: statim à radice multas emi-
tit virgas inæquales, frequentibus ramis dona-
tas: folia illius angusta, mucronata, nullo serua-
to ordine, caulem & ramos ambiunt, satis ma-
nifestæ acrimoniæ: extremi rami multos albos
flosculos in caput ferunt, quibus excussis, subse-
quuntur plantæ thecæ in spicæ speciem nascent-
es, superioribus similes, duobus vtriculis con-
stantes, in quibus semen: radix crassiuscula, du-
ra, non viuax.

Lobel. Obs. & Icon. Plantar. Thlaspi frutico-
sum alterum. Miror ita ietunè descriptum, nec
annotatum locum vbi proueniat, ego vt antè di-
ctum, Heidelbergæ accepi à D. Sprengero sic
plantæ ramulum, dicebat esse Thlaspi fruticosum
Lobelii: folia rara, angusta, vnciâ digiti breuiora,
acuta, cinerea: capsula oblonga cum cuspidē, si-
miles Thlaspi incano siliquis oblongis, flosculi
maiusculi, albi in sicca planta.

C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 27. siue Thymbræ fo-
lio fruticosum.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi fruticosum 2.
Clus. H. post. Thlaspi 5. [legendum 6.] Hispani-
cum flore albo.

THLASPI

THLASPI FRUTICOSVM FOLIO
Leucolii marini minoris.

Descriptio



Virga nu-
merosa
sparsa, crebris
Leucolii mino-
ribus foliis:
flores candidi,
copiosi, & semen
compressum
Thlaspi parui.
Radix lignosa,
fibrosa, in Bel-
gii hortis.

Lob. Obs. &
Icon. Plantar.
Thlaspi fruti-
cosi folio Leu-
coli marini.
C. Bauhinus
Phyt. Thlaspi
26. siue Leucolii
folio frutes-
cens.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi fruticosum folio
Leucolii minoris, Baum d'her Baur senff.

LEVCOIVM CVM SILIQVIS
rotundis flore luteo.

Descriptio



Plures ex ra-
dice candida,
fibrata, mediocri-
ter crassa, caules
proferre cubitum
altos, teretes,
leuiter hirsu-
tos, & in mul-
tas alas diductos:
folia semunciam
plus minus lata,
palmum longa,
subhirsuta, & no-
nihil incana: flo-
res extremis ra-
mis copiose con-
gesti haerent, par-
ui, lutei, quadri-
folii: quibus su-
perueniunt veri-
culi turgidi me-
dium dissepiente

membranula tenui, cui adherent semina, folia-
cea, orbiculata, rufa, Leucolii granis similia.

Clus. Hisp. & H. post. Eruca peregrina, Leu-
coium semine rotundo vulgo quorundam.

Lob. Obs. & Icon. plant. Patavinum Leucoium
marinum.

Tabern. Hist. & Icon. Leucoium marinum lu-
teum maius. Groß geel Nieröyeln.

Hist. Lugd. Eruca peregrina Clusii, Patavi-
num marinum Leucoium Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 7. siue maritimum
luteum, siliquis rotundis.

Gerard. Leucoium marinum latifolium Bro-
ad leaved Gilloflower.

Locus & tempus

Leucoium cum siliquis rotundis denominari
hanc plantam, quia foliis subhirsutis, albidis, &

semine compresso magis accedit ad Leucoia
quam ad Erucas, à quibus diffidet non parum.
Lugduni habebam in horto, ibi etiam curavi
depingendum. Montbelgardi in horto Ill. E.
C. latum mihi prouenit, ac primo anno floret,
hiemem perfert, nec perit postquam tulit semen
Argentini vidi virentem Octobri in horto
Friderici Meieri. Valerandus Dourez annota-
uit, Aprili mense florere & in maritimis laticis
& Illyria passim prouenire, D. Jac. Zwingerus
misit mihi anno 1595. semen cum hac inscriptio-
ne, Leucoium Patavinum Lobelii quod mihi
prouenit & repositum hiemem pertulit, floruit
Iunio, Iulio, & Augusto, quo etiam tempore se-
men maturum. Crescit quibusdam Castellis lo-
cis incultis, & secus vias, ubi Maio floret. In
Belgiam allata non nisi Iunio & Iulio.

LEVCOIVM SPINOSVM, SIVE
Thlaspi spinosum aliis.



Dodran-
tali serè Descriptio

est radice, cras-
sifuscula, con-
torta, lignosa,
fortis prope-
modum fusca,
intus buxca,
in plura capi-
ta facessente.
stolones lignosi,
crebri, dur-
rum, etiamuo-
vnciarum, aut
paullò longio-
res, fusco, aut
incano, porra-
ceae cortice
vestiti, in ra-
mos frequentes
diuisi, alii in
spinas longius-

culas, rigidas, mordaces, rectasque abeunt, positi
& forma Pimpinellae spinosae: folia per imos ra-
mos pauca, per superiores conferta, incondita,
Thlaspi montani lutei, semuncialia, atque vn-
cialia, vix culmum lata, inuicem obtusa, crassa,
incana, sapore. Brassicae acrisculi: extremis
ramulis haerent ex mediocribus pediculis, gemi-
no ordine viridantes capsula capitulis Myagri si-
miles, bifores, dissepimento membranula luci-
da in duos loculos distincta, semen continens
rufescens, rotundum, compressum, gustu acri.

Lobel. Obs. Icon. Pl. & Hist. Belg. Thlaspi fru-
ticolum spinosum Narbonense.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 28. siue spinosum.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi spinosum, Ste-
chender Thlaspi, oder Bauren freß.

In ipsis praeruptis montis Lupi saxi & cauti-
bus G. Cherlerus collegit Iulio siliquis feren-
tem: dudum habui, verum existimabam esse
Leucoium Patavinum spontaneum, consideratis
capsulis & non spinis.

Huc non male posset reponi Galastium quod
Honorius Bellus dicit spinosam, foliis esse Leu-
coli albi, floribus albis, siliquis rotundis. Verum
de ea lib. n. circa finem

LEUCOIYM LVTEVM SPINOSVM.

Descriptio



Leucoium
Lipinosum
Creticum, quo
nomine appel-
lem, inquit
Clusius, dubi-
us sum. Nata
autem est hæc
planta etiam
Iacobo Pla-
teau, semine
peregrinè acce-
pto. Illam cer-
te nascentem
non vidi, sed
iconem ipsius
manu delineat-
am ad me mi-
rebat cum bre-
ui descriptione
idem Pla-
teau. Eam vi-

delicet crescere ad cubitalem aut maiorem alti-
tudinem, & in multos ramos duos & lignosos
spargi, quos cingerent folia, confertim na-
scentia, incani & cineracei coloris, per oras
nonnihil dentata: & sparsim in ramis multos
flores nasci, flavos, quinque foliis constantes: eos
autem ramulos initio satis tenellos esse, paulo
post tamen, duos & spinosos euadere. Quale
semen eius esset, non ascribebam, sed duntaxat
sciscitabatur an Hippophastum Dioscoridis esse
posset. Sed cum Dioscorides suum Hippophas-
tum, humilem herbam esse asserat, sine caule, si-
ne flore, inanish. tantum capitulis, foliisque spinosis,
radiculas habere molles & crassas, & quibus foliis
etiam & capitulo succus exprimitur, & in usum
adferretur, non video quâ ratione hæc planta ei-
us descriptioni accommodari queat.

Quoniam porro folia, Leucoii marini foliis
non valde dissimilia habuisse videbatur, Leucoii
spinosi appellationem obtinere posse arbitror,
donec aliud magis aptum, & ipsi plantæ conue-
niens reperiat, tamen si flores eius pluribus foliis
quam Leucoiorum flores præditi sunt.

Miror apud Clusium titulo Leucoii spinosi ad-
ditum Creticum, quandoquidem in descriptione
non dicit Creticam stirpem, sed aliud ibidem
tradit Leucoium Creticum, quod non spinosum.

THLASPI FOLIO ALLIARIE.

Descriptio

Hæc folia infima lata & rotunda sunt: quæ
autem superius in caulibus quos à li-
brota, oblique acta, serpente, alba, tenui, ligno-
sa, Allii, &que obolere radice, plures emittit, ter-
res, leuës, & cubitales, altioresque, folia inferiora
sunt Alliarie similia, alia ad Napy folia quodam-
modò accedunt, oblonga, auersa parte cæsa, ad-
uersâ in luteo virefcentia, duabus pinnulis sub-
rotundis caulem amplectentia, sapore oleraceo,
nonnihil ad Cepas quoque accedente, & quorum
alis rami enascuntur, sim. liter foliati: flores Na-
sturtii aquatici, albi, quadrifolii: siliqua vno lo-
culo donata, subrotunda, nulli fissura, semen con-
tinent singule singulum, flatum.

Lobel. icon. Plant. Camer. hort. Thlaspi Pan-
nonicum. Clus. Pann. & Hist. post. Thlaspi 1. mon-

nam peltatum. Icon non adeo feliciter in Bel-
gica expressa ut necesse erat. C. Bauhin. Phyc-
Thlaspi 4. siue Glastifolio.

Thlaspi Pannonicum primo vidi Argentorati

apud D. Fridericum Meyer, deinde Stut-
gardia in hor-
to Ducis vnde
attuli plantan-
dum in Hortu
Ill. E. C. ubi fel-
liciter hincem
pertulit & flo-
ruit tota æsta-
te, ac deinceps
se propagat, fo-
lia inferiora si-
milia sunt Al-
liaræ. Inue-
nitur vmbrosis
locis ad arcem
Stichenstain, &
quâ iter est ex
ea arce ad Sne-
berg, nusquam
alibi Clus. ob-



seruatum: nunc verò eius operâ, missis Viennâ
eius Plantis, & semine ad amicos, Belgicis & An-
glicis hortis inquilinum factum. Floret iunio,
semen iulio & Augusto ad maturitatē peruenit.

SCORODOTHLASPI VLYSSIS
Aldroandi.

Scito, her-
scle, nomine
Scorodotyla-
spi plantâ hanc
vocauit Cl. V-
lysses Aldroan-
dus rerum Na-
turæ sagacissi-
mus veltigator,
& apud Bono-
nienses Phyl-
eus celeberrim-
us: Hic illu-
striss. Principē
D. D. Fridericu-
Ducem VVir-
temb. & Tec-
censem, Comi-
tem Montbelg.
&c. Dominum
meum Clemē-
tiss. cum Italia

illas oras lustraret, multis pereleg. in tribus semini-
bus exoticarum plantarum donauit, inter quæ &
hoc fuit, quod sequenti anno in horro Montbel-
gardeni dicti mei Principis consecum in talem
excreuit plantam, qualem modo describam.

Radice nixitur singulari, albâ, paucis fibris do-
nata: ea veluti in capita diuiscata, numeroso
siliqua stipatu longis pediculis prædita, quæ ex
principio angusto sensim ouatam figuram acqui-
runt, & subrotundo ambitu finiuntur, quorum
priora foliis Bellidis quodammodò respondent,
quædam leuiter laciniata, quædam paucis den-
ticularis, alia ferè nullis donata. Color virens est,
pluseulis ex costa nigris excurrentibus. At quæ
altero

no positi cauliculis herent folia, præsertim superius, minimis seu alis caules amplectuntur. Cauliculorum fastigio sessilibus insident albi, parui, Bursa pastoris vulgaris, quatuor foliolis constantes, cum apice in medio, quos bursa sequuntur oblique, subrotunda, cordata, non multum compressa, ad Thlaspeos cordati burfulas accedentes. Tota cæterum planta Allium redoler manifeste odoratu, ac etiam non tacta. Radicula & folia oleraceo gustu prædita sunt, grato, & vel tantillum acridinis sapida in faucibus relinquent, non sine halitu Alliarum, unde a pronome insignita ab excellentissimo Aldroando, cui viro hoc nomen obseruantia ac memoriam *hermionis* lubentes reliquimus, eiusdemque vestigia historiae nostræ, cum alibi sæpe, ex merito tanti viri imprimere voluimus. Noua est hæc plantula, nec a quoquam, quantum nobis quidem constat, hætenus prodita. Vnde nec aliis celebrata nomen, usquam iam prælibato.

Montbelgardi in horto Ill. C. Wirt. quem excolimus fata produxit flores & siliquas luto.

Locus & tempus.

THLASPI ALEXANDRINUM Cortusi Joh. Bauhino.

Descriptio



Miste ad me aliquando Cl. V. Dn. Cortusus plantam hoc titulo, *Thlaspi alexandrino*, *bella planta*. Est autem herba dodrantalis, ex radice singulari quaternos caules emittens, teretes, glabros, multis alis cæcauos: ad quorum diuaticationes propagationisque, superiore præsertim parte, singula v-

lut Perfoliata, ramos amplectuntur, subrotunda: ramorum extremis longa serie utrinque ex brevibus pediculis appenduntur siliquæ circinatae, quales ferè Thlaspios tenuifolii Fuchsi, maiores, in mucronem leuiter obtusum desinentes, quas secundum longitudinem percurrit costa, à qua utrinque valuula biparentis siliquæ dehiscences abscedunt, dissipatione medio relicto, inque singulis valulis singula semina compressa, ruffa, ex latiore basi in acutum desinente, videtur habere aliquid commune cum Thlaspi Hederaceo Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Tlaspi n. Alexandrinum Cortusi. Io. Bauhin.

THLASPI HEDERACEVM.

Descriptio

IN Portlandiæ peninsula, Cornubiæ vicino Iportu Plummoune / aliisque maritimis Angliæ caucibus, repens herbula, dodrantalibus & spiritibus gracilibus cauleculis, strigis, puni-



caucibus: folia sinuatis, hederaceis, capnolis. Flosculi candidi & semen exile, in quibus gustu & habitu Thlaspi expriment.

Lobel. Obs. & Icon. Plant. Hederaceum Thlaspi.

Cap. Bauh. Phyt. Thlaspi n. siue repens Hederæ, quod nondum videre licuit.

ALISSVM VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. V.

Varia est apud auctores Alyssi historia. Et quidem ex Dioscoridis sententia *ἀλυσσός* frutex parvus [*σπυρίων*]. Ruellius addit vnicaulis] est, subasper, folia habens rotunda, circa quæ fructus, duplicis scuti figura, in quibus semen est aliquantulum latum. Nasceitur in montanis & asperis locis.

Locus

Hoc, ut opinor, ab Alyssio Plinii discrepat, is namque videtur Rubiam minorem Alyssum facere, cum enim de Erythrodano, seu Rubia maiore, dixisset, subiungit. Distat ab eo, qui Alysson vocatur, foliis tantum, & ramis minoribus.

Aliud insuper & Aetius describit his verbis. Alysson aiunt esse Sideritum heracleam appellatam, quæ iuxta vias nascitur vbique, purpureum florem habens, & folia crassiora. Aetij opinio nem tueretur etiam Paulus. Cornarius autem diuersas herbas rectè statuit Sideritum heracleam, & hanc quæ propriè Alysson vocatur: quum illa improprie, & tamen ab affectu, idem nomen adeptæ sit.

Galenus quoque de diuerso ab his Alyssis ex Asclepiadis auctoritate loquitur. Alyssos, inquit, herba est Marrubio similis, sed asperior & magis spinosa (aculeata), circa pilulas (orbiculos) florem ad cæruleum vergentem profert.

Cæterum, *ἀλυσσός* Græcis, similiter Alyssum Latinis dicitur, quod mortos à cane rabido mirifice iuuat, autoribus Galeno, Aetio, Paulo, Plinio & Pausania.

Alyssi decoctum, inquit Dioscorides, porum singulus qui sine febre sunt soluit. Idem facit & detentum, aut naribus admodum, At cum mele tritum, lentigines & maculas Solares depurgat. Putatur & canis rabiem sanare, cum cibo contusum & exhibitum [*ἀλυσσός* *καὶ* *κυνὸς* *ῥαβίης* *ἰατρικόν*]. Lat. ex ver. cod. *ἀλυσσός* *καὶ* *κυνὸς* *ῥαβίης* *ἰατρικόν*, commorosos à rabidis sanat contusum & in cibo datum. Sed & id domo suspensum salutare esse dicitur, cum hominibus tum aliis animalibus, ne fascino laedantur. Quin & puniceo paniculo alligatum, pecorum morbos abigit.

Quod verò de singulis illis, idem Plutarchus

Scriptis, τὸν δὲ λαὸν κατακτείναντες συνέβη ἐν ἀκρότι
οἱ τὴν χεῖρα πέμψαι, οἱ δὲ ἐν ἀποστάσει, ἀνὰ τὴν
πέμψαντες αὐτοὺς: Id est, Alyssum herbam manu re-
nentes solum, alii vero intuentes, singulis libe-
ratur.

Galenus dilucidius eius facultates declarat. Murficæ iuvat morbos à cane rabido. Sed & iam rabienti data sæpè ipsam sanavit. Ex hæc quidem facultas ex similitudine totius nature constat, experimentoque solo cognoscitur, nec ratione percipitur. Alioqui ex viu comperitur moderate liccare ac discutere, & aliquantulum extergere. Hac ratione & vitiliginem & maculas faciei à Sole prognatas expurgat.

A cane commorlos, Plinio etiam teste, rabie sentire non patitur, potus adalligaturque. Mirum est quod additur, sanicem conspecto omnino frutice liccari. Infantiā sanari ex veteri codice Corn. legit, qui tamen non infantiā, sed singultum legendum ex Plutarcho putat. Ex Galeno, inquit is, & Plinio clarè patet, commorlos à Cane rabioso fruticem siue herbam Alysson auxiliari: Verùm Dioscor. verba ita iacent, ut ipsius canis rabiem sanare dicere videatur: *Αντι τῆς ῥαβίας τοῦ κυνός, τὸ ἀλυσσόν ἐστι βοτανή*: nisi *αὐτὸς ὁ κύνος* eam rabiem quæ ex Cane homini inducta sit accipere velimus.

ALYSSON SILIQA LATA ASPERA
quibusdam Lunaria flore luteo.



A Lyſſon
Dioſco-
ridis purata
herba, radice
ſimplice & li-
gnola, candi-
cantique niti-
tur, ſapore præ-
dita feruor:
ex qua plures
eriguntur can-
tes, recti, rigi-
di, incanâ la-
nugine hirti,
qui cis ſaſtigiũ
in ramos ali-
quos abeunt,
in quibus ſi-
res numeroſi,
parui, melini,
Eryſini flori-
bus magnitu-

dine & formâ similes, ex quatuor foliolis contex-
ti: quibus delapsis *siliqua* oriuntur ex oblongo
rotundatæ, villo aspero rectæ, compressæ, *semen*
claudentes similiter compressum: *sula* germi-
natione prima ex oblongo rotunda, postmodum
in longum protrahitur, in obtusum mucronem
desinit, nonnihil sinuata, Leucii foliis similia,
albicantha, hirsuta & tactu aspera, sapore clera-
ceo prædita.

Dodon. Gall. Alysson Neotericorum, quorundam Lunaria maior.

Cesner. hort. Alyssus Dioscoridis Dodonæ :
Lunariæ maioris species aliquorum. Lunariæ
Græcæ similes producens filiquas herbe Alyss
cognata. • Et de coll. stirp. Lunariæ species. Lu-
naria lutea. Alyssos quorundam. Lunaria à
Gastarcho missa. Item de Lunariis. Ab Vlyf-
se Aldroando herba missa, Lunaria appellata. A

Lythraeae

Lobel. & Pen. in Ad. Alysson, & nonnullorum
Lunaria appellant, & dicunt nullā melius A-
lyssio Dioscoridis quadrare. Idem cap. de Thla-
spi Narbonensi, Alysson Belgicum & Francorū
vocant. Lobel. Ob. & Leon. Plin. Alysson Dio-
scoridis puratum.

Cesalp. Lularia testis Alysson Dioscor.

Hist. Lugd. Alyssum Dodonzi, Recentiorum
quorundam Lunaria maior. Alyssum Dalecham-
pii.

Casp. Bauh. Phyt. Lunaria 4. f. *lunata* Ag. *lunata* Ag.
Lunaria, Dioscoridis.

Hort. Lusit. *Abyssum Dodonæi*, *Lunaria lutea*
sive *Græca*.

Alysson filiqua lata, aspera. Lugduni mihi e-
rar in horto. Basileæ in hortis filiquas fert Iunio
mense, Septembri semine maturo: mihi etiam. Locus
obseruata est in hortis Parauii Bernardi Trincel- Tempu-
ni: Ferrariæ Monasterii S. Dominici & Regii.
Bononiæ vt S. Saluator al burgo di S. Catharina
Florentiæ: & Parmæ Nobilis Ant. Lallæ Ro-
rens April. Montbelgard. in horto I. E. C. huc-
mem perfert, semenque abundat Augusto & Se-
ptembri, florens adhuc Octobri.

ALYSSON ANGVILLARAE.



Hoc nomi-
ne inter *Dactylipos*
Valeradi Dou-
rez plantas her-
bam ibuenio
fruticofam, ra-
mis, duris, li-
gnofis, tereti-
bus, hirsutis: fu-
lis familia Thla-
spi minori, vel
Alyflo minori
querundam, la-
tiora, afperiora
hirsuta, subro-
tunda, in obtu-
fum acumen de-
finita, fit: qua
eà sunt difpofitae
ferie qua in iam
dicto Thlafpi,
hirsutis pedi-

cellis haerentes, compressae, circinatae, retundatis, in umbonem modicè protuberantes, triplo maiores quàm Thlaspi modò dicti, multo majores, stilum exiguum è summo profertur, membranulà lucidà valvulas discriminante. *Semen* quale sit, nequeo animadvertere: nec quales fuerint *fructus* ausim, licèt adhuc videri edisse, asserere: videntur tamen lyrei vel pallidi fuisse.

Marthin post. com. Ital. pingit hoc *Alyssum*
ex sicca procul dubio planta, ac ait. Cum sciam
multos bonos Simplicistas plantarū, cuius figu-
rā apponimus, verum *Alyssum* existimare, appo-
nere volui: quamvis non respondeant omnes hōr-

An Lobel. & Penz. Adul. & Icon. Mant. Thlaspi Græcum propinquius fortè Dioscoridis Polygonati (Poligoni) folio aut Olæ, Læuris semines

Considerandum sanè quantum differat hoc
Thlaspi ab Alyssis, de quo Anguillara epist.
11. pag. 117. An Calalp. Thlaspi quoddam genus
in monte S. Iuliani in Pisano, floribus luteis: fru-
ctulato ac nullo depresso, multis specie duorum
nummorum.

C. 2. m.

An C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 21. siue Alysson dictum primum. Matthioli Alysson Icon. p. 498. Thlaspi Græcum propinquius Diosc. Polygonati folio aut Oleæ, lentis semine Lob. icon. p. 213. flosculis albis interdum luteis? Apud Lob. in Adu. & Pl. Icon. legendum Polygoni folio & Typographi errore positum esse Polygonati satis apparet, quæ obsecro similitudo Polygonati cum olea? in descriptione præterea dicuntur folia pusilla, glauca, albidula, Leucoii lutei, sed multo minora: quæ sanè nihil commune habent cum Polygonato: Miror hoc non correctum. Quisnam scripsit de duplici colore florum?

LVNARIA BISCUTATA.

Descriptio



Biscutata Lunaria, haec exiles, pedales, & cubitales, tenues, teretes, in alas aliquot diuisos, paucis foliis donatos: ea enim magna ex parte itacim ex radice medio-criter crassa (Bursæ aut Maluæ Lob.) exorta per terram sparguntur, palmum longa, & breviora, paulo semuncia la-

tiora, sinuata, aspera, hirsuta, ciliata (Lobelio alb. nt. Hieracii aut Leucoii sed minora:) alarum extremis flores coarctati tenuissimis hærent pediculis, luteoli, parui: atque hos sequuntur pericarpia pulcherrima, foliacea, peltata (semine pellucida Lob.) didyma, ad ligulam extra scutulam quoque prominulam adnexa, quorum singulis singula clauduntur semina latiuscula, orbiculata, compressa, rufa (Leucoii purpurei & albi sapore & effigie potius quam Nasturtii Lob. l.)

Et hæc est illa, quam Lobel. & Pena Ada. Thlaspi paruum Hieracifolium, siue Lunariam luteam Monspel. & Leucoium luteum marinum (Biscutellam, addit Lobel. in Icon. Pl.) Lunariam minorem alteram vocitant. Huic nullus locus ceterior quam inter Thlaspi omnium iudicio putatur. Hæc primum culta in hortis Italicis vocabatur Leucoium marinum non ita magna similitudine.

Clus. Pann. & Hist. post. Thlaspi clypeatum Thal. Leucoium montanum.

Camer. hort. Thlaspi bifidum, vel Lunaria bifidula à Clusio & Lobelio depicta. Crescens copiose prope Capuam, foliis aliquantulum diuersis, ferè Napi vel Rapistræ, altitudine setiquipedis non multo minor.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi minus clypeatum n. Hein & Schild Thlaspi.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 24. siue biseutatum maius folio crasso hirsutissimo.

Lunariam biseutatam seu Didymi, vt nomina-

bat Gesnerus, obseruauimus Monspelii cum essemus secus viam quæ itur Frontignanum & ad montem prope Castellum non longe à fluuiio: hanc eandem prius videramus in peregrinatione nostra Rhætica cum Gesnero in monte Burmio vicino, cum semine maturo Iunio mense. Genæ sata in horto nostro primo pullum caulem protulit, tota hyeme integris foliis abundauit & sequenti anno maio Maio mense floruit. Frater C. Bauhinus Monspelii florentem etiam Maio & Iunio obseruauit. Montbelgardi in hor. Ill. E. C. Wirt. eodem anno quo sata, floruit & semen maturuit Augusto & Septembri, hiemem pertulit: semen fuit missum per fr. C. Bauhinum cum hac inscriptione. Thlaspi species Bononiæ. Basileæ vidi florentem cum semine maturo Augusto in horto D. Dis. Jac. Zvvingeri. In pratis Monspelienibus hæc Thlaspi collegit Lobel. & minorem Lunariam alteram vocitabat. Hæc primum culta in hortis Italicis & peregrina creditur. Supra Badenses thermas, vicinisque collibus, adeoque tota illi collium catena, quæ per Leyenberg & supra Manderstorf ad Danubium usque versus Orientem excurrit, copiose auctore Clusio nascitur.

Cum Leucoio, purpureo præsertim & albo, in foliis & viribus nonnulla hæc communia Lob.

LVNARIA PELTATA MINIMA quibusdam ad Thlaspi referenda.



Inter Valerandi Dou-
rez plantas si-
ne nomine
plantulam pul-
chram reperti-
mus quam &
etiam Genet
Cherlerus at-
tulit collectâ
in Nemausen-
si agro: Ea pal-
mo brevior
placula, radice
simplice, li-
gnosa, vnde
plures pullula
cultenti, simpli-
ces alias, alias
etiam alis con-
caui, in terram
repandi, te-
nues, asperi, ex rubore obscuro incani: per quos
foliola alternata, aspera, & inferiore præsertim
parte incana, Thlaspi minoris foliis similia,
sed multis numeris minora: si scilicet luteoli sum-
mis hærent coliculis & ramulis, quos denso
agmine stipati consequuntur orbiculi foliacei,
glabri, maiores quam Thlaspi dicto: sub quo-
rum umbone minimum elato semen coarctetur
singulare, minutum, rufum.

Thlaspi alterum minus Clypeatum Serpilli folio Narbonense; nuspiam Lobel. & Penz. vi-
sum, nisi in agro Narbonensi Monspelienisque,
locis squallidis, sabulosis, prope pusillas An-
chusas.

Casp. Bauhin. Phyt. Thlaspi 25. siue Clypeatum minus.

K k k k

Locus & tempus


Descriptio

BURSA PASTORIA.

CAP. VI.

Bursa pastoris nonnunquam palmaris, pedalis, & cubitalis interdum planta, radice nititur recta, alba, fibrosa, sapore subdulci & nauseoso: a qua prodeunt folia oblonga, modò integra, alias profundè in ambitu laciniata, nonnihil hirsuta, pediculis fere vncialibus, cum superiora in caulibus nec pediculum quidem habeant, immediatè auterentia, inter folia exurgit caulis vnus, terni, quaterni, qui rursus in ramulos diuiduntur, qui à medio fere ad iurumum vsque fastigium

stipulos nullo ordine emittunt, pedicello tenui semunciali, paruos, albos, ex quatuor foliolis constantes, & in medio flammulae aliquot lutea habentes, interdum corymbatim in summo caule quasi umbellam conficiunt: quibus succedunt seminum receptacula ex acuto principio in laniatam bifidam crumenulam



Descript

geminata, semina Brunfelsio parua & nigra. Hac magnitudine & foliorum diuisione mire ludunt, ut quis diuersas possit suspicari species.

Guido ait. Guido nimis licentiosè Galeni locum interpretans ait Polygonum esse virgam vel Bursam p. floris: Polygonum & Bursa pastoria multum differunt.

Euchar. Rastl. Bursa pastoris & Pera pastoris.

Brunfels. Bursa & Pera pastoris maior, cui descriptiones Dioscor. de Polygonia & Sanguinali minime quadrant.

Cord. in Dioscor. Bursa pastoris, **Hein. Dase.** scheltraut; id est, Bursa pastoris minor.

Trag. Bursa pastoris, Bursa pastoris maior & vulgarissima.

Cornar. in Diosc. credit Bursam Pastoris vulgi Medicorum esse Herbam Medicam. Sed Descriptio Medicæ Cornarii non conuenit cū bursa pastoris vulgi Medicorum, suspicio mihi aliqua oritur de Crista gallinacea, vel Cornarium nescire quid scribat, stirpium enim non fuisse peritum suis ex libris satis apparet: vulgi autem bursa pastoris vel Christa gallinacea nullo modo conuenit cum descriptione Medicæ.

Marthiolus qui sine descriptione pingit, ait non defuisse qui Thlaspi & Bursam Pastoris vulgè dictam, vnā & eandem esse plantam existimant. Sed eorum sententiam prorsus explodendam merito censet. Licet enim figurā similis esse concedatur, attamen quod Lacuna monet, viribus & temperamento multum differt.

Catalp. qui Bursam pastoris vulgi inscribit foliis Erucæ, semine exiguo & flauo, sapore suba-

cri: at totā herbā insipido & glutinoso, ait apud Antiquos inter Thlaspi genera numerari. Id autem Thlaspi descriptionem Dioscoridis partim ostendere: nam folia in cacumine diuisa, & fructus in extremo latos huic plantæ magis conuenire. Ex Galeni historia colligere licere Bursam pastoris esse Thlaspi deterius. Ac Bursam nostram pastoris Capsellam dici inter cetera nomina Dioscoridi ascripta.

Fuch. Hist. & Icon. Dodon. gall. & lat. in fol. bursa pastoria. **Gerard. hort.** bursa pastoria maior & minor bursa pastoris, Thlaspi satium. **Lobel. Obs. & Icon. Plant.** bursa pastoria. **Corn. hort.** bursa pastoris eleganti folio instar Cornopi repentis. **Eidem in Marthiol. hist. Germ.** & **Epit. v. & H. Lugd.** bursa pastoris. **Tab. Icon.** & **Hist.** bursa pastoria maior. Item bursa pastoria minor.

C. Bauhin. Phyt. bursa pastoris prima minor folio sinuato. Secunda bursa maior folio non sinuato, bursa pastoris folio integro. De qua ait: Naturæ lusum tantum existimabamus, verum cum aliquot annis idē obseruauerimus, & priori distinguendam censemus. Tertia bursa pastoris media, **Tabern.** bursa pastoris minor.

Schvv. Cat. Sil. bursa pastoris maior, **Siles.** scheltraut / Dasehenfraut / Blumtraut.

Bursa pastoris, vulgè **Officin. & It.** Bursa pastoris, aliquibus *Pera pastoria*, & *Pera pastoria*, nonnullis *Herba cancri*, *Cristula*, *Sanguinaria* & *Sanguinalis* dicitur, nec iniuriā, [ut videtur **Targ.**] cum sanguinis eruptiones sistere possit. Videtur tamen ipsi non Sanguinalis sed Sanguinalis esse legendum quod si firmum esset, cōtē hac planta non procul à Verbena prima Dioscor. distaret. Nihil tamen affirmat. Inuenimus hoc manuscriptum per **Leodigarium Ruzianum** Bursam pastoris esse Io. Frisio in **Dictionario Lonicitum** alteram Plinii, **Germ.** **Sedeltraut** / **Le. scheltraut** / **Blumtraut** / & **birtenfeld** selg. **Dorsetens** cruys. **Gall.** *Bourse de pasteur* ou *Borger* & *Tab. uret.* **Genevens.** *l'herbe de l'espingle*. **Castil.** *Pany quefillo*. **Hung.** *Pastor de Zary*. **Pol.** *Podostfa*.

Bursam pastoriā vidi florentem Martio, **Vat.** **taui** Februario. **Genev.** passim Ianuario, Martio, Maio, Nouembri. **salut.** florentem adhuc Octobri, **Lugduni** abundat. **Montbelgard** floret Martio, ac interdum tota hieme etiam in horto **Il. E. C.** spontanea, ad hortum ferarum vidi florentem Aprilis, folio non sinuato, an perpetuo talis nondum obseruavi. In **Ducatu VVirtembergico** circa fontem Admirabilem florens Augusto, In monte **Teck** Octobri. Secus vias locis desertis & incultis, ac in rudibus ut plurimum spontè prouenit: & quandoque maior, lubide verò minor, & omnino exigua. Floret, viget, ac semen perficit totā æstate.

Vires huius non vulgares celebrantur, ex aceto enim, id scribente **Fuchio**, trix collectio- num inflammationes refrigerat, ac ed confu- tes humores cohibet: imponitur sacris ignibus & quibus stomachus astuat. Succus eius pulu- entis auribus infunditur: cruenta sanæ, velox, mirè efficax est in comprimendis omnibus san- guinis eruptionibus. Bursa pastoris siccata, ait **Tragus**, vino rubro vel aqua pluviali, in qua cha- lybs cadēs extinctus fuerit, decocta, ac pota, dys- tericis ac lientericis, fluxiones alui cohibet, vni- sanguinolentæ medetur, sanguinis excreationes, mensiumque abundantiam producit sistit, omni-

Thlaspi

Nomin

Locus & tempus

Vires

Vires

omneque internorum viscerum qualis erosiones sanat: eadem aqua destillata per aliquot dies continuos mensurâ quatuor aut quinque cochlearum pota efficit. Erchinon ex lineo panno factum, succoque herbar. nadesactum ac naribus inditum, sanguinem sistit: idem succus, vel aqua etiam destillata, vulneribus recentibus colluendis, vtilissima sunt: Multi in ea sunt sententia, ut credant, sanguinem e naribus aliisue vulneribus manantem cohiberi, si herba saltem, apud eum hominem incaluerit.

Bursa pastoris, autore Marthiolo, ex refrigerantium est, exsiccantium & adstringentium genere. Quapropter prodest trita & emplatri modo imposita inflammationibus & sacris ignibus, decoquitur pluviali aqua: cum Plantagine & Armenio luto, bilisiturque eius decoctum ad intestinorum difficultatem, & ad cruentas excretaiones. Sistit mentium abundantiam, licetius & Peristertia decocto infideant mulieres: esturque ad idem, & contra denique omnes fluxiones efficax est, tenui pulicula circumlita & in oleo fixa: additur in impiastris, quæ ad capitis vulnera componuntur, & in vnguentis copiosius: ad gonorrhæam accipitur vicia una succo recentis herba expressi, cuius licopia non decur, duplum iuris decoctæ sicce herbar, additis camphoræ granis tribus, bibiturque diebus aliquot continuis. Succus cum Aëzoi succo aut aëro mistus partium calidas collectiones, & sacrosignes extinguit. Sunt qui scribant Bursam pastoria. Icterus profligare, si simul folia, flores, & Theca ciliatis indantur; ut nudum pedem contingat, coque modo deinde abuletur: decoctum in colitione omnes sanat faucium tumores. Succus vultu podagra calidæ puerendorumque feruidis tumores illinitur. Celebris ad sanguinem sistendum & fluxiones repellendas, succo poro in sputo sanguinis & dysenteria, trahitur & super varos ad sanguinem inde fluentem. Cæsalp. Herbam ex aceto tenui & carpo adhibet ut fluxum sanguinis sistat, & rigorem tertianæ compescat. Bursam pastoria frigidam & siccam in tertio gradu censet Lacuna, ac idem restringere omnem partem, & seprimere omnis generis fluores.

Lacuna bellum mouet Lob. eumque cum pluribus aliis taxat, dicens: Gustu non perinde ut Thlaspi, sed exiccante potius quam refrigerante. Nam qui quia sanguinem sistat (sistit autem strenuè) frigidam faciunt, intelici argumento vtuntur, etenim umbellæ, floresque gustanti aliquid acrimoniæ inurunt, indicioque sunt liccando colligendoque sistere, ut porri succus, vittriosum, vitrica: non refrigerando: trita carpis imponitur, addita Plantagine, ad tertianas spurias, purgato prius corpore. Ad hæmorrhagiam sanguinis ex quacunque parte fluat Bursam pastoria contusam, cum aqua frigida applicat Timot. Ross. parti vnde fluit, & subito cessat. Si e naribus fluit aut ex alio capitis loco, apponit capitis pulsibus, subitoque suppressit. Aquam destillatam Bursæ pastoria aut decoctum eius menstruos fluores & dysenterias rubras potam compescere scribit Brunfels. Sic & pessum ex corone factum & lusco eius inunctum naribus inditum sanguinem inde fluentem sistere. Herbam gestatam cum naturali calore reposita fuerit, idem quoque facere perhibet, quod difficulter credimus, & quia res herbaria certe inuenta est, id aliorum observationibus iudiciis & experientia conferenda relinquimus.

Tom. II.

BURSA PASTORIS PARVA
folio glabro, spisso,



Bursa i-
sta parva *Descriptio*
est, radice vni-
câ, sed in te-
nuiores sub-
dipisa: folium
primum sim-
plex, rotundum,
paruum, alia
Bursæ maioris
more aliqua-
tenus lacinia-
ta, crassa, gla-
bra, vix sexra-
talia: cauliculi
singuli vel
plures, dodra-
tales, ac etiam
minores: si fi-
culi multi si-
mul, albi: fili-
que rotundior

res quam in vulgari. In foliis nullum manife-
stum saporem animaduerto, in summitatibus in-
gratus est.

Plat. Icon. Pastoria bursa minima.

Tabern. Icon. & Hist. Natur. iun. petræum. C. 8. 11.

C. Bauh. Phyt. Bursa pastoria 4. huc minor: Bur-
sa pastoria 5. Tragi sine icone. huc autem Bur-
sa pastoria cum non sint vascula, ut vult Tragus,
acinis peponum similia, merito existimo Tra-
gi Pastoriam bursam 6. huc non referendam;
sed ad sequentem.

Itinere Masnister, Than, & Frausmatten in-
ueni in mensis Aprilis sine Bursam pastoria hanc;
antehac non visam; reperi quoque in muris qui-
busdam inter Remiremont oppidum Lotharingæ
& Plunarias Therinas, parvam, angulari
caule. Nobis etiam data licca Argentina D.
Vldarico Chelio Medico insigni. Basileæ ad
margines aruorum vtrunque raro, præsertim
extra syluam propè Wyl pagum obseruauit Ge-
ner Chetlerus.

*Idem &
tempus*

BURSA PASTORIA MINIMA,
oblongis siliquis, verna, loculo, oblongo.



Bursa hæc *Descriptio*
minima,
radice est te-
nuissima & rã-
dem fibrosa: à
qua per terra
sparguntur so-
la multa in
circulum o-
blonga & an-
gusta, & mu-
cronata, vix
vinciam longi
interdum ru-
bentia, hirsu-
ta, vitæria mō-
dō, modō rubē-
tia, oris per ex-
tremū aliquot
erenis inci-
sis, sapore pri-
Kkkk 2

mum subalutante, tandem acri, nitroso & vellicante interque *caulis* nunc vnus, alias bini, terni & plures teretes, palparei, aliquando vix sextantales, *flosculi* sustinent singul multos albos, aliquando purpurascens Bursa pastoris vulgaris maiores, quatuor foliis bifidis constantes, ex pediculis plusquam vncialibus: *loculo* oblongo compresso nulla lacuna ut in Bursa vulgari, nulloque dissepimento intrinsecus distincto: *semen* continente minutum, rotundum: Semine maturo & decedente remanet tenuis membranula alba, qualis in Lunaria maiore.

Hanc describens Tragus, *Bursam* pastoriam s. & postremam fecit, quam fr. C. Bauhinus in Phyt. ad precedentem refert contra meam sententiam ut iam ante annotatum.

Brünfels. *picturem* exhibuit nomine *Gengsbium* / quæ melius placer quam Lobelii. Huic autem in Aduers. & Obs. & Leon. Plant. Paronychia Alfine folia.

Dodon. Lat. in fol. Paronychia vulgaris titulo depingit & describit, ac dicit: Veram & legitimam hanc esse non constat, ut enim Dioscor. *περυνία* s. *βουκρινία* videretur, id est, Paronychia fruticulus est similis Pepto, longitudine minor, foliis vero maior. At vulgaris Paronychia nec fruticis in modum veluti Peplus assurgit, nec maiora ei, sed minora quam Pepto sunt foliola.

Tabern. Icon. & Hist. Alfine minima.

Camer. qui ad hist. Thalii Pilosellam siliquo- sam minimam omnium vocat, inter figuras iconem sub Pilosella siliquata ponit pictam ad meam placam, quam cum descriptione Gelneco miseram.

Hist. Lugd. Myosotis paruum Dalechampii inscribit.

C. Bauhin. Phyt. Bursa pastoris s. siue oblongo loculo minor dicitur. Hæc, inquit, non solum magnitudine & paruitate variat, liquidem etiam minima vnciam & selquiunciam longa reperitur: verum & foliorum formam discrepat: habetur namque foliis integris, ut Lobelius. Dodonæus, Lugdun pag. 124. lib. II. cap. 3. & Tabern. Icon. pag. 798. pingunt: datur & latioribus laciniatisque foliis quemadmodum Lugd. pag. 128. lib. II. cap. 4. nomine Myosotidis parua expropiat. Similem posteriori ex monte Sfrigel quæ itur in Italiam habemus, quæ tamen non solum folia in orbem humi strata habet, sed paulo altius quina tenaciter obtinet lata laciniata, & in cauliculi summo vnicum quod in summitate tripartitur, capsulam quin etiam obtinet priore duplo maiorem, eamque non oblongam, sed subrotundam.

Schv. Bursa pastoris minima, Silesia *hungerblumlin* (flos famelicus) dicta. Credere enim vulgus ait eius vberem prouentum annonæ caritatem denotare.

Locus & Tempus

Geneux *en plain palau*, floret principio Martii & Aprilis, passim secus vias & in segetibus. Montbelgardi florens Martio in muris in Horto E. C. Montpelii florebat Vere. Prope Besfordiam medio Aprilis inueni cum membranulis tenuibus remanentibus a semine deciduo. Frater Basileæ obseruauit. In Silesia [inquit Schvæck.] Aprilis floret in multam ætatem, lætescente interim semine. Atenosis agris & hortis plurimis.

BYRSA PASTORIA FOLMS Perfoliate.

Bursam pastoriæ Perfoliatæ folio, voco pulchram herbulam, cui *radix* tenuis, supra vni-

ca, mox fibrosa, aliquot coliculos palmatos & breuiore interdum vnicum emittens: colore ex fusco leuiter rubente & virente, veluti glauco lenes, teretes, ex foliorum alis ramulos nonnunquam producentes: *folia* superiora alternatim caule siue pediculis amplexantur, alis eorum serè concurrentibus, ut a caule porfora: quodammodo videantur, vnciali longitudine, diu diu angustata, deniuecula, glabra, glauca ut Perfoliatæ: *stipuli* politu florum Bursa vulgaris, parualibi, quatuor foliis constantes inuolucro totidem foliorum in fusco viridum circundati, ex pediculis tenuissimis seminecialibus, in medio *stamina* crocea: decedentibus floribus, imò antequam in etiam in totum decidant, subnascuntur *siliquæ* parue Bursa pastoris, formæ cordatæ, veluti intracta, ut in Thlaspi, *seminibus* continent parua compressa, rotunda, subrotunda: Sapor plantæ subacris.

Camer. in fine hort. ex plantis meis *locis* sub titulo Pilosellæ figuram habet.

Hist. Lugd. sub Thlaspi primo genere à Dalechamp. obseruato.

Tabern. duas figuras habet ram in Icon. quam

Hist. Ac prima Thlaspi oleraceum Baurensensiss. inscribit: altera Thlaspi minimi Clusii, *Heinss* Thlaspi.

Clusii Pann. & Hist. post Thlaspi pumilum Thlaspi 3. Thlaspi montanum minus, seminibus acris saporis. Fortè eadem cum nostra, sed minor ratione loci ubi prouenit.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi s. siue Perfoliatæ siue Brassicæ capistris folio, maior

Schv. Bursam pastoriæ maiorem appellat. Bursam pastoriæ folio Perfoliatæ inueni in Burgundia iuxta Oppidum Insulam in viribus ad dextram quæ itur ad Tres Reges, florebat April. Hanc Montpelii vidi, ubi florebat & capsulas ferebat mense Martio. Montbelgardi in Horto H. E. C. copiose sponte prouenit: & florebat Martio & Aprilis, Gelneco ad meam plantam siccam adnotauit: Ad Myagrios retulerim. Obscurendus capsulis maturis mense Maio in Ducatu VVirt. inter Leuenberg & Stungardiam.

BYRSA PASTORIAE SVBLONGO LO- culo affinis pulchra planta.

Per terram spargit folia, Barbarea muralis, aliquatenus similia, breuiora, latiora, magisque rotundata, duas vncias lata, per ambitum ferrata, hirsuta, aspera nonnihil, cuiusmodi etiam per caules ramosque, sed portione minora, cernuntur siue pediculis, statim autem è *radice* tenui plures emittit *caulis*, alios aliis foelicibus adolecentes, cubitum altos & ampliores, nonnunquam in ramos plures diuisos, quos non *Barbarea*.



Barbarea, cauli
appropinquo, sed ab
scedentes didu-
cit flores singu-
lis ramis multi-
bus. quos exci-
piunt serie lon-
ga locali burse
pastoris sublon-
go loculo simi-
les, biflores, qui
in medio striam
habent, quorum
altriuscuius ab-
scedentibus val-
uis semina appa-
rer - minutum,
relicta dissep-
te membranula.

Hanc plantam
cum siccam ante 30. annos misissem D. Gesnero,
ad eam annotavit, videri referri posse ad Mya-
gri sylu. speciem. Sed perinde est siue ad Mya-
gron, siue ad Bursam pastoris referas, inquit
C. Bauh. in Phyt. qui hunc inter Bursas pastoris
sexum locum dedit, ac Bursam pastoris loculo
oblongo maiorem appellat.

Monspelii Martio florentem & siliquis ser-
tem legi, quo mense etiam Bailex locis cam-
pistris hectoribusque provenit. solet.

Bursa pastoris affinis herbula s. liali Thym.

Humilis quidam heroula affinis Bursæ Pa-
storis, copiosa in Sicilia & in Plurimonia
agro locus vias: ramulis deditur libris
multis lumen procumbentibus: siliis in Thy-
m. rotundioribus, candidioribus, subhirsutis: que
siliis fert tota hyeme candidos, veluti in ca-
pitula aceruatos, in lumen ramulis, odore qui
in hirsutissimo flavo mellis, fructus minores lili-
di similes: Planta in lipido sapore constat, ut
Bursæ pastoris, Catalp.

DRABA VETERIBVS.

CAP. VII.


Auctoritate Dioscoridis apud, herba in cu-
biti altitudinem assurgit tenuis. spargens
virgas & ab utroque latere folia veluti Lepidii
teneriora (αλωπη, quod etiam significat mol-
liora,) tamen & candidiora. In lumen vero
patet umbellam que: modum Sambucus [α-
] que flores habet albos (αλβα αλωπη, vulgo αλωπη
(tenues,) ac sic etiam Manardo legi placet: Flu-
vis herba cognitur cum petulana, maxime in
Cappadocia. At fructus [αλωπη] ipsius aridus,
Piperis (πικρὸν) loco oblongis miscetur. Et
quoniam hæc postrema, At fructus [αλωπη] Plin. de
Dryophono tradit, Cordus coniectura ductus.
(non quidem sat probabili nostro iudicio) Dra-
bam Dioscoridis cum Dryophono Plinij unum
esse existimat.

Serapio Drabam, Oribasio Braben dictam (in-
quit Sarrac.) Nasturtii generibus annumerat, &
Nasturtium Orientale appellat. Ceterum in-
ter nostra Aldini exemplaris, hoc ipsum caput,

ut Hermolaus habet, cum Arabidis herba in-
scriptione repetitur, ita ut Arabis & Draba
nisi & eiusdem plantæ diuersa nomina fuisse vi-
deantur.

Ast ab hac opinione alienus est Cornarius ac
Drabam herbam supposititiam esse in Diosc. &
ab aliquo adscriptam existimat: eo quod his in
hoc libro habeaturum hoc loco, tum ad finem
post Glattum ante Telephium intrusa. Sed in
Arabia appellatur, & alias eadem de ipsa tradit-
ur, in idem etiam verbis: ut nec de nomine,
nec de re satis constet: maxime quoniam a-
pud nullum alium Scriptorem, neque Diabes,
neque Arabidis herba mentio fiat, altero sane
ex altero corrupto. Quare non videt, quantum
fidei debeat haberi his, qui Nasturtium Ori-
entale, vel Babylonium esse Drabam dicunt: aut
etiam Cumum sylvestre.

DRABA MVLTIS FLORE ALBO.



Vix cubiti superat

Draba, caule
rotundo, stria-
to, ex radice li-
gubia surgen-
te, multiplice:
quem folia al-
ternatim basi
una amplectun-
tur, oblonga,
vnciam & ul-
triuscuius lata,
sinuata: ramu-
lum fastigium in
creberrimos a-
bunt, surcul-
los, & ipsos
quoque folio-
los: quibus
umbellam in-
stent siliis
candidi, quib-
us delapsis raso-
la suboritur,
corculum imi-
tata ex cono
stylam exigua
promittens,
que hinc suis
loculis rotide
semina parua
rassa conti-
nent.



Nascitur in
quit Maff. in
Ananiensi a-
gro planta so-
lus Lepidio
non dissimili-
bus, & umbel-
la f. r. Sambu-
ci, Drabam ad-
unum refer-
ens, quemad-

modum & in Galliis nasci Ruellius testatur.

Camerarius eni ad Hist. Germ. Matth. & Epit.
Arabidis siue Draba dicitur, habet solum in sua
icone valde hirsutum, nos talem hirsutiem non
Kkkk

obseruamus. Pannonica sine Draba hactenus est, verum pili breuiss. eaque non solum serena, sed etiam laciniata, vt obseruamus in planta nobis per Agerium data pro Pannonica in Austria collecta. Monspelienis concolor nobis videtur & eiusdem formae. Eadem in horto Arabis verior.

Lobel. & Penz. Adu. Obs. & Icon. Plant. Arabis huc Draba. Hist. Lugd. Arabis seu Draba Matthioli. Celsus, Draba. Hist. Pann. & Hist. post. Draba vulgaris 1. folio in ambitu dentato ex viridi cinereo, sapore acrisculo &c.

C. Bauhin. Phyt. Draba prima v. bellata: quae a Matthiolum, Lonic. & Lugd. dentatis pingere solis, quod hactenus in ipsa planta obseruauerit: at Lobelium, Castor. Clus. licet hic dicat dentata, folijs integris delineare.

Nomen

Draba multis flore albo, graece *Ἀράβις*, *Ἀράβη* & *Ἀράβη*, Arabis huc Draba, nonnullis Nasorum Babilonicum & Orientale. It. Draba. Ger. *Turfsch Freg*: Gall. *Drac*.

Locus & Tempus

Drabam Monspelii in marginibus quorundam agrorum iuxta urbem: Patavii in horto publico & apud Cortusum florere vidi mense Martio: Frater florentem obseruauit Maio. Nulli fere agrorum margines circa Viennam, totaque adeo inferiote Austria, hac plantam, non sunt oblit, quae subinde in ipsa etiam arua late irrepit. Floret Maio & Iunii initio, semen sub Iunii finem maturum est. Meminit Clusus etiam hanc plantam legere in Insula illa quam facit Rhodanus in duo cornua diuisus inter D. Aegidii Fanum & Arletem, dum Massiliam prosequeretur.

DRABAE SPECIES GLABRA.

Descriptio

Pro Drabae specie dedit nobis plantam D. D. Agerius Argentinenis Medicus, collectam in horto Bononiensi. quae multa habet similia cum Draba ante descripta, excrescit tamen penes ad duos cubitos, quantum colligimus ex plantis siccis, an vnum vel plures ferat caules ignoramus. utamen sunt concaui, glabri: per illos alternatim caulem amplectentia siliqua serrata vel laciniata, sed minora multo longitudine & latitudine, in ramos superiores partes diuiduntur, qui longiores quidem: sed minus se expandunt: siliqua minima albi: quibus capsula succedunt paruae.

DRABA MINOR CVM ORBICULARIBUS CAPITULIS.

Descriptio

Draba minor: Drabae genus minus Clusio huc icone, multa promit a summo radice capite siliqua, longis pediculis nixa, aliquantulum angulosa, villis quibusdam obsita, inter quae gracilis exilit cauliculus, palmatis, paucis foliolis longioribus praeditus, qui a medio fere ad summum orbicularibus capitellis onustus est, membranula in duas partes diuisus, semen exile, fuscum, continentibus: radix, pro planta exhibita, satis crassa, paucissimis fibris donata: viua vt arbitrat, nam praecedentis anni cauliculum adhuc retinebat ex planta, quam Gulielmus de Mera Medicus, in itinere obseruatam, & inter chartas repositam, floribus tamen carentem, Clusio Francofurti donabat Anno 1593.

LEPIDIVM PAULI.

CAP. VIII.

Ex radice digitali repente surgit caulis singularis, rectus, gracilis, laevis, fungosa medulla ferebus: bicubitalis & alior: siliqua Mali Cistii, siliquis maiora, in ambitu crenata, rigida, ex viridi in laeuum vergentia, sapore Siapios: cauliculi, pusilli, copiosi, albi, apicibus herbidis.

Ambae nostrae icones sunt ex Guarinianis, quam autem plantam denotet secundam, nondum nobis constat.

Facile autem nobis persuademus plantam

quam hic tradimus, nempe Piperitum, esse Lepidium Plinii Dioscor. Galeni, & Pauli, diuersam plantam ab Iberide Dioscor. Plinii & Democraus, vt monuimus ante capite de Iberide: in quo nobiscum sentiant plures, vt Marantia.

Quae autem Veteres tradiderunt de Iberide & Lepidio, item equiuocationes, nos tradimus ante.


Herm. hanc forte existimat in Dioscor. Lepidium Columelle satium, Plinii peregrinum, Lepidium Raphanum in Pannonia dictum. Pauli Lepidium, Ruellius ad radicem suam Raphanum teritiss.

Lepidium Antiquorum, Piperitis &

Siliquastrum Plinii multis putatur, quam secutus sententiam aliquando est Braslausolus: nunc vero mutauit, & Pauli & Plinii Lepidium existimat, ac etiam Dioscoridis, distinguit eam ab Iberide eiusdem. Serapionis & Arabum etiam Sceiteragi facit, ostendens Auicennam postremo loco de Sceiteragi confudisse Iberidem & Lepidium. Vocat praeterea Peneirellam.

A Cordo describitur & vocatur Lepidium huc Iberis maior. Item Piperitum & Zinziberitum.

Lepidium



Lepidium, inquit Tragus, est Germanis dictum pfefferkraut; hoc est, Piperitis Senffraut: nam ad Sinapi referri posse neminem hodie puto.

Matth. in Diosc. non potest nō admirari, quod tam facile crediderint Hermblaus, Manardus, ac Ruellius illos securus, Lepidium eam plantam esse quæ vulgò in Italia appellatur *Raphanus*; nisi nostratē Piperitum, quæ proculdubio Plinianum refert Lepidium, Raphanum vocauerint.

Fuchs. ab Iberide distinguit Lepidium, vulgò herbariorum Piperitum.

Lepidium Diosc. & Piperitum Anguill. diuersam facit à Galeni Iberide & Lepidio.

Lacun. in Diosc. vocat Lepidium Plinianum & Pauli, & Piperitum vi. lgi.

Gesner. hort. Lepidium Aeginetæ, Senffraut, Romæ *Crapinella* dicta.

Apoll. rad. s. in Triphera Saracenica magna, Lepidium Plinii. Iberidem Pauli secundam. Idem cum Piperite maiori, vulgò *herba pueri* [sic] herbae nōmine dignaretur, siue Aetio non reclamaret, cum Anguillario Dioscoridis Lepidion concluderet.

Piperitis Neoteritorum sē quorundam silueris Raphanus, Gall. *Passerage*, Germ. *pfefferkraut*, Belg. *peper cruyt*. Videtur Lepidium Pauli & Plinii, non item Dioscoridis: Non est etiam Piperitis Plinii, licet interdū ita vocetur.

Lobel. & Pena in Adu. merito tuerentur Ruellium aduersus Matthiolum cap. proprio de Lepidio, dicentes: Piperitis, Gallia plebi *passerage*, Pauli etiamque Plinii Iberidis siue Lepidii notas explet: sūtiliter Senensis Barbaro & Ruellio insultat quum lapsos dicit, ut putarint *Raphanus* italicis dictum Lepidium esse: perspicue Ruellius hunc errorem detexit. Hodierna die vocatur Raphanus agrestis Officinis & mulierculis Belgis: Gallica plebecula etiam nomine Raphani sylvestris Piperitum seu Lepidium vocat, ut monet Ruellius Matthiolum decipiens, ne utriquam deceptus. Lobel. Icon. Plant. Raphanus sylu. offic. & Lepidium Aeginetæ vocatur: Idem ait & in Obseru. ubi etiam Lepidium maius Cordi & Tragi nominatur.

Hist. Lugdun. Lepidium Pauli & Plinii, Lepidium à Diosc. prorsus diuersum. Lepidium Pauli & Plinii primum, siue maius, à Recentioribus Piperitis nuncupatum.



G. Bauh. Phyt. Lepidium i. siue latifolium.

Hort. Lusit. Lepidium Pauli Aegin. & Piperitis cum Brunfelsio, tum (non est autem Piperitis Plenii acerrimo gustu linguam vellicante) ab Offic. Raphanus sylu. [non ille quidem de quo post fatium diximus, neque Raphanus rusticus] sed qui à Gall. *Passerage* nominatur.

Lepidium siue Piperitis Genex in hortis copiose provenit & serpit admodum: in hortis modeste pulchre, denique tota hieme virebat, florebat mense Iunio. Spontè provenit apud flumina Montpelii. Lugduni, Basileæ, & Montbelgar di in hortis meis & aliozem florens Iunio & Iulio, suo reatu in areis infesta hortulanis, Patruu in hortu Musati, vidi & Ferrariæ in Cornobio S. Domini à L'angeli.

LEPIDIVM NON REPENS.

Radix fibrata, ex qua folia oriuntur primum palmaria & sesquipalmaria, angustiore principio, pēnes pediculum sextantalem aut quadrantalem, sensim dilatata ad ternas, circiter



Lepido Pauli aliquatenus simile.

Per lignosos ramos, inaequales, hucos, vix diu varicatos, folia Ocyri foliis respondentia, acuminata, hirsuta, sapore acrisculis: flores extremis ramulorum confertim congesti.

Descriptio

DENTILLARIA RONDELETII.



Similes, festucubiales emittit, striatos, nigrescentes, in alternos ramos crebro diuicissimos, pinnis caulem cōplectuntur, glabra, ariourentia, seruidi saporis, Conyze foliis paria, perextremos ramulos multis numeris minoras: flores cacuminibus habent.

Descriptio

acerratum congesti, oblongi purpurei, calyce hirsuto. *Semina magna, nigra, acris.*

Gesner hort. Dentelaria Mompelli dicta, & alio nomine Flammula. An de hac loquitur etiam Gesnerus in sine list. Cordicap. de Chamæneriis: Clus. Hisp. Antonii Nebrissensis Lepidium. Quorundam Molybdæna, hoc est, Plumbago Plinii putata, vulgo Herba S. Antonii dicta. Narbonensium suo tempore Dentelaria appellata, Granatiensis vulgi *Belzæ*. Lob. & Pena Adu. Obs. & Icon. Plant. Dentaria vel Dentilaria Rondelerii & Narbonensium: Aeginetæ Lepidium itidem putatum: Molybdæna Plinii. Celsus. Hæc sylvestris Herba S. Antonii. Camer. hort. Molybdæna seu Plumbago Plinii, Dentilaria Rondelerii: Romæ, herba S. Antonii, Italica *Crepanella*, in Illyria *Cucurda*. Tabern. Ic. & Hist. Plumbago quorundam, *Rochfraut* / *wasfer pfeffer* / cui planta non conueniunt nomina Germanica. Clariss. Vir. D. Vlysses Aldroandus, cum Bononiæ essem, vocabat Plumbaginem Plinii. C. Bauhin. Phyt. Lepidium 3, seu Dentilaria.

Sunt 28. anni, quum stirpis huius (cuius, tum florum & fructus accuratam picturam à me desiderabat, meque adhortabatur ut gnauiter in hocce Herbario pergerem, sicut & ipse in suo faciebat, addens bonam esse inter mortales eiusmodi contentionem) descriptionem cum ipsa planta missi D. Gesnero nomine Dentilariæ Rondelerii, vti tunc vocabant Mompellii, vbi florentem obseruabam mense Septembri. Vidi præterea circa Arelatam, & vno circiter miliari ab Auenione, iuxta castellum Papæ, Lugduni habebam in horto. Mihi etiam villa Basileæ in horto insigni D. D. Fœlicis Plateri, vnde transtuli in Hortum III. E. C.

Herba acris. Radix ad dentium dolorem commendatur.

COCHLEARIA.

CAP. IX.



Cochlearia radix subest crassiuscula, recta, cui adnatae fibræ aliquot, longæ, albæ, à qua statim oriuntur folia multa, pediculis secundum terram purpurantibus duas uncias longis, crassa, succulenta, modice in cochlearis ferè modum cæna, saturato virore prædita, supina par-

te profundo nervorum dissentiu sulcata, rotunda, alias angulosa: at quæ in caulibus nascuntur, oris reflexis inflexis sunt laciniata, longiora quæ sine pediculis, gemina ala, libera tamen cauliculis implectuntur: caules à radice plures, an-

gulosi, subpurpurei, in ramulos subditi, distantes & minores, maiores verd cum tementi proferunt: *folies multi, candidi, quaternis foliolis constantes, multisque staminibus exsertis: cauliculis viridi: succedit in siliquis semen.* Bonis plantæ sapor acris, Nasturtium relapsens, sicut & odor.

Dodon. gall. cuius figura non placet, Latine Cochlearium vocat, Germ. *löffelkraut*: Gall. *Herbe aux coilliers*: Belg. *lepelcruyt*.

Britannicam veram, Britannicam Plinii, Scimus, inquit Lobel. & Pena in Adu. visam esse Herbam Cochlearis, verum neutiquam Plinianæ descriptioni congruit. Lobel. Obs. Cochlearia Batava: Telephium Lacunæ, Thlaspis & Nasturtiis affinis. Icon. Pl. Cochlearia Batava.

Gesner. hort. Cochlearia, vt & lo. VVicto quam Telephium aut Britannicam esse negat.

De hac Hadr. Iun. in nomencl. rei herbariæ Britannica Plinii, Herba Bataviæ peculiaris: quam Frisios monstrasse Romanis militibus tradit, vt putat, quod confines Oceano Britannia velut propinqua eius nomen dedicauerint: in quo linguae imperitia fallum puto, quum vocis originem referendam existimem ad *Breuten* ita dicuntur capites & quibus aggerum moles aduersus maris imperum surgunt, in quibus copiose prouenit.

Hodie Cochleariam indigitamus, quod in oblongis foliis extremitas in Cochlearii formam rotundetur. Hollandi inde *lepelcruyt* & *lepelbladen* appellant. Non desunt qui Telephii nomine eam designari malent.

C. Bauh. Phyt. Cochlearia folio subrotundo.

Marcus Hirschlerus in thes. Cochleariam duplicem facit Britannicam & Batavam.

Cochleariæ semen accepi anno 1595. à fratre Casparo Bauhino, quod Autumno satum & hyeme repositum in cella pulchre vires remansit: & Maio capit florere, folia similia primis foliis barbaræ: remanet in horto, hiemem profert & quorannis se semine deciduo propagat, & primo Vere caulum producit, florens Martio & Aprilis in horto III. E. C. Montbelgarum.

Cæterum facultatem habet, teste Dodonæo, calidam euidenter & siccam, virenti Nasturtio sapore & qualitate persimilem. Mala quod Scorbuthi Germania nuncupat, efficaciter medetur, in lacte aut vino decocta, & aliquot continuis diebus epota. Tales plantarum species in quaque regione à Deo creantur, quales hominibus & animalibus eidem natis maxime conueniunt. Quod & uiam testis rebus docuerunt monstrare possunt, inquit Solenander. An id tam confidenter hoc nixus competentiâ sepe nimmer probavi, ex plantarum nascentium frequentia me ferè animaduertere posse, quibus morbis popularibus, nimirum in *Scorbuth*, quolibet Regio subiecta sit. Obseruatus hoc ipsum apud Danos, Phrygios, & Hollandos: quibus Scorbuth dictus morbus frequens, istius quasi proprium medicamentum, Cochleariam scilicet, copiose prouenit.

Cochlearia minima

Dominus Rodolpheus Medicus ostendit mihi Pfortæ hanc in horto D. Soceri Gmünger Phytomætopi Cochleariæ genus paruum, florens cum siliquis mentis Martio 10. anno 1595. quod dicebat sibi missum nomine Britannicæ, ac quædam pu-


cabat à precedenti genere: folia autem non multo maiora quam in Alfine vulgari proferebat.

PIPER INDICVM, SIVE CALECURICUM, siue Piper Siliquastrum.

CAP. X.

Piper Calecuricum, siue Capsicum oblongius.

Descriptio



Capsicum siliqua latiore & rotundiore.



torro, insident exalbidi, septenis foliis striatis constantes, medium occupantibus violaceis apicibus, totum autem florem in ea parte amplectente calatulo viridi in mucrones aliquid acuminato. Siliqua succedunt, nucis longae corniculorum instar habentes, vel rectae, vel incurvæ: nunc breves & contractæ, per maturitatem puniceas, vel atrorubentes, nunc: semen copiosissimum continentes compressum, rotundum, fulvum. Radix brevis nec caule crassior, numerosissimas à lateribus fibras circumquaque spargens: nulla est plantæ pars quæ a-

crimoniam non sit prædita, sed præter reliquas indomitus est seminum & siliquastrum feruor vrentissimus.

Siliquastrum, Fuchsi sententiâ, convenientissimo nomine à Plinio lib. 20. cap. 17. dicta est herba hæc, à siliquis nimirum magnis & oblongis quas producit.

Eadem etiam ab eodem Piperitis, quod semen eius gustatum Piperis saporem & actimoniam præ se ferat, nominatur. Alia tamen est ab ea quam vulgò Piperitum appellant, ut monuimus. Sunt qui Piper Hispanicum, alii Piper Indicum, nonnulli etiam Piper Chalcidicum vocant & Bre-silicum. Auicenna zingiber caninum Fuchsi, Trago, atque aliis videtur esse: Dodonæo Actuarii Capsicum, fortè quoddam semen comestum mordeat, à 270 mordeo. Siliquastrum autem Plinii esse, herbam cuius picturam damus, vel inde constat, quod Plinius Castore Siliquastrum demonstrat, caule rubro & longo, dentis geniculis, foliis Lauri: semine albo, tenui, gustu Piperis. Et alio in loco: Panax Piperis saporem reddit, & magis etiam Siliquastrum, ob id Piperitidis nomine accepto.

Hanc Piperitidem cum Fuchsi in quatuor distinguimus genera: In Piper scilicet Calecuricum nigrum & rubrum seu maius & minus. Præter quæ, alia sunt bina, quorum primum, maioris discriminis gratia, Piper Calecuricum siue Capsicum oblongius; alterum Capsicum siliqua latiore & rotundiore inscribimus. Alii alia differentia: notant in siliquis, ratione formæ & coloris. Formæ quidem, quæ tum longa, eaque vel crassa, vel gracilis & incurvata: tum brevis, eaque lata, vel rotunda, & denique (ve prodit Camer. hort.) piloso caule, pilis albis prædita, latioribus foliis, fructu longo, plerumque in acuminatam longam appendicem desinente, flore quoque citrà in alius maiore: Color aliis initio niger, aliis viridis, in maturitate autem, aut croceus aut rubicundus. Cetera in his omnibus non valde dissimilia sunt.

Monard. ex vers. Clus. Axis seu Capsicum (non vers. Ital. Axes aut Depe d'India,) Piper Indicum (Americum potius Clus. cuius omnia genera aliquando vidit colore flavescente,) folio viridi, Ocymo latifolio simili, flore albo, fructu thueriz formæ, oblongo, rotundo, Melopeponis formâ aut Ceratiorum.

Credidit cum Ruellio Gesnerus id ominasse Mauritiorum Cardamomum vel Cardamenum maius, quod nos Piper Indicum appellamus, attestante Matthiolo (perrinaciter nobis contrariâ Lacuna,) sed nec sit Serapionis, nec Auicennæ Cardamomum.

Matth. German. Piper Indicum siue Calecuricum: siliquæ unâ digitum longa: rotunda alterâ.

Camer. ad Hist. & Epit. Matth. dicit figuræ priori titulus Siliquastrum siue Piper Indicum, alteri Siliquastrum varietas triplex.

Apud Cordum, qui Piperitum, siue siliquastrum Peruvianum cognominat, est annotatum, esse Capsico fortè aut Cardamomo Arabico cognatam plantam. Ibidem Gesner. ex Trago figuram apposuit.

Idem Gesnerus passim, Capsicon recentiorum Græcorum, Piper rubrum, Piper Indicum, & Cardamomum Arabum, eius opinio, vel asserente Clusio, sufficienter refutatur à Matthiolo.

Lobel. & Penz. Adu. Capsicum Actuarii, siue Caninum 22. Auicennæ, Calecuricum Piper recentiorum.

ribus. Lob. Obs. vnam habet figuram hoc tit. Capsicum [Tab. Ic. Siliquastrum.] Piper Indicum: & alteram, Capsicum breuioribus siliquis. Et postea Capsicum, Piper Indicum longioribus siliquis: Piperitis Cordi. Siliquastrum Plinii & Tragi: perperam longum Dioscoridis. Icon. Plac. Capsicum Actuatum, siue Caninum Zingiber Auicennae. Calecuticum Piper, siue Piper Indicum longioribus siliquis.

Nomina
linguar.

Casp. Bauh. Phyt. Capsicum 1. siue siliquis longis recuruis. Capsicum 2. siue siliquis oblongis. Capsicum 3. siue piloso caule. Capsicum 4. siue siliquis latis, cordatis.

Piper Indicum, Calecuticum, Brasilianum, Americum, siue Capsicum 2. Tab. Ic. Siliquastrum Plinii, & Piperitis: Germ. Indianischer oder Calecutischer Pfeffer / Schottenpfeffer / Persischer Pfeffer: Belg. Bresille peper. Gall. Poivre d'Inde, & Poivre d'Espagne, & de Bresil. Ital. Pepe d'India. Boh. pepe Indyans. y aut Turecky.

Locus &
Tempus.

Piper Indicum siue Calecuticum, siue Piper siliquastrum vidi Basilicæ in hortis mensè Nouembri cum pulchris longis siliquis: Genue etiam Montebellardi in Horto E. C. prouenit mihi cum fructu magno longo, & cum fructu magno breui.

Capsicum hoc seu Piper Indicum diligentissime colitur tota Castella cum ab Hortulanis, tum à mulieribus in ædiam suarum pensilibus hortis. Meminit etiam videre Clus. anno 1586. maxima copia cultum in suburbanis Brunnæ urbis celebris in Moravia, quo cultores non contemnendum quantum faciunt: est enim apud vulgus frequenter in usu. Sed & hæc omnia genera aliquando vidit colore flauescente in Lubrania, monasterio quodam circa Olysiponem.

Vites
Vfus.

Vitantur eo tota Castella per totum annum cum virente, cum siccò pro condimento & Piperis. Valenter excofaciat atque desiccet, inquit Fuchsius, id quod seminis insignis acrimonia, & foliorum amaritudo euidentissime monstrant, ut certe non temerè plerique hoc semine loco veri Piperis vtantur, ut quod easdem facultates haud dubie habeat. Dodonæus hoc Piper Indicum calidum siccòque esse ordine tertio, eademque quæ Fuchsius de eius viribus tradit, quibus addit eos cibos quibus miscetur, croceo colore infici, ventriculum excofaci, ciborum coctionem promoueri, strumas, ceteraque ædemata discutere, eodem cum melle illito maculas faciei lentiginisque deleri, frequenter tamen eius usum noxium esse, quod malefica quædam vis eaque occultè prædictum sit, quæ canes, si id comederint, interimit. Piperitis, inquit Plinius, quam & Siliquastrum appellamus, contra morbos conitiales bibitur: utilis gingiuis, dentibus, oris suauitati & tactibus. Auicenna Zingiber caninum, canes interficere scribit: calidum esse ordine secundo, siccum primo, recens cum semine tritum cutis & faciei maculas lentisque abstergere, durorum tumores digerere. Particulatim concisum (inquit Monard.) & iusculo maceratum, meliorem saporem edulsi conciliat, quam Piper vulgare: ideoque eius vsus est in omnibus in quibus aromata ex Moluccis insulis & Calecutio delata commendantur: in eo solum differens, quod illa multis aureis emuntur, hoc sola satione acquiritur: nam in vna planta colliguntur aromata in totius anni vsum, minore dispendio, & maiore commodo. Flatus discutit, vile pectori & perfrictionibus, calefactique & roborat partes internas. Caliditatis & siccitatis in quarto fere

gradu particeps, siliquarum decoctum aut paratum aquas hydropicorum educit. Indi nonnulli vnguentum quoddam ad confirmandos dentes conficiunt ex vnionum feracibus conchis & huius plantæ foliis crematis vna, & aqua maceratis, donec calcis candorem referant. Eo illitos dentes aterrimos reddunt, simulque absque dolore semper conseruant, ut tradit apud Camer. hort. Benzo Mediolanensis lib. 1. c. 3. historiz noui Orbis.

PIPER SILIQYA PARVA BRASILIANVM



Fruticosum hoc Capsici genus, oblectatum a Clusio apud Monardem, cubitalibus ramis, virentibus, foliis hortensis Solani ferè, aliquantulum angustioribus: flore candido, exiguo, ut Solani hortensis, fructu in longis pediculis paruo, per initia viridi, deinde nigricante, ubi maturant, rubro,

Do tripus

continente multa semina latiuscula alterius Capsici modo, tam feruidi gustus, ut fauces aliquot dies intendat gustatum.

Idem eodem loco figuram exhibet, cui titulum feci, Capsicum Brasilianum, atque hoc Lusitanos vocare *Piment de Bresil*, hoc est, Piper Brasilianum.

Lobel. & Penz. Aduers. Capsici varietas, multo breuioribus, rotundis, turbinate, eodem semine prægnantes, Augusto & Septembri maturans siliquas.

Lob. Obs. Capsicum breuioribus siliquis. Pl. Icon. Capsicum, Piper Indicum breuioribus siliquis.

Matthiol. Hist. Germ. lib. 2. cap. 87. Piper Indicum paruum & rotundum.

Hist. Lugd. Capsicum Brasilianum Clusii.

C. Bauh. Phyt. Capsicum 5. siue siliquis rotundis Cerasi formæ, aliquando latioribus, aliquando angustioribus est foliis, hoc pingit Tabern. Ic. pag. 859. Siliquastri rotundi angustifolij nomine. Hocque plerumque turredis est cauliculis.

In nonnullis Lusitaniz locis fleret, & fructu profert toto Autumno, & in calidioribus regionibus etiam hyeme. In Brasilia abundanter, multiplicique in usu esse intelligebat descriptionis auctor.

Locus &
Tempus.

Piper siliquosum magnitudinis baccarum Asparagi.

Parua sunt grana, Asparagi vix maiora, sed oblonga, quippe ouata, cuticulâ contecta minata, splendete, ut Pseudocapsici fructus. Intus penitus seminibus scæter oblongis, flauis, compressis, per ambitum angulosis, quæ si vel linguæ adhi-

Descriptio

bea

beas quemadmodum & ipsas baccas tritas aut discepras, mirum quàm insigni acredine eam adorianur ac vellicent. Sanè Pseudo-capsici aliquod genus nouum & peculiare esse facile crediderimus. Thomas Platerus Medicus perdoctus, attulit nobis ex Hispania, aliaque per multa exoticæ elegantia causa gratissima, seuimus Montbelg. in horto Ill. C. Wirt. quem curamus excolendum.

Piperis Indici paruum genus siliquis oblongis.

Basileæ in horto D. D. Fœlicis Plateri, mense Nouembri obseruauit cum flore & siliquis penè maturis paruum genus Piperis Indici siue Capsici, cui *silia* similia Alinæ maiori, non multò longiora vnciâ digiti, si pediculum demas subrotunda, *siliqua* parua eiusdem longitudinis.

Idem est ut existimamus, cuius accepimus siliquas rubras à D. Friderico Meyer, cui titulus, *Piperis* surrectum minus, quod repositum in Hypocausto hoc anno 1605, durat cum frugis spe.

ANIL SIVE NIL INDORVM COLOR.

CAP. XI.

Descriptio

A Nil Arabibus Turcis, omnibusque iis Nationibus dictum, vocatur in Guzarate ubi fit, *oali*, nunc verò plerisque *Nil*: Herba est, quæ seritur singulis annis, Ocymo similis, eodemque modo colligitur, & siccata maceratur. Hanc deinde probè contusam & in panes coactam, per aliquot dies siccandam exponunt: & siccata viridi colore prædita videtur: quòque magis exsiccatur, eò magis ad cæruleum tendit, donec tandem in cæruleum exsiccaturum siue Venetum colorem euadat. Id Anil probatur quod maximè purum est, quodque vltimum arenæ modo non remanet, sed in tenuissimam farinam diffanditur. Alii id præferunt, quod in aquam coniectum fluitat; Leue igitur esse debet & benè coloratum.

Fragsus repch.

Pro Ocymo Mangiticam habet auctor [Garcias], inquit Clusius, quod vocabulum quotquot Lusitanos consului Basilicum seu Ocymum interpretari sunt. At mihi iniqua admodum ista comparatio videtur, siquidem non solemus ex Ocymo pastillos conficere, sed potius ex Isatide quæ huius plantæ descriptione multò elegantius quadrat. Sed hic Fragsi inscitiam mirari licet qui in Rhapsodia sua (quam ex Orta mea-que in eū annotatiuncula, tum etiâ ex Monarde, maxima ex parte contexuit, malignè suppresso omnium nomine) nugatur me velle Mangiticam eandem plantam esse cum Isatide, quam existimo pluribus notis cum Anil Garcie descripto potius conuenire, quàm Ocymum, cuius foliis lium Anil depingit. Sed antequam Anil quod sic eulumnior postea describit, quodque in Occidentali India coli asserit, cum Ocymo peculiare quidquam habet? Imò ipsum nihil nisi Isatidem describere, vel mediocriter in re herbaria versatus facile iudicabit.

Locus

Costæ Ital. Anil Arabum, Turcarum quorundam mercatorum Nil, Herba, ex qua fit color cæruleus.

Camer. Hort Nil siue Anil egregia planta ex qua fit Indicum.

C. Bauh. apud Matth. & Phyt. Isatis 4. siue In-

dica.

Herba est in Insula Iava, ait Linschot. de hac verba faciens, quam Indi *Enges* vocant, ex qua suum Anil parant. Crescit ea in locis sylvestribus sine omni cultura. Eadem contusa Bombacem quoque tingunt. Folia habet ea herba Rosmarini similia, sed non tam longo est virgulto, surrecto interim velut Thymi.

Nos Hist. nost. l. i. arborem quandam foliis Coluteæ, nomine Anil exhibuimus. Anil nomine missa planta Clusio est Scabam Alpini de qua libr. eodem.

Appendix ad Caput vltimum Libri XXI.

Cum per loci angustiam nobis inibi non licuerit Isatidis absolute historiam, quædam & hic de ea substituiamus: nec abs re, cum etiam cum Anil aliqua sit illi conuenientia, & hic liber præcedentis sit velut Appendix.

Præter igitur vires quas ex Dioscoride tradidimus, quædam ex Plinio, Galeno, & aliis substituemus.

Glastum, inquit Plinius, sanguinem sistit phagedænas & putrescentia vlcerum quæ serpunt sanant: item tumores ante suppurationem. Contra ignem sacrum radice vel foliis prodest, vel ad lienes potum. Simile Glastum, inquit Plin. in Gallia vocatur, quo Britanorum coniuges, sturisque toto corpore oblitæ, quibusdam in sacris & nudæ incedebant, Aethiopum colorem imitantes.

Omnes verò, Cæsar ait, se Britanni Glasto insciunt, quòd cæruleum efficiat colorem, ut ea ratione truculentiores visu, & aspectu formidabiliores & horridiores hosti sese ingerant in præliis: Propterea Martialis cæruleos Britannos indubiè dixit, ait:

Clandia cæruleis cum sit Rofina Britannis Edira.

Horat. Epodon. 16.

Nec fera cærulea domuit Germania pube.

Cæruleam vocari dicunt interpretes, ob cæruleum oculorum colorem, omnibus ferè Germanis communem.

Turpis Romano Belgicus ore color.

Antiquos verò Germanos herba Glasca ad tingendos crines vfos fuisse prodidit Ouid. de arte.

Fœmina canicem Germanis lufcis herbis.

Et melior verâ, queritur arte dolus.

Isatis satius Galeno, quâ vtuntur Tinctores, facultatis est valenter exsiccatis, nondum tamen mordentis. Est enim simul amara, atque adstringens: proinde magna vulnera corporum durorum glutinat, etiam in capitibus in musculorum fueriat, vel sanguinis profluvio laborantibus partibus vtiliter illinitur: tumores & edematodeis mirificè digerit, simul ac reprimit, & aduersus omnia vlcerum maligna, & cacoëthe mirabiliter resistit, etiam si putrescant, exedantur ac erodantur. At si nonnunquam pro ægri natura valentior appareat, foliis eius tritumiscere, aut panē, aut hordeaceam farinā, aut triticū, aut polentam, pro vincente nimirum in vno quoque affectu. At Isatis sylvestris manifestè iam acre quiddam cum gustu, cum affectu profert. Valentius enim quàm satius siccatur, valentiusque humidis etiam putredinibus resistit, ad cætera iam dicta deterior, quoniam moderatius & minus mordaciter siccatur. Vlcerum namque talia

irritantur his remedijs, & phlegmone inflammantur. Ceterum ob potentiorē facultatē lenioris quoque utilis fuerit, cum altera imbecillior tantum prodesse non possit.

Fernelius Meth. med. lib. 7. Glastum ponit in suo Emplastro ad Herniam.

Utramque Isatin vino decoctam & potam iecinorosis utilem esse scribit Tragus, ita tamen ut simul extrinsecus decocto foueatur Hepar.

Quo. 3. anno Glastum primum terræ madatur, praesertim si tempestius sequatur imber, quater excinditur, sarculo duobus digitis sub terra adacto, quo tempore folijs nascitur Plantagini similibus, partim supra terram nonnihil extantibus, partim humi procumbentibus. Anno deinde proximo Triticum eidem agro mandatur, qui Glastum aluit, non enim Glasti proventu is emaciatur, sed lœtificatur potius: & ex radicibus quas firmas & alius impactas aratri culter nequit proscindere, ac extirpare, cum segete pululant Glasti caules, qui in alteram sectionem semen præbent, maioris quam Triticum pretij.

Hæc illis subiicienda quæ ante de eius Satione dicta sunt.

Pastillos è Glasto hac ratione fieri testatur Carol. Steph. Decerpta folia in pistrino subiguntur, pressa inuertuntur, & seorsim in vase collocantur, inclinato, ut sanies effluat: denud eadem mola subduntur, & tum demum in globos digeruntur viginti aut 24. uncias pendentes, in Sole, aut si id per aeris inclementiam non licet, in clibano siccandos: hosce globos quidam in diem D. Martino sacrum in horreis asseruant, post in puluerem redigunt, & in aceruos aggerunt: quoniam verò sæpenuerò acerui calorem concipiunt, sæpius commouendi erunt, & recenti aqua affusa quantum opus videbitur, probè humectandi: ut enim nimia aquæ proluvie submerguntur, ita vicissim parcius affusa aqua comburentur: his igitur factis, iidem illi pulueris Isatidis acerui in longas porcas digerendi, & quarto aut sexto quoque die inuertendi, quoad probè refruxerint, extraque omnem concipiendi caloris metum fuerint positi: quæ in re summa est

adhibenda diligentia, alioqui si incaluerit Isatis viribus exiit: atque hæc quidem omnia postquam executus fueris, in aream rectè paucam interes, quoad vendendi tempus sese offerat, quo autem diutius in aceruos aggesta fuerit Isatis, euadit præstantior. Thololares autem, quorum ager vberem Isatidis prouentum reddit, non consueverunt globos in puluerem redigere, sed folia in dolium capacius coniecta prælo subiiciunt, ut saniem herbaceam excludant: ex relicto maxime globos cogunt, Solique exponunt æstiuo siccandos: ex quibus in cottinas coniectis Lanzæ caeruleum colorem saturatiorem diluatioremque pro Insectoris arbitrio imbibunt.

Alium modum conficiendi pastillos tradit H. Lugd. his verbis: Excisa folia & in aceruos coniecta post biduum aut triduum, in rotundo pavimento, quadratis strato lapidibus, detratæ mola lignæ subduntur, quam oculis panno tectis versat equus: Sequitur equum circumeuntem villicus, qui palâ herbam à mola dissectam in lapides referat, & conerrat, ut à prætereunte denud mola frangatur. Vbi satis obrutum Glastum videtur, rustici manibus comprimentes, sanies succosa ut eliciatur, quæ principio nigra atramenti ferè modo, in caeruleum post colorem abit, globos ex herba tusa conficiunt, quantum capere & amplecti utraque manu possunt, & eos partim insolarum, si cælum sudum est, siccant, propè molam, & arcem vicinam: partim, si pluit, aut obstat tempestas humidior, in petticis sub testæ adibus rusticorum affixis, & ad Orientem vel Septentrionem versis, ordine dispositos, quos duratos & exiccaros conduunt saccis, & ad usum eius tincturæ seruant, quæ nigro colore pannos inficit. Semine Glasti manio, vel aliâs trito, & salina vel alio liquore madido, apparet statim color è caeruleo purpurascens quo indigenæ manicarum coriâ nondum sordidâ tingunt. Est enim illis ut & olim Britannis, gratissimus eius coloris aspectus. Caeruleam spumam innatantem, quam igni feruescentes eructant cottinæ, Indum nostri vocant Insectores, & ad pictorum usus siccant.

FINIS LIBRI VIGESIMI SECVNDI.



HISTORIA

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS SECVNDVS.


MOLLIENTES ET HOLERACEÆ PLERÆQVE.

Mensaria & culinaria beneficia in unam classem cogere haec sunt Botanici noster ordo. Congenerum & affinium societatem à forma & fructus similitudine affinamus. Diffa sunt multa holeracea in precedentibus. Dicuntur & plures insequentibus. At hoc libro Maluaceas & his quodammodo similes, corè plerasque holeraceas, aut non valde ab his alienas enarrabimus. Vbiq; studiis Rhiz. tenuis consultum volumus. Si quis melius digerere possit, faciat.

DE MALVA SIVE MALACHE VETERIBVS,
& in Genere.

CAPVT. I.

Malua est
Theophr.



MALVA [de herba, non de arbore nobis sermo est] ex opinione Theophrasti, in alcum se attollit, atque mensibus senis, aut septenis in arborem transit, ita, ut longitudine, crassitudineque hactenus instar

grandescens, commodè ad vsum baculi veniat: tempore verò longiori exacto pro ratione magis quoque incrementa capessit. Alibi de Malua inquit: Annuo caule constat, inter olera non nisi cocta manditur: Maluæ folia à Sole atque Sideribus affici sentiuntur. Assidue namque circumaguntur cum Sole, seque eodem inclinant, quod Sol perferretur. Causa verò in detractione humoris est. Eodem namque inclinatur, quod Sol humorem seruofaciens prouocauit.

Lucius Columella idem hexametro hoc testatur.

Et Maloche prouoluitur quæ uersat Solem.

Quo loco obseruandum est, cum dicit Maluam Solem sequi, id in minori Malua maximè videri. De siluestri ait, à Medicis Althæam vocari: Theodorus Hibiscum vocat, de qua infra dicemus.

Dioscorides Maluam satiuam [ῥομανίαν] recenset inter olera, Malachen [μαλάχην] vocans, ad cibum magis idoneam, quam siluestrem. Sed neutram describit, tanquam notissimam.

Apud Plinium non vnum satiuæ genus, sed duo esse traduntur, totidemque siluestris: hæc amplitudine foliis discernuntur. Maiorem Græci Malopem vocant in satiuis: alteram ab emolliendo ventre dictam putant Malachen. E siluestribus, cui grande folium & radices albæ, Althæa vocatur ab excellentia effectus; à quibuldam A-

nistalthæa: reliquum genus siluestris non describit. Ex his colligere licet nostram vulgarem Maluam quamuis non colatur, in genere domesticæ apud Antiquos extitisse: Alterum verò genus quod spectaculi gratia seritur in hortis, Malopen esse apud Plinium, quam videtur intelligere, cum alibi de Malua loquens inquit: in Arabia tradunt auctores Maluas septimo mense arborefcere, baculorum vsum præbere exemplum.

Deprompta autem hæc sunt ex Theophrasto, de ea quæ cultu arborefcit. Ex Theophr. igitur colligimus, id quod apud nos seritur, satiuum alterum genus fuisse apud Antiquos. Quod verò Theophr. statuit Maluam in arborem transire, hoc non concedimus, sed omnino dicimus esse particulare genus: nec vnquam culturâ in arborem abire. Sume quam voles Maluam, cole, proceriorem quidem, et nunquam arborefcentem, nec specie à pristina differentem efficies.

Galenus siluestris & hortensis quoque meminit, ac priuatim eius, quæ ἀνδρὸς ἐνδράξω nuncupatur.

Sunt ergo Maluæ plura genera. Est enim Malua satiuum, id est, hortensis, siue satiuæ: & Malua siluestris, non quæ in siluis, aut asperis locis, sed quæ in incultis sua sponte nascitur, quam Dioscorides vocat, quæ vox incultam & inelaboratam certam significat, qualis in semitis, pratis, aliisque huiusmodi ruris & agri partibus est. Et siluestrem hanc Maluam, vulgarem hoc capite intelligimus, non Althæam; nec Alceam, de quibus postea dicemus.

Differentiæ quoque multæ, ex florum figura & vario colore. Alia enim rubras, alia candidas, alia in purpurea albicantes Rosas producit. Et hæc rursus atque illas, vel multiplici foliorum tex-

Tom II

LIII

tura constant. Ex ipsa Maluæ foliis. Vna siquidem folio sinuato, altera rotundo, nonnulla etiam crispo ternitur. Vna rursus aliis attollitur, altera pumila est & humi iacet, de quibus posthac agemus.

In genere omnis Malua à Græcis *μαλὰ* dicitur, à Lat. Malua, ab Arab. *Chubea* seu *Chubar*. & semen illius *Bizeri Chubeiz*: Trago, Germ. *papeln*, Belg. *Maluer*, *fresena cruy*: Gall. *Maline*, Hisp. *Malua*, Angl. *Mallow*, Boh. *Slyz Hung. Malua*.

Vt porro Malus Latinis, quasi Molus quoddam alium molliat, dicta est, auctore Varrone, ita Græcis *μαλὰ* ab emolliendo ventre, quia *μαλὰ* molle significat.

Plinius maiorem à Græcis Molopen vocari in satyris, alteram Malachen, scripsit. Athenæus *μαλὰ* Atticè dici, in multis autem Antiphanis & Epicharmi exemplaribus *μαλὰ* pet. scriptum reperiri memorie prodidit.

Antiquos Maluis cæterorum olerum modo vesci solitos fuisse, subducendæ alii gratia, vel ex Theophr. constat. Vnde Martialis:

Exoneratur ventrem mihi vilis Malua:

Atulis, & varias quas habet hortus opes. Et

Vesce lachryis, & mollioris vere Maluis,

Nam facies dnrum phœbe carantis habes.

Quare scripsit Dioscorides. Malua satina cui longè aptior est siluestri, stomacho aduersatur, alium iuuat, sed multò magis caules: interaneis & vesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata agilopas ex melle sanat: verum cum cicatricem trahere cœperint, eâ demum citra salem utendum est. Contra aculeatos apum vespertini quæcunque illa efficax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti non feruntur: vlcera manantia in capite, fursuresque cum vrina sanat. Sacris ignibus ex ambustis decocta folia tritaque utilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vulvas in fessione molli: prodest erosionibus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, sedisque, clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua contra omnia venena auxiliatur, si continuò à bibentibus rehomatur. Contra phalangiorum morsus remedio est. Lac euocat. Semen in vino potum, addito Loti siluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.

De hac perspicuè differit Galenus his verbis. Quemadmodum *βελανη*, quæ Lactuca agrestis est, ab hortenſi, ita Malua agrestis à satina differt. Plantæ enim congenetes eò inter se differunt, quod agrestis quidem siccitate, satina verò humiditate superat. Porro succo Maluæ lentior quidam inest, quod Lactucæ non inest, à refrigerandoque abest perspicuè. Id quod etiam an equam edas intelliges, si utrumque olus vicissim calido alicui affectui, ut erysipelati, cataplasmatibus modo applicueris, quod etiam vulgò faciunt, tenera folia diligenter ad exatam leuorem conterentes. Senties enim in hoc cataplasmate Lactucam quidem manifestè refrigerare: Maluam autem calorem quandam habere moderatum ac tepidum. Cæterum hoc olus facillè subducitur, non modò propter humiditatem, verum etiam propter lentorem, & potissimum quando quis cum oleo & garo copiosam ipsam sumperit. Nutrit autem & ipsa mediocriter. Et rursus, Malua agrestis digerentis paululum & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis quanto plus habet aquæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est fructus eius tanto validior est, quanto & sicior. Porro huius generis est quæ Dendromala-

the nuncupatur, sed efficacissima comprehensuram in digerendo.

Plinius diffusius virtutes Maluarum explicat. In magnis laudibus Malua est utraque, inquit, & satina & siluestris. Omne solum in quo feruntur pinguius facilius. Huic contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, præcipuè Scorpionum, vespertini, similitumque, & muris aranei. Quin & tæta cum oleo qualibet earum peruncta, & habentes eas non feruntur. Folium impositum Scorpionibus terporem adfert. Valent & contra venena. Aculeos omnes extrahunt illitæ etudæ cum nitro: potè verò decoctæ cum radice fursoris amari venena resingunt, & ut quidam dicunt, si vomatur. De iisdem mira & alia traduntur. Sed maxime si quotidie quis succi ex qualibet earum sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturum. Vlcera manantia in capite sanant cum vrina putrefacta, lichenas & vlcera oris cum melle. Radix decocta fursures capitis, & dentium mobilitates. Eius quæ vnum caulem habet radice circa dentem qui doleat punge, donec desinat dolor. Eadem strumas & parotides pariosque, additâ hominis saluâ purgat circa vulnus. Semen in vino nigro potum à pituita & nausis liberat. Radix mammarum vitis occurrat, adalligata in lana nigra. Tussim in lacte cocta, & sorbitionis modo sumpta, quin diebus emendat. Stomacho inutiles Sextius niger dicit. Olympias Thebana abortiuas esse cum adipè asserit. Alii purgari feminas foliis earum manus plenis mentura, in oleo & vino sumptis. Vique constat parturientes foliis substratis celerius solui, protinus à partu reuocandum ne vulua sequatur. Dant & succum bibendum parturientibus ieiuniis, in vino decocta hemina. Quin & semen tritum adalligant brachio, genitale non continentium. Adeoque ex Veneti nascuntur, ut semen vniculis aspersum genitali feminarum auaritates augere ad infinitum Xenocrates tradat. Item tres radices iuxta adalligatas tenelimo & dysentericis utilissimè infundi. Item sedis vitis, vel si foueantur. Melancholicis quoque succus datur cyathis ternis tepidus, & infatiantibus quaternis. Decoctæ comitialibus hemina succi. His & calculosis, & inflatione, & torminibus, aut opisthotonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacris ignibus, & ambustis decocta in oleum folia imponuntur, & ad vulnenum, impetui cruda cum pane. Succus decoctæ neruis prodest, & vesicæ, & intestinorum rosionibus. Vuluas & cibo & infusione emollit in oleo: succus decoctæ porci meatus suaves facit.

Scribit Simeon Sehi, Maluam ventriculum facillè lubire, non solum propter humiditatem, verum etiam propter lentorem, atque imprimis si cum oleo & garo offeratur, vino quo eduxit tempore irrorata. Velicam, thoracem, pulmonemque iudare, & raucam vocem linire. Siluestris Malua, ut ferunt, comesta dolores ex vespertini ictu tollit. Si quis morsus à vespis aut apibus, succo Maluæ præfectum siluestris perungitur, conuulsam dolorem leuatur: Dicitur etiam huius decoctum potum lapides conterere, lomnum conciliare, facillèque partum præstare, si mulier eâ trebridi vestur. Illa inflammationes lenit & que indurata sunt molli. Illud Maluæ peculiare est, ut vesperti & apum ictibus imposita, dolores lenet.

Maluæ herbarum nomine sequentes insignimus plantas. Vulgarem flore maiore & minore, seu folio sinuato & rotundo. Maluam Stellatam: Maluam trimistrem cum vnguibus purpuris.

Vitis & vitis
Alumina foliis
Hortis

De D.

Galeni

Vitis & vitis
Alumina

Alumina
Alumina

Ex Simeon
Sehi.

Maluz speciem Cobes. Maluam roseam, siue hortensem. Maluam Crispam. Maluam arboream: de quibus ordine. Sed plures adhuc (de quibus suo loco) apud Botánicos Maluz titulo habentur plantæ. Ait enim C Bauhinus in Phyt. Altera Malache è silv. cui grande folium & radices albæ, Althæa vocatur. Sic Harch. in Euch. Althæam à Galeno Anadendromalachen [arborescentem Maluam] vocari testatur. Scribit Camer. hort. Pastinacam (Germ. addo) agrestem in pratis nascentem, Malachen agriam dici.

Et Celsus. per Maluam caule altiori ferè ad Malopen accedentem, Althæam, quæ Sida cognominatur, intelligere videtur. Sed & Malua Theophrasti Tabernæ & aliis nihil aliud est, quàm Althæa Theophrasti, vel Iutea. Nec Malua Hispanica, aut Malua silvestris alia est ab Alcea. Sic penitus nihil differt Malua querna ab Alcea tenuissimè secta. Eadem quoque est Malua Veneta cum Alcea Solisæqua. Matthian com. li. titulo Maluz quartæ, quam non describit, Geranium maluatum exhibet. Tandem quam alii Maluam equinam vocant, Petasites mihi dicitur. Cur demum cum Ruellio & Lonice. Anagyridem nonnulli Maluam terrestrem vocent, mihi non constat.

MALVA VULGARIS DVPLEX, VNA

Flore maiore, altera minore: vna folio sinuato, altera rotundo.

Descriptio

Radix
Gustus
Caules
Folia

QVam vulgaris est hæc Malua, tam est utilitate multâ commendata: radicem sortita satis tennem, eximii candoris, dulcem gustu & lubrico lentore viscidam: caules ad cubitum interdum excrescunt hirsuti, subrepentes, per humum reptantes: folia rotundata, nonnihil laciniosa, pilosa, autopurentia, in ambitu crenata, in caulibus

folia laciniata: flores parui inter folia exsunt ex pallida purpurea albicantes, purpureis lineis striati, quinquefolii, citris purpurascensibus medium occupantibus: semina compressi orbiculi umbilicati instar habet, gustu perquam viscido, saturo. Altera procerior dicta in hoc à præcedenti differt, quod flores speciosiores, Alceæ, purpurei, maiores. Semen, radix, consimilia.

Est mihi Malua data per D. Agerium Bononiæ collecta cum hac inscriptione, Malua vulgaris maior flosculis minimis, Cobet Plinii: hæc pilis longioribus & calycibus nonnihil differre videtur, quæ varietas fortè est à natura loci.

Quædam modum Cord. in Diole. Maluz silu. Tom. II.



tantulæ mentionem fecit, sic in hist. vna solum describit, quam Maluam silv. rotundam vocat, cui per Gelnerum figura conveniens addita.

Erraticam, seu siuestem (germanicam) Maluam in duas distribuit species Fuchsius: in sylvestrem pumilam, & silv. elatorem. In figuris autem eius dis-

crimen non ritè apparet, ac videntur vnius esse plantæ potius quàm duarum.

Et licet Tragus vnicam habeat figuram, nempe eandem cum Fuchsi pumila, hoc titulo, Malua vulgaris, Germanicè Fäß pappeln. In descriptione tamen distinguit ut Fuchsius, eam autem pingere videtur quæ magnum florem fert.

Cornarum Diole. Malua silu. alia altior.

Dorsth. sub his nomen claturis: *malva arvensis* Malua, Malua minor, Lien capræ [Porta scribit Maluz folia Magos Lien capræ appellare, ob eam quæ cum liene similitudinem habet.] Muris vrina, duas habet icones, quarum vna refert Maluam minorem flore maiore: prior verò videtur diuersæ plantæ quippe Calthæ aquaticæ.

Malua quam Anuqui *Ommimorbiæ* appellauerunt vulgaris adeò nouit est, inquit Matth. ut nulli ferè repentiatur qui eam non noverint. Bellum sanè dictum. Nulli non ferè nota Malua Matthiolo, illo excepto, qui non noverit in vulgari Malua vnâ maiori flore, alteram minori, qui sibi persuadet Italicam arborescentem cultorum mangoniæ talem esse: quum sit diuersa, ut postea dicetur: tueantur Matthiolum Glossatores & Patrocinatores si possunt.

Lacus. solum minorem videtur pingere ex Matth. cum tamen vnâ humilem, alteram elatorem statuat.

Geln. hort. Malua agrestis maior & minor.

Dodon Gall. & Lat. vtramque Fuchsi figuram, iisdem titulis exhibet.

Lob. & Penz Adu. Malua silu. vulgaris procerior: Item Malua silu. minor. Lob. Obi. & Icon. Plant. pingit ambas, ac vocat, Maluam vulgarem proceriorem: Item Maluam silu. repentem pumilam.

H. Lugd. Malua vulgaris Matthioli: Malua silu. pumila repens: & Malua silu. maior.

Tabern. Icon & hist. Malua silu. maior, & Malua silu. minor.

Camer. hort. Malua vulgaris duplex, maior & minor. Eidem ad Hist. Germ. Malua minor. Et Epit. Malua, Malua maior & minor.

Schvv. Malua silu. pumila albo flore *malva arvensis* Malua officin. Malua silu. procerior *malva arvensis* Malua silu. repens Cordi.

C. Bauh. Phyt. Malua. siue silu. folio rotundo. Malua Brunfels. Trago prima, Lob. pumila. Malua 2. siue silv. folio sinuato. Brunfels. equina.

Trago altera species. Lob. procerior: hac in genere domesticarum fuisse apud Veteres videtur: *Erupod math.* Malua i. sive sylu. folio rotundo quam Theophr. coqui & cibo idoneam esse scribit. *Figuram ponit ex Tabern.* quæ cum minore flore, cur autem potius eam quàm quæ cum maiori flore, igroro, satis magni videntur flores in figuris Matthioli.

Nemina
linguacum

Malua folio lineare flore maiore Græcis *μαλὴ* & *μαλὴ*, à Diosc. *μαλὴ* & *μαλὴ*, à nonnullis *μαλὴ*, quasi doloris mitigativa: item & *μαλὴ* & *μαλὴ*. O. *Utiaca*. Dodon. Germ. *Rospappeln* / S. *Joh. pappeln* / *trilde rorbe pappeln* Silef. Gall. *maulue sauvage*. Aut Malua folio rotundo flore minore, *Geng fâs* / aut *hasen pappel* / *flain vnder gemein pappel*. Belg. *flain Malouwe* / Gall. *petite mauve*. Montb. *des fourmagers*, Hung. *Köz malua*.

Locis &
tempus

Sylvestris Malua prior incultis locis exiit, solo tamen secundo, non sterili, iuxta vias, hortorum sepimenta, apertum, margines, locis nonnihil humentibus. Proxima non tardè in tuderibus, ac aliis perinde incultis ac neglectis locis reperitur. A Iunio mense in multam æstatem flores præfert, interea tamen semina rarum ad maturitatem pertuenit. Malua pingui delectatur loco, & humido, gaudet latamine hortorum. Malua Montpeli frequens: Basileæ florentem vidi Maio & Iunio ac Octobri, extra urbem & intra urbem. Lugduni & Genetæ proveniunt. Montbelgardi passim ac etiam in Horto Ill. E. Civitæque provenit spontè supra finem, aut culta in horto.

Vires &
Vitis

Vites ex Dioscor. & Galeno videant Lectores,

Tempera-
mentum

quas referendas existimamus ad modò prædictas nostras Maluas. Maluæ radix sicca [calida & humida, Port.] inquit Matthioli, die vna in aqua macerata, & deinde madida papyro circumvoluta, & sub cinere ferventi decocta, & iterum siccata, vtiliter usurpatur ad dentiticia: mundat enim affinitate dentes, & gypseam materiam solvit.

Drugs

Foliorum & radicum decoctum gargarizatu exasperatas fauces lenit, mucago verò acrimonias emendat: Fernefacta folia in cibum apposita ratiocedings expediunt, ex oleo autem, sale, & recentibutyro alium citant. Fit & solis cum salignis

Maluæ
radix

Ironidibus vitis præstantissimum medicamentum ad venenosorum mortus. Succus auribus instillatus dolorem sedat. Decocta vna cum radice ad lentorem visque datur potanda agrè parturientibus magno iuvamento: id quod etiam præstat

Maluæ
semen

lucetis scilicet pondere haustus. Semen ex vino rubro potum nauseam tollit. Cauliculi molles decocti delibratique comeduntur ex aceto, & oleo, & sale. Asparagorum in modum, prima statim mensa, ad citandam alium. In summa, Malua ad multa utilis est: ideoque non immeritò Antiqui

Maluæ
semen

Maluam omnimortuam [omnium orbicem] appellaverunt. Datur vtiliter succus potandus melancholicis sex vnciarum pondere, at infanientibus vncie octo propinantur.

Maluæ
semen

Ad raucedinem recipit Bapt. Codronch. aqua stillatiæ Maluarum 3vi. Aceti scyllit. 3vi. cuius porciunculam singulo die per horam vnam vel alteram, non semel ægrum per nares attrahere iubet. sed etiam bis, pñt opus sit. Et hoc erthinum à se experientià comprobatum scribit. Maluam

Maluæ
semen

vulgarem maiorem & minorem cum Allio vino incoquunt ad tertias & bibunt contra stranguriam: Hodie Maluarum decocto uti solemus in Clysteribus ad aluum ciendam & vrinam. Aelianus fatinà Maluæ succo suffusa lacertis & similibus insectis perniciem affecti perhibet.

Maluæ
semen

Ad raucedinem recipit Bapt. Codronch. aqua stillatiæ Maluarum 3vi. Aceti scyllit. 3vi. cuius porciunculam singulo die per horam vnam vel alteram, non semel ægrum per nares attrahere iubet. sed etiam bis, pñt opus sit. Et hoc erthinum à se experientià comprobatum scribit. Maluam

Maluæ
semen

vulgarem maiorem & minorem cum Allio vino incoquunt ad tertias & bibunt contra stranguriam: Hodie Maluarum decocto uti solemus in Clysteribus ad aluum ciendam & vrinam. Aelianus fatinà Maluæ succo suffusa lacertis & similibus insectis perniciem affecti perhibet.

Maluæ
semen

Ad raucedinem recipit Bapt. Codronch. aqua stillatiæ Maluarum 3vi. Aceti scyllit. 3vi. cuius porciunculam singulo die per horam vnam vel alteram, non semel ægrum per nares attrahere iubet. sed etiam bis, pñt opus sit. Et hoc erthinum à se experientià comprobatum scribit. Maluam

Maluæ
semen

vulgarem maiorem & minorem cum Allio vino incoquunt ad tertias & bibunt contra stranguriam: Hodie Maluarum decocto uti solemus in Clysteribus ad aluum ciendam & vrinam. Aelianus fatinà Maluæ succo suffusa lacertis & similibus insectis perniciem affecti perhibet.

Maluæ
semen

Ad raucedinem recipit Bapt. Codronch. aqua stillatiæ Maluarum 3vi. Aceti scyllit. 3vi. cuius porciunculam singulo die per horam vnam vel alteram, non semel ægrum per nares attrahere iubet. sed etiam bis, pñt opus sit. Et hoc erthinum à se experientià comprobatum scribit. Maluam

Maluæ
semen

vulgarem maiorem & minorem cum Allio vino incoquunt ad tertias & bibunt contra stranguriam: Hodie Maluarum decocto uti solemus in Clysteribus ad aluum ciendam & vrinam. Aelianus fatinà Maluæ succo suffusa lacertis & similibus insectis perniciem affecti perhibet.

Maluæ
semen

Ad raucedinem recipit Bapt. Codronch. aqua stillatiæ Maluarum 3vi. Aceti scyllit. 3vi. cuius porciunculam singulo die per horam vnam vel alteram, non semel ægrum per nares attrahere iubet. sed etiam bis, pñt opus sit. Et hoc erthinum à se experientià comprobatum scribit. Maluam

Maluæ
semen

vulgarem maiorem & minorem cum Allio vino incoquunt ad tertias & bibunt contra stranguriam: Hodie Maluarum decocto uti solemus in Clysteribus ad aluum ciendam & vrinam. Aelianus fatinà Maluæ succo suffusa lacertis & similibus insectis perniciem affecti perhibet.

Maluæ
semen

Ad raucedinem recipit Bapt. Codronch. aqua stillatiæ Maluarum 3vi. Aceti scyllit. 3vi. cuius porciunculam singulo die per horam vnam vel alteram, non semel ægrum per nares attrahere iubet. sed etiam bis, pñt opus sit. Et hoc erthinum à se experientià comprobatum scribit. Maluam

Maluæ
semen

vulgarem maiorem & minorem cum Allio vino incoquunt ad tertias & bibunt contra stranguriam: Hodie Maluarum decocto uti solemus in Clysteribus ad aluum ciendam & vrinam. Aelianus fatinà Maluæ succo suffusa lacertis & similibus insectis perniciem affecti perhibet.

Maluæ
semen

Ad raucedinem recipit Bapt. Codronch. aqua stillatiæ Maluarum 3vi. Aceti scyllit. 3vi. cuius porciunculam singulo die per horam vnam vel alteram, non semel ægrum per nares attrahere iubet. sed etiam bis, pñt opus sit. Et hoc erthinum à se experientià comprobatum scribit. Maluam

Maluæ
semen

vulgarem maiorem & minorem cum Allio vino incoquunt ad tertias & bibunt contra stranguriam: Hodie Maluarum decocto uti solemus in Clysteribus ad aluum ciendam & vrinam. Aelianus fatinà Maluæ succo suffusa lacertis & similibus insectis perniciem affecti perhibet.

MALVA STELLATA.

MAluæ pulchra species, cui *fontes tenues*, *Descriptio*
cubitales vel bicubitales, ramosi: folia



priora in tenella planta sunt ex longis pediculis parva, rotunda, serrata, ubi autem adolevit per ramos ex brevioribus foliis, in satis magna, in tres partes diuisa, quorum quoddam sagittam expriment: *se* per ingratum, nonnihil viscosum, *se* magnus purpureus striatus, quinque foliis cordatis constans: in medio pistillus albus ex multis apici-

bus constans: eius calyx prior membraceus vti & secundus, in quo cupides tres stellam quoddammodò exprimentes: *semen* quale vulgariibus Maluis. Tota planta hirsuta.

Argenturæ primùm vidi florentem & cum semine maturo Septembri, in horto D. Friderici Meier Argenturæ, qui Maluam stellatam nominabat, is semen à Domino Agerio vt audio accepit.

Locis &
tempus

Malua
stellata

MALVÆ TRIMESTRIS FLORE CVM vnguibus purpureis.

PEdali altitudine crescit hoc Maluæ genus, *Descriptio*
caule rotundiusculo, tereti, viridi, lanugine tamen aliquantulum obsito, quem raris & nullà certà serie distributa ambiunt folia, tenella, viridula supernè, infernè diluio-
ra infimo cauli adnata, circinata, semina sunt rotundiuscula, in ambitu serrata: suprenum caulem & ramulos amplectentia angulosa sunt, ad foliorum Althææ formam penè accedentia: flores summis ramulis inhiærent satis magni, quinque foliis extimè par-
te lunati, constantes: purpureiscentis coloris, vnguibus saturatiorè purpurâ in-



fectis, prodeuntibus ex vñbilio staminibus pallidis, villis purpureis: *semen* in foliaceis capitulis planum: *radix* est parva, candicans, tendi-

bus.

bus fibris prædita, annua tamen, aut potius tri-
mestris, quam subsequens hyems corrumpit.

Huius siccam plantam suis floribus ornata
& chartæ implicatam mittebat ad Clusium N.V.
Ioannes Hogelandys anno 1592. ex qua subie-
ctam iconem delineari curabat.

MALVÆ SPECIES COBES.

Descriptio
& Sycon.

Cobes, Maluz species non inelegans futura,
quantum ex rudimento colligere Camer.
hort. poterat, si ad frugem pervenisset, Clar. V.
D. Paludani ex Syria reducis munus. Semen re-
liquatum Maluarum semine minutius.

Cobes etiam semē ego quondam recepi, quod
latum in hortu Ill. E. C. Montisgardii, sed non
provenit.

C. Bauh. phyt. Malua nona Syriaca, Cobes
Camer. quod Paludanus ex Aegypto allatum,
Kobes nomine Patavij communicavit.

MALVA ROSEA SIVE HORTENSIS.

Descriptio



Hæc si, ut
Rosæ, na-
res conciliaret,
nulli dubium
quin de præstā-
tia & pulchritu-
dine cum ipsis
Rosæ certare
posset. Cæte-
rum Aculusculæ
magnitudinē as-
sequitur, stipite
crasso, solido,
hirsuto, recto,
rariis ramis ali-
quot brachiato:
folia alternatim
longis medio-
criter & lanugi-
nolis pediculis
ex caule oriun-
tur, singula, la-
ta, quinque fe-
rè divifuris obi-
ter insecta, in
ambitu crenata,
suprà atrouirē-
tia, infrà albi-
diora, utrinque
pilosa: ex quo-
rum alis flores e-
micant, successi-
vè plures, Rosæ
magnitudine &
colore, id est,
rubro, aut puni-
ceo, aut saturo
sanguineo, aut
carneo, aut al-
bo: ijque mo-
dò simplices
medium occu-
pante cono api-
culis sublatis

& purpurascens prædita, in multa foliola
flori cōcolora sese explicante: modò multiplici
foborum sætu luxuriantes: insident hi autem

calyci geminato, canā lanugine pubescenti, se-
menque post se relinquunt, in passilli formam
compressum. Radix longa, alba, lentum mu-
corē remittit, non alio quā Maluz sylvestris
sapore.

Huius etiā species invenitur folio amplo, ficus
profundè laciniato.

Cordo Malua hortulana, rara visu, ac quasi
ignota, & Romana Malua dicitur.

Trago in inscriptione Malua Romana, & in-
ter nomenclaturas, Rosa nobilis, Hortensis.
Malua, Metensium Rosa vitramarina, Malua
Theophrasti & Dioscoridis (apud quem huius
nominaliter sint) Anthema [à Pytha-
gora, Dodon.] Diadema [à Zoroastre] Chocor-
tem [ab Aegypto] Capra heni [ab Aegypto] Mu-
tis cauda [Vr. n. a. p. u. d. e. r. i. o. n.] Malua hor-
tensis: Malocha Veterum (quod videre sit in
Aulularia Plauti) Malua Romana Arabum, ano-
rum Molochia, Malucha aliorum arborea (cu-
ius semen Kizari Kaum vocant) Hebræorum
Chalmuth, & Harni, testē Aruch Monst. Est,
inquit in descrip. colore floris candido, roseo, ru-
bro, & ex utroque nigricante, simplici & multi-
plici horum textura. Hæc Tragus, ego non au-
sim asserere hanc esse Maluam Theophrasti, in-
clinat animus in aliam.

Fuch. Malua hortensis. Dioscor. & Galeni.
Corn. Malua [à Dioscor.] Malua hortensis.

Matth. Malua folio nigro flore Rosarum effi-
gie subente, candido, vel subrubro: Malua ar-
borea. Et in hist. germ. ut & p. st. com. cum ma-
gn. fig. Malua minor, & Malua maior altera. Be-
nè sibi consulunt Matth. qui in post. com. cen. &
Camer. in eundem Hist. Germ. quod in Epit. se-
cerat, Maluam, deam non amplius vocant ar-
boream, ac melius, quā eius Patromator.

Lacū. Malua hortensis, flore purpureo, &
albo: Græcorum Dendromatachæ, Lat. Malua
arborea. sed ut iam dixi, hanc Maluam nec ar-
boream, nec Dendromatachæm sententiam.

Dodon. gall. p. ngenti Malua triua: Lat. Mal-
ua hortensis, & Malua hortensis, multiplici flore:
de qua ait Ad differentiam aliarum Maluarum
[Malua hortensis] dicitur a nonnullis, et
Rosa vitramarina & Rosa hyemalis. Atque hæc
est illa, quam in Maluaceo caule fundi Plinius
tradit: folia oleracea (perperam in plerisque ex-
emplaribus, Olex, aut oleacea) habens, quam
Muscæon vocat. Appellari autem hanc Maluam
nominibus ex Trago adscriptis inter spuma Dio-
scor. reperitur.

Gesh. hort. Malua Romana quorundam, Ha-
stula regia Apulæ, flore candido & rubro, simplici,
vel multiplici. Et in cat. pl. Hastula regia Apu-
lei, Rosa Autumnalis vulg. Maluz genus [à Dioscor.]
quod non concedimus ipsi.

Re de meo iudicio dubitant Lob. & Pena in
Ad. Malua rosea fruticosa, an Galeni Arabis [à Dioscor.]
Lob. Obseru. & Icon. plant. duas ponit fi-
guras his titulis. Malua rosea fruticosa: Malua ro-
sea multiplex.

Camer. hort. Malua hortensis siue Romana,
Bismalua vulgi, flore simplici & pleno, multiplici
colorum differentia. Repertuntur enim candido,
dilutè purpureo, siue ut vulgè vocant incarnato,
rubro, puniceo, nigricante. Atque hæc posterior
differentia primo anno raro floret, & vix durat
ultra triennium.

Hist. Lugd. quinque proponit figuras, licet tot
non erant necessaria, sed his titulis: Malua ma-
ior. 1. 2. 3. Matthioli, Malua rosea simpliciore flore
Malua rosea multiplex Lobelin

Totidem & Tab. habet. Quarum: 1. Malva arborea, siue hortensis. 2. Malva arborea alba multiflora. 3. Malva arborea flore nigro multiplici. 4. Malva rosea multiplex. 5. Malva rosea simplex.

C. Bauh. Phyt. Malua 5. siue rosea folio subrotundo flore simplici, Malua hortulana Brunfels. Romana Trago, Rosea Lobelio: Hæc Malua satina est apud Antiquos: Malua quæ cultu arboriscit Theoph. Plinio Malope: flores candidi, rubentes, & hi modò saturati, aliàs purpuræ modo respluentes, non rarò omninò diluto colore: sic & ex rubro, nigricantes. Malua 6. siue rosea folio subrotundo, flore pleno, Lobelio Rosea multiplex, in flore multiplices differentia, hinc tres icones apud Tabern. Malua 7. siue rosea folio Ficus, Tabern. peregrina. Item Malua 8. siue arborea Veneta dicta, Arborea. Matth. Icon. quoad iconem: & Malua maior eidera fol. Lat. Malua maior vnicaulis Matth. Icon. quoad descriptionem: & Malua maior, altera eidem Lat. in folio. Eadem apud Matthiolum Malua 2. maior siue rosea folio subrotundo, flore simplici quæ Malua satina est apud Antiquos, & quam cultu arboriscere scribit Theophr. Malua 3. siue rosea folio subrotundo, flore pleno. Malua 4. maior altera siue arborea Veneta dicta flore æeruleo. Quis obsecro credet Maluam vulgarem siue stem latrone in Roseam mutatam, quis præterea vidit roseam in arborem transisse: aliam ego cum Theophrasto, Plinio, & Matthiolo vidi, non hanc.

Nomina *Malva pœgœa* Dioſcor. & *malva*, Dodon. Lat.
linguarum *Malva roſea*, ſeu *hortenſis*, Germ. *Berten*: vnd
 Rômiſch *pappeln* [*Romanæ*] herbſt vnd winter
 Roſen [*Rosa autumnalis, vindexialis, ſive hye-*
malis] Wnroſen / ac ſi Roſam honoris diceret,
 Belg. winter Rooſen / herbſt roſen. Gallis *Rose*
d'outre mer, Malue de jardin, ou cultivee. Ital. *mal-*
ua maggiore. Matth. in com. Ital. Angel. *bole boſc.*

Malua roseam ex semine variis in locis colle-
cto, ac etiam nobis misso, seminimus in horto E. C.
Montbelgardi, cuius diuersos habemus colores.
Geneua habui flore candido simplici [rubro sim-
plici, candido multiplici, & rubro multiplici, flo-
rentem Iunio ac etiam Nouembri. Basilea etiam
in hortis vidi, Patant in hortis, vt Musati. Bono-
nia in horto S. Saluator al burgo di S. Catharina.
Primo anno caules non profert sed secundo, po-
stea vt plurimum perit, fert alioqui hyemem.
Stutgardia in horto Ill. C. V. Vittemb. & in horto
ad fontem admirabilem cum variis coloribus
pleno & simplici flore obseruati. Apud Frider.
Meier florentem Septembri folio Ficus, flore co-
ruleo simplici, quam ex Italia missam dicebat.
Folii sapor viscosus.

Vitis & v. Malux hortensis flores coquant in vino veteri, vt legimus apud Camer. hort. quo porriginis abluunt & sanant. Vtuntur etiam ad erysipelatis rubores compescendos, imprimis rubentibus Rosis, imitati coloris similitudinem. Ego florum decocto sollicitè vtor in siccitate & ardore linguæ & faucium. Et quia in dictis floribus nullam agnosco adstrictionem, nondum intelligo, quo succellu Io. Liebaui ad fluxum menstruorum nimium Malux roseæ flores præscribat.

MALVA CRISPA.

Descriptio **A** Lutido hinc plantæ, licet breuioris vitæ,
quanta homini, caule crassiusculo, nonnihil
anguloso, viridanti, glabro, rigido, aliquantulum

concauo, & in ramos filio: *folia palmaribus*
dodrantalibus pediculis, alterâ parte hirtis, alte-
râ glabris appensa, latitudine memorabili, breu-
bus pilis donata, non tantum laciniata sunt, ve-

rum etiam cre-
bro flexu refle-
xique petiorum
crispa : *flores*
conferti, ad pe-
diculorum, quæ
folia sustinent,
exortum, breui-
bus plerumque
petiolis insi-
dente, haud ma-
iores quam
Malæ sylue-
stris pumilæ
seu proculatæ,
colore ex dilu-
tissimo rubore
albicante, ex
quinque foliis
compositi, caly-
cè hirsuto, vire-
scente, quin-
quepartito, in



quo succedunt in orbem congesta semina, Malu-
iam dicitur: radix subest dodrantalis aut longior,
alba, mediocriter crassa, sapore, ut & reliqua plan-
ta, glutinosa.

Lob. Obs. *Malua cristpa vulgi*, & , vt etiam Pl. Synon.
 Icon. *Malua cristatus oris*. Dodon. *Malua cristpa*. *Malua crist*
 Tabernacon. & Histor. *Malua cristpa*, *frass peps*
 peln. Casp. Bauhin. phyt. *Malua 4. siue solis cri-*
 spis.

Camer. hort. *Malua crispa* siue *laciniosa* Cor-
di, Arborefcere videtur, quamvis tantum sit
planta semestris, de qua scribit hæc, *Malua Orien-*
te Sole hiat, Occidente clauditur. Pythagoras, ut
refert *Alianus* *ἡνικα ἄρα αὐτὴν ἐπὶ τῷ ἱερῷ τῶν* [folium
Malua esse sanctum.] dixit lib. 4. variz. hist.] nimi-
rum quia mysteria sua in hoc olim scriptabant
sacerdotes. Gesn. hort. *Malua crispa*, *Malua Ro-*
mana quorundam: *Albua crispa* & maior *Ollin-*
gesi.

*Cordo in Diosc. *Malva hortensis*, *Malva Ro-*
mana: *Malva sinuosa* crispitudine, *Malva Dio-*
scoridis. Hanc idem describit in hist. sub titulo
Malva hortensis laciniisqz, cui Gesn. apposuit fi-
guram inscriptione *Malva hortensis* crispz.

Geneux mihi prouenit in horto, virens Octo-
bri & Nouembri, postquam semen pertulit e-
mortua, semine deciduo quorannis se propagat,
ac è semine deciduo prouenientem ibi vidi hye-
mem perferre. Basilea vidi in horto D. Dis Theo-
dori Zwinkeri, Montbelgardi in horto E.C. flo-
rentem vidi Iunio & Iulio.

Maluz crispz magnam emolliendi vim prx a-Viro
liis tribuit Camerarius.

MALVA ARBOREA.

MAlua arborea stipitem adolescit crasso, ligneo quaternum aut quinum cubitorum, perenni, folia amplissima, Malua repentis modo sinuata, sed lanuginosa Altheae mollitie, flores secundum stipitem Maluacei, parui.

Et hæc illa est Malua arborea, quam Rauvvolf.
Halepi ab incolis veteri Arabico nomine *haur*
dici scribit, sub cuius gratiola umbra deambulare
liceat. Idem meminit Malua arboreſcentis alte-
tius

LIBER XXIII

terius, qua Alceam arborescentem folio virente, inferius interpsi.

Galenus nostro iudicio hanc arboris generis vocat, cuius verba ante recitamus, ut & Plinius & Theophrastus.

Casalp. Malua quidam arborescens, & Anadendromalache Galeni.

Camer. hort. Malua arborescens.



Malua arborescens

Dendromalache

Malua arborescens

Malua arborescens

Malua arborescens

scens, Arborescens interdum ad 8. vel 10. cubitos assurgens. Tum alibi in Italia, tum frequens in itinere. quo itur Pisa ad portum Liburni ab eodem aliquando inuenta.

Grin. Malua arborescens. In Append. Malua Arborescens. Dendromalache Galeni.

Maluam quae in aliquibus locis in Italia arborescit, nil aliud esse quam sativam cultorum mangonio in tantam magnitudinem assurgentem ignoranter sibi persuadet Matth. dicit: Maluam quae in arborem degenerat, vidi Grignani ad Benaci ripas in quodam Monachorum cenobio, ubi eorum otio & cultu tantum sibi alceue rat amplitudinem. Hæcille. Ego verò facile dederim alicubi Maluam arboream ita humilem esse, ut in altum se non attollat, sed culturâ deinde arborescat: verum nunquam concesserim Maluam vulgarem siue magno, siue paruo flore arborescere: colant Glossatores & Patrocinatores Matthioli, videbunt quid impetrabunt: culturâ maior euadet & etui aptior, sed arborea nunquam fiet, nec etiam eundem florem nanciscetur, ut rectè etiam statuunt Lobelius & Pena.

Primo vidi Esslingæ apud insignem Pharmacopœum Volmarium: postea Monspelii in quibusdam hortis. Creuit mihi Geneux in orto: Basileæ Frater C. Bauhinus habuit in orto. Montbelgardi à me lata in orto E.C. primo anno creuit, ad altitudinem quinque cubitorum circiter: reposita, floruit sequenti anno: flores parui: aliquot annis durat, modò diligenter reponatur.

ALCEA VETERIBVS.

CAP. II.

Quæ inter se affinia sunt, quasi catenâ quadam merito connectuntur, atque hinc Alcea & Althæa seu Bismalua de necessitate Maluarum tractationem quoque consequuntur.

Alcea igitur, auctore Dioscoridē, & hæc sylvestris Maluæ species est, habens folia fissa, ad verbenacæ foliorum similitudinem: caules tres aut quatuor [foliorum plenos addit Plin.] qui corticem Cannabi similem habent: florem paruum Rosæ similem: radices albas, latas, quinque aut sex, cubitales, obliquas adiungit Plinius, qui eam nasci scribit in pingui solo, nec in secco.

Radices, inquit Dioscorides, cum vino aut aqua potæ, dysentericis ruptisque medentur. Plinius: Vfus radices ex vino vel aqua dysentericis,

aluo citæ, ruptis, coarctatis. Et Alceæ radix collectiones discurrit. Et paulò post, Spasticis, tremulis, opisthotonicis Alceæ radix bibitur ex aqua multa. Sic & rigores excalfacit. Et Alceæ licet farina torminibus pota cum vino resistit. Genus Alcea in simplicium catalogo prætermisit. Paulus ex Dioscoride, Alceam sylvestris Maluæ speciem esse dixit, quæ cum vino pota dysenterias & rosiones sanat, & magis ipsius radix. In hoc tamen Paulus à Dioscoride & Plinio dissidet, quod dicit, id est, rosiones, habet pro his quæ ruptæ, id est, rupta, Diosc. & Plinius appellauere, ut fortasse patet in Paulo, pro his legere oporteat.

Paulus l. 1. c. 1.

Paulus l. 1. c. 1.

Paulus l. 1. c. 1.

ALCEA VULGARIS.

Esquicubitalem & maiorem altitudinem ubi saltequitur, est caulis hirsutus, asperis, fungosa medulla factus: folia Maluæ vulgaris sunt, etia,

Descriptio



maiora, ad pediculum vique plerumque in tria, quinque, aut sex segmenta diuisa, atro-virentia, hirsuta: & ex corticis alis, pediculis quadrantalibus. hirsutis appenduntur flores rosei speciosi, purpurascens carneæve colore, quinque foliis striatis compositi, quorum medium occupat racemulus apiculis albicantibus: semina coniun-

cta compressi cascoli formam amulantur, ceu vulgaris Maluæ: radix digitalis longa.

Cordo, Trago, Fuchl. Mauh. Apollini, Fuchl. Hærchio, Lonic. (cui etiam Herba Simeonis, sed eius icon mala,) Dodon. gall. & Lat. in fol. vbi & speciei minoris meminit, & Casalp. Alcea.

Synon.

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Herba Simeonis

Brunsell. Alcea Dioscoridis. & Herba Simeonis dicitur: Ruellio, Rustica Althæa, vel Bismalua sylvestris. Trago Alcea, sylvestre Maluæ genus, Malua altera, Malua sylvestris. Barbari Cauda Leonis, & Peristerion quorundam. Corn. Alcea Officinarum & Herbar. Malua, & Maluæ sylvestris. species. Io. Agric. Vngarica herba, Throd. Dorst. Dens Leonis, Hermannii Comitibus à Nouenare Lagopoda Dioscoridis.

Alceam, inquit Matth. passim serè in Italia, alij Bismaliam, alij Maluam sylvestrem, nonnulli etiam Maluam agreste nominant: Alceæ Galenum meminisse non reperio, nisi lib. 7. simplic. vocet Maluam sylvestrem.

Ait Cronemburg. de comp. med. Alceam Dioscoridis quosdam perperam Maluam Theophrasti existimasse.

Amat. in Diosc. Alcea, Herba Hungarica. Item cent. 2. curat. 33. Alcea, Malua Vngarica.

Anguill. Cannabin sylu. facit, ac dicit, Herbarij vocant Hungaricam, alij Alceam: quam vis autem non sit Alcea, conantur tamen demonstrare descriptionem conuenire.

Cæterum, variæ etiam sine Cannabis sylu. dicitur, quod (ut Dodon. vult) ex cortice, Cannabino persimili, funes intorqueri queant.

Cannabis

Cannabis

Cannabis

Cannabis

Cannabis

Cannabis

Cannabis

Cannabis

Lobel. & Pena in Adu. Vulgaris Alcea, 8a Malva sylvestris. Lobel. Obs. & Icon. Plantar. Hort. Lusit. & Chuf. hist. post. Alcea vulgaris.

Hist. Lugd. Alcea Matthioli : Alcea vulgaris Lobelij.

C. Bauh. Phyt. Alcea. 1. siue vulgaris maior.

Schvv. Maluam sylvestrem, Alceam dictam scribit & a tunc a colore, quod firmiter dy-
senteria & ruptis incedatur, Rothe pappeln/
berg leudte.

Nomina
linguarum

Malva Græcis & Alcea Latinis. Germ. Sigmars murg, Sigmunde murg, Sachleudren/
wilde pappeln/Schvv. augen pappeln/ Baunfell,
felix Cordo, vulgè Herba Sinedonis, Belg.
Sigmars cruyt. Gall. Bimantue vel Guimantue
savage. Ital. Bismalus, Malua siluatica, Maluanif-
co saluatico, Buon vischio. Hsp. Maluan mtesina,
& Malua di Ingeria. Boh. Felxß loren Jan.

Locum &
tempus

Alcea vulgè prouenit Montbelgardi extra mu-
ros horti Illust. E. C. & prope pagum Nimmis in
Comitatu Montbelgardenli, int. r pontem l'an-
tancourt, & Dampierre florens luto; copiosè cir-
ca Mathas Castellum : Mihi visa est etiam Mon-
pelij ac Genex. In Ducatu VVircembergico
ad fontem Admirabilem florens Augusto mense.

Rur. gotam dicit Schvv. in cultis campis, agrorum,
scrobiumque marginibus, iuxta vias se-
pes, & senitas; fluit Junio & Augusto.

Vires.

Ex emplasticorum medicamentorum numero
esse Alceam, & folia quæ glutinosum quid ac len-
tum habent, & etiam radix ipsa, quæ glutino-
sa, dulcis & modicè adstringens apparet gi-
stantibus, abundè monstrant. Hinc satis con-
stat Alceam citra insignem, tum caliditatem, tum
frigiditytem siccare, ac planè emplasticorum con-
sistentiam obtinere. Celebratur ad caliginem
oculorum ab empiricis, ut non desint qui credant
radicem Alceæ, è coilo suspensam aciem oculo-
rum supra modum acutere, & tueri posse. Et hinc
fortè nomen indeptum germanicum Rothe-
pappeln : Sylvestre Maluæ genus, quam Alceam
vocari Tragus dixit, si herba & radice vino vel
aqua decoctum bibatur, torminibus intestino-
rum remedio est, ruptis & conuulsis conducit, &
opitulatur. Breuiter, Malua Romana, Alcea,
Malua vulgaris, & Hibiscus, omnibus calidis do-
loribus totius corporis apprimè conducunt.

Caligo ocu-
lorum

Inflamma-
tiones.

ALTHÆA SIVE BISMALVA.

CAP. III.

Descriptio

EX Malvarum familia prærogatiuam tulit Al-
thæa, utilitatis multiplicis nomine commen-
datur, radicibus multis nixa, benè habitis, albis,
mucagine lentâ, quam mansu macerationeue de-
ponunt, turgidis : caules bicubitales & procerio-
res, teretes, tenues, hirsuti, angusto tubulo peruii:
in quibus folia alternata Maluæ vulgaris longio-
ra, sinuosa, serrata, mollicello tomento incana, ex
alio flores proferunt, Maluæ vulgaris surrectæ, co-
lore albo tantillum ad carneum declinante, quin-
que foliis constantes, in quorum medio stylus 4.
apicibus purpurantibus & obsol. tis floridus eri-
gitur : semen pastilli compressi rit u vt in vulgari
relinquitur.

Alcea Dios-
coridis.

Dioscorides Althææ folia tribuit, vt Cyclami-
no torrida, lanugine canescentia : florem roseum:
bicubitalem caulè : radicem lentam, intus albam.

Hibiscus
Theoph.
Hist.

Theoph. de Hibisco inquit: Folio Maluæ, ma-
iori tamen, pilosiorique: caulibus mollibus gustu

Maluæ: flore melino: fructu Maluæ: radice fi-
broso, alba.


E sylvestribus (Maluæ) inquit Plinius : cui
grande folium, & radices albae, Althæa voca-
tur.

Synonyma vt & alia nonnulla in appendice huius
libri traduntur.

Græcis δὲ ἰσηράκη & ἀλθαία ὀνόμαζαντες:
Arabibus, Chirimi, Charimi, Chalchimi, & Bese Za-
mini : Germ. Zbisch & Zybisch / beywurz, & So-
dwurz & Sammetpappeln. Belg. witte hancst/
vande witte

Malua
Plin.

Nomina
linguarum



Malhe : Gall.
Crimulue,
quod glutinosum
fit Malua : Ital.
maluanifco Hsp.
Herba cananien-
ra & Marmaric-
Angl. Widshe
Malow : Boh.
wysoly Sles.
Hung. Feyer
Maluash. e. al-
ba Malua &
Mazola.

Copiosa nux-
est Montbel-
gardi proci-
pens Maio, flo-
rens Junio, in
Horto E. C. no-
stra opera ha-

Locum &
tempus

betur etiam in aliis. Monspelij obseruauit spontè
prouenientem prope mare : Basileæ, Genex &
Legduni in hortis. Nascitur locis vliginosis &
pinguibus, humentibus, & paludibus præter
in fossis. Floret Iulio & Augusto mense.

Multiplicem eius in medendo usum ævulsi-
tem declarat Dioscor. his verbis : Decocta Al-
thæa in vino aut aqua multa, aut per se pota effi-
cax est contra vulnera : item ad strumas, paroti-
das, abscessus, mammarum inflammationes, con-
tusiones sedis, inflationes, neruorum rigores : si-
quidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad ci-
atricem perducit. Cocta, vt dictum est, adiecto
suillo adipe, aut anserino, terebinthinae, vt
malagmatis lentior fiat, facit ad vulus inflama-
tiones, præclusionesque in pectus tubercula. De-
coctum eodem fungitur munere : onera vulus,
reliquiasque à partu extrahit. Decoctæ succus
ex vino potus succurrit vrinx difficultati, calculo-
forum cruditatibus, dysentericiis, ischiadicis,
tremulis, ruptis.

Plinius Maluarum usum Medicum (de quo iam
diximus) suscipi persequutus, tandem addit, Al-
thææ in omnibus supradictis efficacior radix,
præcipuè conuulsis ruptisque. Cocta in aqua
aluum sistit. Ex vino albo strumas & parotidas
& mammarum inflammationes tollit. Panos il-
lita. Eadem arida in lacte decocta, quàmlibet
perniciosa tussi medetur. Hippocrates vulnera-
tis, sitientibusque defectu sanguinis, radicis deco-
ctæ succum bibendum dedit : & ipsam vulneri-
bus cum melle & urina, item contusis, luxatis, tor-
mentibus, & musculis, neruis, articulis impositam
& asthmaticis ac dysentericis in vino bibendam
dedit. Mirum aquam radice ea addita addensari
sub dio, atque lactescere. Efficacior autem quod
recentior. Hæc Plinius, quorum quedam etiam
Dioscorides habet. Verum quod aquam radio

Malua
Plin.

Vulnus

Althæa

Althæa addensati atque lactescere dixit, idiam ex Dioscoride atque Theophrasto protulimus, ut ex his non immerito dubitet Cornarius an lactescere rectè in Plinio legatur, & non potius lentescere, aut coalescere. Idem Plin. quilla de Althæa prodidit seorsum aliquot locis de Ibisco, ut ab Althæa diverso scripsit. Hibiscum, inquit, à pastinaca gracilitate distat, damnatum in cibis, sed medicinz utile. Et Pastinacæ simile Hibiscum, quod Molochen agnam vocant, & Aristolochiam, viceribus cartilaginis, & ossibus fractis medetur, solia eius ex aqua pota alnum solvunt, serpentes abigunt. Apum, vespærum, crabronum ictibus, illita medentur. Et mox, Celsus & podagris, quæ sine tumore sunt, radicem eius ex vino decoctam imponi iubet. Et medetur lichenibus Hibisci radix cum glutino & aceto acri decocta ad quartas. Quæ in re Plinio aperte refragantur Dioscorides & Galenus, cæterique Græci, qui Althæam Ibisicum siue Ebiscum vocauerunt. Sic enim Galenus. Ebiscus siue Althæa, est autem Malva agrestis, facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmonem leuandi, mitigandi, concoquendi difficiles coctu abscessus. Radix portò eius & semen cætera quidè pari foliis modo agunt, verùm tenuiorum partiù, magisque ex siccatoriam, adhuc magis extensoriam facultatem, ostendunt, ut & vitilignes detergant, & semen renum calculos confringat. Ac radicis decoctum ad dysenteriam, diarrhoeam, & sanguinis reiectionem aptum est, nempe cum adstringentem quandam facultatem habeat. Et de Maluis agens. Huius generis est & ea quæ Dendromalache nominatur: sed efficacissima prædictarum in digerendo, appellatur etiam Althæa.

Aquà destillatâ Althææ erosiones intestinorum ex dysenteria, aliaue cholera causa profectas per sanat; Tragus: asthmaicis propinatur vtiliter. Radix minutim concisa, inque lacte aut aqua decocta, quousque in pulcem euadat, & emplastritu imposita emollit, & maturat quæcunque vlcera, quæ spontè sua suboriantur, quale id est quod in manibus si penumerò nascitur, & à Germanis Das Misset nuncupatur, nec non alia huiusmodi, quacunque corporis parte oriuntur. Oleum ex foliis Althææ compositum, omnes apum & vespærum aculeatorum ictus per sanat, illitu. Idem possunt folia per se. Semen in puluerem redactum & cum rore, qui Maio mense excipitur, temperatum, vitilignes & maculas faciei emendat. Radix aut semen in aceto decocta ac calida in ore retenta, dolori dentium auxiliatur: proinde apud Medicos equitios magni nominis & usus est hæc radix. Hæcille. Tumores duri si sint minores tolli tradit Saxonia impositâ radice Althææ macerata in aqua ardenti, aut Oxymellice.

ALTHÆA PROFUNDE SERRATO siue dentato folio.

Descriptio Nominè Althææ Thuringiæ accepit Basileæ à Richnero Althæam [de qua iam habebam portionem nomine Althææ Thuringiæ Camerarii, ni fallor, inter Cherlerianas Basileæ asportatas] folio molli, hirsuto, vulgatis æmulo, pulchrè tamen laciniato, profundè & tenuiter serrato: flore mascululo, rubente, stilo apicibus ornato purpureis vel nigricantibus.

Ab Clusio Pannon. Althæa laciniato folio siue tertia: & Hist. post. Althæa Pannonica 4.

cuius folia sunt incana & mollia, in tres lacinias maiores diuisa: flores etiam paulò minores [quæ in Pannonica] Belgicæ floribus magnitudine

respondentes, sed colore differentes, nempe qui toti carnei sunt siue incarnati, multis intus flammibus nigricantibus: cæterà vulgati similia: gaudens humilis (in Pannonia) locis & secundum rivulos sitis, florentque Iulio. Cal. Bauh. Phyt. Althæa tertia, siue laciniato folio, tertia Clusio.



ALTHÆA FLORE GRANDI ALCEÆ, Thuringiæ Camerario.

DE hac Althæa flore grandi Alceæ, seu, ut in Iconibus ab ipso inscribitur, Althæa Thuringiæ, dubitat Camer. hort. an altera sit fortassis, aut tertia ex Pannonicis Caroli Clusii? Sed dubii sumus & nos, relinquimusque aliis liberum certiora perquirere. An igitur Clusii Althæa

Pannonica 2. seu Althæa aliud genus, quod licet foliis totaque reliqua facie cum vulgari conveniat, maiusculos tamen flores habere videtur? An verò Althæa Pannon. 3. vel tertium Althææ genus, de quo sub præcedente diximus?

Cal. Bauh. Phyt. Althæa 2. siue flore maiore. Althæa altera

Clusii. Althæa Thuringiæ Camer. Hanc D. Doldius Norimbergæ misit: ac similem Monspelio à Io. Heinricho Cherlero habemus.

ALTHÆA SPECIES VULGARI similis.

Althæa Pannonica tertia Clusii hist. post. forma non valdè dissimilis Pannonicæ 2. (siue flore grandi,) sola in floribus differentiâ, qui minores sunt, vulgari tamen floribus aliquantulum maiores.



ALTHÆA ARBORESCENS

Descriptio



In arbutulæ proceritate excrecit Althæa, ob id arborescens dicta, stipitibus lignosis, firmis, cortice tomentoso vestitis: folia Malvarum minorum magnitudine, aliâ leviter sinuata, aliâ Althææ modo, in nonnullis oblongas lacinias cæsa, candidantia, lanuginosa, pediculo satis longo, viloso, nixa: ex quorum alis ex-

oriuntur flores Malvæ vulgarioris succedæ pares, purpurascens vnguibus & ad radicem hirsutis, folioso hirsuto calyce, in quo postea orbiculos circumæctorum seminum nigrescentium pellicula alba contextorum increlescit.

Synon.

Althæa fruticosa Clusii

Lob. mutatur

Alcea cannabina

Clusius reprehenditur

Lobel. Obs. Althæam arborescentem, seu Althæam fruticem Clusii eandem sanè existimat, cum Althæa arborescente in Aduersariis descripta. Clusius autem suam Althæam fruticem 1. seu Althæam fruticantem, à Lobelii Althæa arborea differre scribit, ac ait. Quam Lobelius Althæa arborea nomine exhibet, ea nobis aliquando Melchliniæ semine peregrinè misso prouenit, Stoloniibus singulis annis Hyeme marcescentibus, &c. Ast semen quod misit Clusio, non fuit Althææ arborea Lobelii, ei enim stolones non pereunt Hyeme. Ea de qua loquitur Clusius est Alcea Cannabina. Scio ipsum perseverare in sua opinione & Cannabinam suam ab ea separare, quam Lobelii putat arboream: an bene iudicent alii, de Cannabina plura sub Alcea.

Idem rursus Lobelii in Icon. plant. diuersas statuere videtur, siquidem eas separat, ac sub diuersis titulis sculptas proponit. Nunc enim Althæam arborem Olbix in Gallo prouincia: nunc fruticem Clusii, vocat.

Consultur sibi hac in parte Compilerator Hist. Lugd. qui Clusii Althæam fruticem 1. & Pechæ & Lob. Althæam arboream, eadem tabellâ comprehendit, ac Althæam lignosam Dalechampii cognominat.

S. B. var.

Contrâ, sed malè Casp. Bauh. Phyt. Althæam 4. sue frutescentem folio rotundiorè incano: Althæam fruticem Clusii & Lobel. in Obseru. Althæam lignosam Dalechampii, ab Althæa sua 5. sue Althææ arborecente folio acuto, Althææ arborea Olbix Aduers. separat, ac dicit: Hanc licet Lobelius cum præcedente eandem faciat, diuersa tamen est: vtramque habemus: huius enim flores minores, folia etiam non ut præcedentis mollia nec rotunda, sed acuminata &c. quod ex figura facile est colligere. sed si C. Bauh. figuram Lobelii in Aduersariis diligentius considerasset, deprehendisset vique eam non esse bonam, sicuti plures minus bonas habet. Sunt nobis rami ab ipso Lobelio dono dati nomine Althææ lignosæ propè Hieres ad iustam arborem

prouenientis, in quibus folia superiora in tres partes acutas diuisa, in cæteris non differentia: mihi data etiam per Valerandum Dourez, & ea, quam hætenus obseruavi, ita ut mihi persuaderè, ac cum ipso Lobelio, cui potius credendum se interpretanti, eandem Lob. in Aduers. & Clusii: variare autem arboream Althæam etiam in eadem planta ut faciunt cæteræ Althææ ac Malvæ. Flores in pictura Aduers. ex sicca planta malè picti satis demonstrant non minores fuisse, quam in Clusii figura: nec etiam si rami ex planta quæ in Prouincia prouenisset paulò minores haberet flores; ac folia minus mollia, sed paulò rigidiora, hoc faceret differentiam: vidimus quod die quantum immutentur apud nos plantæ, quorum semina ex calidioribus regionibus delata: anni quoque tempus facit mutationem.

Aliquando recepi Lutetiâ à Domino Rasse semen cum hac inscriptione: Althæa frutex, ex quo aliteres magni ex Oriente flore rubro: fortè floris colos, præter magnitudinem aliud genus à præcedenti denotat.

Tabernæ Hist. & Ic. in quibus mutata est nonnihil prior icon, vnius plantæ, Althææ arborecentis Lobelii, & Althææ arborecentis Clusii, duas habet figuras, cum tamen vnica sufficisset.

Collegi Stutgardiz in horto mense Nouembri semina, quæ Montbelgardi in horto Ill. E. C. fata, ex quibus excreuerat ad altitudinem duorum hominum pulchra sanè arbor quæ hueme domo resecta conseruatur, & folia retinet, & denuò Maio floret. Eam etiam vidi Pfortzemi D. Göttingen in horto pharmacopæi. Basileæ apud Dominum Zvingerum: Lutetiæ in horto Robini nostri. Quibusdam in locis, teste Lobelio, & seruidiore celo [quale in marinis Gallo-prouinciis ad Olbiam] prouentu tanto fruticat, ut ad sepes constituendas satis sit. Tandem iuxta urbem Horuelam extremis limitibus Valentini regni Murciano finitimi obseruauit Clusius, Martio florentem, an verò perpetuâ esset fronde, cum Hispanicarum stirpium historiam scripsit, ignorauit. Multis autem post annis, ex ea stirpe, quæ à Ioh. de Casabona nulli Francofurti ad Mœnum nata est, deprehendit plantam folia non abicere nisi aliis nouis enatis, ut pleræque stirpes perpetuâ si dè virentes facere solent. Frigidioribus etiam locis hyemem perfert.

ALTHÆA SPECIES, QVIBUSDAM ARBOREA ALTERA, VEL BRYANÆ FOLIO.



Anno 1602. prouenit nobis in horto Montbelg. foliis rotundis, quæ reposta hiemem pertulit & excreuit anno 1602. ad altitudinem hominis, foliis & floribus paulò minoribus: caule ex viriditate lucete: ramis veluti farina aspersis, quibusdam ex superioribus foliis subius magis candidibus, quibusdam

quibusdam longiusculis sine laciniis.

Anno etiam 1602. verno tempore Seta, ad altitudinem pene cubiti excreuit, cui folia ex longis pediculis rotunda, coloris Althææ, in ferna parte candidiore, caulis tomento candidus.

*De Althæa
Ficus Clu-
sij*

De hac fortè Clusius hæc scribit. Nata forsitan hæc planta [Althæa frutex 3.] semine, quali me donabat superiore anno Ioseph. à Casabona, Althææ arboris duorum generum appellatione, recens ab ipso in Creta insula collecto. Vni ex alpiis quibus communicabam, prouenit planta, quæ sequente anno, valde adoleuit: nam ramos protulit bicubitales, cortice viridi teetos, cui inspersa est plurima incana lanugo, seu potius tomentum, ut in priore quod descripsi genere: folia etiam habet incana, angulosa, & per oras dentata, illis tamen maiora: flores minores, Althææ vulgaris florum magnitudinem vix superantes, quinque foliis constantes, instar reliquarum Malvarum, coloris rubri valde diluti, & ad carneum (si ita vocare licet) inclinantis, multis staminibus ex albo pallecentibus, in oblongiusculo & crassiusculo stilo nascentibus, & umbilicum occupantibus: floribus defluentibus succedunt plana capita, ut in vulgari Malua, semen in orbem serie quadam distributum continentia.

*Synon.
Camer. Hort.*

An Camer. Hort. Althæa arborescens, vel potius fruticosa perennis planta, alia ab Hispanica Clusii, & fortassis eadem cum Prouinciali Penzæ, sed non exquisita picta. Ego Hispanicam Clusii & Penzæ eandem puto, diuersam ab hac, nec hanc etiam ad Tabernamontani arborescentem refero, sub cuius inscriptione eam anno 1595. Heidelbergæ communicaram memini.

C. Bauh. phyt. Althæa 6. siue fruticans foliis Bryoniæ perennis. Ramum ex horto Domini Camerarii ad nos misit, inquit is, Doctor Doldius arborescentis semperuicentis nomine, cuius etiam sit mentio in horto Camerarii p. 12. Althææ arborescentis nomine: at ne quis cepeat eandem cum Althæa arborem Olbiæ Lobelii.

*Locus &
tempus.*

Mihi missum semen per Dominum Christophum Schvartz Stutgardia inter semina quæ pro Creticis miserat: Dominus Casabona idem mihi transmisit, cui titulus erat, Althæa arborea 2. ex Candia, foliis ad satis amplam magnitudinem excrecentibus. Argentina vidi in horto D. Frederici Meier florentem Septembri, Montbelgardi in horto Ill. E. C. prouenit, & reposita sequenti anno floruit Augusto, Septembri, & Octobri, sed semen non maturuit propter Aestatis & Autumni pluuiosam constitutionem.

ALTHÆA SIDA DICTA QVIBUSDAM:

Descriptio.

Sida nomine planta folium habet circumscriptiōe Abutili putati, ex rotundis in acutum mucronem desinens, delictum, molle, villosum, & per ambitum serratum. Flos magnus Maluæ roseæ florem æquat, oblongus in sicca planta, staminibus in medio longis, colore prædictus, ut voluit Adversaria, purpureo, saturatiore quàm Prætoris aut Maluæ sativæ, aut Cytini, iuxta & in summis canticulis videntur tempore vindemiatum utriculi rotundi, oblongi, phæo, vel pullo colore, Aristolochiæ effigie, prægnantes Smyrni semine, aut Milii colore & magnitudine. Radix hortensis Maluæ: canis cubitorum duorum.

Dodon. Lat. in folio, Althæa 2. Althææ peregrina quædam species apud Belgas tantum hor-

tensis: fructu tuberoso, rotundâ serâ ac globosâ, quinquangulari tamen specie: radice quali Althæa. Nonnulli, inquit, Sidam esse volunt. Sed quia Sida aquatilis est stirps, capite quàm papa-

ueris maiore, ut Theophr. testatur lib. 4. idem Sida Theophrasti ad Nymphæam referenda.

Lob. & Pena Adu. Althæa palustris Cytini flore, Sida Theophrasti exstimata. Obseru. Althæa palustris Cytini flore. Et: Althæa hortensis Dodon. Sida Theophrasti propior palustris planta. Ic. Plant. Althæa palustris Cytini flore, Aristolochiæ utriculis.



Figura Lobelii nullam plantæ quam hic tradidimus partem bene exprimit, Lobelium tamen intelligere plantam de qua agimus satis apparet, cum ait, Althæam esse hortensem Dodon. apud quem figura mihi placet.

Nec meliorem Lobelio Tabern. Icon. & Hist. nomine Althææ palustris, Wasser Eibisch/ exhibet.

Casp. Bauh. phyt. Althæa 7. siue palustris. Sida Theophrasti maior Beabbi.

Nobis prouenit in horto Ill. E. C. Montbelgardi: verum non floruit aliquot annis reposita duravit, quotannis caulis exsiccatis.

ALCEA ARBORESCENS GLABRA; Kethia dicta.

Fruticis modo assurgit, stolonibus lignosis, cortice nigricante obductis, quali etiam vestiti



rami, in quos stolones diuiduntur: his nullo ordine distributa adnascuntur folia, angulosa, in paucas lacinas dissecta, in ambitu serrata, superne admodum viridia, inferne quodammodo pallecentia: summis ramis innascuntur flores Roseæ instar ampli, elegantes, quinque foliis constantes, albis, quæ multis purpureis venis

prædita sunt: ungues purpurei floridore, quam in

Sabdarifa flore, & infecti: ex umbilico prodeunt multa stamina flaua, & stilus albus multifidus. Semen non vidimus. Radix crassa, longa, intus, vt & caulis albicans.

Synonyma Camer. hort. Alcea arborescens, cuius dupli-tem inter icones figuram habet eodem nomine, ac em: Rauuolfium meminisse dicit in suo itinere nomine Maluæ arborescentis. Ego autem huc non refero Maluam arborescentem Rauuolfii, sed ad veram Maluam.

Idem minor. C. Bauh. Phyt. Althæa palustris septima altera, flore minore ex albo, &c. Eidem Alcea 3. siue arborca. Alcea arborescens Camerarii, quorundam Kefnia Syrorum dicta. Item: Alcea 7. siue Syriaca Lutetia habita à Robino. Hæ mihi vna planta non tres, donec demonstretur discretimen.

Impet. Chetmio planta Syriacæ dicta species Althææ, fruticosa, quæ in Syria colitur ad oculorum oblectationem. Chetmio planta Syriaca & Cretea species Alceæ arborescentis. Clus. Althæa frutex 1. Rarum & elegans, seu tertium Althææ fruticans genus.

Locis & Tempus. Pulchram hanc plantam primum vidi Lutetia in hortu loh. Robini hortulani regii. Postea nomine Ketmiz in hortu D. Frid. Meyer Argentunæ. Vidit in hortu D. Iacobi Zvingeri Bileæ: ac eius ramum habeo cui Frater Casp. Bauhinus ascripsit nomen Kermia & Sida nuntius Theophr. Bembo.

ALCEA PENTAPHYLLI FOLIO vel Cannabina.

Descriptio.



Herba hæc hominis altitudinē excedens, collisilis est asperis, lentis, in plures ramulos diuisis: folia Cannabinis suis similia, ex pediculis brevioribus, in tres partes secta longas, mediam longissimam, reliquis utrinque breviores, quæ sæpe iterum in minores subdividuntur: sic non tantum

tripartita, sed modò quinquepartita, diuersimodè crenata, hirsuta, nigricantia, minus aspera Cannabinis, sapore viscido: flores interdum singuli, interdum binii longis pediculis vel ramulorum potius extremitatibus Alceæ vulgaris similes, minores tamen, quibus exidentibus succedunt capitula, qualia in Malua vel Alcea, parua, foliis obuoluta, in quibus semina Maluæ crispæ, nigra: radix perpetua, cuius pars vna maior, alia minor, exterâ & intus alba, gustu admodum viscido.

Synonyma Quamuis Alceæ alteri satis cognoscatur Alceæ descriptio apud Dialc. & Plinium, magis tamen videtur Galapino conuenire Cannabis sylvestris.

Camer. hort. Alcea Cannabina, secundum nonnullos Cannabis silu. Diosc.

Lob. & Penz. Aduerl. & Icon. Plant. Alcea fruticosa Pentaphylli folio.

C. Bauh. Phyt. Alcea 6. siue Cannabina, Cannabis silu. Dioscoridis.

De hac Clus. in Hisp. & Hist. post. in sol. scribit, nomine Althææ arborca Lobelii. Quidam doctissimi inquit, Lobelius Althææ arborca nomine exhibet, & nobis aliquando Machliniæ nata semine peregrinè misso, feliciter prouenit, atque ex radice crassa & lentâque, qualis in Althæa vulgari, durior tamen & quodammodò lignosa summâ parte, aliquot stolones protulit humane proceritatis, qui adueniente brumâ marcescebant, singulis dein de annis nouo vere plures protrudebant: flores Augusto demum producentes, semen Septembri: quo à venis excusso & deciduo, alia etiam stirpes spontè renascebantur. Quod verò non sit Lobelii Althæa, quod sibi falsè persuadet Clusius, vel ex eo manifestum sit, quod in Lob. Althæa stolones non marcescunt, nisi tota planta simul pereat. Et hæc ab hac Alceam fruticolam cannabino folio capite sequenti separet, ei tamen assentiri non possum, quamuis quod de flore maiore scribit nostræ plantæ non conueniat. Ceterum Icon, quam proponit Clusius, est eadem cum iconè Cannabinæ Alceæ Lobelii.

Nata mihi est in hortu Ill. E. C. Montbelgardi, ex semine Pataulo à Cl. vito D. Iac. Antonio Cortuso misso, nomine Cannabis sylvest. quorundam addente, nec Althæam, nec Alceam esse. Semen maturat Augusto & Septembri, quo tempore florentem adhuc obseruavi. Missum est & eius semen Sturgardiâ nomine Alceæ Venetæ. Primum autem visa mihi est in hortu D. Cortusi.

ALTHÆA THEOPHR. FLORE LVTEO, quibusdam Abuilon.



Cum Althæa vulgari de mollitie palmâ certat, quod Abuilon vocat, radice parua, albâ, fibris aliquot adnatis donatâ, subdulci: caulis foris tomento molli totus est oblitus, pingue quid attrectatus manibus alinens, incanus: cortici, qui facile delibatur, subest lignum Saligni instar, candidum & durum, medul-

lata succulentam viridem continens: ex caule folia nullo ordine nascuntur, pediculis palmaribus, & minus lata, circinatæ rotunditatis, nisi in mucronem acutiorem desinerent, lanugine incanâ & insigniter molli obducta: ex horum alis rami producuntur: indidem flores itidem prodeunt, Garyophyllatæ aquaticæ, intus & croci, striati, & quinque foliis compositi, medium occupante apiculorum

Cannabis silu. Alcea chypriacina. Alc. Pentaphylli fol.

Althæa arborca Lobelii Clus.

Clus. Cannabina

Locis & tempus.

Descriptio.

apiculorum luteorum glomere: totum verò florem complectuntur quinque folia incana, lanuginosa. Succedunt tomentosa capitula. In glande paulò minora, suprema parte plana ferè, ex decem aut duodecim folliculis latiusculis, compressis, in mucronem acutum desinentibus, in orbem iuxta positis. In quibus semina semicircularia ferè, compressa, sulca, medulla albà, dulci.

Synon]

Camer. hort. Abutilon, Malua Italica lutea, Welsch gelbe pappeln/Althza Theoph. nonnullorum.

Abutilon.
et alia sunt
Althza lu-
tea.
Ibiscus
Theoph.
et alia non

Quærent Lobelii Obs. Althza floribus luteis an Theophr. Ibiscus, & Auic. Abutilon: Idem Aduers. rogant & tamen æquè tutò Ibiscum vel Althzam Theophr. profitentur atque Althæ speciem, aiuntque Senensem foliaceum Abutili inuolucrum Sidæ appinxisse & Abutilon putauisse. Id Plant. Althza luteis floribus.

Matth. no.

Nunquam vidit Matthiolus Althzam flore luteo. Demonstratur hæc planta, quam volunt aliqui Althzam Theophr. quia flores luteos producat, alii volunt Abutilon Auicennæ. Sed cum nec vni, nec alteri respondeat, eorum opinioni assentiri non potest. Idem Matthiolus picturam habet nomine Althæ luteæ siue Abutili Auicennæ, plantæ sibi nunquam vitz nec aliis. Althza lutea, quæ vocari solet Abutilon, non habet magnos flores, quales appingit sed paruos.

Dod. Lapp.
Althza
Theoph. non
est.

Abutilon vocat & inscribit Dodonæus, nec repugnare vult ei quod Auicenna, simile Cucurbitæ (sc. folio) esse scribit, sed fallitur. Videri ait præterea nonnullis Althæam esse illam, cui Theophrastus florem tribuat melini siue lutei coloris. Nam vulgò Althæa non luteum, sed albidum esse florem. Sed posse Theophrasti exemplar, quod multis locis vitiosum, & hiatus multos habet, & hoc loco mendo non carere: quamobrem non facile fuerit hanc Theophrasti Althæam affirmare, præsertim cum tantum lentoris etiam Althææ radici Theophrastus tribuere videatur, ut aquam condensare queat si trita huic iniiciatur, quod vulgaris Althææ radix omnino potest: Abutili verò putati minimè.

Tabern. re-
prehend.

Gesn. hort. Malua vel potius Althæa Theophr. Abutilon. Tabern. sc. & Hist. dicitur Malua Theophrasti, Gammet pappeln/ quæ tamen nomina melius conuenirent Maluæ arboreæ. Miror si vident Theod. hanc plantam, cur non annotet habere florem luteum: figura eius etiam non placet.

Hist. Lugd.
mutat.

Dodonæus plantam apud H. Lugd. secundo loco nomine Althææ Theophrasti depictam, Althæam seu Ibiscum Theophrasti esse arbitratur, & Abutilon Auic. Eandem pro Ibisco vel Althæa Theophr. descripsit Pena, pinxit Lobelius. Matthiolus eandem ostendit. Sed neque Althæam alteram Theophrasti, neque Auicennæ Abutilon esse arbitratur Historia, nullà ratione aliorum opinionem resellens. Ea autem Malam & bonam habet figuram: Bonam nomine Althææ Theoph. malam titulo, Althææ alterius Matthioli.

Locus &
tempus.

C. Bauh. Phyt. Althza 8. siue Theophr. flore luteo.

Althza flore luteo feliciter mihi prouenit Montibergardi in Horto E. C. ea hiemè non fert, interdum semen non maturefcit, est annua planta quæ non diu durat. Geneuz in horto durauit ad Nouembrem, deinde gelu confecta. Batileæ vidi in hortis, ut Di. Theod. Zvvinckeri florentem adhuc Septembri, habebam Lugd. in horto. Frater meus Caspar. Bauh. mihi misit, ac ascripsit se obseruasse excrecentem ad duos cubitos in Tom. II.

ter Ferrariam & Bononiam. Abutilon Dodonæi, peregrinum Belgio est, nec alibi quàm in hortis conspicuum olim fuit. Solet sub finem æstatis florescere, quod erat Martio aut Aprili satum.

ABUTILON INDICVM.



Leonhardus Doldius humanissimus atque Doctissimus Medicus Norinbergensis, & in stirpium cognitione apprime versatus, Abutili Indici descriptionem communicauit talem, viti à se genuitque depicti coloribus. Flore est pallido, subcandido, siue medio luteo, pediculo nixo subhirsuto, sicut & nouella folia ac caulis, non tamen eius

ad tactum mollitiei, quæ vulgò notum Abutilon Italicum. Pediculi in fibras diuulsi foliis venulas sparsas subministrant spicæas in aucta parte folio existente pallidior, interna verò saturatius virescente. Caulis penes internodia subruffescens. Florem excipit folliculus subniger stellatim compactus: semen quoque continens nigrum: Exterius inuolucrum ex viridi flauescens. Radix pallida, fibrosa. Anno elapso è semine mihi produit antiquo, verum ad frugem non peruenit.

Camer. hort. Abutilon Indicum potest ad Althæas referri.

BAMIA.



Bamiz lata Descriptio sunt folia, ferè Maluæ roseæ, in tres potissimas lacinias primò minùs profundas altè serratas, diuisa: palmaribus pediculis nixa: ex quorum alis flores erumpunt, subsequente filiqua secundum caulem rectà surrectà, trium ferè vnciarum longitudine, in tubum nem fastigiata, hirtis pilis obsita, pè-

tagonà, quæ in totidem segmenta diffilit, è quo rù vniuscuiusque medio secundum longitudinem

M m m m

intergeritius paries enascitur, vnum vtrunque
versum annexum habens *seminum* Orobo mino-
rum, rotundorum, cortice crassiusculo, nigro, cri-
po: pulpa, alba dulci: basin siliquæ committit cauli
pediculus crassus, teres, semuncia longior.

Descriptio

Planta ipsa, scribente Alpino (si eandem intel-
ligit nobiscum) ad Altheæ magnitudinem crescit,
foliis flomibusque Malux, aureis tamen, à quibus
fructus sunt similes quibusdam paruulis Cucu-
meribus, qui semina parua, subnigra, rotunda
continent. Lobel. teretia, rotunda, pulla, Erui aut
Orobi paria.

Synonyma

Lobel. & Pena Adu. Exotica Maluacea, Bamia
Eben quorundam. Hæc tamen facie sit Malux,
sed arboræc nandū adultæ: nempe folio crassiore,
rotundiore, minusque sinuato, & magis ad Sidam
accedente, tamen incertum adhuc sitne Malua-
ceo generi accensenda.

Sabbdariffa
Bamia

H. Lugd. Sabbdariffa alia.
Prosp. Alpin. Bamia: cuius descriptio brevis
& imperfecta videtur respondere nostræ Bamiz:
in iconæ tamen eius folia non sunt laciniata vt in
nostra.

Alcea Indi-
ca rotundio-
re folio

C. Bauh. Phyt. Alcea n. siue Indica rotundiore
folio, paruo flore, foliis aliquando in profundio-
res lacinias sedus, quàm figura Alpini proponat.

Tempus

Accepti ab Ill. Do. Guilhelmo Landgrauiio se-
men sub titulo *Bamia del gran Cairo* latum in hor-
to Montbel. Ill. E. VV. prouenit & floruit mense
Iulio & Augusto, olim habueram in horto meo
Lugdunensi: accepi etiam semē à Casabona Stut-
gardiam missum nomine *Bamia de Cairo*: Vidi Ba-
sileæ apud D. Doctorem Felicem Platerum. Ra-
rissimam hanc plantam etiam viderunt Lobel. &
Pena Veronæ in vrceis pensilibus, ac Monspelii
seuerunt & virentem habuerunt. Semina Ægyp-
tiis in cibo in vsu sunt: ex his enim non secus

Vires. &
vfu.Leguminum
modo editu

Temper.

Pectus

Pulmo

Inflamma-
tio

Tumores

Vteri duri-
ties

Calculus

Ophthalmia

Pleuritis

quàm nostri ex Phasiolis, Pis, aliisque legumi-
nibus fercula parant, quibus frequentissimè ves-
cuntur plerumque in iure carniū paratis: folia,
fructusque frigidi & humidi in primo gradu
aiute, habere vim resoluentē & emollientem, ac
proinde pectori ac pulmonibus conuenire, ven-
trem emollire. Fomenti vel emplastri modo folia
apposita inflammationes resoluunt, dolores mi-
tigat, tumores emolliunt, concoquunt, ac ad sup-
purationem adiuuentur. Mulieres ad vteri duri-
tiam, tum fomenti tum emplastris, tum infes-
sionibus ex foliis ac fructibus procuratis multā
cum utilitate vtuntur: in renum verò inflamma-
tione & calculis ex iisdem paratum decoctum
per os cum saccharo candido sumptum aliquibus
diebus, pro selessissimo auxilio habent ad oph-
thalmias, etiam finita fluxione decocto collyrii
modo frequenter vtuntur, atque cum eo fomen-
tare latens dolentem in pleuritici solent.

BELMUSCVS ÆGYPTIA HONORIO
bello.

Descriptio

Misit nobis Insignis Medicus Honorius Bel-
mus ex Cydonia Cretæ *semina* pulchra ad
Bamiam nonnihil accedentia, magis compressa &
lunata, & striata: vmbilico albicante, coloris fuscī,
odore & sapore optimè Moschum resipientia,
videtur mihi semē non maturum quia medulla
pauca: de eo autem nobis hæc scribit: Mitto se-
men plantæ cuiusdam quæ in Ægypto *Belmuscus*
vocatur, Bamiam, quam Rauuolffius Trionum
Theophrasti vocat æmulatur, ab Ægyptiis mulie-
ribus in maximo pretio habetur, vtuntur enim

en in balneis [sed ad quid ignoro.] Christianis
communicare nolunt: ita amicus admonuit, qui
eam ad me misit.

BAMIA ALIQVATENVS AFFINIS

Sabbdariffa.



Sabbdariffam

Speregrino nomine plan-
tam quandam
nominat Mal-
uaceam, recto
cane procero
& firmo: folia
pediculis lon-
gis sesquipal-
maribus hæ-
rent, nonnihil
rubentia,
glabra, in tres
lacinias serra-
tas diuisa, quo-
rū priora quæ-
dam nullā pe-
nitūs, quædam
exiguā dui-
surā superne
à predictis
variant, ex co-
rum sinu pro-
deunt flores Alceæ Venetæ maiores: *semina* trian-
gularia, [recurua, sinuata, ita vt ad Semilunii figu-
ram quodammodò accederent, nisi parte sinui
opposita in gibbum essent eleuata, colore sub-
cinereo.

Rauuolffius qui describit, & Arabibus *Lubie*
Endigi, id est, Phasioli Indici, dici tradit, existimat
esse Trionum Theophrasti, eodemque nomine
inter icones inscribit. At meo iudicio hæc planta
Veteribus fuit incognita.

A Lob. Obs. Ic. Plant. Camer. Hort. (qui Lobe-
li iconem non vsque adeo accuratam esse scribit),
H. Lugd. [quæ in append. alteram eiusdem plan-
tæ habet iconē & describit sub Triono Theoph.]
Horto Patavino (qui & Alceam Indianam vocat)
& Tabernā. *Sabbdariffa* vocatur.

C. Bauh. Phyt. Alcea 10. siue Indica magno flo-
re, foliis ludens: primis enim aliquando laciniatis,
aliis verò & communiter in tres lacinias diuisis,
aliquando tamen in septenas profundas lacinias
sectis, instat foliorum Elleborasti.

Sabbdariffa mihi primū vīsa op̄erā insignis
Pharmacopei Volinarii, qui semen misit huius
pulchræ plantæ, quæ prouenit Montbelgardii in
horto Il. C. Vvitt. Postea mihi etiam missa fuit
nomine Sabbdariffæ seu Alceæ Indicæ: Vidi Ba-
sileæ florentem apud D. Doctorem Martinum
Chmielecium Medicum Polonum 1595. mense
Septembri: habui etiam à Richnerto quæ proue-
nerat in horto D. Doctoris Felicis Plateri. Ar-
gentinæ quoque obseruavi in horto D. Fridenci
Meier mense Octobri.

BETA.

CAP. IV.

Quarum tractationem iam aggredimur, si plā-
tas intuearis, hunc locum sibi minime ven-
dicant: nulla enim his aut certe exigua cūm ha-
æne


Descriptio

H. Lugd.
nos.
Alcea In-
diana
Lugdun.
nos.

Locus &
tempus

LIBER XXIII

Beta candida.



Beta nigra.



Beta radice rubra crassa.



Tou. a. l.

Descriptio

Beta nigra
Rubra
Beta rubra
radice cras-
sa.
M. sp. 1000

Genus re-
centis ex-
terna faciei
necessitudo
intercedit.
Verum cum
& ipse emol-
lientes sint
& holeracez
hic collocare
voluimus.

Beta quam
ex radicis &
foliorum ar-
gumento ca-
didam vocat,
radicem li-
gnosam ha-
bet minimi
digni crassi-
tudine, me-
diocriter lo-
gam, candi-
dam : folia
dilutius vi-
rent, Lapa-
thi, crassa &
succulenta,
sapore nitro-
so : caulis
duos cubitos
altus, aut e-
tiam maior,
gracilis, stri-
atus, multis
alis concu-
sus : in qui-
bus longa
serie flosculi
exigui, ex fo-
liorum alis,
apicibus lu-
teis constan-
tes, quinis
calycum fo-
liolis obual-
lati : semen
rotundum,
& crispum su-
perficie al-
perum, ful-
cum. Huic
per similes
Nigra dicta,
foliis brevio-
ribus, atro-
virentibus.
Itemque &
ea quæ vulgi
Rubra est, fo-
liis rubenti-
bus. At Ru-
bra alia non
tantum fo-
liorum dis-
crimen ag-
noscit, sed
& radice quæ
ventriosa,
Napi instat,
intus sorbi-
que sangui-

neo colore saturo infecta est. Repentem & La-
tea à iam dicta radice buxæ solim differens. Or-
nant pratensis lil. E. C. Virt. horum duz aliz:
Vna albis, latissimisque costis ornata : altera ve-
ro rubris, quarum semen Argentinâ missum, quæ
facile pereunt.

Dioscorides & Galenus duo genera tantum fa-
ciunt, nigram & albam.

Theophrastus candidam sapore præstantiori
esse tradit, pauciorumque seminum, quam Sicu-
lam quidam appellauerint : caule carnosio : radi-
ce singulari, & carnosâ, longâ, crassâ & rectâ, vti
Raphani : suavi, ut crudam nonnulli mandant.
Silvestris etiam ademinis in genere Carduorum
aculeatis foliis non constantis.

Beta hortensiorum, inquit Plinius, lenissima
est. Eius quoque à colore duo genera Græci fa-
ciunt, nigram & candidam, quam præferunt, parci-
simi seminis, appellantque Siculam, candoris sa-
nè discrimine præferentes, ut Lactucam. Nostri
Beta genera faciunt, Vernalis & Autumnalis, à
temporibus sativis : quanquam & Iunio seratur.
Et mox rursus, Mira differentia si vera est, candi-
dis solui aluos modicè, nigris inhiberi. Item lib.
20. cap. 8. Esse & Betam silvestrem idem scripsit,
quam Limonium [ut Theophr.] vocari tradit, &
Neuroidem, multo minoribus, tenuioribusque
foliis, ac densioribus, vnde semper caulium. Sed
hanc Diosc. non novit, Limonium à Betis valde
diffingens. Et Galenus silvestrem non esse dicit,
nisi quis Lathyrum seu Rumicem ita nominare
velit. Quibus verbis Galenus tam plausibilem
ac receptam Platonis sententiam in Timæo am-
biguam nobis effecit, sativas omnes plantas olim
fuisse seras, neque à se ipsis cultu differre. Cum
enim, inquit Scaliger, Lathyrum à nobis multo
studio huius rei gratia cultum, nunquam induerit
Beta faciem, aut saporem, etiam nunc hære-
mus in illius sententia, non omnem plantam mi-
tem, fuisse prius agrestem.

Cæterum, videas hodie qui se peritissimos vo-
cari cupiunt, qui quid intersit inter Betam & Bli-
tum, nec legendo in libro, nec in horto oculis
manu contrectando discernere queant. Apud
Monachos in Mesuem ita scriptum habetur. Her-
ba quedam [Blitum Indicum] habet folia Betae, si-
ue, quod idem est, Bliti. Hos igitur Betam cum
Blito confundere dubitationi nullus est locus.

Porro varii varias silvestris Betae nomine in-
scribunt plantas. Nam Limonium Tragi, quod
Germanos Betam pratensem [Wisen Wangolt]
vocare scribit, est Trifolium palustre Dodonæi,
de quo lib. 17. diximus. Beta silvestris speciem fa-
cit Dodon. Lampsanam : eandem Lobelius Lam-
planx nomine depinxit. Beta silu. distortam ef-
fe Gesner. in cat. pl. indicat. Sunt etiam, qui Beta
silu. speciem Pyrolam facere non verentur. Alii,
ut Lonic. confundunt Beta silu. [Limonium
Tragi] cum Pyrola altera. Myosotis, Auricula
mutis, ut tradit Gesn. in cat. pl. exsumatur à Me-
dicis Germ. Beta silvestris. Alii, ut Cæsalp. Beta
silu. Plantago [maior] vocatur. Nonnullis, teste
Anguill. Plantago aquatica. Gesner. adhuc in cat.
pl. Beta silu. nomen Potamogeto adscribit. La-
pathum ait Galenus, licet appellare Beta agre-
stem. Sed & Cardum pratensem multi Beta
silu. faciunt.

Beta primam nobiscum appellant candidam
Math. [qui tamen hoc titulo nigram proponit,
ex transpositione & incuria Typographi, & ex
Math. H. Lugd.] Trag. qui hanc agrestem seu er-

Disser. &
Gal. genera

Candida
Theophr.
Sicilia

Ex Plinio

ut nigra
& candida
Sicilia

Limonium
Beta silu.

Plin. refert
satur

Est prae-
terea pluri-
morum

Blitum

Trifolium
palustre
Lampsanam
Bistorta.
Pyrola
Pyrola
sila

Myosotis

Plantago
Plantago
aquatica
Potamogeto
Lapathum
Carduus
pratensis
Beta campe-
stris

raticam Betam canet:) Fuchf. Dod. gall. & Lat. in fol. Cord. in Dioscor. Lacun. Hist. Lugdun. & Schuvvenckfeldius. *Betam albam* Turb. Gesner. hort. Lonie. Lob. Obl. & le. plant. Hort. Luf. Camer. hort. Epit. & Hist. Matth. germanic. *Betam albam* C. Bauh. phyt. *Betam Brunfels* & Tragus pingens. *Betam* 1. siue *albam* C. Bauh. ad Matth. in Phyt. 4.

Beta nigra *Beta nigra* nominatur à Matth. (qui ut dictum hoc nomine albam pingit.) Tragus. (apud quem perperam siluestre Betæ genus creditur:) Fuchf. Dodon. gall. Gesn. hort. Lacun. Castor. Histor. Lugd. (quæcum Matth. eam transposuit, ac candidam dicit:) Casp. Bauh. phyt. & hort. Lusatiz. Schvv. vocat *Betam nigram* à foliorum colore ex obscuro magis virentium: *Betam* vulgatiorem: *Betam rubram* Dod. Lat. in fol. Lonicerus. *Betam* Taberna.

Beta rubra *Rubra* meminerunt Brunfels. Tragus. Hanc inscribit Lob. Obl. Ic. plant. & Hist. Lugdun. *Betam rubram* vulgatiorem, *Betam* 2. siue *rubram* vulgarem. C. Bauh. phyt. & apud Matth. pro *Beta* 2. seu *nigra* pingitur.

Beta rubra *Beta rubra* radice crassa ea est, quam Matth. nomine *Rufa* ita exprimit: In Germania tamen habetur & *Rufa*, non modò foliis, sed etiam radice, quæ illi Raporum oblongorum magnitudine extuberat: colore aded rufescente, ut eius succus viuum sanguinem referat. Hanc Lob. Obl. & Icon. Cast. Gesn. hort. cui & Sentoastaphilinum: Camer. hort. Epit. & Hist. Matth. Germ. & Schvv. cui etiam Rapum rubrum dicitur, *Betam rubram* vocant, Dodon. gall. & Lat. in fol. *Betam nigram* Romanam: C. Bauh. phyt. & apud Matth. *Betam* 3. seu *rubram radice crassa*: Corn. in Diosc. Rapum latium rubrum.

Hist. Lugd. rectè unicam descriptionem duabus figuris accommodat, non enim ex ab invicem differunt, licet diversis titulis inscripserit. Vocat nunc *Betam Erythrorizon* Dodonzi, nunc *Betam rubram* Matthioli. Fuchf. inquit ea, inter Raporum genera recenset, & Rapum rubrum vocat, cum tamen Rapi species non sit.

Beta lutea *Beta lutea* traditur à Camer. hort. Est hæc ea, quam Gesn. hort. flavam nuncupat, C. Bauh. *Betam* 4. radice buxæ. C. Bauh. Phyt. *Betam* 5. siue *luteam*.

Beta lutea Manifestè veritati contrariatur Corn. qui solùm ex radicibus, & non etiam ex foliis *Betam albam* & *nigram* dignosci posse falsò contendit. Hoc quidem faciliè verum foret, si omnes in re herbaria, ut ipse, cætuissent.

Dorstenium Dorstenium *Betam* nunquam gustasse, ne dicam vidisse, credimus. Brassicam liquidem pro *Beta* monstrat.

Nomina linguarum Quod olus Græcis simpliciter *νιθαρον*, vel *νιθα* vocatur, id Latinis *Beta* dicitur: Arab. *Deika* & *Celb*, Hebr. *Teradin*, Germ. *Mangolt*/ *pießel*/ *Römischöl*/ *pießöl*/ & *Romgras*: Belg. *Biete*: Gall. *Bete*, *porree*, *reparee*, & *lorte*, Ital. *bietola*, Hisp. *Afelgas*, Angl. *Bette*, Bohem. *Manholt*, Hung. *Ezefla*. Cum adiectione verò, Gr. *λευκὴν ἢ μέλαν νιθαρον*, Lat. *Alba* vel *rubra* aut *nigra Beta*, Germ. *Rot* oder *weis mangolt*: Belg. *witte* oder *Roode Biete*: Gall. *blanche* ou *rouge bete*. Angl. *white* oder *Redde Betis*. Particulatim verò *Beta* radice rubrâ, crassâ, Græcis *νιθαρον ῥιζοῦ*. German. *Rott Mangolt*/ *Rott Rüben*, quasi Rapum rubrum dicas, Beyerisch *Rüben*. Rapa Bauarica, fortè quiddam copiosa inibi aut crescant, aut alius præstent, & Rote Sodaswürzen. Gall. *des Rendes*, *ugets*, Ital. *Bietola rossa*. *Betam* porro Græci ab impulsu

nominarunt: etenim cultus ratione quadam incrementum capescit arboris, neque vili hortensium latitudo foliorum maior. *Betæ* nomen sibi adiecit, quoniam figuram *B* literæ græcæ dum semine turget, reflexe videtur. Nam summitatem in cacumine reflexam obtrinet. Id quod testatum nobis reliquit Lucius Columella in suo carmine de cultu hortorum ita canens:

*Nomine tum Græcorum litera proxima prima,
Pangitur in cera doli mucrone magistri:
Sic & humo pingui ferrata cuspide icta
Deprimitur, folio viridis pede candida Beta.*

Et quantumvis *Sicula* cognomēto *Beta* solummodò candida veniat, ut Theophr. & Plin. memoriz prodiderunt, tamen nunc extitit litera vna, serè omnibus nostris sæculi Medicis *Sicula*, omnis *Beta* nominari cœpit.

Betam ex cultu aiborescere scribit Theophrastus, & eminare radicem à latere: Iulio, ut cetera, quæ Sementis postera vocent, serendam: zitate sexto, hieme decimo die erumpere: ex semine paucas provenire anno primo, sed longo tempore pōt pullulare, anno se. sequente & tertio, eas aquis salis iniuri, & his rigatas meliores effici.

Montpelii colunt *Betas* valde magnas albas & nigras, sed ubique passim in hortis seruntur. *Rubra* verò radice crassâ multum in Germania provenit: Omnes recensitas differentias Montbelg. in horto Ill. E. C. V. Viremb. quondam colebant.

Beta nigra, ut scribit Dioscoridēs, coquitur cum Lent-cula, ut ventrem sistat, quod magis radice eius præstatur (genus id cibi *νιθαρον* veteres appellarunt.) Candida alio utilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se, noxius est succi. Vnde succus earum cum melle naribus inditus, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radice & foliorum, furfures lendēque deterget: perniohes lotu mitigat. Crudis foliis vitiliginēs nitro antea perfactas, alopeciarum inanitates, scalpēdo prius exasperatas, atque depascētia vlcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisque cocta medetur.

Plinius de actis, ut de oleo & alimento hæc tradit. Vnus is & cum Lente ac Faba, idemque qui oleris, sed præcipuus ut lenitas excietur acrimonia Sinapis: Medici innocentiorē quāni olus esse iudicaver. Quamobrem appositam non nemini degustare etiam religio est, ut validis potius in cibo sint. Gemina is natura & oleris, & capite ipso exilientis bulbi. (Nam cum foliis humi sparsis caulis ex illorum medio prodire incipit, eius caput gustu & callosa quadam firmitate bulbo simile esse videtur.) Et pauld pōt. Mra differentia si vera est, candidis solui alios, modicè nigris inhiberi. Et cum brassica cotrumptur in dolo vini sapor, odore *Betæ* foliis demeritis restitui. Sed idem alio in loco vsum medicum ex *Betâ* præscribit, tum ea quæ Dioscorides, tum alia recensens. Nec *Beta* sine remedio est, utraque. Siue candida siue nigra radix recens & inademfacta, suspensa luniculo contra serpentium morsus efficac esse dicitur. Candida *Beta* cocta, & cum Allio crudo sumpta, contra tineas. Nigra radices, ita in aqua cocta portiginem tollunt, atque in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores veteres, & verugines, item sonitum aurium sedat, insusus iis: ciet vrinam. Medetur dysentericiis iniecta, & morba regio. Dolores quoque dentium sedat illitus succus: Et contra serpentium ictus valet, sed huius radice

radice duntaxat expressus. Ipsa verò decocta per-
nionibus occurrat. Albus succus epiphoras sedat
fronti illitus: aluminis paucò admittit ignem fa-
crum, sine oleo trita scilicet, adustus medetur. Et
contra eruptiones papularum, cocta que eadem
contra ulcera quæ serpunt, illinitur, & alopecis
eruda, & ulceribus quæ in capite manant. Succus
eius cum melle naribus inditus caput purgat.
Coquitur & cum lenticula addito aceto, ut ven-
trem molliat. Validius cocta fluxiones stomachi
sistit, & ventris.

Vires ex
Galeno

Galeno verò auctore succus betarum tergend-
vim habet manifestam adeò, ut ventrem ad ex-
cernendum incitet, & stomachum interdum
mordicet, præsertim quibus naturæ sensu exactio-
re præditus est: ob idque edulium id stomacho
est noxium, si largius sumatur: corpori autem ab
ipsa, ut ab aliis oleribus, paucum alimentum acce-
dit. Verum obstructum hepar Maluâ magis ape-
rit, & multò magis si cum Sinapi aut omnino sal-
tem cum aceto mandatur. Lienosis item eodem
modo sumpta est vtile medicamentum. Et, beta
nitrosæ facultatis particeps est, quæ tum digerit,
tum extergit, & per nases purgat. Ceterum cocta
nitrositatem omnem exuit, sitque leuiter discuti-
ens. Potrò ad detergendum digerendumque
validior est beta alba: nam nigra adiunctum ha-
bet quidpiam adstrictionis, & magis in radice
quàm in aliis partibus.

Obstru-
tio hepatis

Ex Simeone
Sethi

Ex Simeone Sethi betæ succus mediocriter ab-
stergit, ventrem etiam ad effluxum proritat, &
stomachum aliquando vellicat, eorum præsertim,
qui huc valde sensibilem habent. Quapropter e-
dulium est stomacho infestum, si plurimum co-
medatur. Exiguum est eius alimentum sicut cæ-
terorum olerum. Vtilis verò est ad icteris ob-
structiones cum aceto comesta. Pari modo si eda-
tur, & lienis obstructionibus bonum fit medica-
mentum. Constat autem beta ex contrariis fa-
cultatibus: succus enim eius calidus est, ventrem
constringit, & sitim adfert. Eius verò corpus cras-
sarum partium, flatuosum, concoctu difficile, &
frigidum, ventremque sistit: maximè si aqua in
qua coctum est, subinde abiciatur.

Obstru-
tio lienis

Corrigentia
betæ

Ad betarum cocturam vinum & piper expeti-
scribit Martialis his versibus:

*Ve sapiant satæ fabrorum prandia Betæ
quàm sapè petet vina piperque coquus.*

Beta con-
ducenda ra-
tio

Præterea eiusdem betæ radicibus conditis v-
tuntur. Conditur autem beta in aceto hac ratio-
ne, cum foliis & radicibus integrum eradicandum
betæ olus, aquâ deinde benè, necnon etiam cul-
tro mundandum: In aqua ex hoc bulliendum,
& transuersim in particulas secandum, posito ve-
rò in vase aliquo figulino, aquâ reiectâ, sale carui
vel granis luniperi condies, his superinfuso ace-
to, cyato vno atque altero pleno, pro betæ quan-
titate.


Tempera-

Nihil in culinis beta hortensi frequentius esse
testatus est Tragus. Nam in cibo usurpatur. Tem-
peramento calida est beta, maximè quod ad radi-
cem atinet, id quod hinc manifestum fit, cum e-
nim succus naribus excipitur, adurit, & sternuta-
menta proritat. Beta in cibo sicut Spinachia para-
ta facillimè est concoctionis, usque in primis
conducit qui stomachi imbecillitate laborant. Be-
tæ hortensis plantulæ recentes cum radicibus le-
uiter bullitz, & ex aceto postea deuoratz cibi
appetentiam adferunt, sitim compescunt, chole-
ram in ventriculo reprimunt. Debet verò eius-
modi cibus æstate potissimum usurpari.

Bayrus emplastro è radicibus betæ curat acho-
res.

BETA CRETICA SEMINE SPINOSO.

Betæ Creticæ folia nostratj non multum diffi-
milia, nisi quod vix ad eam magnitudinem



quantum ob-
seruare licuit,
proueniunt, cæ-
teroqui satis
carnosa, per ex-
tremum rotun-
da, aut saltem
obtusata, iuxta
pediculum an-
gustum nonni-
hil alata: stipes
parui, lutei, spi-
cati in ramorū
extremitatibus:
esthni circa cau-
lem nascuntur
ex foliorum a-
lis in tres spi-
nas radiatas de-
sinentes, costis
pulchris dona-
ti, transversisq;
cancellis reticu-

lati, quorum unicuique semen inest vnum oblon-
gum, pellicula ruffa tectum, medulla alba. Rami
multicubitales vel minores ex radice annua su-
pra terram se extendunt.

Si hæc non iam usurpasset nomen betæ, ad La-
pathum vel Spinachiam potius referrem. Casp.
Bauh. phyt. beta 6. siue Cretica semine aculeato.

Betam Creticam semine spinoso vidi Basileæ
1595. Augusti sine semine maturo in horto Do-
mini Iacobi Zvingeri, quod attuli ferendum
Montbelgardi in horto E.C. quod provenit. Ac-
cepi etiam à D. Phil. Seb. Sprengero nomine betæ
spinose Candiz.

Lapathum

Locus &
tempus

BETA LATICAVLIS MONSTROSA.

Admirandæ betæ *monstræ*, quam H. Lug-
dun. picturâ exprime curauit, cuius caulis
est quatuor digitos latus, circa quem parua sunt
folia, & quem totum semen operit, sed in eius fa-
stigio ita densum: ut caulis prospectum adimat.
Aliquando propè D. Ramberti oppidulum Allo-
brogum in pingui quodam prato talem vidit
Dalechampius siluestris Cichorii caulem.

C. Bauh. phyt. beta 7. siue lato caule.

Nos quia in monstris plantis numeranda
est, eam merito à præcedentibus separauimus,
nec pingendam quidem esse duximus.

Descriptio


SPINACHIA MAS ET FOEMINA.

Fætu gustu tota est planta: radix tenuis, al-
ba, folia Dentis Leonis, latiora, profundè si-
nuata, minus tamen crebris laciniis, pinguisculis,
& farina tenui triplicis modo respersa: caules
fistulosi, striati, in alas diuisi: flores in alis & cau-
libus, à medio serè vsque ad fastigium, creberrimi

Descriptio

M m m m

fi, ex herbido purpurascens: *semen* aculeatum, & ut nomen docet, spinosum: alias Lentis modo compressum, orbiculatum & innocens.



Hoc olus Veteribus (quod mirum est) incognitum fuisse videtur, cum de eo nihil illi, quod legatur, literarum monumentis tradiderint: vel forsitan quod cibo, quam medicina potius natum esset, nec quicquam illustre fortitum, ob id ingenii segnitie obscurum, vel quodd, ut conici potest, nondum in usum vulgi, literato-

rumque cognitionem eo saeculo venerat, qui eorum quae sua fuerunt memoria, prorsus intactum nihil intentatumque reliquerunt. Non enim silentio tam frequens olus abolere voluissent, sed potius celebratum in lucem prodere. Mospelii praeceptor Rondeletius blitum Veterum vocabat, quae opinio mihi non penitus displicet.

Trago Hist. Germ. & Lat. vocatur Oulus Hispanicum, Spinachia altera seu vulgaris, & Spinachia silvestris. Seutlomalachen, inquit Ruellius, recens Graecia fecit olus, quasi dicas Maluaceam aetam, quod, ut reor, parentum adulterio natum existiment, Veteribus inauditum, forte quod figura, & deticulato seminis habitu aetam, & molitia Maluam mentiretur. Sed forte Seutlomalachen, ait Gesn. hort. hoc est, medix inter aetam & Rumicem naturae, potius quam Seutlomalachen appellandum. Spinachiam manifestum habere lexum scribit Scaliger. Coniicio autem morem ab eo intelligi illum, cuius semen spinosum est: seminam sine spinis. Ab his non penitus dissona sunt, quae apud Camer. hort. & Hist. Lugd. leguntur. Spinachiae genera duo, sativum, & silvestre. Sativum item dup, mas & semina, Mas semen fert, Foemina floret quidem, sed seminis infertunda sterile scit.

Spinachia describitur & pingitur à Lob. & Pen. Adn. Obs. sc. plant. Dod. Hist. Lugd. Fuch. qui & Spinacium olus vocat. Brunfelsio. Camer. in Hort. & Hist. germ. Matth. qui Spanachia inscribit. Tabern. sc. & Hist. Amato, atque Matthiolo.

Amatus quidem domesticum Rumicem siue hortense Lapathum, Spinachiam nostram esse sibi falsè imaginatur, quod & Casalp. sentire videtur. Quare merito Robert. Constantium hallucinari scribit dum sine autoritate aut ratione hoc contendit. Constantino in eo ad stipulanti- bus Grapaldo & Matthiolo.

Falluntur & ii, qui Plinii Boulapathon apud Dodonaeum esse existimant: Lapathi siquidem genus Boulapathon estradicis tantum altitudine ab aliis differens, ut ipse refert. Nec quonque Hippocratis blitum est, quod veluti linguam esse scribit lib. de morbis mulieb. Nam inter subditi-

istud refertur, quae rubrum fluxum muliebrem reprimunt ac sistunt. Talis autem Spinachiae facultas haudquaquam est adstrictione omni carens. Nec est Chrysolachanthum, ut vult Monardus.

C. Bauh. Phyt. Lapathum hortense alterum, seu Spinachia semine spinoso. Idem apud Matth. Atriplex 2. Lapathum hortense alterum, Spinachia mas quibusdam. Item Phyt. Lapathum 4: siue hortense alterum, seu Spinachia sterilibus. In Matth. Spinachia 3. sterilis.

Spinachia siue Spinacia & Spinaceum olus, Nomen quod Latini appellant, *σπινάχιον* recentioribus Graecis dicitur, ab Arab. & Serap. Hispanac: à Germ. Spiner oder Binsch: belg. Spinagie: Gall. *Espinaches* ou *Espinars*: It. *Spinacci* & *Spinace*: Hisp. *Espinaca*: Angl. *Spinache*: Boh. *Spinak*:

Spinacia quidem & Spinaceum olus ab insigni seminis spiculatorum nota, quod tam glabra, & mollis herbae semine in spinas occalescat. *Σπινάχιον* verò sumpto nomine à raritate, quod raro illo medici vterentur. Quibus haec vocabula displicent, Atriplicem Hispaniensem vocant, Mauritanii *Hispanach*, id est, Hispanicum olus, fortasse quod inde primum duxerit originem, ad ceteras tandem nationes translatum: quidam Seutlomalachen.

Spinachiam colimus Montbelgardi in horto E. C. marem & seminam. Passim in hortis scribitur nullum solum respiciens, cum Martio & alio tempore, tum Septembri mense, exiens septem à latu diebus, folio primum triangulo, molli, mox intubaceo, non hortens Hiemis frigora, quae si iniqua nimis, Ingländis foliis conseruantur: ut Vere cibum suppediet, quo tempore semine profert: Hieme enim restat: Martio verò satum intra duos menses perficitur, hinc Iunio & Iulio flores & semen edit.

In culinis, teste Trago, nihil ferè frequentioris est usus, pulubus ex Spinachia recenti confectis. Temperamento illa frigida & humida est, cibo & medicina accommodata. Pulvis Spinachiae aluo astrictiori profuit, potestque id oleris in omni penae aegritudine cibo deligi, nam meo iudicio inter omnia culinaria olera Spinachia laudatissima est, & gratissima. Spinachia aluum emollit, gutturis asperitati medetur, & aridæ tussi confert, teste Constant. Succus & aqua distillata Spinachiae pota, calorem restinguit, stomachi rofiones mitigat, & lac elicit. Spinachia cataplasmatibus in stomacho & epati imposita, inflammationibus illarum partium prodest, doloremque tollit. Eadem ichibus scorpionum, & araneorum imposita succurrit. Spinachia primæ refrigerantium & humectantium classis, nec omnino vacat nitrosa qualitate Camer. Aluum emollit, melius Atriplice suppediat alimentum, sed aluo parum haerens facile exigitur. Flatus colligit, & vomitiones concitat, nisi excrementitius humor abiciatur: ventrem decocti iure prolnit. Citra aquam coquitur hoc olus, quod magnam vim humoris inter coquendum remittat, & veluti proprio contentum iure alienum aspernetur. Aibitur eius succus ad scorpionum & araneorum ictus, ac etiam vulneri illinitur: quinetiam cocta lenit exasperatas fauces: sed nauseam facile parit, nisi Zinzigere, aut alio conlimili condidatur: Recipitur & inter crude acetaria recens enata.

SPINACHIA SEMINE NON PVNGENTE;

Folio maiore rotundiore.

Longè maior matonibusque est foliis, quam *Spinachia vulgaris*, nec non rotundioribus, ceteroqu

Blitum V-
etum
Olus Hispan-
icum

Seutloma-
lache Ruell.

Seutloma-
lache Ges.

Semin Spin-
achia

Genera
Spinachiae

Rumex do-
mesticus

Lapathum
hortense

Amatus
Casalp.

Hallucina-
tio

Boulapath-
on

Non est
Blitum

Hippocratis

Locu &
tempus

Cultus

usus

Temper.

Vomitus
con-



exteroqui
mollitie & fa-
tuo sapore si-
milibus: que-
madmodum &
floribus proxi-
mè circa cau-
lem ad pedicu-
lorum exortu
muscosis: at
semina subse-
quuntur con-
glomerata
multa veluti
in racemulum,
lenticulis serè
paria, rotunda,
nullis spinis
horrida, cine-
ricei coloris.

Trago est
hæc Olys Hif-

panicum i. nobilissimum, siue Spinachia i. nobilis.
Spinachia sativa folio Lapathi seu Boni Henrici,
caule Betæ, semine nequaquam spinis horrente.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Lapathum al-
terum semine non spinoso, tertia Atriplex. Spi-
nachia semine non spinoso.

Spinachia semine non pungente, folio maiore,
rotundo, rarior habetur, cum Hiemem non faci-
lè ferat. Passeres & alia aves seminum huius val-
dè avidæ.

BONVS HENRICVS.

Descriptio



Synonyma

Rumex
Vulgaris
Vulgaris
Serpentinum
Vel Colu-
brina radix

Tota bona.
Bonum Hen-
ricum

cum cum Fuchsis inscribit, & Rumicem vinctuo-
sum, [Schmerbel, propter vinctuosa folia]
vulgarem vulnerariam herbam Germanos [ge-
mè in mundi fratre] nonnullos etiam Serpen-
tium vel Colubrinam radicem [ob folia, quibus
vestitur, Ari aut Vngulæ asininae similia,] vocare
dicit: Rumicem tertium siluestrem Dioscoridis
quem illic Plantagini similem, & in terra iacen-
tem dicit cum Fuchsis esse radicem, ac pro Spin-
achia sylu lubens habet.

Totam Bonam, Spinaciæ facie, seu bonum Hen-
ricum magni ducunt Aduers. Lob. & Penz, ita
namque de ea loquuntur. Sed Tota bona per-
Tom. II.

Oxylapathi
buxea cras-
sa radice nititur:
sed tenuiores
complures can-
tes emittit, stria-
tos, partim ere-
ctos, partim su-
pinos: folia tri-
angula, Atriplici-
cis, atrovirentia,
farina tenui re-
spersa, sapore
nonnihil nitro-
lo: strobili in
thyris, muscoli,
herbidi, semen
rotundum Ra-
phanino sup-
par.

Trag. quem
bonum Henri-

quàm optima, magisque usu quàm vllà pe-
nitia recepta, Mercurialis credita fuit iamdiu
à plebe muliercularum, aut illis non multò pe-
rioribus Pharmacopœis Anglis, quàm adhuc
inscitiam magis pertinacia quàm vllà ratione fo-
uent, quia fauit illis euentus. Siquidem est huius
plantæ deterforia facultas multò quàm Mercu-
riali tutior in morbis seruidis, nec tamen est i-
gnaua in attrahendo facultatis, cibus verò multò
Mercuriali gratior, tametsi plustulùm statuum
habet, & non ita procul à Spinaciæ natura abesse
videtur. Lob. Obs. Tota bona, Spinaciæ facie, Rumex
Rumicis 3. genus Fuchsi, 2. Turneri. Eidem icon.
plant. Tota bona, siue bonus Henricus.

Dodon. gall. & Lat. in sol. qui sub Tota bona
describit & depingit: At bonum Henricum à
singulari quadam vili facultate vocari: veluti &
perniciosa quadam plantam Malum Henri-
cum appellent, de quo alibi dicendum.

Camer. Epit. & H. St. Matth. Germ. Tabern.
Icon. & Hist. Brunfels. & Hort. Lusit. Bonum Hen-
ricus. Thalyo Tota bona Dodonæi. Atriplicis ge-
nus intermedium. Clusio Tota bona. Gesn. coll.
stirp. Lapathi seu Rumicis genus, vulgò bonus
Henricus vocatum. Atriplicis filu. species. H.
Lugd. Lapathi filu. 2. genus.

C. Bauh. Phyt. Lapathum 3. siue vinctuosum
folio nonnunquam maximo instar Aromis. Se-
ignatum botanicum ostendit Dorstb. dum sub
Colubrinæ nomine ponit iconem boni Henrici
& huius nominat.

Bonus Henricus, G. Güter Heinrich. Schme-
bel. Belg. Algoede & Cammefens oore. Gall. linguam
roue bannex. Tota bona, vii vocant Lob. & Dod.
bon Henry. Ital. uerba infarinata, Angl. English
Mercury.

Bonum Henricum multis dictum vidi Mont-
peli, allatum ex montibus circa Gangen, floren-
tem mense Maio. Genæ quæ itur ad montem
Thuyri copiosè offenditur: Basileæ inter portam
cineream & lapideam mense Octobri florens,
Montbelgardi copiosè Iulio.

Vulneraria herba est bonus Henricus, ac miri-
ficè ad sordida purganda, ac glutinanda vlcera
confert, sicut appensa etiam ac trita vulneribus
imposita, vermes qui in iis nati sunt excidere fa-
ciat. Hæc Fuchsius, quæ Camer. in Matth. Germ.
tribuit Atriplici feruidæ. Sed Fuchsius subscribit
Dodonæus: ac insuper Dodonæus testatur folia
cum oleis cocta, atque elitata, lubricam red-
dere aluum. Præfertur, ut videre est apud Matth.
ad venenosorum animalium ictus. Radicis suc-
cus illius scabiem sanat, & cutis maculas exter-
git, præsertim si cum aceto misceatur.

DE BLITO IN GENERE.

CAPUT. IV.

Theophrastus olus hoc scribit vtraque parte
fructificare, scilicet cacuminib., & lateribus,
ided copiosius, protinus enim nodis singulis, se-
men insidens, racematim gerit: caret radice illa
singulari, quæ in rectum tendit, sed continuè ab
extremo multas crallas, prolixiores quàm Atri-
plex gerit, lignosas.

Quamvis autem Diosc. Plin. & Galenus nullas
olus proponant differentias, attamen plures esse
cum ab aliis, tum à nobis obseruatum est, de qui-
bus posthac dicendum erit.

M m m m 4

Nomina
linguarum
Ægyptia.
Rapa. Blis

Blitum olus hoc Græci dixerunt, Latini Blitum
Egyptii, ut inter Dioscoridum legitur, Eblatori-
pam, alii Eiplam, Dacti Blis vocant: Arabes bacha-
la fomenia, & bachale alienante, Germ. Meyer
Blut wurtz Apollinari, vund Rothmeyer: Galli
blette d'Espagne, Fuchl. dublit, breyon Sabaudis:
Ital. blito budoni, & bierelone, Hisp. bredos & ble-
dos: Angl. wilde sine Orrage: Boh. Blyt.

Adagium

Plinius Blitum nomen ad ignauiam & fatuitatem
referte videtur. Blitum in eis videtur, inquit, ac
sine sapore, aut acrimonia vlla. Vnde conuiuium
seminis apud Merandium faciunt mariti. Di-
cuntur etiam sapere Hippocrati Cereus ei antipathicus
siderati, stupidi, & attoniti.

Beliores Ge-
de

Festus d. 3. deducit. Est autem nomen cu-
iusdam pifis omnino inutilis, & qui nulli ani-
manti est esui: licet & inertem, stolidum, stu-
pidumque designet, & Antiqui Cereus, murcidos,
stolidos, baidos, fatuos, bliteosque dicant: inde-
que conuiuium apud Gallos in vulgus emanat:
locordes, nulliusque momenti homines beliores
& blitres, Græci imitatione nominantes. Viden-
tur Latini, Betam pro specie Blitum, aut pro Blito
ipso accipere, nisi, ut ait Lobelius, lepidissimus
Martialis non bene noscat discrimen illo disti-
ctio:

Locu

Ut sapient fatua &c. de quibus antè.
Blitum non tantum in incultis prouenit, sed
& in hortis sentur, quod cum semel natum fue-
rit, ipsum se per multa secula seminis deiectione
separat, ut, etiam si velis, vix possit aboleri: fatuum-
que semel pluribus annis relictibili fertilitate pro-
uenit, nec runcari, nec sariti flagitat. Martio men-
se sentur, florèturque media ætate & Autumno
seminèque prægnans est.

Tempus

Vfus in
Dise.

Blitum estur oleis modo, inquit Dioscorides.
Alio vtile est, nullius in medicina vltus. Blitum
& Atriplex authore Galeno, aliis oleis sunt a-
quosiora, & qualitatibus expertia: quo fit, ut non ex
solo oleo & garo ipsa madant, sed acetum etiam
iniiciant: nam alioqui stomacho sunt noxia. O-
lera autem huiusmodi ad facilem deiectionem
sunt propensa, præsertim si cum humiditate lu-
bricum quiddam habeant: Porro alimentum
corpori præbent exiguum. Et, Blitum olus est ef-
fultentum, humidum, frigidum, & temperatè in se-
cundo maxime excoctum à temperatis. Hippocra-
tes contra, Blitum scribit esse *Sequens d. 3. d. 3. d. 3.* id
est, calidum esse, & ad excernendum non incita-
re: Imò fluxum muliebrem resiccare.

Ex Plinio

Plinius inuile stomacho esse ait: ventrem a-
dèd turbare, ut cholera faciat aliquibus. Dicit
tamen aduersus scorpiones potum è vino pro-
desse, & clauis pedum illini, item lienibus, &
temporum dolori ex oleo. Hippocratem men-
strua sisti eo cibo putare.

Venerum
mouet.
Aluum eis

Blitum album Tridentina rura Bredone vulgò
appellant, ut scribit Matthiolus, & à nonnullis
in cibum admittitur. Primum aqua decoquunt,
dein affuso oleo, vel butyro, in sartagine frigunt,
additis Allio, & Omphacio, vel aceto, sed is cibis,
ut is vltu sese compenisse testatur, vomitiones mo-
uet, ventriculi & intestinorum tormina facit, &
alui fluxiones citet excitata bile. Mirum igitur, si
Hippocrates, Galenus, Plinius, Matthiolus, vera
scripserunt, quod dixerit Dioscorides alitum al-
uo vtile esse, nullius in medicina vltus.

Dign. not.

Alita hæc numerantur. Alitum pulchrum re-
ctum magnum rubrum. Rubrum minus. Pul-
chrum magnum, album. Album minus. Ere-
ctius, siue 3. Tragi Maximum, siue Amaranthus
maior, semine albo. Sed & hæc ad bliti genera

referuntur. Amaranthus purpureus. Amaran-
thus panniculâ speciosa cristata. Simphonia Da-
lech. siue Amaranthus tricolor.

Est præterea nobis blitum 4. Tragi, Atriplex,
Pes asserinus dicti. Item & blitum 5. eiusdem,
nobis Atriplex, dictus Pes asserinus alter, siue
ramosior. Alitum illud scetidum à quo apud Plau-
tium alitea meretrix cognominatur, dicemus A-
triplicem scetidam. Nec est ut quidam falsè pu-
tant Spinachia alitum. Officinæ quoque non ra-
rò cum alito betam confundunt. Errant demum
qui putant Cynocrambem esse bliti genus.

Alasimâ,
siue Ama-
ranthus
maior.
Purpureus
pannicula
speciosa
tricolor.
Duplex per
asserinus.
Atriplex
scetida.
Spinachia.
Beta. Cyno-
cramba

BLITVM PVLCHRV M RECTVM MA-
gnum rubrum.

Facilis adolescentia, radice pollicari fatua, ut &
tota planta, caule fistuloso, inus extraque

Descriptio



sanguineo ru-
bore perfuso,
concolorè-
que succum
pressu remit-
tente. folia ne-
taceis minora,
magis rugola,
quæ cælum spe-
ctant ex rubro
nigrescunt, pro-
nâ parte hila-
rius rubent:
stipulis molli-
secundum cau-
lem, apiculis
validis con-
stant, semen A-
triplicis sylue-
stris, vel Ama-
ranthi nigrum,
nitens.

An Aduers. An Lob. blitum ru-
brum
Lob. & Penz, Blitum rubrum intensè rutilis san-
guineis caulibus, foliis ex rubro liuentibus, & l-
con. plant. blitum rubrum: An Dodon. gall. blit-
um magnum rubrum sine iconè: An Lat. pin-
genti blitum rubens: Est Apollinari sub nomine
Blut wurtz pictura mala, quæ videtur aliquate-
nus alitum maius exprimere. An Hermol. quod
Fuchsius affirmat: alitum siue alitus [Græci etiam
bleton] rubens: An Matth. alitum rubrum, qui in
post. comm. lt. pingit hoc titulo, alita rosso: in
Lat. blitum rubrum: in Hist. Germ. Kottet mes-
yer / aut Blutkraut: An Lob. Oblitum Matth.
hoc pingit hoc titulo, alitum: An Anguill. alitum
nigrum, cuius meminit Alexander Trallianus lib.
8. cap. 7. An Ruell. qui partem suæ historię &
Hermolao sumpsit: alitum rubens & rubrum o-
lus, vel poretæ rubra vulgò: Sed videant Lecto-
res ne fortè Poretæ rubra Gallis sit beta rubra.
An Gesn. hort. alitum peregrinum, vel alitum fa-
tuum rubrum, vel alitum vulgè.

An Aduers.
An Lob.
blitum ru-
brum
Apollinari
sub nomine
Fuchsius.
Lob. mat.
An Poretæ
rubra
Ruell.

Taber. ic. & Hist. alitum. C. Bauh. phyt. alitum
3. siue rubrum maius. Hort. Lusar. alitum ru-
brum.

Vidi Basileæ in horto D. D. Felicis Plateri, cu-
ius semina Montbelgardis terræ commisi, quæ
plantas protulerunt Iulio & Augusto mensibus
florentes, seminæque Octobri maturescentes,
seque ipsas quotannis ex deciduis seminantes.

locus &
tempus

BLITVM RVBRVM MINVS.

Descriptio Satis magnam radicem pro plantæ ratione habet, rubentem, fibrosam, ex cuius capite plu-



Synonyma

res caules oriuntur, supini, rubentes: & in his folia multa. Solani hortensis, minora, nervosiora, colore attrouiente, sapore satuo: ex quorum alis secundum caulem numerosi nascuntur flosculi, ex herbidis & mucosis fibris compositi, obvium serè eludentes.

Tragus, à quo cap. de alio primum describitur, vocat blitum nigrum, A-

triplicisque filu. genus facit. & dicit posse vocari Atriplicem finariam [Musimilthen.]

Aduers. Lob. & Penz. alitum minus rubrum. Lob. ic. pl. alitum rubrum supinum. Dod. Gall. alitum rubrum paruum. Camer. Hist. Matth. Germ. alitum rubrum: & Epit. alitum rubrum minus. C. Bauh. Phyt. alitum 4. siue minus penitus rubrum.

Scrutur in hortis, ac etiam in iis spontè produnt, ut & præsertim in iis locis in quibus fœmus pecorum aliquandiu asseruatus fuerit.

BLITVM PVLCHRVVM MAGNVM, album.

Descriptio Et hoc simile rubro, nec ab eo nisi colore differens, caule ut illud assurgens unico, magno, firmo ad duos trève cubitos erecto, albo: sed foliis maioribus, nisi locus interdum audior diversitatem faciat.

An Hermol. alitum candidum? An Ruellio, qui partem suæ Historiæ desumpsit ex Hermol. cuius tamen non recorjatur, alitum candidum, quod Turgon in Narbonensi Gallia esse scribit, aut malè, ræo iudicio, videant Lectores. An Matth. Blitum album, cuius figura ex Fuchsio desumpta videtur, ac alterius esse plantæ.

Quam Aduersaria Lob. & Penz. blitum maius album vocant, vereor ne cum blito 3. Tragi confundant, cui folia Ocymi tribuit. Dodon. Gall. ni fallor, hanc describit primo loco, ac vocat blitum magnum album, figura autem, quam ponit, blito 3. Tragi debetur: Lat. fortè in solub. blito maiore, iconem Lobelii, quæ meliùs convenit, proponit.

Gesn. hort. alitum sativum album. Hist. Lugd. aliti albi maioris titulo alitum 3. Tragi ex Matth. depinxit. C. Bauh. phyt. Blitum 1. siue album maius. Hort. Lus. Blitum album.

In Burgundiorum Paultuse vidi: ac plantavi Montibelg. in horto E. G.

Blitum album minus.

Radicem agit profundam, crassam, fibris multis constantem, eulsu difficilem, albam, in superiori parte nonnihil rubescentem: caules plures, in principio aliquantùm rubentes, ad dodrantem, pedemue plurimum per terram sparsos fungosos, succi plenos, albos, serè rotundos, nonnihil striatos, fractu faciles, foliis alternatim dispositis: inferioribus, breviori pediculo, superioribus maioribus longiori hærentibus, oblongis, subrotundis, in extremitate obtusis & fissis, ex viridi nigricantibus, ornatos: ex quibus ad cubitalem vel ampliorem altitudinem pro ratione loci unus elevatur, desinens veluti in spicam, principis florum Bliti, vel Amarantii maximi similem, floribus & seminibus plenam. Ramulis etiam in foliorum exortu insident flores sine pediculis, racematim coherentes, virides: odor ex viriditate quodammodò gravis: sapor quoque viscidus. Herba inter hortorum vitia valdè odiosa, quia se expandens alias suffocat.

Trag. Blitum 1. seu Atriplicis filu. genus alitum: Atriplex finaria propter rationem iam dictam. Lob. & Penz. Adu. Blitum minus album. Dodon. Gall. Blitum minus [à la tige verte]. Camer. ad Epit. & Hist. Matth. germ. Blitum album. Hanc Gesn. in h. Cortchorum vocabat.

Montibelgardi abundat passim Blitum minus album vel potius viride. Geneuz quoque frequens: Tubingæ, ac Tiguri, in agris non cultis secus itinera, in hortis & areis.

Blitum nigrum seu Sanguinaria illa, à mulierculis nonnullis in dysenteris & sanguine sistenda usurpatur. Succo eius expresso minii vice in scriptione usurpasse sæpè in puerili ætate se meminisse Tragus. Refrigerat, inquit Matth. humectat, & emollit. Menies remorantes prouocantur, molè & secundè educuntur, si fœminæ vapore decocti calidi suffiantur, aded ut vapor ad vterum ascendat.

BLITVM ERECTIVS, SIVE

3. Tragi.



Plurimis fibris radicata, parum altè demissa, nonnihil rubentibus, quo etiam colore præditi sunt caules quadrati, dodrantales aut cubitales, exsuccis, ramosis: in quibus nascuntur folia ex intervallis modò aduersa, modò Ocymi, aliàs acuta, aliàs obtusa, minùs crebra quàm in aliis Blitis, ex quorum alis & in ramorum extre-

mitis racematim flosculi coherent purpurascetes: subsequenti paruo semine nigro Portulacæ sanguineo florido colore ex afficta tingente. Fl. gusa

An Blitum candidum?
Ruell. tax.
tur. Turgon

Lob. 1.

Locus

Descriptio

Synon. gura Fuchsiana non in omnibus placet.
Hanc pingit Tragus hoc titulo, Blitum Maier:
ac pro Blito 3. [Orunt Mist Milten] describit, ac
addit: Est & hæc Atroplicis siluestris species, her-
ba innoxia, quæ inter cætera olera non raro legi-
tur, potest fieri ut pluri sit species.

Fuch. bot. Fuch. Hist. & Icon. figuram Trago similem ha-
bet, verum descriptio ex Hermolao ad aliam plan-
tam pertinere videtur.

Dod. not. Dodon. gall. figuram Fuchii habet siue Tragi
hoc titulo, blitum, *blerte*. Descriptionum autem
quas Dodonæus posuit nulla conuenit. Latin. in
fol. eandem ponit & describit, sub titulo, bliti mi-
noris.

Mat. not. Matth. picturam habet quæ videtur facta ad
imitationem figuræ Fuchii, cui titulum facit, ali-
tum videtur tamen non respondere descriptioni
aut plantæ quam existimamus eum intelligere.
In comm. Ital. eandem figuram habet sub titulo
bliti albi: Item in Hist. Germ. Mirum cur ponat
duas figuras, cum dicat Blitum album iisdem foliis
provenire quibus rubrum.

Iam dictam Matth. figuram proponit etiam H.
Lugd. sub hoc titulo: blitum album maius, at eius
descriptio non conuenit.

An Gesn. hort. huius meminerit nomine ali-
ti siluestris lectoribus considerandum relin-
quo.

Polyperon
Polyperon Anguill. & ex eo H. Lugd. & Lobel. Obs. Poly-
sporon Cassiani Bassi. Ic. Plant. Polyspermon, à
seminis, ut in Obs. contendit, florique muscoli
botrydi non dissimilifloratâ, quibus onusti nu-
merosi cauliculi.

Locus & tempus Genevæ proveniebat in hortis: Montbelgardi
satis vulgaris: spontaneus etiam in Horto E.C.
semine maturo Augusto. Monspelii quoque ob-
servavi.

BLITVM MAXIMVM, SIVE AMARAN- thus maior, semine albo.

Descriptio



mores digesti, easque frequentes, & rubæ instar
nonnunquam in latum luxuriantes, colore fuli-
ginoso, aut purpuræ obsoletioris, staminibus lu-
teis, quibus semina succrescunt minuta, alba, Mili
excorticati æmula.

Synon. Et hoc est illud, quod Matth. in post. comm.
cum mag. fig. It. & Lat. Blitum maius vocatur.

nist. Germ. apud Carver. Blitum Vngaricum &
Epit. Blitum. Et Icon. Blitum rubrum maius. Do-
don. Lat. in fol. Amaranthus maior floribus obso-
leti coloris: Lobel. & Pena in Adu. Blitum maius
Matthioli vocant. Lobel. Ic. plant. Amaranthus
maior floribus panniculosis, spicatis, purpureis.

Gesn. hort. Amaranthi specie maxima, semine
albo, *Pennachia* Italicorum fortè. An eadem ex Mo-
nachis, Blitum Indicum vel Topiatium, planta ex
Indiis nuper inuentis allata.

Tab. Icon. & Hist. Blitum Indicum. An de hoc
Pet. Cieca c. 40. par. 1. Chronici, *Quinna*, [ut vult
Clusius] ex qua potionem parant, aut elixir vel-
cuntur.

Cæsalp. Bliti genus aliud, siue peregrinum, de
quo ait: Seritur hodie in hortis non solum ad ci-
bos, sed etiam magis pulchritudinis gratiâ, ob co-
loris venustatem, grande est, specie serè arborea:
folia sunt Blito longiora, rubentia, caulis crassius,
striatus, tuberosusque, ad quaternam cubita acce-
dens, ex alis, & ex summis ramis paniculæ lon-
gissimæ exeunt ac tenues, colore nigrescentis Rosæ,
specie floris Amaranthi, sine odore: semina in
his multa continentur, candida, Panico exiliora,
quæ in cibos veniunt. An hæc Erysimum fuerit
apud Theophrastum inter fruges, quod Trionum
veritè Theodorus, Plinius Trionem vocat?

H. Lugd. & Cast. Blitum rubrum maius. Casp.
Bauh. Phyt. Amaranthus maximus, siue cristat-
us: Apud Matth. Blitum maius Matthioli. Hort.
Lus. Amaranthus purpureus maior.

Blitum maximum siue Amaranthus maior se-
mine albo simili Milio excorticato, Genevæ in-
terdum excedebat altitudinem hominis: Lug-
duni etiam in horto meo florebat Septembri &
Octobri: nascitur in hortis variis vidi florens
Iunio. Montbelgardi in hortulo meo, & Hor-
to E.C. satum facillè provenit. Aliquando acce-
pi nomine Amaranthi Indici: floret Augusto,
semina matura Septembri. Habetur etiam in fi-
culibus ad fenestras opacandas.

AMARANTHVS PURPUREVS.

Descriptio
Flori eximie venustatis Amarantho purpu-
reo, radix crassa, Bliti, succulenta, è rubore
candicans: caulis singularis, purpurascens, po-
tissimum propter terram, striatus, alternis alis
concauus, cubitum, aut sesquicubitum altus: fo-
lia bliti, acutiora, minus ut plurimum rugosa,



atrovirentia,
per margines
nonnihil ru-
bentia, sapore
saturo: è quo-
rum alis ma-
gnæ gratiæ flo-
res coccinei
pediculis suis
insident caetu-
laues, modò
cui spicæ sin-
gulares, modò
coniunctæ plu-
res, quorum si
singulares su-
mas flosculos,
quintis foliolis
rotundèq; apici-
bus constant.
Semen per ma-
turitatem ni-
grum, parvum,
avidum

nitidum, lubricum, rotundum, compressum.

Synon. Opumē sentiunt meo iudicio, qui presentem plantam censent esse *Amaranthum* Plinii, sic scribentis, *Amarantho* non dubie vincimur. Est autem spica purpurea verius quam flos aliquis, & ipse sine odore. Mirum in eo, gaudere decerpi, & laetis renasci. Provenit Augusto mense: durat in Autumnum. Alexandrino palma, qui decerptus asseruatur. Mirumque, postquam defecere cuncti flores, madefactus aqua reuiuiscit, & hybernas coronas facit.

Tempus Risti sese exponit Ruellius ut qui de ignotis scribere ausus sit. Si enim nouisset, nunquam sane ex *Amaranthi* radice bulbum fecisset. Pro pudor, libros sate consulisset, si ipsa autopsia doceri non potuit, aut non voluit. *Amaranthus*, inquit, radice est bulbosa &c. Sicut de eo priuatum Dioscorides quantum multos flores hac nominum ambage complectatur, ut *Ageraton*, *Elichryson*, & alios complures, forsitan quod paucis viribus in Medicina polleteret. Galenus *Heliochrysi* nomine *Amaranthum* exprimit, &c.

Qualitas Circeam [Dixeram alii] hanc plantam Trago appellare placuit, licet radix non quadret, in hac namque nullum singularem odorem deprehendere licet qualem Dioscorid. & Plin. Circeae tribuunt.

Est amoris Cordo in Diosc. Purpurea *Amaranthus* Plinii vulgo Flos amoris dictus, nullam faciens medicinam. Eadem in Hist. [cui Gesn. figuram addit ex Trago,] Fusch. Matth. Lacun. Lonic. [eius *Amaranthi*, sylv. quid?] Hist. Lugd. quæ alteram *Amaranthi* angustifoli Lobeli figuram habet, de qua inferius. Dodon. de flor. Hist. gall. & Lat. *Amaranthus purpureus*. Sed Dod. qui eandem figuram etiam pro Bliti specie alibi sub *Amarantho* purpureo saturo cocci colore exhibet, in descriptione non ostendit, an spicae sint singulares, vel diuulsæ, olim figuram habebat Fuchianam, nunc ei figura cum spicis diuulsis. *Amaranthus* 1. Castori, Gesner. hort. *Amaranthus* Plinii, *Gelofia* Gellorum, *Gelofa* Cardani. Est hæc planta *Phlox* siue *Flamma*, ut interpretatus est Gaza, Theoph. Anguillare. Cels. *Amaranthus*: Lob. & Penz. Aduers. & Icon. plant. *Amaranthus purpureus*, saturo coccineo. Obs. *Amaranthus*, perperam Circeæ Trago: *Phlox* siue *Flamma* Theophrast. Anguillare.

Dodon. taxatur. Tabern. icon. & Hist. *Amaranthus purpureus* maior, cuius effigies habet spicas nonnihil diuulsas.

Bliti species C. Bauh. phyt. *Amaranthus* 2. siue simplici spica, in cuius genere & cristatus nonnunquam, Circeæ Tragi. *Amaranthus* 3. [apud Matth.] siue panicula sparsa *Amaranthi* Plinii.

Amaranthi Plinii Hort. Lusit. *Amaranthus purpureus* vulgaris: *Amaranth* maior floribus paniculosis spicatis.

Phlox siue Flamma *Amaranthus purpureus* Græcè, ut quibusdam placet, inter quos est Amatus, dicitur *χρυσόξαν*, propriè autem Gerin. flor amor / Blümlin der hebe / Taüsent schön, & sammet blüm. Belg. flower bloemen. Gall. Pisse Belours, ou Fleur d'amour, & Fleur de l'ouffe. Ital. Amaranzo, seu Fior velluto, Horta. Fior di grana. Angl. flower gentia. Turc. pürple veluet flor. ut flor amour. Boh. Broet milosti. *Amaranthus* [Amaranthus] quoniam non marcescat, sed recens & exsiccatu diutius purpureum & flammeum colorem conseruet, dicitur. Quid si ex amore & anthos dictio-nibus nomen compositum sit, id quod illa appellatio Flos amoris innuere videtur. Pisse-verre dialectum gallicum, passivum Ruellius

reddidit, quo nomine holosericum villosum coccineum, Carmesinum dictum, Galli nuncupant, cum quo de coloris principatu certet.

Locus & tempus *Amaranthum purpureum* colunt Monspelii in hortis: Basileæ habui in orto Patris florens lunio, habebant & alii, ut Dominus Cælius. Dom. Theodorus Zvingerus. Genevæ solent in hortis serere, Patavii vidi in hortis. Montbelgardi in orto Ill. E. Cell. solet provenire. Proveniant spicae Augusto mense, durant in Autumnum.

In figulis & hortulis suis puellæ plantare consueverunt hunc. Ceterum aliofosa planta hyemis impatiens, quotannis è suo semine repullulaleit. Mirum cum defecere cuncti flores, madefactus aqua reuiuiscit, & hybernas coronas nedit. Quà dote iam in scilicibus seritur, ut ab Augusto floreat in Octobrem, quo tempore gestit frequenter carp. Collectum & furni tepore siccatum, puellæ ad coronarios hyemis usus reconducunt.

AMARANTHVS PANNICVLA SPECIOSA cristata.



EX omni. Descriptio.

bus *Amaranthi* palmam obtinet, floris elegantior præcipue species, medix inter Blitum maximum seu obsoleti coloris *Amaranthum* & eum qui simplici spica est, magnitudinis, caulibus nempe multis ab eadem radice surgentibus,isque ramosis, striatisque, cubitum alterum altis, quos cortex obtegit

succo sanguineo propter terram surgens: folia ex intervalis, quam *Amaranthi* simplici spica maiora paulo, multo vero angustiora quam illius obsoleti: ex quorum alis, adeoque & in ramulorum fastigiis fulgentes flores non tam spicati, quam reticulatim decussatimque reflexis, simplicisque paniculis cristatis latioribus conspicui, ita minulis dilutione purpura tinctis: paniculae interdum fert palmares ac uncias tres latas, quales habet.

Synonyma Dodon. gall. *Amaranthus purpureus* 2. Lob. & Penz. Aduers. Obs. & icon. plant. *Amaranthus holosericeus* sanguineis floribus. Camer. in Epit. & Hist. Matth. Germ. *Amaranthus cristatus*, hanc *Pham* / Straßßedern. Hist. Lugd. *Amaranthus holosericeus*, Lobeli. C. Bauh. phyt. *Amaranthus* 4. [apud Matth.] siue panicula incurva.

Locus & tempus Varus in hortis observauit. [mihi Montbelgardi etiam provenit in orto Ill. E. Cell.] florentem Augusto & Septembri.

Vires & usus Flores, folia, & radices huius plantæ ad sicciorum accedunt temperaturam. Hodie in corollis puellarum texendis duntaxat usurpantur. Ceterum, tribuuntur huic passim vires quædam in

Historia
repreh.

vulgaribus & impressis Herbariis, quibus fides sine ratione nequaquam est adhibenda. Et hinc iure maximo Dodon. in hæc verba prorumpit: Recentiorum plerique Amarantho purpureo, & præcipue primo adstringendi cum frigidityte & siccitate potentiam, sanguinisque omnem florem sustendi, vires attribuunt: quas tamen ei inesse nulla qualitas ostendit, præter solum fortè colorem quo spicæ rubent. Nam rubra omnia sanguinem vndeque fluentem cohibere ac suppressere, quorundam est opinio: eò quòd quidam sanguinem suppressoria, talia colore sint. Sed ex coloribus de virtutibus simplicium & medicamentorum, certè nihil colligitur, ut Galen. de simpl. med. facult. secundo & quarto dilucidè ostendit. Qua de causa & perperam ratiocinantur: qui Amaranthum purpureum, sanguinem suppressere, colicacos & dysenteriacos adiuuare, ex solo colore iudicant. Videsigitur periculi plena esse, quæ à Matth. approbantur. Huic, inquit, facultas inest [ut Recentiorum quorundam fert opinio] frigida & sicca: proinde flos eius potus colicacos & dysentericos iuuat. Mensium abundantiam cohibet, & albas vteri fluxiones. Quinetiam cruenta expuentibus prodest, præsertim si in pulmone, vel pectore, vas aliquod fractum fuerit.

Matth. a
natur

SYMPHONIA DALECHAMPIO, SIVE Amaranthus tricolor.

Deser. H.
Lugd.



Hanc ita describit H. Lugd. Radice est breui, candida, in turculosas propagines diuisa: caule vnico, pedali, rubente: foliis albi, alternatim viridi, roseo, & luteo colore pictis, sic ut in lingulis foliis adultis & perfectis ea coloris varietas (Pluracorum plumas referens) iucundissimum intuentibus præbeat

spectaculum. Semen profertur in exigua spica, villosa, cauli adhaerente sine pediculo. flauescens punctis notata, quod vice floris est, perinde ac si natura tantum venustatis ac gratiæ prius in folia contulerit, ut deinde veluti picturæ florum oblita eos vix inchoatos reliquerit.

Synon:

Symphonia
Gomphrena
Genesia sine
Helisia
Celosia
An Lycop.
seos aut Anchusa
asperes
Disce Papagalli, et
Theobrotum
Plinius
Blitum maculatum

Hæc stirps Symphonia Plinio dicta & Gomphrena à nobis existimatur quam Ruell. Genesiam, siue Helisiam vocat. A Trago Celosia Italarum dicitur, germ. Widerschein. Verum nomen aliquod in Dialconide habere, se ignorare fatetur nisi fortè Lycopseos, aut Anchusa species sit.

An in Aduers. à Lob. & Pena inter Amaranthos recensetur, vocaturque Amaranthus tricolor, ac quæritur, vulgo Papagalli siue an Theobrotum Persarum apud Plinium? A Lob. Obs. & Icon. Plant. Amaranthus tricolor: An Gesn. hort. blitum maculosum? An eadem de coll. stirp. Ama-

ranthus cum herbaceo verticello, floris loco? An de hac Adrian. Spieg. Isag. loquitur? Color alius duplex triplexque, ut generi bliti quod tricolos appellant, à triplici colorum varietate, quæ in foliis annotatur. Hoc nonnulli Plinii Siphoniam volunt.

Notat Hist. Lugd. aliquos pro Symphonia Plinii, Dalechampi (hoc enim titulo hanc plantam proponit) Symphonā, aut Symphenam scribere: pro Gomphrenā, Cremphenam & Comphenam: Eamque ab Hetrascis hodiè, Herbam mirabilem [Herba de la marauiglia,] appellari, ob excellentem & admirandam coloris in foliis varietatem.

Hæc & C. B. Phyt. Amaranthus fit, & quidem si siue folio variegato, de quo ait. Blitum variegatum alii cognominant, alii Corethoro cognatum faciunt. Hoc coloris varietatem in foliis ostendit, in altera hilarior, in altera obscurior, quare illam sceminam, hanc marem nominare solent. Hort. Lus. Amaranthus tricolor, pictus: alitum varium: Papagey federn. Turn. bliti genus, medio folio rubro, modò virente.

Symphoniam Plinii Dalechambio, meo iudicio bene denominatam vidi basilicæ in horto Di. Doctoris Felicis Platerii, semine turgentem mense Septembri. Tanta est pulchritudo & varietas colorum ut propterea vocetur Gallicè Montpelier l'aleuse, quasi diceret summè expectandam & inuidendam. D. Vlysses Aldroandus cum essem apud illum nononiz vocabat Theombrotium Plinii. Montbelgardis septius in horto meo & Horto E. C. prouenit satis: sed ad maturitatem non peruenit. In hortis, ut legimus apud H. Lugd. colitur ad acetariorum vsum, præsertim ab olitoribus Italis, allato ex Hetruria semine. Altiola est hæc planta, ad primam frigoris inclementiam flaccescens. Quamobrem ante veris teporem eius semen olitores terræ credere non audent, ne tenella herba algoribus vtiatur ac pereat. Sapor idem qui & Bliti, nisi quòd paulullò magis austera est: quare in posca sanguinem reicientibus medetur auctore Plinio.

Vires

ATRIPLEX RVBRA ET ALBA hortensis.



Non rard Descripco hominis staturam adæquat, caule imo terete, supremo angulato: folia Petz. minora, ad pediculum quasi alata, nonnihil in ambitu sinuata, copiosa farina respersa, colore ex viridi in luteum languente seu Xerampelino, gustu saturo: strobili copiosi apiculis constant luteis vel herbidis, quibus succedunt siliqua foliaceæ, latæ, in quibus semen Amaranthi. Radix recta, palmum longa, aut circiter fibrosa.

cedunt siliqua foliaceæ, latæ, in quibus semen Amaranthi. Radix recta, palmum longa, aut circiter fibrosa.



fibrosa. Nec alia Atriplicis sativae rubra facies, nisi quoddam sanguineo colore tota picta est.

Diosc. Atriplicem, Chrysolachanum vocat, & olus cognatum, idque in sativum & silvestre, ut etiam Plin. & Galenus, dividit.

Theophrastus radicem lignosam tradit, vnam altè descendentem, vnde alix exeant, copiosè fructificare, nam

protinus nodis singulis semen infidens racematim gent à latere & in summis, semen foliatum, ut in Lasepitis.

Sed licet Atriplicis duo genera tantum tradant Diosc. Plin. & Galenus, sativum & silvestre, attamen dari & tertium, quod est Maritimum, nemo inficiabitur: cum teste Maranthia, ex frondium, seminum, radicisque similitudine liquidò appareat, non habere aliam differentiam, nisi quoddam salso gustu sit, propter maris contiguitatem, foliaque subalbida habeant, quod omnibus maritimis euenire solet. Sed misso silu. & maritimo, de sativo hoc cap. tractabimus.

Fuchsius itaque videtur vnicà descriptione & figurà, quam Atriplicem hortensem subscripsit, ambas proponere. Tragus Atriplicis sativae tria fastigia facit. Scribit enim quandam proferre folium rubicundum, aliam ex luteo languescens, porrextam nigricans.

Videtur lac. Theod. Tabern. cum Hort Lusit. in eadem specie rubra ponere tres colores, aliter quàm Tragus: certum est albam permanere albam, & rubram rubram, quicquid dicat Theodorus. Nos ponimus duas figuras quia ex Fuchsiis erant sculptae.

Matth. qui alias solum domesticam nominat, in ist. germ. Atriplicis Graminis modo virentis, rubra ut ignis, & pallidè lutea meminit. Anguill. Atriplex domestica. Lonic. cuius figura displicet, rubram, albam & virentem tradit. Gesn. hort. Dod. gall. Atriplex sativa, alba & rubra. Non esse autem cum Trago Matth. Lonic. & aliis Atriplicis sativae tria constituenda fastigia docet Dodon. Latin fol.

Lob. & Penz Adn. Atriplicis sativae duplicem constituunt speciem. Vnam, quam Chrysolachanum vocant Dioscoridis tum Antiquiores tum Posteriores, cui folia marcescentia à luteo vel flauo in aureum vergant. Alteram, folio & flore purpuream, luteam.

Ex alp. Atriplex, folio colore ex viridi pallente. Camer. hort. Atriplex purpurea grandis, semel lata postea decedente semine proveniens. Hist. Lugd. virentem licet Atriplicis sativae exhibeat, tamen, albam tamen & rubram recipit. Albi. inquit, folia eum tenella sunt, candidant, cum adoleverint, colore ex viridi in luteum e-languescunt. Alterius folia, caules, flores in rubro fulvescunt.

Alph. Moresch. Atriplicem impropiè sanè Tom. I

Chrysanthemum vocat, quod haecenus apud neminem me legisse memini.

C. Bauh. Atriplex hortensis alba. Atriplex hortensis rubra: ad Matth. Atriplex hortensis rubra. Atriplex domestica: & ab hac differens, colore potissimum, hortensis alba.

Gerard. Atriplex sativa alba: Atriplex sativa purpurea pro qua ab ipso malè ponitur icon pedis aserini. Tabern.

Præsentis planta Latini in genere dicitur Atriplex. Græcis, αἰνιστὰς ἢ χρυσολάχανον [aureum olus] Arab. Caraf, seu Caraf. Germ. Molten/Milsten. Belg. Malde: Ital. Atriplice, & Armula, Trapeze Reppie & Troppie: Gall. Arrouches, Bonnes Dames, preudes femmes. Montb. des Arables. Bizont. Des Armoues. Gen. u. r. Fellefles, Hisp. Armolles: Angl. Orrage seu Orade: Boh. lebeda.

Atriplexum, ut Feltus refert, appellabatur ab Atriplice atro, ut aliqui putant, colore. Verum à voce Græca potius quàm ab atrore fluxit nomen. Nam Atriplicis olus αἰνιστὰς Græcis dici Columella testatur, Hippocrates αἰνιστὰς appellat. Aet'y-chius αἰνιστὰς, quod αἰνιστὰς, & Suidas αἰνιστὰς [Atriplicis, d. hieram in t mutare frequenter amantibus] αἰνιστὰς, i. rēgias ἢ ὑπὸν αἰνιστὰς, id est, quod statim in amplitudinem adolescat: siquidem octavo à sativ die profilit; confestimque incremento proficere conspicitur: fidem celeris augmenti facit ereptum in confinio cæteris herbis alimentum. Ac ne in hortis quidem iuxta eam nasci quicquam tradunt, nisi languidum: χρυσολάχανον, id est aureum olus græci appellant, quod auri colorem representet. Alij tradunt ab aureo sine luteo flore nomen hoc induisse.

Atriplex alba & rubra hortensis, non nisi sativa provenit, assiduoque humore satiri amat. Frequens Montbelgardi etiam in Horto E.C. Genoux observavi parvas plantas virentes, ex semine deciduo lanuatio, & florentem ut alias consuevit Iunio & Iulio: Potentiori magnas areas Atriplice ferunt, & maiori in usu quàm Montbelg. In retriuit hortis rara admodum Atriplex, frequentissima autem apud Insabres feritur, à rusticis in hortis & in campis. Hæc inter coquinarias herbas ocysimè assurgit, nam post quindecim dies à sativone vsuipatur in coquinis & tantum Vere edulis.

Atriplex, ut scribit Dioscorides, cocta estur ut Vitis olus, alium mollior: panos discuit siue cruda, siue cocta illinatur. Semen cum aqua mulla potum regium morbum sanat.

Atriplicis, ut oleris, in cibis sum cum Blito declarat Galenus, quæ de re antea diximus. Vltum medicum & temperamentum alibi sic explicat. Atriplex frigida & humida temperie est, humida quidem secundi ordinis, frigida verò primi, quam utique tepidam esse caliditatem posuimus, cuiusmodi Rosæ inest: non tamen adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimè terrena, similiter ac Malua. Quin & ventrem similiter permeat vella, ob lubricitatem. Hortenses autem Atriplices & Malua quàm agrestes tum humidiores, tum frigidiores. Quare phlegmonis & phygethitis incipientibus, gliscenibusque & mollibus etiamnum, ac velut feruentibus hortenses: vigenibus autem ac declinantibus, & indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abstergendi vim habet. Itaque ad morbum regium ex hepate obstructo obortum velle est. Ex quibus sanè verbis tota Dioscoridis sententia declarata est.

Atriplex & silvestre est, inquit Plinius, & sativa

Non n



Atriplex silvestris


scripsit. Nec placet Camerarium Atriplicis silv. 3. utulo apposuisse iconem sine descriptione: praeterea Matthiolum non meminit Atriplicis recte. Si figura facta est ad plantam, de qua hic agimus, ut suspicor, folia oportet esse sinuata non aculeata.

An Thal. Atriplex humilis minor,

quod Casparus Bauhinus Phyt. asserit, ac Atriplicem silv. 3. facit siue minorem.

ATRIPLEX SILV. FOLIS INTEGRIS racemosa.

Descript. & synonyma



Camer. ad Chist. Germ. Matth. Atriplex silv. 2. Icon autem proposita à Camerario non parum differt à Matth. icon: appingit enim racemulos non lappulas, vel potius latiusculos folliculos: is non describit.

Casp. Bauh. Phyt. Atriplex 3. siue sylvestris folio sinuato. Apud Matth. Atriplex 4. Atriplex silv. 2. Matth. Lug. Taber.

Atriplex silv. Cordo in Diosc. Cxsal. Atriplex sinuata Lobelii. Frater assumit figuram Tabern. quæ mihi diuersa videtur à Matthioli silv. 2. ægiam hist. Lugd. & Lobel.

Locus

Obseruauimus variis in locis in Sundecouia circa fimos.

ATRIPLEX VULGARIS ANGUSTI-folia cum folliculis.

Descriptio

Oblucida huic videntur folia, ut pene atria sint, ad Polygoni folia proximè accedentia, latiora, acuminata, subinde (quanquam rarius) laxissime sinuata: excreuit autem ad cubitalem & setquicubitalem altitudinem: flos radix, Atriplicis silvestris sinuata: folliculacea fert pericarpia, sæpè etiam rhomboidea, conferta, quæ dehiscuntia semen ostentant, singula singulum rotundum, compressum.

Est hæc Matth. (qui non describit, nec describitur).
Tom. II.



C. Bauh. Phyt. Atriplex 12. siue angustocentodia folio, Dod. Silv. altera Lob. Polygoni aut Helxines folio. Folius communiter oblongus, angustis, non sinuatis: reperitur tamen aliquando folius ad præcurrendum duabus alis donatus. Apud Matth. Atriplex 7. siue angustocentodia folio. Atriplex silv. 1. Matth. inter maiores figuras, inter minores enim non expressit. Dodon. Atriplex silv. humillima & quarta.

Montbelgardi & Baulex prouenit in vineis Locus & agrorum marginibus.

ATRIPLEX SYLV. MONSPESSULANA cum pulchris inuolutis.

Folia est breuiore (quo multum differt ab Atriplice Matth. 1.) albicante, sinuato, Atriplicis vulgaris, breui pediculo constante: inuolutis seminibus angulosis, quodammodo Cynoglossæ nostræ topariæ similibus, intra ramulos & foliorum pediculos prodeuntibus, semine includentibus paruum, compressum, nigrum: lappis etiam multo maioribus, nec velut in spicas desinentibus: ita ut habere aliquid videatur similitudinis; quod lappas attinet, cum Atriplice prima silv. Matthioli in post. figuris, melius tamen accedit ad secundam, quam facili existimari.

Non n.

mea ostendit) Atriplex in comm. cum mag. fig. Lat. Atriplex silv. Ital. Atriplice farina. 1. Hist. Germ. Atriplex 2. Wilde mels ten. Lob. adv. & 1. Plant. Atriplex silv. Polygoni, aut Helxines folio. Dodon. gall. Atriplex silv. minor: Lat. in fol. Atriplex silv. humillima, ramulosa, foliis angustioribus, floribus, seminibusque parvis respondens. Calp. Atriplex silv. breuior (siuè folio simili, sed minore, ac nigrore, coque circa summum caulem tenore, & sensim longore, seminibus similiter depressis, nigris. Camer. hort. Atriplex silv. Polygoni folio. hist. Lugd. Atriplex silv. 1. Matth. Polygoni folio 2. editionis.

Descriptio

HISTORIAE PLANTARVM

An Matth. in comm. cum mag. fig. Lat. & Ital. Atriplex sylu. 2. ? In hist. Germ. Atriplex sylu. Wilde Melten 2. An Lobel. Obs. & icon. Atriplex sylu. sinuata ? Camer. in Epit. & hist. Germ. Matth. Atriplex sylu. 1. hist. Lugd. p. 536. Atriplex sylu. 2.

An C. Bauh. Phyt. Atriplex 3. sine filu. folio sinuato ? Hanc, inquit Atriplicis sylu. hispida parua recte nomine à D. Doldio accepimus : eandem Monspelii Augusto mense frater Ioh. Bauhinus collegit. Apud Matth. Atriplex sylu. lappulas habens, à nobis primum descripta, cauliculi leuissimè hispidi. Hæc frater. Ego quidem anno 1561. Monspelii collegi, & descriptionem misi Do. Gesnero cum ipsa planta, At nihil hirsuti aut hispidi obseruauit. Considerandum an D. Doldius suam hispidam dixerit à capitulis & inuolucris angulosis seminum.

C. Bauh.

(qui dicit Diosc. & Galen. huius non meminisse.) Dodon. Lat. infol. H. Lugd. Atriplex marina, Meer Melten.

Lobel. & Penz. Adu. Atriplex marina repens &c. Lob. etiam Obs. & Ic. Plant. Atriplex marina repens. Sed repentem dicere non conuenit: spatiosa est supra terram, non repit.

Camer. hort. [qui ait rubro & herbaceo semine inueniri] Epit. & Hist. Matth. germ. Atriplex marina.

An Cynocrambes 3. genus, in maritimis visum, ramis humi procumbentibus, candidis foliis, rotundioribus, puluisculo argenteo aspersis, rotundioribus.

Gerard. ut antè dictum, pro Atriplice marina Matth. figuram Atriplicis sylu. demonstrat, quid pro quo.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Atriplex 9. sine maritima.

Atriplicem maritima habeo à Valerando Dourez. Jac. Reinaudeto, fratre C. Bauh. qui Venetias attulit ex Lib. Frequentem offendi scribit Matth. Tergesti ad salinas in maris litore: Lob. in maritimis mediterraneis & Adriaticis nusquam non obuiam, humi stratum.

Vis Atriplicis marinx quæ cæteris Atriplicibus, sed propter salsedinem, quæ referta est magis quidem aluum citat, magisque abstergit si è carnis iure decocta edatur, Matth. His addit Camer. Digerit, incidit, attenuat, liquat, à putredine vindicat, aperit, & abradendo expurgat. humentem ventriculum siccat, hydropicos iuuat, pingues extenuat. Atriplex marina primum crescens in Aestuarius Venetis, vnde quandoque cinerem parant ad conficienda vitra.

ATRIplex HALIMOIDIS LOBELII.

Descriptio Atriplex halimoidis Aescina est, caules edens ternum & quaternum cubitorum, & folia Halimiflores & semina racemosa cæterarum more. Mihi primum visa in vridatio Ioh. Muttoni Neruiensis Pharm. Seminis & rudera amat, Lob. Obs. C. Bauh. Phyt. Atriplex in Halyni folio.

Locus

ATRIplex ARBORESCENS.

Delineatio Semen quoddam ad nos milit Luretia Robinus Botanicus Reginus, nomine Atriplicis arborescentis insula Cælix dicit. Istud fere magnitudine Mili est, cinereum, rotundum ac modicè compressum, hylo candicante, sapore satuo, nec effatu digno.

Scribit hanc plantam semper virere: à nobis seminata est Montbelgardi in horto Ill. E. C. Vvirtemberg, quem colimus.

ATRIplex MARITIMA.

Descriptio



Atriplex maritima humi surgit caules cubitales numerosos, ex crassiusculis radicibus exortos, totos albicantes, per quos & folia candicantia sinuata, Pedis anserini similia. Flosculi per extrema pouissimum ramulorum facematim congesti, flores Portulacæ marinx imitantur. In icone à nobis preposita radix picta nimis crassa.

An Cordo in Obs. sylu. Atriplicis sylu. genus, gustu salsum Matth. in comm. lat. & It. & hist. germ.

ATRIPLICIS MARINÆ SPECIES Valerando.




Atriplicis marina habeo datam à iam dicto Valerando Dourez Pharmacopæo cui hæc ascripta. Atriplicis marinx species, Polyperon Cassiani Bassi quorundam. Hec valde similis Atriplici syluestri vulgaris, nisi eadem.

ATRIplex FOETIDA

Vix humo tollit caules, ut plurimum, ramosos, dodrantales, aut etiam maiores: quos vestiunt folia ex rotunditate modicè in acumen desinentia, pouissimum superiora, in inferioribus quædam sinuata, farinaceo puluisculo asperso candicantia, odoris virosi inextinguibilis, ut

Descriptio



Synonyma
Garosmum
Vulvaria

qui vel attra-
ctu leui manus
ita inficit vt
longo tempore
vix possit epi.
Fl. sculi racem-
mofi Atriplicis
alitarum sylue-
strium modo.
Radix gracilis
fibrata.

Cord. hist.
Garosmum, A-
grestis Atriplic-
is minima (for-
te minima) spe-
cies, Vulvaria.
Garosmum au-
tē dubio pro-
cul ex eo dicit,
quod rāger, si-
ne liqua nen

piscium redoleat.

Tragus Atriplicem caninam & scetidam, &
Blicum scetidum & Bonum Henricum app. illa:
Germ. güt oder stolz Heinrich / bundemilten.
Virium, inquit, Atriplicis potius est, quam quid-
uis aliud.

Sed & Lonic. hanc Boni Henrici [Güter Hen-
rich] nomine describit, nullam cum Trago po-
nens figuram, ac nomina Boni Henrici male ac-
cihens.

Dodon. gall. Tragium Germanicum, quorun-
dam Vulvaria: Lat. in fol. Garosmum, Atriplex
scetida.

Gesl. hort. Atriplex altera, Garosmum.

Lob. Icon. Plant. Atriplex pusilla, olida, Hirci-
na. Vulvaria vocata, Garum olens. De hac autem
Adversaria: Est in Nitobrigum agro, aliisque lo-
cis quāplurimis herbula Atriplici accensenda, se-
cus vias frequentissima, teneta, paruula: humi
demissa folia candore micant, quasi polline in-
terpersa. Hanc notissimam fecit odor, & sermē
infamem: odoratu namque hircus tetetque spi-
ritus opplet nares, quo imbuti queruntur perimul-
ti se meretricum impuros loculos subodoratos
esse: planeque referre odorem illum virosum
quem prostituta libidinis scorta ex impura col-
luvie congesta spirant. Inde vulgō *Futuriam* di-
cunt: atque autumant: hac illicitas vestium
muliebrium plicas canes sagire, atque atrecto ve-
retro Veneris aestu actos, illas amplexas cupere
init, praesertim in templis ubi tetius odor spirat,
& mitius ventis dissipatur. Hae vulgi sunt, tota ci-
bis abdicanda. Lob. Obi. Atriplex olida, Vulva-
ria, Garum olens, Garosmum Cordi.

Czasp. Cynocrambe affinis herbula folio mi-
nimē serrato: sine flore: semine racemoso, exi-
guo, rotundo: vulgō *Conina*, nam redolet mu-
lebrina: videretur Conyza tertia apud Dioscori-
dem: Sed quod hinc plantae Czasp. florem negat,
errore statet.

Vulvariam apud H. st. Lugd. & scetida odore
Tragium vocauit Dodonaeus. G. l. *Herbe de Bue*.
Quia verò duo sunt alia Dioscoridi Tragi gene-
ra, ad horum discrimen Tragium Germanicum
cognominavit. Alii Atriplicem caninam dixe-
runt, quia eam ex urina canum trahi putant.

Hinc Tabern. Vulvaria n. (Schamstraher/
Maugenfrucht) appellavit, dicta nomina in xiii.
ferē omnia adscribens. Gerardo, Atriplex olida

Tom. II.


dicatur. Angl. Stinkin Orach. C. Bauh. Phyt.
Atriplex 10. siue scetida.

Atriplex scetida, quae a nobis Montbelgardi,
Geneuz, Bailex & Lugd. observata est, iuxta pa-
rietes proveniens dicitur, & locis sabulosis, praeter
tum quae lotio canum sepius asperganur. Aestate
media floret, edisque semen. Vbi semel ad hortos
translata durius recurrit.

Ex vtero laborantibus gravitate odoris pro-
desse posse testatur Dodonaeus. Feminis stran-
gulatu vulvae oppressis, confere creditur, maxi-
mē si umbilico imponatur. Bonus hic Henricus,
inquit Tragus, vermes in ulceribus putrid sani-
mantium quadrupedum natos excutit certissimo
experimento, si herba tula ulceribus imponatur
id quod non semel ipse vidi. Sunt qui vermes
enim dicant, si herba solum ad allgetur iumento.

ATRIPLEX, DICTA PES

Antennus.



Pestimilis Descriptio
Pest Atriplicis
siue scetida. si-
nuata vulga-
tion, sed huius
flora ampliora
laxius & rarius
sinuata, atqui-
sentia, caput
grauante odo-
re praedita: fl.
racemosus A-
triplicis tam di-
ctae. Semen exi-
guum, rotun-
dum. Radix li-
gnescit fibrosa:
caulis crassius-
culus, rectus,
cubitalis.

Tragus hanc
inter Solana refert, & Solanum 4. venenolum
& furiosum, Schveins todt / Mortem porco um,
Schwylag supplicium. Idem, ab effectu expectas
vocare tradit ancillas. Idem & cum eo Fuch.
Dod. gall. & Lat. in fol. Tab. Gerard. & Gesl.
de coll. st. sp. qui tres & Chenopodium Plinij
vocant, pedem antennis nominant.

Matth. in post. com. It. & Lat. cum mag. fig.
Atriplex sylu. 3. Icon sine descriptione.

Lob. & pent. Adn. Atriplex sylu. (siue pes an-
terinus) lat. folia. Obi. Atriplex tylu. lat. fol.
It. plant. Atriplex sylu. (siue pes antennis), lat.
folia, lacetis laciniis.

Hist. Lugd. frustra duas icones proponit, ac
deterius diversis capitibus. An Thal. Atriplex
sinentia grandior? Czasp. Cynocrambe ge-
nus alterum, quod Herimol. testatur apud Plin-
ium Chinopum esse: i.e. Herbam similem An-
setino pedi. C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Atri-
plex 6. siue sylu. lat. folia, Cynocrambe, non au-
tem Dioscoridi s.

Atriplex dicta Pes antennis, cognominatur
a Germanis Gänß fuß / quibusdam Siew oder
Schveins todt? & Siew plag. Belg. Gänßen
vdt. Gall. Pied d'oye. It. Pied di Oca. Ang. Boon
se foot.

Secus veteres parietes, vias, semitas, alibi que
in cultis ac desertis humentibus nonnihil locis

Nann 3

Nomina
linguatum

HISTORIAE PLANTARVM

frequens est, viget ac floret vna cum Atriplici-
bus reliquis. Hanc Lugdani, Geneuz, nec non
Montbelgardi obseruauit.

Vitis.

Herba planè lethalis & pestifera maximè si à
suis deuoretur, Fuchlio & Trago auctoribus.
Facultate frigida & humida est, & quidem non
minùs Atriplice: sed vti apparet, etiam amplius
refrigerans, secundo ordine.

ATRIPLEX DICTVS PES ANSERINVS alter siue ramosior.

Synon.



Chenopodium
Pes anseri-
num.

Rorror Ge-
rardi

Blitum 5. &
Atriplicis
quintum ge-
nus Tragi est
simile 4. [id est
Pedi anserino]
à quo ferè ni-
hil differt, nisi
quòd folia ha-
bet acutiora &
magis nigri-
cantia.

Taber. Icon.
& Hist. Chen-
opodium, Pes
anserinus 2.
Gäss füss 2.
Gerard. Atri-
plex 2. fatiua
purpurea pur-
ple Orach. Qui
nalè pro Atri-

plice purpurea ponit pedis anserini 2. figuram.
C. Bauh. Phyt. Atriplex 7. siue sylu. latifolia al-
tera acutiora & nigriore folio.

Locus

In antiquis areis & fossis fimi ac pagis inueni-
tur.

PARIETARIA.

Synon
Descriptio



Vulgatis no-
tior est à
natalibus dicta
Herbaris Parie-
taria, hirsutis cau-
libus, ramosis, do-
nata: folia Mer-
curialis, hirsuta,
atrouidentia &
nitentia: stipes
còferti circa cau-
lem ex foliorum
alis floccos cocci-
nei serici imitan-
tur primulidm &
nodulo emican-
tes. post se flami-
na ostendunt ob-
scure, ex albo
purpurascen-
bus apiculis, in-
uoluta, quæ si

nullo euoluere conetis, subaltim excusso pulue-
re cum impetu spectaculo incundo, se expan-
dunt repanda, in medio seminis rudimentum cir-
cumdantia. Radix fibrosa. Est hæc maior & mi-
nor.

Hanc nostram parietariam Helxines nomine Disc. illam
delineat Dioscorides his verbis. Cauliculos pro-
fert tenues ac subrubentes, folia Mercurialis, hit-
luta: circa caules velut exigua semina, aspera,
vestibus adhzrentia.

Matth. Brunsell. (cui & Panetaria, & septima Synon.
Parthenii species:) Anguill. Fuchf. Dod. gall. Gesh. Parthenium
hort. Lacun. Lob. Adu. Obs. & Ic. Plant. Tuer. Perdicium
(cui & perdicion) Castori. H. Lugd. Czfalp. Ca-
mer. Helxine. Trago. Lonic. Cord. in Hist. Dod.
Lat. in fol. & Tab. Parietaria. Helxine altera &
Muralium, Cord. in Dioscoridem. Per Herbarum
uenti Fuchf. Adolph. Occo. Cord. Apollo. Luma-
nate maius, & alii Helxinem, siue Parietariam in-
telligunt.

E. Hym & modum Græcis, Helxine; Perdicium
& Perdicaria Lat. vulgò autem & officinis Parie-
taria, aut corrupta voce Parietaria appellatur &
Muralis: Extant verò eius & alia nomina, cum
apud Diosc. & Plinium, tum apud Apuleium &
passim alios, vt Sidentis, Heraclea seu Herculana,
Vitriaria, Vrceolaria, Veratium, Ixine siluestris,
Clibadium, Polyonymon, Elitis aut Alitis, Amel-
xine, Eufine, Amorgine, Sucotachon, Plichu-
con, Melampeton, Cuitampelon, Anatetamenon.
Diosc. Plinius & Apuleius Parthenium quoque
appellant. Sed animaduertendum est Plinium
huius nominis homonymià deceptum, duas
herbas diuersissimas confundere, nimirum Pa-
rthenium Dioscoridis, & Helxinem hanc nostram,
siue Parietariam:

Dicta autem est Helxine, quòd aspera folio-
rum hirsutie, asperoque semine, tenaci nexu ve-
stimentis obuiis adhzreat. Perdicium, à perdic-
bus, quæ eam elitare solent: Parietaria, quòd in
parietinis exeat, atque eadem de causa Muralis
& Muralium. Herba vitri, Vitriaria, Vrceolaris &
Vrceolaria, quòd tergendis vrceolis, vasisque va-
treis efficax sit. Dicitur Germa. tag vnder Nacht,
non tamen ea, quæ luteis purpureis & similibus
floribus insignis est (S. Peterskraut / Mau-
fraut Belg. Glas cruyt. Gall. Parietaire: Hisp. Yer-
ua del muro: It. Parietaria: Angl. Pellitory of the
Wal.

Nascitur iuxta muros, parietes, sepes, in rudi-
ribus, ac subinde in vineis, ac ipsis muris. In
hortis etiam plantata ita prouenit, vt inde vix a-
bigi possit: Maio mense exit: Iulio, ac Augusto se-
men profert: radix hieme solà restat. Introduxi in
Hortum E. C. ac etiam in meum, vbi hiemem per-
fert ac non solùm se radice multiplicat verùm et-
iam semine: Patavi passim prouenit: Montpelis
toto anno viret in muris: Montbelgardi verò pe-
reunt folia & Martii mense prorumpunt. Lug-
duni vidi virentem Septembri & Octobri. Ge-
neuz non longè à Porta Rine in sepibus & in va-
riis hortorum muris.

Vim habent folia Helxines refrigerantem, au-
dore Dioscoride, & adstringentem, quare impo-
sita sanant ignes sacros, condylomata, ambusta,
pannos incipientes, omnem inflammationem ac
tumores. Succus eius Cerussa admixta illitus, ery-
sipelata & herpetas sanat, & podagras cerato cy-
prino, aut adipe hircino exceptis: prodest & ul-
si diuturnæ succus cyathi mensura haustus. Ton-
sillis quoque inflammatis vtiliter gargazatur &
illinitur, aurium dolori cum rosaceo instillatus
prodest.

Helxine inscit lanas, inquit Plinius, sanat ignes
sacros & vlcera quæ serpunt (in vulgus exem-
plaribus verba hæc, & tumores collectionesque
perperam

perpetuam leguntur ex priore versu repetita) & guttura incipientia turgescere. Item veterem tussim cyatho hausto, & omnia (in ore tumida, sic enim legendum) sicut consillas: Et aurium dolores cum rosaceo. Eadem exemplaria habent varices cum rosaceo, nullo sensu. Helxine enim cum rosaceo in varices nihil agere potest, nec eius facultatis meminerunt Dioscorides, neque Galenus. Vetus codex arietes vocem habet, sed itidem corruptam & nihil indicantem. Quare locum sic, ut posuimus, Cornarius emendavit ex Dioscoride.

Abstergerendi & leuiter adstringendi vim cum subfrigida humiditate illi tribuit Galenus ad praedictos affectus etiam commendans. Facit, inquit Aëtius, ad alopecias & impetigines herba ipsa per se assidue affricata. Aperit & hemorrhoidas sedis, & fistulas sanat, & sinus occludit cum modico sale trita, & cataplasmatibus modo imposita. Ex his intelligere licet multos melxine abuti, qui eam in frigidis vitis pro somento usurpant, cum refrigerandi constringendique vi praedita sit. Ceterum cum adstringendi facultas ei quoque insit (est enim gustu nitroso, bliteo, & superficie abstergente,) potest etiam calculosis, & iis qui difficultate urinae laborant exhiberi. Succus enim eius trium vnciarum pondere haustus auctore Matthiolo suppreffam urinae mirè prouocat, eademque super tegula calefacta, vinoque Cretico irrorata, & pubi illita, calculosis & urinae difficultate laborantibus mirè auxiliatur. Potissimum, inquit Fuchsius, si aliquid quod maiorem abstergerendi vim habeat, admisceatur. Sic Aëtius hemorrhoidas aperire tradit, si cum sale cui detergendi vis inest, tuta apponatur. Multi hodie vsus est in enemaibus ad ventris & vteri dolores paratis, & ad balnea, absterfioni accommodata. Eiusdemvis magna est ad recentia vulnera sananda. Si enim recens semi contusa vulnere alligetur, tertioque die soluat, non erit opus alio vti medicamento. Succus in ore detentus dentium dolores mulcet. Stillaturia eius aqua faciem abstergit, & nitorem addit.

OCIMASTRUM VERRUCARIUM.

Descriptio.

EX radice tenui, fibrosa, sulcata, caulis surgit singularis, teres, subhirsutus, geniculatus, ex viridi rubescens, nitidus: folia ex articulis aduersa, Solani vulgari, acutiora, atrodiscentia, aut ex viridi purpurascens, per ambitum leuiter sinuata: flores in thyrsibus pulchelli, quadrifolii, colore carneo, bifori inuolucro, antequam patefiant, conditi, staminibus concoloribus medium occupantibus subiectis, hirsutis globulis, postmodum in lappulas abituri: quorum singulis modò vnum, modo vna semina oblonga recluduntur. Nostra icon facta est ad plantam ramolam.

Trago germ.



Lappula
fil.
Helicop
pium.

Lappula siluestris. Ocimi foliis herbam, Heliotropii genus, Gesn. aliquando putabat: nunc de hortis Ocimastrium verrucarium appellat. Lob. Obs. & Ic. Plant. Circam Luritanam dicit. Tabern. Ic. herbam Diui Stephani. nist. Lugd. Circam Dalechampi. Sed non placet planta huc pro Circam Diol. In descriptione etiam Dalechampi sunt, quae in ipsa planta non obseruo. Schvv. est Circam domestica, Ocimastrium verruc. Item, Circam siluatica, helxine filu. siue fluuiatilis Tab. [Thal. legendum] vald. tag. vnd. Nadr: minor est tota & tantulum rubens. Solanaturam emulatur.

C. Bauh. Phyt. Parietaria 3. helxine filu. seu fluuiatilis & ruralis maior & minor Thalyo quid est: Item Solanum 9. Solanifolia, Circam dicta, ratione loci variat. In monte Fracto multo minor est vix palmi dimidium aequans.

Ocimastrium verrucarium Montbelgardi in sylua le Chesnoy: item in sylua inter Esthon & Melgny Danigon: vnde in hortum E. C. transtulit: Basilex in syluis, nec non Geneue, & propè Masnunder, riuus & viginosis gaudet, locis opacioribus frequens. Inueni etiam ad putridos arborum truncos. In hortis reptatu suo odiosa.

MERCVRIALIS MAS ET

fœmina.

CAP. V.



MERCURIALIS MAS ET fœmina. Descriptio. Mercurialis mas et fœmina folia minimè distinguenda, quae inter se simillima, ad Parietaria & Helicopsum accedunt, sed glabra, aut virore splendens, & in ambitu serrata, sapore nitroso calidiusculo & nauseoso: caules virique angulosi spithamei, acetum maiores, geniculati, laues: ex foliorum albis fœminae quidè ligula recte emicant, tenues, quas verticillatum ceu in, spica ambiunt: strobili glomerati, pulchelli, qui in quatuor foliola herbida sese explicant, ex his apiculorum; luteolorum aut herbidorum ostentant (nullo succedente semine pereuntes.) Mari autem ex iisdem

Nnon 4

alis breues pediculi ortu natus, quorum singulis testiculata bursula, nonnihil compressa, hirsutaque insidet, gemina *semina* recludens [Dodonæo ad Aparines & forma & asperitate accedentia, compressiora tamen.] Radix utriusque tenera & fibrosa.

Mercurialis sativa & silvestris. Vtraque mas & femina. Nos hoc capite vulgò receptam siue sativam prosequemur: silvestrem, seu repentem, quæ Cynocrambe dicitur, sequenti capite tradidit.

Mercur. Mercurialis, ut tradit Dioscorides, folia Octimo similia habet, Helixina cognata, sed minora, ramulos duplici geniculorum nodo cinctos, alarum caua multa, densa: fructum semina copiosum, racemosum, mas è foliorum sinu dependentem, paruum, rotundum, seu binos testiculos *vna* coherentes: frutex est dodrantalis aut minor.

Ex Plinio. Plinius de eadem re paulò aliter scripsit. Linosostis siue Parthenium Mercurij inventum est: Idem apud Græcos Hermupoa nunc multi vocant eam, apud nos omnes Mercurialem. Duo eius genera, masculus & femina, quæ efficacior.

Synon. Fuch. Matth. Dod. gall. & Lat. in fol. Gesn. hort. [qui de coll. stirp. Linosostin vocat:] Anguill. Lob. Obs. Lacun. Lonic. Castor. Tab. Camer. hort. epit. [ubi Mercurialis simpliciter inscribitur] & hist. Matth. germ. Hist. Lugd. *Mercurialis mas.* Trago, Mercurialis 2. vel testiculata, aut testiculata. Lob. Ic. plant. Linosostis, Mercurialis mas. Cordo in Diosc. [cui & Phyllon Arthenogonon] & Turn. Mercurialis mascula. Brun-

Mercur. *Mercurialis mas.* Trago, Mercurialis 2. vel testiculata, aut testiculata. Lob. Ic. plant. Linosostis, Mercurialis mas. Cordo in Diosc. [cui & Phyllon Arthenogonon] & Turn. Mercurialis mascula. Brun-
Phyllon Arthenogonon Yell. Mercurialis, & sexta Parthenii species. Cæsalp. Mercurialis fructum ferens. C. Bauh. phyt. & ad Matth. Mercurialis 1. siue testiculata. Schvv. Mercurialis sativa mas, testiculata.

Mercurialis femina Matth. Fuch. Turn. Dod. gall. & Lat. in fol. Lacun. Gesn. hort. Lob. Obs. & Ic. plant. Cordo in Diosc. Castor. Tabern. Camer. hort. epit. & hist. Matth. germ. Hist. Lugd. *Mercurialis femina.* Trago, Mercurialis vulgaris & 1. Cæsalp. Mercurialis florens. Cordo in Diosc. Phyllon Thelygonon Theophrasti. C. Bauh. phyt. & apud Matth. Mercurialis 2. siue spicata.

Matth. bal. Matth. ait non deesse, qui velint Phyllum à Linososti [Mercurialis non differre. Verum se non posse cum illis liberè consentire. Sed hanc tanquam erroneam opinionem in postremis comment. Ital. & Lat. merito omisit.

Anguill. Anguill. Dioscoridis caput de Phyllo corruptum esse scribit [quod tamen non demon-
strat] admiscens, quæ Theophr. dixit de Arthenogono & Thelygono, quæ dux plantæ, sunt Mercuriales duæ.

Tragus & Dorstii. utramque vna iconè expriment.

Ryff. tab. Apud Ryff. in Diosc. figura Cynocrambes posita pro Mercuriali mare, & semina Mercurialis pro Cynocrambe, Mercurialis maris pro femina.

Brunsch. Hier. Brunschianepiam habet figuram, in edit. anni 1595. quæ postea iterum ponitur pro Consolida media. Aduers. Penz & Lobelii marem & feminam agnoscunt, Linosostidemque, seu Parthenium, & Mercurii herbam appellant.

Nomina Græcis *Αρθένογόνος*, *ἡμερῖος*, *ἡμερῖος* [Hermubotane, aut ut Manlius legit, herm porana] vel *ἡμερῖος* [Hermupoa, id est, Mercurii herb.] Lat. *Mercurialis* [Mercorella Patern.] quod à Mercurio inventa sit, ut ait Plinius. In Orbis Med. compendib. Lineum costum habetur, pro

quo tamen Linosostis sit legendum, ut Tragus prudenter monet. Sic & Linosostia super El. de Sebesten & Ellenitii. reperitur. *Ableb* Auerh. Phyllum Theophr. Dod. Germanis Bingel *frucht* *tum* *arg.* Mercurius *frucht*. Trago *miners grun*. Belgis Bingel *erhyt*, Mercuriacl. Gallis *de la Mercuriale*. Ital. *mercorella*. Hisp. *mercurialis* & *Urtiga morta*. Anglis *French Mercury*. Mas Theophr. Græcè *ἡμερῖος*, Femina vero *ἡμερῖος* appellatur. Notandum autem esse adhuc & aliud Parthenium, & apud Dioscoridem quoque aliud Phyllon.

Reperitur Mercurialis in hortis olitorum, vineis, aliisque locis humentionibus ac umbratis, *Locis* *tempor* *us* horum aruorumque sepimenta. Tota Aestate utraque viget: Augusto mense semine prægnans est mas: In femina enim nondum vid. semina, sed tantum flores. Hyeme plurius parte intercidit.

Vtraque Mercurialis Medicis, Sepiasiaris omnibus, atque etiam mulierculis notissima est subnitrolo sapore, & nonnihil viroso succo purgante & medicato, ad multa perquam utili. Vtraque enim, auctore Dioscoride, aluum mouet, olerum modo comesta, cocta in aqua, & ea epota bilem & aquosa ducit. Creduntur præterea feminæ folia trita & pota, post purgationem pudendis apposita, ut semina concipiantur efficere: masculis vero similiter adhibitis, mares generari.

Plinius de medico utriusque usu paulò aliter quam Dioscorides tractauit, eundemque fusiù ex Hippocrate declarauit, qui etiam hodie in libris illius extat, maximè eo quod de sterilibus inscribitur, & in duobus de morbis muliebribus. Verba Plinii hæc sunt. Mirum est quod de viroque genere eorum proditur, ut mares gignant, hunc facere, ut femina, illam. Hoc contingere si à conceptu succus protinus bibatur in passo, & danturque folia decocta ex oleo & sale, vel crassa ex aceto. Quidam decoquunt in nouo felle cum Heliotropio, & duabus aut tribus Allii speciebus donec percoquatur. Decoctum dari iubent & herbam ipsam in cibo altera die purgationis muliebri per triiduum, quarto die à balneo coiret. Hippocrates miris laudibus in mulierum usu prædicauit has. At hunc modum medicorum nemo nouit. Ille eas vult cum melle, vel rosaceo, vel vino admouit. Item ad ciendos menses, ad secundasque. Hoc idem prætere potu solumque dixit. Instillauit auribus olidis succum, inunxitque cum vino vetere. Alio folia imposuit & epiphora. Stranguræ & vesicæ decoctum eius dedit cum myrrha, & thure. Alio quidem solentem vel in febrî, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextariis aque ad dimidias bibitur sale & melle admixto, nec non cum ungula suis aut gallinæ decocta. Salubrius purgationis causâ putante aliqui utramque dandam per se, siue cum Malua decoctam. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum lædunt.

Mercuriali, inquit Galenus, utuntur omnes, ad ventris purgationes duntaxat. Verum si quis eius periculum facere voluerit in Cataplasmate, sanè admodum eam esse digerentis experietur facultas. Hæc Galenus. Eius hodie in enematibus frequentissimus est usus. Et multis in locis Pharmacopœi multum utuntur melle quod Mercurialem vocant. Succo expressilibus tribus incoquant mellis boni libram vnam cum semisse, vel libras duas ad enemata, & muliebri enanthismata. Observatum est Verrucas omnis generis utriusque Mercurialis solis tolli vel earum succo. Item

Locis *tempor* *us*

Vires

Mercorella

Vires

Mercorella

Mercorella

Mercorella

Mercorella

Mercorella

Mercorella

Mercorella

utrinque semen cum Absinthio decoctum ictericos mirifice iuvare, malis quæ serpunt succum cum aceto mederi. Quædam Matthiolum literis mandavit Ruellius.

CYNOCRAMBE VETERIBVS.

CAP. VI.

Cynocrambe
Mercurialis
silv.
Mercur.
mascula.
Hederifolia.
Vitis.

Cynocrambe siue Cynia, quam aliqui Mercurialem (αυροζώνη) silv. masculam vocant, cauliculis duorum palmorum altitudine emittit, tectum [πυκνόν] mollem Sarrac. subalbidum: folia Mercuriali aut hederæ similia, ex intervallis subalbida: semen foliis adhærens parvum, rotundum. Vim habet caulis & folia, tum pota, tum olerum modo in cibo accepta, alium movendi. At decoctorum iusculum, bilem & aquosa ducit.

Verum huius Cynocrambes cum neque Theophrastus, neque Galenus, neque Paulus, neque Aëtius meminerit, videtur Cornario hoc totum caput ex precedenti temere repetitum Dioscoridi accipuisse & superfluum esse, ac redundare. Adulterinum caput est, inquit Marcellus, maxime cum in vetustis codicibus minime reperitur. Cynocrambem autem Ruell. eandem cum Atriplice silv. facere videtur, sed male, præsertim, quod Diosc. de silv. Atriplice lib. 2. de Cynocrambe verò ad finem quarti, tanquam de diversis plantis tractaverit.

Sed Galenus, Paulus & alii, atque etiam Diosc. alterius Cynocrambes mentionem fecerunt sub nomine Apocyni de quo suo loco.

Est verò Cynocrambe Honor. Belli & Casp. Bauh. nobis Alsine scæda de qua Hist. n. g. l. 29.

Cynocrambe Gerardo Anglonon bene dicitur de Phyllo Hist. n. libro præsent. Est tandem alia Cynocrambe siue Mercurialis silvestris, de qua iam agendum.



sunt, acuminata, in ambitu serrata, pediculis brevibus, gustu nauseoso, ex foliorum alis pediculi exeunt, in mari quidem breviores, quatuor vel quinque, viciales aut semunciales ac maiores, breviores alios interdum à latere proferentes, quibus insident strobili herbaceo colore præditi ternis foliolis constantes, quorum medium

occupat loculamentum seminum rudimentum, ex cuius cacumine emicant apiculi bini corniculati extrorsum reflexi: loculi bisluti compressi, in geminos testiculos, Lentis magnitudine divisi, semina bina continent dissepimento membranulæ distincta in vno pediculo tergemina: At in Cynocrambe semina à ex foliorum alis pediculi surgunt tres 4. aut quinque vicias longi tenues, striati, quibus strobili in spicam digesti, muscosi, ternis foliolis herbaceis compositi, in quibus staminula aliquot herbæceæ qui nullo succedente semine intereunt. Dodonæo tota herba vitæ odoris ingrati redolent.

Anguillara ait Cynocrambem sibi incognitam.

Coniungit Brassicæ, xxi. n. siue cum Matthiolo, Cynocrambes nomine, Cord. in Diosc. Mercurialem silv. & quidem cum Matthiolo Trago; Amato, Aduersarius & H. Lugd. masculam tantum proponit; In hoc enim genere inveniri feminam negat, sed non absque errore. Eum autem falsi ac feminam haberi, ipsemet in Historia palam facit. Inibi namque errorem suum agnoscit, ac duas describit, Vnam quidem titulo Mercurialis masculæ sylvestris, alteram verò feminæ, cui Gesn. figuram addit. Is præterea in Diosc. in hac herba demonstranda Ruellium errasse scribit, id quod Matthiolum clare demonstrat. Videtur, inquit, Ruellius existimasse Cynocrambem eandem herbam esse cum Atriplice silvestri. Quia in re (si ita credidit) aperte errasse deprehenditur. Differt enim ab Atriplice silv. non modo foliis & facie, sed etiam caulis proceritate. Si quidem Atriplex silv. quandoque ad duum cubitorum altitudinem assurgit. Cynocrambe verò binum palmorum longitudine contenta est.

Cynocrambe nihil aliud est, inquit Corn. quàm silvestre Linosyris genus. Hanc Officinæ saltem Atriplicem silv. vocant, unde quidam, Wildtmel den/Scheismelden nominant.

Dodon. Gall. quamvis solum marem pingat, tamen Cynocrambes feminam quoque statuit. Lat. autem in fol. duntaxat vnius meminit, ac figuram Plantini sub titulo Cynocrambe, Mercurialis silvestris ponit, ac describit, atque eam habere semina masculæ Mercurialis: attamen in eius iconæ sunt picti flores feminæ, quasi essent flores maris. Ego sanè hætenus non observavi ex



Plurimis fibrosis radiculis perennibus & lentis, sapore nonnihil dulci sed fastidioso, pet. terram repit. Cynocrambe tam mas quàm femina, nervo ducto fibratum Hellebori instar fæctis: caules surguntur aliquot, teretes, concavi, longis internodiis geniculati, pedales, propter terram purpurascens: folia ad articulos; bina opposita laxissima, lanuginosa, folius Mercurialis vulgaris similia, tectera, duas aut tres vicias longa, inferora tamen multò minora

Descriptio

Plurimis fibrosis radiculis perennibus & lentis, sapore nonnihil dulci sed fastidioso, pet. terram repit. Cynocrambe tam mas quàm femina, nervo ducto fibratum Hellebori instar fæctis: caules surguntur aliquot, teretes, concavi, longis internodiis geniculati, pedales, propter terram purpurascens: folia ad articulos; bina opposita laxissima, lanuginosa, folius Mercurialis vulgaris similia, tectera, duas aut tres vicias longa, inferora tamen multò minora

Errat. Corn.
di.

Ruellii
ror.

Descriptio
silv. non est.

Lin. & Gesn.
Officin. cor.

Dodon. cor.
natur.

feminae floribus; maris femina provenire.

*Gefn. la-
plm.
Castrag-
ria. Castra-
gula*
Fallitur Gefn. hort. qui Mercurialis agrestis marem duntaxat esse asserit, ac ob istius *Castragariam*, vel *Castrangulam* vocari tradit. Idem prae terea in cat. plant. Cynocrambem Brassicam caminam, Cyniam Officinariam, Atriplicem silu. & Springfraut vocitat. Quod nomen germanicum ita convenit, ac si prunum silu. Acaciam dicens.

*Atriplicis
facida
Tab. reproh.*
Lob. Obseru. & lc. plant. figuram habet cynocrambes marem & feminam exprimentem, an vero laudabilem iudicent alii. Is alias pristinam nec maris, nec feminae meminit.

*Ryff. icon
transpafsa*
Ryffius in Diosc. male habet pro cynocrambe figuram Mercurialis feminae proprio errore vel Typographi. Cynocrambes enim maris figura est sub titulo Mercurialis maris.

Matthiolo cynocrambe, cuius Galenus non meminit.

*Cynocrambe
finae
Mercurialis
reproh.
mon*
Fuchf. Amat. Dodon. gall. & Lat. in fol. Lobel. Obi. & lc. plant. Cast. [qui nullius momenti figuram habet.] Hist. Lugd. Euch. Fab. Columnae, Apollini, Cynocrambe. Fuchf. icon. Camer. hort. Epit. & hist. Germ. Cynocrambe mas. Eidem histor. Germ. Thal. Mercurialis sylvestris mas. Trag. Lonie. Mercurialis sylvestris. C. Bauh. Phyt. Mercurialis altera vel montana. C. Bauh. Phyt. Mercurialis 3. siue filu. testiculata, apud Matth. cynocrambe 1. siue Mercurialis montana testiculata. Schv. Mercurialis silustica *Kuwxpaußu* Dioscor. cynocrambe Matth. & Dodonzi.

*Cynocrambe
finae Mer-
curialis re-
proh. fami-
na.*
Camer. hort. epit. & histor. Matth. germ. Thal. cynocrambe femina. C. Bauh. phyt. Mercurialis 4. siue filu. spicata. Apud Matth. cynocrambe 2. siue Mercurialis montana spicata.

*Nomen
linguarum*
Kuwxpaußu, xuvia, & Aroßuñ d' xia Graecis, Latinis cynocrambe, Brassica canina, cynia & canina etiam simpliciter, ac passim Mercurialis sylvestris: Aphris *harmas*, aliis *afumeslabon*: Germ. *hunde fól / hunde fraut*, vnde *wildd Biegel-
fraut*. Belg. *wildd Mercuriael / wildd Biegel-
crüyt*. Gall. *chou de chien & Mercuriale sauvage*: Ital. *Mercorella bastarda*. Hisp. *Verca perruna*. Angl. *wildd Mercury*.

*Locus &
tempus*
In sylvis ac aliis perinde umbrosis gignitur, vi-
ret, vigetque eodem quo altera Mercurialis anni
tempore.

Cynocrambem marem & feminam obseruavi
Geneuz prorumpentem Martio & Aprili: Basile-
ae cum essem in monte prope Moutets viren-
tem adhuc Octobri, & mense Iunio iuxta Leu-
rack, & in monte *wasserfal*: Abundat mas cum
femine Maio in Montbelgardensi monte Mon-
bar.

Virtus
Facultate Mercuriali alteri respondet, si pra-
stat quae Dioscor. scribit [vide antè.]

PHYLLON EX VETERIBVS.

CAP. VII.

*Plin. &
Gaza re-
proh.*
*Phyllon
reproh.
finae O-*
Phylli meminit Theophr. de plant. hist. lib. 9.
cap. 19. ubi ita scriptum reliquit: Quaedam ad
procreandum marem, aut feminam valere tra-
duntur: eamque ob causam herbam aliam [quidam
quod nec Plin. nec Gaza agnouit, hic vero her-
bam quandam simpliciter reddidit.] mariscam &
femini faciem habentem, marem & feminam dixe-
runt, sibi inuicem similes, & Ocymin figuram ha-
bentes ambas: fructus femini muscolo flori
Oleae similis, pallidusque. Alterius figura nuper
ex muscolo flore incipientis Oliuae coherens si-
li, geminamque testiculorum hominis modo.

Dioscorides ex Crateo tradit Phylli duo ge-
nera. Phyllon, inquit, quod alii Elzophyllon.
Bryoniam nominant [sunt qui *Brion* legant, quod
musci modo exeat, qui *Brion* Graecis dicitur] in sa-
xosis nascitur. Ac illud quidem, quod Thelygo-
non (quasi Feminiparum) dicitur, solum veluti
Bryon, Oleae pallidius gerit, sed colore magis
herbaceo: caulem tenuem, breuem: radicem
gracilem: florem albam: semen Papaveris ma-
iusculum. Arthenogonon (Mariparum) tam dicto
simile, nisi quod semen differt: habet enim rac-
mosum, ei quodammodo simile, quod postquam
defloruit Olea, primum emergit atque conspicit-
tur. Perhibetur autem, Arthenogoni potius
res generari: Thelygoni vero feminas. Hae me-
morae prodidit Crateus: quanquam talia mihi
videtur historia tenuis, tanquam *fama* auditi-
one accepta, proponere.

Plinius eadem serè prodit: in codicibus tamen
eius non Arthenogonon, sed Arsenogonon cor-
ruptè legitur.

Galenus, Paulus, & posteriores Medici Graeci,
inter simplicia, Phyllon non receperunt, forte
quod nullum eius usum, ut Cornario videtur,
Medicum viderent, & ei, quem priores de ipso
tradiderunt, parum fidei haberent: Aut, quod
non secus illis ac nobis fuerit incognitum. Quo
fit, ut mirari non liceat, si adhuc quoque legiti-
mum nondum sit compertum.

Videtur quidem Ruellius existimasse Persica-
riam, quam maiorem cognominant, esse Phyl-
lon. Qua in re aperte fallitur: siquidem Persica-
ria illa humentibus ac vliginosis locis prone nit:
Phyllum vero in saxosis nascitur, ut Diosc. testa-
tur. Qui tamen & ipse, ut eius verba accuratius
expedire liquet, nullam huius herbae cogniti-
onem habuisse deprehenditur, nisi eam, quam ex
Crateo historia habuit. Non desunt tamen, qui
velint Phyllon à Linozoith (Mercuriali) non dis-
ferte, quod pluribus tum notis, tum facultatibus
sibi inuicem respondeant. Verum cum his con-
sentiendum non est, quod, ut iam antè quodam
dictum est, Mercurialis folia habeat Ocymini, Hel-
xinae cognata, non autem Oliuae: florem herba-
ceum non album: quod nascatur passim in horti-
etiam & vineis, non saxosis tantum: quod de his
denique seorsim diuersisque capitibus scripserint
Dioscorides & Plinius, utpote de rebus inter
differentibus.

Ex Theophrasti porro verbis colligit Mat-
thioli, Dioscoridis codicem esse deprauatum,
quandoquidem Theophrasto Thelygonum non
nascitur musci modo, neque solum habet Oleae
viridius, ut in Diosc. scriptum legitur: sed fructum
quidem fert in modum musci Oleae, pallidioram
amen.

Suspiciantur quidam apud Hist. Lugd. de arborum
herbarum eandem & repetitam esse delineatio-
nem, quare Diosc. caput de Phyllo vtriusque
Mercurialis marem & feminam exprimit, quod
vtrumque omnino erroneum est.

Alii alia Phylla adinuenerunt. Est enim Phyl-
lon quoddam Arthenogonon, & Thelygonon
lio incano Monspessulanum quod Dioscoridis
putatur Dodonzo & aliis, ut paulò post videtur
est.

Est ut sunt Phyllon Dioscoridis Agenio, de
quo dicemus hist. n. g. lib. 19. sub Gaza Phyllo
holosteo tomentoso.

Phyllon, ea planta, quam Matthioli in Salu-
tino monte inuenit, nobis Cynocrambe femina
est. Non enim cum Penn. & Lob. Adn. Noli me
tinge,

tangere eandem suspicamur.

Phyllon Amatus censet ni multum fallimur Ophyoglosson, de quo lib. 8.

Folium [*αμύν*] herbari, marem & feminam *αμύν* esse putat Gesn. in cat. pl. quam Linblat vocant. Hanc nos Bisolium minus, siue Ophry esse dicemus lib. 3. Merito autem de horto Cerin. eos increpat Gesn. qui Sedum ferratum cum Celsip. & H. Lugd. Phyllum cognominant & statuunt. Quod autem idem Gesn. in deser. montis fracti in fine lib. de Lunaria, Sedum alpinum minimis foliis cinereum, Phylli genus facit, minus conuenit.

Alia adhuc duo Phylla Dalechampsius apud Hist. Lugd. pingit & describit, vocatque primum simpliciter Phyllum arrhenogonum: Alterum vero Arrhenogonon minus quod nos Phyllum Dalechampsii, musci genus inscribimus, de quibus lib. 37.

Phyllon Hippocratis Libycum & Aethiopicum Silphium est, quod traditur lib. 27. *οβία* idem vocat olea condimentaria, Rucam, Mentham, Apium, quae aliis dum emebantur, adiaci solebant. In Aetio saepe Phylli voces leguntur, pro Folio, & foliis Malabathri.

De Leucacantha in genere dicitur, quod nota voce Phyllon adpellatur. Est tandem Leucacantha aliqua quam Phyllon alii cognominant, nos vero, ceu lib. 26. patet, Carduum marianum appellamus.

PHYLLON ARRHENOGONON ET Thelygonon folio incano Monspelul.

Descriptio



C Vbitales & pedales habet caules multos totos candido tomento pubescentes & per aetatem liguescentes qui in ramos ex aduerso positos ordine certos abducuntur: folia oblonga subrotunda, crassiuscula, nervosa, mollia, lanuginosa, incana, ad articulos obliuuntur: strobili minimi, in mare quidem ad iuncuras breuib.

pediculis nixi, vix apparentes ante fructus, sunt duo apices ochrea colore pallido. Fructus autem sunt gemelli, testiculati, ut in Mercuriali mari, Cynocrambe & Aparine, villosis loculis comprehensi: femina, inquit Lobelius, uti minoris Heliotropii exiliunt, immatura albida, matura vero Cyaneo nitens colore, rotunda & quam Papanis maiora, gustu feruida, & nonnihil pingua. Radix lignosa, erilis: In femina flores spicati racemosique, veluti in Mercuriali femina.

Monspelienfibus hae planta merito Phyllon Dioscoridis appellata est, quamvis *Ελαειν* vocari tradit propter similitudinem forte quandam cum Olea: folia enim habet oblonga & candidatio Olea: item *σπορια* propter florem masculum.



Ab Aduersariis ambo pinguntur his titulis: Phyllon mas, seu Arrhenogonon Mariparum & Thelygonon Phyllon, siue Feminarum. Lobelin sc. Plant. eandem figuram retinet, licet non valde bonam ac Phyllon theligonon & Phyllon arrhenogonon inscribit. Sed in Obolplane omisit, Arrhenogonon, Phyllon

marem, Thelygonon (feminam) vocans.

Matth. in post. comm. non dubitat, quin Phyllon a Cortulo missum sit verum Phyllum. Eum autem mirari subit, si is Phyllum nouerit, cur non describat, sed tantum pingat.

Dodon. Lat. in fol. feminam pingit, ac idcirco Phyllon Thelygonon merito ascripsit. Duorum, inquit, generum Phyllon est, mas & femina, veluti Mercurialis.

Phyllum du; lex est Veteribus, inquit Clusius. Quod Theophrastus mariticum [*αβρηνόγονον*] id Diosc. Feminificum [*Θελύγονον*] facit. Praeterea Theophr. [cuius sententiam potius sequimur] Phyllo Oculi folia tribuit: Diosc. Olea. Illud inter alia ei cum Mercuriali, Cynocrambe, & Heliotropio minori commune est, ut eruta radices tempore succellu ceruleum colorem contrahant.

Icones nostrae quae ex Clusio desumptae nobis absentibus (licet non desissent plantae ipsae) corruptae fuerit per pictorem & sculptorem.

Camer. in Epit. & hist. Matth. germ. ambo pingit vocans in hist. Phyllum marem & feminam, Welsch Bingelstraß. In Epit. quod *αβρηνόγονον* & *Θελύγονον* Sed temere nimium, meo quidem iudicio, Dioscoridis contextum huic Phyllo ascripsit, quasi absque controuersia atque errore Dioscoridis Phyllum diceret. Figurae autem posita a Camer. sunt Gesn. cui miseram ante multos annos plantas siccas cum descriptione vtriusque. Sed quae tanta Camerarii ingratitudo, ut nec mei, nec Gesneri mentionem fecerit. Cuculum semine dixissem ingratum.

H. Lugd. Compiler non animaduertit se duas vnius figuras platea proponere. Phyllon enim Thelygonon Matth. & Phyllon Thelygonon Theophr. quod cum eiusdem Theophr. Phyllo Arrhenogonon ponit, est eiusdem plantae.

Tab. icon. & hist. Phyllon mariticum, Welsch Bingelstraß Das männlein. Phyllon feminificum, Welsch Bingelstraß Das Weiblein.

Gerard. Cynocrambe Dogs Mercurie. 2. Phyllon Thelygonon, Chil Dreus Mercurie. Icones duas Phylli habet ex Tabern. Quis autem ex Phyllo testiculato fecit Cynocramben, ut facit Gerardus.

Cast. Durant. Phyllon.

C. Bauh. Phyt. Phyllon 1. & 2. siue testiculatum & spicatum. Arrhenogonon & Thelygonon. Nascitur utraque, ut scribit Clusius, multis Hi-

Phyllon Ge-
ram
Matth. non
tatur.

Camer. in
Epit. & hist.

Ingratitudo
do

H. Lugd.
nos.

Cynocram-
be

Noli me
tangere
Ophyoglos-
sum

Bisolium
minus
Sedum fer-
ratum
Sedum alpi-
num minus
min. foliis, cin-
ereum

Phyllon
Dalech.
musci genus

Silphium
Olea

Malaba-
thrum
Leucacantha

Carduus
marianus

Synon.
Phyllon
Diosc.

spania & Gallia Narbonensis locis secundum
vias, ubi Aprilis, interdum maius, floret. In Bel-
gio vero non nisi æstate: & singulis annis ex se-
mine deciduo germinat apud nonnullos rei her-
baria studiosos. Has plantas vidi circa Monspe-
lium virentes, florentes, & semina ferentes men-
se Aprilis, Maio, Iunio & Augusto. Phyllon vidi
in horto D. D. Felicis Plateri Basileæ, quod
cultura maius euadit, Genex mihi prouenit in
horto.

Virus

Arrhenogoni potum masculi sexus fieri partus, ut Theligoni feminei, Theophrastus & Dioscorides scriptum reliquere. Silmanticenses utriusque decoctum omnibus animalibus à canerabido demortis propinant, magno successu, ut inquiunt. Granatensis verò, Mauritanis præsertim, ad muliebres morbos magno in usu est.

Canis va-
lido maxilla





in genere.

CAP. VII.

Corchorum oleraceis adnumerat Theophrastus, qui ob sui amarorem in prouerbium (quod, alii sic, *Corchorus inter Olera*) abiit, cuiusque folium Ocimum emulatur: Plinius iis, qui sponte nascuntur, quibus plerumque gentium vescuntur in cibis. Corchorum, inquit, Alexandrini cibi herba est, conuolutus folius ad similitudinem Mori. Præcordius, ut ferunt, uelis, alopeciiisque, & lenti-
gini. Bonum quoque scabiem celerrimè sanari eà inuenio apud Nicandrum & serpentium morsus antequam floreat. Sed cum Theophrast. Corchorum Ocimi folio esse dixerit, mirum est Plinium ex alio fortasse autore scripsisse Corchorum herbam esse conuolutus folius ad similitudinem Mori. Quare quidam legunt, (■ scil. qui corchorum Pilosellam maiorem esse concludunt, de qua suo loco) commaculatis foliis, ad succi Mori similitudinem, quæ in ea perspicere liceat.

Alexander
in his her
to

Plus tard

Leſſio de
uſuſq. Cór-
choror, Cor-
coror. Cér-
coror male

Sed varia lectio est Corchori. Suidas enim, quod magis probò, *Kίρρος* habet, *κίρρος* Hesych. & Varinus. Notat etiam Hermolaus *Κίρρος* ἐν *λαζάνις* apud Græcos multos legi, verum id mendosè.

Equinoca

Anagallis

Angelica 3.
verens

Blumen T.
C. J. Trapp

Ptilafella
mauer.
Pisciculus
quidam.
Corcoranus
sive Asio-
chea

Ceterum multis hac ætate cum Plinio Anagallis Corchorus dicitur, quorum opinionem non probo. In Anagallide enim folium non est ^{anagallide} ~~anagallide~~. Corchori cuiusdam (non tamen Veterum) nomine Angelicæ; speciem, quam repentem inscripsimus, intelligit Gesn. hort. Idem Blieti speciem quandam (Blitum 1. & 2. Trag.) facit. Dalechampius Corchorum esse suspicatur plantam eam, quam pro Myosotide (auricula muris) maiore Tragus depinxit ac descripsit, quàmque nos Pilosellam maiorem quorundam vocauimus. Lycophyton falsus est, ^{anagallide} ~~anagallide~~ putans esse piliculum quandam, Eratophone teste. Est enim uti dictum, olus quoddam agreste, & vile in Peloponneso. Diuersum ab his prorsus Corchorum, Molochiam Serapionis quorundam multi statuunt, quibus & nos facile subscripserimus. De hoc igitur agendum.

CORCHORVS SIVE MELOCHIA.

វិស័យ

CYbitali lxxi canē hanc plantam observa-
ui, solus Cynocrambes ferē vel Mercurialis

tionem dehiscentes, semen claudens copiolun-
cineum: angul. linn. parvum, gustu viscidum.
Flores, teste Alpino, parvi sunt, croci, Leuconis
minores.

Prosp. Alpin. pl. Egypt. Melochia. Camerar.
hort. Corchorus sive Melochia. Olyus Iudaeum.
Hic inter icones ex Gesneri typis semen & folia
cum barbulis exhibet. quae in Lobeliana pictura
fuerunt omissa. Lobel. Obs. & Sc. plant. Corchorus
Plinii, Melochia Scrapionis quorundam, C. Bauh.
phys. Corchorus.

Melechiam feminam in horto E.C. ex semine
misso per Fratrem C. Baubinum qui noli etiam
siccam plantam attulit. Augusti fine nondum
floruit. Crescit copiose in hortis Halepi.

Semina Melochiz sunt in maximo usu apud
Egyptios ad omnes effectus, quibus semina Al-
theæ conducere competens est. Nam Melochiz
facultate planè similis Altheæ videtur, proinde
ad suppurandos, resoluendos atque emolliendos
tumores duros, eius maximus usus est, habet et-
iam maiorem visciditatem eius mucilago quàm
Altheæ. In cibus nihil est ipsa Egyptiis famili-
us, decoquunt in aqua vel iure carniū, ex eius
cibo multi malè se habent, parum nutrit, & fu-
cum viscidam gignit ex quo difficiles viscera
obstructiones. Foliorum decoctum est pectori
amicum, ipsum enim humectat, ex quo siccis al-
perisque tussibus præsentaneum cum lactaro
candido est auxilium, atque ægrè spirantibus. Se-
mina pondere duarum drachmarum sumpta co-
piosissimè purgant omnes humores. Alpinus
Ravvollius aciditatis saporis herbam dicit, cui si cre-
dendum prædictis contrarias habet facultates.

Super.
Virex.

1. Arbeitsblätter
 2. Arbeitsblätter
 3. Arbeitsblätter

ГЛАВА 1

Citrus
typicus

Druck, f. d.
Tafel, f. d.

1914

DE LAPATHO, OXYLAPATHO,
 Hippolapatho, Veterum senten-
 tia & in genere,

CAP. VIII.

Ex Instituto hoc in loco de Lapathis agemus,
 Ecū Beta enim, & Blito his intercedit amnitas,
 in semine, foliis, arque addit tota planta. Adde
 quod emolliens est & holeracea.

Lapathi generis est, inquit Dioscorides, quod
 & aliquantulum in extremis acuminatum. Est &

Department
May 1929

1997

alerum hortense, primo non ex quatuor Orb. legitur, non in omnibus, cui electioni subscribit Plinius & Matth. nec legerim ex antiquioribus non dissimile cum Hist. Lugd. simile. Tertium silvestre est, paruum, simile Platanagini, molle, humile. Est & quartum genus, quod aliqui Oxalidem, aut Anaxyridem, aut Lapathum (αἰγρον, silu. Lat. ex ver. cod. addit) vocant. Cuius folia silvestri & paruo Lapathi similia sunt: caulis non magnus: Semen subacutum, rotundum, acre, in caule & propaginibus. At verò Hippolapathum, olus magnum est, in paludibus quoque nascens. Dioscorid. haec genera, qui quinque Lapathi genera, non eo quo solet, sed perturbato ordine descripsit.

Pluribus tibi modis constans modò Lapathum
 sativum, modò filucis & Rumicem vocat.

Lapathum, inquit Galenus, potest quis silue-
stem Betam dicere, cum simile sit, non tantum
gustu, sed facultate, botanici Betæ. Quandoqui-
dem verò Beta iucundior est Lapatho, ob id ma-
gis homines ipsam edunt. At Oxylapathi, & qua-
litate, & facultate, nomen ipsum indicat: Est
enim Lapathum acidum. Hippelapathum autem
in paludibus nascitur. Confundere videtur Gale-
nus Oxylapatha, quorum hoc est ab ὄξω [aceto
seu acido sapore] illud ab ἄγρῳ, acutus, propter so-
lia acuta. Tria autem Lapathi genera Galex toto
agnoscit, Lapathum simpliciter dictum, Oxyla-
pathon, & Hippolapathon.

Theophr. qui duo Lapathi genera tradit, filv.
& virbanum, Oxalidem cum Oxylapatho quo-
que confundere videtur.

Actius brevis est & obscurus in Lapathi generibus annotandis. Vlcus, inquit, canis rabidi perfundatur radice Lapathi; quod Oxalidem vocant, decocto. Silvestre Lapathum est folius in acutum tendentibus, radicem habens oblongam, veluti Raphanum paruum.

Auicenna¹⁷ & Serapio Lapathum omne sine
descripserunt Acetosam nominant, perperam sub-
scribente Matthiolo, ad saporem referentes, quod
ad foliorum figuram retulit Dioscorides.

Λάπιθος & *Λαπίθος* [vt videre est apud Hist. Lugd.) *Græcis* dicitur, qui *Rumex Lanius*, *Barbatus Lapathion*. *Lapathus* autem ἀνὰ τὸ ἀπὸ τῆς ἀνδρὸς dictus est, quod valet exinanire, & pro ventrem levare usurpatur. *Lapathum Arabes Humadh, hundh*, seu *Hamad* appellant : *Itali Rombice* & *Lapario*, *Germ. Ampffer*. *Hisp. Labaca*. Ceterum *Oxylapathum* non ab acore & acido sapore, sed ab acumine foliorum appellatum assisimus. *Oxalidem* autem proprie *Romani Rumicem* appellant, forsitan quodd ab ea succus non aliter atque *mamma*, quam *Rumem* *Veteres* dixerunt, siccantibus exugi soleat, nam foliorum acor a quibusdam hauritur, vt lac ab agnis, qui in suis matribus subeumantur. De qua *Virgil*.

Exordiusque Rurix, Malua, Vinleque vire-
bent.

Nisi quis à celi similitudine ductum nomen existimet, quod Spato cognatum in modum pedis recuratur, cuius meminit Lucilius:

Tum sparguntur Runcices porcantur, stragula
porra.

citante Nonio: Adfertur tamen & hic versus à Festo, sed pro Rumices habet Murices. Hippolapathon Græci quasi grande Lapathum dicunt, magnis amplisque rebus Bu & Hippo præponere soliti, à boue & equo-excellentis magnitudinis animalibus magnitudinem mutantes, velut etiam in Hippomarathro & Hipposelino: &
Rom. 12.

apud Plinium in humastro Vuz, & Bumelia Fraxino : itemque apud Theophrastum.

Lapathorum historia ex Veteribus relata, superest vix illud eorum virtutes adscribamus. Omnium olus decoctum, inquit Dioscor. aluum mollior. Crudum illud cum tolaceo aut croco Melicerides discutit. Semē lyliæstris & Oxylapathi & exalidis cum aqua aut vino vultiter contra dylen-
terias & colicos affectus, stomachi fastidia, scorpiōnumque ictus bibitur. Si quis etiam in potu præsumat, nihil ictus patietur. Radices ipsarum ex aceto & cruda illis, lepras, impetigines, scabrosque vngues sanant. Sed antea locus aceto & nitro in Sole pestificandus est. Pituitus decoctum earum sedat, si eo foueantur. Coctæ in vino si cum iere colluantur, aurium dentiumque do-
rem mollescent. Strumas parotidasque discutiant; si cum vino decoctæ illinantur. Lienæ autem cum aceto. Aliqui vtiuntur radicibus contra strumas, vinculo collo eas appendentes. Tritæ & appositæ fœminarum fluxiones sistunt. Decoctæ cum vino & potæ regio morbo correptos emendant. Calculos vesicæ comminuunt. Men-
ses cient. Scorpiōnum ictibus auxiliantur. Hippo- lithon easdem cum antè dictis Rumicum gene-
ribus vites obtinet.

Eadem serē & Plinius. Vbi autē: n iurē exiguo
habet, lego: go thūte exiguo: Et yb melicerias,
lego melicerias: Vbi poto vino, lego semine
ex vino poto.

Lapathum; referente Galeno, nemo crudum
ederit, sicut neque R. tam. Oxylapathum verd
crudum edunt rutales mulieres picā laboran-
tes, aliquando etiam pueri gulosi. Sed hæc de
Oxalide d. cti credimus, cum qua Gal. Oxylapa-
thum confundit.

Nunc sicut Lapathi variis esse significationes:
Ac primum quidem denotat simpliciter sumptum
quodcumque Lapathum. Quale est Lapathum acutum
nostrum siue Oxylapathum: Lapathum vulgare
folio obtuso: Lapathum sylv. magnum vulgare
Lathum acutum minimum: Lapathum sativum.
Lapathum maius. Hippolapathum siue Rhabarbarum
Monachorum: Lapathum maximum aquaticum,
siue Hydrolapathum: Lapathum aquaticum minus.
Lapath. folio rotundo alpinum: Lapathum
anthoxanthum: Lapathum acutum crispum:
Lapathum marinum sinuatum: Lapathum
fluviatile longo serrato folio: Lapathum sanguineum,
siue Sanguis Draconis herba; de quibus singulis
ordine iam iam venit agendum. Est & Lapathum
Oxalida nuncupatum, nobis Oxalis maior folio longo.
Docti quidam Acerolam rotundam (Oxalidem folio
rotundo) Lapathum esse censent, aut indocti.
Lapathi species minor Gelnero, Oxalis minima.
De Lapatho Persicaria vulgo dicta vide lib. 48. Vocant Lob. & Pena in
Adv. Fontalem crispam, pusillum Fontulapathum
& Lapatholum tenellum, inconsiderate. Hallucinantur
qui cum Amato contendunt Spinachiam esse
Lapathum sativum. Lapathum Dioscoridis tertium,
non est Bonus Hennis, ut quidam volunt. Apud
Geln. in acript. Diosc. falsò habetur Phyllitis
esse Lapathum siue &c.

LAPATHVM ACVTVM SIVE
Oxylapathum.

A Dubiti & sesquicubiti altitudinem excre-
cit, caule multis alis concavo, striato, subtri-
angulo. Distingui



bente : folia
Betr. lãgiora,
rugokora, &
nonnihil in
ambitu crispa,
modò acumi-
nata, aliàs su-
brotonda, sa-
pore subacido:
flores mulco-
si, copiosi ex
fibris com-
positi : qui-
bus semen tri-
quetrum suc-
cedit, mem-
branis solis
tenuis ex viro-
re subescenti-
bus conclu-
sum. Radix do-
drantalıs cit-
citer, crassitu-
dine digitali, crocea, sapore amaro.

Gesn. hort. Lapathum silv. Oxylapathum voca-
tum, à foliorum figura acutiore, non quidem
omnibus Lapathis, sed nonnullis. Et de coll.
Lapathum cuius radicis usus est ad scabiam.

Cord. in Diosc. Lapathi 3. species, Oxylapa-
thon, Rumex acutus, Lapathum acutum, silvestri
simile, nisi angustiora & acutiora haberet folia.

Lob. & Penz. Adv. Lapathum acutum, siue
acutifolium, nusquam non in pratis. Lob. Ob-
serv. & Ic. Plant. Lapathum acutum, Oxylapa-
thum, qui figuram habet, quæ non multum pla-
cet. Nostram enim iam sculptam ex Fuchianis
quam etiam retinet Amarus.

Dod. gall. Oxylapathon, Rumex acutus, Lapa-
thum acutum Offic. Et Lat. in sol. Lapathum.
Lapathum silv. siue Oxylapathum.

Fuch. Lapathum 1. Diosc. siue Lapathum acu-
tum Offic. Oxylapathum cuius quamvis an-
ceps in acidum saporem, vel acutam figuram, vi-
deatur significatio, tamen nomen à solis, quæ in
mucronem desinunt, accepisse videtur.

Brunsch. Hiero. Brunsch. & Apollini, Lapa-
thum acutum, Oxylapathum. Helfrico, Rumex
sylvestris, admodum acutus. Wirsung. Rumex, Hip-
polapathum, Officinis Lapathum acutum.

Hist. Lugd. Oxylapathum Diosc. primum La-
pathi genus, Offic. Lapathum acutum. Bauh.
Sylvestre Lapathum 2. in aquosis nascens, folio
admodum acuto, quod Oxylapathum Dioscori-
dis rectè opinatur.

C. Bauh. Phyt. Lapathum 7. folio acuto, Oxy-
lapathum Dioscoridis, & Plin. Apud Matth.
Lapathum acutum, & Sida sylvestris Auicen-
næ.

Schvv. Lapathum acutum, *gelbe Ampfer* Dioscor.
Lapathum acutum Offic. *Gelb spitz / Ochsenz-
zunge Spitz* Hort. Lus. Lapathum acutum, Oxy-
lapathum acutum, *Gelb Ochsenzunge / Gündel-
wurz*.

Lapathum acutum, *gelbe Ampfer*, Germ. Grind-
wurz Trag. *Spitz ampffer / wilder ampffer*,
mangelwurz, *wilder mangolt*, *Streichwurz*,
sitter wüz, Belg. *patich & paerdich* Gall. *parelle*,
Ital. *Rombre lapatio*, Hispan. *paradella*, Lapacca, &
Romana, Angl. *doct*.

Montbelgard. Oxylapathum siue Lapathum
commune passim provenit etiam in horto E. Cel.
spontè: observat. Monipely, Basileæ cum semine

menle Octobri, Genevæ, virens mensis Februarii
principio. Martio mense, ut habet Tragus, folia e-
mergunt, appetente Junio floret, spontè sua gi-
gnitur in humidis horti, palustribus locis, pratis
& circa fossas.

Ex Oxylapathi radicibus aqua destillatur, quæ
ad psittulas, alphas, ionthos, vitilignes, lichenas,
omneque denique cutis, præsertim faciei, macu-
las defendas plurimum facit. Decoctum Oxyla-
pathi ex vino diebus aliquot potum auriginem
pellit & cutim prillino nitore restituit. Credunt
quidam (ex superstitionis) hippitæ nunquam eos
qui Rumicis sylv. radicem Lunâ decrecente ef-
fossam secum portaverint: Hist. Lugd. Radix La-
pathi acuti foris ad lotiones, foris, & linimenta,
etiamque inter in decoctis, vsurpant Officinis so-
lita, ut & ra-nuli & folia.

Vires.
vsa.
dign.
Curt. 9. 10. 11.
Facies. Ma-
cula
Decoctum.
Superficies.
Radix
Lapathum
acutum 10.
tum

LAPATHVM VVLGARE FOLIO obtus.

Folia superne retusis, brevioribus quàm in
Lapatho acuto, rotundioribus, à quo, teste
Lobelio, semine, caule, flore & radice vix discer-
nendum.



Lesototes per-
pendant qua-
le describat
Matthioli, in
post. comm.
cum magna fig.
Lapathum spò-
tanetum, an de-
scriptio fortè
non facta ad
plantam, si ad
plantam facta
an possit con-
uenire Lapatho
cui folium re-
tusum.

Descriptionem Matthioli
Historia Lugd. H. Lugd.
posuit pro La-
patho satiuo
Tragi, & figu-
ram Matthioli Hippolapathi pro eo Lapatho cò-
tra mentem ipsius Matthioli.

An Anguill. Lapathum silvestre, foliis cæteris
rotundioribus: C. Bauh. phyt. Lapathum 6. folio
subrotundo, Lapathi tertia species Dodon. Hist.
Gall.

In eodem locis nascitur, quibus vulgare: *Stimul.*
circa rudera & areas.

LAPATHVM SILV. MAGNVN vulgare.

Lapathum Rumex agrestis quidam qui à
Pharmacopolis Lapathum nunc dicitur, à
Germ. *hasen ampffer / Gasse wüz / & Butter
ampffer / Butter lantich*, quoniam rustici Buty-
rum eius foliis involutum in vires venale fe-
rant: non desunt etiam qui Buglossum eum vo-
cent, Missenorum & Wittenbergensium Saxo-
num Germanico vocabulo decepti, autore Co-
do in Diosc.

Tabern. Icon. & Hist. Hippolapathum silve-
stre, wild *Mengelwurz*, aut *Meunen wüz*.

Descriptio

Lapath fol.
subrotundo

Locum

Locum

Oxylapathi
significatio
subrot.

Oxylapathi
Diosc.
Lapathum
acutum

Sida fol.
subrotunda

Nomina
linguarum

Locum
&
ampfer

Lapath. officin.

Locus



Schvv. Lapathum vulgare, Lapathum Officinarium. Obsen- gänge, Butter- bletter / Ohm- bletter / Grind- wurz. Herba vulgaris noti- tie.

Hippolapa- thum non so- lum in palu- stribus proue- nire vidit Mat- th. sed etiam in montibus, iis praesertim in lo- cis, ubi pecudes diutius stabula-

Stabilitas

Locus

Vires & v. sus

ri solent, & ubi eorum fimo pinguescit solum, illi plantae omnino respondens, quae sub Rhabar- bari nomenclatura, passim hodie in hortis ac vi- ridariis colitur. Locus humidioribus in areis pagorum ad stabula plerumque reperiri tradit, Schuvvenchf.

Radices, eodem autore, trita illinuntur con- tra scabiem aliasque cutis infectiones. Addunt vnguentis quibus capillos fluos reddunt, ca- pitisque sutures abstergunt. Folia calidis deflu- xionibus vtiliter imponuntur. Pates obtinet cum Oxylapatho vires: nec ab eo distinguere vi- detur Dioscorides.

LAPATHUM ACUTUM MINIMUM

Delicentia



Omnibus paribus minus est Oxy- lapathum vulgato caetera ei si. milli- mū: interim hoc peculiare habere videtur, quod statim a radice serè caulis in alas incipit diuidi, in quibus flores ex certis interval- lis verticillatim nascuntur mus- coli, luteoli, sin- gulis serè verti- cillis appposito foliolo ligula in- star: quo verti- cilla tamen ex- tremā carent.

Lapath. pum

Locus & tempus

Lob. Icon. Plant. Lapathum acutum minimum. Tab. icon. & H. st. Hort. Lusit. Lapathum mini- mum. C. Bauh. Phyt. p. 35. Lapathum & sine mi- nimum.

Circa Montbelgardum provenit locis humidis florens Iulio & Augusto.

LAPATHUM SATIVUM LAPAS.

Descriptio

Vera hortensis Rumex, quam Laufannae Sa- baudiae nospido provenire scribit Tragus, La- Tom II.

patho maiori, siue Rhabarbaro Monachorum, quadantenus similis est, ac folia tenuiora sunt pinguiora & molliora, ac etiam magis exigua, quare inter olera reliqua ob dulcedinem suam in colinas recepta est. Rumicem domesticum, Sa- baudienfes Lampe & Lampade vocant. Gesn. hort. Lapathum hortense in Sabaudia tantum vi- dit circa Laufannam & alibi, ubi Lampe vocatur vulgo, Lapathum maximum est, quod aliqui apud nos in hortis serunt: Rhabarbarum Monacho- rum. Cord. in Diosc. Lapathum, Rumex sativus Garten ampffer.

C. Bauh. Phyt. Lapathum i. hortense siue secun- dum Dioscondis, Rumex hortensis, vel sativus Tragi, quem Hippolapathi silu. nomine pingit Maub. Ital. & ex eo Lugd. p. 506. Lapathum sati- um Lugd. 601.

Cur dicatur à fratre Lapathum sativum Tragi pingi per Matthiolum pro Hippolapatho ani- madvertere non possum. Tragi Lapatho folia sunt magis ex- gna, Matthioli autem Hippolapa- thi folia Rhabarbaro omnino respondent: in eo imitatus est Hist. Lugd. ubi Lapathum sativum Matthioli & Lapathum Tragi idem esse tradun- tur, & confunduntur cum Hippolapatho Matth.

Conferuntur Hist. Lugd. Lapathi descriptionem ponit ex Matthiolo, deinde ei iungit Tragi & Ges- neri sententiam de Lapatho sativo: praestitisset posuisse descriptionem ex Trago, vel date novam herbae quam dicit de Lapas vocari: Cur icones e- iusdem plantae Matthioli diversis locis posuitur pro Lapatho sativo Matthioli, cuius assumpsit descriptionem, ponit iconem à Matthiolo non propositam pro Lapatho sativo sed Hippolapa- tho: cur dicit Lapas rursus in hortis colere: deinde in hortis non ferri? Cum haec insignis confusio ap- pareat, nos lectoribus indicandum relinquimus an utraque icones Matthioli non sint referendae Lapatho vulgari silu. maiori, descriptio autem ex Matthiolo. Lapatho folio obtuso: Nomen Lapas in historia Lugd. amphibologiam habere videtur: Sed ut libere dicam quod sentio: suspitor Tra- gum & Gesnerum pro Lapatho hortensi Laufan- nensi observasse Rhabarbarum Monachorum primo anno satum, quod tunc delicatius est quam sequentibus, si quis nos aliter doceat rem gratam faciet.

LAPATHUM MAIUS SIVE RHABARBA- rum Monachorum.



Hominis procerita- tem interdum assequitur, canis surgens striato, rubente, supe- riora versus in numerosos suc- culos diuiso, se- ribus serie longa per totos serè ramos masculis: semine lubse- quente angulo- so, folliculis me- branaceis circum- dato: folia pe- dalia & sesqui- pedalia, lata, & cumnata, ducta, rigida, rubentia

Descriptio

Qooo 2

fursum aliquando reflexis oris nonnihil, vt Canalem quendam imitentur, pediculis rubentibus longis. Radix prolixa, crassa, multis adnatis fibris donata, intense crocea.

Synon.
Rhabarbarum hortorum

Quod vulgus Europæ (ait Sylu. de simpl.) pro Rhabarbaro passim in hortis ferit, Lapathi genus omnino videtur, licet radicis colore Rhabarbaro nonnihil sit affine, viribus tamen plurimum abest. At cum reliqua Rhoi vtriusque historia nemini scribatur, convincere nequeas, congenerem plantam, vel degenerem & diuersam, nisi ex partu vnius natura.

Differensia
Rhab. Monachorum
à ceteris
Rumicibus

Tragus in Hist. Germ. Rhabarbarum Monachorum ait esse herbam peregrinam, primum in Hercinis silua repertam, ac postea in conuiciis Monachorum exultant. vocatque Hippolapathum & Rumicem grandem, ab aliis Rumicibus in eo tantum differre ita tens, quod folio & caulibus magis rubeat & proceriore sit.

Hippolapathum
Rumicem grandem

Gesl. hort. Lapathum maximum, Rhabarbarum Monachorum dictum: idem aut omnino proximum Hippolapathum in palustribus locis, aut montanis nascenti.

Rhab. Germanicum
magnum

Lapathi vel Rumicis speciem, quam in plurimis Germaniarum locis ferunt, magno errore, ait Cord. in Diosc. verum Rhabarbarum esse credunt.

An de hoc Monardes de simpl. noui orbis lib. 3, ex versione Cluuii. Planta quam multi in Hispania Rhabarbari nomine seuerunt Rumicis folia obtinens, cuius genus illam esse existimo, quoniam secundus Rumex rubentem habet radicem.

Patientia
vulgi

Lob. & Pena Adu. Satium Hippolapathum latifolium vulgi, & Rhabarbarum Monachorum, Obl. Hippolapathum satium latifolium, Rhab. Monachorum, Patientia vulgi. Icon. plant. Hippolapathum satium latifolium & Rhabarbarum Monachorum.

Dodon. gall. Lapathi 2. species *le-pathe d'herbe*, Rumex satius, Rhabarbarum Monachorum Neoteriorum quorundam, & Galeni Hippolapathum. Et Lat. in fol. Hippolapathum, Rhabarbarum Monachorum.

Fuchl. Lapathi 2. genus Dioscoridis: Lapathum hortense, Oxylapathum dissimile, non quidem in vniuersum, sed dontaxat in foliis, quæ Serapione teste, multo sunt latiora Rhabarbaro Monachorum.

Lapathi latifolium
longum
rotundum
formam

Lapathum latifolium inquit Camer. hort. Itam longa quam rotunda forma vocant, Rhabarbarum Monachorum, quod Veteres Hippolapathum, in dupla dosi exhibitum nihil purgat. Item Lapathum satium: Et alibi Rhabarbarum Monachorum. Considerent autem Lectores, quæ in re differat Lapathum rotunda forma à Lapathum rotundifolio: præterea perquirant discrimen Rhabarbari Monachorum à Lapathum satio.

Patientia

Goropio in Vertumno, La Patientia vulgo, cui nomen de Græca voce *πασις* i. vacuo, factum: Est eadem Hermath. lib. 9. Lapathi genus, delicatius & tenerius ceteris, quod vulgus Patientiam nominat, de quo etiam proverbium: *Lapathum non in cuiusvis hortu prouenire.*

Hippolapathum
Rhabarbarum
Purgat.

Tabernacon. & hist. Hippolapathum satium. Rhabarbarum hortorum, à peregrino non ab simile, quod vt à medicis fide dignis Matthiolo relatum est, hilem deiecit, quamvis peregrino sit longe infirmius. Ait is præterea in post. commen. Italicum aliud Rhabarbarum potius satium, quam verum, quod vulgo vocant Rhabarbarum Monachorum. Sed nullam facultatem veri Rhabarbari

habere, licet contrarium crediderint aliqui. Idem in hist. vocat Hippolapathum verum sine Rhabarbarum Monachorum.

C. Bauh. phyt. Hippolapathum 14. siue latifolium Rhabarbarum Monachorum dictum, Hippolapathum Dioscor. Gal. & Plinii. Rumex verba Theophr. Rhapontico substituit.

Lapathum maius, siue Rhabarbarum Monachorum: Germ. *Münch Rhabarbarum*. Galli, *Rhenbarbe des Moines*, *la Patientie*. Belg. *Patientie Burg*. *Chon lasihou*.

Folia merse Martio emergunt, appetente Junio floret: & sponte semine se propagat. Hippolapathum hortense Matthioli sententia pluribus spectaculi causa in hortis & viridariis: siluestre sponte nascitur in palustribus. Nos in vasis Germaniarum, Galliarum & Italiarum locis obseruauimus.

Rumicis, qui Rhabarbarum monachorum vocatur, radix purgandi vim obtinet autore Fuchl. si in puluerem redacta drachmæ pondere sumatur. Neque id mirum admodum, cum etiam Dioscor. ipse omnium Rusticum olus decoctum aluum mollirescatque decoctas eorundem radices

cum vino, regio morbo correptos emendare, ob huius nimirum per inferna educationem, testetur. Quomodo verò eâ vtideceat, Tragus te docet. Magnarum virium, inquit, hæc radix cum pauxillo Zingiberis sumpta, phlegma & bilem perintestiora euacuat, hoc modo. Rad. aridæ drachmam, Zingiberis scrupulum, in puluerem redige, sume ieiunus in iure calido. Pro Rhabarbaro qui substituitur, duplici dosi ventur. Radix digerit, abstergit, prouocat, mundat, aperit, nonnihil adstringit. Bilem flauam & terrosos humores educit. Folia tenera in oleis eduntur ad emolliendam aluum. Radicis succus, ait Matthioli, cum sulphure galli, scabim sanat, cum Lupinorum vero farina lentigines, albugines, & alias cutis infectiones exterit. Radicis dilutum, ex vino paratum præstat ad pellendos renum calculos. Idem facit sicca radice puluis: drachmæ pondere ex meraco pitus: quin etiam ex matrubu decocto haustus auguriam curat.

Rhabarbari
succedaneum

Folia.
Radix.
Succus vidi
Dilutum
rad.

LAPATHVM MAXIMVM AQVATICVM siue Hydrolapathum.

Magis huic in fibras diducta est radix, quam vel Oxylapathum, vel Hippolapathum, foris nigra, intus burza: cum notabili adstrictione amicans: cunctis largitur ad cubitos duos, flore & semine Lapathi acui, cui & filia similia, sed longitudine serotina cubitali, leuiora, minisque rugosa, leniter crispatis oris, subacta, & strenue adstringentia.

Dodon. gall. Lapathi quinta species, Hippolapathum magnum aut Rumex palustris: Gal. *Græde Parolle*, *ou Parolle des Marex*: Germ. *Wasser ampffer*: Belg. *Groete patië*, aut *water patië*. Et lat. in fol. Lapathum, siue Rumex 3. Hippolapathum dictum folio ampliore ac maiore satio. Idem postea hydrolapathum vocat, in fossis ac scrobibus requirendum. Eum autem hydrolapathum non nouisse, commonstrat figura, quam pro Lapathum satio proposuit. Hippolapathum etiam vocant Cordus, Tragus, & Lobelius. C. Bauh. Lapathum 11. aquaticum folio cubitali. Apud Matth. hydrolapathum silv. Matth. & Cast. Lapathum palustre Tabern. Schvv. Lapathum palustre maximum *le grand lapathum*. Hippolapathum silv. Matth. Rumex

Dod. 11.



Locus & tempus.

Vires
Error quorundam.Idem.
Vires.

aquaticus, Gross wasser oder weicher ampfer/ wild Mänsch Rhabarbarwurcz.

Maximum Lapathum aquaticum provenit in fossis urbis, id existimo variare à vulgari Oxylapatho propter stum, qui facit ut diversè videatur planta ob insignem foliorum amplitudinem. Nascitur aquosis palustribus, ac stagnantibus locis & fossis humidioribus.

Quidam Antuerpiani & Galli sudaculi Sepplariani ad medicos usus sufficiebant achen rubro, cuius fructus & notas non minus adumbrat esse Lobelio, quam Limonium. Radix crassa, croceis lenit alium. Idem etiam discunt. Folia Podagricis calidis, & viceribus vtiliter imponuntur fluentibus, Schvenckf.

LAPATHUM AQUATICUM minus.

Locus.

Hic etiam aqua sunt natales, aiant in Adv. Lob. & Pena, sed non nisi limpida & fontanæ, trans quas è fundo exerit cauliculos tene-
rulos, flacidos, graciles, non absque hinc inde filamentis, ut ceteræ aquaticæ, stipantibus & dendulis: folia sunt item admodum tenuia & mollicella, nec tamen aquæ innatantia ritu Potamogetonis, sed erecta, viridantia ex atro, lanceola, angustiora multò quam Potamogetonis. Lob. & Pena Adv. Pusillum Fon-

Hortulapathum pusillum
Lapathum minus.

Vires.

tilapathum, & Lapatholum vocatum tenellum. Lob. Tabern. & Hist. Lugd. C. Bauh. Phyt. Lapathum 12. aquaticum minus. An Gesn. hort. Lapathi genus silv. quod circa lacus Tigurensis ripas nascitur in ipsa etiam aqua. Schvv. Lapathum palustre minus Hydrolapathum minus.

Folia miscenda colligebant sedulo quidam Pharmacopœi Narbonenses, præsertim Neman-
si ad vnguenti Martuati nomen & rerum fatraginem confusissimam, tuebanturque semper
Tom. II.

idem, non aliud gentis Lapathi, sed conditum esse illi vnguento.

LAPATHUM FOLIO ROTUNDO Alpinum.



Descriptio

Lapathum. Istud radice furculosa & longa nititur, cuius singuli furculi pluresque pollicares crassitiam facile assequuntur, rugosi, & fibrosi, succulentos intensè, sapore amaro: caulis bicubitalis & tricubitalis, canis profundis sulcis exaratus, rubescens, alis multis donatur: folia Batdanz, notabilis latitudinis, re-

tunda, glabra, pediculis rubente & striato appenduntur: flores muscoli & profusissimi alas ferè totas obfident, ex herbidis tribus foliis apicibusque multis luteis compositi: quibus semina succedunt triangularia, nonnihil rubentia.

Gesn. hort. Lapathum silvest. circa Friburgum Helvetiorum, foliis ferè rotundis. In app. Lapathum rotundum, Rhabarbarum appellatum propter similitudinem aliquam. Anguill. Lapathum rotundum, quod non vult dicere Rhabarbarum. Lob. & Pena Aduers. Obs. & Ic. plant. Hippolapathum rotundifolium, Pseudo Rha Recentiorum. Figura non multum placet. Camer. hort. Lapathum rotundifolium, quod nonnulli Rha perperam existimant. H. Lugd. Hippolapathum rotundo folio Lobel. Pseudorhabarbarum Recentiorum. C. Bauh. phyt. Lapathum 14. Hippolapathum rotundifolium. Schvenckf. Lapathum domesticum rotundifolium.

Nascitur, autore Clusio, in omnibus iugis Alpium Striacarum & Austriacarum, præsertim circa humidiora illa loca, ad quæ armenta stationem istic habentia æstivis mensibus aquationis gratia convenire solent frequentissimè. Olim in peregrinatione mea Rhætica cum D. Gesnero inveni in Rhætia alpibus, habui etiam Genevæ in horto allatum ex vicinis montibus ubi durabat cum foliis amplis rotundis. In horto Ill. E.C. plantatum se propagat.

Nomine Rhabarbari utebatur Lazarus à Schvende, qui aiebat purgare, si ad duplum Rhabarbari exhibeatur.

LAPATHUM ANTHOXANTHUM.

Lapathum silv. 4. Dalechampii, eam plantam liquidam esse putant, quam nonnulli Parnaces Chironium folio Lapathi, flore aureo, à Plinio dictum esse arbitrantur. Radice est brevis, furculosa, fibrata, dura, lignosa: caulis duobus

Synonyma
Lapathum rotundum.Pseudo Rha
Recentiorum.Lapathum domesticum rotundifolium.
Locus

Vires.

auribus, angulosis, palmi aetudine: foliis Oxy-
palathi, oblongis, angustis: flore in summis ramis
aureo. Vnde Antoxanthos, id est, lutei floris La-
pathum nuncuparunt.

Locus



Casp. Bauh.
phyt. Lapa-
thum 10. silue-
stre flore au-
reo.

In fossis & v-
liginosis locis
provenit. Nam
& C. Bauhino
hoc ad palu-
stria circa No-
rimbergam
collectum
transmisit D.
Doldius.

LAPATHVM ACVTVM
crispum.

Synonyma

TAberna Icon. & Hist. Lapathum acutum cri-
spum, fraus Spiz mengelmürg.

Cas. Bauh. phyt. Lapatii folio acuto folia saepe
angustiss. oblonga & crispa. Schvenckf. Lapa-
thum acutum crispum, id est, Spiziger fraus
ser amper.

Locus

Humectis gaudet.

LAPATHVM MARINVM SI-
nuatum.



Elegans hae
Lapathispe-
cies, caules
emittit humi
procumbentes,
alias oblique e-
rectos, dodran-
tales, in ramu-
los diuisos an-
gulosos, atque
striatos, quibus
folia vncialibus
serè pediculis
haerent, alterna-
tim posita, la-
ciniata, duabus
insignibus laci-
niis imam par-
tem in totidem
appèdices diui-
dèntibus, figurà
oblongà, è quo-

rum ramulis ramulorum exortus est: qui velut
in spicas longas ex semunciali intervallo, stipes
minimos aggestos habent, obsoleti coloris & ex
luteolo vixente, quodammodo albicantes. Radix
rufescens, simplex serè paucisque fibris donata.

Gener Cherleus Iunio florentem collegit
prope Aiguemortes.

LAPATHVM PVLCHRVN BONONIENSE
sinuatum.



Pulchrum
lanè est
Lapathū quod
à diligenti
stirpium inda-
gatore D. Ago-
nio Medico Ar-
gentinensi ac-
cepimus colle-
ctum Bono-
niæ, ex crassa
radice multa fo-
lia, pleraque
duarum vncia-
rum pediculis
tenuibus eius-
dem penè lon-
gitudinis pro-
ferens, vnciam
lata, in medio
profundo verin-
que sinu ref-

pondente, subrotunda: caulis palmaris: in co-
calices hirsuti geniculatim dispositi.

LAPATHVM FLVITANS LONGO
serrato folio.



Elusa radix est
geniculata
ex lingulis ge-
niculis fibras e-
mittens, quibus
vado inhaeret,
primis internodi-
is rubescens:
caules edit mul-
tos, rotundos,
quinque aut sex
cubitos longos,
in aqua fluitan-
tes: folia palmi
atque eo am-
plius longa, an-
gusta, in ambitu
crenata, alter-
natim per cap-
les nascentia,
gustu satius &
sicco. In cau-

lium vertice thyrsus eminet eà prorsus specie,
quā in Potamogetone visitur. Nascitur in vadis
ammum pigriorum, ut Araris.

Oxylapathum aquaticum Dalechampi. Casp.
Bauh. Phyt. Lapathum 13. in aquis fluitans foliis
crenatis. Lapathi genus silv. Gesneri.

LAPATHVM SANGVINEVM, SIVE
sanguis Draconis herba.

Facilis est huius à Lapathis reliquis discretio,
sanguineo succo quo scatur, necuis per folia
Lapathi minoris, acuminata, crebris discurrenti-
bus, varioque implexu ruborem atrofanguineum
vixenubus foliis conciliantibus: quorum succus
& manus

Descriptio



Synon.

Varietas

& manus & alutam primum purpureo, mox in caeruleum degenerante colore tingit, quo simul & pediculi foliorum turgent. Reliqua effigiatura non ablimilis Lappatho acuto, nisi quod magnitudine superatur.

Dodon. gall. Lappathi quartis species altera, parva & siluestris, tota rubra, floribus & seminibus. Reperiri autem in hoc genere tota candida

instar niuis affirmat. Rubram autem à Latinis Lappathum nigrum appellati scribit, à modernis Sanguinem Draconis: Gall. *Sang de Dragon*, Germ. *drachenbluet*. Et Lat. in fol. Lappathum & siue rubens: Lappathum nigrum, & niger Rumex. Perperam, inquit, faciunt, qui succum huius, qui ex hoc instar vini rubentis exprimitur, Sanguinem Draconis vel esse suspicantur, vel nuncupant.

Hist. Lugd. Lappathum siluestris tertium: Tertium Lappathi silu. genus Diosc. indicatum, Lappathum nigrum & Sanguis draconis. Lobel. & Penz. Aduerf. Obl. & Icon. plant. Lappathum sanguineum. Camer. hort. Lappathum sanguineum siue Sanguis Draconis, Graecis *σπυδαίον*.

C. Bauh.

Phyt. Lappathum 9. rubens. Apud Matth. Lappathum sanguineum. Cui leuerus censor iconum Hist. Lugd. non potius imitatus sit iconem Camer. quam Lobelii nescio.

Hort. Lusit. Lappathum sanguineum, Sanguis Draconis herba.

Locus

Tempus.

Sanguineum Lappathum à me satum Mont. belg. in horto Ill. E. C. facile prouenit & secundo anno caulem profert, semine deciduo se multiplicat & propagat, floretq; Iunio: Basileæ & Lugduni habui in hortis. B. moniz vidi in horto di S. Saluador al Bargo di S. Catharina: Tubingæ cum effem apud Fuchsum ei dicebatur Sanguis draconis. Septentrionis hortis sponte etiam oritur, rariis in calidis plagis.


Folia aluum cient in iuleulo, aut expressus succus sanguineus totius plantæ, Lobelius. Gustu nitrofiore quam Oxylappathum esse deprehenditur. Reliqua sunt cum eodem communia. Semen puluerisatum & in aliquo decocto astringente potum singularem habet efficacitatem in sistendis mensibus & similibus fluxibus, Camerarius.

RHAPONTICVM

CAP. IX.

Descriptio

Rhapontici radix, quam ostendunt Sepalsia, Raphani medicinis crassitudine est, Rhabarbaro grauior, compactior, rugolo, sulcoque cortice obducta, secta per transversum spiras ostendens, colore vario, minusque rubro quam Rhabarbarum, amaro vix euidente & ferè dulci sapore. Tom. II.




re prædicta, cum adstrictione admista, sputum etiam tingit coarctans.

De copula ex Veterum & Recentiorum sententia in huius secundi Tomi Appendice.

RHABARBARVM.

CAP. X.



Crassa radicis talcoz sunt, quas utraque manu interdum vix complectaris, cortice nigricante obducta, circularibus Zonulis rugosæ, valleculis tuberculisque inæquales, mediocriter graues est substantia nonnihil integrim sit fungola, crocea, crispo linearum rubentium discursu veluti undulata, non sine albedine aliqua

Descriptio Cortex

Substantia

Sapor

admista, sapore amaricante haud ingrato nec vehemente, cum euidente adstrictione. Liqueorem cui infunditur colore croceo tingit.

Hic Rhabarbarum tantum describimus, plura de eo in huius ex Veterum & Recentiorum sententia in huius Secundi Tomi Appendice traditur.

OXALIS VULGARIS FOLIO

CAP. XI.


Hic libro Oxalides sine imponant. Quoniam enim accedant ad Lappathia, vel hortulanis notum est, à quibus plerisque Lappathi nomine veniant. Oxalis igitur vulgaris folio longo, cubito altiores promit caules striatos, concavos, in alas diuisos: folia Bistortæ minora, acuminata, quæ pediculo adhærent falcata pinnatave, succulenta, atrouirentia, sapore acido: flores & semen Lappathi acuti: Radix fibrosa, lutea, strenua siccante & adstringente sapore.

Brunf. Acetosa & Lappathum acetosum.

Oooo 4

Delineatio

Synonyma
Acetosa.
Lapath. a.
crispum.



Anagyris
agrestis.

Lapath. a.
crispum.

Oxalis can-
dida.

Oxalis
montana.

Oxalis
linguata.

Oxalis
terrestris.

Oxalis
corniculata.

Oxalis
bilobata.

Apud Hier.
Brunsch. in e-
dit. anni 1550.
male cum Ace-
tosa iungitur
Vnifolij figu-
ra.

Lonic. Ta-
bern. Dod. gall.
& Lat. in fol.
Czislup. Oxalis,
Acetosa, & Cor-
do in Diole.
cui etiam La-
pathi sine Ru-
mids quarta
species. Fuch-
sistor. Lapathi
quartum ge-
nus Oxalis.

H. Lugd. O-
xalis maior, La-
pathi tyli. genus 4. Dioscoridis [vt & Trago] alijs
Oxalida, alijs Anaxyrda, aut Lapathion agreste
[aceto] vocatum. Plinij siluestre genus [Lapathi]
Oxalis dicta, Latinis Rumex, nec alia Lapatha
Actio, Lapathum Oxalis vocatum.

Job. & pena Adu. & Ic. Plant. Oxalis sine Lapathum, Oxalida, Acetosa. Obleru. Lapathum, Oxalida. Anguill. Lapathi sine Numicis species, & alia vocata, aliquibus Lapathum acutum. Cast. Acetosa maior. Adolph. Occo Sup. vng. mart. Lapathiolum 1. Acetosa. Getn. hort. Lapathorum species minima, Oxalis dicta maior, pratensis, longioribus folijs. Item Append. Lapathi genus minus, acidiorque Oxalis dicta, cuius semen difficulter colligitur, nam subito decidit, priusquam probe matureseat.

Amat. Oxalis, Acetosa, Oxylapathum Galeni, hortense, latum. Camer. Epit. Matth. Thal. Oxalis maior. Hort. zul. Acetosa maior vulgaris. C. Bauh. Phyt. Acetosa 1. Pratensis. Lapathi quartum genus Diosc. & Lapathum silu. Plinij. Apud Matth. Acetosa pratensis seu Lapathum 4. Diosc. Aliquando media foliorum parte per longitudinem candida: nonnunquam utrinque ab exortu duplici sagittali figura. Schvv. Acetosa maior vulgarissima & alia Diole. & alia, Acidus Rumex, Lapathum, Oxalida.

Matth. in Diosc. Oxalis vulgo offic. Acetosa appellata. Illud Lapathum quod ab acido succo & alia Græcis dicitur (cui id silentio inuoluit Diosc.) duorum est generum, maius nimirum & minus. In com. cum mag. fig. Oxalida.

Oxalis, Græcis & alia & alia. Gal. etiam & alia & alia 1. acidum Lapathum, siue acidus Rumex. Offic. Acetosa. Germ. Sauwampffer. Belg. Sürfele/ Zureck. Gall. Oseille, & Oseille, à nonnullis Agreste & vinette, à ingd. Salicette: It. Acedras. Angl. Sorrel. Hung. Solta/ Solau/ Lapuch, Keisaltza Szami.

Vbiq. & pratis & hortis quolibet anni tempore vigere scribit Lobelius: vt & nos obleruamus.

Recentiores Acetosam statuunt esse frigidam & siccam in secundo, inquit Fuchsius. Digerit, addit Schvvenex, aperit, incidit nonnihil humores lentos. Ventriculum astuantem refrigerat, appetitum ciborum excitat, Iecinotis calorem con-temperat. Biliosis ac pestilentibus febribus aduersatur. Radix Hepatis ac Melasarcum soluit

obstructiones, in febribus vtilis. Semen medicamentis additur cordialibus. Aqua destillata & succus in frequenti sone vlu febrientibus contra astum, sitim & lapsam appetentiam. Acstius mensibus Acetosa ciborum multorum vtile condimentum.

OXALIS CRISPA.



H. Ac natali Descrip-
tione, tem-
pore, & cres-
cendi modo à
priori nihil pla-
ne variat, quàm
quodd natura
folijs crispis in
hac mirè ludat.
Eam autem ico-
ne expressam
exhibere statui-
mus, ne histo-
ria generali ce-
mere quid de-
sit.

Taber. Icon. Synon-
Oxalis, trauster
ampffer. Calsp.
Bauh. Phyt. A-
cetosa pratensis
folia cris-

pantur aliquando vt pingit Tabern.

OXALIS SILVATICA

maxima.

D. Vorum cubitorum circiter altitudine est Descrip-
tione, singularibus, f. l. ex interuallis certis am-
tus, singulatis, & l. palmaribus, vncias tres
latis, acuminatis, glabris, inferioribus verd duplò
maioribus, acido sapore præditis.

Oxalidem maiorem Broccenbergensem, nihil Synonyma
à communiori differre scribit Thal. nisi quodd loco
viginosiore nata paulò amplior existit, quod
neutiquam Thalso concesserimus. Est enim in
nostra quzdam differentia, quæ non à solo loco
pendet.

An Camer. Acetosa Hispanica grandiss. fo-
liis?

C. Bauh. phyt. Acetosa 1. montana maxima, Synonyma
folijs maioribus & rugosioribus quàm pratensis.
Oxalidem maiorem Thalio appellare videtur.
Oxalis 5. montana, Oxalis altera Calalpina.
Montana scilicet, folijs ad Spinachiam acceden-
tibus.

Schvven. Acetosa alpina siue maior montium, Acetosa al-
Bergsam ampffer, vulgari est similis præter folia,
quæ latiora & magis succulenta, nonnihil amari-
cantia.

Oxalidem syluaticam maximam Montbelg. in Locis &
horto Ill. C. Virt. plantatam habui, ex syluis de-
latam: prius videram cum esse Geneuz in monte
Thuri maiorem & rugosiorē pratensem, quæ
ibi etiam proueniebat. Frater in montibus Hel-
ueticis & Sabaudicis prouenire dicit, Schvven.
plurimam ad sinulos montium altissimis locis
herbidis.

Oxalidis maioris radicibus muliercula ignare
imponunt, quodd croceæ admodum sint, pro Rha-
barbaro vulgari eas obtinentes, Thalio.

OXALIS

OXALIS FOLIO AMPLISSIMO GENICV-
lis tuberosis.

Descriptio Oxalidis genus in iugo Wechfel Clusius ob-
seruabat, satiuo nunc mai⁹, foliis valde am-
plis cui hoc peculiare erat, ut in caulis nodis &
geniculis, subinde veluti tubera quædam adna-
scerentur, & quibus folia tandem sese explica-
rent: quæ tubera tellure obruta [periculum enim
fecit] sui generis plantas protulerunt.

Synon. Clus. Pannon. & Hist. Oxalis amplissimo folio.
C. Bauh. phyt. Acetosa 4. geniculis nodosis.

OXALIS TUBEROSA RADICE.

Descriptio

Oxalis tu-
berosa,
terram supra,
Oxalidæ præ-
sertim refert:
foliis parvis
magnitudinis
& formæ, aliis
caulem alis
suis compli-
xis, aliis lon-
giore pedicu-
lo nixis. Flos
stamineus, lu-
teolus, rac-
mosus. Lobe-
lio teste, radi-
cibus tubero-
sis Filipendu-
læ vel Oenā-
thes perquam
spectabilis.

Oxalis exotica, foliis scule & semine hortensis,
quam toto habitu præfert.

Synon. Lobel. Obscrv. & Ic. Plant. Camer. hort. Hist.
Lugd. Tabern. Oxalis tuberosa. C. Bauh. Phyt.
Oxalis 3. tuberosa radice.

Locus & tempus

Heidelbergæ in horto Di. Sprengeri vidi flo-
rentem Iunio folio longiore. In Belgii sara &
Generosis D. Bractonici Do. Pancio Ferrarienti
medico missi Lib.

OXALIS FOLIO ROTVNDIORE
repens.**Descriptio**

Lvdie subin-
de hæc foliis
modò rotundis,
serè Cochleariæ
vel Chelidonii
minoris proxi-
mis, modò ala-
rum appendici-
bus donatis, al-
as Sagittæ instar
mucronatis pin-
natisque, veluti
Spinachii folio-
rum extremum,
colore glauco,
pinguiculis
dehcatog; acore
præditis: caules
inanes, cubito
longiores: stipes
li è fibris com-
ponuntur ex lo-

teo rubentibus, ut in aliis, quibus & semen res-
ponder. Radix tenuis reptat ut & caules, sapore
minùs acido, sed magis sicco quàm folia.

Hist. Lugd. Lapathum alterum siluestre, ter-
tium Dioscoridis Lapathi genus, paruum, plan-
tagini proximum, quod docti quidam vulgi Ace-
tosam rotundam esse rentur.

Ruellio lib. 2. c. 49. Acidula aut minuta Oxalis, ^{Acetosa ro-}
vulgò dicta Gallicè *Ozeille menue*: Oxalis altera ^{tunda}
Hederæ foliis. Oxalis hortensis minor, *Ozeille rom-*
de, *Ozeille franche* & *Ozeille Romaine*, Oxalis ro-
tunda.

Lobel. & Pena Adu. Obs. & Ic. Plant. Oxalis sa-
frua franca rotundi folia repens, Romana vocata,
quia præfertur cunctis gustu & aciditate delica-
tiore.

Amat. in Diosc. Oxalis 3. folio hederaceo, Bila-
cuta Receptionum, Huius, inquit Rob. Const. ap-
ud Amatum, horticulis Oxalidis aliud est genus
cuius nec Diosc. nec Amatus meminit folio sc. for-
tundo & carne flore. Sed Roberto non assentior
dum dicit Amato non cognitam Oxalim folio
rotundo, nisi mihi demonstretur diuersam esse
quandam folio hederaceo Oxalidem.

Gesn. hort. Oxalis rotundioribus foliis, Lapa-
thi species minor, siue Oxalis alteri minori co-
gnata quam aliqui Acetosam Gallicam vocant.

Camer. hort. Acetosa rotundis foliis.

Cz. sp. Oxalis tenuis mediæ magnitudinis ro-
tundioribus foliis.

C. Bauh. Phyt. Oxalis 7. rotundifolia, aliquan-
do sunt quædam folia non angulosa sed in acutum
desinentia: habetur & grâdissimis foliis, quæ Ace-
tosa Hispanica Camer. Camerarius non statuit
varietatem ut Frater, sed separat interposita aliâ
spec. e. Tab. icon & Hist. Oxalis rotunda, siue ro-
tundifolia. Hort. Lus. Acetosa rotunda franca. ^{Acetosa ro-}
Schv. Acetosa Sabaudica, Oxalis Gallica Roma-
na, Oxalis rotundioribus foliis Gesn. ^{tunda}

Plantam in horto E. C. ac prouenit etiâ in alijs.
Obscrui Basilæ in hortis, Lugduni, Genevæ,
aliisque locis plurimis: in quibusdam verò in mu-
tis.

S. pidissima est, & aqua inde destillata retinens
acidum laporem in febribus vultus datur. Suc-
cus eius acidus enihammatis præcipuè utilis.

OXALIS MINOR ACVLEATA

Candia.



RAmulos do-
drantales & cu-
bitales humi ^{Descriptio}
fusos, vndatim
flexuosos, præ-
les striatos, pro-
ducit, colore
propter terram
rubente, ali-
qui viridi: folia
paucâ, Oxalis
veruecinæ, pin-
nis multifloris
ex intervallis
per totam ra-
morum serè lo-
gitudinem mus-
cosi, luteoli:
quibus semen
succedit trique-
tato, purpura

scēs, triplici membranula aculeata circumclusum, contorto latiusculo succulento pediculo appensum, radix purpurea gracilis summā terrā haret.

*Acetosa
Cretica*

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Acetosa 10. siue Cretica semine aculeato. In hortō illustr. Ducis Vvitemb. qui Montbelgardi colitur.

*Locus &
tempus*

Inter semina Stutgardiam missa per Dominum Iosephum de Cassa bona fuit semen cum hoc titulo, Acetosa aculeata minor Cardiz, ea lata in Horto Ill. E. C. Montbelgardi Aprilis fine dodrantales cauliculos produxit cum foliis parvis longis siue auriculis, floruit Iunio, semina matura Iulio, quæ aliquid habent similitudinis cum Tribulo terrestri, sed multo minora, nec ita pungentia: præterea adest pars longa incurua tenuis vrin Caltha.

OXALIS PARVA AVRICVLATA
repens.

Oxalis minima prolixas habet lignosasque radices, valde fibrosas, rubentes, huc illuc

Descriptio



*Synon.
Lapathum
Rumex*

repantes, in plura sæpe capita diuisas, quæ folia emittunt oblonga semunciam aut vnciam longa, ad imum auriculata, gustu reliquorum instar acido. Flosculi longos efficiunt racemos, triangulo semine subsequente.

Cord. in Dioscor. Lapathi siue Rumicis & genus Acetolæ forma & sapore simile, multo tamen minus, in agris nascens.

*Oxalis mi-
nima*

Trago. Germ. & Lat. Oxalis minima, Lapathium, & Acetofella, radice & semine asperi & acerrimi saporis, caule & folio acido ut vulgaris.

*Acetofella
Oxalis mi-
nima*

Lonic. Acetofella. Tab. icon. & H. st. Oxalis ovina, Schaff. ampffer. Adhuc Oxalis minima 1. Klein. Sauer ampffer. Item Oxalis minima 2. Gar. Klein. Sauer ampffer. Dod. Lat. in fol. Oxalis minima, Acetofella.

An Cretalp. Oxalis quæ sponte nascitur gracili solo, tenuis herbula? Camer. Epit. Matth. Oxalis minor. Hort. Lus. Acetosa minor ouina. Item Acetosa minima.

*Oxalis lan-
ceolata*

C. Bauh. phyt. Oxalis 8. arvensis lanceolata. hæc ratione loci maior minorque reperitur: hinc Tabern. duas pingit icones p. 446. Oxalidis Quinz & 441. Oxalidis minimæ nomine. Marum minor etiam in montibus Euganeis reperitur. Oxalis 9. arvensis minima non lanceolata. Oxalis minima 2. Tabern. Qui censuerit [inquit Frater] hanc referendam ad præcedentem minorem facili assenserimus.

*Oxalis
bulgar*

Schvvenckf. Acetosa Lanceolata minor. Oxalis minor nobilior Schaff. ampffer. Spreng. ampffer. Klein. epler Sauer ampffer. palato gravior

quæ vulgaris: Acetosa lanceolata minor, Oxalis arvensis feldor ampffer. Abter saüwer ampffer. quæ semine cum prægnat tota rubra apparet.

uist. Lugd. Oxalis minor Matthioli. Oxalis minor tenuifolia sinuata, veruecina nuncupata, omnium acidissima, ozeille menue, & ozeille de brebis Gallicæ.

Lob. & Penz. Adu. Obl. & le. plant. Oxalis tenuifolia sinuata veruecina. Belgis Escapo sicut dicitur, id est, Acetosa veruecina, quia gustu acido pecori non ingrata.

Geln. hort. Oxalis altera minor, Lapathi species minor. App. Oxalis oblongioribus foliis & prætensi similior, sed tenerior.

Matth. in Diosc. Lapathum minus, Oxalis altera succola, foliisque maioris acidior. In h. st. I. talcum magnis fig. Oxalide minore. In epit. Oxalis minor, ozeille menue. Ital. acetofella, Saggiola & Sannicella.

Minima auriculata multis in locis præuenit: ac habeo plantatam in hort. E. C. suo reptatu odiosam. Tanto luxu, ait Lobelius, sabulosis Brabantiz, Picardiz, Normanniz, & Angliz importuna, ut segetes enitet, vires aut incrementum præpediat, fusco purpureo seminunt, caulium, & foliorum colore solum ipsam operiens. Sabulosis & incultis agris florentem Maio obseruauit Tragus, circa Glaronam Geln. locis siccis, & lapidosis ad pedes montium circa r. par. Limagi.

Refrigerat, auctore Matthiolo, ac siccat perinde ac altera: digerit, & incidit. Omnia bestæ potest, quæ maior, nec infirmioribus pollet viribus.

*Locus &
tempus*

*Temperata
Vinea*

OXALIS AFRICANA.



Elegantissima hæc planta præ reliquis Oxalidibus, tum varietate, tum raritate conspicua est. Vix cubitalem adsequatur altitudinem, ramis oppositis succulentis brachiata. Ad quorum exortum folia exeunt gemina, opposita (aliquando etiam singularia) triplicis siue spinachiz figuræ, sed longæ, &

vel portulacæ ipsa, crassiora. flosculi summitatibus hærent ex luteo virentes & rubello quodam, figura Oxalidis vulgaris, solâ magnitudine differentes, quippe maiores, ex recuruo pediculo penduli. Quibus vascula succedunt magna, vncialia, sæpe iniquetra, pinnata, rutilo quodam conspersa, triangulare semine Oxalidum intergerinis parietibus continentia: radix simplex, alba, paucis fibris donata. Tota ceterum planta gustu & aciditate delicatior reliquis congeneribus præferenda.

An de hac Prosp. Alp. de pl. Egypt. Zacinth. Oxali

Oxalidem, qua eius insula Pharmacopoei ad medicinam utebantur, inspexi, admodum à nostris Oxalidibus omnibus diuerfam, quippe exilis herba ipsa est, foliis paruis, crassis, oblongis, Calthæ foliis æmulis, gustum ut nostra acido sapore ferens.

C. Bauh. Phyt. Oxalis 6. Calthæ folio peregrino Alpini.

Locus & Tempus

Martii fine facta Montbelgardi sub finem Maii adoleuit, pauloque potit ad magnitudinem peruenit. Miliū erat semen Luteri à Robino Herbario regio nomine prædicto.

HERBA IOHANNIS INFANTIS OXALIS folio.

Hic prætermittenda non videtur ea planta, quæ vii sunt ii qui Hispaniam nouam primi subiugauerunt, in curandis vulneribus. Cuius vsum Monardi primus ostendit Indus quidam Hispani famulus, nomine Ioannis Infantis, à quo hæc planta denominata est. Est autem exigua, foliis Oxalidis, aliquantulum villosis, sine hispidis.

C. Bauh. Phyt. herba Iohannis Infantis, Monardis. At Castor Durantes p. 228. iconem habet.

Vires & Virtus

Viridis exigua præmansa aut trita, vulneribusque imposita, sanguinem sistit, eaque conglutinat. Netuorum aliarumque partium vulnera digerit, & mundat, & denique ad cicatricem perducit. Idem vris pollet sicca in pollinem redacta: quæ ad vulnera carne explenda viriditatem præfertur.



FAGOTRITICVM.

Descriptio



Cum Oxalide & Fagotriticum propter foliorum & seminum similitudinem, quam cum illa habet, coniungi desiderat. Rubente caule ad duos pedes aut altius surgit, ærato, lxxi, & in ramos aliquot diuiso: folia ex longis pediculis rubescentibus hederacea, atroviuentia, sapore fatuo: ex quorum alis singulares exeunt pediculi trientales, aut quadrantales, tenues, qui flosculos in muscariis sustinent primum colore carneo, deinde albo præditos, quorum singuli quinis constant foliolis, apicibus rubentibus. Semen triquetrum, nigra gluma obductum, fannam candidissimam continet, insipidum. Radix lignosa, alba, longa, multis fibris donatur.

Synonyma
Frumentum
fol hederaceum
Oxymum
Fagotriticum

Cord. in Diolc. Frumenti genus folio hederaceo. Tragus Oxymum Veterum Diolc. Plinii & Platina facit, ac ab *oxys* [ent]o] teste M. Varrone dictum scribit, sed quam bene, ostendunt Mart. & Dodonæus.

Existimauit aliquando Auguill. Formentone esse Gramen Parnassii, sed merito mutauit sententiam, agnoscens (sed & hoc malè) esse Oxymum M. Varronis.

Lonicer. cui Frumentum vaticinum dicitur, duas exhibet figuras, tunc tamen vna suffecisset.

Matthioli itaque iudicio, Dorlon. Tabern. Camer. & nostro, Frumentum Sarracenicum (ita enim illi in hist. germ. inscripsit) Veteribus est incognitum. Quare erant quicunque cum Trago & Anguill. Oxymum veterum esse scribunt. Explodenda Loniceri opinio, teste Matthiolo, in suis in Diolc. comment, quod Frumentum Turcicum, siue ut alii inter hos Castor. Camer. in Epitom. & Hist. germ. Mat. placet, Sarracenicum quod Tridentina rura vulgò appellant Formentone, & Foro Iuhenses Sarracino, Oxymum esse existimat. Quin etiam aberrasse deprehenditur, quod huic plantæ omnes odorati Oxymi facultates reddiderit.

Apud veteres quidem nullum habere nomen, nec Oxymum quidem esse, siue illud Dioscoridis, siue alterum Varronis & Columellæ, vel inde constat, quod, attestante Dodonæo (quin Hist. gall. Tragotrophon, de Frument. autem & Hist. Latin. Fegopyron vocat) Oxymum Dioscoridis herba est odorata: Fagotriticum verò planta sapore & odore fatua. Sic & Varronis, aliorumque rei rusticæ Latinorum scriptorum Oxymum, non alicuius herbe genus, sed pabuli nomen est, ex legibus videlicet, ac leguminibus, veluti Varro lib. 2. cap. 31. de Oxymo scribens, testatur. Id genus pabuli sunt, inquit, segetes vides scilicet antequam siliquas ferant Item & Plinius lib. 18. cap. 16. Apud antiquos, ait, erat pabuli genus, quod Cato Oxymum vocat. quo crebant (exemplaria pleraque minus bene scribebant) aluum bubus, id erat & pabuli, segete viridi dissecta antequam gelaret. Sura Mantius ad aliter interpretatur, & tradit Fabæ modos decem, Vicæ duos, tantundem & Erulæ in iugero Autumno misceri & feri solitos, melide & Avena Græca, cui non cadit semen admixta: hoc vocitatum Oxymum, huiusque causa feri solitum, Varro appellatum à celeritate proueniendi ait. Ex quibus sanè euidentissimum est. Fegopyron propriè Oxymum non esse: sed frugem nouam, veteribus vel non cognitam, vel non visatam, vel neglectam.

Frustra querit Lob. in Adu. & Obs. ubi Lampinam veram quorundam asserit, malè,) An Belgarum *Bolghem* [Triticum Sarracenicum] sit Erysimum Theophrasti, id quod in sc. Plant. non absque extore manifesto inscriptione sua concludit.

Lobelium sequitur Gesn. in cat. pl. & H. Lugd. eodem errore Frumentum Sarracenicum Erysimum Theophr. & Irionem Plinii cum imperitio. sibus esse scribentes, Qua de re lib. 21.

Tabern. Icon. & Hist. Oxymum cereale & Tragopyrum. Formentone Calsp. C. Bauh. Phyt. Panicum 6. siue Frumentum Sarracenicum, cetum etiam apud Matth. ubi inter Tritici genera reponit & quantum facit.

Græcè *oxys* [Phegopyrum, Fegopyrum, aut Fagopyrum, quam vocem laudat Had. lun. Latine Fagotriticum dixeris, seu Triticum faginum quod faginam glandem, & formam triquetram & colore fordido, hæc quantitate multo minus, quodammodo refert: Et sanè meliore ratione, quam si Erymon vocis ad hirci pabulum, Tragotrophon, Tragopyrum, & Triticum hircinum retuleris. Alii Frumentum Sarracenicum appellare malunt, Germ.

Geydenborn / Beckweitz / Buchweizen / rinde
Grütz. Belg. Boefweyde / Bueckenweyden / rind
Boeck Weete. Gall. De la Dragee aux cheneux &
M. L. Froment me, Saravina. Angl. Bechebreare
Vinde Saltweate. Bohem. Posalku.

Locus

Tempus

Vires

Infusum
Tea buiso.
Tinctura.

Pessum

Vitis
Pulmentum
Placenta

Panis

Tabulum
cimentorum
herba vicia
etc.

Nascuntur quancunque solo, neque vllum quan-
tumvis aridum, macrumque respuit: gaudet im-
bibus: cito pinuenit, celeriter madrescit: Bis
in anno feri potest: Nempe Vere Martio aut A-
prili: ac Autumno post mensem pabuli causa.
Plerisque Germaniae locis & Brabantiae Campa-
niae vulgare: Italiae etiam non incognitum. Fa-
gotriticum sapidis feliciter in horto Ill. E. C. pro-
uenit florens Iunio, Iulio & Augusto. Copiose
obseruatur in Ditione Marchionatus Badensis
Rastelana in agris inter Basileam & Bingen pa-
gum. MonsPELLi & Tiguri florens Septembri.

Autore Marthiolo calefacit, & humectat, ve-
rum non multum à temperatis distat. Farina ex
lacte decocta praestat illita ad biliosas inflamma-
tiones. Rura non solum ex ea panes pinunt,
sed pulcem quoque conficiunt, quam potentiam
vocant, quae non ingratus est cibus, ubi recte fiat,
& calco & butyro aspergatur. Pusillam quoque
exutis granorum putaminibus, è granis parant
& ex carniū iure decoquunt ad esum. Fego-
pyron, ait Dodon. Triticum, Secali ac Hordeo mi-
nus nutrit, plus tamen quam Milium aut Pani-
cum. Pulmentaria ac placenta quae ex eius farina
conficiuntur, facile concoquuntur, cito descen-
dunt, alimentumque corpori adferunt, exiguum
quidem, non tamen malum aut vitiosum. Panis
qui ex eo aliquando, cogente annonae penuria,
coquitur, aut farinam eius admixtam habet, hu-
midus est, citiusque descendit, ac flatulentis plus
obtinere, quam ex Secali coctus. Herbam vici-
dem priusquam semen maturuerit, boues iumen-

edque pascuntur. Semine gallinaceum genui pa-
llum eiusmodi pinguefecit.

Semine pa-
llum ge-
neris galli-
nacei.

LUNARIA MAGORVM


Arabum.

A foliis sinuatis [inquit Lobelius Obseru.] Lunae crescenti similibus haec rara planta

Descriptio &
Synonyma
Lunaria
Locus.

Lunar è nomen
adepta, à peritis
rei herbariae,
quam non nisi
conuallibus Al-
lobrogum inter
montes illorum
praecellum, vul-
go Mont Senis
vocatam, & D.
lo. Maurum ver-
nacule S. Jean de
Morienne, colle-
gi, nominéque
Lunariae donauit,
alii quod dilcer-
natur ab aliis
Lunariis, Lunar-
iam Magorum
Arabum dixere:
Exeunt Martio
tenella solis à ra-
dices lignosa flo-

Infusum
vitis.




xuosa, cinerea, Oxalidis francæ rotundifoliae in-
mulum erumpentis similia, Thlaspi hederaceo
serè paria: flores & semina necdum nobis visa.
Icon. Plant. Lunaria Magorum Arabum.

C. Bauhinus Phyt. Lunaria Oxalidis rotundæ
folio, quam nondum videre licuit.

FINIS LIBRI VIGESIMI TERTII.





HISTORIA VNIVERSALIS PLANTARVM


LIBER VIGESIMVS QVARTVS.

LACTVCACEÆ, INTYBACEÆ, CÆTERÆQVE ID GENVS,
quarum flos in pappum abit.

Proxime dicuntur Papposa, & ipsa non parua haleracearum societate stipata. Semen lanuginis est, quam Pappum vocant. Nomen Græci dedere, quia nascencia florum capitula numerosâ diuiduntur lanugine, ipsis seminibus insidente.

LACTVCA, THRYLAX VETERIBVS.

CAP. I.



In Veterum scriptis cum plurimum Lactucarum mentio fiat nec etiam pauciores Neoterici assignent, de his in genere quædam præfari Boranicus noster ordo nos cogit.

Lactuca igitur à lactis copia nomen adeptæ gratissimum olus est, teneritudine, ac dulcedine cæteris prælatum: numerosis constat ab radicibus, ac latis, se inuicem compactili serie amplectentibus, idcirco quæ in medullis clauduntur, albidiora sunt, ac teneriora: quia ab iniuriis externi aeris & Solis protegentur: cum caulescit amara redditur, & lacte mader: caulis affurgit densis foliis, rectus, & crassus [aculeis quibusdam horrens, id quod & foliis, quæ terram spectant, vsu venit, maximè ubi aliquantulum consenuerint, addit Trag.] qui in cacumine funditur in ramos candidos, in quibus pauca sunt foliola, subrotunda, ac viridia: sterculos gerit in cacuminibus pallidos, qui in pappos transeunt: semina subsunt oblonga, & compressa, aliis candida, aliis nigra.

Lactucam in satiuam & syluestrem distinguit Dioscorides. Satiuam quidem, cui nemini non notam, non delineat, sed medicum eius usum duntaxat adscribit, de quo infra, vt & Brassica syluestri. Nominat verò idem & Lactucam marinam, quæ à satiuâ prorsum dissidet, ac Soldanella hodie à Medicis & Pharmacopœis nuncupatur: de hac egimus libro 15.

Theophrastus lib. 7. ac 4. cap. plura genera esse scribit. In genere Lactucarum, inquit, candida dulcior, atque tenerior, cuius tria genera

reddunt, Laticaulis, Rotundicaule, & Laconicum: huic folium Carduo simile: & recta, ampla, & caule minime brachiata est: inter latas aded quædam laticaulis fiunt, vt pro valuis hortorum huic nonnulli vtantur. Quæ verò lactis admodum copiosa, & folio pusillo, & caule candidiori consistit, syluestri similis est.

Plinius Theophrastum sequutus inquit: Lactucæ Græci tria genera fecere: vnum laticaulis, aded vt hostiola olitoria ex his factitari prodiderint: folium his paulò maius herbaceo, & angustissimum, vt alibi consumpto alimento: alterum rotundi caulis: tertium sessile, quod Laconicum vocant. Alii, inquit, coloris & temporis satius genera discernere: esse enim nigras, quarum semen mense Ianuario seratur: albas, quarum Martio: rubentes, quarum Aprili: ac omnium earum plantas post binos menses differri: diligentiores plura genera faciunt, purpureas, crispas, Cappadocicas, Græcas: longiora his folia, caulesque lati: præterea longi & angusti, Intubis similes: pessimum autem genus, cum exprobratione amaritudinis appellauere Picrida: est etiamnum alba distinctio Atræ, quæ Meconis vocatur, à copia lactis soporiferi: quanquam omnes solum parere credantur. Apud Antiquos Italici hoc solum genus earum fuit, & ided Lactucæ nomen adeptæ: purpuream maxime radicis Cæcilianam vocant: rotundam, verò ac minimæ radicis Astylida [Astylida Athen. quasi urbanam,] quidamque Eunuchion: quoniam hæc maxime refragetur Veneri. Est hæc omisit Cæsalp. etiamnum quæ vocatur Caprina (Marina ex Corn. Hist. Lugd.) Lactuca. Ecce cum maxime

PPP

*Genera
Diosc.
generalis
Lactucæ*

*Das sum.
ma Lactucæ
vasilegia
Dioscorides.
Lactuca
marina f.
ac Soldanella.*

*Genera
Theophr.*

*Lactucæ
Lactucæ*

*Genera Plin.
Lactucæ*

*Rotundi
caulis.
Sessile seu
Laconicum.
Nigra.
Alba.
Rubentes.
Purpureæ.
Crispæ.
Cappadocicæ.
Græcæ.
Picrida.
Meconis.*

*Cæcilianæ
Astylidæ
Eunuchion.*

Caprina.

Tom. 11.

ma capite terepere satius admodum probata quæ Cilicia vocetur, folio Cappadociz: nisi crispum, lariusque esset.

Quod de laticaulis scribitur, aliquando horum valuis eius caules viles ob amplam latitudinem, non videatur mirum: vidit enim Cæsalpinus inter Anchutas caulem aliquando in speciosam latitudinem creuisse: paucis foliis, ut pote nutrimento in caulem absumpto: multo autem magis id Lactuce contingere potest: habitior enim multo est eius caulis.

Satiuam Lactucam in tria diduxit genera Tragus. Eorum primum est, Lactuca sativa maior: alterum Lactuca crispa: tertium, quæ & ipsa crispa dicitur, pulcherrima est.

Martholus in prioribus communia quidem ac diuersa agnoscit genera, qualia verò illa sint non docet, ac si non cognita. Melius certe in post. comm. cum magn. fig. & Hist. germ. ac etiam Epit. cum addit. Camerarii doctrinæ suæ consulit, dum crispam conglobatis in orbem foliis, teneramque inueniri scribit, ac etiam duram, parulam, lactescentemque haberi, esse etiam quam à lato caule Laticaulis, & à rotundo Rotundicaulem, & quam Sessilem (excaulem Ryff. qui triplicem hanc differentiam habet) quod humi procumbat, appellauerint Græci: se verò in Capitatum, Rotundam & Crispam (ita etiam Fuchs. distinxit & Lonicer.) diuidere: differre etiam foliorum colore, nam aliam saturatè viridem esse, aliam subviridem, aliam subeandicantem, aliam cruentis maculis respersam, è Cypro allatam: esse & quartum quoddam genus, cui in cibo prima laus sit, Romanam vulgò vocatum.

Cypria
Romana

Dodonæus gallicus Lactuce sativæ quinque tradit species, dicitque earum primam absolute Lactucam vocari: secundam à Plinio Lactucam crispam appellari: tertiam verò Lactucam Laconicam & sessilem ab eodem Plinio; à Columella Beticam, à modernis autem capitatam nominari: Quartam speciem, esse Cecilianam Columellæ: quintam tandem eiusdem Cypriam seu Plinii Græcam: & has duas species modernis esse incognitas. At Dodon. Lar. alias differentias habet: ait enim culturæ mangonio non raro folia Lactuce hortensis in aliâ speciem transformari: vel enim crispam & Crispam à Plinio, Cecilianam à Columella cognominari: aut ita in se in orbem contrahi, ut capitatam Brassicam æmulari videatur, & vulgò Capitatam, Sessilem, Plinio Laconicam, Columellæ Beticam, Crescentio Romanam vocari: atque huius quidem media ac interiora folia ex diluto admodum luteo colore in albicare: præter has verò & aliam quandam Lactucam esse folio obscurius virente, aut, ut Columella dicat, viridis coloris: quam Plinius Nigram appellet, tam & quandam fusci, ac veluti purpurei, coloris, siue ex albido rubicundam, hanc Rubentem, ni fallatur, Plinium nominare: ac addit paulò infra: Purpurei folii, siue ex albido rubentis, Cypriam esse Columellæ, Plinii Græcam. *Idem*

Dodonæus Dodonæi varium & mutabile caput. Is in Hist. gall. Crispam Plinii, à Cecilianâ diuersam statuit, nunc in sol. Lar. vnam & eandem pronunciat.

Lob. in Adu. quatuor adscribit Lactuce sativæ varietates. Satiuam folio Scarolæ: Sessilem siue Capitatam, rugosis crispæ Brassicæ foliis (harum duarum solum meminit in Obseru.) Roma-

nam dulciorem, nigriore & Scarolæ hortensis folio, semine nigro: & Crispam, non capitatam.

Has quatuor differentias agnoscit etiam Schyvenckfeldius: additque quintam Lactucam fuscam, nigram Cæsalpino cognominatam.

Plures his differentias adfert Tabern. Lactucam absolute inscriptam, capitatam, crispam primam [hanc nos eandem facimus cum eiusdem intybaceâ crispa,] crispam secundam, Intybaceâ Intybaceam crispam, & maritima, quæ est capitata, priusquam caulescat.

Hist. Lugd. videtur recipere Lactucam sativam, Crispam, Capitatam, & Romanam. Sed cur illam solum sativam inscribit: nonne & ceteræ etiam sativæ sunt?

Cæsalpinus has differentias dicit. Semina, inquit, aliis Lactucis candida, aliis nigra: differentia quoque & in foliis: quædam enim latiore folio constat: quædam longiore; quædam crispo: quædam plano: quædam in ambitu sinuato, ac valdè crispo, quam priuatim Scarolam vocant: à cuius similitudine Lactucas & Scarolas vocant, Tunicarum plexus intricatos, ceruicem, & carpum ornantes: Alia Capitata cognominatur, cuius folia clauduntur ad capitum effigiem: differunt quoque colore, quædam enim alba, quæ frequentior est: Alia rubra, ac si vinum foliis esset aspersum: Alia nigra: semina autem nigra & huius, & rubræ, ceteris autem candida. Harum autem expositionem cum Veterum Lactucis partim clarâ esse, partim curiosiorē [laboriosiorē intelligo,] videri scribit.

C. Bauh. Phyt. ex Cæsalp. sua mutuasse nobis videtur, cuius verba hæc sunt. Diuidimus Lactucam sativam in Crispam, Rotundam, Capitatam, Romanam, Cypriam: folio enim alia est latiore, alia longiore, alia crispo, alia plano, alia sinuato, alia colore rubro, alia purpureis maculis asperso, alia obscurius virente. Sic & Capitata colore differt: alia enim alba, alia rubra, ac si vinum foliis esset aspersum, alia nigra: hisque duabus posterioribus semina sunt nigra: aliis verò candida.

Et hæc in genere dixisse sit satis: ab vniuersalibus ad particularia descendamus.

Lactuce simpliciter dictæ nomine duplex intelligenda venit. Satiua & sylvestris. Satiua quædam est vulgaris capitata & non capitata & alia rubra: alia Romana dulcior: alia longa, & valdè angustio folio: alia crispa dissecta. Sylvestris quædam folio lato, succo viroso, quædam folio lato, succo viroso, quædam Endiuia dicta folio laciniato, dorso spinoso, alia murorum flore luteo: alia purpureo, & his affines, de quibus ordine.

Describitur ab his diuersa Lactuca sylvarum purpurea sylvestris, sc. quædam Thalii. Est hæc sylvarum nostra Lactuca purpurea. Lactuca eratica, iuxta Dioscoridis est, si Trago credimus, qui eam ab Apuleio Lactucam siluaticam dici ait: Hæc à nobis. Hedychnois Fuchsi inscribitur. Idem Tragus Lactucam minorem apulei Dioscoridis, ad Lactucam silu. pertinere scribit: Vocatur hæc à nobis, Hieracium minus Fuchsi præmorsa radice. Per Lactucam Leporinam Apulei intelligimus Sonchum luteum & asperam Fuchsi: In Syr. de Cichorio Lactuce sylu. nomine sumit Ioub. Pharm. Sonchum asperum. Est Lactuca Leporina Apulei Trago Hieracii species parua. Lactucam siluaticam Apulei credimus esse Sonchum tertium siue repentem.

Differentia
Tabern.

H. Lugd.

Scarola

Capitata

Aquileia
Paig. cap.
cy non cap.
Rubra
Rom. dulcis
Sylvestris
plena.

Prunella
Prunella
Prunella
Prunella

Lactuca
Lactuca
Lactuca
Lactuca
Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca

Lactuca


Lactuca

Lactuca


pentem. Lactuca minor Dod. gall. est nobis Hic-
raciū minus primum. An Capanulē species. La-
tuce filu. genus in muris Geln. de coll. stirp. Pri-
mula veris odoratam Italonū vulgus Lactucā sil-
vestre vocat: l. 30. Accedere vult Dod. Olus albu
Anchusam, quod Valerianae campestris specie
facit Camerarius. Lactuce generibus: vocatur à
nobis Locusta herba. Hist. n. g. lib. 27. Lactucam
petram Creticam Belli inscripsimus Rapuncu-
lum Creticum Petromerulam, l. 20. Lactuca ca-
praria quorundam est Galega de qua lib. 17. La-
tuce Alini, Pand. Clario, Muscellina herba, pro-
cul dubio est Anchusa. H. n. g. l. 33. Lactuce no-
men attribuitur etiā Lathyridi, ut videre est ex
Trago lib. H. n. g. 17. Lactucam caprinam Latini,
Plinio autore, l. ichymalum nominant, H. n. g. lib.
34. Herbam lactariam terminam Græcos Tithy-
malum myrsiniten vocare scripsit Vesalius, l. 34.
Lactuca marina Latinorum & præcipue Corn.
Celli est Tithymalus paralyus lib. 34. Lactuca
Solifera est Tithymalus Helioscopius lib. 34.
Byron Lactuce foliis, est muscus marinus, di-
ctus Lactuca.

LACTUCA SATIVA VULGARIS CAPI- tata & non capitata.

Descriptio



Parasit.



Synonyma

Tom. II

Lactucas
admittunt no-
strum n. men-
terum princi-
pia subdulces,
folia Endivie
ample, rugoso,
lacte prægna-
te, per primā
adolescētiā
grato, tandem
amaro & ci-
bis abdicato,
quod sit ubi
caulescit plā-
ta: ceterum
folia aliās in
caput conglo-
bantur, aliās
patula dehul-
cunt: canis
in ramos sin-
ditur crebro
deinceps diui-
dendos: quo-
rum extremis
stasculi herent
lutei, parui, ex
squammato
capitulo pro-
siliētes, qui-
bus in pappo
fascellentibus
semen lucere-
scit paruum,
utrinque acu-
tum, oblongū,
compressum,
coloris cine-
tici.

Tragus fi-
guram habet
eandem cum
ea quam hic

posuimus, cui titulum hunc fecit. Lactuca cri-
spa & lata, fraus vnde breytter Lattich. Est au-
tem ipsi ex tribus sativæ Lactuce generibus pri-
mum & maximum, latissimis foliis, ex viridi ni-
gricantibus, quemadmodum Beta maior, ac ver-
tus medium coeuntibus, non aliter quam Brassi-
ca capitata: semine subalbido: hanc vocat in
margine Lactucam 1. siue sativam maiorem. Es-
se etiam in hoc genere scribit nonnullam foliis
candidis, quæ & ipsa in caput quoddam coeat.
Alterum Tragi genus, Lactuca 2. siue crispa,
folia acquirit satis longa, quercinis similia, inci-
sa, herbacei coloris: semine nigricante.

Lactuca sativa cuius imaginem dat. Fuch.
folia Intybo sativo haud dissimilia habet: hanc
rotundam vocat. Germ. Breitter lattich. Al-
teram foliis, quæ crispa admodum sunt, dunta-
xat à priore variare tradit, aliās per omnia simi-
lem, Latine crispa vocari ait Germ. Frauser
lattich, Lactuca commune & crispue, à Columella
lib. 11. cap. 3. Cecilianā & Beticā. Fuch. autem
duo hæc genera vna icone complexus est: & ter-
ciam capitatam non nisi foliis suis, idque dum
paululum creverunt, à prioribus differre scribit,
ac Latine Lactucam capitatam: Germ. Grossen
weissen lattich nominat.

Nos figuram ex Fuchianis quæ placet pro
vulgari hic ponimus. talem etiam proposuerat
Tragus: quam proponit pro Capitata, licet etiā
convenire possit pro vulgari, & pro capitata po-
ni ubi caulescit, eam autem (capitatam) pon-
mus postea pro Romana, quamvis pro ea non sit
posita à Fuchio, qui eandem habet figuras sub his-
dem nominibus.

Dodon. gall. Lactuca prima foliis longis, pla-
nis, latis, semine albo: Lactuca simpliciter dicta.
Secunda foliis similibus vituli mesenterio, Plinio
Lactuca crispa, Gallicè Lattich crispue, Belg.
Obecronsfelde lettuce. Tertia glomeratis
foliis, Plinio Lactuca Laconica, Lactuca sessi-
lis Columellæ. Lactuca Bética, Neoterici La-
tuce capitata: Gal. Lactuca pinnata ou resue. It
utramque Fuchii figuram habet: quam autem
pro Crispa ponit, propriè crispa non est: nec e-
tiam Fuch. pro sola crispa posuit. Nos illam fi-
guram, quam sativam inscripsit, pro Lactuca
Romana, non quod de ea Dod. scribat, exhibe-
mus. Dodon. Lat. in fol. Hortensis siue sativæ
Lactuca folio oblongo, lato, lævi: quæ cultura
mangonio folia ita mutat, ut vel crispen-
tur, aut ita in se contrahantur, & capitatam Brassicam
æmulari videantur: Lactuca sativa Galeno & Do-
don. dicitur, à nonnullis uero à Pythagorici
Lactuca: Belgis Saleet. Huius generis cum fo-
lia crispantur, Crispa Plinio, Cecilianā Colu-
mellæ: foliis in vibem coactis, Plinio Laconica,
Colum. Bética, Petro Crescentio Romana, Belg.
Etop salact.

Prior figura quam sativam inscripsit non ma-
le convenit vulgari, cum caulescit, amissis prio-
ribus foliis posset fortè accommodari & Roma-
næ nostræ. Quam ponit pro Crispa non proba-
t folio enim est laciniato descriptioni non respō-
dens. Tertia figura est Capitata priusquam cau-
lescat.

Mathiol. in prioribus comment. has nostras
Lactucas intelligit, cum è pluribus ac diversis
generibus, quandam conglomeratis in orbem fo-
liis, crispa, teneramque nominat, & alteram
duram, patulā ac lactescentem. Figura autem
quam ubique proponit Matth. pro crispa, mihi
videtur non crispa demonstrare, sed eam quam

PPP 1

Lactuca
rotunda.

Crispa

Iconi

Lactuca

Lactuca

La

Dodon.

Thridacna
Maritima
Euphorbia

Dodon.

Math.

rotundam in post. vocat, eadem etiam in postre-
mis pro Lactuca florescente ponitur: ea etiam
icon quam olim profuerat pro florida, quamque
in hist. German. florescentem facit, respondet
Fuchsianæ, quæ pro Romana Matthioli [de qua
post] poni potest.

Lonic. has pingit nomine Lactucæ rotundæ,
& Lactucæ sessilis.

Corn. crispam ac rotundam Lactucam vocat,
& alteram Capitatam candidiorem illa.

Eunuchion
Astylus.

De præsentibus Lactucæ speciebus loquitur
Gels. de hort. cum ait, Est lactuca crispa (ni
fallor) eadem quæ sessilis & capitata: excaulis,
Pythagoricis Eunuchion, mulieribus Astylis (sic
enim legendam,) Cilicia aliquibus, & Latifolia
crispa, latiorque Cappadociæ admodum proba-
ta. Capitata quidæ genus minus, in hortis nostris
est, maius Batilæ, præsertim apud Carl. Secundū.

Lobel. Obs. & Ic. Plant. Lactuca sativa (voca-
bulum hoc omisit in obs. folio Scariolæ. Item
Adu. & Ic. Plant. (ubi iconem ponit quæ posset
conuenire Lactucæ Romanæ.) Lactuca crispa
non capitata, quæ eadem cum iam dicta esset,
nisi illi essent folia reduciora, contractio-
ra, & bullatis rugis crispata: unde tota tene-
rior & olere grauior habetur. Semine alioqui
& reliquis partibus, à superiore non differt. Et
rursum Adu. Obs. & Ic. Plant. Lactuca sativa sessi-
lis, siue [tria vitia vocabula in Obs. non habet]
capitata, rugosis [desideratur hæc vox in Obs.]
crispis Brassicæ foliis: & hæc supplenda sunt in
Icon. Plantini.

Casalp. Lactuca folio latiore: quædam lon-
giore: quædam crispa: quædam plano: alia ca-
putia: quædam alba frequentior.

H. Lugd. tres icones habet: priori titulus La-
tuce sativa. 2. Lactuca crispa Matthioli. Prior
verò floridæ Matth. altera est etiam Matthioli
vulgaris nondum florentis. 3. Lactuca crispa
Dod. & Fuchsi, ea figurâ comprehenditur vtra-
que Matthiolina: eam autem ex Fuchsi pro-
ponimus.

Tab. 101.

Tabern. Hist. & icon. laticif, Lactuca, siue
prima fopflantch. Lactuca capitata siue 2. La-
tuce tertia siue crispa 1. à prima tantum diffe-
rens foliis crispioribus. Figura quam posuit Cõ-
pilator mihi non videtur competere descriptioni,
est enim folio laciniato.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 1. siue sativa lactuca
florescens Matth. icon. Item Lactuca 6. siue ca-
pitata. Apud Matth. Lactuca crispa quæ capi-
tata & non capitata: est illa crispa Matthioli
&c. Item Lactuca tertia, Lactuca sativa Dod.
gall. & fol. Lugd. Cord. in Diosc. Lactuca flores-
cens Matth. Lacun. Lactuca sativa Lobel. La-
tuce Gelsner. Casalp. Camer. Tabern.

Getard. Anglo Lactuca 1. sativa, Garde lettuce.
Lactuca 5. capitata Cabbage lettuce.

Schvv. Lactuca lata, Lactuca crispa, & La-
tuce capitata.

Locus &
tempus

Lactuca vulgaris non capitata & capitata
passim, frequens præsertim Gencuz, Batilæ,
Lugduni, & Montbel. ubi vna mihi candidiori,
alia viridiore colore vulgation: copiose coluntur
Lactucæ in Horto E.C. ubi interdum hiemem
perferunt: Monspelii Lactuca non capitata a-
bundat, capitata tantæ magnitudinis, vt vna
patinam satis amplam repleat. Tota hieme ibi
in viu. Porentruri in Horto D. Ritneri optimas
& magnas conglobatas degustauimus sulu prin-
cipio, dicebat se habere cum pluribus capitibus:

anno 1609. habemus cum tribus capitibus, quæ
vix differre videntur à cæteris capitatis, capita
tamén minora, alteram sativæ speciem existi-
mam, quandoquidem ex particulari semine
nobis prouenit quod Hortulanus accepit.

LACTUCA RUBRA.

Casalp. est Lactuca rubra, ac si vinū foliis ef-
set aspersum: hoc gen^r lacissimis foliis constat
ac patulis, dulcius cæteris, sed durius: idcirco re-
centia tantum folia secant, regerminat enim
diutius antequam caulescat: semina ei nigra.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 3. siue maculosa; La-
tuce 5. Dodonæi, Lactuca rubra Casalpini. In
errore versatur Dodonæus, ait enim Lactucam
foliis rubentibus Neotericis incognitam, quæ
Cypria dicatur & Plinio Græca; Dodon. verò no-
tam non fuisse existimo.

Lactucam habemus rubram in Horto Ill. E.C.
quæ interdum hiemem perfert: aliquando attri-
li ex Sulez Alsatiæ: prouenit nobis etiam semine
Italico nobis per Illust. C. Wirt. dato cum ex Ita-
lia rediit.

LACTUCA ROMANA longa dulcis.



Enomine
hortis nostris
innotuit, folio
dulci, oblon-
go, modice la-
ciniato, & in-
feriâ parte se-
cundum co-
stam spinulis
acinato: flore
& caule La-
tuce nostræ,
sed semine in-
cedente nigro.
Figura quam
polumus ex
Fuchsianis me-
diocriter ex-
primere mihi
videtur Roma-
nam, idcirco etiam

parandam non curauimus.

Lobel. & Pena Adu p. 86. Lactuca Romana
dulcior, nigrore & Scariolæ hortensis folio, se-
mine nigro.

Tabern. Hist. & icon. Endiuicem laticif, Lactu-
ca larybacea.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 1. siue foliis Endiuic.
Lactuca 2. Tragi, Lactuca larybacea Tabern.
Item Lactuca 4. siue folio obscurius virente. La-
tuce nigra Casalpini. Lactuca Tabern. conside-
rata figurâ mihi videtur eadem cum Romana à
me dicta, quæ mihi videtur Tragi secunda diuer-
sa, quia ait foliis esse Quercinis iunctis: talia folia
non repræsentat figura Tabern. Casalpini ni-
gra non malè conuenit cum Romana.

An Tragus hanc sub nomine maxime Endiuicem
comprehendit non distinguens à Lactuca silue-
stri lato folio, nescio: ignoro etiâ an culturâ pos-
sit mutari in Romanam, quæ cum siluestri com-
munes

munes habet spinas in dorso & alia quedam.

Cæsalp. hanc Lactucam nigram vocat, eique folium angustius adscribit ac productius, planū, colore viridi, qualis in Cichorio: non surrigi hanc in caput ait, nisi vinculo alligentur folia: sic enim candidissimam reddi, & frigili teneritudine ceteras vincere: semine rubro.

An Dod. Lat. Lactuca quedam folio obscurius virente, aut, ut Columella ait, viridis coloris, quam Plinius nigram appellat.

Germ. hort. Lactuca Romana asilex in quorundam hortis educari solita.

Matthioli. in Dioscor. cum mag. fig. Lat. & Ital. Quartum Lactuce genus, cui in cibis prima laus, Romanum vulgo vocatum, foliis maioribus, pinguioribus, viridioribusque: id in ovatum caput extuberat, ubi in cacumine ligetur, & cæteris tenerius albiusque evadit, & præsertim si terra circumducatur ad acumen usque.

Gerard. l. 2. c. 14. Lactuca Intybacea, lumbard lettuce.

Schyvenckfeldii nobis videtur Lactuca Intybacea Endivien latin. / Roman Salat / à vulgari distas folio nigriore, nec perinde scabro, semine nigro: tota te. tella, gustu dulcior, & que gravior, aptior ventri movendo. Videtur & eisdem Lactuca fusca, Lactuca nigra Cæsalpini. Schwarzer Salade / florentiner Salad. Sed illud miramur, cur dicat minus palato sapere, ut Lactucam capitata. n. seu sessilem, quam tamen ait primæ in acerbatis commendationis. Non video ego quomodo possint simul & semel in eodē subiecto subsistere, esse primæ commendationis, & minus sapere. Quis nisi homo depravati gustus ei, quod palato minus sapit, primas tribuit?

Lactucam Romanam longam dulcem primum vidi Basileæ, postea Genevæ observavi copiosam in hortis, vnam candidiorem, alteram nigriorem, utraq; dulcem cum parvis quibusdam spinis in costa: vidi etiam in Watteville: semen solet esse nigricans: Montbelgardi in Horto E.C. provenit nobis utroque colore, nempe foliis ex viridi nigrioribus & ex pallido candidioribus.

LACTUCA LONGO ET VALDE ANGU- sto folio.



Hvic Lactuca folia à radice statim oriuntur multa, palmum aut sesquipalmū longa, vnciam vnam aut alteram lata, superiora vero ut brevia, ita angustiora, spinulis quibusdā per margines donata, utraque vero acuminata: caulis cubitalis & sesquipedalis.

ramosus: flores & semen cum Lactucis vul-
Tom. II.

garibus eadem, sed semini color fuscus.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 5. sine longifolia à fratre Io. Bauhino accepta. Et alia quedam huic valde similis, quam Cast. Durantes pingit, ac Lactucam Gallicam nominat, non tamen eandē.

Observavimus hanc Lactucam quibusdam in hortis inter Bessfordiam & sodinas argenti in Girardinegni, ac alibi, ut in pago Tremoyne: Plantata Montbelgardi in horto Ill.E.C. se propagat semine deciduo, quod maturum Augusto.

LACTUCA CRISPA LACINIATA.



Dod. Lat. Din. folio quoad figurā non autem descriptionē, Lactuca crispa.

Tab. Hist. & Icon. frasser laticif, Lactuca crispa, prima. Item frasser Endivien laticif Lactuca Intybacea crispa. Dnas figuras habet meo iudicio vnius plantæ Compiler: prior figura non respondet descriptioni: Altera figura destituitur descriptione.

C. Bauhin. Phyt. Lactuca 3. sine crispa altera, Intybacea crispa Taber. Item Lactuca 7. sine crispa latioribus foliis varians. Recedit à me frater. Separat enim ille, quam ego non separo, iungit autem quam ego separo. Ei autem apud Matthioli. Lactuca non capitata dicitur, Lactuca crispa Tragi, D. d. gall. & Lat. Lugd. Cast. Tab. Fuchsio, Lob. Icon. Cæsalp.

Proponit hic frater iconem Tab. Lactuce crispe, ad quam an sit referenda crispa Tragi, Dodon. Gal. Lugd. Fuchsii & Cæsalp. dubito.

Lob. Icon. Lactuca crispa non capitata.

Gerard. Lactuca 2. crispa. Curled lettuce. Lactuca 4. Sabauda crispa Sauote lettuce.

LACTUCA CRISPA ET TENVITER dissecta.

Potissimum in his est discrimen, quod obscure virentia, non ut præcedentium Lactucarum integra, sed laciniis tenuibus incisa, itaque undulatum inter forasque flexis reflexisque crispa. Flores conveniunt.

Tabern. Hist. & Icon. frasser laticif. Lactuca crispa secunda.

C. Bauhin. Phyt. Lactuca 7. sine crispa. Lactuca crispa Trago. Lobel. Icon. pag. 422. latioribus & paulo angustioribus foliis variat, quare duas icones proponit Tab. Icon. pag. 422. & 423. Nos contra Fratrem non separamus Tabern. priorem crispa ab Intybacea, ut antè monstratum: Lobelii etiam crispa potius ad præcedentem referimus.

PPPP 3

Synonyma

Locus & Tempus

Synonyma

Tab. Hist.

C. Bauhin

Description

Scirpula.



plexus intricatos ceruicem & carpum ornantes.
Lonicerns huius solo nomine meminit, & vo-
cat *fraus laticif.*

Gerard. *Lactuca* 3. *crispa altera*, *Small curled lettuce*.

Locus
tempus.

Lactuca crispa Genèux prouenit in hortis:
Montbelgardii habemus in horto C. Wittemb.
hiemem ferentem. Watvillâ attulimus semi-
na. Basileâ quoque obseruamus.

Nomina
linguarum
in genere.

Quæ à Lat. *Lactuca* vocatur, à Græcis *βηρυς*
dicitur, à Recentioribus, ut Simeone Serki, *cap-
sa* vel *uasa*, & *βηρυς*, quanquam siluestre
olus quoddam proprie *βηρυς* appellari Gale-
nus scripserit, Pythagoricis *βηρυς*, *Entichum*,
quod cocta coitum aueriat, mulieribus verò A-
ttilida: Hebræis, *resse Aruch* Monstero, *Chaseret*,
Mauritanis *Cherbas*, seu *Chas*: Auic. *Alibace*: Ger-
man. *Salat laticif*: & *Schmaltz* *fraus*/Belg *lact-
touw*, *Salact*: Gall. *Laitue*: Hisp. *Lechuga*, *ber-
ruga*, & *abface*: Ital. *Lattuca* Angl. *lettuce*: Boh.
Salat & *loeyfa*. Hung. *Salata*.

Satio.
Locus

Lactuca, ut Crescentius credidit, feri & trā-
plantari potest ferè toto tempore anni in terra
pingui benè subacta per se vel mixta cum aliis
herbis, & quæ sata fuerit Autumno vtiliter plā-
tatur mensè Decembri circa areas aliarum her-
barum quæ tum ferantur. Ipsa enim non timet
gelu, sed roboratur ex eo, & erit bona post hie-
mem cum aliis herbis quousque semen produ-
cet. Sed quæ de naturâ paruarum, non transplan-
tantur. Quæ verò sunt ex magnis quæ *Romana* di-
cuntur, quæ habent alba semina, transplantari debet,
ut crescant & dulcedinem habeant, multum iugā-
tur irrigatione tepore siccitatis. Scribitur *Lactuca*
toto anno, sed Martio & Aprili mensibus potis-
simum, binis mensibus inter semen plantamque
& maturitatem. Prouenit à satu, inquit Theo-
phrastus, die quarto vel quinto, recisa regermi-
nat, cuius regerminati caules suauiores: nam
dulciores, quamdiu teneri sunt: quidam hos
magis lactuosos esse: primos autem magis ama-
ros, & minis concoctos: radix brevis, maxime
vniuersa; quia caret multiplici radice, sed tan-
tū fibris coheret: translata breuioris est radi-
cis, quam sata: quia ex lateribus magis mittit
semen lanugine continetur. Transferri autem
debet, authore Columella, cum sex foliorum e-
rit. Locis quidem apricis, & maritimis opti-
mè Autumno ponitur: mediterraneis, & frigi-
dis contrā, hyeme non æque commodè disperi-

Tempus
satio.Quæ trans-
plantantur.

An Trago
*Lactuca cris-
pa* & tertia,
fraus laticif / in de-
scriptione
tertiò loco
exhibita?

Cesalp. *La-
tucca* quæ-
dam in am-
bitu sinuata
ac valde cris-
pa, quam pri-
matim *Scaro-
lam* vocant: à
cuius simili-
tudine. *La-
tuccas* & *Scar-
rolas* vocant,
tunicarum

tur: sed & huius quoque radix firmo ligari debet,
maioresque copiam desiderat aquæ, si que
sit tenerioris folii. Sunt autem complura
Lactuce genera, quæ suo quoque tempore feri
oportet: Ea enim quæ fuscæ, & velut purpureæ,
aut etiam viridis coloris, & crispæ folii, vti Ca-
ciliiana mensè Ianuario rectè differunt. At Cap-
padocia, quæ pallido, & pexo, densoque folio
viret, mensè Februario: quæ deinde candida est,
& crispissimi folii, vti in provincia Batica est fi-
nibus Gaditani municipii, mensè Martio rectè
pangitur. Est & Cyprii generis ex albo rubicun-
da, leui & tenerrimo folio, quæ in Idibus Apri-
lis commodè disponitur. Ferè tamen aprico co-
li statu, quibus locis aquarum copia est, penè to-
to anno *Lactuca* feri potest: quæ quod tardius
caulem faciat, cum aliquod incrementum ha-
buerit, exiguam testam in media parte accipiat, eo
enim quali onere coacta in latitudinem se dif-
fundit.

Satio
tempus
satio.

Si verò & bona specie habere velis *Lactucas*
duob' diebus antea quam es ablaturus, comas i-
psarum, h. e. supernam partem, iuxta Constan-
tinum *Calatam*, ligato: sic enim albæ & specio-
sæ erunt. Inalbat ipsas etiam arena superne
infusa. Si verò velis *Lactucas* facere concavas
& foliosas, & in caulem non excrecere, sed hu-
miles, & ad terram depressas esse, transplantatas
rigabis: quum autem altitudinem palmi habue-
rint, circumfodies ipsas ut appareant radices, &
stercore bubulo recenti oblitus obrues, & statim
rigabis. Vbi autem increuerint, germinem acu-
tissimo ferro finde, & testam non picatam impo-
ne, quò in latitudinem, & non in longitudinem
augmentum capiant.

Cultura
mangoni.

Inalbat.

Satio
Odor
albus.

Ut autem *Lactuca* habeat in se *Apium*, &
Erucam, & *Ocymum*, & alia huius generis ab
eadem radice, caprinum aut ouillum stercus
Didymus accipit, & quantorum paruum sit per-
forat, & industriè euacuat, seminaque dicta,
aut quæcunque velis, in euacuata partem den-
se indit, & in profunditatem non minorem duo-
rum parvorum deponit, stercore tenero ac rara
præsubstat, deinde tenui terra aggestâ, & sensim
aquâ rigat, atque etiam vbi enatum fuerit semen
irrorat, assidue stercus inspergendò, & postquam
in caulem excreuerit, multo plus diligentia ad-
hibet, nasciturque *Lactuca* cum iniectis simul
seminibus concreat. Alii duas aut tres capri-
ni aut ouilli stercoris pilulas confringunt, & se-
mina ipsis admiscunt, eaque simul in linte-
olum mittunt & rigata defodiunt, aliaque item
curâ adhibita *Lactucam* multiplicem & varia-
rum specierum habent.

Reddetur *Lactuca* odorata, si Citrii semen
in eius semen imponatur, & sic feratur.

Vires
&
visus in
genere. an
Discrep.

Lactuca sativa, ut scribit Dioscorides, refri-
gerant, stomacho gratæ habentur, somnum con-
ciliant, aluum emolliunt, lac euocant, (augent
Corn.) verum decoctæ magis alunt. Stomachicis
illotas esse prodest. Epotum semen assiduas li-
bidinum imaginationes in somno compescit,
& Veneri refugatur (at semen ipsius potum, his
qui assidue semen per somnum effundunt, auxi-
liatur: & coeundi appotentiam auerit. Corn.)
Ipsa verò frequentiores in cibo claritati oculo-
rum officium: si assidue edantur visus hebetu-
dinem in ducit: Muria condiuntur, cum in cau-
lem exierunt, vim quandam nanciscuntur succo
lactis siluestris *Lactuce* similem.

Discrep.
via lecta.

Est, inquit Plinius, quidem natura omnibus
refrige-

refrigeratrix, idcirco æstate gratæ stomacho fastidium antecurunt, cibique appetentiam faciunt. Diuus Cereæ Augustus Lactuca conferuatur in ægitudine teritur prudentiâ Mulsæ Medici. Somnum faciendi, veneremque inhibendi, æstum refrigerandi, stomachum purgandi (reborandi Dalechamp.) sanguinem augendi vim habent, quoniam & insatiationes discentiunt, ructusque lenes faciunt, concoctiones adiuuant. Creditatem ipsæ nequaquam faciunt, nec vlla res maiorem in cibis auiditatem incitat inhibetque eadē: in causâ alterutraque modus est. Ambustis profunt recentibus, priusquam pustulæ fiant cum sale illitæ. Vlcera etiamque terpuat, coercent immittit cum Aphronitro, mox in vino trita. Igni sacro illinuntur. Conuulsa & luxata caulibus tritis cum polenta ex aqua frigida leniunt: eruptiones papularum cum vino & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederunt, ad quod vtilissimè quàm maximi caulibus, & amaræ. Quidam lacte insudant. Deseruesfacti ii caules, & stomacho vtilissimi traduntur, sicut somno, & satia maxime Lactuca, & amara lactensque, quam meconiem vocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte vtilissimum esse precipitur: Semen satiarum contra scorpiones datur: Semine trito ex vino potio & libidinum imaginationes in somno compesci. Quidam tamen frequentiores in cibo officere oculorum claritati tradiderunt.

Sed de iis accuratissime Galenus. Plurique Medicorum, inquit, hoc olus, ut Ficus Autumnalibus fructibus prætulere. Nam inter ipsa aliud melioris succi non inuenias. Quod porro nonnulli vitio verterunt, id ei in præcipuam laudem cecidit, dicentes scilicet eam sanguinem & quidem multum generare. Et si ita re verâ haberet, nõ modo nulli olerum, sed ne optimi quidem succi, ac maximi nutrimenti edulis esset secundum. Si verò quia perimulcūm ē Lactuca sanguinis cogeratur, idcirco damnandam eam censeant, fallimur huic malo occurrere potest: quippe quum valescentibus, & liberalius exerceri, & ea parcius uti integrum sit. Hæc ergo aduersus eos qui olus hoc non recte vituperant. Illud porro scire cõuenit, omnibus aliis oleribus paucissimum sanguinem & vitiosum generantibus, ex sola Lactuca non multum quidem, nec vitiosum, haud tamen omni ex parte laudabilem gigni. Ut plurimum quidem crudâ ipsa valescunt: æstate autem cum iam in semen proruptura est, in aqua dulci præcoquentes cum oleo, garo, & aceto assumunt, aut cum aliquo ex condimentis, obsoniisue, præsertim iis que caseo constant. Plurique etiam antequam excaulescat in aqua elixa vtuntur, ut ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse ceperunt. Nam amicus quidam meus cum olerere hoc a longo tempore, me ut familiari cibo vsum fuisse sciret, videretque post mandata me citra magnam molestiam non posse, cocturæ rationem indicauit. Etenim in iuuentute quoniam os ventriculi bile effectescebat, æstus moderandi gratiâ Lactucâ utebar. Cum autem ad prouentam ætatem peruenissem, olus hoc contrâ quàm in iuuentute, somnum iam omni studio & industria accersenti auxilio fuit. Quippe qui etiam iuuenis lucubranda gratiâ vigiliis dedita operâ me assuescebam. Declinante iam ætate ipsa ex se insomni, grauius hoc incommodò afficiebat. Aduersus quod vnicum mihi præsentissimum remedium Lactuca vespere comman-

ducata fuit. Frigidum ergo humidumque succum profert, non tamen vitiosum. Itaque, sicut alia olera, à iusta concoctione non excidit, neque alium cohibet, uti neque impellit, Atque hæc illi non immerito accidunt, quum nec aultera, nec acerba sit, quibus facultatibus in vniuersum alius sistitur, quemadmodum à salis, acris, & omnino abstergendi vim habentibus ad excretionem concitatur, quoniam nihil lactucæ inest. Et alio in loco. Lactuca humidum est frigidumque olus, non tamen extremè, siquidem edendo non foret, verum maxime secundum aqua, ut sic dicam, fontanæ frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmones accommodum est, & parua & leuia erysipelata, non tamen ad maiora. Est etiam edulium siti aduersum. At semen potu genitura profluuium cohibet, quomobrem iis datur qui libidinis somnis vexantur. Præterea Galenus alibi ex Archigene recensens olera, quæ stomachicis in cibo conueniunt, in iis habet Lactucas, & *meconides*, quas meconides lactucas conuertit Cornarius. Appellatur meconis quoddam Lactucæ atræ genus, à copia succi, & lactis saporiferi, similitudine quadam cum Meconio, hoc est, papaueris succo: *papauer* enim Papauer Græcis dicitur. Lactucæ succus, auctore Matthiolo, ex rosaceo fronti & temporibus illitus, non solum febrientibus somnum conciliat, verum etiam capitis dolorem mulcet. Gargarizatur vtiliter ex Punici mali succo, ad colu mellæ inflammationem. Testiculis illitus seminis profluuium cohibet, præsertim addito caphuræ momento, sed venerè extinguit. Idem præstat epotum semen ex Papaueris seminis cremore haustum, atque etiam ardoribus vrine opitularur. Cauendus Lactucarum succus suspiciosus, sanguine excreatib, pituitosisque, & iis maxime qui liberis dant operam.

Huius itaque diuersas ob causas, diuerso etiam tempore varius fuit vsus. Antiquitus enim quoddam ebrietati oblectaretur, eamque prohiberet, in cornu sine sumebatur: post verò ad conciliandam appetentiam, in cœnæ principio sumi cœpta est, unde illud Martialis extat.

*Claudere qua cenat Lactuca solebat anorum
Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?*

Hæc nunc quoque æstivo tempore plurimum vitimur in acetariis. Herba multum salubris, Vnde Columella in carmine.

*Idemque saluari properet Lactuca sapore,
Tristia qua releuet longi fastidia morbi.*

Et Paulus Aegineta h. i. ipsam optimi succi sanguinem facere testatur. Lactucæ caulem, seu truncum in vsu esse saccharo conditum integrum prodidit Iouertus. Confectura sapientis est sicca, demulcendæ siti optima. Si quis (ait Constant.) viui radicem Lactucæ satiaze euulsam ex terra ante Solis exortum, latenter sub stratu ægri ponat, ipsi somnum inducit. Ipsa similiter quoque folia quinque numero, aut tria, aut vnum, somnū adferent ægroti, clanculum sub pultinar posita, ita ut partes à caule auulsæ ad pedes ægri spectent, supernæ verò ad caput ægri vergant. Qui ieiunii præsumperint Lactucam, aquarum vaticatibus in peregrinationibus non consternabuntur, neque offenduntur, neque verò ab ebrietate tentabuntur, quisquis ipsam præsumplerit. Ceterum Lactuca assidue comesta visus hebetudine cohibet, & visus claritatem inducit, præsertim si sit dulcis: & multæ quidem in cibum acceptæ, ventrem soluant, paucæ verò sistunt, & grauedinem mitigant.

LACTUCA SYLVESTRIS LATO
folio, succo viroso.

Descriptio EX radice minimi digiti crassitudine, candida, sparsis fibris capillata, caule tricubitali & altiori adolefcit, erecti, lxxvi, inani, ramoso, lac perquam amarum, & retum saporem ex radicis



& caulis vulnere fundens: folia infima lata, lxxvi, bo satiuo proxima, nigricantia, in ambitu leuibus spinulis quasi serrata, superiora, Lactuce sylvestris modo, Fuchsio & aliis sinuata, quæ terram spectant spinulis per costæ longitudinem hispida: flores conferti, Lactuce colore luteo, calyce squamato, subrubente: semen ex pappo comento pendulum, nigrum. Sculptor picturam nostram corruptit.

Descriptio [silu. Lactuca] folio breuiori (saxatilis) quam satiuæ est, ait Theophrastus, idque consummatum aculeatur, & caule simili modo breuiore perfrigitur, succum acrem ac medicatum habet. Nasceitur in aruis, carpitur succus per mellea. Aiunt eo purgari hydropem, caliginem ab oculis atteri, & argema tolli cum muliebri lacte.

An Endiua maxima.

Αχινα δειδαι Dioscoridis similis est satiuæ: sed ampliorem caulem habet, & foliis candidiorem (Αχινα, forte eum Theophrasto legendum) (Capparis breuiora vel Αχινα nigriora) & graciliora & asperiora: est verò sapore amara. De Lactuce sponte nascentis primo genere Plinii, quam Caprinam vocant, plura dicentur inter vires. Hæc fortè est illa maxima Endiua Tragi, siue Tricu maior, foliis Lactuce quadantenus similibus, linguam referentibus minimè inciliis: semine omnis Lactuce scæne magis nigricante: &c.

Tragi figura ponitur apud Cordum in histor. lib. 1. c. 114. pro Lactuca agresti, quamvis Cordus inibi de hac non scribat.

Lonicetus eandem figuram habet ex Trago hac inscriptione Endiuen (Endiua), de qua ait. Endiuen aut Antissien / & Gangdistel & leber distel, vulgò Endiua, species Lactuce, quæ quidam volunt esse Lactucam siluestrem, Gallis Lacteron dictam.

Lob. Adv. Lactuca agrestis, Scariolæ hortensis folio, Lactuce flore, opii odore vehementi, soporifero & viroso: Norbonæ apricis locis: Lactuca altera silvestris Rondeletio: & Lactuca silv. vera. Icon. Plant. Lactuca agrestis.

H. Lugd. Endiua Tragi: Thesion Dalechampi: Item Lactuca silv. vera Dalechampi, cui adscripsit saporem insigniter amarum.

Lactuca silv. vera Dalechampi descriptione [inquit C. Bauh.] subiungit H. Lugd. alterius Lactuce silv. historiam ex Pena, sine iconè tamen quæ tamen Pena Lactuca ab hac diuersa non est. Eandem & tertio pingit additâ descriptione, sub Thesio Dalechampi.

Camer. hort. Lactuca silv. Anglica, grandis admodum & alta, odore prorsus Opii.

C. Bauh. phyn. Lactuca 12. siue silu. odore viroso, Thesion Theophrasti creditur.

Lactuca silvestris vera Dalechampi in rupibus lapidosis saxosisque locis nascitur, vbi durum solum pauca terra contegitur: nonnunquam ex rupium ipsarum rimis exilit. Vidi Genevæ, & in Than Alsatia, ac habeo Montbelgardi in horto Ill. C.

Nunc de huius Lactuce facultatibus dicendum. Viribus aliquantulum Papaueri similis est, inquit Dioscorides, vnde lacteum eius succum aliqui Meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema, caliginemque repurgat: contra adustiones efficaciter illinitur cum lacte mulierum. In summa somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit: contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter quam satiuæ libidinum imaginationes in somno anollitur, ac venetum aceret. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur in in fictili nouo lac eius, antea, vt in aliis liquaminibus moris est insolutum.

De hac Plinius ita tradit. Lactuce sponte nascentis primum est genus eius, quam Caprinam vocant (marinam,) quæ pisces in mare deiectâ protinus necantur qui sunt in proximo. Huius lac spissatum mox in aceto pondere obolorum dultum, adiecto aquæ vno cyatho hydropicis datur, quibus vepbis exprimere voluit illa Dioscoridis ὀφθαλμοῖς καὶ ὀφθαλμοῖς καὶ ὀφθαλμοῖς. Aquam per aluum elicit potus in aceto mulso, &c. Eiusdem succi vsum medicum Theophrastus habet eo loco, quem supra citavi. Ex quo & hæc Plinius descripsit, additis quibusdam aliis. Succus omnibus [siluaticis] candidus, vinibus quoque Papaueri similis: carpitur per mellea incilio caule: conditur in fictili nouo. Sanat omnia oculorum vitia cum lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatrices, adustionesque omnes, præcipuè caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Idem succus aluum purgat in posca potus ad duos obolos. Serpentiū ictibus in edetur in vino potus. Et folia tosta, thyrsique triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur, maxime contra scorpionū ictus. Verum contra phalangia commisto vino ex aceto. Aliis quoque venenis resistunt, exceptis quæ strangulando necant, aut iis quæ vesicæ nocent: item Psymmithio excepto. Imponuntur & ventri ex melle & aceto, ad detrahenda vitia alui. Vrinæ difficultates succus emendat. Crateuæ eum & hydropicis obolis duobus in aceto & cyatho vini dari iubet.

Hæc verò Galenus tradit. Iis qui venereis somniis vexantur agrestis Lactuce semen exhibetur, cuius colligitur succus, argema caliginesque expurgans, cum adustione cum lacte muliebri inunctis.

Quæ argema Theophrastus, Dioscorides, & Galenus dixerunt, Plinius cicatrices videtur conuertisse. Ad Theophrastum Dioscorides addidit, ὅτι ἐκ τῆς γῆς succum illini, Galenus ὅτι ἐκ τῆς γῆς, quod idem est. Sunt autem ὀφθαλμοῖς & ὀφθαλμοῖς.

Locus & tempus.

Vires & vires.

Succus.

Semen & semen.

Semen & semen.

Ex Plinio.

Hydropis.

Plinius.

Collyria & oculi.

Oculi.

Vires & vires.

Ex Galeno.

Semen & semen.

ma, seu *Endivia* in sculorum vlcera. Ceterum, per adustiones hoc in loco qui igne, vel quodvis alio modo ambusta accipiunt, vehementer errant. Auctor *de morbis Galeni* inscripta definit *Endivia* esse, cum superior tunicula in superficie inusta vlceratur, aut etiam paulo altior vlceratio fit, ob magni fluoris influxum. Vnde non male aded in-
estio dici potest.

LACTUCA SILVESTRIS SIVE ENDIVIA multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso.

Descript.



Inconcordia
Habet per
caulem folia,
Sonchi diuisu-
ra, laciniata, &
serrata, spinis
secundum co-
stam aversa
parte donata,
amaro la-
cte prægna-
ta: *radix*
verò bicubita-
lis & maior in
principio spi-
nosus: qui in
sumo in mul-
tos abie ramu-
los, quos flores
ornant parui,
lutei, lactuca-
cei, in pappos

degenerantes. Huius Lactuce quædam mihi
species observata folio non laciniato etiam per
caules.

Olus illud agreste, quod præter Lactucam sa-
tiavam (*Endiviam*) apud Pergamenos in Asia, de-
scribitur nomine in viis ipsis nasci: & locis fossa-
rum eminentioribus, & præterea riguis ac ple-
risque incultis, inueniri tradit Galenus, sine La-
tuce hæc silvestris, nec ne, cui integrum erit di-
ligentius perquirere, per nos licet. Nobis satis sit
ea de Thridacina illa Galeni, hoc loco adscribe-
re, quæ ab ipso de ea apud Cord. referuntur. Exi-
guum autem id olus est, instar Lactuce hortens-
is nuper enatæ, amariorisquæ quippiam præ se fert,
& multo magis dum adolefcit: ubi autem cau-
lem iam produxerit, saporem amarum habet, vel
manifestum. Hactenus Galenus.

De nostra planta loquitur Cord. in Hist. cap.
de Lactuca falso Endivia vocata, dicens: Lactu-
cam agrestem Galeni tempore Græcis Thridaci-
nen appellatam hodie ubique in Germania à ve-
ritate aberrantes Lutybum & Endiviam tã Me-
dici, quàm Pharmacopoliæ vocant: Eius caulis fo-
lia profert statim à terra ferè in profundis sinus
excavata, quorum anterior pars in mucronem
desinit. At Brema in Saxonia, ea folii portio nõ
in turbinem fastigiatur, sed in rotunditatem ex-
it. Figura quæ Cordo per Gesnerum ex Trago
addita est, non convenit descriptioni, sed potius
Lactuce silvestri folio lato, succo viroso.

Tragus lib. 1. cap. 86. figuram non multum dis-
similem habet à Fuchii figura, vocatque Lactu-
cam silvestrem, & Lact. silu. primam, *Endiviam a-*
grestem Dioscoridis, & Condriillam Galeni. Eadem
eidem Trago cap. 89. dicitur vulgaris Eu-
divia, Dioscor. Seris & Lutybus, altera angustio-

ri folio, atque posse germanice vocari *Samen*
Endivien & *Genszügen* / Scariolam autem &
Scariolam à Serapione dici c. 143. ac de ea scrip-
sisse Plinium.

Crediderim ego Appollinatæ per *Genszügen*
& *Endivien* intelligere hanc Lactucam silvestrem:
verum ille pingit Sonchum, nomina quoque for-
te confundens in alia impressione.

Lonic. hanc pingit l. 5. cap. 69. sub titulo *Wils*
der Lattich, atque veteribus Medicis & Apore-
cariis dici Endiviam. Eius postea ponit descri-
ptionem c. 70. quamvis figura non respondeat,
quæ Sonchi non aspera Fuchii est. Hanc appel-
lat *Sardusell* / atque esse Endiviam silvestrem.
Figura autem quam ponit pro Lactuca silvestri
non placet, nec etiam descriptio satis demonstrat,
quid velit: confundit omnia suo more.

Fuch. Hist. & Icon. Matthiol. in prioribus
comm. in Dioscor. itemque in postrem. cum mag.
fig. lat. & lt. In Hist. germ. ac Epic. Camer. Dod.
gall & Lat. in fol. *Lactuca silvestris*.

Corn. in Dioscor. lib. 2. cap. 121. Lactuca silu-
genus, adeò Intubum, aut potius Serin Lactuca
lunilem, referens, vt officina ipsam Endiviam
appellat.

Lob. & Pena in Advers. Seris domestica, altera
Lactuca in Dioscoridis amara, angustifolia, offi-
citis iam olim sola Endivia agnita & recepta,
perperam Recentioribus Lactuca silvestris pu-
tata. De hac inibi scribunt. Speciem hanc in-
cultam Seridis sativæ, non varietatem facimus.
Est enim foliis, dum primùm pullulant & emer-
gunt altius, Scariolæ hortens: postea adultio-
ra in effigiem Dentis leonis sinuantur dentatis
oris, & nonnullis quasi in dorso spina aculeis, vt
in nostra vera silvestri Lactuca: Caulis quaternũ
cubitorum, hispídus, vnicus, rectus, lacte turgi-
dus, floribus luteis, pallidis Lactuce donatus: a-
maro gustu, & præsertim vetustioris, acri radice,
pusilla, fibrosa, Seridis hortens, Symplo de ra-
dicibus miscenda consuetudine Practicantium,
quos doctissimos Barbaros, tam protervè quàm
inscrite, quidam declamatores puri rident, &
spureis conuitiis lacerant, quod hanc plantam
Endiviam veram putarint, & etiamnum vsurpet
non modò ad Symplos de radicib., de succo Endi-
viæ & alios Nicolai, sed etiã stillatitias aquas ex
ea conficiant, quib. suas Rhabarbari macerationes
parent. Esse quippe nimis calidam, amaram, in-
gratam, quidam illorum reprehensorum, alii au-
tem esse silu. Lactucam, nec aliam se nosse dicti-
tant. Sed enim qui institutum perpenderit vete-
ris Barbarorum nostrorum scholæ, animaduertit
illos magna ratione & experimento neutiquam
contemnendo fultos. Quippe non solùm hanc
Endiviam, aptiorem esse decocto succo, & stilla-
titia ad intemperies, obstructions hepatis, &
primarum venarum, sed etiã macerationes Rha-
barbari, Myrobalanorum, & similium medicame-
torum: cum enim sit paulò tenuiore & minus
excrementoso humido, melius referat & abster-
git: cum etiam intima rerum macerandaru per-
uadit, nec calore exuperat, aut amaro nocet,
cum eius amaror non sit à calido, aut saltem non
calidus, vt norunt cultioris Philosophiæ periti, &
studiosi conciliare apud Galenum, & Auerroem,
questionem de Opio, Meconio, Rapauere, La-
tuce, & non parum multis aliis amaris, multum
tamen frigidis. Quin Dioscoride docente Ser-
des silvestres stomacho meliores sativis, quia ipsi
estuantem & tenore resolutum refocillant: in ci-

Varietas

An Olus a-
greste Ga-
leni Theri-
acina de-
scribitur

Endivia
folia
Lat. agrestis
Gal.

Endivia
folia
Lat. agrestis
Gal.

Lat. silu.
Diosc.
Chonardilla
Gal.
Endivia

Apollinatæ

Lonic. hanc

Lactuca silu.

Seris domestica

Relix. Symplo

Endivia vera

Lactuca silu.
Institutionum
Dioscoridis
approbatum

bis vorata, & foris adnotata: Et nota huius melius congruunt Endiuia siue Seridi amaræ angustifolia, quam Lactuca silvestri. Idem postea dicunt cap. de Lactuca agreki. Seridis species, quam Sonchum arboream, silvestremque quidam putant, nihil Lactucæ simile habet, præterquam lac & semen. Pharmacopœi hanc ubique pro silvestri Endiuia agnoscunt & usurpant. Capite tandem de Soncho aiunt. Propinqua addo est sonchi natura Endiuia, ut multi etiam hodie putent spinosam Endiuia nostram esse Sonchum asperam: verum tres cum notissimas habeamus Sonchos, illam Endiuia officinarum retinimus.

Lob. Obs. Endiuia vulgarior officinarum, Seris domestica, altæ Lactucina Dioscoridis amara, angustifolia. Icon. Plant. Seris domestica, Lactucina Diosc. Offic. Endiuia.

Thal. Lactuca silu. Cordi ac Tragi.

H. Lugd. Lactuca silvestris Matthioli. Hanc sinit Hist. Ruell. lib. 2. cap. 69. passim ab offic. Endiuia dici tradit, id quod etiam Fuchsius Matth. & Dod. perhibent: verum non sine magno errore Lactucam hanc silu. Endiuia dicit, ac pro ea medicamentis inunisci. Desinant quæso [inquit Fuchs.] hac pro Endiuia uti Medici, si modò rectè consultum agis cupiunt.

Cæsalp. Endiuia silu. de qua Nicol. Florentinus, qui eam recipit in syr. de Cichorio cum Rhabarbaro.

C. Bauhin. Phyt. Lactuca siue silu. costâ spinosa.

Græcis in genere *διδυμία*, Lat. Lactuca silvestris, Endiuia multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso, & à quibusdam Seriola per duplex tr. quod ferræ modo acutæ spinas folii costâ à tergo habeat: à Zoroastro ut memini legere apud Dod. gall. Pherumbrum appellatur: German. wilder lasso: Belg. wilde lassoire: Gall. *Lactue sauvage*: It. *Lattuca saluatica*: Hup. *Lattuca saluaga*.

Nati hanc secus vias, agrorum & pratorum margines, tum & iuxta scrobēs, autor est Dodonæus; reperiri & in vineis, ac hortis, in quibus olæ feruntur; facillimè autem, ubi semel sata sit, singulis annis recurrere. Lactucam nostram hanc Genevæ vidi virentem hieme ex semine deciduo. Montpelii incipit provenire mense Martio ac ibi abundat, sicuti & Basileæ: Lugduni verò, ubi ad altitudinem hominis excrevit, Februario & Martio. Ibidem observavi foliis non laciniatis prioribus longiusculis.

Recentior ætas, ut Dod. perhibet, loco Intybi hac non infeliciter vitur: Nam ad iocinoris inflammationes & morbum regium confert; calorem siquidem contemperat, & meatus expurgando aperit. Semen huius idem, quod Lactucæ sativæ potest, & Veneri refragatur.

LACTUCA SILVESTIS MVRORVM flore luteo.

Affatim lac fundit tota planta, quæ ex radice digitali, amara, caule perquam tenues erigit cubitales & tesquicubitales, læves, subrubentes, subinde inanes, aut certè medullâ fungula plenos, ad quorum genicula oriuntur folia profundè laciniata, extremâ laciniâ triangulâ hederaceum folium referente, colore quâ terrâ spectant purpurascens, interdum flosculi in ra-

mulis exigit, Lactucæ, plures congesti, colore luteo, quinque foliis constant, totidemque coloria itamina in medio exiguunt, postmodum aliorum more in pappus abeunt.

Anguilla. Herba Scariolæ silvestris species, cuius meminit Galen. cap. de Lactucis. Gesn. apud Cord. lib. 2. cap. 61. Lactuca siluatica luteis floribus. de hort. *Flora*



Lactuca silu. flore luteo: *Flora* illa in silvis humidis crescit ad quatuor aut quinque cubitos. Sonchus forte arboreus Dioscoridis: species una folio oblongo subdulci & grato gustu, angulato, floribus luteis. In append. Sonchi genus læve, Lactuca illa [ut doctiss. Iuuenis Iohan. Bauh. nos monuit] silu. Anguillæ, cuius meminit Galenus.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Sonchus alter folio profundis laciniis linuato, hederaceo.

Tabern. Icon. & Hist. Sonchi genus II. Sonchus siluaticus.

Cæsalp. Herba quædam in ruderibus nascens, à Plinio inter Lactucas silvestres Hieracia vocatur.

Camer. hort. Sonchus luteus varius.

C. Bauh. Phyt. Sonchus siue lævis alter, vel Lactuca murorum lutea. Item: Lactuca id. siue Lactucæ species silu. Gesnero. Et Frater has quidem se iunxit, ego autem (quia Gesnerus non separat, & quia ignoro quæ sit) ambas iungo. Eidem apud Matthioli. Sonchus lævis alter, vel Lactuca murorum lutea: Intybus silvestris 3. Tragi. Sonchus lævis altera Mat. Cast. & Lugdunensis. Intybus 3. Tragi, cuius nos descriptionem posuimus sub Soncho non laciniato, folio est prælongo, angusto, flore luteo & multiplici ac maiori duobus suis Intybis silvestribus, siue Sonchus. Hæc non conveniunt Lactucæ muraræ: proponit Frater iconem ex Tabern. quæ probanda pro Lactuca muraria, sed quæ nihil mihi videtur habere commune cum Soncho lævi altera Matthioli: nec cum vlla iconum à Matthiolo propositarum pro Soncho.

Lactuca murorum silu. provenit Montbelgardi in muris Castelli, & silvis umbrosis, florens Iulio. Basileæ observavi itinere Dornacum in vassersfall ad duos tresve cubitos excrecentem Augusto cum semine maturo, ceu etiam prope portam lapideam dictam. Frater C. Bauh. qui nescio quâ occasione Chondrillam 2. Dioscoridis nominat, Genevæ in rectis, & parietibus mense Decembri virentem conspexit.

LACTUCÆ MVRORVM AFFINIS Sonchus Dendroides Dalechampi.

Radicem habet crassam, nigricantem, ex qua radicle multe prodeunt: caules bicubitales.

Sonchus
arborescens
Endiuia
silu.

Endiuia
spinosa

Lactuca
Diosc.

Nomina
linguatum

Seriola

Pherumbrum

Locus &
tempus

Vires &
usus

Descriptio

Synon.

Lact. silu.
Anguillæ
Sonchus

L. Bauh.

Locus &
tempus

les, atque interdum etiores, teretes, foliis stipatis sinuosis, seu per oras ex intervallo infectis, latis, Quercui haud absimilibus, lacte disfluentibus. Rami in caulibus nulli sunt, sed ab imo scapo ad summum usque non procul à singulorum foliorum exortu, singuli nascuntur petioli, tenuis, qui multos flores sustinent luteos, quales sunt aliorum Sonchorum, aut Lactucæ, qui tandem in pappos alveunt.

Sonchus dendroides Dalechampi
synonyma
Dist.

Hic Sonchus Dendroides, i.e. arborescens Dalechampi, est tertium illud Sonchi genus, inquit H. Lugdunensis, cuius capite de Soncho tertio loco Dioscorides meminit. Sed hic scrupulus ac dubitationem rei herbariarum studiosis præsens descriptio Dalechampi inicit, cum dixerit, ramis nullis, sed foliis raris & floribus huius Sonchi caules ornat. Dioscoridis autem Sonchus tertius, iuc arborescens [*ἀνδροειδής*] latis constet foliis, quæ quidem caulem in ramos exeuntem distinguant, cum quidem in Dioscor. latino legatur. Sed hunc scrupulum ex Græco codice ita eximendum esse iudicat, *ὁ γὰρ ὁ ἀνδροειδής, ὁ δὲ τριττός, ὁ δὲ τελευταῖος, ὁ δὲ τριττός, ὁ δὲ τελευταῖος, ὁ δὲ τριττός, ὁ δὲ τελευταῖος.* Quæ sic fideliter convertisset Ruellius. Alter Sonchus, etiam tener est & arborecens, & latifolius: sed caulem folia distinguunt.

Sonchus hic Dalechampi habet multa communia cum Lactuca murorum: verum tamen si descriptio & icō Dalechampi vera est, necesse est differunt. Utinam Dalechampi particularem locum, ubi repererit, annotasset: posset ibi perquiri. Lactucam sane mutariam sæpius observavi in saxosis montium cliuis, ubi Dalechampi suam

Sonchum dendroidem provenire scribit.

C. Bauhin. Phyt. Sonchus 10. siue arborecens, Dendroides Dal. multum cum Lactuca murorum conueniens.

LACTUCA SILVATICA PURPUREA.

Lactuca silvatica purpurea, caule est bicubitali & altiore, glabro, tereti, medullâ alba pleno: quem folia ex intervallis alternatim vestiunt, sinuata, glabra, tenella, subtus glauca, supra viridia, nullo aut brevissimo pediculo donata, angusto principio, mucroneque, inferiora quidem, uncias duas circiter lata, palmum longa, superiora vix unciam sæpe lata, & quæ cauli adheret interdum latiora quàm inferiora, pinatæque, sapore nullo eccellente: caulis in ramis aliquot dividitur, atque hi rursus in alios minores, qui flores sustinent Lactucæ pares, & quinque foliolis contextos, sed colore hilar

purpurascens, qui in pappum faciliuntur, semine oblongo, gracili: radix subest pollicaris, à qua multæ longissimæ dependent fibræ, sapore grato, dulci, cum leuisculo amarore prædita.

Gesl. apud Cordum lib. 2. hist. cap. 61. (ubi pulchra figura) dicitur Lactuca silvatica purpureis floribus. De hort. Lactuca silu. in siluis nascens, purpureo flore, Sonchus Dioscor. forrè. Item: Sonch. arborecens Dioscor. puniceo flore.

Clus. Pannon. & Hist. post. Sonchus 2. Sonchus laevis purpureo flore.

Tabern. Icon. Libanotis Theophrast. sterilis. Sonchus silvaticus, wald larrich. Hist. wald larrich, an Libanor. Theophr. seu Rosmarinum infrugiferum: item Hist. sine iconc, Sonchi 10. genus.

Camer. hort. Sonchus cæruleo flore. Trago,

Lactuca flore purpureo, larrich m. brassicor blumlein Thal. Lact. silvestris iped, d. d. d.

Casp. Bauh. Phyt. Lact. 9. siue montana purpureo cærulea maior. Huius generis, inquit, est Sonchus 2. Clusii, quem eubitali dicit, nostra verò Lactuca ad tres & etiam ad quatuor cubitos exurgit: quare hæc Clusii Lactuca



montana purpureo cærulea minor dici poterit.

Gerard. Anglo, Erysimum silvestre. Pro Erysimino Gerard. habet iconem Tabernamontani, cui titulum fecit Libanotis, de qua antea: sed male: nihil habet commune cum Erysimino.

Lactuca siluat. flore purpureo observavi Mœbelgardii in monte Eßeben: aliquoties seminavi & plantaui in orto Ill. E. C. Abundat circa Mafnister & Rotenburg. Gencuz mihi visa in montibus Saleue & Thuri, & plantata in hortis florens Iulio, ceu & in montib. circa Tigurum. Basilea in montibus circa Dornachum, wasserfall & Mouters, florens Augusto & Septembri. D. Doldius misit Norimbergæ nomine Lactucæ silu. Erythranthem Thalii. Monte quodam prope Strolbergam siugum hircynicum quod vocat, die parishöhexopiosa est. Vidit Thal. eandem crebram montes Semanz siluæ in principatu Heptenbergensi habere.

Synonyma
Lact. silu.
purpureo flore.

Sonch.
purp. flore.

Libanor.
Theophr.
sterilis.

Eryth. Ger.
rardi

Locus
tempus

SONCHUS CÆRULEUS LATIFOLIUS.

Astutgie Sonchus cæruleus latifolius caule bicubitali & altiore, crassiusculo: folia laciniata, in triquetram laciniam Hederæ foliæ emulam, in ambitu serratam desinunt: summus caulis hirsutus, thyrsum gestat florum, Sonchi similitum, sed cæruleo colore nitentium, in pappos celeriter faciliuntur: hunc dedit frater C. Bauh. siccup ex Alsap. & clarum. Eundem autem

Descriptio

Descriptio



gidos, hirsutos, variegatos, in ramis diu-
ricatos: folia
Dentis leo-
nis, profunda
incisa, alias in-
tegra, aut
quam leuissi-
me dissecta,
crispa, pilosa:
flores successi-
ue emicant ex
foliorum in-
premporū alis
& caulū late-
ribus, Dēaleo-
nis, sed colore
caeruleo, in-
terdum albo:
tota planta a-

maria insigniter deprehenditur: radix, caules, fo-
lia, flores: perculaturam manus, & magis euadit:
in spontaneo interdum, caulis monstro-
sam acquirit altitudinem.

Cichorium
var. gene-
rale

Ellenquit Marc. Vargilius, Cichorion pa-
regina Græcis vox, quæ omnia Inty-
borum genera simul indicat. Est ab aliquibus
ad amarum Intybum contracta fuerit. Nec quic-
quam videtur in antiquis scriptoribus circa con-
generis plantæ huius appellationes certum.
Accedit ex eo facile est colligere, nullam in his,
nec Græcis, nec Latinis, certam perpetuamque
appellationem esse: sed in Græcis Cichorion
nunc agreste, nunc latuum Intybum indicare:
Picridem semper agreste: quemadmodum Se-
rim plerumque satium. In Latinis Intybum
modo satium, modo agreste: Ambubeiam au-
tem agreste semper. Nec fore antiquos aucto-
res legentibus aliquid vilius, quam precedente
rei coniecturâ, contra quam in cæcis sit, non
ex vocibus res, sed ex rebus voces intellexisse.
Solutus Celsus lib. 2. cap. 29. de utroque genere a-
gens, ad certas voces in medicina rem contra-
xisse videtur: satiumque Intybum, siluestre
Ambubeiam appellasse. Censetque Marcellus,
quoniam graui periculo in medicina hæc va-
riantur, satium in Græcis Serim, in Latinis In-
tybum. A greste in Græcis Picrida aut Cicho-
rium in Latinis Ambubeiam semper appellari:
ut certa nominum ratio certam legentibus rem
indicaret, nisi in medicæ materię nomenclatura
audacior videri aliquibus timeret.

Synon.

Luminare maius vocat Endiuia alteram &
Cichoream, & Endiuia magis amaram Auicenna:
Intubum quorundam, aliorum Solsequium,
Sponsam Solis, Intubum erraticum Plinii, Ro-
strum porcinum: videtur etiam nominare Sca-
riolam agrestem & Bartifescere.

Cronenburg. in syr. de succo Endiuia Serim
sive Intubum erraticam, vel silv. Picridem Atil,
& Cichorion Celsi, Latinorum quorundam Am-
bubeiam & Ambubeiam, offic. Cichoream no-
minat, dicitque Tragum lib. 1. cap. 91. in sex diffe-
rentias hanc plantam digessisse, ubi postremam
iure satiam asserat, siquidem in Hollandia &
alibi, ut retur, omnes pharmacopoli in hortis
eandem diligenter curent, biemis patientem: folio-
rum lupiubus lanugine molli vestitis. Sed errat
Tragus non loquitur de Cichorea culta, sed In-
tubo satio, & Cichorea culta differant, de qua
verba facit Cronenburgius. Tragus loco ci-

tato dicit Erraticum Cichorium caeruleo flore,
Cichorea sive caerulea in quo genere, tam-
en tamen, inueniuntur plantæ, quæ partim
candidum, partim roseum gerant florem) est
herba solaris, quæ Varroni Solsequium, Helio-
tropium, & Egyptiis Agon dicitur: Cichorea
satia & erratica (hanc pingit solo Cichorea
nomine: pro illa Intybum exhibet satium, per-
tinent ad caput Dioscoridis de Seride, potestque
ferri, ut apud Theoph. lib. 7. cap. 7. & in Intyba
& Porcellia vocentur.

Recedit a Trago Cordus in Diosc. lib. 4. cap.
19. ita scribens: negware herba dicta Germa-
nia, vulgo creditur esse Heliotropium, sed fal-
so, cum sit Cichorium, i.e. Intybum agreste:
erroris causam protulit Plinius, qui caeruleum
florem Heliotropio tribuit. Idem lib. 1. cap. 150.
ait. Intybum siluestre, quod Cichorium & Picris
ob amaritudinem, vocatur, & Amarago à Gara-
th. Theoph. interpretatur, in pharmacopoliis
Cichorea nominatur: flores habet caeruleos, qui
serè semper Solem versus inclinantur, vnde e-
tiam à quibusdam Solsequium sive Heliotro-
pium appellatur, quamuis Heliotropium diuersa
sit ab Intybo sive Cichorio, & suis generis, herba.
Describit hanc Cord. hist. sua lib. 2. c. 66. de Cicho-
rio sive Agresti Intybo cui appositus figura Tra-
gi Gelsnerus, cui de hort. etiam Intybum agre-
ste dicitur: In cat. pl. Ambubeia Intybus agrestis
& erraticus, Seris & Picris.

Subscribit Cordo Amarus, qui hanc lib. 2. c.
116. titulo de Endiuia (plures enim dicto lo-
co ac diuersos titulos habet,) intelligit, ubi gra-
ce dicitur ἀγρία, ὑπόγειον, & ὑπὸ γῆς vocatur, latine
Cichorium, Intubum agreste, & Ambubeia. Is au-
tem pro Seride siluestri, Intybū satium exhibet.

Brunfels. com. 3. Rhapsod. 11. Solsequium Ci-
chorium facit, ac ex Intyborum genere esse pro-
nunciat, quam bene aurem Solsequium faciat
etiam ex Fuchsio patet. Rudissimus, in-
quit, error quorundam, qui hanc [Intubum
silv. sive Cichorium inscribit] Heliotropium ef-
se contendunt: cum tamen primum folia repu-
gnent, quæ non sunt Oeymo similia, neque can-
dida, sed nigricantia magis: deinde non (semper)
candidum, sed magna ex parte caeruleum florem
habet. Radix denique eius, ut Heliotropii, non
inutilis, sed experientia teste, mirè efficax. Qui-
bus omnibus accedit manifesta cum aliis satius
Intubis similitudo, quæ una satis docet Intubum
esse siluestre: & non Heliotropium: ut quoru-
dam temeritatem non satis mirari queam, qui
contra apertam veritatem, & omnium Medico-
rum consensum, secus pronunciare audent. Si-
quidem species est erratici Intybi, à Plin. lib. 20.
cap. 8. memorati, quæ Græcis ὑπόγειον dicitur
& ὑπὸ γῆς, Lat. Ambubeia, vulgo herb. & offic. Cicho-
rea; silvestris (addit Dod. gall. qui eam hoc ti-
tulo pingit: Intubum silv. Cichorium, facitque
Cichorea & Seridem tertiam) gall. Cichorée sauvage,
Germanild negware/ Belg wilde Licoreye. Ci-
chorium & Intybum (inquit Dod. lat. in fol. eius-
dem generis sunt, Sed Intybum satium, Cicho-
rium verò silvestre. Et hoc duplex est: Vnum la-
tioris folii, Hedypnois Plinii: alterum quod a-
marius est, ac ὑπόγειον Dioscoridi dicitur; Lat. In-
tubum silvestre, Intubum agreste, Intubum er-
raticum, & Chicorion; offic. Cichorea, Germ.
negware [quasi viarum custos, vel negwareis
(quod peregrinis quasi viam indicare videtur,
Fuch.) hindleiff/ & Sennensirbel, Cordo
Belg.

Belg. Cicoreye : Gall. Cichorée, It. Cichoren, Tor-
nasole, Lob. Girasole, Radicula, Radichio, &
Radechio, Tabern. Hisp. Almorces & Cichoria :
Angl. Cycorye : Boh. Střerbař & Ezafalka : his
addit Nomenclator Pannon. Intybum ulla. cr-
tulo flore hungaricè Napra nező siu vocari : Po-
lon. Dodrosyf, Tabern. Arab. Dumbabe.

Matthioli. in Dioscor. lib. 2. cap. 129. duas figuras ponit, quarum alteri titulus est, Inrybus siluestris, siue Cichorium: alteri Cichorium satium. Seris satina, dicit is, in Italia in hortis colitur, folio erraticæ ampliore: in Seridum siluestrium genere ea etiam Seriola dici posset, quæ passim in hortis colitur: Plinio Cichorium ipsū propriè Ambugia, vel Ambubeia dicitur. Idē eodem capite, Chondrilla titulo Cichorium proponit, vt & in comm. cum mag. fig. lat. & ital. ac præterea aliam iconem Inrybi minoris, ac aliam Cichorii domestici, & aliam Cichorii siluestris. In Hist. germ. similes figuras priorum commentariorum habet: vnam quidem sub hoc titulo: Garten wegwarr / wilder Scariol: Intubus erraticus, siue Cichorium hortense: Alteram sub hoc: Feld wegwarr: Intubus erraticus, siue Cichorium siluestre: dicit etiam vocari Sonnenwirbel/ Heliotropium.

Nos Cichorii iconem vnam proponimus tantum, & hanc ex Fuchsianis, quæ iam erat parata, videreturque sufficere pro Cichorio silu. & satiuo. non enim ita mutatur culturâ, quin similitudinem magnam retineat cum spontaneo : nobis idem non multum attridet icon Matthioli Cichorii satiuæ siue domestici : placeret potius pro eo planta, quæ proponitur in comm. cum mag. fig. pro Intubo minore. Displicet quiddam Chondrilla suam i. confundat cum Cichorio, quod satis patet ex iconè, quam postea in Hist. germ. reiecit non subrogatâ meliore.

Corn. in Dioscor. Siluestris & erraticus Intubus dicitur. Lonic. mild wegwurz, Cichorium agreste. Lacunæ, Turn. (cui & Intubum filu. r.) Cord. hist. Gefn. cat. pl. Eur. Cordo. (cui & Inrybū filu.) Cichorium.

Cichoria nostra intelligit Anguill. per Dioscoridis Serides duas primas: vnam, quæ Picris & Cichorium vocatur. Alteram latiore: ambas siluestres: primam spontè nasci tradit, quæ si colatur, facere folia latiora, & in Italia dici *li Radichi*. Idem cap. de Chondrilla ait, Taraxacum idem esse cum Cichorea: id patere ex Auicenna.

Lob. Ad. Seris filu. Picris, Cichorium. Item :
Cichorium sativum caeruleum, Picris eadem.
Obs. Seris filu. Ambubeia. Item : Seris sativa. I-
con. Plant. Seris, Picris, filu. Cichorium. Item :
Cichorium sat. caeruleum.

Tabern. Icon. & Hist. Cichorium. Item: Cichorium sativum. Et: Cichorii sativi altera icon. Et tandem: Cichorium album sativum. Cichorium (inquit is in Hist.) vocatur in genere à Dioscoride, Theophrast. Gal. & aliis, *μαγισ*, *μαχάριον*, *μαχάριον ἀγριον*, *αίριον ἀγριον*, Const. *τρώχιστος*: Plinio Intubum erraticum, Chreston, Ambugia, & lib. 2. de remed. Citroximum, Marc. Emp. Intybus rusticus, Gazà Amarago & Ampulla: Nic. Myrso Heliotropium ceruleum, Celso Ambubeia, Guil. Placentino Rostrum porcinum, Petro Cresc. Sponsa Solis, aliis Antica Solis, Solsequiū ceruleum, Endivia filu. Seris erratica, Serap. lib. de temp. simpl. cap. 143. Taraxacon: Aui-cennà Taralcun, aliis Arab. Taraxaten, Tatasequi, Tatsequi, Taraxacoron, Alteraxacon, quæ pœnina Arabes à verbo græco Troximum mu-

tuarunt : dicitur aliis etiam à Sreph. glossogra-
pho Haliabhar, & à Serap. Hundede, Humdede
& Suasben, Dundede & Dumdede, quæ nomina
orta sunt ex græca appellatione Intybi, quæ qui-
dem tam horrendæ quàm siluestre Cichoriû de-
notant. Arabes enim siluestre Cichoriû Tata-
xacon & Altaraxacon solum nominant. Cicho-
rium flore est cæruleo : qui secundum Solem co-
uertitur, qui mane oriente Sole se paulatim aper-
it versus Orientem, circa Meridiem planè aper-
tus, sursum Solem respicit : postea se conuertit
ad occidentem. & occidente Sole omnino oc-
cluditur, & clausus noctu manet donec oriatur
Sol. Et licet cælum nubibus sit obductum, attamen
possunt ex hoc flore diei partes observari. Vt e-
nim nubes Solis cursum impedire nequeunt, sed
lumen solum terræ tollunt : ita privatio radiorû
Solis quidem impedit quominus flos recludatur,
sed cursum eius herbæ minime retardant, quod
inter naturæ miracula reponendum, & hinc Sol-
stinalis herba meritiò nuncupatur. Secundum
Cichorium est flore albo. Tertium est pulchro
flore, colore rubello, scisfarb, Cichorium pur-
pureum. Quartum est Cichorium cultum vulga-
ri simile, nisi quod culturâ maius & cibis com-
modius, flore cæruleo : Cichorium sativum zam-
wegwart / Cichorii sativi altera icon. Quintum
Cichorium album sativum. *Compiler Tabern.*
absque necessitate multiplicat figuras, quatuor
non erat opus: color enim nullam facit diferen-
tiam, quæ figura exprimi queat : Verum quid-
est culturâ nonnihil variari Cich. erraticum.

Camer. apud Matth. germ. Cichorium latum,
vel hortense. Item : Intubus silvestris.

Hist. Lugd. Intubum filu. angustifolium. Et:
Hypochaeris Dalechampii. Dux figuræ apud M.
& duæ descriptiones vnius plantæ.

Et hoc à Casp. Bauh. etiam annotatum. Sed is non animadvertit Historiam insuper aliam figuram proponere, cui nomen fecit, Intubum lilu. latifolium, Cichorium latifol. Matth. Seris fariva Lobelii. Huius quidem folia sunt integra, qualem differentiam in descriptione nostra tradidimus.

Gerardo Anglo Hieracium latifolium quoad figuram, non aurem descriptionem. Is figuram Cichorei, siue Intubi erratici Tabernamontani male ponit pro Hieracio. Item: Cichorium sativum, Garden Succorie. 2. Cich. sat. latifol. Broade garden Succorie. Item postea: Cich. silvestre, milde Succorie. Gerardus ex Tabern. Cichorii & sativi altera icone facit Cich. latifolium, quasi alia sit species: Cichorii sativi albi iconem Tabern. ponit pro Cichorio silvestri.

C. Bauhin. Phyt. Cichorium 4. siue fatiatum &
Cichorea fatiua Tragi lib. 1. cap. 91. flore albo &
cæruleo, quare huius tres icones apud Tabern.
Item: Cich. 5. siue officinarum: Seris, Picris
Diosc. Cichorea Theophrast. Intybum erraticum
Plinii. Eidem apud Matthioli. Cichorium do-
mesticum flore cæruleo & albo. Item: Cichoriū
silu. offic. seu Picris. Ego cum fratre Cichorium
fat. non separo ab erratico, qui culturā tantū
mutat nonnihil: si non colatur, quod fuit fatiū,
iterum fit erraticum. Tragi autem Cichoream
fatiuam huc non refert, sed ad Intybum, siue
Endiuifam fatiuam, quod demonstrat etiam li-
gura.

Thal. Intyous filu. seu Cichorium filu. flore ex-
ruleo, duplicis differentiz. Altera enim constat
folio prorsus integro: Altera in lacinias disrup-
to. Istius speciei, rarius tamen, aliquando flo-

Handball
Handball
Swiss.
Dance.
Dance

Take your
your seat

Verbs: *Verbs*

Complete
Feb. 1962

Hieracium
otifol Er-
or Ceras.

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Non de-
chiamare.

March 1971

Error

*Teris. Ho-
plex filu.
Angust.*

Chresier.
Ambugia.
Circumstiti
Iurk ruffi
cus. am
gulla
amica sola

Taxation

HISTORIAE PLANTARVM

re candido se se offert, ut ad Hardyniam circa Wernigerodam.

Schivvench. Cichorium silu. albo flore, Cichorium album.

Locus. Cichorium siluestre, inquit Dodonaeus, non modo in hortis seratur, sed & per vniuersam Germaniam, tum & alibi secus vias ac locis incultis exit: ac potissimum folia habens profundioribus insuris laciniata; quod & reliquis amari-
Tempus.

us est. Iulio & Augusto mensibus praecipue cum floribus reperitur: semen interea perficitur. Cichorium obseruari Mompelii florens Iunio; Basileae, quae iter Moutets Octobri inter portam cineream & lapideam intra & extra urbem, & ad ripam fluminis Busech & alibi. Vidi Lugduni & Patavii, quibus in locis copiosus v-
Vit.

lus radicum elixatum in acetiariis mense Ianuario & Febuario. Tanta est Cichorii similitudo cum Dente Leonis Veris principio, ut difficile sit discernere has plantas. Cichorium flore albo cultum Montbelgardii habeo in orto E. C. ex semine Sturgardia missa, seipsum ex semine deciduo multum propagans, & non cultum ab erratico non differens, licet in loco culto proueniat.

Naturae miracula. Flos Solsequii, ut Brunfelsi. annotat, seu Cichorii, iniectus fornicarum cumulo in rubrum vertitur colorem, idque magno naturae miraculo.

**Vires & v-
lus.** De omni Seride Dioscorides haec prodidit. Refrigerat utraque & adstringit, stomacho utilissima: aluum sistit cocta, si cum aceto assumatur. Siluestres stomacho meliores: quandoquidem aestuantem ipsum, & quem imbecillitas vexat, cibo leniunt. Cardiacis per se aut cum polenta, vtiliter illinuntur podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt: herba cum radice illita, percussis à Scorpione subuenit, igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerussa & aceto, valet ad illitus eorum, quae refrigerationem desiderant.

**Syluestres
Cardiacis
Herba.** De Seride eadem fere Plinius. Utraque stomacho utilissima, praecipue quem humor vexat. Cum aceto in cibo refrigerant, vel illitae, discutiantur vel alios morbos quam stomachi. Cum polenta siluestrium radices stomachi causa sordentur, & cardiacis illinuntur super mammam sinistram, ex aceto. Omnes ex & podagris viles, & sanguinem reicientibus. Item quibus genitura fluit: alterno dierum potu. At de Intubis & Cichorio. Intubi quoque non extra remedia sunt. Succus eorum cum rosaceo & aceto capitis dolores lenit. Idem cum vino potus iocinoribus, & vesicis, & epiphoris imponitur. Et mox: Cichorium refrigerat in cibo sumptum: & illitum, collectiones, succusque decocti ventrem soluit: iocinoti, & renibus, & stomacho prodest: Et paullo post. Quod quidem propter singularem salubritatem aliqui Chreston appellat, alii Pancration. Et siluestre genus, alii Hedy-
Succus.

pnoida vocant latioris folii. Stomachum dissol-
**Ex Plinio
de Seride.** lurum adstringit cocta, crudaque sistit aluum. Et dysentericis prodest, magis cum Lente. Rupra & conuulsa utroque genere iuuantur. Item quibus genitura valetudinis morbo effluat. Ita Plinius qui & nomina & facultatem clare distinguit.

Temper. Subamarum est olus, inquit Galenus, & magis quod aggreffe est, quod ob id ipsum mneida, h. e. amarum quidam nuncupant. Est autem sic-
**Ex Plinio
de Seride.** ca frigidaque temperamentura, vtrumque pri-

mo excessu. Potro domestica Seris magis etiam, quam agrestis refrigerat, sed & humiditatis multae admistio siccitatem extinguit: verum utraque adstringens qualitas est particeps. Et alio in loco. Cichoria & Seris cibarii generis sunt: nam apud nos rustici haec edunt & crudae & coctae. Vtuntur etiam iis Erasistratus abunde in affectionum circa aluum curatione. Facultas horum olerum suffrigida est, & subamara, ac modice adstringens. Et propter has facultates optima sunt pharmaca calidis temperaturis hepatis: nam praeterquam quod moderate refrigerant, robur etiam visceri addunt per adstringentem facultatem. Praeterea commissuras osculorum venarum in sima visceris parte, ac eas quae in gibba sunt, extergens. Neque vero frigidas intemperies magnopere laedunt, quemadmodum quae frigidam humiditatem abique adstrictione aut amaritudine habent, facere solent.

Cichorii decoquitur herba & radix, apud Tragus, vino aut aqua, & calidum bibitur id decoctum, aduersus obstructions iecoris, lienis, sed in principio hydropis, & malo corporis habitu, [Graecis *αγγύρια* dicitur] hoc remedio uti conuenit: ad eadem valet aqua distillata, imprimis verò aestuanti stomacho, & ardentibus febribus, imbecillitatique cordis utilis est. Folia Cichorii caerulei abcessibus, tumoribus & inflammationibus, nec non pudendorum pustulis imposita, dolorem mitigant, ardorem extinguunt, calidam podagras commodissima. Verum aduersus iam commemoratas affectiones aqua distillata maioris est momenti, si ea in linteolis lineis excepta affectis partibus imponatur, maxime verò hoc pacto usurpata anthraci auxiliatur. Aquae e floribus caeruleis distillata, inflammationibus & caliginis oculorum imposita, potenter remedium adfert.

Coniunctum quoque de omni Seridis specie Marth. agit. Intybus, ait, & Cichorium selectissimum praebent medicamen immodice calenti hepati, quocunque tandem modo usurpata, siue foliis recentibus crudisque aut coctis comestis, siue succo, aqua stillatitia, aut decocto hausto, siue, siccorum foliorum puluere assumpto: modice enim refrigerant & adstringunt, robur & tonum iecinoris conseruant, eiusque venulas obstructas expediunt, idque amaroris causa: tota substantia hepati familiaria sunt, non tantum in calidis eius affectibus, verum etiam frigidis ex vino albo cum Petroselino, aliisque similibus calidis plantis diureticis decocta & pota: folia cocta ex aceto comesta gonorrhoeam reprimunt. Decoctum Cichorii lictericorum sordos colores delet bibitum: semen confractum, & vino haustum ante insultum febrilem, cum mitiorem reddit; & tandem percurat. Ego huius solius plantae ex aqua decoctum egenis saepe propinaui in febribus vtiliter: efficacius erit remedium, si Cichorii cum floribus sumas M. j & minutim concisum ex vini albi generosi lib. i. decoquantur ad medias, bibatur colamen mane calidum, quatuor aut quinque horarum ieiunio sequente: eodem modo diebus aliquot iteretur. Quibus natura calidius hepar, dolores capitis & cathartos generat, vinum aqua stillatitia diluunt: radix eiusdem saccharo, condita, hepatis calorem temperat. Aqua Cichorei cum linteis imposita singulare creditur ad exanthemata pestifera remedium. Foliorum eius succus cum oleo rosato & aceto rosaceo cephalalgiam applicatus lenit. Scabiem tollunt & cu-
**Ardens fe-
bris.**
**Miscell.
Tumores.**
Arthrit.

em emaculant, ex contraria Cichorii radice ossu-
le cum aqua rosacea.

Cichorea appositā sedat Bayrus dolorem ca-
pitis, & astuaciones à Sole factas. Flores Cicho-
rii ad calculum destillari meminit Gesnerus. Ioā.
de Monte exper. commendat ad oculorum
calorem & ruborem aquam stillatitiam: de
qua vide plura cap. de Linaria lib. 29. Idem te-
statur radices coctas cum carne & esus certum
remedium esse contra omnes fibras. Radix Ci-
chorii silu. flore albo, si certo tempore effodia-
tur ab obstetricibus peritis, creditur partum ac-
celerare substrata parturientibus, ut scribit
Schvvenckfeldius. Plura de viribus qui scire
volent legat Matthiol. germ. & historiam Taber-
namontani.

INTYBUM SATIVUM TRIPLEX.

Intyb. sativ. latifolium.



Intyb. sativ. angustifolium.

Corn. Diosc. Intubum sativum lara folia ha-
Tem. II

A Estiua
est plan-
ta, hiemis a-
pud nos haud
facile patiens,
radicibus fi-
brosis, lacte
pregnantibus:
folia per ter-
ram sparsa,
antequā cau-
leseat, longa,
lata, nonnun-
quam angu-
sta, Lactucæ
foliis similia,
in abita sub-
inde crenata,
subamara, quæ
hortulanorū
māgonio cri-
spa aliquando
conspiciuntur,
& alba: caulis
cubitalis &
sesquicubita-
lis, lævis, stri-
atus, inanis,
multis ramis
brachiatus,
tortuosus, vul-
nere lac fun-
dit: flores ex
foliorū (quæ in
caule hedera-
cea sunt, mi-
nora) alis e-
micant cæru-
lei, Cichoreæ
silvestris: se-
men quoque
cōsmile. Hu-
ius species
provenit no-
bis Italo &
semine, folio
laciniato,
quod differt
à Cichorio
culto.

bens, corruptā voce Endibia vocatum. Et alterū
angustis foliis, Scariola appellatum. Satiū In-
tubus, quem priuatim Plinio testis lib. 20. cap. 8.
Serin nominant Veteres, in duas à Fuchsis di-
strahitur species. Quatum vnam latiore folio

Intyb. sativ. crispum.



constare scri-
bit, ac Lactu-
cæ similiorem
facit, Intu-
būque lat-
latifol. siue
Endiviam in
hist. & icon.
inscribit, quā
ait in omni-
bus pro vera
Endivia deb-
eri usurpari of-
ficinis. Nam
quā hodie sub
hac voce vi-
tur non esse
verā Endiviā,
sed Lactucam
silu., ut suo
dictum loco.
Alteram, quā
Intubum sati-
uum angustif-
olium, siue

Scariolam inscribit, angustiora habere folia, &
subamaram esse tradit, ac diminutivum à Seris no-
mine Seriolam dici testatur. Nos Fuchsi binas
admittimus icones, non enim diuersam ab Intu-
bo crispo statuimus, licet non parua, ratione cul-
turæ, in his reperitur varietas. Sufficisset quidē
vna ex Fuchsiānis, sed quia iam erant sculptæ,
eas Lectorum oculis nobis subiicere placuit.

Exhibet eas quoque & Amarus, ac quidem sub
Seride silvestri, Intubum sativum latifolium pro-
ponit: sub Seride autem sativa, eiusdem Fuchsi
Intubum sativum angustifolium. Nomina autem
quæ Seridi suæ silvestri adscribit, ei non conue-
niunt, sed Cichorio, de qua re antè. Amarus au-
tem de suis Seridibus à se icone exhibitis loqui-
tur, quando ait. Domestica verò Endivia duplex
est, altera latifolia, hortis familiarissima, & que
terrā obruta, alba reddita, hibernis mensis, oxe-
lzo & sale, cruda, & cocta anteponeitur, quanquā
vniuersa Hispania, sic paratam eam nunquam,
quod sciam, viderit, quam aliqui Endiviam, alii
verò Cichoriam vocant. Altera verò arctioribus
foliis Endivia, à Seri Seriola, post verò Scariola
nuncupata est. Ceterum ab Intybo, siue Intyba
corruptè Endivia deducta est.

Hæc est illa Cichorea sativa Tragi, Seris sati-
ua angustifolia Dioscoridis, quo nomine & In-
tybus vocari meruit, potestque heri ut apud Theo-
phrast. lib. 7. cap. 7. & 9. Intyba & Porcellia vo-
ceretur. Cordi in Dioscor. Intybum sativum ab I-
talis Endivia sativa vocatum. Cordi in hist.
(cui figura Tragi addita) Cithor. sativum ab I-
talis Endivia hortensis, seu simplicitè Endivia
nuncupata. Matthiol. in Dioscor. Intybus hor-
tensis. Et: Intybus hortensis alter. In comm.
cum mag. fig. Lat. & It. Intubus maior, & Intubus
minor. Endivia maggiore & Endivia minore. In-
tubus crispa. Et quoque tertium Intybi hortensis
genus, amplo, foliosoque cespite proveniens, fo-
liis magnis, sed ubique in ambitu crispis ac sim-
briatis, caule cæteris maiore, crassiore, tenerio-

reque, in acetariis expetitur reliqua cum extre-
tis paria sunt. In Hist. germ. Intubus sativus ma-
ior, seu Endivia, Endiuien. 2. Intub. sativ. minor
Garten Scariel/ vera sativa Scariola. 3. Endivia
crispa, Große Frause Endiuien.

Matthiolus ponit [Fuchsum imitatus] duas ico-
nes valde similes pro diversis plantis, eiusdem e-
xistimarim, nec demonstrat, quia in re differat In-
tubus alter à Cichorio sativo: cuius icon etiam si-
milis: in comm. lat. & ital. cum mag. fig. pro Inty-
bo siue Endivia minore ponit diversam iconem:
folia enim laciniata appingit, ea placet pro Ci-
chorio.

Dod. gall. Intubum sativum latifolium, Cicho-
rea domestica 1. Endivia aliorum, offic. Scariola.
Intub. sat. angustifolium, Cich. sat. & hortense of-
fic. Cichorea domestica. Lat. in fol. Intub. sativum,
sive prior, sive hirsutab Avic. ac Serap. Taraxa-
con ab Italis Scariola nuncupatur, quam appella-
tionem plerumque offic. servant, quæ & Serio-
lam ipsam quasi Seridem haud perperam vocitant,
sed minus rectè Seriolam per duplex triuam Ser-
iola Lactuca silvestris est. Dodon. non amplius
meminit Intybi sativi angustifolii, quod mirum.

Gesn. hort. Intybum (Endivia vulgo) italicum
latifolium, quod ad acetaria hiemis terra obruitur:
Cichorium sativum.

Lob. in Adu. Seris siue Intybum sativum latifo-
lium, Endivia, & Scariola officinis. A Cichorio nō
tantum cultu, sed etiam genericā differētia distat:
nullo enim neglectu, transmutatione, aliōve incom-
modo visa fuit nunquam in silvestrē aut Picrim Ci-
chorium degenerasse, aut hæc ad speciem huius
Seridis promouisse. Et manifesta radicum diffe-
rentia, est enim Cichorii bene habita, carnosa ad-
modum, gratā: Endivæ verò fibrosa, penē nulla,
nulliusque usus in cibis, alicubi tamen in quibus-
dam compositionibus. Lob. Obi & Icon. Plant.
Intybum sativum latifolium, Endivia & Scariola.
Omnia hæc postrema vox est in Ic. Plantin.

Anguill. Seris hortensis 2. Diosc. Endivia nostra
[Italica] alba.

Lonic. Scariola sativ. latifol. Intub. sat. latifol.
Cichorea sat. latifolia.

Tabern. Icon. & Hist. Intybus maior, Große
Endiuien. sive, sive quæ & æquea ximium, Plin-
io & Latinis authoribus Intybum, Intubum, In-
tybus aut Intubus, Intybum sativum aut domesti-
cum, Seris sativa & Cichorium domesticum, Her-
baris Endivia, Endivia maior, End. sativa siue
domestica Romana. Serap. & Arab. Dunbebe,
Dumbebe Humbebe, Hundebe & Endela, Boh.
Serbat / Polon. Volertz & Melertz / in Candia
Endiu. 2. Intybus crispa, Frause Endiuien / Endivia
crispa; Belg. Ebecrolde Endiute: crispitudine fo-
liorum præcedenti tantum differt. 3. Intybus
minor, sive Endiuien: cui nomina græca priori
similia, hodie vocant *seris*, Serium & Seriola.
Herb. Cichorium sat. minus, Seris minor, Endivia
minor, intybum angustifolium, Endiuola, practi-
cis Scariola, Neapoli dicitur *Scarola*: Hisp. *Seraya*
Endida. Primo similis nisi foliis esset longioribus
& amarioribus. 4. Intybus minor flore albo, Ser-
iola alba, & Scariola alba: præcedenti solo flore
albo differt. Monuimus ante plantam solo colore
differentem non mereri propriam figuram.

Camer. ad Matth. germ. Endivia, Intybus sativus
2. Endivia crispa. Große Frause Endiuien. In E-
pit. Intubus maior. Item: Intubus crispa: Camer.
proponit tantum duas icones novas non tres ut
faciebat Matth. quasi una sit superflua.

Gerard. Anglo, Intubus sativa Garde Endi-
ue. 2. Endivia crispa, Curled Endiue. Item: In-
tybum silu. wilde Endiue. 2. Intybum silu. lati-
fol. Medowe Endiue. Gerardus omnia con-
fundit.

Tabern. sativum facit silu. & minus album
sat. silu. latifolium: Tabernamontani icones sunt
plantarum solo colore differentium.

H. Lugd. Intubum sativum latifol. Item: In-
tub. sativum angustifolium Matthioli. Et: In-
tub. sat. angustifol. Dodonæi [hæc duo sunt v-
num:] Item: Intubum crispum.

C. B. Phyt. Endivia 1. siue vulg. latifolia: Seris
domestica latifol. Dioscoridis: Intubum & Seris
hyberna Plinio quæ Theoph. *seris* censetur: ac
cuius etiam meminit Plinius lib. 20. cap. 19. flori-
bus est cæruleis, raro candidis. Endivia 2. siue
crispa. Endivia 3. siue angustifolia, floribus cæ-
ruleis, aliquando albis, cuius causa Tabern. duas
habet figuras. Apud Matth. 1. Intubus maior.
2. Intubus minor. 3. Intub. crispa. Endivia siue In-
tybum sativum, cu ante quoque monuimus,
propter solum & culturam maius & minus effi-
citur: crispa verò transplantatione & mangonio
hortulanorum.

C. Schvvenck. Cichoreum italicum, Cicho-
rea sativa.

Intubum sativum, à nonnullis Endivia, ab Ita-
lis Endivia & Scariola, quam appellationem
plerumque officinæ servant, dictum, à Græcis *si-
ris*, sive *seris* appellatur; à German. quibusdam
Scariol, vulgò Endiuien; Lonic. breyt oder
groß wegweiss oder wegmart; Belg. Endi-
ue / Endiute; Gallic. *Endiue ou Scariole*,
Hispan. *Endivia*, & ut Dodon. ait, *Serrape*; An-
gl. *Endiue* / *white Endiu* / vel *garde Endiue*.
Intybum crispum; Germ. *frause Endiu* / Belg.
Ebecrolde Endiue / Gall. *Endiue crispue*; It. *En-
divia crispa*, Angl. *Curled Endiue*.

Seritur Intybum in hortis, & quod Vere satum
celeriter adolescit, ac ipsa ætate florens semina
profert, ac deinde intercidit. Iulio verò sa-
tum in Hiemem restat, Septembri aut Octobri
terrâ obrutum, colligatis prius foliis, niuis in-
stat candidum redditur, ac deinde mensibus hy-
bernis mensis aliorum acetariorum loco inser-
tur. Id quod Plinius [ait Dod:] haud ignorasse
videtur lib. 20. cap. 8. vbi Seridem duorum gene-
rum esse tradit: nigram æstivam deteriolem; &
hibernam candidiorem. Omnes Intybi siue Se-
rides in Italia vulgaris sunt notitiæ. Lætor mul-
tū exire, inquit Lobelius, è semine Italico, aut cu-
iuspiam regionis meridionalis, vade solent fere-
re quidam Brabantii, Angli, & Germani Olito-
res: simul ac terna, quaternæve foliola erupe-
runt, in solum pinguius latamine multo transmo-
necur, latectioque frustis media onerantur folia,
quæ latius se porrigant luxurientque, quæ indu-
stria amatorem exuit, gratiamque inquit cum hi-
bernis mensis ad acetaria, servatur obruta terrâ,
sineto, stramineque.

Hoc olus ut Hieme tota albis & carnosus foliis
suis in acetaria veniat, sapore gratissimo, cole-
re sit debes, authore Gesnero. Circa finem Ju-
nii serere non admodum angustè: deinde cum ad
duos palmos, seu digitos octo exereuit, tempesta-
te sicca, euellere cautè ita ut manu radicem inse-
ratis, i. e. remotius à capite apprehendas, & simul
corrupta folia si quæ sunt separabis, & rursus
plantabis, ita ut vndiquaque duobus palmis mi-
nimū distent: & folia etiam principio sui non-
nihil

Seris hor-
tensis.

Cichorea
sativa
Intybus
maior

Endivia
Romana.

Gerard. ro-
pre.

H. Lugd.
ow.

Cichorea
italicum

Nomina
linguarum

Locus &
Tempus.

Satio.

Cultura
mangonia

Nil in terram mergantur. Postea initio Hiemis, antequam nix ingruat, cunctas euulsas plantas in cella vinaria seruabis, hoc modo. Soli aliquod spatium ad duos digitos terra recenti operies, huic plantas Intybi impones duabus aut tribus radicibus simul iunctis, donec spatium iterum repleueris: cum rursus eas terra operies, & sic alternis. Aliqui in vili aliquo vale ligneo, cum terra uti dictum est, alternis instrata, seruant in hypogeo. Galli & Itali in hortis terram obruerunt & seruare solent: sed apud nos in hortis & gelatur facile, & pluuiis deinde putrescit.

Basileæ primò vidi in horro præceptoris mei Ex lii Secundi Canonis, tandem habui in horro Genevæ, ubi in transplantatum partim ferebat folia lata, partim dissecta, florebatque Iunio & Iulio, non facile ferebat Hiemem, idcircoque arenam obruebam. Colmaria in Altitia vrbis Medicus D. Iacob. Weckerus nò euellere eam terra, sed inuoluebat stramina & circumaggerabat terrâ. Montbelgardi rariùs serunt, transplantant, ligant & Hieme in arenam reponunt.

Magis quàm agreste refrigerat.

CICHORIVM VERRUCOSVM, SIVE ZACINTHA Hieracii adnumerandum.

Descriptio



Paulùm admodum humo tollit caules, graciles dodrantales, aut etiam cubitales, intus fungosos, ramosos ad quorum latera sessiles adnascuntur rari si. f. ult, alii etiam ramulorum extremis, luteis: quibus in pappos euanescentibus, succedunt pericarpia pulcherrima verticillatim radiata, Lupini

femini magnitudine, in quibus semen copiosum, Lactuca parum non ita compressum. Folia oblonga Dentis Leonis, laciniata, multa per terram sparguntur, in ramis pauca: radix longa, multis fibris donata.

De hoc Cichorio loquitur Matthiol. in post. comm. cum mag. fig. cum ait. Est & alia Cichoracei generis planta, quam quidam Zacyntham vocant, nobis autem ab effectu Cichorium verrucarium appellare licuit. Radice hæc nixitur Rapunçuli figurâ, subnigricanti colore, adnatis circumquaque capillaceis fibris. Folia habet Cichorei, verum paulò asperiora: caules cubitales & quandoque maiores, tenues asperiusculosque, in quorum summitatibus flores oriuntur aurei, cichoraceæ speciei, quibus flaccescentibus semen remanet subnigrum, capituli instar, circumquaque secundum longitudinem secti, Melopeponis modo.

Lob. in Adu. Verruca Condrilla: de qua ait: Condriillam Cichorium illud silvestre, quod Zacyntham, usque peregrinarem affectans, vocat Commentator, certum est oriri in Italia,

neigitur è Zacyntho insula græca eam euocer. Ceterum dum Lobelius hoc in loco Matthiolū carpit, ipse tidendus reprehendendusque videtur, ut cui non fuerit Zacyntha Matthioli nota: perperam enim putat eandem cum Chondrilla priore Clusii, id quod in Obf. scriptum reliquit, dicens. Verrucaria Chondrilla, Chondrilla prior Dioscoridi, Clusii, Zacyntha Matth. It. Cichoria verrucaria, & Mazza di canalliere, & Mazza ferrata, Angli. Gumme Succory.

Clus. Cichorium verrucatum, Zacyntha, de qua ait. Zacyntha Matthioli, seu Mazza di canalliere Italorum nihil commune habet cum Condrilla nostra priore, Dioscoridis legitima (Hedypnoide Montepellulana) ut quidam censent, Zacynthæ, siue Cichorii verrucarii, iconis, quæ apud Matthiolum ineptè expressa est, facie decepti &c. Quæ res adeò me cogit, ut Cichorei verrucarii legitimam iconem proponam, omittam Matthioli falsam.

Gamer. hort. Zacyntha siue Verrucaria Matthioli, Cichorium verrucarium Gesneri:

C. Bauhin. Phyt. Chondrilla 8. siue verrucaria. Cichorium verrucosum satum Montbelgardi anno 1581. prouenit. Hoc acceptum refert Calzolarius Matth. qui plantam ad ipsum misit.

Mira huius plantæ facultas est ad tollendas verrucas. Siquidem scimus (inquit ex Calzolarius Matthiol.) nos nonnullos, quorum manus verrucis admodum numerosis scatebant, sanatos esse, deuoratis in acuario semel tantum huiusce Cichoraceæ plantæ foliis. Idem præstat eius semen, tribus diebus drachmæ pondere deuoratum, dum se cubitum recipiunt verrucosi. Parum certum est, authore Lobelio, semel voratâ, quod ait Commentator, & multi de aliis plurimis fabulantur, delere verrucas: illita verò posse certum, & commune illi est cum quamplurimis, quarum succo exuruntur aut exsiccantur verrucarum radices & appendices, tum calidis ut Tithymalo, tñ frigidis ut Plantagine, Equisetio, intermediis ut Heliotropiis, de quo nomen verrucariæ testatur idem.

CICHORIVM SPINOSVM.



Cichorio spinoso folia indidem plura, ceu ex eodem puncto, alternatim oriuntur, Cichorii angustiora, sinuata, virentia: caulis glaber in ramulos diuiditur rigidiusculos incoditos, multifariam diuaticatos, in duras abeuntes spinas, Tragacathæ aut potius Aspalathi Mōspeliensis imitatione: flores

ad ramorum diuagationes, ipsorumque adeò furculorum cacuminibus impositi, ærulei, denticulatis folijs constantes, duplò triplòque quàm

Cichorei vulgaris, minores: cui semen simile: habemus Cichorium hoc tanta copia caulium pedaliū se diffundens, ut caput penē ambitu zquet.

Descriptio

Belles

Locus

Caules

Floris

Semina

Chondrilla

spinosa

Cich spinosa

jam

Locus

Chicorium spinosum, ait Honor. Bellus, frutex est in maritimis proueniens, siccisque collibus, & arenosis locis: folia ferens Cichoracea, profundē diuisa, crassiora tamen & minora, magisque amara, quā Cichorei vulgaris: caules dodrantes, albos, in orbem diffusos, crebris albis spinis scatentes, erinaceum quemadmodum Echinopoda totā facie representans: flores inter spinas Cichorio similes profert, colore cyaneos: quibus succedunt semina Cichorei: radice firmatur singulari, magnā ut Cichorium. Recens semine natā, antē quā in caulem abeat, in acetariis manditur. sed durior & amarior est Cichorio. Vocatur vulgo *spinosa*, h.e. Hydria spina, quia vulgariter in tota Creta fictilibus hydriis vtuntur ad hauriendam aquam ē fontibus, quas hāc herbā obturant, ne mures aliūdue animal inus penetrare possit, videtur enim ad hoc munus ista planta à natura formata: nam semper rotundā figurā cernitur. Hydria vulgō dicitur *spinosa* & *spinosa* spinam significat, nomine ab *hydria* corrupto: quibusdam insulz locis dicitur etiam *radichium* a h.e. Radichium stuidam, ob similitudinem, quam cum Cichorio habet, quod in Graecia vulgariter *spinosa* vocatur, & stoebe, quā dicitur *spinosa*. Huius vsus in defectu Cichorei.

C. Bauh. phyt. Cichorium spinosum. Apud Matth. Chondrilla spinosa, Cich. spinosum D. Doldii. Ferd Imper. Cicoria spinosa, Cichorez omnino similis, si excipias caules spinosos: herba Cretica. Io. Ponz in Baldo, Cichorium spinosum Creticum Belli.

Semen in horto Ill.E.C. terrā commisi quod dederat Frater Neapoli ab Imperato. Pharmacopoeo missum. Gener Io. Henric. Cherlerus attulit Parauio, vbi colebant Cortusus & Bembus nomine Cichorii spinosi. Verū ea planta nondum protulerat flores, suaeque habebat folia. Floret Iulio & Augusto, folia amara non lactescunt, & cito pereunt, etiam reliquis plantz partibus eleganter virentibus.

HIERACIVM STELLATVM.



Descriptio

AD cubitalem altitudinem assurgit, tenuibus coliculis & ramolis, rantillā lanugine, nisi propter terram, vix hirtis, non sine foliis multis: folia primū erumpentis Hedypnoidis, & pingui solo palmari & plusquam selqui-palmari longitudine, sextantali & quadrantali latitudine, nonnihil sinuo-

sa, hirsuta: flores simplices, parui, Lampyris, lutei: quibus succedunt semina stellae radiatae hirsuta, quae postmodum falcis in modum incuruantur: tota planta lac manat.

Hieracium hoc stellatum mihi mittebatur aliquando per D. Doctorem Schuuarzium Stuegardia: pro Astragalo Plinii.

A Lobelio in Obs. inscribitur Hieracium Narbonense siliqua falcata. In Icon. Plant. Hierac. Narbon. falcatum. A Tabern. Icon. & Hist. Hierac. Monspeliacum & Narbonense, *habichtrau von Montpellier oder Languedoc*: Hierac. 10. A Gerard. Anglo, Hierac. falcatum Lobelii, *Erosod hanf etvede*. A C. Bauh. phyt. & apud Matth. Hierac. 19. siliqua falcata.

An Celsalp. Ragadiolo similis, cuius semina stellam representant.

Abundat in loco pingui Monspelli ac circa Bononiam; Montbelgardi in horto E.C. Iunio, Iulio & Augusto.

Hieracis affinis Ragadiolus edulis.

Folii constat tenuioris Ciconii, sine lacte, & sine amaritudine: flosculos fert luteos in alis foliorum, & semina longa, & adunca: representantia autem pedes: ipsa herba dodrantis, humi procumbens, ramosa: floris foliola ex medio semine videntur erumpere; cum tamen ex summo oriatur: nam reliqua pars vagina potius est seminis.

Celsalpino descriptionis auctori dicitur vulgō Ragadiolus, *Ragaggiolo* in Hetruria, qui assumitur in cibis crudus, ut Cichorium.

Cichoris similis Spagnin Americanum.

In Americz insula Madagascari, siue S. Laurentii, auctore Theueto, prouenit cordialis herba, quā Spagnin vocat, similis Cichorio siluestri nostrati [Galliz videlicet,] quam applicant vulneribus, & morsui viperarum, & aliorum animalium, venenatorum educit venenum.

SONCHVS MINVS LACINIOSA

minor, siue minus Spinosa, & asperior siue spinosior,

CAP. III.



LACTE tota planta turgēt amaro, *caulis* inanis, cubitum altus & maior, hominē interdum altitudine excedens, ramosus: folia parua laciniata, tenera Endiuiz ferē, spinulis in ambitu donata, sed parua aut nihil pungentibus, caulī immediate adnascuntur *floris* lutei, Hieracii, sed calyce

calyce glabro, qui celetiter in pappos abeunt, & longiuscula, multis fibris donata: Fluius similis parum aut minimum laciniata acutis & rigidulis horrens spinulis.

Theophrastus Sonchum in genere nominat, eumque inter spinosa foliata numerat, in cuius caule cum ramulorum prouentu vna illosculus quoque quidam emergat: peculiaris inter Aca- maceae: qui conceptus non spinosus.

Dioscorides postquam duo Sonchi genera facit, describitque: in fine capitis tertium addit. Vnum, inquit, siluestrius, magis aculeatum: alterum mollius, (πυρρόν, delicatius,) esculentum: caulibus angulosus, cauis (aut, quae dictio quidem in vulg. codicibus non legitur, sed eam habent veteri codices & Orib. Ergo non erit, ut aliqui putant, ex Plinio duntaxat reposita, Matthiol.) aliquando subrubens: folia habet per intervalla in ambitu diuisa: eorum facultas refrigerandi, modice subastringens: vnde conferunt stomacho astuanti, & inflammationibus, & quae sequuntur: in fine autem addit: Alter Sonchus, qui, & mollior, arborea specie constat, & lato folio: folia autem caulem cingunt: & hic quoque eadem praestat.

Sed & Plinius duo genera facit album & nigrum, Lactucae similia ambo, nisi spinosa essent, caule bicubitali anguloso, intus cauo, sed qui fractus copioso lacte manat.

Galenus ait Sonchum postquam perfecte absolutum sit, ex spinosis plantis esse.

Sonchi genera duo agnoscit Herbariorum pars maior, id quod ex iam dicendis clare demonstramus.

Quia autem Cornar. duo tantum Sonchi genera ex Dioscor. agnoscit, textum Dioscoridis ita legit. Sonchi duo genera sunt. Alterum agrestius & spinosius: alterum delicatius & quod editur, & quae sequuntur. At Sonchus delicatus ille arborem refert, quae lata folia habet: Priorem nostri Censdissel (Carduum Anserinum dixeris,) vocant: posteriorem hasenfol, id est, olus Leporinum. Quidam Palatium leporis, quod sub eo lepus in aestu latebras quærat. Sed quam bene ita legat, videant doctiores. Ego praeterea palatium Leporis existimo dicendum non palatium, quia leporibus gratus cibus. Corn. etiam suo more Sonchum distinguit.

Cord. histor. Sonchus asper maior & Sonchus asper minor: caule pedali, foliis per ambitum maioris modo spinulis horrido, sapore amaro.

Miror autem Tragum diligentem stirpiū Germanicatum indagatorem ita negligenter descripsisse Sonchū ut difficile sit intelligere quid velit. Quae dicit de radice serpente non conueniunt Sonchus asperis dictis multis, quia eis non repunt: sed illi qui multis dicitur Hieracium: cui Soncho multa etiam conueniunt quae in postrema descriptione ponit. Sunt (inquit Fuch.) qui Lactucellam & Lacteronem appellant, à copioso lacte, quo caulibus eius dissectus diffuit.

Fuchius (quem sequitur Amatus, cuius figuram etiam exhibet) suo more non describit particulatim, nec distinguit Sonchi alterum genus siluestrius, aculeatius & nigrius, quod Sonchum asperam in Hist. & Iconibus inseribit, à Soncho non aspera: Icon quam proponit est Sonchi folio minus laciniato, quam etiam nos ex eo proponimus.

Dodon. gall. Sonchus siluestrior, aspera. Sonchi species 1. Lacteron. Lat. in fol. Sonchus asper: spinosior alter asperior ac siluestrior cognomi-

natus. Item Sonchus, asperior marinus. Figura Dodonzi gallici est folio non laciniato Fuchii, cui non respondet descriptio. Latino est Sonchus asper, qualis Lobelio, non laciniatus.

Casalp. Sonchus latiore folio ac minus fuso.

Gesner. eat. pl. Sonchus filu. niger, spinosior, πύρρον, wilder hasen fol / Seudissel. De coll. stirp. Sonchus agrestis marginibus foliorum aculeatis. Item Sonchi genus filu. procerum, luteis floribus, subdulce, foliis non dissectis, angulosis, totum laeue, sine aculeis. Item Sonchus pinguis caulibus & nervis rubicundis. Sonchum nigrum Gesneri potius repono sub non laciniato, quia mihi in Sonchorum genere spinosior & nigrior videtur non laciniatus.

Lob. Aduers. Sonchus aspera vulgi, flore Hieracii, foliis Dentis Leonis: alias Diplaci & Lactucæ, an Dioscoridis arborelscens Sonchus tenerior latifolia? Cicerbitam Latini & Itali etiamnum vocant, Germani spinam anserinam. Spinosa namque sunt omnes Sonchi, sed quædam horridiuscula aculeis, quædam perpusillis aut nullis ferè visitur. Quarum duæ frequentiores maiores sponte cultis & incultis legibus & vinctis: minime obuia & nota. Aspera quæ vocatur, caulem erigit quaternum & senum cubitorum: vni folia laciniata Dentis Leonis, alteri verò Lactucæ. Obs. Sonchus laevis tenerior latifolia. Icon. Pl. Sonchus aspera vulgi flore Hieracii foliis Dentis leonis, alias Diplaci & Lactucæ. Itē Sonchus tenerior aculeis asperior aut horridiuscula. Icon. Pl. Sonchus laevis tenerior. Icon proposita à Lob. in Obs. respondet Fuchsianæ à nobis propositæ.

Hist. Lugd. Andryala maior Dal. Item Sonchus laevis latifolius Lobelii. Item, Sonchus asperior Lobelii. Non placet Hist. diuersis capitibus scribere de Andryala & de Soncho.

Andryala maior Dal. (inquit Casp. Bauh.) Icon Sonchi asperi Fuchii, & Sonchus laevis latifolius Lobelii sunt idem.

Thal. Hærcyn. Sonchus laevis maximus sesquicubitalis, foliis dodrantalibus, cretatis parum, sed non profundè dissectis, in ambitu spinosis, sinuatis.

Schuyvenckf. Sonchus asper, πύρρον, Carduus suillus, Cichorium porcium. Endiua spinosa stehend seudissel.

Sonchus aspera folio non laciniato, spinosa valde: Genevæ Iunio: Basileæ quoque prouenit & Monspelii, florens April. Montbelg. frequens in Horto Ill. E. C. Wittemberg. cum spinulis mollioribus, ac etiam hominem altitudine excedens loco humidiori, florens Iunio.

SONCHVS LACINIATVS NON SPINOSVS & spinosus.

PARUA, fibrosa, albæque radice nititur: caule cubitali & ampliore, intus concauo, purpurascens: folia longa, laeua, ferè glauca, Dentis Leonis diuisura, latiora, teneriora, lacte prægnantia, alternatim prodeunt, alias pediculo longo, alias nullo, sed latiore basi caulem amplexentia, in circuitu quasi dentata, in quibus vel nullæ spinæ, vel molles: flores foliosis lutei, Dentis leonis minores, quorum extrema folia aversa parte purpurascunt, & in pappos abeunt. Semen paruum oblongum, & in fusco rubens. Sonchus laciniata sæpè spinis horret ac multum variat, vel foliis amplioribus, spinis minus rigidis, vel minori-

Gesner. eat. pl.

Spinosa ad hunc.

Lob. repræsentat.

Andryala maior Dal.

Locus & tempus.

Descriptio

bus foliis, rigidioribus spinis.

Descriptio laui, Sonchum nostrum laciniatum non spinosum.

Sonchus laciniatus non spinosus.



Sonchus laciniatus spinosus



Laui duo genera.

*Matthioli
argentei
plures.*

de eo quicquam, quod equidem legerim, memoriam prodiderunt Theophrastus, & Plinius. Ait idem in commun. mag. fig. lat. & Ital. Folia utraque Sonchus profert Cichorii modo laciniata in aspero crispa, aspera, & pungentia, subrubentiaque. In laui vero laui, & spinis nullis rigetia. Huius duo habentur genera: quae tantum foliis aliquatenus differunt, nempe eorum alterum lauioribus habetur foliis, minus quoque laciniatis, ac etiam magis extensis. 1. Sonchus aspera. 2. Sonchus laui. 3. Sonchus laui altera. Hic opus haberet Matthiol. spongia maxima glossarum & patrocinantium pro expungendis erroribus. Quam olim posuit pro Soncho aspero sine descriptione, ac in postremis retinet, est laciniatus Sonchus minor non spinosus, cui tamen in postremis tribuit

folia aspera & pungentia. Quid proponat pro Soncho plano in primis com. & postremis pro laui altera asserere non auium: Lectores considerent an intelligat Sonchum lauem Lob. de quo agemus sub Soncho Terracetola. Quam proponit in postremis pro Soncho laui nescio, nisi sit noster Sonchus radice reptatrice, de quo postea, quem etiam pro Hieracio maiore exhibere putamus. Matthiolus non sibi constat: nec distinguit bene suos Sonchos.

Lac. in Diosc. Sonchus asperus, Sonchus laui: proponit duas similes icones, non possum animaduvertere quae in se differant, sunt autem Sonchi laciniati non spinosi.

Lonic. Sordidus, Endiua silu. Item Chondrilla alia species Dioscoridis, quorundam sordidus. Lonicus nescit suo more quid pingat, scribatue. Duas icones habet Sonchi laciniati: primo loco descriptio non responderet iconi, describit enim Lactucam silu.

Dodon. Gall. Sonchus tenerior non aspera. Sonchus laui prior, Brassica Leporina, Sonchus tenerior. In Hist. Gall. est icon Fuchsi folio laciniato spinoso, cui non responderet descriptio: In fol. Lat. Sonchus laui figura qualis Lobelio, folio laciniato non spinoso.

Sonchus (inquit Casalp.) quae vulgo Cicerbita vocatur & alicubi Crispinulus; Quaedam in vineis frequens & in aruis locis cultis: Alia in rudibus nascitur: Quaedam in collibus virebrosus & siluis nascitur. Quaedam in montibus caule bicubitali.

Camer. ad Hist. Matth. germ. & Epit. eiusdem tres nouas icones proponit a Matthioli diuersas. Prima titulus est in Hist. Sonchus aspera (Sonchus in Epit.) Alteri Sonchus laui: Tertia Sonchus laui altera. Harum prima, quae melius placet, est foliis laciniatis, acceditque ad nostram laciniatam lauem, siue minus spinosam: quae vero laui inscribitur spinis pluribus scater: tertia quae sit, adhuc me latet. Hanc ait Camer. vulgo vocari Cicerbitam, & in Italia Crispinum & Crispinulam.

Gesni. cat. pl. Sonchus candidus tener & elculentus, *αγχερ*, quem Diosc. Cicerbitam a Romanis dici prodiderit, quod nomen adhuc hodie in Hetruria seruetur, ab Herbariis nonnullis Leporis palatium vocari, quod fortassis eadem Apulei Lactuca Leporina fuerit. Item Sonchi genus 2. tenerum, arborescens, a solo Dioscoride descriptum. *αγχερ*, *αγχερ*, *αγχερ*. Isti autem in hanc fol. latiore folio. De hort. Sonchus asper & laui, Lactuca quaedam species siluestris.

Lob. in Adu. Sonchus laui laciniatis foliis, Gerin. hanc fol: Belg. hanc latam nude. It. Cicerbita silua. Oleracea tamen esse potest, tamen quia non colitur non manditur. Obs. & c. pl. Sonchus laui vulgaris foliis laciniatis, Dentis leonis.

Clus. Hist. post. Sonchus lauior vulgaris prima (est eadem cum Lobelij icones) Sonchus lauior vulgaris secunda. Clusus has binas lauioris vulgarissimi Sonchi species non describit, sed eas in hunc finem tantum in illo capite rarioribus Sonchi generibus praefigit, ut hae ab illis commodius ab invicem secerent & distingui possent.

Hist. Lugd. Andryala minor Dalechamp. Sonchus Fuchsi. & Dodon. alter humilior, tenerior & spinis carens. Item Sonchus laui laciniatis foliis

foliis, Lob. 1. Sonchus Asper Matth. 1. Sonchus levis 3. Sonchus levis altera, Matth. 4. Quod ante dixi iterum nunc dico, displicere historiam ponere Andryalam alio capite, quam capite de Sonchis. Icon pro Andryala minori est Fuchsi quæ non caret spinis, indicante ipsa icon: carent spinis Sonchus Lobelii levis, & Matthioli asper, quas duas icones eiusdem plantæ existimo. Cur duas leues ex Matthiolo ponat nescio, cum sit tantum ea quam olim pro leui primo, & postremo pro leui altero pingit.

Tabern. Icon. & Hist. Sonchus asper. Cicerbita aspera, Gänssdistel / Säumdistel / wilder Hasenföhl. Item Sonchus levis latifolius, Breyscher Hasenföhl. Sonchus levis alter flore luteo, Geeler Hasenföhl. Sonchus levis tertius flore nuceo, Weisser Hasenföhl. Non displicent Icones tres Tabern. pro Soncho laciniato minus spinoso: foliis variè ludit hæc planta.

Frater C. Bauh. pro Soncho aspera Matthioli, ponit iconem Tabern. folio laciniato spinoso, pro leui lauem Tab. laciniatum.

Schwenckfeldius ut supatus Synonymis incedat, idem bis ponit, & quidem primò græcum, *συγγρηγμένη*: Secundò Latinum, Sonchus esculentus. Et hæc ab invicem more suo separant, tanquam diversa sonent. Tautologiam committit, numquid doctè sentit?

Locus & Tempus Sonchum non spinosum laciniatum vidi Möspeli: ut & Basilæ adhuc florentem Octobri, extra urbem inter portam Stein & Eschen. Geneva, passim in hortis florens Nouembri. Montbelgardi passim spontè, etiam in Horto E. C. folio laciniato spinoso.

Nomina Sonchus in genere vocatur à quibusdam Cicerbita, & Lactucella, teste Cordo in Dioscor. Germ. Geweide & Hasenföhl. Brasica leporina, item Säumdistel / Gänssdistel / Mössdistel. Belg. hasse lartouwe / Gansendistel / Meidweye. Gall. Laiteron & Laiteron, Palau de Lieure. Ital. Lattucella, Soncho, Cicerbita seu Crespine, Crispini & Latifoli Lob. hisp. Corajas, Cerrajas, Cerrajas.

Sonchi Synonyma. Cicerbita & Säumdistel. Boh. Mico. hug. Sonchus asper, Rastich, Sonchus, levis Pie fef. *Συγγρηγμένη* Græcis dicitur, sic & Lat. Sonchus, *συγγρηγμένη*, id est, quod salubrem fundat succum. Cicerbitam à Romanis vocari, quo vocabulo etiam hodie uerruria vitur, in quibusdam Dioscoridis exemplaribus legitur. Sed nomen id recens Dioscoridi attributum putat Ruellius, cum nusquam à Latinis usurpatum inueniatur. A Recentioribus etiam Lactucella, eademque fortasse quæ ab Apuleio Lactuca leporina nominatur, quod cum leporem animus deficit æstu hæc sibi solet mederi, Galli Laiterons à lactis copia nominant, & leporis palatum, Palau au lieure, quod hoc animal ut ab æstu vindiceretur, & calor propulset incommoda, soleat sub ramis eius decumbere.

Hi Sonchi nascuntur in hortis, campis, & vineis, Aestareque florent.

Utriusque vis refrigerat, inquit Dioscorides, modicè adstringit, æstuanti stomacho, & inflammationibus illi profunt. Succus eorum stomachi rosiones sorbitione mitigat: lac elicit, in velere appositus sedis ac vulvæ collectionibus opitularur. Tam herba quam radix illita vibratis & scorpione ictibus subuenit.

Galenus de Sonchi viribus hæc scripsit. Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plattis est. Ceterum viridis etiamnum & tener estur, perinde ut cætera olera silvestria. Temperamentum e-

ius quodammodo mistum: Maris & adstrictionis cuiusdam est particeps, & siue caraplastis modo illinatur, siue edatur, aptè refrigerat: postea verò quàm planè resiccatu fuerit, terreste eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem. Quæ præterea Plinius scripserit scire operæ præmium est. Estur & Sonchus, ut quem Theseo apud Callimachum apponatur Hecale, uterque albus & niger, Lactucæ similes ambo, nisi spinosi essent, caule cubitali, anguloso, intus cauo, sed qui fructus copioso lacte manat. Albus cui est lactis nitor utilis orthopnoicis, Lactucarum modo (ex emblemate addit Cornarius ex vetere Pliniano codice,) Erasistratus calculos per urinam pelli eo monstrat, & oris graucolentiam commanducato corrigi. Succus trium cyathorum mensura in vino albo, & oleo calefactus adiuuat partus, ita ut à partu ambulet gravidæ. Datur & in sorbitione. Ipse caulis decoctus facit Lactis abundantiam nutritibus, coloremque meliorem infantiam: utilissimus iis quæ lac coire sibi sentiant. Instillatur auribus succus, calidusque in stranguria bibitur cyathi mensura, & in stomachi tononibus cum semine Cucumeris nucleisque pinis. Illinitur & sedis collectionibus. Bibitur contra serpentes scorpionisque, radix verò illinitur. Eadem decocta cum oleo in Punici Mali calyce, aurium morbis præsidium est. Hæc omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet vesci, ut morbos faciente, de albo consentiens. Agathocles etiam contra sanguinè tauri demonstrat succum eius. Refrigeratoriam tamen vim esse conuenit nigro, & hac causâ imponendum cum polenta. Sic enim Cornarius ex eodem vetere codice.

Soncho nostri vtuntur hyeme in acetariis, inquit Matthioli, præsertimque eius radicibus, quæ cum teneræ sint & dulces, mentis expectantur. Lacteus liquor è caule manans datur potandus [Lectores considerent quomodo liquor lacteus excipiens & potandus,] ægrè spirantibus, & asthmaticis. Idem auribus instillatus dolorem tollit, præsertim in malicorio cum oleo decoctus. Tam herba quam succus ad æstuosas stomachi lacerationes & hepatis biliosas obstructions utilissima: ob id Tertianis, & putridis febribus conuenit. Sonchus levis vulgaris non differt facultatibus. Ex vino stomachi fluxionibus medetur. Suspiriosos & Asthmaticos iuuat & stranguriam sanat. Succus auribus instillatus eorum dolores mulect.

SONCHVS REPENS MVLTIS HIERACIVM MAIVS.

Sonchum repentem voco, quem multi Hieracium maius, cuius radices longè latèque repentes non nisi difficulter euelli possunt, perennes, lactifluæ: caulis bicubitalis vel longior inferiore parte glaber, sibi demum pilosus, ubi in ramulos diuidi occipit: folia & per tetram sparsa & quæ cauli adnascuntur, Sonchi levis foliis similia, palmaria & plusquam bipalmata non admodum lata, profundis laciniis incisa, spinis mollicellis donata, colore ferè glauco: flores quàm Sonchis reliquis paulò maiores, lutei, hirsuta foliorum attrouissentium compage coërecti, qui tandem in pappos abeunt. In iconè nostra Fuchsiانا radix repens deest.

An Cordo in Diosc. Hieracium maius, stybi agrestis species, Germ. wilde scindistel?

N. Loyd.
m.

Schwenckfeld.
m.

Locus &
Tempus

Nomina
linguæ
in genere

Sonchi Synonyma.

Cicerbita
nomen Dioscoridis attributum.

Vires &
Temperamentum.
ad inflammationes
venæ
non idem.

Plinius

Albus

Plinius

Strabo

Calculus

Succus

Partum

inuat

Lact generat

rat caulis

Strabo

Strabo

In acetariis


Stomachum

Obstructiones biliosas

Febres putride.

Descriptio

Hierac.
maius Fuch.
chfi.



Fuchsius cum Hieracii maioris figuram ponat in Historia, itemque Iconibus sine sufficienti descriptione, iudicamus eius Hieracium idem cum nostro Soncho repente.

Picturam eandem, quam nos ex Fuchlio habemus, exhibet Dod. gall. pro Hieracio maiore, siue primo, quod græcè vocari tradit *ἱεράκιον* τὸ

πρῶτον à Lat. quibusdam Sonchiten, Lampfucan, & Sithelean.

Matth. re.
prob.

Sed & Matth. in prioribus comm. figuram Fuchsi habet pro Hieracio maiore, sine tamen descriptione. In postlat. & Item Hist. Germ. & Epit. [hic vox maius omittit] Camerarii, eadem figura eodem titulo ponitur.

An Lob. in Adu. Sonchi tertia species à Matthiolo picta? Idem in Obl. & Icon. Plant. imaginem figuræ Fuchsi similem habet, inscriptione, Hieracii maioris.

L. admodum.

Figuram quoque ferè eandem cum iconè Fuchsi habet Lonic. hoc titulo: *habichtsfraut*, aut *wilde sawdistel*. Græci, inquit, Hieracium maius h. e. Accipitrinam, Apuleius Lactucam siluaticam, Pharnac. Cichoream luteam, vocant.

Hist. Lugd. Hieracium minus Dalech. maius Matthioli.

Sonchi nostræ repens sub Hieracio maiore solam picturam sine descriptione exhibet Lacuna.

Clus. Pannon. Sonchus 3. Sonchus laevis altissimus, seu & Hist. poster. vbi Sonchus lauior Austriacus quintus altissimus inscribitur.

Tabern. Hist. & Ic. Sonchus 2. siue laevis angustifolius, *sonchenfraut*, *hasenföl* mit *schmalen bletteren*. Item: Sonchus arborescens, *Baum sonchenfraut*.

Thalio Hieracium maius, siue Sonchites.

Camer. hort. Hieracium latifolium Matthioli. An Camer. per hoc intelligat plantam quam demonstrare videtur figurâ Matthioli, dubito. Lectores perpendant. An Calsalp. Hieracium magnū.

C. Bauh. Phyt. lib. 3. Sonchus luteus calyculo hirsuto: Sonchus retrius, vel Sonchus laevis altissimus, Clusio: Sonchus arborescens Tabern. Item postea Hieracium maius primum, Hieracium maius Fuchsi, Lobel. Obl. & Icon. *mihi vna planta & non diuersa*.

Schvv. Sonchus arborescens, *οὐχὺν τρυφίον* Dioscoridis, à vulgari magnitudine differens.

Nomina
linguarum

Sonchus repens, multis Hieracium maius, *sonchenfraut* aut *οὐχὺν*, Germ. *Groß habichtsfraut*: Gall. *Grande Cichorée sauvage*: Belg. *Groß hauide fruyt* Dod. & *soepuenfruyt* Tabern. Angl. *hawke weed* de Lobel.

Locus &
tempus

Inuenitur Sonchus laevis altissimus Clusii in paludosis salicetis & harundineris, iuxta pisci-

nas, stagnantes aquas supra Badam Austræ vrbem, viâ quæ Napolim Austræ ducit, & supra Triebsvinckel pagum, Floret Iulio. Sonchus repens, molesta suo reptatu Montbelgardi in horto Ill. C. W. & in agris prope Andincourt ad Dubium abundat, & passim alibi. Geneuz quoque obseruatur, florens Iulio & Augusto.

Cum porro hæc planta Sonchi sit haud dubiè genus, iisdem etiam facultatibus præditam esse verisimile est.

Facultates

SONCHIS AFFINIS TERRACREPOLA.

Radicem habet Intubo similem, parum fibratam, candidam: caules multos, cubitales, foliatis: folia Intubo similia sunt, candidiora, minus infecta ac laciniata, succo lacteo manantia, gustatu suauia, licet nonnihil amara sint: flos luteus in pappos euanescent.

Descriptio

H. Lugd. Crepis Dalechampi. *Ἡεροῦδινος* Crepis (inquit Hist.) est Theophrasto, i. e. in caule

foliata, cuius-

modi cum sit

hæc planta, &

eam seruatoad-

huc Crepidis

nomine Crepa-

lo vocent Itali,

& Terracrepola,

Crepidem esse

Theophrasti

indicauit Dale-

champsius. O-

lus siluestre, in

Hetruria, anto-

re Calsalino,

Terracrepolum

vocatum, Dios-

corides Hiera-

cium paruum

appellat, Pla-

nius & Theo-

phrast. Crepidè

vocant.

Terracrepola.
Hierac.
maius.



Nascitur spontè in aggeribus terrenis agri Monspelienis, satù verò cultu in hortis nostris (Lugdunensibus) inquit Dalechampsius. Oriri eam scribit Calsalinus in collibus saxosis & in edificiis: florere tota Ætate: Hieme nequaquam perire: nam regerminare à latere. Vidi ego Auinioni, & Lutetia in horto cuiusdam Monachi.

Locus &
tempus

Herba Terracrepolis in cibis cruda ex oleo & aceto [vt ipsemet Auinioni vidi] expetitur, nam dulcis est & subatrangens.

Virus

CHONDRILE VETERIBVS.

CAP. IIII.

Aliqui, vt Dioscorides tradit, Chondrilen Cichorion, & aliqui Serin vocant. Eius duo sunt genera: Prior quidem folia & caulem, & flores Cichorio similia habet: vnde & speciem Seridis syluestris esse ipsam quidam dixerunt: sed in totum tenuior est. At circa ramulos ipsius reperitur gummi simile Mastiche, magnitudine Fabæ. hoc cum Myrrha citrura, magnitudine Oliuæ in linteo apposum, menses ducit.

Cichorion.
Seris.

Herba

herba ipsa una cum radice confusa, ammixto melle in pastillos efformatur, qui diluti nitro addito, vitilignes deterunt. Gummi verò etiam pilos agglutinat. Sed & radix recens ad eadem facit, si in ipsam acus tingatur, & pilis admouetur. Commoda est etiam ad viperas cum vino pota. Et succus ipsius aluum fistit, coctus cum vino & porus, aut per se ipsum. Est & alia Chondrilles species. Folium habet circumtosum, oblongum, per terram stratum. Caulis succo plenus. Radicem tenuem, acutam, leuem, rotundam, sublauiam, succo plenam. Vires habent concoquendi & folia & caulis. Succus autem pilos in palpebris agglutinat. Nascitur in terræ cultæ locis.

Chondrilla
alba.

Vires

Plinius

Condrilem speciem Seris esse, Galenus in Seris tractatione dixit: quam etiam, ut & Diosc. & Cichorion, & Serim vocari tradit.

Plinius utraque species inter se confundit, & quæ Diosc. duabus, ipse tanquam vni attribuit. Præter vires autem à Dioscoride recensitas quas etiam habet, tradit: Aliquos feminis & oculis, generationique virorum contrariam putasse. Inter vulgares in cibo herbas etiam Chondrillam recenseri. Chondrillam amarum esse, ac æri in radice succo.

Condrilla, iuxta Rob. Constantini mentem, est herba Cichorio similis, ob idque à *Cichorio* quidam vocarunt: apud Gal. & Paulum *χονδρίλλαν* scriptum, apud Diosc. *χονδρίλλαν*, apud Plin. *Chondrillon* siue *Condrille*, & alibi *Condrilla*, quæ melius scribitur per *con* monente Gesnero, qui suspicatur apud Theophr. pro *Andryalia* legendum *Chondrilla*. Hæc dicta fuit, *ἀνδρῶν χονδρίλλαν*, quod est gramus, & *χονδρίλλαν* quod continere significat, quasi continens grumos, quos *Μαλὶχ* similes esse ait Dioscorides.

Chondrillacearum generis plantas plurimas passim, easque diuersas admodum specie reperire licet apud Authores, quæ vix quisquam facile & dextrè certis nominibus *Thaliociste*, à se inuicem distinxerit: præsertim cum rei herbariæ scriptores, Intybacearum & Chondrillacearum (quorum tamen vbiuis ferè locorum ac terrarum ingens copia sese offert) historiam nondum accuratè examinerint: Solis enim aut nominibus proposuerunt: aut etiam foliis nudisque descriptionibus delinearunt, non adhibitis iconibus: aut saltem appositis figuris & nominibus descriptiones earundem neglexerunt. Solo nomine proponit C. Bauh. Phyt. Chondrillam is. siue spinosam. Hanc, inquit, integræ cum nondum habeam, eâ nominalle sufficiat. Nec dum scio quæ sit Chondrilla illa, cum foild *Endiuem* ait Gesneri in ear. pl. Item *Chondrilla* altera, cum *Gânz* zugeneri, quas solum nominat.

Cæterum è diuersis diuersorum Authorum Chondrillis, est nobis quædam, quam cæruleam inscribimus. Est & alia lutea cognominata. Sed & Chondrillam vimineam à iam dictis diuersam statuimus. Occurrit præterea Chondrillis affinis quædam laciniosa, an *Trinciarella* Camerarii. Chondrilla adhuc quædam existit hirsuta rubente flore. Sed & Chondrilla *Creticæ* nomine quædam nobis missa est semine crispo, de quibus nunc ordine dicam. His subiungimus Chondrillas quasdam ex *Thalio*, quas foliis nudisque descriptionibus, non adhibitis iconibus discernere admodum est operosum. *Tragus* insuper lib. 1. cap. 9. duas addit *Cichoreæ* luteæ species, tertiam & quartam, quas *Chondrilla* Dioscoridis facit: Nos *Hieracium* minus

Tom. II.

hirsutum. Chondrilla *Thalii* *racemosa* duplex, maior & minor, ac rursus alia species cui folia magis in lacinias diuisa existunt, An *Hieracium* i. Dod. minus, & longius radicum *Lo-beli*. Galenus inquit *Anguillara*, meminit cuiusdam Chondrillæ de qua non locutus Dioscorides, quæ nihil aliud est, quàm planta quibusdā dicta *Taraxacon*, *Hedypnois* nostra, siue *Dens leonis*, Chondrilla altera Dod. *Thalio*. Chondrilla prior Clusio plurimum accedere videtur ad primam Dioscoridis Chondrillæ speciem. Est hæc nobis *Hedypnois* *Montpess.* Chondrilla secunda Dioscoridis *Rauuolthii*, est nobis *Conyza marina*. Chondrillæ alterius Dioscoridis genus aliud eiusdē *Rauuolthii*, est *Conyza maritima* affinis. Chondrillam alteram Dioscoridis *Fabii Columnæ*, exhibemus pro *Cichorio bulboso*. Chondrilla Galeni, si *Trago* non sit contradicendum, est *βελσαλεια* Dioscoridis, *Lactuca siluestris* *Fuchsi*. Chondrillæ alteram speciem Dioscoridis, *sambistel* *Loniceri* l. 1. cap. 74. (qui eandem antea posuerat pro *Endiuia* siluestris) diximus ante *Sonchum* non asperam. Quidam curiosi apud *Monardem* volunt *Tragopogonem* *Hispanicum* siue *Scorzoneram*, Chondrillæ esse speciem, cuius mentionem facit Dioscorides, verum multum differunt. Chondrillæ nomen sibi vendicat *Cichorium verrucosum*: Item *Cyanus*, *Catanance* quorundam, & *Cyanus folio* *Ceterach* quorundam. Est tandem Chondrilla à nobis inuenta folio non dissecto.

Hedypnois
siue Dens
Leonis

Hedypnois
Montpess.
lana

Conyza
maritima

Conyza
maritima
bulbosa

Cichorium
bulbosum
Lactuca
siluestris

Sonchum
non asperum
Scorzoneræ

Cichorium
verrucosum

Cyanus
Catanance

CHONDRILLE VEL CHONDRILLA cærulea.



Chondrilla cærulea caules erigit cubitales, teretes, leues, fungosâ medulla repletos, ramis satis frequentibus brachiatos: folia priora palmaria aut dodrantalia, lacinias ad Cichoreum accedentia, glabra, & pene glauca, superiora autè profundioribus lacinias incisa, leuius

etiam alias dissecta, glabra: in summis ramorum flores, cæbri, radiati, cærulei, ex calyce logō squamato, in quo semen nigrum longum latum: radix perennis simplex, longa, digitali crassitudine, paucis fibris donata, foris tenui & nigro cortice vestita, intus candida, carnosa, tenera, & admodum fragilis. Tota herba lacteâ iurgat liquore, & gusta dulcis est.

Chondrillam nostram cæruleam Cordus in hist. inferibit Chondrillam teneram.

Marthiol. in suis comm. Chondrilla 1. & Chondrilla 2. De prima ait. Siluestris (veri, in comm. Ital. cum mag. fig.) Cichorii species Chondrilla est: gracilioribus tamen foliis, caule, floribus, ac

R. 111

tur: ex horum sinu ramuli exeunt, quorum singulis flos vnicus insidet, Sonchi, luteus, in pappos euanescentes.

Lob. in Adu. Condrilla Coronopi aut Cyani tenuifolia lutea vinearum, quam nonnulli alteram Condrellam Dioscoridis esse putarunt, nec sanè ita ablimilis? Ego cum Montpelii essem anno 1562. Condrellæ, vel Souchi speciem feci, ac quidem per plures annos mihi persuasi esse Chondrellam Matthioli secundam, quia in Hist. Germ. scribit eam flore luteo conspici: verum pauca fides habenda figuris & descriptionibus Matthioli. An Thalis Condrilla altera Matthioli in renues lacintas profunde dissecta, floribus luteis, duarum specierum maior & minor? Hereo ut dictum, quid Matthiol. pingat pro Chondrilla altera, mutauit figuram & aliam reposuit.

Montpelii flores mense Februario & Martio in muris nasci. Spontè tota Estate calidiorum regionum vinetis & oliuetis glaucosis passim obseruari esse scribit Lobelius.

CHONDRYLLA VIMINEA.



Pullulant primùm per terram in orbem sparsa folia magna, Hedyonoidis laciniis, glabra, quæ in caulem surgente planta marcescunt: ipse verò caulis propter terribilis spinulis totus horret, atque ad cubitos duos aut tres assurgit, frequentibus ramis vimineis variè diuaticatis fruticosis, foliis aut nullis aut raris, iisque gramineis tenuitatis: flores extremis ramulis hærent lutei, Lactucaceis pares, nec formâ dissimili, semine succedente itidem Lactuce pari, verum non compresso, sed rotundo ferè, striato, oblongo, cinereo, cum tomento villosa appenso. Radix subest simplex, pollicaris & crassior, glutinosissimo lacteo succo abundè prægnans, cubiti aut sesquicubiti longitudine, non ingrata dulcedine prædita. Totam plantam amaro esse gustu tradit Columna, eam fuscè describens.

De Chondrilla viminea Cæsalpinus loqui crediderim, cum, inquit, ad Condrellas reduci potest quædam in collibus & vineis, & aliquando in ædificiis vetustis frequens: radice valdè succosa, & acri: foliis ab radice Cichorii tenuioris, hirsutis, caule recto, cubitali, propè radicem aspero, superne leui: ramulos fert rectos: in quibus foliola tenuia, non incisa, quasi Poligoni: flosculos pallidos non in summo, sed à lateribus, qui euanescent in pappos: in huius ramis aliquando videntur tuberculi nigri, ex concreto lacte geniti.

An Cordo in Dioscor. Chondrilla altera, G. serordistæ? An eadem in Hist. Ixopus intybacea Tom. II.

herba quam ibidem describit, prope senam plurimam prouenire tradens.

Ad eius historiam à Cordo traditam adscribit Gælinus nomen à liquore, quem Graeci opon vocant, quem Ixiæ, e. visci instar, viscosum habet, confingere: se similem herbam in solo argilloso ad pedem montis vidisse, foliis ferè Plantaginis minoris: radice, cum arida suffigit, Iuniperum ferè olente.

Trago Cichorea quinta & maxima siue proceræ, & eadem Dioscoridis. Lob. & Pena Adu. & Ic. Plant. Condrilla viminea viscosa vinearum. Clus. Hist. Condrilla 2. siue viminea. Hist. post. Condrilla 2. siue viminalis, Condrilla viminalibus virgis, Condrellæ genus alterum vimineum, Inquerina Salmaticensis vocatum, aliis Atuniera. H. Lugd. Condrilla viminea viscosa Penz. Tab. Ic. & Hist. Chondrilla iuncea, viminea, aruensis, Bico condrellen? Jeter condrellen. An eadem in n. Condrilla lutea quinta sine iconè? C. Bauh. Phyt. Chondrilla 1. siue iuncea, viscosa, aruensis: prima Diosc. Fab. Columnæ Condrilla, Chondrilla 1. Dioscoridis: nam tota viscosa, atque albo succo est repleta, & si quamlibet partem sectas, radicem, folia, caulem, ramos, spres etiam, ex rima vi orta lacteus succus exit, qui concreuit paulo post Mastiches duritie, & colore, (imò & odore, quod mirum, nec ullis aliis Condrellis euenit:) sed postea longo tempore nigrescit.

Circa Montipelum prouenit florens Estate & Autumno. Basileæ apud Rhenum quæ itur Erengas florentem vidi Maio, & Octobri in agris ad portam D. Ioannis. Britæci copiosè floret, & senem maturat Octobri & Nouembri. Prouenientem plurimam, ac Iunio & Iulio florentem vidi cis pontem Castri noui Montpelii. Cospexit nascetem Clus. Salmaticensi non modò agro, post melleis in aruis, & ad eorum margines, sed plurimis aliis regionibus: copiosè per vniuersam Pannoniam, & variis Germaniæ locis.

CHONDRILLIS AFFINIS QVÆDAM
laciniata an Trinciata?

Chondrilla vel Hieracis affinis, cui è radice crassa longa prodeunt aliquot capitula, ex quibus multa folia vincta duas, longe, laciniata, quorū pars extrema subrotunda, leuia, & satis crassa, ipsaue caules iuncea, ramoli, cubitales interdum multò minores: in eorum extremitatibus flores singulares masculi, lutei, in pappos desinentes: hæc herba lactescit sine amaro.

An Camer horti, Trinciarella, quo nomine ex Italia accepit?

C. Bauh. Phyt. Dentis leonis similis Trinciarella Camerarii. Item Sonchus s. laevis angustifolius Lob. laevis Matth. De Sonchis consule scriptur Matthiolus, maximè verò de laevi.

Locus & tempus.

Nostram obseruauimus Monspelii & eius speciem minorem, propè Gigam florentem Aprili. Trinciarella Camerarii eo ipso quo feritur anno flores & semen producit, & si per hyemem in fideali seruetur etiam in plures annos perdurat: alioquin radices, quæ dulces quoque sunt, ut vniuersa planta, primo frigore laeduntur & intereunt.

CHONDRYLLA HIRSVTA. rubente flore.

Descriptio



Plures ex eadem radice, simplice, alba, dura, fibris donata, lac fundente, caules attolluntur pedales & cubitales, foliidi, lactiflui, tenues, striati, singularibus foliis donati: quorum singulis singuli inhiçet flores monocloni, colore ex albo purpurascente, denſe

foliis per extremam oram crenatis stipati, ex calyce thorulis hirsutis canicularo, cui ad basin haud secus atque in Hedypnoide prominula appositæ folia, eaque glabra: ea porro florum subinde est præmatura fecunditas, ut vix semunciam longi tudinem assecuti caulium rudimentis, iam tum capitula florum præcludia innascentur: folia vel à radice statim vel ab imo caule per terram sparguntur, [nam in caule reliquo rariora sunt] Hedypnoidis lacinias, quibus magnitudine tamen cedunt, utrinque hirsuta, odore graui: succedunt semina longa, tenuia, cum pappo.

C. Bauh. phyt. Chondrilla purpurea fertida. Chondrilla 6. Chondrilla hirsuta rubente flore apud fratrem Io. Bauhinum visa: An Chondrilla rota hirsuta Camer. de hortis? Huius & altera species duplò ferè maior, caule ramoſo, folio latiore, flore eodem. Dux sunt in Phytopinace insidem plantæ descriptiones.

Variis in locis vidi: in horto verò E. C. W. lata Aprili floruit Iulio & Augusto mensibus, annua est planta, Frater C. Bauhinus obseruauit Basileæ in horto D. Zvvingeri.

CHONDRILLA CRETICA nomine missa semine crispo.

Radix Dentis leonis: caules spinulis horridi, variè nulloque ordine in alas diuisi: Folia

lactuca syluestri: Flores Sonchi. Semen pulchrum, incuruum, ex ceruice denticulata in rostellum pulchrum desinens, per maturitatem rufum.

An camer. hort. Hieracium Creticum, pro Endiua lutea missum, semine curuo, aspero, vnguium modo. An Gesn. hort. Hieracium maius Creticum satiuum Patavio missum? An Casp.

Bauh. Phyt. Hieracium 10. Intubaceum flore magno albido?

Hieracium Creticum Endiua lutea. An Hieracium? Bauh.

Locus & Tempus.

Breuis xui planta ante hyemem, imò antè Autumnum etiam, perit: floret Iunio & Iulio: Semen iisdem mensibus maturat in horto Montbelgar-di. Monspeluli florentem obseruauit O. Robri.



Chondrilla foliis hirsutis, flore unico, magno, luteo.

Chondrilla hæc species est foliis sesquiunciam latus, longioribusque, in terræ superficie ad radicis sursum dispersis, hirsutis, in ambitu laciniatis, caule cubitali, amplioreque, tereti, striato, recto, florem vnicum proferente, magnum, luteum, in alabastrino velut calyce detentum.

Descriptio

Chondrilla radice candidula, floribus luteis paruis.

Chondrilla species radice candidula, exigua, parum fibrata: folia priora circa radicem dispergens, tria, quatuorue, oblonga, ex tenui pediculo protensa, integra, non dissecta, paucis ac exiguis quasi spinulis in ambitu prædita: quibus superadduntur mox alia tria, quatuor, quinave, longiora, in lacinias [quæ tamen maiore intervallo à se inuicem dirimuntur, atque in altera Matthioli species] diuisa, hæc quo rursus consimilia alia, sed breuiora, pauciora & aliquantulum tenuiora per caulem [qui oblique distorquetur ac teres quidem est, sed euidenter striatus, cubitalis ferè] consequuntur: flores huic sunt lutei, parui. Reperitis in locis pratensibus montium.

Descriptio

Chondrilla maior & minor, flore Tragopogonis luteo.

Chondrillarum generis species quadam maior, caule procero, striato, bicubitali, qui in summo in aliquot brachijs diuiditur, quorum quodlibet florem singularem profert luteum Tragopogonis floris instar. Folia caulis exerit pauca, longo intervallo se consequentia, longa, lata: quorum inferiora in ambitu parum subinde exscinduntur, superiora verò profundius circumroduntur, infrequentius tamen id quam in Chondrilla secunda Dodonæi accidit. Huius reperitur & alia species.

Descriptio

species flore consimili, caule item, sed foliis destituta: ea verò pauciora numero humi recumbunt, quorum prima lata quidem aliquantulum sunt, sed subrotundiora, reliqua longiora conspiciuntur, ac in ambitu circumrota, sed non profundè, nec admodum crebrò.

Minor alia Huius generis & minor reperitur species, radice parua, lignosa, fibris paucis constare: caule unico, recto, cubitali, ac aliquantulum proceriori, tereti, tenui, lzui, foliis carente, quæ solummodò humi reclinantur, numero sex, septem, octo, nouem, decem, pauloque plura, quandoque quadrantalia, in ambitu circumrota modicè. *Florem* itidem hæc Tragopogonis æmulum profert & vnicum.

Chondrilla caule hispida, nodis multis prædita.

Descriptio Chondrillæ alia species, paulò ab hinc iam dictæ minoris (huius scilicet generis) speciei fermè æmula: radice parua, fibratà, nigricante: caule crasso, striato, parum hispido, nodis multis prædita, ex quibus emergunt folia oblongiora, viridiora, circumrota aliquantulum, scabra, hirsuto dorso prædita.

Chondrilla caule cubitali aspero, floribus pappaceis.

Descriptio Chondrillæ species caule cubitali, aspero, striato: foliis quadrantali longitudine, humi sparsis, quaternis, quinis, senis, septenisue, in ambitu circumrotis modicè: iis verò, quæ caulem conscendunt, excisis, ita vt in ambitu euidenter lacinia inde relinquantur: floribus paruis, pappaceis, agminatim in summo caulis constitutis, quorum singulus peculiari petiolo innititur.

Chondrilla minor foliis in dorso rubentibus.

Descriptio Chondrillæ cuiusdam minoris species, radice singulari, quandoque & bifidà, mediocriter crassà, digiti parui longitudine, fibratà, nigrà: folia exerie parua, lzui, carnosà, oblongiuscula, integra, recurua, angusta, in dorso rubentia, numero quaterna, quina, sena, septena, octona etiam quandoque. *Coliculus* producit incuruum, rubicundum, digiti minoris longitudine, vnico donatum flore luteo, Tragopogonis fermè alicuius modo. In pratis pinguioribus nascitur.

Chondrilla parua, flore singulari, caule foliis prorsus destituta.

Descriptio Chondrillæ parua species, radice parua, fibrata, ex nigro subrubente: foliis quadrantali longitudine, humi procumbentibus, asperis, mediocriter latis, viridibus, contractu facilibus, senis vel septenis, nonnunquam octonis: caule palmari, pauloque longiore, tenui, tereti, aspero, modicè cacumen recuruante, foliis prorsus destituta: flore singulari, simili Chondrillæ Dodonæi alterius.

Chondrilla foliis in ambitu quasi spinosis.

Descriptio Chondrillæ alterius alia species, radice candida, lignosa, inutili: caule cubitali, minorèque vt plurimum, tenui, striato: foliis donato paucis, viridibus, oblongiusculis, mollibus, integris, in ambitu quasi spinosis, flore luteo. In Stolbergensibus apricis montibus.

HIERACIA VETERVM

CAP. V.

Hieracii, vel Hieraciæ sœm. gen. vt apud Aetium & nomen legitur (referente uermol.) magni & parui meminit Dioscor. his verbis. Hieracium magnum caulem producit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia habet ex interuallis rariùs fissà, Sôcho per ambitum similia: flores melinos in oblongis capitibus. Vim habet refrigerantem modicè adstringentem. Quare stomacho æstuant, & inflammationibus commode imponitur. At succus si sorbeat, stomachi roisiones mitigat. Herba ipsa cum radice imposita, à Scorpioneictis auxiliatur. Hieracium paruum folia etiam ipsum ex interuallis fissà per ambitum habet: caules producit teneros ac virides, in quibus flores melini circulum absoluentes. Vim habet & ipsum eandem cum prædicto. Plinius lib. 10. cap. 7. de Lactucæ spontè nascentis generibus agens. Ex his, inquit, rotunda folia & breuia habentem, sunt qui hieraciam vocet quoniam accipitres scalpendo eam, succoque oculos tingendo, obscuritatem quam sensere discutiant. Estigitur ex Lactucæ generibus hieracium.

Galenus in simpl. censu id præterit, velut sub Lactuca comprehensum. Ita etiam Aëtius & Paulus.

ἱεράκιον Dioscoridi (inquit C. Bauh. Phyt.) Accipitrina, ab accipitre qui *ἱεράκιον* nomen habet, cognominatur. Dicitur & *σχημα*. hieracium quidem ab accipitre nomen habere testatur Turnerus, sed propterea fortè quod pappi eius viles sint ad vomitum accipitribus ostendendum.

Hieracii nomine plures donantur plantæ, facie & facultatibus admodum diuersæ. Plinius enim (teste C. Bauhin.) hoc inter Lactucam siluaticam refert, & cum ea confundit.

Quam nos Lactucam muralem luteo flore inscripsimus, Cæsalp. hieraciam vocat. Condriam Creticam Gein. de hortis hieracium maius Creticum satium appellat.

Buglossum luteum an sit hieraciū maius Creticum, querunt nonnulli: verum frustra. Est hieracium cum capitulis Cardui benedicti.

Reperitur hieracium quoddam Sabaudicum montanum, cuius meminit Lob. in Adu. Obs. & Ic. Plantar. Item Camer. hort. & Cæsp. Bauhin. Phyt. hieracium grandius apud Belgas Clusii, Cichoreum luteum montanum angustifoliū hirsutæ asperum C. Bauhin. Phyt. eiusdemque Cichoreum luteum pratense hirsutum, est hieraciū maius nostrum hirsutum asperum.

Est hieraciis affine Cichorium luteum. hieracium maius Fuchsi, Dodon. Lobel. Lonic. Camer. Thalii: Cæsp. Bauh. & aliorum, est Sonchus repens nostra.

Hieracium magnum venenatum à Pona missū, an eiusdem in Baldo hieracium Intybaceum flore carneo?

Hieracium foliis & facie Condriæ Lobelii, est hieracium minus quorundam.

hieracium minus alterum seu Morsus diaboli, à nobis inscribitur, hieracium minus radice præmorsa.

Pilosellam maiorem Gallorum Pontani Thalii, seu Costam herbam in Italia, alibi *Ingrasiam di Pori* vocat, vt arbitratur Camerarius, depinxit Clusius inscriptione hieracii latifolii (huic titulo nos addimus) ramosi, hirsuti.

Qui vulgo in Hetruria Terracrepolus vocatur,

Rrrr 3

Hierac.
magnum
Diosc.
Sôcho fr.
mila
Vires

Paruum

Lactuca
spontanea
Plinio.
Hierac. Gei.
de dictam.

Lactuca

Accipitri.
na.
Sanchini

Æquinocti

Lactuca
filia

Lactuca
muralis
Condriam
Cretica

Hierac.
cum capiti
tulis
Cardui
benedicti
Hieracium
Sabaudicum

Sonchus rep.
Poni
Hieracium
magnum
venenatum
Hierac. mi.
nus quibusd.
dam
Hierac. mi.
nus radice
præmorsa.

Hierac. la.
tifolium
ramosum
hirsutum

nobis, Sonchis affinis Terracrepola.

Hieracium longius radiculatum Lobelii, est Hieracium nostrum minus Dodon. longa radice.

Hieracium intybaceum Tabern. dicitur nobis

*Hierac.
macrocau-
lon iuncif.
Hieracium
maius la-
tifolium
Clusii.
An Hierac-
ium lati-
fol. monta-
num Gene-
ense.
Hieracium
montanum
Hieracium
flore in-
clinans
Hedypnois*

Hieracium macrocaulon iuncum.

habetur & hieracium maius latifolium Clusii, & alterum genus angustioribus foliis.

Hieracium Britannicum Clusii, quod Londini Cichorium montanum nuncupabant, an hieracium latif. montanum Geneuense.

Hieracium montanum latifol. minus Tabern. montani, appellamus hieracium latifol. glabrum ex valle Griethachiana ramosum.

Hieracium est nobis 5. alpinum hirsuto folio, Clusio quodammodo incano.

Hierac. montanum vel sextum Clusii, & aliud genus foliis nonnihil laciniatis.

Hieracium minimum vel octauum Clusii, est Hieracium nostrum florem inclinans: Hierac. Lobelii facie Hedypnois.

Hieracium maius Dioscoridis Tragi, hieracium minus Gesn. de hort. coll. stirp. & in Cat. pl. Lonjic.

Cordi in Diosc. & Euch. Roellin. recte à nobis inscribitur hedypnois, siue Dens Leonis.

*Hieracium
Narbonen-
se.*

Inter alia hieracia est nobis Narbonense rotundifolium monoclonum.

Hieracium foliis & floribus Dentis leonis Lobelii, hierac. 7. siue montanum laciniato folio Clusii, an hieracium monoclonum hirsutum.

Hieracii affines Intybi Species tredecim tradit Thalius.

Clusius quoque dubitat in Pann. an eius Scorzonera 4. siue humilis fibrosa radice sit referenda ad hieracii genus aliquod. Inscribitur hæc à nobis Trogopogonis species, siue Scorzonera &c.

Hieracium Narbonense falcata siliqua nominamus hieracium stellatum.

*Hierac.
stellatum
Cichorium
bulbosum.*

Sed & Cichorium bulbosum in Aduersariis Lobelii Hieracium marinum Dioscoridis alterum cognominatur.

*Dracuncu-
lus.*

Gesnerus tandem inter ascriptitia Dioscoridis Dracunculum Hieracium appellat.

HIERACIUM MULTIS, ALIIS

Cichoreum luteum, hirsutum & glabrum, vel minus hirsutum.

Hieracium luteum hirsutum.

Descriptio



Facie tota Cichoreo sylvestri proximum, radices crassas habet & longas, fibratas, lac fundentes amarum: unde caules plures surgunt cubitales & plusquam bicubitales, multis alis concavi, canaliculati, rubentes, aliis admodum hirsuti, aliis ferè glabri, inanes: folia ortu primo tam Cichoraceis si-

milia, ut distinguere sit difficile, præsertim in eo genere quod folia habet hirsuta: sit enim nonnunquam, ut, præterquam per nervi longitudinem, reliqua folii pars glabra sit: sunt ea autem Cichorii modo sinuosa, aliis Dentis Leonis ritu profundius incisa: flores pediculis singuli donati, Lamplææ florum forma, nonnihil maiores, simili-

Hieracium luteum glabrum, seu minus hirsutum.



lites lutei, ex capitulo canaliculato hirsuto, qui in pappos abeunt. Semen relinquuntur minutum, striatum, fuscum. Icon prior à nobis proposita est ex Fuchsianis: secunda Lobelii ab eo pro hedypnoide Plinii exhibita.

Dodon. gall. hedypnois, Intybi 4. species, hedypnois Plinii, German. Geel negwart, Gall. Cichoree iaulne. Belg. geel Cichoree. Descriptio Dod.

Item.

Synon. Hedypnois.

Dodonæus.

côuenit cū nostro hieracio, ubi locis cultis & humidioribus prouenit, licet figuræ flos maior videatur, & in descriptione minor dicatur flore Dentis Leonis.

Lobel. in Aduers. hedypnois Plinii, Cichorium luteum pratense, Dents Leonis flore, hieracii folio: & an eadem sit Verrucarum Cichorium, luteo flore, & sulcatis capitulis? Obs. hedypnois Plinii, Aphaca Theophrasti. Lobelium nesciuitse de qua planta scriberet satis ex eo apparet quod dubitat in Aduers. an sit Cichorium verrucosum, & in Obs. cum putauit Zacintham eandem plantam cum Condrilla Clusii. Figura quam assumpsit pro hedypnoide Plinii est ex Dodonæo. Plant. icon. hedypnois Plinii & Aphace Theophrasti: Cichorium luteum pratense Dentis Leonis flore, hieracii folio. Item hieracii folio. Item hieracium foliis & facie Condrillæ. Prima figura est Dodonæi minus hirsutum demonstrans & cultum.

Hedypnois Plinii.

Aphaca Theoph.

Lobel. nesci.

March. in hist. Germ. & Epit. iconem habet hapro Chondrilla 1. Klein Sonnenwirbel, quæ retinuit Camerarius quæ nobis videtur exprimere potius hieracium, de quo hic agimus quod penè glabrum.

Aphaca.

An Cam. hort. Chondrilla tota hirsuta frequens in massa, quam in cibo coctam, & acerrari quoque instar conditâ, auide comedunt? Item hieracium foliis & facie Chondrillæ Lobelii? An Chondrillæ nomine intelligat hieracium hirsutius asserere non ausim: lectores diiudicent.

An Thal Intybi sylvestris seu Cichorii sylu. flore luteo species quarta.

Lectoribus considerandum relinquo an Tabern. Dens leonis tertia de qua in Icon. & histor. non sit eadem planta cum Dodonæi hedypnoide. Is autem in hist. per hieracium Chondrilloides idem

idem fortè intelligit quod Lob., verum exactam descriptionem non habet, quâ distinguat ab aliis, nec iconem, sed pro iconem, sub N. 12. nescio quo errore scriptum, *Blauw habichtfrant* hieracium caeruleum: in descriptionibus nullius coerulei hieracii fit mentio.

Cichorium luteum C. Bauh. Phyt. Cichorium 9. siue luteum alterum, vel Hieracium minus glabrum. Hedypnois Dod. Hedypnois Plinii. Item hieracium 14. siue Chondrilla folio maius: *Apud Matthioli.* hieracium maius Matthioli. Fuchf. Dod. gall. Lac. Lob. Castori, Tab. hieracium magnum Cæsalp. hieracium minus Dalechampi: Lugd. Taraxacon maius Lonicero. *Frater* proponit pro Hieracio maiori Matthioli iconem Tabernamontani Hieracii maioris: verum ea differt multum à Matthioli iconem, à Fuchsiana, à Dodonæi, à Lacunæ, à Lobelii, à Dalecham. & Loniceri: hi enim omnes proponunt iconem Sonchi nostri repentis. Descriptio apud Cæsalpium non videtur malè conuenire Soncho nostro.

Dens leonis Gerard. Dens leonis Cichorizata, Succorie den de lion. Item Hieracium maius Dioscor. *Great hanke weede.* Iconem habet propositam à Tabern. pro Dente leonis tertia, sicuti etiam Hieracii eo titulo exhibiti: cur titulos mutat absque figuris?

Gerard. met. Lonic. habichtfrant/ wilde sawdisel *1624. 1625.* maius, Accipitrina, Apulei Lactuca silu. Pharmacopæorum Cichorea lutea. Lonicerus Hieracii historiam habet, quæ nostro Hieracio magis hirsuto conuenire posse videtur, licet figura non respondeat, est enim Sonchi repentis.

Lonic. 1624. An Clusio in Pann. & Hist. pol. Hieracium grandius apud Belgas. An Thallio Intybi siluestris, seu Cichorii silvestris flore luteo, foliis integris, species quarta? Hieracium multis, hirsutum valdè, Genue abundat florens mense Maio. Montpelii Martio & Aprili. Montbelgardia abundat in Herbo E. C. florens Iunio spontaneum, semine cum pappis decidentibus Iulio. Id etiam Basilez inueni cu flore mense Octobri quâ itur Moutets. & propè fluuium Birsam, hoc glabrum est, aut saltem non ita hirsutum vt aliud quod maius hirsutum dicimus, modò paruum modò magnum. Hieracium vulgare glabrum copiosè nascitur in agris Basileensibus, vbi florere solet adhuc mense Nouembri.

HIERACII PARVA SPECIES HYOSERIS angustifolia aspera.

Descriptio



Exigua, sed crassiusculâ donatur radiculâ, succisâ nonnihil, ac hî præmorfa esset, pluribus fibris ornata: foliis longis & angustis, hirsutis, in terra sparsis: caulibus duobus aut tribus, glabris, à radice prodeuntibus, nò multò plus palmum longis, versus superiora, vt plurimum, in bi-

nas alas diuisis, quarum extremitatibus insident flus vnicus luteus, plenus, satis magnus: tota planta amaricantis est saporis, Tabern.

Tab. icon. Hyoseris angustifolia: hist. hyoseris altera, Hein ferdslein frant/ hyoseris angustifolia. hyoseris formella. C. Bauh. Phyt. hieracium 21. siue minimum angustifolium.

Lucos multum amat: frequens etiam in solo arenoso, gramineo, & secus vias.

Synonyma
Hyoseris angustifolia siue formella

HIERACIVM PVLCHRVN.



Ad Dentem Leonis Descriptionem
Leonis laciniis & Cichorii siluestre accedunt huius folia, forma & hirsutie, prima verò minus laciniata, alia alternatim per caulem, at saporem nullum manifestum gustanti offerunt, quòque altiora eò minora redduntur: caulis vnicus, rectus striatus, cubitalis hirsutus, foliis alternatim orientibus amictus, quæ sine pediculo latam habent basim cum alis: flores in cacumine numerosi, ex pediculis propriis, hieracii similes, lutei, in pappos facillentes: radix non magna cū fibris aliquot crassiusculis. Hoc hieracium vidimus montpelii florens Maio.

HIERACIVM ERVCÆFOLIVM hirsutum.



Hieracium à Genere Cherlero nobis delatum, quod vt hieracium nostrum pulchrum singulari affurgit caule ad altitudinem pedalem, penitus hirsuto, foliis vestito etiam hirsutis, vncialibus, aut sextantalibus, cineracei coloris, laciniis Cichorii Erucæ circumrosis, extremo folii ferè triquetro. Flores

in summo caule vnicus autus maiusculus.

HIERACIVM PVLCHRVN RAMOSVM Sprengerianum.

Inter succas meas herbas plantam perelegantissimam

R 150 4

Descrip.

tem adseruo sesquicubitali altitudine, necdum integram, pilosam, aliis minoribus ramis, alterno sicu ex longa distantia brachiata, ad quorum alas *berent* internae quidem ex principio angulato longa, ac



doctantalia, ferè sesquicunciam lata, profundis & amplis incisuris ordine quodam serrata, ac penè laciniata, nervo insigni per medium excurrente: superne verò folia breviora lato principio ac veluti alis caulem amplectuntur perfoliatae instar. Flores in summitatibus lutei quales in Hieraciis in singulis ramis qui-

am, seni, plus minus, qui temporis progressu in pappo fatiscunt. Tota planta pilosa potissimum in extremis ramis in quibus pili longiores: Pictor non fatiscit nobis, pauciores pinxit flores. Hanc plantam collegimus Heidelbergæ in cultissimo orto insignis Pharmacopœi & Botanici D. Sprengeri, florentem Iunio.

tem.

Locus & tempus

SONCHUS LANATUS Dalechampii.

Descriptio



IN cubitalem altitudinē & ampliorem excrevit, foliis per caulem crassiusculum pilosum, que fortuito dispositis, duarum triumve unciarum longitudine, eulmi latitudine, nonnihil sinuatis & subinde veluti eoriosis, ad cyani folia nonnihil accedentibus nervo unico secundum longitudinem excurrente, tomentosis, nullo

pediculo nixis, ad quorum radices ramuli enascuntur: superior pars caulis ramosior in plurimos surculos molli lanugine obsitos diuaticatur: flores gerens aureos Esigerontis, tandem in pappo fatiscunt, calycibus circumdatos, tomento delicato & molli pubescentibus: radice nititur satis crassa & longā, non multum fibrosa, planta sicca nonnihil amarā: Interdum hæc palmaris est foliis minoribus laciniatis.

Varinas.

Hist. Lugd. Sonchus lanatus. Quidam Molluginem appellant, quamvis à Plinii Mollugine

diuersa sit.

C. Bauh. Phyt. Sonchus 11. villosus luteus.

Montspeli propè Peraux inueni, in saxosis & apricis, florens Iunio mense.

Locus & Tempus.

Tota planta lacteo succo rurgit, Cichorii more, gustuque amaro prædita est, sed minùs quam reliqua Cichorea, quorum & facultatem obtinet, licet imbecillior.

HIERACIUM LATIFOLIUM MONTANUM Geneuense folio Conyze maioris Montspeli.



Caules editi plures cubitales, ac etiam maiores, cauos, crassos, hirsutos, qui superius in aliquot breues ramulos diuisi, flores gerunt luteos, magnos, Hieracii capitulis asperis pares: tandem in pappo euanescentes: folia infima Conyze Montspeliensis maioris foliis paria, palmari circiter longi-

Descriptio

tudine, vnciam lata, sinuata nonnihil, & quasi serrata, per caulem alternatim sunt disposita, caulem modicè amplectentia, hirsuta, potissimum parte inferiore, minùs tamen aspera quam Hieracium asperum. Radices fibrosæ, crassiusculæ, nigricantes & crassis capitibus. Suspiciamus hoc traditum à Clusio pro Britannico.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 6. siue Conyze folio caule purpurascēte. Hieracium Britannicum Clusii. An Hieracium montanum maius latifolium Tabernamontani? Hieracium Tabern. separo à Clusii & nostro Geneuensi: quia Tabern. folia non habet Conyze: sunt etiam Tabern. autem folia tenuia & mollia, siue non rigida.

Hierac. Conyze folio.

C. B. nov.

Hieracium latifolium inueni in montibus circa Geneuam folio Conyze Montspeliensis maioris. Hieracium Britannicum Clusii, impenitè amara est planta, nusquam spontè nascens ipsi conspecta: sed Londini duntaxat, in hortis Doctiss. virorum Ioannis Richzi & Hugonis Morgani Pharmacopolarum Regionum, ex borealibus Britanniae regionibus, in quibus spontè crescit, delata. Floret Iunio & Iulio, semen Augusto maturum.

Locus.

HIERACIUM PANNONICUM LATIFOLIUM Clusio, Pilosellæ maiori, siue Pulmonariæ luteæ accedens, maculatum & non maculatum.

HVIC quina aut sena sunt folia, humi strata, lata, lntybo sariuo latifolio non multum dissimilia, per ambitum nonnihil sinuosa, interdum etiam laciniata, mollia, hirsuta, nigricantibus

Descriptio

his maculis frequentissime infecta, interdum minime, lacteo succo turgentia: e quorum medio



caulis exit cubitalis, cauus, raris foliolis septus: in quo plerumque vnicus (interdum alter & tertius) flos ex crassiusculo calyce, nigraque lanugine hirsuto emicat. Hedipnoidis flori similis, sed pallidior, plenus, aliquantulum odoratus: semen oblongiusculum, fuscum, pappo sa comâ, ut in Tragopogo, præditum, quod maturum leuiss-

imo statu dispergitur: radix illi minimi digiti crassitudine, nigro atque crasso cortice obduta, lactei succi plena.

Clus. in Pann. & Hist. post. Hieracium Pannonicum siue latifolium primum.

Camer. hort. *Costa* herba in Italia alibi *ingrassia di porci*, & quam ex icone cognoscere possum, conuenit cum Hieracio latifolio Clusii. Item Hieracium latifolium Pannonicum. Item apud Thaliu, Pilosella maior Gallorum Thali, quam ut arbitratur, depinxit in Pann. Clusius cum inscriptione Hieracii latifolii.

An Thal. Harc. Pilosella maior Gallorum, siue plantam nominabat.

Tab. icon. & Hist. Hieracium phlomoideis vultu habet: is maculatum non meminit.

Assumptissimam figuram Clusii, in qua 4. crantem folia, quia defuit nobis vitens, postea Deo fauente melior icon proponetur.

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 2. siue latifolium hirsutum maculatum.

Gerard. Hieracium 1. Clusii, The first haute weede of Clusius.

Inuenitur plerisque Hungariae, Austriae superioris, atque Moraviae montibus, gramineis & simul apricis locis, siccioribusque pratis. Inueniebam etiam (inquit Clus. in post. hist.) & maculis liuidis, & nullis maculis insignito folio, siccioribus circa Francofurtum pratis. Floret Maio, semen plerumque maturum Iunio.

Hieracium maius latifolium Pannon. 2. Clusii.

Cubitales atque etiam bicubitales interdum sunt huic caules, firmi, rotundi, quadam lanugine obfusi: quos inordinata, siue confuso ordine nascentia, multa ambiunt folia, tres vncias aut amplius longa, vnum lata, mollia, in ambitu dentata, lacteo succo plena: summus caulis in aliquot ramulos hincit, sustinentes imbricata capitula, e quibus prodeunt flores lutei, denis, duodenis, aut pluribus foliolis, extrema parte incisae, constantes: medium occupantibus multis luteis fibris: radix minimi digiti crassitudinem aequat, multisque tenuibus fibris capillata, singulis annis augefcit, & ad litora nouos, frequentioresque caules profert.

Eius genus inuenitur graciliore caule, angustioribus, & vix semunciam latis foliis: in reliquis conueniunt.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium maius latifolium siue Pannonicum secundum.

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 3. latifolium foliis mollioribus & dentatis.

Nascitur cum sequenti in extremitatibus sicciorum pratorum inter vepres, etiam ad caeduarum siluarum margines.

Hieracium maius angustifolium Pannonicum 3. Clusio.

Cubitales & huic assurgunt caules, rotundi, superioribus minus crassi, & frequentiore asperiore lanugine obfusi: quos similiter ambiunt confuso ordine multa folia superioribus angustiora, breuiora, atque etiam dura, nec minus lacte turgentia, summus caulis diuiditur quoque in ramulos imbricata capitula sustinentes, e quibus exoriuntur flores superiori ferè similes: radix non adeo crassa quam superioris, sed non minus fibrosa, nec in nouis proliis educandis minus teritilis. Illius etiam genus alterum obseruauit author angustioribus foliis & multo longioribus, licet non minus duris, quod alioqui tota quodammodo facie ipsi responderet.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium maius angustifolium, siue Pannonicum tertium.

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 4. angustifolium caule aspero.

Hieracium alpinum hirsutum folio 5. Clus. quodammodo incano.

Aliquot sunt huic folia e radice prodeuntia, vncialis ferè latitudinis, oblonga, molli crispaeque



lanugine admodum hirsuta, & quodammodo incana, lacteo succo prædita: e quorum medio caulis pedalis plerumque emergit hirsutus, quem per intervalla ambiunt folia superioribus breuiora, at triplo latiora, & in mucronis desinentia, non minus quam illa hirsuta, aut lacteo succo prægnata: vnicum in summo fert capitulum

e multis hirsutis & incanis foliolis compactum (nonnunquam in lateribus alterum & tertium) quod in florem sese explicat Hieracii floribus similem, multis foliis lacteo colore prædictis constantem, qui deinde in pappos cum suo breui & nigro semine euanesceit: radix nigricat, multis candidantibus fibris prædita est, & singulis annis novos caules profert. Tota planta admodum amara est.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium 5. alpinum

Costa.
Ingrassia
di porci.
Pilosella
maior Gal-
lorum.

Hierac.
phlomoideis
vultu.

Locut.

Descriptio

Synonyma

Locut.

Varietates

Synonyma

Descriptio

Synonyma

hirsuto folio. An porro (inquit Clusius post. hist.) ea planta quam Dalechampsius Sonchum lanatum appellat?

Locus
tempus.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 5. montanum hirsutie incanum. Camer. hort. Hieracium 5. Pannonicum. Gerard. Hieracium 5. Pannonicum. Clusius, kind of harte weede. Tabern. Ic. & hist. Hieracium latifolium montanum.

Inuenitur in herbolis Alpium iugis, ubi Iulio, interdum etiam Augusto floret: at in hortis Maio, semen vero Iunio perficit. Prouenire observauit Tabern. in Deschgeberg, & in Schwarzwald [Harcynia] in supremis montibus inter Greyßbach, Auegast & Rabelsauer fontes acidos.

LAMPSANA VETERIBVS. CAP. VI.

Napum
Lapathum.

Lampsana (ita tradente Dioscoride) siluestre lolus est, plus alens, stomachoque vtilius, quam Lapathum. Huius folia & caulis cocta eduntur. Hanc Romani Napum, Aegyptii Euthine vocant, Graeci, inquit Hermolaus, Lampanem.

Lap. an.

De Lampsana Plinius lib. 19. cap. 8. haec scribit. Nec non olus quoque siluestre est trium foliorum, Diui Iulii carminibus, praecipue iocis militaribus celebratum. Alternis quippe versibus exprobrauerunt Lapsana se vixisse, apud Dyrrachium, praemiorum partitionem cauentes. Est autem id Cyma sylvestris, ut rursus de eadem lib. 20. cap. 9. Inter sylvestres Brassicas & Lapsana est, pedalis, hirsutis foliis, Napi simillimis, nisi candidior esset flore. Coquitur in cibo: saluum leniter emollit.

Galen. lib. 2. de alim. de Lapsana nihil dixit, velut sub Brassicae generibus comprehensa. Verum 7. simpl. Pharm. Lapsana, inquit, si edatur malum succum gignit. Si vero imponatur, extergendi ac discutendi vim quandam habet.

Aequiuoc.

Lapsanae porro nomine plures non solum, imo penitus diuersas meminimus diuersos Autores referre plantas.

Lap. an.
Dodon.

Dodonaeus Lampsanam statuit plantam, quae teste Lobelio potius Hieracii congener, aut Sonchus cognata videatur.

Brassica

Pro Lapsana Cornarius exhibet Brassicam, quae opinio non placet, ut indicatum est lib. 1. H. n. g.

Rapistrum
flore luteo.

Veram Lapsanam Lob. Gesn. & alii Rapistrum flore luteo esse existimant, post Rapas a nobis lib. 21. descriptum.

Fagotritum
Apium,
Galla.

Rapistrum album Lampsanam vel lapsanam vocant Riss. in Diosc. Turn. in Herb. Angl. Gesn. de coll. 8. p. & in cat. pl. ac Schuenckfeldius.

Lampsana vera quorundam, Ocymum Veterum Tragi Lob. Obs. est Fagotriticum nostrum.

Aculam Rob. Const. in Lexico est Apium. Lapsanae cur dicatur Eustach. & Eucharis Roesslin de galla, mihi non constat.

Lapsana agreste olus Cordi, ex Brassicae genere, Germanis Rinsöl appellatam, quo se apud Dyrrachium vidit ille milites Caesari in triumpho exprobrauerunt, quid:

LAMPSANA DODONAEI.

Lac fundit amarum vulnerata, siue radice quam habet albam & digitalem, siue caulibus quos

supra cubitum erigit, hirsutos rubentes, caulos, concavos: siue foliis denique, quae Barbarez illae instar formatae habet, sed mollicella, hirsuta: flores autem stellati, lutei, Hieracii, sed parui: qui in pappo illi similiter abeunt.

Dodon. gall. Lampsana, ab aliquibus Napium appellata. Ruellio, ni fallor dicitur Chrysolachanum Plinii.

Synonyma
Napium.
Chrysolachanum
Plinii.
Sonchus cognatus
Lapathum

Gesn. hort. Sonchis cognatum olus, Tiguren-sibus Milderoy vocatum.

Lobelio in Aduers. Lampsana Dodonaei, qui ait perperam a Dodonaeo Lapsanae nomine esse exhibitam, quia neutiquam Sinapi, Napis, aut Brassicae congener, sed potius Hieracii. Obs. & c. plant. Lampsana, sed hoc mirum cur Lobel. nunc faciat



Lampsanam, cum in Aduersariis negarit, nec sine ratione.

Camer. hort. Lampsana Dodonaei, laetescens planta, passim obuia, in Prussia Papillaris nominata.

Tablicon. & Hist. Sonchus siluaticus 1. wilder Sonchenfraut: Sonchus siluaticus 2. Sonchus siluaticus.

Gerard. Sonchus siluaticus wood Sotterhisele. C. Bauh. Phyt. Lampsana 1. varians foliis, aliquando prorsus integris, aliquando in lacinias aliquot diuisis: an hanc Diosc. intelligat cogitandum. Item: Lampsana 1. siue siluatica, Sonchus siluaticus 2. Tabernamontani. Ego has duas non separo: lussam eam naturae duntaxat esse existimo: quod de Tabern. tribus speciebus etiam dictum sit.

Schvv. Lampsana, hanc Iam Dioscor. papillaris, wild Sonchen fraut / Kein sol / Milderhen. Fol. & Tab. liis integris & laciniosis.

Parietinis, rudibus, aruorum & hortorum marginibus frequentem eradi esse Schvvenckfeldius: quod & ego obseruasti.

Efficax est in sanandis papillis exulceratis, unde & nomen Papillaris sortita esse videtur. Resecat, abstergit, & digerit. Papillas exulceratas imposita sanat.

HIERACIUM CAPITVLIS CARDVI benedicti, maximum Buglossum echioides quibusdam.

Multifida radice nititur, crassitudine digitalis, alba, lac amarum fundente: caulibus bicubiculis radicis crassitie aequat, striatis, rubens, densissimis spinis acutis, rigidis, sed facile caulem relinquens horrens, succum itidem lacteum & vulnere fundens, ramis compluribus brachiatis: folia Buglossae, sinuosa, longa, multo magis spinis minacibus horrida: flores Hieracii, crocantes, in pappum facillentes, & calyce, thorulis hirsutis

Descriptio

pidis canaliculato. Nostram iconem melius pictam sculpsit corrupti.

Hierac. Echiodes.
Tabern. Icon. & Hist. Hieracium Echiodes, Buglossum luteum, habichfraus / Geel Ochsen- gung genant.


Lobel. in Adu. Buglossum Echiodes luteum,

quod pluris faciunt mulierculæ Anglæ, quam Buglossum Echiodes luteum Hieracio cognatum.

Casp. Bauh. Phyt. Buglossum luteum: An Hieracium maius Creticum sativum Gesn. Frustra querit Frater, non est hieracium Creticum sativum Gesneri vñ satis apparet ex historia Chondrilla Cretice semine erupo. Hieracium capitulis Cardui Benedicti maximum mihi provenit Montbelgardis in orto E. C.

Eodem anno quo lata planta caulem produxit, floruit Augusto, Septembri & Octobri: Annua est planta seipsam seminans, florer Iunio & Iulio. Basileæ in orto D. Felicis Plateri collegi semina matura fine mensis Augusti. Heidelbergæ vidi in orto Electoris.

HIERACIUM ASPERYM MAIORI flore in agrorum limitibus.



Satis crasse radice multitudine, compluribus fibris donata, colore ad buxum inclinare, lac fidentes amaro sapore, verum non insigni præditum: can- les ex eadem radice multi surgunt, teretes, striati, rigidis pilis asperi, ramosi, lacteum succum manantes, cubitales, bicubitales & altiores: folia infe-

riora quidem duobus palmis interdum longiora, sesquiunciam lata, acuminata, primum arroure- tia, post de coloris intentione nonnihil remittentia, hispida, acuminata, sinuata per margines, & aliquantulum crispa: superiora verò alternatim caulibus adherent, minora, acutiora, cæte- roquin similia: sapor vtriusque subamarus: flo-

res suis singuli pediculis modò longis, modò bre- uibus, posteriores prioribus, vt in Impla Plinii, altioribus insident, Tussilaginis floribus pares, lutei, foliola exteriora maiora, crenata, ex capi- culo ex longis foliolis multis squammato, subas- pero, quod delapsis floribus inferiore parte in ventrem canaliculatum turgescit, semen clau- dens lanugine oblitum. Cum Hieracio maxi- mo capitulis Cardui benedicti multa communia habet hoc hieracium, quod aliquando Cichorii asperum vel spinosum credideram. Figura no- stra ex Fuchianis non in omnibus placet pro nostro hieracio aspero: folia non satis sinuata.

Trago Cichorea (wegwart eidein in histor. germ.) tertia & quarta flore luteo, foliis asperioribus spinulis horrentibus: radice longa luteum succum manante, qui in gummi quasi glutinosum coagulatur, semine subluteo: ad Condrillam Dioscoridis referenda.

Thalio in Harc. Intubus silu. seu Cichorium silu. flore luteo, passim ferme in tota hircynia vulgare, duplex. Aliud foliis integris: quod rursus foliorum ratione subdividitur in quatuor species: Aliud diuisis.

Tab. Ic. Cichorium luteum, Geel wegwart: Histor. Cichorium luteum primum. Eidein in hist. Cichorium luteum secundum. Item loc. Hieracium luteum asperum, Rauch weg- marten habichfraus. Hist. Hieracium novum. Cullata descriptio & figura Cichorei 1. lutei re- spondere videtur cum nostro Hieracio, quod Fuchsius, cum Tubingæ esset vocabat Intubum luteum tertium. Quale sit Cichorium luteum 1. quod non depingit, sed tantum describit, asserere non possum. Si quis tamen duo hæc Cichoria lutea Tabernamontani, ad Hieracium de quo c. sequenti agemus, velit referre, id eius iudicio committimus. Hieracium eius luteum asperum huc collocatum volumus.

Gerard. Cichorium luteum yellow Succorie / Hyofris Plinio, Lobel. nedypnois. Item Hieracium asperum, Scharpe haude weede. Gerardus iconem Tab. habet Cichorii 1. lutei: verum an intelligat nostrum Hieracium asperum maiori flore, vel sequens, lectoribus considerandum relinquo. Asperum eius eidein est cum eo quod ex Tab. proponimus.

C. Bauhin. Phyt. Cichorium 7. seu luteum pra- tens hirsutum. Cichorea lutea vel 3. Trago. Cichorium luteum Tabern. foliis variis, aliud integris, aliud diuisis: illius ratione foliorum quatuor species, qua de re Thalio. Item: Cichorium 8. siue luteum montanum angustifolium, hirsutum asperum, quod Intubum tertium Fuchsius fecit, Scariolam tertiam Corrusus, Hieracium luteum asperum Tabern. Non separo adhuc Cichorium 7. & 8. Bauh. donec mihi constet aliqua certa differentia inter hæc duo: & an vnaqueque suam differentiam semper seruet, nolim tamen negare duas species, iudicent alii.

Hieracium quoddam asperum vel spinosum mihi aliquando Cichorium luteum nominatum, provenit passim in agrorum marginibus circa Montbelgardum, ac etiam in orto Ill. E. C. flo-rens Iulio, Augusto, Septembri, & Octobri mensibus. Frater C. Bauhinus misit Basileæ nomine Scariolæ tertie Corrusi. Provenit in Rossberg propè Magsmünster. In Ducatus Wirtembergici monte Teck & Bol in agrorum limitibus. In Alsatia asperis collibus secus agros & vineas, apud Mediomatrices verò in montanis pratis vberim gigni scribit Tragus.

Cichorium luteum.

Synonyma Cichorea flore luteo.

Hyofris Plinio.

Cichorium luteum.

Hyofris Plinio.

Hyofris Plinio.

Gerardus.

Cichorea lutea.

C. Bauhin.

Locus tempus.

Lingua bovea lutea.

Tab. Hierac. Creticum C. Bauh.

Tempus.

Descriptio.

HIERACIUM RECTVM RIGIDVM,
quibusdam Sabaudum.

Descriptio



Synon.

Intybus.

hirsuta, atrovirentia, alternatim posita: radix dura, longis fibris donata.

Lob. Adu. Hieracium Sabaudum montanum. Obseru. Hieracium Sabaudum. Iconib. plant. Hieracium alterum grandius. Tubingæ cum essem præceptor meus Fuchsius faciebat Intybi speciem.

Matthioli
Lactaris.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 18. siue angustifolium fruticosum. Hieracium Sabaudum Lobelio. Hoc Patavi latioribus & hirsutioribus foliis & caule reperitur, quod D. Guilandinus Erinum Matthioli esse assererat, & apud Galenum Militarum, apud Plinium Lactaridem, dici.

Hierac.
mont. angustifol.

Camer. hort. Hieracium alterum grandius Lobelii, rectum & fruticosum.

Tab. icon. & hist. Hieracium montanum angustifolium: Berg habichfraut mus schmalen blettern. Hieracium 14. Sabaudum dictum.

Locus &
tempus.

Gerard. Hieracium intybaceum Endioco hæc secedit. Ecce proposita icona Tabern. mutat titulum Gerardus?

Hieracium dictum Sabaudum quibusdam, in Sabaudia obseruati. Montbelgardi abundat propè vites & in pratis, floret Iulio & Augusto, plantati etiam in Horto ill. E. C. Passim reperitur in montibus ad Rhenum & circa Heidelbergam & in Ostwald, sabulosis & petris locis, potissimum circa montanas arces Stadenburg & Schönenburg/ in Hareynia.

HIERACII SABAVDI
varietas duplex.

Descriptio

Acepimus à fratre C. Bauhino Lactaridis siue Erini Matthioli nomine plantam licet accedentem ad hieracium Sabaudum, si non idem: in foliis tamen discrimen, vel lusum: in caule cubitum excedente, folia, priora, alternatim disposita, vncias duas longa & pollice angustiora, ovalia ferè, non crenata, qualia à Matthiolo pinguntur superiora, quosdam dentes habent, hirsuta sunt: flores similes Hieracio Sabaudum, lutei, in pappos euanescentes. Idem nobis misit cum hac inscriptione Plantam cuius etiam i-

conem damus, Lactaris & Militaris Plinii, Erini Matthioli species, Guilandino Patavi. Hec sanè multum variat si non diuersa planta in caulis cubito altioribus hirsutis, folia alternatim quasi sita, aversa potissimum parte hirsuta, tres pollices longa, duos lata, in acumen desinentia, pulchras habent lacinias acutas, quæ in superioribus ramis breuius sunt & lata, in ramorum extremitatibus flores quales præcedenti.

An Erinus Matthiolo? Non est Erinus, teste

Hieracii Sabaudi varietas. Erinus quibusdam Mac. dicta;



Hieracii Sabaudi varietas alscera.



fuit describere: sed pingendam curauit plausible in vulgus Pharmacopæorum iconè, quinis, ne pluribus, erectis de cespite caulis: Ocymi folio, bino, nonnihil crenato, per intervalla donata, nullà additâ prorsum, quæ dubiam vel fidem, plantam fulciret, historiâ: cuius picturæ quum cum puerisset, postremò de vltimis Commentariorum interpolationibus curauit expungendam, nullam interea in huius misellæ sobrepitiam locum suffecit: ac ne verbum quidem subdidit, quâ id de causa dempsisset.

Synon.

At arch. op. pimo capla. decor.

Disse. explicat.

Matth. corpus.

Lacu.

Lacuna Matthioli exhibet figuram falsam atque vocari Erinum barbarice Herbam lactis, & Lactatiam, nonnullosque per Erinum Balsamiram maiorem intelligere.

Cast. Dur. Erinus, Basilicum aquaticum. H. Lugd. Erinus Matthioli. Sed & Lonic. figuram malam Matthioli habet lib. 5. cap. 341. ubi Wasser Basiliens. Erinus & Echinos Dioscoridis, Ocy-mum aquaticum vulgi, Lactor, Herba lactis, Militaris, & Anabula cognominatur.

C. Bauhin. Phyt. & apud Matth. facitur se ignorare quid sit Erinus Matthioli, pro eo autem ipsi ostendebat Guilandinus Hieracium quod Sabaudi nomine Lobelius proposuit.

HIERACIUM MINUS PRÆMORSA radice, sine Fuchsi.

Descriptio



Per terram spargit, sua longa quædam, ad radicem partem laciniata, sic ut interdum laciniæ oppositæ sicut respondeant, alias vero non item, sedque ex brevioribus, vel longioribus interualis, hilaris virore splendens, sapore & succo lacteo cum eiusdem classis aliis conveniens, si quibus donata pilis, si rari sunt:

inter hæc *caulis* erigitur modò unus, modò plures, cubitales & sesquicubitales, nudi, striati, inapnes, circa summum in alas aliquot divisi: quarum singula singulos sustinent flores luteos foliosos, & calyce oblongo, modicè squamato, incano, lanuginoso. Radix fibrata, imò parte præmorsâ nigricat, per cætera candicans, lacte turgida. Hæc sanè planta insigniter variat magnitudine & laciniarum diversitate.

Synon. Fuchsi. hist. Hieracium minus. Tragus nullam habet figuram sui hieracii minoris, Morfus Diaboli appellari, eandem autem figuram, quam Fuchsius & Dodonæus habent, ponit cap. 88. sub titulo Lagopi basenstrauch, unde transpositionis suspitio: inibi enim descriptio non videtur quadrare figuræ.

Matth. in Dioscor. eandem habet figuram, cui inscriptio est, hieracium minus: interea pro suo more non describit. In com. Ital. & Lat. cum mag. fig. ceu & Epit. Camer. eandem quoque retinet, descriptionem quidem apponens, sed quæ non quadrat figuræ: folia enim non sunt asperiora quàm in Cichorio. Nec ea mutat in Hist. germ. Camerarius, sed descriptionem inibi diversam addit, quæ non facit mentionem asperitatis foliorum.

Hæc an hieracium minus præmorsâ radice bene fuerit notum Gesnero de hortis, dicenti: Pro hieracio minori Matthioli herbam Sôchis cognitam exhibet, quod ad vires parum interesse puro & Dens Leonis.

Tom. II.

A Lonicero pingitur sub titulo basenstol/ vocaturque in descriptione basenstolch / Lactuca leporina, basenstrauch / oder Semmelf / Sôchus non aspera, Lactucella, Cicerbita, & Lactuca Gallorum.

Lacuna nomine hieracii minoris, quod quoddam Dentem Leonis vocare scribit, solam proponit figuram. Verum hieracium hoc non solet dici Dens Leonis sed è contra Dens Leonis quibusdam existimatur Hieracium minus.

An Anguill. Lactuca leporina Apulei, Cæzalepre, & Hieracium minus Dioscoridis. Item postea hieracium minus. Romæ & in Hetruria Cæzalepre, quo in cibus & potissimum in acetariis veniunt.

Lob. Aduers. [ubi & morfus Diaboli vocatur:] Obs. (ubi ipsi Lagopus & Lactuca Leporina Tragi videntur) & Ic. Pl. Hieracium minus præmorsâ radice.

Tabern. Icon. Hieracium minus Dioscoridis: Hist. Hieracium secundum de postea inter nomina, *ipsum* *inest* & *ipsum* *inest* Dioscoridis, Accipitina minor Herbariorum, Sitchelade & Sitchelade Africanorum, Hispanorum *Coyon de Galbo* *hierna*, i.e. herba testiculi galli, Ic. Hieracio *nunre*, Angl. *lytle hawk* *wede* / Belg. *bas uidecrust* / Germ. *klein habichstrauch*. Item Icon. Hieracium nigrum, schwarz habichstrauch, Hist. Hieracium tertium. Adhæc Icon. Hieracium minus, Lactuca leporina basenstrauch / basenstolch: Hist. Hieracium quartum. Tandem Icon. Hieracium aphacoides, habichstrauch: Hist. Hieracium quintum, quod Aphacæ Theophrasti simile sit.

Camer. hort. Hieracium minus Matthioli, *stent* *herba*: Gerard. lib. 2. cap. 31. proponit icones Tabern. sub his titulis, hieracium minus Dioscor. Hieracium nigrum, Hieracium leporinum, Hieracium aphacoides.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 16. siue minus, Itē Hieracium 15. siue Chondrilla folio minus, Hieracium Aphacoides Tabern. Apud Matthioli, hieracium minus.

Hort. Lat. Hieracium minus præmorsâ radice, Lactuca leporina basenstrauch / basenstolch.

Hieracium præmorsâ radice inueni Genevæ in pratis circa *Arve* fluvium, floret Iunio, Iulio & Augusto. Frequentissimè circa Basileam. In Ducatu Wirtembergico, ad fontem Admirabilem floret Augusto, Septembri & Octobri.

HIERACIUM MACROCAVLON IVNCE non siue minus primum Dodonæo.

Ex radice crassa, albâ, amarâ, succo lacteo prægnante, complures exeunt caules cubitales, interdum triubitales circiter, angulosi, læves, atrovirentes, concaui, in ramos aliquot divisi: flores singulis circulis insident singuli, Hedyphoidis, lutei, ex squaroso modicèque hirsuto capitulo emicantes, semine succedente rusto, longo, ad tactum nonnihil aspero, cum papposo tomento: folia pleraque omnia ex radice statim orta per terram sparguntur, Sonchi laciniati, interdum plus minusve laciniati in obversum mucronem desinentia, tenera, hirsuta, raris & longiusculis pilis, nonnihil amara.

Dodon. gall. hieracium minus primum inscriptum, dixitque appellari à nonnullis *Inybam* *grece*, aut *Lactucam* *minorem*, Germ. *klein habichstrauch* Belg. *klein habichstrauch*.

Lact. leporina.
Cicerbita.

Lactuca.

Cæzalepre.
Anguill.

Accipitina.
Coyon de Galbo.
Hierna.
Testiculi galli.

Hieracium.
Aphacoides.
Icones 4.
Tab.
Figura 4.
Gerardi.
Hieracium minus.
Hieracium nigrum.
Leporinum.
Aphacoides.
Pieris.
Thompson.
Amarog.
Gaza.

Locus & Tempus.

Descriptio.

Synon.
Dens Leonis.

Lob. Adu. Obs. & Icon. plant. Hieracium longius radicum.

Tab. Icon. Hieracium Intybaceum. *wegwarsen* / *habichfraut* : In hist. Hieracium textum.

Item Hieracium macrorhizos, *habichfraut* : In hist. Hieracium septimum. Item icon. Hypochæris, Porcellia, *fördlein* / *frant* : In hist. Hypochæris.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 8. siue Dentis leonis folio, radice oblonga. An Apargia Theophrasti. - hist. 9. Hieracium 9. siue Dentis leonis folio alterum unicaule. Hieracium 6. Tabern. Hieracium 11. siue dentis leonis folio minus, Hypochæris Tabern. Antè dixi coniungam prædictas plantas, verum nescio quare Hieracium 6. Tabern. dicatur unicaule, quandoquidem in descriptione ramolium faciat, & figura quoque id indicet.

Gerard hypochæris, Porcellia, *Swines Succocie*. Item Hieracium longius radicum, lang rooted *haufe weede*. Icones Tabern. habet.

Montpelii observavi florens mense Maio ad ripam fluminis propè Castelnèuf, ubi in pratis solet provenire. Genevæ in muris. Montbelgardii etiam in horto Ill. C. Wirt. spontè, semine maturo Iulio, ac florens Augusto. Frater C. Bauh. Basileæ collectum misit nomine Hieracii longius radicati.

HIERACIUM FLOREM INCLINANS.

Delicatio



Radix compluribus fibris donata lacunarum: *folia* in orbem per terram spargit multa, Dentis leonis, hirsuta, aspera, spithamea & longiora, alia caulibus adnascuntur: atque hi plures ex radicis capite oriuntur, nonnūquam in ramos divisi & foliis donati, alii nudi, tenuiores, simplices sesquipalmares & bipalmares: sed

enitum hi, tum illi terram versus nutant expandi, spinulis rubentibus, ut & foliorum dorso costa, asperi, *flores* hieracii, lutei, nutant, in pappos abeuntes: ad radicem florum caules crassescunt interdum quā parte se contorquent: *semina* longa sunt, nigra, inuoluta quibusdam partibus similibus seminibus longioribus Calthæ. Lobel. Icon. Pl. Hieracium facie Hedypnois. Teut. 182.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 17. siue minus alterū capitulo inclinato. Hieracium 21. siue minimum latifolium. Hieracium minimum, vel 8. Clusio.

An Clusio in Pann. hieracium 8. siue minimum: hist. post. hieracium 9. siue minimum?

An Tab. Icon. hyoleris latifolia, hyoleris mascula, *flein ferdlein* / *fraut* : In hist. hyoleris. 1.

Gerard. Anglo hyoleris mascula *Male Swines Succorie*.

Prope Montspelium observavi florens Aprili & Maio ubi caules solent esse simplices: Montbelgardii in horto Ill. C. à me satum, folia maiora, minus laciniata, caules diuariantur, floret etiam Iulio. Basileæ collecti semen maturum Augusto in horto D. Iacobi Zvingeri.

HIERACIUM MONTANVM

maius latifolium.



Radice nititur breui, nigro-incanā, succisā, digitum amorem crassitudine equare fibris multis, albis, in extremitate bifurcatis donatā, lacte prægnante, saporis multum amari: *folia* longis, latis, crispis, ex albo incanis, rigidā lanugine obductis, Hieracii Echiodis folii in modum effigiaris, sed duplō latioribus, breui petiolo herentibus, caulem amplectentibus, præsertim inferioribus, breui petiolo herentibus, acuminatis. Inter folia ad finem Augusti procedit *caulis* rotundus, asper, pilosus, spithamam unam & mediam longus, quandoque in duas aut tres alas diuitus, in quibus *capitula* crassa exoriantur, multis foliolis constantia: *florē* producentia luteum, plenum, qui cum alii huius generis in floccum abit, ac una cum semine nigro ventis dispergitur. Tota planta lacte turget.

Tabern. icon. Hieracium montanum maius latifolium: hist. Hieracium 11. siue montanum maius latifol. *Groß Berg habichfraut* mis breiten blettern secundum.

Gerard. Chondrilla Hispanica, flore purpureo. Quam plantam intelligat Gerard. nescio: icon est Tabern. qui non designat Hispanicam sed Germanicam plantam floris lutei, Icon hæcerat ponenda c. 32. pro Hieracio latifolio, *Broad leaved haufe weede* / *vbi* pro eo male ponitur figura Cichorii Tabern.

Gerard. Chondrilla Hispanica, flore purpureo. Quam plantam intelligat Gerard. nescio: icon est Tabern. qui non designat Hispanicam sed Germanicam plantam floris lutei, Icon hæcerat ponenda c. 32. pro Hieracio latifolio, *Broad leaved haufe weede* / *vbi* pro eo male ponitur figura Cichorii Tabern.

Hort.

Hort. Luf. Hieracium montanum maius latifolium Groß bleterich hapißkraut.

Locum. narynię summis montibus incola, inter Griesbach/ Antegast/ vnnde dem Rabelgatter/ Saubrunnen.

HIERACIUM LATIFOLIUM GLABRUM ex valle Griesbachiana.

Descriptio



Priorē hęc amulatur, licet radix minor sit, & folia angustiora, & paulo breviora, inferiora etiam longiori prædita sunt pediculo, cetera vero pediculo caret, caulem amplectētia, ad exortum angustiora quā prioris, tenera, mollia: caulis ambit in quinque, sex, aut septem staminula, quibus singulis flus in-

tidet vnicus, luteus, præcedentis floribus par, sed paulo minor: tota planta amara est.

Hier. latifolium minus.

Tab. Icon. hieracium montanum latifolium minus, Klein Berg habichkraut mit breiten bletern: In hist. hieracium 14. hieracium latifolium montanum minus, hieracium 7. siue latifolium glabrum.

Gerardo hieracium montanum latifolium, Great leaved haufe weede.

Locus & Tempus.

Hieracium latifolium glabrum obseruau in valle Griesbachiana Maio florens, vt & Tabern. descriptionis author.

HIERACIUM LATIFOLIUM PRÆMOR- sa radice, caule singulati, Pilosella maiori affine.

Descriptio



Tom. II.

Sylvas a-
mar, foliis
palmaribus,
quibusdam
brevioribus, a-
liis longiori-
bus, vix vnciā
latis, quædam
detrata in mar-
gine, breuissi-
mis pilis, &
quibusdam cō-
spicuis dona-
ta, aliis mani-
festis, quædam
in acumen de-
finunt: caulis
dodrantalis ac
etiam cubita-
lis, vnicus ra-
mus, nullis ra-

mis diuifus, sine foliis, multos in summo cacumi-
ne cōgestos flores luteos sustinens, ad instar Pul-
monarię Gallicę, qui tandem in floccos abeunt,
ad singulas diuisiones foliolum tenue angustum.
Radix fibrata & præmorsa.

Hoc nostrum hieracium videtur habere mul-
ta communia cum Inrybo & quædam Thalii in
harcinia de quo paulo pōst.

Hieracii speciem nunc descriptam, accepit
Basileā à Fratre in siluis inuentam, qui hieraciū
latifolium præmorsā radice nominabat. Ha-
bui etiam ab Vldaricho Cholio Argentinā ex
plantis D. Agerii.

PILOSELLA MAIOR QVIBVS DAM, ALIIS Pulmonaria flore luteo.



Descriptio

Hic radix
genicula-
ta, rubra, fibra-
taque, lac ma-
nus sapore a-
marum: à qua
caulis surgit la-
te similiter
prægnans cum
foliis, cubitalis,
tenuis, hirsutus,
in cuius alis su-
mitatem versus
ortis, flores in-
sident lutei, hie-
racii, qui in pap-
pos marceidi fa-
cessunt: Folia
à radice statim
exoriuntur, si-
nuosa, supernè
virentia & hir-

suta, infernè densiore lanugine canescentia,
maculis pulchris interdum notata, sapore amaro
& nitroso, pediculis subrubentibus, villosis, lō-
gis quibusdam, aliis brevioribus.

Inscribitur hęc à Trago (qui non meminit
macularum) Auricula muris maior, Groß
Meißhor: & quibusdam Germanis dicitur he-
drisch mundfraus / hoc est, Solidago Sarrace-
nica.

Synonyma
Auricula
muris ma-
ior.
Solidago
Sarraceni-
ca

Pingitur à Lonicerō Pulmonaria, quæ à qui-
busdam Gallica dicitur sub inscriptione, Groß
Meißhor / Auricula muris, quæ var., Pilosel-
la vulgi, sed descriptio non satisfacit.

Lob. Adu. Obs. & Icon. Pl. Pulmonaria Gallo-
rum flore hieracii, Auricula muris maior Tragi.
Gesn. in cat. Hyoseris Plinii, hodie fortassis
Auricula muris: De hort. Pulmonaria Galli-
ca, Lactucarum generi cognata: Scopa fortè il-
la regia Plinii ramis oblongis: Et forsā eadem
Sideritis illa Plinii, Scopa regia appellata. Ro-
bert. Const. in Amar. Pulmonaria.

Tabern. Icon. Pulmonaria Gallica siue aurea.
Hist. Pulmonarię Gallica mas. Is non meminit
foliorum maculatorum.

C. Bauh. Phyt. Pulmonaria 1. siue Gallorum fo-
llo pilosissimo, hieracii flore: Theophras-
ti lib. 7. cap. 7. & Plinii lib. 22. cap. 15. nonnullorū
Cochorus.

Nascitur Alsine, siue Auricula muris maior
Tragi in vmbrosis nemoribus, nonnunquam etiā
ex antiquis muris in perpetua vmbra sitis pro-
rumpit: lunio mense appetente caulem emittit

SSff a

An Camer horti, Trinciarella, quo nomine ex
Synonyma Italia accepit?

C. Bauh. Phyt. Dentis leonis similis Trinciarella
Camerarii. Item Sonchus s. laevis angustifolius
Lob. laevis Matth. De Sonchis consule scrip-
sit Matthiolus, maximè verò de laevi.

Locus &
tempus.

Nostram obseruauimus Montpelii & eius spe-
ciem minorem, propè Gigam florentem April.
Trinciarella Camerarii eo ipso quo scribitur anno
flores & semen producit, & si per hyemem in fi-
dili seruetur etiam in plures annos perdurat:
alioquin radices, quæ dulces quoque sunt, vt vi-
niuersa planta, primo frigore laeduntur & in-
tercunt.

CHONDRYLLA HIRSVTA. rubente flore.

Descriptio



Plures ex
eadem ra-
dice, simplice,
alba, dura, fi-
bris dona-
ta, lac fun-
dente, can-
tes attollun-
tur pedales &
cubitales, soli-
di, laetiflui,
tenuis, striati,
singularibus
foliis do-
nati: quo-
rum singulis
singuli inludēt
flores mono-
cloni, colore
ex albo purpu-
rascentes, densē

foliis per extremam oram crenatis stipati, ex ca-
lyce chorulis hirsutis caniculato, cui ad basin
haud secus atque in Hedypnoide prominula ap-
posita folia, eaque glabra: ex portò florum sub-
inde est praematura fecunditas, vt vix semuncia-
lem longitudinem allecuti caulium rudimentis,
iam tum capitula florum praeludia innascantur:
folia vel à radice statim vel ab imo caule per ter-
ram sparguntur, [nam in caule reliquo rariora
sunt] Hedypnoidis laciniis, quibus magnitudine
tamen cedunt, verinque hirsuta, odore graui:
succedunt semina longa, tenuia, cum pappo.

C. Bauh. phyt. Chondrilla purpurea foetida.
Chondrilla s. Chondrilla hirsuta rubente flore
apud fratrem Io. Bauhinum visa: An Chondrilla
tota hirsuta Camer. de hortis? Huius & altera
species duplò ferè maior, caule ramofo, folio-
latiore, flore eodem. Dux sunt in Phytopinace
eiusdem plantæ descriptiones.

Variis in locis vidi: in horto verò E. C. W. lata
Aprilis floruit Iulio & Augusto mensibus, annua est
planta, frater C. Bauhinus obseruauit Basileæ
in horto D. Zvvingeri.

CHONDRILLÆ CRETICÆ nomine missa semine crispo.

Radix Dentis leonis: caules spinulis horridi,
variè nulloque ordine in alas diuisi: Folia

lactuca syluestris: Floras Sonchi. Semen pulchrum,
incuruum, ex ceruice denticulata in rostellum
pulchrum desinens, per maturitatem rufum.

An camer. hort. Hieracium Creticum, pro En-
diuia lutea missum, semine curuo, aspero, vn-
guum modo. An Gesn. hort. Hieracium maius
Creticum satium Patavio missum? An Calsp.

Bauh. Phyt.
Hieracium so-
lntubaceum
flore magno
albido?

Locus &
Tempus.

Brenis cui
planta ante
hyemem, imò
antè Autum-
num etiam,
perit: floret
Iunio & Iulio:
Semen iisdem
mensibus ma-
turat in horto
Montbelgar-
di. Montpel-
suli florentem
obseruauit O-
tobri.



Chondrilla foliis hirsutis, flore unico,
magno, lacteo.

Chondrilla hæc species est foliis sesquiunciam
claus, longioribusque, in terra superficie ad
radicis summum dispersis, hirsutis, in ambitu la-
ciniatis, caule cubitali, amplioreque, tereti, stria-
to, recto, florem vnicum proferente, magnum, lu-
teum, in alabastrino velut calyce detentum.

Descriptio

Chondrilla radice candidula, floribus luteis paruis.

Chondrilla species radice candidula, exigua,
paruum fibrata: folia priora circa radicem
dispergens, tria, quatuorue, oblonga, ex tenui pe-
diculo protensa, integra, non dissecta, paucis ac
exiguis quasi spinulis in ambitu prædita: quibus
superadduntur mox alia tria, quatuor, quinque,
longiora, in lacinias [quæ tamen maiore inter-
uallo à se inuicem dimittuntur, atque in altera
Matthioli specie,] diuisa, hæc quo rursus consimi-
lia alia, sed breuiora, pauciora & aliquantulum
tenuiora per caulem [qui obliquè distorquetur
ac teres quidem est, sed euidenter striatus, cubi-
talis ferè] consequuntur: flores huic sunt latei,
parui. Repentem in locis pratensibus mon-
tum.

Descriptio

Chondrilla maior & minor, flore Tragopogonis lacteo.

Chondrillarum generis species quædam maior,
caule procero, striato, bicubitali, qui in summo
in aliquot brachia diuiditur, quorum quodlibet
florem singularem profert luteum Tragopogonis
floris instat. Folia caulis exerit pauca, longo in-
teruallo se consequentia, longa, lata: quorum
inferiora in ambitu parum subinde excinduntur,
superiora verò profundius circumroduntur, in-
frequentius tamen id quam in Chondrilla secun-
da Dodonæi accidit. Huius repetitur & alia
species

Descriptio

species flore confimili, caule item, sed foliis destituito: ea verò pauciora numero humi recumbunt, quorum prima lata quidem aliquantulum sunt, sed subrotundiora, reliqua longiora conspiciuntur, ac in ambitu circumrofa, sed non profundè, nec admodum crebrò.

Minor alia Huius generis & minor reperitur species, radice parua, lignosa, fibris paucis constare: caule unico, recto, cubitali, ac aliquantulum proceriori, tereti, tenui, lzui, foliis carente, quæ solummodò humi reclinantur, numero sex, septem, octo, nouem, decem, pauloque plura, quandoque quadrantalia, in ambitu circumrofa modicè. *Flor*em itidem hæc Tragopogonis æmulum profert & vnicum.

Chondrilla caule hispido, nodis multis prædita.

Descriptio Chondrillæ alia species, paulò ab hinc iam distet minoris (huius scilicet generis) speciei fermè æmula: radice parua, fibratà, nigricante: caule crasso, striato, parum hispido, nodis multis prædita, ex quibus emergunt folia oblongiora, viridiora, circumrofa aliquantulum, scabra, hirsuto dorso prædita.

Chondrilla caule cubitali aspero, floribus pappaceis.

Descriptio Chondrillæ species caule cubitali, aspero, striato: foliis quadrantali longitudine, humi sparsis, quaternis, quinis, senis, septenisve, in ambitu circumrosis modicè: iis verò, quæ caulem conscendunt, excisis, ita vt in ambitu euidenter lacinia inde relinquantur: floribus paruis, pappaceis, agminatim in summo caulis constitutis, quorum singulus peculiari petiolo innititur.

Chondrilla minor foliis in dorso rubentibus.

Descriptio Chondrillæ cuiusdam minoris species, radice singulari, quandoque & bifidà, mediocriter crassà, digiti parui longitudine, fibratà, nigra: folia exent parua, leuia, carnosa, oblongiuscula, in te gra, recurua, angusta, in dorso rubentia, numero quaterna, quina, sena, septena, octona etiam quandoque. *Coliculum* producit incuruum, rubicundum, digiti minoris longitudine, vnico donatum flore luteo, Tragopogonis fermè alicuius modo. In pratis pinguioribus nascitur.

Chondrilla parua, flore singulari, caule foliis proesus destituito.

Descriptio Chondrillæ parua species, radice parua, fibrata, ex nigro subrubente: foliis quadrantali longitudine, humi procumbentibus, asperis, mediocriter latis, viridibus, contractu facilibus, senis vel septenis, nonnunquam octonis: caule palmari, pauloque longiore, tenui, tereti, aspero, modicè cacumen recuruante, foliis proesus destituito: flore singulari, simili Chondrillæ Dodonæi alterius.

Chondrilla foliis in ambitu quasi spinosis.

Descriptio Chondrillæ alterius alia species, radice candida, lignosa, inutili: caule cubitali, minoreque vt plurimum, tenui, striato: foliis donato paucis, viridibus, oblongiusculis, mollibus, integris, in ambitu quasi spinosis, flore luteo. In Stolbergensibus apricis montibus.

HIERACIA VETERVM

CAP. V.

Hieracii, vel Hieraciæ fœm. gen. vt apud Aetium & Homerum legitur (referente uermol.) magni & parui meminit Dioscor. his verbis. Hieracium magnum caulem producit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia habet ex interuallis rariùs fissà, Sôcho per ambitum similia: flores melinos in oblongis capitibus. Vim habet refrigerantem modicè adstringentem. Quare stomacho æstuant, & inflammationibus commodè imponitur. At succus si sorbeat, stomachi rosiones mitigat. Herba ipsa cum radice imposita, à Scorpioneictis auxiliatur. Hieracium paruum folia etiam ipsum ex interuallis fissà per ambitum habet: caules producit teneros ac virides, in quibus flores melini circulum absoluentes. Vim habet & ipsum eandem cum prædicto. Plinius lib. 20. cap. 7. de Lactucæ spontè nascentis generibus agens. Ex his, inquit, rotunda folia & breuia habentem, sunt qui hieracium vocet quoniam accipitres scalpendo eam, succoque oculos tingendo, obscuritatem quum sensere discutiant. Est igitur ex Lactucæ generibus hieracium.

Galenus in simpl. censu id præterit, velut sub Lactuca comprehensum. Ita etiam Aëtius & Paulus.

Epiphon Dioscoridi (inquit C. Bauh. Phyt.) Accipitrina, ab accipitre qui *ἰναξ* nomen habet, cognominatur. Dicitur & *συχίτης*. Hieracium quidem ab accipitre nomen habere testatur Turnerus, sed propterea fortè quod pappi eius vires sint ad vomitum accipitribus cendum.

Hieracii nomine plures donantur plantæ, facie & facultatibus admodum diuersæ. Plinius enim (teste C. Bauhin.) hoc inter Lactucam situatam refert, & cum ea confundit.

Quam nos Lactucam muralem luteo flore inscripsimus, Cæsalp. hieraciam vocat. Condri- lam Creticam Geln. de hortis hieracium maius Creticum satium appellat.

Buglossum luteum an sit hieraciū maius Creticum, querunt nonnulli: verum frustra. Est hieracium cum capitulis Cardui benedicti.

Reperitur hieracium quoddam Sabaudicum montanum, cuius meminit Lob. in Adu. Obs. & Ic. Plantar. Item Camer. hort. & Cæsp. Bauhin. Phyt. hieracium grandius apud Belgas Clusii, Cichoreum luteum montanum angustifolium hirsutum asperum C. Bauhin. Phyt. eiusdemque Cichoreum luteum pratense hirsutum, est hieraciū maius nostrum hirsutum asperum.

Est hieraciis affine Cichorium luteum. hieracium maius Fuchsi, Dodon. Lobel. Lonic. Camer. Thalii: Cæsp. Bauh. & aliorum, est Sonchus repens nostra.

Hieracium magnum venenatum à Pona missum, an eiusdem in Baldo hieracium litybaceum forte carneo?

Hieracium foliis & facie Condriillæ Lobelii, est hieracium minus quorundam.

hieracium minus alterum seu Morfus diaboli, à nobis inscribitur, hieracium minus radice præmorsa.

Pilosellam maiorem Gallorum Pontani Thalii, seu Costam herbam in Italia, alibi *Ingrassiam di Perti* vocat, vt arbitrat, Camerarius, depinxit Clusius inscriptione hieracii latifolii (huic titulo nos addimus) ramosi, hirsuti.

Qui vulgo in Hecyria Testaceopolus vocatur,

R r r r 3

Hierac.
magnum
Diosc.
Sonchus sp.
milo

Vires

Paruum

Lactuca
spontanea
Plin.
Hierac. Sp.
de dictum

Lactuca

Accipitri-
na.
Sonchus

Æquinoxi

Lactuca
fla.

Lactuca
muralis
Condriilla
Cretica

Hierac.
cum capiti-
sulis
Cardui-
benedicti
Hieracium
Sabaudum

Sonchus rep-
ens
Hieracium
magnum
Gemma-
Hierac. mo-
nus quibus-
dam
Hierac. mi-
nus radice
præmorsa.

Hierac. la-
tifolium
ramosum
hirsutum

nobis, Sonchis affinis Terracrepola.

Hieracium longius radiculatum Lobelii, est Hieracium nostrum minus Dodon. longa radice.

Hieracium intybaceum Tabern. dicitur nobis

Hieracium macrocaulon iunceum.

habetur & hieracium maius latifolium Clusii, & alterum genus angustioribus foliis.

Hieracium Britannicum Clusii, quod Londini Cichorium montanum nuncupabant, an hieracium latif. montanum Geneuense.

Hieracium montanum latifol. minus Tabern. montani, appellamus hieracium. latifol. glabrum ex valle Griethachiana ramosum.

Hieracium est nobis s. alpinum hirsuto folio, Clusio quodammodo incano.

Hieracium montanum vel sextum Clusii, & aliud genus foliis nonnihil laciniatis.

Hieracium minimum vel octauum Clusii, est Hieracium nostrum florem inclinans: Hierac. Lobelii facie Hedychnois.

Hieracium maius Dioscoridis Tragi, hieracium minus Gesn. de hort. coll. stirp. & in Cat. pl. Lonjic. Cordi in Diosc. & Euch. Roesslin. rectè à nobis inscribitur Hedychnois, siue Dens Leonis.

Inter alia hieracia est nobis Narbonense rotundifolium monoclonum.

Hieracium foliis & floribus Dentis leonis Lobelii, hierac. 7. siue montanum laciniato folio Clusii, an hieracium monoclonum hirsutum.

hieraciis affines Intybi Species tredecim tradit Thalius.

Clusius quoque dubitat in Pann. an eius Scorzonera 4. siue humilis fibrosa radice sit referenda ad hieracii genus aliquod. Inscribitur hæc à nobis Trogonogonis species, siue Scorzonera &c.

Hieracium Narbonense falcata filiqua nominamus hieracium stellatum.

Sed & Cichorium bulbosum in Aduersariis Lobelii Hieracium marinum Dioscoridis alterum cognominatur.


Genus tandem inter ascriptitia Dioscoridis Dracunculum Hieracium appellat.

HIERACIUM MULTIS, ALIIS

Cichoreum luteum, hirsutum & glabrum, vel minus hirsutum.

Hieracium luteum hirsutum.

Descriptio



Facie tota Cichoreo sylvestri proximum, radices crassas habet & longas, fibratas, lac fundentes amarum: vnde caules plures surgunt cubitales & plusquam bicubitales, multis alis concavi, canaliculati, rubentes, aliàs admodum hirsuti, aliàs ferè glabri, inanes: folia ortu primotam Cichoraceis si-

milia, vt distinguere sit difficile, præsertim in eo genere quod folia habet hirsuta: sit enim nonnunquam, vt, præterquam per nervi longitudinem, reliqua folii pars glabra sit: sunt ea autem Cichorii modo sinuosa, aliàs Dentis Leonis ritu profundius incisa: flores pediculis singuli donati, Lamplanæ florum forma, nonnihil maiores, simili-

Hieracium luteum glabrum, seu minus hirsutum.



liter lutei, ex capitulo canaliculato hirsuto, qui in pappos abeunt. Semen relinquatur minutum, striatum, fuscum. Icon prior à nobis proposita est ex Fuchsianis: secunda Lobelii ab eo pro Hedychnoide Plinii exhibita.

Dodon. gall. Hedychnois, Intybi 4. species, Hedychnois Plinii, German. Geel meg-wart, Gall. Cichoree iaulne. Belg. geel Cichoree. Descriptio Dod.

Synon. Hedychnois.

Dodonæus.

conuenit cū nostro hieracio, vbi locis cultis & humidioribus prouenit, licet figuræ flos maior videatur, & in descriptione minor dicatur flore Dentis Leonis.

Lobel. in Aduers. Hedychnois Plinii, Cichorium luteum præterse, Dentis Leonis flore, hieracii folio: & an eadem sit Verrucarium Cichorium, luteo flore, & sulcatis capitulis? Obs. Hedychnois Plinii, Aphaca Theophrasti. Lobelium nesciuitse de qua planta scriberet satis ex eo apparet quod dubitat in Aduers. an sit Cichorium verrucosum, & in Obseru. cum putauit Zacintham eandem plantam cum Condrilla Clusii. Figura quam assumpsit pro Hedychnoide Plinii est ex Dodonæo. Plant. icon. Hedychnois Plinii & Aphace Theophrasti: Cichorium luteum præterse Dentis Leonis flore, hieracii folio. Item hieracii folio. Item hieracium foliis & facie Condrillæ. Prima figura est Dodonæi minus hirsutum demonstrans & cultum.

Hedychnois Plinii.

Aphaca Theophr.

Lobel. me.

Matth. in hist. Germ. & Epit. iconem habet huiusmodi Chondrilla 1. Klein Sonnenwübel, quæ retinuit Camerarius quæ nobis videtur exprimere potius hieracium, de quo hic agimus quod penè glabrum.

Aphaca.

An Cam. hort. Chondrilla tota hirsuta frequens in Hassia, quæ in cibo coctam, & acetarii quoque instar condita, auidè comedunt? Item hieracium foliis & facie Chondrillæ Lobelii? An Chondrillæ nomine intelligat hieracium hirsutum asserere non ausim: lectores diiudicent.

An Thal Intybi sylvestris seu Cichorii sylu. flore luteo species quarta.

Lectoribus considerandum relinquo an Tabern. Dens leonis tertia de qua in Icon. & histor. non sit eadem planta cum Dodonæi Hedychnoide. Is autem in hist. per hieracium Chondrilloides idem

idem fortè intelligit quod Lob., verum exactam descriptionem non habet, quâ distinguat ab aliis, nec iconem, sed pro icone, sub N. II. nescio quo errore scriptum, Blaum habidifraut hieracium caeruleum : in descriptionibus nullius coerulei hieracii sit mentio.

Cichorium lucum C. Bauh. Phyt. Cichorium 9. siue luteum alterum, vel Hieracium minus glabrum. Medypnois. Dod. Medypnois Plinii. Item hieracium 14. siue Chondrilla folio maius : Apud Matthiol. hieracium maius Matthiol. Fuchf. Dod. gall. Lac. Lob. Castori. Tab. hieracium magnum Casalp. hieracium minus Dalechampi : Lugd. Taraxacon maius Lonicero. Frater proponit pro Hieracio maiori Matthioli iconem Tabernamontani Hieracii maioris : verum ea differt multum à Matthioli iconem, à Fuchsiana, à Dodonæi, à Lacunæ, à Lobelii, à Dalecham. & Loniceri : hi enim omnes proponunt iconem Sonchi nostri repentis. Descriptio apud Casalpinum non videtur malè convenire Soncho nostro.

Dens leonis Gerard. Dens leonis Cichorizata, Succorie den de lion. Item Hieracium maius Dioscor. Great banke weed. Iconem habet propositam à Tabern. pro Dente leonis tertia, licet etiam Hieracii eo titulo exhibiti : cur titulos mutat absque figuris?

Gerard. Lonic. habidifraut/ wilde sandvisel *indistinctum* maius, Accipitrina, Apulei Lactuca silu. Pharmacopæorum Cichorea lutea. Lonicerus Hieracii historiam habet quæ nostro Hieracio maioris hirsuto convenire posse videtur, licet figura non respondeat, est enim Sonchi repentis.

Lonicera An Clusio in Pann. & Hist. post. Hieracium grandius apud Belgas. An Thallio Inrybi silvestris, seu Cichorii silvestris flore luteo, foliis integris, species quarta? Hieracium multis, hirsutum valdè, Genevæ abundat flore in mense Maio. Montpelii Martio & Aprili. Montbelgardii abundat in Herbo E. C. flore in Junio spontaneum, semine cum pappis decidentibus Julio. Id etiam Basileæ inveni cu flore in mense Octobri quâ itur Mouters. & propè fluviu Birsam, hoc glabrum est, aut saltem non ita hirsutum ut aliud quod maius hirsutum dicimus, modò paruum modò magnum. Hieracium vulgare glabrum copiosè nascitur in agris Batilensibus, ubi florere solet adhuc in mense Novembri.

HIERACII PARVA SPECIES HYOSERIS angustifolia aspera.

Descriptio



Exigua, sed crassiusculâ donatur radiculâ, succisâ nonnihil, ac præmorsa efficitur, pluribus fibris ornata : foliis longis & angustis, hirsutis, in terra sparsis : caulibus duobus aut tribus, glabris, è radice prodeuntibus, non multò plus palmum longis, versus superiora, ut plurimum, in bi-

nas alas diuisis, quarum extremitatibus insident flos vnicus luteus, plenus, satis magnus : tota planta amaricantis est saporis, Tabern.

Tab. icon. Hyoseris angustifolia : Hist. Hyoseris altera, Klein ferdlein frant/ Hyoseris angustifolia. Hyoseris foemella. C. Bauh. Phyt. Hieracium 21. siue minimum angustifolium.

Lucos multum amat : frequens etiam in solo arenoso, gramineo, & secus vias.

Synonyma
Hyoseris
angustifolia
siue foemella


HIERACIUM PVLCHRVM.



Ad Dentem Descriptio
Iconis laciniis & Cichorii silvestre accedunt huius folia, forma & hirsutia, prima verò minus laciniata, alia alternatim per caulem, at saporem nullum manifestum gustanti offerunt, quòque altiora eò minora redduntur : Caulis vnicus, rectus striatus, cubitalis hirsutus, foliis alternatim orientibus amictus, quæ sine pediculo la-

tam habent basim cum alis : flores in cacumine numerosi, ex pediculis propriis, hieracii similes, lutei, in pappos facillentes : radix non magna cû fibris aliquot crassiusculis. Hoc hieracium vidimus montpelii florens Maio.

HIERACIUM ERVCEFOLIUM hirsutum.



Hieracium à Genere Descriptio
Cherlero nobis delatum, quod ut hieracium nostrum pulchrum singulari assurgit caule ad altitudinem pedalem, penitus hirsuto, foliis vestito etiam hirsutis, vncialibus, aut sextantalibus, cineracei coloris, laciniis Cichorii Ervæ circumrosis, extremo folii ferè triquetro. Flos

in summo caule vnicus aureus maiusculus.

HIERACIUM PVLCHRVM RAMOSVM Sprengerianum.

In ter siccis meas herbas plantam perelegantem

Descrip.

tem adscruo sesquicubitali altitudine, necdum integram, pilosam, alius minoribus ramis, alterno situ ex longa distantia brachiata, ad quorum alas *barent* internè quidem ex principio angusto longa, ac



tridrantalia, ferè sesquicubitali lata, profundis & amplis incisuris ordine quodam serrata, ac penè laciniata, nervo insigni per medium excurrente: superne verò *folia* breviora lato principio ac veluti alis caulem amplectuntur perfoliatæ instar. Flores in summitatibus lutei quales in Hieraciis in singulis ramis qui-

ant, sent, plus minus, qui temporis progressu in pappo fatiscunt. Tota planta pilosa potissimum in extremis ramis in quibus pili longiores: Pictor non fatiscit nobis, pauciores pinxit flores.

Hanc plantam collegimus Heidelbergæ in cultissimo orto insignis Pharmacopœi & Botanici D. Sprengeri, florentem Iunio.

Loc.

Locus & tempus

SONCHVS LANATVS

Dalechampii.

Descriptio



IN cubitalem altitudinè & ampliorem excrecit, *foliis* per caulem crassiusculum pilosum, que fortuito dispositis, duarum triumue vnciarum longitudine, culmi latitudine, nonnihil sinuatis & subinde veluti eortolis, ad cyani folia nonnihil accedentibus nervo vincto secundum longitudinem excurrente, tomentosis, nullo

pediculo nixis, ad quorum radices ramuli enascuntur: superior pars caulis ramolior in plurimos surculos molli lanugine obfitos diuaticatur: flores gerens aureos Enigerontis, tandem in pappo fatiscences, calycibus circumdatos, tomento delicato & molli pubescentibus: *radice* nititur satis crassa & longâ, non multum fibrosa, planta sicca nonnihil amarâ: Interdum hæc palmaris est foliis minoribus laciniatis.

Varietas.

Hist. Lugd. Sonchus lanatus. Quidam Molluginem appellant, quamvis à Plinii Mollugine

diuersa sit.

C. Bauh. Phyt. Sonchus 11. villosus luteus.

Monipeli propè Peraux inueni, in saxosis & apricis, florens Iunio mense.

Tota planta lacteo succo turget, Cichorii more, gustuque amaro prædita est, sed minùs quàm reliqua Cichorea, quorum & facultatem obtinet, licet imbecillior.

Mull. Arg. Locus & Tempus.

HIERACIVM LATIFOLIUM MONTANUM

Geneuense folio Conyze

maioris Montpell.



Causas edit Descriptio
Plures cubitales, ac etiam maiores, cauos, crassos, hirsutos, qui superius in aliquot breues ramulos diuisi, flores gerunt luteos, magnos, Hieracii capitulis asperis pares: tandem in pappo euanescentes: *folia* intima Conyze Montpellulanæ maioris foliis paria, palmari circiter longi-

tudine, vnciam lata, sinuata nonnihil, & quasi serrata, per caulem alternatim sunt disposita, caulem modicè amplectentia, hirsuta, potissimum parte inferiore, minùs tamen aspera quàm Hieracium asperum. Radices fibrosæ, crassiusculæ, nigricantes & crassis capitibus. Suspiciamus hoc traditum à Clusio pro Britannico.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 6. siue Conyze folio caule purpurascere. Hieracium Britannicum Clusii. An Hieracium montanum maius latifolium Tabernamontani? Hieracium Tabern. separo à Clusii & nostro Geneuensi: quia Tabern. folia non habet Conyze: sunt etiam Tabern. autem folia tenuia & mollia, siue non rigida.

Hierac. Coi. 23 folio.

C. B. m.

Hieracium latifolium inueni in montibus circa Geneuam folio Conyze Montpellulanæ maioris. Hieracium Britannicum Clusii, impenitè amara est planta, nusquam spontè nascens ipsi conspecta: sed Londini duntaxat in hortis Doctorum virorum Ioannis Richzi & Hugonis Morgani Pharmacopolarum Regionum, ex borealibus Britannia regionibus, in quibus spontè crescit, delata. Floret Iunio & Iulio, semen Augusto maturum.

Locus.


HIERACIVM PANNONICVM LATIFOLIUM

Clusio, Pilosellæ maiori, siue Pulmonariæ luteæ accedens, maculatum & non maculatum.

HVIC quina aut sena sunt *folia*, humi strata, lata, Intybo sariuo latifolio non multum dissimilia, per ambitum nonnihil sinuosa, interdum etiam laciniata, mollia, hirsuta, nigricantibus

Descriptio

his maculis saporis infecta, interdum minime, lacteo succo turgentia: e quorum medio



caulis exit cubitalis, cauis, raris foliolis septus: in quo plerumque vnicus (interdum alter & tertius) flos ex crassiusculo calyce, nigraque lanugine hirsuto emicat. Hecipnoi-
dis flori similis, sed pallidior, plenus, aliquantulum odoratus: semen oblongiusculum, fuscum, papposa coma, ut in Tragopogo, praeditum, quod

naturum levissimo flatu dispergitur: radix illi minimi digiti crassitudine, nigro atque crasso cortice obduta, lacteo succo plena.

Clus. in Pann. & Hist. post. Hieracium Pannonicum siue latifolium primum.

Camer. hort. Cesta herba in Italia alibi Ingrafisa dicitur, & quamvis ex icone cognoscere possum, convenit cum Hieracio latifolio Clusii. Item Hieracium latifolium Pannonicum. Item apud Thaliū, Pilosella maior Gallorum Thalii, quam ut arbitrat, depinxit in Pann. Clusius cum inscriptione Hieracii latifolii.

An Thal. Hirc. Pilosella maior Gallorum, siue plantam nominabat?

Tab. icon. & Hist. Hieracium phlomoides vult habidifraus: is macularum non meminit.

Assumpsimus figuram Clusii, in qua 4. tantum folia, quia defuit nobis vitens, postea Deo fauente melior icon proponetur.

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 2. siue latifolium hirsutum macularum.

Gerard. Hieracium 1. Clusii, The first haue weede of Clusius.

Inuenitur plerisque Hungariae, Austriae superioris, atque Moraviae montibus, gramineis & simul apricis locis, siccioribusque pratis. Inueniebam etiam (inquit Clus. in post. hist.) & maculis liuidis, & nullis maculis insignito folio, siccioribus circa Francofurtum pratis. Floret Maio, semen plerumque maturum Iunio.

Hieracium maius latifolium Pannon. 2. Clusii.

Cubitales atque etiam bicubitales interdum sunt huic caules, firmi, rotundi, quadam lanugine oberti: quos inordinata, siue confuso ordine nascentia, multa ambiunt folia, tres vncias aut amplius longa, vnum lata, mollia, in ambitu dentata, lacteo succo plena: summus caulis in aliquot ramulos finditur, sustinentes imbricata capitula, e quibus prodeunt flores lutei, densi, duodenis, aut pluribus foliolis, extrema parte incisae, constantes: medium occupantibus multis luteis fibris: radix minimi digiti crassitudinem aequat, multisque tenuibus fibris capillata, singulis annis angescit, & ad latera novos, frequentioresque caules profert.

Eius genus inuenitur graciliore caule, angustioribus, & vix semunciam latis foliis: in reliquis conveniunt.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium maius latifolium siue Pannonicum secundum.

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 3. latifolium foliis molibus & dentatis.

Nascitur cum sequenti in extremitatibus sicciorum pratorum inter vepres, etiam ad exduarum silvarum margines.

Hieracium maius angustifolium Pannonicum 3. Clusio.

Cubitales & huic assurgunt caules, rotundi, superioribus minus crassi, & frequentiore asperioribus lanugine oberti: quos similiter ambiunt confuso ordine multa folia superioribus angustiora, breviora, atque etiam dura, nec minus lacte turgentia, summus caulis diuiditur quoque in ramulos imbricata capitula sustinentes, e quibus exoriuntur flores superiori fere similes: radix non adeo crassa quam superioris, sed non minus fibrosa, nec in nouis prolibus educandis minus fertilis. Illius etiam genus alterum obseruauit author angustioribus foliis & multo longioribus, licet non minus duris, quod alioqui tota quodammodo facie ipsi respondet.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium maius angustifolium, siue Pannonicum tertium.

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 4. angustifolium caule aspero.

Hieracium alpinum hirsutum folio 5. Clus. quodammodo incano.

Aliquot sunt huic folia e radice prodeuntia, vncialis fere latitudinis, oblonga, molli crispaeque



lanugine admodum hirsuta, & quodammodo incana, lacteo succo praedita: e quorum medio caulis pedalis plerumque emergit hirsutus, quem per intervalla ambiunt folia superioribus breviora, at triplo latiora, & in mucrone delineantia, non minus quam illa hirsuta, aut lacteo succo praegnata: vnicum in summo fert capitulum

e multis hirsutis & incanis foliolis compactum (nonnunquam in lateribus alterum & tertium) quod in strem sese explicat hieracii floribus similem, multis foliis luteo colore praeditis constantem, qui deinde in pappos cum suo breui & nigro semine euanescent: radix nigricat, multis candidantibus fibris praedita est, & singulis annis novos caules profert. Tota planta admodum amara est.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium 5. alpinum

Cesta
Ingrafisa
de poris.
Pilosella
maior Gal-
lorum.

Hieracium
phlomoides
dicitur.

Locus.

Descriptio

Synonyma

Locus

Descriptio

Varietas

Synonyma

Descriptio

Synonyma

hirsuto folio. An porro (inquit Clusius post. hist.) ea planta quae Dalechampius Sonchum lanatum appellat?

Locus
tempus.

C. Bauh. Phyt. Hieracium s. montanum hirsute incanum. Camer. hort. Hieracium s. Pannonicum. Gerard. Hieracium s. Pannonicum. Clusius, kind of harte weede. Tabern. Ic. & hist. Hieracium latifolium montanum.

Inuenitur in herbolis Alpium iugis, ubi Iulio, interdum etiam Augusto floret: at in hortis Maio, semen vero Iunio perficit. Prouenire obseruauit Tabern. in Veschgebirg, & in Schmarn wäld [Harcynia] in supremis montibus inter Greyßbach, Antegast & Ribelsauer fontes acidos.

LAMPSANA VETERIBVS.
CAP. VI.

Napum
Lubine.

Lampsana (ita tradente Dioscoride) siluestre Lolus est, plus alens, stomachoque vtilius, quam Lapathum. Huius folia & caulis cocta eduntur. Hanc Romani Napium, Aegyptii Eurhine vocant, Graeci, inquit Hermolaus, Lampanem.

Lopana.

De Lampsana Plinius lib. 19. cap. 8. haec scribit. Nec non olus quoque siluestre est trinum foliorum, Diui Iulii carminibus, praecipue iocis militaribus celebratum. Alternis quippe versibus exprobrauere Lapsana se vixisse, apud Dyrrachium, praemiorum parsimoniam cauillantes. Est autem id Cytha syluestris. Et rursus de eadem lib. 20. cap. 9. Inter syluestres Brassicas & Lapsana est, pedalis, hirsutis foliis, Napii simillimis, nisi candidior esset flore. Coquitur in cibo: aluum leniter emollit.

Aequiuoca

Galen. lib. 2. de alim. de Lapsana nihil dixit, velut sub Brassicae generibus comprehensa. Verum 7. simpl. Pharm. Lapsana, inquit, si edatur malum succum gignit. Si vero imponatur, extergendi ac discutiendi vim quandam habet.

Lampsana
Dodoni.

Lapsana porro nomine plures non solum, imo penitus diuersas meminimus diuersos Autores referre plantas.

Brassica

Dodonaeus Lampsanam statuit plantam, quae teste Lobelio potius Hieracii congener, aut Sonchus cognata videatur.

Rapistrum
flore luteo.

Pro Lapsana Cornarius exhibet Brassicam, quae opinio non placet, ut indicatum est lib. 1. h. n. g. Veram Lapsanam Lob. Gesn. & alii Rapistrum flore luteo esse existimant, post Rapas a nobis lib. 21. descriptum.

Rapistrum
album.
Apium.
Galla.

Rapistrum album Lampsanam vel lapsanam vocant Riff. in Diosc. Turn. in Herb. Angl. Gesn. de coll. s. p. & in cat. pl. ac Schuenckfeldius.

Lampsana vera quorundam, Ocymum Veterum Tragi Lob. Obest Fagotriticum nostrum.

Aquilegia Rob. Const. in Lexico est Apium.

Lapsana cur dicatur Eustach. & Eucharion Roellin de galla, mihi non constat.

Lapsana agreste olus Cordi, ex Brassicae genere, Germanis Rinföl appellatum, quo se apud Dyrrachium viderat milites Caesari in triumpho exprobrauerunt, quid?

LAMPSANA DODONAEI.

Lac fundit amarum vulnerata, siue radice quam habet albam & digitalem, siue caulibus quos

supra cubitum erigit, hirsutos rubentes, ramulos, concauos: siue foliis denique, quae Barbarea dicitur instar formata habet, sed mollicella, hirsuta: flores autem stellati, lutei. Hieracii, sed parui: qui in pappo illi similiter abeunt.

Dodon. gall. Lampsana, ab aliquibus Napium appellata. Ruellio, ni fallor dicitur Chrysolachanum Plinii.

Synonyma
Napium.
Chrysolachanum
Plinii.
Sanchus col
gnatus clon



Gesn. hort. Sonchis cognatum olus, Tigurensisibus Muldhey vocatum. Lobelio in Aduers. Lampsana Dodonaei, qui ait perperam a Dodonaeo Lapsanae nomine esse exhibitam, quia neutiquam Sinapi, Napii, aut Brassicae congener, sed potius Hieracii. Obs. & c. plant. Lampsana, sed hoc mirum cur Lobel. nunc faciat

Lampsanam, cum in Aduersariis negarit, nec sine ratione.

Camer. hort. Lampsana Dodonaei, lactescens planta, passim obuia, in Prussia Papillaris nominata.

Tab. icon. & Hist. Sonchus siluaticus 1. Wilde Sendenfraut: Sonchus siluaticus 2. Sonchus siluat. 3.

Gerard. Sonchus siluaticus moed Sonchus silue. C. Bauh. Phyt. Lamplana i. varians foliis, aliquando prorsus integris, aliquando in lacinias aliquot diuisis: an hanc Diosc. intelligat cogitandum. Item: Lampsana 1. siue siluatica, Sonchus siluat. Tabernamontani. Ego has duas non separo: lulum enim naturae duntaxat esse existimo: quod de Tabern. tribus speciebus etiam dictum sit.

Schvv. Lampsana, aequil. Dioscor. papillaris, C. 8. ut. wild Sonchen fraut / Rein föl / Mulden. Fo. 5. & Tab. liis integris & laciniosis.

Panietinis, rudibus, aruorum & hortorum marginibus frequentem tradit esse Schvvencfeldius: quod & ego obseruadi.

Efficax est in sanandis papillis exulceratis, unde & nomen Papillaris sortita esse videtur. Resecat, abstergit, & digerit. Papillas exulceratas imposita sanat.

HIERACIUM CAPITVLIS CARDVI
benedicti, maximum Buglossum echioides quibusdam.

Multifida radice nititur, crassitudine digitalis alba, lac amarum fundente: caulibus bicubitalis radice crassitie aequat, striatus, rubens, densissimis spinis acutis, rigidis, sed facile caulem relinquens horrens, luccum itidem lacteum e vulnere fundens, ramis compluribus brachiatis: folia Buglossae, sinuosa, longa, multo magis spinis minacibus horrida: flores Hieracii, crocantes, in pappum facientes, e calyce, thorulis hirsutis

Descriptio

pidis canaliculato. Nostram iconem melius pictam sculpsit corruptit.

Hierac. Echioder.
Buglossum luteum
Tabern. Icon. & Hilt. Hieracium Echioder, Buglossum luteum, habichfraus / Geel Ochsenjung genant.

Lobelin Adu. Buglossum Echioder luteum,

quod pluris faciunt mulierculæ Anglæ, quam Buglossum Echioder luteum Hieracio cognatum.

Casp. Bauh. Phyt. Buglossum luteum: An Hieracium maius Creticum sativum Gesn. Frustra querit Frater, non est Hieracium Creticum sativum Gesneri v. satis apparet ex historia Chondrilla Creticæ semine erumpo. Hieracium capitulis Cardui Benedicti maximum mihi provenit Montbelgardis in orto E. C.

Eodem anno quo lata planta caulem produxit, floruit Augusto, Septembri & Octobri: Annua est planta seipsam seminans, floruit Iunio & Julio. Basileæ in orto D. Felicis Plateri collegi semina matura fine mensis Augusti. Heidelbergæ vidi in orto Electoris.

HIERACIUM ASPERUM MAIORI flore in agrorum limitibus.

Satis crassæ radices multitudine, compluribus fibris donatæ, colore ad buxum inclinare, lac fudentes amaro sapore, verum non insigni præditum: canales ex eadem radice multi surgunt, teretes, striati, rigidis pilis asperi, ramosi, lateum succum manantes, cubitales, bicubitales & altiores: folia infe-

riora quidem duobus palmis interdum longiora, sesquiuunciam lata, acuminata, primum attenuata, post de coloris intentione nonnihil remittentia, hispida, acuminata, sinuata per margines, & aliquantulum crispata: superiora verò alternatim caulibus adherent, minora, acutiora, cæteris quæ similia: sapor vtriusque subamarus: flo-

res suis singuli pediculis modò longis, modò brevibus, posteriores prioribus, ut in Impia Plinii, altioribus insident, Tussilaginis floribus pares, lutei, foliola exteriora maiora, crenata, ex capitulo ex longis foliolis multis squammato, subaspero, quod delapsis floribus inferiore parte in ventrem canaliculatum turgescit, semen claudens lanugine oblitum. Cum Hieracio maximo capitulis Cardui benedicti multa communia habet hoc hieracium, quod aliquando Cichoriū asperum vel spinosum credideram. Figura nostra ex Fuchianis non in omnibus placet pro nostro hieracio aspero: folia non satis sinuata.

Trago Cichorea (wegwart eidem in histor. germ.) tertia & quarta flore luteo, foliis asperioribus spinulis horrentibus: radice longa luteum succum manante, qui in gummi quasi glutinosum coagulatur, semine subluteo: ad Condriillam Dioscoridis referenda.

Thalio in Marc. Intubus silu. seu Cichorium silu. flore luteo, passim ferme in tota hircynia vulgare, duplex. Aliud foliis integris: quod rursus foliorum ratione subdividitur in quatuor species: Aliud divitis.

Tab. Ic. Cichorium luteum, Geel wegwart: Histor. Cichorium luteum primum. Eidem in hist. Cichorium luteum secundum. Item Ic. Hieracium Intybaceum asperum, Rauch wegwart habichfraus. Hist. Hieracium novum. Collata descriptio & figura Cichorei lutei respondere videtur cum nostro Hieracio, quod Fuchsius, cum Tubingæ essemus vocabat Intubum luteum tertium. Quale sit Cichorium luteum, quod non depingit, sed tantum describit, asserere non possum. Si quis tamen duo hæc Cichoria lutea Tabernamontani, ad Hieracium de quo c. sequenti agemus, velit referre, id eius iudicio committimus. Hieracium eius Intybaceum asperum huc collocatum volumus.

Gerard. Cichorium luteum yellow Succorie / Hyofiris Plinio, Lobel. nedypnois. Item Hieracium asperum, Scharpe haude weede. Gerardus iconem Tab. habet Cichorii lutei: verum an intelligat nostrum Hieracium asperum maiori flore, vel sequens, lectoribus considerandum relinquo. Asperum eius idem est cum eo quod ex Tab. proponimus.

C. Bauhin. Phyt. Cichorium 7. seu luteum præterse hirsutum. Cichorea lutea vel 3. Trago. Cichorium luteum Tabern. foliis variis, aliud integris, aliud divitis: illius ratione foliorum quatuor species, qua de re Thalio. Item: Cichorium 8. lue luteum montanum angustifolium, hirsutie asperum, quod Intubum tertium Fuchsius fecit, Scariolam tertiam Cortusii, Hieracium Intybaceum asperum Tabern. Non separo adhuc Cichorium 7. & 8. Bauh. donec mihi constet aliqua certa differentia inter hæc duo: & an vnaquæque suam differentiam semper seruet, nolim tamen negare duas species, iudicent alii.

Hieracium quoddam asperum vel spinosum mihi aliquando Cichorium luteum nominatum, provenit passim in agrorum marginibus circa Montbelgardum, ac etiam in orto Ill. E. C. florens Iulio, Augusto, Septembri, & Octobri mensibus. Frater C. Bauhinus misit Basileæ nomine Scariolæ tertie Cortusii. Provenit in Rossberg propè Masmünster. In Ducatus Wirtembergici monte Teck & Bol in agrorum limitibus. In Alsatia asperis collibus secus agros & vineas, apud Mediomatricos verò in montanis pratis vbertim gigni scribit Tragus.



Lingua bovis lutea

Tab. Hierac. Creticum
C. Bauh.

Cichorium luteum
Icon.

Synonyma
Cichorea
flore lutea

Intyb. silu.
f. luteo.

Cichor. luteum

Intubus luteus

Hyofiris Plinio

Gerardus icones

Cichorea lutea

C. Bauh.

Locus & tempus



Descriptio

HIERACIUM RECTVM RIGIDVM,
quibusdam Sabaudum.

Descriptio



Synon.

Intyber.

N.

hirsuta, atroviuentia, alternatim posita: radix dura, longis fibris donata.

Lob. Adu. Hieracium Sabaudum montanum. Obseru. Hieracium Sabaudum. Iconib. plant. Hieracium alterum grandius. Tubingæ cum essem præceptor meus Fuchsius faciebat Intybi speciem.

Militaris.
Lactaris.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 18. siue angustifolium fruticosum. Hieracium Sabaudum Lobelio. Hoc Patavii latioribus & hirsutioribus foliis & caule reperitur, quod D. Guilandinus Erinum Matthioli esse assererat, & apud Galenum Militarem, apud Plinium Lactaridem, dici.

Hierac.
mont. angustifol.

Camer. hort. Hieracium alterum grandius Lobelii, rectum & fruticosum.

Locus &
tempus.

Tab. icon. & hist. Hieracium montanum angustifolium 1. Berg habichstrauch mit schmalen blättern. Hieracium 15. Sabaudum dictum.

Gerard. Hieracium intybaceum Endipico hænte weede. Eceur propolisra iconc Tabern. inurat titulum Gerardus:

Hieracium dictum Sabaudum quibusdam, in Sabaudia obseruavi. Montbelgardi abundat propè vites & in pratis, florer Iulio & Augusto, plantauit etiam in Horto Ill. E. C. Passim reperitur in montibus ad Rhenum & circa Heidelbergam & in Ostwald, sabulosis & petris locis, potissimum circa montanas arces Stadenburg & Schönenburg in Hancynia.

HIERACII SABAUDI
varietas duplex.

Descriptio

Accepimus à fratre C. Bauhino Lactaridis siue Erini Matthioli nomine plantam siccam accedentem ad Hieracium Sabaudum, si non idem: in foliis tamen discrimen, vel lusus: in caule cubitum excedente, folia, priora, alternatim disposita, vncias duas longa & pollice angustiora, oualia ferè, non crenata, qualia à Matthiolo pinguntur superiora, quosdam dentes habent, hirsuta sunt: flores similes Hieracio Sabaudum, lutei, in pappos euanescentes. Idem nobis misit cum hac inscriptione Plantam cuius etiam i-

AD cubitos duos allurgit, interdum procerius, caulis rigidis, hirsutis, rubetibus, lacte prægnantibus, qui in summitate in aliquot surculos facellunt, quorum singuli singulos flores iustinent luteos Hieracii vulgaris, folia præ omnibus Hieracii, rigida, oblonga, rigidis denticulis sinuata,

conem damus, Lactaris & Militaris Planti, Erini Matthioli species, Guilandino Patavii. Hec sanè multum variat si non diuersa planta in caulis cubito altioribus hirsutis, folia alternatim quasi sita, auersa potissimum parte hirsuta, tres pollices longa, duos lata, in acumen desinentia, pulchras habent lacinias acutas, quæ in superioribus ramis breues sunt & lata, in ramorum extremitatibus flores quales præcedenti.

An Erinus Matthiolo? Non est Erinus, teste

Hieracii Sabaudi varietas. Erinus quibusdam Mart. dicta;



Hieracii Sabaudi varietas altera.



Columna, quæ à Matthiolo depingitur, mutila planta, sine floribus, quam nemo nisi ab eodem depictam vidit, præter ipsum, qui se manus lacte infecisse eam extirpatam asserit. Sed certè folia ab ipso depicta Dioscoridis Erinum non referunt, verba quidem illius non peraspiciam, nam folia incisa in superiore parte, foliorum scilicet intelligitur, non caulis ut perperam fide deperit. Commentatoris inquit in Adu. Lobelius, impudentiusculi commentum licet deprehendere & ridere. Is namque quum sibi visam & lectam ad riuulos aquarum, aded lacteo succo manantem, ut eo manus inficere posset: palam & audacter logizimum Erinum asseuerasset, non verbis ausus

fuit describere: sed pingendam curauit plausibili in vulgus Pharmacopæorum iconem, quinis, ne pluribus, crectis de cespite caulis: Ocymifolio, bino, nonnihil crenato, per intervalla donata, nullà additâ prorsum, quæ dubiam vel fidem, plantam fulciret, historiâ: cuius picturæ quum cum puduisset, postremò de vitimis Commentariorum interpolationibus curauit expungendam, nullam interea in huius misellæ subceptitiam locum suffecit: ac ne verbum quidem subdidit, quâ id de causa dempsisset.

Synon.

Matthioli opusculum cap. 1. datur.

Diosc. explicat.

Matth. cap. 1. datur.


Lacu-

Lacuna Matthioli exhibet figuram falsam atque vocari Erinum: barbarice Herbam lactis, & Lactariam, nonnullosque per Erinum Balsamirum maiorem intelligere.

Cast. Dur. Erinus, Basilicum aquaticum. H. Lugd. Erinus Matthioli. Sed & Lonic. figuram malam Matthioli habet lib. 5. cap. 341. ubi Wasser Basilien / Erinus & Echinos Dioscoridis, Ocy-mum aquaticum vulgi, Lactor, Herba lactis, Militaris, & Anabula cognominatur.

C. Bauhin. Phyt. & apud Matth. faretur se ignorare quid sit Erinus Matthioli, pro eo autem ipse ostendebat Guilandinus Hieracium quod Sabaudi nomine Lobelius proposuit.

HIERACIUM MINUS PRÆMORSA radice, sine Fuchsi.



Descriptio

Per terram spargit folia longa quædam, ad radicem præter lacinia-ta, sic ut interdum lacinia oppposito situ respondeant, alias vero non item, sedque ex brevioribus, vel longioribus intervallis, hilariter virore splendens, sapore & succo lacteo cum eiusdem classis aliis conveniens, si quibus donata pilis, ii rari sunt:

inter hæc caulis erigitur modò unus, modò plures, cubitales & sesquicubitales, nudi, striati, inaptes, circa summum in alas aliquot divisi: quarum singula singulos sustinent flores luteos foliolosos, calyce oblongo, modicè squammato, incano, lanuginoso. Radix fibrata, inâ parte præmorsâ nigricat, per cætera candicans, lacte turgida. Hæc sanè planta insigniter variat magnitudine & laciniarum diversitate.

Fuchs. hist. Hieracium minus. Tragus nullam habet figuram sui hieracii minoris, Morsus Diaboli appellari, eandem autem figuram, quam Fuchsius & Dodonæus habent, ponit cap. 88. sub titulo Lagopi basensirauch, unde transpositionis suspicio: mihi enim descriptio non videtur quadrare figuræ.

Sed & Matth. in Dioscor. eandem habet figuram, cui inscriptio est, hieracium minus: interea pro suo more non describit. In com. Ital. & Lat. cum mag. fig. ceu & Epit. Camer. eandem quoque retinet, descriptionem quidem apponens, sed quæ non quadrat figuræ: folia enim non sūt asperiora quam in Cichorio. Nec ea mutat in Hist. germ. Camerarius, sed descriptionem inibi diversam addit, quæ non facit mentionem asperitatis foliorum.

Hæreo an hieracium minus præmorsâ radice bene fuerit notum Gesnero de hortis, dicenti: Pro hieracio minori Matthioli herbam Sôchis cognatam exhibet, quod ad vires parum interesse puto à Dente Leonis.

Tom. II.

A Lonicero pingitur sub titulo basensöl / vocaturque in descriptione basenslarrich / Lactuca leporina, basensirauch / oder Serweld / Sôchus non aspera, Lactucella, Cicerbita, & Laidon Gallorum.

Lacuna nomine hieracii minoris, quod quosdam Dentem Leonis vocare scribit, solam proponit figuram. Verum hieracium hoc non solet dici Dens Leonis sed contra Dens Leonis quibusdam existimatur Hieracium minus.

An Anguill. Lactuca leporina Apulei, Cazzalepre, & Hieracium minus Dioscoridis. Item postea. hieracium minus Romæ & in Hetruria Cazzalepre, quo in cibis & potissimum in acetariis utuntur.

Lob. Aduers. [ubi & morsus Diaboli vocatur:] Obs. (ubi ipsi Lagopus & Lactuca Leporina Tragi videntur: & Ic. Pl. Hieracium minus præmorsâ radice.

Tabern. Icon. Hieracium minus Dioscoridis: Hist. Hieracium secundum: & postea inter nomina, in præteritis & in præteritis Dioscoridis, Accipitrina minor Herbariorum, Sitchelade & Sitchelade Africanorum, Hispanorum Coyon de Galba herua, i.e. herba testiculi galli, Ic. Hieracium minus, Angl. lyle hawke weede / Belg. bas widschryt / Germ. Klein habichfraus. Item Icon. Hieracium nigrum, schwarz habichfraus, Hist. Hieracium tertium. Adhuc Icon. Hieracium minus, Lactuca leporina basensirauch / basenslarrich: Hist. Hieracium quartum. Tandem Icon. Hieracium aphacoides, habichfraus: Hist. Hieracium quintum, quod Aphacæ Theophrasti simile sit.

Camer. hort. Hieracium minus Matthioli, speciosa herba: Gerard. lib. 2. cap. 12. proponit icones Tabern. sub his titulis, hieracium minus Dioscor. Hieracium nigrum, hieracium leporinum, Hieracium aphacoides.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 16. siue minus, Ite hieracium 15. siue Chondrilla folio minus, Hieracium Aphacoides Tabern. Apud Matthioli. Hieracium minus.

Hort. Luf. Hieracium minus præmorsâ radice, Lactuca leporina basensirauch / basenslarrich.

Hieracium præmorsâ radice inveni Geneux in pratis circa Arne fluvium, floret Iunio, Iulio & Augusto. Frequentissime circa Basileam. In Ducatu Wirtembergico, ad fontem Admirabilem floret Augusto, Septembri & Octobri.

HIERACIUM MACROCAVLON IVNCE- um siue minus primum Dodonæo.

Ex radice crassâ, albâ, amarâ, succo lacteo pregnante, complures exeunt caules cubitales, interdum triebitales circiter, angulosi, laeves, acrourentes, concavi, in ramos aliquot divisi: flores singulis circulis insident singuli, Hedyphoidis, lutei, ex squarroso modicèque hirsuto capitulo emicantes, semine succedente rusto, longo, ad tactum nonnihil aspero, cum pappo cometo: folia pleraque omnia ex radice statim orta per terram sparguntur, Sonchi laciniosi, interdum plus minusve laciniosi in obusum mucronem desinentia, tenera, hirsuta raris & longiusculis pilis, nonnihil amara.

Dodon. gall. hieracium minus primum inscriptis, dixitque appellari à nonnullis Intybum agreste, aut Lactucam minorem, Germ. Klein habichfraus / Belg. Klein hawchschryt.

Scff

Lact. leporina.
Cicerbita.

Lactucella.

Cazzalepre.
Anguill.

Accipitrina.
Sitchelade.
Coyon de Galba.
Herua.
Testiculi galli.

Hieracium.
Aphacoides.
Icones 4.

Tab. 4.
Gerardi.
Hieracium minus.

Hieracium minus.
Lactuca leporina.
Aphacoides.
Theophrasti.
Amaraga.
Gaza.

Locus & Tempus.

Descriptio

Hort. Lus. Hieracium montanum minus latifolium Groß bletterich bapichfraus.

Locus. Marcynię summis montibus incola, inter Griesbach/ Antegast/ vnde dem Rabelstamer/ Saubrunnen.

HIERACIUM LATIFOLIUM GLABRUM
ex valle Griesbachiana.

Descriptio



Priorē hęc emulatur, licet radix minor sit, & folia angustiora, & paulo breviora, inferiora etiam longiori praedita sunt pediculo, cetera vero pediculo caret, caulem amplectentia, ad exortum angustiora quam prioris, tenera, mollia: caulis ambit in quinque, sex, aut septem staminula, quibus singulis floribus in-

sidet vnicus, luteus, praecedentis floribus par, sed paulo minor: tota planta amara est.

Hier. latifolium minus.

Tab. Icon. Hieracium montanum latifolium minus, Klein Berg bapichfraus mit breiten blettern: In hist. Hieracium 14. Hieracium latifolium montanum minus, Hieracium 7. siue latifolium glabrum.

Gerardo Hieracium montanum latifolium, Great leaved haufe weede.

Locus & Tempus.

Hieracium latifolium glabrum obseruavi in valle Griesbachiana Maio florens, vt & Tabern. descriptionis author.

HIERACIUM LATIFOLIUM PRÆMOR-
sa radice, caule singulari, Pilosella maiori affine.

Descriptio



Tom. II.

Sylvas amarat, foliis palmaribus, quibusdam brevioribus, aliis longioribus, vix vnciam latis, quorundam decora in margine, brevissimis pilis, & quibusdam conspicuis donata, aliis manifestis, quorundam in acumen desinunt: caulis dodrantalis ac etiam cubitalis, vnicus ramus, nullis ra-

mis diuisus, sine foliis, multos in summo cacumine coëctos flores luteos sustinens, ad instar Pulmonariae Gallicae, qui tandem in floccos abeunt, ad singulas diuisiones foliolum tenue angustum. Radix fibrata & præmorsa.

Hoc nostrum Hieracium videtur habere multa communia cum Intybo & Quilargula Thalli in uarcinia de quo paulo post.

Hieracii speciem nunc descriptam, accepit Basilea à Fratre in siluis inuentam, qui Hieracii latifolium præmorsam radice nominabat. Habui etiam ab Vldaricho Cholio Argentina ex plantis D. Agerii.

PILOSELLA MAIOR QVIBVSDAM, ALIIS,
Pulmonaria flore luteo.



Descriptio

Hic radix geniculata, rubra, fibrataque, lac manans sapore amarum: à qua caulis surgit late similiter prægians cum foliis, cubitalis, tenuis, hirsutus, in cuius alis summitatem versus ortis, flores insident lutei, Hieracii, qui in pappos maridi facessunt: Folia à radice statim exoriantur, sinuosa, supernè virentia & hirsuta, infernè densiore lanugine canescentia,

maculis pulchris interdum notata, sapore amaro & nitrolo, pediculis subrubentibus, villosis, longis quibusdam, aliis brevioribus.

Inscribitur hęc à Trago (qui non meminit macularum) Auricula muris maior, Groß Meißor: & quibusdam Germanis dicitur heidnisch mundfraus / hoc est, Solidago Sarracenica.

Pingitur à Lonicero Pulmonaria, quæ à quibusdam Gallica dicitur sub inscriptione, Groß Meißor / Auricula muris, quod idem, Pilosella vulgi, sed descriptio non satisfacit.

Lob. Adu. Obs. & Icon. Pl. Pulmonaria Gallorum flore Hieracii, Auricula muris maior Tragi.

Gesn. in cat. Hyoseris Plinii, hodie fortassis Auricula muris: De hort. Pulmonaria Gallica, Lactucarum generi cognata: Scopa forte illa regia Plinii ramis oblongis: Et forsitan eadem Sideritis illa Plinii, Scopa regia appellata. Robert. Const. in Amat. Pulmonaria.

Tabern. Icon. Pulmonaria Gallica siue aurea. Hist. Pulmonaria Gallica mas. Is non meminit foliorum maculatorum.

C. Bauh. Phyt. Pulmonaria i. siue Gallorum folio pilosissimo, Hieracii flore: Theophrasti lib. 7. cap. 7. & Plinii lib. 21. cap. 15. nonnullorum Corchorus.

Nascitur Alfine, siue Auricula muris maior Tragi in vmbrosis nemoribus, nonnunquam etiā ex antiquis muris in perpetua vmbra sitis pro-rumpit: lunio mense appetente caulem emittit

SSSS

foliis destitutum. Pilosella Tragi quæ quibusdam Pulmonaria Gallica dicitur, aliis Hepatica, quam Auriculæ muris nomine Lonicæ^r satis bene paxit, Montpelii crescit in muris & siccis locis, florens mense Aprili. Genævæ vidi virentē in radice montis Salevæ Februarii principio. Basileæ floret Julio cum pulchris maculis in foliis.

Temper.

Galenus inquit Tragus lib. 6. hanc stirpem describit, atque illam frigidæ & humidæ naturæ esse, ideoque eodem modo lacris ignibus adhiberi posse.

PILOSELLÆ MAIORIS SIVE PVLMONARIÆ luteæ species magis laciniata.

Descriptio



Proximè dicta est hæc à radice similis: folia autem maiora, latiora, longiora, & profundius laciniata, in angulos profundos acuminatos ad pediculi finem dissecta, stellam mediam repræsentantia, quorū quædam rotunda, quædam acuminata, pilosa, lanuginosa: caulibus cubitalis vnicus, unico folio in media sua parte, magis laciniato præditus,

in alas aliquot diuisus, ad quarum exortum, foliolum admodum exiguum, acuminatum, angustumque exoritur: flos in fine lunii apparet, in Iulio explicatur ac perficitur, luteus, plenus, in pappū abeuns: Tota planta lacte mader.

Tabern. Hist. & Icon. Buch. weiblein, Pulmonaria gallica scæmpta.

C. Bauh. Phyt. Pulmonaria Gallica 2. siue latifolia laciniata.

Locus

In siluis densis & opacis Fagorum non adeo frequenter occurrit.

PILOSELLÆ MAIORIS SIVE PVLMONARIÆ luteæ laciniatæ species minor.

Descriptio



Radix huic crassa adeo, multis crassiusculis fibris donata, ut non nisi lacera- ta euelli possit: folia ex pluribus ceu capitibus viciis septem lōga, quædam breuiora: quædam parum aut vix laciniata, eaque minora, maiora autem profundè laciniata, parte superna vix hirsuta, in aversa pili manifesti in costis vel nervis: fo-

lits inferioribus pediculi longi, superioribus per caulem multò breuiores: caules ipsi dodrantes, infernâ parte rubentes, rotundi, cauli hirsuti, in paucos ramos diuisi: quorum extremis flores insident singulares, satis magni, lutei & pappoli. Nec in radice, nec in foliis saporem vllum insignem animaduertimus.

In muro pontis Clareuallæ vrbis, nec alibi me obseruasse recordor. Flores & semina decidunt Augusti principio.

Locus & tempus

PILOSELLÆ MAIORIS SIVE PVLMONARIÆ luteæ species angustifolia.

Descriptio



Preceden- tibus nititur radice magis curta & longioribus fibris donatæ: folio donatur lōgo ut prior, sed angustiori, piloso, lanuginoso, latè dissecto, nec profundè laciniato, non duntaxat à radice orto, sed & caulem ad summum usque amplexo, in summitate ad alarum exortum intr-

gro, non laciniato. Caulis & flos prioribus respondent.

Tabern. Hist. & Icon. Buch. S. h. m. c. schmalen Blettern. Pulmonaria Gallica tenuifolia.

C. Bauh. Phyt. Pulmonaria Gallica 3. siue oblongo, angustoque folio.

Pulmonaria gallica tenuifolia.

PILOSELLA SIVE PVLMONARIA

lutea angustiori folio valdè pilosa duplex.

Descriptio



Pilosellæ maiori siue pulmonariæ luteæ similis, cuius tamen folia acuminata sunt, longis pilis valdè hirsuta, non tantum à radice statim orta, sed etiam per caules pedales hirsutos: flores lutei, singuli vel bini, ac etiam terni, maiores quam in vulgari, qui nondum pallescens, foliis obuestitur, quæ caui longique pili

pili ornant, & tandem in pappos euanescent: radices torosæ, nigre, in fibras crassiusculas desinentes.

Alia similia Huic similis si non lusus cui folia per caules breuia & lata: folia longis pilis hirsuta, inferiora verò breuiora habere videntur pediculos: prior in icone notatur litera A. Altera verò litera B.

Locus Pilosella alpina nostra florebat mense Iunio in monte Salene prope Geneuam, vnde mihi alata quæ notatur B. Altera quæ A. insignitur, repperita à nobis in peregrinatione Rhætica prope mosen in muris, quam Gesn. Pilosellæ speciem faciebat. Similem habemus ex plantis siccis Agerianis Argentinæ datis cum flore vnico.

APHACA OLVS VETERIBVS.

CAP. VII.

Aphaca o-
las Theop. Aphacam olus, non legumen, appellat Theophrast. lib. 7. cap. 7. propter foliorum similitudinem: ea enim foliis Intubo quodammodò proximis cõditur. Inter Cichoracea autè c. 11. Aphacam vocat ingustabilem, & amaram, quæ festinanter floret: sed flores celeriter senescit, atque lanugine pappo dicta marcescit: tum alius iterum prouenit, atque iterum alius: idque tota hyeme, verèque toto vique ad Aestatem fastiditur: flos Melini speciem gerit. Alia tamen est Aphaca inter legumina, ut suo loco pateat. Mirari subit Theophrastum, cur Aphacam amaram & quidem ingustabilem scribat, & tamen inter olera recenscat. Plinius Aphacem vocat: Acquinoctio, inquit, nascens Aphace, subinde alio marcescente flore emittit alium, totaque hyeme, totaque Vere vsque in Aestatem.

Aquinoctio Quænam porro sit hæc Aphaca Veterum asseru difficile fuerit. Fuchsius & post eum Matthioli. Amari. Casalp. Thalius, C. Bauh. Schvvekf. & alii, Dentem Leonis esse concludunt. Nos hanc Hedypnoideam siue Dentem Leonis Fuchsi inscribimus.

Hedypnois
flos leon.
Leonis
Fuchsi
An Hierac.
minus siue
Cichorium
luteum
Senecio
hirsutus
grauiter
oleus Hedypnois Plinii, Aphaca Theophrasti Lobelio, an hieracium minus multum, aliis Cichorium luteum?

Aphacæ Theophrasti, non quidem legumini, sed herbæ inquit Dodon.) conuenit Erigeri siue Senecionis species. Cichorium fortidum à plarisque [à nobis Senetio hirsutus grauer oleus] appellata.

HEDYPNOIS SIVE DENS LEONIS

Fuchsi.

Descriptio Radice digiti ferè minimi aliquando crassitudine, lac e plaga fundente, surgunt nudi & imanes pediculi, palmares & plusquam dodrantales, aliquando hirsuti lanugine facili cedente, quibus insident singulis singulis flores pulchri, patuli, lutei, maiores quàm Hieracii, cuius floribus similes sunt: exterioribus foliis pronà parte ex fusco rubescentibus, calyce glabro, multido, extra quem quatuor aut quinque folia viridantia reflexa: flores in pappos abeunt, calyce dehiscete & circa pediculum reflexo, nudam florum sedem porosa pellicula caluitium senile imitante, obductum.

Synonyma Hermol. in Dioscor. coroll. 663. Cichorium folio latiore; Edypnoidea, & Leonis Dens vulgari voce dicta. Cordo, & Corn. in Diosc. hieracium paruum: de quo hic ait. Ex hoc Hieracium prio-

Tom. II.

ri non adeò dissimile, ex Lactucæ aut potius Intybi generibus est, ideòque ab Autoribus per se præteritum, & sub illis comprehensum. Nostri flein habet fraudicunt. Alii Rõefraut. Quamquam sint qui Hedypnoidea Plinii, ista Germanicà appellatione accipiant Et sanè videtur eadem herba esse. Apud illum (Cordum) annotatum est esse Hedypnoideam Fuchsi.

Generosus Dominus Hermānus Comes à Neuenare, tam splendida stirpe natus, non erubuit rei Medicæ dare operam, sed summo studio (ut cetera omnia) herbarum cognitionem esse sectatus: id quod Annotationes eius doctissimæ te-

stantur, quæ suo secundo Tomo Herbarii adiecit Brunfelsius. Ibidem herbam quam cõmuni vocabulo & recepto Dentem leonis vocant, eam putat esse, quæ à Dioscoride Lagopus in quarto herbarum hist. libro nominatur.

Sunt, qui Cichorium & Dentem leonis pro eadem accipiant herbam, inquit Brunfelsius.

Tragus Hedypnoideam hanc pingit, & describit Hieracii maioris titulo, dicens. Generosus Comes de Neuenare putauit hanc plācam ad Lagopoda (Dioscoridis) referri posse. Ego tamen affirmo Lagopoda non esse appellandam. Quin constanter pronuncio esse Dioscoridis lib. 3. ἡδύπνοια, Sonchiten, Lactucam erraticam, & Sicheliam: Apulei cap. 30. ἡδύπνοια, Aspidelon, vel Aspidelon, Picridem, Lobontion, Lactucam siluaticam, Officinarum & vulgi Dentem Leonis, Rostrum porcinum, & Apottematicam (ut Comiti iam commemorato placet) dici: Germanos etiam, seu & hieracium minus, propter Solem Sonnenwibel Heliotropium, temporis ratione Merzenblumen (Florem Martii,) ob colorem Osterblumen, seu Eierblumen (Florem vtiellinū dixeris, & quia rasi capitis similia sunt scaporum cacumina psaffenblatt / Münchshöpf (Caput Monachi,) & à foliorum forma, lewen zant, (Dentem leonis) & misen lattrich (Lactucam pratensem,) seu weglattrich (Lactucam viarum,) quod forma & lacteo succo ad siluaticas Lactucas pertinere videatur, vocare solere: posse & commodè Augenwurz (Oculariam radicem) dici &c.

Matth. in suis comm. Hist. germ. & Epit. cum addit. Camerarii, Dens Leonis, de quo ait. Quæ Theophrasti lib. 7. cap. 11. de plantarum historia Aphaca vocatur, inter Cichorii genera esse reponendam nemo est qui ambigat. Huic per omnia in vniuersum responderet, quæ nonnulli Dens Leonis, aliis Dens caninus, quibusdam Caput Monachi, aliquibus Rostrum porcinum, plerisque verò Ambubeia vocatur. Tamest Plinio Cichoripsum propriè Ambugia vel Ambubeia dicitur.

Sff 3



Dens le-
onis
Lagopus
Diosc.

Cichorium
non qd

Cameri de
Neuenare
no.
Lagopus
non qd

Rostrum
porcinum
Apottema-
tica
Heliotropi-
um. Flo-
rem Martii.
Flos vtiell-
linus

Caput Mo-
nachi
Lactuca
pratensis
Lactuca
viarum
Ocularia
radix.

Aphaca
Theophr.

Dens can-
inus

Ambubeia

Loiucus huius figuram habet lib. 4. cap. 71. sub titulo habido frau / vnde paffenroßlin / dicitur vocari Hieracium minus, officinis etiam Altaxacon, Græcis Hedypnois.

Fuchsius, inquit Anguillara, à quo Hedypnois (Plinio etiam Hedipnois dicitur) quod suauiter dormire faciat, vel quod eius flos præter alias Serides suauiter admodum spiraret: huc Dens leonis inscribitur, Intybi erratici speciem alteram facit.

Fuchsius cum apud eum esset vocabat Intybum siluestre latifolium, Hedypnoim maiorem Plinii, Aphacem Theophrasti, τρυφύλλων Pauli & Dionysii Vricensis de re rustica.

Amat. in Diosc. lib. 1. enarr. 126. Spouda species Cichorii agrestis.

Dodon. gall. Condrilla altera.

Lobel. in. Adu. Vulgi Dens Leonis, siue Vrinaria. Vrinaria herba, pilleschiet Gallis pueris dicta, quasi Lectiminga: alium namque suppressendo, obstructionsque referendo Meseriazum, plus lotii derigat in vesicam, quam quantum pueruli retinendo sicut, præsertim inter dormiendum, eoque tunc imprudentes & inuiti stragula permingunt. Siquidem mulierculæ mendicæ & pueruli rustici in pratis, prope tumulos aggerulosue Talpari terra seminata (veluti Endiuia cōtingit) germina, eoq; suauiora minulq; amara, candidiora effusa, in acerariis vorant, auiusculis indunt. In Obf. Dens Leonis vulgi, Taraxacon, Corona & caput Monachi, Chondrilla Galeni Anguillara, Chondrilla altera Dodonæ: Idem antea quoque vocabat, Condriillam alteram Dioscoridis, Dentem leonis Dodonæ radice longa non rotunda. In Icon. Plant. Dens leonis vulgi, siue Vrinaria.

Gesl. hort. Hieracium minus, Hedypnois altera Plinii. In cat. pl. Hieracium alterum quod & minus, reuffela frau (Herba Diaboli) Gæll sonnenwibel (Solsequium luteum), Intybum sylvestre.

Huius Cæsalpinus meminit, quando ait. Aphaca, cui innumera vulgò traduntur nomina, quæ lubens prætereo passim iuxta semitas, & circa opida nascitur: &c.

Cronemb. de compos. medic. Seris altera agrestis, Plinii Hedypnois & eiusdem vt Theophr. Aphæ, Vulgò Dens Leonis. Lac. in Diosc. Dens leonis, Rostrum porcinum, Officinis Taraxacon. Turn. Intybus silu. altera, Theophr. Aplaca, Plinio Hedipnois.

H. Lugd. Hedypnois Dalechampi.

Tabern. Icon. & hult. Dens Leonis, Rostrum porcinum; paffenblatt / sauwüssel / bundsblum, Flos canum.

C. Bauh. phyt. Dens Leonis latiore folio: Item Dens Leonis angustiore folio. Habetur maior & minor. Quum Hedypnois foliis mirabiliter ludat & Cæsalpinus tantum dicat reperiri angustioris folii: ego duas Dentes Leonis non facio: sed varietatem existimo.

Hedypnois siue Dens Leonis Fuchsi, vocatur germ paffen roßlin / Roßtraut / paffenblatt / pippaw, mündkopff, Belg. papentruyt / houtsrooßen & schorftbloem. Cauter bloemen, Gallicè Dens de chien, ou de Lion: on pissenlitt. Italicè Gruani, Radice, Girasole. Dens de cane & Pissia al letto. Patavii Pisso di can. Hisp. Dente de Lion. Angl. Den de Lion, aut priestes cronwe. Boh. Plossfa.

Hedypnoim Plinii siue dentem Leonis vidi

Monspeli, Lugduni florentem toto anno, Patavij Februarii, vbi copiose eadem in acerariis edunt, Genevæ florentem Februarii principio & Octobri; Basileæ Maio, Iunio, Iulio, Augusto, & Octobri inter portam secin & Eschen. Bilsenij vocant des Pepes: Quedam Saga in Burgundia vocabat Cranulor, & fascinata allerebat esum fascinum tollere. Montelgardij frequens etiam in Horto E. C. sponte proveniens, florens Aprilis. Ceterum provenit in hortis, in campis, prope sepes, & in ruinosis ædificiorum muris, quinetiam in vineis, pratis & viridariis.

In apostematibus ac ardentibus febribus nihil sanè utilis ac efficacius usurpari meo quidem (inquit Tragus) iudicio potest aqua huius (Dentis Leonis) destillata, si ea singulis vicibus mensura trium aut quatuor cochlearium bibatur: hoc enim remedio punctori lateris dolores mirigantur, somnus accersitur, tussis aufertur vna cum inflammatione: optima collyria aduersus maculas oculorum ex aqua eius destillata sunt, quamquam succus idem possit, sed & vehementius & efficacius oculorum caliginem discutit: herba viridis extrinsecus imposita (quod & de linteolis in aqua madefactis intelligendum est) omnem inflammationem nigrarum & adurentium pustularum sedat, siue illæ pedibus, mamminis aut genitalibus oriantur: quin & inflammationi membrorum medetur aqua destillata, linteolis in ea madefactis ac impositis. Postremo solent & mulierculæ facies suas hac aqua abluere, vt maculas exterant, purumq; & immaculatum vultum consequantur. Adstringit, roborat, atque abstergit, authore Matthiolo; magis quàm vtrumque Cichorium. Cocta, stomachum dissolutum adstringit, cruda verò alium sistit: Eadem dysenterici auxiliatur, sed magis cum lente decocta. Succus potus prodest, quibus genitura effusa in aceto decocta, vrinæ tormina discutit. Vniuersæ plantæ decoctum porum Ictericam tollit.

Vires
Apostematibus.
Aqua destillata.
Collyria.
Succus.
Herba.
Pustulae.

Favus.
Vires.
Marthiola.
Dysenteria.
Ictericum.

HEDIPNOIS MONSPESSVLANA. siue Dens leonis Monspess.



EX radice crassiuscula caulis surgit palmatis, culta etiam cubitalis & bicubitalis, crassiusculus, concauus, paulo super radicem ramos tres, quatuor, aut quinque diuisus; quorum unusquisque florem gerit vnicum magnū, odoratum, Hedypnoidis nostratis flori similem, calyce multo crassiore, pulchriore, piloso, à foliis multis compacto. floris folia extrinsecus rubescunt, cæteroqui lutea: tandem is in pappos euasceit.

Plant. Icon. Condrilla prior Dioscor. Vermicaria

Salterana
con.
Intybi erra-
con.

Intybi silu.
Traximæ
Pauli.

Condrilla
Vrinaria.
Pissalitt
Gallorum.
Lectiminga

Corona Mo-
nachi.

Herba Dia-
boli.
Solsequium
luteum.

Aphaca
Cæsalp.

Seris agre-
stis.

Hedypnois
Dalech.
Plus canum.

C. Bauh. phyt.

Locus &
tempus.

caria Condrilla. Item post. Chondrilla altera Diosc. Montspeliensium Dens Leonis Asphodeli vel Leucacanthæ bulbulis.

H. Legd. Quatuor figura vnius (istius Hedypn. Montspeli.) plantæ pro diuersis & distinctis herbis exhibita apud uistoriam habentur.

C. Bauh. Phyt. Dens 19. Leonis Montspeliensis. Cichorium Constant. Matthiol. Chondrilla altera Dioscor. Lob. Item Chondrilla 9. Verrucaria altera. Chondrilla prior Dioscor. Lobel. & Clus. Eandem plantam duobus locis tradit Fracet.

C. Bauh. Quærit Lob. in Ad. Montspeliensium Dens Leonis, Asphodeli, vel Leucacanthæ bulbulis oblongis, an Condrilla altera Dioscoridis? Item demonstrare videtur minus conuenire Condrilla alteri Dioscor. lectores locum perpendant: Huius, addit, facili proventus in Hetruria, Galloprovincia, & Narbonæ marginibus latorum & pratorum. Vites quas dicimus alibi opportunius, lauerè nostrum Commentatorem, qui hunc Dentem Leonis nouitatis & peregrinitatis titulo iactat Constantinopolitanum Cichorium, cum tamen Sienæ illius patriæ, inque Hetruria, Liguria, Galloprovincia & Narbonæ pratis non parum copiosum istud proueniat. Neque enim flores sunt huius duplò ferè maiores magisque pallentes, quàm communis, propterea putandū & scilicet prouenire aut frequentius Costantinopoli, quàm Massilia, aut Montspeli vnde scimus tum Commentatori, tum aliis non paucis

Scriptoribus hodiernis missas & obitufas plerique plantas pro Aphricis, Syriacis, & Constantinopolitanis. Sic res cadit pigris & ambiriosis ingenis, quos res nondum vilæ oblectant, vt pueros pictura capiant & decipiant. An putarat peritos illic istud Cichorium admiraturos, quia Constantinopolitanum erat & a Cæsareo Oratore missum? An non pudet tantum rei herbarie scrutatorem nondum nosse Cichorium patrium, & noli credere oratori occupato muneribus aulicis, quàm exercitato ad discendas varias species Seridis. Clus. n. sp. Condrilla prior, nist post. Condrilla prior Dioscoridis legitima, nonnullis Hispanis *Terna di S. Guteria* nuncupata, quo nomine & Phyllum ab illis vocatur.

Terna di S. Guteria Prouenit Montspeli in pratis, nec non etiam in locis siccis in ipsis muris urbis, florens mense Aprilis & Maio, & autumnus vt Septembri. Habitat in horto Genevæ, ubi totam hiemem pertulit. Inuenit eam Clusius Salmaticensi agro locis incultis, & multis aliis Hispaniæ Augusto flores, vel etiam serius.

HIERACIUM MONTANVM LACINIATO folio lanuginoso Clusio.

Ex radice obliqua & rugosa, minimique digitati crassitudine, multis etiam fibris donata, aliquot exuberant capita, vnde sena aut plura nascuntur folia, vnius, duarum & trium vnciatū longitudine, semunciam lata, crassiore neruo per mediam longitudinem excurrente, mollia, breui incanaque lanugine prædita, infima parte valde laciniata & angustiora, superna vero latiora, sed dentata duntaxat, candido succo turgentia: e quorum medio, bini aut terni emergunt caules, palmares, enodes, foris laues, intus concavi: sustinentes flores luteos, floribus hieracii & alpini hirsuto folio similes, quibus tamen color paulo saturior, *semen* maturum tenue, longi-



tern. Hieracium 17.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 13. laciniato, lanuginoso folio, quod valde conuenire tradit cum hieracio Lobelii foliis & floribus Dentis Leonis bulbosi. Sed Lobelius pingit suum different admodum radice & valde hirsutum, cum profundis laciniis vel segmentis. Gerard. Hieracium 7. Clusii. haude recede.

Crescit in leytenberg, florētque Iunio, hieracium montanum laciniato folio Clusii. Prouenit in altis Lotharingæ montibus inter Esplan & Fonteneus, Tabern.

HIERACIUM NARBONENSE ROTUNDIFOLIUM caule aphylo, & Hieracium caule Aphylo hirtutum.

Illud Montpelio, ex rupibus illi vicinis equis habuimus. Quod statim a radice alatis pediculis longiusculis folia fundit octona aut dena, plus minus, rotundis, in ambitu exacutis, sed in-



nordis apiculis, veluti aculeis, donata, lauia, sapore manifesto destituta. E quorum sinu caules bini exeunt, palmæ vix longiores, nudi, quales in Dente Leonis vulgi dicto, quorum summa florem sustinet luteum, minorem quàm distans plantæ, sed in elegantem pappum pallidulum fatulentem, quod multiplex singulos flocculos, sed Lactucæ pedicello sustinet: semen exiguum, longum, sed Lactucæ minus, subruffum, striatum. Sapore nullum manifestum animaduertimus.

insculum, nigrum pappo inuolutum a vento abripitur.

Clus. Pann. 6.

Hieracium 7. montanum laciniato folio. nist post Hieracium 8. folio Hedypnoidis: Hieracium montanum laciniato folio.

Tab. Icon. & nist. Hieracium montanum angustifolium foliis Cichoraceis. Berg ha bichfraut mit schmalen wegwarten blättern

Descriptio

Descriptio

Hoc autem radice nictur fibras multas demittente, foris fuscâ, intus albâ, quæ aliquando singularis, aliquando iuxta terram in plura capita dirimitur, tandem in vnam radicem coëuntia: per terram sparguntur folia semunciam lata, sinuato, obtuso mucrone, hirsuta, cilioli

pedales, setqui pedales & cubitales, tenues, striati, non ramosi, hirsuti, inanes: flos Dentis Leonis ex hirsuto calyce.

C.B. Phyt. Hieracium 12. siæ foliis Cichoraceis flore magno.


Genus prouenit passim in pratis floreus Maio, Montbelgardi copiose maximè quoque, floret Iunio & Iulio.



Locus & tempus.

HIERACIUM PARVUM HIRTUM caule aphylo, crispum vbi liccatum.

Descriptio



& incana, semunciam aut uncias duas longa, satis lata, diuisione Erucæ purpureæ nobis dictæ, siccata crispa videntur, radix crassa.

Locus.

A multis annis habemus Monspelii collectum Idem quoque attulit gener Cherlerus, & D.I. Jac. Micg: diu duranti existimo plantam.

HIERACIUM MONTANVM 6. Clusio angustifolium.

Descriptio

Radix, ita deserviente Clusio, digiti crassitudinem interdum æquat, longa, nigricans, tenuibus fibris prædita, summâ parte in plura nonnunquam capita excuberans, quæ summâ tellure sena aut plura oblonga folia, semunciam ferè

lata, & nonnihil incana proferunt: è singulis radicis capitibus, prodeunt inter folia, singulares caliculi, duri, nudi, dodrantes aut palmares tantum, vnicum florem sustinentes, è multis oblongis extremo in-



sectis foliis, luteoque colore præditis, constatem: quo deficiente, semen oblongiusculum cum pappo leui auræ statæ excutitur. Aliud eius genus inuenitur, cuius folia nonnihil in lateribus laciniata sunt, ferè instar foliorum Leucoii marini, minus incana: flos autem colore magis rutilat, alioqui per omnia simile. Vtriusque planta lacteo succo plena, & amariuscule gustu est.

Clus. Pann. & hist. post. Hieracium montanum 6. Tab. Icon. & histor. Hieracium montanum 2. Berg habich fram mit schmalen blätteren. Hieracium 16. Gerard. Hieracium 6. Clusio, hæc vocat.

C. Bauh. Phyt. hieracium 20. folio oblongo non dissecto. nuius & altera species, foliis nonnihil laciniatis, minusque incanis habetur. Cam. hort. hieracium Pannonicum 6. montanum.

In omnibus illis montibus à Calenberg Danubio imminenti ad Alpes excurrentibus nascitur Hieracium hoc sextum Clusij. Floret Maio. Crescit in montibus Alfarie non longè ab arce montana fönig stein/quæ itur feldberg, Tabern.

Locus

Tempus

CICHORIUM BVLBOSVM.

Descriptio



Vt rarum ita pulchrum est Cichorij genus, innumeris fibris tenuibus longè lateque perreptas, quibus appendi bulbi, Auellane circiter magnitudine, Alabastritis marmoris candore, solidi; folia semunciam aut uncias duas longa, semunciam latiora, leuiter sinuata, glabra, in obtusum mucronem delincentia, crassiuscula, rubescentia: inter hæc surgunt costuli palmates hirsuti; quorum fastigijs flores intendent Hieracij, lutei, in pappum euanescentes: hæc

Hæc planta amara est & lacteum succum habet.

Histor. Lugd. Cichorium strumosum Miconii: **A** foliorum forma vocatur Cichorium, strumosum vero ab effectu & forma radice, quæ strumas refert & sanat. Quam ob causam Baccione, ubi frequens oritur, Porcellanes vocant, quasi dicas strumosam.

Condriilla Lobel. in Adu. & Icon. Plant. Condriilla pusilla marina lutea bulbosa, an Dioscor. radice rotundâ orbiculatâ Strongyle? & an Theophr. Cichorium, Perdicionæ.

C. Bauh. Phyt. Chondrilla 10. siue bulbosa marina. Cichorium bulbosum Dalechamp. hist. Lugdunensi. Item Chondrilla 11. siue Cichorium strumosum Myconii, multum similitudinis habes cum prædicta, folio minime per ambitum serrato. Hoc videtur Cast. Dur. Hemorrhoidalis nomine velle exprimere.

Per arenam serpit, floret mense Aprili prope montem Seti ad mare. Bulbui Montepelio a Genaro Cherlero allati & Montebelgardi in horto Ill. E. C. lati pulchre quidem folia genuerunt, insigniter repentes: in matutinis aliis & luncetis, unde maximo labore eulsi (cum inter radices luncorum penitus se deliteant) obseruauit.

Radice istam globosam ad strumas curandas multum cõsue se experimẽto didicisse Myconius apud Historiam Lugdunensem asserit. Quinque aut sex integre cum melle sumptæ multis diebus continuè mirum in modum profunt. Eadem præstat aqua earum stillatitia, vel decoctum, sed inefficacius: item conditum ex iis cum melle paratum admodum iuuat. Quare, uti dictum, hanc plantam Myconius Cichorium strumosum à forma & effectu nuncupauit. Radices, quas serophulis mederi ait Cæsalpinus, sumuntur ex melle vel cum farina Tricea in placenta, ut vinum vetus superbibatur ieiuno ventriculo mane & vespere: nam elicit sudores, & strumas in collo dilucit.

PILOSELLA MAIORI FLORE, SIVE vulgaris repens.



Descriptio

Passim secus vias obuia Pilosella haud facile quenquam lateat, humi decumbens & repentibus *serpens* hirsutis, amarum lac fundentibus, nouam sobolem per demissas fibras subinde propagans: *ha* pilis obita murinis auribus similia, supra viuentia, infra incana, sapore

exliccante: *flores* Dentis leonis minores, lutei, Matthioli. aurei, extimis foris purpureascentibus, calyce hirsuto, fusco, qui maturescentes in paposam lanuginem euolant. *Radices* numerosæ,

tenuæ, sed humi pertinaciter hærentes.

huius notissimæ herbæ non meminisse nec nomen ullum ei indidisse Veteres aiunt Herbarii, quam Recentiores Pilosellam appellant à copiosis pilis, quibus tum cauliculi, tum folia vestiuntur.

Minima quædam Intybi species hæc est, inquit Cordus, quod ex floris formâ, colore, & lacteo foliorum liquore facile colligitur, similiter ab omnibus (vt Dioscorid.) Auricula muris vocata, etiam Germanis quibusdam & Italis Pilosella.

Nomina *Meußboh* & *Wagelstrant* sunt quidæ Pilosellæ, quam picturâ exhibet Apollinaris: verum vires, quas adscribit, sunt veriusque Anagallidis: cauant igitur Lectores, ne cum Apollinari has duas plantas confundant.

Brunfels. Tom. 1. Rhaph. 45. & in quarto p. 271. Auricula muris. Sed Auricula muris (teste Hieron. Brunsch.) non est Latinorum Pilosella: quâuis tamen Tragus hanc lib. 1. cap. 93. describat & depingat sub nomine Auriculæ muris minoris.

Sed & Theod. Dorst. iconem Pilosellæ proponit hac inscriptione. Auricula muris, *meis* vau, Pilosella.

An Fuchs. hist. cap. 6. de hoc loquitur cum ait. Auriculam muris pro Anagallide qui depictam ostendunt Herbarii, errant. Vt & qui Pilosellam alio nomine Auriculam muris appellari tradunt.

Cast. Dur. Cæsalp. Camer. in Epit. [cui in hist. Matthioli. germ. Pilosella minor.] & Matth. in suis comin. *Pilosella*.

Quidam, inquit Lacuna, existimant, Pilosellâ esse Holostium, sed non est: est enim Holostium legitimum incognitum: existimo speciem esse alicuius Graminis. Matthioli idem statuit, & postea in post. Comm. cum ann. C. Bauh. sibi ipsimet contradicit, & labilem viri memoriam!

Lonic. lib. 4. cap. 75. figuram bonam Pilosellæ maioris Fuchsi habet, titulo *Flora Meußboh* / *Wagelstrant* / & præterea aliam parvam quæ non placet, nec etiam descriptio.

H. Lugd. Pilosella maior Matthioli.

Tabern. in hist. Pilosellam primam: in Icon. Pilosellam & Auriculam muris cognominauit? C. Bauh. Phyt. Pilosella 1. siue maior repens hirsuta. Thallio, Pilosella media, Auricula muris vulgi. H. Luf. Pilosella vulgaris, Auricula muris.

Pilosella maiori flore, siue repens vulgaris vocatur Germ. *Meußboh* / *Wagelstrant*. Gall. *Pilosella*, *Oreille de rat ou souris*. It. *Pelosina*, *Auricula di topo*. Belg. *Wagel cruyt* / *Musfoor*. Gallo-Belg. *Peluerse* & *Peluerre*. Hispan. *Pilosella* Boh. *Chlupafed*. Sclauon. *Musch* Czermony a muduy. Hung. *Eger* fil.

Nascitur extenuato & arido solo, in collibus & incultis locis, & agrorum herbis linitibus. Maio & Iunio mensibus potissimum floret.

Amarum lac secta planta mittit: id quod extenuantis atque abstergentis indicium est facultatis, inquit Matthioli. Tota Pilosellæ planta vehementer adstringit, glutinat, cohibet, refrigerat, siccat: quapropter huius rei non ignari pastores maxime cauent, ne ouum greges in illis pascuis inmorentur, ubi huiusmodi plurimum gignitur: quandoquidem depascentes oves tantâ alui adstrictione alliciuntur, vt inde facile emorian- tur. Hinc didicerunt Medici, eam mederi dysentericis, & vteri profluuiis: quin & ex vino austero potam vulnera glutinare, tam scilicet exterius, quam interius, illaram, coeliacisq; magno esse auxilio, & biliosis vomitionibus: cruentis item

Synonyma

Pilosella
Ergon

Intybi
minor

Apollinaris
minor

Auricula
muris
Brunfels
not.

Dorst *not.*

Pilosella

Lapsum
multorum

Lonic. *not.*

Nomina
linguâ

Locus
tempus.

Vires
ex Matthioli
et aliorum

Gregi
not.

Dysenteria

Vulnere

Fractura.

Morb.
vuln.Ediorum
focum.
Plerum.
Pulm.

spuris, enterocelis, & omnibus in vniuersum fracturis opem ferre, sed præcipuè caluaria. Non desunt etiam à recentioribus qui eam maximè commendunt ad ramicem, vuluæ relaxationem gargarizatu, ad locinoris & splenis affectus, nempe ad regium morbum, incipientem hydropem, & lienis tumores, quod viscera hæc roboret. Additur quoque vtiliter in potionibus intrinsecorum vulnerum, & in vulnerarijs emplastris, atque vnguentis: foliorum succus non solum recentia vulnera glutinat, sed vlcera quoque contumacia, phagedenâque sanat: & præf. ritum oris, & pudendorum. Succus decoctumque aciem ferri vel chalybis sæpe mesam indurat.

Huic autem non absumilis, sed multò maior Camerario alia Pilosella maior cauliculis non ramosis flore magno, quam etiam describit Frater.

PILOSELLA MINOR FOLIO angustiore, minùs piloso, repens.



cati, ubi flores duo, tres, quatuor, lutei vel alterius sed minores.

Lactucella
fil.

Camer. hort. Lactucella Sylu. repens, ambigens inter Hieracium & Sylu. Lactucam amara. C. Bau. Phyt. Lactuca 14. Lactucella Syluestris Camer. Item Pilosella 1. siue maior repens glabra: Auricula muris minor Tragi, secunda. Pilosella maior Camerarij. An Horto Lus. Pilosella maior altera, Gross. Neusßörlin.

Pallim in syluis prouenit, florens mense Maio & Iunio.

PILOSELLA MINORI FLORE Hirsutior & elatior non repens.

Descriptio Fibrosa est huic radix, turgens lacteo succo acri & amariante, reptatu fibrarum non se propagans, nec humi procumbens, sed Hieraciorum more, nonnunquam ad bicubitalem altitudinem excreuit in plures caules modicè hirsutos, interdum hirsutissimos, maxime verò parte inferiore, cui folia quædam adnata admodum angusta, vncialia, quadrantalia & palmata: latiora verò sunt & paulò longiora nonnunquam quæ à radice statim oriuntur, sapore subdulci, nullâ eccellente adstrictione, quæ lac manant sicut & caules, qui



propè summum cacumen in aliquot surculos quadrantales & sextantales diuiduntur, hique rursus plures breues hirsutos pedicellos promunt, quorum singulis singuli insident flosculi. Hieracij affinis, lutei, pleni calyce ambici striato, lanugine nigra obliro.

C. Bauh. phyt. Synon.

Pilosella 1. siue maior erecta, quam si quis ad

Hieracia referre malit, non cum eo contenderit. Taber. inquit, videtur eam voluisse exprimere in Hist. & Icon. nomine Pilosellæ maioris alterius. Imò nobis non videtur voluisse, sed expressit. Verum quidem est, quod ea melius pingi potuisset. An Hort. Lus. pilosella maior altera Gross. Neusßörlin.

Pilosella hæc prouenit in muris circa Montebelgardum. Basileæ collegit Frater in syluis, Patavio etiam attulit.

AVRICULA MVRIS HISPANICA, alijs Hieracium Paunonicum flore saturatè croceo.





Vldim^o anno 1608. in horto Stutgardiano Ill. Principis, & horto Fontis admirabilis, plantam à nobis hæcenus nullibi obseruatam, quæ sagè speciosa nobis videtur è genere pulmonariæ Gallorum, quæ quibusdam pilosella dicitur. Hæc autem vocant Auriculam muris. Ei radix est fibrosa purpureascenti amara, manans

succo lacteo, ex se emittit climata instar pilosellæ maioris Fuchij & Consolidæ medix, quæ radicales albas in terram defigunt, ac ea ratione plurimum se multiplicat & expandit: Folia ei primò vncias duas longa, postea palmo longiora, potissimum quæ ex caule prodeunt, ea similitudinem quandam habent cum quodam Scabiosa syluatica, maiora latitudine vncias duas excedunt, quædam habent in margine veluti denticulos longis spatijs dispositos,

positos, nonnihil sunt aspera, potissimum superio-
re parte, inferiore autem nervosa, utrinque co-
piosi pili: *Caulis* ei cubitales & sesquicubitales,
qui horrent pilis nigris longis, per caulem tria
folia, inferiora maiora, superiora minora, & in
iis denticuli maiores, à principio caulium maio-
rum oriuntur minores palmares vel pedales, si-
cuti etiam inter folia caulium, quæ rara: rami-
li singulares: in extremitatibus copiosa *capitula*
florum ex brevibus pediculis prædictæ Pulmo-
narie similibus: calyces siue foliola hirsuta pilis
nigris, mense Maio, in medio solus flos, qualis
prædictæ herbæ vel Hieraciorum se expandit:
Colore insigni quasi Arantiorum non bene ma-
turatorum, in medio apices plurimi lutei bifidi:
folia floris in circuitu qualia Calthæ, denticula-
ta, siue crenata: Vbi flos vnicus evanuit in sine
Maii multi simul florent, & veluti umbellam
exhibent: odor parvus ferè Hedypnoidis siue
Dentis Leonis: Excidunt flores remanentibus
calycibus, in quibus pili & semina, tenuia, longi-
tuncula fusca, semina matura vidi Iunio.

CHONDRILLA FOLIO NON DISSECTO,
caule nudo & foliato.

Descriptio



Radice
firmatur
longa, crassa,
lacteæ succo
turgente, in
capita aliquot
diuisa, folia e-
mittente mul-
ta, palmaria
& longiora,
semicla, plus
minus lata,
Plantaginis
tenuifolia fo-
liis similia, a-
cuminata,
glabra, crassa,
Chondryllæ
cæruleæ in-
stat, eiusdem
pend coloris:
caules frequen-
tes iuncea,
dodrantales
siue pedales,
glabri, silioli,
foliis plerum-
que nudi, non-
nunquam fo-
liati, in binos
ramos ut plu-
rimùm didu-
cuntur, quorū
singulis flos
insidet vnus,
magnus, lu-
teus, in pappo
evanescens;
quibus semina
adherent te-
nuia, longa,
striata, & ruf-
fa, per matu-
ritatem parū
mihī constat

cuius coloris, ex sicca hanc potissimum descripsi.

Condriillæ speciem aliquando seui, herbam à
me inuentam florere Iunio circa Curiam Rha-
thorum ad Rhenum. Valerandus Dourez hanc
candem aliquando mihi dedit pro Chondrilla
ex Syria allata.

Locus &
tempus

SENECIO SIVE ERIGERON VETERIBVS.

CAP. VIII.

Senecio tametsi non fundat Lacteam succum;
Stamen inter Lactarias stirpes eum recensere
placuit, propterea quod semen non illius ut ea-
rundem in auras evanescat. Cūque sit vulga-
tissima herba, nihilominus diligentius eius histo-
riam prolecutus est Dioscorides, quā vel Balsa-
mi, Cinnamomi, vel Garyophyllorum. Descriptio
igitur Senecionis, apud eum sic se habet.

Senecio, qui Latinis aliter inter Dioscoridis
notha Herbulum, aliis Erechthites dicitur, *cauli-*
culo est cubitali, subrubicundo, *foliis* crebris &
Eruce modo per extremitates diuisis, sed mino-
ribus multo: *stribus* in luteum vergentibus, qui
quidem citò dehiscunt ac deflorescentes in pappo
abunt. Atque inde etiam Erigerontis no-
men Senecio apud Græcos inuenit quod Vere
flores capillorum ritu canescant. *Radix* est su-
perficua. Nascitur porro maxime in maceris &
circum oppida.

Erigeron à Græcis, quæ à nostris (inquit Plin.
in cod. ver.) Senecio vocatur, herba est Trixage-
nis specie & mollitia, cauliculis subrubicundis:
nascitur & in tegulis, & in muris. Nomen hoc
Græci dederunt, quia Vere canescit. Caput eius
numerosa diuiditur lanugine (qualis est spinæ)
inter diuisuras exeunte. Quare eam Callimachus
Acanthida appellat, alii pappum. Nec deinde
Græcis de ea constat. Alii Eruce foliis esse dix-
erunt, alii roboris minoribus multo. Nec defue-
re qui & alterum genus facerent, nec quale esset
demonstrarunt. *ve. y. q. r.* Theophr. inter olera &
Intubacea numeratur 7. hist. 7. diutius florens, in-
ter hyberna prorumpens post Aphacam.

Ceterum, Senecionis nomine sequentes do-
nauimus plantas. Primum quidem Senecionem
vulgarem, quem Erygeronem verum sine Senecio-
nem credimus. Senecionem alterum hirsu-
tum, viscidum, maiorem, odoratum. Senecio-
nem folio non laciniato. Senecionem siue Eri-
geronem cæruleum, aliis Conyzam cæruleam.
De his max ordine agemus hæc libro: Senecio ma-
ior, inquit Tragus, verè appellari potest flos S.
Iacobi & pro illo usurpari turd potest. hic flos à
nobis Iacobæa interbitur lib. 25. De Senecio-
ne marino siue Iacobæa marina agemus libro
iam dicto. Senecionis nomen tribui Carduo
benedicto apparebit ex Trago lib. 26. c. de Car-
duo benedicto. Recentiores, teste Cordo, Si-
ymbrium Cardamine, siue Nasturtium aquaticū,
maximo errore Senecionem vocant, ut videre
est lib. 28.

SENETIO VVLGARIS SIVE ERIGERON.

Fibrosā partimque lignosā radice nititur Sene-
cio, tenui, albā, subpurpureāque, sapore olera-
ceo, ex quā atolluntur caules terni, quini, & plu-
res, teretes, striati, hirsuti, brachiati, & concaui,
foliis donati vncialibus & longioribus, pediculis

Herbulum?
Erechthites

Eruca fo-
lio

Erigeron
Plin.
Trixageni
specie

Acanthida
Callima-
chi
Foliis
victas
Genus
lin.

Synonyma
Senecio
Vulgare
siue Eri-
geron
Senecio
hirsutus
gramineus
olens
Senecio
in non la-
ciniatus
Senecio
cæruleus
Iacobæa
Iacobæa
marina
Carduus
benedictus
Symbrium
Cardamine
siue Na-
sturtium
aquaticum

viduis, hirsutis & veluti circumscissis, alterno positu nascentibus: flores in ramulorum fastigijs plures simul iuncti, pediculis brevibus lanuginosis appensi, tanquam itaminum luteorum complexus, qui in pappi celeritate fatiscientes cum ventis feruntur, hæc autem ambiunt innolucra calycum instar, striata, basi squammulis atro mucronatis compacta.

Synon.

Brunfelsi Tom. 2. in Diosc. lib. 4. p. 124. Erigeron siue Senecio herba quæ hodie in acetarijs vtuntur: hæc Herba petrella.

Petrella.

Verbena

femina.

Tragacanth.

C. Bauh. apud Matth. & in Phyt. Senecio minor: Verbena femina Brunfels.

Trago dicitur Senecio, Senecio: vulgaris. Is male, meo quidem iudicio, Erigeron Dioscoridis & Aphacæ Theophrasti ad vnum genus refert & omnia ea de Senecione intelligit quæ Theophrastus de Aphacæ prodidit. Nam & ipse Theophrast. Erigeri expressè meminit. Quod verò Simonem Ianuensem Carduum benedictum Erigerum appellantes manifestè errasse scribat, sicut & illos, qui Nasturtium hoc nomine vocent, a veritate minimè alienum est.

Simonis Ianuensis error.

An lo. Agricola Ammonio in Nicol. Alexand. in suis paralipomenis Carduncellum, quod vulgus Omnium mensium florem, Germ. Aller Monat blumlin vocare tradit.

Synon.

Enflach. Roß. not. Georg. Pich. 1770.

Senecio.

Dodon. gall. Erigeron secundum, Senecio minor (& hoc titulo etiam a Castore inscribitur.) Lat. in fol. Erigerum minus: Erigeri species altera seu minor. Lob. in Adu. & Icon. plant. Gesnero de hort. Tabern. Ic. & Hist. Th. dio & mort. Lul. Senecio siue Erigeron. Camer. hort. Senecio vulgaris. Apud Eustachium. Roesslin Senecionis figura male adpratur capiti de Caputia. Ponitur a Georg. Pich. in annot. in Simil. Macrum cap. 47. de Senecione figura Nasturtij aquatici non bene & præter Amilij sententiam. Senecio Matth. Lac. Fusch. (cui omnes notæ Dioscoridis respondere videntur.) Turn. Corn. in Diosc. H. Lugd. Camer. ad Hist. germ. & Epic. Matth. & Cæsalpino.

Senecio vulgaris siue Erigeron vocatur Græcè *ἔριγρον*. Germ. *Eichwurz* / *Grindkraut*. Belg. *Eruyscrut*, *Grimferuyt*. Gall. *Senecion* aut *Senessin*. It. *Spelliciosa*, *Carduncell*. Patav. *Verzolo*, alibi *Silazzon*. Hisp. *Bon Varon*, *Cardo morto*, & *yerua cana*. Ang. *Gronsfell*. Boh. *Primetue forny*. Hung. *Aggo siu* / *Konto siu*. Nomencl. Pannonico. *ἔριγρον* quidem quasi vernus senex, quod flores capillorum ritu vere canescant & in lanuginem abeant: vnde Latinis Senecio.

Erigeron vnde dictus.

Locus & Temper.

Nascitur maximè in maceris, parietibus, & circum oppida. Montbelgardi passim sponte prouenit in hortis, veluti in orto E. C. tota hieme & æstate viret. Florentem vidi Vere & Autumno Montpelij. Basileæ in hortis & alibi Octobri & Maio, Genevæ Nouembri & Ianuario. In monte Rosberg propè Masnünster florentem Octobri, Patavij Ianuario & Februario.

Vires et Dign.

Testium et sedis infla.

malorum.

Vulnera.

Dign. 162.

Qui cortu.

Plin.

Ex Plinio superflua.

Folia cum floribus, authore Dioscoride; refrigerandi vim habent: proindeque illa cum vini modico aut etiam per sese folia, testium & sedis inflammationes sanant: quin & ex manna thuris cum reliquis medentur vulneribus, tumijs quæ neruis inflicta sunt. Illi quoque pappi per se cum aceto, idem præstant: verum recentes epoti strangulant. Totus [ver. hac postrema periodo caret:] autem caulis si ex aqua coctus cum musto potui detur, stomachi dolores a bile contractos persanar. Erigeronem, inquit Plinius, si fetto

circumscriptam effodiat aliquis, tangatque eadem dentem, & alternis ter despuat, ac reponat in eundem locum, ita vt viuat herba, aiunt dentem cum postea non doliturum. Doloribus Erigeron ex aceto illinitur. Cætera quæ habet ex Dioscoride mutuatus est.

Galenus contentus dixisse Senecionem vim mixtam, refrigerantem, simulque moderate discutientem habere, reliqua velut in herba nota omittit. Cum autem herba euidenter sit amara, vt sicet, abstergat, aperiatque necesse est, quare nil mirum fuerit teste Matthiolo, si femina Epoto foliorum succo, aut totius plantæ decocto, remorantes menses sibi prouocent, abaniculis edoctæ. Senecionem herbam suppurationem accelerare prodidit Fontanus: Cæsalpinus folia recipi in acetaria.

De Galen.

Menses. Suppuratio acetaria.

SENECIO HIRSVTVS, VISCIDVS, maior, odoratus.



Perinde vt Descrip.

Senecio vulgaris, radice nititur fibrosa: folijs donatus similibus similiterque incis, sed lanugine vndique obfuit, idcirco non nihil incanis, insuper caeteris viscidis, mollioribus & terribidioribus, procerior, hirsutior, quemadmodum & florum torcorum in pappos abiturorum

calyculi striati. Planta nonnihil sapore aromatico, figura alioquin hic posita minus placer.

Trago lib. 1. cap. 50. Matricaria sylvestris, Matricariæ siluestre genus. An eidem dicto libro. 96. Senecio secunda maior?

Matricaria sylvestris. An Senecio maior Trago.

Dodon. Gallico Senecio maior: at in fol. Erigerum tertium, in Cichoraceorum ac Intubaceorum familiam reponendum, ferens nonnihil, vnde Cichorij fortidi a nonnullis appellationem adeptum est: sed quod cum Aphacæ herba Theophrasti continere videtur.

Erigeron, Cichoraceum, Intubaceum, Cichorium, Intubaceum, Erigeron, Cichoraceum, Intubaceum, Cichorium, Intubaceum.

Lob. in Obs. & Ic. Plant. amborum meminit, pingens Erigerum; Dodonzi hoc titulo: Erigeron tomentosum. Primum verò siue maius Dodonzi, in Icon. Erigerum tomentosum alterum.

Cæalp. Senecionis species altior, & in omnibus maior. Gesn. hort. Senecio feridus.

Clus. Pannon. Iacobæa Pannonica n. mollior. Hist. post. Iacobæa Pannonica prima, quibusdam Senecio feridus dictus, sine icone.

Iacobæa Pannonica. Hist. post.

Tabern. Hist. inter nomina Artemisiæ: genus Geeler weterig / & wilder Nierstram / Matricaria lutea, & Matricaria sylvestris.

Artemisia lutea. Artemisia sylvestris.

H. Lugd. 1. 5. cap. 18. Senecio feridus Dalechampi, quibusdam Artemisia ferida, Sideritis quæta Plinii nonnullorum. Lectorum erit considerare an hic Senecio feridus non sit idem cum Senecionis

Sideritis. Artemisia ferida. Artemisia quæta.

neccionis specie Dodonæi, cuius figuram hoc eodē capite 18. Histor. Lugdunensis ponit, quasi esset diuersa planta, annon etiam Erigeron tomentosum Lobelii.

Senecio *incanus pinguis.* C. Bauhin. Phyt. Senecio 2. siue incanus pinguis, Erigeron 1. Dod. gall. Erigeron alterum tomentosum Lob. icon.

Locus & tempus. Crescit iacobæa Pannonica 1. Clusii in Pannonia & Austria exeduis siluis. Floret Iunio & semine deciduo quotannis sponte renascitur, variis in locis obseruauit, & habeo in Horto Ill. E. C. semine maturo Augusto & Septembri. Fuchsius præceptor meus cum apud illum essem vocabat Arthemisiā monoclonon Germanicam.

Vitis. Matricariæ siluestris Tragi ligna in siluis exeduis ex ordine composita incenduntur, ut ignis calore terra sationi frugum idonea reddatur.

SENETIO FOLIO NON LACINIATO.

Descriptio.



Herba cubitali altitudine, radicibus tenuibus, candidis, lignosis, dulcibus: caule aliquantisper piloso, rotundo, cauo, medulla lanuginosa facto: in quo folia sunt exigua, pilosa, in ambitu serrata, crassa, aliquantulum viridia, inferne rubescentia, quæ quandoque colore vinoso manus

inficiunt: In caulis summitate flores sunt lutei, in pappos protinus abeuntes. Sapor totius plantæ aqueus est, ut vulgaris Senecionis. Nascitur in quercetis, locisque non admodum siccis, sed humidis interdum & in pratis.

SENETIO SIVE ERIGERON CÆRVLEVS, aliis Conyza cærulea.

Descriptio.

Senecio hic subinde magnitudine, felicius aut infelicius solum nactus, variat, alias sesquipalmaris, alias plusquam dodrantalis: radicibus fibrosis, albicantibus, gustu nonnihil aromaticis: ex quibus caules surgunt multi, tenues, striati, rubentes, hirsuti, ramosi, medulla alba pleni: folia integra, nec usquam dissecta crenatae, lanuginosa, inferiora quidē viciis ferē duas longa, lemunciam lata: superiora ut breuiora ita angustiora, utraque sapore acris & aromatico: capitula quàm in Senecione vulgaris longè crassiora, canaliculata, tomentosa, nonnihil rubentia: florum foliola dilutius purpurea tincta sunt, medium obtinente papposo tomento exalbido in luteum vergente.

Tinctio. Trago lib. 1 cap. 49. Tinctorius flos alter (in Histor. germ. das ander scharren blumen geschlecht Scharren Germ. dicta,) Tinctorii floris genus alterum, primo (Asteri attico purpureo) Tom. 14



hand ab simile, sed per omnia magis extenuatum, & nigricantius, flore lanuginoso, instar florum Hieraciorum in auras evanescente.

Dodon. gall. Erigeron 3. Gall. tierce espece, de Senecion, verum Erigeron & Senecio Theophrasti. Lat. in fol. Erigerum 4. cito quoque canescens cauleculis tenuibus, dodrantalibus, parum hirsutis,

ex obscuriore rubore subnigricantibus: foliis angustis, paucis, mollibusque: stoculis in ramulis eminentibus, pallide luteis, citissime ac non modò eodem die sed sæpe intra horæ spatium in papposam lanuginem abeuntibus. Geln. in fine Hist. Cordi Conyzoides cærulea, heydnisch wandfrant, (Conyzoides dixit) Dentellaria quorundam. Eidem de hort. Dentellaria nostra, Conyzoides quidam herba.

Tabern. icon. Conyza cærulea: Histor. Blau Dürmurg. Cur Tabern. non amplius Conyzam appellat?

Quam essem Tubingæ Fuchsius vocabat Conyzam minorem.

C. Bauhin. Phyt. Conyza 14. siue cærulea.

Flos tinctorius alter Tragi in tractu Rheni in quibusdam pratis, Iuniperorumque nonnullis colliculis ac montibus provenit: Iulio & Augusto mensibus colligitur, posteaque venundatur, qui tinctoribus tantum in usu est. Erigerum 4. Dod. lat. siue 3. gall. in viginosis ericetis, quandoque in siluis macro & sterili solo nascitur. Senecio siue Erigeron cæruleus, siue Conyza cærulea etiam multis in locis provenit, circa Montebelgardum.

ASTER EX VETERIBVS.

CAP. IX.

Aster Atticus (qui apud Dioscoridem ab aliquibus inter notha Asteriscon, ab aliis Bubonion, à nonnullis Hyophthalmion, à Dacis Rathyvida, à Romanis Inguinalis herba vocatur) est virgultum lignosum (pachist. Euladit, virga lignosa pachist. Euladit vet. caulis lignosus Max. cell. flos habens in cacumine purpureum, aut rubeum [pachist. Euladit,] Anthemidis capituli modo diuisuris incisum per ambitum (Asteris, vndique pachist. Euladit vet. Quidam ad xion euladit) foliis stellæ modo radiatis. Quæ verò caulem circundant folia, oblonga sunt ac hirsuta (vet. aliqui tota sequenti periodo carent usque ad Prædestia pulchra.) Exstuant stomacho, oculorum & inguinum inflammationibus, sedique procidit illiciti auxiliatur. Aiunt & id quod in

flore purpurascit ex aqua potum, angina laborantibus, ac plerisque comitialibus opitulari. Prodest verò flos recens ac etiam quia humidus, inguinum inflammationi adhibetur. Si verò aridus sinistra laborantis manu decerpatur, & inguini adalligetur, dolore liberat. Posteriores Græcorum reliqui addunt: Nasci inter petras, locisque asperis, ac stellates huius radios noctu splendere &c. quæ cum superficiali aliquid contingant, nec in antiquissimis opibusque inueniantur, ut minime Discordea, reiciuntur.

Aster, inquit Plinius, ab aliquibus Bubonium appellatur, quoniam inguinum præsepticum remedium est: cauliculus foliis oblongis duobus aut tribus: in cacumine capitula stellæ modo radiata. Bibitur aduersus serpentes. Sed ad inguinum medicinâ sinistra manu decerpi iubent, & & iuncta cinctum alligari. Prodest & coxendicis dolori adalligata. Sic Plin. lib. 26. cap. 5. euarians aliquantulum a Dioscoride, qui de serpentibus & coxendicis dolore nihil habet: sicut Plinius, de oculorum inflammatione, anginis, & comitali morbo nihil tradit.

Diof. Ger. V. 8. 10. *Plin. lib. 26. cap. 5.* *Orbasius, Ruellius, Cornarius, & Anguillara. At Cordus, Marcellus, & Matthiolus, loco distincti- uæ particule, &, copulatiuâ, &, reponunt. Existi- mant enim idē genus Asteris hic describi, quod floris foliola, quæ quidem capitulū ipsum ambiūt, habeat purpurea, medium verò capitulum luteum. At Sarrac. & recte nostro iudicio duo Asteris ge- nera floris colore distincta depingi existimat, quorum vnum illa eadem floris foliola habeat purpurea, alterum lutea: nam in utroque gene- nere quod medium floris locum tenet, citra con- trouersiam melinum seu luteum visitur.*

Inguinalis herba. Foliorum in flore Inguinalis herbæ numerus, positura, & forma, quibus stellæ modo radiatur cognominem stellis, vulgarem alioquin & in sepibus nascentem herbam fecerunt. Vfus deinde medicorumque cætus vtilem inguinibus cogni- tam in græcis Bubonium, in Latinis Inguinalem. Atticus autem Aster, quod ibi frequentior quàm alibi prouenire creditus sit, appellatur. Huophthalmum etiam quidam vocauerunt hanc plantam, quasi Suis oculum, quod totus eius flos animalis illius oculum referre videatur.

Bubonium. Huophthalmum. Asterem Atticum Herbarios hodie partim As- pergulam vocare, Gerin. verò Sternkraut, autor est Cornarius. Nunc, quod monendum videtur, Asterias siue Stellaria nomen est multis plantis commune. Hoc enim nomine donantur Bubonium, Coronopus, Alchymilla, Cardui genus Theophrasti, Myacantha (Carduus nostras stellatus siue Calcitrapa, de qua lib. 26.) Perdiciis quoque alterum genus à Plinio Astericum quasi stel- late nominatum. Præter has omnes sua est Mon- peliensibus Asterias siue Stellaria, quæ à nobis in- scribitur Rubia parua cæruleo flore, de qua lib. 36. H. n. g.

Asterem Atticum esse censet Virgilianum Amel- lum Matthiolus, (de eo dubitat merito Gesnerus, cum adhuc sub iudice lis sit, aliis affirmantibus aliis verò negantibus), de quo ille ita Georg. 4.

Est etiam flos in pratis cui nomen Amello. Fecere Agricola, facili quatuordecim herba: Namque uno ingenem tollit de cespice sylvam. Aureus ipse, sed in foliis, quæ plurima arcum. Funduntur, viola subluet purpura nigra.

Præter nostros Asters, quorum magnam con- quiliuimus varietatem, quosque mox ordine re-

censuimus, plantæ aliæ occurrunt non parvas, quibus Asteris nomen ab alijs inditum.

Conyza enim marina Dalechampi appellatur à Lobelio Obs. & Ic. Plant. & Hist. Lugd. Aster conyzoides Gesneri.

Conyza marina Dalech.

Sic quoque Conyza media à Lobel. Obs. & Schvencfeldio Aster Atticus luteus nominatur.

Conyza media.

Apud Cord. in Hist. pl. lib. 2. cap. 62. pro Atere Attico, & sub eius titulo male apposita figura Chamæli auri quorundam.

Apud Tragus Chamæmelū eranthemum no- minatur Aster Atticus flore medio luteo.

Chamæmelum auri quorundam Chamæmelum eranthemum.

Crithmum tertium Matthioli Lobelius in Obs. Asterem Atticum marinum cognominat.

Sed & Tripolium, Turperum Serapionis cogno- minatur à Tabern. apud Vvirsung. Aster mari- nus nuncupatur.

Est Aster Hermol. Barb. lib. 4. coroll. 734. vulgò Stella dictus, hunc H. n. g. lib. 17. Pedem leonis & Alchimillam vocamus.

Pes leonis. Eryngium.

Aspergula Dodonzi, siue Hepatica Stellaris, multis vulgò censetur Aster Atticus. De hac dice- mus lib. 38.

Asterem Atticum vel etiam Asteriscum Ara- bum interpretes, & Pandeclarum author Mar- thæus Sylvaricus cum Eryngio confundunt: alijs alibium etiam vocant.

Alibium.

Theoph. Golius in Onom. Asterem Atticum ab alijs Vuam lupinam vocari tradit. Sed Vuam lupinam siue Herbam Paris non esse Asterem At- ticum est manifestum. Asterem quidam dicunt, sed non Atticum multi.

Herbam Paris.

Considerandum an Asterion Pausaniz possit esse Marrubium album, inquit Tragus. Idem Tragus Asterij nomen Cannabi etiam tribuit.

Marrubium album Spondylium Imperatorie.

Spondylium inter Spurias voces, Corn. Dodon. & Gesnero testibus, Asterium cognominatur.

Astericum (Imperatoria) non est Meu, inquit Brunfels. Tom. 2. p. 18. in Corollarijs. De Impe- ratoria lib. 17. H. n. g.

Parietariam à nonnullis Astericum vocari pa- tebit lib. 23. cap. de Parietaria.

Hermolaus est testis Caroli. 680. Capita Papa- ueris Asteriscos Græcis appellari. Vide lib. 30. ca- put de Papauere.

ASTER ATTICVS PURPUREO & albo flore.



Aster Atticus qui creditur, caules habet cubitales & sesquicubitales, tenues, teretes, duros, hirsutos, subrubentes, folijs amictos oblongis, acuminatis, asperis & pilosis, interdum crenis paucis incis. lapore subaromatico & subamaro ac sic- cante: caules circa fastigium in fur-

Descriptio

Bubonium. Huophthalmum.

Stellaria moni aquo- vocum Carduus stellatus.

Asterem.

in sarculos dividuntur quibus flores insident a-
mœni, radiato Bellidis maioris positu, sed colo-
re violaceo (Dod. c.eruleo purpureo,) aut albo, di-
sco medio fulvo, in pappos facessente: radix te-
nuis transversa iacet, a qua multæ demittuntur
fibræ, sapore amaro nonnihil aromatico & cal-
faciente, quidam aiunt nonnihil Caryophylli
resipiente: semen parvum sublongum, luteo
non multum dissimile. De hoc autem ait Tra-
gus. Flos tinctorius primus, tinctoribus spiren-
tibus Scharrenfraut dicitur.

Hunc Florem tinctorum i. vocat Tragus, &
Chamæmelum tertium, & tinctoribus Spirensi-
bus Scharrenfraut dici tradit.

Matthiol. Lac. Castori, Fracast. Camer. ad
Epitom. Matthiol. Schvvenckf. Lonic. Cordo.
Dodon. gall. & Lar. Guiland. Euch. Ræsslin. &
aliis passim Aster Atticus. Fuch. Aster Atticus
purpureus. Gesn. de hort. Aster Atticus Fuchii.
Bened. Aret. Aster Atticus Fuchii flore puniceo.
Camer. hort. Aster Atticus flore cæruleo: ad H.
Germ. Matthiol. Aster Atticus. Bubonium, In-
guinalis. Lacunæ Asteris Attici 2. species. Thal.
Aster Atticus cæruleus. H. Lugd. Aster Atticus
Matthioli. Wirsung. Sternfraut, Aster.

Aster att.
Fuchii.
Inguinalis

Aster pur-
pureus

Clusio Aster Italorum & Fuchii: Is autem
iconem habet quam Lobel. Obs. & Icon. plant.
ponit nomine Asteris Italorum.

C. Bauh. Phyt. Aster 3. (i. apud Matth.) siue ce-
ruleus (flore cæruleo, Camer. hort.) vulgaris du-
plicis differentia, qui enim maturius floret, mi-
nus altè assurgit, quam qui serius: deinde habe-
tur latifolius & angustifolius. Item: Aster 4. siue
montanus luteus. Una planta.

Nomina
linguæ

Aster Atticus vocatur græcè Ἀστὴρ Ἀττικός,
Bocconius, & alii, nonnullis Inguinalis, Asterio,
Asteriscon. G. Megerfraut / Scharrenfraut /
Bruchfraut / & Sternfraut / magistrow. Belg.
Sterrecrout. Gall. Petite Espargoutte, seu petit
Muguet. H. Bob. & Efralia-da.

Locus &
tempus

Nascitur asperis, incultis, collibus & conual-
libus variis in locis, florens Augusto: semine ma-
turo Octobri.

ASTER ATTICVS MONSPELIENSIS purpureus angustioribus folijs.

Descriptio



Cognatus
est Asteri
Attico Fuchii,
caulibus rectis,
cubitalibus, ter-
tibus, hirsutis:
per quos folia
crebra, glabra,
nervosa, Li-
nariz folijs
magnitudine &
forma respon-
dentia: flores
in frequentibus
pediculis, alijs
palmaribus, alijs
vncialibus
umbellam men-
tiuntur, Aste-
ris Fuchiani si-
miles, pauld ta-
men minores,
violaceis in

ambitu folijs, disco luteo, qui in pappos resolu-
tur. C. B. Phyt. Aster 14. siue Tripolii (Tripolii
flore etiam dicit Lobel. in icon.) variegato flore.

Tom. II.

Asteris Attici Fuchii species angustioribus Locus &
folijs florens apud mare Monspelii a me visa tempus
mensis Septembris.

ASTER ATTICVS LVTEVS, SV- pinus, spinosus.



Aster hic
supinus,
est cauliculis
multis ab una
radice prodeu-
entibus donatus,
humis magnæ ex
parte diffusis,
hirsutis & hir-
sutis: folijs nu-
merosis, superi-
ori panè simi-
libus, sed pau-
lò viridioribus
singuli rami
duræ & folio-
sum sustinent
cauliculum, in
quo flos luteus
circinatz ro-
tunditatis, Buph-
thalini aut

Descriptio

Cherisanthemi ximulus: quo evanescente, calycu-
li in aded dura & lignota capitula evadunt, ve
vix frangi possint, atque semen, quod in
iis continetur & hanc inhaeret, eximi.

Clusio luteus Aster Atticus supinus siue secundus:
Hist. post. Aster 2. supinus. Dod. de purg. in ap-
pend. ubi eadem icon quæ apud Clusium, Aster
Atticus flore luteo: Eandem habet iconem Lar.
in fol. pro Astere Attico supino siue 4. Lob. Obs.
& Hist. Lugd. (cui & Aster humi iacens,) Aster
Atticus supinus Clusii. C. Bauh. Phyt. Aster 2.
siue luteus supinus. Camer. hort. Aster Atticus
repens Clusii.

Aster att.
sup. Clus.

Aster att.
flore luteo
Clus.

In Germaniæ, Italiæ, Galliæ, & Bohemiæ as-
peris & incultis reperitur locis, in sylvis, in colli-
bus, nec non etiam in pratis: florens Junio, Iulio
& Augusto.

Aster auricomus glaber latifolius folio non rigido.

Non penitus omni pilo caret, verum tam brevè
tamque ratum, tam per folia, quam per caulem
habet, ut visus vix capiat: aduicuntur autem
alternatim folia, caulem pinnis complexa, vnciæ
circiter lata, tres longa, nonnihil in ambitu sinu-
ata: ex quorum vniulcuiusque sinu palmaris cir-
citer emicat pediculus, florem plerumque vnicum,
aliquando binos sustinens, aureo intenso colo-
re micantem, magnum, Tragopogonis lutei x-
imulum, disco luteo, denso extrinsecus agmine
obvallatum foliorum viridantium, leuium, acu-
minatorum, tantæ longitudinis ut ipsum florem
interdum superent. Collegit in campestribus
& squallidis quibusdam prope Lupi montem
Cherlerus Genes meus.

ASTER PURPUREVS MONTANVS.

Asteri montano purpureo radix satis crassa,
longa, nigricans, fibrata, in plura diduci-
tur capita, ac se propagat: ex quorum singulis

Tit. 2

Descriptio



energit coliculis
vni palmaris,
rarius dodran-
talis, interdum
etiam cubitalis,
hirsutus, paucis
foliis vestitus, in
summo florem
gestans, maiore
quam vulgaris
purpureis alte-
ris, cetera simi-
lem, foliolis ce-
ruleis purpureis
ue luteum veluti
oculū stellatim
ambientibus,
quem in pappis
appensum semen
sequitur: folia
circa radicem
multa, pilola, vni-

ciam vnam, duas, aut tres longa, semunciam lata,
per extremum rotunda. Autore Camerario in-
terdum globuli tumentes villosi prope radicem
adnascuntur foliolis, estque omnino minor vul-
gari Astore.

Synon.

Camer. apud Matth. Germ. Aster Atticus mi-
nor, hirsuta vesicula quæ adnasci solet, Flein
Sternfraut: In epit. eiusdem, Aster Atticus ce-
ruleus alpinus.

Descriptio

Clus. Pann. Aster Atticus quintus: hist. post. se-
ptimus, Austriacus quintus, Aster Alpinus ce-
ruleo flore, siue septimus.

C. Bauh. phyt. Aster 13, siue montanus ceruleus
magno flore. H. Lugd. Aster purpureus montan.

Locum
tempus.

Oritur herbosis Austriacarum Alpium iugis.
Florat Iulio. In hortis translata sub finem Mai
& Iunio floruit Clusio, subsequens deinde hiems
abstulit & corruptit: ex earum enim stirpiū est
genere, quæ cultura vix miscere volunt. Aster
purpureus montanus Dalechampii in sabulosis,
aridis, & perflatis montium tumulis ac cliuis gi-
gnitur.

ASTER MONTANVS FLORE luteo magno hirsutus, quibusdam Oculus Christi.

Descriptio



Enicula-
tim veluti
incedit obli-
quæ acta radix,
nigricans, cras-
sifuscula & ca-
pitata, fibras
satis longas &
numerosas de-
mittens, ex
pluribus dis-
paratis capiti-
bus subinde in
vnum coeunti-
bus conflata:
caules complu-
res ex supina
radice pedales
& maiores
surgunt, non-
nunquam pal-

mares tantum, pilis obiti: foliis vestiti supradis-
tatis, frequentibus verò terram proximè, tomen-
tosis, albidis, vncias tres vel quatuor longis, se-
mū. latis, ex principio angusto valde viroso: flores
in ramulorum extremis emittunt singulares, ma-
gni, aureis in ambitu comantes foliis, disco con-
colori, foliis flori circumiectis albidis, euanescenti-
bus in pappo.

Synon.

Lobel. Icon. plant. Aster montanus hirsutus.
Tabern. Icon. & hist. iconem habet ex Lobelio
nomini mutata pro Astore montano luteo for-
mina, Berg Sternfraut Weiblein. Hist. Lugd.
Aster luteus, Oculus Christi minor. Item Aster
Atticus Penz. Nostra icon facta est sicuti & de-
scriptio ad siccam plantam, in qua flores minores
paruli, quos expansos esse oportebat: forte Lobe-
liana facta ad plantam diligentius siccatam.

Casp. Bauhin. Phyt. Aster 11, siue luteus monta-
nus hirsutus: An Conyza maior altera Thalic-
trum? Item: Aster 12, siue luteus montanus hirsutus al-
ter. Idem forte cum precedenti.

An Conyza
maior altera
Thalictrum?

Aster luteus, siue Oculus Christi minor Hist.
Lugdunensis in sabulosis tumulis & aridis nasci-
tur quæ Lugduno itur Viennam. Asteris Attici
genus flore luteo magno, hirsutum reperi inter
Nemaulum & Auenionem prope tres insignes &
antiquos pontes du Gab.

ASTER ANGUSTIFOLIUS luteus.

PVlchrum est Asteris genus, caule gracili, ri-
gidulo, foliis æquabili graminea angustia pal-

Descriptio



maribus aut
minoribus, a-
cuminatis,
æruosis, &
maxima ex
parte glabris,
viridibus, sine
pediculis villis,
dense stipato:
cuius furculis
singuli im-
positi flores ma-
iusculi, lutei,
Calthæ vel po-
tidis Conyze
medicæ Mon-
pelienstium, cui
congener vi-
detur, aut Bri-
tannicæ Lug-
dunensium, ca-
lyce squam-
mato ex viridi

incano, hirsuto.

Clusio in Pannon. est Aster angustifolius
quatuor, qui pingit & describit.

C. Bauhin. Phyt. Aster 7, siue luteus angustifo-
lius.

In vmbrosis montium vbi Viennæ vicinorū
pratibus, in ipsis etiam collibus herbosis, atque in
siluula ad Danubium sita paulo supra Eberstorf
arcem Imperatoriam, primo cum semine
ab vrbe Viennæ miliari, copiose
crescit. Florat paulo se-
rius posteriore.

ASTER

ASTERI MONTANO HIRSVTO MAGNO
flore, siue Oculo Christi similis si non idem,
siue Conyza tertia Clusii.

Descriptio



Est nobis planta ex Agerianis stirpibus siccis praedicta a nobis descripta plurimum accedens, si non eadem, sed fortè variâ ratione loci: folia priora sunt pede longiora, ex angusto longo pediculo vix vnciam lata, figura Scorzonerae foliis accedentia, albicantia, villosa, potissimum internâ parte, tactu laui: folia verò

per caulem breuiora, & breuioribus pediculis, candidiora: flores similes, quibus orbis ex foliolis luteis, in medio apices ex tomento emicantes, exterius calycis squammâ siue foliola albicantia: flores res in nostra planta, vnus maior. Ex proportionem partis quam habemus, videtur hæc planta cubitalis. Icon autem eadem quæ Conyzæ Austriacæ Clusii: vtrique bene conueniens.

Floret lunio: ac in locis siccis & aridis, heribris tamen nascitur: Clusius.

C. Bauh. Phyt. dicitur Conyza 6. siue Pannonica.

ASTER TERTIVS PANNONICVS CLVSII
luteus folio hirsuto Salicis.

Descriptio



Caulibus est villosis re-
tibus, dodrâ-
te altioribus,
per quos alter-
natim nascun-
tur folia, nullis
subnixa pedi-
culis, Salignâ
circumscriptio-
ne, venosa, pi-
lis obsita, le-
mucia latiora:
nonnunquam
angustiora, vn-
ciam vnâ aut
tres longa, le-
uiter in acumē
desinentia: flos
summo insidet
cauli, Calthæ
par, luteis per

ambitum foliis, concoloribus in umbilici æquo-
rum fibris, calyce est hirsuto, viridante, folio-
so. Ressecatis floribus, inquit Clusius semen
exiguum in capitulis remanet, quod maturum
cum pappo à vento discutitur: radix fibrosa ad-
modum.

Clusio Pannon. Aster Pannonicus tertius: In
Tom. II.

post. I. hist. Aster lanuginoso folio siue quintus.

C. Bauhin. Phyt. Aster 6. siue luteus hirsuto Salicis folio: quandoquidem autem suspicamur Camerarium apud Matth. in hist. Germ. hunc quoque depingere sub titulo Ein ander Sternfrum mit gelben blumen: Alius Aster flore luteo: Et in Epit. eiusdem, pro Aster luteo flore, aliorum Conyzæ species: nos assumpsimus iconem Camerarii: verum ne quis fallatur lubet eius descriptionem addere quæ eiusmodi est. Caules proferunt mediocres per quædam intervalla radicis repentes & se propagantis ab inferiore parte demissis fibris rectis, quæ aliquantulum odorata sunt, sapore aromatico modicè ad Cinnamonum saporem accedente, subacri. In summis caulibus duos vel tres ramulos habet, quibus flores lutei disco in medio apicibus conferto insident, quicquid in pappos abeunt. Folia per caules alterna hirsuta nullo pediculo duab. quasi alis eosdem amplectuntur. Nascitur in salibus.

Aster in
seculum
Salicis
folio
C. B.

Aster luteo
flore
Camerarii
Icon.
Descriptio
C. B.

ASTERI MONTANO PURPUREO SIMI-
lis vel Globulariæ.

Descriptio



Tota pul-
chella est
planta ex Ageri
stirpibus siccis:
radice nigra,
crassa, pro pro-
portione pusille
herbæ, cuius
cauliculus qua-
tuor vnciarum
foliis alternis
vestitus latius-
culus, vnciam &
semitis longis, in-
ferioribus ex
longioribus pe-
diculis quibus-
dam vncialibus,
aliis duobus &
semitis culmo
paulò latiori-
bus, in obrutam

extremitatem desinentibus: flos summo cauli
insidet vnicus, staminib. multis glomeratus, simi-
lis Globulariæ quæ Aphyllantes dicitur: folia ac-
cedunt ad folia Asteris montani purpurei, sed
angustiora & delicatiora, nec ita hirsuta videntur,
lectores rem poterunt diligentius perspèdere
si eis similis occurrat planta.

BRITANNICA CONYZOIDES, QVIBVS-
dam Aster Pannonicus Clusio.

Descriptio

Britannicam Dioscorid. voluit non nemo do-
ctus, Conyis & Asteribus cognatam plantâ,
cubitalem, radice obliquâ, repente, fibrosâ, acri,
cum aliqua aromaticitate, caule incano villosa,
in alas aliquot circa summum diducto: foliis ma-
ximis quidem sesquipalmum longis, duas uncias
latis aut amplioribus, reliquis palmum circiter
longis aut breuioribus, semunciam latis: vtrius-
que longa, densa, canâque lanugine subtus pu-
bescentibus, sapore amaro præditis, circa villam
adstrictionem quantum possum animaduertere:
flore Helenii sed minore multo, luteo disco in
pappo auolante.

Text 3

Plant. Icon. Britannica Gesnero & Lugdun. con Lobeliana non placet, nec etiam Dalecham-
pi, seu nec descriptio quæ est in Hist. Lugd. lib. 9.
cap. 7. ut enim potius facta est ad descriptio-
nem Dioscoridis quàm ad ipsam plantam, quod
stille agnosceret, cui nota fuerit planta quæ tra-
dit Dalechampi, nec novis ea agnosceret ad-
ditionem: ac displicet tribui huic Britannicæ no-
væ vires non expertas ab ipso Dalechampio, sed
ex persuasione vanæ. Considerandum an hæc tra-
datur à Clusio Pannon. nomine Asteris Pannoni-
ci primi, & in post. H. L. 4. c. 7. Asteris, Austriaci.

An Aster montanus prægrandi flore Helvæ.
Lobellii.

Tabern. Icon. & Hist. Aster montanus luteus
mâ, berg Sternfrucht Maundlein. Descriptio il-
lius desumpta, ut ipse faceret, ex Lobel. interea
mutata, idem, pro more confecto, licet non de-
monstret ubi videtur plantam, nec noram aut vi-
sam censens: Ceterum Britannicam Conyzæ
idem forte plagie Leon. & Hist. pro Conyza, quæ
non displicet pro hac, quamvis aliam plantam in-
telligat, nempe mediani huc tertiam de qua pau-
lo post agemus.

C. Bauh. phyt. Aster, vel hircus magno flore.

Lobellius hanc magna copia nasci tradit Lug-
duni ad montem & intra pomeria peninsulæ her-
bidis amœnæ, quam alluunt & determinant duo
flumina: hinc Rhodanus ab Oriente, illinc Arar
(quæ vulgò Sone dicitur) ab Occidente: & vo-
cant vernaculè *Ayrea*. Nos observavimus pro-
venientem Lugduni à Ayno, florentem Octobri.
Montbelgardi etiam nobis visa non longè à S. Su-
sanna pago & alibi, florens Augusta.

BACCHARIS VETERIBVS.

CAP. X.

Baccharis, ut eam describit Dioscorides, her-
ba est fruticosa (βακχαρίς, quæ vox in vulg.
exempl. deest.) odorata & coronaria (coronaria
vet. quidā,) cuius folia aspera magnitudine inter
violam & Verbascum (βακχαρίς, Ald. ἀμπύλη) me-
dia: caulis angulosus, altitudine cubitali, propa-
gines adnatas habens (παράφυλλα, Matth. suspica-
tur legendum παράφυλλα) flores purpurei sunt,
subalbicantes, odorati, (Cat. addit ἀρωμα) radices
Veratro [Elleboro] nigro similes,
quibus odor (vet. quidam addit ἀρώμα)
est cinnamomo proximus. Solum amat asperum
minimèque humidum. Radix in aqua decocta co-
uulsis, ruptis, enersis, seu ex alto præcipitatis, spi-
randi difficultati, tussi veteri (Ver. addit, ἀρωμα) Jac
vrinæ difficili auxiliatur. Menses quoque
pellit, & contra serpentium morsus vituliter ex vi-
no propinatur. Subdita vnica è renellis radici-
bus partus extrahit. Decoctum verò puerperis in-
ferentibus vitale. Vituliter quoque in diaphanata
[diaphanata sunt res in puluillum detritæ ut com-
modè inspergi possint] inferitur, quippe quæ ma-
gnam habeat odoris gratiam. Folia ut pote quæ
astringant (καὶ ἀσπύλλια, Sic Aegineta Bac-
charis folia astringendi vi prædita agnosce: at
radici vim obstructions aperiendi, mensisque &
vrinas ciendi tribuit:) capitis doloribus adhibita
profunt, itemque auxilium inflammationi, ægilopis
incipientibus, & mammis à partu inflammationis
arque etiam erysipelatis. Ceterum & ipse odor
somnium gignit.

Phonius præter ea quæ à Diosc. nominatus est

dictæ ad vnguentis olim commendatæ, quæ
quoddam errore crasso Baccharis rusticam Nardum
appellasse, cum alia sit herba sic cognominata,
quam Græci Alaton vocant. Quoddam e-
tiam Perpensam vocasse.

Galenus in Simplicibus Baccharim potest
sed in glossis Hippocraticis βακχαρίς αὐτὴν πρὸς
ἐξοντι, Vulpes nipp. lib. de natura muliebti,
& per Diosc. βακχαρίς ἴσχυος αὐτὴν, inquit.

Paulus ex Dioscoride transcripsit, Baccharis
est herbam odoratam, similem Cinamomo, Co-
ronariam, acrem. Cuius radix decocta ab obstru-
tione liberet, & vrinas ac menses imponat: folia
verò astringendo fluxionibus profunt.

Virgilius etiam nouit Baccharem, non solum
ut Coronariam, sed etiam ut astringentem, fasciis
nimia lunde sic enim habet in Mœliis.

ut fulta plantam lœdare, Baccharis pro-

creta, ne vari non mala lingua furat.

Baccharis ignota est Officinis, sed verbanorum
vulgus, Benedicten frant, id est herba Benedicti,
siue Benedictam vocat: aliqui etiam benedictum,
hoc est, Chirothetas nostræ domus (est hæc Ga-
ryophyllata de qua lib. 17.) appellant.

Anguill. existimat caput de Bacchari spurium
esse, & ideo eximendum ex Dioscoride: Græci
enim nullam esse herbam sub nomine Baccharis,
ac caput de Bacchari in Dioscoride idem esse ad
capite de Alaro: transpositum tamen, corruptum,
diuulsum ab aliquo sciolo, qui huic rei attende-
re debebat. Quod ad Baccharem attinet, Lati-
norum, nihil se certi scribere posse: cum Vi-
gilius nihil de eius forma dixerit, Plinius autem
describens Combricem dixerit simile esse Bac-
chari: unde patet Baccharim eius differre ab ea
quæ Diosc. Baccharis habetur.

Contrà sic Lobel. & Pen. in Adu. Licetius a-
buruntur Lectoris pastoria, qui istud caput
Dioscoride quasi spurium expulsum voluit, &
Labes hæc profecta è fragmentis Crætor, ubi
Baccharis Dioscoridis Alarum vocatur & descri-
bitur. Quod quidem nos monet, sedulam appella-
tionum perpensionem neutrquam neglectam ha-
bendam esse accuratis viris, veri fidei venientibus.

Monspelij quæ Baccharis vulgò creditur est nobis
Conyza maior Matthioli. Ex Ruellio non
potest intelligi, quam plantam lib. 3. cap. 37. pro
Bacchari herba fruticosa intelligat per D. Mariz
Chirothetas, existimamus tamen eadem esse cum
sequenti. Eorum opinionem, qui Baccharim di-
cebant Digitalem purpuream refellit odor puti-
diusculus. Caryophyllatam nonnulli suspican-
tur esse Baccharem Dioscoridis, verum descriptio
non conuenit plantæ. Baccharim Libani à Rati-
uollio traditam non probat Clusius, de ea age-
mus post Gnaphalia. Baccharim Germanicam ac-
etispa, Ocymum minus, siue Basilicam vocat Tra-
gus. Baccharim Dioscoridis affirmaret Maiora-
nam siluestrem ni stultæ temeritatis argui se posse
vereretur Tragus. Si Matthioli Baccharis est ver-
basei species ut Adversaria volunt pag. 145, per-
pendendum an possit esse Blattaria purpurea
Baccharim Lonicenus, & Brassauolus ipsum se-
cutus, eam plantam magno errore esse putare,
quam quidam Selaream appellant, & nos Galli-
trichum inscriptimus. Alteram Ornithoglossi
speciem [Gallitrichum siue Ornithoglossum] Baccha-

Pulmonaria ad Buglosium apcedens
Leucoium Asarum.
 non esse non placet Dodonæo. Baccharis, ut testatur Turnerus in Herb. Angl. par. 1. pag. 74. dicitur Officinæ Pulmonaria, quam ad Buglosium accedere scribimus H. n. g. lib. 33. Violam maronalem Fuchii albam, purpuream, puniceamque (Leucoium) aliqui Baccharin esse putant. H. n. g. lib. 11. Baccharis etiam dicitur Asarum, quamvis appellatio Baccharis Asaro minime conveniat.

CONYZA MEDIA MONSPELIENSIS.
 quibusdam Asteris Attici genus folio
 glabro rigido.

Descriptio



Conyza medicæ nomine innotuit Montspeliensis herba, caule pedali & plusquam cubitali, striato, glabro, duro: foliis alternatim positis amictis, utque duris, rigidis, nervosis glabris, pediculo destitutis, femunciam lata aut paullo latiora, tres uncias plus minus longa, acuminata, le-

uiter in ambitu crenata: flores Chrysanthemi, conspicue magnitudinis, lutei, & capitulo squaroso, succedente cum seminibus papposa lanugine: atque hi quidem, non secundum caules & ramos nascuntur, sed Asterum modo singuli singulorum surculorum extremis insident: radix lutea longa, fibrata. Icon nostra facta nobis absensibus non placet, erat pingenda ex planta virenti, uti imperaueramus, sed picta ex sicca.

Aster Atticus Pann.
Clusio Salicifol.

Existimamus hanc à Clusio traditam in Pannon. pro Asteris Attico Pannonico secundo, & in post. hist. pro Asteris quarto, seu Austriaco secundo, Asteris Pann. salicifol. quarto.

An Tinctoria flos 3.
Trago.

An Trago Tinctorii floris tertium genus, das dicit Scharzenblumen geschlecht.

Bellistinea oculi Christi.

An Gesl. in sine Hist. Cordi pag. 116. Tinctorius flos luteus Tragi & parviflorus flore luteo?

H. Lugd. Asteris lutei genus aliud, pratis viderique locis gaudens, quorundam sententiâ Bellis lutea, alius oculus Christi vocatus.

An Cæsalp. Asteris Attici altera species in rudibus ramosa, altior: capitulis ac floribus minoribus luteis?

An C. Bauh. Phyt. Aster 4. siue montanus luteus Salicis glabro folio: Aster montanus Lobel. Icon. p. 350.

Florentem reperi Iulio inter l'auisconne & Dampierre locis latis siccis ad sepe tamen. Plantarum Montbelgardii in Horto Ill. E. C. reperi etiam inter Montbelgardum & iuxta vires montis la Chan, semine maturo Iulii sine. Observauimus etiam florentem inter Colmarium & Polmeiller florentem Iulio. Frater Casp. Bauhinus misit

collectam Basiliensibus montibus, nomine Asteris Conyzoidis Gesleri.

CONYZA MEDIE MONSPEL.
 affinis multiflora.



Est nobis inter nostras plantas siccas una cui manu Valeradi Dourez ascriptum est Conyza Matthioli: Hæc similis est Conyza medicæ Mospeli. dicitur folia glabra rigida: verum per caulem admodum crebra, breuiora & in extremis minus lata denique sunt, sublonga, flores lutei quamplurimi veluti

Conyza Matthioli Valerandi

umbellam representantes, minores, duodecim supputauimus, exstimauius caulem fuisse cubito altiore, satis autem crassus est: Sunt nobis similes plantæ non recordamur unde, minores & cum paucioribus floribus.

CONYZA SPECIES FOLIIS
 virgæ aureæ.



Est nobis Conyza quædam collecta anno 1595. Iunio mense, Spitz in horto Cl. & insignis luriscon. D. Fengenagel Assessoris Cameræ Imperialis Spirensis studii seduli indagatoris, ea non parum differt à cæteris plantis quæ Asteres vel Conyza denominantur, folia enim per caules alternatim disposita, serè similia Virgæ aureæ vulgaris foliis, quatuor vel quinque uncias longa, ex angusto pediculo longo dilatantur ad unciam unam, dein paulatim tendunt in acumen, eo modo quo Virga aurea, in iis pilos non animaduertimus, folia in superioribus partibus breuiora & angustiora: sunt ex principio lato: Caules rotundi, cubitales & sesquicubitales, in aliquot ramos diuisi, in quorum longis partibus supremis capitula magnitudinis circiter Chamæmeli lutei vulgo dicti, quæ cinguntur corona paruum foliorum luteorum, v. cæteræ Conyza & Asteres, qualis

Locus

Descriptio

si dicitur non recorder: calix constat ex foliis
siue squamis cinereis vel albicantibus. Tugur
cum esse anno 1561. apud Gesnerum observare
tam, ea ei dicebatur Conyza species, eandem re
peri inter plantas siccas Valerandi Dourez cu
hac inscriptione: Conyza media quidam.

CONYZA MEDIA MATTH. FLORE

magno luteo, humidis locis
proveniens.



Conyza me
dia ad cu
bitum vnum
aut alterum ex
crescit, inter
dum altius, ca
le tereti, lanugi
ne incana obdu
cto, lentis: foliis
crebris nullo or
dine accrescen
tibus, alis vtrin
que caulem am
plectentibus, a
cuminatis, ru
gosis, albican
tibus, villosis: flo
res raris extre
mis insident,
Bupthalmi,
circinata folio
rum luteorum

Synonyma serie disci medii orbitam concolorum radiantem
ambiente, odore nullo eccellente: radix subest
caulem crassitie equans, oblique fere acta, paucis
libris donata.

Trago, qui eam describit lib. 1. cap. 54. vocatur
Conyza maior seu mas.

Fuch. hist. Calamintha tertium genus, An
Anguill. epist. p. 110. Conyza tertia? Matth. hanc
depingit in priorib. comm. in Diosc. lib. 1. cap. 119.
In post. cum mag. fig. Lat. & Ital. cap. 130. sub titulo
Conyza media (vt & Lacuna, & Dodon.) sed non
describit: in Hist. Germ. Camer. & Epit. eam
exhibet pro Conyza 1. Mitterl. durnburg.

Lonic. lib. 5. cap. 100. Calamintha tertia, Gele
Münch. Item cap. 117. Conyza media Mitterl
durnburg. Frustra duas figuras & duas historias
vnius plantae diversis locis ponit.

Gesl. de hort. Conyze species tertia aquatica.
Lob. & Penz. Adv. vt & Obseru. Conyza me
dia, Dioscoridis lineamentis affabre congruens.

Clusio Pann. p. 526. Conyza tertia vulgaris
frequentissima per Pannonias locis riguis, ab o
mnibus tertia Dioscoridis aut media appellata,
quæ duplex est maior & minor.

An Thabo Conyza aquatica duplicis differe
ntie: alterius speciei folia sunt integra & latiora,
alterius paulo strictiora & profundius in ambitu
ferrata.

C. Bauh. phyt. Conyza 4. siue maior vulgaris,
Conyza maior Trago, hinc icona, Conyza Matth.
& Baccharis Monipellensium. Item Conyza 5.
siue media, Asteris flore luteo, vel 3. Dioscoridis:
Cunilæ tertium genus apud Plinium lib. 10. cap.
16. quæ Cunilago: plura habet genera Cunilæ, vt,
saciæ quæ Satureia est hortensis: Cunilam
montanam, quæ Satureia sylvestris: Cunilam
palestina, quæ origanum silvestre: & denique

Cunilaginem quæ Conyza est. Matth. hanc
Conyzam maiorem Trago separat Conyza Ma
thioli & Bacchari Monipellensium Lobelii.

Conyza media Matth. flore magno luteo, hu
midis locis proveniens. Germ. vulgo dicunt dero
routa/ aut danderout. Fuch. Obs. Matth.
Gall. Calament aquatic. Hipp. perna dola podya o
rta. Boh. glasy frans.

Conyza duo genera in locis hinc & ac
minofis, cuiusmodi sunt margines fluuio
rum, paludibus Sole exiccatis, humidioribus pratis, &
ad nonnullas sepes nascuntur. Frequentissima in
omnibus regionibus quas peragunt. Clusio lo
cis riguis. Basileæ, Lugduni, Monipellii, Genovæ
& Montbelgardi observantur.

Eius facultates Clusio non sunt competere. Vi
res à Diosc. Conyza attribuitur huic tribuit Ta
bern. atque alii: verum quomodo satis appareat
non bene notas has plantas & tribus diversis plu
ris indistinctis ascribere vires nos eas omi
timus, ne cuiquam illudamus. Solent hanc A
nicula in die Assumptionis Mariæ, vt vulgo vo
cant, colligere, suisque sanguinibus, & quas vo
cant Verbenis adiungere, ac consecrare, aduer
sus Diaboli præstigia, tempestatque iniurias,
sibi persuadentes in locis tonitruis, grandineque
minime nocere posse, in quibus Conyza seme
tur. Sed relicta his superstitionibus, ad alia Cony
ze genera transeamus.

CONYZA MEDIA MINOR SPECIES

flore vix radiato.

Conyza media altera, radice fere est vni
ca, palmari aut sesquipalmari, aliis paucis
libris donata, alia plurimis, nunc recta, nunc co
preolorum ritu contili, lignosa, alba, insipida.



Gaul. erigit
plures, subru
bentes, Cony
za media
prioris bre
uiora, sesqui
palmari &
dodrantrales,
teretes, subhi
sutos, & Gna
phali vulga
rissimi ritu cis
fastigium ra
mosos, hoc est,
vt soboles ma
trem superet.
Alia ex inter
uallis alterna
tim oriuntur,
quàm in dicta
Conyza mino
ra, Senecionis
cerulei fere

paria, undulata ac crispa, odore remissiore, sapo
re ingrato: flores minores quam in Media prima
Conyza. Nostra non parum placet, ita sculptam
emimus. An Trago Conyza femina Theophras
ti? Inquit Gesl. apud Cordum in Hist. lib. 2. cap.
143. Conyza Tragi, quam hic exhibeo, vt cum
Cordi Conyze conferatur, videtur Conyza mi
nor Matthioli. An igitur Conyza Matthioli mi
nor? Hanc frater C. Bauhinus sibi persuadet esse
Conyzam Lobelii, quod facile concedo.

Matth. 101 Matth. ponit figuram sine descriptione parum artificiosam. Lacuna figuram habet Matthioli Conyza minoris nomine. Lonic. Conyza minor seu foemina, Flein durreurg.

A Dodon. gall. Conyza minor tantum describitur, ac ab eo existimatur Conyza foemina Theophrasti. Eadem in sel. lat. pingitur pro Conyza minima, & describitur pro Conyza tertia vel minore, Theophrast. foemina: aliis Panion, vel Libanotis, ut inter norhas appellationes reperitur.

Conyza minima Lobel. & Pena Adu. Conyza minima siue Pulicaria. Obs. pag. 137. Conyza minima, minime omnium glutinola: perperam Conyza minor Matthioli. Pnyllium Cordi. In hist. lib. 2. c. 119. Ego existimo errore Typographi ibi positam, nec hanc intellexisse Cordum ut putat Lobel. Pl. Icon. Conyza minima.

Camer. ad Matth. Germ. sine icon: Parua Conyza Norimbergae proueniens locis humidis secus vias, depicta à Lobelio & Dodonzo.

H. Lugd. p. 1044. Conyza minor Matthioli. Item p. 1045. Conyza minima Lobelii. Hae describitur, illa non, una verò planta. Clus. Pann. & Hist. post. Conyzae mediae minor species, vel Conyza tertia vulgaris minor. An Thallio Conyza minima. Tabern. Icon. & Hist. Conyza minor, Flein durreurg. C. Bauh. Conyza 7. siue minor flore globoso.

Locus & tempus. Conyzae mediae minor species flore minus radiato Montbelgardi abundat locis humidis, florens Iulio & Augusto ante pontem è regione horti mei. Frater Casparus Bauhinus observauit Basileae frequentissimam, & Monspelii vocari Herbam S. Rochi. Vbiuis Galliae, Germaniae & Angliae locis lacustribus & humentibus aruis multa. In Bernardogresen ara & fossis altero à Londino lapide fruticas Lobel.

CONYZIS AFFINIS HERBA VVLNERARIA, siue Solidago Sarracenica tertia Trago, hirsuta.



Descriptio

D Vm Lugduni medicinam faceremus Germanus quidam dedit nobis plantam sunt quadraginta anni quam nos adhuc integram habemus, is autem eam curauerat deferendam ex locis supra Spiram Germaniae urbem celebrem, ut commendatam ad vlcera tibiarum: in ea

sicca observauimus, caulem teretem villosum folia rotundis pinnis amplecti, nullis nixa pediculis, acuminata, vnciam aut palmum longa, latitudine vnciali aut semuncia angustiora, non multum dissimilia à foliis Conyzae verè maioris, nonnihil hirsuta: summum caulis fastigium in

plures abit pediculi, quorum singuli strom gestant aureum in pappos degenerantem, calyce imbricato. Hae ex sicca.

CONYZA MAIOR MATTHIOLI Baccharis quibusdam.

Ex radicibus multis sparsis non alce depactis lignosis, fragilibus odoratis, amaris, & acerbis, surgunt ad cubitos tres aut quatuor alti, caules stipati, atropurpurei, cana lanugine hirsuti.



supra media in multos ramos erectos desinunt: folia Verbasci nigri, minuta, leuiter crenata, odorata, sapore acris & nonnihil amaro: flores conferti, grauius olentes, lutei, pappos, in calyculis squarrosis, mollibus, viridi rubroque versicoloribus. Au Arctium siue Arcturus Dioscoridis Casalpino.

Cordus ni multum fallor hanc describit lib. 2. hist. cap. 145. nomine Conyzae Helenicidis, ubi Gesnerus figuram apposuit, cui hunc adscripsit titulum, Conyza Helenitis: Eadem aut simillima videtur Matthioli Conyza maior.

Hanc Matthioli lib. 3. cap. 119. in Dioscor. pingit, traditque in Hetruria passim prouenire ac vocari vulgo Pulicariam. Hanc eandem forte aliter pingit lib. 3. c. 44. ex sicca planta pro Bacchari Dioscoridis Romae à Lacuna missa. In Hist. post. Italic. cap. 130. eandem pingit pro Conyza maiore, & lib. 3. c. 45. eandem Baccharis nomine iterum pingit: Anguillaram exagitant, qui putant Baccharis caput superfluum apud Dioscoridem. Idem Epit. cum addit. Camer. Conyza, Graecis καυζα, Italis Conyza seu Pulicaria: Germ. Geelmung. Hisp. Aradegua: Gallice herbe aux Putes. Item Hist. Germ. lib. 3. cap. 97. Grosse Durreurg Conyza maior seu mas. Item libro 3. cap. 43. Baccharis. Matthioli nec Conyza maiorem valde vulgarem, nec suam Baccharim describit: idque suo more, ego suspicor Baccharim eius non differre ab eiusdem Conyza maiore, nisi figuram non placet: displicet in epit. addi nomen Geelmung, diuersae plantae, non magis conueniens quam alia nominari: nec ea planta placet pro Conyza maiore, nec pro Bacchari, figuram etiam non arident. Cum Monspelii essem vocabatur haec planta à Monspelianis Baccharis, & olim Tubingae per praepceptorem meum Fuchsum, Conyza maior.

Lacuna lib. 3. cap. 47. quamvis Baccharim siccam miserit Matthiolo, ab eo tamen resupsit figuram: & exhibet Baccharis nomine: ac iterum postea eandem cum Matthiolo pro Conyza maiore depingit.

Hanc, ait Gesnerus de hortis, Baccharim Mō-

spelli existimata falsò ab Aretio. Esse enim Conyzis cognatam herbam, vocatque Conyzam maiorem.

Synon. Planta nostra à Lob. in Adu. Conyze aut potius Conyze nominatur. In Obs. Baccharis Monspel. Aduers. 245. perperam Conyza maior Matth. & Dodonæo Conyza helenitis Cordi. In Icon. Plant. p. 574. Baccharis Monspeliensium.

Dodon. gall. Conyza maior Theophr. mas, Pulicaria & Cunilago. Germ. *dürwurz* & *donnerwurz*. Lat. in fol. Conyza altera, ab aliis pro prima specie iudicata.

Lonic. Conyza maior seu mas *Groß dürwurz*.

Casalp. vulgò Incensaria, quorundam Baccharis, aliorum Libanotis sterilis apud Theophr. Mas Conyza Plinii.

Camer. hort. Baccharis Monsp. Conyza maior Match. frequens ad Danubium circa Ratisbonam.

Lugd. p. 917. Baccharis Monspeliensium, Conyza maior Matthiolo. Item p. 1044. Conyza maior Matthioli Eadem figura bis posita.

Casalp. Dur. p. 144. Conyza, *durwurz*. Ital. Conyza & Pulicaria, Germ. *Geelmünz* Conyza maior. Figura non placet, nec etiam nomen Germanicum quod conuenit tertie eius Conyze.

Thalio Conyza Helenitis Cordi.

Hort. Luf. Baccharis Monspeliensium, Conyza maior Matthioli.

Staph. sax. Quæ à Matthiolo Conyze maioris nomine exhibetur, minime teste Clusio Conyza esse potest, sed ad Dioscoridis Baccharim accedere videtur: eam satis ineptè Salmanticenses Helenii faciebant, cum nullis cum Helenio notis conueniat.

Baccharis Tabern. Tabern. Icon. Baccharis *Groß dürwurz* quibusdam. Hist. Baccharis quam Lonicus describit, cuiusque Match. meminit. Iconem habet Matthioli in qua summitas non respondet Conyze maioris, suspicamur ficticiam.

Gerard. Angl. Baccharis Monspeliensium *plowmaue Spinnard*.

C. Bauh. Phyt. Conyza 4. siue maior vulgaris: Conyza maior Trago, Baccharis Monspeliensium. Conyza maior Tragi est alia à Bacchari Monspeliensium.

C. 2. no. **Locus & tempus** Nascentur spontè plerisque exuvis montanis siluis: muris, secus vias, & eiusmodi locis, quemadmodum obseruauit Florentiz in Castello: circa Tubingam, Monspeli (Florentem) mense Septembri: Basileæ (mense Octobri adhuc florentem) Genevæ, Lugduni, & Montbelgardi virentem totâ hieme, etiam mensis Februarii principio, ac Florentem Iulio & Augusto.

Vitæ Radicem ex vino decoctam propinabant quidam vetulæ ad profligandam scabiem, in quem usum & nonnulli Monachi ex eius radice & foliis vnguentum parabant: Clusius.

CONYZA HELENITIS MELLITA incana Lobelii.

Descriptio **C**aulis emittit sesquipedalem, tomentosum, incanum, ex radice fibrosa, Baccharis vulgaris non absimili; folia oblonga, Digitalis foliis affinia, inferius exalbida, seu cinericea, superius purpurouirentia, foliorum Rhaphontici instar: flores lutei, Conyze alterius similes, multò maiores quàm Senecionis,



CONYZA HELENITIS
pilosa Lobelii



Pilosa alpina dicatur.

CONYZA VETERIBVS.

CAP. XI.

Aliquot Conyze speciebus traditis, superest ut ad ea eius genera veniamus, quæ ad Veterum Conyzas magis accedere videntur. Præmittemus tamen prius eorundem de iis sententias.

Præstat enim exiguum circumscribere Conyzam.

Conyza, inquit Theophr. alia quidè mas est, alia verò termina: fœmina quidè tenacior folio est, & constrictiore, & in totum minor. Mas autem maius & pinguius, habens præterea verò florem splendidiorum. Fructifera verò ambo. In vniuersumque serò floret, circa arcturum aut post arcturum germinat: Grauis autem odor masis: Fœminæ verò acrior (sc. odor) Quam ob rem contra venenata utilis. Et hæc Theophrastus, ex quibus tua mutuatus est Plinius.

Conyza apud Dioscoridem quædam parva vocatur, odore præstantior: maior altera, quæ fructu

mellis, vnguenti odore, sapore acrisculo, Lob. C. Bauh. Synon. phyt. Conyza octaua siue Helenitis mellita incana Lobelii Iconum pag. 347.

Nascitur in syluis quibusdam Atticis, vnde propter raritatem in hortos aliquot translata.

Proximè **Descriptio**
ad Conyzam helenitem mellitam incanam accedit, foliis, radice, & floribus. In eo verò potissimum differunt, quod & caule, & folia admodum aspera & pilosa sunt: Lob.

Synonyma
C. Bauh. Phyt. Conyza 10. siue alpina pilosissima. Hæc ad eam pilosa est, ut quibusdam

Olea filia
Mater.
Flos.
Radix.
Contra ve-
nena.
Culices,
pulices.

frutice altior est, foliisque latioribus atque gra-
uacoloris. Vtriusque *f. lina* Olea similia, at hirsu-
ta & pinguis. Et maioris quidem Conyzae *cauli*
in basium cubitorum altitudinem assurgit, mino-
ris vero pedem aequat. Flos squalidus (vel fria-
bilis Sarrac.) est, lutei coloris, & subamarus, ac
in pappos abit: *radices* autem superuacuae. Fru-
tex cum foliis substratum totumque venenatas be-
stias fugat, culices abigit, ac pulices quoque nec-
cat. Folia viliter imponuntur terpentium mor-
sibus, tuberculis atque vulneribus. Flores etiam
ac folia ad menses partusque peliendos in vino
bibuntur: itemque contra itranguriam, tormina,
morbumque regium. Eadem ex aceto pota, co-
mitiales adiuuant. Quin & decoctum in fessu
vulnū vitii medetur, mensesque purgat. Subdi-
tus autem succus abortum infert. Sed & herba
ex oleo peruncta, contra rigores est efficax. Te-
nuior vero, etiam capitis dolores impolita sanat:
(nonnulli eod. carent sequentibus ad capitis vsu;
calcem.) Est & tertium Conyzae genus, caule
crassiore mollioreque, foliis medix inter maiore
& minorem amplitudinis. Minime autem pin-
guis ea est, ac odore longè grauior, atque adeo
iniucundior simul & inertior. Locis aquosis
prouenit.

Rigore.
Dolores ca-
pitis.
Conyza
maior.

Temperam-
entum.

Galenus tria quoque ut Dioscorides, Conyzae
genera assignat. Conyzam maiorem, minorem
& mediam. Maior & minor, inquit, similes sunt
tum temperaturae, tum facultatis, gustui amarae
& acres. Est & tertium Conyzae genus, in lo-
cis humidioribus proueniens, vtriusque illis tum
grauacoloris, tum imbecillius. Sed primae me-
moratae tertiae sunt ordinis exasciando & ex-
siccando.

Duo, inquit Schol. Graecus, sunt Conyzae gene-
ra: alia huiusmodi agrestis: alia vero urbana mi-
nistis. Verum agrestis acrior est sativa. Cete-
rum inter nothas Dioscoridis appellationes vo-
catur Conyza magna, aliis Cynozemarites, aliis
Danais, aliis Tanachion, aliis Phycos, aliis Ili-
chys, aliis Dinofmos. Prophetis Brephoctonos,
aliis Anubias, aliis Hedemias. Aegyptiis Ceti,
Romanis Inrybum, aut Militaris mina, aut Del-
liarium, aut Febrifuga. Aliis Phragmosa, aliis
Musterum, aliis Pissa. De altera Conyza, alii Co-
nyzam parvam vocant, alii Panion, alii Libano-
tida. Prophetis est Coronos.

Aquinoca

Virga an-
rea fuso-
laeque
Sarraceni-
ca angu-
stifolia af-
fina.

Alisma
de arch. fuso
Plantago
alpina.

An Senecio
alium fuso
herbarum?

Senecio ca-
eruleum.

Ambrosia
guibidam
aliquam
Anon. fuso
Herba cer-
ulea.

Posterior aetas circa Conyzarum à Veteribus
traditarum notitiam nonnihil laborat. Praeter
alias enim Conyzae plantas, tradunt quandam a-
quaticam maximam serratifoliam Gesnerus, Tha-
lius, Camer. & Hott. Lusitanus, quam Virga
Aurea siue Solidagini Sartacenicae angustifoliae
affinem facimus, est Lingua avis Dalechampii.

An Conyza annumerandum sit Alisma Alpi-
num, Caltha Alpina Gesneri [Alisma Matthioli
siue Plantago Alpina,] dubitat Harsynia Saxo-
nothuringica Thalii.

An Senecio alius siue hirsutus est Conyza fœ-
tida Hippocratis de qua Gesnerus hort. sub voca-
bulo Cotula, Thal sub titulo, Erigeron fœtidum
seu maius.

Senecionem caeruleum Fuchsius cum apud il-
lum essem vocabat Conyzam minorem: Cony-
zoidem caeruleam siue Conyzam murealem Ges-
nerus.

Conyza Hippocratis aliquorum, est quibusdam
Ambrosia, teste Gesnero de hortis.

Conyza tertia quondam, Alypum montis
Ceti Lobelii, quam Herbam terribilem Narbo-
nensem Hist. Lugd. Hippoglossum Valentium

Clusius, Prarmisem quidam cognominant, est A-
lypum Monspelii siue herba terribilis.

Volgo Connina videretur Conyza tertia apud
Diosc. Calsalpino, quam Attriplicem fœtidam in-
scripsimus.

Confundit Plinius cum Origano & Cusila origanum
Conyzam, diuersas naturae plantas.

Conyza non est Thymbra sicut perperam sen-
tit Iacob. Manlius, testibus Io. Agric. & Eur.
Cordo.

Perficariae duae species sunt, ut opinatur Tra-
gus in dissert. apud Brunfels. tom. 3. p. 277. Cony-
za Dioscoridis.

Oliuer. de Serres in suo Thes. agr. l. 6. c. 15. con-
fundit Conyzam cum Psyllio.

Errat Auerr. dum Harmel Offic. Rucam silue-
stem vocatam Conyzam Hippocr. appellat.

Conyza dicitur Eustachio Roslin. de Cicuta,
de qua Hist. n. g. lib. 27.

CONYZA MAIOR MONSPELIENSIS odorata.



Conyza
maior
caule fruticat
sesqui cubitali
& bicubitali,
multiplici, li-
gnoso, rigido,
hirsuto, & ta-
ctu glutinoso;
Clusio, obso-
leti coloris, in
multos ramos
brachiato: fo-
lia germina-
tione primā
inordinata,
alternatim
caulem am-
plexantia, tres
vncias longi-
tudine aequat;
non totā vn-
ciam lata, obiter ferrata, adulta vix vnciam vnā
longa, mollia, pilosa & glutine quodam lento vi-
scida, ex viridi pallentia Clusio: flores secundum
extremos ramos spicatim frequentes exiliunt
lutei, Clusio rotundi. Senecioni ferè similes, in
pappos euanescentes, semine paruo, cineraceo:
Radix subest crassa fibrosa. Tota planta grauior
odorata est.

Figura ex Fuchsiānis non est integra & melius
posset depingi, defunt flores & serraturae in foliis.

Hanc appellat Camer. in horro Conyza maio-
rem: ad Matthioli. Germ. Conyza minor siue fo-
mina, quam alii tradunt pro Conyza maiore o-
dore grato, quam describit Pena, quae videtur à
Clusio tradita & Rauuolffio. In Epit. Conyza
minor. Ego separo Rauuolffii quia illi potuit
esse nota Monspelulana: quamuis in figura que-
dam respondeant figurae Penae & Lobelii in A-
duers.

Dod. Lat. in fol. Conyza maior.

Lobel. & Pena Aduers. Conyza maior veta,
Dioscoridis lineamentis affabre congruens. Io.
Pl. Conyza maior veta. Figura Lobelii non om-
nibus absoluta.

An Anguill. epist. p. 230. Conyza secunda?

n. Lugd. Conyza magna Penae. Hae figurae v-

Icon.

Synon.
Conyza mi-
nor Camer.
Camer. m.
tata.

Conyza
maior Dod.
Conyza
maior veta
Lob.
An Conyza
maior veta
Conyza
maior Penae
non Lugd.

iam dictum non in omnibus placet. Cum Conyza magna Pena eandem tradit esse Conyzam Syriæ C. Bauh. in animadu. in hist. Lugd. quam propterea notat. Nos cum H. Lugd. diuersas agnoscimus. Nec Conyza magna Pena spinas habet.

C.B. var. Clus. Hisp. & Hist. post. Conyza maior, cuius radicem Plinius à quibusdam Libanorum appellari tradit. Hanc Gaza Pulicariam vertit, propter eam fortè quam illi Dioscorides in enecandis pulicibus tribuit facultatem: nam alia est Pulicaria dicta ob seminis cum pulicibus similitudinem. Hispani quidem yerua pulgera, nimirum ob similes quas dixi vires, vocant.

Castor. var. Figura quam habet Castor p. 144. pro Conyza minore hullo modo est minoris Conyze veræ, imò à multis existimatur maior vti à Matthiolo.

C.B. Phyt. Conyza sive mas Theophrasti, maior Dioscoridis.

Locus. Radix, autore Clasio, viax est, multis annis perstans, quotannis novos pluresque caules proferens. Supra Olyssiponem frequentissima ad collium Trago flumini imminentium radices. Murciano item Valentiniòque regno, atque etiam Narbonensi agro iuxta vineas & vinearum margines. Aliquando in Belgica scitilibus sara prouenit, & egregie flores protulit. Solo maritimo, vt testatur Dodonæus, & austrino celo gaudet, & circa Adriatici sinus littora, & circa Romæ & Florentiæ reperitur. In Narbonensi quoque Gallia, haud procul Monspelio, secus vias, ac vinearum margines. Conyzam maiorem Monspelii dictam florentem vidi mense Septembri. Passim prouenit Monspelii, Florentiæ etiam vidi in arce & circa arcem. Monsbelgardi prouenit mihi in Horto Ill. E. C. & aliquot annis durauit.

CONYZA MINOR VERA.

Descriptio



TAm hæc maiorem refert, vt qui illam norit, & hanc quoque oblata norit, odore simili, sed vegetiore, ea minor est precedenti, cubitū ferè alta, vtpotissimum recta, quod in altera non temere videas, ramosa. Folia multò tenuiora, angustiora, breuiora, subhirsuta, viscida: flores iidem, eodemque spicato ordine, sed minores, numerosiores.

An Conyza
1. Angul.

An Anguill. epit. 210. Conyza prima, in Apuleia, Paganis, & aliis locis Pulicaria.

Clus. Hisp. & Hist. post. Conyza sive minor Conyza femina Theophr. quam Gaza Pulicariam vertit, Hanc Clusius non depingit. Gess. hort. in append. Conyza vera minor.

Conyza
var. Gess.

Dod. Lat. in fol. Conyza præter maiorem mediam & minimam alia minor, iis etiam odoratior, sine icone.

Lobel Advers. & Icon. plant. Conyza minor vera.

H. Lugd. Conyza minor vera, Pena.

C. Bauh. phyt. Conyza sive femina Theophr. minor Dioscoridis. Floret autem cum maiore, sub Autumnum videlicet, & subinde semen proferit, obseruauimus spontè Monspelii (vbi etiam Clusius) copiosè prouenientem, & florentem mense Septembri: repertam in Italia inter Saleut. Montem gilbi mense Aprili, vt & Bosileæ florentem mense Septembri.

CONYZA SYRIÆ QVIBVSDAM



Plures et Descriptio
eandem refert, proferens
cauliculos, circiter
pedem aut paulo amplius
altos, quorum nonnulli sunt sur-
recti, porissima vero pars
humis procumbit, nouasque
fibras agens, subinde alios
cauliculos producit longiuscula habet
oleæ folio, pinguis, subhirsuta, satis graui
odoris, cui ra-

men suauitas quidam admixta sit: alioqui floribus & ceteris notis à Maiore non valde diffimilis.

Rauvvolff. Itin. pag. 14. Species minoris dicitur
mutuel [i. Conyze] Diosc. Latinis & Græcis dicta
Conyza: hanc inter Icones parte 4. eodem titulo pingit.

Species min.
notis Conyza
et Diosc.
Rauvvolff

H. Lugd. append. p. 110. Conyza Syriæ, minus plantæ authoris non meminit Historia, immemore laud.

Clus. Hist. post. Conyza minor Rauvvolff, forte maioris genus.

Conyzam Syriacam C. Bauh. in annot. in Hist. Lugd. non paruo errore eandem statuit cū Conyza magna Pena.

Circa Tripolim Syriæ obseruauit descriptionis auctor Rauvvolff. suam Conyze minoris genus.

C.B. var.

Locus

CONYZA MONTANA MYCONI.

folio Hyssopi vulgaris, villosa.

Radix est lignosa, solida, inanis candicante, foris nigrescente, minimi digiti crassitudine, gustu aliquantulum adstringente, exsiccata non minus, quam subetis cortex. Ex hac stola multi prodeunt, teretes, villosi, solidi, dodrantales: in quibus folia tenuia, Hyssopi vulgaris, sed glaucescens Ledi modo, odore graui & viroso, & huiusmodi quid olente. In summo cauliculorum sunt flasculi Soncho similes, luteoli, in pappos abeuntes. Gustu subamara est cum leui acrimonia, ca-purulentans.

Descriptio

Myco-

inscriptions
1851-1852



renda, vnde Myconus alias plantas milit Dale
champro.

C. Baub. Phyt. Conyza n. fine montana glutinosis pilosis foliis.

CONYZA CAPITATE NUTANTE.



dum tertiamque versus inclinatum sustinentes, ex multis seu squamis compositum, quarum medium obsident multa apices lutei, eo ferè modo dispositi, quo in Verberinis florem ambiunt quædam longiuscula folia viridantia stellæ in morem radiata. Radices fibrosæ, Helleburi nigri similes. Hanc Basileæ inveni ante multos annos. Thalius in montibus apricis Soli Meridionali & Orientali obiectis.

H. Lugd. p. 1040. Hydropiper aliud Dalecham-
i.

C. Bauhin. Phyt. p. 641. Cannabina similis capitulis nutantibus, quam nobis ostendit frater Iohan. Bauhinus, Verbelina similem cum capitulis nutantibus nominans. An fortè Hydropiper alterum Dalechampii, Lugd.

Tom. II.

CONYZA MARINA.



lis superius diuisus flores gestat Conyza maioris,
luteos, in pappum euanescentes.

H. Lugd. p. 136. Conyza marina. Lob Obs.
& Ic. Plur. Aster Conizoides Gussieri. Rauhvolk.
Itiner. Chondrylla Diosc. alter 2.

C. Bauh. Phyt. pag. 116. Chondrilla 12. bulbosa
angustifolia maior.

Gener Cherlerus in Gallia Narbonensiscopio-
se observavit & collegit in campetribus illis iux-
ta Montem Lupi. In Anglia, Belgio; & agro
Louvaniensi iuxta Academiam pomaria. Juxta A-
lepuat in aquis repertus.

CONYZÆ MARINÆ AFFINIS CHONDYLLA alia Rauvolfii.



Conyze ma-
crina similis
planè est radice
& floribus, foliis
tamen latiora,
pilosioraque;
magisque cin-
erea sunt, perin-
de ut Flolostil
Montpelicenis.
Rauv. volff.

Rauvvolf.
Hodaporia p.
nr. Chondrylla
alia. Hanc pin-
git parte 4. in l-
con. numero
nr. pro Chon-
dryllæ Diofco-
ridis genere 2-
ho. H. Lugd.
app. p. 27. Chon-

dryllæ aliud genus Dioecoridis. C. Baum Rhyt.
p. 17. Chondrilla lz. bulbosa angustifolia minor.
Lapidosis agris circa Alepu-n nascitur Chon-
dryllæ Dioecoridis genus aliud Raupvolshi.

CONYZA ALPINA.

R Annis frequentibus fructuat, sesquicentibus
rigido *caule* folia alternata ferè, pediculis
uncialibus & sesuncialibus hærentia, ex rotundo

Descriptio



nonnihil oblonga, vncias circiter ternas lata, paulo longiora, modicè in acumen desinentia, profundè in ambitu serrata, subtus ineanà lanugine pubescentia, supra virentia: floris ramulorum extremis crebri interrent, Intei, Chrysanthemi similes, in pappos euascentes.

Clus. Pannon. p. 576. Jacobaea latifolia altera: & in Hist. post. lib. 4. p. 23. Jacobaea Pannonica quarta, siue icon.

An Gesnero in descriptione Montis fracti, Conyzae alpinae genus sequebiri aut amplius proceritare, corymbis florum luteis, fibris radicum albis pluribus & confertis, subamaris, quod à pecore non attingitur, pastoribus Boni vocatum, aliquibus Goldfrus:

C. Bauh. phyt. Jacobaea 7. siue foliis rotundis, serratis.

Locus

Hanc cum Gesn. in peregrinatione nostra obseruauimus in monte prope Resen, non longè à lacu Tigurino, florentem mense Iulio.

JACOBÆA PANNONICA FOLIO non laciniato.

Descriptio



Terna, aut quaterna, aut plura habet folia, latiuscula, in ambitu leuiter dentata, caulem cubitale plerumque, angulosum, gracilem, per quem inordinata spatia sunt folia, infimis paulo minoribus, at in supremo angustioribus, lata basi ipsum amplectentia: in summo caule quaterni aut qui-

ni, tanquam in umbella nascuntur flores, Jacobaeae vulgaris floribus non multum absimiles, antequam explicentur ex atro rubescentes, sed ubi aperti sunt auri fulgore splendentes, quos in ambitu stipant quindena aut plura foliola per extremum incisa, supernè phoenicea, subtus verò quodammodo rubentia: si flores maturi in pap-

pum abeunt, cui inuolutum est semen nigricans, oblongiusculum, vulgaris Jacobaeae semini non dispar: radix non valde magna, nigricans, tenuibus fibris candicantibus donata, sub Autumno noua denuò folia latiora, ad veteris caulis sedem singulis annis producit. Tota planta mollicula, & quadam lanugine obrita conspicitur: amari- cantis est saporis.

Clus. Pannon. p. 573. Jacobaea secunda, p. 574. Jacobaea Pannon. folio non laciniato: Hist. post. lib. 4. p. 22. Jacobaea Pannon. 2.

C. Bauh. Phyt. Jacobaea 8. siue foliis nonnihil dentatis.

Jacobaea Pann. 2. Clusi. nascitur apud Neme- thuyuniar ill. Balthazaris de Bathyan, aliisque Pannoniae & Austriae inferioris montosis & ca- duis siluis. Floret Iunii initio, & sub eiusdem extremum finem, semen maturum est.

JACOBÆA MARINA SIVE cineraria.



Vltus co- similis

Jacobaea co- gnominem hanc reddidit, natalisque lo- cus maris imus differentia ad- iunxit: prima folia Quernis similia, rario- ribus fissuris minusque altis incisa; quæ postmodum ad costam vsque profundius di- uiduntur, digi- tali ferè inter- capedine seg- menta lacinia-

ta intercedere, crassiuscula, inferius cine- reo molli tomento vnà cum pediculo obrita, superius attrouientia, nitida, & nonnulla quo- que lanugine fortuita obiter respersa, sapore praelata parum grato: flores multi coaceruati Jacobaeae, Melini, in pappos tandem abeunt. Lob. Ad. & Ic. Pl. Cineraria, Jacobaea marina, Chry- santhemum marinum, & Artemisia marina Neotericorum. Tabern. Icon. & Hist. Jacobaea marina, Cineraria, S. Jacoba blum. Dodon. Lat. in fol. Jacobaeae 4. Cineraria vulgè dicta, à subalbido cinerum quorundam colorè, quem refert Cinerariae nomen, quæ à nonnullis Erige- ton marinum dicitur. C. Bauh. Phyt. Jacobaea 1. siue marina. Erucam cineream Lugdunensis bis pingit, bisque describit p. 651. & p. 383. quæ sanè eadem cum præcedenti.

Hanc plantam olim vidi in horto di S. Salua- uator ad Burgo di S. Catharina, Vidi etiam in horto Nicolai Ferrariensis & à Innocenti:

Aegyptii, autore Alpino, Artemisiâ albâ (quæ illi Achaouam, Cineraria, & Jacobaea marina vocatur,) ad multa vtuntur, quippe decoctum ex foliis paratum ad renum vesicæque calculos pollere aiunt, nec non ad sanandas viscerum an- tiquas obstructions, frigiditatem, strangulatio- nem, sterilitatem, inflationem, atque ad menses interceptos reuocandos, in infusionibus.

IACO-

IACOBÆA VULGARIS.

Descriptio

Iactus solum nactus trium cubitorum altitudinem allequitur, caule recto, rubente, striato: folia alternatim posita, Senecionis maiora, leui adstrictione prædita: flores plures iuncti, Senecionis, maiores, lutei, umbilico concolori in pappos tandem abscutes: radix alba, fibrosa. Ducas figuras ex Fuchianis ponimus non ut specie differentes, sed tantum variantes.



Synonyma
Senecio
maior.
Herba S.
Iacobi.
Flos S. Iacobi.
Herba Iacobi.
Iacobæa
Senecio.
Artemisia
polyclo-
nos.
Flos Iacobi.
Differencia



Iacobæa vulgaris dicitur Senecio maior, Matthiol. Callor. Lugd. Camer. apud Matthiol. in Hist. & Epit. Herba S. Iacobi, Fuchl. Casalpini. Flos S. Iacobi, Brank. Trago. Lonic. Herba Iacobæa, Tab. Iacobæa, Dod. gall. & fol. Iacobæa, Senecio, Lob. Adv. Obi. & Ic. Plant. Artemisia polyclo-nos, seu Flos Iacobæus, Thal. Iacobæa vulgaris, Clusio & C. Bauh. apud Matthiol. & Phyt. vbi ei quarta est. Differentias habet, inquit, in foliis: alterius sunt instar Erucæ laciniata: alterius ad Raphani folia accedunt, sed minus hirsuta.

Iacobæa vulgarem Germ. vocant S. Iacobæ blumen: quibusdam S. Iohannis blumen & gross cretus blumen. Belg. Sint Jacobs cruyt aut bloemen: Gallis, H: rbe on fleur de S. Iaque. It. Carduncello maggior.

In Pannoniis, Austria, vicinisque regionibus nascitur frequentissima, Iacobæa vulgaris Clusii. Iacobæa abundat passim Montbelgardi florens adhuc Septembri & Octobri: Montpelii observauit cum flore mense Aprili & Maio: Balileæ quæ iuxta Montets Octobri, ab Aluuium Birse intra urbem & quæ iuxta Brenzard & versus Gösdelinguen prope Molendinum. Genus frequens est.

Flos S. Iacobi non solum eandem formam, sed eandem cum Senecione vires & facultates obtinet, ut pro illo iure usurpari possit, imprimis autem vulneribus, inflammationibus, & fistulis medicetur, Tragus.

Tom. II.

IACOBÆA LATIFOLIA.



Iacobæa latifolia caulem habet tricubitalem, teretem, rubentem, medulla albâ factam, in ramos alcerius instar diuisum, quorundam extremis flores insident, magni, lutei, stellati, ceu vulgaræ, & tandem in pappum totum evanescentes: at folia plurimum differunt, dodrantem fere longa: duabus vnciis latiora, serrata:

Descriptio

glabra, mollia, profundè circa principium secta: reliquâ & ultimâ laciniâ ad Bugulæ folium accedente: verum enimvero, quæ per ramos conspiciuntur paullo magis sunt laciniata, Artemisius fere diuisurâ. Radix obliqua, multis fibris capillata: suspicor annuam herbam.

In Sundcouia florentem Augusto observauit ad ripam fluviali.

IACOBÆA PANNONICA LATIFOLIA.



Cinterdum excresecit caule, firino, striato, quem ambiunt folia lata, rugosa, mucronata, per oras serrata, viridia, latiore basi, & veluti appendicibus quibusdam prædita: infima parte quæ caulem amplectitur, ingrati & nonnihil acris saporis: quæ vero à radice germinant,

Descriptio

rotundiora sunt & maiora, sed nullos appendices habent, periuste tamen serrata atque superiora: summus caulis dividitur in aliquot ramulos, qui flores omnino luteos sustinent, Iacobææ vulgaris similes, multo tamē maiores, & ad Buphthalmi amplitudinem accedentes, maturitate in pappum evanescentes: semen observare non licuit: radix satis crassa & candicans, subinde fibras, vulgaris Iacobææ instat, in latera expandit.

Clusio Pann. p. 374. Iacobæa latifolia Pannonica tertia.

C. Bauhin. Phyt. Iacobæa sive latifolia flore Buphthalmi.

Vauv.

Nomen
linguarumLocus &
Tempus.

Vires

Locus
tempus

Prouenit in Austriacis Stiriacisque Alpibus:
Floret Iunio & Iulio, in hortos translata etiam
Maio.

CHRYSANTHEMVM ALPINVM
Iudenbergense Iacobæz affine.

Descriptio



Multa ha-
bet se-
cundum radi-
cem longius-
cula folia, Ab-
sinthio umbel-
lifero, quod
infra describe-
tur, similia,
crassa, pollica-
ri longitudine,
in lacinas ali-
quot diuisa, vi-
ridia (in no-
uellis tamen
quidam canic-
ies conspici-
tur) a nari sa-
poris: caules a-
liquot palma-
res, rarioribus
& tenuib⁹ dif-

fectis foliis ornatos, striatos, in quib⁹ veluti um-
bellæ denum aut duodenum luteorum florum, Ia-
cobæz vulgaris, floribus non multum absimi-
lium, & eiusdem odoris: radix crassiuscula est,
multisque candicantibus fibris capillata.

Clus. Pann. p. 565. Chrysanthemum Iudenber-
gense, siue [ut in post. hist.] alpinum 1. Ad Chry-
santhemi genera referendum, aut Iacobæis ad-
numerandum.

C. Bauh. phyt. p. 125. Chrysanthemum 2. siue
alpinum foliis laciniatis: Hoc attulit D.D.
Theodorus Collado Nemaufanus nunc Medicus
ex Helueticis Alpibus.

Locus.

Chrysanthemum alpinum 1. Clusii prouenit
in Iudenburg, Spital, & aliis quibusdam Stiria-
e iugis, cum Leucanthemo mox describendo: eo-
dem tempore florens.

CHRYSANTHEMVM ALPINVM
Erscherianum Iacobæz affine.

Descriptio



Non pro-
ximè radi-
cem nascun-
tur folia. A-
brotoni ma-
ris foliis res-
pondentia, di-
lutiore viri-
ditate nitentia, & odore,
si terantur,
haud ingra-
to, sapore ve-
rò amarican-
te & minime
grato: ex his
caules exeunt
pedales, mi-
noribus foliis
obusti, in ali-

quot interdum ramulos diuisi, qui singulos
geminos sustinent flores Chamæmelo vulgari ma-
iores, inodoros, omnino flauos, hoc est, medium
orbem luteum cingentibus etiam luteis foliis,
latis latis: radix fibrosa & nigricans est, plures-
que à latere spargit ramos.

C. Bauh. phyt. Chrysanthemum 3. siue alpinum
foliis Abrotoni multifidis.

Inuenitur, inquit Clusius, in Erscher, Snealben,
Veitzalben, & cellis aliis Alpium Stiria iugis.
Floret Augusto. Inibi etiam inuenitur Chrysan-
themum alpinum Snebergense, Clusio 3. [C. Bau-
hin. 4.] Alpinum dictum.

Locus.
Tempus.

TRAGOPOGON SIVE BARBA
hirci Veteribus.

CAP. XII.

Tragopogonis seu Tetrapogonis, quem alii
Comen vocant, inquit Dioscorides, caulis
breuis est, folia habens Croco similia, radicem lō-
gam, dulcem (supinam addit Hermol.) In sum-
mo caule calix est magnus [ὁ καὶ τὸ κεφάλαιον καλεῖται
μύρα] & eius summa parte erumpit semen ni-
grum [κατὰ τὴν μέσην] à quo etiam nomen accepit.
Est autem herba, quæ in cibi vsum ve-
nit. Et ita Marcellus, Hermol. Cornar. Mar-
thiolus.

Tragopogon.
Coma.

Hirci barbæ, inquit Theophrastus, radix lon-
ga & dulcis, folia Croco similia, nisi quodd longio-
ra sunt: caulis breuis, super quem calix amplior,
& e summo vertice pappus canus grandior, à quo
scilicet Tragopogonis nomen accepit: [non igitur
à semine nigro ut sibi falsò nonnulli imagi-
nantur.]

Ceterum, Tragopogon [Hirci barbæ] & Scā-
dix à Plinio vocatur, nisi, quod suspicatur Her-
mol. deprauata lectio sit: is aliàs descriptionem
Dioscoridis mutuatus.

Scandix.
Plin.

Acetarium quidam olus hanc esse falsò vo-
lunt, quam vulgò Barbam petræ & in Gallia Cis-
padana Barbulam hircinam vocent: habetur &
quæ Gerontopogonon, id est, Senis siue præbyce-
ri barbæ dicitur, Tragopogoni fere tota similis,
nisi quod lacte manat & radice amara est, non
dulci: à Nicandro Geros Pogon sortasse nuncu-
pata. Tragopogona vocari, & in Trago piscæ
partem subgula eius nigricantem Athenæus
auctor est. Tragopogona, Galenus inter sim-
plicia non recenset, inquit Cornarius. Et of-
ficinæ ostendunt falsam pro vera Hirci bar-
bæ herbam. Tragopogon à Galeno cognomina-
ta est planta, quæ Ledum seu Ladanum dicitur,
& barbæ hircinæ Arabibus, ut Aulicennæ & Se-
rapioni, teste Trago libro 1. cap. 95. inquit Gesne-
rus. Amatus quantum videt Marthioli, eam
plantam Tragopogona putat, quæ Fuchsio Apios
dicitur. De hac nos H. n. g. lib. 17. egimus sub ti-
tulo Chamæbalanus.

TRAGOPOGON FLORE
luteo, purpureo, ac
puniceo.

In pratis obuius Tragopogon radice lacte
turgente dulei, minimi digiti crassitudine,
longa: caulis cubitalis, foliis ab anno ad sum-
mum vestitus, fere porraceis, cæcinatis, cau-
lem



Descript.



lem amplectē-
tibus : ex quo-
rum sinu rami
pronascuntur :
quorum sum-
mis insident
flores magni,
denso foliorum
radiatorum a-
gmine stipati,
lutei : qui in
pappos abeunt,
semine appenso.
Ab hoc non
multum differt
atropurpureus,
& puniceus,
sive spontaneus
cultus. Quz-
libet plantz fe-
re pars vulne-
rata lac fundit
album, emanās,
mox in luteum
facilem, visci-
dum, quod ra-
dici rectz, digi-
tali vel maiori
crassitudine, te-
nere copiosum
& dulce cum
sit, culinis ex-
petitur : caules
inanes ramosi,
foliis multis
stipantur Por-
raceis, quz in-
terdum valde
lata interdum
tenuissima : flo-
res foliis octo
virentibus lon-
gis & acumina-
tis obvallati,
tribus vnciis, su-

perantes, qui colore sunt vel atropurpureo vel
puniceo : qui postea in pappos abeunt : quibus
adhuc semen duas vncias longum, teres, striatū,
asperum, per maturitatem extremam nigricans.
Synonyma *Tragopogon*, Hirci barbulā, Hetruria vulgo ap-
pellat Salsifrica, flore aureo : Nesciuerim [inquit
Matthiol. in prior. comm.] qua ratione ductus
negarit Hermolaus hanc Theophr. & Dioscor. le-
gicimā Hirci barbulam esse, cum illa pulchre hu-
ius notis respondeat. Sed Matthiolus iniuriam
facit Hermolao, qui de Barba Capre Fuchsi
scribit.

Camer. hort. Barba hirci flore luteo & pur-
pureo.

C. Bauh. Phyt. & apud Matthiol. Tragopogon
sive pratense luteum. Itē Tragopogon sive ce-
ruleum.

Anguill. epist. 7. scribit Tragopogonem, i. e.
Barbam hirci, in Tuscanā dici Salsifricam &
Barbam di prete : Patavii Herbam lissam. Cord.
Hist. Hirci barba.

Hieron. Brunsch. magno errore Hypocistida
in hac herba nasci putavit, Ledum forte intel-
ligens, quod à Galeno Tragopogon nominari,
iam supra ostendimus.

Tragopogonis & Gerontopogonis H. Lugd.
tres ponit figuras, sufficiens duz ac etiam v-
Tom. II.

na : si nostra Fuchsiā placuisset, secundam non
curassemus putandam : non existimari à Tra-
gopogone distinguendam Salsifricam Italorum.

Tragopogon alterum (inquit C. Bauh. in ani-
maduers. in Hist.) & Gerontopogon p. 1079. In
omnibus conveniunt, præterquam in radicis sa-
pore, qui in illa amaridisculus, in hac dulcis sta-
tuitur. Sed idcirco duabus figuris non erat o-
pus.

Dodon. Lat. in fol. Tragopogon ut Fuch. Lo-
nic. & Casalp.) Item: Tragopogon cum pappo:
figura superflua.

Tragopogon flore luteo purpureo, ac puniceo
vocalur Græcis, *tragopogon* & *tragopogon*. Item & *tragopogon*
Hirci barba, Cōma. Germ. Boeckebart/
Gauchsbrot. Belg. Boxbart / Josephs bloem.
Gall. Barbe de Ben. Montbelg. de la barbe au Loup.
It. Barba de Becco. Hisp. Barba cabrera. & Barba
de cabran. Angl. Boeck beard. Boh. Bozy brada
fa. Pueri, aut Tragus, qui radice tenera adhuc
velci solent, sicut & alias herbas, præsertim O-
xalida deuorare consueverunt, Gauchsbrot, qua-
si Coccyis panem, ob dulcedinem radicis vocat,
quæ si Apitius perspecta foret, nunquam non a-
cetiis suis illam præ ceteris herbis & radicibus
infererent.

Tragopogonem luteum obseruavi Monspelii
cum flore Aprilis & Maio & Augusto in pratis,
Genevæ viretem in horto meo mense Ianuario,
cum flore Maio in pratis, etiā Iunio. Lugduni
copiosum in pratis : Patavii vidi mense Februa-
rio, & Montbelgardi abundat in pratis florens
Maio. Notandum omnes flores ad Orientem co-
uersti. Tragopogon purpureum passim proue-
nit mense Aprilis & Maio.

Barba capri tenella à Belgis holicoribus acci-
tariis miscetur, ac facultatibus Condrellis adstipu-
latur, lancinationibus æstuantibus, iecori, sto-
macho, renibus & thoraci auxilio est. Eitur Bar-
bula hirci prior Matthioli, hyeme frequenter
in acetariis, glutinat recentia vulnera, si folio-
rum succus vel eius stillatitia aqua splenis & æ-
tritidis linteolis superponatur : radix excoalefacit,
ac etiam primo ordine humectat : alterius radi-
cis lacteus succus adstringit, cohibet, firmat, &
modicè abstergit, esui tamen inidonea est. Radix
cruda aut cocta esca, vel ius bibitum, vrinæ stilli-
cidio medetur, calculū expellit. Pectoris vitiis
succurrit : tussis sc. respirationi difficili, tabiditas,
& pleuritidis, & succus eius, & aqua distillata. Sed
& vulneribus utiliter adhibentur, & lac eius, quæ
breui temporis spatio ad cicatricem perducunt.
Aquam ex herba & radice distillata Maio mense,
remedium esse præsentissimum aduersus aposte-
mata & dolores laterum legitur apud Tragum.
Plura qui volet, legat Tab.

TRAGOPOGON FOLIO LACINIATO flore pallido, & Monspelienſe flore luteo.

Tragopogoni radix similis tenera lactiflua,
filia priora tenuia, longa, quædam non laci-
niata, alia laciniis paruas habent, ubi primò
provenit ex semine deciduo & locis siccioribus
cultis : in qua caules plures nascuntur cubitales,
amplexu foliorum liberi, quæ tamen satis tum
per ramos frequentia, triplò quadruplòue vulga-
ri Tragopogonis foliis latiora, in crebras pro-
fundas laciniis dissecta, quæ aliquid commune
habent cum Dente Leonis : flor luteus pallens
Vuuu ;

Synonyma
Salsifrica.

Hermol.
epist.
Hirci bar-
bula.

Barba di
prete
Herba lissa
Hieronimus
Brunsch.
error.

Dod. n. 1.

Nomina
hugana

Pan. Ca-
culi.

Locus &
tempus.

Vires
Facultas
Condrellis.

Vulnera.

Prima stilli-
cidium.

Pleuritis.

Apostema.
Id.



qualis vulgari:
ac semine ad
Scorzonera
semina pro-
prios accedit.
Fabio Co-
luna de plant.
nouis p. 21. &
22. Tragopogō
laciniatis to-
lis. Anguill.
epist. p. 133. A-
corum Theo-
phrast. & Ma-
ria de Scorzera.
C. Bauh. phyt.
& apud Matth.
Tragopogō 3.
sive laciniatū
primis foliis
penitus gra-
mineis, inte-

gonis, sesquiclam lata vel angustiora, in per-
quam longum angustissimum mucronem desin-



nentia: flores
insident ex-
tremis ramu-
lis singuli,
Tragopogo-
nis, lutei, ex
calycib' squa-
marum com-
pactilibus, la-
uib' : semen
Tragopogonis
papposum.

Matth. in ^{Scorzonera}
poster. comm. ^{Hispanica}
cum mag. fig. ^{ex Bohemia}
Lat. & Ital.
Scorzonera
Hispanica ac
Bohemica me-
minit, easque
pingit ac Tra-
gopogonis co-
generes facit,

gris nec laciniatis.

Locus &
tempus


In horto Ill. C. Witt. floret Maio, semen ma-
turat Iunio & Iulio, quo tempore perit, nec ultra
annum durat, semine deciduo quotannis se pro-
pagans. Basileæ, Patavii, & Bononiæ etiam ob-
seruamus.

TRAGOPOGON FOLIO GRAMINEO

flore albo & luteo cum tantilla
impura.

P

Descriptio



Folius est mi-
noribus, Ga-
ryophyllorum
florum styla al-
borum foliis si-
milibus, angu-
stis & acutis:
radix albis Tra-
gopogis similis
capite capilla-
to: caules te-
nues rotundi, in
quorum supre-
mitatibus capi-
tula cyano li-
milia: ex quibus
ubi aperiantur
prodeunt flos-
culi albi, aliis si-
miles nisi lon-
giores & acu-
tiores, similes

atque Hispanis Scorzoneram huc Scorzone-
ram, quod a vipera demorsis, quam in Scurzo vo-
cant, præsentaneo remedio auxiliatur, Viperi-
nam esse. Is non putat esse quemquam qui de ea
ante ipsum scripserit: inuentam esse primum in
Catalonia Hispania à quodam seruo Aphro: qui
propinato radicis succo incolumnes seruabat
quotquot demorsi fuerant: primum misisse sic-
cam Ioh. Odoricum Melchiorum Trid. Regina
medicum, paulò pòst viridem ex Hispaniis alla-
tam: Non multo pòst tempore copiosam quo-
que in Bohemia nasci compertum esse: &c. Non
deesse autem, qui in Hispania hanc plantam
Chondryllam esse censeant: sed horum sententia
non esse subscribendum.

Chondrylla
non est.

Gesnero de hortis Tragopogon peregrinus vel
Hispanicus dici posse videtur illa herba quæ His-
panis Escorzonera, hoc est, Serpentaria dicitur,
quæque depicta est in fine iconum stirpium Fu-
chsi edit. Antuerpiensi. Tragopogonis autem
genus esse monuit Coudenbergius. In Tarraco-
nensi Hispania (nunc vocant Catalonia) Her-
ba Mauri cuiusdam industriæ cognita est quam
vocant Escorzonetam. Existimant eandem esse
quæ olim Ptolomeus liberatus sit, ut Cardanus
lib. 6. de rerum variet. prodidit, qui Escorzone-
ram vocat.

Tragopogon
peregrinus
Scl. Hispanica

Lobel. Icon. Plant. p. 551. & Obs. p. 298. Scorzo-
nera, Viperaria.

Casalp. p. 518. Scorzonera de qua Nicolaus
Monardes Hisp. quam multi existimant apud
Dioscoridem Chondryllam esse, sed magis videtur
ad Tragopogoni genus reducenda.

Camer. hort. Scorzonera floribus simplicibus
& plenis in multis locis Germaniæ, à qua His-
panica non alia ratione quàm soli & Climatis
ratione videtur differre. Aliquot huius differen-
tias Pannoniæ & Austriæ peculiare recenset
Clusius.

Thal. Scorzonera tenuifolia lutea, de quo stirpis
genere varia varietatibus statuerunt. Nā multo
planta Hispanica nonnullis dici capit, deinde
Scorzonera nomen ei accessit: plurimis in Ger-
maniæ locis reperitur. Differentias verò folio-
rum ratione & florum etiam evidentes obtinet,
ita ut altera sit latifolia, altera angustifolia. Est

Belli maiori [Ioannis blumen:] prouenit incultis
locis humidis: floret Iunio & Iulio.

C. Bauh. phyt. p. 536. Tragopogon 5. gramineo
folio, radice villola.

TRAGOPOGON HISPANICVS SIVE
Escorzonera aut Scorzonera.

Descriptio

Pedali longitudine est radix, crassitudine pol-
licari, lacte dulcissimo, non sine aliqua ad-
strictione, prægans, caulis sesquicubitalis, mul-
tis alis concavus, inanis, lanugine quadam rasi-
li obsitus: quæ eadem inferius pubescunt folia, la-
tioribus basi caulem amplectentia, longa, Tragopo-

etiam altera subdulci, altera amarâ radice, quâ antidotaria vi magis præditam esse existimo.

C. 2. m.

Hæc eadem verba Thali pro suis recitat C. Bauh. Phyt. qui præterea male separare videtur suam Scorzoneram i. siue latifoliam sinuatam, seu Matthioli Hispanicam, ab eiusdem Boemica, seu sua latifolia secunda. Matthiolus liquidem has non distinguit. Non malè quidem C. Bauh. Scorzoneram Serpentariâ quoque, quod contra venena serpentum effeac habeatur, cognominari posse diceret, sed id ipsi non donandū quod Scorzonera & Serpentariam eandem statuat. Serpentariâ nomen de pluribus dicitur plantis. Tragopogis porro adnumerandas esse eas plantas, quas vulgò Scorzoneras vocant, nemo est, ut arbitrat C. Bauh. qui dubitet. In eo solū differre videntur quod illorum radix minime sit vivax, contra quam Scorzonera.

Tragopogon
& Scorzonera
differe
rentia
Locus.

Tabern. Icon. & hist. Scorzonera Hisp. Viperaria. Item Scorzonera Germanica. Miror tantam similitudinem picturæ Scorzonerae Hisp. cum Scorzonera Germanica si diuersarum plantarum. Oritur montosis locis, præcipue humectis. Maius Scorzonerae genus duntaxat in Hamburgenfi monte Pannonia inuenit Clusius, quodâ loco admodum herbofo, & arboribus circumsepto. Bohemicam uascribit Matth. in monte quodâ fluoso, vliginosoque, nō lōgè à Poggebror. Scorzonera latifolia siue Hispanica ex semine mihi feliciter Montbelgardii progenit in Horto Ill. E. C. ubi caulem & semina petulit. perit interdum tamen, plantæ non ferunt caulem ante tertium annum: eam etiam habui Lugduni & Genevæ in hortis meis, primo anno non terebat caulem: Lugduni florebat Maio, Genevæ Iunio. Parauit obtinui mēse Martio in horto D. Cortusii: Spite vidi florentem Ianio in cultissimo horto Clarissimi viri D. Tenguadel Alseforis.

Virus

Tota planta magni est vñs ad magnos morbos depellendos. Namque præsentaneo remedio aduersus viperarum cæterorumque venenatorum mordus ictusque, ac pestiferos morbos quoscunque, tam è foliis, quam è radice succus desumitur, præbeturque potandus: Vtilis reposta confertur modo ad vertigines & capitis dolores, aliquoties 3ß. in hebdomade sumpta. Comitibus item ingruente insultu mirè affectis subuenit. Cardiacis item datur & vertiginosis. Enimvero commanducata per se radix tristitiam discutit, hilaritatemque conciliat. Quin etiam laqueus radicis succus oculorum aciem acuit.

Dolor
guttur
Comitibus

Orbit.

Tanta eius vis, inquit Manardus, aduersus Scorzonem; ut si eius succo tangatur, torpeat confestim: si iniiciatur in os, pereat: manibus eo succo illis contractatur serpens prædictus sine periculo: non enim mordet, atque adeo torpeat, ut semimortuus videatur: qui fuerit ictus, si comedat de eius radice, aut succum foliorum bibat, confestim sanatur, si inflatus iam fuerit, delidet tumor: sedantur dolores, & deliquia: si præsumatur antequam momorderit, non superueniunt praua symptomata: bibitur eius succus clarificatus, vel per se vel cum aliis roborantibus cor, aut veneno resistentibus, non solū ad Scorzonis ictum sed & ad Vipere, aliorumque serpentum: datur eius aqua distillata ad febres pestilentes & malignas: prouocat enim sudorem mirificè, ubi natura hunc motum tentat: confert ad melancholias, tristitias & deliquia: miscetur quoque epithematibus cordi conferentibus: radices condite per multos dies assumptæ, & aqua prædicta obstructions Hepatis & Lienis tollunt:

Febres
pestilentes

menstruasque purgationes moliantur.

An porro similibus facultatibus præditæ sint Scorzonere Pannonicæ quibus celebrem illam & adeo decantatam Hispanicam pollere aiunt, neminem adhuc periculum fecisse arbitrarur.

TRAGOPOGONIS SPECIES, SIVE SCOR- zonera humilis latifolia.



Latiora brevioraque
habet folia, quâ
Scorzonera
maior Panno-
nica i. Clusii,
Bupleuro lati-
folio, siue Ela-
phobosco Mô-
pelliano non
valde dissimi-
lia, crassiora
tamen & duri-
ora, quinque
neruis, seu ve-
nis per longi-
tudinem excur-
rentibus, di-
stincta, crui-
lei quodâmo-
dò viridi per-
mixti coloris;

Descriptio

gustu verò aliquantulum amaro & feruido: caulis inter hæc assurgit gracilis, pedalis altitudinis, striatus, raris foliis sepius, cui insidet fl. superiori similis, luteus, magnus: quo marcido nascitur in calycibus semen oblongum, asperum, Tragopogo simile, sed minus: in villosâ materiâ albâ latens: radix pollicaris est crassitudinis, interdum maior, longa, nigro, rugosâque cortice tecta, intus alba, quæ contracta lacteo succo manat, successu temporis flauescente, superiore parte, hirsuta veluti cæsarie donata est, & in plura capita plerumque extruberat, ex quibus folia prodeunt.

C. Bauh. Phyt. Scorzonera, siue latifolia nervosa, Clusio humilis latifolia.

Hanc Clus. in monte Badensibus thermis imminente, vicinisque aliis locis, obseruauit in Austria.

TRAGOPOGONIS SPECIES SIVE SCOR- zonera humilis angustifolia.



Floratur
hæc crassâ
radice longa,
nigro, denso,
rugoso corti-
ce prædita, la-
cteâ succo
plena, quæ nō
nunquam su-
periore parte
in plura capi-
ta, quemad-
modum præ-
cedens, extru-
berat, crassi-
tudine mini-
mi digiti (no-
uellatum pla-
tarum instar)
villosâ: ex
quibus
V. 2. 4.

Descriptio

videntur folia Tragopogo similia, firmiora tamen, breuiora, & eiusdem, cum præcedentis foliis coloris: inter ea exerescit humilis, palmum vix excedens *caulis*, aliquot breuibus foliis septus, *cauus*, *florem* in summo fastigio ferens flauum, alteri ferè similem: *semen* deinde in longioribus caliculis, Scorzonera Hispanica semini par, minus tamen, quod maturitate, leuissimo aut statum excutitur, & eius arbitrio fertur.

C. Bauh. phyt. Scorzonera 4. siue angustifolia prima.

Locus & Tempus.

Hæc & sequens florent Aprili & Maio: semen interdum Maio, aut sub Iunii initium maturalescit.

Meminit etiam Clusius Scorzonera humilis fibrosa radice quæ illi 4. C. Bauhino verò quinta dicitur.

TRAGOPOGONIS SPECIES SIVE

Scorzonera maior angustifolia
subæruleo flore.

Descriptio



Frequentia huic sunt folia, longa, Tragopogi foliis minora & angustiora, inter quæ cubitalis assurgit *caulis*, *cauus* quidem ille, sed firmus, durus, viridis, aliquot oblongis foliis septus, & supremâ parte in binos aut plures ramulos diuisus, ferentes in longioribus calicibus *florem* Scorzonera Angustifolia

floribus non dissimilem, nisi quod paulo minor sit, & coloris ex cæruleo purpurascens, iucundi odoris, pastillorum è benzoïno confectorum uidorem quodammodo æmulantis, sed fugacis ædmodum: sena deinde, octona, aut plura in singulis calycibus *semina*, Scorzonera seminum æmulis, quæ matura, cum suo pappo à vento excutuntur: *radix* singularis, minimi digiti crassitudinem æquat, denloque, foris nigricante, & rugoso cortice obducta, supremâ parte hirsuta, & villosa, quæ vulnerata, succum exstillat initio lacteum, deinde fulvescentem, *gustû* primum gummoso, postea aliquantulem acri: viuax est, ut reliquarum radices, vetustate crassior euadens, & superiore parte in plura capita subinde exuberans.

Clus. Pannon. p. 639. Scorzonera Pannonica 5. Hist. post. lib. 5. p. 159. Scorzonera angustifolia elatior pannon. 4. Scorzonera maior angustifolia cæruleo flore.

C. Bauh. Phyt. p. 538. Scorzonera 6. siue angustifolia subærulea.

TRAGOPOGON SPICATUS

tenuifolius

Tragopogon spicatus Hist. Lugdunensis,



radice, foliis, caule ge. Descriptio, niculato, similis est reliquis Tragopogi generibus, nisi gracilior *caulis* est, *radix* tenuis, *folium* angustius, *flor* autem luteus maxime discipat, & qui spicatum coarctatus sit.

C. Bauhin. phyt. pag. 536. Tragopogon 4. siue spicatum luteum.

VIRGA AVREA VULGARIS
latifolia.



Enicula- Descriptio, tum hu-
ius incedit *radix*, oblique per terram acta: fusca, frequentes dimittens fibras albicantes, sapore aromatico: *caules* recti & rigidi, duos aut tres circiter cubitos alti, striati, subhirsuti, medulla fungosa farcti: *folia* cum à radice, tum in caule, & hæc quidem alter-

natim, longis pediculis appensa, interdum nullis aut perquam breuibus donata, quorum quæ iura sunt, palmum ferè lata existunt, duos circiter longa, superiora minora, arrougentia, utraque hirsuta & per ambitum serrata: *flor*es, tum in summo caule cum pediculis peculiaribus ex foliorum alis exortis, frequentes insident. Dorice vocata floribus similes, lutei, magnam partem stamini, in pappos euanescentes.

Virgam auream vulgarem latifoliam multi Solidaginem Sarracenicam, heidnisch wundkraut/ appellant. An autem hæc vera sit Solidago Sarracenica asserere non vult Matthiolus. Is in post. comm. Ital. & Lat. cum magn. fig. quam vulgò Virgam auream vocant Herbam Iudaicam & Paganam cognominat, atque eius flores non esse similes Camomillæ, ut Iuchsius in suo herbario pinxerit. Negat præterea esse illo modo Sideritum primam. N. n. existimo ego Matthiolum iouisse discrimen inter Solidaginem Sarracenicam & Virgam auream: reprehendit figuram Iuchsii, quum tamen planta quam pingit, ei nota non sit: præterea eius figura, quod folia attinet minus probanda videtur: metitò dixit se nolle

nolle asserere, an sit vera Solidago Sarracenica.

Virga aurea, inquit Gesn. de hortis, vulgè ab Italis dicta, nominatur à Fuchſio Solidago Sarracenica (latifolia, ut ab ipſo nobis præſentibus appellabatur.) Verùm præceptor Fuchſio hæc in parte aſſentiri non poſſum, quum hæc dux plantæ non parum differant.

Hist. Lugd. p. 1272. Virga aurea Matthioli. Itæ: Virga aurea Dodonæi. Dux figuræ eiufdem plantæ.

C. Bauh. Phyt. Virga aurea 2. ſive anguſtifolia. Hæc ſæpè ſine crenis vel ſaltem minùs cõpiciuis, aliquando folia circum minutiffimè ſerrata: foliis oblongis, aliquando ſubrotundis.

Virgæ autem hæc planta nomen inde accepit, quòd tamuli floribus granidis, auricolorem virgulam referant. Belg. Gulde ronde. Gall. l'orge d'or. Sunt qui Leucographin Plinii aurument. Solidago & Conſolida ab alijs à viribus denominatur.

Copioſè provenientem vidi Genevæ. Baſileæ eum eſſe obſervavi copioſè florentem Octobri in monte Montets, & in monte prope Brenſach, menſe etiam Auguſto florentem in montè prope Leurach.

VIRGA AVREA SIVE SOLIDAGO SARRACENICA latifolia ſerrata.



Triplicem latiora huic quàm iam dixiſſe ſolia, longiora, cæteroquæ ſimilia, petinde ut caules ramique: at verd flores lutei, pappi non ſecundum ramulos ſpicati, ſed ſummis extremitibusque umbellam quodammodò effigiantes hærent.

Hist. Lugd. p. 1271. Conſolida Sarracenica maior: item p. 1273. Virga aurea altera Lobelii. Duas figuras vnius ſtirpis exiſtimo duobus diuerſis capitibus deſcriptas.

Casp. Bauhin. Phyt. Virga aurea 1. ſive latifolia ſerrata: Reperit in monte Roſberg prope Maſſmünſter florentem Octobri: Frater Caſp. Bauh. in Baſileenſi monte Måndenſtein.

Casp. Bauhin. Phyt. Virga aurea 1. ſive latifolia ſerrata: Reperit in monte Roſberg prope Maſſmünſter florentem Octobri: Frater Caſp. Bauh. in Baſileenſi monte Måndenſtein.

VIRGA AVREA ANGUſTIFOLIA SERRATA, ſive Solidago Sarracenica.

Virgam auream anguſtifoliam hanc voco, ad alterius differentiam quæ folijs latioribus prædita eſt: quarum utraq; à Virga aurea vulgari diuerſa eſt. Hæc itaque, de qua nobis ſermo, bicubitalis & tricubitalis eſt, caulibus ſtriatis, glabris: ex quibus alternatim folia naſcuntur palmum & ſequipalmum longa, vnciam vnam aut duas lata, ſimilia ſerè folijs Salicis auricu-

latæ, Doriæ inſtar per ambitum crenata, ſed tenuiora, glabra, non hirsuta ut in vulgari, ſapore quodam aromatico prædita, calidiuſculo: flores non ſecundum caulem, ut in Virga aurea vulgari, ſed extremis ſurculis ut in Doria, ut umbellam quodammodò mentiantur, lutei, folijs longiuſculis, ternis vel quaternis conſtantes, ſtaminibus in pappis reſoluendis mediè obtinentibus.



Trago, Dodon. & Fuchſio, Herba fortis, quibuſdam etiam Cartafilago & Filago, eam, inquit Fuchſius Cartaphylax dicendum eſſet cuius nec deſcriptio iſti conuenit.

C. Bauhin. Phyt. eſt Virga aurea 4. ſive anguſtifolia ſerrata cuius aliam adhuc ſpeciem eſſe aſſerit longioribus folijs.

H. Lugd. p. 1270. Conſolida ſive Solidago Sarracenica à coniungendis vulnerum labijs à Sarracenis & Turcis ita dicta: Herba fortis Gall. Conſoulde & Conſolide Sarrazine. Duas figuras habet, vni titulus Solidago Sarracenica Fuchſii, alteri Solidago Sarracenica Lobelii.

Anc collecta eſt in monte Roſberg prope Maſſmünſter, & plantata in Horto M. E. C. florens Septembri, ac etiam Octobri.

VIRGÆ AVRÆ SIVE SOLIDAGINI anguſtifoliæ affinis Lingua avis Dalechampii.



Lingua maior duorum aut trium eſt cubitorum, caule ſtriato, cauo, per quæ ex longis interuallis alternata ſola Solidaginis Sarracenicæ non multum abſimilia, ſine pediculis adnata, palmum aut ſequipalmum longa, ſemunciam circiter lata: in ambitu ſerrata, in acutè mucrone deſi-

gentia, & ſubtus veluti tomento obſita: ſupremus caulis in ſurculos crebros diſcitur, atque hi rurfum in pediculos, in quibus flores lutei Solidaginis Sarracenicæ.

Lingua ma-
ior H. Lugd.
Conyza
max. ferrat-
ifolia. Cam. H. Lugd. p. 1037. Lingua maior. Camerario in-
ter icones Hircyniarum stirpium fol. 3. Conyza
maxima ferratifolia.

An Lob. Icon. Plant. p. 147. Conyza Helenitis
foliis laciniatis? Gesn. hort. Conyze aquaticæ
species. Thal. Conyza aquatica maxima ferra-
tifolia. C. Bauh. phyt. Conyza 12. siue palustris
ferratifolia.

Locus &
Temper. Non placet à Dalechampio reponi inter Ra-
nunculi genera cū quibus nihil commune habet.
Ante triginta annos plantæ caulem cum foliis
non floridum repoli, ubi collegerim non recor-
dor. Siccam etiam habui à Richnero.

ALISMA SIVE DAMASONIVM Veteribus.

Alisa. Aty-
ron. Lyrin. **A**λίσμα, quod alii Αλίσμα, alii Δαμασονίον, alii
Αλίσμα, alii Δαμασονίον vocant, teste Dioscoride,
folia habet αλίσμα, λίσμα similia, angustiora tamen
& ad terram deflexa: Caulis est cubito altior, ha-
bēs capitula thyrsi specie, (quidam εστραγιάδα,) flo-
res sunt tenues, albi, subpallidi, radices αλίσμα
λίσμα, tenues, odoratæ, acres, subpingues:
Amat locos aquosos. Radix drachmæ vnius aut
duarum pondere pota cum vino, commoda est
his qui Leporem marinum vorant, & quos
Rana rubeta momordit, & qui Opium hauserit.
Item ad tortiones [] & dysenteriam, cum
per se, cum cum pari Pauco pota. Conuenit et-
iam conuulsis & ad vteri affectiones. At ipsa
herba aluum sistit, & fortis reducit, & impolita
tumores (αλίσμα) mitigat.

Meminit & Plinius lib. 25. cap. 10. Alismatis &
quidem duplicis: alterius laciniatis angustis foliis,
alterius maioribus foliis, utriusque in syluis,
cetera quæ habet sunt Dioscoridea. Eius in cal-
culo expellendo vires se casu expertum esse tra-
dit Galenus, in dysenteria autem minime.

Acquiuoca De Alismate siue Damasonio, magna inter
Auctores controuersia: aliis Plantaginem: aliis
Caleceolum Maris: aliis Digitalem: aliis Men-
tham græcam: aliis Auriculam vrsi, aliis Primu-
lari veris, aliis Bifolium maius & minus: aliis
Plantaginem aquaticam: aliis Saponariam: aliis
Lilium conuallium: aliis Halymum: aliis Elle-
borinen: aliis Costum hortensem, aliis Alisma
Monspeliensium, siue Doriam de qua iam: aliis
aliam plantam statuentibus.

ALISMA MONSPELIENSIVM siue Doria.

Descriptio **O**bliquæ fertur radix, crassitudine digitali, al-
ba, multas longas ab inferiore parte fibras
dimittens, concava, ubi in caulem excrescit, sapo-
re aromatico & amaro, caulis trium aut qua-
tuor cubitorum est altitudine, rectus, simplex,
concauus: cui alternatim sine pediculo folia ad-
nascuntur, Lepidii foliis accedentia, non
neruosa ut sunt Plantaginis aquaticæ, quibus e-
tiam sunt longiora, acuta, crenata, pinguis, prio-
ra folia habent aliquid simile cum plantagine a-
quatica, non tamen sunt ita lata, nec nervos se-
cundum longitudinem habent, cum pediculis
sunt cubitalia. Sunt sapore Angelicæ aromatico,
sed remissiore, amaro: caulis fastigium in ali-
quot diuiditur surculos, qui fl. re. sustinent laco-
bræ luteos, sed minus foliosos, in pappos abeun-
tes. Sculptor noster malè pro serraturis veluti
pilos in icone nostra demonstrat.



Gesn. hort. p. 186. Virga au-
rea, forte Pana-
ces Chironium
cui Lapathi fo-
lium tribui-
tur, nisi id po-
tius Doria circa
Monspelium di-
cta sit.

An Lobel. &
Pena Aduers. p.
124. Norbonen-
sium Dorea qua-
si aurea, quam
perperam Doriam
vocant: neutri
quam Doriam du-
ci tritemū, quasi
exoticæ huius
reptæ laudem
verè asserunt her-
barii quidam.

An Theophr. Panax Chironium
& Plinii Pharnaceum. Figura Aduers. non pla-
cet. Lobel. Obl. p. 158. Ic. plant. p. 197. Herba Do-
ria, Item Icon. plant. p. 177. Herba Doria Narbo-
nensis.

Camer hort. Dorea herba utraque maior &
minor ad Consolidam auream accedens.

H. Lugd. p. 1273. Dorea siue Herba aurea Nar-
bonensium Penæ, vulgè l'herbe Dorée. Item Li-
monium aliud.

C. Bauh. phyt. Virga aurea siue maior, vel
Doria, id est, aurea.

Alisma siue Damasonium quod quidam Mon-
spel. diiudicant, habeo in in horto Ill. E. C. viua-
ci radice quod floret Iulio & Augusto, semen
maturum Septembri; Vidi etiam Monspelii Ma-
io florentem ad flumini ripam prope Castel-
neuf: ut & Patavii: Tiguri florentem Iunio in
horto D. Gesneri qui Doriam appellabat. Ferra-
tia in horto monasterii S. Dominici.

Locus &
Temper.

TRIPOLIUM MAIUS ET MINUS



Descriptio **T**ripolium vocat ho-
die quidam
herbam mari-
tinam, cubita-
lem & fessui-
cubitalem, ra-
dice fibrosa hæ-
rentem: folia
ad Limoni
maioris folia
accedunt, stri-
ctiora, longi-
tudine ferè pa-
ria, nervis re-
ctis Plantagi-
neis donata,
glabra, nullo
ordine per ra-
mos crescen-
tia: caulis fa-
stigium ramo-
sum flores gerit surculorum extremis hærentes,
purpureos cartuleosue, qui in pappos evanescent.
Tripolium, [ait Diok.] folia habet Maris, attra-
men

men crassiora : caulem palmarem & superna parte diuisum. Eius flos ter die colorem mutare perhibetur, [Id fieri posse, inquit Lobel. & Pen. in Adu. lubet credere, cum videamus e naturæ officina multo mirabilia euenire:] ita ut mane candidus, meridie purpureus, vespere punicus aspiatur. Radix est alba, odorata, calidi gustus.



*Plin. hallu-
cinatur.*

Reperio
(Matth. verba sunt) in historia Tripolii non parum hallucinatum esse Plinium libro 21. cap. 7. ubi tripiter Tripolium cum polio herba confudit, addens ut asserere non dubitauerit, polium ter in die foliorum mutare colorem. Id quod de Tripolii floribus tradidere tamen Dioscorides,

cum Antiquorum reliqui.

inquit Dodon. gall. vocatur Latine Tripolium, Arabicè Serapioni capite 330. Turbith, sed non est Turbith Mesue aut Auicennæ, quidam vocant *Camomille bleue*, vel *Maquerite bleue*, quæ tamen nomina non conveniunt. Fabulosum est [ait etiam quod à Dioscor. adscribitur, tradi nempe vno die ter colorem floris eius mutari: & manè album, meridie purpureum, vespere punicum, id est, punicum. Sed tamen tres dierum colores vno die reperiri posse, veritati haud repugnat. Nam cum flores omnes, non simul, sed particulatim & sensim periciantur, tres faciliè contingit florum colores observari: incipientium nempe, completorum, & deficientium. Nondum patentes aut completi subpurpurei sunt: perfecti patentesque, quales scripsimus: deficientes papporum candidam ostentant lanuginem.

Camer. hort. Tripolium à Lobelio depictum. C. Bauh. Phyt. Tripolium n. siue maius. Item Tripolium 2. siue minus. Nasceitur, inquit Dioscor. apud Dodonæum, Tripolium locis maritimis, quæ vnda alluit, recedentique demittit. Ac talibus quidem in Belgii quibusdam maritimis nostrum reperitur: ut in Zelandiæ insulis. Neque videlicet in mari, neque in sicco, sed locis, quæ æstuant mate allidit, recedens, resuens, retroque commeans deserit. Translatum ad hortos diutius viget, sed luxurians grandescit, & in fibras radices commutat. Æstivis mensibus flores facit. Sciant hæc, teste Lobelio, Narbonica & Anglica littora & fluminum crepidines, quas refluxus & maris æstus inundant, ubi ferme nulla alia herba comparet. Frequens in littore Veneto.

Tripolii radix, uti Galenus ait, gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu. Dioscorides radicem in vino potam duarum drachmarum pondere per alium aquam ducere refert: itemque urinam. Conciditur etiam ad alexipharma-

ca, siue venenis resistentia medicamenta.

Ceterum Tripolium, Turbith Serapionis, radix alium non citet decocto & succo pota ait Lobelius. Sed ego cum non intelligo, Si Tripolium quod exhibet, alium non citet non erit Dioscor. Tripolium quod

*Lob. redans
quint*

EUPATORIUM ADULTERINUM. CAP. XIII.



Quarum Descriptio
A tipas accolit adulterinum Eupatorium, insigni proceritate distans, trium, aut plurium cubitorum altitudine gliscens, caule erecto, tereti, tomentoso & in viridi purpurante, medulla alba pleno, gratum & aromaticum odorem, cum inciditur, spirante, multis aliis concavo:

falsa per intervalla disponitur, sed ex eodem eugenicula plura exeunt in vnum pediculum coeuntia, veluti in Cannabe, cuius foliis similia sunt satis, oblonga, acuminata, per ambitum serrata, pilosa, sapore amaro: flores in mucariis glomerati, meris fere staminulis constantes, ex albo purpureascent, in pappos tandem facientes. Radix subest fibrosa, alba, non absimili cum foliis gustu.

Trago Herba S. Konigandis dicitur, quam Officinæ hæcenus pro Eupatorio non sine errore usurparunt.

Dodon. Gal. Pseudohepatorium mas, Eupatorium bastard mas: in officinis non sine magno errore pro Eupatorio usurpatum: Doctis recentioribus Eupatorium aquaticum, aut adulterinum, Belg. Coning humnecruyt/bera clausen & Bolesenscruyt mannefen. Dod. lat. in fol. Vulgare siue adulterinum Hepatorium vulgi, Eupatorium nonnullorum, Eupatorium adulterinum Fuchsi, Cannabina plerumque à similitudine foliorum Cannabis, Terzola Baptista Sardi existimata:

Lobel. Aduers. pag. 227. Aquatica Cannabina Eupatorium dicta mas, quod per multi Pharmacopœi, Belgæ præsertim, Eupatorium Auicennæ foliis Cannabis prædictum vocitant. Obscrv. pag. 284. & 285. Cannabina aquatica planta, Eupatorium dicta, Officinis Galliæ Eupatorium cannabinum. Officinis Belgii perperam Eupatorium Græcorum. Icon. Plant. p. 528. Cannabina aquatica, siue Eupatorium mas.

Amato in Dioscor. lib. 2. enarr. 163. Cannabis filu. & non, ut multi rentur, Eupatorium. Item lib. 4. enarr. 44. Eupatorium Auicennæ, quod ait falsò Ruellium apud Dioscoridem Hydropiper esse credere.

Merito Cord. in Dioscor. lib. 2. cap. 191. Ruellium à veritate aberrasse scribit, quod falsò vocatum Eupatorium Hydropiper esse iudicet. Adolph. Occo in pharm. Eupatorium Auicennæ

*Herba S.
Konigandis*

Pseudohepatorium

Eupatorium aquaticum

*Cannabina multis
Terzola
Sardi
Cannab.
aquatica*

Eupat. cannabinum

*Cannabis filu. amari
Ruell. err.*

*Non est
Turbith*

Diosc. fabulosus

Temperis

*Hydriacum
Grinam
Adu.*

(ita quoque vocat Rob. Constant. apud Amat.) Kunigundis herba & Origanum aquaticum. Castor. Durant. p. 177. Eupatorium vulgare & Auicennae, iis in fine herbarii aliam habet figuram quae melius placet. Anguill. epist. 14. Eupatorium Auicennae non verum.

Eupat. A.
Matth.

Matth. in prior. comm. Lat. Eupatorium Auicennae inscribit: Euchar. Roellin. Eupatorium. Harchio in Ono. pag. 18. Eupatorium Auicennae. foliis Cannabinis. Monach. in Mss. dist. 6. cens.

Eupat. A.
vulgar.

189. Pseudo seu Adulterinum Eupatorium. Fusch. hist. Eupatorium adulterinum, Eupatorium des Arabes. De comp. medic. Eupatorium alterum, Eupatorium Auicennae, quod pro vero & Graecorum Eupatorio usurpari non debet: sed videndum ubi Sepiasarii Auicennae medicamenta construunt. Celsus. Eupatorium vulgare, Thallio pag. 85. Pseudohepatorium mas. seu Hepatorium Auicennae quorundam: Camer. hort. Eupatorium Auicennae sine aquaticum.

Pseudohepatorium.
Eupatorium.
Auicennae.
non videtur esse.

H. Lugd. p. 1053. Eupatorium vulgare, quod vero Dioscoridis Eupatorio ferè omnes substituant, non rei ignoracione, sed maiorum virorum obseruatione, & experientia ducti, quas etiam ipsa aspectu insignis plantae, foliorum amaritudine & odoris praestantia, satis praese fert. Igitur propter amicas hepatis vires, forte & ob folia Eupatorium vocauerunt, verius Pseudoeupatorium dicendum.

C. Bauh. phyt. Eupatorium 1. (apud Matth.) siue cannabinum. Tabern. Herba S. Kunigundis. Schv. Eupatorium adulterinum. Origanum palustre. Cannabina aquatica: Circa serobium, tumulorum, ac stagnantium aquarum margines, fluuiorum ripas, aliisque vlginis, subinde & in veteribus ac humentibus muris nascitur: Amat aquosa & vicina aquis loca, non tamen rigari omnino postulat. Iulio & Augusto floret ac viget: radix resistibilis est; sed caules foliaque hyeme intercidunt. Obseruari varijs in locis, ut Lugduni, Genuae, Monspelij, Balileae, & Montbelgardi.

Vires &
Tempor.

Herba viribus insignis; quamvis ab Antiquis silentio fuerit praetermissa. Amari tantis quidem est gustus, odoris non minus tamen suavis, quam Agrimonia odorata, cui viribus proxime accedit, ac nonnullis in affectibus excellentior est. Obes nimis naris erant, re-

ste Lobelio, qui ferè eam dicantabant. Radicis minorum seu fibrarum eius incisarum pugillus in vino decoctus, colatus & potus, Geshero per per horam post, aluum semel mouit, postea vero vomitum duodecies ferè cum magno labore: ita ut Ellebori albi instar purget, sed longe facilius & tutius, profuit sanè plurimum, magna pituitae copia euacuata. Gustu vehementer amara est, inquit Fuchsius, ut calidam & siccam esse in secundo ordine aut in medio tertii non sit dubium. Haud dubie haec herba astringit, expurgatque, & quae in venis est crassitiem incidit: Potest obstructions iecoris & lienis aliarumque partium corporis soluere. Hic frutex, praesertim in flore, vulnera & vlcera sanandi vires obtinet. Argentinae, autore Trago, in pecoribus tantum curandis usurpatur. Certum est vino decoctam herbam aut aquam destillatam vitis internorum membrorum utilissimam: Sulfur herbae siccat & venenata animalia ligantur. Asunt ceruostelis laesos remedia ex hac herba petere. Pseudo-Eupatorium, ut apud Matthiol. & H. Lugd. legitur, calido siccoque est temperamento: calfacit, tenuat, abstergit, incidit, aperit. Ex recentibus folijs contritus succus exprimitur, & insolutus, cogitur in pastillos, quorum frequens in medicamentis vsus. Confert maxime eiusdem decoctum, aut epotus succus iocineris doloribus & alijs eiusdem affectibus ab obstructione ortis. Quare vtiliter propinatur hydropicis obstructionibus vexatis. Datur quoque succus ad ventriculi apostemata a frigidityte nata, quibus etiam prodest herba externis illita. Foliorum decoctum auxiliatur diuternis, praesertim pituitosis, febribus ab obstructione prouenientibus. Idem vrinas & menses pellit: scabiem pruritumque sanat cum fumaris decoctum ex caprino sero: sed succus validior est, qui potus elephantiasin incipienti medetur. Flores illiti vulnera recentia & vlcera sanant. Datur idem vtiliter pecoribus tussientibus & anhelosis equis, quorum etiam dolores finit. Succus binum obolorum pondere in cataportis deuoratis intestinorum vermes necat. Idem recens expressus illinitur commos de ex aceto & sale aduersus scabiem. Addi scribitur a Schvvenckfeldio balneis ad vteri affectus, & lixijs aduersus inueteratos capitis dolores.

FINIS LIBRI VICESIMI QVARTI.



ALCEA TENUIFOLIA CRISPA.

Descriptio



A Vulgari Alcea in eo potissimum differt, quod folium habeat tenuissimè in creberrimas lacinijs tenues, crispas diuisum, alioqui folio alterius Alceæ par. Flos purpureus magnus, conuenit cum orbiculata seminum sublequentium placenta. An folius naturæ lusus: & an ex eodem semine proueniat præ-

cedens & hæc considerandum?

Lonic. Malua querna, Dens Leonis, Selryß Lotensan. Ryff in Diosc. Alcea altera, segmentis profundioribus laciniata. Camer. hort. & Hort. Lusit. Alcea tenuifolia folio crispo.

An Cæsalp. Alcea quædam patnain syluis, quam ad Cannabin syluestrem reduci posse putat? An Cordo in Sylu. obl. Alcea tenuissimis folijs?

C. Bauh. phyt. Alcea tenuifolia Camerario: Hægo non duas statuo species, sed tantum unam.

Schvv. Malua sylu. seu Querna, Dens Leonis, Auger pappin, Selryß. Eodem cum priori loco natali, si limmodò differens quod sub Quercubus nascatur. Schvv. præuè iudicat, aliud discrimen in descriptione ostendi.

Collectam eundem loco Bessfordiam Montbelgardo, plantam in horto Ill. E. C. obseruauit etiam circa S. Cosmum in Suntgouia: Frequens etiam in Hærcinia sylua & apud Rhenum.

ALCEA VILLOSA.

Descriptio



Alcea villosa nomen dedit deus ille villus rigidusculus & asper quo tota planta horret. Rami palmates aut dodrantales, teretes, hirti, multi, ex radice simplice, gracili, palmari, statim exoritur. Folia parua, plerumque profundè in tres lacinijs serratas dissecta, lanuginosa. Flores th ex foliorum si-

nu quam in ramorum extremis, modii inter Maluæ syluestris repentis & erectæ flores, purpurascens, è quinque folijs compositi, è calyce magno quem comparam duplex foliorum acuminatorum asperorum pilolorumque agmen, in quo succedit orbiculata seminum nigricantium placenta.

Hist. Logd. Alcea villosa. C. Bauh. Phyt. Alcea 9. Synon. Alcea hirsuta 14

Valerandus Dourez à quo primò habui plantam vocabat Alceam montanam. Data mihi Argentina ab Agerio 1593. ubi audio in vicinia prouenire. Copiosam obtulit & collegit Gener. I. Henr. Cherlerus in vinetis circa Montpelium, sicioribus præsertim & in collem subquædam elaus.

ALCEA PANNONICA CAMERARIO.

Descriptio

Alcea Pannonica cuius semen communicauit Clusius, minutius vulgari, planta ipsa folijs primò exit nullam diuisuram habentibus, rotundis, crenatis, postea in caulem alurgens magis laciniata profert. Hæc Camerarius.

An Alcea genus tertium Clusio?

Huius figuram non inuenio apud Camerarium, nec in post. Hist. Clusius meminit. C. Bauh. Phyt. Alcea 4. siue Pannonica.

ALCEA AMPLISSIMO FOLIO

laciniato.

Descriptio



Misit nobis frater C. Bauhinus Alceam pulchram folio amplissimo mandis expansa ferè magnitudine, in magnas partes diuiso, glabro, in pediculis tamen pilis aliqui tenuiores quam in vulgari, si bene iudicamus ex sicca, flos etiam quem misit separatò, si eiusdem plantæ est, quod nobis persuademus, pediculo est tenuiore quam in vulga-

ri, ac longiore viciarum trium, folia floris qualia vulgari: calycis foliola minora, & minus hirsuta.

MALVÆ INDICÆ FORTE

genus.

Ex prima navigatione in lauam à Batatis alla- Locus: Exot. lib. 2. cap. 15. decimus o-
tus est Clusio [Exot. lib. 2. cap. 15. decimus o-
ctauus] fructus subrotundæ in plano formæ, vn- Descriptio
ctalis ferè, nigro aut subfusco & leui cortice te-
ctus, in quinque partes diuiso, sub quo latebat
cartilagineus alius cortex, inæqualis & asper, ex-

XXX



tuberans ea parte quâ superior cortex diuisus, continens in singulis loculis tumulentibus quaternâ aut quingranâ Alceæ Ægyptiæ granorum magnitudine, longiora tamen, & infimâ parte quâ cortici adhaerant angustiora, nucleum exalbida tunica tectum intus verò subitidem, continentia, nullò manifesto sapore præditum. An Malux ali- quod genus? nu-

cleus certè manducatus, lentum & viscosum quidpiam præbebat.

ALCEA SOLISEQVA MULTIS Veneta.

Descriptio



Candidissimam sed terrem, fibratam agit radicem: caulibus dodrantibus, teretibus, asperis & hirsutis: cuiusmodi sunt & pediculi: quibus appenduntur folia Alceæ vulgaris æmula, in tria segmenta sinuata subdivisa, superius attenuentia, inferius remissius colorata, sed magis pilosa, gustu viscido & lento: flores

quàm Alceæ vulgaris minores, sed peregrina elegantia acceptiores, ex luteo herbidi, vngibus purpurantibus, quorum medium occupat cuneolus apicibus croceis & coccineis stipatus, quibus circumuicitur viriculus membraneus hirsutus, striatus, quinque thornis à medio sursum verum radiatus.

Synon.

Alcea Gescaria
Alcea Veneta
Malua Veneta
Alcea peregrina
Hypecoum Matth.
Lonic. nana
Herba Hungarica

C. Bauh. Phyt. Alcea 3. sine vesicaria.

Conabatur nonnulli Trago persuadere Malnam seu Alceam Venetam eam esse stirpem quæ Dioc. Androtamos dicitur, sed errant. Existimat is eam congenerem esse vel Althææ vel Alceæ.

Gesn. hort. Malua Veneta: Alcea peregrina. Hypecoum Matthioli, Malux & Alceæ species. Item in append. Alcea Bononiensis Volmari.

Cord. Obs. lylu. Alceæ species.

Lonic. stirpium ignatus, duas habet figuras, & descriptiones vnius plantæ. Idem prior est Malua Venetiana, Penediger oder Wasser röslein. Et Herba Hungarica. Vnger frann.

Nostri quoque figura quæ etiam sculpta non placet.

Quamvis quidam hanc Italicam & Venetam dicant, tamen nupiam meminimus, aunt Lob. & Pena in Adu. in Italia, nedum Venetis, nisi hortis vidisse. Admodum rudis est Commentator, qui Rutæ folia huic esse contendit: imponit dum huic vires Opii asserit. Lobel. Obs. & Ic. Plant. Alcea peregrina Solisequa. Alcea vesicaria Dodonæo, perperam Hypecoum Matth. Alcea Veneta Tragi. Matth. in Dioscor. Hypecoum. Græc. ὀνίκεα, Ital. Hypecou.

Camer. ad Matth. Hypecoum Matthioli, alii Alceam Venetam vel peregrinam Solisequam nominant. Sunt qui Gallicè vocent, La gloire du Monde, & Germanicè Laternblum. Hort. Lus. Alcea peregrina. Veneta Solisequa fata in orto Hl. C. Vvitt. Montbelg. quorannis provenit: dudum annotavi non mihi placere pro Hypecou: Locum habebam etiam Genex in orto: floret Iulio, semen maturat Iulio.

Appendix ad cap. III. lib. XXIII.

Marcell. Althæa Malua: siluestris. Brunsch. Althæa & Malua Hispanica. Camer. hort. Thal. Clus. Flor. Lusit. Althæa vulgaris. Lob. & Pena Adu. Ic. Plant. Gesn. hort. Althæa & Ibisus. Tragi. Germ. Ibisus & Malux genus. Gesn. hort. Malua agrestis genus. Cæsalp. Malua siluestris prima & Bismalna. Cordo in Diosc. Althæa, syluestris Malux genus. Et Hist. Althæa, seu Malua palustris. H. Eggd. Althæa Matthioli. C. Bauh. Phyt. Althæa seu Diosc. & Plinii, floribus carididis aut ex albido dilute purpurascens.

Cæterum notissima hæc est Althæa titulo patet sinu autoribus, & omni Chirurgorum, vulgo, ex vnguento maximè quod de Althæa appellatur.

Debuerat autem nostræ ætate in maiore nominis & usus honore Althæa esse: Nec Maro quondam pæcoris sui greges viridi compellere Hibiisco, ex quo tam honestam Garcia illi appellatorem fecerat: ut sola hæc inter omnes naturæ plantas à toto Medicinæ usu indicaretur: Si quidem nihil Althæa Græcis aliud est, quàm si à mendendo Medicam simpliciter dicas: Quibus addit in Medicina pharmacum remediumque: & addit verbum mederi est: sic enim nominata est à τὸ μεδαναι & τὸ μεδαναι αὐτὴν autem Dioscoride, id est, quod inter primas sit vtilis, & plurimis polleat remediis. Nec aliter in Theriacis suis Nicander addidit aliquod sæpè appellat. Hanc Palladius in Octobri mense Hibiscum dici testatur his verbis: Althæa h. e. Hibisci folia, vel radices, aut eius caulem tenerum decoctum, vel vinum ex molli fiat fortè, in dolum mitti asserunt. Nomen

naturæ tamen etiam Ibisus, teste Diosc. seu Hibiscus & Eufiscus & Ibisus. Item Maluiscus, nomine ex Malua & Ibisco composito: Officinis Bismalus, seu Vismalus, quasi Malua viscosa, & ab excellentia effectus à quibusdam Aristalthea [eumalthea] inquit Plinius, à Theophrasto eum malthea [Malua siluestris]. Est enim, ut ait Dioscorides, in siluestrium Maluarum genere. Dicitur tandem quoque Dendromalache & Anadendromalache [Anadendron & Anadendron] à Galeno, cen arborea siue arborelens Malua. Quidam olus Iudæum appellant.

Præter Althæam Bismalus dictam, nobis hæc quoque sunt cognita. Althæa profundè serrato siue dentato folio. Althæa flore grandi Alceæ, Thuria.

Thuringiaca Camerarij. Althæa arborescens. Althææ species quibusdam arborea altera, vel Bryonia folio. Althæa Sida dicta quibusdam. Althæa flore luteo, quibusdam Abutilon. Appellatur etiam Abutilon Indicum à C. Bauh. Althæa. Sed & Maluam arboream nonnulli Althæam vocant. Sic quoque Lobelius & Pena in Adu. Maluam roseam Althæam faciunt. Maluam crispam, Althæam crispam & maiorem appellat Olling. apud Gein. hort. Plurimi, inquit Braslau. decepti sunt, Alceam cum Althæa confundentes. Althæa Lobel. Clusij mihi videtur Alcea pentaphylli folio, siue Cannabisi filu. Cortusi. Althæa demum dicitur de Ocimoide inter supposititia Dioscoridis apud Cornarium de qua hystoria nostræ generalis lib. 29.

Appendix ad C. IX. LIB. XXIII.

DE RHA SIVE RHAPONTICO
Veterum sententia.

Rha. Diosc. **P** quod alij Pm vocant [alij pmar, Romani pmar, inter spuria Diosc.] Nasitur in locis supra Bosporum, vnde etiam adfertur, radix nigra, Centaurio magno similis, minor tamen & rubicundior [striper] quantum levis. Optimum est quod terendines non sensit, viscosumque gustu, cum remissa adstrictione [adstringens] & quod commansum pallidum est, & Crocum quodammodo colore refert. Potum facit ad inflationes, stomachi debilitatem, omnis generis dolorem, conuulsa, splenicos, hepaticos, nephriticos, tormina, vesicæ & Thoracis vitia, præcordiorum distentiones, vteri affectiones, coxendicum morbum, sanguinis sputa, anhelationes, singultus, dysenterias, cæliacas affectiones, circuitus febriles, & venenatorum morsus. Datur ad singulas affectiones similiter vt Agaricum eodem pondere, & cum iisdem liquoribus, non febricitantibus cum vino mulso: febricitantibus cum aqua mulsa: tabidis cum passo: splenicis cum aceto mulso: stomachicis ita vt est manditur ac deuoratur, nullo insuper liquore absorpto. Tollit etiam lurida & impetigines cum aceto illitum. Et inflammationes omnes diuturnas diffundit cum aqua illitum ac impositum. Summa verò ipsius vis est adstringere cum aliquantula caliditate.

Rhacoma Plinio. Rhacoma (ita enim vocat Plinius) affertur ex his quæ supra Pontum sunt regionibus. Radix Costo nigro similis, minor & rufior paulò, sine odore, calfaciens gustu & adstringens. Eadem trita vini colorem reddit, ad Crocum inclinantem. Illita collectiones inflammationesque sedat, vulnera sanat, epiphoras oculorum sedat ex passo illita. Insignita cum melle, & alia liuentia ex aceto. Farina eius inspergitur contra Cacoethe & sanguinem reicientibus drachmæ pondere in aqua. Dysentericis etiam & Cæliacis, si febris carent, in vino: sin aliter, ex aqua. Facilius teritur, nocte antecedente madefacta. Datur & decoctum eius bibendum duplici mensura ad rupta, conuulsa, contusis, ex sublimi deuolutis. Si pectoris sint dolores, additur pipæris aliquid & myrrhæ: si dissolutio stomachi, ex frigida aqua somitur, siue intus, siue extrâ, purulentis excrecationibus: item hepaticis, spleneticis, ischiadicis: ad renum vitia, suspuria, orthopnoeas. Artetiæ scabritas sapat ex passo, tribus obolis potus trita, aut

decoctum eius. Lychenas quoque ex aceto imposita purgat: Bibitur contra inflationes & perfrictiones, febres frigidas, singultus, tormina, asperitates, capitis grauitates, melancholicas vertigines, lassitudinum dolores & conuulsiones.

In Rheo (teste Galeno de Antid.) quoque frus committitur. Nam quibus in locis nascitur, simulque euulsum est, ipsum elixant, quod succum remittat, ac tam succum vt syncerum & aquæ impermistum, quam Rheum exiccatum, vt non elixum ad nos postea mittunt. Quamobrem scientia opus est verum ab adulterino secernendi, quam facillimè consequuntur, qui suæ spontis Rheum aliquando viderint. Nam elixi pars quæ sub aspectum venit, densa per totum & compacta non est, sed rarior: & gustu tentatum saporem adstringentem, vel nullum vel obscurum remittit. Cum tamen si adulteratum non sit, vehementer adstringat. Citò tamen & ipsum foraminosum efficitur. Rheum [ait porro Gal. simpl. 8.] quidam Rha nuncupant, mistam habet tum temperaturam, tum facultatem: habet enim quiddam terrestre frigidum, cui indicio est adstrictio: & adiuncta est quædam illi caliditas: siquidem si pluseulum mandatur, lubacæ conspicitur. Quin etiam æteræ cuiusdam substantiæ subtilis est particeps, quod indicat tum laxitas, tum leuitas: verum [adde minimè] & opera: ob id enim (Add. licet adstringens tamen) non tantum conuulsis, sed & ruptis & orthopnoeæ prodest: Sic quoque liuentia & lychenas sanat illitum cum aceto. Porro quod adstrictionis opera haud instrenua sunt, hinc discernere liceat, quod sanguinem expuentibus, cæliacis & dysentericis, conferat: nec enim reluctatur terrestri frigido tenue æreum, imò eò quod deducat in altum valentioris effectus causa existit.

Meminit Rhapontici Paul. Aegineta diuersis in locis. Et primò quidem de cruditatibus & vomitu in mulieribus prægnantibus, vbi dicit, bibant Ponticam radicem, quæ vernacula lingua Rha vocatur. Idem eodem lib. cap. 41. Si magis subducere volumus, de Rheo parum ammiscemus. Item lib. 7. in antid. ex corallio podagrica, & paulò post in Antidoro podagrica Agapeti, dicit, Rhei barbarici. Et tandem l. 7. sub litera, Rheon alij Rha vocant, compositum est ex terrea frigida, & tenuium partium ærea substantia, calidaque ac leniter acri. Vnde conuulsa & rupta, & erecta ceruice spirationes iuuat. Item liuida, discutiendo. At astringendo, sanguinis sputationibus, & cæliacis & dysenteriacis prodest. Vtraque verò facultate, hepaticis.

Nunc Mesuem de Rhapontico scribentem audiamus. Rhabarbarum etiam clemens, inquit, & excellens est medicamentum, multas dotes medicamento purganti maximè expetitas completum. Calidum siccum ordine secundo potius quàm primo, substantia duplici constat, vna aquea, terrea, adstringente, corpus dante, profunda, altera ærea, & ignea (à qua rarum efficitur) superficialia, quæ suam terream, essentiam adurendo amarum efficit, & purgatorium, & obstruenda liberans. Has autem substantias macerando separamus. Vt calida & purgatrix in humorem transferatur, terrea verò adstringens remaneat. Bilem verò pituitamque illa vacuat, præcipuè à ventriculo & hepate, & inde sanguinem purgat, obstruções liberat, & affectus male natos sanat, ischærum, hydropem, splenis tumorem, febres putridas, etiam diuturnas, dolorem hypochondrii,

Scimus Dioscoridem respicere genus astringentium, Galenum autem habere rationem eius quod adulteratum, ac cum eo conferte non adulteratum, quod si conferatur cum adulterato animaduertetur vehementer adstringere, interea non respicere genus astringentium, nec cum omni adstringente conferre: vel fortè in Dioscoridis codice deprauatam quis dicat lectionem: dicit enim in fine capitis summam eius vim esse astringere: Melius aliter ac Galenus, dicit illud quod maceratum & exanimatum valenter adstringere & croci colore non inficere.

Appendix ad Caput X. Libri XXIII.

Rhabarbarum inquit, Syluius in Mesuem, à Rhapōtico Veterum diuersa res est, prisca incognita. Hoc ex tiguis ad Rha fluium supra Pontum [vnde Rha Ponticum Græcis & Latinis, & Radix Pontica Celso dicitur] & Bosporum Septentrionali tractu affertur: parum purgatorium experientia Posteriorum, licet inuentu sit rarissimum, & hodie propè ignotum: obscuratum opinor à Rhabarbaro seu Indico, quod ex India Meridionali in totam propè Europam quæstu maximo conuehitur, odoratum, grauitate insigni commendabile, astringens, amarum, cholagogum magis, colore cum manditur planè croceo. Quod siue idem sit genere cum Pontico, siue omnino diuersum, aliis disquirendum relinquo, quibus plus est cui & facultatis: cum præsertim etiam celebres hodie Medici in ea controuersia sibi non consentiant, & nunc idem, nunc diuersum assument. Manardus namque in Epistolis nunc idem, nunc diuersum censet. Mesues & Serapio suo Rhabarbaro tribuunt omnia, quæ Dioscor. & Gal. Rheo. Mihi satis fuit admonere in locum Pontici iam propè desiti Indicum viribus proximum, & ubique copiosum potius esse sufficiens: tantò tamen parcius quanto efficacius, &c.

Eadem serè tradit Tagaultius quæ Syluius, Rhabarbarum, inquit, seu Rheon barbaricum vulgare, & quo hodie passim ad subducendam alui nobilium præsertim & delicatiorum, Medici videntur radix est preciosissima, & ad multiplices medelarum vius proficiens: Pænis & Arabicæ familiaris Scriptoribus, & passim nunc in Officinis Raues Sceni & Rheubarbarum vocatur. Verùm ætate P. Aginetæ qui longè post Dioscoridem, Galenum, & Plinium vixit, Rheon barbaricum appellari cæpit, quod ex Barbarorum regionibus deportaretur. Ideoque Raues Sceni Arabes dixerunt, quod ex Scenitarum agro deportaretur. Vnde Græca posteritas Rheo Sceniticum vocauit quod apud Scenitas Arabes legatur. Quare & Arabicum iure dici posset. Auetrois Cordubent. Rheo hoc barbaricum inter cætera purgantia medicamina ponit præcellentissimum. Quem secutus Mesue, ubi medica pharmaca solutoria quæ bene dicta vocat recenset, eius honorificam mentionem facit. Non idem esse putatur multis Veterum Rhaponticum & vulgare nostrum Rheubarbarum. Hoc enim: Ex meridionalibus regionibus ad nos deferretur, non autem ab Aquilonaribus ut Veterum Rhabarbarum. 2. Nigrum non est, sed potius flauum, neque vllam, cum Costo nigro similitudinem habet, ut Rhachoma Plinii. 3. Vehementem habet odorem. 4. Quod grauius est melius, Mesue, & nostris Seplasiarius omnibus ac Medicis. 5. Plurimum valet purgando. 6. Tempore Pauli Aginetæ [qui inter Veteres non connumeratur] cepit innotescere mundo, medicis quante illum fuerunt planè incognitum.

Tom. II.

Rheum hoc, Rha Recentiorum Fuchsius appellare placuit, quia Veteribus Græcis Dioscoridi, Galeno, & Theophrasto, atque inter Arabes Serapioni & Auicennæ etiam incognitum fuit: Recentioribus autem Græcis, Paulo nimirum, Actuatio, & Nicolao, quibus simpliciter *ρῆον* appellatur, celebratum. Eius duo faciunt fastigia. Vnum *ρῆον βαρβαρικόν*, hoc est, Rheum barbaricum, quod ex Barbaria vocata deportetur, illis dicitur. Alterum *ρῆον Ἰνδικόν*, hoc est, Rheum Indicum, propterea quod ex India, aut locis Indiæ proximis, nempe Scenitis populis, ut autor est Stephanus de viribus Persidis, affertur, vnde Sceniticum etiam à quibusdam nominatur. Vtriusque Nicolaus in Drosato septuagesimo meminit, & quidem separatim, ut hinc diuersa esse inter se liquet. Mesue tria facit Rhei genera, vnum Indicum quod Raues Sceni appellat, omnium præstantissimum. Alterum Barbarum generis nomine vocat. Tertium Turcicum omnium ignauissimum. Id quo hodie passim ad subducendam nobilium & delicatiorum alui medici vtuntur ex meridionalibus regionibus, præsertim ex eius parte, quæ Barbaria hodie nominatur, ad nos deferretur, ideoque rectè Barbaricum appellatur. Hinc superioribus annis, quum Tunilam, vel ut nunc vocant Tunetum, Carolus Imperator expugnasset, milites eius magnam copiam secum in Germaniam attulerunt. Regio itaque vnde affertatur, satis indicat à Veterum Rheo esse diuersum, utpote quod ab aquilonaribus regionibus delatum fuit. Accedit quod nigrum non sit, sed potius flauum: vehementer quoque odoratum est, ac graue, & quod grauius est èd melius. Plinius denique &c. Mercatores, addit, ex Alepo & Syria, aiunt Rhaponticum non differre à Rhabarbaro: sed eandem esse radicem: Rhaponticum plantant esse iuuenem, ideo nullo præditam odore, nec ita efficaciter propterea purgare, ut faciunt altæ radices, quæ ad veram peruenire perfectionem: ac ubi vnà colligitur ibid. & aliud.

Rheon Veterum & Recentiorum Rhabarbarum diuersa esse etiam statuit Manardus in Epist. Rheon, inquit, scribunt Plinius & Dioscorides radicem esse absque odore, Costo nigro similem: cum id quod in usu est cum Costo nigro nullam similitudinem gerat, magnumque longè odorem nec insuauem iacter. Præterea Rheon barbarum à nostris vocatum ex Meridionalibus regionibus ad nos affertur, non Aquilonaribus, ubi Bosporus, Rha fluius, & Stagna Mæotica &c.

Contrariam verò sententiam amplectitur Anguil. Quod ad me attinet, ait, credo verè Rhabarbarum non esse plantam diuersam à Rheopontico: quandoquidem videntur multæ plantæ, quæ iuuenes differentes radices habent ab iis quæ ad perfectionem perueniunt, id quod existimo in hac planta fieri, ac id quanto magis videmus nec figurâ, nec substantiâ, nec colore diuersam Rhapontici radicem à Rhabarbari. Quod Rhabarbarum purget & non Rhaponticum euenire potest ratione imperfectionis, ut iam dictum de radice. Quod odorem non habeat, in causa est iuuentus, ut apparet in verâ Aristolochia longa, quæ odoratissima est, dum autem iuuenis est, nullum planè odorem habet. Eadem ætas efficit ut gustu non sit amara, non arida, non densa: sed rara & leuis: iuueniuntur enim multæ radices, quibus idem euenit. Id expertus sum in radicibus, quibus vscimus, ita ut in eadem specie iuuenis multum à matura differret, qui ignorasset, existimasset aliud esse. Huius etiam opinionis

Xxxx

fuit Mesues Rhaponticum & Rhabarbarum eandem esse rem, cum Rhaponticum vocat Rhauet Turcicum, dicens, debilius reliquis omnibus prænominatis. Itaque si Mesues existimat Rhaponticum esse Rhauet Turcicum, & iungat cum Rhabarbaro: erit iuxta meam opinionem Rheubarbarum, sed imperfectum comparatione facta cum reliquis Rhabarbaris. Quandoquidem si fuissent species differentes, duo fecisset capita, non sub vno complexus fuisset. Sed cum sciret eandem speciem non distinxisset, nisi bonitate minore. Quod ad eos attinet qui dicunt nasci circa fluuium Rha, dico falsum esse, quandoquidem in locis non nascitur Rheubarbarum: sed Lappathi species, quæ ibi abundat, quæ ad nos adfertur, cum autem nescio quid simile habeat cum Rhabarbaro, vocatur eius radix Rhabarbarum monachorum & Rheon, ut etiam affirmat Iohannes Tzetze Hesiodi commentator, quem deinde nostri sequuti sunt. Si verum esset ibi nasci, maior eius copia Constantinopoli videretur, quam videatur: ubi minus quam alio in loco videtur. Clima posse efficere, cur Rheuponticum, hoc est Rhabarbarum non soluat, & inodorum sit, credi posset, cum multa sint nobis exempla, ut in Persia, quæ ex Persia ubi venenata est in Egyptum translata, sub eo climata venenum amittit, ac cibis idoneus. Galenus loquens de vino dicit vitem Pergamo translata ad vnum stadium qualitatem manifestè mutare. His igitur de causis non dicemus Rhaponticum plantam diuersam esse a Rheubarbaro. Sed hoc illo perfectius & maturius esse: Quæ Anguillæ sententia nobis non parum attidet.

Sequentia, quæ ex Bellonio, Garcia & Acoſta ſubſcribentur, natales maximè concernunt. Maxima igitur pars Rhabarbari, ut ſcribit Bellonius, quod in Europam deſertur, emittitur in Halepo, ubi interdum ſimul 12. camelis onuſti Rhabarbaro conſpiciuntur, id deferentes ex Aſamia ubi diligenter colitur: neminem reperimus qui plantam viderit Rhabarbari, cuius vires copioſe deſcripſit Meſues, qui non meminit Rhapontici, quod exiſtimauere Græci: ipſe qui morabatur Damasci aut Halepi dicit ſuo ſeculo Rhabarbarum delatum fuiſſe ex India & ſeni, id eſt Aſamia aut Aſſyria, & tertio ex Barbania, quarto ex Turckia: dicit præterea indigenas maceraſſe &c. fieri poſſe ut Meſues tempore id fecerint: nunc autem quum magnum videant ex Rhabarbaro emolumentum, tanta diligentia excolunt, ut abundet: cum eſſemus Halepi venundabant decem libras pro duodecim ducatis: &c. ut verum fateamur Rhaponticum valdè ſimile eſt Rhabarbaro, non tamen idem dicimus, manuſcriptum tamen vtriuſque facultates valdè ſimiles. Mirum quod ſcribit Bellonius, plantam neminem viſiſſe & coli in Meſopotamia ſemine ſatam. Annon quodlibet ſemen terre commiſſum radicem proferens, plantam quoque producit?

Omne id Rhabarbarum addit Garcia, quod in Indiam, Perſiam, & Europam importatur, in Chinatum regione naſcitur: vnde per Tartariam Ormuz & Alepam deſertur, inde & Alexandriam, & tandem Venetas, vnde reliqua Europæ regna petunt. Nos præter id quod nauigiis ex China inferunt, eo etiam vtimur quod Perſæ Ormuz aduehant, quod nimis tædinem & cariem ſentit: Nam Rhabarbarum ſub menſem Maium in Indiæ maſſima illatum niſi ante Septembrem abſumatur, planè inutile eſt, & in mare abiiciendum: corruptum enim ut pleraque alia aromata habent

illis menſibus (1) noſtro auctori ſunt alio quodam loco Iunius, Iulius, Aſguſtus) interea aliud præſtantius & recentius ex Ormuz importatur, cuius uſus. In montanis verdè hieme adſeruati alia eſt ratio, putredini enim non eſt adeo obnoxium. Eam ob cauſam qui illud in India conſeruare vult, in Diſnager aut Balagate perferri curat. Reſerunt genus quoddam naſci in certa Tartariæ vrbe nomine Samarcandar: ſed quod improbum ſit, nec niſi iumentorum purgationibus vtile. Nullum autem eſt Rhabarbaricum, aut Indicum: ſed ſolummodò Chinenſe, quod Rham Chini Perſæ appellant, Mauritani tamen plerique ſolummodò Rham. Aliquando in Couchin intellexit Rhabarbarum ab indigenis interdum decoqui aut deſtillari, & eius decocto aut ſullatitiâ aquâ ſeſe purgare, eamque eſſe cauſam cur interdum tam facile tædinem ſentiat & corrumpatur. Sed cum neminem audierim, qui, an hæc ita ſeſe haberent, ſe viſiſſe diceret, affirmare non aſſum.

Rhabarbarum, pergit Acoſta, in interiora Chinatum regione duntaxat prouenit, vnde in urbem Cantam [ſilius Prouinciæ portum & emporium, ubi Luſitani habitant] exportatur & inde nauibus in Indiam aduehitur. Aliam viâ ex eadem Prouincia camelis deferunt per Tartariam, quod non adeo carioſum &c. Quod verdè nonnulli ſcribunt eius regionis incolæ Rhabarbarum macerare &c. fabula eſt, quam inde originem ſumpſiſſe arbitror, quod nonnulli gentiles mercatores Rhabarbaro ſungoſiori & vetuſtiori [ut ſcilicet a corruptione liberent] aquam tepidam adfundant, deinde lineis pannis emundatum bacillis aut filo trahant ut exſiccet, & nonnulla foramina pipens tenuiſſimè triti polline & cera obturent: deinde probè ſiccant in Plylli ſemine adſeruent. Hæc mihi retulit Mercator Canariſus.

Reubarbarum mittit China, regio ultra Calcut: montes Singui ciuitas, & Prouinciæ Suochur magno Cham obiecta. Sed in Chorazami regione Perſidis inprimis mira eſt eius copia, id eſt coniectura ſe adſequutum ſcribit Ludouicus Romanus nauig. quod ſenæ Rheubarbari libra noſtro more pondo vnciarum duodecim ſingulo aureo veniebant.

Plurimum putgat Rhabarbarum, ut teſtis eſt apud Fuchſium, Aſtuarius, flux bilis impetus, poſſiſſimum Indicum, potenter donat, idèque verè cholagogum exiſtit. Quare Meſues ſententiam falſam eſſe oportet, qui Rheon hoc planè innoxium eſſe, ac tui dum pueris, tum prægnantibus dari poſſe licetis mandauit. Nam ut quodiana multorum experientia comprobatum eſt, & idipſum tum Græci poſteriores, tum alii Medici teſtantur, humores in venis bilioſos attrahit & educit, id quod ſine grauiore agitatione fieri non poſteſt. Quia vtrique agitationem grauidis periculoſam ſemper, viſiſſe autem interdum moleſtam eſſe abundè conſtat. Non igitur rectè faciunt noſtri temporis Medici, cum imbecillioribus & grauidis idipſum exhibent. Nam & ipſe noui Medicum cui non ſatis ſeſcitè ceſſit Rhei in muliere quadam teneriore exhibitio. Atque tum magis purgando ledere ſolet, quum maceratum exhibetur. Nam quum macerando eius ſubſtantia calida & purgatrix, quod Meſues etiam fateatur, in liquorem in quo maceratum eſt tranſferatur, tædèa verdè & aſtringens, adenque roborans, & purgandi vires nonnihil frangens in Rheo remanent, neceſſe eſt ut tum validius pur-

Rhaponticum
species.

Rhabarbarum
monachorum

Locus

Wend pl
Sens vides.

Vnde Rha-
barbarum:
deſertur.

Tempus.

Nullum
ſim eade
barbari
Indicum
Chinenſe.

Vari & v
ſus
Bilem pur
gat.
Meſues ſen
tatur

Gravidis
non aſſum.

Medici

Prægnant
bus præſta
re dant
itaque

get, quàm si integrum exhiberetur. Præstaret itaque imbecillioribus & delicatioribus integrum exhibere Rheum, quàm eius dilutum. Nam hoc modo illi adesset, quod vehementiam eius frangeret, adstrictio scilicet minorum ipsa. Hinc est, quod Auerthoes Rheum barbarum alius purgantibus medicamentis præfert, ut quod infranans eius vehementiam secum habeat, cæteris ferè omnibus eo destitutis. Prægnantibus tamen & pueris præstat Cassiam & Mannam propinare, quæ maiori facilitate, citraque omnem noxam aluum subducere possunt, quàm Rhabarbarum. Si enim omni caret vitio & noxa, ut Mesue & Iuniores Medici affirmant, cur in eius sumptione infranantia, aut ut ipsi loquuntur corrigentia, illi esse adicienda docent: nempe spicam, mastichen, Cinnamomum, & luncum odoratum.

Cæterum quum purgandi facultate præditum sit Rheum Recentiorum: reprehensione non vacat, quod illud hodie plerique dysenteria laborantibus exhibent. Erroris autem occasio nulla alia fuit, nisi *peruersa imitatio*. Quum enim viderent Veteres, tum Græcos, tum etiam Arabes, in dysenteria crebro fuisse vlos Rheo Pontico, voluerunt se ipsi Rhabarbaro, quod idem esse putauerunt, in eodem malo uti. Quod si verò eius quod nunc vocant Rheum Ponticum radice pro Veterum Rheo vli fuissent: omnem reprehensionem effugere potuissent, quod eius, ut ostendimus, legitimum sit succedaneum. Nam ut Veteres suum Rheum in dysenteria & vulneribus sanandis esse efficax experti sunt, ita etiam Centauri radix, quam Officina Rhaponticum nominant, miram in iis malis vim obtinet.

Potro Rheum hoc Recentiorum datur ex lactis fero vel decocto Intybi sativi latifolii. Maceratur quoque in iisdem liquoribus, aut in stillatione Intybi iam dicti liquore, idqueestate potissimum: aut vino albo & odorato, & id quidem hyeme. Propinatur per se tritum pondere drachmæ vnius cum dimidia [si uita eius substantia alia addit Aug. Ferr.] Mesue ausus est addrachmas quatuor progredi, quæ satis multa est quantitas. Dilutum seu infusum vnius, duarum, vel trium, aut quatuor [si purgans aliud addatur] drachmarum pondere sumitur. Hoc castigazione non eget, ut Aug. Ferrerius de vera M. M. de castig. præit. Med. docet, sed Spica Nardi, Schoenanthos, Cinnamomo, vigotani creditur.

Improbat idem præterea & merito præsertim in dysenteria torrefactum Rhabarbarum. Quam enim morbus requirit, naturalem & efficacem habet adstrictionem, & exsiccationem vi purgatricis coniunctam. Præterea in torrendo, si modum exarseris, non solum remittes medicamentum, verum etiam purgatoris facultate penitus destitues. Cumque portò modum attingeris, vix efficies, quin medicamentum vitione scrimoniæ [propter quam & tenuitatem in alui fluxu Veteres purgantia non adhibebant, quod & intestina roderent, & novam materiam ad locum affectum traherent] acquirat, præsertim in partibus exterioribus, internis vix ignem sentientibus.

Rhabarbari vsum in prægnantibus cum Mesueo probo consideratis considerandis, ut qui multas sollicite sine ulla damno purgarim: infusionem præfero substantiæ, quod enim citius sine violentia medicamentum purgans euacuat ed mihi gratius, illud Præceptorem Rondeletium secutus, non laudo correctionem purgantium

per adstringentia.

Non approbo eorum morem qui in dysenteria à principio astringentia exhibent, si augent morbum dum per ea retinent educenda, nempe acres malignos & putridos humores: quod natura vergit ed ducere oportet, si per convenientia fiat loca: si igitur statim à principio educantur, convenientibus purgantibus subleuantur citò, & postea tunc astringentibus ut licet. Inter medicamenta purgantia magni facio Rhabarb. multifolium experientia edoctus, nolim tamen asserere an torrefere Rhabarb. sit calidius tostura redere.

Quia autem Rheum calidum & siccum hepatis calidioris mors est, nisi refrigerantibus temperetur: Ided illius extractum quod Spagyrici cum aqua vitæ parant calorem noui caloris accessione adaugentes, non magni facio. Si quid laudandum in eo, est quod in pilulis possit commodè exhiberi, & fortè etiam melius conseruari & circumferri.

Appendix ad caput ultimum lib. XXIV.

VERBESINA, SIVE CANABINA AQUATICA, flore minus pulchro, elationis ac magis frequens.

Verbesina altera elatior, & crebrior priore, amplior etiam, extra aquas nasci solita, caules plerumque cubito maiores tollit, rarius minores, rubentes, hirsutos, solidos: folia ad articulos bina aduersa, tripartita, Cannabinorum vel potius Pseudoepatorii æmula, profundè serrata, pilosa, subinde per ramos quoque nullo modo laciniata: ceterum ex foliorum sinu proflunt ramuli, quorum extremis flores insident lutei, multi, squammas striatis purpurantibus in ambitu, pulchritudine multum sequenti cedentes. Semen longum, latum, in duos stilos asperos desinit, qui vestibis adherent: totum verò florem obvallant folia, iis quæ in summis conspiciuntur ramulis suppositis, radiatum disposita: radices fibrosæ, inutiles.

Trago Verbesina, sive supina dicitur, Verbesinaque supina Dioscorides esse ab illo statuitur licet, ut ipsemet fatetur, Verbesina supina Dioscoridis ipsi perspecta ac cognita non sit. Nec placet ipsum adscribere nomenclationes spurias Verbenæ supinæ Dioscoridis, siquidem ea non sit.

Dodon. gall. p. 46. Pseudohepatorium semina: Gall. Eupatoire femelle bastard, Belg. Boelfens cruyt myssen, Eupatorium Auicennæ existimatur, idè quod à quibusdam Eupator Auicennæ appellatum. Lat. in sol. Hepatorium aquaticum, ad Hepatorium vulgare & adulterinum referendum, quod & Terzola dicitur, qua de causa etiam Terzola aquaticum dici potest. Descriptio à Dodonæo posita sicuti & figura videntur demonstrare quod Verbesinam de qua agimus, id tamen asserere non auctim: in postremis nomen Belgicum huic non amplius tribuit, sed Eupatorio Offinarum.

Thalio Pseudo-Hepatorium alterum seu femina. H. Lugd. pag. 1039. Hydropiper, Pseudoepatorium semina Dodonæi [Gall.] Chrysanthemum aquaticum quorundam. C. Bauh. Phyt. p. 641. Cannabina aquatica 2. sive folio tripartito diuiso. Verbesina supina vel 3. Trago. Pseudohepatorium Dod. Huius folia communiter in tres partes, aliquando quinque, sex diuiduntur.

Preser sibi contrarius

Rheum recentiorum non dandum dysenterici

Dosis in subg.

Rhabarb. torref. non probatur

Descriptio

Verbesina supina Trago

Pseudohepatorium semina

Eupatorium

Terzola

Dod. us.

Hydropiper

Cannab. aquat.

quar. fol.

tripartita

Casalp. lib. 12. cap. 17. Quadam in aquis serē nascens, Eupatorio breuior, ramosa: foliis tripartito diuisis, capitulis in cacuminibus paucis, stellatis, flore luteo: seminibus valde compressis, oblongis, in duos aculeos desinentibus, vnde *Bidens* vocetur.

C. Schvvenckf. Eupatorium Conyzoides primum Conyza aquatica maxima serratifolia, Eupatorium Cannabinum semina Septentrionalium stellato & odoro flore, Lobelio. *Nobis* non vna planta sed tres distincte. Prima quidem Verbesina præsens est: altera, Lingua aut maior Dalechampi terra, Verbesina pulchriore flore luteo. *Schvvenckf.* confundit omnia.

Loci & tempus Loci humidis, palustribus & fossis provenit circa oppida & pagos. Hepatorium aquaticum Dodonzi, in riguis gignitur, quæ raro & non nisi siccissimis ac seruentissimis temporibus, aquis carent, prodit verò & intra fluminum quorundam late patentes alueos: quod altius crescit & flores profert, orbiculato ambitu, multis exiguis luteis foliis stipatos, Bupthalmi æmulos. Non morò autem in Belgio, sed & in Germania, ac Bohemia reperitur: nec destituuntur eo humida Britannia loca. Plurima æstatis parte floret ac viget, semēque perficit.

Vires & virtus Verbenaca supina serpentes, itaque venenosa animalia pellit, veluti & Conyza. Potest etiam depascentibus, ac longè lateque serpentibus viceribus adhiberi, auctore Trago. Terzola aquatica Dodonzi amara herba est, proinde calida & sicca, vsum tamen in medicina habere ignoratur, nisi sternutamenta ciet.

VERBESINA PULCHRIORE FLORE LUTEO.



Descriptio Verbesina pulchriore flore mihi dicta, fibris radicatur mulus, albis, tum ab imo caule, tum ab eius gemculis demissis, sapore aromatico: caules cubitales, & maiores, aliis minores, teretes, subhirsuti, & non nihil subinde rubentes: folia ad nodos bina aduersa, quatuor aut quinque vncias longa, vnam latam, acuta, serrata tantummodò, non in lacinias diuisa, superficie utrinque lœui, sapore acrisculo: ex foliorum alis duo ramuli diuersi exeunt, quorum alter altero

minor esse solet. Flores multò pulchriores quàm in Verbesina elatiore, quorum extrema folia ex luteo viridantia struis nigricantibus picta, his proxima atreo fulgore nitent, magna, in orbem acta: medium occupant alternatim remissi floriculi luteoli quinquepartiti, apiculos nigros exserentes, lquidammodò striatæ, eximie quidem similes sed suppare: *semē* oblongum, compressum, fuscum, brevissimis seu aristis asperiusculis capiti adnatis ad vestes adhæret.

Verbesina [aliàs Forbesina] Italica dicta, videtur Gesn. hort. in append. planta floribus Indici vulgò dictis cognata.

Lob. Adn. pag. 127. Semina Canabina Septentrionalium stellato & odoro flore. *Icon. plant. 529.* Eupatorium Cannabinum semina Septentrionalium stellato & odorato flore. *Nirar* in figura Lobelium flores pulchrè radiatos non demonstrare, quasi non notit discrimen inter Cannabinam minùs specioso flore, & eam quæ pulchriorem habet florem. Folia nonnihil respondent ei de qua hoc capite agitur.

Hist. Lugd. lib. 9. cap. 27. videtur pingere pro Hydropipere altero Dalechampi: quanquam non placeant figuræ: conuenit nomen Chrysanthemi aquatici, non tamen figura Dodonzi sub titulo Hydropiperis Pseudo-eupatorii semine Dodonzi: licet quædam respondeant, non tamen omnia.

Casalp. lib. 12. cap. 17. Bidens folio non dissecto.

Tabern. Icon. & Hist. Eupatorium Cannabinum Chrysanthemum wasserwundkraut / fungundkraut wable, wasser sternkraut / Geel seberskraut Belg. Boelsens cruys wyssen. Eupatorium cannabinum semina, Vinga aurea aquatica, Stellaria aquatica, Consolida aquatica, Vercelleri. Italice Terzola, quia utilis ad teruanas. Non est Terzola Baptista Sardi, cui flos exruleus, idem vocamus Terzollam luteam, hoc est; Terzonariam luteam. Tabern. tribuit huic plantæ nomina Belgica, de quibus sibi non constat Dodon.

C. Bauh. phyt. Cannabina aquatica 3. siue folio non diuiso.

Schvvenckfeld. Eupatorium Conyzoides secundum; Eupatorii Cannabini 2. species, Hydropiper 1. Lugd.


Semper obseruari in aquosis locis, ubi aqua fluit vel residet, ut in diuione Phirenli, propè *Haur monsier*. Montbelgardi circa urbem florent Augustò. In lacunis & fossarum stagnantibus aquis quæ itur Octlingen propè Basileam reperiuntur. Borealibus magis & ipsis in vdis aut mediis riuulis cunctanter fluentibus viuunt. In Anglia vbiq; videri præsertim Londini & Auxonia; Lobel.

Vulneribus, inter sumpta præsertim plurimum confert, & eadem superior potius est: Tribuit, huic Lobelius facultates Pseudo-eupatorii vulgaris: siue Eupatorii Officinarum, ne Lectores fallantur prius inuestigent quàm vrantur, de qua Canabina hic loquantur, an de ea quæ pulchrum florem habet, an de ea quæ minùs pulchrum, & quæ elauor est.



ENIGMATON.

OMNIVM PRAECIPVORVM CAPITVM
QVÆ IN SECVNDO VNIVERSALIS HISTORIÆ
PLANTARVM TOMO CONTINENTVR
INDEX.

A			
	<i>Bism foliis trifolijs</i>	pag. 361.	<i>Alcea arborescens glabra</i> <i>ibid.</i>
	<i>Abutilon Indicum</i>	359.	<i>Alcea Pentaphylli folio vel canabina</i> 358.
	<i>Accium</i>	95.	<i>Althea Theoph. flore luteo, quibusdam Abubilon</i> <i>ibid.</i>
	<i>Achanaca Indorum</i>	835.	<i>Amaranthus purpureus</i> 968.
	<i>Aconitum Lycollonum Dodonæ</i>	901.	<i>Amaranthus Pannicula speciosa cristata</i> 969.
	<i>Acerus veteribus</i>	754.	<i>Amomum in genere</i> 191.
	<i>Egilops quibusdam aristis recurvis</i>	431.	<i>Amomum quorundam odore Cariophylli</i> 194.
	<i>Egilops Veteribus & in genere</i>	434.	<i>Amomum nostrum ex ipso fructu</i> <i>ibid.</i>
	<i>Egilops Bromoides</i>	436.	<i>Amomum Clusij</i> <i>ibid.</i>
	<i>Egilops Matthioli fortis</i>	439.	<i>Amomum novum Cardamomi vulgaris facie, sine Indi-</i>
	<i>Agas</i>	791.	<i>cuius Racemus</i> 191.
	<i>Agrimonia seu Eupatorium</i>	398.	<i>Amomum verum quorundam</i> 208.
	<i>Allium vulgare & sativum</i>	554.	<i>Anemio sine Pseudamomum</i> <i>ibid.</i>
	<i>Alli genus, ophioscorodon dictum quibusdam</i>	559.	<i>Anacardaceum Phascolus totus ruber</i> 265.
	<i>Allium sine Moly montanum latifolium</i>	<i>ibid.</i>	<i>Anonis sine testa bonis, vulgaris, & alba, spinosa</i> 391.
	<i>Allium bicorne, proliferum flore inus albescente, cum</i>	560.	<i>Anonis lutea non spinosa, Dalechampia Natrice.</i> 393.
	<i>stria purpurascens externe</i>	561.	<i>Anonis non spinosa purpureo flore</i> <i>ibid.</i>
	<i>Allium sylvest. bicorne flore viridi</i>	<i>ibid.</i>	<i>Anoblasum Cordi, sine Aphyllon</i> 783.
	<i>Allium sylvest. bicorne purpureum proliferum</i>	<i>ibid.</i>	<i>Anihyllis prima quibusdam.</i> 331.
	<i>Allium sylvest. Montepellulanum albinum Io. B.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Apocynon Veteribus</i> 131.
	<i>Allium flore luteo sine pallido</i>	561.	<i>Apocynum sine Periploca scandens, folio longo, flore pur-</i>
	<i>Allium quoddam sylvestre flore purpureo</i>	562.	<i>purante</i> <i>ibid.</i>
	<i>Allium Spherocephalum purpureum sylvestre</i>	<i>ibid.</i>	<i>Apocyno affinis Secamone flore albo</i> 134.
	<i>Allium Spherocephalum bisfolium Italicum</i>	563.	<i>Apocynum folio rotundiore flore ex albo palliescente</i> <i>ibid.</i>
	<i>Alli genus forte Scorodoprasson alterum Lobelio</i>	564.	<i>Apocynum latifolium amplexicante</i> 135.
	<i>Allium Petraum umbelliferum</i>	<i>ibid.</i>	<i>Apocyni fructus</i> 140.
	<i>Allium umbelliferum pratense</i>	564.	<i>Aphyllon Indicum</i> 211.
	<i>Allium sylvestre propusill. uncinatum moschatum</i>	565.	<i>Aphace in genere</i> 310.
	<i>Alisma Montepellensium sine Doria</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aphaca olim veteribus</i> 1035.
	<i>Alisma sine Damasomum Veteribus</i>	1064.	<i>Aqua vita</i> 94.
	<i>Allis affinis pseudoorchis Monophyllos</i>	<i>ibid.</i>	<i>Arbor Angelina</i> 173.
	<i>Allium vrsinum bisfolium vernum sylvaticum</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aracis subacens</i> 296.
	<i>Allium alpinum</i>	566.	<i>Aracis subacens serratus</i> 297.
	<i>Alopecuros Alpinus</i>	809.	<i>Aracis veteribus</i> 312.
	<i>Alcena nodosa Dalechampi</i>	851.	<i>Arachidna Veteribus</i> 313.
	<i>Alliaria</i>	883.	<i>Arachidna, aut potius Aracoides Honori Belli</i> <i>ibid.</i>
	<i>Alyssum Veteribus & in genere</i>	913.	<i>Araci, vel Apios leguminosa species Carolo Tossano</i> 326.
	<i>Alysson siliqua lata aspera, quibusdam Lunaria flore</i>	914.	<i>Arbor Trifolia Indica</i> 369.
	<i>luteo</i>	<i>ibid.</i>	<i>Arundines ex Veterib.</i> 491.
	<i>Alysson Anguillara</i>	945.	<i>Arundo vulgaris palustris</i> 485.
	<i>Anil sine Nil Indorum</i>	953.	<i>Arundo maxima & hortensis</i> 486.
	<i>Alcea Veteribus</i>	<i>ibid.</i>	<i>Arundo Papyrus quibusdam</i> <i>ibid.</i>
	<i>Alcea vulgaris</i>	<i>ibid.</i>	<i>Arundo Anglica C. Bauh.</i> 487.
	<i>Althea sine Bismalna</i>	954.	<i>Arundo scriptoria</i> <i>ibid.</i>
	<i>Althea profunde serrato sine dentato folio</i>	955.	<i>Arundinis scriptoria Indica genus spadiceo colore</i> <i>ibid.</i>
	<i>Althea flore grandi Alcea Thuringiaca</i>	<i>ibid.</i>	<i>Arundo Nastos seu farcta toxica figurata</i> <i>ibid.</i>
	<i>Althea species vulg. similis</i>	<i>ibid.</i>	<i>Arundo nastos seu farcta sine Toxica gracilis</i> 488.
	<i>Althea arborescens</i>	956.	<i>Arundo humilis, rara ac insuavis</i> 489.
	<i>Althea fida dicta quibusdam</i>	957.	<i>Arundo Indica versicolor</i> <i>ibid.</i>
			<i>Arundo Indica versicolor flexilis</i> <i>ibid.</i>

INDEX.

<i>Arundo Indica punicea mollis</i>	ibid.	<i>Bambusa affinis Ligname seu Lnhame</i>	791.
<i>Arundo Indica fluitans</i>	ibid.	<i>Barbarea</i>	868.
<i>Arundo Indica latifolia</i>	ibid.	<i>Barbarea muralis</i> Job. Bauhini	869.
<i>Arundo Indica latifolia flore luteo punctato</i>	490.	<i>Balsamina summa Persicifolia, vel Salicifolia</i>	909.
<i>Arundo Saccharina, & Saccharum</i>	931.	<i>Bamia</i>	959.
<i>Arum</i>	783.	<i>Bamia aliquatenus affinis Sabdariffa</i>	960.
<i>Arum Bizantinum</i>	785.	<i>Baccharis veteribus</i>	1048.
<i>Arisarum latifolium quibusdam</i>	786.	<i>Beidelfar Alpini sine Aposynum Syriacum</i>	136.
<i>Arisarum angustifolium</i>	787.	<i>Bexucco del Peru.</i>	151.
<i>Asclepias Veteribus</i>	138.	<i>Bera sine cerevisia</i>	415.
<i>Asclepias sine vincetoxicum multum, floribus abicantibus</i>	ibid.	<i>Belusium Egyptia Honorio Bello</i>	960.
<i>Asclepias flore nigra</i>	140.	<i>Beta</i>	ibid.
<i>Asclepias Cretica Clusij</i>	ibid.	<i>Beta Cretica semine spinoso</i>	963.
<i>Asclepias Indica</i>	ibid.	<i>Beta latifolia monstrosa</i>	ibid.
<i>Astragalus quibusdam</i>	316.	<i>Bonni Henricus</i>	965.
<i>Astragalus Veteribus</i>	332.	<i>Bodaglam fructus exotici Paludani</i>	188.
<i>Astragalus Romanus</i>	333.	<i>Bulbus Esulentum Veteribus</i>	569.
<i>Astragalus Maritimi</i>	333.	<i>Bulbus vomitorius veteribus</i>	570.
<i>Astragalus maior Fuchsi</i>	334.	<i>Bulbocodium vulgatum</i>	591.
<i>Astragaleides, sine Astragalus sylvaticum, Astragalo Fuchsi affinis plantis</i>	ibid.	<i>Bulbocodium Hispanicum</i>	594.
<i>Astragalus recticaulis hirsuta</i>	ibid.	<i>Bulbocodium flore pleno</i>	ibid.
<i>Astragalus Monspessulani</i>	318.	<i>Bulbocodij pleno flore speciosum genus Venerij</i>	595.
<i>Astragalus quidam Montanus</i>	319.	<i>Bulbocodij sine narcissi floribus luteis multiplici varietate</i>	ibid.
<i>Astragalus Monspessulano candidior & Onobrichis quorundam</i>	ibid.	<i>Bulbocodium minus</i>	596.
<i>Astragalus Syriacus</i>	340.	<i>Bulbocodium minimum coronatum</i>	ibid.
<i>Astragalus forte lanuginosus Baccius</i>	ibid.	<i>Bulbocodium tenuifolium flore luteo</i>	ibid.
<i>Astragalus Dioscorid. quibusdam</i>	340.	<i>Bulbocodium Tenuifolium aliud flore luteo fimbriato</i>	ibid.
<i>Asphodelus maior</i>	625.	<i>Bulbocodis forte affinis bulbus flore luteo</i>	598.
<i>Asphodelus bulbosus Dodon.</i>	627.	<i>Bulbocodis forte affinis bulbus alius flore luteo</i>	598.
<i>Asphodelus minor folio fistuloso</i>	631.	<i>Bulbocodium minimum tenuifolium album</i>	ibid.
<i>Asphodelus minimus albus</i>	632.	<i>Bulbus Eriophorum</i>	211.
<i>Asphodelus luteus</i>	ibid.	<i>Bulbus Monophyllos flore albo, an Bo. Cyn Theoph.</i>	611.
<i>Asphodelus minor radice lutea</i>	633.	<i>Bulbus sylvaticus Fuchsi flore luteo, sine Ornithogalum luteum</i>	593.
<i>Aster ex veteribus</i>	1042.	<i>Bursa pastoria, sine Pilefella filiquosa</i>	870.
<i>Aster Atticus purpureus & albo flore</i>	1044.	<i>Bursa pastoria</i>	916.
<i>Aster Atticus Monspessulensis purpureus angustioribus folijs</i>	1045.	<i>Bursa pastoria parva</i>	917.
<i>Aster Atticus luteus, supinus, spinosus</i>	ibid.	<i>Bursa pastoria minima, oblongis filiquis, verna, loculo oblongo</i>	ibid.
<i>Aster purpureus Montanus</i>	ibid.	<i>Bursa pastoria folijs perfoliata</i>	918.
<i>Aster Montanus flore magno hirsutus, quibusdam Occidentis Christi</i>	1046.	<i>Bursa pastoria sublongo loculo affinis pulchra plantis</i>	ibid.
<i>Aster angustifolius luteus</i>	ibid.	<i>Blitum in genere</i>	965.
<i>Aster ternus Pannonicus Clusij luteus folio hirsuto Salicis</i>	ibid.	<i>Blitum pulchrum vel luteum magnum rubrum</i>	966.
<i>Asteri Montana Purpureo similis vel Globularia</i>	ibid.	<i>Blitum rubrum minus</i>	967.
<i>Achera, & xolla sine Glumen</i>	412.	<i>Blitum pulchrum magnum album</i>	ibid.
<i>Atriplex rubra & alba hortensis</i>	971.	<i>Blitum erectum, sine 3. Tragi</i>	ibid.
<i>Atriplex sylvatica</i>	972.	<i>Blitum maximum, sine Amaranthibus maior semine albo</i>	968.
<i>Atriplex angustifolia laciniata minor</i>	ibid.	<i>Bryonia alba maculata</i>	146.
<i>Atriplex sylv. folijs integris racemosa</i>	973.	<i>Bryonia seu vitis nigra baccis</i>	ibid.
<i>Atriplex vulgaris angustifolia cum folliculis</i>	ibid.	<i>Bryonia laevis sine nigra baccifera C. Bamb.</i>	149.
<i>Atriplex sylv. Monspessulana cum pulchris involucris</i>	ibid.	<i>Bryonia Mechoacanina nigricans</i>	151.
<i>Atriplex maritima</i>	974.	<i>Brassica Marina sine Soldanella</i>	166.
<i>Atriplex Halimoidis Lobelij</i>	ibid.	<i>Brassica Veteribus & in genere</i>	819.
<i>Atriplex arborescens</i>	ibid.	<i>Brassica capitata alba</i>	826.
<i>Atriplicis marina species Valerando</i>	ibid.	<i>Brassica Italica tenuissima glomerata flore albo</i>	827.
<i>Atriplex fatida</i>	ibid.	<i>Brassica Sabaudica rugosa</i>	828.
<i>Atriplex, distans pes asserinus</i>	975.	<i>Brassica rugosa longioribus folijs</i>	ibid.
<i>Atriplex distans Pes asserinus alter sine ramosior</i>	976.	<i>Brassica multiflora</i>	ibid.
<i>Auricula Maris Camerarij</i>	387.	<i>Brassica alba vulgaris</i>	829.
<i>Avena alba & nigra</i>	432.	<i>Brassica alba expansa</i>	ibid.
<i>Avena nuda</i>	431.	<i>Brassica Colopapa,</i>	ibid.
<i>Avena pilosa</i>	ibid.	<i>Brassica Monosperma Angelica</i>	830.
<i>Auricula maris Hispanica</i>	1042.	<i>Brassica siphosa</i>	ibid.
<i>Auricularia Sylvarum quibusdam</i>	800.	<i>Brassica Anglicana minima nuda</i>	ibid.
B <i>Balsamina Cucumeraria</i>	151.	<i>Brassica nigra dicta</i>	831.
<i>Bambusa</i>	792.	<i>Brassica capitata rubra</i>	ibid.
		<i>Brassica rubra vulgaris</i>	ibid.
		<i>Brassica crispata laciniata</i>	832.
		<i>Brassica</i>	

INDEX.

Brassica laciniata rubra
Brassica laciniata alba
Brassica tenuissimum laciniata
Brassica Thyrsoides
Brassica rubra minor
Brassica sylvestris
Brassica spinosa
Brassica sylvestris proceras Thalis
Brassica Congzoides

ibid.
 ibid.
 ibid.
 233.
 ibid.
 ibid.
 855.
 817.
 1047.

C

Capparis spinosa & non spinosa 63.
 Capparis officinarum Cortex ibid.
 Capparis arborescens 65.
 Capparis fabaginea sive Peplias Lucotianorum 66.
 Capparis fere similis Albani 66.
 Campanula Indica 105.
 Cacabulum quibusdam vel Alsine Baccifera 175.
 Cardamomum Veteribus & in genere. 300.
 Cardamomi equinocantones 204.
 Cardamomi genus Maximum, Grana Paradysi, sive Melegeta 204.
 Cardamomi species cum siliquis sive thecis longis & brevibus 205.
 Cardamomum maius meligetha simile, sicut modo turbinatum Cordo 207.
 Cardamomi facie fructum, triangularis malignus 208.
 Cantabrica Veterib. 159.
 Catanance in genere 308.
 Catanance leguminosa quorundam 309.
 Calamus aromaticus in genere 525.
 Calamus aromaticus verus quibusdam 528.
 Calamus aromaticus Cechini Martellini 530.
 Cape sive cepa rubra & alba rotunda ac longa 547.
 Capa Afcalonica sive fissilis 551.
 Calamus Aromaticus vulgaris multis Aiorum 714.
 Cana sine Arundo l. dica, quibusdam flos Caneri 752.
 Campanula parva, Anguillara Cantabrica 796.
 Campanula folio hederaceo, species Cantab. Anguillara 797.
 Campanula rotundifolia minima ibid.
 Campanula limifolia rara, flore ceruleo ibid.
 Campanula lychnidea 803.
 Campanula angustifolia carulea & alba ibid.
 Campanula Maior & asperior folio vrinæ 805.
 Campanula sive Cervicaria Maior & lauior flore albo magno 804. & 806.
 Campanula Alpina glabra, flore dilatissima caruleo ibid.
 Campanula sive Cervicaria Bononiensis parva flore ibid.
 Campanula repens flore minore caruleo ibid.
 Campanula sive Cervicaria Media Thalis floribus caruleis parvis 807.
 Campanula pulchra à Toffano Car. iomissa ibid.
 Campanula Serpylli folia Joh. Bauhini 816.
 (akile quibusdam, alius Eruca marina, & Raphanus marinus 867.
 Cakile sive Eruca marina latifolia 868.
 Candelina Myagrum Aldroando 894.
 Chamacistus Serpylli folio, nigricante, & hirsuto 17.
 Chamacistus angustifolius flore luteo Clusij ibid.
 Chamacistus foliis Myrsi Tarentina, canis vel cinereis 18.
 Chamamorus 62.
 Channanorus Norvegica ibid.
 Chamamorus altera Norvegica 63.
 Chamacerasus Gesners, vel chamaperichyanon quodam Alpinum 107.
 China radix 120.
 China spuria pyriformis sive turbinata 122.

China spuria Acori effigia Lobelij 123.
Chamabalanus leguminosa 314.
Chondrus & halica sine alica 411.
Chondrule veteribus 1018.
Chondrule vel Chondrilla carulea 1019.
Chondrilla lutea 1010.
Chondrilla viridescens 1011.
Chondryllis affinis quadam laciniata, an Trinitatis? ibid.
Chondrylla hirsuta rubente flore 1012.
Chondrylla Cresia nomine massa semine crispo ibid.
Chondrilla folio non dissecto, caule nudo & foliato 1041.
Chrysanth. Alpinum Iudenbergense Jacobe affine 1058.
Chrysanthemum Alpinum Etscherianum Jacobe affine ibid.
Cistus & de eo veterum sententia 1.
Cistus mas maior folio rotundiore 2.
Cistus mas 2. folio longiore ibid.
Cistus mas 3. folijs dilutius virentibus 3.
Cistus mas 4. Monsp. folio oblongo albido ibid.
Cist. mas 5. folijs crispis, & quodammodo sinuosis ibid.
Cistus foetida Monspeliensis flore albo, & Hispani a luteo 4.
Cisti species quedam Hispanica flore albo ibid.
Cistus folio Halimi flore luteo 5.
Cistus folio Halimi longiore incano ibid.
Cistus folio Lavendula Clusio foris idem cum Helianthemum vello ibid.
Cistus folio Sampsochi Clus. cui macula in flore 6.
Cistus folio Thymi Clus. cum macula in flore ibid.
Cistus Ledon latiore folio 8.
Cistus Ledon flore macula nigricante notato ibid.
Cistus Ledon, Populi nigra folijs Clusij, maior & minor 9.
Cistus Ledon latifolium Craticum ibid.
Cistus Ledon 4. Clus. flore candido 10.
Cistus Ladaniifera, sive Ledum Monsp. angustifolio nigricant. ibid.
Cistus Ledon 6. minoribus angustioribusque folijs Clusij 11.
Cistus Ledon folijs colore cinereo ibid.
Cistus Ledon folijs Rosmarini Coronaria Clusij, flore luteo ibid.
Cistus L. don 9. Clusio 12.
Cistus Ledon Thymi folijs Clusij ibid.
Cistus annuus 1. Clusio folio rotundiore 13.
Cistus annuus 2. Clusio, flore pallido, macula punicea insignito ibid.
Cistus annuus flore guttato 14.
Cistus annuus folio Ledi flore luteo ibid.
Cistus minimus folio subrotundo ibid.
Cisti species annua angustifolia 15.
Cistus humilis Clusio, sive Helianthemum omnium can-jucans, flore nunc albo nunc pallido 16.
Cistus Helianthemum flore parvo luteo 17.
Cistus Helianthemum folio Polij montani 19.
Cistus pusillus folio candido flore luteo ibid.
Cistus pusillus montis Baldi, foris Austriacum myrsifolium ibid.
Cisti folio arbor exotica, capitulis Platani 21.
Citrullus folio Colocynthis folio, semine nigro, quibusdam Anguria 235.
Citrulo affinis melo Indicum, sive Patheca 237.
Citrulo vel Meloni Indico accedens Camolanga ibid.
Cicora antiquis 291.
Cicer in genere ibid.
Cicer arvensum 292.
Cicer sylvestre multifolium 294.
Cicer sylvestre minus Thalij ibid.
Cicer sylv. trifolium 295.
Cichorium silvestre & sativum 1007.
Cichorium verrucosum, sive Zinziba, Hieracium 11.

INDEX.

Costus ingratum sine Thapsia species	ibid.
Crocus	637.
Croci verni species varia pag. 640. & sequentibus	
Crocus montanus Autumnalis	646.
Crocus siluestris Bizantinus candidus tantillum	<u>subca-</u>
ruleus	647.
Crotopogon rufus fructus	188.
Cucurbita in genere, eiusque species varia 48. pag.	<u>154</u>
215. & sequentibus usque ad pag.	<u>231.</u>
Cucurbitinus fructus magnitudine cuius Sicutibij	238.
Cucumis vulgaris viridis & albus	245.
Cucumis minor pyriformis	247.
Cucumeres longissimi	ibid.
Cucumis Aegyptius Chate	248.
Cucumis siluestris sine Asininus	ibid.
Cucumeris filu. succus Elaeversium.	249.
Cynocrabio	979.
Cyclaminus	176. & 177.
Cynobatus veteribus	33.
Cynorrhodon veteribus	ibid.
Cyperus in genere	499.
Cyperi species varia pag. 301. & sequentibus	
Cynorchis prior Dodonae	758.
Cynorchis Delphinia	760.
Cynorchis monensis maculosis foliis	ibid.

D

D Elphisioides minus Casalp.	869.
Dentaria aphyllis minor Tabern.	783.
Dentaria quinquifolia	900.
Denticularia Rondeletij	941.
Digitalis purpurea	812.
Digitalis flore magno candido	813.
Digitalis Lutea flore maior	ibid.
Digitalis ferruginea	ibid.
Digitalis flore minore subluteo	814.
Draba lutea quibusdam	870.
Draba lutea similis	ibid.
Draba veteribus	939.
Draba multis flore albo	ibid.
Draba species glabra	940.
Draba minor orbiculatibus capis.	ibid.
Drackena radix	740.
Drackenaaffinis radix	<u>741.</u>
Dracontium veteribus & in genere	787.
Dracunculus maior vulgaris	789.
Dracunculus aquaticus	ibid.
Dryophoron Plumj	924.

E

E Pimedium quorundam	396.
Ephemerum non testale veteribus	647.
Ephemerum <i>Matthioli</i>	909.
Erinas, Erneos, vel Echinos Veteribus & in genere	
798.	
Erinas maior rapunculo affinis	799.
Erinus Dalechampi	811.
Eruca maior sativa annua	859.
Eruca Romana seu Gentilis	860.
Eruca sativa Hispanica	ibid.
Eruca tenuifolia perennis	861.
Eruca filu. angustifolia flore luteo	ibid.
Eruca minimoflore Monspel.	862.
Eruca inodora	ibid.
Eruca purpurea, alijs carulea	865.
Eruca palustris maior fl. albo	867.
Erysimum Tragi	863.
Erysimum alterum <i>Matthioli</i>	864.
Eupatorium seu Agrimonia	398.
Eupatorium adulterinum	1061.

INDEX.

F

F <i>Alim Thuesi Helenio folijs similis</i>	792.
<i>Faba vel Phascolus Indicus magnus</i>	274.
<i>Faba arborescens speciei varia</i>	275.
<i>Faba, cyanae leguminosa in genere</i>	278.
<i>Fav fallusum ex Veteribus</i>	415.
<i>Festuca graminea glauca vacua: effusa iuba: & nemoralis latifolia</i>	279.
<i>Festuca uncei folio C. Bauhini</i>	480.
<i>Festuca uncei folio spica gemina C.B.</i>	544.
<i>Festuca sexta Thaly</i>	ibid.
<i>Festuca pratensis Lanuginosa C.B.</i>	ibid.
<i>Festuca dimetorum Eiusdem.</i>	545.
<i>Flos Persicum Silybrii congener</i>	70.
<i>Fennugracum silvestre, sine Glycyrriza silvestris quibusdam</i>	330.
<i>Fennugracum syl. Tragi affinis plantis</i>	331.
<i>Fennugracum</i>	361.
<i>Fennugracum filu. Dalechampi</i>	365.
<i>Fragaria ferens fraga rubra & alba</i>	394.
<i>Fragaria non fructifera</i>	395.
<i>Fragie Serapionis</i>	391.
<i>Fru. lilia nigra</i>	681.
<i>Fruilus squammosus cum grano pipere nigri, an Brama Diosc.</i>	184.

G

G <i>Alanga maior</i>	718.
<i>Galanga minor</i>	719.
<i>Galega</i>	342.
<i>Galega montana Dalechampi</i>	343.
<i>Galega nemorensis verna</i>	ibid.
<i>Galega nemorensis verna affinis flore albo item fl. purp. & albo</i>	344.
<i>Gladiolus sine Xyphion.</i>	701.
<i>Glaucifolia Cichoreides Bauhini & Turritis secunda Clusio</i>	836.
<i>Glaux Hispanica</i>	341.
<i>Glaux Veterum</i>	352.
<i>Glaux leguminosa Herbariorum</i>	ibid.
<i>Granadilla Hedera similis</i>	114.
<i>Glycyrris sine Amara dulcis</i>	109.
<i>Glycyrriza</i>	316.
<i>Glycyrriza Dioscor. chinata non repens</i>	327.

H

H <i>Abazelin sine Granum Alzelin veterib.</i>	504.
<i>Harmia Serapionis sine Piperella</i>	189.
<i>Hals. acabum peregrinum sine Cor Indum</i>	173.
<i>Hedera veteribus & in genere</i>	110.
<i>Hedera communis maior & minor</i>	111.
<i>Hedera Dionysia Dalechampi</i>	113.
<i>Hedera Lachryma</i>	114.
<i>Hedypnois sine dens Leonis Fuchsj.</i>	1031.
<i>Hedypnois Monspeffulana</i>	1036.
<i>Helianthemum vulgare flore luteo</i>	15.
<i>Helianthemum folijs maioribus flore albo</i>	16.
<i>Helianthemum flore albo folijs angusto, hirsuto</i>	17.
<i>Helianthemum tenuifolium glabrum luteo flore</i>	18.
<i>Helianthemum alpinum folio Pilosella minoris Fuchsj. ibidem.</i>	ibid.
<i>Helianthemum folio Thymi incano</i>	19.
<i>Helianthemum sine Cistus humilis, folio Sampsuchi, capitulis valde hirsutis</i>	10.
<i>Helianthemum ad numulariam accedens</i>	ibid.
<i>Helianthes species rara coma inflexa ut in Heliotropio ibidem.</i>	ibid.
<i>Helxine Cissampelos</i>	156.
<i>Helxine Cissampelos multi, sive Convolvulus minor</i>	157.
<i>Helxine semine triangulo</i>	157.
<i>Helianum Aegyptium ex genere forte visiarum</i>	314.

<i>Herba mimosa</i>	391.
<i>Hermodactyli veterib.</i>	657.
<i>Hemerocallis veterib.</i>	688.
<i>Hermodactyli veterib.</i>	657.
<i>Hemerocallis veterib.</i>	688.
<i>Hesperides flore purpureo albo & vario</i>	877.
<i>Hesperis Pannonica inodora</i>	878.
<i>Hesperis colore inolegansi</i>	879.
<i>Hesperis Syriaca</i>	ibid.
<i>Hesperis Syriaca alia</i>	880.
<i>Hesperis Alpina muralis minor sine repens</i>	ibid.
<i>Hesperidi Alpina sine muraria affinis Draba succulentum.</i>	ibid.
<i>Hesperidi Alpina muraria sine similis succulentum & magna</i>	881.
<i>Hypocistis</i>	799.
<i>Hieracium stellatum</i>	1014.
<i>Hieracia Veterum</i>	1015.
<i>Hieracium minus, alijs Cichoreum lateum hirsutum & glabrum vel minus hirsutum</i>	1014.
<i>Hieracium parvum speciei byaseris angustifolia aspera</i>	1015.
<i>Hieracium pulchrum</i>	ibid.
<i>Hieracium Erucasolium hirsutum</i>	1015.
<i>Hieracium pulchrum ramosum Sprengerianum</i>	ibid.
<i>Hieracium latifolium Genense folio Conyza maioris Monspeff.</i>	1016.
<i>Hieracium Pannonicum latifolium Clusio, Pilosella maior sine Palmaria lutea accedens maculatum ibidem.</i>	ibid.
<i>Hieracium capitulis Cardui benedicti, maximum Bueglossum echinoides quibusdam</i>	1018.
<i>Hieracium asperum maiori flore in agrorum limitibus</i>	1019.
<i>Hieracium velleum rigidum quibusdam Sabaudum</i>	1010.
<i>Hieracium Sabaudi varietas duplex</i>	ibid.
<i>Hieracium minus premorsa radice sine Fuchsj</i>	1032.
<i>Hieracium Macrocaulon unceum sine minus primum Dodoneo</i>	ibid.
<i>Hieracium montanum maius latifolium</i>	ibid.
<i>Hieracium latifolium glabrum ex vallis Griesbachiana</i>	1033.
<i>Hieracium latifolium premorsa radice, caule singulari, Pilosella, maiori affinis</i>	1033.
<i>Hieracium montanum laciniato folio lanuginoso Clusio</i>	1037.
<i>Hieracium Narbonense rotundifolium caule aphylo, & hieracium caule aphylo hirsutum</i>	ibid.
<i>Hieracium parvum hirsutum caule aphylo crispum viti siccatum</i>	1038.
<i>Hieracium montanum 6. Clusio angustifolium</i>	ibid.
<i>Hordeum veterib. & neotericis in genere</i>	419.
<i>Hordeum distichum</i>	429.
<i>Hordeum Hexastichum pulchrum</i>	429.
<i>Hordeum Polystichum</i>	ibid.
<i>Hordeum dictum Germani Oriza</i>	429.
<i>Hordeum nudum sine Gymnocritum</i>	410.
<i>Hordeum mutinum</i>	411.
<i>Hordeum vrens nove Hispania</i>	ibid.
<i>Holostium Matthioli unceum.</i>	ibid.
<i>Hyacinthi parvi facie graminis Triglochin</i>	508.
<i>Hyacinthi historia ex veter. sententia</i>	571.
<i>Hyacinthus vernus Boerhaaves minor caruleus, angustifolius, odoratus</i>	571.
<i>Hyacinthus Boerhaaves vernus minor, latifolius, caruleus, inodorus</i>	572.
<i>Hyacinthus Boerhaaves albus</i>	573.
<i>Hyacinthus autumnalis minimus maior</i>	574.
<i>Hyacinthus maximus Boerhaaves coma carulea</i>	574.
<i>Hyacinthus Orientalis quibusdam Constantinopolitani</i>	575.
<i>Hyacinthus brumalis albus</i>	577.

INDEX

<i>Hyacinthus minimus serotinus flosculis hyacinthi Orientalis</i>	578.
<i>Hyacinthus odoratissimus dillius Tibicadi, & Muscari</i>	578.
<i>Hyacinthus odoratissimus Tibicadi luteus</i>	579.
<i>Hyacinthus Tibicadi lutei varietas sine Muscari lutei praecox</i>	ibid.
<i>Hyacinthus stellatus bifolius, & trifolius vernus dumetorum, flore caeruleo, & albo</i>	ibid.
<i>Hyacinthus stellaris albicans serotinus</i>	580.
<i>Hyacinthus stellaris vernus parvulus, flore ex caeruleo cinereo</i>	581.
<i>Hyacinthus stellaris albicans serotinus</i>	580.
<i>Hyacinthus stellaris vernus parvulus, flore ex caeruleo cyrenco</i>	587.
<i>Hyacinthus stellaris maior.</i>	ibid.
<i>Hyacinthus stellatus asinus minor</i>	581.
<i>Hyacinthus varius</i>	ibid.
<i>Hyacinthus stellatus Byzantinus</i>	582.
<i>Hyacinthus stellatus asinus</i>	583.
<i>Hyacinthus trifolius Theophrast. Label.</i>	ibid.
<i>Hyacinthus comosus Byzantinus Candicans cum staminibus purpureis</i>	ibid.
<i>Hyacinthus Comosus albus cum caeruleis staminibus.</i>	584.
<i>Hyacinthus affinis Planta.</i>	ibid.
<i>Hyacinthus Peruvianus</i>	585.
<i>Hyacinthus Angelicus sine Belg.</i>	ibid.
<i>Hyacinthus Hispanicus</i>	586.
<i>Hyacinthus stellaris cinereus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus totus albus Campanilla</i>	ibid.
<i>Hyacinthus flore rubro</i>	ibid.
<i>Hyacinthus obsoletior Hissp. Anglico similis</i>	587.
<i>Hyacinthus minor Hispan. angustifolius caeruleus & albus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus minor Hispanicus obsoleto flore</i>	588.
<i>Hyacinthus Indicus tuberosa radice</i>	ibid.
<i>Hyacinthus Mauritanicus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus latifolius Dalechampi</i>	ibid.
<i>Hyacinthus lilifolius stellatus</i>	589.
<i>Hyacinthus Tripolitanus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus ex Thracia</i>	ibid.
<i>Hesich Thunberg</i>	791.

1.

<i>Iacobaea Pannonica folio non laciniato</i>	1016.
<i>Iacobaea Marina sine Cineraria</i>	ibid.
<i>Iacobaea vulgaris</i>	1057.
<i>Iacobaea Pannonica latifolia</i>	ibid.
<i>Iberis Fuchsi sine Nasturtium pratense sylvest. & flore pleno</i>	879.
<i>Iberis Fuchsi affinis Trifolia Cardamine</i>	890.
<i>Iberis Fuchsi aliquatenus similis Cardamine Dalechampi odorata</i>	891.
<i>Iberis Fuchsi vel Nasturtium aquaticum affinis Cardamine Alpina media Clusii</i>	ibid.
<i>Iberis & Lepidium Veteribus & in genere</i>	919.
<i>Iberis</i>	918.
<i>Isaminum sine Gelsemium flore albo</i>	107.
<i>Isaminum Hispanicum flore maiora</i>	101.
<i>Isaminum sine Sambacho Arabum Alpino</i>	102.
<i>Isaminum sine Gelsemium luteum & caeruleum</i>	ibid.
<i>Isamine veterib.</i>	115.
<i>Intyba ferides & Cichoria ex veteribus</i>	1006.
<i>Intybum Sativum triplex</i>	1011.
<i>Iridia bulbosa species varia</i>	703. & sequentibus
<i>Iridia bulbosa affinis sisyrrinchium minus</i>	ibid.
<i>Iris vulgaris violacea sine purpurea hortensis & sylvestris</i>	709.
<i>Iris ex Veterum sententia</i>	ibid.
<i>Iris Dalmatica maior</i>	715.
<i>Iris Dalmatica minor</i>	716.

<i>Iris dilute carnea involucri albo forti Dalmatica ibidem.</i>	
<i>Iris Lusitanica verna violacea, Clus. Maior latifolia cum vena purpurea</i>	717.
<i>Iris altiss. bitolor caeruleo obsoleto cinereo mixta</i>	718.
<i>Iris flore albo</i>	719.
<i>Iris lutea, folijs florum repandis variegatis</i>	720.
<i>Iris latifolia maior Susiana vel Chalcidonica flore maiore variegato Clusio prima</i>	721.
<i>Iris biflora Lusitanica flore violacea Clusio</i>	722.
<i>Iris flore violacea folio virante, an Clusio 25. cantè folijs nudo</i>	723.
<i>Iris humilis latifolia colore violacea, & saxatilis eadem, nec valde similis, Clus. primum genus. Chamairis minus</i>	724.
<i>Iris humilis latifolia maior acaulis: Clus. Chamairidis latifolia genus alterum</i>	724.
<i>Iris humilis latifolia minor, & eius varietates quinque</i>	ibid.
<i>Iris humilis latifol. minor elegantiss. variegata, Clus. Chamairis</i>	725.
<i>Iris angustifolia minor Clusio quarta</i>	726.
<i>Iris graminea cui perenne quatuordecim folia</i>	727.
<i>Iris tenuifolia maior flore caeruleo & striato angustifolia</i>	728.
<i>Iris angustifolia flore albo</i>	729.
<i>Iris tenuifolia flore violacea an Clusio</i>	729.
<i>Iris tenuifolia Michel Foldensis spontanea, forte Clusio angustifolia maior sine prima</i>	729.
<i>Iris Tripolitana folijs longissimis flore atro</i>	730.
<i>Iris Tuberosa Belgarum</i>	ibid.
<i>Iris Palustris lutea sine Acornu Adulterinum</i>	732.
<i>Iris, sine Erysimum Veteribus</i>	861.
<i>Isopyron veterib.</i>	304.
<i>Isopyron Casalpini</i>	ibid.
<i>Luncus Alpinus cum cauda Leporina</i>	514.
<i>Luncus Alpinus Bombycinus</i>	515.
<i>Luncus genus Europice</i>	519.
<i>Luncus panicula arundinacea</i>	520.
<i>Luncus Maethioli</i>	ibid.
<i>Luncus pungens</i>	ibid.
<i>Luncus acutus maritimus C. Bauh.</i>	521.
<i>Luncus foliaceus</i>	521.
<i>Luncus foliaceus capsulis triangulis</i>	521.
<i>Luncus trifidus</i>	ibid.
<i>Luncus maximus heloschonus</i>	522.
<i>Luncus parvus cum Pericarpis rotundis</i>	ibid.
<i>Luncus humilis</i>	ibid.
<i>Luncus exiguus montanus Cas. Bauh.</i>	ibid.
<i>Luncus foliaceus minimus</i>	523.
<i>Luncus minimus fortis admirabilis</i>	ibid.
<i>Luncus parvus montanus</i>	ibid.
<i>Luncus capsulis longis</i>	ibid.
<i>Lunculus Capsulis Equiseti minor & fluitans C. Bauh.</i>	ibid.
<i>Lunculus laevis, seu scirpus Indicus Cas. Bauh.</i>	524.
<i>Lunculus Sphacelicus Tabernamont.</i>	ibid.
<i>Luncus genus modula profus minus Hist. Lugd.</i>	ibid.
<i>Luncus acuminatus reflexo maior</i>	ibid.
<i>Luncus acuminatus reflexo aliter</i>	ibid.
<i>Luncus floridus</i>	ibid.
<i>Luncus floridus minor C. Bauh.</i>	525.

L

<i>Lactuca, Thrylax veteribus</i>	995.
<i>Lactuca sativa vulgaris capitata & non capitata</i>	997.
<i>Lactuca rubra</i>	998.
<i>Lactuca Romana longa dulcis</i>	ibid.
<i>Lactuca longo & valde angusto folio</i>	999.
<i>Lactuca crispata laciniata</i>	ibid.
<i>Lactuca</i>	

INDEX.

Lactuca crispata & tenuiter diffusum *ibid.*
Lactuca filu. sine endemia multis doliis, folio laciniato, dorsa spinosa 1003.
Lactuca filu. mutorum flore luteo 1004.
Lactuca mutorum affinis Sanchus Dendroides Dalech. *ibid.*
Lactuca filu. purpurea 1003.
Lampyris veteribus 1028.
Lampyris Dodonai *ibid.*
Lachryma lobi multis, sine milium arundinaceum 449.
Lapathum, Oxylapathum, & Hippolapathum, ac de his Veterum sententia, & in genere 987.
Lapathi species varia pag. 983. & sequentibus
Lathyrus sine cicercula in genere. 302.
Lathyrus maioris species flore rubente, & albido, minore, dumetorum, sine Germanic. *ibid.*
Lathyrus maior, latifolia, flore maiore purpureo speciosior 303.
Lathyrus maior Narbonensis angustifolius 304.
Lathyrus species lutea *ibid.*
Lathyrus luteus sylu. dumetorum *ibid.*
Lathyrus siliqua hirsuta 309.
Lathyrus species qua Ervilia filu. Dodonai 309.
Lathyrus anguloso semine 306.
Lathyrus flore rubro & alio albo 307.
Lathyrus quidam, quibusdam Aegyptia Aracum 308.
Lathyrus folio tenuiore florib. rubris *ibid.*
Lagopus Trifolius quorundam 177.
Ledum, & Ladanum 6.
Lens 317.
Leporis auricula Casalpini 309.
Leucoium bulbosum Hexaphyllum cum unico flore, rarius bino 390.
Leucoium bulbosum minus Triphyllum 391.
Leucoium bulbosum praecox Bizantinum *ibid.*
Leucoium bulbosum Polianthesum tardius florens floribus minoribus 392.
Leucoium Triphyllum flore caeruleo Someri *ibid.*
Leucoium bulbosum autumnale minus tenuif. 393.
Leucoium bulbosum ferre affinis Bulbus flore intus luteo, foris purpureo *ibid.*
Leucoium bulbosum ferre affinis Bulbus quidam *ibid.*
Leucoium ex veterum sententia 871.
Leucii species varia 872. & sequentibus
Leucoium cum siliquis rotundis flore luteo 931.
Leucoium spinosum, sine Thlaspi spinosum aliis 931.
Leucoium luteum spinosum 931.
Lepidium Pauli 940.
Lepidium non repens 941.
Libanotis species Rondeletii 25.
Lilium Alexandrinum sine Ornithogalum magnum Syriacum 629.
Lilium album vulgare 684.
Lilium album Syriacum Ranzvolffii 687.
Lilium rubens vel croceum maius 688.
Lilium rubens vel croceum minus 689.
Lilium Phoeniceum dalmaticum 690.
Lilium cruentum latifolium *ibid.*
Lilium bulbiferum maius *ibid.*
Lilium bulbiferum incanum 691.
Lilium bulbiferum repens *ibid.*
Lilium Croceum flore pleno 691.
Lilium bulbiferum cruentum angustifolium *ibid.*
Lilium flore mutante ferrugineo duplex, maius & minus *ibid.*
Lilium flore mutante albo 694.
Lilium flore mutante maximum *ibid.*
Lilium flore mutante, sine Hemerocallis Chalcodonica aliquibus 695.
Lilium praecox mutante flore rubro 696.
Lilium mutante flore flauo 697.
Lilium Persicum sine Suffanum 699.

Lilium Asphodeli radice luteum, sine Lilio Asphodeli *ibid.*
luteo quorundam flore luteo 700.
Lilium radice Asphodeli phoeniceum, sine Lilio Asphodeli quibusdam 701.
Lignum Colubrinum in genere 169.
Lobus cum seminibus conuoluto maiori accedentibus 166.
Lobus Aethiopico pipari similis, acris 188.
Lobus Cartilagineus ex Insula Mauritii, Phascolo sine Fabâ nigra 272.
Lobus peregrinus cartilagineus, Phascolo ex puniceo nigro sanguine annulo cincto. 273.
Lobus quadrangularis 278.
Lobus membranaceus planus niger *ibid.*
Lotus in genere 353.
Lotus sativa veteribus 354.
Lotus sativa veterum *ibid.*
Lotus corniculata glabra & hirsuta minor *ibid.*
Lotus Corniculata maior species 355.
Lotus Corniculata siliquis singularibus vel binis, tenuis 356.
Lotus fil. quassa flore fusco tetragonolobus 358.
Lotus siliquosa aliquomodo similis Coronopus, ex Cod. Caesar *ibid.*
Lotus Ornithopodii siliquis *ibid.*
Lotus siliquosa lutea Monspeliensis 359.
Lotus sativa, odorata annua flore caruleo 359.
Lotus filu. ex Cod. Caesar. 371.
Lolium quinquum Trago Hordei granis aristis non admodum multis 416.
Lolium graminum spicatum 417.
Lopulus mas & femina 152.
Lupinus in genere eiusque species varia 288. & sequentibus
Lupinus filu. Italorum rusticorum Casalp. de illis 314.
Lunaria maior siliqua rotundiore 881.
Lunaria maior siliqua longiore 882.
Lunaria bisculata 935.
Lunaria pelata minima quibusdam ad Thlaspi referenda *ibid.*
Lysimachion veteribus 921.
Lysimachia species varia *ibid. & pag. sequentibus.*

M

M *Altegris sine Frutillaria saturator & delusior* 681. & 684.
Malua Veteribus & in genere 947.
Malua species varia 949. & sequentibus
Malinathalle Theophr. & Anthallium Plinio 904.
Marragon albicans pitillu adiconem cum coloribus 694.
Marragon flore luteo praecox 697.
Manihot Theophr. Luc. a & Castori 794.
Melones 142. & sequentibus
Melilotus in genere eiusque species varia pag. 142. & sequentibus.
Mel Scilliticum 620.
Meleagris sine fritillaria Pyrenaea flore minore 683.
Meleagris sine fritillaria Aquitanica reflexis ornibus *ibid.*
Meleagris sine Fritillaria flava 684.
Medum Diosc. Ranzvolff. 803.
Medica in genere 382.
Medica species varia 387. & sequentibus
Mechoacan 149.
Melegueta 108.
Melium 446. & 447.
Miagri species varia 392. & sequentibus
Miagri species varia 392. & sequentibus.
Moly 561. & sequentibus.
Musum 87.
Mungo 119.
Myrio Cistus Pennai florib. luteis oblongis 121.

INDEX.

Myagrum Veteribus & in genere

N

N <i>Alburtium Indicum folio peltato scandens</i>	175.
<i>Nasturtium Indicum fol. anguloso</i>	176.
<i>Nasturtij Indici putata filiqua Peruviana</i>	176.
<i>Nacham Garcia</i>	417.
<i>Narcissus Cyprius luteus polyanthes flore pleno</i>	395.
<i>Narcissus folijs florib. albis, oblongo calice luteo</i>	397.
<i>Narcissus lancifolius omnino albus calyce longo</i>	398.
<i>Narcissus lancifolius albus calyce magno</i>	399.
<i>Narcissus in genere</i>	ibid.
<i>Narcissus Medio purpureus flore pleno</i>	602.
<i>Narcissi varia alia species ibidem & sequ. usque ad pag. 609.</i>	
<i>Narcissus Persicus croci flore molino, Colchicis affinis</i>	661.
<i>Narcissus autumnalis minor & similes planta</i>	661.
<i>Narcissus Africanus bifolius sine exotens</i>	679.
<i>Narcissus Africanus folio rotundiore</i>	ibid.
<i>Napus</i>	842.
<i>Napus sylvestris</i>	483.
<i>Nasturtium veteribus</i>	911.
<i>Nasturtium vulgare</i>	912.
<i>Nasturtium crispum Joh. Bauhini</i>	915.
<i>Nasturtium latifolium Dioscorideum Joh. Bauhini</i>	ibid.
<i>Nasturtium Alpinum Caps. Nasturtium vulgare. Joh. Bauh.</i>	918.
<i>Nasturtium Alpinum tenuissimè diffusum</i>	ibid.
<i>Nasturtium filu. Valentinum Clusio</i>	920.
<i>Nasturtium vel Thlaspi maritimum</i>	927.
<i>Nerium alpinum quibusdam, alijs Ledum glabrum, & hirsutum</i>	21.
<i>Nerium sine Rhododendrum flore rubro & albo</i>	140.
<i>Nery facie arbor</i>	142.
<i>Nery filique effigie Kaye Baka</i>	ibid.
<i>Nil Arabum quibusdam sine connatis caruleis</i>	164.
<i>Negundo arbor mas & femina</i>	188.
<i>Noli me tangere</i>	909.

O

<i>Ornithopodio affinis vel potius solea, vel ferro equino, herba</i>	343.
<i>Ornithopodium flore flavescente</i>	350.
<i>Ornithopodium tuberosum Dalechampi</i>	351.
<i>Ornithogalum Cetraceum pallens, & ornithogalum Hispanicum minus</i>	621.
<i>Ornithogalum pallido flore</i>	624.
<i>Ornithogalum luteum minus</i>	ibid.
<i>Ornithogalum veterib.</i>	627.
<i>Ornithogalum spicatum flore viride</i>	627.
<i>Ornithogalum spicatum albo flore Monspess.</i>	628.
<i>Ornithogalum Creticum & Pannonicum albo flore</i>	629.
<i>Ornithogalum vulgare & verius minus & minus.</i>	630.
<i>Ornithogalum Neapolitanum</i>	631.
<i>Orobis sine Erum in genere</i>	317.
<i>Orobis sine Erum multis</i>	321.
<i>Orobis cicer Lobelij</i>	321.
<i>Orobo similis Lathyrus Cretensis Honorij Belli</i>	ibid.
<i>Orobo similis Aracis Cretensis eiusdem</i>	ibid.
<i>Ochras in genere</i>	195.
<i>Omphacium</i>	24.
<i>Onobrichis in genere</i>	336.
<i>Onobrichis purpurea flore</i>	337.
<i>Onobrichis subcaerulea flore</i>	ibid.
<i>Onobrichis pallido flore</i>	ibid.
<i>Onobrichis Casalp.</i>	343.
<i>Oriza veteribus</i>	450.
<i>Oriza in genere</i>	451.

<i>Oriza India orientali peculiaris</i>	453.
<i>Orchis sine Testiculis in genere</i>	755.
<i>Orchis barbata fatida</i>	756.
<i>Orchis galea & alia fere cinerea</i>	757.
<i>Orchis stratiomatica maior</i>	758.
<i>Orchis stratiomatica minor</i>	ibid.
<i>Orchis ornithophora folio maculoso</i>	759.
<i>Orchis magna latis folijs, galea nigricans.</i>	ibid.
<i>Orchis alius purpureus, alius ex roseo candidum Trago</i>	ibid.
<i>sive quartum</i>	760.
<i>Orchis maior tota purpurea non maculata</i>	760.
<i>Orchis Ornithophora flore colore herbaceo</i>	761.
<i>Orchis Ornithophora candida</i>	ibid.
<i>Orchis minor purpurea & aliorum colorum</i>	ibid.
<i>Orchis sine Cynosorchis tertius Dodon.</i>	762.
<i>Orchis maior tota purpurea</i>	763.
<i>Orchidis genus paruum</i>	ibid.
<i>Orchis parva flore rubro sine phaniceo</i>	764.
<i>Orchis minor folijs tenuioribus reflexis flore panicante</i>	ibid.
<i>Orchis Batanica</i>	ibid.
<i>Orchidum quarundam Icones</i>	ibid.
<i>Orchis minor angustifolia</i>	765.
<i>Orchis parva floribus, multis punctis notatis,</i>	ibid.
<i>Orchis rotundus Dalechampi</i>	ibid.
<i>Orchis sine testiculis maximo flore</i>	766.
<i>Orchis faciflora</i>	ibid.
<i>Orchis melutia</i>	767.
<i>Orchis sine testiculis phagodes hirsuto flore</i>	ibid.
<i>Orchis Myodes</i>	ibid.
<i>Orchis Serapias tertius Dodon. & Myodes Lobelio</i>	ibid.
<i>Orchis Myodes flore grandisculo</i>	768.
<i>Orchis Myodes lutea</i>	ibid.
<i>Orchis parva autumnalis lutea</i>	ibid.
<i>Orchis Erisia hirsuta</i>	769.
<i>Orchis sine triorchis lutea tertius</i>	ibid.
<i>Orchis spiralis alba odorata</i>	ibid.
<i>Orchis radice repente</i>	770.
<i>Orchis Lilifolia minor</i>	ibid.
<i>Orchis alba calcari longo</i>	771.
<i>Orchis hermaphrodita bifolia</i>	772.
<i>Orchidis genus quibusdam satyrium castratum</i>	772.
<i>Orchides, Culices minores triphylla</i>	ibid.
<i>Orchis Batrachites</i>	ibid.
<i>Orobanchis & Hamadryas Veteribus & in genere</i>	779.
<i>Orobanchis flore maiore</i>	780.
<i>Orobanchis flore minore</i>	781.
<i>Orobanchis minor purpurea floribus sine ramosa</i>	ibid.
<i>Orobanchis magna purpurea Monspessulana</i>	782.
<i>Orobanchis affinis nidus avis</i>	ibid.
<i>Orobanchis & nido avis affinis Psendo aquilifer An-</i>	ibid.
<i>striatum violaceum</i>	ibid.
<i>Oxalis vulgaris</i>	989.
<i>Oxalis cista</i>	990.
<i>Oxalis sylvatica maxima</i>	ibid.
<i>Oxalis folio amplissimo geniculis tuberosis</i>	991.
<i>Oxalis tuberosa radice</i>	ibid.
<i>Oxalis folio rotundiore repens</i>	ibid.
<i>Oxalis minor aculeata Candia</i>	ibid.
<i>Oxalis parva auriculata repens</i>	992.
<i>Oxalis Africana</i>	ibid.
<i>Oxis sine Trifolium acidum</i>	337.
<i>Oxys lutea</i>	338.

P

<i>Palmata Satyria in genere</i>	773.
<i>Palmata non maculata.</i>	774.
<i>Palmata speciosiore tyrsa, folio maculato</i>	ibid.
<i>Palmata maculata</i>	775.
<i>Palmata alba.</i>	ibid.
<i>Palmata sine Serapias palustris</i>	ibid.

INDEX.

<i>Palmata sine Orchis Pannonica</i>	ibid.	<i>Pisi pulchra species folio anguloso</i>	ibid.
<i>Palmata Serapias palustris leptophylla, violacea, maculata & non maculata</i>	776.	<i>Pisi minor ex purpureo variegata, vicia familia</i>	293.
<i>Palmata angustifolia palmifolia</i>	ibid.	<i>Pisa parva viridia</i>	ibid.
<i>Palmata Serapias montana.</i>	ibid.	<i>Pisa minor rubra variegata</i>	ibid.
<i>Palmata floribus impenso rubris</i>	777.	<i>Pisa magna, rubra variegata</i>	ibid.
<i>Palmata palustris Nephelodes</i>	ibid.	<i>Pisa maiora, alba</i>	299.
<i>Palmata sine Cynosorchis macrocarpos galericulata</i>	ibid.	<i>Pisum erectius comosum</i>	ibid.
<i>C. Gemma</i>	ibid.	<i>Pisa sine tunicis durioribus in siliqua magna alba</i>	300.
<i>Palmata Caryophyllata</i>	ibid.	<i>Pisum Guinea album sine Cicer</i>	ibid.
<i>Palmata angustifolia maculata paup.</i>	ibid.	<i>Pisum Brasilianum flavescentis area fusca germen em- gerit</i>	301.
<i>Palmata rubella cum longis calcaribus</i>	778.	<i>Pisum Brasilianum phoeniceum, & nigrum</i>	ibid.
<i>Palmata minor odoratissima.</i>	ibid.	<i>Pisum Indicum variegatum</i>	ibid.
<i>Panicum silvestre dictum & dens (ant)</i>	441.	<i>Pisum Indicum quoddam rotundum, fuscum</i>	ibid.
<i>Panicum vulgare panicum</i>	440.	<i>Pisum Indicum minus nigrum</i>	ibid.
<i>Panicum caruleum sine Indicum</i>	441.	<i>Pisum Indicum umbilico eminente</i>	ibid.
<i>Panicum Americanum sesquipedalis spica</i>	ibid.	<i>Pisa Indica folijs longiusculis</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum Veteribus</i>	396.	<i>Pisum sylvestre</i>	309.
<i>Pentaphyllum vulgare repens</i>	397.	<i>Polygalon veteribus</i>	315.
<i>Pentaphyllum rectum</i>	398.	<i>Polygalon Gesneri</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum Alpinum splendens</i>	ibid.	<i>Polygalum minus saxatile</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum minus molle lanugine pubescens</i>	ibid.	<i>Polygalon Gesneri affine caput Gallinaceum</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum parvum bursatum</i>	ibid.	<i>Polygalon Gesneri similis planta</i>	349.
<i>Pentaphyllum minus folio subius albicante</i>	ibid.	<i>Polygalon cortusi</i>	351.
<i>Pentaphyllum recti species varia</i>	ibid.	<i>Polygala quibusdam</i>	ibid.
<i>Pancreatum Veteribus</i>	610.	<i>Potentilla sine Argemone</i>	398.
<i>Pancreatum Montepessulanum multi Scylla alba parva</i>	611.	<i>Perrum</i>	551.
<i>Pancreatum Indicum</i>	611.	<i>Perrum sectum, & Scherophaffon quibusdam</i>	551.
<i>Pancreatum alterum Vernum Indicum</i>	612.	<i>Pseudo china radix clusi.</i>	122.
<i>Papyrus Nilotica</i>	307.	<i>Pseudo Asphodelus quibusdam</i>	614.
<i>Parietaria</i>	976.	<i>Pseudo-narcissus albo flore clusi</i>	397.
<i>Pauate arbor folijs mali aurea</i>	101.	<i>Pyramidalis Valerandi, bursata</i>	808.
<i>Pentaphyllum vel potius heptaphyllum flore rubro ibi- dem.</i>	ibid.	<i>Pyramidis lanis</i>	ibid.
<i>Pentaphylloides supinum</i>	ibid.		
<i>Pentaphylloides erectum</i>	ibid.		
<i>Pentaphyllum folius arserne & supernè incans ibidem</i>	ibid.		
<i>Pentaphyllum sine potius heptaphyllum flore muscoso ibid.</i>	ibid.		
<i>Pentaphyllum Indicum</i>	ibid.		
<i>Pentaphylla effigies Leucas quibusdam</i>	ibid.		
<i>Perichymenum ve. eribus</i>	103.		
<i>Perichymenum plurimum sine Caprifolium duplex perso- litium & non persilitium</i>	104.		
<i>Perichymenum rectum, fructu rubro & nigro</i>	106.		
<i>Perichymeno simile</i>	107.		
<i>Perichymenum rectum folio serrato</i>	ibid.		
<i>Perichymenum rectum fructu caruleo</i>	108.		
<i>Perichymenum parvum Prutenicum Clusi</i>	ibid.		
<i>Pepo indicus minor angulosus</i>	226.		
<i>Phaselus, Phascolus, Phasiolus, Dolichus, Smilax bor- tensis in genere.</i>	231.		
<i>Phaseli seu Phasioli sexaginta circiter species varia pag.</i>	238. 259. 160.		
<i>& sequentibus usque ad pag.</i>	278.		
<i>Piper nigrum</i>	181.		
<i>Piper nigrum Clusi</i>	182.		
<i>Piper nigrum Acoffa</i>	183.		
<i>Piper abortivum, Brasma</i>	184.		
<i>Piper album</i>	ibid.		
<i>Piper Insula Taprobane candidum Molaga</i>	185.		
<i>Piper candatum</i>	ibid.		
<i>Piper longum</i>	ibid.		
<i>Piper longum Monardis</i>	186.		
<i>Piper longum Clusi</i>	ibid.		
<i>Piper ex Florida</i>	187.		
<i>Piper Ethiopicum siliculosum</i>	ibid.		
<i>Pisum in genere ex veteribus & neotericis</i>	295.		
<i>Pisa potissimum vulgaris, parva, alba, sine arvensis</i>	297.		
		<i>Quamoclit</i>	177.
		<i>R</i>	
		<i>Radix Quimbaya.</i>	151.
		<i>Radix purgatina Indica malialista</i>	ibid.
		<i>Radix Carolinensis, folijs Lupuli</i>	153.
		<i>Radix Malace quodam toxicis sagittis resistens</i>	173.
		<i>Radix S. Helena Galanga species:</i>	740.
		<i>Rapunculus vulgaris campanulatus</i>	795.
		<i>Rapunculus genus folio serrato rotundior</i>	798.
		<i>Rap. montanus, sine Franchetium montanum</i>	808.
		<i>Rap. spicatus sine comosus albus & caruleus: itemque folio maculato</i>	809.
		<i>Rap. flore globozo purpureo</i>	810.
		<i>Rap. minus folio tenui gramineo</i>	ibid.
		<i>Rap. Alpinus parvus comosus</i>	811.
		<i>Rap. comoso spicato aliquatenus affinis ex Baldo</i>	ibid.
		<i>Rap. Sonchi facie umbellatus</i>	ibid.
		<i>Rap. Creusci Petro marula</i>	ibid.
		<i>Rapum sativum rotundum & oblongum</i>	818.
		<i>Rapum sylvestre γερνύδα ἀγρία veteribus</i>	841.
		<i>Rapum sylv. Matthioli</i>	ibid.
		<i>Rapistrum flore luteo</i>	844.
		<i>Rapistrum Monospermum</i>	845.
		<i>Rapistrum genus Austriacum</i>	846.
		<i>Rapistrum flore albo striato, sinapi agreste album Trago</i>	851.
		<i>Raphanus</i>	846.
		<i>Raphanus Byzantinus</i>	850.
		<i>Raphanus Ramula Cretensis dicta</i>	ibid.
		<i>Raphanus sylv. veterum</i>	ibid.
		<i>Raphanus sylv. Matthioli</i>	ibid.
		<i>Raphanus sylv. sine Armoraci à multis</i>	851.
		<i>Raphanus aquaticus Tabern.</i>	867.
		<i>Radicula sylv. sine palustre</i>	866.
		<i>Rhaponticum</i>	986.
		<i>Rhabarbarum</i>	ibid.
		<i>Ribes vulgaris acidus rubens</i>	27.
		<i>Ribes vulgaris acidus, albus baccas ferens</i>	98.

INDEX

<i>Ribes flore rubente</i>	ibid.	<i>Saccharum Candum</i>	916.
<i>Ribes monocarpus</i>	ibid.	<i>Saccharum Candum violaceum</i>	917.
<i>Ribes Alpinum dulcis</i>	ibid.	<i>Saccharum Penidum</i>	918.
<i>Ribes nigrum dictum folio olente</i>	ibid.	<i>Saccharum candum rosaceum</i>	ibid.
<i>Ribes verum Arabum</i>	99.	<i>Saccharum cinnamomeum</i>	ibid.
<i>Ribes Rauwolfii, aut illi congener planta</i>	100.	<i>Saccharum Alheifar</i>	ibidem.
<i>Rosmarinum sylvestris quorundam</i>	23.	<i>Sacryum quorundam Erythronium bifolium flore unico</i>	ibid.
<i>Rosmarinum sylv. aequos Clusio.</i>	24.	<i>radiato albo & purpureo</i>	680.
<i>Rosm. sylv. minor Camerary</i>	ibid.	<i>Satyrum veteribus in genere</i>	755.
<i>Rosm. Coronarium fruticosum</i>	25.	<i>Satyrum Erythronium Matth.</i>	779.
<i>Rosa.</i>	27.	<i>Scammonea Monspeliaca flore parvo</i>	116.
<i>Rosa rubra, flore valde pleno, & semipleno, & simplici</i>	34.	<i>Scammonea & Scammonium veterib. & in genere</i>	160.
<i>ferè</i>	34.	<i>Scammonea Syriaca flore maiore consuetud.</i>	163.
<i>Rosa Hierica</i>	109.	<i>Scammonium, succus Scammonae densatus</i>	164.
<i>Rosa Achaicus, flore pleno: coloris rubelli</i>	35.	<i>Scorpioides Leguminosa</i>	349.
<i>Rosa sine spinis, colore penè facum vini rubri</i>	ibid.	<i>Scorpioides leguminosa altera</i>	350.
<i>Rosa pumila Pannonica flore rubello</i>	35.	<i>Scopa Regia veterum</i>	868.
<i>Rosa sylv. rubella parvo frutice</i>	ibid.	<i>Scorpioides ex sententia veterum</i>	898.
<i>Rosa rubella flore maiore multiplicato sine pleno, in-</i>	36.	<i>Scorpioides filiqua Campode hispida</i>	ibid.
<i>carnata vulgò</i>	36.	<i>Scorpioides montanum</i>	899.
<i>Rosa folio crispo, flore rubello sine incarnato</i>	37.	<i>Scorodololapsi Vlissis Alatroandi</i>	931.
<i>Rosa rubella sine incarnata similis</i>	ibid.	<i>Scorodoprassum dictum</i>	938.
<i>Rosa Pranestina alba versicolor</i>	ibid.	<i>Schrenanthis sine luncu odoratum</i>	935.
<i>Rosa Hollandica rubella, plena quibusdam centifolia</i>	ibid.	<i>Scilla veteribus</i>	614.
<i>spinosa frutice</i>	38.	<i>Scilla rufa magna vulgaris</i>	615.
<i>Rosa centifolia Bazanica altera</i>	ibid.	<i>Scilla magna alba</i>	618.
<i>Rosa pomò spinosa, folio hirsuto</i>	ibid.	<i>Scythice radix veteribus</i>	328.
<i>Rosa pomifera Venetis, Sprengeri, folio hirsuto</i>	ibid.	<i>Securidaca flore luteo, filiqua lata oblonga</i>	345.
<i>Rosa spinosissima hirsuta</i>	ibid.	<i>Securidaca altera sine minor</i>	347.
<i>Rosa minor rubello multiplicato flore asperis spinis</i>	ibid.	<i>Securidaca genus Triphyllum</i>	373.
<i>armata</i>	ibid.	<i>Secale</i>	416.
<i>Rosa cinnamomea floribus subrubentibus spinosa</i>	39.	<i>Secale latifolia C. Baub.</i>	417.
<i>Rosa rubello flore parvo, simplici, non spinosa</i>	ibid.	<i>Secale luxurians C. Baub. quid?</i>	ibidem.
<i>Rosa sylv. pomifera Lobelio, flore rubello, sine spinis</i>	40.	<i>Scriphium Germanicum sine Sophia quibusdam</i>	886.
<i>pumila, eadem serie cum precedenti</i>	40.	<i>Sesamum veteribus</i>	895.
<i>Rosa pumila spinosissima foliis pimpinella, glabri</i>	40.	<i>Sesamum</i>	896.
<i>flore albo</i>	40.	<i>Senecio sine Erigeron veteribus</i>	1043.
<i>Rosa spinosissima pumila flore rubro</i>	41.	<i>Senecio vulgaris sine Erigeron</i>	ibidem.
<i>Rosa aruina Tabern. spinosa</i>	ibid.	<i>Senecio hirsutus, viscidus, maior, odoratus</i>	1042.
<i>Rosa minima</i>	ibid.	<i>Senecio folio non lacinato</i>	1045.
<i>Rosa foliis odoratis Eglemina dicta</i>	ibid.	<i>Senecio sine Erigeron, caruleus, alius Conyza cerulea</i>	ibidem.
<i>Rosa Eglemina flore pleno</i>	43.	<i>Sicyopepon compressus rotundus, Melonis effigie</i>	126.
<i>Rosa sylvestris, folio Eglemina vivente, albo flore &</i>	ibid.	<i>Sinuos, Sinva, Sinuc, sinuv à, Μελωνίτων, Cucumis</i>	ibid.
<i>rubello</i>	ibid.	<i>Pepo, & Melopepon, veteribus & nostris</i>	138.
<i>Rosa sylv. alba cum rubore, folio glabro</i>	ibid.	<i>Sisyrinchium veteribus</i>	707.
<i>Rosa sylv. folio glabro, flore planè albo</i>	44.	<i>Sinapi veteribus & in genere</i>	852.
<i>Rosa sylv. alba, cum aliquo rubore, folio hirsuto</i>	ibidem.	<i>Sinapi filiqua latiuscula glabra semine raso, sine vul-</i>	ibid.
<i>Rosa candida plena & semiplena</i>	ibidem.	<i>gare</i>	855.
<i>Rosa lacteola</i>	45.	<i>Sinapi album filiqua hirsuta, semine albo & raso</i>	856.
<i>Rosa humilis</i>	ibid.	<i>Sinapi Erysimo Tragi cognatum sine simile</i>	857.
<i>Rosa moschata maior</i>	ibid.	<i>Sinapi sylvestre Monspellanum</i>	858.
<i>Rosa moschata minor flore simplici</i>	ibidem.	<i>Sinapi Geneuense sylvestre</i>	ibid.
<i>Rosa moschata minor flore pleno</i>	47.	<i>Sinapi Monspellanum filiqua aspera hirsuta</i>	ibid.
<i>Rosa Succcharina plena</i>	ibidem.	<i>Sinapi Echinatam</i>	ibid.
<i>Rosa lutea</i>	ibidem.	<i>Sinapi agreste flore purpureo</i>	866.
<i>Rosa lutea flore pleno</i>	48.	<i>Sinapi aquaticum Patanum</i>	867.
<i>Rosa subnivalis & carulea</i>	ibidem.	<i>Sisymbrium Cardamine, sine Nasturtium aquatic.</i>	884.
<i>Rosa semper vivens Clus.</i>	ibidem.	<i>Sisymbrium Cardamine sine Nasturtium aquaticum</i>	ibid.
<i>Rosarium collectio, delectus, repositio, & substitutio</i>	ibid.	<i>flore maiore elatius</i>	885.
<i>Rosarium vives & usus</i>	49.	<i>Sisymbrij Cardaminis species quadam insipida</i>	886.
<i>Rubus maior fructu nigro</i>	57.	<i>Sium seu Lauer Matth. filiquosum</i>	887.
<i>Rubus minor fructu caruleo</i>	59.	<i>Sisymb. cardamine hirsutus minus flore purpureo</i>	888.
<i>Rubus Idæus spinosus fructu rubro, & albo</i>	ibidem.	<i>Smilax aspera</i>	115.
<i>Rubus Idæus non spinosus</i>	60.	<i>Smilax aspera minus spinosa fructu nigro</i>	116.
<i>Rubus sine spinis Valentini</i>	61.	<i>Smilaci affinis Salsaparilla</i>	117.
<i>Rubus Alpinus humilis</i>	ibidem.	<i>Smilax aspera Zaccynthi Alpino</i>	ibid.
<i>Rubus Idæo minor affinis Chamæmoris</i>	62.	<i>Smilax lanis veteribus</i>	354.
<i>Rubi facie senticosa planta Lobelio</i>	63.	<i>Smilax hortensis</i>	299.
S			
<i>Sapa sine Hepsoma</i>	87.	<i>Smilax hortensis, sine Phasolus Anaxyridi similis ferè,</i>	ibid.
<i>De Sambach seu Zambach & Ismino quadam in-</i>	100.	<i>colore rubescens</i>	261.
<i>genere</i>	100.	<i>Sonchus caruleus latifolius</i>	1009.

INDEX

Sonchus minor laciniosa mitior, siue minor spinosa, & asperior siue spinosior 1014.
Sonchus laciniatus non spinosus & spinosus 1015.
Sonchus repens, multus Hieracium minus 1017.
Sonchus affinis Terracrepola 1018.
Sonchus lanatus Delechampi 1016.
Sorghi 447.
Sorghi album, Milium Indicum, Dorā, 448.
Soldanella montana quibusdam 817.
Spartium spicatum, pungens, Oceanicum 511.
Spartium maritimum, siue Oceanicum latifolium. 512.
Spartium paruum Lobelia 513.
Sparganium quibusdam 541.
Sparganium alterum ibid.
Sparganium minimum Bauhin. ibid.
Sparganium Placa Narcisso simile flore albo Lily 663.
Spargula for. id. plerisque Xyris 711.
Spinachia mas & semina 963.
Spinachia semine non pungente, folio maiore rotundiore 964.
Symphonie Dalech. que Amaranthus tricolor 970.

T

T *Elehium veteribus* 889.
Telephium Scorpioides ibid.
Tetragonolobus Loto similis filiqua 359.
Tetraspi angustif. Fuchs. Natursium sylu. lo. Bauh. 914.
Tetraspi. ceterib. & in genere 910.
Tetraspi vulgatum 911.
Tetraspi capitulo hirsutis 912.
Tetraspi cum filiquis latis 913.
Tetraspi Creticum quibusd. flore rubente & albo 924.
Tetraspi umbellatum arvense amarum 925.
Tetraspi paruum umbellat. o. flore nudo odorato 925.
Tetraspi umbellatum tenuiter diuiso folio amarum Narbonense ibid.
Tetraspi folijs globularis 926.
Tetraspi folijs globularis affinis siue Alsinifolia cū Myagris folijs ibid.
Tetraspi capsula cordata peregrinum 927.
Tetraspi minus quibusdam, alijs Alysson minus 928.
Tetraspi montanum luteum ibid.
Tetraspi montanum minimum Monspeliensium folio laciniato 929.
Tetraspi capsulis sublongis incanum ibid.
Tetraspi semper vivens species candida 930.
Tetraspi frutescens alterum Lob. ibid.
Tetraspi frut. o. folio Leucocy marini minoris 931.
Tetraspi folio Alliaria 932.
Tetraspi Alexandrinum Cortusi lo. Bauh. 933.
Tetraspi hederaceum ibid.
Tetradis flos 681.
Tormentilla 398.
Trasi 304.
Trasi minores 306.
Tragos 415.
Tragos duplex Casalp. 361.
Tragorhis minore flore fuliginoso 764.
Trachelium minus minus 800.
Trachelium ramosum florib. plerisque singularibus 801.
Trachelium minoris species dua. siue Rapunculus sylu. umbellatus maior & minor Thalia ibid.
Trachelium minus album ibid.
Trachelium altissimum hirsutum asperius, folijs angustis, floribus parvis ibid.
Trachelium minus petraum ibid.
Trachelium maiori, petras Pona simile. si non idem 802.
Trach. Tragopogi folio montanum Fab. Columna ibid.
Trachelium siue Viola Calathiana Herb. Angl. ibid.
Trachelium candidum Anglicum minus, folijs ferè digutalis vel Campanula 807.

Trachelium pumilum Alpinum, lanugine pubescens, singulis florib. ex singulis ramulis satis magnis 809.
Tragopogon siue Barba hirci veteribus 1058.
Tragopogon flore luteo, purpureo, ac puniceo ibid.
Tragop. folio laciniato flore pallido, & Monspeliense flore luteo 1059.
Tragop. folio gramineo flore albo & luteo cum tantilla purpura 1060.
Tragop. Hisp. siue Escorzonera aut Scorzonera ibid.
Tragopog. species, siue Scorzonera humilis latif. 1061.
Tragop. species, siue Scorzonera humilis angustif. ibid.
Tragop. species siue Scorzonera maior angustif. subcaeruleo flore 1062.
Tragop. spicatus tenuif. ibid.
Trifolium minus & minus 1064.
Trif. capitula Glomerato rigido 378.
Trifolium albo-incarnatum spicatum, Lagopus maximum 376.
Trif. angustif. Hispan. siue Lagopus angustifolium flore dilute rubente 377.
Trif. glomerulis Personata Chetleri ibid.
Trifolium paruum rectum flore glomerato cum unguiculis 378.
Trif. cuius caules ex geniculis glomerulos oblongos proferant ibid.
Trifolium glomerulis tormentosis, per caulum longum ducem 379.
Trif. folliculaceum, vesicarium minus purpureum ibid.
Trifolium caule nudo glomerulis glabris: & aliud paruum cum glomerulis lignosum. ibid.
Trif. paruum quiddam suis lotus pratensis purpurea Dalech. ibid.
Trif. minus albo flore incanum Clus. 380.
Trif. pratense flore albo minus, & sem. glabrum ibid.
Trifolium paruum Monspelianum pilosum cū paucis floribus ibid.
Trifolium pratense luteum mas flore minore, semine multo ibid.
Trif. affine quadris. Phenon Lob. ibid.
Trif. pratense album a Fuchs. depictum, siue mas ibid.
Tribulus Terrestris 351.
Trifolium argentatum florib. luteis 359.
Trifolium rectum Monspelianum 359.
Trif. album rectum hirsutum valde 360.
Trif. Halimacabum, siue vesicarium 361.
Trifolium in genere 362.
Trifol. siue Lotus Hieracium, edulis, filiquosa 365.
Trifol. Asphaltites siue bituminosum odoratum, & non odoratum 366.
Trifolium Americanum 368.
Trif. odoratum siue Melilotus vulg. flore luteo 370.
Trif. Italicum siue melilotus Italis. a Corniculis incurvis 372.
Trif. pratense, & Lotus prat. veterib. & in genere 374.
Trif. maculata & acris 374.
Trif. purpureum vulgare ibid.
Trif. purpureum minus, folio & spica longiore & breviori 375.
Trif. minus Clus. secundum, non albū, sed rubrū ibid.
Trif. minus certum purpureum Clus. ibid.
Trif. montanum minus Thalia, purpureum ibid.
Trif. alpinum Rhaeticum Astragaloides 376.
Trif. stellatum purpureum Monsp. ibid.
Trif. angustif. spicatum 376.
Trif. pratense luteum semina, flore pulchriore, siue Lupulino 381.
Trif. saxatile hirsutissimum siue argenteum ibid.
Trifolium peltatum Creticum 381.
Trif. cochlearium maritimum, Medica marina 383.
Trif. aculeatum Creticum 388.
Trif. palustre 389.
Trif. hepaticum siue Trinitatis herba, flore carul. ibid.

INDEX.

<i>Trif. hepatic. siue Trinitatis herba flore rubro</i>	390.	<i>Typha palustris media</i>	340.
<i>Trif. hepatic. flore pleno</i>	ibid.	<i>Typha minor</i>	ibid.
<i>Trif. Affinis Anonis pusilla glabra fruticans Chert.</i>	394.	V	
<i>Trif. Affinis Anonis minima hirsuta Chertleri</i>	ibid.	<i>Vella Eruca folijs flore violaceo</i>	365.
<i>Triticum veteribus & in genere</i>	399.	<i>Vitis vinifera</i>	67.
<i>Triticum vulgare glumas trititando deponens</i>	407.	<i>Vitis folio Apij</i>	71.
<i>Triticum multiplici spica glumas facile deponens</i>	ibid.	<i>Vini genera tria</i>	87. & 88.
<i>Tritic. rufum Hexastychon</i>	408.	<i>Vini genera varia : Vini natura : Vina factitia : Vina marina : Vinum melitites</i>	88.
<i>Tritic. dictum Far Clusinum Dalech.</i>	408.	<i>Vitis sylvestris</i>	123.
<i>Tritic. cinericeum maximis aristis donatum, trititando glumas deponens</i>	ibid.	<i>Vitis alba siue Bryonia</i>	143.
<i>Tritic. speciosum grano longo</i>	410.	<i>Vitis nigra quibusdam</i>	147.
<i>Triticum sylv. Agriostari Cretensibus</i>	ibid.	<i>Vicia vulgaris sativa</i>	310.
<i>Triticum Indicum</i>	453.	<i>Vicia albo semine</i>	311.
<i>Triticum Pernuvianum album longum</i>	454.	<i>Vicia vulgaris sylv. semine parvo, & nigro frugum</i>	312.
<i>Tuberaria nostras</i>	pag. 12.	<i>Vicia sylv. quasi incana flore albo</i>	ibid.
<i>Tuberaria maior Myconi</i>	ibid.	<i>Vicia sylv. flore albo alia</i>	ibid.
<i>Tuberaria minor Myconi</i>	13.	<i>Vicia luteo flore sylv.</i>	313.
<i>Tulipa siue Lisianarcissus</i>	663.	<i>Vicia sepium perennis</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox flava</i>	666.	<i>Vicia lutea cum galea fusca</i>	314.
<i>Tulipa praeox rubra</i>	ibid.	<i>Vicia multifolia cum latis siliquis</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox alba.</i>	ibid.	<i>Vicia multiflora perennis, nemorensis, siue dumetorum</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox purpurea</i>	667.	<i>Vicia prana, siue Cracca minor, cum multis siliquis hirsutis</i>	315.
<i>Tulipa praeoces varia</i>	ibid.	<i>Vicia siue Cracca minima species, cum siliquis glabris</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox lutea varia</i>	ibid.	<i>Vicia sylv. maxima piso sylvestri similis</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox rubra varia</i>	668.	<i>Vicia aliqua</i>	316.
<i>Tulipa praeox alba varia</i>	ibid.	<i>Vicia sylv. cum Lentis siliqua</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox purpurea varia</i>	669.	<i>Vicia parvum genus, folio longo</i>	ibid.
<i>Tulipa praeox Amethystina varia</i>	670.	<i>Vicia pulchrum genus multifolium, siue species quibusdam</i>	ibid.
<i>Tulipa serotina</i>	ibid.	<i>Vicia quae pitinine Anguillara, lata siliqua, flore luteo</i>	ibid.
<i>Tulipa serotina flava cui quatuor folia in Caule</i>	671.	<i>Vicia folijs Aracus Anguillara</i>	317.
<i>Tulipa serotina rubra</i>	ibid.	<i>Viola Mariana Dodones, quibusdam medium.</i>	804.
<i>Tulipa dubia</i>	ibid.	<i>Virga aurea vulgaris latifolia</i>	1062.
<i>Tulipa coccinea holosericea</i>	ibid.	<i>Virga aurea Solidago Sarracenica latif. serrata</i>	1063.
<i>Tulipa dubia secunda media prima</i>	672.	<i>Virga aurea angustif. siue Solidago Sarracenica</i>	ibid.
<i>Tulipa tertia media secundum genus, flore praecocibus aequali</i>	ibid.	<i>Virga aurea siue Solidagini angustifolia affinis lingua auri Dalechampi</i>	ibid.
<i>Tulipa bulbifera</i>	674.	<i>Voluntus terrestris</i>	160.
<i>Tuliparum icones ex Lobelio, diversa ab ijs quae Clus. habet in postrema historia</i>	ibid.	<i>Vstilago</i>	418.
<i>Tulipa lutea obtusis foliolis florum</i>	ibid.	<i>Vulneraria rustica</i>	362.
<i>Tulipa Phænicea luteis oris, flore spatulo</i>	675.	<i>Vua monstrosa barbata</i>	75.
<i>Tulipa Coccinea Puniceave rutilans</i>	ibid.	<i>Vua passa</i>	85.
<i>Tulipa coccinea candidis oris</i>	675.	Z	
<i>Tulipa rubra oris & vaginulis albis</i>	ibid.	<i>Zea in genere ex veteribus & neotericis</i>	410.
<i>Tulipa nivea tota</i>	ibid.	<i>Zea siue Spelta</i>	411.
<i>Tulipa candore & rubore confusa</i>	ibid.	<i>Zea verna Immet</i>	413.
<i>Tulipa pumiles</i>	676.	<i>Zea monococco, Briza quibusdam</i>	413.
<i>Tulipa minor lutea Narbon.</i>	677.	<i>Zedoaria</i>	741.
<i>Tulipa Hispanica Narbonensis</i>	678.	<i>Zingiber & eius Siliqua</i>	743.
<i>Tulipa lutea Bononiensis</i>	ibid.	<i>Zingiber Mechini, rara varietas</i>	746.
<i>Tulipa pumilio angustifolia alba</i>	ibid.		
<i>Tulipa pumilio alba altera Lusitanica</i>	674.		
<i>Turritis pulcha nova</i>	837.		
<i>Typha palustris maior</i>	539.		



Aq. 1 4456186

